

thale pariter; deficiunt enim spiritus refluxum excitantes, vel nervi nimis concidunt. Si extrema frigeant, id fieri vel defectu impetus eo non propellentis sanguinem, vel defectu sanguinis propter parvam copiam eo non provenientis, vel tenuitate tenuissima ejusdem, qua evaporat antequam ad extrema perducatur. Quoniam vero unguium color vividus ab affluxu vividi sanguinis; igitur ipso evaporante, vel non perducto, flos sanguinis perspici per ungues non poterit: subsistet autem ad ipsos pars sanguinis crassior destituta qua impetu partium quā pressione sanguinis continuè naturaliter affluentis; igitur ungues subnigri, seu lividi videri debebunt. Sed & incurvabuntur; cum etenim hærent carni ad summos digitos, & defectu humorum exsiccantur, retrahetur pars extans versus cohaesionem cum carne, unde fient incurvi. Quarta igitur, aut septima morietur sic affectus æger. Si autem copiosa haemorrhagia narium succedat, minuetur copia sanguinis, qui ceteroquin pulmonem infarcire magis debuisset, unde motus peristaltici validiores, & expressio materiae ad locum inflammatum subsistentis. Simile continget per aliam quamlibet evacuationem materiae, qua pulmo levari posit, cuiusmodi sunt materiae biliosæ, quibus fit inflammatio magis incensa, sicca nempe, & ejusmodi evacuationes, si fiant cum signis coctionis, & diebus criticis, & inflammationi suppuratae non succedit empyema, sed ejus expurgatio per urinam aut alvum, æger evadere facile poterit. Est igitur peripnevmonia inflammatio, erysipelas &c. sincera, vel notha cum febre acuta continua, aliisque expositis affectionibus ab aliqua ex iis causis producta, & essentialis quidem, cuius causa in ipso pulmone est, per consensum, cuius causa aliunde in pulmonem traducitur.

Quæ ad salutem.Quid sit peri-pnevmonia idio-pathica, & sym-pathica.

## PLEURITIS

### Seu Dolor lateris, seu Inflammatio Pleuræ, ubi etiam inflammatio Diaphragmatis.

**C**um inflammata est solum Pleura, dicitur pleuritis legitima; cum vero musculi intercostales, & reliqui aliquando ad usque cutim, ita ut hæc ipsa exterius liveat (ac tum ejusmodi pleuritici icti, vel considerati dicebantur) nuncupatur spuria. Alia rursus sicca, alia humida: illa,

la, cum nihil per tussim redditur: hæc cum aliquid. Rursus alia ad claviculas tendens, in qua dolor sublimior, alia ad præcordia, in qua humilior.

### Antecedentia.

**E**adem sunt, ac in peripneumonia, eodemque modo deducetur ipsorum necessitas, nisi quod humida, & frigida in pleuritide operantur per contactum externæ cutis, in peripneumonia per contactum interiorum tunicarum pulmonis.

### Conjuncta.

**D**olor lateris acutus pectorius: febris acuta continua: respiratio difficultis, parva, frequens, pulsus durus, parvus, frequens: tussis molesta, siccata vel humida, aliquando cum sputo sanguinis, quæ omnia in principio mitiora sunt, in augmento graviora evadunt, sputum fit copiosius. In statu, vehementiora symptomata, inquietudo, delirium, dolor capitis. Si ad salutem fiat gradus, sputum concoctum, liberum, & copiosum. Similiter autem quemadmodum peripneumonia potest esse à sincero sanguine, & verè inflammatio, & ab admixtis humoribus, ita etiam pleuritis, eaque differentias arguunt signa propria cujuscunque humoris. Sunt pleuritides, quibus laborantes in latus affectum decubere possunt: sunt quibus in oppositum, non in affectum: reliqua eadem possunt, quæ in Peripneumonia recensuimus. Cum notha autem pleuritide mitiora omnia conjuncta sunt, ita ut nec adsit febris aliquando.

### Succedentia.

1. Aph. 12.

5. Aph. 8.

5. Aph. 15.

7. Aph. 11.

**I**N Pleuritide si statim circa initia sputum appareat, morbum breviat, sive rò postea appareat, producit. Qui Pleuritide laborant, nisi intra dies quatuordecim supernè repurgentur, iis in empyema fiet morbi permixtio. Qui ex Pleuritide empyi fiunt, si à ruptione intra dies quadraginta sursum purgantur, liberantur, alioqui transeunt in tabem. A pleuritide peripneumonia malum. Succedere autem poterunt eadem, quæ Peripneumonia, & vide pulcherima in Coacis, & prognosticis.

Quoniam pectus est instrumentum respirationis, atque ut moveatur, distrahi & contrahi debent musculi, & membrana succingens, seu pleura; debebunt igitur hæc singula ad hos motus liberè & absque dolore subeundos permanere in sua molitie, & ductilitate, non autem dirigere, & durescere,

scere, quo in flammam intemperie dolos, & quidam gener ex vis, c. pneumonia, q. mationem difcitem pulm. sanguinem è agglutinatio etiam prolic factum latus s. nit, quarru impediat mod decamben pleura, quod dentia autem pa. tantum temporis prehensum, parti. Et naque pleuritis reca cosinus, tufta ab aliq. sympathica, ut

Gum aut cit, extendatur precipios, hi pleure ipsum Paraphrenitid Paraphrenitus

Se

Peripne  
cujus.

scere, quo in statu dolor, & à motu periculum divulsionis imminet: inflammatis autem earum partium quibuslibet durescunt eadem: hinc igitur dolor, & quidem in membrana annexa ossibus pectorius, ut de dolore in genere diximus. Difficilis respiratio &c. propter molestiam intra pectus: tussis ex iis, quæ de russi scripsimus: ab inflammatione febris, ut in peri-pneumonia, quando febris inflammatione non præcedit: pulsus per inflammationem durus &c. sputum per exsudationem in cavitatem pectoris, superficiem pulmonis extimam, hinc in arteriam asperam. Posse autem etiam sanguinem è membranis exsudare, patet ex suictibus, quibus per labiorum agglutinationem cum carne livor in superficie cutis producitur, & sanguis etiam prolicitur. Reliqua patent; decubitus enim in oppositum, vel affectum latus majorem solum, aut minorem inflammationem arguere poterit, quarum illa pressionem à pulmone incumbente non patiatur, vel nimis impedit motum pectoris premente eo toto corpore in ipsum læsum latus decumbente: hæc vero patiatur, nisi id proveniat à coitali pulmonis cum pleura, quod frequentissimum in hoc morbo est, ut observavimus. Succidentia autem partim sunt merè historica desumpta ab ipsa natura, exigente tantum temporis ad coctionem, & ex observatione ita se rem habere deprehensum, partim ex se ipsis, & quæ de Peripneumonia scripsimus, patent. Est itaque Pleuritis inflammatio Pleuræ, vel musculorum Pectoris cum febre acuta continua, dolore lateris pectoris, respiratione difficiili, pulsu duro, tussi &c. ab aliqua ex his causis producta, eritque similiter idiopathica, vel sympathica, ut de Peripneumonia dictum est.

Cum autem pleura ad diaphragmatis superficiem, quæ pectus respicit, extendatur, & ipsum diaphragma musculorum pectoris unus sit, atque præcipius, huc etiam referenda est inflammatio diaphragmatis, vel partis pleure ipsum succingentis. Sed totum hunc Morbum explicavimus sub Paraphrenitidis titulo, cum præcipuum ex conjunctis habeat phrenitidem, & Paraphrenitis vulgo nuncupetur.

## EMPYEMA, Seu Puris collectio in Cavitate Pectoris. Antecedentia.

Peripneumonia, pleuritis, pulmonis Vomica, derivatio sanguinis, vel cuiuslibet aliis humoris, chyli, lymphæ &c. in pus mutabilis facta in

Aaaa

cavita-

Quid sit Pleuritis idiopathica, & sympathica.

Inflammatio Dia-phragmatis.