

Oder: Man giebt dem größern Vieh jeden andern oder dritten Tag (weil es sehr stark davon angegriffen wird,) nüchtern ein Pulver von Nro. 7. und läßt es acht Stunden darauf fasten. Dem kleinern Vieh giebt man nur den dritten Theil eines solchen Pulvers. Sowohl dem größern als dem kleinern Vieh werden überhaupt nur 5. bis 6. Pulver gereicht.

Die angezeigten Mittel.

Nro. 1.

Gemeines Blasenpflaster.

Nro. 2.

Nimm Basiliconsalbe 6. Loth.

Spannischfliegenpulver $1\frac{1}{2}$. Quent.
und vermische sie.

Nro. 3.

Nro. 3.

Nimm Gereinigtes Quecksilber 2. Loth.
 Serpenthin 1. Quentlein.
 Frisches Schweinschmalz 4. Loth.
 und bereite daraus eine Salbe.

Nro. 4.

Nimm Galappenvurzel, 12. Gran.
 Rhabarber
 Galappenharz, mit Pin. abge-
 rieben.
 Versüßtes Quecksilber.
 von jedem 5. Gran.
 Mache mit Balsamischen Syrop 12.
 Willen daraus. Eine Dose für
 einen Erwachsenen.

Nro. 5.

Nimm Kampfer 24. Gran.
 Gereinigten Salpeter 1. Loth.
 Citronmorsellen $\frac{1}{2}$. Loth.
 Mache es zu Pulver und vertheile die-
 ses in 12. Briefe.

Nro. 6.

 No. 6.

Nimm Spanisch Fliegen Pulver
4. Gran.

Versüßtes Quecksilber 8. Gran.

Kampfer 40. Gran.


Mache mit Tragantschleim 30. Pillen
daraus.


No. 7.


Nimm Wurzeln der Belladonna,
18. Quentlein.

Mache sie zu Pulver, und vertheile
dieses in 6. gleiche Briefe. Ein
Brief ist die Dose für großes Vieh.









Inches

1 2 3 4 5 6 7 8

Centimetres

1 2 3 4 5 6 7 8

Blue

Cyan

Green

Yellow

Red

Magenta

White

3/Color

Black

TIFFEN® Color Control Patches

© The Tiffen Company, 2007