

Annotatio 1. Panem quarta hora exire, hunc pisces sequi, demum s. 6. 7ma hora carnes expelli WALAEVS. Semel sedecim horis caro morabatur in ventriculo. Ad septimam, octavam horam, utique in urbanis nec fortibus dura, carnosae, auide deglutita retineri per signa adnotavi.

Annotatio 2. In homine, cui intestinum per latus vlcere apertum, cereuisia hora altera, horaei fructus & legumina post duas, caro & panis ad nonam horam, butyrum tardissime, etiam tertio die exiit. *Ephemerid. N. C. Vol. 10.*

Annotatio 3. Post expulsam cibum sequitur quies ventriculi — adtractio lenta — vis neruea augetur — tandem oritur irritatio interna, expergiscitur appetitus, nascitur fames.

Annotatio 4. Quae celeris & tardae euacuationis causae? Cur pinguiam tamdiu morantur? cur in nonnullis tardissime? Exempla celeris euacuationis. Quid cacostomachus? Quodnam huic malo remedium? An stomachica? Signa ex tardiori euacuatione pro medico.

C A P V T III.

ACTIO PANCREATIS.

§. 1.

Pancreas; eius situs.

Glandula est praelonga, conglomerata, salivialis.

Ponitur

Ponitur retro ventriculum & lienem sub hepate. Incipit ab ipso liene, dextrorsum fere transuersum & antrorsum producitur, rotundo demum capite duodeno toti innascitur.

§. 2.

Fabrica

Huius glandulae eadem est, quae saliuilibus. Componitur nempe ex lobulis & acinis rotundis multa tela cellulosa connexis.

Vasa multa habet, neruos exiguos. Oriuntur isti a plexu posteriori ventriculi & hepatis. Parum sentit, aut obscure.

§. 3.

Secretio.

In minimis huius glandulae acinis segregatur de sanguine humor aquosus, sapore subalfo, etiam inspidus, saliuae similis.

Annotatio. Copia succi definiti nequit; non exiguum esse colligas ex magnitudine glandulae, ductus excretorii, & officii ratione. Experimenta vi facta nihil docent. *

§. 4.

Ductus glandulosus.

Separatum in acinis succum euehit ductus magnus membranaceus, diametro calami maioris minorisue, qui nascitur ex minimis radiculis, quas acini emittunt.

E 2

Per

* GRAEFII, SCHVYLII experimenta.

Per glandulam totam medius decurrit; emergens descendit ad intestinum duodenum, eadem sede, qua choledochus, in sinum intestini producitur, & recepto choledochu in cauum intestini aperitur.

Annoatio. Eius fluentum augent forte incumbentia viscera? hepar, ventriculus lien. An plus eius expellitur tempore digestionis?

§. 5.

Utilitas pancreaticis.

Duplex succi huius utilitas esse videtur.

Canalis pancreaticus, eodem loco, quo choledochus in intestinum aperitur: succus ipse salialis est. Ergo diluere bilem eamque vi noua saponacea acuere; deinde soluere, quod adhuc in massa cibaria crudum est, huius succi munus esse videtur.

CAPVT IV.

ACTIO LIENIS.

§. 1.

Lien, eius nexus.

Est viscus molle, cruentum, liuens, oblongum, quod in laterali & posteriori parte sinistri hypochondrii locatur.

Connectitur ventriculo per omentum minus, septo transuerso per ligamentum; sustentatur a proximo colo; conuexa parte costis respondet.

§. 2.