

## CAPUT V.

DE

# SANGUINEARUM EVACUA- TIONUM NATURALIUM SUP- PRESSIONE.

I.

*S*uppresso evacuationum sanguinearum naturalium, est defectus illarum hæmorrhagiarum, sive totalis, sive quoad partem, quæ in statu naturali pro conservanda sanitatem adesse possent, aut deberent.

SCHOL.

Haud itaque in præsentiarum nobis sermo est de omnium & singularum hæmorrhagicarum evacuationum suppressione: quoniam aliquæ illarum sunt, quæ vel violentæ, vel ad minimum morbose, imo positive noxiæ existunt, quotiescumque sc̄e exserunt: ideoque sui considerationem hac ratione non merentur, quin potius optandum esset, ut semper suppressæ manerent; ad quarum classem pertinent hæmorrhagia vulnerum, hæmoptysis, vomitus miętusque cruentus, & varicum hæmorrhagia, quippe quæ vel nullum sanitati commodum notabile adferunt, vel læsiones partium solidarum nobiliorum producunt, vel ad minimum officium earundem præsentia sua lèdunt, multasque in œconomia naturali turbas causantur.

II.

Hæmorrhagia, de quibus hic nobis sermo est, ad statum naturalem & sanitatis sunt vel absolute necessaria, vel ad minimum ita utiles, ut pro integritate sanitatis conservanda, ab ipsa natura, vel certo ordine, stataque periodo, vel sine ordine quidem, repetito tamen suscipiantur & continuentur.

O 3

SCHOL.

## SCHOL.

Prioris classis sunt menstruae & lochiales evacuationes, in foeminis puberibus, & nuptis, a decimo quarto ætatis anno ad quadragesimum nonum usque familiares.

Ad alteram pertinent hæmorrhoides præcipue internæ, in viris potissimum certæ ætatis occurentes, aut etiam externæ, aliquando statui prægnationis foeminarum supervenientes: & narium hæmorrhagia utriusque sexui, diversæque ætati solennis.

## Hæmorrhagiæ narium suppressio.

## III.

*Hæmorrhagiam narium suppressam nominamus, quando hæc excretio sanguinea, vel in dispositis, plane non succedit, aut rarissime se exserit, vel in adsuetis ante debitum terminum, & ultra consuetudinem, aut plane cessat, aut ad minimum itidem rarioribus recursibus, vel admodum parce succedit.*

## SCHOL.

Per dispositos ad hæmorrhagiam narium illas intelligimus personas, quæ ratione ætatis & temperamenti facilius & naturali ordine huic excretioni subjectæ esse possent, quales sunt pueri, juvenes, & de cholericō aut sanguineo temperamento potissimum participantes: quemadmodum per adsuetos, illos indigitamus, quibus actu vel sub consueta ætate, vel etiam post illam, hæc excretio solennis fuit, nunc autem vel penitus cessat, vel parcissime succedit,

## IV.

*Hoc ipso etiam subjecta declaramus, quæ huic suppressioni obnoxia sunt, pueros nempe & juvenes, eosque, qui ultra hanc ætatem hæmorrhagiam narium solennem experti fuerunt, aut experiri potuerunt.*

## V.

*Subjectum speciale itidem constituunt nares, sicut in hæmorrhagia ipsa.*

## SCHOL.

DESANGUINEATIONE  
ales evacuationes, in for-  
tis anno ad quadragesimam  
principue interne, in via-  
externæ, aliquando fluxus  
narium hemorrhagia cum  
n suppressio.  
u nominamus, quan-  
plane non succedit, &  
e debitum terminum,  
aut ad minimum inde-  
arce succedit.  
am illas intelligimus perfos-  
& naturali ordine hinc ex-  
juvenes, & de cholerico n-  
ipantes: quemadmodum  
ub confusa estate, vel eti-  
item vel penitus celsit, ve-  
us, que huic suppressio-  
nes, eisque, qui ultra la-  
nem experti fuerunt.  
ituent narces, fatus bene

**EVACUATIONUM NATURALIUM SUPPRESSIONE. III**

SCHOL.

Quando nempe illarum vascula, & fibrofa compages vel obstructa, vel stricta sunt, ut sanguini egressum non concedant; ita tamen, ut sub molestiis, suppressionem fluxus sequentibus, partes quoque vicinæ symptomatum subiecta evadant.

**VI.**

*Causam bujus suppressionis materialem proximam sup-  
ditat sanguis, vel quantitate, vel consistentia, vel denique pe-  
culiariter crassi lesus.*

SCHOL.

Quantitas sanguinis in hoc casu ut plurimum peccat excessu, vel ad minimum sub plethora commota, unde vasa sanguifera cum intersticiis fibrosis nimium infarcta, membranam narium ita tendere valent, ut via excretionis præcludatur.

Quoad consistentiam læsam, in considerationem venit ejus spissitudo, quæ exiliora vasa, eorumque ostiola oppilando transitum prohibet, exitumque impedit.

Sub crassi peculiariter læsa denotamus in specie impuritates mucido-viscidas, aliquando sanguini fese intermiscentes, a quibus non modo sanguinis motus ipse retardatur, sed viæ etiam, per quas hæmorrhagia succedere deberet, oblinuntur, obstruuntur.

Antecedentes harum læsionum causas, ideoque respectu suppressionis hæmorrhagiæ remotiores, hic non repetimus, cum Cap. II. §. 13, jam-jam ex parte indigitatæ sint.

**VII.**

*Sicuti in materia movenda, ita non minus in partibus so-  
lidis, materia movenda viam largientibus, causa suppressæ ha-  
morrhagiæ aliquando heret.*

SCHOL.

Permeabilitatem vasorum atque fibrosarum partium, æque ac debitum tonicum robur, pro debito hæmorrhagiarum successu requiri, res est omnibus notissima. Quando itaque hæ partes in naribus vel admodum strictæ & angustatae, vel ultra modum relaxatae existunt, successus hæmorrhagiarum intercipitur: in priori quidem casu positive: in altero autem priva-

privative, dum sanguinis decubitui quidem viam concedunt, sed defectu roboris naturalis laborant, quod tamen pro transpulso sanguinis requiritur.

## VIII.

*Hec partium solidarum in naribus p. n. dispositio varias agnoscit causas occasioales.*

## SCHOL.

Relaxatio enim illa tonica aliquando dependet a defluxionibus catarhalibus serosis, sub coryza aut gravedine prægressis: aliquando a refrigerationibus, extraordinarie ab aëre frigido, simul humido, perpeßis.

Stricatura autem nimia perquam fæpissime originem debet intempestivæ remediorum adstringentium externæ & immediatæ applicationi ad nares, sub turundarum, pulverum stegnoticorum, liquorum stypticorum in nares attractorum formulis, sub prægressis narium hæmorrhagiis paulo largioribus, adhibitæ.

## Menstrui fluxus suppressio.

## IX

*Circamenstruæ evacuationis suppressionem & impeditioñem notandum est, autores diversas ipsius constituere classes, quem tamen, verum si dicere fas est, essentialiter conveniunt, licet quoad gradum, aut speciales quasdam circumstantias ab invicem differant.*

## X.

*Prima, qua circa menstruum negotium a statu naturali contingit, aberratio, dicitur mensum emanſio.*

## SCHOL.

Hæc nihil aliud denotat, quam nimis longam ac diuturnam in juveniis hujus fluxus emanſionem, respectu primæ perruptionis, quando nempe longe tardius quam anno decimo quarto fluere incipiunt.

## XI.

*Alterum gradum suppressionis mensum constituit eorundem imminutio.*

## SCHOL.

EVACUATIONUM NATURALIUM SUPPRESSIONE. II3

SCHOL.

Hæc in eo consistit, quod foemellæ hactenus fluxum menstruum,  
& quidem paulo largiore expertæ, nunc per aliquod tempus, quan-  
titatem fluxus imminutam experiantur, quamvis de cætero ordo & tem-  
pus excretionis conspirent.

XII.

*Tertius gradus est, stricto nomine ita dicta, suppressio.*

SCHOL.

Dicitur autem suppressio mensium, si foemellæ, quibus menses  
jamjam debito ordine, vel aliquoties, vel per longum tempus fluxerunt,  
nunc semel aut pluribus vicibus, totalem hujus fluxus emanationem ex-  
periuntur, ut nihil de illo sentiant; quæ suppressio vel temporaria per  
aliquot menses, vel continua esse potest.

XIII.

*Quartum gradum constituit mensum inordinatus fluxus.*

SCHOL.

Per illum intelligimus, quando menses vel plane irregulari tem-  
pore fluunt, nec tempus solitum quatuor septimanarum servant, sed tri-  
bus, quinque, sex septimanis recurrunt; vel quando statum quidem tem-  
pus servant, sed sub ipso evacuationis decursu, variationes patiuntur, ita  
ut v. g. per unum pluresve dies fluant, mox iterum per aliquot dies sub-  
sistant, & tunc demum denuo prorumpant; quæ constitutio tanto ma-  
gis medicam considerationem incurrit, si repetitis vicibus ita occurrat.

XIV.

*Non minus ad has mensum aberrationes refertur eorum  
decoloratio.*

SCHOL.

Hæc apud Medicos audit, si foemellæ alias sanguinem rubicundum  
ac floridum excernere consuetæ, deinceps loco hujus, vel aqueam sal-  
tem excretionem, loturæ carnium instar, experientur, vel sanguinem  
lividum, tetrise coloribus variegatum excernunt.

XV.

*Ultimam harum aberrationum a regula naturali consti-  
tuit mensum per loca insolita excretio.*

Coschwitzii Pathologia.

P

SCHOL.

## SCHOL.

Quando nempe mensium per ordinata loca fluxu subsistente, temporibus tamen illis menstruis ac debitibus, ex aliis plane locis, licet ad hoc negotium minus commodis & aptis, sanguis profluit, & ordinem illum menstruum semper servat, siquidem exempla talia, vomitus & mictus cruenti, hæmoptyseos, & hæmorrhoidum, vices menstruæ eva-  
cuationis supplentum, apud autores varie prostant.

## XVI.

*Sicuti mensium negotium sua certo statoque tempore capit initia, ita quoque tandem ad cessationem pervenit.*

## SCHOL.

Vocamus autem mensium cessationem, quando universum negotium menstrui fluxus plane cessat, sine ulteriore recursu, sive id fiat tempore statu atque legitimo, circa septimum ætatis septenarium, (ubi quidem morbi nomen non subit, nec tamen semper ita cedit, ut nullam considerationem medicam mereatur) sive præmature ante dictum ætatis terminum consuetum, ubi utplurimum ejusmodi post se trahere solet turbas atque molestias, ut sæpiissime consilio & auxilio Medici fœminæ indigeant.

## XVII.

*Subjecta omnium harum afflictionum sunt fœmini sexus persona, que ultra pubertatis annos adscenderunt, & intra hos, ac quinquagesimum ætatis annum vivunt.*

## SCHOL.

Sicut enim negotium menstruum a secundo annorum septenario circiter ordinarie incipit; ita ante dictum terminum ejus turbationes querere velle, incongruum esset: unde solum in illa ætate sexui sequiori eveniunt, sub qua totum negotium viget. Et cum ultimus ipsius terminus circa quinquagesimum annum ordinarie positus sit, neque post illum easdem amplius expectare licet: quamvis non negandum sit, quod ipsa quoque cessatio frequentissime tales post se relinquat effectus molestos, qui multum laboris, & fœmellis & Medico parere possunt.

## XVIII.

*Subjectum speciale omnium horum affectuum constituit prin-*

DE SANGUINE ARCI  
L.  
inata loca fluxu substitutae;  
s, ex aliis plane locis, de-  
s, sanguis proficit, & o-  
dem exempla talia, vnu-  
rthoidum, vices mentira-  
rie profant.

---

EVACUATIONUM NATURALIUM SUPPRESSIONE. II5

principaliter uterus, cum vasis sanguiferis, illum perreptan-  
tibus.

SCHOL.

Cum enim hic primarium excretionis hujus constituant organum &  
subjectum, non potest, quin etiam pathematum morbosorum hic occur-  
rentium subjectum existat: excepto tamen illo casu, in quo de excre-  
tione mensium agimus per loca insolita, ubi ad minimum uterus cum  
suis vasis haud solitarie pro subjecto venditari potest: cum illæ quoque  
partes hunc censem subeant, per quas insolita exertio contingit; uterus  
vero cum vasis illum perreptantibus, subjectum potius causæ in hoc  
casu aliquando constituere possit.

XIX.

*Cause proximiores hoc spectantes generaliter querenda  
sunt partim in materia movenda, partim in viis, per quas ma-  
teria moveri debet.*

SCHOL.

Utriusque enim debet adesse proportionata habitudo, si debitus  
mensium successus & progressus speratur. Deficiente enim debita ma-  
teriæ movendæ mobilitate aut quantitate, nil proficit viarum optima  
dispositio: sicuti materiæ movendæ legitima dispositio nihil juvabit ne-  
gotium, si viæ fuerint præclusæ, per quas salutaris hæc excretio con-  
tingere, & absolviri debet.

XX.

*Sanguis itaque, quemadmodum materiam movendam, &  
causam materialem proximam in hoc negotio constituit, ita in  
producendis illis recensitis mensium anomaliis in culpa esse potest,  
tam quantitate quam qualitate peccans.*

SCHOL.

Respectu quantitatis, abundantia ipsius aliquando in culpa est, dum  
vasa nimium infaciuntur, & fibræ partium inter se invicem compri-  
muntur, earumque interstitia coarctantur, ut ita transitus ipsi sanguini per  
partes denegetur, nec non eo ipso sanguinis spissitudo acceleretur, va-  
riisque stasis & obstructionibus via sternatur.

Alio respectu peccare quandoquidem potest defectus; deficiente enim debita materiæ excernendæ quantitate, haud mirum est, ipsam excretionem deficere, præcipue cum in præsente casu materia talis sit, ut aliis quoque usibus in corpore inserviat: quos inter nec ille minimus est, ut ipsis partibus fibrosis ac vasculosis debitum robur largiatur, quo tanto melius motus per illas perpetrari possint.

Qualitas aut crasis lœsa hic causam constituit, quando sanguis peccat vel spissitudine sola, ideoque ad promptiore motum ac transitum per partes solidas ineptior redditur; vel, quando simul mucidis viscidisque impuritatibus refertus, lentorem concipit, & partim propriam mobilitatem amittit, partim obstructionibus vasorum atque viarum simul materiam suppeditat.

### XXI.

*Viae, per quas sanguis in locis, huic excretioni dicatis, moveri debet, duplice respectu causam morbificam constituere possunt.*

#### SCHOL.

Vel enim in causa est illorum strictura nimia & coarctatio, quæ positive sanguini in his locis transitum non concedit, atque effluxum impedit: vel ex opposito peccat viarum atonia, & nimia laxitas, quæ quidem ingressum sanguinis permittit, sed decubitus & infarctibus viam sternit, nec ad expulsionem debitam sufficit, cum tamen hæc excretione non nudo passivo profluvio, sed actuali expressione, (de qua motus tractorii in lumbis & regione pubis sœpe testantur) a natura celebretur, ad quam debitum tam vasorum, quam partium vicinarum robur tonicum requiritur.

### XXII.

*Remotiores & antecedentes cause querende sunt partim in temperamento, partim in genere vite, dieta, & morbis pregressis.*

#### XXIII.

*Temperamentum variis modis remotiorem impediti fluxus menstrui causam constituere potest.*

#### SCHOL.

## SCHOL.

Ita enim temperamentum phlegmaticum maximopere impuritatibus mucidis ac viscidis scatet, seroque impuriore abundat, nec non præ reliquis partium fibrosarum laxitati subiectum est, & facilis atonia laborat.

Temperamentum sanguineum facilis sanguine in genere abundant, nec non post phlegmaticum facile toni relaxationem patitur.

Cholericum animi pathematis iracundis præ aliis afficitur, unde ad varias motuum anomalias, easque pertinaciores dispositum existit.

Melancholico familiaris est sanguinis spissitudo, & partium fibrosarum major stricatura, quæ tanto magis augetur, si animi pathemata meticulosæ, terrificæ, accedunt, variisque restrictionibus sanguinis ansam præbent.

## XXIV.

*Ad vitæ genus non minus inter causas horum affectuum respiciendum est, quippe quod diversimode symbolum suum conferre potest.*

## SCHOL.

Præcipue hoc fit, quando per vitam sedentariam, aut speculabundam, motus sanguinis transpressorius, per partes solidas sufflaminatus, ipsius spissitudinem post se trahit, aut per nimis mobilem, in statu plethorico orgasmicæ commotiones sanguinis excitantur, quibus non minus debitæ excretiones sufflaminantur, & extraordinarii infarctus producuntur: aut sub fessione continua, abdomine compresso facta, viscera abdominis, eorumque vasa comprimuntur, & sub respiratione parciore accedente, circulus sanguinis per vasa abdominis retardatur.

## XXV.

*Simili modo diæta vitia multum hic conferunt.*

## SCHOL.

Diæta enim lauta, plena atque vinosâ, præter quod statum plethoricum physice augeat, commotiones quoque orgasmicas in masla sanguinea producit, atque hoc pacto infarctus auget, liberumque ejus transitum per subtiliora vasa facile sufflaminat, & hoc tanto certius, quo magis vita otiosa aut sedentaria concurrit; sicuti diætæti errores circa cibos vappidos,

mucidos, concoctu difficiles, adstringentes, fermentescibiles, commissi, tam disperasiam sanguinis mucidam ac lentam, quam cardialgias, & hinc spasticas in vicinia partium contractiones, verasque stricturas inducere valent.

## XXVI.

*Pariter morbi pregressi sapissime banc causarum classem subeunt.*

## SCHOL.

Hoc fit, quando vel sanguinis defectum, viriumque motricium debilitationem producunt, vel quando male tractati, variis motuum anomaliis ansam suppeditant. Id quod satis frequenter accidit a febribus, aut haemorrhagiis, per adstringentia intempestive cohibitis, atque suppressis, aut aliis spasticis, hypochondriacis affectibus, per opia atque anodyná, neglecta vera causa, palliative curatis.

## XXVII.

*Ad occasioales causas merito referimus animi pathemata, quippe que sapissime repentinam hujus negotii mutationem inferunt, aut turbas productas pertinaciores reddunt.*

## SCHOL.

Ad repentinás turbationes menstrui fluxus plurimum faciunt ira & terror: illa quidem tam humorum exagitationes orgasticas concitando, quam partium solidarum stricturas spasticas producendo: hic vero potissimum restrictiones humorum, per inductionem spasmorum, excitando: sicut mox maximopere atoniam & debilitationem fibrarum motricium, humorumque spissitudinem producendo, turbas inducetas pertinaciores reddere solet. Id quod semper tanto certius succedit, si dicta animi pathemata in tempora fluxus menstrui solita, sive instantia, sive praesentia incident.

## XXVIII.

*Ad eandem causarum classem quoque referri debent vitia diatetica, specialius circa fluxus menstrui tempora commissa.*

## SCHOL.

SCHOL.

Hoc testantur frequentissime illæ observationes in praxi clinica occurrentes, de mensium suppressione, a pane calido, dulcibus, acidis, aliquo edulio concoctu difficultibus, sub mensium fluxu præsente aut instantे, intempestive ingestis.

XXIX.

*Neque hic excludende sunt partium inferiorum, pedum  
nempe atque abdominis, refrigerationes.*

SCHOL.

Nascuntur enim hinc constrictiones, non modo partes exteriores afficienes, sed ad interiora per consensum partium sese extendentes: cuius rei exempla sufficientia e praxi adduci possunt, de mensibus suppressis aut impeditis, quando foemelle loturæ linteorum, pedibus in amne frigido stantes, vacarunt, vel alias vehementiores perfrigerationes percessæ sunt.

XXX.

*Sub mensum emanatione prima haud raro huic causarum  
classi adnumerare debemus vermes.*

SCHOL.

Siquidem hi primæ ætati magis solemnes esse solent, ita facile tunc temporis adhuc in dispositis corporibus restant, & sicuti ordinarie & fere semper convulsiva & spastica symptomata in intestinis, eorumque confiniis excitare solent, ita etiam faciliter negotio similes stricturas in mensenterio, vasisque interspersis, ad uterum quoque tendentibus, & in membranis illa involventibus, producere apti sunt.

## Lochiorum suppressio.

XXXI.

*Lochiorum suppressio est defectus illius profluvii sanguinis,  
quod ordinarie puerperæ post fætus & secundinarum exclusio-  
nem experiuntur.*

XXXII.

*Subjectum hujus affectus solitarie constituunt puerperæ.*

SCHOL.

## SCHOL.

Cum enim fluxus lochialis unice sit consequens partus & puerperii, alio tempore haec suppressio contingere nequit, quam in puerperio.

## XXXIII.

*Subjectum speciale idem est, quod in affectu proxime antecedente declaravimus.*

## XXXIV.

*Cause generaliores & antecedentes quoque, tam materiam, quam vias respicientes, eadem plane subesse possunt, quas modo in affectu proximo recensuimus.*

## XXXV.

*Occasionalem proximam causam ordinarie constituunt vehementes ac repentina spastica & strictura, circa uterum ejusque confinia contingentes.*

## SCHOL.

Hisce occasionem ut plurimum praebent, vel animi pathemata iracunda, aut terrifica, vehementiora ac repentina: vel refrigerationes partium inferiorum, sub partu, aut post illum, admisitae: vel denique dolores post partum, aut exclusionem secundinarum violentam remanentes, in spasmos vehementiores demum degenerantes.

## Hæmorrhoidum suppressio.

## XXXVI.

*Hemorrhoides suppressas vocamus, quando excretio sanguinea, qua aliquando in personis dispositis per venas sedis intestino recto contingit, vel per notabile atque insolitum tempus, vel totaliter, supprimitur.*

## XXXVII.

*Subjecta hujus morbi equidem in utroque sexu occurruunt, verum-*

verum tamen rariora sunt e sexu sequiori, frequentiora e virili,  
ubi tamen etatis conditio simul conspirat.

## SCHOL.

Etiamsi fluxus hæmorrhoidalis sexui muliebri in totum non denegetur, experientia tamen comprobatum habemus, hunc fluxum mulieres saltem quasi ex accidenti, & a causis occasionalibus, aut plane individualibus, experiri: viros autem frequentiore numero eidem subjici, ita tamen, ut neque totus virilis sexus, neque omnis ætas ipsi subiicitur, sed certa dispositio temperamentorum, & ut plurimum ætas quadragesimum annum superans, accedere debeat: unde suppressiones hujus fluxus haud in aliis, quam hujus conditionis personis quærenda erit.

## XXXVIII.

*Pars, quæ specialiter in hac suppressione afficitur, est intestinum rectum, cum vasis hæmorrhoidalibus dictis illud per currentibus.*

## SCHOL.

Notum est ex anatomicis, quod vasa hæmorrhoidalia sint vel interna, vel externa, quorum illa a ramo V.P. hæmorrhoidalii, hæc primitio ab iliacis, secundario ab hypogastricis oriuntur, illa ad interna intestini, hæc ad externum ipsius limbum excurrunt. De prioribus itaque magis dicendum est, quod partem affectam constituant; præ reliquis, quoniam fluxus etiam internarum hæmorrhoidum maximopere contingit; per externa vasa autem hic fluxus, propter densitatem integumentorum, rarissime succedit.

## XXXIX.

*Causarum, hanc suppressionem producentium, enodationi merito supersedemus, cum essentialiter eadem plane sint, quas sub mensum suppressione recensuimus, quapropter applicationem illarum ad presentem quoque affectum commendamus.*