

CAPUT III.

DE

LUE VENEREA CUM ADNEXIS.

I.

*L*ues venerea est morbus contagiosus, chronicus, peculia-
rem humorum lymphatico-salivalium, & sanguinis
impuritatem viscido-salsam & acrem producens:
primordialiter ab impura venere oriens, variis tamen modis,
communicabilis, suamque tragœdiam in partibus tam fluidis
quam solidis, diversis cruciatibus ludens.

SCHOL.

Luem venereum morbum esse, Germanis neque ab omni ævo no-
tum, neque omni tempore adeo familiarem, quam nostris temporibus
existit, res est notissima. Ante navigationem enim Columbi ad oras
Americanas, notum fuisse hunc morbum, haud constat: sed ab illius con-
fortibus, dum reverterentur, ad Hispanos, & abhinc in obsidione Neapo-
litana ad Neapolitanos, & hinc simul ad Gallos translatum fuisse, historia
testatur, unde quoad prima sua incunabula morbus Americanus nomina-
ti meretur.

Accepit autem, secundum hunc sui progressum ad varias regiones
earumque incolas, varia quoque nomina, titulosque diversos: unde ab
Hispanis variolarum Hispanicarum, a Neapolitanis, morbi Neapolitani, &
a Gallica natione morbi Gallici, vel der *François* nomen ac titulum ob-
tinuit, atque hunc ultimum quasi proprium in hunc usque diem retinuit,
ut vulgo alio nomine non insigniatur: nisi quod medici, ad causas ipsius
magis respicientes, luis venereæ nomen ipsi imposuerint, cum hic mor-
bus tanquam lues contagiosa familiarissimus & ordinarius sit illis utrius-
que sexus personis, que illicita venere utuntur, ejusque castris sese de-
derunt, & loco stipendi illum inde reportant: qui variis hinc pathema-
tibus complicatis, ulceratoriis mali moris, præcipue circa genitalia & par-
tes glandulosas faucium, colli, narium, inguinum, nec non dolorosis ar-
thriticis & osteocopis circa ossa cranii, scapularum, humerorum & tibia-
rum,

rum, tempore nocturno præcipue ingravescentibus: aut nodosis, atque tophaceis, gummiosis, in summo capite, fronte, artibus, & locis tendinosis fœse manifestare solet.

II.

Subjecta hujus affectus, quæ ipsum vel totum, vel ex parte experiuntur, duplicitis sunt generis.

SCHOL.

Vel enim ex propria culpa hoc sibi contrahunt malum, & hujus ordinis alia non sunt, quam ejus ætatis personæ, ut annos pubertatis transgressæ, lusibus venereis indulgere valeant, sine discrimine temperamenti aut sexus: si nempe causam primariam antecedentem, concubitum puta impurum, non evitaverint.

Vel ex causis occasionalibus & externis eidem subjiciuntur: & hanc si respiciamus classem, ab illa neminem excludere possumus, cuiuscunque ætatis, sexus aut conditionis fuerit, cum tristis observatio doceat, pueros atque infantes æque ac adultiores ac senes, viros pariter ac mulieres, juvenes cum virginibus, maritatas & non maritatas, ab illo corrupti: ubi tamen notandum, non apud omnes ab iisdem antecedentibus specialibus causis, neque uno eodemque modo ac gradu dictum affectum ori.

III.

Speciale subjectum cum respectu ad certam principalem corporis partem hanc est determinabile.

SCHOL.

De humoribus enim notissimum est & manifestum, quod peculiari impuritate in totum laborent, ipsisque solidis partibus labem communicent; ex solidis autem paucæ excipiuntur, quibus non aliqua ad minimum labes adfricetur, prout ex historia morbi pathognomonica abundantissime patet.

IV.

Causa materialis proxima lesionis ejusmodi tam in humoribus, quam per humores in partibus solidis, est miasma speciale venereum, per contagium ab uno corpore ad aliud communicatum & translatum.

Coschwitzii Pathologia.

Yy

SCHOL.

SCHOL.

Subtilis equidem & fermentativæ indolis existit hoc miasma, haud tamen ejusmodi subtilitatis, ut instar miasmatum febrilium contagiosorum humorum putredinosam corruptionem inducere posset, sed potius humoribus, præcipue lymphatico - salivalibus, & per hos ipsi sanguini speciale lentorem, mucescentiam & tenacitatem contrahens, quæ tandem in corruptionem falso - ulcerosam abit, partes solidas simul arrodentem, & tendines, membranas, glandulas æque ac alia ossa afficien tem: quæ mucescentia ad sanguinem usque penetrans, in summe infec tis se se haud raro manifestat sub venæctione, quando illorum sanguis refrigeratus non modo speciale lentorem in genere monstrat, sed por tiones viscosas albidas singulariter collectas continet.

V

Causam antecedentem hujus mali proximam nullatenus ponere possumus in rebus naturalibus, aut non naturalibus, earumque abusu, sed in solo contagio, ab aliis corporibus communicato.

SCHOL.

In humoribus enim lymphatico - salivalibus, quatenus in quovis subiecto solito modo constituti sunt, & specialiter liquidum spermaticum & humorem genialem constituunt, ejusmodi corruptionem atque ipsius fundamentum quererere nefas esset, dum ne unicum quidem exemplum allegari potest, quod unquam in homine vel ex seminis abundantia, vel ejus diuturna retentione, vel e contrario, ex immoderato, puro tamen veneris uisu cum conjugie propria ac pura, malum hoc, nedium unicum hujus morbi symptom a esse entiale generatum fuerit.

VI.

Communicatio hujus miasmatis & contagii venerei fit dupli ci modo: uno immediato, altero mediato.

SCHOL.

Inmediatum communicationis modum nominamus, quando sub concubitu cum persona impura alterutrius sexus miasma illud contra hitur, & vel foemella a viro gonorrhœa, aut lue venerea perfecta la borante, vel masculus a foemella, fluorem album malignum experiente, conta-

DE LUE VENERÆ

der, dum pericula illa minora
autem venerei non excidat, c
ontra illorum lœsi infundit, inq
scolcula venerea sui genitale
in feminis prodicunt.
I quibus tamen, vel nimis di
spicere illud latius serpit, & in
venient, unde reliquæ humoribus
nominantur, thymus tamen tryp
tanum generali per totum corpor
i, enque versus modis habet.
Mediator vero communicationis
in uno modo directa concubitus
ab proprio coniuge, communi
tate per velimenvorum,
tum, & oscula ab iunctis soror
i.

Mediator communicationis
spes non sunt, quam illi,
natiuæ sequuntur.

Læze arteriæ facilius datur
v percutere arterias, disper
fuge humerosa infundit post
i percutere craniæ, quo leviter
alii moris producunt.

Unde ab illis lectorum Infectioru
mies faciles venere maxime per
trimenti: a vescicis cruralibus
& pubem, cum rhegmatibus an
spergibus & ferrugines circa
vulvo communis, fuscum &
vix folent: gallos tracto te
sua lepto - lymphaticus communis

YJ 2

gio adficitur, dum particulæ illæ miasmaticæ immediate membris genitalibus cœstro venereo tunc excitatis, calentibus & spongiosis affricantur, porisque illorum fœse insinuant, ibique primo ordinarie effectus suo^s edunt, ulcuscula venerea aut gonorrhœam in viris, fluorem album magnum in foeminae producunt.

E quibus tandem, vel nimis diu occultatis, vel perverse tractatis, contagium illud latius serpit, & successive partes vicinas glandulosas penetrat, unde reliquis humoribus præter & transfluentibus ulterius communicatur, ibique tandem tragœdias suas ludit, donec sub circulo humorum generali per totum corpus diffusum, varias ejus partes obſeat, easque variis modis laedat.

Mediatum vero communicationis contagii modum vocamus, quando quis citra modo citatam concubitus impuri culpam, ab alia persona infecta, sub propinquiore commercio, incisus contagio afficitur: id quod fieri potest per vestimentorum, lectorum, poculorum communem usum, & oscula ab infectis accepta.

VII.

Mediate communicationis contagii effectus tam graves & precipites non sunt, quam illi, qui immediatam contagii communicationem sequuntur.

SCHOL.

Longe tardius succedunt hæ lœsiones, dum maxime externis corporis partibus adhæret contagium, ibique lentiore gradu poros penetrare, seque humoribus insinuare potest, interim autem proxime in cute & partibus cutaneis, pro diversitate medii communicationis, lœsiones mali moris producit.

Unde ab usu lectorum infectorum, & hinc sudore communicato, ordinarie scabies venerea maxime pertinax & pessimæ indolis, ad ferinam pertinens: a vestimentis cruralibus affectus serpiginosi circa crura, scrotum & pubem, cum rhagadibus ani: ab osculis impurarum personarum impetigines & serpigines circa labia & nares: & a poculorum intempestivo communi usu, faucium & uvulæ lœsiones ulceratoriae contumaces oriri solent: a quibus tractu temporis miasma per poros cutis humoribus seroso - lymphalibus communicatur, atque per illos intimius

reliquis partibus affricari potest, ita ut successively, & neglegtis illis lesionibus, totum malum venereum inde ortum capere possit.

VIII.

Longe autem gravior contagii translatio est, quando teneris aliquando infantibus, citra illorum culpam dira hac lues communicatur.

SCHOOL.

Id quod fieri potest sub ipsa generatione a parentibus impuris, & lue venerea infectis: ubi miseri infantes, parentum peccata luente, miserrimo atque tristissimo modo hoc malo adficiuntur, dum tota humorum massa ita contaminatur, ut sepius summum luis venereæ gradum, per varias externi corporis defecationes adspectui offerant, quamprimum hanc lucem adspiciunt, & quidem upplurimum modo incurabili: cum propter maximam tenellorum teneritudinem debita atque legitima medendi methodus locum non inveniat, quapropter, ut sine omni auxilio miserrime pereant ac moriantur, necesse est.

Ab hoc contagii modo & gradu haud multum discedit alter, quo morbus infantilis lactentibus sub lacte nutricum, hac lue infectarum, affrictantur, quoniam hoc tanquam unicum illorum nutrimentum, a nutrice inquinatum, non nisi omnes humores inquinare ac contaminare potest, unde postea diffuso per humores contagio, effectus ipsius tandem elucescit, per lesiones partibus solidis induelas, faucium nempe erosiones ulcerosæ circa uvulam & tonsillas, aut labiorum oris defecationes ulcerosæ rodentes, consolidationem non admittentes: vel in locis pudendis serpiginosis affectibus sese prodentes; ubi specialiter circa anum rhagades ac verrucæ serpiginosæ, cum infantum contabescentia familiariter apparent. Ubi notabile est, quod in nutricum proprio corpore, nisi admodum graviter infectæ fuerint, haud raro per totum lactationis tempus, fere nihil insoliti aut morbidi sentiatur, sed illæ quasi sanæ adpareant, dum infantuli illis ad tempus loco medicorum sunt, & id, quod alias in proprio corpore conspiciendum esset, lacte detrahunt. Interim tamen non sanantur, sed ordinarie facta ablactatione, malum tandem in ipsis prorumpit, & propriis signis sese manifestat.

Gonor-

Gonorrhœa.

IX.

Gonorrhœa est profluvium p. n. materie fanoſa ulcerofa ex membro virili, cum ardore atque dolore, ab urethra exulceratione modo leviore, modo graviore, ortum ducens.

SCHOL.

Inter affectus ita dictos venereoſ haud ultimus hic est: sed ordinarie quaſi primus, qui impurum concubitum sequitur. Hunc enim excipit primo dolor & ardor cum leviore urethra exulceratione, ab initio quidem, in principio ipsius ſub frenulo, ubi levis aliqua cavitas obſervatur, perſiſtente, poſtmodum vero per longitudinem urethrae ſuccelſive progrediente, & ſepiuſ, ſi prior gradus neſligatur, ad penis radicem, & glandulam proſtatam ſeſe extendeſte: ubi propter continuatatis ſolutionem in parte membranofa & glandulofa ſtillicidium aut profluviuſ materiæ ſubmucide fanoſa, & tandem liquoris genitaliſ, involuntarium & perpetuum, prodiuſt, quem laſionis gradum, ſi diutius du-raverit, & malum ad ſummuſ perveniat incrementum, ſequi potheſt ipſa-ruſ veſicularum ſeminalium eroſio, & tandem ſub hoc rerum ſtatu ve-ri ſpermatis viriliſ involuntaria continua excretio.

X.

Subjectum gonorrhœa generale conſtituit ſexus nobilior, quippe qui ſolus ab illa vexatur.

SCHOL.

Quamvis enim ſequiori ſexui fluor albus familiaris ſit, qui hujus vices ſupplere potheſt, & gonorrhœa muliebris dici, ad minimum tamen ſecundum loquendi modum, in ſcholis medicis receptum, uterque affe-ctuſ ab invicem separatus exiſtit: deinde ætas annos pubertatis ſuperans, & ad exercitia venerea apta: junior tamen præ ſenili, ob rationes partim morales, partim physicas plures; magis ſpecialiter autem huic affe-ctu ſubjiciuntur illæ dicti ſexus, dictæque ætatis personæ, quæ illicita veneare utuntur, atque concubitum cum personis impuris celebra-re ſolent.

Vy 3

XI.

XI.

Speciale subjectum, aut partem affectam, declaramus urethram, glandulam prostatam, & aliquando vesiculos seminales.

SCHOL.

In primo enim principio dolores exulcerationem declarantes persistunt sub glande, e regione frenuli, e quo loco etiam prime guttulae humoris effluentis leni tactu exprimi possunt: successu temporis autem materia acris partim per se, partim sub accessu urinæ transfluæ per reliquum urethrae tractum sese disseminat, & ita successive circa penis radicem glandulam prostatam aggreditur, ubi cum liquido in illa sequestrato fermentescibili concurrens, tanto acrior facta, hic potissimum maximamque lœsionem causatur: quæ lœsio tunc per dolores & cruciatus, in hac regione orientes, agnoscitur, atque ut plurimum hic subsistere solet, nisi forsitan neglectu totius affectus, aut perversa ipsius medicatione, virus illud altius ad vesiculos seminales ducatur, iisque simile damnum minetur.

XII.

Distinguitur gonorrhœa ordinarie in simplicem aut benignam, vel venereum aut malignam.

SCHOL.

Circa hanc distinctionem primo notandum est, gonorrhœam distinctum plane affectum esse a pollutione: quamvis enim vi vocis gonorrhœa significet spermatis aut genituræ profluvium, & hoc intuitu apud lexicographos gonorrhœæ titulus & pollutioni & nostro affectui communis tribuatur, nihilominus tamen usus hucusque receptus sufficienter docet, a medicis plurimis & magis probatis utrumque affectum satis notanter distingui, ideoque apud praticos duplum titulum in usu esse: ut taceam, confusionis fundamentum satis aperte niti ignorantia distinctionis causæ, id quod facile condonandum est antiquitati, ob minorem morborum venereorum notitiam, quippe qui a certo saltem tempore magis magisque innotuerunt.

Unde

Unde primis temporibus harum rerum ignari medici omne profluviū materiae mucidae spissiusculae ex urethra, ob analogiam cum liquido spermatico, pro spermatis aut genituræ excretione habuerunt, ideoque terminum gonorrhœæ a veteribus acceptum, atque ab his pollutionibus tributum, ad hunc nostrum affectum applicarunt, quem errorē per multa tempora durantem alii recentiores probabiliter emendārū, novum pollutionis titulum pro meliori affectuum distinctione introduxerunt, eumque vero seminalis materiae profluvio & excretioni involuntariæ tribuerunt, gonorrhœæ titulum nostro affectui præsenti relinquentes.

Hinc factum videtur, quod speciem aliquam pollutionis, in se sane oppido raram, gonorrhœæ titulo insigniverint, & cum hæc excretio doloris, materia excreta quoque, alieni coloris ac odoris expers existeret, hanc benignam nuncupaverint: eique opposuerint malignam nostram veneream, tanquam contrarii signis & symptomatibus gaudentem. Cum autem uterque affectus differentiam notoriam indolis, causarum, formalitatis, eventus, & curationis habeat, me a tramite veritatis non defletere puto, si affectus essentialiter distinctos distinet quoque retractavērim, ideoque asseram, hoc sensu gonorrhœam benignam non dari, sed semper malignam, vel a causa venerea orientem: quoad gradum autem, si comparatio instituatur, utique illam tam in principio, quam sub finem benignorem esse præ ipsius statu, nec non pro gravitate cause materialis proximæ majore, aut minore malignitatis gradu pollere: quo etiam interpretandum esse puto aliorum assertum de gonorrhœa benigna, quod ex maligna ortum capere possit.

XIII.

Causa materialis proxima est materia acris caustica, a persona impura, fluore albo venereo laborante, communicata.

SCHOL.

Hæc enim intra præputium & glandem in principio hærens, & intra urethram pedetentim sese insinuans, primum exulcerationis fundatum præbet.

XIV.

Causam antecedentem proximam constituit concubitus impurus.

SCHOL.

SCHOL.

Hinc facilime patebit, materiam sub gonorrhœ a effluentem non esse materiam seminalem, aut verum sperma, nisi in malo ad summum gradum proiecto & inveterato, sed potius in principio materiam faniosam, ex membrana urethræ glandulosa sudantem, cui tractu temporis, altius serpente exulceratione, succedit & admiscetur liquidum, in glandula prostata sequestratum, a cuius admixtione major acrimonie gradus, colorisque atque odoris, ex albo & quasi insensibili, in flavum aut viridescentem, & tetricum foetidumque mutatio dependet, præcipue si virus venereum altiores in humoribus ceperit radices.

Fluor albus venereus.

XVI.

Fluor albus venereus, dicitur profluviū acre faniōsum & causticum ex genitalib⁹ mulierum, ab ulcerosa illorum lesionē post contagium venereum ortum ducens.

SCHOL.

Sicut in sexu nobiliore gonorrhœa virulenta, ita ab iisdem causis in sexu sequiore hic affectus oritur atque occurrit, & cum illa, similitudine maxime, coincidit, dum non minus virulentiam suam causticitate, & erosione non modo pudendorum interiorum, sed & partium vicinarum, quas attingit, molestissima, prodit.

XVII.

Subjectum generale molestissimi bujus affectus est sexus muliebris.

SCHOL.

Huic enim soli familiaris existit, & quidem etiam ab annis pubertatis, per reliquam vitam, ita tamen, ut in specie juniores, & specialissime lascivæ personæ, exercitiis venereis illicitis deditæ, præ reliquis huic affectui subjiciantur.

XVIII.

Partem affectam specialem constituit uteri vagina, cum glandulis humorem spissuscum seroso-mucidum, pro humectatione partium continue secernentibus & excernentibus.

SCHOL.

LUE VENEREA C

SCHOL.

et animi ib⁹ impetu concubito natiū
mālū & spongeatatem par
ut famelis & viris vel hoc v
debet, communicat.

III.

Causa proxima materiālē
veneris infecti, & mālū c

Sen.

Hoc materialis crudus, cum liqu
idū & emetores circaret, ha
ste pares hōles non accidit sap
er infinita latitudine extant, le
viter pabulatorum, cum excell
eretur summae urbis hi
c vias quoque pares, quo hi
cūnūmū efficiuntur.

II.

Causa antecedens proxima
paz sub antecedente effectu
urino reperiuntur nōmū.

CAPIT

E POLLUTIONE,
IBO MULIERVM

Polluti

l.
datus of spermatis vir
sib nocte & somno, at
etiam vigilantiis per
ut præcipue finalis & sens
uus. Prolongata

SCHOL.

Hic enim sub impuro concubitu miasma venereum promissimum, propter mollitatem & spongiositatem partis, sese insinuandi locum inventit, quando foemellis a viris vel lue venerea ipsa infectis, vel gonorrhœa laborantibus, communicatur.

XIX.

Causa proxima materialis est miasma venereum, sub spermate virili infecto, a maribus communicatum.

SCHOL.

Hæc materialis causa, cum liquido illo vaginæ uteri indolis fermentescibilis existente concurrens, huic acrimoniam causticam contrahit, unde partes solidas non modo superficialiter arrodit, fluxumque continuum substantiæ saniose excitat, sed satis frequenter etiam profundiora ulcera pudendorum, cum excrescentiis verrucosis post se trahit, semperque summum ardorem sub urinæ emissione inducit, imo ordinarie vicinas quoque partes, quo fluxu suo pervenit, arrodit, cumque cruentam efficit.

XX.

Causa antecedens proxima & reliqua occasioales eadem sunt, quas sub antecedente affectu indicavimus, quapropter illas hic denuo repetere nolumus.

CAPUT IV.

DE POLLVTIONE, ET FLVORE
ALBO MVLIERVM BENIGNO.

Pollutio.

I.

Pollutio est spermatis virilis involuntaria excretio, vel sub nocte & somno, atque insomniis venereis, vel etiam vigilantibus personis, cum membra virilis tentigine ac priapismo simul & semel contingens: vel diurne Coschwitzii Pathologia.

Zz

quoque