

Ad alteram revocabimus eas lœsiones, quæ in sensuum & motuum defectu, aut remissione nimia consistunt, nobisque affectus apoplecticos, paralyticos, lipothymicos, & syncopicos sunt.

CAPUT I. DE MOTUUM EXACERBATORUM VITIIS.

I.

*M*otus exacerbati sunt vel idiopathici, vel symptomati.

SCHOL.

Per illos intelligimus ejusmodi motus, qui causam in corpore hærentem materialem pro fundamento agnoscunt, cuius vel imminuendæ, vel alterandæ & corrigendæ, vel penitus ejiciendæ gratia directo & intentionaliter ab ipsa natura suscipiuntur & exacerbantur: quale quid e. g. sub spasmus propter humorum spissitudinem removendam contingit.

Per hos vero, quæ a causa externa aliena mere passiva producuntur, foventur, & quasi ad imitationem illarum saltem adornantur, quod aliquando a refrigeratione externa partis solidæ occurrit.

Palpitatio Cordis.

II.

Palpitatio cordis est motus ipsius pulsatorius, in systole & diastole consistens, p. n. & extraordinarie, ita per intervalla auctus, ut sensu tactus, visus, immo auditus, tam ab agro, quam aliquando ab adstantibus, per costas, & vestimenta, facile percipiatur.

SCHOL.

Haud rarus aut infrequens est hic affectus, sed potius maxime cognitus, & in sensus incurrens: non perpetua duratione & gros afficiens,

ciens, sed per intervalla utplurimum recurrens, eam ob rationem a natura suscepitus, ut sanguis in circulo suo vegetius promoveatur, & corpus ipsum ab ejus extraordinaria colluvie liberetur, simulque vel spissior factus attenuetur, vel peregrinis etiam miasmaticis particulis refertus, ab illis repurgetur, aut aliquando propter causam aliquam continentem in organis, circulationi sanguinis dicatis, hærentem, eamque impedientem, simpliciter fortiori nisu transpellatur, ne sub diuturniore mora coagulationi & stasi subjiciatur.

Unde videmus, cordis palpitationem obtингere, vel post extraordinarias corporis exagationes, sub cursitationibus: vel sub repentina sanguinis restrictione ab extremis ad interiora, per terrorem, vel sub febribus malignis, & contagiosis, gangrena, sphacelo, & venenis assortitis: vel sub hypochondriacis atque hystericas pathematibus: vel deinde sub polypofa concretione in ipso corde, aut vasis cordi proximioribus atque majoribus hærente.

E quibus si rite perpendantur, maxime elucescit, palpitationem cordis magis esse aliarum læsionum symptoma accessorum molestum, quam ipsam læsionem aut morbum, imo si recte & secundum rei naturam loqui velimus, nihil esse morbosum, sed motum cordis p. n. quidem & consuetudinem auctum, eum vero in finem a natura susceptum, ut fortiori illo motu aliquid noxiæ atque morbosum, læsionem inducens aut minitans, pro viribus removeatur, excutiatur, aut avertatur.

III.

Palpitatio cordis vel plane temporaria & transitoria est, vel chronicum affectum constituit.

SCHOL.

Notamus hic merito differentiam, quæ circa hunc affectum in respectatum occurrit: dum vel a sola causa externa, corporis nempe exagatione sub motu aut cursu velociore, aut ascensione ad loca acclivia originem dicit, & cessante causa, mox iterum cessat, nec sine tali causa recurrit; vel ab aliis causis in corpore hærentibus sepe atque frequenter recurrit, citra tales occasionalem atque externam manifestam causam, eoque ipso ansam præbet, ut prior species, tanquam magis naturalis, medicæ considerationi non subjiciatur, & tanquam affectus, nihil morbosum

DI MOTUUM ELACER

viu succedit, negligatur, et
affidum molestum, qui cum
est, & in praefatis usque re

Subjecta molestia bujus
Tumina praे viris.

Va tamen, ut ordinaria
tendo concorreret: hinc possunt
dinchello-sanguinum in cont
in finali dectione, ambo faci
eoque ex calore rite determinari
et illo conseruari, ordi
in esse solent, hoc tumina
la quibus mentes cellule, na

Subjectum speciale est ip

Hoc enim vel menores
lymphaticos & duodenicos expe
rione tam via prima adspic
ta, in conditione substan, ut re
bus, accessus epiploicus diffundit
se, & fortiori lymphatis impinguia, f

Causa materialis ordinari
unitate finali abundans.

Cum nempe hoc modo ad mod
um per partes magniores & i
nfectis & hypochondriacis, pr
, prius ex utrigenere fed

SCHOL.

morbosi involvens, negligatur, cum altera species proprie talem constitut affectum molestum, qui causarum indagationem ac remotionem meretur, & in praesenti quoque nostræ considerationis objectum existit.

IV.

*Subjecta molesti hujus affectus sunt corpora plethorica:
& Fœminæ præ viris.*

SCHOL.

Ita tamen, ut ordinarie quasi cum statu plethorico, sanguinis spissitudo concurrat: hinc potissimum temperamentum melancholicum, aut melancholico-sanguineum in considerationem venit, quippe quæ, si otiosa vita simul abutantur, tanto facilius huic affectui subjiciuntur: Fœminæ quoque ex culpa vita sedentaria præ viris magis ab illo vexantur, & si viri de illo conqueruntur, ordinarie hypochondriacis passionibus expositi esse solent, sicuti fœminis quoque, hysterica passione laborantibus, & quibus menses cessant, magis familiaris esse solet.

V.

Subjectum speciale est ipsum cor.

SCHOL.

Hoc enim vehementiores motus, eosque frequentiores & velociores systalticos & diastalticos experitur, sub qua motus pulsatorii exacerbatione tam vasa proxime adjacentia, quam ipsi pulmones & diaphragma in consensum trahuntur, ut ab infarctu sanguinis majore in pulmonibus, motus respiratorius difficilior reddatur, donec cessante palpitatione, & fortiore sanguinis impulsu, respiratio quoque liberior iterum evadat.

VI.

*Causa materialis ordinaria est sanguis, plus justo spissior,
& quantitate simul abundans.*

SCHOL.

Cum nempe hoc modo ad motum circulatorium & progressivum, præsertim per partes angustiores & strictiores, minus aptus sit, (qualis melancholicis & hypochondriacis, præcipue fœminis, partim ex temperamento, partim ex vita genere sedentario, familiarissimus esse solet.)

sub impeditiore illius progressu, notabilis aliquando ipsius portio versus majora ac interiora vasa regurgitat, & ad ipsum cor redundat: sub qua redundantia ventriculi cordis, ultra solidum & debitum sanguine replentur, ut inde primo debilior succedat pulsus, & angustiam quasi lipothymicam post se trahat, dum ventriculi repleti extenduntur, quæ pulsus debilitas tamen mox in velocitatem & violentiam mutatur, quando natura, ob damnum coagulationis sanguinis evitandum, & pro restituendo liberiore ipsius circulo, motum fibrarum cordis intendit, & sub systole validiore, citiusque repetita diastole, molem, haec tenus cor obruentem, simul & semel propellit, & expulso sanguine, ab illo motu extraordinario ad tempus vacat, donec nova accidente causa occasionali regurgitationis, ad idem naturale quasi remedium recurrat.

Id quod tamen sub sola sanguinis abundantia, aut leviore ipsius spissitudine concurrente, paulo rarius contingit, nisi in ejusmodi subjectis turgefactoria sanguinis expansio aliquando accedat. Si autem vel ex temperamento, vel ex diæta, vel ex genere vita & animi pathematicis, sanguinis spissitudo indies increbescat, tunc utique frequentiores quoque contingunt palpitationis recursus.

VII.

Aliquando certa & specialis sanguinis impuritas & discrasia in culpa est.

SCHOL.

Non enim semper sola sanguinis spissescientia est accusanda, dum etiam in aliis affectibus aliquando symptomatice occurrit, ubi particulae miasmaticæ, putridæ sanguini permixtæ sunt, ad quarum citiorem expulsionem & eliminationem e corpore, natura iisdem motibus extraordinariis insurgit, id quod accidit in febribus malignis, sphacelo, & veneno assumto.

VIII.

Aliquanda causa materialis non baret in ipso sanguine, sed in organis, aut circa illa, que motui sanguinis inserviunt.

SCHOL.

Huc pertinent polypi, in corde ejusque ventriculis, aut vasis sanguineis

guiferis reperiundi, æque ac carnosæ ipsius cordis excrementia, quas tamen causas non æque dignoscere, & certo perspicere licet, nisi omnium reliquarum ordinarium causarum defectus tale quid arguat, atque probabilem de illarum præsentia conjecturam suppeditet: de quarum clas- se quoque sunt liquoris pericardii nimia quantitas, tubercula, calli, ossi- cula sive in corde, sive in arteriis, sive extrorsum illis adhærentia.

IX.

Sustinuerunt veteres, non solum a causa sanguinea, aliis que hactenus recensitis, sed frequenter etiam a flatu, vel materia flatulenta, palpitationem cordis ortum ducere.

SCHOL.

Id quod in tantum verum est, & relictissime se hadet, si flatulentia tanquam causa occasionalis consideratur; cum enim sine exceptione quasi hypochondriaci ad flatulentiam, & speciatim anotericam, maximam ha- beant dispositionem, hinc contingit, ut præsentibus multis flatibus, iisque per motum intestinorum stritorum sursum propulsis, sanguis etiam majore quantitate ab inferioribus ad superiora particulariter congeratur ac propellatur, qui tamen hoc redundans & régurgitans ordinario pul- sus motu disspellit ac propelli nequit, sed utique majorem motus pulsa- torii proportionem & gradum postulat, & ita naturam physica quadam necessitate ad ejus susceptionem inducit: si autem flatus tanquam causa materialis proxima in corde ejusque ventriculis hærens accipiatur, ne- xus causalitatis haud æque quadrare videtur.

Spasmi.

X.

Spasmi sunt species motuum exacerbatorum, in partibus solidis mollibus fibrosis, vel totum musculum, vel partem ipsius, vel plures musculos simul, extraordinaria fibrarum tensione rigida simpliciore afficiens, & dolores ut plurimum efficiens.

SCHOL.

SCHOL.

Distinguit se spasmus a convulsione in eo, quod spasmus consistat in simpliciore rigida partium musculosarum tensione; convulsio autem motu reciproco antagonistico plurium muscularum, in officio sibi oppositorum, absolvatur, & quod spasmus ordinarie sit dolorificus, quod sub convulsione non sentitur.

XI.

Subjectum spasmorum generale constituunt individua maxime plethorica, præcipue notabili humorum spissitudine simul laborantia.

SCHOL.

Hæc enim individua, si præterea pleno vietu, lautaque diæta, vietque genere otioso utantur, causam maxime suppeditant, propter quam natura sanguinis abundantis depletionem & imminutionem siceram, aut spissioris & ex spissitudine restagnantis transpressionem per partes spongiosas aut tubulosas, pro ipsius attenuatione, & mobilitate conservanda intendit.

XII.

Spasmi tales sunt vel universaliores, vel magis particulares.

SCHOL.

Illi sunt motus ejusmodi exacerbati, generaliter per totum corpus varie sese diffundentes, & ad generaliorem humorum, aut sanguinis in specie transpressionem, aut expressionem hæmorrhagicam tendentes, sub variis ita dictis rheumatismis & congestionibus, aut harum incompletis moliminibus conspicui.

Hi illi sunt motus, qui circa unam aut alteram solum, vel plures corporis partes obversantur, quales sub affectibus arthriticis vagis aut fixis, podagricis, ischiadicis, chiragricis & gonagricis, imo colicis hæmorrhoidalibus, in conspectum veniunt. Cum autem de generaliibus rheumatismis, & moliminibus congestoriis incompletis, sub reliquis congestionibus jam dixerimus, nunc ad particulares illas spasticas & dolorificas afflictiones transgredimur, initium faciendo a genere, arthritide nempe tam vaga, quam fixa, & abhinc ad species subalternas, podagram, ejusque sorores, progrediendo.

Arthri-

Arthritis.

XIII.

Arthritis est affectus spasticus dolorosus, tractorius, & lancinatorius, articulationes præcipue occupans, & circa partes tendinosas sese exserens.

SCHOL.

Formale arthritidis consistit in motu tonico exacerbato, vel spastico partium musculosarum, & tendinosarum, per sensations valde molestas, tensivas, tractorias, lancinatorias, dolorosas sese manifestante, quæ vel continuæ sunt, vel per intervalla recurrent, vel sub artuum & articulorum motibus increbescunt, ita tamen, ut sensus doloris molestus non tam in ipsa articulatione, quam circa illam & in ejus ambitu, partibusque musculosis circumiacentibus sentiatur.

Unde quoque arthritidis nomen non æque pro explicanda morbi formalitate, sed pro indigitando loco affecto inservit, quo intuitu etiam sub morbi articularis nomine occurrit, quoniam potissimum artus in genere, tam superiores, quam inferiores, eorumque confinia occupare solet, quamvis non semper strictissime hunc terminnum servet, sed latius sese frequenter satis diffundat: ita, ut partes superiores magis occupante affectu, non solum humerus & brachia patiantur, sed dolores etiam ad scapulas protendantur, ibique saepius fixam sedem teneant, & dorsi superiori partem afficiant: sicuti si circa inferiores magis artus versentur, ut plurimum præsertim in morbi initio, dolores illi tractorii & spastici musculos lumbares afficiunt, nec raro dignotionis confusionem inter hos arthriticos, & nephriticos, hisce partibus alias familiares, inferunt.

XIV.

Arthritis dicitur vel Vaga, vel Fixa, vel Scorbutica.

SCHOL.

Sub vaga dolores ab uno corporis loco ad alium transcurrendo, nullam sibi certam eligunt sedem, sed modo dextrum, modo sinistrum artuum latus, modo superiores, modo inferiores magis partes occupant, sub fixa autem eam, quam semel occupaverant, partem aut regionem, vel plane constanter per totum morbi decursum retinent, vel ad minimum sub recursibus repetunt.

De scorbutica vero notamus, quod revera esentialiter cum priori eadem sit, & cognomen saltem exinde acceperit, quod vel in quibusdam subjectis scorbutica quedam impuritas aut viiscidior sanguinis & humorum conditio tanquam causa concurrens revera adsit, vel quod ex hypothesi pathologiæ falsæ & acris, majorem aut minorem salium scorbuticorum rodentium, pungentium præsentiam, ex contumacia & vehementia dolorum, in mente fibi fingere soleant scriptores.

Chiragra, gonagra, podagra, malum ischiadicum.

XV.

Chiragra est species arthritidis fixæ particularis, in carpo, metacarpo, digitisque manuum occurrens, dolore acerbo ac tumore sese manifestans.

XVI.

Gonagra est species arthritidis fixæ, circa genua, dolore & tumore occurrens.

XVII.

Podagra est species arthritidis fixæ, simili dolore atque tumore, intercurrente rubore, in tarso, metatarso, digitisque pedum occurrens.

XVIII.

Ischiadicum malum est species arthritidis fixioris, ab osse sacro incipiens, ad caput ossis femoris extensæ, sedemque doloris fixiorem circa ipsum acetabulum formans.

SCHOL.

SCHOL.

De omnibus hisce affectibus dolorofis & spasticis probe notandum est, quod, quamdiu in genere circa artus obversantur, nec certam eorum particulam specialiter obsident, nomen generale arthridis retineant; quando autem hanc indolem mutant, & in una certa quadam particula, magis circa articulationes ipsas firmius fixiusque haerent, tunc varias quoque speciales denominationes accipiant, & diversos quoque quoad externam faciem affectus constituant, praesertim si in una illa membrorum particula contumacius persistant.

Unde facilime pater, omnes modo recensitos affectus speciales essentialiter a genere non differre, sed differentiam nominis solum a parte specialiter affecta accipere, neque exinde necessarium esse, ut singulam speciem peculiari pathologia prosequamur, sed commode satis omnes sub uno arthritidis titulo pertractari posse.

De ischiadico malo in transitu notamus, quod incipientes hi doles ischiadici, dum circa regionem lumbarem adhuc haerent, magnam familiaritatem atque similitudinem habeant cum doloribus nephriticis, eosque facile mentiantur, nec non aliquando, verum non semper, cum illis complicentur, id quod subinde varios in diagnosi & praxi post se trahere valet errores.

Favet huic falsae diagnosi aliquando inspectio urinæ, eamque di-
gnoscendi minor habitus: habent enim arthriticorum urinæ parallelum
quid quoad primum intuitum cum urinis nephriticorum & calculosorum,
dum utræque arenulas quasi rubras satis copiosas visui in vitris urinariis
præbent, ab imperitis pro fabulo calculoso habitas: quarum differen-
tiam essentialem tamen ab illo in regulis pathognomonicis nostris expli-
cavimus.

XIX.

*Subjectum omnium borum affectuum generale sunt homi-
nes plethorici, quoad temperamentum sanguinei & cholericis,
vel potius ex utroque mixti: quoad etatem diverse.*

SCHOL.

Respectu enim constitutionis utplurimum illi his affectibus subjiciuntur, qui habitu corporis gaudent floridiore, spongiolo, vitamque amant otiosam, dieta fruuntur lauta, plena, vinosa, iræ ac veneri dediti existunt.

Ætatem quod concernit, haud familiares sunt dicti affectus ætati puerili ac infantili, sed potius juvenili circa partes superiores, maxime autem viridiori ac vegetæ virili circa lumbos & ischium tunc temporis, ubi motus & molimina excretoria ad hæmorrhoides tendere incipiunt, neque tunc nisi pro moliminibus ad hæmorrhoides in genere tendentibus explicari possunt: paulo proiectiori autem ætati circa extremitates præcipue inferiores.

Ante omnia autem ejusmodi personæ talia pathemata sub reliquis circumstantiis experiuntur, quibus in juniore ætate excretiones sanguinis spontaneæ cujuscunque generis, præcipue largiores & frequentiores, familiares fuerunt, & postmodum suppressæ sunt, aut quæ artificialibus sanguinis ventilationibus adsuetæ, easdem neglexerunt.

XX.

De subiecto speciali aut parte affecta, non est, quod multa addamus, cum buc pertinentia in superioribus sufficienter tracta sint, ubi loca specialia singula speciei indigavimus, simul que musculosas cum tendinosis partibus potissimum affici diximus.

XXI.

Causa omnium horum dolorificorum affectuum atque spasmorum materialis est sanguis, tam quantitate excessiva, quam qualitate, aut motu peccans.

SCHOL.

Quantitate excessiva sanguinem peccare, exinde constat, quod hi affectus primario subiecta plethora aggrediantur, in quibus sanguis vel propter molem physicam, vel propter majorem commotionem orgasmicam, quotidianis & plane ordinariis motibus haud sufficienter per partes tubulosas transprimi, & circumelli potest, quin naturæ molestias quasdam pariat.

Huic quantitatis læsioni succedit altera qualitatis labes, ut plurimum in spissitudine plus justa consistens, cui tamen, ratione diætæ aromaticæ

maticæ atque vinosa, jungere se potest acrimonia sulphurea, partibus tendinosis infensa, & orgasticarum commotionum fundamentum primum existens: neque in totum hic negare volumus discrasiam salsam in quibusdam subjectis, graviora symptomata producentem, cum ex modo allegatis causis facile impeditior secretionum & excretionum successus elucescat, præcipue, si forsan ejusmodi impuritates serosaæ antea jam ex diæta vitæque genere in corpore abundaverint, aut ex locorum indole & genio familiares esse possunt.

Motum sanguinis peccantem accusamus, quando in illis, qui præcipue hos spasmodicos affectus circa partes inferiores experiuntur, haemorrhoidalis excretio in viris, aut menstrua in fœminis, justum non habet successum, atque hinc molimina restagnatoria & reluctatoria ad partes affectas oriuntur: sub quibus natura, vel sub sola plethora præsentia, ejus imminutionem aut depletionem per haemorrhagicas sinceras excretiones, pro diversitate ætatis congrua, vel si reliqua discrasie concurrant, fortiorum sanguinis transpressionem per partes porosas, simulque spissioris attenuationem, aut imprioris depurationem intendit.

XXII.

Cause antecedens & remotiores sunt illæ, quæ sanguinem vel in quantitate augent, vel ipsius & reliorum humorum commotionem orgasticam excitant.

SCHOL.

Hæ, etiamsi non semper solitarie & proxime affectus producant, illos tamen fovent, ac pertinaciores reddunt, & sunt diæta in genere plena, lauta, cum vita otiosa conjuncta, in specie vero calida aromaticæ, vinosa, spirituosa, quæ ex utraque parte nocet: nec non animi pathemata vehementiora, quo nomine ira, & suo sensu venus, hanc classem subeunt, a quibus massa humorum tam intestine & orgastice, quam localiter eximie commovetur.

XXIII.

Occasionalem hic suppeditant causam partium solidarum alterationes insigniores, tam relaxatoria, quam stritoriae.

SCHOL.

Harum illæ decubitui humorum majori ad partem favent, hæ autem necessariam exhalationem & transpirationem impediunt, simul quoque humorum alterationem coagulatoriam aut inspissatoriam producunt. Pertinent huc extremorum artuum refrigerationes vehementiores tam humidae, quam siccæ, vel diu continuatae, vel saepius repetitæ, atque perpeccæ; particulares membrorum fatigations ac debilitations per nimios motus laboriosos, aut lassiones partium prægressas particulares: nec non pedum speciales fatigations stando inductæ, quarum causarum omnium effectus satis frequenter multis post annis sese exserere solent.

Asthma Convulsivum.

XXIV.

Asthma convulsivum est affectus spasticus constrictorius thoracis acutus, respirationem supremens, & suffocationem minitans, a sanguine circa pectus restagnante vel congesto ortum ducens.

SCHOL.

Acutum nominamus hunc affectum, quia non modo acute, ex improviso quasi, ægrotantes invadit, sed brevi quoque tempore horarum aut dierum, vel in pejus ruit, vel transit, licet aliquando novis paroxysmis, vel statariis, vel vagis iterum insurgat.

Consistit autem ð formale hujus acuti & sotaci affectus principaliter & primario in motu partium fibrosarum exacerbato spastico, principaliter musculos pectorales occupante, thoracemque comprimente, ita tamen, ut reliquæ etiam partes, præcipue inferiores, ab illo non imunes maneant, unde tanto major atque facilior sanguinis ad interiora contingit compressio & regurgitatio, vasorumque pulmonalium oppletio, asperæ arteriæ minores ramifications tanto facilis comprimens, aërisque liberiorem ingressum impediens.

Unde

Unde sese exserit per repentinam, eamque summam respirandi difficultatem, sonum sub respiratione sibilum, & vocem sonoram, anhelitum summum, cum maximo instantis suffocationis metu, sub sensu specialis muscularum pectoralium, & thoracis compressionis atque stricturæ, præsertim sub ægrorum decubitu supino, manente respiratione pauculo liberiore sub sedendo; sub quibus omnibus faciei ac capitis rubor, pulsus celeritas & inæqualitas, cum vasorum sanguiferorum turgescentia, cordisque palpitatione, concurrunt.

XXV.

Differt hoc asthma ab asthmate tam humoroso, quam sicco; a catarrbo suffocativo, atque ab incubo, licet quoad primum intuitum, cum omnibus his aliquam habeat analogiam externam.

SCHOOL.

Ab asthmate utroque sese distinguit tam ratione materiae peccantis, quæ in his serosa, in nostro præsenti sanguinea existit, quam modi invasionis, & temporis durationis: nostrum enim asthma est acutum, quoad invasionem & durationem, illa vero sunt chronica, quæ neque uno impetu, sed diuturniore tempore successive invadunt, neque breviter decurrunt, sed uno tractu per septimanas, menses, imo annos durant, vel si varios recursus servent, ad minimum sub singula exacerbatione longius tempus constanter tenent.

A catarrho suffocativo differt hoc asthma primario respectu materiae peccantis, subjectorum, & ipsius formalitatis. In illo enim æque præsto est materia serosa-mucida; in hoc sanguinea: illius subjecta sunt infantilia, senilia & phlegmatica; hujus corpora juvenilia, aut virilia vegeta, ad minimum plethorica, & cholERICA, vel ex hoc temperamento notorie mixta: illius formalitas magis consistit in partium fibrosarum atonia & relaxatione paralytroidea, hujus, in earundem strictura exacerbata spastica.

Ab incubo potissimum sese distinguit modo invasionis, tempore durationis, & eventu. Incubus enim solum sub somno & dormientes invadit, expurgentibus ægris statim & totaliter cessat, nec ullum periculum aut suffocationis metum incutit, certumque corporis decubiti

tum

tum pro causa occasionali agnoscit: cum ex opposito hoc nostrum asthma, vigiles &que ac dormientes invadat, expurgiscentibus &gris non cefset, sed continuet, sedentibus &que ac decumbentibus molestum sit, per plures ad minimum horas, si non dies, protrahatur, funestumque even-tum, vel per suffocationem, vel per vasorum rupturas in pectore, imo in capite, ideoque hæmoptysin, vel apoplecticos affectus minitetur.

XXVI.

*Subjecta asthmatis convulsivi sunt persone quoad tempera-
mentum activiores & calidiores, simul Plethorae; quoad aca-
tem, provectionem juvenilem, vel vitilem vegetiorem agentes:
ratione sexus, viri præ fœminis.*

SCHOL.

Temperamenta itaque, quibus hoc asthma magis imminet, sunt cholericum, cholericо-sanguineum, & sanguineo-cholericum, longe rarius-melancholicum, nisi cholericī accessus superveniat; vel cause occasio-nales concurrant: quoniam modo dicta temperamenta, tam ratione fibrarum magis firmarum atque tensarum, quam ratione animi activi, firmi, & alacris, nec non ipsius sanguinis ad commotiones orgasticas proprii, præ aliis dispositionem faciliorem ad ejusmodi motuum exacerbatio-nes fovent, prout plures hac de re a nobis allatae sunt rationes in disser-tatione de asthmatis convulsivi & catarrhi suffocativi differentiis.

Quoad aetatem observamus, ipsi subjectam esse neque infantilem, neque admodum senilem, sed ordinarie & ut plurimum intermedium, provectionem juvenilem, & vitilem vegetiorem: ita tamen, ut non omnes plane excludamus senes, cum utique casus quoque extraordi-narii existant, ubi senes respectu humorum, juniores viribus, dieta vi-nosa, vita genere & animi activitate antecedunt.

Ratione sexus, viros præ fœminis hoc affectu frequentius corripi ob-servavimus, id quod solennioribus huic sexui evacuationibus sanguineis spontaneis, maximopere adscribendum esse arbitramur.

XXVII.

XXVII.

Subjectum speciale in hoc affectu varia constituunt corporis nostri partes, quæ sub illo simul patiuntur, & afficiuntur.

SCHOL.

Ita enim pro tali haberi debent musculi thoracis tam intercostales, quam qui pectoralium nomen atque officium gerunt, a quorum numero neque excludimus diaphragma, aut musculos, abdominis respirationi inservientes, qui motu strictorio fortiore perculsi, costarum totiusque thoracis motum elevatorium sufflaminant: præterea sub sanguinis congestione regurgitatoria patiuntur cor cum vasis sanguiferis, atque pulmonibus, dum illud a sanguinis quantitate obruitur, ne motum pulsatorium ordinate prosequi valeat, vasa distenduntur, & pulmonum vasa adeo sanguine repente infarciuntur, ut tota vesicularum pulmonary compage, nimium expansa, asperæ arteriæ bronchia interjecta comprimantur & coarctentur, ne aëri liberior permeandi concedatur facultas.

XXVIII.

Causam materialē proximam constituit sanguis.

SCHOL.

Hic enim ultra modum & impetuose ad pectoris confinia congestus atque compressus, liberiore suo circulo orbatus, circa cor & pulmones restagnat, metumque summum suffocationis incutit: de quo testatur partim temperamentum, partim ætas, partim status plethoricus, ut plurimum vel physice vel moraliter conjunctus, i.e. commotus.

XXIX.

Antecedentes causa sunt tam ipsa sanguinis abundantia, quam omnia, que plethoram physice ac materialiter augere, & sanguinis expansioni orgastica, materiali potissimum concursu, favere possunt.

SCHOL.

Illa sanguinis abundantia generaliter apud ejusmodi subjecta peccat, sive id fiat mole physica valorum capacitatem superando, sive per commotionem orgasticam expansoriam majus spatum requirendo.

Coschwitzii Pathologia.

D d d

Hanc

Hanc orgasticam expansionem maxime promovent diæta lauta, plena atque vinosa, cum vitæ genere otioso concurrens: ubi in specie vina generosa, Hungarica, Italica, Gallica calidiora, tanto magis in considerationem veniunt, quanto plus illa particulas sulphureas, oleofas & pingues in sanguinis mastia adaugent. Nec minus sub hac causarum classe comprehenduntur sanguinis evacuationes, earumque suppressiones, sive illæ naturales consuetæ per nares, vel menstruæ in foeminis, aut hæmorrhoidales in viris fuerint, sive etiam artificiales assuefactæ per V. Sectiones & scarificationes, præcipue largiores, postmodum autem neglectas.

XXX.

Ad occasionalium causarum classem referimus animi pathemata iracunda graviora: corporis exagitatorias commotiones: progressam scarificationis consuetudinem: & aliquando flatulentiam antecedentem.

SCHOL.

Animi enim pathemata iracunda vehementiora non solum energiam suam exserunt in sanguinem, illum orgastice commovendo, dum partes bilioso-sulphureæ in majore ipsi communicantur quantitate, sed maxime etiam in partes solidas, musculosas, nerveas, motus spasticos tractorios vehementiores & pertinaciores producendo, quales sub omni ira manifestissime observantur.

Ad exæstuatoriam corporis commotionem disponunt exercitia athletica, saltatoria, cantatoria, cursoria: aut humorum exagitationes ab aëre calidore & sicciore, sive solari, sive conclave nimirum calefactorum: quæ tanto efficacius noxam inferre possunt, si mox post illearum cessationem corpus sudore forsan perfusum aëri frigido committitur, aut potibus frigidis glaciatis, largiter & repente haustis, refrigeratur: unde pororum externi corporis constrictiones spasticae, ad musculos substratos sece diffundentes, facili negotio oriuntur, nec raro circa vilæera nobiliora infarctus, stases, inflammations prognascuntur.

Neque

Neque immerito mentionem hic injicimus consuetudinis repetitæ scarificationis in scapulis, & dorso superiore, quippe quæ aliquando occasionem præbet, ut spasticæ tractiones, & motus extraordinarii, in illis musculis tanto facilius orientur, & exacerbentur.

Flatulentia, etiamsi affectum non excitet, atque primario causatur, tamen eundem in paroxysmo graviorem reddere potest ac solet, quo intuitu etiam clysteres revellentes ac carminativi tam relaxando spasmos muscularum abdominis & diaphragmatis, quam expansionem flatulentam intestinorum removendo, eximiam in paroxysmo opem ferunt.

XXXI.

Causa efficiens omnium horum motuum qua talium, sub hoc affectu concurrentium, est, & manet ipsa natura.

SCHOL.

An, & quomodo natura in hoc negotio concurrat, id facile ex tota causarum connexione patet: in quantum nempe motus illi tracto-rii & spastici a principio agente dependent, nec sine illo in actum deduci queunt, in tantum utique natura, tanquam causa motuum efficiens considerari deberet: quod autem semper, & in omni casu, natura quasi a priori motus illos studiose pro transpulsione sanguinis, & sub intentione excretionis sinceræ per pectus suscipiat, id asseri nequit: quoniam in illis casibus, ubi causæ occasione affectum provocarunt, specifica talis directio atque intentio locum non habet, sed potius generalis illa restrictio quasi passiva sufficere potest, licet ex fundamento consuetudinis motuum atque decubitum prægressorum, aliquando aliquid activi concurrere possit: ubi autem evacuationes sanguineæ spontaneæ suppressæ fuerunt, & citra externas occasionses notabiles tale quid accedit, ibi directionem talem, & intentionem naturæ, etiamsi respectu ele-
tionis viæ, & gradus movendi, erroneam, agnoscere decet.

Colica.

XXXII.

Colica est acutissimus intestinorum tam tenuium, quam crassorum, dolor, a flatulenta eorum extensione, & spastica con- tractione ortus.

D d d 2

SCHOL.

SCHOL.

Intestina, quæ substantiam habent nerveo-membranosam, in statu suo naturali expansionem non patiuntur, nisi aliqualem a materiis transgredientibus, quæ tamen motu peristaltico continuo facile sufflaminatur, ut tanta non fiat, quæ dolores efficere potest. Quando autem ex ciborum & potuum reliquiis materia mucida, in intestinorum canali hærens, a calore interno in flatus expanditur, canalis ille membranosus per portiones ultra modum expanditur atque inflatur, quod sub anfractuoso illius situ facilius contingit. Hoc facto, inducta sensatione molesta, facili negotio circa illam partem ita adfectam, motus peristalticus extra ordinem a natura augetur, & constrictio fit spastica, quæ modo e superiori, modo ab inferiori parte contingit, ideoque pro hac diversitate flatum, sub borborygmis & torminibus, vel sursum vel deorsum pellit aut, si ex utraque parte simul agat, flatus incarcerationem, intestinis summe dolorosam, producit.

XXXIII.

Distinguimus colicam in simpliciorem benignam, & in convulsivam seu spasmodicam.

SCHOL.

Simplicem atque benignam vocamus colicam, quando simplicioribus torminibus & borborygmis cum æquali abdominis inflatione, sine gravioribus symptomatibus occurrit, & modo intestina tenuia, modo crassa afficit, mox diarrœa serosa, mox etiam alvi obstructione stipata.

Spasmodicam vero, seu convulsivam nominamus, quando sub summis cruciatibus torminosis, umbilicus spastice retrahitur versus interiora, abdominis musculi per spasticas retractiones inæquales redduntur, intestina ita contorquentur. ut versus superiora retracta respirationem impedian, aut alia quoque abdominis viscera vicina, renes, ureteres, vesica, & in viris testiculi, in consensum spastico-dolorosum trahantur.

XXXIV.

Subiecta colicæ diversa existunt, pro diversitate causarum, quibus exponi possunt.

SCHOL.

SCHOL.

Colicæ enim simpliciori variis ex causis subjiciuntur infantes, adultores, seniores, viri & fœminæ, cum hæc potissimum errores diætæ & regiminis vitæ, pro causa antecedente agnoscat.

Spasmodicæ autem & convulsivæ vel infantes, vel adultiores plethorici, cholerici & hæmorrhoidarii subiecti existunt, cum hæc vel causam biliosam, vel hæmorrhoidalē negotium turbatum sequatur: cui ad latus ponimus negotium menstruum in fœmellis.

XXXV.

Subjectum speciale primario constituunt intestina tam tenuia, quam crassa: secundario partes vicine & abdominis musculi.

SCHOL.

Ut plurimum quidem intestinum colon pro vera sede colicæ haberi solet, ast experientia docet, hoc assertum generaliter & sine exceptione non valere, sed potius restrictionem debitam mereri: etiamsi enim colon non sit excipiendum, tamen potissimum inflationum & borborygmarum minus dolorosorum subiectum existit, dum hoc intestinum tanquam crassum adeo sensibile non sit, nisi plane excessiva sit illius expansio, quæ tamen ob peculiarem ipsius structuram cellulosa haud æque facile succedit. Ubicunque autem sensibilissimi adsunt dolores lancinatorii & spastici, ibi certo intestina tenuia maxime patiuntur, id quod potissimum testatur locus dolorum, qui tunc in medio ventris circa regionem umbilici sentiuntur, ubi tamen colon situm suum non habet.

Quod autem reliquæ partes per consensum patientur, id testatur partim muscularum abdominis expansio, præcipue si colon præ reliquis intestinis afficiatur, partim dolores renales atque lumbares, partim denique nauseæ atque conatus vomendi, haud raro concurrentes.

XXXVI.

Causa colicæ simplicioris & benignæ proxima materialis, est materia mucida, ex parte viscida, in intestinis hærens.

SCHOL.

Hæc materia ex reliquiis alimentorum generata, ejus indolis est, ut in consistentia sua semiliquida, per calorem in corpore accedentem expandi, & quasi in bullas elevari possit: quo facto, in ea intestinorum portione, ubi tale quid sit, intestinum flatu distenditur, ultra modum naturalem expanditur, molestaque sensatione afficitur: quam facile excipit spastica intestini stricturna, quæ flatum ita generatum, vel ad superiora, vel ad inferiora propellit, & strepitus, aut murmura hinc inde per intestina vagantia, producit: vel, si ex utroque latere fatus generati, & intestini expansi concurrat, fatus incarcerationem, majoremque & fixiorum dolorem in ea parte intestini causatur.

XXXVII.

Causæ antecedentes querendæ sunt potissimum in victu crassiore & crudiore.

SCHOL.

Ea enim alimenta potissimum hujus materiæ peccantis generationi favent, quæ succun aquosum aut mucidum, vel partes crudiores, graviores, continent: unde horum classem subeunt legumina, pisa, fabæ, olera valde humida, & succo aquoso turgentia, cucurbitæ, cucumeres, melones, pepones, piscium mucidiorum carnes, quibus haud immerito quoque adnumeramus cerevisias valde aquosas, non sufficienter defecatas, quæ fecibus suis motum intestinum quasi fermentatorium producent, in tali materia mucida jam præsente: quorsum etiam referri metrentur dulcia fermentescibilia, eundem effectum edentia, & quidem hoc tanto magis, si forsan simul eodem tempore concurrant.

XXXVIII.

Colica convulsiva pro causa sua proximiore agnoscit vel saburram biliosam, vel sanguineam congestionem.

SCHOL.

Illa, saburra biliosa, tam apud infantes, quam apud adultiores & seniores acrimonia sua caustica substantiam intestinorum aggreditur, tunicae nerveam vellicando, rodendo, motusque spasticos immediate producen-

DE MOTU IN EAC
moto, qui voluntate controlla-
re, vel eludi fieri.

Hæc semper congladio
i hemorrhoidis, vel me-
ni refugitionis, longa-
guinis redundante in va-
m moleham effici, un-
tiones coronar, quæ ad
i faciunt, qui a calore ex-
er dyploca fundimento no-
vum anæmias, ne gravida-

Causæ antecedentes
victu, vel sanguinei ab

Incubida pregræs hym-
no corpore præfato fuit,
iis extraordinarie commo-
e cœpi prospicere, in qua-
mox. culica, et plu-
sibiles concutus, unde
nra: vel guttulas in alieno
opus ede: il quod de quo
non se morit, quando lo-
quens recte presens, quæ
i iniquum vident, q-
mina, diuinas biliosas, pe-
diarrhae biliosi delectan-

Sanguinis abundantia q-
nta, vel ut patricius confi-
i genere considerat ut o-
ui, plurimum homines ple-
nigentes, osidos hunc aff-

ducendo, qui ordinarie continuare solent, donec causa illa materialis vel correcta, vel educata fuerit.

Hæc nempe congestio sanguinea originem ordinarie capit a negotio hæmorrhoidali, vel menstruo turbato: unde contingit, ut per modum restagnationis, sanguis majore impetu ad intestina redundet: quæ sanguinis redundatio in vasis intestinalibus primo expansionem tunicarum molestam efficit, unde postmodum in tunica nerva spasticæ tractiones oriuntur, quæ ad incarcerationem materiæ flatulentæ in intestinis faciunt, qua a calore expensa, intestinalorum canalis distenditur, & ita ex dupli fundamento molesta sensatio oritur, sæpius tantas inducens motuum anomalias, ut gravissimorum symptomatum syndrome cooriatur.

XXXIX.

Causam antecedentem hujus colicæ constituit vel prægressa iracundia, vel sanguinis abundantia.

SCHOL.

Iracundia prægressa symbolum suum hic confert, quatenus vel in proprio corpore præsto fuit, & quidem in adultioribus, quando sub illa bilis extraordinarie commovetur, & spasticis motibus ad intestina maiore copia propellitur, in quo casu aliquando concurrit peculiaris bilis acrimonia caustica, aut ipsius cum reliquis ciborum acidis & fermentabilibus concursus, unde in acrimoniam acido-causticam p. n. degenerat: vel quatenus in alieno corpore perpera effectus suos in alterum corpus edit: id quod fit apud infantes pusillos, qui lacte nutriuntur nutricum aut matrum, quando hæ ira vehementer commotæ, mammas emulgendas tenellis præbent pusionibus, ipsisque lac biliosis impuritatibus inquinatum offerunt, quo infantes adeo lœduntur, ut gravissima tormina, diarrhoeas biliosas, porraceas, incurvant, siquidem id pluribus sub diarrhoea biliosa deductum fuit.

Sanguinis abundantiam quod concernit, hæc vel universalis esse poterit, vel ut particularis considerari meretur. In priori sensu plethoram in genere consideratam ut causam agnoscimus, dum manifesto videmus, ut plurimum homines plethoricos, vicarias evacuationes sanguineas negligentes, otiosos, huic affectui præ aliis obnoxios fieri, gravius que

que ab illo detineri. In posteriore vero sensu hanc abundantiam sanguinis particularem ita interpretanur, ut majorem ipsius quantitatem in vasis mesaraicis supponamus, quam proportio vasorum ferre potest, ita ut restagnatoriæ oppletones circa venam portæ exinde orientur, dictos spasmos producentes: id quod maxime fit, quando vel per hæmorrhoides, vel per menses, sanguis haud debite evacuari potest. Quæ causarum diversa præsentia & connexio aliis anam præbuit colicam dividendi in flatulentam seu phlegmaticam, biliosam, & hæmorrhoidalem.

XL.

Cause occasionales & extrinsecæ, colicam excitantes & foventes, ordinarie in erroribus diæta aut regiminis, vel in morbis prægressis sunt querenda.

SCHOL.

Prioris generis sunt ingestiones ciborum crudiorum, flatulentorum, aquoso succo prægnantium, aut dulci fermentescibili turgidorum: quorum pertinent fructus horæ variæ, melones, cucumeres, mala persica, legumina, potus cerevisiarii haud sufficienter excocti & defecati, præcipue post ingestionem dulcium, aut pinguium ingurgitati.

Ad alteram classem pertinent refrigerationes pedum & abdominis, quibus spastica excitatur contractio in extremis, unde partes excrementaria serosæ reprimuntur ac repelluntur ad interiora, & partes nervosas afficiendo, in illis spasticas tractiones producunt.

Ad morbos prægressos aut antecedentes si respiciamus, haud raro accidit, ut post febres per adstringentia male tractatas, ejusmodi dispositiones ad colicam spastodicam remaneant. Nec minus idem aliquando contingit, quando apud foeminas profluvia sanguinea, sive menstrua, sive lochalia, adstringentibus aut opiatibus intempestive sistuntur.

A podagra retrocedente, aut per topica repellentia retropulsâ, sæpius colica convulsiva oritur, quando spasmi ab exterioribus ad interiora transferuntur, ibique tragœdiam maxime funestam ludunt: sic etiam

etiam symptomatice ad esse potest colica, ac supervenire aliis morbis, qui primam ipsi occasionem suppeditant; qualis est nephritis calculosa, & hernia incarcerata, quibus ejusmodi colicæ passiones gravissimæ haud minus solennes esse solent. Eodem quoque modo ut symptoma colicus dolor invadit puerperas, quando abdominis ligaturam debitam negligunt, aut simul externis refrigerationibus fœse exponunt.

Cardialgia.

XLI.

Cardialgia est motus spastico-tractorius orificii ventriculi superioris, dolorificus & anxius, sub diaphragmatis consensu metum suffocationis saepe incutiens.

SCHOL.

Solet hic affectus a quibusdam distingui in cardialgiam & cardiom, prout nempe vel idiopathicus, vel symptomaticus existit, vel quatenus congestiones & restrictiones sanguineas, aut solum cruditates primarum viarum pro causa agnoscit; verum, cum hæc differantia cause & indolis essentiam rei non mutet, sed saltem gradus & symptomatum diversitatem inferat, hanc distinctionem tetigisse sufficiat, monendo, entia præter necessitatem non esse multiplicanda.

XLII.

Distinguimus itaque cardialgiam in symptomaticam & idiopathicam.

SCHOL.

Per illam intelligimus, quando hic spasticus affectus sub aliis morbis aut læsionibus occurrit, iisque supervenit: quale quid frequenter contingit in febribus, sive chronicis, sive acutis, læsionibus vulneratoris, aut inflammationibus ventriculi, duodeni, diaphragmatis, malo hypochondriaco, aliquæ affectibus sanguinis translatoriis in partibus a ventriculo diffitis. Sub hac comprehendimus hunc spasticum affectum, quando citra morbi alterius presentiam, causam proxime in ventriculo hærentem agnoscens, præsto est, & oritur.

Coschwitzii Pathologia.

E e e

XLIII.

XLIII.

Subiectum bujus affectus generale est varium.

SCHOL.

Haud certam ætatem, certumve temperamentum, aut sexum hic determinare licet, cum pro differentia causalium, diversis quoad hos respectus, personis eveniat, sive adultiores, sive senes fuerint, sive masculi sint, sive foeminae.

XLIV.

Subiectum speciale constituit ex parte ventriculi orificio superius, ex parte diaphragma.

SCHOL.

Utraque pars cum altera ita cohæret, ut se invicem in consensum facilime trahant, transitum enim oesophagus per diaphragma sortitur, haud procul a circulo nerveo in parte diaphragmatis sinistra, atque ab hoc arctissimo nexo comprehenditur, unde in alterutra parte nullus contingere potest motus, quin altera simul ab illo afficiatur. Contracto itaque ventriculi orificio, trahitur quoque diaphragma, unde respirationis difficultas suspiriosa dependet, sicut a diaphragmate spastice tracto atque commoto ventriculi orificium comprimitur, nervique hic occurrentes, in consensum trahuntur.

XLV.

Causa bujus affectus idiopathici ordinarie est saburra quadam peregrina & vitiosa, in ventriculo barenſ.

SCHOL.

Ad hanc classem pertinet partim saburra viscidula, mucida, a cibis dyspeptis in ventriculo collecta, gravitatis pondere ventriculum male afficiens, ut inde motus a natura pro ipsis extrusione suscipiantur, unde vomitus quoque sepissime sequuntur: partim saburra biliosa aut acida, quæ acrimonia sua tunicam villosam, nerveamque afficit, & morsificando, vellicando motus talismodi tractorios producit: partim vermifosa soboles, quæ in ventriculo aliquando hospitium suum querit, &

mor-

mordendo substantiam ventriculi lœdit: quorsum etiam venena, aue
emetica & purgantia drastica assumta referimus.

XLVI.

*Symptomatici affectus cause in aliis partibus hærent, varie
existunt, & per consensum eundem provocant.*

SCHOL.

Ita in affectibus hypochondriacis & hysterics per inflationem intestinorum diaphragma premitur, & tensione sua ventriculi orificium moleste afficit: in vulneribus aut ulceribus, vel inflammationibus intestinorum, ventriculi, pleuræ, diaphragmatis, idem contingit per consensum nervorum, a quibus dictæ partes participant.

XLVII.

Occasionalē causam saepe constituit refrigeratio tam interna, quam externa.

SCHOL.

Illa contingit sub ingurgitatione pororum frigidorum repentina; hæc sub regionis præcordialis, post sudores percessos, refrigeratione immediata: quo etiam aliquando e longinquo facit retrocessio excretionum periphericarum per exanthemata cutanea, per materiæ noxiæ translationem ad interiora.

Convulsiones & epilepsia.

XLVIII.

*Convulsiones & epilepsia, etiam si quoad motum spasticum
exacerbatum essentialiter convenient, tamen a medicis ordinarie
distinguuntur.*

SCHOL.

Solet nimirum distinctio communiter desumi a differentia gradus, ut minori horum motuum gradu convulsionis, majori vero & totum corpus occupanti epilepsiae titulus tribuatur: quæ tamen distinctio a gradus vehementia saltim defumta, secundum mentem Ill. Stahlum non exhaustit, quin potius secundum ejus animadversionem,

distinctio a genio morbi idiopathicō aut symptomatico deducenda ac desumenda esset; ubi illis motuum convulsivis exacerbationibus, quæ alii gravioribus aut sensibilioribus morbis præsentibus aut imminentibus superveniunt, & cessante aut remittente tali morbo iterum evanescent, seu leviores, seu graviores fuerint quoad gradum, nomen convolutionum strictius competere; epilepsia vero denominationem illis maxime tribuendam esse, quæ sine tali morbi alicujus notabilis aut manifesti præsentia, hominibus de cætero sanis adparentibus obtingere, & continuare solent.

XLIX.

Convulsiones sunt motus partium musculosarum & tendino-nervarum spastici reciproci, aliis affectibus primariis jam præsentibus aut imminentibus supervenientes, aut juncti.

SCHOL.

Dicuntur itaque convolutiones motus ejusmodi extraordinarii symptomatici, cum aliis morbis juncti, ipsis durantibus durantes, & sub illorum cessatione iterum cessantes, tractione reciproca & antagonistica partium utplurimum musculosarum, in una aut pluribus corporis partibus simul, vel etiam in toto corpore sese manifestantes, ut sensum visus & tactus incurvant, & vel musculus unus aut alter, vel universum quoddam membrum, vel totum denique corpus violenter & citra voluntatem, ægri imo ipso inscio, moveri videatur.

L.

Epilepsia est motus partium musculo-tendinosarum spasticus reciprocus, cum artuum motu violento jactatorio, idiopathicus, citra alius morbi cardinalis presentiam præsens.

SCHOL.

Distinguit se epilepsia a convolutione in eo, quod individua de cætero sana apparentia, sine aliis morbi primarii complicatione illis afficiantur motibus, ita ut repente in terram decident, aut decumbant, non adver-

advertisitibus id quasi aliis adstantibus, nec ipsis ægris præsciis, ut quasi mortui sine sensu jaceant, & vel totum corpus, vel aliqua corporis membra hinc inde jacentur, aut violenter moveantur, dentes strideant, oculi torqueantur, spuma salivalis ex ore profluat, & manus fortissimo spasmus in pugnum colligatur, post paroxysmum vero ægri tales apparenter sani de reliquo maneant.

LI.

Veteres epilepsiam distinxerunt in emprostotonum, opisthotonum, & tetanum.

SCHOL.

Respicit hæc distinctio specialissimum modum motuum epileptico-rum, ita ut *emprostotonum*, vocaverint, si totum corpus antrorsum magis trahatur, & moveatur: *Opisthotonum* autem, si ex opposito motus illi tractorii magis retrorsum corpus flectant, trahantque: & denique *tetanus* dixerint, quando corpus rigidum saltem tenerur, nec truncus multum jactatur, commotis tamen reliquis membris, brachiis nempe, & pedibus, quæ tamen distinctiones omnes ad rei essentiam nihil faciunt, sed de symptomatum saltem differentia testantur.

LII.

Distinguitur majore utilitate in epilepsiam recentem, & habitualem.

SCHOL.

Hæc distinctio enim a tempore durationis desumpta, utilitatem habet practicam, respectu prognos eos instituendæ; sicut enim epilepsia in genere ad illos pertinent affectus morbos, qui curatu difficultissimi existunt, ita sane major adhuc difficultas in debellando hoc malo occurrit, si per moram temporis, sæpeque repetitos motus, habitus consuetudinalis accesserit, quem certe considerare debet medicus, quando curam suscipere conatur.

LIII.

Subjectorum, respectu convulsionum, nulla observatur differenzia.

SCHOL.

Quamvis enim magis specialiter & frequentius infantes illis subjecti adpareant, propter morbos huic ætati solenniores, quibus convulsiones facile sociantur; quales præcipue sunt dentitio, & quidem difficilis, variolæ, morbilli, asthmata, præcipue illa, quæ retrocessionem excretionum subcutanearum violentam aut repentinam sequuntur: id quod frequentius accedit a scabie, tinea capitis, aut crusta lactea retrocessis: nihilominus tamen omnis ætatis, sexus & reliquæ conditionis personæ, conspirantibus reliquis causis, iisdem obnoxia fieri possunt ac solent.

Adultioribus itaque si eveniant, ordinarie id contingit sub aliis gravioribus morbis, v. g. febribus inflammatoriis, malignis, exanthematicis, difficulter procedentibus, a lœsionibus partium nervosarum gravioribus, in specie capitis, aut aliarum ipsi vicinarum, quemadmodum utrique ætati a vermisbus haud infrequentes esse solent.

LIV.

Epilepsia subjecta, quoad etatem, magis adulta, ratione temperamenti, cholERICA, & melancholica, ut plurimum observantur.

SCHOL.

Possunt equidem epilepsia veræ omnes ætates subjici, cum autem in ætate infantili & puerili, ordinarie maxima suspicio aliorum affectuum morbosorum, & ad minimum verminosæ sobolis subsit atque concurrat, hanc ob rationem ætas adultior quasi cum illius exclusione, tanquam subiectum morbi consideratur.

Temperamenta quod attinet, illa præ aliis huic affectui subjecta existunt, quibus firmiores sunt fibræ, & quæ de reliquo ad exacerbationes motuum præcipue ab animi pathematisbus, ira aut terrore, proniora sunt, quo respectu cholERICA & melancholica temperamenta, & quæ horum quidquam sub reliqua miscela continent, magis ad hunc morbum inclinant.

LV.

Causam convulsionum materialem & proximam quod cernit,

cernit, hæc erit diversa, pro diversitate morbi, cui convulsiones junguntur aut superveniunt.

SCHOL.

Cum enim convulsiones symptoma sint, alios morbos concomitans, quisque sane facile videbit, causam non subesse peculiarem atque specificam ratione convolutionum, sed generaliorem, ab ipso morbo cardinali dependentem, quatenus nempe ipsa natura generalem ipsius morbi causam, ut summe sanguinum, ejusque affectus maxime periculosos aut deleterios, aut dolorificos atque molestos, vel physice sentit, vel moraliter estimat, ideoque sub generaliore intentione molestias aut noxas molendi aut removendi, ejusmodi motus suscipit, & gradu majore aut minore intendit, ut id, quod ordinariis motibus obtemperare nec potest, nec cupit, violentia quadam exprimatur & expellatur.

Ita sub dentitione difficiliore causam materialem præbent dentes, qui ut plurimum sub sui protrusione ordinaria magis gingivas & periodicum, maxillas investiens, pungendo, premendoque afficiunt, ibique dolores sensibiles excitant, unde per consensum partium nervosarum natura communicantur idem molestæ, ut inde commoveatur ad violentæ excussionis susceptionem.

Sub variolis atque morbillis, ut & sub reliquis febribus contagiosis, malignis, inflammatoriis & exanthematicis, miasma illud morbosum adest, quod, si diutius in massa humorum persisteret, vel semel expulsum ad eandem retrocederet, tam mixtionem humorum invertere, quam texturam partium solidarum internarum ac nobiliorum labi ulceratoria, aut putredino-sphacelosa afficere atque evertere posset: quod ut præcaveatur, motibus ordinariis & placidis non sufficientibus, aut per causas occasionales turbatis, natura extraordinarios tales ac violentos motus haud raro suscipere solet.

Læsiones partium membranoso-nervearum si adsint, sive a vulnere, sive a corrosivis & causticis, quorum etiam venena pertinent assumenta, dolor gravissimus, sensus maxime incurrens, producitur in parte lœsa, ibique prima ad spasticam tractionem suppeditatur occasio, quæ per nervos altius communicata, motum quasi reciprocum causatur, ut natura,

quæ

quæ per nervos sensum molestissimum sub specie motus continuati percepit, nunc per eosdem nervos reactionem instituat, partesque solidas extra ordinem moveat, quo causa molestia, si fieri potuerit, impetu quasi removeatur.

Idem fere observatur a vermium præsentia, si vel vivi dentibus intestinorum tunicæ nerveæ adhærent, vel aut vivi, aut mortui, ex magno numero in globos convoluti, intestina, præsertim tenuia, nimium expandant tantisque, vel corrupti ac putridi putredinosæ corruptionis ulteriore dissemination & communicationem minentur.

LVI.

Occasionalem convulsionum causam frequentissime suppeditant animi pathemata graviora, & refrigeratio.

SCHOL.

Inter animi pathemata hoc facientia præcipue ira & terror eminent, a quibus ordinarie motus spastici excitantur, in totum corpus redundantes, qui speciatim in gravioribus morbis exitiosi esse solent.

Refrigeratio autem maxime considerationem meretur sub affectibus exanthematicis, sive chronicis, sive acutis, cum facilissime exanthematum retrocessionem & translationem ad partes internas nobiliores producere valeat.

LVII.

Epilepsia, quam idiopathicam esse diximus, causa prima & proxima ut plurimum sunt immateriales.

SCHOL.

Rarissime enim sub pervestigatione causarum aliquam materialem inveniemus, quæ tanquam proxima, unde primi illi motus originem sumferint, accusari possit, licet deinde ejusmodi causæ non deficiant, quibus affectus semel praesens foveatur, augetur, graviorque redditur, sed ordinarie primam ipsius causam proximam antecedentem offendimus im-

mate-

materialem, motuum fundamento nitentem, quæ ex anigi pathemati-
bus gravioribus, ira nempe, aut terrore oriunda, affectum animi &
anima æstimatorum inducit; dum ex impressione & præfiguratione
anima vehementi, & maxime repentina ac inopinata, licet falsa quando-
que & erronea, ordinarii motus turbantur, & in eorum locum tales
suscipiuntur eorundem exacerbationes, quæ generaliter intentionem
quidquam molesti aut periculosi avertendi, summa violentia abigendi,
aut effugiendi, indicat, unde omnes epilepticorum motus, qui in ar-
tibus & toto corpore, nec non thorace observantur, in genere exactis-
sime convenient cum illis motibus & conatibus eluctatoriis, qui ordi-
narie sub vehementi iracundia, pugna, contentionibus, per manus &
artus fieri solent, ea tamen distinctione, ut differentia temperamenti
maxime elucescat, & motus illi a suo vigore sub defectu temperamenti
prioris cholericæ, aut cholericæ-melancholici, multum remittant.

Unde pro hac diversitate sæpiissime quoque concurrunt vel cla-
mos illi ejulatus, & suspiriosa, sæpius anxia repetita respiratio, quæ
itidem generaliter coincidit cum vociferationibus & exclamatiōnibus ira-
cundis atque rixosis, sub ira occurrentibus: vel meticulosa & erra-
bunda quasi anxietas, quæ post terrores graviores, vel solos, vel cum
ira complicatis solennis esse solet, ac variis vagisque oculorum, den-
tium, oris & linguæ motitationibus, deficiente tamen sermone & lo-
quela, sese exferere solet, & sub epilepsia itidem per oculorum vibra-
tiones, & vel fixas truculentas, vel tortuosas & torvas motitationes,
dentium stridores, linguæ volutationem variam conspicua existit: quæ
omnia tandem vel in manifestiores & generales quasdam excretiones,
urinæ, exrementorum, spermatis, ciborum e ventriculo, pro diversitate
causarum concurrentium, vel in defatigationes & lassitudines membrorum
insignes desinunt, nec raro torpores ac debilitations circa actus ratio-
nales post se relinquent.

LVIII.

*Similis conditionis est dispositio hereditaria, sæpiissime soli-
tarie causam primariam constituens.*

SCHOL.

Satis frequenter enim in quibusdam individuis nullæ tales causæ
ab iracundia aut terrore principaliter adsunt, sed hæc altioris recessus
Goschwitzii Pathologia.

Fff

causa

causa subest, qua natura iisdem motibus quasi assuefit apud infantes, quibus obnoxii fuere parentes, ita tamen, ut tanto facilius in actum deducantur, si eadem causæ antecedentes accedant, a quibus apud parentes affectus concitatus fuerat, aut ad minimum ab iisdem foveantur, cum præcipue ejusmodi subjecta vel ex naturali dispositione teneriora & sensibilia existant, vel ex educatione indulgentiore talia fiant, eamque ob rationem ipsiis animi pathemata tanto facilius noceant.

Nec possum, quin huc etiam referam consuetudinem convulsivorum motuum prægressam, quo nomine aliquando illi in ætate proventiore, a causis denuo accendentibus, epilepsia facilius subjiciuntur, qui in pueritia affectibus convulsivis symptomaticis frequentius expositi fuere.

LIX.

Pro ulteriore autem epilepsia fomentatione & inveteratione, concurrere possunt cause materiales varie.

SCHOL.

Quando enim semel producta est epilepsia a causa immateriali antecedente, facile quid est, ut deinceps a causis materialibus concurrentibus, & occasionalibus accessoriis, non modo foveatur, sed de novo semper exciterur, promoveatur, & augeatur, quæ licet variae sint, ut plurimum tamen ita comparatae sunt, ut motuum concitationibus ansam præbeant, suique excretionem generaliter poscant.

LX.

Pertinet aliquando ad hanc causarum classem plethora, cum sanguinis consistentia spissiore.

SCHOL.

Hæc enim motus naturæ intensiores pro attenuatione & imminutione poscit: quod tanto facilius succedit sub plethora commotione a potibus spirituosis ac inebriativis, quæ ordinarie in ejusmodi subjectis plethoricis paroxysmorum promptiores recursus caufari solet, & quidem tanto magis, si venæctionibus jamjam adsueta, easdem neglexerint, sub qua circumstantia facililime circa æquinoctia, aut solstitialia tempora recurrere solent paroxysmi.

Pari

DE MOTUUM EX-

Parte fundamento illi non
no fero circa mediu[m] temp[or]e
d' bonis modum habent
in faccedentem, promovent
modo mons per erroremHanc raro nascitur
visus in variac[i]is subiectuVenerabilium enim progra
u connexiones disponunt, a
unica excretioni levata, utSimili queque modo p
confundunt.Quando nempe hoc mor
phantulimibus detestis, vi
venerem totius supp[er]im
i' intendit, vi quod remen
tereis, ad spathium genit
iger, d' id exercitio spatu
rum experient, non tam
individua, quodcum sum vir
gina correpti fuerint, quod
illa, sed parsimno epilep
sius ejaculator, quæ ordinat

Mania, ej

Mania est delirium idiop
totius sua sitre

Pari fundamento illi nituntur paroxysmi epileptici, qui in foemino sexu circa menstrua tempora occurtere solent, ubi natura semel ad horum motuum habitum delata, mensum, præcipue paulo difficilius succedentium, promotioni, non raro sine necessitate, exacerbatos ejusmodi motus per errorem adplicat.

LXI.

Haud raro nimia quoque ciborum & potuum ingurgitationes in voracibus subjectis, paroxysmorum recursus accelerant.

SCHOL.

Ventriculum enim prægravando, eundem ad nauseosas & spasticas ipsius commotiones disponunt, simul quoque sub paroxysmorum finem vomitoriae excretioni favent, aut illos in diarrhoeam terminare faciunt.

LXII.

Simili quoque modo phantasia venerea sapius causam tam constituant.

SCHOL.

Quando nempe hoc morbo correpti juniores, plethorici, venereis phantasmatibus detenti, vel ex nimia continentia, aut castitatis voto, venerem totaliter supprimunt, ac materiam, quam excernere natura intendit, vi quasi retinent, vel quando e contrario motibus illis venereis, ad spasticum genus aliquatenus pertinentibus, nimium indulgent, & sub excretione spermatica, aut post illam, paroxysmorum recursum experiuntur, unde exempla prostant, quod specialiter ejusmodi individua, quoties cum uxore concubuerunt, sub actu venereo epilepsia correpti fuerint; quod idem in aliis subjectis denotat involuntaria illa, sub paroxysmo epileptico facta, membra virilis erekcio, spermatisque ejaculatio, qua ordinarie paroxysmi solvuntur.

Mania, ejusque species.

LXIII.

Mania est delirium idiopathicum, seu gravissima rationis perturbatio sine febre.

SCHOL.

Non dubitamus, hunc affectum morbidum ad morbos motuum exacerbatorum referri posse, cum partim sub motuum exacerbatione sese manifestet, partim ipse morbus sit principii moventis & agentis in corpore nostro, animæ.

Distinguimus autem maniam ab aliis deliriis, quod hæc sint symptomatica, sub febrilibus affectibus concurrentia, mania vero existat idiopathica, nullamque febrem comitem agnoscat. Individua enim maniaca de reliquo quoad corpus sana apparent, appetitu gaudentia bono, orthostadia fruuntur, motusque voluntarios non modo libere peragere possunt, sed violenter ut plurimum exercent; sub sermonibus inconcinnis, minus connexis, vociferationibus, clamoribus, & furiositate conjuncta, præcipue si ad iram commoveantur.

LXIV.

Differentia maniae occurrit tam quoad gradum, quam quoad objectum, circa quod versatur.

SCHOL.

Respectu gradus alia est levior, quæ solis sermonibus inconcinnis, cantationibus, aut gesticulationibus insolitis sese manifestat; alia vero gravior, quæ violentiis variis sese exserit, & in furorem abit, ut vel homines violenter aggrediantur ægri, vel res durissimas, vincula, catenæ, aliaque frangant. Ratione objecti, circa quod versatur, alia ludicra, jocosa atque ridicula tractat, quæ Medicis moria aut morosis audit; alia est occupata circa amorem certæ cujusdam personæ alterius sexus, quæ si moderatior adhuc existat, erotomania, si autem in sexu sequiore ad summum gradum lascivi desiderii, cum gestibus impudicis, corporisque denudatione pervenerit, furoris uterini titulum gerit. Alia circa objecta meticulosa, tristia observatur, tristibusque gestibus, solididine, humani confortii fuga & aversatione, gemitibus, suspiriis sese prodit, quæ melancholia vocatur.

LXV.

Subjecta huic affectui obnoxia pro diversitate objecti sunt diversa atque varia.

SCHOL.

SCHOL.

Si enim strictiore sensu maniam accipiantus, quæ ut plurimum furosa esse solet, vel ad minimum facile in furem degenerat, & quæ circa objecta iræ aut ambitionis versatur, omnium maxime temperamentum cholericum, aut cholericо-melancholicum ipsi subjicitur, quippe quod naturaliter ad actiones vehementiores, taliaque animi pathemata erronea inclinat.

Ad morosin vel sanguinei, vel juniores personæ, vel etiam senes, procliviores existunt, quippe quibus familiaris esse solet minor judicij firmioris usus, & major ingenii lusus, varias diversasque ideas, multum saepe confusas, producens.

Erotomania & uterino furori maxime subjiciuntur personæ utriusque sexus juniores, plethoricae, de temperamento sanguineo & cholericō participantes, venereis actibus vel animo indulgentes, vel jamjam adsuetae; unde tam virgines & adolescentes, quam viduæ juniores ipsi subjiciuntur.

Melancholia tanquam subjecta ut plurimum agnoscit temperamenti melancholici personas, quippe quæ minore judicij perspicuitate gaudent, majore vero sanguinis spissitudine laborant, ideoque variis sanguineis infarctibus, stagnationibus, oppletionibus obnoxiae existunt, meticulosæ sunt, mœstitia deditæ, patresque difficultatum semper audire solent.

LXVI.

Subjectum speciale ipsius afflictionis morbos & aliud constituere non possumus, nisi ipsam animam.

SCHOL.

Hæc enim in his affectibus vere ægrotat, nec sana existit; unde etiam jure meritoque hi morbi, morbi mentis dicuntur, in quos medicus, qua talis, sane minimam potestatem habet, ut directe & immediate aliquid ad illorum sanationem præstare valeat, sed potius moralibus regulis, propositionibus ac remonstrationibus majora jura tribuere necesse habet.

Cum vero anima nostra ita ægrotans, per varias materiales in corpore harentes causas, a faciliori restitutione ad integratatem, multoties

datur, saepe medicus occasionem nanciscitur, ut privative aliquid agere, illasque causas malum aggravantes & foventes, subtrahere possit, & hac via mentis ægritudinibus mederi valeat.

LXVII.

Causa talismodi materiales, omnes hosce affectus secundum suas species foventes, consistunt vel in sanguinis & humorum generali abundantia, & orgasmō; vel in sanguinis spissitudine; vel denique particulari ipsius congestione restagnatoria.

SCHOL.

Prima harum causarum ordinarie subest in mania stricte dicta, æque ac causarum tertia: Individua enim cholérica & cholericō-sanguinea, quando plethora laborant, simul ad orgasticam sanguinis commotionem & expansionem pronissima existunt: quæ pedissequam agnoscit peculiarē, majoremque ipsius ad caput congestionem restagnatoriam, unde vasa sanguifera turgida meninges expandendo substantiam cerebri premunt, nec non seniorium commune ita afficiunt, ut illud suo officio satisfacere nequeat, nec anima suas actiones principes per organum principale ita affectum & alteratum, in corpore, debito modo edere valeat.

Nec minus valet eadem causa, sanguinis nempe abundantia, atque major, quam par est, ad caput commotio, in morosi simpliciore, præcipue si juniores aggrediatur: cum in senibus causa magis in genere nervoso debilitato quærenda videatur.

Ad erotomaniam & furorem uterinum si mentem dirigamus, omnino sanguinis abundantia & orgastica commotio manifestissima esse solet, cum dicti affectus sub plena lautea diæta occurrant, optimeque sanguinis detractionibus & fame curentur: quæ causa etiam in virili sexu specialem orgasmum spermatis virilis, & peculiaria hinc pendentia symptomata venerea tentiginosa, causatur. In fœminis autem peculiaris concurrit sanguinis restagnatoria congestio circa uterus in furore uterino, unde vel mensum suppressiones, vel corundem largiores & minus tempestivæ eruptiones concurrere solent.

In

In melancholia autem potissimum sanguinis spissitudinem accusare licet, partesque, per quas sanguis moveri debet, angustiores & strictiores: hoc enim utrumque, sicut in statu sanitatis causa existit, ut melancholi difficiliorum habeant sanguinis circulum, præcipue per capitis & viscerum abdominis confinia, ideoque circa actiones animales tardiores, difficiliores, meticulosi, speculabundi, timidi existant, ita in hoc statu morbo animæ maximum quoque confert symbolum pro aggravando fovendoquo malo.

LXVIII.

Causæ remotiores & antecedentes, materiales tamen, ex iis, quæ sepius in pathologicis, alia occasione proposita sunt, facile erunt inveniendæ.

SCHOL.

Sunt enim illa omnia ex diæticis, quæ vel plethoram in genere augent, vel sanguinem orgastice commovere possunt, vel spissitudinem nimiam ipsi conciliant: quo nomine, diverso tamen respectu, accusare licet diætam plenam, lautam, vinosa, aromaticam, spirituosa, cum vita otiosa junctam: potuum sufficientium & diluentium tenuiorum defestum: ventilationum sanguinis & motuum laboriosorum corporis negletum, nec non excretionum debitum naturalium suppressionem, quo ipso etiam tam mensum suppressionem, quam in viris licitam & debitam spermatis excretionem denegatam, intellectam volumus.

LXIX.

Causa primaria & proxima omnium horum affectuum est immaterialis.

SCHOL.

Consistit enim semper in illegitima objectorum, circa quæ versantur, estimatione morali, & nimis firma idearum de illis fictarum aut conceptarum impressione & præfiguratione, quæ alio, quam par est, ordine celebratur.

LXX.

Occasionales causæ admodum sunt varie, pro diversitate temperamentorum & individuorum.

SCHOL.

SCHOL.

Ita enim uni occasionem præbet ira, cum ambitione mixta, alteri voluptas atque libido: sicut alii per curas domesticas, ærumnas, meditationes & speculations profundiores circa res spirituales, peccata commissa, pluraque alia, ad infortunatam hanc mentis conditionem disponuntur ac detruduntur.

Hydrophobia, seu rabies canina.

LXXI.

Hydrophobia est gravis & peculiaris maniaci delirii species, a morbo canis rabidi in specie producta.

SCHOL.

Distinguit se hoc delirium ab aliis, præcipue ob causam plane specialem, nec non peculiaribus plane symptomatibus. Rabies enim canina propterea vocatur, quod partim a morbo canis rabidi oriatur, partim homines ita afflicti canibus quasi similes reddat; dum in majore ipsius gradu latrant, ejulant, mordent, ore spumant, dentibus strident, ringunt, consortium hominum fugiunt, & specialissime instar canum rabidorum, aquas & liquida timent, (unde affectus hydrophobiæ nomen accepit.) De reliquo commotiones febriles, cardialgicæ, cordis palpitationes atque tremores, cum somni defectu, viriumque prostratione, facie rubicunda, oculis torvis atque fulgentibus, huic affectui sunt solennes.

LXXII.

Subiecta certa bujus affectus haud determinare licet, dum omnes ipsi subjecti existunt, qui morbum canis rabidi passi sunt, nec cito a causa morbifica liberantur.

LXXIII.

Causa materialis proxima & immediata bujus mali, est miasma venenarum, cum saliva canis rabidi communicatum.

SCHOL.

Hoc enim tanquam summe agile atque subtile fermentescibili sua indole sub morbo & vulnere inficto sanguini & humoribus communicatum, instar aliorum miasmatum humores penetrat, motusque peregrinos dissolutorios producit, & procul dubio partibus nervosis nobilioribus

DE MOTUVA EX
mentis maxime intentione
genere miasma, quales
actica oboris, crin, solent
peritos, & gravis, quo
miser, specialissime in ani-

C
DE MORB
DI

V
vire, a mias
in genere es
lari sensatio
rationis depravati
manifestant,

Sicut in antecedente capi
do motuum extorquenti
tadre necessarius ludet,
remotionem & circumspectio
nem inter alias, affectus

APO

Applexia est abolitionis
vibrarum totalem & repres-
generis nervos officio de
manifester se applexa, q
decidit, sine non volunt
bus solens pullo ac rebus
Graecian Polyporum

bus internis maxime infensum existit; ut inde tales motuum anomaliae in genere nascantur, quales sub febribus etiam malignis, a causa miasmatica obortis, oriri solent. Ubi haud parum contribuit terror ille repentinus, & gravis, quo personae tales sub morsu canis rabidi afficiuntur, specialissime in animo turbas primo afficiens.

CAPUT II. DE MORBIS EX MOTUUM DEFECTV.

I.

Morbos, a motuum defectu pendentes nominamus in genere eos, qui maxime sub totali aut particuliari sensationis & motus voluntarii abolitione, nec non rationis depravato usu simul juncto, in sensus cadunt, seque manifestant.

SCHOL.

Sicut in antecedente capite illos pertractavimus affectus morbosos, qui sub motuum extraordinaria exacerbatione contingunt, ita hos etiam pertractare necessitas suadet, cum æque periculosi existant ac illi, sive que remotionem & curationem poscant: sunt autem affectus huc pertinentes inter alios, affectus apoplectici, soporosi & lipothymici.

Apoplexia.

II.

Apoplexia est abolitio rationis, sensationis & motuum voluntariorum totalis & repentina, in toto corpore se manifestans, a lesio generis nervosi officio dependens.

SCHOL.

Manifestat se apoplexia, quando ægri repente ac subito quasi attoniti decidunt, sine motu voluntario, & sensu, ac rationis exercitio, superstite solum pulsu ac respiratione, oculi modo clausi, spasmo tamen Coschowitzii Pathologia. G g g non