

Stengel vor-  
 ange Wurzel-  
 den aber auch  
 haben ungefähr  
 ein Finger und  
 vier Zoll lang;  
 er hart an, ist  
 innen, weichen  
 besteht aus mit  
 einem be-  
 weichen, sehr  
 weichen - voll  
 steht die Wurzel  
 dem Geruch, der  
 nur viel stär-  
 ker der Geruch  
  
 und enthält die  
 mit Benzoesäure  
 im Wasser ge-  
 löst, ein gelbes  
 oder in kaltem  
 Wasser eine ei-  
 genartige und  
 harte Materie  
 abzuscheiden  
 kann, süß-  
 sauren Kalk.  
 In der Arznei,  
 als Kramel und  
 — Die Gegen-  
 andes (Leber  
 der natürlichen  
 arten. — Sollen  
 von derselben  
 möglich.  
 oben angeführte  
 ich noch fol-  
 gende mit Bern-  
 stein oder die Ck. as-  
 the racemosa  
 h aus dem bei-  
 vorgeht. Wenn  
 man zu Menschen  
 an soll, so steht  
 in Widerspruch,  
 man, daß ich  
 erst der Blüte-  
 Wahrscheinlich  
 ten der Gattung  
 überin.  
 e n.  
 25.  
 26.



*Chiococca racemosa, Linn.*

39

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Chico  
Ch.

Die  
allers,  
Trenn  
Die  
des Bab  
des Dur  
einh  
Jann, f  
Hökers  
Hö sil  
Wend  
einh  
der Galt  
einh  
an  
wurde  
Stap  
Jap  
mit  
einh  
in  
Jann  
Jap  
Jann  
Jann  
Jann