

sunt. Ab ejusmodi doctoribus illi, qui armentorum pecorumque ægrotorum curam habent, ut salutaria consilia, atque auxilia petant, adigendi sunt. Vid. Cel. Jo. Christ. Polyc. Erxleben Einleitung in die Vieharznenkunst. Göttingen 1769. practischer Unterricht in der Vieharznenkunst. ibidem 1771. Hrn. Franz Jos. L. B. von Lam bewährte Horren Schaf. Pferd. und Gederviehs Arznenkunst. Wien 1765. Hrn. von Sind vollständiger Unterricht in den Wissenschaften eines Stallmeisters. Frankf. u. Leipz. 1769 Ejusd. Abhandlung von der Nährkrankheit der Pferde, ib. 1768.

Cap. X.

De pharmacis, quæ in pharmacopolis publicis prostare debent.

§. CXXIX.

Pharmacorum Schema.

Licet inutili remediorum copia officinæ publicæ haud gravandæ sint; necessarius tamen eorum numerus rectaque qualitas, requiritur. Aliquam de illis normam daturus, schema aliquod, a viris nonnullis in medicina ac pharmacia eruditissimis datum a summo Magistratu comprobatum, & a mentorulis auctum, hic subiiciam; quod pharmacopoliis apta ratione visitandis inservire

pot.

poterit. Cum autem in urbium minorum officinis pharmaceuticis remedia simplicia bonæ notæ, & ex compositis non nisi usitissima, asservare, satis sit; asterismo notatorum coemptio & præparatio ejusmodi pharmacopeis præcipienda non est; cum plerumque ad Medici atque Chirurgi, ibi, vel in vicinia, habitantium, præscripta pharmacorum, maxime compositorum, apparatus accommodent.

Schol. Primo corpus pharmaceuticum secundum tria naturæ regna, & dein chymicum pertractantur. Interdum tamen, propter materiarum similitudinem, ab hoc ordine recessum est.

§. CXXX.

Naphtha terræ ejusque productæ.

Naphtha terræ, vel petroleum album.
Ambra grisea, levis, striata, maculosa sit, rubrum vilius est. Acui candenti non adhaereat, accensa flamمام concipiatur, gratumque odorem spargat, & nihil vel parum relinquat.

Asphaltum, bitumen Judaicum, est bitumen minerale, induratum, fragile, splendens, nigrum, tritum fuscum, accensi odor gravis.

Suc-

Succinum in fragmentis.

Praeparatum.

§. CXXXI.

Sales styptici eoruinque praeparata.

Alumen crudum.

Ustum.

Vitriolum album.

Cyprinum.

Martis, purum non natura, sed arte
producitur.

Colcothar, seu caput mortuum vi-
trioli.

Naphtha.

Oleum vel acidum concentratum.

Phlegma, vel ros.

Spiritus.

dulcis hic naphtha vitrioli nobilitatus
liquorem mineralem anodynum Hoff-
manni constituit.

§. CXXXII.

Arsenicum & auri pigmentum.

Arsenicum, sal semimetallicus est.

Pulverulentum, album.

Crystallinum, naturale.

Artificiale, cum sale alcalino sub-
limando factum.

Flavum ex IX. arsenici partibus &
sulphuris una sublimando factum.

* Ru.

Rubrum ex X. arsenici & sulphuris
duabus partibus eod. modo fit. Fla-
vum & rubrum natura productum
rarius occurrit.

Auripigmentum, sandaracha Graecorum
est minerale ex arsenico & sulphure con-
strans, flavum, & micis quasi aureis
splendens. Ex hoc & aqua calcis vivae
liquor docimasticus vinorum lithargyrio
infectorum, hepar sulphuris arsenicale,
paratur, & recens ad hunc usum opti-
mus est.

§. CXXXIII.

Sulphur.

Sulphur citrinum, particulis terreis non
inquinatum sit.

Flores sulphuris, est sulphur sublimando
depuratum.

Lac sulphuris.

§. CXXXIV.

Sales essentiales.

Ad sales acidos essentiales, in officinis se-
vandos hi referuntur:

Sal aceto sellae.

Suicini volatilis, sunt crystalli squamosae,
oleo fo-acidae. Succino pulverato, cre-
more tartari, saccharo Thomae, sale am-
monico vel communi adulterars solent.

Tar-

Tartarus crudus.

Cremor tartari, terra alba non adulterata sit.

Crystalli tartari.

§. CXXXV.

Sales alcalici, volatiles et fixi.

Salum alcalinorum volatilium atque fixorum sequentes, puri, in officinis proflare debent:

Sal cornu cervi volatilis.

Volatile Anglicanus siccus, a cathartico Anglicano differt.

Oleosus sylvii.

Viperarum.

Cineres clavellati, albi sint.

Sal absintii.

Cardui benedicti.

Centaurei minoris.

Genistæ.

Plantarum, vel herbarum universalis.

Sales plantarum sulphuris acido non imbuti, multo minus saturati, sint.

Soda, vel soda Hispanica depurata.

§. CXXXVI.

Sales medii.

Sales medii accurate saturati, nec particulis terreis, vel metallicis, inquinati sint.

Sal acidularum catharticus. v. c. Ebshamensis, Egranus, Sedlizensis, Seidschutzenfis &c. vel artificialis ad horum naturam præparatus.
Ammoniacus.

Flores martiales, aroph. Paracelsi.
Simplices.

§. CXXXVII.

Sacchara.

Ex sacchari speciebus sequentes in officinis servantur:

Saccharum album, durum, albissimum sit. A veterum saccharo naturali, seu succo arudinis sacchariferæ, solis calore in spissato, ut artificiale, differt.

Lactis.

Penidium.

Perlatum.

Manna est succus dulcis, natura concretus, cum saccharo naturali similitudinem habens. Cala brina duriuscula & quodammodo translucens est.

§. CXXXVIII.

Terræ.

Terræ officinales genuinæ & puræ sint, ceteroquin perinde est, ex quanam regione desumptæ sint.

Bo-

Bolus alba, linguæ prompte adhæret, atque ex albo rubescens est.

Rubra.

Calx viva, recens & bene asservata sit.

Magnesia nitri est terra alcalina, evaporatione, & calcinatione, non autem præcipitatione cum acido vitrioli, præparanda. Levissima atque albissima sit.

Terra sigillata alba.

Rubra. A bolis non, nisi forma, differunt.

§. CXXXIX.

Lapides.

Pluribus lapidibus usu medico destitutis officinæ gravatæ sunt; ex illis hi usitatores sunt.

Corallia alba.

Rubra.

* Crystallus montana præparata; qua tam, tanquam humoribus nostris in solubili carere possumus.

Lapis hæmatite.

Spongiarum.

§. CXL.

Metallica & semimetallica.

Cerussa alba, pura & ponderosa sit.

Chalybis vel Martis limatura, pura, nec

I 2 par-

particulis aeneis aut aurie¹ a'ceis qualis
claustrorum est, inquinata, nec ferru-
gine exesa sit.

Crocus Martis adstringens, rubeus est.

Aperitivus antimoniatus Stahlii dilatè ru-
bet, atque antimonio diaphoretico mar-
tiali quodammodo similis est.

Lapis infernalis, lunaris, niger & com-
paetus sit.

Lithargyrium; quod pro calcinationis grà-
du & colore flavo vel albo, in aureum
atque argenteum vulgo dividunt.

Minium.

Plumbum ustum.

Saccharum saturni crystallinum.

Viride aeris, vel ærugo aeris.

Cadmia fornacum
(Ofenbruch) vel nihil

album, pompho-		lxv, flores Zinci
lvx, flores Zinci		
albi, acrimoniae ex-		partes sint.
albi, acrimoniae ex-		
Grise-um, tutia		præparata, modice
præparata, modice		
gravis.		

Fossilis, lapis calaminaris, minera
Zinci cinerea vel rubescens est.

§. CXLI.

Antimonium ejusque præparata.

Antimonium crudum, purum atque stria-
tum sit.

dia-

diaphoreticum edulcatum, album,
in lipidum, non emeticum sit.
non edulcatum.

Martiale, vel cachec-
ticum martiale.

Antimonii butyrum, liquor crassus, regu-
lino acidis & corrosivus est.

Clylus.

hepar, vel crocus metallorum,
calx antimonii partibus reguli-
nis inquinata, emetica, atque
fusca est; ad tartari emet, præ-
parationem adhibetur.

Regulus martialis.

medicinalis, seu febri fu-
gum cranii, sine sale
communi parandus, a
scoriis rite separatus sub-
tilissime pulveratus, insi-
pidus & coloris punici sit.

Sulphur auratum ultimæ præcipi-
tationis.

rubrum, vel Kermes mine-
rale, multo cariore, quam
præcedens, pretio constat.

Vitrum rite fusum, & coloris hyacinthi-
ni, sit. Ex hoc tartarus emeticus
præparatur, & respectu doseos, an-
cum duplici vel simplici crystallorum
tartari portione factus sit, sciendum est.

§. CXL.II.

Mercurius ejusque præparata.

Mercurius currens, seu vivus, purus sit. dulcis, densus atque insipidus sit, cum aqua calcis vivæ colorē nigrescentem, sed cum solutione alcalina non aurantium, induat. Rarus & acris nocet.

Præcipitatus albus, probe edulcatus sit. sublimatus, vel corrosivus. acer- rimum venenum est. Turpet thum minerale, citrini coloris, probe edulcatum sit.

Aethyops mineralis.

Antimoniatus.

Cinnabaris factitia.

nativa, pura particulis lapideis non inquinata sit; factitiæ puræ non est præstantior præparata; usibus internis destinata minio non adulterata sit.

§. CXLIII.

Fungi.

Ad fungos officinales sequentes pertinent:

Agaricus, albissimus, levis & tragilus sit.

trochiscatus, recens, nec viribus defectus sit. quer-

quercus pedis equini facie, præ
paratus, hæmotaisticus.

Fungus chirurgorum, lycoperdon.
Sambuci.

§. CXLIV.

Radices officinales.

Radices justo tempore effosse, rite de-
puratae, siccatae atque asservatae, non cor-
ruptae, cariosæ, atque inertes sint.

Radix althææ.

Alkannæ rubræ, sapor ex subacri
subdulcis.

Angelica, fibrofa, ex subacri ama-
rescens apii.

Ari, aronis, serpentariæ majoris. Sa-
por non nimis vestitæ acris.

Aristolachiæ cavae, globosa, intus
cava, fusca, peramara.

Radix aristof-
lachiæ veræ { longæ, crassa, extus fusca,
intus alba, amaresiens.
Rotundæ, crassa, aliquatenus
globosa, extus fusca, intus
subflava, amara.

Asari, tenera, fibrofa, extus fusca,
intus subflava, acerrima.

Apargi sativi.

Bardanæ.

Bistortæ, vel serpentariæ vulgaris ru-
bræ, acerba; extus subnigra, in-
tus rubea.

- * **Brusci vel rufci, myrti folii, aculeati,**
albida, ex subdulciamara
- Bryoniæ, vitis albæ, prægrandis,**
alba, ex acri amara.
- Calami aromatici acori veri, excor-**
ticata alba, ex acri amara.
- * **Capparum, subflava, subdulcis.**
- Carlinæ, cardopatiæ, subflava ex acri**
subdulcis.
- Caryophyllatæ, fibrosa, fusca, sapor**
& odor aromaticus.
- Chinæ, crassa, ponderosa, farinosa,**
fere in sapida, extus fusca, intus
ex pallido rubea. Non sit cariosa.
- Cichorei sylvestris, extus fusca, in-**
tus subflava, amarescens.
- Corsolidæ majoris, symphyti, extus**
nigra, intus fusca, mucilaginosa,
insipida.
- Contrayervæ Peruvianæ, fibrosa, ex-**
tus fusca, intus subflava, subacris.
- Costi amari, crassa, interdum per-**
medium dissecta, extus fusca, intus
subflava, ex subacri amarescens.
- Circumæ, ponderosa, saturate flava,**
aromatica, non cariosa, sit.
- Cyperi rotundi, parva, coniformis,**
extus fusca, intus subflava, ex acri
aromatica.
- Dystamni albi, hujus radicis cortex**
al-

albus in officinis servatur, odor aromaticus, sapor ex subacri amarus.
Enuke, helenii, fusca, sapor ex acri amarus, odor aromaticus.

Galangæ minoris, tuberosa, ponderosa, extus fusca, intus rubea, acris, aromatica, non cariosa sit.

Glycyrrhizæ, lequiritiæ.
Ejus baculi.

Graminis.

Hellebori albi, extus subnigra, intus alba, sapor ex amarescente peracris.
nigri, nodoso-fibrosa, sapor ex amaro acris.

Hermodactylorum, cordiformis, in uno latere sulcata, extus subflava, intus alba, farinosa, subacris.

Jalappæ, mechoacannæ nigrae, fusca ponderosa, ex acri dulcis.

Imperatoriæ majoris, ostrutii, extus fusca, intus subflava, ex amaro acris, fragrans.

Ipecacuanæ, tenuis, nodosa, extus grisea, intus subflava, ex acri subamara.

Ireos Florentinæ, alba, farinosa, ex dulci acris, odor violaceus.

Levisticæ, extus fusca, intus subflava, ex subdulci subacris aromatica.

Liliorum alborum, alba, mucilaginosa, ex amaro subdulcis.

- * Malvæ vulgaris.
- * Mechoacannæ albæ, crassa, extus fusca, intus grisea, farinosa, ex subdulci peracris.
- * Pareiræ bravæ, crassa, lignosa, extus nigra, intus grisea, ex amaro acris.
- * Petañtidis majoris.
- Petroselini vulgaris.
- Pimpinellæ albæ, extus ex fusco flava, intus alba peracris.
- * Plantaginis aquaticæ.
- Pœoniæ, intus alba farinosa subdulcis.
- Polypodii vulgaris, extus ex fusco nigrescens, intus fusca, dulcis non lignosa.
- Pyrethri officinalis, extus obscure, intus dilute, fusca, peracris.
- Rhabarbari orientalis ponderosa, saturate flava, striis rubeis distincta, non cariosa, vel situ, corrupta, sit.
- Rubiæ tinctorum, extus pallide, intus saturate, rubra, subarama.
- Saponariæ majoris, lævis, extus fusca, intus subflava, subdulcis.
- Sarsaparillæ, tenuis, longa, extus fusca, intus alba, farinosa, subdulcis.
- Scorzonerae lati foliæ, extus flava, intus alba, farinosa, subdulcis.
- Spicæ Celticæ, alpinæ, Valerianæ Celticæ, sunt radices cum foliis aba-

to - oblongis, oblusis, integerrimis.
Color fuscus, odor armaticus, sapor
amarus.

Indicæ, nardi, graminis cypero-
dis aromatici Indici, spica incur-
va, ciliata structura fibrofa,
color fuscus, sapor, amarus
& aromaticus. Florum nomi-
ne utraque vulgo venit.

Squillæ, scillæ, alba vel subruba,
bulbosa, amara, taraxaci, extus füs-
ca, intus alba, subamara.

Tormentillæ, nodosa, extus obscure,
intus dilute, fusca, adstringens.

Turpethi, lignosa, extus obscure füs-
ca, intus pallida, subacris.

Valeriane majoris, fibrofa, fusca,
ex acri amarescens, minoris, fibrofa,
extus fusca, intus alba, subacris
aromatica.

Vincetoxici, hirundinariæ, fibrofa,
extus subflava, intus alba dulcis.

Zedoariæ, tuberosa, cinerea, ex
acri amaricans, fragrans.

Zingiberis albi, nodosa, pallida, acris
aromatica, non cariosa sit.

nigri, ejusdem plantæ ra-
dix, infusione cum aqua
fervida ita immutata.

§. CXLV.

§. CXLV.

Herbæ.

Herbæ genuinæ, justo tempore lectæ, rite siccatae, & mundæ, nec vetustate inertes, aliove modo corruptæ, sint.

Herba abrotani, angusti folii, chamæcy parissi vel santolinæ, pedunculis unifloris, foliis quadrifariam dentatis. Recens citrinolet, sapor ex amaro acris est.

* Absinthii Pontici, artemisiæ foliis multipartitis, subtus tomentosis, floribus subrotundis nutantibus, receptaculo nudo. Sapor amarus.

Vulgaris, artemisiæ, foliis compositis, multi, fidis, floribus subglobosis, pendulis, receptaculo pappolo. Sapor peramarus.

* Acetosæ, rumicis, floribus hermaphroditicis, foliis hastatis.

* Acetosellæ, oxalis, scapo unifloro, foliis ternatis.

Adianthi albi, rutæ murariæ, asplenii, frondibus alternatim decompositis, foliolis cunei formibus, crenulatis. Sapor amarescens.

nigri veri, capilli Veneris, asplenii, frondibus subtripinnatis,

natis, foliolis alternis, pinnis lanceolatis. Sapor subdulcis. Inter V. herbæ capillares refertur.

* Agerati, cupatorii Mesues, achilleæ, foliis lanceolatis, obtusis, acute ferratis. Sapor amarus est.

Agrimoniæ, foliis caulinis pinnatis, empari petiolato, fructibus hispidis. Sapor ex subamaro adstringens.

Alceæ, foliis sinuato angulosis.

Alchimillæ, majoris, foliis lobatis.

Sapor subamarus atque adstringens.

Althææ, bismalvæ, hibisci, foliis simplicibus tomentosis. Herbis V. mollientibus accensetur.

Anagallidis, foliis indivisis, floribus puniceis. Sapor ex amaro acris.

Anethi hortensis, graveolentis, feminibus compressis.

Aristolochiæ longæ, foliis cordato-oblongis, undatis, caule infirmo, floribus solitariis. Sapor peramarus, haueosus.

Arnicæ, veræ, ptarmicæ montanæ, doronici plantaginis folio, foliis caulinis oppositis.

Artemisiæ, caule purpurascente, foliis pinnati fidis, planis, laciniatis, floribus erectis.

Asari, foliis petiolatis, subcordatis,
floribus trifidis. Sapor amarus.

Basilici, ocymi vulgatoris citrati, fo-
liis ovatis, glabris, calycibus ciliatis.
Sapor acris, odor aromaticus.

Betonicae, spica interrupta, corolla-
rum lacinia labii intermedia emargi-
nata. Sapor subacris.

Borragini, foliis omnibus alternis,
calycibus patentibus.

Botryos Mexicanæ, ambrosioidis, che-
nopodii, foliis oblongis, sinuatis,
racemis nudis, multi fidis. Odor
suavis, sapor amarus.

Brancæ ursinæ, acanthidis, foliis
sinuatis inermibus. Subacris est &
viridi colore spiritum vini tingit.

Cardui benedicti, centaureæ, caly-
cibus duplicato spinosis, lanatis in-
volucratis, foliis semi decurrentibus,
denticulato-spinosis. Sapor amarus.

Centaurii minoris, gentianæ, corollis
quinque fidis, Hypocrateriformibus,
calycibus membranaceo carinatis,
caule dichotomo foliis cordatis. Sa-
por amarus.

Chaerfolii, scandicicis, seminibus
nitidis ovato-subulatis, umbellis sessi-
libus, tateralibus. Odor balsamicus,
sapor ex subaci aromaticus.

Cha-

Chamædryos, *teucrii*, *foliis cunei formi ovatis, incisis, crenatis, petiolatis, floribus subverticillatis, ternis, petiolatis.* Sapor ex amaro ad stringens.

Chamæpytios, *ivæ arthriticæ, teucrii, foliis trifidis, linearibus integrermis, floribus sessilibus, lateribus solitariis, caule diffuso.* Sapor amarus, recentis odor terebinthinæ æmulus.

Chelidonii majoris, *pedunculis n ulti floris.* Sapor ex acri subamarus & adstringens.

minoris, ranunculi, foliis cordatis, angulatis, petiolatis.

Cicutæ majoris, *aquaticæ maculatæ Gesneri, conii maculati, seminibus striatis.* Recentis odor cantharidum odori similis, siccæ sapor sub acris.

* *Cochlearia* foliis radicalibus subrotundis, caulinis oblongis, subsinuatis.

* *Consolidæ majoris*, *sympyti, foliis ovato - lanceolato - decurrentibus.* Sapor mucilaginosus.

* *Saracenica*, *virgæ aureæ angusti foliæ, minus ferratæ, solidaginiscaule erecto, racemis alternis erectis.* Sapor acris & adstringens.

* Cy-

- * Cynoglosi, foliis lanceolato, ovatis, tomentosis, corollis calycem & quantibus. Recentis odor quodammodo narcoticus est.
- * Dictamni Cretici veri, crigani foliis tomentosis, spicis nutantibus odor & sapor aromatici sunt.
- * Ebuli, sambuci, cymis trifidis, stipulis foliaceis, caule herbaceo. Recentis odor gravis.
- Erysimi, siliquis spicæ adpressis, foliis runcinatis. Siccae odor ingratus, sapor nullus, recentis autem acris.
- Euphrasiæ flore albo, foliis ovatis, linearibus, argute dentatis.
- Farfaræ, tussilaginis, scapo imbricato unifloro, foliis subcordatis, angulatis denticulatis.
- Fœniculi, anethi, seminibus ovatis. Fummariæ, pericarpiis monospermis, racemosis, caule diffuso. Sapor ex subacri amarus.
- * Galegæ, ruræ caprariae, leguminibus strictis, erectis, foliolis lanceolatis, strictis, nudis. Sapor dulcis.
- * Geranii Robertiani, pedunculis bifloris, foliis quinque trive partitis, lobis pinnatifidis, calycibus hirsutis. Recens fæter.

* Ga-

Gratiolæ, digitalis minimæ, floribus pedunculatis, servatis. Sapor ex acri amarus, nauseofus,

Hederæ terrestris, glaucomatis foliis reniformibus, crenatis. Sicce sapor ingratus.

* Hepaticæ nobilis, anemones foliis trilobis, integerrimis. Sapore & odore caret.

stellatæ, matrisylvæ, asperulæ foliis octonis, lanceolatis, floribus fasciculatis, pedunculatis. Odor suavis, sapor subamarus. Huic alias galii species v. c. quaticum, molluginem &c. male substituunt.

Herniarie glabrae herbaceæ, millegranæ. Recentis sapor subsalsus.

Hyssopi, spicis secundis. Recentis sapor & odor aromaticus.

Levisticæ, ligustici, foliis multiplicibus, foliolis superne incisis. Apium quodammodo sapis. Odor aromaticus.

Linariae vulgaris, flore luteo, anirrhini, foliis lanceolato-linearibus, confertis, caule erecto, spicis terminibus sessilibus, floribus imbricatis.

Lupuli salicarii, humuli.

Majoranæ, origani, foliis ovatis, obtusis, spicis confertis, compactis pubescentibus. Recentis sapor acris, odor aromaticus.

Malvæ vulgaris, caule procumberente, foliis cordato - orbicularibus, obsolete quinquelobis. Sapor mucilaginosus.

Mari veri, Syriaci, teucrii, folis ovatis, utrinque acutis, integrimis. Recentis oder fragantissimus, sapor acris.

Marrubii albi, denticulis calycinis setaceis, uncinatis. Sapor amarescens. Meliloti vulgaris, trifolii, floribus racemosis, leguminibus nudis, dispermis, caule erecto. Odor gratus, melleus.

Melissæ hortensis citratae, floribus ex axillis inferioribus subfessilibus. Citrum olet.

Menthæ crispæ, floribus spicatis, foliis cordato dentatis, undulatis, fessilibus. Odor aromaticus, sapor ex acri amarus.

Mercurialis, caule brachiatæ, foliis glabris. Mucilaginosa est, & V. herbis emollientibus annumeratur.

Millefolii, achillieæ, foliis duplicito-pinnatis, glabris, laciñiis linearibus, acute laciniatis.

Nicotianæ, hyoscyami Peruviani; foliis lanceolatis. Odor quodammodo narcoticus, sapor acris & nauseosus.

Ori-

Origani Cretici (vulgo Spanischer Hopfen) spicis aggregatis longis, prismaticis, rectis, bracteis membranaceis calyce duplo longioribus. Sapor ex acri amarus, odor aromaticus.

— vulgaris, sylvestris, spicis subrotundis, paniculatis, glomeratis, bracteis calyce longioribus, ovatis.

* Oreoselini, athamantæ foliolis divaricatis, selini pinnis ad angulos obtusos pinnatis, pinnulis incisis, non serratis. Sapor ex subacri aromaticus. Prunellæ, confolidæ minoris, bracteis cordatis.

Pulegii, menthae, floribus verticillatis, foliis ovatis, obtusis, subcrenatis. Sapor ex acri amarus, odor aromaticus.

Pulmonariæ maculosaæ, foliis radicalibus ovato cordatis. Mucilaginosa est, maculas etiam sicca retinet.

Roris marini hortensis, angustiore vel latiore folio. Sapor subamarus, odor aromaticus.

Salviæ, foliis lanceolato-ovatis, integris, crenulatis, floribus spicatis, calycibus acutis. Sapor subamarus, odor aromaticus.

Saniculæ, foliis radicalis simplicibus,
flosculis omnibus sessilibus.

Saponariæ maioris, lœvis, calycibus
monophyllis cylindricis, foliis ova-
to lanceolatis.

* Satureiæ hortensis, pedunculis bifloris.
Odor fragans, sapor peracris, aro-
maticus.

Scabiosæ, corollulis, quadrifidis, co-
rollis radiatis, caule hispido.

* Schoenanthi cum floribus, iunci odo-
rati spicati, laguri spiculis paniculæ
coniugatis, ovatis. Sapore amarum
præstat, atque odorem aromaticum
spargit. Spica non orbatus sit.

* Sclareæ, hormini, salviæ foliis rugo-
fis, cordatis, oblongis, villosis, fer-
ratis, bracteis floralibus, calyce lon-
gionibus, concavis, acuminatis.

Scolopendri vulgaris, linguæ cervinæ,
asplenii frondibus ensiformibus, in-
tegris, basi cordatis, inflexis.

— — linguæ cervinæ veræ, ceterach,
asplenii, frondibus pinnatifidis, lobis
alternis confluentibus. Sapor nullus.

Scordii nostratis, teucrii, foliis ovato lanceolatis, ferrulatis, sessilibus, floribus saepe binatis. Odor alliacius, sapor amarus.

Serpilli vulgaris, thymi floribus capitatis, caulibus decumbentibus, foliis planis, obtusis, basi ciliatis. Sapor acris, odor aromaticus.

* Sideritidis, betonicae verticillatae, calycibus spinosis. Odor haud ingratus, sapor nullus.

Tanaceti vulgaris, lutei, foliis pinnatis, pinnis pinnatifidis, ferratis. Sapor amarus, odor gravis.

Thymi vulgaris, erecti, foliis revolutis, ovatis, floribus verticillato spicatis. Sapor ex amaro acris, odor aromaticus.

Trifolii aquatichi, fibrini, menyanthae foliis ternatis. Sapor peramarus.

Verbasci, foliis vtrinque tomentosis, decurrentibus.

Verbenae, spicis filiformibus, foliis multifido laciniatis. Sapor subamarus, adstringens.

Veronicæ officinalis, spicis laterali-
bus pedunculatis, foliis
oppofitis, caule procum-
bente. Sapor amarescens,
odor haud ingratus.

Vincæ pervincæ, foliis ovatis. Sa-
por amarus, subadstringens.

* Urticæ mortuæ, lamii flore albo, fo-
liis cordatis, acuminatis, petiola-
tis, verticillis viginti floris.

§. CXLVI.

Flores.

Flores genuini rectio tempore collecti, in
aëre ficcо cito fіccati, probe asservati, nec
vetustate corrupti sunt. Vires facile amitten-
tibus officinæ onerandæ non sunt.

Flores acaciæ, sapor amarescens, odor
gratus.

Anthos, roris marini, recentes & fra-
grantes sunt.

Arnicæ veræ, doronici plantaginis
folio, sapore acres, colore subflavi.

Aurantiorum, naphæ, odorem amit-
tunt.

Balaustiorum, granatorum, rubri, ad-
stringentes.

Bellidum minorum.

Bor.

Borraginis, floribus IV. cordialibus
annumerantur, fusci sunt.

* Buglossæ, ex IV. cordialibus, colo-
rem fere purpureum servant, sapo-
re subacres sunt, his in officinis echii
vulgaris flores vulgo substituunt.

Calendulæ, color flavus perdurans,
& sapor ex acri amarus est.

* Carthami, cnici subacres, & obscure
flavi sunt, salivam colore dilute
flavo tingunt,

Centaurii minoris, rubri, amari.

Chamomillæ Romanæ, color albus,
sapor ex amaro aromaticus, odor
balsamicus.

vulgaris, sublutei, odore
grati, sapore amari.

Cheiri, levcoii lutei, odor gratus,
sapor ex acri amarescens.

Croci orientalis pistilla, pura, odore
fragrante, sapore ex acri amare-
scente prædita, nec carthami vel gra-
nati floribus &c. adulterati sint.

Farfaræ, tussilaginis, color luteus,
sapor subacris.

Genistæ, spartii, color ex flavo sub-
viridis, sapor subacris.

Hyperici, ex flavo fusi, & ex amaro adstringentes.

* Liliorum alborum, flavescent atque odorem perdunt.

* convalium, flavescent, odore privan tur, amarum sapiunt.

Malvæ arboreæ, color purpureus, sapor subacris.

Meliloti, flavi, odore grato.

Millefolii, seu ejus summitates.

* Nymphaeæ albæ, flavescent, saporem ex amarescente adstringentem præstant.

Papaveris erratici.

* Persicorum, sapor subdulcis est, color in obscure fuscum mutatur.

* Pœoniæ, color purpureus, sapor ex dulci amarescens.

Primula veris, paralyseos, color viridecit, odor haud ingratus, sapor subdulcis.

* Rosarum albarum.

* pallidarum.
rubrarum.

* Salviæ, color fuscus fit, odor gratus, sapor ex subacri aromaticus est.

Sambuci, color subflavus, odor ingratus, sapor subamarus est.

Saf-

- * Sassafras, magni constant, colorem & odorem maxima ex parte perdunt.
- * Scabiosæ, color coeruleus ex parte pallescit, sapor subacris est.
- Spicæ Celticæ & Indicæ vide inter radices.
- * Stoechadis Arabicæ, odor quodammodo aromaticus, sapor ex acri amarescens.
- * Citrinæ, germanicæ, gna-phalii, color flavus, sapor amarescens.
- * Tanaceti, color flavus, sapor amarus, odor ingratius.
- Tiliæ, color subflavus, sapor subdulcis, odor gratus.
- * Tunicæ, color ex parte flavescit, odor gratus, sapor subdulcis.
- Verbasci, color in fuscum mutatur, odor suavis, sapor ex dulci subadstringens.
- Violarum, sapor subamarus est, colorem atque odorem sat cito perdunt, nisi in vitris, loco calido probe serventur,
- Urticæ mortuæ albæ.

§. CXLVII.

Semina.

Semina matura, pura ac probe asservata,
nec vetustate rancida sint.

Semen amomi, baccæ rotundæ, pipere pau-
lo majores, ex fusco-nigricantes,
sapore atque odore aromatico.

Anethi hortensis, compressum, quasi
membranaceum, tribus striis insig-
nitum, colore dilute fusco, sapore
aromatico, odore grato.

* Angelicæ sativæ, latum compre-
sum, striatum, & albicans, sapor
& odor aromaticus.

Anisi vulgaris, oblonge rotundum,
parvum, striatum, subviride, dulce,
aromaticum.

stellati, badiani, capsula semi-
nalis stellam sex septemvera-
diis, tot grana continentibus,
exhibit. Color ex fulvo fus-
cus, sapor aromatico dulcis.

* Apii saltivi, parvum, striatum. Qua-
tuor calidis minoribus accensetur.

* Aquilegiæ, nigrum, parvum, spen-
dens.

Avenæ.

* Bar-

- * Bardanæ, oblongum, fuscum, striis nigris distinctum, sapore amaricante.
- * Basilici, ocymi vulgatoris, parvum, nigricans, mucilaginosum.
- Cannabis sativæ, parvum, rotundum, cinereum, oleosum, dulce.
- Cardui benedicti, oblongum, teres, striatum, scopulam quasi referens amarum.
- Mariæ, oblongum, quodammodo compressum, fuscum, mucilaginosum, amaricans.
- * Carthami, album, oblongum, angulare, dulce. Maturum & ponderosum sit.
- Carvi, cari, cumini pratensis. Inter IV. calida majora refertur,
- Cicerum rubrorum.
- * Citri, peramarum.
- Citrulli, extus ex fusco nigrescens, intus album, subdulce. Ad IV, frigida majora pertinet.
- Cochleariae, parvum, rotundum ex rubro fuscum, ex acri amaricans.
- Coriandri vulgaris, sativi, rotundum, sapor aromaticus.

Cucurbitæ, planum, margine cinctum, album. Inter IV. frigida majora militat.

Cydoniorum, fulva, mucilaginosa.
Cynæ, vel santonici, parvum, fuscum,
ex acri amarum.

Cumini Romani, oblongum, stria-
tum, ex flavo spadiceum, cimices
redolens.

* Dauci Cretici, oblongum, superiore
parte acutius, incanum, sapore ex
acri aromatico.

Vulgaris, forma & sapore cum Cre-
tico fere convenit.

Erucæ, sinapi hortensis, parvum,
rotundum, flavescens, acre.

Fabarum vulgarium albarum.

Fœniculi Cretici, oblongum, stria-
tum, ex cinereo spadiceum ex
subacri dulce. Multo oleo dives
est, atque a stipidibus purgatum sit.

vulgaris, odor gratus, sapor
dulcis. Calidis IV. majori-
bus accensetur.

Fœnu Graci, parvum, angulosum,
durum, flavum, mucilaginosum,
sapore atque odore ingratiss.

Hordei.

Hyo-

- * Hyoscyami albi, parvum, planum,
reniforme, pallidum, oleosum.
- * Levistici, planum, membranaceum,
oblongum, striatum, pallidum,
amarum, fragrans.
- Lini sativi, oblongum, planum, fuscum, oleosum.
- Lycopodii, musci clavati repentis,
pulveris instar perparvum, subflavum.
- * Malvæ, semilunare, fuscum, mucilaginosum.
- Melonum, cucumeris semine crassius
atque pulposius. Ad frigida
IV. maj. pertinet.
- * Milii solis, lithospermi Cretici maj.
rotundum, album.
- * Napi sativi, parvum, rotundum, ex
rubro nigrum, ex acri americans.
- Nigellæ, cumini nigri, angulosum,
rugosum, nigrum, acre.
- Oryzæ.
- Papaveris albi, parvum, oleosum,
dulce.
- Petroselini, parvum, oblongum, striatum,
ex subaci amarum
- Poeoniaæ, rotundum, pisiforme, sub-dulce.

Psyllii, puliciforme, fuscum, mucilaginosum, subacre.

Rutæ, parvum, reniforme, nigrum, subacre.

Sabadilli, oblongum, nigrescens, sapor ex amaro acerrimus.

Staphidis agriæ, triangulare, asperum, ex nigro griseum, acre, odore ingrato.

Tanaceti, ex fisco flavescens, sapor ex amaro aromaticus.

Violarum, rotundum, albicans, oleosum, subacre.

Urticæ Romanæ, fuscum, oleofum, subacre.

§. CXLVIII.

Ligna.

Lignum aloës, agallochum. Odor fragrans, sapor ex subaci amarus. Verum, ob pretium exorbitans, raro, sumquam, ad nos affertur.

Guaiaci, sanctum, ponderosum, resinum & nigricans sit. Saporem ex acri amarum praestat, gratum odorem spargit.

Juniperi.

Nephriticum, fuscum, durum, grave, atque ex acri americanus est.

Va-

Variis coloribus tinctura ejus aquosa ludit.

Quassiae; radix ejus lignosa extus fusca, intus alba, sapore amarissimo praedita est.

Rhodium, fuscum, grave. Sapor ejus ex acri americana, & odor sua-vis est.

Santali albi, pars ligni exterior est. Sapor ex subamaro aromaticus, odor gratus; uterque tamen citrino debilior.

citrini, reliquis præstantior.

Sapor subamarus, odor fragrans est.

rubri, pars ligni interior, dura & gravis est. Integri color saturate ruber, comminuti, ab additamento salino, floride ruber.

Sassafras, sapor ex acri subdulcis, odor aromaticus, fœniculi æmulus.

§. CXLIX.

Cortices.

Cortices genuini bene siccatae, & conservati sint.

Cortex cascarillæ vel chacarillæ, color fuscus, sapor amarus.

Caf-

Cassiae caryophyllatae, canellae Cubanæ, odor aromaticus, sapor acris, caryophyllorum aromaticofum amarus.

Ligneæ, xylocassiae, canellæ Malabaricae, sapor mucilaginosus & peracris.

Cinnamomi, canellæ Zeylanicae, color ex flavo - rubeus, sapor ex acri subdulcis, odor gratus, aromaticus. Oleo suo essentiali non orbatus sit.

Chinæ de China, Peruvianus, tener, cannulatus, subfuscus, & sapore ex amaro subadstringente, non vero crassus, planus & adstringens, sit.

Culilavan, caryophylloidis, color fuscus, sapor ex peracri amarus.

Fraxini, color ex cinereo subviridis, sapor ex acri atque amaro adstringens.

Guajaci ligni, color e cinereo rubeus, sapor ex acri amarescens.

Sassafras ligni, odor aromaticus gratus, sapor ex acri dulcis

Simarubae, fibrosus, pallidus, sapor ex amaro subadstringens.

Tamarisci fructicosæ, color ex grieseo

leo fuscus, sapor ex subacri suba-
marescens.

Thymiamatis, thuris, color fer-
ruginous, odor suavis, sapor ex
acri amarus.

Winteranus, canella Magellanica,
crassus, cannulatus, extus cine-
reus, fungosus, intus solidus &
pallidus, sapor ex peracri amares-
cens.

§. CL.

Folia.

Folia rite siccata, bene asservata, nec ve-
tustate corrupta sint.

Folia aurantiorum.

Lauri.

Malabathri, oblonga, acuminata, den-
sa, glabra, tribus nervis a petiolo ad
apicem excurrentibus prædita sunt,
sapor gratus, odor aromaticus est.

Populi arboris oculi, gummoso resi-
nosi sunt, suave olent.

Sennæ, cassiæ foliis sexjugis, subova-
tis. Alexandrina acuta, colore ex
flavo subviridi, sapore ex subdulci
amaricante, nauseoso, prædita, Ita-
lica obtusiora ac viliora sunt. Ultra-
que mundata sunt, ac petiolis care-
ant.

L.

Visci

Visci querni, lanceolata, obtusa sunt.

§. CL.I.

Baccæ.

Baccæ maturæ, bene siccatae, asservatae,
nec vetustate corruptæ sint.

Baccæ alkekengi.

Ebuli.

Juniperi.

Myrtillorum.

§. CLII.

Nuclei.

Nuclei recentes, nec vetustate corrupti,
aut rancidi sint.

Amygdalæ amaræ.

dulces.

Nuclei persicorum.

Pineæ.

Pistaciæ.

§. CLIII.

Fructus & pulpa.

Ex fructibus sequentes in officinis servari possunt.

Aurantium, Curassavicum.

Baniglia, vaniglia, est siliqua compresa,
longa, fusco - atra, fæporis subacris,
odoris aromatici.

Caricæ, vel ficus passæ, pingues, non siccæ verminosæ aut vetustate corruptæ sint.

Cardamomum minus; grana angulosa, fusca, thecis minoribus inclusa, odor gratius, sapor aromaticus.

maximum, grana paradisi, sunt parva, triquedra, extus spadicea, intus alba, saporis acris.

Caryophylli aromatici, & **anthopylli**.

Cassia fistularis, est siliqua longa, rotunda, nigricans in loculamentis suis pulpam nigriscentem ex acido dulcem, una cum seminibus depresso, includens. Ejus pulpa non nimis vetus nec justo siccior fit.

Cerasa acida siccata.

Citrus.

Tamarandi siliquæ, filamentis lignosis praetextæ e fusco nigricantes, non tam hæ, quam earum pulpa in officinis servatur; nigra & acida est; rob prunorum &c. non inquinata sit.

§. CLIV.

Gummata.

Gummata pura, genuina, nec vilioribus adulterata sint.

Gummi Arabicum, purum atque pellucidum sit. Cerasorum substituere solent. Opopanax, in glebas compactum, graveolens, flavescens & saporis ex acri amaricantis est.

Sarcocolla, sunt granula gummosa, parva, friabilia, rufescentia, prædulcia.

Tragacantha communis.

Electa, est gummi leve, pellucidum, odore non ingrato.

§. CLV.

Gummi resinæ,

De gummi resinis idem valet, quod de gummatibus modo in commune dictum est. Amoniacum, a quisquiliis liberum sit, sapor ex amaro nauseofus, & odor gravis est.

depuratum.

Asæ fœtidæ, 1. seris fœtidi, ex granis flavescientibus composita est, odorem allatum spirat, & plus partium gummosarum, quam resinosarum, continet.

Bdellii ex granis pellucidis concreta est, ferrugineo colore gaudet, sapore atque odore myrrham æmulatur.

Euphorbii, ex granis pellucidis constat, odore nullo, sapore acerrimo ac nauseoso prædicta est.

Gal-

Galbani, est succus plus gummosus, quam resinosus, colore ex flavo subfuscō, & sapore ex acri amaro præditus.

Guaiaci, friabilis, nigrescens est, prunis injecta gratum odorem spargit; nativa hæc a resina, spiritu vini rectificatissimo ex ligno extracta, differt.

Guttæ, flava & acris est, multas partes gummosas, paucas resinosas, continet.

Hederæ, color ex fusco nigrescens, sapor ex acri amarus; multæ partes resinoſæ, paucæ gummosæ illi insunt.

Ladani, ex griseo nigrescens, in spiras contorta, sapore ex acri amaro prædicta est, atque fragrantem odorem accensa spargit.

Myrrhæ electæ, multas partes gummosas, paucas resinosas, in sinu suo fovet, saporem ex acri amarum præstat, atque odorem gratum emitit. Ex hac liquamen myrrhæ vel oleum myrrhæ per deliquium paratur. Cum autem facile corrumperatur; ad usus recens parandum est.

Sagapeni, color fuscus, sapor peracris, odor ingratus, porraceus.

Styracis calamitæ, ex flavo rubescens, sapor ex acri dulcis, odor fragrans.

Tacamahaca in glebas compacta, ex flavo rufa, sapore subamaro, odore non ingrato, donata est.

§. CLVI.

Resinæ.

Resinæ puræ, nec aliis vilioribus adulteratæ, sint.

Resina abietina, vel pini, colophonia, fusca, friabilis.

Anime (vulgo gummi) arida, friabilis, sapore terebinthinæ æmulo, odore fragrante.

Benzoe, asa dulcis (vulgo gummi) arida, friabilis, fusca, sapore acri, odore suavi.

Ejus flores.

Camphora, resina volatilis, vel oleum essentiale siccum est. Pura, candidissima sit. Odor fragrans specificus, sapor ex acri americans.

Ialappæ, non duriuscula, sed fragillima, non obscure, sed dilutea fusca nec pice aliave resina adulterata sit.

A Pharmacopeis tutius præparatur.

Iuniperi, sandaracha Arabum (vulgo Gummi) pellucida, subflava, friabilis, accensæ odor suavis.

Laccæ in granis (vulgo Gummi) ex fusco rubescens, sapor subadstringens.

Tabulis, Schellack, ex fusco paratur.

Laci-

Laricis, terebinthina cocta.

Lentisci, mastiche in forte.

in granis vel electa, alba,
pellucida, friabilis, odo-
re grato.

Olibani, thus (vulgo Gummi) duri-
scula, semipellucida. Sapor ama-
ricans, odor accensi fragrans.

Sanguinis draconis in granis (vulgo
Gummi) ruber, sapore adstringente.
tabulis, arte factus, impu-
rus, & in aqua solubilis
est, ad ignem non ardet.

Scammonii, diagrydium, purum splen-
dens, acre.

Sulphuratum.

§. CLVII.

Balsama.

Balsama naturalia genuina, non arte facta
& probe conservata fint.

Ambra liquida, vel styrax liquidus, resina
liquida, tenax, ex flavo-fusca, sapore
ex acri aromatico, atque odore suavi præ-
dicta, ut plurimum vero ex styrace, myr-
ra ac terebinthina arte factus est.

Balsamus de Copaiava, albus, clarus, fra-
grans, & in tincturis spirituoso - alcal-
nis totus solubilis sit. Aureo colore,
majorique densitate prædictus deterioris
indolis est.

Indicus siccus, fere pellucidus, recens dulcis, vetus friabilis, sapor acris, odor suavis, benzoës aemulus, est.

Nucistæ, ex nucis moschatæ oleo expresso ac stillatitio factus.

Orientalis vetus, de Mecha, opobalsamum, color ex flavo rubescens, mellifluido similis, odor chærephylli æmulus, sapor ex acri amarescens. Vix unquam genuinus in officinis prostat.

Peruvianus albus, color pallidus, odor suavis, sapor ex acri amaricans est; huic balsamum de copaiva in officinis substituere solent.

Niger, color ex nigro rubescens, sapor ex acri amarus, odor fragrans, est. Mixtionem cum oleis expressis respuit.

Tolutanus, color ex flavo rubescens, odor fragrans, sapor ex dulci aromaticus.

Terebinthina communis, alba, pura & fluida, sit.

Veneta, pura, liquida, odore fragrans, supore ex acri amaro.

Balsama artificialia:

Balsamus Arcae.

Sulphuris amygdalatus.

Anisatus.

Terebinthinatus.

Vitæ Hoffmanni.

§. CLVIII.

Animalia.

In officinis sequentia insecta atque amphibia affervantur.

Afelli, vel millepedis integri.
præparati.

Coccinilla vel cochinilla, quæ integra, granulata, externe albicans, & trita purpurea, sit, ac salivam colore ex fusco-rubente masticata inficiat. Ex hac, vel fantalo rubro, lacca Florentina paratur, quæ levis & pulchre rubens sit.

Lumbrici terrestres exsiccati.

Viperæ Italicae.

§. CLIIX.

Animalium partes.

Ex animalibus desumpta hæc officinalia sunt.

Axungia piscis ascia.

Castorei.

Axungia Viperarum Castoreum, ponderosum, fuscum, graveolens atque amarum sit.

Fel tauri inspissatum.

Ichthyocolla, vel colla piscium, alba, ponderosa, solida, toraque solubilis sit.

Ossa: Eboris rasura.

Cornu cervi rasura.

Philosophice præparatum.

Ustum

Sepiæ.

Unicornu verum, marinum, dens teres, striatus & tornatilis, ex mandibula superiore ceti narhval est.

Fossile, sunt dentes, maxillæ, cornua aliaque ossa animalium fossilia, fragilia & moschum quodammodo redolentia.

Sperma ceti, album, pinguedinosum, ex tenuibus lamellis compositum, non vetus & rancidum sit.

§. CLX.

Animalium producta.

Inter animalium producta officinis pharmaceuticis inservientia hæc referuntur:

Bezoar occidentale, ex lamellis compositum,
fragile, leve, coloris cinerei, viridis-
centis vel nigrescentis, est, & peregrini
aliquid intus concludere solet.

Orientale, lamellatum concretum, leve, glabrum, ac durum, est; corpori albo affixum lineam ex luteo-viridem relinquit, ac spiritum nitrit ac salis, in iis solubile, rubro colore imbiuit.

Cera alba.

Citrina,

Chermes, Kermes vel tintororum grana,
integra & rubicundo fusca sunt.

Concharum testæ præparatæ, in acido solubiles, nec terreis adulteratæ sint.

Gallæ turcicæ, parvæ, duræ, ponderosæ,
nodosæ & nigrescentes sint.

Lapides cancrorum præparati, de quibus
modo dictum quoque valet.

citri acido saturati.

Margaritæ occidentales.

Mel simplex.

Rosarum, ex illo & rosarum rubrarum
foliis conficitur.

Moschus Alexandrinus est substantia granulosa, pinguis, sapore ex subacri amariante, odore specifico, fragrantissimo. Globulos Moschatos ingreditur.

Zibethum, fuscum, unctuosum, amari cans, fragrans, & papyro affrictum sine crassamento, solubile fit.

§. CLXI.

Aceta.

Aceta simplicia pura, debitoque acore prædita sint, & composita ingredientium saporem prætent, odoremque spargant; nec turbida, corrupta aut vappida sint

Acetum bezoardicum, per infusionem paratum.

Lavendulæ.

Lithargyrii.

Rofarum.

Rubi Idæi.

Rutæ.

Squilliticum.

Vini.

— destillatum.

Ex acero & melle oxymel simplex, & addita radice squillæ, oxymel squilliticum conficitur.

CLXII.

CLXII.

Aqua stillat simplices.

Pharmacopolia multis aquis stillatitiis simplicibus, maxime ex rebus sale volatili & oleo essentiali parentibus, factis, adeoque nec sapore nec sapore nec odore præditis, vel etiam nimia aquarum sapidarum atque odoriferarum copia onerare, minime consultum est. Nec alium forte illæ usum haberent; nisi ut, parum, vel prorsus non, in usum tractæ, denique corruptantur, perditisque opera ac sumptibus, effundendæ sint. In iis præparandis non tam ut earum copia, sed virtus, obtineatur, allaborandum est. In vasis vitreis vel cupreis stanno puro largiter obductis, sine interjecta mora, destillationi subiiciantur; ne contagium metallicum nocivum contrahant. Non justo debiliores, nec turbidæ aut corruptæ; sed, pro ingredientium ratione, sapidæ vel odoriferae, aut utraque qualitate præditæ, quod adjectis litteris s. & o. indicatum, & asservatae sint.

Aqua acaciæ florum, s. o.

- * Acetosæ
- * Anethi, s. o.
- * Anisi, s. o.
- * Bellidum minorum.
- * Borraginis.

Cardui

- Cardui benedicti, f.
 Carvi, f. o.
 Caryophyllorum aromaticerum, f. o.
 Cerasorum nigrorum, o.
 Chærefolii, o, f.
 Chamomillæ, f. o.
 Cichorii.
 Cinnamomi, f. o.
 Cornu cervi citrata.
 Ebuli
 Fabarum florum.
 Fœniculi, f. o.
 Fragorum.
 Fumariæ
 Galegæ, f. o.
 Hyslopi, f. o.
 Lavendulæ, f. o.
 Liliorum alboru m.
 Convallium.
 Majoranæ, o. f.
 Matricariæ
 Melissæ, f. o.
 Menthae, f. o.
 Millefolii.
 Naphæ florum, o.
 Papaveris erratici.
 Petroselini, f. o.
 Plantaginis.
 Pœoniæ florum.
 Prunellæ.

* Pulegium

Pulegii.

Rosarum, f. o.

Rubi idæi, f. o.

Rútæ.

Salviæ, f. o.

Sambuci florum, f. o.

Scordii, f. o.

Serpilli, f. o.

Spermatis ranarum.

Tiliæ florum, f. o.

Verbenæ.

Veronicae.

Ulmariæ, f. o.

§. CLXIII.

Olea essentialia, stillatitia.

Olea essentialia, stillatitia, spiritu tere-
buithinæ, oleis expressis v. c. de been, non
facile rancescente, suorum subjectorum ex-
tractis, & spiritu vini rectificatissimo adul-
terantur; quæ fraudes, pro corruptionis di-
veritate, odore alcohole vini, & aqua de-
tegi possunt. Pauca, quæ in frequentiore
usu sunt, a pharmacopeis tutius præparan-
tur.

Oleum absinthii, viride est.

Anethi.

Anisi, album est, & in frigore spissescit.
Anthos, vel rorismarini.

Auran-

Aurantiorum expressum, de Pergamo, leve est, & elaeofacharis parandis idoneum.

stillatitium; ingratum est.

* Calami aromatici.

* Caieput, vel cardamomi longi.

* Cardomomi minoris.

Caryophyllorum aromaticorum, grave est, & in aqua fundum petit.

De Cedro, cirri essentiale expressum, leve est, & aquæ supernata, elæofacharis conficiendis inservit.

Chamomillæ vulgaris, cæruleum est.
Chærefolii.

* Cinnamomi, grave & percarum.

* Citri corticum.

* Coriandri.

* Cubebarum.

* Cumini, rubeum est.

Fœniculi, dulce est & in frigore coagulat.

* Hyssopi.

Iuniperi e baccis, subviride est.

Lavendulæ.

* Lauri e baccis.

* Ligni rhodii.

Sassafras, grave est & in aqua ad fundum agitur.

Macis.

Maioranæ

Melis-

Melissæ. Oleum fecum vini melissa
imprægnatum substitui solet.
Menthæ crispe, viride est, & ingra-
tum odorem spargit.

* Millefolii, subcæruleum est.

Origani Cretici, rubeum & peracre est.

Nucis moschatae.

* Petroselini.

Pini.

* Piperis dulce est.

Pulegii.

* Rutæ, in frigore coagulat.

Sabinæ.

* Salviae.

Satureiæ.

Spicæ, seu lavendulæ angustifoliæ,
Cleum terebinthinæ a spica abstractum
substituunt.

Terebinthinæ, vel spiritus terebin-
thinæ.

* Thymi.

§. CLXIV.

Olea stillatitia empyreumatica.

Olea stillatitia empyreumatica acria sunt,
atque odorem ingratum, empyreumaticum,
spargunt; quod tamen in rectificata non
æque cadit.

M

¶ Oleum

* Oleum betulinum, Krumholzöl.
Ceræ

Rectificatum
Cornucervi, subtiliori oleo suo
non orbatum sit.

Rectificatissimum, oleum
animale Dippelii, album,
pellucidum est, subdul-
ce sit. In vitris minori-
bus, plenis, probe ob-
turatis asservandum est;
ne aëris accessu rufescat
& vires perdat.

Ligni guaiaci.

* Mastiches.
Philosophorum.
Tartari fœtidum.

§. CLXV.

Olea expressa.

Olea expressa ex seminibus & fructibus
recentibus, non corruptis, præparentur,
pura, vilioribus non adulterata, recentia
nec rancida sint.

Oleum amygdalarum dulcium. Ex hoc
oleo citri espresso, camphora & radice af-
kannæ

Bezoar-

Bezoardicum Wedelii fit.
 Cacao, vel butyrum cacao.
 Hyoscyami seminis.
 Laurinum.
 Lini.
 Nucis moschatæ.
 Nucum iuglandium.
 Olivarum, papaveris oleo adulterari
 solet.
 Ovorum, oleo amygdalarum, oliva-
 rum &c. inquinari solet.
 Palmæ, flavum est, & ireos Floren-
 tinæ rudicem redolet.
 Papaveris seminis.

§. CLXVI.

Olea coctæ.

Ex oleis coctis hæc usitatissima sunt, &
partim coctione, partim leni digestione pa-
rantur.

Oleum absinthii.
 Anethi.
 Chamomillæ.
 Hyperici, rubeum est.
 Liliorum alborum.
 Linariæ, viride est.
 Lumbricorum terrestrium.
 Mastichinum
 Menthae, viride est.

Momordicæ.
Rosarum, subviride est.
Scorpionum.
Verbasci florum.

§. CLXVII.

Essentia.

Essentia, pro ingredientium differentia,
spiritu vini rectificato, vel rectificatissimo,
& vulnerariae sine sale alcalino, rarius aqua
parata, & ritæ saturatae sint.

Essentia absinthii composita.
simplex.

* Adianthi albi.

Alexipharmacæ Stahlii ordinaria
temperata.

* Ambræ.

Ammoniaci Gummi.

* Angelicæ.

Aristolochiae rotundæ.

Asæ dulcis, benzoës, simplex.
fœtidæ

Cardamomi

Balsami Peruviani.

* De Copaiava.

Cascarillæ.

Catechu.

Cardui benedicti.

Castorei simplex.

Cen-

- Centaurei minoris.
 Chinæ corticis, Peruviani,
 Cinnamomi.
 Citri corticum.
 Croci orientalis
 Enulæ radicum.
 Fuliginis Clauderi, quæ aquosa est.
 Gentianæ rubræ.
 Ialappæ radicum.
 Hirundinariae, vincetoxici, radicum.
 Hyperici
 Ligni aloës
 guaiaci.
 Sassafras.
 Lignorum.
 Macis.
 Mastiches.
 Myrrhæ cum alcali,
 sine alcali.
 Pimpinellæ albæ radicum.
 Populi oculorum, vulurariorum.
 Santonici semenis.
 Scordii.
 Succini cum alcali,
 sine alcali.
 Theriacalis.
 Trifolii fibrini.
 Tormentillæ.
 Zedoariæ.

§. CLXVIII.

Tincturæ.

Tincturæ officinales convenienter men-
struo ac methodo factæ, rite saturatæ &
probe servatae sint.

Tinctura antimonii acris saturate rubra sit.
Tartarisata.

Benzöös,

Bezoardica Wedelii.

Catechu.

Coralliorum.

Laccæ.

Martis aperitiva.

Mett illico saponacea Dippelii, sapo
chemicus, saturate rubra sit.

Papaveris erratici.

Rhabarbari, anima rhabarbari, alca-
lina est; sed pro re nata, cum cre-
more tartari vel sale mirabili Glau-
beri &c. præparari potest.

Salis tartari.

§. CLXIX.

Mixtura.

Mixtura simplex ordinaria, seu spiritus
diatrion.

*

Temperata; hæc loco spi-
ritus theriacalis essentiam
alexipharmacam Stahlii
eadem quantitate contine.

* Peto.

- * Pectoralis Wedelii
- * Polychresta Halensium, vulgo Milz.
Eßenz, ex mixtura simplici temperata atque extracto panchymagogio Crollii fit.
- Tonico - nervina Stahlii.

§: CLXX.

Elixiria.

Elixiria colore obscuriore minus elegante,
e. g. fusco , obscure viridi, nigricante,
quam essentiæ atque tincturæ gaudent.
Eorum menstrua pro ingredientium diversitate,
spirituosa, vinosa, aquosa, vel mixta , sunt.

Elixirium antifebrile.

aperitivum Clauderi.

Balsamicum Hoffmanni spirituosum.
viniosum.Sydenhami, laudanum
liquidum

Pectorale Wedelii.

Proprietatis cum rhabarbaro.

§. CLXXI.

Aquæ compositæ.

Aquæ compositæ vinosa vel spirituosa
vino non oligophoro , & spiritu vini, puris,

M 4

non

non antea ab aliis rebus abstractis, præparatae, rite saturatae ac bene asservatae, claræ, non turbidæ sint, nec empyrevma redoleant.

Aqua Anhaltina.

Apopleætica spirituosa.

Embryorum.

Carbunculi.

* Carminativa per infusionem.

Cinnamomi cydoniata.

vinosa.

Epileptica Langii.

Hungarica, vel spiritus anthos.

Liliorum convallium cum vino.

Masticina.

Melissæ cum vino.

Menthæ cum vino.

Theriacalis.

Veronicæ cum vino.

Vulnerariae Gallorum (eau d'arques-
busade)

Zedoariæ vinosa, simplex.

anisata.

§. CLXXII.

Spiritus phlogist. & abstractitii.

Ingredientibus suis spiritus inflammabiles
atque abstractitii satis saturati, & moderato
igne præparati sint; ne partibus aquosis vel
empy-

empyreumaticis justo debiliores vel nauseo-
si fiant.

Spiritus angelicæ.

Anisi.

* Aurantiorum corticum.

* Carminativus Sylvii.

* Citri corticum.

Cochleariae.

* Foeniculi.

* Hyssopi.

* Juniperi e baccis.

Lanvendulae.

* Liliorum convallium.

* Lumbricorum terrestrium vinosus

vel simplex.

Masticinus.

Matricalis , pellucidus manet.

Melissæ.

Menthæ.

Rosarum.

Sambuci e floribus.

Serpilli.

Theriaialis.

Vini rectificatus.

Rectificatissimus , alcohol vini;

in quo satartari siccus meneat.

Campheratus.

Crocatus.

§. CLXXIII.

Spiritus acidi & acido phlogistici.

Spiritus nitri vulgaris, non justo debilior sit.

Concentratus seu fumans.
Dulcatus; acidum non sapiat.

Naphta nitri, servatu difficilis.

Salis, non justo debilior sit.

Dulcatus; phlogiston non ante tenet.
Sulphuris per campanam.

* Tartari rectificatus, acido empyreumaticus est, vitriolatus, aperitivus Penoti.

Carminalivus de tribus, ex spiritu vini, acido nitri & tartari, sine alcali fixo parandus.

Formicarum, ex spiritu vini atque acido volatili constat.

Vitrioli vid. sub salibus stypticis

§. CXXXI.

dulcis, Ibid.

§. CLXXIV.

Spiritus urinosi.

Spiritus urinosi rite saturati, atque ab empyreumate sufficienter liberati sint.

Spi-

Spiritus cornu cervi rectificatus.

Fuliginis.

Salis ammoniaci anisatus.

Cum calce viva paratus.

Vinosus.

Bezoardicus Bussii spirituoso ammoniacalis est.

§. CLXXV.

Liquores.

Liquor cornu cervi succinatus, melius digestione præparatur. Color albicans, & odor non adeo empyreumaticus sit.

Nitri fixi, vel alcahest Glauberi.
Salis tartari, vel oleum tartari per diliquiūm.

Terræ foliatæ tartari, albus,
rite saturatus sit, & syrapi violarum colorem non mutet.

§. CLXXVI.

Julepi.

Julepi ex aqua quadam odorata & saccharo confecti, lenissima evaporatione ad syrupi consistentiam redacti sint.

Julepus rosarum.

* Sambucinus.
Violarum.

M 5

§. CLXXVII.

§. CLXXVII.

Syrupi,

Cum saccharum partes gumoso-resino-sas, aromaticas, & salinas vegetabilium solvat & servet; syrupi efficacibus pharmacis accentendi sunt. Ad justam autem consistentiam coquendi sunt, ne justo humidiores, loco humido asservati, & raro in usum adhibiti, humididatem ex aere attrahentes, corrumpantur, vel ex fructibus dulcibus facti fermentationem subeant, aut coctione plus justo spissati, veteris mellis instar, exstant crystallos saccharinas forment. Ingredientium vegetabilium atque sacchari proportio in dispensatoriis proposita v. c. ut x. ad xvi. &c. tam accurate observari nequit; sed pro illorum qualitate hujus quantitati modo aliquid addendum, modo demendum est.

* Syrupus absinthii compositus.

Acetositatis citri, haud corrumpitur.

De althaea Fernelii.

De ammoniaco.

Aurantiorum corticum, iusto siccior crystallos saccharinas format.

Berberum, conservatu facilis.

Bryoniae.

Capillorum veneris simplex, corruptionem non subit.

Car-

Cardui benedicti-

Cerasorum acidorum, iusto liquidior
fermentescit.

Chamomillæ.

Chermes, ex æquis succi chermes,
& sacchari portionibus parandus.

De eichorio cum rhabarbaro.

Cinnamomi.

E toto citro, servabilis.

Citri corticum.

Cochleariæ, cum dupla sacchari por-
tione conficiendus.

Contrayervæ.

Corraliorum.

Corticis chinæ, de china, Peruviani,
cum dupla sacchari portione confi-
ciendus.

Cydoniorum.

Diacodion, de capitibus papaveris.

Enulæ, helenii.

De erysimo Lobelii.

Farfaræ.

Fragorum.

De fumaria.

Glycyrrhizæ.

Granatorum,

De iuiubis, iusto liquidior, fer-
mentationem subit.

De manna laxativus.

De mentha.

Moro.

- * Mororum, haud corruptitur.
- * Myrtillorum, æque servabilis.
- * Nucifæ.
- Papaveris albi.
erratici, servatu facilis.
- * Pœoniae Florum.
De Vradicibus aperientibus.
- Ribium, servabilis.
- * Rosarum rubrarum, per infusionem.
pallidarum, vel solutivus;
justo spissior crystallos sac-
charinas deponit,
- Rubi idæi, servatu facilis.
- * Scelotyrbicus Foresti.
De scilla.
- * De stoechade.
Scordii.
- * De symphyto Fernelii.
- * Tunicarum florum.
Violarum, servabilis est.

§. CLXXVIII.

Rob.

Rob vel rohob sunt succi diuturniore co-
etione inspissati, conservatu faciles. Sed
vegetabilium ingredientium colores in ob-
scurores mutantur.

Rob

- Rob acaeiæ nostratis.
 * Berberum.
 Cerasorum.
 * Cydoniorum.
 Ebul,
 * Juniperi.
 Loch sanum & expertum, facile cor-
 rumpitur.
 Mororum.
 * Nucum.
 * Prunorum Damascenorum.
 Ribium.
 Rubi idæi,
 Sambuci.
 De spina cervina. Cavendum, ne
 ad usus internos ille rhamni cathar-
 tici succus inspissatus adhibeatur,
 qui, in pictorum gratiam, in va-
 fis cupreis diutius relictus fuit
 (Safrgrün) & ærugine inquina-
 tus est.

§. CLXXIX.

Electuaria.

Electuaria mediae inter bolos atque syru-
 pos consistentiae sint, ut spatula, sine de-
 fluxionis metu, ex vase promi queant. Ob
 spissiorem consistentiam servatu facilia sunt;
 si a loch, quod sanum & expertum nomi-
 nant, recesseris.

Ele^{ctu}ria-

Electuarium diascordion Fracastorii.

De manna.

Mithridatum Damocratis.

Tamarindorum.

Theriaca Andromachi.

Cœlestis.

§. CLXXX.

Unguenta.

Unguentum album cum camphora.
simplex.

Aegyptiacum.

* Alabastrinum.

Apostolorum.

Basilicum.

Dialthæz.

Digestivum.

De linaria.

De lithargyrio,

Majoranæ, butyrum majoranæ.

De minio cum camphora.

Nervinum.

Pomatum.

Populeum.

Purpureum F. Wurtzii.

Rubrum potabile, butyrum rubrum
potabile viride potabile, butyrum
viride potabile.

Uvarum.

§. CLXXXI.

§. CLXXXI.

Succi iuspissati.

* Succus acaciæ, sapor ex subdulci austerus, baud ingratus.

Aloë hepatica, gummoso resinosa, ex fusco flavescens, amarissima, fragrans.

Soccotrina, lucida ex fusco nigricans, peramara fragrans.

Catechu, vel terra Japonica, resinoso gummosa, dura, ex rubro nigricans, ex amaro austera.

Cucumeris agrestis, elaterium nigrum, ex dulci amarescens.

hypocistidis, niger, ex acido austerus.

Liquiritiae, ex amaricante dulcis.

Manna, est succus natura concretus, dulcis, Calabrina duriuscula & translucens.

Flecta.

Papaveris orientalis, opium, nigrum, sapore ex acri amaricante, odore gravi, narcoticō. Turicum fuscum, purius atque odoratius est.

§. CLXXXII.

Extracta.

Extracta conveniente menstruo, non alkalino, lenique evaporatione, præparata atque ad debitam consistentiam reducta, nec vitiosa præparatione, vetustate aut mala asseveratione, in primis aquosa, corrupta sint.

Extractum absinthii.

N

Aloës

- Aloës aquosum.
 Chinæ de china, corticis Peruviani.
 Cardui benedicti.
 Cascarillæ.
 Centaurii minoris.
 De cicuta, conii maculati.
 Colocynthidis.
 Cochleariae.
 * Castorei.
 Catholicum.
 Croci orientalis.
 Fumariae.
 Gentianæ rubræ radicum.
 Hellebori nigri radicum.
 Nicotianæ.
 Opii aquosum.
 Panchymagogum Crollii.
 Scordii.
 Tormentillæ.
 Trifolii Fibrini.

§. CLXXXIII.

Emplastra.

Emplastra recta consistentia gaudeant,
 eorumque ingredientia, in primis gumma-
 ac resinæ, inter se probe mixta sint, ut
 discissa massæ homogenæ speciem præ se-
 ferant.

Emplastrum album coctum.

De betonica, ex obscuro viride
 Cephalicum Schroederi, nigrescens,
 fragile.

De-

De cicuta, ex nigro virens, odor specificus.

Citrinum, ceræ flavæ speciem præ se fert.

De crusta panis, fuscum, odore grato.

Defensivum rubrum.

De galbano crocatum Mynsichti, obscure fuscum, molliusculum; in justo duriore galbanum, ob pretium, male omissum est.

Diachylon compositum, cum gummatisbus, flavo colore præditum, simplex albidum.

Diaphoreticum Mynsichti, flavescentia, odor balsamicus, gratus.

* Diapompholygos, griseum.

* Ad fonticulos, rubrum.

De hyoscyamo, obscure virens,

Ad hernias, obscure rubrum, odor gratus.

* De lauri baccis, obscure fuscum.

* Malacticum cum gummi, flavum, odorem gratum spargens.

* Mammillare, fuscum, molliusculum.

De minio rubrum.

* Opodeldoch, fuscum & durum.

Oxicroceum, ex fusco rubescens; in rubro orleanæ croco male substituta est.

De ranis cum mercurio.

sine mercurio, griseum & durum est; eique emplastrum diapalmæ substitui solet

Diapalmæ, diachalciteos, durum &
 pallide flavum
 Saponatum Barbette, rubescens.
 De spermate ceti, durum subflavum,
 ranarum, album.
 Saturninum Mysichti, obscure fu-
 scum.
 Stomachicum, subflavum, grato
 odore præditum.
 Stypticum Crollii, obscure rubrum.
 Diasulphuris Rulandi, durum, ex ai-
 gro fuscum.
 Vesicatorium.

CLXXXIV.

Spones.

Spones puri sint, legitima consistentia
 gaudeant, nec ad aërem liberum made-
 scant.

* Sapo tartareus, corrector Starkeyanus.
 venetus, albus & purus fit.

§. CLXXXV.

Pilule officinales.

Pilulas, pro connexis, recentes confi-
 cere, utique præstat. Cæteroquin tamen
 quædam earum compositiones in usus adeo
 frequentes tractæ sunt; ut earum masses
 officinæ vix supersedere possint; quo se-
 quentes referimus.

Pilulae de ammonico.

Balsamicæ Becheri. Harum variae
 admodum formulæ sunt, in officinis
 igi-

igitur, ad quamnam præparenrur,
sciscitandum est; mut, re exigente,
emendetur, atque ad normam des-
derataꝝ redigatur.

De cynoglossa.

Pestilentiales Ruffi.

Polychresta balsamica.

* Starckeyanæ.

* Spleneticæ.

De flyrace

De succino Cratonis.

§. CLXXXVI.

Condita, confectiones, conservæ.

Ne præparatis ex saccharo officinæ phar-
maceuticæ nimis graventur; cupedinarii
plurimas confectiones siccas, radices ac fru-
ctus conditos, relinquendos esse, censeo.
Conservæ vetustate non justo sicciores sint.*

Conditi cortices aurantiorum

* citri, ejusque caro.

* Fructus berberum.

Ceras. acid.

Cydoniorum, horumque panis.

Nuc. jugland.

Ribes.

* Rubi idæi.

Conditæ radices calami aromatici.

* Cichorei.

* Enulæ.

Zingiberis.

Confectio alkermes incompleta.

De hyacintho incompleta.

Con-

Conserua cochleariæ.

* **Millepedum.**

Rosarum pallidarum.

Rubrarum.

Tunicæ florum.

§. CLXXXVII.

Rotulæ.

Rotulæ sunt medicamentum siccum, orbiculare, ex variis speciebus & saccharo, aqua stillatitia soluto, coctione factum; non præparatione, sed forma, a morsulis differunt. Aromata aliaque, quorum vis in volatili residet, saccharo ad debitam consistentiam cocto, non super ignem, admiscenda sunt.

Rotulæ berberum ex succo diaireos

* **De rhabarbaro.**

Contra vermes.

§. CLXXXVIII.

Morsuli.

In morsulis aromata aliaque, quorum vis in volatili residet, saccharo ad rectam consistentiam cocto, non super ignem, admenda sunt.

Morsuli Antimoniales, vel restaurantes, Kunckelii. In horum præparatione Antimonium cum saccharo non super ignem misceatur; ne emeticifiant, & loco amygdalarum vel pinearum facile rancefcantium, cortices conditi melius sumuntur.

Im-

Imperatoris.

Purgantes.

§. CLXXXIX.

Pastæ.

Pasta althææ { pâte de guimauve. }

Liquiritæ { pâte de réglisse. }

Pastilli pro fumo communes.

§. CLXXXX.

Trochisci.

Trochisci sunt pastilli ex pharmacis pul-
veratis & mucilagine v. c. tragacanthæ fa-
cti, variisque virtutibus, pro ingredientium
natura, gaudent.

Trochisci alhandal

anthelmintici; omissis C. C. phi-
los. præp. & conserva ros. rubr.

* Beccichi albi.

nigri.

* De tremor. tartari.

§. CXCI.

Farinæ.

Farinæ officinales non adulteratæ, aut ve-
tustate malaque asservatione, corruptæ sint.
Farina, amyrum.

Fabarum.

Fœnu Græci.

§. CXCII.

Pulveres officinales.

Pulveres, volatilia v. c. ambram, moschum,
camphoram, olea essentialia, herbas & flo-

reg

res nervinas, atque semina oleosa in mix-
tione sua habentes, melius recentes præpa-
rantiur. Ceteroquin in usitatorum nume-
rum sequentes veniunt.

Pulvis absorbens Wedelii

antispasmodicus Stahlii, ex æquali-
bus nitri antimoniali & nitri depura-
ti partibus & duodecima cinnabaris
præparatae paratur.

* Bezoardicus Wedelii major.

minor.

Sennerti.

Cachectius Quercetani.

Contra casum.

Epilepticus Marchionis.

Pannonicus ruber.

Squillæ compositus.

Stomachalis Birckmanni.

* Contra vermes.

§. CXIII.

Species.

Species, in quarum mixtionem aromata
atque vegetabilia nervina veniunt, melius
recentes parantur.

Species pro cataplasmate.

Cephalicæ pro cucuphis.

Pro gargarismate adstringente.

emolliente.

De hyacintho.

Specificum cephalicum Michaëlis.