

### CAPUT III.

*Novam Encheirisin, non-  
nullasque Observationes beneficio  
illius factas exponit.*

Postquam haec tenus variorum de receptaculo chyli & ductu thoracico tam in animalibus brutis, quam etiam in homine visis observationes recensuimus, hoc capite novas alias jam allegatis adjiciemus, & novam circa has partes Encheirisin haec tenus, quantum equidem novimus, incognitam Curiosorum oculis & censuræ subjiciemus. Differt autem illa ab aliorum hæc in re factis experimentis, quod hæc probè perspecta non opus habeamus, homines vivos, utpote quod, ut supra diximus, religio vetat, cultro anatomico subiungere, neque etiam ad supplicium damnatis cibos, quos assumere plerique detrectant, ad satietatem, imò ad nauseam usque ingerere; quod etiam necesse non habeamus, casum vel fortunam propitiari exorare, quo illa nobis has vias offerat & aperiat, quo certam earum partem nobis manifestet, siquidem in quovis subiecto humano omni tempore etiam post plures à morte dies totus tractus vasorum lacteorum tertii generis ad oculum demonstrari, liquore quodam colorato, veletiam cerā repleri, & in humore balsamico per insigne temporis spatiū conservari potest, quorum ductuum tres cum annexo receptaculo hunc in modum præparatos asservamus. Est autem illa en-

chis

cheirisis (ut paucis rem edifferamus) ut vas quoddam lymphaticum (quorum ingens numerus ad inferiorem cisternæ partem properat) infra receptaculum propinquum investigetur, id quod facilis negotio obtinebis, si defixis in venam emulgentem sinistram oculis cam accurate examinaveris; huic namque tria ut plurimum vasa, lymphatica dicta, superincumbunt, quæ à partibus inferioribus sursum delata obliquè per medium dictæ venæ emulgentis repunt, atque rectæ ad receptaculum tendentia eidem liquorem suum contentum infundunt. Quæ vasa cum satis insignis magnitudinis sint, in oculos facile incurruunt. His visis, illi, quod magnitudine & capacitate quam maximum conspicuum est, parvò quodam vulnusculō antea inflato tubulum adapta, illoque mediante flatum immittit; quo subeunte animadvertes, vesiculam attolli eō in loco, ubi receptaculum situm est, & partes superincumbentes elevari: præterea aërem inflatum ulterius supra diaphragma progredi, & canalem quendam tenuem & pellucidum distendere, postea in venam utique subclaviam sinistram transire, & ex hâc in cavam dextrumque cordis thalamum irrumpere; porro etiam in descendenterem venæ cavæ truncum ruere, eundemque toto cursu dilatare & replere. Cujus rei certior fieri poteris, si loco aëris, qui, tanquam corpus fluidissimum, facile diffundit & dilabitur, liquor coloratus e. g. lac (quod ob colorem, quem cum chylo communem habet, aptissimum est) mediante syringe eidem vasi lymphatico injicias: illud enim, quia argenteo colore nitet, in receptaculum & ductum thoracicum penetrans omnia manifestiora redit;

dit, ita ut tota hæc via lactea uno obtutu conspici que-  
at. Quoniam vero lac eodem modo, ac alii liquores  
fluidi manent, & toti statim effluunt ex his partibus,  
ubi fortè aliquo in loco vel per præcipitantiam, vel  
etiam inadvertentiam (id quod facile evenire potest)  
acie scalPELLi vel levissimè lœduntur, & tale vulnuscu-  
lum neque ligaturâ, neque aliâ ratione commodè  
coërceri potest, hinc præstat ceram vel albam, vel  
alio quodam colore imbutam, aut etiam sevum hirci-  
num huic rei adhibere, quippe quæ frigefacta indu-  
rantur, & talem consistentiam, uti loquuntur, acqui-  
runt, ut alienis etiam terminis non contenta non am-  
plius diffluant.

### §. II.

Dum autem hæc fiunt, probè cavendum est, ne  
fluidum injectum, sive illud aër sit, sive lac, sive etiam  
cera, nimio cum impetu propellatur & cogatur in hæc  
vasa, utpote quæ, cum tenerrimæ structuræ sint, facile  
rumpuntur; id quod totum experimentum irritum  
reddet, & inquirentem fine suo frustrabitur. Quod  
si verò ex voto res successerit, hos ductus à vicinis par-  
tibus, nervis nimirum & vasis, nec non membranis  
facili negotio discernes, & sollicitâ manu cautoque  
scalpello separabis, eadēm prorsus ratione, quam cap. I.  
§. 7. indigitavimus. His itaque omnibus, quæ mo-  
dò enumeravimus, detectis, perlustratis, & separatis,  
de toto hoc invento triumphare poteris. Et hæc etiam  
methodo usus est Nob. Dn. Kisling, Medicinæ Can-  
didatus dignissimus, cum proximè clapso Anno 1710.  
d. 19. Martii receptaculum Pecqueti & ductum thoraci-

cum in homine primò videret. Ipsi enim in eximendis partibus genitalibus occupato in conspectum venerunt supra jam allegata, & venæ emulgenti sinistræ incumbentia vasa lymphatica, quorum nedio aperto & inflato animadvertisit flatum transfire in canalem thoracicum & venam subclaviam, atque redire per venam cavam infra diaphragma abscissam. Hinc non sine ratione suspicatus est, hoc vasculum in receptaculum æquè ac ductum chylierum immediatè hiarē, id quod autopsia etiam confirmavit: nam cum inventum hocce ulterius prosequeretur, & lac dicto vasculo injiceret, omnes hæ viæ ab immissio humore canticante repletæ atque turgidæ apparuerunt; id quod hujus rei certiores nos reddidit.

### §. III.

Divulgatâ encheirisi nihil aliud superest, quam ut nonnullas observationes beneficio illius factas, quomodo nimirum hæc vasa in diversis subjectis sese exhibuerint, subjungamus. Quod ipsum quidem icones ad calcem dissertationis adjecti aliquatenus declarant, attamen, quo tota hæc res melius intelligatur, brevi aliquâ explicatione opus esse existimamus. In primo itaque subjecto, quod muliebre fuit, vidimus vasa lymphatica, aut lactea secundi generis plurima, præsertim verò quatuor (*fig. I. uuuu*) præ aliis conspicua, suisque nodis & quasi articulis, valvularum indicibus, instructa, quæ ab inferioribus sursum delata in receptaculum sese insinuare videbantur. Secundò, receptaculum Pecqueti (*f*) quod exactè è regione arteriæ cœliacæ (*p*) situm erat, & corpori primæ lumborum

borum vertebræ incumbebat. Referebat illud sac-  
 cum insigniter cavum duos circiter digitos minores  
 latum, & quatuor longum, atque in plures quasi ves-  
 culas divisum, secus ac Cl. Bartholinus vult, qui non-  
 nisi glandulosam ejus substantiam admittit. Eo in  
 loco, ubi dexter diaphragmatis tendo primam inser-  
 tionem habet, & prima lumborum vertebra secundæ  
 jungitur, scilicet è regione arteriæ mesaraicae superio-  
 ris (q) bifurcatum conspiciebatur. Postea in ulte-  
 riore ejus præparatione repertum est, idem non in  
 duos tantum ramos, sed potius in quatuor, eosque in-  
 signes distribui, è quibus unus, qui in parte sinistrâ ex  
 altiore ejus loco propullulat, unâ cum duobus mediis  
 recta descendebat; quarto, qui omnium amplissimus  
 erat, à prioribus obliquè deflectente, & latitudine di-  
 giti minoris infra emulgentem sinistri lateris arte-  
 riæ sub aortæ trunco lœvam versus tendente; in hoc  
 ramo nulli nodi conspiciebantur, quemadmodum in  
 tribus prioribus, ita ut probabile videatur, cum nullis  
 valvulis munitum esse, siue receptaculi partem  
 constituere; reliquos verò lymphaticorum albo ad-  
 scribi debere. Tertiò, cisterna in superiore sui parte  
 angustior facta desinebat in canalem chyliferum seu  
 ductum thoracicum (xxx) secundum dorsi longi-  
 tudinem ascendentem, & corpori vertebrarum ejus  
 superincumbentem. Decurrebat autem inter ve-  
 nam sine pari, quæ Græcis αγυγα dicitur (e) arte-  
 riæ aortam seu magnam (b) & ex parte œsophagi-  
 gum; ita quidem ut infernâ sui sede vena azygos, su-  
 pernâ verò œsophagus ipsi superimpositus fuerit; ve-  
 na sine pari à latere dextro, à sinistro vero arteriæ aor-

tæ trunco semper accumbente. A quâ arteriâ æquè ac  
 vена hinc inde surculi certis in distantiis hunc ductum  
 supergressæ ad latera excurrebant, quorum alii venæ  
 (1234) alii vero arteriæ intercostales (5678) ab  
 Anatomicis vocantur. Prætereà eo in loco, ubi aliâs  
 bifurcatus est, & aorta è corde exurgens, hîcque  
 in figura abscessâ (cc) ipsi superincumbit, nimi-  
 rum inter quartam & sextam dorsi vertebram,  
 mirum in modum ampliabatur, ut duplo major  
 & capacior, quam aliis in locis conspiceretur.  
 Porrò infernâ sui parte dextrorsum magis refleæteba-  
 tur, (si situm arteriæ magnæ, non vero spinæ dorsi  
 spectes, huic enim immediatè incumbit) ubi verò ad  
 exortum venæ αξόγες pervenit, obliquè & sinistrorsum  
 versus superiora pergebat, sub œsophago absconditus  
 latens, cui etiam mediantibus fibrillis tenuissimis  
 arctè adhærebat. Deinde à corpore vertebrarum  
 dorsi magis deflectens & œsophagum quoque dese-  
 rens ad arteriam carotidem sinistram, ubi illa cum  
 subclavia ejusdem lateris è trunco aortæ ascendentis  
 exoritur, properabat; postquam eò pervenerat in sac-  
 culum satis capacem & transverso pollice longum am-  
 pliabatur, qui aliud quasi receptaculum & quidem su-  
 perius constituebat: ab hujus sede inferiore propullu-  
 labat ramus satis insignis, arteriæ carotidi sinistriæ me-  
 diantibus fibrillis arctè adhærens, qui post aliquam ad  
 superiora inflexionem rursus descendebat, atque su-  
 pernae receptaculi parti inserebatur, suo decursu circu-  
 lum quendam (yy) satis accuratè describens. Cui  
 circulo in multis convenit cum illo rorifero, qui à  
 Bilio primò demonstratus tantoperè depraedatur,  
 de

de quo vid. cap. I. §. 8. Insertionem ductus thoracici  
in venam subclaviam sinistram (ff) dupliceū (fig. I.  
zz & fig. 3. c) in hoc subiecto reperimus, ostiolis juxta  
se invicem positis (fig. 4. bb) eo præcisè in loco, ubi  
vena subclavia & jugularis interna mutuos in ample-  
xus ruunt. Alterum ostiolum, quod superius non  
immeritò vocatur, & altero inferiore multo majus  
existit, statim à latere valvulae majoris (fig. 4. aa) po-  
situm erat; quæ parietem intermedium jugularem in-  
ter & subclaviam format, imò sub eādem abscondi-  
tum quasi latebat, & non nisi venâ sursum sublatâ con-  
spiciebatur. Alterum verò ostiolum, quod inferius  
est atque minus, à priori latitudine semidigitii minoris  
transversi distans in venæ subclaviae parte magis infe-  
riore & quasi in ejus limine situm obtinuit. Utrique  
adstat valvula propria duplex seu bivalvis, illi, quæ  
circa principium intestini coli conspicitur, quoad  
structuram non absimilis.

## §. IV.

Quò autem certior huic invento veritas consta-  
ret, eundem ductum chyliferum aliquot post diebus  
in subiecto virili quæsivimus, & duce eodem vase lym-  
phatico pari modo invenimus, qui ratione sui decur-  
sus cum priore quidem conveniebat (uti illud è fig. 2.  
parte) nihilominus tamen multa etiam peculiaria, &  
à priori multum diversa exhibebat. Et primò qui-  
dem receptaculum Pecqueti nullum sacculum insigni-  
cavitate præditum præ se ferebat, sed ductus solummo-  
do hoc in loco magis quam alibi dilatatus & amplia-  
tus erat. (g) Paulo inferius verò super corpore secun-

dæ lumborum vertebræ tres potissimum glandulæ  
conspiciebantur, quarum duas (cc) figura 2. exhibet  
mediantibus suis ductibus (dd) & sibi invicem & du-  
ctui chylifero conjunctæ; id quod inde collegimus,  
quia liquor illi, quæ in dextro latere sita erat, injectus  
eam transit, atque in alteram, ut & ductum ordina-  
rium penetravit. Tertia glandula situ inferior & cum  
prioribus triangulum constituens, propè finem tertiarum  
lumborum vertebræ plures canaliculos minores sibi  
invicem annexos habebat, ductu quodam insigni, qui  
ordinario & quoad capacitatem, & quoad structuram  
non absimilis erat, ad eandem pergente, ita ut nonnifi-  
eius continuatio esse videretur. E quibus elucescit,  
hanc de glandulis lumbaribus observationem cum illa  
Bartholini egregiè concordare, & utramque autopsia  
inmiti, quamvis nonnulli contrarium sibi persuadeant.  
vid. cap. 2. §. 3. Paulo superius fasciculus atque con-  
geries infinitorum tubulorum miris anfractibus, gy-  
ris, & flexibus capreolorum vitium instar constans,  
ac vasis spermaticis in corpore pampiniformi prope  
testem comparanda observabatur, (fig. 2. e) qui ta-  
men omnes in ductum chyliferum (gg) hiabant,  
ita ut lac huic injectum in illos quoque transiret.  
Erat iste fasciculus transversum pollicem latus, &  
unum cum dimidio longus, atque immediate sub  
arteriæ magnæ truncō (fig. 2. aa) situs, ubi cœliaca  
ex eodem egreditur; partim sinistro ultimæ dorſi  
vertebræ lateri, partim etiam corpori primæ lum-  
borum incumbens. Paululum supra eundem alias  
à latere dextro se conspiciendum præbuit (f) non  
adeò latus atque diffusus, uti prior, undecimæ dorſi  
ver-

Vertebræ incumbens, qui æquè ac ille ab injecto in ductum ordinarium lacte repletus fuit, licet cera ob canaliculorum exilitatem eò penetrare non potuerit; hic nonnullos surculos, minimos licet, ad latus etiam dextrum emiserat. Post ductus chylifer multum angustabatur, donec circa finem octavæ dorsi vertebræ in duos ramulos abierit, quorum dexter absque ulteriore divisione & sine ullis anfractibus ad primam usque dorsi vertebram ascendit; recto etiam transmite, nisi quod, ubi circa quintam sinistrorum progredivetur, levi quâdam & superficiali tortuositate (sit venia verbo) præditus fuerit. Alter verò, isque sinister, multis statim gyris anfractuosis circa exortum suum majoribus, mox verò in progressu exilissimis conspicuus erat (oo) qui canaliculi minores partim versus sinistrum, & quidem majore in copia, partim vero dextrum versus latus evagabantur; tūm in surculum majorem collecti circa medium quinta dorsi vertebræ cum ductu ordinario coäluerunt: idem deinde ductus prope medium primæ ejusdem dorsi vertebræ duos rursus in surculos dividebatur (h) capacitate & longitudine sibi invicem æquales, & duobus digitis transversis longos, qui post brevem sui decursum rursus ampliabantur, atque in sacculos sibi etiam æquales, & figurâ suâ, ut & magnitudine fructum corni referentes (12) abibant; hi ramuli in superiore sui parte ferè coēuntes circulum quendam aliquo modo exhibebant, eodem forte titulo, quo rorifer ille Bilsii, dignum. Insertio ejus hoc in subiecto, pari ratione ac in priori duplex erat, & orificium duplex, majus alterum, alterum minus: verum cum hoc discrimine, primò, quod quem-

quemadmodum in illo alterum situ inferius, alterum superius dici poterat, ita in hoc utrumque eadem ferme in linea atque altitudine positum videbatur. Secundò, quod insertio ferè magis in principio venæ singularis internæ sinistri lateris (*l*) paulò infra ejus valvulas primas, quam in vena subclavia (*ii*) observabatur.

## §. V.

Cum autem Experientia (non fallax illa & rudis, qualem multi nostro hoc seculo jactitant, sed solida & constans) sit cognitio nullo docente per usum reperta, eorum quæ non unâ vel alterâ vice, sed sàpius, imò sa- piissimè unô eodemque modô evencrunt, & in pluribus subiectis observata sunt, hinc non contenti hanc encheirisin in uno vel altero cadavere adhibuisse, & vias microcosmi lacteas vidisse, sed iisdem vestigiis insistentes hoc inventum ulterius prosequi & quâ ratione in aliis sese haberent, indagare allaboravimus, præsertim cum in primis duobus subiectis naturam mi- rè ludentem deprehenderimus. Quam ob causam Anno hoc currente sub initium mensis Martii aperui- mus subiectum virile, & viso receptaculo ductuque chylifero in hujus insertionem quoque inquisivimus, quam in latere dextro in vena subclavia reperimus, quæ alias in sinistro ordinariâ naturæ lege conspicitur; id quod adeò peculiare & extraordinarium est, ut Diemerbr. Anat. l. 1. c. 11. se unaquam in homine inser- tionem ductus in subclaviam dextram invenisse neget. Mense insequente Aprili cadaver furis (penè dixerim homicidæ, quippe qui, ut suam servaret, lictoris uxori vitam adimere in animo habebat) suspendio in- terempti

terempti, permittentibus id summis justitiae Arbitris, in  
Theatrum nostrum Anatomicum devchi curavimus.  
Erat illud valde musculosum, & quoad viscera optimè  
alijs constitutum, excepto quod dexter pulmonum  
lobus arctè satis adnatus erat pleuræ; id quod fre-  
quentissimè, & modo non in omnibus corporibus ob-  
servatur, quemadmodum illis, qui cadaverum aper-  
tioni saepius interfuerunt, satis superque notum est.  
Reperimus in hoc subiecto Receptaculum Pecqueti  
eadem fermè ratione, quâ in primo constitutum; re-  
ferebat namque sacculum oblongum, amplum, & in-  
signiter cavum, in quem multa vasa lymphatica sese  
exonerabant, quique simili modô sensim & sensim in  
canalem extenuabatur. Hinc inde etiam in ipsum  
hunc ductum vasa ejusmodi sese insinuabant, & qui-  
dem potissimum circa ejus initium duo valdè insignia,  
in dextro alterum, alterum vero in sinistro latere.

Tum ubi vertebrae dorsi attigerat, inter quartam  
& sextam ejus vertebram divaricationem quandam,  
qua isthmum quasi efformaverat, habebat, latitudine  
duorum pollicum transversorum longam; quæ talem  
se conspiciebant præbuit, qualem Joh. van Horne diss.  
de ductu chylifero nobis depingit, excepto quod in ejus  
investigatione arterolas intercostales per eandem  
transire vix observaverimus. Prætereà dexter bifur-  
cationis ramus multò major & capacior erat sinistro;  
uterque post brevem sui decursum cum se invicem  
coalescet. Ipse hic ductus prope insertionem  
suam etiam in sacculum satis conspicuum dilatabatur,  
non tamen adeò insignem ac in prioribus subiectis,  
cumque unicum & simplicem, quia neque canalis di-

videbatur, neque etiam circulum quendam decursu suo describebat. Eodem die subjectum virile ad manus erat, in quo easdem etiam partes perlustravimus, & receptaculum priori aliquo modo simile, ut & bifurcationem praedicta in loco deprehendi mus. Ut vero certiores redderemur valvularum, quas unanimi fere suffragio huic ductui attribuunt Anatomici, tentavimus eo in loco, ubi supra cor ad levam magis reficitur, aërem, atque postea lac in eundem propellere, & quidem versus inferiora (nam viâ contrariâ & versus superiora quævis injecta facili negotio pergere supra jam diximus & ostendimus) : verum, licet parva quædam ductus portio intumuerit, tamen neque spiritus inflatus, neque etiam lac injectum, multò minus cera ulterius permeare potuit ob valvulam obstantem, quæ nodum quendam repræsentavit; hinc imminente ruptionis metu' ab ulteriore propulsione desistendum erat; autopsia interim nobis probavit & confirmavit ea, quæ suprà cap. I. §. 5. recensuimus.

Et pauca hæc de nostra Encheirisi Dissertationis Academicæ loco allegasse sufficient. Quod si quis de ista dubitare forsan vellet, illi eandem unâ cum nonnullis ductibus cerâ repletis & liquore balsamico imbutis, atque à putredine vindicatis ad oculum demonstrare paratos nos profitemur. Quæ si ferenda fronde, B. L. exceperis & tuâ attentione digna judicaveris, cum inventis facile sit addere, his forsan alia in posterum observata, DEO volente, adjiciemus.

Cui sit Laus, Honor, & Gloria.

T A N T U M!

COROL