




De
officinelle Lægemidlers Brug

fremstillet i alfabetsk Orden

af
ved

Julius Curjel,
Corpslæge.



Kjøbenhavn.

C. A. Reitzels Forlag.


1870.



Dv 1201

*Justus. Juno
stud. med.*






De officinelle Lægemidlers Brug

fremstillet i alphabetisk Orden

ved

Julius Curjel,
Corpslæge.



Kjøbenhavn.

C. A. Reitzels Forlag.

1870.

Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Muhle.

S
be
su
Lu
A
D
m
m
til

Som Hjælpemiddel ved Udarbeidelsen har jeg fornemlig benyttet Commentarius medico-practicus in pharmacopoeæ suecicæ editionem septimam auctore Nic. Joh. Berlin, Lund 1869, Compendiöses Wörterbuch der speciellen Arznei-Verordnungslehre von Dr. Falck, Erlangen 1864, Dr. Warncke: Læren om Lægemedlerne etc. og Supplementum pharmacopoeæ danicæ, ligesom jeg har betjent mig af de deri brugte Abbreviationer ved Henvisningen til de deri anførte Formler.

Abbreviationer.

- < = stigende.
1-3 d. d. = 1-3 Gange de die.
72 = pharmacopoea danica 1772.
28 = pharmacopoea in praxi publica seqvenda 1828.
40 = pharmacopoea danica 1840.
50 = pharmacopoea danica 1850.
A. S. = additamentum supplementi (O. Bang).
A. S. 69 = Formler af «Haandbog i Therapien» 2den Udgave (O. Bang).
Ctgrm. = centigrammata.
d. d. = de die.
D. 40 = pharmacopoea danica 1840.
D. 50 = pharmacopoea danica 1850.
Gramm. = gramma s. grammata.
M. 69 = pharmacopoea militaris 1869.
M. v. = pharmacopoea militaris vetus.
Milligrm. = milligrammata.
n. c. = formulæ nosocomii communis.
n. c. Ch. = formulæ nosocomii communis sectionis chirurgicæ.
n. c. Med. = formulæ nosocomii communis sectionis medicæ.
n. fr. B. = pharmacopoea nosocomii regii Fredericiani (O. Bang).
n. fr. T. s. Tr. = formulæ nosocomiales Trieri.
n. fr. v. = Formler af «praxis medica» (F. L. Bang).
p. d̄ = pro dosi.
-

cupru
eddike
dig B
cupric

chr.,
atonic

I
til Gu
til 15

U
arter,
Svovl.

eddike

V
eller d
stivum
paasky
(Febril
abdom
rheum:

D

Acetas cupricus,

cuprum aceticum crystallisatum, viride æris crystallisatum D. 50, eddikesurt Kobbertveille. Opløses i 14 D. koldt aq. Indvendig Brug er obsolet; udvortes anvendes det som sulphas cupricus, men meget sjelden.

Virkning: Adstringens, irritans, causticum (Blepharitis chr., conjunctivitis chr., ulcus corneæ, oris, pharyngis; ulcera atonica, syphilitica).

Dosis: til Øienvand 5-25 ctgrm. til 25 gramm. aq. d.; til Gurglevand 1-2 D. til 100 D. aq. d.; til Penslesaft 1-2 D. til 15 D. Saft; Fomentation 1-5 D. til 250 D. aq.

Undgaa at tilsætte ælsende og kulsure Alkalier og Jordarter, Sæber, garvestofholdige Midler, Æggehvite, Mælk og Svovl.

Acetas kalicus,

kali aceticum, terra foliata Tartari D. 50, eddikesurt Kali. Opløseligt i 2 D. aq. og i 4 D. spir. conc.

Virkning: Diureticum (ved at gjøre Urinen alkalisk eller dog mindske dens Syregrad), mildt diaphoreticum, digestivum, solvens, alterans (ved at virke som Alkalierne til at paaskynde Iltningen i Blodet, f. Ex. af Urinsyre til Urinstof), (Febrilia, catarrhus ventriculi & intestinalis, indigestio, plethora abdominalis, hæmorrhoides, icterus, hydrops, urolithiasis, rheumatismus, arthritis).

Dosis: 30-60-120 ctgrm. 3 Gange d. d. i Opløsning

i Vand eller en anden Vædske; ikke i Pulverform, da det henflyder i Luften.

Undgaa at tilsætte Vinstensyre, stærke Mineralsyrer.

Liq. kali acet. ph. 1850 holder sig ikke, men skimler meget let, især i Varmen; julapium salinum ph. 1850 holder sig dog bedre end julapium salinum n. fr. v. (citras calicus). Vinum diureticum A. S. 1869.

Acetas morphiæ,

morphium aceticum D. 50,

eddikesurt Morphin. Opløses i spir. conc. og i aq. d. med Tilsætning af faa Draaber acetum, fordi ved Henstand let nogen Eddikesyre fordamper af Præparatet. Vi have et constantere Morphinpræparat i chloretum morphiæ, der er helt opløseligt i aq. d.; det er da i det Hele at foretrække og navnlig til subcutan Injection.

Virkning: Anodynum, sedativum, antispasmodicum, hypnoticum (i de samme Tilfælde som opium). Det paa-skynder ikke saa meget Pulsens Hyppighed og bevirker ikke saa meget Forstoppelse som opium (derfor gives det heller ikke mod Diarrhe); derimod fremkalder det lettere Brækning.

Dosis: (Maximaldosis 3 ctgrm.) 1-3 ctgrm. < 5-10 ctgrm. pro dosi, om fornødent, 2-3 Gange de die i Form af Pulver, Piller, Saft, Opløsning i Vand med faa Draaber acetum.

Udvortes i clysma, sjelden Salve 1 D.-15 D. ax. eller 1 D. til 10 D. ol. hyoseyami inf.; endermatisk 2-3-5 ctgrm. uden Tilsætning af constituens; hypodermatisk 6-15-30 milligrm.

Undgaa at tilsætte de ætsende og kulsure Alkalier og Jordarter, Jernsalte, salpetersurt Sølvite, Jod, Jodkalium, Chlornatrium og Tannin.

Liq. morphii n. fr. T. Liq. morphii acet. n. c. Med. Syr. morphii acet. n. c. Ch. Syr. morphii A. S.

Acetas natricus,

natrum aceticum D. 50,

eddikesurt Natron. Opløses i 3 D. aq. d. og i 20 spir. conc.

Virkning: Refrigerans, digestivum, solvens, diureticum (ved at gaa over i Urinen som kulsurt Natron), allerans (i Lighed med Alkalierne), (Febrilia, lettere catarrhalske Betændelser, indigestio, icterus, plethora abdominalis, Hæmorrhoidalbesværligheder). I det Hele virker det som acetas kalicus, kun meget svagere og benyttes saa godt som aldrig.

Dosis: 1-3 gramm. 3-4 Gange d. d. Bedst i Opløsning (1 D. til 10 D. Vand med Syrup, hvoraf en Spiseskefuld hver 2 Time) eller i Pulver.

Undgaa at tilsætte stærke Syrer, Kalisalte, som have en svagere Syre end Eddikesyre, og Salte, der have en svagere Base end Natron.

Acetas plumbicus,

plumbum aceticum depuratum, saccharum Saturni depuratum
D. 50,

eddikesurt Blyille. Opløseligt i 2 D. aq. d. og 8 D. spir. conc.

Virkning: Adstringens, hæmostaticum (Hæmorrhagier, især hæmoptysis (og da ofte med digitalis eller acetas morphius), chroniske Slimflod, Diarrhe, Dysenteri, hektisk Sved, purulente Betændelser, Pneumoni hos svækkede Individuer (alene eller sammen med sulphas chinicus); Aneurysmer).

Udvortes: ved Betændelser i ydre Legemsdele, navnlig Øielaagene, lette Forbrændinger, Contusioner, Furunkler, Slimflod, gonorrhoea, leucorrhoea.

Dosis: (Maximaldosis 15 ctgrm.) 3-5 < 10-15 ctgrm. 3-4 Gange de die (ofte sammen med opium, acetas morphius, men ikke chloretum morphiicum). Bedst i Pulver med Sukker, Piller eller Opløsning i Vand med Tilsætning af nogle Draaber acetum; som Saft tilsættes lidt syr. sacchhari.

Udvortes: i fintfordelt Pulverform til Paastrøning; til Øienvand: 5-15-25 ctgrm. til 25 gramm. aq. d. med lidt mucilago gi. arab.; til Injection i Næsen, Urinrøret, Skeden eller til Fomentation: 1-3-5 D. til 250 D. aq. d.; til Clyster 20-40 ctgrm.; Salve: 1-2 D. til 20 D. ax.

Undgaa at tilsætte Alkalier, Syrer, de fleste Salte, Tannin, bassorinholdige Midler (mucilago cydoniæ, amyllum, althæa), Æggehvide, almindeligt Vand; naar man fordrer en klar Opløsning, maa man ikke engang tilsætte opium.

M. saturnino-opiata n. fr. B. M. sat.-op. A. S. 1869.
Sol. saturnino-opiata n. fr. Tr. P. plumb. n. fr. T. P. plumb. c. dig. n. fr. T. P. saturninus n. fr. B. P. saturnino-carbonatus n. fr. B. P. saturnino-digitalis n. fr. B. P. saturninus cum opio n. fr. B. Pil. saturninæ n. fr. B. Ung. acetatis plumbici. Ung. ac. plumb. comp. Ung. universale. Aq. ophthalmica alba ph. 1850.

Acetas plumbicus venalis,

plumbum aceticum crudum s. saccharum Saturni D. 50,
almindeligt Bly sukker. Til pharmaceutisk Brug.

Acetas zincicus,

eddikesurt Zinkilte. Opløseligt i 3 D. aq. d., ligeledes i spiritus.

Virkning: Det er et meget mildere Præparat end sulphas zincicus, som det iøvrigt ligner i Virkning; det bruges næsten kun udvortes (Chroniske Ophthalmier, blennorrhøiske Øienaffectioner, chroniske Hudsygdomme, især eczema, impetigo, gonorrhoea, leucorrhoea).

Dosis: i Opløsning i Vand 10-15 ctgrm. til 25 gramm. til Øienvand; til Injection 1-2 D. til 250 D. aq. d.; i Salve, 10-50 ctgrm. til 25 gramm. ax.

Undgaa at tilsætte stærke Syrer, de ætsende og kulsure Alkalier, metalliske Salte og Tannin.

Acetum,

acetum dilutum D. 50,

ren Eddike. Indeholder 4% vandfri Eddikesyre.

Virkning: Refrigerans, adstringens, antisepticum.

Udvortes: Adstringens, irritans, desinfiens (Febrilia, Skjorbug, Hæmorrhagier, Forgiftning med opium og Alkalier; de septiske Former af Typhus og exanthematiske Febre; Næseblødning, Metrorrhagier, Contusioner).

Dosis: til Drik 1-2 D. til 10 D. Vand med Tilsætning af Sukker; som Modgift mod Forgiftning med narcotiske Midler (opium), efter anvendt emeticum, 1-2 Spiseskefulde først hver 5te, senere hver 10de Minut, indtil Forgiftningstilfældene tage af; ligesaadan ved Forgiftning med de ætsende og kulsure Alkalier. Som desinfiierende Vadskemiddel bruges det rent; til Fomentation rent eller blandet med $\bar{a}\bar{a}$ Vand; til Gurglevand og Injection 1-2 D. til 10 D. Vand; clysma: 30-50 gramm. til 125 gramm. aq.

Undgaa at tilsætte Baser, kulsure Salte, Svovlmetsaller. Acetum rubi idæi. Acetum scillæ.

Acetum crudum,

acetum vini crudum D. 50,

Eddike. Bruges, hvor det kommer an paa Billighed, som Surrogat for den rene Eddike.

Garg. piperinum M. 69. Mixt. camphor. acida M. 69.

Acetum Rubi idæi,

Hindbær-Eddike. Bruges fortyndet med Vand som kjølede Drik for Febersyge.

Acetum Scillæ,

acetum scilliticum D. 50,

Strandløg-Eddike.

Virkning: Diureticum.

Dosis: 1-5 gramm. 3 Gange d. d., sjelden alene, mest tilsat Mixturer; saaledes kan den indtil Saturation sættes til Mixturer med bicarbonas kalicus eller supercarbonas ammonicus pyroleosus. Den gives ofte sammen med liqvor menyantthis acidus; den er et godt Opløsningsmiddel for gi-resina ammoniacum.

Oxymel scillæ. Tr. diuretica ph. 1840. Tr. diuretica n. c. Med.

Acidum aceticum,

Eddikesyre. Indeholder 25% vandfri Eddikesyre. Til pharmaceutisk Brug.

Acidum arsenicosum,

arsenicum album D. 50,

Arseniksyrling. Opløselig i 60-75 D. koldt Vand, næsten uopløselig i spiritus.

Virkning: Indvortes alterans, antispasmodicum; udvortes escharoticum (indvortes: intermittens, chroniske Hudsygdomme, psoriasis, eezema, impetigo, asthma, neuralgia og Neuroser, phthisis pulm.; udvortes: Epithelialkræft).

Dosis: (Maximaldosis: 5 milligr.) 2-5 milligr. < 1-2 Gange de die post cibum, bedst som liqvor arsenitis kalici (gtt. 8 er 5 milligr.) eller i Piller. Udvortes i Pulverform, blandet med 5-10 Dele Mel.

Undgaa at tilsætte Jod, Syrer, Alkalier, Svovlmetal, Metallsalte, Tannin, Æggehvide, Sukker.

Pil. arsenicales s. asiaticæ A. S. Nr. 1 indeholder c. 5 milligr. Pil. asiaticæ A. S. 69 Nr. 1 indeholder c. 5 milligr.

Pulvis cosmicus ph. 1850. Pil. asiaticæ ph. gall. Ac. arsen. 25 etgrm. Gi arab. 50 etgrm. Pip. nigr. 250 etgrm. Aq. d. q. s. til 50 Piller. Nr. 1 indeholder 5 milligr. Efter Hebra: Ac. arsen. 25 etgrm. Opii plv. 1 gramm. Sap. alb. q. s. til 60 Piller. Nr. 1 indeholder c. 4 millgr.

Acidum benzoicum,

flores Benzoes D. 50,

Benzoesyre. Opløses i 200 D. aq. d. og i 2¹/₂ D. spir.

Virkning: Det virker inciterende paa Slimhinderne, formindsker Galdemængden, udskilles gennem Urinen som Hippursyre og gjør Urinen sur. Expectorans, antibiliosum, diureticum (Catarrhus chronicus, icterus, navnlig i den Form, der beroer paa en for rigelig Galdedannelse, uræmia, eclampsia (ofte sammen med moschus), lithiasis, især den phosphorsure Stendannelse, catarrhus vesicæ med neutral eller alkalisk Urin.

Dosis: 15-30-60 etgrm. 3-4 Gange d. d. eller oftere enten i Pulverform (som expectorans) og forskrives ad char- tam ceratam, eller i Piller (med sulphidum stibicum, cam- phora, r. ipeacacuanhæ).

Undgaa at tilsætte de ætsende og kulsure Alkalier, Me- taller, Svovlmetaller, basiske Salte.

Tr. thebaica benzoica. P. pectoralis ph. 1840.

Acidum citricum,

Citronsyre. Opløses let i Vand og Vinaand.

Virkning: Den virker noget mildere, men ellers meget lig Vinstensyre. Refrigerans, antisepticum, antibiliosum (Febrilia, Congestioner, Skjørbug, icterus catarrhalis, rheumatismus ar- ticularis acutus; udvortes: scorbutiske Mundaffectioner og Echymoser).

Dosis: $\frac{1}{2}$ -1-2 gramm. 3-4 Gange d. d.; som Limonade 1 D. til 100 D. aq. med Tilsætning af Sukker og elæo-saccharum citri. Den bruges istedetfor Eddike til Julaper, og der fordres 4 D. for at mætte 5. D. bicarbonas natricus og 6 D. bicarbonas kalicus. Udvortes: til Penslesaft 1-2 D. til 15 D. Honning; til Vadskevand og Fomentation 1 D. til 50 D. aq.

Undgaa at tilsætte Baser, kulsure Salte, Svovlmetaller. Julapium salinum. Jul. sal. M. 69.

Acidum gallotannicum,

acidum tannicum, tanninum purum D. 50, Garvesyre. Opløselig i Vand og Vinaand.

Virkning: Adstringens, stypticum (Blennorrhoeæ, Hæmorrhagier, bronchitis chr., chronisk Diarrhe, hektisk Sved (i Hektik ofte i Piller sammen med ferrum reductum), chronisk mb. Brightii, cystitis chr., Salivation; udvortes mod ulcera, sprukne Brystvorter (opløst i Glycerin), decubitus, profuse Afsondringer, Hæmorrhagier, Salivation, Affald af Haaret, chroniske Øjenbetændelser, gonorrhoea, leucorrhoea).

Dosis: 3-15-30 ctgrm. 3-4 Gange d. d. som Pulver (med saccharum eller cortex cinnamomi cassiæ) eller Opløsning (aq. cinnamomi spir. eller aq. d. med Tilsætning af et eller andet aromatisk Vand, undertiden ogsaa muc. gi arab.), eller Piller (med muc. gi arab., conserva rosæ). Som Modgift i Forgiftning med opium, Morphin, Strychnin, Brækvinsten 30-50 ctgrm pro dosi, oftere gjentaget, altid i Opløsning.

Udvortes: alene i Pulverform (stypticum); til Salve 1-5-8 D. til 50 D. ung. glycerini; til Fomentation og Injection 1-2 D. til 100 D. Vand eller vinum gallicum rubrum; til Indaanding i Pulverisation 5-30 ctgrm. til 25 gramm. aq. d.; til suppositoria eller baculi uterini (p. 4, axungia benzoatæ p. 5, ceræ p. 1, butyri cacao p. 10 ph. britt.).

Undgaa at tilsætte Alkalier, Syrer, Metalsalte, Alkaloider, Æggehvite, Lim og Emulsioner.

Ung. contra alopeciam A. S. 1869.

Acidum hydrochloratum,

acidum muriaticum concentratum, acidum Salis, spiritus Salis fumans D. 50,

Saltsyre. Indeholder 25% vandfri Saltsyre.

Virkning: Causticum.

I ufortyndet Tilstand bruges den kun udvortes, som Ætsmiddel ved diphtheritis, angina gangrænosa, stomacace, gangræna nosocomialis, phagadæniske Saar, Condylomer og andre Excrecentser. Til Ætsningen betjener man sig af en Glasstang, en Charpispensel eller en Asbestpensel.

Acidum hydrochloratum crudum,

raa Saltsyre. Indeholder 33% vandfri Saltsyre.

Virkning: Causticum.

Anvendes især til pharmaceutisk Brug. Til et Helbad tager man 125 gramm.; til et Fodbad 65 gramm.

Sol. chlori. Fum. Chlori M. 69.

Acidum hydrochloratum dilutum,

acidum muriaticum dilutum D. 50,

fortyndet Saltsyre. Indeholder 10% vandfri Saltsyre.

Virkning: Digestivum, refrigerans, antisepticum; udvortes: tonicum, adstringens, causticum (Dyspepsi, chronisk Brækning, catarrhus intestinalis, exanthematiske Febre, Typhoidfeber, Pyæmi, Skjørbug; udvortes: diphtheritis, stomacace, angina, Salivation; gangrænøse, scrophuløse og syphilitiske Saar paa Huden; chroniske Hududslet).

Dosis: (Maximaldosis gtt. 25) gtt. 5-15-25 pro dosi; 5 gramm. til 200 gramm. mucilaginos Vehikel (inf. althææ) med syr. 30 gramm. m. d. s. 1 Spiseskefuld hver 2den Time. Til Gurglevand, Fomentation og Vadskevand 5-10 gramm. til 200 gramm. Vædske; til Penslesaft 3 gramm. til 25 gramm. mel rosæ.

Undgaa at tilsætte de ætsende og kulsure Alkalier, Metaller, Bly-, Sølv- og Qvægsølvsalte.

Mixt. ac. hydrochl. M. 69.

Acidum nitrico-nitrosum,

acidum nitricum concentratum, spiritus Nitri fumans D. 50, rygende Salpetersyre.

Virkning: Causticum. Den bruges kun udvortes som Ættsmiddel mod Vorter, Condylomer, Teleangiektasier, forgiftede Bidsaar, pustula maligna, gangrænøse Saar; man ætser ved Hjælp af en Glasstang eller en Asbestpensel, bedst under Anvendelse af et fenestreret Plaster.

Acidum nitricum,

Salpetersyre. Indeholder 25⁰/₁₀₀ vandfri Salpetersyre.

Virkning: Diureticum, antibiliosum; udvortes: irritans, causticum (Chronisk hepatitis med Gulsot, chronisk mb. Brightii, syphillistiske og gangrænøse Saar, chroniske Hudsygdomme, eczema, impetigo, pernio).

Dosis: (Maximaldosis gtt. 20) gtt. 5-10-20. 4 gramm. til 220 gramm. aq. d. med 30 gramm. Syrup; heraf 1 Spiseskefuld hver 2den Time. Man maa tage denne Mixtur med en Porcellainske eller Træske, og ikke med en Metalske. Udvortes til Vadskevand 1-2 D. til 50 D. aq.; til Injection 1-2 D. til 100 D. aq. Mod Frostknuder 1 D. til 3 D. aq. cinnamomi, hermed pensles 2 Gange daglig indtil Deskvamation af Huden.

Undgaa at tilsætte de ætsende og kulsure Alkalier, Salte, Metaller, organiske Stoffer, ætheriske Olier og spirituosa.

Ungv. oxygenatum pharm. 1840.

Acidum nitricum crudum,

Skedevand. Indholder 54% vandfri Salpetersyre. Bruges kun udvortes; man tager til et Helbad 125 gramm., til et Fodbad 50 gramm.; undertiden blander man den til Bad med en dobbelt saa stor Portion acidum hydrochloratum crudum.

Acidum phenylicum,

s. carbolicum, Phenylsyre, Karbolsyre. Tungt opløselig i Vand, let opløselig i Glycerin, fede Olier, spir. concent. og æther.

Virkning: Den ligner i Virkning Kreosot. Desinficiens, idet den standser Forraadnelsen og Gjæringen, antisepticum, adstringens, causticum, antiparasiticum (Forskjellige putride Affectioner, diphtheritis, tinea favosa, prurigo, scabies, Slimpapler, Ulcerationer, caries, Tandpine; til desinficerende Forbinding efter Lister).

Dosis: Indvortes 15-20-30 etgrm. 3 d. d. i Piller eller Emulsion. Udvortes anvendes den enten ren eller blandet med 5-10 D. ol. olivarium, eller 5 D. Glycerin eller 3-5-10 D. spir. conc. Til Gurglevand, Fomentation, Injection og Vadskevand p. 1-2-3 til 200 D. Vand eller acetum, undertiden med Tilsætning af tr. lavandulæ rubra eller tr. myrrhæ. Som desinficiens p. 1-10 til 1000 D. aq. Et Karbolvand af 1 D. til 100 D. Vand vil kunne træde istedefor aq. kreosoti ph. 1850. Empl. carbolicum: ac. carb. 2 gramm., ceræ fl. 8 gramm., glycerin. 10 gramm., empl. lini (ox. plumb. p. 3 ol lini p. 4) 65 gramm. Pil. odontalgicæ: āā 2 gramm. ceræ og ac. carbol., 30 etgrm. opii plv., 150 etgrm. flor. caryophyll. og muc. gi ar. q. s. ut f. pil. Nr. 60.

Undgaa at tilsætte Salpetersyre og iltende Stoffer.
 Lotio carbolica A. S. 1869.

Acidum phosphoricum dilutum,

fortyndet Phosphorsyre. Indeholder 10⁰/₀ vandfri Phosphorsyre.

Virkning: Refrigerans, antisepticum (Febrilia, Typhoid-feber, Pyæmi, hektisk Sved).

Dosis: gtt. 5-15-25; man tager 5-8 gramm. til 220 gramm. aq. med 30 gramm. Syr. eller til 250 gramm. inf. althææ, dec. chinæ; eller man giver den som linctus, 5 gramm. til 50 gramm. syr. rubi idæi.

Undgaa at tilsætte de ætsende og kulsure Alkalier, Metalsalte, Tannin.

Acidum pyrolignosum crudum,

raa Træsyre. Lader sig blande med Vand, mindre godt med spir.

Virkning: Antisepticum, adstringens. Brugtes fordom mere end nu, dog mest udvortes, hvor vi nu anvende acidum carbolicum (noma, angina gangrænosa, putride, gangrænøse Saar, decubitus, tinea favosa).

Dosis: til Gurglevand 5-6 D. til 100 D. Vand, til Penslesaft 1-2 D. til 15 D. syr. sacchari, til Fomentation, Injection og Vadskevand 5-10-15 D. til 100 D. aq.

Undgaa at tilsætte Baser, basiske Salte og stærke Syrer.

Acidum succinicum,

acidum succinicum depuratum D. 50,

Ravsyre. Opløselig i 24 D. koldt aq., ligeledes i spir. og æther.

Virkning: Incitans, antispasmodicum, diaphoreticum (hysteriske Kræmper, chronisk Rheumatisme).

Dosis: 30-50 ctgrm. i Pulver, Piller eller Opløsning.
 Undgaa at tilsætte kulsure Salte, Baser, basiske og
 metalliske Salte.

Liqvor succinatis ammonici pyroleosi.

Acidum sulphuricum,

acidum sulphuricum depuratum s. rectificatum D. 50,
 Svovlsyre. Indeholder 80% vandfri Svovlsyre.

Virkning: Causticum. I ufortyndet Tilstand bruges den
 kun udvortes som Ælsmiddel (noma, pustula maligna, giftige
 Bidsaar, Vorter, Condylomer, Teleangiectasier). Man ætser
 ved Hjælp af en Glasstang eller Asbestpensel.

Undgaa at tilsætte Baser, Metaller, Salte, ætheriske
 Olier.

Acidum sulphuricum dilutum. Liq. acidus Halleri. Tr. aro-
 matica acida.

Acidum sulphuricum crudum,

acidum sulphuricum anglicum crudum s. oleum Vitrioli D. 50,
 raa Svovlsyre. Indeholder 76% vandfri Svovlsyre; mest til
 pharmaceutisk Brug.

P. pro vaporibus Chlori.

Acidum sulphuricum dilutum,

spiritus Vitrioli D. 50,

fortyndet Svovlsyre. Indeholder 10% vandfri Svovlsyre.

Virkning: Refrigerans, antisepticum, adstringens, hæ-
 mostaticum.

(Febrilia, Congestioner, Typhoidfeber, exanthematiske
 Febre, Pyæmi, Skjørbug, Hæmorrhagier, gastrorrhagia, ente-
 rorrhagia, metrorrhagia, hektisk Sved; udvortes: stomacace,
 scorbutiske Mundaffectioner).

Dosis: (Maximaldosis gtt. 30) gtt. 5-15-30 pro dosi 6-12 Gange de die; 5-10 gramm. til 250 gramm. Vand med Syrup eller til inf. althææ. Udvortes: til Penslesaft 1-2 D. til 15 D. mel rosæ.

Undgaa at tilsætte Alkalier, Metaller, Metalsalte, ætheriske Olier.

M. acida sulphurica. M. ac. chinica n. c. M. ac. ferrea n. fr. T. M. ac. mucilaginoso A. S. M. ac. mucilaginoso opiata A. S. M. acida opiata A. S. Aq. vuln. Thed. ph. 50. Mixt. ac. sulphurica M. 69. Mixt. chinica M. 69.

Acidum sulphuricum fumans,
rygende Svovlsyre. Er til pharmaceutisk Brug.

Acidum tartaricum,

sal. essentielle Tartari D. 50,

Vinsyre. Opløselig i 1½ D. Vand, ligeledes i spir.

Virkning: Refrigerans, antibiliosum, antisepticum (Febrilia, Congestioner, Gulsot, Skjørbug).

Dosis: 30-50-60 ctgrm. i Pulver, Piller, Opløsning, 5 gramm. til 250 gramm. Vand med Syrup, hvoraf en Spiseskefuld hver 2den Time; til lædskende Drik 2-5 gramm. til 500 gramm. Vand med Syrup eller Sukker; i Julaper mætter 10 D. af den bicarb. natrius 11,2 D. og bic. kalieus 13,3 D.

Undgaa at tilsætte de ætsende og kulsure Alkalier, Baser, Svovlmetaller, Blysalte, tartras kalieus.

P. effervescens. P. efferv. comp. M. acida vegetabilis ph. 1840 & n. fr. v. P. efferv. M. 69.

Ærugo,

viride æris D. 50,

Spanskgrønt, kun tildels opløselig i Vand.

Virkning omtrent som acetas cuprieus. Udvortes

brugtes det som causticum (blepharitis chr., syphilitiske Saar og Exkrescentser, Ligtorne).

Dosis: Enten strøer man det paa i Pulverform, eller anvender det i Opløsning 5-10 etgrm. til 25 gramm. aq.; i Salve 1-2 D. til 15 D. ax.

Undgaa at tilsætte Syrer og sure Salte, de ætsende og kulsure Alkalier, Tannin.

Empl. manus dei. Cera viridis ph. 1850 (Ligtornplaster).
Ung. cantharid. viride.

Æther,

æther sulphuricus, naphta Vitrioli D. 50,

Æther. Blandes med spir. alcoholisatus i ethvert Forhold, opløses i 10 D. Vand.

Virkning: Incitans, carminativum, analepticum, anti-spasmodicum, anodynum, vermifugum; udvortes ved sin hurtige Fordampning refrigerans, eller ved forhindret Fordampning anodynum, irritans, rubefaciens; indaandet anæstheticum (Gastralgi, Kolik, colica hepatica og Galdesten (Durande), Flatulents, Brækning, helminthiasis, Hysteri, Asthma, syncope, asphyxia, Collaps, især som Følge af betydelige Blodtab; udvortes: Congestioner og Betændelser, hernia incarcerata (den dryppes paa og lades hurtig fordampe), rheumatismus art. acutus, Neuralgier, Paralyser (man indgnider den og indhyller derefter i Vat).

Dosis: gtt. 15-30 eller mere (om nødvendigt en The skefuld) i Vand eller paa Sukker (maa ei tælles i Nærheden af et brændende Lys), i Regelen ofte gjentaget. 1 gramm. = gtt. 50-60. Til mixtur, inf. eller dec. sættes den efter Afkøling 5 gramm. til 250 gramm.; i Klyster 2-4 gramm. (Hysteri); ved syncope holdes den for Næsen som et inciterende Lugtemiddel.

Æther spirituosus. Æther spir. camphoratus. Sol. chlorati ferri spirit. ætherea.

Æther aceticus,

naphta aceti D. 50,

Eddikeæther. Lader sig blande med spir. alcoh. i ethvert Forhold, opløses i 8 D. Vand.

Virkning: Den virker omtrent som Æther, men er svagere; derimod er Lugten og Smagen behageligere (Flatulents, Kolik, Cardialgi, Krampebrækning, hysterisk Hovedpine og Tandpine, Nervetilfælde hos Gravide, asthma, syncope, typhus; udvortes som analepticum (Lugtemiddel) ved Afmagt, hysteriske Kramper).

Dosis: gtt. 20-30 eller mere p. d.; 5-7 gramm. de die i Mixtur, dec. eller inf. 1 gramm. = gtt. 40-50. Æther acetic., tr. lobeliæ $\bar{a}\bar{a}$ 5 gramm. d. s. 15-20 gtt. hver $\frac{1}{2}$ Time mod nervøs Asthma.

Sol. subacetatis ferri spirituoso-ætherea.

Æther chloratus spirituosus,

spiritus muriatico-æthereus, spiritus Salis dulcis D. 50, fortyndet Chloræther. Virker omtrent som Hoffmannsdræber, men bruges dog mest som diureticum (Flatulents, Vattersot; udvortes som analepticum (odoramentum incitans) ved Afmagt).

Dosis: gtt. 20-40 eller mere p. d.; 5-10-15 gramm. til 200 gramm. Mixtur. 1 gramm. = gtt. 25.

Tr. diuretica ph. 40. M. boraxata n. fr. B.

Æther nitrosus spirituosus,

spiritus nitrico-æthereus, spiritus Nitri dulcis D. 50, fortyndet Salpeteræther.

Virker omtrent som æther spirituosus, bruges dog mest som diureticum, og det sjeldnere end æther chlor. spir. (Flatulents, Vattersot).

Dosis: gtt. 20-40 eller mere p. d.; 5-10-15 gramm. til 200 gramm. Mixtur. 1 gramm. = gtt. 25. Den forandres hurtigt, blandet med andre Midler, og maa kun forskrives i smaa Portioner.

Æther spirituosus,

spiritus sulphurico-æthereus, liqvor anodynus mineralis Hoffmanni D. 50,

Hoffmannsdraaber. Virker svagere end æther, ellers ligesaadan og bruges hyppigere.

Dosis: gtt. 30-60 p. d., i Asphyxi en Theskefuld; 5-10 gramm. til 200 gramm. Mixtur. 1 gramm. = gtt. 40-45.

Æther spir. camph. Sol. chlor. ferrici spir.-æth. Liq. antispasticus n. fr. v. Liq. antihystericus n. fr. B. & A. S. 69 & n. e. Ch. M. rhei-anodyna n. fr. B. & A. S. 69. Elix. anodynum n. fr. B. Inf. vernifugum n. fr. B. & A. S. 69. Inf. valer. ep. s. tonico-nerv. M. 69. Inf. vermif. M. 69 Liq. antispast. M. 69.

Æther spirituosus camphoratus,

spiritus sulphurico-æthereus camphoratus, liqvor nervinus D. 50, Kampherdraaber.

Virkning: Ineitans, diaphoreticum, antispasmodicum (hysteria, cholera nostras, rheumatismus muscularis, rheumatiske Neuralgier).

Dosis: gtt. 10-10-30 p. d. gtt. 10 svarer til 5 etgrm. camphora. Med $\bar{a}\bar{a}$ sol. chl. ferr. spir. i diphtheritis.

Liq. nervin. foetidus n. e. Liq. antirheum. comp. n. fr. B. & A. S. 69. Tr. antasthm. n. fr. v. & ph. 40.

Ætheroleum absinthii,

oleum æthereum Absinthii D. 50,

Malurtolie. Opløses i ethvert Forhold i spir. conc. Ligesom de ætheriske Olier i Almindelighed er den opløselig i æther og lader sig blande med fede Olier.

Virkning: Digestivum, carminativum, vermifugum (Dyspepsi, Flatulents, Kolik).

Dosis: gtt. 1-5 paa Sukker, eller opløst i Æther og æth. spir.; eller som vermifugum 1 D. til 8 D. ætheroleum terebinthinæ, gtt. 1-10 3 à 4 Gange d. d.

Ætheroleum anisi,

oleum æthereum Anisi D. 50,

Anisolie. Opløses i ethvert Forhold i spir. conc.

Virkning: Digestivum, carminativum, expectorans (Dyspepsi, Flatulents, Kolik, Brystcatarrh).

Dosis: gtt. 1-5, som corrigens i Form af elæosaccharum.

Spir. ammoniacatus anis. Tr. theb. benz. P. pectoralis ph. 40.

Ætheroleum bergamo,

oleum æthereum Bergamottæ D. 50,

Bergamotolie. Opløses i ethvert Forhold i spir. conc.

Den bruges mest udvortes til at parfumere cosmetiske Midler.

Ætheroleum cajepu,

oleum æthereum Cajeputi D. 50,

Cajeputolie. Opløses i ethvert Forhold i spir. conc.

Virkning: Excitans, antispasmodicum, diaphoreticum (Cardialgi, Kolik, chronisk Rheumatisme; Tandpine).

Dosis: gtt. 1-5 paa Sukker eller i æth. spir.; paa Bomuld anbringes den i hule Tænder.

Ætheroleum carvi,

oleum æthereum Carvi D. 50,

Kommenolie. Let opløselig i spir. conc.

Virkning: Digestivum, carminativum (Dyspepsi, Flatulents, Kolik); corrigens for drastica.

Dosis: gtt. 1-5 med Sukker eller i æth. spir.

Pil. aloes comp. ph. 40.

Ætheroleum caryophylli,

oleum æthereum Caryophyllorum D. 50,

Nellikeolie. Opløses i ethvert Forhold i conc. Spir.

Den bruges mest udvortes, mod Tandpine paa Bomuld, og mod Tungelamhed.

Tr. balsamica aromatica. Spir. ophthalm. ph. 50.

Ætheroleum cassiæ,

oleum æthereum Cinnamomi D. 50,

Kanelolie. Opløses i ethvert Forhold i spir. conc.

Virkning: Carminativum (Dyspepsi, Flatulents, Kolik); i Form af elæosaccharum bruges den som corrigens for amara.

Dosis: gtt. 1-3 paa Sukker eller i æth. spir.

Tr. balsamica aromatica.

Ætheroleum cedro,

oleum æthereum Citri s. de Cedro D. 50,

Citronolie. Opløselig i Alcohol.

Virkning: Carminativum (Dyspepsi, Flatulents, Kolik); corrigens i Form af elæosaccharum.

Dosis: gtt. 1-4 paa Sukker og i æth. spir.; udvortes til at parfumere cosmetiske Midler.

P. refrigerans.

Ætheroleum foeniculi,

oleum æthereum Foeniculi D. 50,

Fenikelolie. Opløses i 2 D. spir. conc.

Virkning: Carminativum, expectorans, galacticum? (Flatulents, Kolik, Brystecatarrh); meget brugt til Børn; corrigens i Form af elæosaccharum.

Dosis: gtt. 1-5 paa Sukker eller i æth. spir.

P. magnesiæ c. rheo. P. pectoralis ph. 40. Aq. foen. ext. M. 69.

Ætheroleum juniperi,

oleum æthereum Juniperi D. 50,

Enebærolie. Danner med 12 D. spir. conc. en uklar Opløsning.

Virkning: Carminativum, diureticum (Dyspepsi, Flatulents, Kolik, Vattersot, chronisk Blæreecatarrh).

Dosis: gtt. 2-6 som elæosaccharum, Piller eller i spirituos Opløsning (Genever). 1 gramm. med āā 5 gramm. tr. digitalis og æth. chlor. spir. gtt. 20-30 som diureticum.

Tr. diuretica n. c. Med. Pil. ad hydropicos ph. 50. Spir. paralyticus ph. 50. Lin. hydragogum n. fr. B.

Ætheroleum lavandulæ,

oleum æthereum Lavandulæ D. 50,

Lavendelolie. Opløses i ethvert Forhold i spir. conc.

Virkning: Carminativum, excitans (Dyspepsi, Flatulents, Kolik); udvortes til at parfumere cosmetica.

Dosis: gtt. 1-5 paa Sukker eller i æth. spir.

Tr. balsamica aromatica.

Ætheroleum macidis,

oleum æthereum Macis D. 50,

Muskatblommeolie. Den er letopløselig i spir. conc.

Virkning: Carminativum, excitans (Dyspepsi, Flatulents, Kolik); corrigens i Form af elæosaccharum.

Dosis: gtt. 1-2 paa Sukker eller i æth. spir.

Tr. balsamica aromatica.

Ætheroleum Majoranæ,

oleum æthereum Majoranæ D. 50,

Merianolie.

Virkning og Dosis som ætheroleum macidis.

Un. major. Spir. ophthalmicus ph. 50.

Ætheroleum menthæ crispæ,

oleum æthereum Menthæ crispæ D. 50,

Krusemynteolie. Opløses i ethvert Forhold i spir. conc.

Virkning: Carminativum, excitans (Dyspepsi, Flatulents, Kolik); corrigens i Form af elæosaccharum.

Dosis: gtt. 1-5 paa Sukker eller i æth. spir.

Ætheroleum menthæ piperitæ,

oleum æthereum Menthæ piperitæ D. 50,

Pebermynteolie.

Virkning: Digestivum, carminativum, analepticum, anti-spasmodicum (Dyspepsi, Flatulents, Kolik, cholera asiatica); corrigens (Ex. for moschus) i Form af elæosaccharum.

Dosis: gtt. 1-3 paa Sukker, eller i spir. eller æth. spir.; 1 gramm. med 100 D. sacch. & muc. tragac. q. s. ut. f. trochisci Nr. 100.

Rotulæ menthæ pip. P. rhei salinus ph. 40 og A. S. 69. P. magnesiæ c. rheo A. S. 69. P. antipyroticus n. fr.

B. P. bismuthi A. S. & A. S. 69. Troch. bismuthi A. S.
69. Aq. menth. p. ext. M. 69. Jul.sal. M. 69. P. rhei sal. M. 69.

Ætheroleum origani cretici,

oleum æthereum Origani cretici D. 50,
spansk Humleolie. Til udvortes Brug.

Bals. opodeldoc ph. 50. Spir. saponatus ph. 50.

Ætheroleum rosmarini,

oleum æthereum Rosmarini s. Anthos D. 50,
Rosmarinolie. Opløses i ethvert Forhold i spir. conc.; til ud-
vortes Brug.

Linimentum opodeldoc. Spir. saponis camph. Ung. nervinum.

Ætheroleum sinapis,

Sennepolie. Opløses i ethvert Forhold i spir. conc.

Virkning: Udvortes irritans, rubefaciens.

Dosis: gtt. 5-10 til 250 gramm. Vand til Gurglevand;
til Indgnidning mod Lamhed gtt. 1 til 25 gramm. spir. conc.;
som rubefaciens 50 ctgrm. til 25 gramm. spir. conc. eller
gtt. 30 til 25 gramm. Olie; denne rødgjørende Sennepspiritus
benyttes saaledes, at blødt Trykpapir vædes med gtt. 20-30,
lægges paa Huden og tildækkes med Gummipapir.

Undgaa at tilsætte Syrer, ætsende Alkalier, Metalsalte.

Ætheroleum terebinthinæ,

oleum Terebinthinæ rectificatum D. 50,
rectificeret Terpentiniolie. Opløses i 10 D. spir. conc.

Virkning: Excitans, diureticum, antispasmodicum, an-
thelminthicum, hæmostaticum, catharticum; udvortes, hvor den
raa Olie anvendes, irritans, rubefaciens, hæmostaticum (atonisk
Vattersot, chronisk Lungeblennorrhoe, Pneumoni paa Over-

gang til 3die Stadium, den hypostatisk Pneumoni, Lungegangræn (som Indaanding), chronisk Blærecatarrh, gonorrhoea secundaria, leucorrhoea, Blærelamhed, ischuria, incontinentia urinæ, atonisk Tarmblødning, passiv hæmoptysis, rheumatismus chron., lumbago, ischias, asthma nervosum (i Intervalterne mellem Anfaldene), Galdesten (Durande), helminthiasis (ascaris lumbricoides, ox. vermicularis og tænia), f. typhoidea med meteorismus (i Klyster), f. puerperalis; udvortes mod rheumatiske Smertes, pernio, decubitus, Lamhed, Anæsthesi, Neuralgi, Kolik).

Dosis: gtt. 5-40 pro dosi (20-150 ctgrm.) 4-5 Gange d. d. (1-7 gramm. de die); som catharticum og anthelminthicum 5-10-15 gramm. taget i flere Portioner med $\frac{1}{2}$ Times Mellemrum; kan gives i Kapsler eller som oleos linctus; i Emulsion 2-10-15 gramm. til 120 gramm. aq. arom. med 30 gramm. Syrup og Tilsætning af vit. ovi Nr. 1 eller gi. arab. 7 gramm.; 1 D. - 10 D. ol. ricini som anthelminthicum hos Børn, hvoraf en Theskefuld 2-3 de die; opløst i æther 3 D. (Durande), hvoraf gtt. 30-50 Morgen og Aften imellem Anfaldene af colica hepatica.

Udvortes: Den rene Olie til Indgnidning eller Fomentation, hvortil den anvendes mere eller mindre varm paa Lærrød og bliver liggende $\frac{1}{4}$ Time; det er ofte særdeles smerteligt; i Liniment (1 D. sol. ammoniaci, 2 D. spir. camph., 3 D. ætherol. tereb. eller ææ ætherol. terebinth., ol. camph., acid. aceticum), i Klyster 5-15 gramm. i 120 gramm. emulsion ved Hjælp af vit. ovi Nr. 1.

Ol. sulphurato-terebinthinatum. Emulsio terebinthinata A. S. 69. Mel. tereb. n. fr. T. Ol. terebinthinæ cum opio A. S. Ungv. terebinthinatum. Ol. crotonis tereb. n. c. Med. Ol. contra tæniam ph. 50. Spir. antipar. M. 69.

Ætheroleum terebinthinæ crudum,

oleum æthereum Terebinthinæ D. 50,
 raa Terpentiniolie. Til udvortes Brug.

Empl. hydrargyri. Spir. antiparalyticus.

Ætheroleum thymi,

oleum æthereum Thymi D. 50,
 Timianolie. Til udvortes Brug.

Lin. opodeldoc. Spir. saponis camph.

Æthiops mineralis,

hydrargyrum sulphuratum nigrum D. 50,
 Mineralmor. Det er en Blanding af Svovl og enkelt Svovl-

qvægsølv; det brugtes tidligere som antiserophulosum, og især
 mod chroniske serophuløse Hududslet.

Dosis: 30-50-80 etgrm. 2-3 Gange d. d.

Agaricus chirurgorum,

fungus Quernus D. 50,

Fyrsvamp. Virker som hæmostaticum paa mekanisk Maade,
 bruges ogsaa i forskjellige andre chirurgiske Øiemed.

Aloe,

aloe lucida D. 50,

Aloe. Ei fuldstændigt opløselig i Vand, bedre i spir. conc.

Virkning: Digestivum, cholagogum, purgans, emmenag-
 ogum (atonisk Dyspepsi, habituel Forstoppelse, manglende
 Hæmorrhoidalfloed?, forskjellige chroniske Leversygdomme,
 Gulsot, retentio vel suppressio mensium).

Dosis: in dosi refracta som tonicum og cholagogum 3-
 5 etgrm. 2-3 Gange d. d., mildt afførende 15-30 etgrm.,
 drasticum eller pellens 30-60 etgrm., om fornødent, gjentaget;
 bedst i Piller med sapo med., bilis bovina dep., extr. gentianæ.

Undgaa at tilsætte stærke Syrer, Alkalier.

Extr. aloes. Liq. Claudi. Tr. benzoës comp. Pil. aloeticæ M. v. Pil. aloes comp. ph. 40. Pil. resolventes c. aloë ph. 40. Pil. Rufi ph. 40. Pil. aperientes c. marte ph. 50.

Amylum arrow,

amyllum Marantæ, Arrow-Root D. 50,

vestindisk Salep, Arrow-Root.

Virkning: Demulcens, obstruens, nutriens (Diarrhe, Dysenteri, phthisis, Reconvalescens efter svære Sygdomme). Smager bedre, men er neppe virksommere end Hvedestivelse.

Dosis: 5-10 gramm. røres ud med lidt koldt Vand, og derpaa heldes langsomt under Omrøring 250 gramm. spilkogende Vand eller Mælk; senere forbedrer man Smagen med Sukker, Kanel, Vin. Man kan og benytte den til Jevning paa Kjødssuppe.

Inf. amyli marantæ M. 40.

Amylum tritici,

Hvedestivelse.

Virkning: Demulcens, exsiccans. Indvortes kun som constituens for Pulvere og Modgift i acut Jodforgiftning. Ud- vortes i Klyster (Diarrhe, Dysenteri, colitis). 1-2 Thesefulde røres ud med lidt koldt Vand, og derpaa i 125 gramm. kogende Vand. Som Størpulver alene eller med oxydum zincicum (eczem, intertrigo, herpes). 1 D. ox. z. til 3 D. am. trit.

Undgaa at tilsætte Metalsalte, Borax, Spiritus, Tannin.

Pulv. pector. antispast. ph. 40 & M. 69. Pulv. merc. c. opio M. 69.

Antidotum arsenici,

Modgift mod Arsenik. Det er en vandig Opløsning af svovlsur Magnesia med deri suspenderet Jerntveiltehydrat og Magnesiahydrat. Det er Modgift mod acut Forgiftning med aci-

dum arsenicosum, idet der nemlig dannes basisk arseniksyrligt Jernveille og basisk arseniksyrligt Magnesia, der begge ere uopløselige i Mave- og Tarmsaft, medens den svovlsure Magnesia virker afførende.

Dosis: Man forskriver 300 gramm. og giver, efter emeticum, heraf 2 Spiseskefulde hver 5te Minut i Løbet af $\frac{1}{2}$ Time, og bliver ved, indtil Forgiftningstilfældene høre op og der med Stolgangen i rigelig Mængde afgaaer Jernveillehydrat; man mindsker Indgifterne, naar Forgiftningstilfældene mildnes.

Aqva amygdalarum amararum concentrata,
concentreret Bittermandelvand. 720 Draaber indeholde 1 Draabe vandfri Blaasyre; gramm. 1 indeholder 1,4 Milligram. vandfri Blaasyre.

Virkning: Sedativum (Kardialgi, ulcus ventriculi, enteralgia, Brækning, Hoste, Kighoste, Asthma; udvortes mod prurigo, eezem, Øienbetændelser).

Dosis: (Maximaldosis gtt. 60) gtt. 20-40 alene eller som Vehikel for narcotiske Extracter; 10 gramm. til 250 gramm. Mixtur eller 50 gramm. Saft; 10 ctgrm. - 1 gramm. til 25 gramm. aq. d. til Indaanding i Pulverisation.

Undgaa at tilsætte Alkalier, Jordarter, Metalsalte.

Linctus expectorans n. c. Med. Inf. dig. comp. n. c. Ch.

Aqva amygdalarum amararum diluta,
fortyndet Bittermandelvand. Sættes for at forbedre Smagen til Mixturer.

M. bromata A. S. 69.

Aqva aurantii triplex venalis,
Aqva florum Naphæ s. Aurantiorum destillata D. 50,
Pomeransblønstervand. Sættes for at forbedre Smagen til Mixturer, 1 D. til 10-20 D.

Aqva chamomillæ,

Chamillevand. Bruges som Vehikel for krampestillende Midler.

Aqva cinnamomi,

Kanelvand. Sættes som corrigens til Mixturer

Aqva cinnamomi spirituosa,

Aqva Cinnamomi vinosa D. 50,

viinaandholdigt Kanelvand. Corrigens til Mixturer.

Inf. rhei alk. Tr. pomi ferr. Mixt. alba. M. sennæ comp. n. fr. T.

Aqva destillata,

destilleret Vand. 1 gramm. = gtt. 10-15 til Mixturer, Solutioner etc.

Aqva foeniculi,

Fennikelvand. Adjuvans til carminative og expectorerende Mixturer; til Nyfødte theskefuldvis.

Liq. pectoralis. Tr. digitalis rubra.

Aqva menthæ crispæ,

Krusemyntevand. Corrigens til Mixturer.

Julap. salinum n. fr. v.

Aqva menthæ piperitæ,

Pebermyntevand. Corrigens til Mixturer.

Julap. salinum. M. salina n. fr. B.

Aqva mercurialis nigra,

sort Mercurialvand. Indeholder Qvægsølvforilte, bruges undertiden som Badevand til syphilitiske Saar.

Aqva petroselini,

Petersillevand. Adjuvans i diuretiske Mixturer.

M. boraxata n. fr. B. M. antiscorbutica A. S. 69 Em.
ammoniacalis ph. 50.

Aqva phagadænica,

gult Mercurialvand. Indeholder Qvægsølvteildehydrat, fri Kalk og
Chlorecalcium; det bruges undertiden til at forbinde ulcera
syphilitica.

Aqva rosæ,

Aqva Rosarum D. 50,

Rosenvand. Især til udvortes Brug.

Aqva ophth. simpl. n. fr. v. Lotio sulph. A. S. 69.
Mix. Ferri ep. Mors. purg. ros. Muc. Cydoniæ.

Aqva sambuci,

Hyldeblomstvand. Adjuvans til diaphoretiske Mixturer.

M. camph. M. diapnoica ph. 40 og A. S. 69. Liq. Clauderi.

Aqva tiliæ,

Lindeblomstvand. Adjuvans til diaphoretiske Mixturer, men
holder sig ikke godt.

Argentum foliatum,

Bladsølv. Til Forsølvning af Piller.

Atropina,

Atropin. Kan bruges i de samme Tilfælde som Belladonna;
dog anvendes kun meget sjelden den rene Atropin, hyppigere
sulphas atropicus (Epilepsi, Asthma, Kighoste, Neuralgier;
udvortes som mydriaticum og imod Neuralgier og Contrae-
turer).

Dosis (Maximaldosis 2 milligrm.) 0,5-1-2 milligrm., som mydriaticum 5 ctgrm. til 10 gramm. Vand; til subcutan Injection 0,5-1-2 milligrm.; i Salve 2-4 ctgrm. til 10 gramm. Fedt.

Undgaa at tilsætte Syrer, Chlor, Jod, Brom, Tannin og opløselige Metalsalte.

Axungia porci lota,

renset Svinefedt. Bruges som constituens til Salver.

Balsamum copaiva,

balsamum Copaivæ D. 50,

Kopaivabalsam.

Virkning: Diureticum; den virker omtrent som Terpentinen og har en eiendommelig Indflydelse paa Slimhinderne (Gonorrhoeen).

Dosis: gtt. 20-40, 3-4 Gange d. d. enten alene eller i Kapsler, hvoraf 6 til 8 d. d., eller i Piller (10 gramm. med ceræ alb. 5 gramm., fruct. cubeb. 15 gramm. m. f. pil. 160 d. s. 8 Piller 4 Gange d. d.) eller i Emulsion (15 gramm. med gi. arab. gramm. 8, aq. menth. pip. q. s. ad emuls. gramm. 120 Syr. zingib. 30 gramm. m. d. s. 1 Spiseskefuld hver 2den Time).

Capsulæ cum bals. copaiva. Capsulæ cum bals. cop. & ext. cub. Boli ad modum Velpeau n. c. Mixt. ad mod. Choparti n. c. Ch. Syr. Cop. n. fr. B. Pil. scill. ph. 50.

Balsamum peruvianum,

balsamum indicum nigrum D. 50,

Peruviansk Balsam.

Virkning omtrent som Kopaivabalsam; anvendes sjelden indvortes (bronchitis chron., leucorrhoea), udvortes deter-

gens, adstringens, antiparasiticum (torpide Ulcerationer, excorierede Brystvorter, Frost, Gangræn, Øreflod, Fnat).

Dosis: gtt. 10-30 p. d. i Piller; udvortes alene eller i Salve, Emulsion (b. peruv. 1 gramm. gi. arab. plv. 2 gramm., ol. amygd. 4 gramm., aq. rosæ 15 gramm. mod excorierede Brystvorter; dog irriterer det undertiden for meget); til en Indgnidning mod Fnat 25 gramm. (kostbart).

Tr. balsamica arom. Tr. benzoës comp. Pil. contra leucorrhoeam A. S. Bals. Locatelli ph. 50.

Balsamum terebinthina communis,

Terebinthina communis D. 50,

almindelig Terpentin.

Virkning: udvortes irritans; til Salver og Plastre.

Ung. bas. flavum & nigrum. Ung. terebinthin. Ung. canth. viride. Empl. cantharid. Empl. canth. cum euph. Empl. citrinum. Empl. hydrargyri.

Balsamum terebinthina veneta,

Terebinthina veneta s. larinica D. 50,

venetiansk Terpentin.

Virkning: Diureticum, med en eiendommelig Indflydelse paa Slimhinderne; paa Grund af den indeholdte Terpentinolie virker den som denne Olie (catarrhus vesicæ chr., Efterdryppert).

Dosis: 50-100-150 ctgrm. i Piller (b. ter. gramm. 20, hydratoc. magnes. 15 gramm. f. pil. 100 ph. gall.); til Klyster 5-10 gramm. i Emulsion.

Empl. de galb. croc. Empl. gi.-resinosum.

Balsamum toltutanum,

Tolubalsam.

Virkning: omtrent som peruviansk Balsam. Expecto-rans (chronisk Lungecatarrh).

Dosis: 50-100-150 ctgrm. i Piller eller Emulsion.
Tr. tolutana.

Biboras natricus,

borax raffinata, boras natricus cum aqua D. 50,

Borax. Opløselig i 15 D. Vand, uopløselig i Vinaand.

Virkning: Diureticum, emmenagogum, ecbolicum; udvortes detergens, cosmeticum (hydrops, Amenorrhoe, Adynamia af uterus i Fødslen; aphthæ, serophuløs Øienbetændelse, Hornhindepletter, Fregner, acne, pruritus cutaneus).

Dosis: 30-50-100 ctgrm. 3 Gge d. d. eller oftere i Pulver eller Opløsning; som vevækkende Middel 30-60 ctgrm. hver $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ -1 Time; udvortes i Penslesaft, Gurglevand, Øienvand til Inddrypning i Øiet og cosmeticum 1-2 D. til 50 D. Vand.

Undgaa at tilsætte Syrer, kaustisk Kali, kulsurt Kali og de fleste Salte; gi arabicum, amyllum, Saleb, i hvis Sted muc. cydoniæ kan anvendes.

Linetus ad aphthas ph. 40 Linct. boracicus n. fr. v. Inf. emmenagogum n. fr. B. Lotio benzoica A. S. 69. Linetus boracicus M. 69. Sol. tart. bor. M. 69.

Bicarbonas kalicus,

tvekulsurt Kali. Opløses i 4 D. Vand.

Virkning: Det virker mildere end carbonas kalicus og afgiver mere Kulsyre, men benyttes efter de samme Indicationer. Antacidum, diureticum (Pyrosis).

Dosis: 0,5-1 gramm. i Pulver eller Opløsning; 10 D. fordrer til Mætning 6,7 ac. citricum.

Undgaa at tilsætte Syrer, sure Salte, Kalksalte, Metalsalte.

Bicarbonas natricus,

natrum carbonicum acidulum D. 50,

tvækulsurt Natron. Opløses i 13 D. Vand, uopløseligt i Vin-
aand.

Virkning: Antacidum, digestivum, diureticum, lithon-
tripticum (Pyrosis, Cardialgi, Brækning, bronchitis, catarrhus
ventriculi, intestinalis, vesicæ, Gigt, Galdesten, urinsur Sten-
dannelse, diabetes).

Dosis: 0,5-1-2 gramm. i Pulver eller Opløsning; i
trochisci (bic. natr. 5 gramm., sacchar. 95 gramm. muc. gi
tragac. q. s. ut f. troch. 100; hver indeholder 5 ctgrm.);
10 D. fordrer til Mætning 8 D. ac. citricum.

Undgaa at tilsætte Syrer, sure Salte, Kalksalte, Metal-
salte.

Inf. rhei alkalinum. P. effervescens. P. efferv. comp. P.
antipyreticus n. fr. B. P. ferri carb. extemp. n. fr. Tr. (Ems,
Bilin, Vichy). Pil. ferri cp. A. S. Pulv. efferv. M. 69.

Bilis bovina depurata,

fel tauri inspissatum D. 50,

renset Oxegalde.

Virkning: Antacidum, digestivum (Atonisk Dyspepsi,
chroniske Leversygdomme med Galdemangel i Tarmkanalen).

Dosis: 30-100 ctgrm. 2-3 Gge d. d. i Piller med
Sæbe, Rhabarber (Bil. bov. dep., rad. rhei plv. $\bar{a}\bar{a}$ 5 gramm.
f. pil. 100, hver indeholder 5 ctgrm.). Den udvortes Brug
i Salve mod tabes meseraica og Orm er obsolet.

Undgaa at tilsætte Syrer og Salte.

Ung. ad scrophulos Hufelandi ph. 50.

Bioxalas kalicus,

sal. Acetosellæ s. Oxalium D. 50,

Syresalt. Til pharmaceutisk Brug.

Bitartras kalicus,

cremor Tartari, Tartarus depuratus D. 50,

tvevinsurt Kali. Opløses i 170 D. Vand.

Virkning: Refrigerans, resolvens (antibiliosum), diureticum, lenitivum (Febre, Congestioner, Ansigtsrosen, catarrhus ventriculi, polycholia, plethora, icterus, chroniske Leversygdomme, Hæmorrhoidaltilfælde, Vattersot, Forstoppelse).

Dosis: Som refrigerans, digestivum, resolvens og diureticum 0,5-1-2 gramm. i Pulver; som aperitivum 5-10 gramm. pro dosi eller 10-20 gramm. d. d. (oftest med rheum, sulphur sublimatum).

Undgaa at tilsætte de ætsende og kulsure Alkalier og Jordarter, Syrer.

P. refrigerans. P. digestivus. P. eccoproticus ph. 40. P. eccoproticus mitis n. fr. Tr. P. digestivus ad quartanas ph. 40. P. hæmorrhoidalis n. fr. B. & A. S. 69. P. diureticus A. S. P. dig. M. 69. P. eccopr. M. 69. P. refrig. M. 69. P. temp. camph. M. 69. Sol. Tart. borax. M. 69.

Bitartras kalicus depuratus venalis,

Tartarus depuratus venalis s. Crystalla Tartari D. 50,

renset Vinsten. Til pharmaceutisk Brug.

Bitartras kalicus. P. dentifricius ruber.

Bolus alba,

hvid Bolus, er kiselsur Lerjord.

Virkning: Exsiccans, adstringens (chroniske Ulcerationer).

Dosis: som fint Pulver til Paastrøning; 1-3 D. til 25 D. Fedt i Salve.

Brometum kalicum,

Bromkalium, opløses i 2 D. Vand og 80 D. spir. conc.

Virkning: Narcoticum, antispasmodicum, hypnoticum, dæmper Excitationstilstande i den sexuelle Sphære, frembringer Anæsthesi af Slimhinderne, især Øiets og Svælgets (Chorda, priapismus, Pollutioner, Nymphomani, Epilepsi, Søvnløshed, delirium tremens).

Dosis: 30-120-200 ctgrm. p. d. 2-3 Gge d. d. i Pulver, Piller (5 gramm. med extr. gentianæ 250 ctgrm., pulv. rad. gent. q. s. ut. f. pil. 100), bedst i Opløsning (5-10-20 gramm. til aq. d. 120 gramm., aq. aurantii, syr. zingib. āā 15 gramm. m. d. s. 1 Spiseskefuld pro dosi.)

Undgaa at tilsætte Syrer, sol. chlori og de fleste opløselige Metalsalte.

Mixt. bromata A. S. 69.

Bromum,

Brom. Til pharmaceutisk Brug.

Bulbus scillæ,

radix Scillæ D. 50,

Strandløg.

Virkning: Diureticum, expectorans, emeticum (atonisk Vattersot, chronisk bronchitis).

Dosis: (Maximaldosis 25 ctgrm.) 3-15-20 ctgrm. 3 Gge d. d.; til Børn 1-3 ctgrm. i Pulver eller Piller (bulb. scillæ, fol. digitalis, gi-res. guttæ, sulphid. stibici āā 1 gramm., extr. chamom. q. s. ut f. pil. 40 d. s. 2-3 Piller 3 Gge d. d.).

Acetum scillæ. Extr. scillæ ph. 50. Pil. ad hydrylicos ph. 50. Pil. scilliticæ ph. 50. Pulv. alterans cum dig. & scilla A. S. Vinum diureticum A. S. 69.

Calx chlorata,

calcaria chlorata D. 50,

Chlorkalk. Opløses for største Delen i 10 D. Vand og udvikler rigeligt Chlor ved Tilsætning af Saltsyre.

Virkning: Desinficiens, antisepticum, adstringens. Bruges næsten kun udvortes (stærkt suppurerende, putride og gangrænøse Ulcerationer, Frost, Forbrændinger; til Desinfektion af ildelugtende eller med Miasmer og Contagier opfyldte Rum) i linctus, gargarisma, Vadskevand, Fomentation, Injection 0,5-1-2 gramm. til 100 D. Vand; Opløsningen maa filtreres.

Undgaa at tilsætte Syrer og sure Salte, Metalsalte; den destrueres ved Lysets og Luftens Adgang og i Varme.

Sol. calcis chloratæ n. c. Med. Fumigatio Chlori M. 69.

Camphora,

camphora raffinata D. 50,

Kampher.

Virkning: Excitans, diaphoreticum, antisepticum; udvortes derivans, irritans, resolvens, anodynum, (Mod Astheni, truende Collaps og dissolutio sangvinis i typhoid Feber (fb. nervosa stupida), exanthematiske Febre eller i Betændelser, især Pneumoni, arthritiske Metastaser; Forgiftning med Cantharider og Seilla; Blærekrampe, Stranguri, Ischuri, priapismus, Nymphomani; catarrhalsk Diarrhe; rheumatiske Affectioner, rheumatiske Neuralgier og Paralyser; udvortes mod rheumatiske Affectioner, Lamhed, Anæsthesi, Contusioner, Sugillationer, decubitus, gangrænøse Saar).

Dosis: 3-10-20 ctgrm. 3 Gge d. d. eller oftere (sammen med moschus, opium, fol. digitalis, sulphas chinicus), enten i Pulver (camphora trita) med gi arab. som constituens ad chart. cer. eller i Emulsion eller Piller.

Æther. spir. camph. Mixt. camphorata, Tr. thebaica benzoica. Lin. ammoniac. camph. Lin. opodeldoc. Spir. camphor. Spir. saponis camph. Ol. camph. Lapis divinus. Empl. minii camph. Empl. saponatum. Ungv. hydratocarb. plumbici camph. Ungv. acetatis plumbici comp. Emuls. camph. ph. 40. Mixt. camph. lax. n. fr. v. Mixt. camph. muc. op. A. S. Liq. antirheum. A. S. 69. Liq. antirheum. ep. n. fr. B. Liq. nervin. foet. n. c. Tinct. antasthm. n. fr. v. Lotio sulphurata A. S. 69.

Cantharides,

spanske Fluor.

Virkning: Diureticum, emmenagogum, aphrodisiacum; udvortes vesicans (Lamhed af Blæren, af collum vesicæ og derpaa beroende incontinentia urinæ, amenorrhoea; prophylacticum ? mod Hydrophobi).

Dosis: (Maximaldosis 6 ctgrm.) 1-3-5 ctgrm. 2-3 Gge de die, meget sjelden i Pulver eller Piller, hyppigst som Tinctur.

Empl. canth. Empl. canth. cum euph. Ung. canth. simplex. Ung. canth. viride. Collodium canthar. Tr. canth. Tr. canth. fortior. Ung. ctra alopeciam A. S. & A. S. 69.

Capsulæ cum balsamo copaiva,

Kopaiva-Kapsler. Nr. 1 indeholder 75 ctgrm. og man giver 6-8 de die.

Capsulæ cum balsamo copaiva & extracto cubebæ, Kubebe-Kapsler. Nr. 1 indeholder 75 ctgrm., hvoraf 7,5 ctgrm. extr. cubebæ, 6-8 de die.

Capsulæ cum oleo crotonis,

capsulæ Crotonis D. 50,

Kroton-Kapsler. Nr. 1 indeholder 15 milligrm. ol. crotonis,
Nr. 1-2-3 pro dosi.

Capsulæ cum oleo ricini,

amerikansk Olie-Kapsler. Nr. 1 indeholder 75 ctgrm., Nr.
5-10-20 p. d.

Caragheen,

lichen Carraghen D. 50,

Karaghenmos.

Virkning: Emolliens, involvens, nutriens (Bronchitis
chr., phthisis).

Dosis: 1 D.-100 D. Decoct; 10 gramm. indkoges med
500 gramm. Vand, til der efter Sining ved Afkøling bliver
150 gramm. Gelee tilbage.

Pasta cacao cum caragheen. Gelatina lich. caragh.
ph. 50.

Carbo ligni præparatus,

carbo ligneus s. vegetabilis præparatus D. 50,

præpareret Kul.

Virkning: Desinficiens, absorberer putride Gasarter
(Tympanitis, cardialgia med Udvikling af ildelugtende Gasarter;
udvortes ved putride og gangrænøse Saar).

Dosis: 0,5-1-2 gramm. i Pulver eller electuarium.

Undgaa at tilsætte Metalsalte, Alkaloider.

Pulv. dentifricius niger. Pulv. carb. amylaceus n. fr. B.
Pulv. saturnino-carbonatus n. fr. B. Elect. carbonis n. fr. B.

Carbonas kalicus,

kali carbonicum purum, Sal Tartari D. 50,
kulsurt Kali. Opløses i lige Dele Vand.

Virkning: Antacidum, diureticum (Pyrosis, hydrops, tussis convulsiva).

Dosis: 10-50-100 etgrm. 3 Gge d. d., ikke i Pulver, bedst i Opløsning (Øl, Kaffe, Seltersvand). I Kighoste: Coecionellæ 75 etgrm., carb. kalici 130 etgrm., Aq. foeniculi 100 gramm., Syr. sacchari 25 gramm. m. d. s. en Barneskefuld ved truende Anfald; til Øienvand 15-30 etgrm. til 25 gramm. Vand; 120 etgrm-25 gramm. Vand til Inddrypning i Øret mod forhærdet Ørevox; ellers tages til udvortes Brug carb. kalicus dep.

Undgaa at tilsætte Syrer, sure Salte, Kalksalte, Metal-
salte.

Sol. carb. kalici. Syr. rhei. Jul. salinum M. 69.

Carbonas kalicus crudus,

kali carbonicum crudum s. Cineres clavellati D. 50,
Potaske. Til et Helbad 200-500 gramm., til Fodbad 30-100
gramm.

Ung. pyrolei pini.

Carbonas kalicus depuratus,

kali carbonicum depuratum, Cineres clavellati depurati D 50,
renset kulsurt Kali. Især til udvortes Brug; til Fomentation
eller Vadskevand 2-6 D. til 100 D. aq., til Salve 1-2 D. til
10 D. Fedt.

Liq. Clauderi. Pulv. dentifricius niger. Ung. ad scabiem
simpl. A. S. 69. Mixt. ferri cp. M. 69.

Carbonas magnesicus,

tung kulsur Magnesia. Til pharmaceutisk Brug.
Oxydum magnesicum ponderosum.

Carbonas natrius,

natrum carbonicum depuratum D. 50,

kulsurt Natron. Opløses i 2 D. Vand.

Virkning: Antacidum, diureticum, lithontriplicum; det er mildere end carbonas kalicus; bicarbonas natrius er at foretrække (Syre i Maven, Vattersot, urinsur Stendannelse).

Dosis: 0,5-1 gramm. i Opløsning; til udvortes Brug er Dosis dobbelt saa stor som af carbonas kalicus dep.

Undgaa at tilsætte Syrer, sure Salte, Kalksalte og Metalsalte.

Pil. Beddoes ph. 40. Inf. amaro-kalinum n. fr. B. & A. S. 69.

Carbonas natrius siccatus,

natrum carbonicum depuratum siccatum D. 50,

tørret kulsurt Natron. Forskrives, naar man vil anvende carb. natr. pulveriseret; det har tabt Halvdelen af sin Vægt.

Carbonas natrius venalis,

natrum carbonicum crudum s. Soda cruda D. 50,

Soda.

(Chroniske Hudsygdomme, eezema, Klø i Huden, leucorrhoea).

Til et Helbad 250-1000 gramm., til Fodbad 60-200 gramm.; til Indsprøjtning 1-5 gramm. til 500 gramm. Vand; naar det anvendes til Vadskning mod Klø i Huden, virker det bedst varmt.

Castoreum canadense,

canadisk Bævergeil. Det anvendes for Billighedens Skyld som Surrogat for det meget bedre c. moscoviticum.

Virkning: Antispasmodicum, anodynum, antihystericum, emmenagogum (Enteralgia, colica, globus, singultus, dolores uterini, dysmenorrhoea, amenorrhoea, adynamia uteri in partu, smertefulde Efterveer).

Dosis: 10-30 etgrm. i Pulver med Sukker som constituens ad chartam cer. eller i Piller.

Tr. castorei canadensis.

Castoreum moscoviticum,

russisk Bævergeil. Se c. canadense.

Tr. castorei moscovitici.

Cera,

Cera flava et Cera alba D. 50,

gult og hvidt Vox.

Virkning: Demulcens, emolliens, defendens; til udvortes Brug ved Excoriationer, Forbrændinger, udvortes Betændelser &.

Ung. ceræ. Ung. cetacei. Ceratum ad labia. Ung. simpl. M. 69.

Ceratum ad labia,

cera ad labia D. 50,

Læbe-Pomade. Mod sprukne Læber, excorierede Brystvorter.

Cetaceum,

sperma Ceti D. 50,

Hvalrav.

Virkning: Demuleens, emolliens, defendens.

Ceratum ad labia. Ung. cetacei.

Chinoidina,

Chinoidin. Opløses ikke i Vand, men i spir. conc. og fortyndede Syrer.

Virkning: Naar det kommer an paa Billighed, bruges det som Surrogat for sulphas chinicus i 2-3 Gange saa stor Dosis; bedst gives det som tr. chinoidinæ.

Chloras kalicus,

chlorsurt Kali. Opløses i 17 D. Vand.

Virkning: Digestivum, har en eiendommelig Virkning paa Mundens Slimhinde (Stomatitis ulcerosa & mercurialis, aphthæ, stomacace, diphtheritis, salivatio mercurialis, hvorimod den og anvendes som prophylacticum, catarrhus ventriculi chron., serophulosis).

Dosis: 25-50 ctgrm. 4-6 Gge d. d. bedst i Opløsning; udvortes til Gurglevand 3-5 D. til 100 D. Vand; i linetus 1 D. til $\bar{a}\bar{a}$ 10 D. mel og aqua.

Undgaa at tilsætte stærkere Syrer, sure Salte; Svovl, Svovlantimon eller organiske Stoffer maa ikke rives sammen med det tørre Salt.

Mixt. chloratis kalici A. S. 69.

Chloras kalicus venalis,

almindeligt chlorsurt Kali. Til pharmaceutisk Brug.

Chloras kalicus.

Chloretum amido-hydrargyricum,

hydrargyrum ammoniato - muriaticum, Mercurius præcipitatus
 albus D. 50,

hvidt Qvægsølvpræcipitat. Uopløseligt i Vand.

Virkning: Kun til udvortes Brug: Irritans, alterans; det virker langt mindre ætsende end oxydum hydrargyricum (Blepharitis chronica, eczema, impetigo, papuløse Sylphider).

Dosis: til Salve 1 D. - 8 D. Fedt eller ung. glycerini; til Øiensalve 20-100 ctgrm. til 10 gramm. Fedt.

Undgaa at tilsætte Syrer, Alkalier, de fleste Salte.

Ungv. hydr. alb. M. 69.

Chloretum ammonicum,

ammonium muriaticum depuratum, Hydrochloras ammonicus
 depuratus D. 50,

Salmiak. Opløses i 3 D. Vand.

Virkning: Expectorans, mucum solvens, mildt diaphoreticum; udvortes refrigerans, discutiens. (Bronchial- og Intestinalcatarrh, pneumonia i Resolutionsstadiet; udvortes: kroniske Betændelser og Infiltrationer, Forhærdelser, Kirtel-svulster, Contusioner, Svulst af Tonsillerne, kronisk angina, leucorrhoea).

Dosis: 30-50 ctgrm. 4-6 Gge d. d., undertiden 1-1, 5 gramm. p. d., bedst i Opløsning i aq. arom. med extr. glycyrrhizæ, for at forbedre den salte Smag; udvortes 10-40 ctgrm. til 25 gramm. Vand til Indaanding i Pulverisation; eller Salmiakpulver ophedes i et indelukket Rum paa en Jernblikplade over en Spirituslampe, derved udvikles hvide Dampe, som Patienten indaander med Luften; til Injection 10-20 gramm. til 500 gramm. Vand; til Fomentation 10-20 gramm. til 200 gramm. Vand eller Eddike.

Undgaa at tilsætte stærkere Syrer, Alkalier, de fleste Salte; giver man Salmiakmixture med en Sølvse, maa den strax vadskes af.

Mixt. salina n. fr. B. Mixt. salina dulcis n. fr. B. Mixt. rheo-salina n. fr. B. Mixt. salina febrifuga n. fr. B. Mixt. salina muc. n. fr. B. Pulv. rhei salinus ph. 40. Dec. Tarax. cp. s. res. M. 69. Mixt. salina M. 69. Mixt. salina dulcis M. 69. Mixt. rheo-salina M. 69. Pulv. rheo-salinus M. 69.

Chloretum baricum,

baryta muriatica, Terra ponderosa salita, Chloretum baryticum D. 50,

Chlorbarium. Opløses i $2\frac{1}{2}$ D. Vand.

Virkning: Alterans. Brugtes tidligere mod scrophulosis, hvor vi nu bruge jodetum kalicum, udvortes mod scrophuløs Ophthalmi.

Dosis: 2-10-15 ctgrm. forsigtigt stigende, opløst i aq. cinnamomi; til Øienvand 25 ctgrm. til 25 gramm. Vand.

Undgaa at tilsætte stærkere Syrer, de fleste Salte, tanninholdige Midler.

Chloretum chinicum.

Chloretum chinicum,

chininum muriaticum, Hydrochloras chinicus D. 50, saltsurt Chinin. Opløses i 20 D. kogende Vand og 3 D. spir. conc.

Virkning: Det er noget lettere opløseligt i Vand end sulphas chinicus; det skal lettere resorberes og hurtigere frembringe Chininens constitutionelle Virkninger.

Dosis og Form som af sulphas chinicus.

Undgaa at tilsætte Syrer, som ere stærkere end Salthyre, Bly-, Sølv- og Kvægsølvsalte, de ætsende og kulsure Alkalier, tanninholdige Midler.

Chloretum ferrico-ammonicum,

ammonium muriaticum martiatum D. 50,

jernholdig Salmiak. Opløses i 3 D. Vand.

Virkning: Som en Blanding af Jern og Salmiak? Tonicum, roborans (Chlorose med catarrhalsk Complication, chronisk Brystecatarrh, chronisk Slimflod, serophuløs Anæmi, Lever- og Miltsvulst efter Koldfeber.)

Dosis: 30-50-100 ctgrm. 2-3 Gge d. d. i Piller med extr. og pulv. rad. glycyrrhizæ (chl. ferr. ammonici 10 gramm, opii plv., rad. ipecac. plv. āā 30 ctgrm. Pulv. rad. alth. & aq. q. s. ut f. pil. 80 d. s. 4 Piller 3 Gange daglig; chl. ferr. ammon., chlor. chinici āā 5 gramm., extr. aloes 3 gramm., ext. glycyrrh. q. s. ut f. pil. 150 d. s. 5 Piller pro dosi) eller i vandig Opløsning (5-10 gramm. til 120 gramm. aq. d. og 30 gramm. ap. cinnam. spir), men ikke i Pulver.

Undgaa at tilsætte stærke Syrer, Alkalier og Jordarter, Metalsalte, Tannin.

Pil. contra spermatorrhoeam A. S.

Chloretum ferricum,

ferrum muriaticum oxydatum D. 50,

Jerntvechlor. Opløseligt i Vand, spir. og Æther.

Virkning: Tonicum, roborans, adstringens, hæmostaticum; udvortes adstringens, hæmostaticum, causticum (Passive Hæmorrhagier, hæmoptysis, metrorrhagia, blødende Ulcerationer, Hæmorrhagi fra rectum, traumatiske Blødninger, leucorrhoea; causticum mod Condylomer, Teleangiectasier).

Dosis: 5-15-30 ctgrm. stigende til 50 ctgrm. p. d. i

tilstrækkelig fortyndet vandig eller spirituøs Opløsning, i Almindelighed som sol. chlor. ferrii; udvortes 1-2 D. til 10 D. Vand; man applicerer denne Opløsning med en Pensel eller Charpi, dyppet deri og trykket ud; til Injection i vagina eller rectum 1-5 D. til 100 D. Vand, i urethra 1-2 D. til 150 D. Vand; 5-20 ctgrm. til 25 gramm. aq. til Indaanding i Pulverisation.

Undgaa at tilsætte Alkalier, Bly- og Sølsalte, kulsure og phosphorsure Salte, Tannin.

Chloretum ferrico-ammonicum. Sol. chloreti ferrii. Sol. chloreti ferrii spir. Sol. chlor. ferr. spir-æth.

Chloretum hydrargyricum corrosivum,

hydrargyrum muriaticum corrosivum, Chloretum hydrargyricum, Mercurius sublimatus corrosivus D. 50,

Qvægsølvtechlor. Opløses i 16 D. Vand, 3 D. spir. conc. og 4 D. Æther.

Virkning: Alterans, antisypiliticum; udvortes adstringens, irritans, causticum (constitutionel Syphilis, sypilitiske Hudsygdomme, rheumatiske Neuralgier; udvortes mod pruritus genitalium, ephelis, chronisk catarrhalsk og scrophuløs Øienbetændelse; causticum mod condylomata lata).

Dosis: (Maximaldosis 30 milligr.) 4—5 < 10—30 milligr. pro dosi 1-2 de die efter Maden, bedst i Piller (chlor. hydr. corr. in aq. guttis sol., opii plv. āā 20 ctgrm. pulv. rad. glycyrrh. 12 gramm., extr. glye. q. s. ut f. pil. Nr. 200 d. s. Nr. 4 p. d., forsigtigt stigende til 5, 6, 7, 8, 2 Gge. d. d.) eller Opløsning (chlor. hydr. corr., chl. ammon. āā 10 ctgrm., aq. d. 40 gramm., vin. colchici 20 gramm. m. d. s. gutt. 40 bih., tilraadet mod den atypiske prosopalgia); udvortes til Mundvand, Gurglevand og Øienvand 5 ctgrm. til 100 gramm. Vand, til Injection i urethra 10-20 ctgrm. til 100 gramm.

aq. d., i vagina 40-60 ctgrm. til 100 gramm. Vand; til Fomentation eller Vadsugning 10-20-40 ctgrm. til 100 gramm. aq. d. (chlor. hydrarg. corr., chlor. ammon. $\bar{a}\bar{a}$ 25 ctgrm. Emuls. amygd. 250 gramm. som cosmeticum), som irritans 1 D. til 100 D. Vand, som causticum 1-2-3 D. til 25 D. spir. conc. eller æther; til et Helbad 4-8 gramm.

Undgaa at tilsætte de ætsende og kulsure Alkalier, Jodkalium, Metalsalte, Tannin og de fleste organiske Stoffer.

Aq. phagadænica. Aq. ophth. merc. ph. 50. Aq. caust. ad condyl. (Plenek) n. c. Ch. Pil. merc. subl. n. c. Med. Lotio hydrargyri A. S. 69. Aq. ophth. merc. M. 69 Aq. phagadænica M. 69.

Chloretum hydrargyrosom præcipitatum,

hydrargyrum muriaticum mite præcipitatum D. 50,

fældet Qvægsølvforchlor. Er mere fintfordelt og har derfor en stærkere Virkning end det følgende.

Chloretum hydrargyrosom sublimatum, calomel,

hydrargyrum muriaticum mite sublimatum D. 50,

sublimeret Qvægsølvforchlor.

Virkning: Alterans, antiplasticum, purgans, cholagogum, antisypiliticum (acute Betændelser, meningitis, pneumonia, pleuritis, i Begyndelsen af en typhoid Feber, hyperæmia cerebri; mb. hepatis chr., helminthiasis (sammen med Santonin), constitutionel sypillis).

Dosis: I chroniske Sygdomme 3-6 ctgrm. 2-3 Gge. d. d.; her gives det ofte sammen med sulphidum stibicum og bevirker i denne Forbindelse mindre let Salivation. I acute Sygdomme 3-6-15 ctgr. hver eller hver anden eller tredie Time indtil den ønskede Virkning (grøn Stolgang eller Salivation); vil man undgaa Diarrhe, sættes opium til; som

deriverende purgans (ofte med rad. rhei, tub. jalapæ) 30 etgrm. 2-3 Gange gjentaget eller 60-120 etgrm. paa engang. Det gives enten som Pulver med sacch. lactis eller r. glycyrrh. som constituens eller i Piller. Udvortes som Strøpulver eller Salve 1 D. til 10 D. ung. glycerini.

Undgaa at tilsætte de ætsende og kulsure Alkalier, stærke Syrer, sol. hydr. calcici, Metalsalte, chlor. ammon. & natric., sol. chlori, Jod.

Aq. mercurialis nigra. Pil. aperientes cum marte 50. Pil. ad hydrop. 50. Pil. calomelanos n. fr. B. Pil. hydrarg. theb. A. S. 69. Pulv. calomel. n. c. Pulv. laxans simpl. n. fr. B. Pulv. calom. cum dig. n. fr. B. Pulv. calom. cum jalap. n. fr. B. Plv. calom. cum moscho n. c. Plv. calom. cum opio n. fr. B. Plv. infant. cum kalom. A. S. Plv. rhei cum hydr. M. Aq. merc. nigra M. 69. Pil. merc. c. Opio M. 69. Pulv. alterans Plum. M. 69. Pulv. merc. c. Opio M. 69.

Chloretum morphicum,

saltsur Morphin. Opløses i 20 Dele Vand og i spir.

Virkning: se opium; det maa foretrækkes for acetas morphicus.

Dosis: (Maximaldosis 30 millgrm.) 1-3 etgrm. p. d., om fornødent, gjentaget 2-3 Gange eller oftere de die, enten som Pulver med Sukker eller i Piller (1 gramm chl. morph. med sacch. lactis 2 gramm. mell. dep. q. s. ut f. pil. 100) eller i Opløsning (5 etgrm., aq. d. 10 gramm. d. s. gutt. 30-60 p. d.); til subcutan Injection 2-5-10-25 milligrm. (5 etgrm. til aq. d. gutt. 50); til suppositoria 3 etgrm. (30 etgrm., but. cacao 20 gramm. f. suppositoria 10 æqvalia).

Undgaa at tilsætte de ætsende og kulsure Alkalier, Metalsalte, Tannin.

Chloretum zincicum,

Chlorzink.

Virkning: Adstringens, irritans, causticum, kun udvortes (scrophuløse og syphilitiske Saar, Saar med Afsondring af pus malum og daarlig Granulationsdannelse, syphilitiske Exerescentser, lupus, cancer).

Dosis: til Fomentation 1-3-5-10 D. til 500 D. Vand; causticum 1 D. til aq. d. eller spir. conc. 1-2-3 D. altid med Tilsætning af nogle Draaber ac. hydrochloratum, for at Opløsningen kan holde sig klar; pasta caustica 1 D. til 1-2-3 D. amyllum & aq. q. s.; denne Blanding æltes sammen med Fingrene til en seig Deig; for at den ikke skal klæbe fast ved Fingrene under Æltningen, maa disse bestrøes med lidt Mel; Pastaen lægges i 2-4 Timer paa den for epidermis blottede Hud; i Salve 1 D. til 9 D. Fedt.

Undgaa at tilsætte Alkalier og deres Salte, Metalsalte.

En Opløsning af 1 D. til 100-200 D. Vand stænkes i Sygeværelser, Latriner for at borttage styg Lugt.

Chloroformium purum,

Chloroform D. 50,

rent Chloroform.

Virkning: Indaandet Anæstheticum; antispasmodicum, anodynum, narcoticum; udvortes irritans, anodynum (Asthma, Brækning, Søsyge, Cardialgi, hysterisk Migraine; rheumatiske Affectioner, Ørepine, Tandpine).

Dosis: gtt. 2-5 forsigtigt stigende til 10-20 p. d. flere Gge. d. d. enten rent i Sukkervand eller i Emulsion (gtt. 50-100 Aq. aur. 120 gramm. Syr aurantii, muc. gi. arab. āā 15 gramm.) eller i Opløsning (1 D. til 7 D. tr. valerianæ æth. og heraf gtt. 10-20).

Chloroformium venale,

Chloroform, anvendes til udvortes Brug (dog ei som anæstheticum) alene paa Bomuld eller 1 D. til 3-5-10 D. ol. camph. eller sammen med spir. conc. āā; til Klyster gtt. 20-30 til 120 gramm. dec. avenæ.

Coccionella,

coccinella D. 50,

Cochinelle.

Virkning: Colorans, antispasmodicum? (Kighoste).

Dosis: 5-30 ctgrm. eller mere, som Pulver med bicarb. natr. som constituens eller i Opløsning. (cocc. 75 ctgr., carb. kalici 130 ctgrm., aq. foen. 100 gramm., syr. sacch. 25 gramm. m. d. s. en Barneskefuld ved et truende Kighosteanfald), til Tandpulvere og Tandtinkurer for at farve dem.

Colla piscium,

ichthyocolla D. 50,

Husblas.

Virkning: Emolliens, demulcens, defendens (ved catarhalske og betændelsesagtige Affectioner af primæ viæ, Diarrhe, Dysenteri).

Dosis: 15-30 gramm. indkoges med Vand til 500 gramm. Gelee, hvoraf 1 Spiseskefuld 4 Gange daglig, ofte med Tilsætning af Vin, Kanel, Sukker.

Sericum adhæsivum.

Collodium,

Kollodium.

Virkning: Agglutinans, defendens, comprimens (vulnera, Excoriationer, excorierede Brystvorter, Frost, zona, peritonitis,

orchitis, mastitis, Blødning efter Iglebid) til udvortes Brug; det pensles paa; skal det virke comprimerende, maa man gjentage Penslingen flere Gange; man kan farve det med lidt tr. coccionellæ eller en Draabe Anilinopløsning.

Collod. elast. M. 69.

Collodium cantharidatum,

Spanskflue-Kollodium.

Virkning: Vesicans.

Det er at foretrække for empl. canth. paa Steder af Legemet, hvor man har ondt ved at faae Plastret til at ligge fast og hos Børn eller Delirerende, som ville rive det af.

Collodium elasticum,

elastisk Kollodium, virker som collodium, dog ikke som comprimens.

Confectio cinæ,

confectio seminum cynæ D. 50,

Ormesukker.

Virkning: Anthelminthicum (se flor. cinæ).

Dosis: til Børn 1 Thesefuld 2-3 Gge d. d.

Cortex cascarillæ,

Kaskarillebark.

Virkning: Aromatico-tonicum (atonia & torpor primarum viarum, Dyspepsi, Flatulents, Diarrhe, i Reconvalescenten efter svære consumerende Sygdomme.

Dosis: Bedst i Infus (15 gramm. til 200 gramm.), hyppigst sammen med r. columbo, geum urb.

Tr. cascarillæ, Ext. cascarillæ 50.

Cortex chinæ calisayæ,

cortex chinæ flavus regius D. 50,

gul eller Konge-Chinabark.

Virkning: Den indeholder mere Chinin end andre Arter af Chinabark. Amaro-adstringens, tonicum, antisepticum (fb. typhoidea, pyæmia, f. puerp., fb. exanthematicæ med septisk Character, Skørbug, Koldbrand, stærke Af- og Udsondringer med Svækkelse, stærke Suppurationer med Hektik, Slimflod, Sædflod, galactorrhoea, Spytflod, polyuria, diabetes, Lungeblennorrhoe, Diarrhe, Dysenteri; passive Blødninger som Følge af dissolutio sanguinis; serophulosis, rachitis, anæmia, chlorosis, Reconvalescents efter svære Sygdomme; hydrops, mb. Brightii, Kighoste, Hysteri, atypiske Nervesygdomme).

Dosis: Bedst som dec., der sies, mens det endnu er varmt (15-30 gramm. til 250 gramm.), eller, naar det kommer an paa Alkaloiderne, 15-30 gramm., der koges med aq. comm. q. s. og ac. sulph. dil. 2-4 gramm. ad rem. col. 200 gramm.

Undgaa at tilsætte Alkalier, Jordarter, Metalsalte, især Bly- og Jernsalte.

Extr. chinæ calis. Tr. chinæ calis. Tr. chinæ comp. Vinum chinæ ferr. P. dent. nig. Ext. Chinæ reg. aqv. 50. Dec. cort. chinæ 40. Dec. chinæ. acid. 40. Dec. chinæ cum senega 50 & A. S. 69. Dec. chinæ cum uva ursi A. S. Dec. chinæ c. cicutæ n. c. M. Spec. antihyst. c. cortice n. fr. B. Dec. cort. chinæ cal. M. 69. Dec. cort. chinæ c. senega M. 69.

Cortex chinæ ruber,

rød Chinabark, er dyrest; den kan anvendes, hvor det mere kommer an paa Garvestoffet end paa Alkaloiderne (Diarrhe).

Cortex chinæ fuscus s. griseus,

cortex chinæ fuscus D. 50,

graa Chinabark, benyttes meget sjældnere end cort. chinæ cal.;
til udvortes Brug (Gangræn, atoniske ulcera, leucorrhoea)
30-50 gramm. til 250 gramm. Dec.

Dec. cort. chinæ simpl. M. 69. Dec. cort. chinæ ac.
M. 69.

Cortex cinnamomi cassiæ,

cortex cassiæ cinnamomeæ s. cinnamomi indici D. 50,

Cassia eller indisk Kanel.

Virkning: se cort. cinnam. ceylan.

Aq. cinnamomi. Aq. cinnamomi spir. Mass. pil. de cy-
noglosso. Tr. lav. rubra. Tr. aromatica. Tr. arom. ac. Syr.
cinnamomi 50.

Cortex cinnamomi ceylanici,

cortex cinnamomi acuti ceylonensis D. 50,

ceylonsk Kanel.

Virkning: Aromatico-tonicum, carminativum, bevirker
Uterincontractioner (Dyspepsi, Flatulents, Cardialgi, vomitus
gravidarum, passiv Metrorrhagi, adynamia uteri in partu;
corrigens for bitre Midler).

Dosis: 30-50-100 ctgrm. som Pulver; til at bestre
Piller (kostbar).

Undgaa at tilsætte Salpetersyre, Metalsalte, især Jern
(som ved Tannin).

Tr. cinnamomi. Vin. theb. croc. P. aromaticus ph. 40
P. antichloroticus 40 & n. c. Med.

Cortex frangulæ,

Tørstetræbark.

Virkning: Catharticum (purgans, eccoproticum ved habituel Forstoppelse, Hæmorrhoidallilfælde, plethora abdominalis, Hypertrophi af Lever og Milt, hydrops).

Dosis: 25-30 gramm. til 250 gramm. dec. (ofte tilsettes som corrigens flavedo aurantii eller fructus carvi eller som adjuvans sulphas natricus 15 gramm.) heraf 2 Spiseskefulde Morgen og Aften eller 1 Spiseskefuld hver 2den eller 3die Time, indtil der kommer grødet Stolgang.

Cortex fructus aurantii,

cortex aurantiorum D. 50,

Pommeransskaller.

Virkning: Aromatico-tonicum, anvendes helst som flavedo aurantii (atonia & torpor primarum viarum, Dyspepsi, Flatulents, Chlorose, Hysteri).

Dosis: 30-60-100 ctgrm. som Pulver, Piller, Inf. (15 gramm.-200 gramm. col.), hvoraf 1 Spiseskefuld hver 3die Time.

Tr. aurantii. Syr. aurantii. Tr. chinæ. comp. Spec. anti-hyst. n. fr. B. & A. S. 69. Spec. ad leucorrhoeam n. fr. B.

Cortex mezerei,

Kjelderhalsbast.

Virkning: Udvortes irritans, rubefaciens, vesicans; et Stykke af Basten 2" langt og 1" bredt, udblødt i Vand eller Eddike, bindes fast paa Huden og bliver liggende i kortere eller længere Tid.

Extr. mezerei. Ung. mezer. 40.

Cortex quercus,

Egebark.

Virkning: Adstringens (udvortes mod profuse Slimflod, leucorrhoea, prolapsus ani & vaginæ, decubitus, slappe Saar).

Dosis: 30 gramm. til et Dec. af 250 gramm. til Fomentation, Injection og Vadskning.

Undgaa at tilsætte mineralske Syrer, Alkalier, Metalsalte (som ved Tannin).

Dec. cort. quercus n. c. Ch. Dec. adstringens A. S. Ung. quercinum Ph. 50.

Cortex radices granati,

Granatrod bark.

Virkning: Anthelminthicum (Tænia).

Dosis: Decoct af 60 gramm. til 375 gramm. (efter at man først har ladet Barken i 24 Timer macerere med koldt Vand), hvilken Portion tages fastende om Morgen, delt i 4 Dele med $\frac{1}{2}$ Times Mellemrum mellem hver. Om fornødent, gives 6 Timer efter til Uddrivning af Ormen ol. ricini eller rad. jalapæ; som Forberedelseseur holder Patienten sig Dagen forud til Sildesalat med Skinke, Løg, Kjødsuppe, Kjød.

Dec. granat. n. fr. B. Dec. adstringens A. S.

Dextrinum,

Dextrin.

Virkning: Agglutinans (Frakturer).

Elæosacchara,

Oliesukkere.

Virkning: som de anvendte ætherolea.

Electuarium e senna mannatum,

electuarium aperiens D. 50,

afførende Latværg.

Virkning: Laxans.

Dosis: 1 Theskefuld hver 2den Time indtil Virkning.

Emplastrum adhæsivum,

emplastrum adhæsivum album (loco emplastri adhæsivi succiei)

D. 50,

Hefteplaster.

Virkning: Adhæsivum, defendens.

Empl. stib. 50.

Emplastrum cantharidum,

emplastrum cantharidum ordinarium, emplastrum vesicatorium
ordinarium D. 50,

Spanskflue-Plaster.

Virkning: Irritans, rubefaciens (i 2-4 Timer), vesicans, epispasticum (efter 6-12-24 Timers Forløb). Til Børn og Kvinder kan det blandes med $\frac{1}{4}$ empl. gummi-resinosum; for at forstærke dets Virkning bestrøes det med pulv. cantharidum, ligesom man ogsaa i Forveien kan gnide Applicationsstedet med Flonel, dyppet i varm Eddike, eller lægge en Sennepskeg paa; det forskrives med en Rand af empl. adhæs.

Emplastrum cantharidum cum euphorbio,

emplastrum cantharidum perpetuum, emplastrum vesicatorium
perpetuum D. 50,

langsomt trækkende Spanskflue-Plaster.

Virkning: Vesicans, epispasticum, rødgjør og løsner Huden, trækker først Blære efter Dages eller Ugers Forløb, bliver derfor liggende i flere Uger. Anvendes i Sygdomme, som ville bedres ved en længere varende Hudbetændelse og Hududsondring.

Emplastrum citrinum,

Citron-Plaster.

Virkning: Irritans (Rheumatismus, chroniske Indurationer).

Emplastrum conii,

emplastrum conii maculati, emplastrum cicutaë D. 50,
Skarntyde-Plaster.

Virkning: Anodynum, discutiens (Kirtelindurationer, rheumatismus, scirrhus).

Empl. res. merc. M. 69.

Emplastrum galbani crocatum,

emplastrum de galbano crocatum D. 50,
safranholdigt Galbanum-Plaster.

Virkning: Svagt irritans, beforder Suppurationen ved Abscesser, Furunkler og torpide Hævelser.

Emplastrum gummi-resinosum,

emplastrum gummosum D. 50,
Gummi-Plaster.

Virkning: Adhærens, defendens, digerens.

Empl. resolvens 50 & n. fr. v.

Emplastrum hydrargyri,
emplastrum mercuriale D. 50,

Merkurial-Plaster.

Virkning: Resolvens, alterans (Kirtelsvulster, Indurationer, mb. hepatitis & lienis chr., Exostoser, Buboner).

Empl. resolv. 50. Empl. res. mere. M. 69.

Emplastrum manus dei,

Guds-Haands-Plaster.

Virkning: Svagt irritans (forskjellige Lungesygdomme).

Emplastrum meliloti,

Meloten-Plaster.

Virkning: Emolliens, resolvens, digerens.

Empl. resolvens n. fr. v.

Emplastrum minii camphoratum,

(ad modum Kiøngii).

Virkning: Irritans, klæber ikke godt.

Emplastrum oxydi plumbici,

emplastrum commune s. lithargyri D. 50,

almindeligt Sølvglød-Plaster.

Virkning: Adhærens, defendens; anvendes hyppigst som Basis for sammensatte Plastre.

Emplastrum saponatum,

Sæbe-Plaster.

Virkning: Stimulans, resolvens (Kirtelsvulster, Indura-

tion af Bryskirtlen, saakaldte Mælkeknuder, Hævelse, der bliver tilbage efter Contusioner, Distorsioner).

Empl. resolvens 50.

Emplastrum sticticum,

Beg-Plaster.

Virkning: Irritans, beforder Suppurationen af Abscesser.

Emulsio amygdalarum,

(loco emulsionis communis),

almindelig Emulsion, Mandel-Emulsion.

Virkning: Emolliens, demulcens (Febertilstande, Irritation af Ventriklen og Intestinalkanalen, Cardialgi, Gonorrhæ, Stranguri); excipiens for andre Medicamenter (camphora, moschus, gummi arab., extr. hyoseyami, oxydum magnesium pond. etc.).

Dosis: 100-300 gramm. p. d. eller efter Behag; om Sommeren forskrives kun en Portion for een Dag, om Vinteren for 2 Dage, da den let fordærves.

Euphorbium,

Euphorbium.

Virkning: Udvortes rubefaciens, pustulans (derivans ved Rheumatismus, Catarrher, Paralyser).

Empl. cantharidum cum euphorbio.

Extractum absinthii,

Malurt-Extrakt.

Virkning og Brug omtrent som hb. absinthii.

Dosis: 30-100 ctgrm. 3-4 d. d. i Piller eller Opløsning i aq. aromatica; constituens for Piller.

Extractum aconiti,

Stormhat-Extrakt.

Virkning: Sedativum (ischias, prosopalgia, odontalgia, rheumatiske og arthritiske Smerter).

Dosis: (Maximaldosis 15 ctgrm.) 3-5-15 ctgrm. som Pulver eller Piller (60 ctgrm. Extr. dulcamaræ 1,5 gramm. Rad. glyc. q. s. ut. f. pil. 20) eller Opløsning (60 ctgrm. i tr. guajaci ammon, vin. stib. $\bar{a}\bar{a}$ 10 gramm. m. d. s. gtt. 20-40 p. d.). Udvortes til Indgnidning alene eller 1-2 D. til 10 D. Fedt.

Inf. colchici c. aconito n. fr. T. Pil. antarthriticæ 50.
Pulv. aconiti cum. dig. n. fr B.

Extractum aloes,

Aloe-Extrakt.

Virkning: noget mildere end Aloe.

Dosis: Som mildt purgans 5-10-15 ctgrm. om Aftenen eller Morgenen mod habituel Forstoppelse; som drastieum 30-60 ctgrm.; bedst som Piller (5 gramm. f. l. a. pil. Nr. 40).

Extr. rhei jalapinum. Pil. aloet. mart. n. fr. B. Pil. aloet. mart. fort. A. S. Pil. aloet. c. rheo A. S. & A. S. 69. Pil. aloet. cum. coloc. A. S. 69. Pil. laxantes n. c. Pil. Winslowii n. c. Pil. anthelm. n. fr. v. Pil. rés. cum aloe 40 & n. fr. v. Lin. lax. A. S. Pil. aloes cum rheo M. 69.

Extractum belladonnæ,

Belladonnablade-Extrakt.

Virkning og Brug som fol. belladonnæ.

Dosis: (Maximaldosis 15 ctgrm.) 1-3 5-10 ctgrm. p. d., til Børn 3-5-8 milligrm. p. d. som Pulver, Piller eller Opløsning (20-30 ctgrm. i aq. amygd. am. c. 15 gramm. m. d. s. gtt. 20); udvortes alene til endermatisk Application eller i Salve 1-2 D. til 8 D. Fedt eller ung. glycerini; til Plaster

1 D. til 3 D. empl. adhæs.; til Øienvand 5-30-50 ctgrm. til 25 gramm. Vand; til Indsprøitning i vagina, urethra 15-30 ctgrm. til 100 gramm. Vand; til Suppositorier (25 ctgrm. til ol. cacao 15 gramm. f. suppos. Nr. 4).

Ung. belladonnæ comp. n. e. Ch. Ung. bellad. jod. A. S.
Lotio sedat. n. fr. B.

Extractum calabar,

Kalabar-Extrakt.

Virkning: Antispasmodicum, myoticum, paralyticum; udvortes myoticum (mydriasis, hernia corneæ, synechiæ post., forskellige Øienoperationer; Convulsioner, Stivkrampe, Epilepsi).

Dosis: (Maximaldosis 20 milligrm.) 5-10-20 milligrm.
Til Inddrypning i Øiet gtt. 2-5 af en Opløsning af 20-30 ctgrm. i 4 gramm. Glycerin.

Extractum chamomillæ,

Chamille-Extrakt.

Virkning: Tonicum-amarum (atonia primarum viarum, Dyspepsi, Flatulents, serophulosis, intermittens, hysteria).

Dosis: 30-50-100 ctgrm. Piller eller Opløsning; constituens & adjuvens til Piller.

M. salina febrif. n. fr. v. Pil. tonico-nerv. 40.

Extractum chinæ calisayæ,

extractum chinæ spirituosum D. 50,

Konge-China-Extrakt, opløses let i Vand.

Virkning: som cort. chinæ calisayæ, men indeholder meget mindre af Alkaloiderne og er kostbart.

Dosis: 30-60-100 ctgrm. som Pulver, Piller eller Opløsning.

Extractum colocynthidis,
extractum colocynthidum D. 50,

Koloqvint-Extrakt.

Virkning: som fructus colocynthid.

Dosis: (Maximaldosis 10 ctgrm.) 3-5-10 ctgrm. pro
dosi 2-3-4 Gange daglig, bedst som Piller.

Pil. laxantes n. c. Pil. aloet. cum. coloc. A. S. 69.
Pil. colocynth. n. fr. B. Pil. aloet. mart. fort. A. S. Lin.
hydragogum n. fr. B. Lin. lax. A. S.

Extractum conii,
extractum conii maculati D. 50,

Skarntyde-Extrakt.

Virkning: som hb. conii.

Dosis: (Maximaldosis 30 ctgrm.) 3-5-10 ctgrm. <
15-20-30 ctgrm. Pulver, Piller med plv. hb. conii, eller Op-
løsning; udvortes til Salve 1 D.-9 D. Fedt.

Pil. conii mac. 40. Pil. narcoticæ 40. Pil. arsenici
jodati n. c. Med. Pil. resolventes 40 & n. fr. v. Pil. res. c.
aloe 40 & n. fr. v. Pil. pectorales 40 & n. fr. v. Dec.
chinæ cum cicut. n. c. Med. Pil. antarthr. 50.

Extractum cubebæ,
(loco extracti cubearum ætherei D. 50),

Kubebe-Extrakt.

Virkning: som fructus cubebæ.

Dosis: 60-90-120 ctgrm. bedst som Piller med fr.
cub. plv. som constituens.

Capsulæ cum bals. copaivæ & extr. cubebæ.

Extractum gentianæ,

Enzian-Extrakt.

Virkning: som radix gentianæ.

Dosis: 30-60-100 ctgrm. Piller eller Opløsning i aromatisk Vand, Vinaand eller Vin, constituens for Piller.

Tr. aperiens amara n. fr. v. Pil. Winslowii n. c. Pil. aloes comp. 40.

Extractum glycyrrhizæ,

succus glycyrrhizæ depuratus, extractum liqviritiæ D. 50,
Lakrits-Extrakt.

Virkning: Constituens for Piller, corrigens for Salte (chloretum ammonicum) i Mixturer.

Extr. glyc. ep. M. salina dulcis n. fr. B. & A. S. 69.
M. nitr. dule. A. S. M. salina dulcis M. 69.

Extractum glycyrrhizæ compositum,

succus glycyrrhizæ compositus D. 50,
Engelsk-Lakrits.

Virkning: Demulcens, involvens (catarrhus pulmonum).

Dosis: efter Behag.

Extractum glycyrrhizæ crudum,

succus glycyrrhizæ s. liqviritiæ D. 50,
Lakrits.

Virkning og Brug som extractum glycyrrhizæ, der dog er at foretrække som langt renere.

Extr. glycyrrhizæ.

Extractum graminis,

Græsrod-Extrakt.

Virkning: som rhizoma graminis.

Dosis: 30-60-120 ctgrm.; den sættes til Mixturer, men

anvendes dog mest som constituens for Piller; den har almindelig Extrakts Consistens.

Ext. graminis liqv.

Extractum graminis liquidum,

mellago graminis D. 50,

tynd Græsrod-Extrakt.

Dosis: 15-30 gramm. de die (15 gramm. til 200 gramm. Vand, hvoraf en Spiseskefuld ad Gangen) mod chron. Leversygdomme ofte sammen med extr. taraxaci liq.; dog anvendes nu istedetfor i Almindelighed forskjellige Mineralvande; den har Syrups Consistens og maa ei forskrives i for stor Mængde om Sommeren, da den let gaaer over i sur Gjæring.

Extractum hyoseyami,

Bulmeblade-Extrakt.

Virkning: som fol. hyoseyami (Hoste, Cardialgi).

Dosis: (Maximaldosis 20 etgrm.) 3-5-20 etgrm. som Pulver med sacch. lactis som constituens, Piller (med plv. fol. hyosc.) eller i em. amygdalarum.

Pulv. antipyroticus n. fr. B. Pulv. expectorans comp. n. c. Pulv. magist. bism. n. c. Ch. Pil. anticardialgiæ n. fr. B. Ung. cerussæ comp. n. c. Ch.

Extractum menyanthis,

Bukkeblade-Extrakt.

Virkning: som fol. menyanthis; anvendes som constituens og adjuvans for Piller.

Dosis: 30-100 etgrm. Piller eller Mixtur.

Liq. menyanthis acidus.

Extractum mezerei,

Kjælderhals-Extrakt.

Virkning: som cortex mezerei; kun udvortes.

Dosis: 50-150 ctgrm. til 25 gramm. Fedt som irriterende Salve til at holde Spanskflue-Saar aabne med, naar Cantharidinens Indvirkning paa Urinveien skal undgaaes.

Ung. mezeræi 40.

Extractum nucis vomicæ,

extractum nucum vomicarum D. 50,

Rævekage-Extrakt.

Virkning: som semen. nuc. vom.

Dosis: (Maximaldosis 15 ctgrm.) 1-3-5-10-15 ctgrm. Pulver med sacch. lactis som constituens eller Piller.

Pil. nucis vom. n. fr. B. & A. S. 69. Pil. extr. nucis vom. n. fr. T. & A. S. 69. Pil. aloet. mart. fort. A. S.

Extractum pomi ferratum,

extractum ferri pomatum D. 50,

æblesurt Jern-Extrakt.

Virkning: Tonicum, roborans; mildt Jernpræparat (chlorosis, anæmia, rachitis, dyspeptiske Affectioner).

Dosis: 30-50 ctgrm. i Piller med r. glycyrrh. eller Opløsning som tr. pomi ferr.

Undgaa at tilsætte Syrer, Alkalier, de fleste Salte, Tannin. Tinct. pomi ferr.

Extractum quassiaë,

Qvassie-Extrakt.

Virkning: som lignum quassiaë.

Dosis: 30-50 ctgrm. Piller eller Opløsning.

Extractum ratanhæ,

Ratanhie-Extrakt.

Virkning: som radix ratanhæ.

Dosis: 30-60-100 etgrm. i Piller eller Opløsning (aq. cinnamomi spir. eller dec. rad. ratanhæ); udvortes, hvortil dog dec. rad. rat. er mindre kostbart, til gargarisma 10 gramm. til 250 gramm. inf. salviæ; linctus (5 gramm., aq. dest. 10 gramm., mel. rosæ 30 gramm.); til Injection 1 D.-10 D. Vand.

Extractum rhei,

extractum rhabarbari D. 50,

Rhabarber-Extrakt.

Virkning: Tonico-digestivum; som laxans i 2-3 Gange saa stor Dosis som rad. rhei og derfor sjelden anvendt som saadant.

Dosis: i refract Dosis 5-30 etgrm.; fuld Dosis 30-60 etgrm. eller mere i Piller eller Opløsning (aq. foeniculi).

Ext. rhei jalap. Pil. aloet. c. rheo A. S. 69. Pil. aloet. cum. coloc. A. S. 69.

Extractum rhei jalapinum,

extractum rhei compositum D. 50,

Rhabarber-Extrakt med Jalape.

Virkning: laxans.

Dosis: 30-60 etgr. pro dosi 2-3 die som Piller (10 gramm. f. l. a. pil. Nr. 80. D. s. 2-3-5 ad Gangen).

Extractum secalis cornuti,

Meldrøie-Extrakt.

Virkning: Hæmostaticum, ecibolicum.

Dosis: (Maximaldosis 30 etgrm.) 5-15-30 etgrm. <

30-60 ctgrm. pro dosi 2-4 de die eller oftere i farlige Blødninger; i Opløsning (2-3 gramm. i aq. d. 120 gramm., syr. aurantii 30 gramm. m. d. s. en Spiseskefuld hver 2den Time i metrorrhagia) eller Piller med rad. glyc. (Extr. sec., acid. gallot. āa 5 gramm., opii plv. 1 gramm. f. l. a. pil. Nr. 80 i hæmoptysis, hæmaturia); udvortes 1 D. til 4 D. Vand til blodstillende Injectioner og Omslag.

Pil. contra spermatorrhoeam A. S. Solut. sec. corn. n. fr. T.

Extractum stramonii,

Pigæbleblade-Extrakt.

Virkning: Sedativum (ischias, rheumatisk Neuralgi, Asthma).

Dosis: (Maximaldosis 15 ctgrm.) 3-5-10 ctgrm. som Pulver med saccharum lactis som constituens eller Piller.

Pulv. stramonii n. fr. B.

Extractum taraxaci,

Løvetand-Extrakt.

Virkning: mest som constituens for Piller.

Dosis: 30-60-120 ctgrm.

Ext. taraxaci liq.

Extractum taraxaci liquidum,

tynd Løvetand-Extrakt.

Virkning: Amaro-solvens (chroniske Leversygdomme, Gulsot, Hæmorrhoider, hydrops, atonisk Dyspepsi med Forstoppelse).

Dosis: 15-30 gramm. de die ofte med extr. gramin. (15 gramm.-200 gramm. aq. arom., hvoraf en Spiseskefuld 4 Gange daglig); nu anvendes hyppigt istedetfor forskjellige Mineralvande.

Farina hordei præparata,

Brystmel.

Virkning: Nutriens, roborans (atrophia infantilis, Hektik).

Dosis: 5-10-15 gramm. røres ud med lidt koldt Vand og gives derpaa et Opkog med 500 gramm. Mælk eller Kjødsuppe.

Ferrum pulveratum,

pulveriseret Jern.

Virkning: Tonicum, roborans, antidotum (chlorosis, anæmia, serophulosis, cardialgia; Forgiftning med Kobber-, Bly- og Qvægsølsalte).

Dosis: 10-30-50 ctgrm. 2-3 de die i Piller med extr. gentianæ eller trochisci med pasta cacao (ferr. plv. 10 gramm., pastæ cacao sacch. 90 gramm. f. troch. Nr. 100; Nr. 1 = 10 ctgrm.), eller Pulver; som antidotum theskefuldvis i Pulverform.

Undgaa at tilsætte Syrer, Bly-, Zink-, Kobber- og Qvægsølsalte.

Ferrum reductum,

reduceret Jern.

Virkning: Tonicum, roborans; det smager ikke blækagtigt og opløses lettere i Mave end ferrum pulv., men er meget dyrere (chlorosis, anæmia, anæmiske Neuroser etc.).

Dosis: 5-10-20 ctgrm. som Pulver, Piller med extr. gentianæ, trochisci (5 gramm. med pasta cacao sacch. 70 gramm. f. trochisci Nr. 100; Nr. 1 = 5 ctgrm.).

Undgaa at tilsætte Syrer, Bly-, Zink-, Kobber- og Qvægsølsalte.

Flores arnicæ,

Arnikablomster.

Virkning: Excitans, nervinum; udvortes adstringens,

discutiens (Typhus ved truende Collaps, pneumonia adynamica, Exsudat i Hjernen efter Betændelse og Commotion; i emollitio cerebri, Extravasat i Hjernen, efter at Indicationen for Antiphlogose, hvor den er tilstede, er fyldestgjort; udvortes Contusioner, truende Gangræn).

Dosis: 10 gramm. til 220 gramm. Infus med 30 gramm. syr. althææ eller muc. gummi ar.; udvortes til Fomentation et Infus af 1 D. til 8-10 D., som benyttes varmt.

Tr. arnicæ. Inf. arnicæ n. fr. B. Inf. tonico-nerv. n. fr. T. Inf. arnicæ M. 69. Inf. val. ep. s. ton.-nerv. M. 69.

Flores caryophylli,

caryophylli D. 50,

Nelliker.

Virkning: Carminativum (dyspepsia atonica & torpida, Flatulents, Tungelamhed).

Dosis: 30-50 ctgrm. Pulver eller Piller; corrigens for drastica og amara; udvortes som Tyggemiddel.

Mass. pilul. de cynoglosso. Tr. lavandulæ rubra. Tr. arom. Tr. arom. acida. Vin. theb. croc.

Flores chamomillæ romanæ,

Romerske Chamilleblomster.

Virkning og Brug som fl. cham. vlg.; men, da de lettere bevirke Qvalme og Brækning, bruges de kun sjældent.

Spec. antihyst. n. fr. B. Spec. antihyst. eum cortice n. fr. B. Spec. antihyst. eum senna n. fr. B.

Flores chamomillæ vulgaris,

Chamilleblomster.

Virkning: Carminativum, diaphoreticum, antispasmodicum; udvortes discutiens (Flatulents, Kolik, krampagtig Menstruation, krampagtige Veer og Efterveer, Nervetilfælde hos Svangre, Fødende og Hysteriske, hemicrania, catarrhalsk Diarrhe).

Dosis: 10-15 gramm. infunderes med 3 smaa Kopper kogende Vand; drikkes som kold The; men, naar den lages varm og rigeligt, virker den diaphoretisk; til Fomentation 1 D.-5 D. Infus; Klyster af 30 gramm. til 120 gramm. infus. mod Kolik, meteorismus; til et Bad 500-1000 gramm.

Aq. chamomillæ. Extr. chamomillæ. Spec. resolv. Spec. pro cat. emoll. Thea carminativa n. fr. v. Inf. chamomillæ M. 69. Spec. res. M. 69.

Flores cinæ,

semina cynæ s. santonici levantica D. 50,
Ormefrø.

Virkning: Anthelminthicum (ascaris lumbricoides, oxyuris vermicularis).

Dosis: 1 Thesefuld til Voxne i Substans eller bedre i Pulver; til Børn efter Alderen 0,5-1-2 gramm. 2-3 Gange de die som Pulver (rørt ud i Sirup, Honning), electarium (5 gramm. med tub. jalapæ plv. 1 gramm., syr. sacchari 15 gramm. m. d. s. 1 Thesefuld 2 Gange de die) eller Decoct, med Tilsætning af carb. natriæ, hvorved det i Vand opløselige santonsure Natron dannes, der er et kraftigt anthelminthicum; mindre hensigtsmæssigt er Infuset.

Confectio cinæ. Plv. cinæ ferratus. Santoninum. Inf. vermifugum n. fr. B. & A. S. 69. Inf. vermif. mart. A. S. Pulv. vermifugus n. c. Ch. Elect. anthelm. 50. Inf. vermifug. M. 69.

Flores kusso,

Kussoblomster.

Virkning: Anthelminthicum (tænia).

Dosis: 30 gramm. af de frisk stødte Blomster macereres og udrøres med den tilstrækkelige Mængde Vand og lidt Cognac og tages om Morgenen efter Kaffen i 2 Indgifter med $\frac{1}{2}$ Times Melletrum; kommer der da efter 4 Timers Forløb ingen Stolgang, tages inf. sennæ eller ol. ricini. Som Forberedelsescur nydes Dagen forud kun Kjødsuppe og Kjød, Sildesalat med Skinke, Løg, og aldeles ingen Melspiser.

Flores lavandulæ,

Lavendelblomster.

Virkning: Excitans til udvortes Brug (Contusioner, Sugillationer, Distorsioner, rheumatiske Affectioner og Lamheder).

Spec. resolv. Spir. lav. Tr. lav. rubra. Thea arnicæ n. fr. v. Ung. nervin. Spir. vulnerarius.

Flores rhoeados,

flores papaveris rhoeados D. 50,

Kornvalmueblade.

Virkning: Colorans.

Syr. rhoeados.

Flores rosæ centifoliæ,

flores rosarum incarnatarum s. pallidarum D. 50,

blegrøde Rosenblade.

Virkning: Odoriferum; til pharmaceutisk Brug.

Aq. rosæ. Conserva rosarum 50.

Flores rosæ gallicæ,

mørkerøde Rosenblade.

Virkning: Colorans, mildt adstringens. Infusum rosæ acidulum ph. succ. (ac. sulph. dil. 2 gramm., petal. rosæ gall. 3 gramm., sacch. 8 gramm. til 200 gramm. inf.) er et elegant Vehikel for sulphas magnesicus, natricus, aluminico-kalicus; ligeledes for sulphas chinicus med Tilsætning af en Smule Spiritus.

Mel. rosæ. Dec. adstr. A. S.

Flores sambuci,

Hyldeblomster.

Virkning: Excitans, diaphoreticum; udvortes resolvens (lette catarrhalske Affectioner).

Dosis: 10-20 gramm til 2-3 smaa Kopper kogende Vand, drikkes som varm The; udvortes som Infus med Vand eller Mælk til gargarisma ved abscessus tonsillæ for at fremskynde Maturationen, gingivitis, pharyngitis acuta.

Aq. sambuci Spec. pro thea pect. Spec. pro cat. emoll. Spec. resolv. Thea sambuci n. fr. v. Spec. pro thea St. Germain. Garg. pip. M. 69. Inf. samb. M. 69. Spec. res. M. 69. Spec. pro thea pect. M. 69.

Flores tanacetii,

Regnfangblomster.

Virkning: Anthelminthicum af tvivlsom Værd og derfor nu meget sjældent anvendt (ascaris lumbricoides, oxyuris vermicularis).

Dosis: 1-2 gramm. i Pulver, electuarium med Honning, Infus af 15-20 gramm. til 150 gramm. col. m. d. s. 1-2 Spiseskefulde pro dosi (allid med Tilsætning af cathartica); til Klyster et Infus af 1 D.-4 D. col.

Pulv. vermifugus 50.

Flores tiliaë,

Lindeblomster.

Virkning: Diaphoreticum (lette catarrhalske og rheumatiske Affectioner, acute Exantherer).

Dosis: 10-20 gramm. til 2-3 smaa Kopper kogende Vand; drikkes som The lunken eller kold; inf. fl. tiliaë er bedre end aq. tiliaë, fordi dette ikke holder sig godt.

Aq. tiliaë.

Flores verbasci,

Kongelysblomster.

Virkning: Demulcens, mildt diaphoreticum og expectorans (catarrhalske Affectioner).

Dosis: 5-10 gramm. til 2-3 Kopper kogende Vand, der sies gennem en linned Klud, drikkes som The.

Species pro thea pect.

Folia belladonnæ,

Belladonnablade.

Virkning: Sedativum, antispasmodicum, mydriaticum (Neuralgi, Krampe, Kighoste, Asthma (røget i Pibe sammen med folia stramonii), Cardialgi, den Form af enuresis nocturna, som beroer paa for stærk Virkning af detrusor urinæ, pollutiones nocturnæ, spastisk Strictur af orificium uteri, urethra, rectum, Nyrecolik, Ischuri, chorea, Epilepsi).

Dosis: (Maximaldosis 30 etgrm.) 3-5-10 < 30 etgrm. pro dosi som Pulver, Piller; dog foretrækker man nu til indvendig Brug radix bell., extr. bellad. eller sulphas atropicus; advortes til Injectioner 10-20 gramm. til 300 gramm. Infus; til Fomentation et Infus af 20-30 gramm. til 300 gramm. col. (mod Ømtaalighed af Øinene, serophuløs Photophobi; galactorrhoea).

Extr. belladonnæ. Spec. narcoticæ 40. Pulv. zinci cum

belladonna n. fr. B. Troch. zinci cum bell. A. S. 69. Inf.
belladonna pro clysmate A. S. Spec. narcoticæ M. 69.
Troch. bell. A. S. 69.

Undgaa at tilsætte stærke Syrer, kaustiske Alkalier,
opløselige Metallsalte, Tannin.

Folia bucco,

Bucco-Blade.

Virkning: Diureticum; anvendes omtrent efter de
samme Indicationer som den i lignende Hensigt brugte uva
ursi (chronisk Blærecatarrh).

Dosis: 1 D. til 10 D. Infus, hvoraf 1 Spiseskefuld
hver anden Time.

Folia cardui benedicti,

Korbendiktblade.

Virkning: Tonicum, roborans, omtrent som fol. meny-
anthis (chronisk Lidelse af Fordøjelsen og Ernæringen, Re-
convalescents efter Koldfeber).

Dosis: Blandet med fol. meny-anthis som The, dog
mest som tr. amara.

Tr. amara.

Folia digitalis,

Fingerbølleblade.

Virkning: Diureticum, sedativum, antifebrile (ved at
førmindske Pulsens Hyppighed og Organismens Varmegrad);
i den nyere Tid som odyagogum til at fremkalde Veer;
udvortes resolvens (mb. cordis, overalt hvor det gjælder om
at stimulere eller regulere den sunkne eller uregelmæssige
Hjertevirksomhed, aneurysma aortæ, hæmoptysis, hydrops (med
bulb. scillæ, bitartr. kalicus, acet. kal.), pneumonia, endocar-

ditis, pericarditis, pleuritis, delirium tremens, metrorrhagia; udvortes mod chroniske Kirtelindurationer, mastitis, orchitis, parotitis, ligesom et Infus er blevet brugt til Fomentation i Nyreeggen som diureticum).

Dosis: (Maximaldosis 30 ctgrm.) 3-5-10 < 20-30 ctgrm. som Pulver, Piller (pil. hydragogæ Heimii er $\bar{a}\bar{a}$ 1 gramm. fol. dig., bulb. scillæ, gi-res, guttæ, sulphid. stib. med extr. cham. q. s. ut f. pil. 40 D. s. 2-3 pro dosi 3 Gange d. d.) eller Infus (2 gramm. - 200 gramm.) 3-4 Gange de die i 3-4 Dage med stadigt Hensyn til Midlets cumulative Virkning; udvortes Infus (1 D. - 5 D.) til Fomentation; Salve 1 D. - 5 D. Fedt.

Undgaa at tilsætte stærke Syrer, Alkalier, Tannin.

Inf. digitalis. Tr. digit. Tr. dig. æth. Tr. dig. rubra. Inf. dig. n. fr. B. Inf. dig. comp. n. c. Ch. Inf. dig. cum nitro n. fr. T. Pulv. calomell. cum dig. n. fr. B. Pulv. alter. cum dig. n. fr. B. Plv. alt. cum. dig. & scilla A. S. Plv. diureticus A. S. Plv. aconiti cum dig. n. fr. B. Plv. saturnino-dig. n. fr. B. Pil. diureticæ A. S. 69. Trochisci digitalis A. S. 69. Vinum diuret. A. S. 69. Inf. digitalis. M. 69.

Folia farfaræ, folia tussilaginis,

Hestehovblade.

Virkning: Demulcens.

Dosis: 15-30 gramm. til 250 gramm. Decoet eller Infus.

Species pro thea pectorali.

Folia hyoseyami,

Bulmeurtblade.

Virkning: Sedativum, anodynum, antispasmodicum (Hoste, Kolik, Menstrualkolik, Cardialgi, Dysuri; udvortes car-

cinoma, smertefulde Svulster, Saar og Abscesser, serophuløs Photophobi).

Dosis: (Maximaldosis 40 etgrm.) 5-10-30 etgrm. Pulver, Piller; men man foretrækker at anvende extr. hyoseyami; udvortes til Fomentation et Infus af 1-1 $\frac{1}{2}$ D. til 15 D., til Injection i Blæren 1 D. til 30 D. col.; til Klyster 1-2 gramm. til 120 gramm. inf.

Undgaa at tilsætte Chlor, Brom, Jod, Alkalier, Tannin.

Extr. hyoseyami. Ol. hyosc. inf. Spec. narcoticæ 40 & A. S. 69. Empl. hyoseyami 50. Spec. narcoticæ M. 69.

Folia melissæ,

folia melissæ citratæ D. 50,

Melisseblade.

Virkning: Carminativum, antispasmodicum, analepticum (hysteria, vomitus, Kolik).

Dosis: 15-20 gramm. infunderes med 2-3 smaa Kopper kogende Vand; drikkes som The.

Spec. resolventes. Aqva melissæ 50.

Folia menthæ crispæ,

Krusemynteblade.

Virkning: se fol. menth. p.

Aq. menthæ crispæ.

Folia menthæ piperitæ,

Pebermynteblade.

Virkning: Carminativum, analepticum, antispasmodicum (dyspepsia torpida, Flatulents, Kolik, Cardialgi, Nausea, Hysteri).

Dosis: 15-20 gramm. infunderes med 2-3 smaa Kopper kogende Vand; drikkes som The; udvortes til Fomentation.

Aqua. m. p. Rotulæ m. p. Spec. resolv. Spir. vulnerrarius. Thea carminativa n. fr. v. Spec. carm. ph. 28. Spec. stom. extr. 40. Inf. menth. pip. M. 69. Spec. resolv. M. 69

Folia menyanthis,

folia trifolii fibrini D. 50,

Bukkeblade.

Virkning: Amaro-tonicum (chronisk Lidelse af Fordøjelsen og Ernæringen, i Reconvalentsen efter Koldfeber).

Dosis: 7-15 gramm. til et Infus af 150 gramm. col.; drikkes koldt.

Extr. menyanthis. Tr. men. Spec. pro thea amara. Thea amara n. c. Inf. mundificans n. c. Ch. Spec. pro thea amara M. 69.

Folia nicotianæ,

Tobaksblade.

Virkning: Antispasmodicum; kun udvortes, og her næsten ganske fortrængt af Chloroform (hernia incarcerata, ileus, volvulus, obstipatio saturnina); til Klyster et Infus af 0,5-1-1,5 gramm. til 120 gramm. col., eller ogsaa gives det af Tobaksrøg; Vadsknng og Fomentation med Infuset er farlig, især i chroniske Hudsygdomme.

Inf. nicotianæ pro clysmate n. fr. B.

Folia salviæ,

Salvieblade.

Virkning: Adstringens (hektisk Sved, til Indskrænkning af Mælkesecretionen efter Afvænningsen, hvor denne Indication i sjeldne Tilfælde er tilstede, galactorrhoea (men til den indvendige Brug anvendes nu ofte istedetfor ac. gallotannicum); angina).

Dosis: 15-30 gramm. infunderes med 2-3 smaa

Kopper kogende Vand; drikkes koldt som The, $\frac{1}{2}$ Kop (3: 60-75 gramm.) ad Gangen; udvortes Infuset (30 gramm. til 250 gramm.) til Gurglevand, Fomentation, Injection.

Folia sennæ,

folia sennæ alexandrinæ D. 50,

Sennesblade.

Virkning: Aperiens, purgans; naar de ere harpixfri, virke de temmelig mildt og sikkert og passe derfor til Kvinder og Børn.

Dosis: Som aperiens 0,5-1 gramm. 2-3 de die; som purgans 2-4 gramm. paa eengang i Pulver eller Halvdelen af et Infus af 7-15 gramm. (til 250 gramm) ad Gangen; man forstærker Virkningen ved Tilsætning af sulphas natrius, tartaras natr.-kal. og manna; som corrigens tilsættes rhiz. zingib., fruct. carvi & coriandri., acid. tartar.

Undgaa at tilsætte de ætsende og kulsure Alkalier, Kalkvand, opløselige Metalsalte, Tannin.

Elect. e senna mann. Inf. sennæ comp. Syr. sennæ mann. Fructus vitis sennal. Spec. pro thea amara. Thea qvass. c. senna n. fr. T. Spec. antih. c. senna n. fr. B. Plv. anticolicus n. fr. v. Plv. liqv. comp. A. S. 69. Inf. sennæ simpl. M. 69. Inf. sennæ cum sulph. magn. M. 69. Inf. sennæ cum sulph. natr. M. 69. Spec. pro thea amara M. 69.

Folia sennæ spiritu extracta,

harpixfri Sennesblade, smage mindre ubehageligt end fol. sennæ.

Spec. pro thea St. Germain.

Folia stramonii,

Pigæbleblade.

Virkning: Sedativum, antispasmodium (asthma, ischias).

Dosis: (Maximaldosis 30 ctgrm.) 3-5-10-20 ctgrm.; men til indvendig Brug foretrækkes extr. stram.; udvortes er Virkningen og Brugen som af fol. bellad. Imod Asthma røges i Pibe eller Cigaretter fol. str. conc. 0,5-1 gramm. med Forsigtighed under Anfaldet; undertiden blandes de hertil med lige Dele fol. bellad. og hyosecyami.

Extractum stramonii.

Folia uvæ ursi,

Melbærblade.

Virkning: Tonicum, adstringens (chronisk Bryst- og Blærecatarrh, Hæmaturi).

Dosis: Bedst 15-30 gramm. til 250 gramm. Decoct (med syr. zingib.); Pulverformen ei god; i Thespecies sammen med de som diuretica ansete folia bucco og radix pareiræ bravæ åå, hvoraf 1 Spiseskefuld til hver Kop The; den tages 3 Gange d. d.; udvortes til Injectioner.

Undgaa at tilsætte Bly-, Jern-, Sølvsalte.

Dec. fol. uvæ ursi c. lich. isl. n. fr. T. Dec. uvæ ursi comp. n. fr. B. & A. S. 69. Thea demulc. comp. n. e. Ch. Pulv. fol. uvæ ursi dulcis n. fr. T. Dec. uvæ ursi M. 69. Dec. uvæ ursi cp. M. 69.

Fructus anisi,

semina anisi vulgaris D. 50,

Anis.

Virkning: Carminativum, expectorans, galacticum? (Flatulents, Kolik, for ringe Mælkeafsondring), corrigens især for Senna, Rhabarber, Jalaperod.

Dosis: 0,5-2 gramm. Pulver; Infus (7-15 gramm. med 2-3 Kopper Vand).

Tr. amara. Tr. colocynth. comp. Spec. pro thea St. Germain. Thea sambuci n. fr. v. Thea juniperina n. fr. v.

Fructus anisi stellati,

semina anisi stellati D. 50,

Stjerneanis.

Virkning: som fructus anisi.

Dosis: 0,5-1-2 gramm. som Pulver; eller som The (7-15 gramm. infunderes med 2 à 3 smaa Kopper kogende Mælk eller Vand og sies).

Spec. pro thea pectorali.

Fructus aurantii immaturus,

poma aurantium immatura D. 50,

umodne Pommeranser.

Virkning: Aromatico-tonicum; corrigens for amara; udvortes i Fontaneller istedetfor Ærter.

Tr. amara.

Fructus avenæ excorticatus,

Havregryn.

Virkning: Demuleens, nutriens.

Dosis: 15-30 gramm. til 500 gramm. Decoct, som tages en Kop ad Gangen; udvortes til Havregrødsomslag, og Decoctet til Fomentation i eezema, som oftest blandet med Blyvand ää.

Fructus cannabis,

semina cannabis D. 50,

Hampefrø.

Virkning: Demulcens (Stranguri, cystitis chr.).

Dosis: 30 gramm. til 200 gramm. Emulsion med Til-

sætning af syr. sacchari 20 gramm.; den smager ubehageligt, men er billigere end em. amygdal; udvortes til Omslag.

Thea demulcens n. fr. v. Spec. pro thea dem. M. 69.

Fructus capsici,

spansk Peber.

Virkning: Irritans, sialagogum (torpid Dyspepsi, Lamhed af Tunge og Svælg, putride Saar i Svælg og angina i Almindelighed).

Dosis: 5-15 ctgrm. Pulver eller bedst i Piller; udvortes til Gurglevand et Infus af 2 gramm. - 200 gramm. eol. eller gtt. 30 - 40 tinctura capsici til 250 gramm. aq. d.; Tyggemiddel i Tungelamhed.

Pil. Beddoes 40. Garg. pip. M. 69.

Fructus cardamomi,

cardamomum minus D. 50,

Malabar-Kardamome.

Virkning: Carminativum (Dyspepsi, Flatulents, Kolik), corrigens for purgantia & adstringentia.

Dosis: 30-50 ctgrm. Pulver eller Piller.

Tr. aromatica. Tr. aromatica acida. Vinum rhei. Plv. aromaticus 40.

Fructus carvi,

semina carvi D. 50,

Kommen.

Virkning: Carminativum, godt og billigt (Dyspepsi, Flatulents, Kolik).

Dosis: 0,5-1-2 gramm. Pulver, Piller; corrigens for purgantia og amara.

Spec. carminativæ 28.

Fructus citri,

poma citri D. 50,

Citroner.

Virkning: den udpressede Saft, succus citri, som acidum citricum; refrigerans, antisepticum (rheumatismus art. acutus, Skjørbug).

Dosis: succus citri spiseskefuldvis, fortyndet med Vand og Sukker.

Julap. salin. n. fr. v.

Fructus colocynthidis,

colocynthides D. 50,

Coloqvinter.

Virkning: Excitans, aperiens, drasticum, hydragogum (habituel Forstoppelse i chron. Leversygdomme, Hjernesygdomme, Hydrops, Blærelamhed, Paraplegi).

Dosis: (Maximaldosis 40 ctgrm.). Som excitans i refract Dosis 1-2-5 ctgrm.; som aperiens 10-20-30 ctgrm. pro dosi 2-3 de die; som drasticum 30-40-60 ctgrm. pro dosi flere Gange de die; gives i Decoet, men extr. og tr. ere mere anvendte.

Extr. colocynthidis. Tr. coloc. comp. Dec. colocynth. n. fr. B. & n. c. Med.

Fructus coriandri,

semina coriandri D. 50,

Koriander.

Virkning: Carminativum, corrigens for purgantia, især fol. sennæ.

Inf. sennæ comp. Spec. stomachicæ int. 40.

Fructus cubebæ,

cubebæ s. piper caudatum D. 50,

Kubeber.

Virkning: Carminativum, anvendes dog mest som antigonorrhoeicum.

Dosis: 1-2-3 gramm. 3-4 de die, Pulver, Piller.

Tr. lavandulæ rubra. Pil. antigonorrh. A. S. 69. Boli ad modum Velpeau n. c. Plv. cubebæ cum alumine n. c. Ch. Extr. cubebæ.

Fructus foeniculi,

semina foeniculi D. 50,

Fennikelfrø.

Virkning: Carminativum, expectorans, galacticum (Dyspepsi, Flatulents, Brystcatarrh, for ringe Mælkeafsondring).

Dosis: 60 ctgrm. til 100-200 ctgrm. som Pulver; 7-15 gramm infunderes med 2-4 smaa Kopper kogende Vand.

Aqva foeniculi. Syr. sennæ mannatus. Species pro thea demulc. Spec. pro thea St. Germain. Spec. pro dec. lignorum. Thea arnicæ n. fr. v. Thea carminativa n. fr. v. Pulv. galactopoeus 40. Pulv. liqv. comp. A. S. 69.

Fructus juniperi,

baccæ juniperi D. 50,

Enebær.

Virkning: Carminativum, diureticum (hydrops, chroniske Affectioner af Urinveiene).

Dosis: 15-30 gramm. infunderes med 2-3 smaa Kopper kogende Vand; udvortes til Fumigation.

Spec. pro thea amara. Thea amara n. c. Inf. mundificans n. c. Ch. Thea juniperina n. fr. v. Vinum diur. A. S. 69. Plv. pro suffitu n. fr. v. Spir. juniperi 50. Succus jun. inspiss. 50. Spec. pro thea amara M. 69.

Fructus lauri,

baccæ lauri D. 50,

Laurbær.

Virkning: Excitans, carminativum (Dyspepsi, Flatulents, Kolik, Hysteri, Amenorrhoe).

Dosis: 30-60-100 etgrm. Pulver, Piller, eller 7-15 gramm. infunderes med 2-3 smaa Kopper kogende Vand.

Ungv. nervinum.

Fructus papaveris,

capita papaveris albi D. 50,

Valmuefrugter.

Virkningen er betinget af deres meget vexlende Morphindighed; den er kun meget ringe.

Dosis: 15-30 gramm. til 250 gramm. Decoet udvortes til Gurglevand, Fomentation, Injection og Klyster.

Syr. fructus papaveris.

Fructus petroselini,

semina petroselini D. 50,

Petersillefrø.

Virkning: Carminativum, diureticum.

Dosis: sjelden som Pulver; 7-15 gramm. infunderes med 2-3 smaa Kopper kogende Vand; men de anvendes dog mest som aq. petroselini.

Aqva petroselini.

Fructus phellandrii,

semina phellandrii D. 50,

Vandfennikelfrø.

Virkning: Carminativum, expectorans (catarrhus chronicus, blennorrhoea & phthisis pulmonum).

Dosis: Infus af 15-30 gramm. til 250 gramm. col.
Dec. phellandrii A. S.

Fructus tamarindi crudus,

tamarindi s. fructus tamarindorum D. 50,
raa Tamarinder.

Virkning: Refrigerans, laxans (Feber, Congestioner).

Dosis: Som refrigerans 30 gramm. til 375 gramm.
Decoet, ofte med 4 gramm. ac. sulph. dil. og 30 gramm.
syr. rubi idæi, som lædskende Feberdrik for en Dag; som
laxans Decoet af 60 gramm. - 200 gramm., hvoraf 1-2 Spise-
skefulde hver Time; i Regelen tilsætter man sulphas mag-
nesicus, natrieus, tartaras natrico-kalicius, manna etc.

Pulpa tamarindi.

Fructus vitis sennatus,

passulæ laxativæ D. 50,
Laxer-Korender.

Virkning: Laxans til Børn.

Dosis: 1 Theskefuld p. d.

Gallæ,

gallæ aleppenses D. 50,
Galæbler.

Virkning: Adstringens.

Dosis: Indvortes kun imod Forgiftning med opium,
Morphin, Blysalte, Brækvinsten som Decoet (15 gramm. til
250 gramm., hvoraf 2-3 Spiseskefulde p. d.); udvortes et
Decoet af 15-30 gramm. til 250 gramm. til Fomentation
(prolapsus ani & vaginæ) eller pulveriseret i Salve 1 D. til
8 à 10 D. Fedt.

Acidum gallotannicum.

Glandula lupuli,

Lupulin.

Virkning: Sedativum (smertefulde Erektioner, satyriasis, priapismus, nymphomania, hysterodynia, dysmenorrhoea, catarrhus vesicæ).

Dosis: 10-30-50 ctgrm. pro dosi 1-3 d. d. Pulver med saccharum som constituens, Piller (2 gramm. med extr. taraxaci 1 gramm. f. pil. 20 eller 3 gramm. med camph. 1 gramm., bals. tereb. ven. 6 gramm. f. pil. 100 hydrato-carb. magn. conspergendæ i catarrhus vesicæ).

Glycerinum,

Glycerin.

Virkning: Emolliens, demulcens; udvortes defendens, leniens, emolliens (catarrhalske Affectioner og Ulcerationer af Svælget og Struben; chroniske Hudsygdomme, Forbrændinger, Erosioner, sprukne Læber, Brystvorter og Hænder, Afskalning af Overhuden, Comedoner, Tørhed af Øregangen).

Dosis: Udvortes alene eller fortyndet med Olie, eller som ung. glycerini; den er et ypperligt Vehikel for de fleste Medikamenter til udvortes Brug.

Undgaa at tilsætte Chlor, Brom, stærke Syrer og Alkalier, navnlig kaustisk Kali.

Ung. glycerini. Collodium elasticum M. 69.

Gummi arabicum,

gummi mimosæ, gummi acaciæ D. 50,

arabisk Gummi.

Virkning: Demulcens, involvens; udvortes defendens, emolliens, hæmostaticum (Irritation af Digestions- og Respirationsorganerne, Forbrændinger, Excoriationer, Blødning efter Iglebid, tenesmus).

Dosis: 0,5-1-2 gramm. Pulver eller Opløsning (med em. amygdalarum) eller som muc. gi ar.; constituens for Pulvere, der vanskeligt udrøres i Vand (campher, moschus, calomel); emulgens for Olier, Harpixer og Balsamer.

Undgaa at tilsætte Alkalier, Spiritus, Æther, biboras natricus, basisk eddikesurt Blyilte og Jernsalte.

Extr. glycyrrh. comp. Mixt. alba. Mixt. alba M. 69. Muc. gi arabici. Pulv. obstipans n. fr. B. Plv. antirheum. n. fr. B. Plv. stypticus 50.

Gummi-resina ammoniacum,

ammoniacum s. gummi ammoniacum D. 50,

Ammoniakgummi.

Virkning: Expectorans, resolvens, diureticum, emmenagogum; udvortes irritans, derivans, resolvens, maturans (catarrhus chronicus, blennorrhoea pulmonis, emphysema pulmonis, asthma, mb. chron. hepatitis, atonisk hydrops, amenorrhoea); udvortes mod Kirtelsvulster, Furunkler, Abscesser.

Dosis: 30-60-100 ctgrm. Piller eller Emulsion.

Emuls. ammoniacalis 50 & A. S. 69. Pil. aper. c. marte 50. Pil. scilliticæ 50. Pil. antihystericae 40. Pil. resolv. 40. Pil. pector. 40. Pil. pector. cum kermete n. fr. v. Empl. giresinosum. E. manus dei. E. meliloti. E. galbani croceatum. Pil. purg. A. S. 69. Pil. resolv. A. S. 69. Emuls. ammoniacalis M. 69.

Gummi-resina asa foetida,

asa foetida D. 50,

Dyvelsdræk.

Virkning: Excitans, antispasmodicum, emmenagogum, anthelminthicum; udvortes irritans, derivans, resolvens (Hy-

steri, Flatulents, Cardialgi, Kolik, Amenorrhoe, Leucorrhoe, ascaris lumbricoides).

Dosis: 5-20-50 ctgrm. bedst i Piller, argento foliato obducendæ (med extr. gentianæ); corrigens er ætherol. menth. pip.; til Klyster 4-8 gramm. i Emulsion med inf. chamomillæ 60 gramm.

Tr. asæ foet. Pil. gummosæ 50. Pil. antihyst. 40. Pil. foetidæ 40. Pil. asæ foetidæ n. c. Pil. tonico-nervinæ 40. Pil. anthelminth n. fr. v. Empl. foetidum 50. Emuls. asæ foet. n. fr. T. Emuls. asæ foet. pro clysm. n. c. Emuls. asæ foet. ad clysm. M. 69.

Gummi-resina galbanum,

galbanum D. 50,

Galbanum.

Virkning: Excitans, emmenagogum; udvortes irritans, derivans, resolvens, maturans (Amenorrhoea, Hysteri; Furunkler, Abscesser, Kirtelsvulster).

Dosis: 30-60-100 ctgrm. Piller.

Pil. aper. c. marte 50. Pil. gummosæ 50. Pil. anti-hysterica 40. Pil. emmenagogæ A. S. 69. Empl. galb. croc. Empl. gi-resinosum. E. manus dei. Empl. oxycroceum 40.

Gummi-resina gutta,

gummi guttæ D. 50,

Gummigut.

Virkning: Drasticum, hydragogum (Forstoppelse, chronisk hydrops, tænia).

Dosis: (Maximaldosis 80 ctgrm.) 10-15 ctgrm. p. d. 2-3 de die, eller 30-60 ctgrm. paa een Gang, i Form af Pulver, Piller; dog gives den bedst opløst i Olie i Emulsion 25-40 ctgrm. i Døgnet (pil. hydragogæ Heimii er gi-res. guttæ,

fol. dig., bulb. scillæ, sulphid. stib. āā 1 gramm., ext. chamom. q. s. ut. f. pil. 40. d. s. 2-3 p. d. 3 Gange d. d.

Pil. purgantes ctr. tœniam A. S. Pil. purgantes A. S. 69.

Gunmi-resina myrrha,

myrrha D. 50,

Myrrha.

Virkning: Excitans, expectorans, emmenagogum; udvortes excitans, adstringens (catarrhus chr., blennorrhœa pulmonum, Hysteri, Amenorrhœe, Leucorrhœe; udvortes ved slet granulerende eller gangrænøse Saar, scorbutisk Tandkjød).

Dosis: 30-60-100 etgrm. Piller (gi-res. myrrhæ 8 gramm., bulb. scillæ 2 gramm., sulphid. stib. 1 gramm., opii plv. 50 etgrm., extr. glycyrrh. q. s. ut. f. pil. 100. D. s. 4-5 Piller 3 de die).

Mixt. ferri comp. Tr. myrrhæ. Liq. Clauderi. Mass. pilularum de cynoglosso. Pil. aperientes c. marte 50. Pil. antihyst. 40. Pil. Rufi 40. Pil. emmenagogæ A. S. Pil. emmenagogæ A. S. 69. Pil. ferri comp. A. S. 69. Pil. ctra leucorrhœam A. S. Pil. ctra spermatorrhœam A. S. Empl. manus dei. Pulv. dentifr. niger. Liq. myrrhæ 40. Mixt. ferri cp. M. 69.

Gummi-resina olibanum,

olibanum s. thus D. 50,

Virak.

Virkning: omtrent som Myrrha; anvendes næsten kun udvortes til vellugtende Røgelse; til deriverende Fumigationer ved gigtiske og rheumatiske Affectioner, Leddesvulster, Oedemer.

Species fumales. Empl. manus dei. Mass. pil. de cynoglosso.

Gutta percha,

Gutta Percha, til chirurgisk Brug; gutta percha ad dentes til Tandkit og til at komme i den hule Tand mod Tandpine

(guttæ perchæ ad dentes 5 gramm. calore emollitis admiscee opii plv., ætherol. caryophylli āā 10 etgrm., ac. gallotann. 60 etgrm.); opløst i Chloroform (Traumaticin) anvendes det som collodium og pensles som dette paa Huden som et dækkende, beskyttende Middel ved Excoriationer, betændelsesagtige og erysipelatøse Affectioner af Huden (p. 1 — chloroformi p. 8; tandem solutis adde chlorof. q. s., ut liqvor syrupicæ crassitudinis oriatur).

Hepar sulphuris,

kali sulphuratum, kalium sulphuratum D. 50,

Svovllever.

Virkning: til udvortes Brug mundans, irritans (Paralyse, chroniske Hudsygdomme, især squamøse og tuberculøse, chroniske Leddesvulster); med Syrer, til Udvikling af Svovlbrinte, sedativum og antitoxicum (rheumatiske Affectioner, Neuralgier, chroniske Hudsygdomme, forbundne med Hyperæsthesi, chronisk Bly- og Qvægsølvforgiftning).

Dosis: til Vadsugning 5-15-25 gramm. til 500 gramm. Vand; til et Bad 50-100 gramm., som i Forveien er opløst i Vand; eller 30-60 gramm., efterat der i Forveien er kommet 15-30 gramm. acidum sulph. crudum i Badet; i et saadant Bad vil man da faa Svovlbrinte udviklet.

Undgaa at tilsætte Metalsalte, Bly, Kobber, Sølv.

Herba absinthii,

herba cum summitatibus absinthii D. 50,

Malurt.

Virkning: Aromatico-tonicum, stomachicum, anthelminticum; udvortes discutiens (Dyspepsi, ascaris lumbricoides; erysipelas, oedema, oxyuris vermicularis).

Dosis: Infus af 7-15 gramm. til 200 gramm. col.;

det tilberedes med Vand eller Øl og bruges i Døgnet; almindeligt foretrækkes tinct.; udvortes til Klyster.

Extr. abs. Tr. absinthii. Tr. amara. Spec. resolv. Spir. vulnerarius. Plv. antichlorot. 40 & A. S. 69. Spec. resolv. M. 69. Ol. abs. coct 50.

Herba absinthii maritimi,

Strandmalurt.

Virkning: Anthelminthicum. Indeholder Santonin (Piper).

Dosis: Den skaarne Urt, blandet med almindelig Syrup, gives theskefuldvis til Børn som Folkemiddel mod Orm; hyppigere Infus af 15 gramm. til 200 gramm. Vand i Klyster.

Herba aconiti,

Stormhat.

Virkning: Anodynum, sedativum (Neuralgi, acut og især chronisk Rheumatisme, Gigt, Hjertesygdomme, hydrops).

Dosis: (Maximaldosis 30 ctgrm) 3-10-30 ctgrm. Pulver, Piller; man foretrækker til indvendig Brug extr. og tinct.

Undgaa at tilsætte stærke Syrer, kaustiske Alkalier, opløselige Metalsalte, Tannin, Chlor, Brom og Jod.

Extr. aconiti. Tinct. aconiti.

Herba conii,

herba conii maculati s. cicuta terrestris D. 50,

Skarntyde.

Virkning: Anodynum, sedativum, antispasmodicum; resolvens (Neuralgi, Prosopalgi, Photophobi, krampagtige Affectioner, Ansigtsskrampe, Cardialgi, Kighoste, Kirtelsvulst).

Dosis: (Maximaldosis 60 ctgrm.) 5-15-20 < 30-60 ctgrm. pro dosi Pulver, Piller; men til indvortes Brug foretrækkes extr. conii; udvortes Infus af 8-15-25 gramm. til 250 gramm. col. til Vadskning, Fomentation.

Undgaa at tilsætte Syrer, Alkalier, Metalsalte, Tannin.
 Empl. conii. Extr. conii. Pil. conii mac. 40. Inf. cicuta
 n. c. Inf. cicuta comp. n. c. Ch. Spec. narcotica 40 &
 A. S. 69. Inf. conii M. 69. Spec. narcotica M. 69.

Herba lobeliæ,

herba lobeliæ inflata D. 50,

Lobelia.

Virkning: Expectorans, antispasmodicum, sedativum
 (asthma).

Dosis: 15-30 etgrm. p. d. Pulver, Piller; men man
 foretrækker tr. lobeliæ.

Undgaa at tilsætte stærke Syrer, kaustiske Alkalier,
 Chlor, Brom, Jod.

Tr. lobeliæ.

Herba majoranæ,

Merian.

Virkning: Resolvens til udvortes Brug.

Ung. majoranæ. Ung. nervinum.

Herba malvæ,

folia malvæ D. 50,

Katost.

Virkning: Emolliens til udvortes Brug.

Dosis: Infus af 15-30 gramm. til 250 gramm. col. til

Mund- og Gurglevand.

Spec. pro catapl. emoll. Spec. pro thea dem. M. 69.

Spec. pro thea pect. M. 69.

Herba meliloti,

Meloten-Urt.

Virkning: Udvortes resolvens, maturans (Kirtelsvulster, Mælkekner).
 Erapl. meliloti. Spec. pro catapl. emoll.

Herba millefolii,

folia & flores millefolii D. 50,

Røllike.

Virkning: Aromatico-tonicum (atonisk Dyspepsi, Chlorose, Hysteri, Leucorrhoe, Amenorrhoe).

Dosis: 15-30 gramm. infunderes med 2 smaa Kopper kogende Vand; drikkes kold.

Spec. antihystericae n. fr. B. Spec. antihyst. c. cortice n. fr. B. Spec. antihyst. cum senna n. fr. B.

Herba origani,

herba origani vulgaris D. 50,

vild Merian.

Virkning: Resolvens til udvortes Brug.

Spec. resolv.

Herba veronicae,

Ærenpris.

Virkning: Mildt adstringens.

Spec. pro thea pectorali.

Herba violae tricoloris,

herba jaceae D. 50,

Stedmodersblomst.

Virkning: Diureticum (crusta lactea, serophuløse Hududslet hos Børn).

Dosis: et Infus (med Vand eller Mælk) eller Decoct af 10-15 gramm. til 200 gramm. col., at bruge i et Døgn; 30 gramm. til 250 gramm. Decoct til udvortes Brug til Vadskning, Fomentation.

Hirudo,

sangvisuga D. 50,

Blodigle.

Virkning: til local Blodudtømmelse; en Igle regnes for at give 15-30 gramm Blod, naar Efterblødningen regnes med; dog kommer det herved mest an paa Iglernes Størrelse.

Hydrargyrum,

hydrargyrum depuratum D. 50,

renset Qvægsølv. Til pharmaceutisk Brug.

Æthiops min. Chlor. hydrargyros. subl. Sol. nitr. hydrargyrosi. Oxydum hydrargyricum. Ungv. nitr. hydrargyrici. Jod. hydrarg. flav. Empl. hydrargyri. Ung. hydr. Pil. æthiopicæ 50.

Hydrargyrum venale,

mercurius vivus D. 50,

Qvægsølv. Til pharmaceutisk Brug.

Hydrargyrum.

Hydras kalicus,

kali causticum fusum, lapis causticus D. 50,

kaustisk Kali, Ætssten.

Virkning: Causticum; den lægges tør paa Huden i en Plasterkurv (til Anlæg af Fontaneller, til at aabne Buboner og kolde Abscesser hos frygtsomme Individuer eller paa farlige Steder, hvor man vil undgaa Anvendelsen af Kniven; Vorter, Condylomer, Fungositeter, Teleangiectasier,

forgiftede Saar); som et universelt virkende irritans (ved atoniske Saar, Efterdryppert, Leucorrhoe, Fistler, chroniske Hudsygdomme, især eezema chron., hvorimod den dog især anvendes i en caustisk Opløsning af 1 D. til 4 D. aq. d.); til et Bad 30 - 60 - 100 gramm.; til et Fodbad 10 - 15 gramm.; til Vadskning 5-15 gramm. til 500 gramm. Vand; til Fomentation 1-5 gramm. til 500 gramm.; til Injection 3-15 ctgrm. til 25 gramm. Vand; til Inddrypning i Øret mod forhærdet Ørevox 20 ctgrm. til 25 gramm. Vand.

Undgaa at tilsætte Syrer, sure Salte, Metalsalte, Olie, Fedt og de fleste organiske Stoffer.

Pulv. pro pasta vienn.

Hydratocarbonas ferrosus saccharatus,

ferrum subcarbonicum saccharatum D. 50,

kulsurt Jernforilte med Sukker.

Virkning: Tonicum, roborans (Chlorose, Anæmi, Scrophulose); det er et mildt Jernpræparat, men forandres let i Luften, hvorfor man kun forskriver det for en kort Tid ad Gangen.

Dosis: 30-60 ctgrm. p. d. 2-4 de die, Pulver, Piller eller trochisci (med pasta cacao saccharata).

Pulv. ferri cum rheo n. fr. T. P. antichlor. 40.

Hydratocarbonas magnesticus,

magnesia carbonica s. alba D. 50,

let kulsur Magnesia

Virkning: Antacidum, aperiens (pyrosis, affectiones dyspepticæ, obstipatio, Affectioner hos Smaabørn, der skyldes Syre i de første Veie).

Dosis: 30-100 ctgrm. pro dosi; en Theskefuld veier 40-50 ctgrm. Den gives som Pulver (med r. rhei, sulphur subl., elæosacch. foeniculi, flavedo aurantii); som aperiens

maa den gives i større Mængde og anvendes derfor sjældent som saadant. Paa Grund af sin ringe Voluminositet er carbonas magnesticus bekvemmere at indtage og bedre at dosere.

Undgaa at tilsætte Syrer, sure Salte, chlor. ammon.

Plv. magnesiæ cum rheo. Plv. galactopoeus 40. Plv. antemeticus n. fr. v. Plv. bismuthi A. S. & A. S. 69. P. dentifricius rub. Oxyd. magn. leve. Ung. kali hydrojod. 50. Ungv. jodeti kalici M. 69.

Hydratocarbonas plumbicus,

cerussa alba D. 50,

Blyhvidt.

Virkning: Exsiccans, adstringens til udvortes Brug, i Form af Strøpulver (ofte med ox. zincicum og amyllum tritici); til Salver og Plastre (Excoriationer, Forbrændinger, pernio, decubitus, Rosen, for at fremskynde Cicatrisationen (Epidermisdannelsen) ved granulerende Saar).

Undgaa at tilsætte Syrer, Chlor, Brom, Jod.

Ung. hydratocarb. plumb. Ung. hydratoc. pl. camph. Empl. cerussæ 50.

Hypermanganas kalicus,

manganoversurt Kali. Opløses i 16 D. Vand.

Virkning: Oxidans, desinficiens, adstringens (ulcera maligna & gangrænosa, ozæna, cancer uteri, leucorrhœa, halitus graveolens, contagia, miasmata). Til desinficerende Vadskning 1 gramm. - 1,25 gramm. til 500 gramm. aq. d.; en desinficerende Opløsning hensættes i Sygeværrelset for at rense Luften; til Injection 2,5 gramm.-500 gramm. aq. d.; til Fomentation 5 gramm.-500 gramm. Vand; naar man vil benytte den sidstnævnte Opløsning til Mundvand, sættes 1 Theskefuld deraf til $\frac{1}{2}$ Kopfuld Vand.

Undgaa alle Tilsætninger.

Indigo,

color indicus D. 50,

Indigo.

Virkning: Antispasmodicum (epilepsia).

Dosis: 30-50 < 100 elgrm. p. d. 3-4 de die som
electuarium med Syrup eller Honning; Piller.

Infusum digitalis,

Fingerbølleblade-Infus.

Virkning: se fol. digitalis.

Dosis: 1 Spiseskefuld 3-5 Gange daglig.

Infusum rhei alkalinum,

tinctura rhei aqvosa, anima rhei D. 50,

Rhabarber-Draaber.

Virkning: Tonicum (adstringens ved den indeholdte Garvesyre, medens den samtidig ved andre indeholdte Stoffer virker som cholagogum) ved atonia primarum viarum, navnlig naar Syredannelse og forstyrret Galdeudsondring spiller en Rolle derved, ved Dyspepsi, Flatulents, Cardialgi, Diarrhe; — aperiens.

Dosis: som tonicum gtt. 40-60 eller theskefuldvis; mod Diarrhe ofte blandet med $\frac{1}{4}$ æther spirituosus; som aperiens 1 Spiseskefuld, om fornødent, gjentaget.

Mixt. rheo-anodyna n. fr. B. Mixt. rheo-salina n. fr. B. Mixt. salina febrifuga n. fr. B. Tr. aperiens n. fr. v. Mixt. aperiens aloetica n. fr. B. Liq. antihyst. n. fr. B. & A. S. 69. Tr. aper. amara ph. 40 & n. fr. v. Tr. antirach. 40 & n. fr. v. M. rheo-salina M. 69. Tr. aperiens M. 69.

Infusum sennæ compositum,

aqva laxativa viennensis D. 50,

Wiener-Laxer-Drik.

Virkning: Catharticum.

Dosis: som laxans 30-60-100 gramm. paa cengang eller 2 Spiseskefulde hver 2den Time indtil Virkning; den passer især for Kvinder og Børn; destrueres hurtigt.

Mixtura sennæ comp. n. fr. T. Mixt. camph. lax. n. fr. v.

Jodetum ferrosum,

Jernforjod.

Virkning: Tonicum, alterans, virker som en Blanding af Jod og mælkesurt Jernforilte (ved Chlorose, Anæmi hos scrophulose eller syphilitiske Individuer, Milt- og Leversvulst, metritis chronica, catarrhalsk Pneumoni og Pleuritis især hos Børn og anæmiske Individuer i Form af syr. jod. ferr.); det destrueres hurtigt og taales mindre godt af Fordøielsesor-ganerne end andre martialia; det er derfor sjældent anvendt.

Dosis: 3-5-15 etgrm. gives som syr. jodeti ferrosi eller pil. jodeti ferrosi, eller som pil. jodeti ferrosi Blancardi; i den sidste, noget dyrere Form holder Jodjernet sig bedst.

Jodetum hydrargyricum rubrum,

hydrargyrum bijodatum D. 50,

rødt Qvægsølvtejod. Uopløseligt i Vand, tungt opløseligt i spir.

Virkning: Alterans, antisiphiliticum; det staaer i Virkning meget nær chloretum hydrargyricum, men er endnu mere caustisk; sjældent indvortes (Syphilis, især compliceret med Scrophulose, iritis syphilitica, haardnakkede chroniske Exanthermer).

Dosis: (Maximaldosis 30 milligrm.) 5-20-30 milligrm.

pro dosi 1-2 de die i Piller, hvortil det sættes efter først at være opløst i spir., eller i vandig Opløsning ved Hjælp af jodetum kalicum, hvorved der dannes et Dobbelt salt (jod. hydrargyrici rubri 40 etgrm., trituro miscæ cum jodeto kalico 5 gramm., aq. dest. 100 gramm.; 1 Theskefuld indeholder c. 15 milligrm. Graefe); udvortes i Salve 1-3 D. til 50 D. Fedt (serophulose og syphilitiske Kirtelsvulster, maculæ corneæ, neuralgia, ulcera syphilitica, lupus).

Undgaa at tilsætte Syrer, Alkalier.

Ung. bi-jodati hydrargyri n. e.

Jodetum hydrargyrosus flavum,

hydrargyrum jodatum D. 50,

gult Qvægsølvforjod. Meget tungt opløseligt i Vand, uopløseligt i spir.

Virkning: Alterans, antisyphiliticum, nærmer sig i Virkning meget chloretum hydrargyrosus; det destrueres let under Dannelse af jodetum hydrargyricum (allerede ved Varme og Lys); derfor anvendes det kun sjældent, og der forskrives kun lidt ad Gangen (syphilis, især compliceret med serophulosis, chroniske Exanthemer, Kirtelsvulster; serpiginoze og syphilitiske Saar).

Dosis: (Maximaldosis 15 etgrm.) 1,5-3-5 < 10 etgrm. pro dosi 2-3 de die i Pulver (jodeti hydrargyrosi fl. 3 etgrm., plv. aromat. 10 etgrm., sacch. lactis 30 etgrm.) eller Piller (30 etgrm., opii plv. 30 etgrm., r. glycyrrh. & ext. taraxaci q. s. ut. f. pil. 20. m. d. s. først 2, siden 4 Piller de die. Sigmund); udvortes i Salve 1-10 D. til 50 D. Fedt.

Undgaa at tilsætte Syrer, de ætsende og kulsure Alkalier.

Jodetum kalicum,

kali hydrojodicum, kalium jodatium D. 50,

Jodkalium. Opløses i $\frac{3}{4}$ D. Vand og 7 D. spir.

Virkning: Antiphlogisticum, resolvens, diureticum, alterans; udvortes resorbens (syphilis, serophulosis, hydrargyriasis, chronisk Betændelse af glanduløse Organer, af uterus og Ovarierne, serøse Exsudationer, hydrocephalus acutus, Infiltrationer af Kirtlerne og Bindevævet, struma; udvortes Indurationer, Hypertrophier, ulcera dyscrasica).

Dosis: 15-50 ctgrm. < pro dosi 3-4 de die i vandig Opløsning (3-5-8 gramm - 220 gramm aq. d. og 30 gramm. syr. aurantii), sjældent i Pulver eller Piller; udvortes i Øienvand 10 ctgrm. til 25 gramm. aq. d., til Gurglevand 5-10 gramm. til 250 gramm. aq. d., til Vadskning 10-15 gramm. til 250 gramm. aq. d.

Undgaa at tilsætte Syrer, sure Salte, Metalsalte.

Sol. kali hydroj. n. fr. T. Mixt. jodata A. S. 69. M. kali hydroj. n. c. Med. Mixt. kali hydroj. fortior n. c. Med. Ung. jodeti kalici. Ung. jodii mercuriale n. c. Ch. Jod. hydr. rubr. Ung. kali hydrojod. 50. Syr. jodatus A. S. 69. Sol. jod. kal. M. 69. Ung. jod. kal. M. 69.

Jodum,

jodina D. 50,

Jod. Opløses i 10 D. spiritus, opløseligt i Chloroform, men i Vand kun ved Hjælp af jodetum kalicum.

Virkning: Alterans, antiphlogisticum, resolvens, diureticum, emmenagogum; udvortes resolvens, irritans, antisepticum, causticum (struma, Hypertrophier og Indurationer af glanduløse Organer, især naar de skyldes Betændelse eller Dyskrasier; serophulosis og Tertiärsyphilis; chronisk Brækning; dyskrasiske Neuroser; udvortes mod struma, Hyper-

trophier og chroniske Betændelser, chroniske, dyskrasiske Saar, Fistler, Congestionsabscesser, leucorrhoea, blennorrhoea, Vandbrok, pernio, periostitis, Buboner; som overfladisk causticum mod Vorter, Condylomer, lupus).

Dosis: 1,5-3-5 ctgrm. enten i Form af sol. jodi spir. eller i vandig Opløsning med jodetum kalicum (1 D. Jod, 2 D. jod. kalic., 97 D. aq. d.), ikke Pulver eller Piller; udvortes til Injection, Fomentation og Vadskning 1-5-10 gramm. til 500 gramm. aq. d. med den dobbelte Mængde jodet. kal.; til stærkere Virkning sol. jodi spir.; i Salve, hvor det hurtigt destrueres, 1 à 8 D. til 100 D. Fedt.

Undgaa at tilsætte Chlor, Brom, Alkalier, Metalsalte.

Sol. jodi spir. Mixt. kali hydroj. fortior n. e. Med. Pil. jod. ferr. Jod. kalicum. Jod. hydr. flav. Jod. ferros. Syr. jod. ferr. Liq. jodi A. S.

Julapium salinum,

almindelig Julep.

Virkning: Refrigerans, digestivum, urinæ aciditatem minuens (Congestioner, Febertilfælde, lette Betændelser, Cattarrh af Digestionsorganerne, Indigestion, Brækning).

Dosis: 1 Spiseskefuld hver anden Time; hvor man frygter den exciterende Virkning af aq. menth. pip., forskrives den istedetfor dette med aq. dest.

Kermes mineralis,

sulphur stibiatum rubrum D. 50,

Kermes.

Virkning: Expectorans, i større Mængde emeticum (Bronchialcattarrh, bronchitis, pneumonia, især henimod Resolutionsstadiet og naar Expectoratet er vanskeligt at hoste op, Asthma, Lungeemphysem).

Dosis: 1,5-3-5 ctgrm. < 2-5 de die som Pulver, Piller med extr. glycyrrh. eller i Saft.

Undgaa at tilsætte Syrer, sure Salte, Metalsalte, de ætsende og kulsure Alkalier.

Pulv. expectorans 40. Plv. expectorans comp. n. e. Pilocyptorales cum kermete A. S. Plv. expectorans M. 69. Linct. pect. e. kerm. n. fr. B.

Kreosotum,

Kreosot.

Virkning: Antisepticum, adstringens (dilatatio ventriculi, især naar der er Sarcinedannelse, nervøse Brækninger, chronisk Mavecatarrh, ulcus ventriculi; stomatitis mercurialis, scorbutisk Tandkjød, Tandpine, gangrænøse og cancerøse Saar).

Dosis: gtt. 1-2-3 p. d. i Piller (kreos. gtt. 30, plv. rad. althææ 2 gramm., ext. glycyrrh. q. s. ut. f. pil. 30) 1 gramm. er = gtt. 30-32; gtt. 2-4 til 50 gramm. aq. d. til Indaanding i Pulverisation.

Undgaa at tilsætte stærke Syrer, Alkalier, Metalsalte, Chlor, Brom.

Ap. kreosoti 50.

Lactas ferrosus,

mælkesurt Jernforilte. Opløses i 48 D. Vand.

Virkning: Tonicum, roborans; et mildt Jernpræparat (Chlorose, Cardialgi, Anæmi, serophulosis).

Dosis: 10-20-40 ctgrm. p. d. 2-3 de die som Pulver ad ch. cer., Piller med extr. gentianæ, trochisci med pasta cacao sacch; eller opløst i vin. gallicum alb. eller de Xeres; den generelle Dosis maa kun være lille, da det forandres ved Luftens Adgang under Opbevaringen.

Pil. ferri cum dig. A. S. 69.

Lactucarium,

lactucarium anglicum D. 50,

Lactucarium.

Virkning: Sedativum, hypnoticum, antispasmodicum; inconstant i Virkning og kostbart; det gives, hvor opium ei taales eller ikke virker (Erethismus, nervøs (hysterisk eller hypochondrisk) Søvnløshed).

Dosis: (Maximaldosis 25 ctgrm.) 10-15-25 ctgrm. pro dosi som Pulver eller Piller.

Lapides cancri,

lapides cancerorum D. 50,

Krebseøine. Uopløselige i Vand.

Virkning: Antacidum, mildt adstringens (Overskud af Syre i de første Veie, Cardialgi, Diarrhe; udvortes til Tandpulver). De ere ligesom testæ ostrearum præp. Substitut for carbonas calcicus, den rene kulsure Kalk.

Dosis: 0,5-1-2 gramm. p. d. Pulver, ofte sammen med rheum og aromatica.

Undgaa at tilsætte Syrer, sure Salte, Chlor, Brom, Jod.

Lapis divinus,

cuprum aluminatum D. 50,

alunholdig Kobbervitriol. Opløselig i Vand.

Virkning: Adstringens, irritans (conjunctivitis catarhalis et scrophulosa, ophthalmoblennorrhoea).

Dosis: 5-10-20-50 ctgrm. til 25 gramm. aq. d.

Undgaa at tilsætte de ætsende og kulsure Alkalier, Blysalte, muc. cydoniæ.

Lapis hæmatites,

lapis hæmatitis crystallisatus nativus D. 50,

Blodsten. Til pharmaceutisk Brug.

Chloretum ferricum 50.

Lichen islandicus,

islandsk Mos.

Virkning: Emolliens, nutriens, tonico-amarum (Bronchitis chr., phthisis, diarrhoea).

Dosis: Decoet af 15 gramm. til 250 gramm. eller som Gelee c. 100 gramm. de die, som nydes sammen med varm Mælk og Sukker; (lich. isl. conc. 60 gramm. koges med 3 Pægle Vand, indtil der bliver 1½ Pægel tilbage; derpaa sier man og inddamper ved svag Varme, indtil nogle Draaber stivne til Gelee ved at heldes ud paa en kold Plade; der bliver c. 200 gramm. Gelee); Bitterstoffet kan bortskaffes ved at udvadske Mossen med en Potaskeopløsning (c. 4 gramm. til 60 gramm. Mos).

Pasta cacao c. lich. isl. Dec. fol. uvæ ursi c. lichene isl. n. fr. T. Dec. uvæ ursi comp. n. fr. B. & A. S. 69. Dec. uvæ ursi ep. M. 69. Gel. lich. isl. M. 69 & ph. 50.

Lignum guajaci,

lignum sanctum D. 50,

Guajak-Ved, Pokkenholt.

Virkning: Diaphoreticum, diureticum, antidyscrasicum (chroniske Hudsygdomme, syphilis).

Dosis: 30-60 gramm. i. g. rasp. til 375 gramm. Decoet for en Dag.

Species pro decoet. lignorum. Tr. guajaci e ligno ph. 50. Dec. lignor. M. 69. Spec. pro dec. lign. M. 69.

Lignum qvassiæ,

Qvassia-Ved.

Virkning: Tonico-amarum (atonisk Dyspepsi, Convalescents).

Dosis: koldt eller varmt, vandigt eller vinøst Infus af 4-8 gramm. til 200 gramm. col., hvoraf en Spiseskefuld hver 3die Time.

Extr. qvassiæ. Tr. qvassiæ. Thea qvassiæ cum senna n. fr. T.

Lignum santali rubrum,

rødt Sandel-Ved.

Virkning: Colorans.

Tr. digitalis rubra. Tr. lavandulæ rubra. Mors. purg. ros.

Linimentum ammoniacatum,

linimentum ammoniatum s. l. volatile D. 50,

flygtig Liniment.

Virkning: Irritans, rubefaciens, discutiens, derivans (rheumatiske Smerter, Lamheder, indolente Kirtelsvulster etc.); Virkningen forøges ved at tilsætte ol. camphoratum; den bliver mildere ved at tilsætte ol. hyoscyami inf. (Kvinder og Børn).

Lin. ammon. camph.

Linimentum ammoniacatum camphoratum,

linimentum ammoniatum camphoratum, l. volatile camphoratum D. 50,

tyk Kampher-Olie.

Virkning: Lidt stærkere end lin. ammoniacatum.

Lin. resolvens 40 & n. fr. v. Lin. ammoniato-camphor. cum opio n. c. Lin. ammoniato-camphoratum theb. A. S. 69.

Linimentum opodeldoc,

balsamum opodeldoc D. 50,

Opodeldok.

Virkning: Irritans, derivans, discutiens (rheumatismus muscularis, rheumatiske Lamheder, Contusioner, indolente Kirtelvulster).

Linteam carptum anglicum,

engelsk Charpi. Til chirurgisk Brug; det forskrives efter Vægt.

Liquor acidus Halleri,

elixir acidum Halleri D. 50,

Hallers sure Draaber.

Virkning: Adstringens, nervinum; de virke omtrent som acidum sulph. dil. (Typhus, Metrorrhagier, nervøs Hjertebanken, Chlorose, naar martaia ei taales, pyrosis).

Dosis: (Maximaldosis gtt. 10) gtt. 5-10 pro dosi i Sukkervand, Salep, Havresuppe (Liq. ac. Hall. 3 gramm. Aq. menth. pip. s. aq. amygd. am. c. 15 gramm. m. d. s. 30-40 Draaber p. d.; liq. acid. Hall. 3 gramm., tr. cinnamomi 10 gramm., vin. theb. croc. 2 gramm. m. d. s. gtt. 30-40 p. d.).

Liq. menyanthis acidus.

Liquor arseniitis kalici,

liquor arsenicalis, solutio Fowleri D. 50,

Fowlers Arsenik-Draaber.

Virkning = ac. arsenicosum, alterans, antitypicum (chroniske Hudsygdomme, fb. intermittens; i denne sammen med styrkende Diæt); de indeholde 1% ac. arsenicosum; 1 gramm. = gtt. 15 indeholder altsaa 10 milligrm. ac. arsenicosum.

Dosis: (Maximaldosis gtt. 10) gtt. 3-4-5 < 7-8-10
pro dosi 1-2 de die i Sukkervand; man lader drikke meget
Vand efter.

Undgaa at tilsætte, Chlor, Brom, Jod, Metaller, Metalsalte.

Liquor Clauderi,

elixir aperitivum Clauderi D. 50,

Clauders Draaber.

Virkning: Emmenagogum.

Dosis: 1 Theskefuld 2 à 3 Gange daglig; de gives
alene eller med andre emmenagoga, tr. sacra, tr. croci,
tr. castorei.

Liquor menyanthis acidus,

elixir antarthriticum D. 50,

sure Bukkeblade-Draaber.

Virkning: Adstringens, tonico-amarum (chroniske
Digestionsforstyrrelser, pyrosis, alcoholismus chr.).

Dosis: 1 Theskefuld 2 à 3 Gange daglig.

Liquor pectoralis,

elixir pectorale D. 50,

Brystdraaber.

Virkning: Expectorans, sedativum (afebril Brysteatarrh,
raucedo catarrhalis).

Dosis: 1 Theskefuld p. d.; ofte med $\frac{1}{2}$ eller lige Dele
tr. thebaica benzoica.

Mixt. paregorica expectorans A. S. 69.

Liquor succinatis ammonici pyroleosi,

liqvor ammonii succinici, liqvo cornus cervi succinatus D. 50,
ravsyrret Ammoniak-Draaber.

Virkning: Excitans, diaphoreticum, antispasmodicum (hysteriske Convulsioner, Kolik og Krampetrækninger hos Smaabørn, Rheumatalgi, acute Exanthemer med typhøse Symptomer, asthenisk Catarrh hos gamle Folk).

Dosis: gtt. 20-40 (til Børn 3-15) p. d. ofte sammen med æther spir., tr. castorei, tr. thebaica eller 5-10 gramm. til inf. valerianæ, senegæ.

Undgaa at tilsætte stærke Syrer, sure Salte og kaustiske Alkalier.

Liq. antispasticus n. fr. v. Liq. antihyst n. c. Ch. Liq. antispasticus M. 69.

Liquor supercarbonatis ammonici pyroleosi,

liquor ammonii carbonici pyro-oleosus, liquor cornus cervi
D. 50,

Hjortetaksalt-Draaber.

Virkning: Excitans, diaphoreticum, antispasmodicum; udvortes irritans (Hysteri, Krammer og Lamhed, Rheumatalgi, Typhus, acute Exanthemer med typhøs Character).

Dosis: gtt. 20-40 p. d. sammen med antispasmodica eller diaphoretica.

Undgaa at tilsætte Syrer, sure Salte, kaustiske Alkalier, Metalsalte.

Spir. antiparalyticus.

Lycopodium,

semina lycopodii D. 50,

Hexemel.

Virkning: Demuleens; udvortes absorbens, exsiccans, defendens (affectiones spasmodicæ vesicæ & urethræ; Hikke; Dysuri, Stranguri, Urinretention hos Smaabørn; vædskende Excoriationer, Intertrigo, Eezem).

Dosis: 0,5-1-2 gramm. p. d. (5-8 gramm, de die);

til Børn 2-5 gramm. de die (lycopodii 5-10 gramm. tere cum syr. althææ v. mel. 50 gramm.; udvortes til Strøpulver (undt. med ox. zincicum); til at bestrø Piller.

Manna,

manna calabrina D. 50,

Manna.

Virkning: Aperiens, især til Børn, Gravide og Fødende; dog ikke meget brugt, fordi Smagen er ubehagelig sød og Virkningen inconstant.

Dosis: som laxans 30-50 gramm. delt i flere Portioner, sjældent alene, undtagen til Børn (5-15 gramm. solve in aq. foeniculi 100 gramm. col.), mest sammen med Afføringsmidler i electuarium, i inf. sennæ; Opløsningen forderves hurtigt om Sommeren.

Inf. sennæ comp. Syr. sennæ mannatus. Sol. mannato-oleosa 40.

Massa pilularum de cynoglosso,

Hundetunge-Pillemasse.

Virkning: Expectorans, sedativum (bronchitis chronica, phthisis).

Dosis: (1 gramm. indeholder 14 etgrm. opium og sem. hyoscyami) 25-50 etgrm. p. d. 1-2 de die som Piller eller Pulver med saccharum som constituens.

Pulv. de cynogl. n. e. Ch.

Massa pilularum resinæ jalapæ,

sapo jalapinus D. 50,

Jalape-Sæbe-Pillemasse.

Virkning: Aperiens, drasticum (habituel Forstoppelse).

Dosis: som aperiens 30-60 etgrm. p. d. nogle Gange

de die; som drasticum 60-130 etgrm. p. d. frembringer den heftige Koliksmertes; gives i Form af Piller (m. p. r. j. 6 gramm., tub. jalapæ plv. 2 gramm. f. pil. 40; hver indeholder 15 etgrm. d. s. 4-6 p. d. til Afføring; m. p. r. j., extr. aloes āā 3 gramm., spir. dil. q. s. ut f. pil. 50 d. s. 2-3-5 p. d.), Extr. rhei. jalap.

Mel album,

mel D. 50,

Honning. Til pharmaceutisk Brug eller for Billigheds Skyld som Substitut for mel depuratum.

Mel depuratum. Pil. jodeti ferr.

Mel depuratum,

mel despumatum D. 50,

renset Honning.

Virkning: Demulcens, aperiens, urinæ aciditatem minuens.

Dosis: 50-100 gramm. de die (mod urolithiasis renalis); constituens for electuaria, linctus og til udvortes Brug sat til Mundvand og Gurglevand; sammen med farina secalina er det Folkemiddel mod Furunkler og Abscesser.

Oxymel seillæ. Mel rosæ. Dec. rad. rat. M. 69. Em. ammon. M. 69. Garg. alum. M. 69. Garg. myrrh. M. 69. Inf. senegæ c. nitr. kal. M. 69. Inf. sennæ c. sulph. natr. M. 69. Linct. borac. M. 69. Linct. pect. M. 69. Mixt. diapn. M. 69.

Mel rosæ,

mel. rosatum D. 50,

Rosen-Honning. Lugter og smager bedre end mel depuratum; benyttes iøvrigt paa samme Maade og som svagt adstringens.

Linet. ad apth. 40. Linet. borac. n. fr. v. Garg.
alum. n. fr. T.

Minium,

Mënnie.

Virkning: Exsiccans, adstringens til udvortes Brug.
Empl. minii camph.

Mixtura acida sulphurica,

mixtura acida mineralis D. 50,
sur Mixtur.

Virkning: som acidum sulph. dil.

Dosis: 1 Spiseskefuld hver 2den Time.

Mixt. acida muc. A. S. Mixt. acid. muc. op. A. S.
Mixt. acida opiata A. S. Mixt. acida ferrea n. f. T. (hvoraf
den sidste meget ildsmagende).

Mixtura alba,

loco decocti albi D. 50,
hvid Stoppe-Mixtur.

Virkning: mildt adstringens, obstipans (Diarrhe).

Dosis: 1 Spiseskefuld p. d. af den velomrystede Mix-
tur; undertiden tilsættes muc. gi arab. (1 D. til 2 til 3 D.),
tr. cascarillæ, en Opiumstinctur.

Mixtura camphorata,

Kampher-Mixtur.

Virkning: se camphora.

Dosis: 1 Spiseskefuld (indeh. 12 ctgrm. camph.) p. d.
Mixt. camph. lax. n. fr. v. Mixt. camph. muc. op. A. S.

Mixtura ferri composita,

mixtura Griffithiana D. 50,

Griffiths Mixtur.

Virkning: Tonicum, roborans (bronchitis chronica, phthisis, Hektik, Chlorose, Anæmi, Cardialgi).

Dosis: 1 Spiseskefuld 4 Gange daglig af den velomrystede Mixtur; denne Portion indeholder 20 ctgrm. gi res. myrrhæ og 10 ctgrm. sulphas ferrosus forvandlet til hydrato-carbonas ferrosus.

Mixtura saleb,

infusum saleb D. 50,

Saleb-Mixtur.

Virkning: Demulcens, involvens, obstipans, sedativum (Catarrh, Diarrhe, Dysenteri).

Dosis: 1 Spiseskefuld bihor.; den indeholder i 100 gramm. 8 gramm. syr. fructus papaveris.

Undgaa at tilsætte Syrer, spirituosa, oxydum magnesium, Metalsalte.

Morphina,

morphium D. 50,

Morphin. Næsten uopløseligt i Vand, lettere opløseligt i spir. conc.

Virkning: Paa Grund af dets ringe Opløselighed foretrækker man de paa samme Maade virkende Morphinsalte, især chloretum morphicum.

Dosis: (Maximaldosis 30 milligrm.).

Guttæ rosæ n. fr. T. (1 gramm. = gtt. 16 indeholder 25 milligrm. citras morphicus) gtt. 5 p. d. (8 milligrm.).

Morsuli purgantes rosati,
morsuli rosarum purgantes D. 50,

Rosen-Laxersukker.

Virkning: Laxans.

Dosis: Nr. 1-2-3 p. d. (Nr. 1 indeholder 50 ctgrm. tub. jalapæ og 6 ctgrm. scammonium).

Moschus,

moschus orientalis s. tunqvinensis D. 50,

Moskus. Kun tildels opløselig i Vand og Vinaand, og lettere opløselig i det første.

Virkning: Excitans, antispasmodicum, har en eiedommelig stimulerende Indvirkning paa det centrale Nerve-system, fornemmelig Hjerne og Rygmarv (truende Collaps i acute Febre, Typhus, exanthematiske Febre, naar de ledsages af typhøse Symptomer og Exanthemet tøver med at bryde frem, forudsat at Grunden hertil ikke ligger i Complicationer; i Betændelser ved indtrædende Collaps, Gangræn, hysteriske Convulsjoner, eclampsia infantum, Kighoste, spasmus glottidis, Kolik).

Dosis: 3-5-10 ctgrm. p. d. (Nogle raade kun store Doser 15 ctgrm. til 30-60 ctgrm. p. d.); Børn i første Leveaar 1-2-3 ctgrm.; ældre Børn 3-5 ctgrm. p. d., efter Omstændighederne hver $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ -2 Time; i Pulver (med ætherol. m. pip. som corrigens), linetus, Emulsion, undertiden i Piller (moschi 3 ctgrm., sacch. 60 ctgrm.; terendo adde ætherol. m. pip. gtt. 1, d. tal. dos. Nr. 6 in charta cerata; moschi 25 ctgrm., sacch., gi arab. plv. $\bar{a}\bar{a}$ 1 gramm. aq. rosæ 50 gramm.).

Undgaa at tilsætte contrastimulantia, aq. amygd. am. cone.

Tr. moschi. Plv. antispasticus n. fr. v. Plv. refrigerans cum moscho n. fr. B.

Mucilago cydoniæ,

mucilago seminum cydoniorum D. 50,

Qvæde-Slim.

Virkning: Emolliens, til udvortes Brug (excorierede Brystvorter. Hæmorrhoidalknuder, Øiensygdomme) enten ublandet eller fortyndet med 3-5 D. Vand.

Undgaa at tilsætte Syrer, spirituosa, acetas plumb.

Aqva ophth. simpl. n. fr. B.

Mucilago gummi arabici,

Gunmi-Slim.

Virkning: Emolliens, involvens, obstipans (Catarrh, Diarrhe, Dysenteri, Excoriationer).

Dosis: gives enten alene eller blandet med 2-4 D. Vand.

Undgaa at tilsætte spirituosa, basisk eddikesurt Blylle, biboras natricus.

Mixt. camph. Aq. mucilaginoso n. fr. T. Mixt. mucilaginoso n. fr. B., A. S. & A. S. 69. Linct. antidotus n. fr. B. Linct. pectoralis n. fr. v. Mixt. obstipans n. c. Med. Linct. pect. M. 69. Linct. pect. c. kerm. M. 69. Mixt. ac. sulph. muc. M. 69. M. camph. M. 69. M. mucil. M. 69.

Nitras amido-hydrargyrosus,

hydrargyrum oxydulatum nigrum, mercurius solubilis Hahnemanni D. 50,

basisk salpetersurt Qvægsolvforille-Ammoniak. Uopløseligt i Vand, opløseligt i Eddikesyre.

Virkning: Alterans (syphilis); det kan bruges som chloretum hydrargyrosus.

Dosis: 5-10-15 ctgrm. (til Børn 1-2-3-5 ctgrm.) som Pulver med sacch. lactis som constituens eller som Piller.

Undgaa at tilsætte Syrer, Alkalier, Svovlmetaller.

Nitras argenticus,

argentum nitricum fusum, lapis infernalis D. 50,
salpetersurt Søville, Helvedessten. Opløses i lige Dele Vand.

Virkning: Adstringens, tonico-nervinum, antispasmodicum, irritans; udvortes defendens, adstringens, irritans, causticum, der kun virker overfladisk. (Hæmorrhagier fra Ventriken, ulcus ventriculi chron., habituel Brækning hos Svangre og uregelmæssigt Menstruerede, Tarmblødning, Dysenteri, Cholera, Diarrhe, Cardialgi, Epilepsi; udvortes især mod catarrhalske Betændelser med rigelig Secretion, Dysenteri, conjunctivitis, ophthalmoblenorrhoea, otorrhoea, angina, laryngitis chronica, stomatitis, diphtheritis, catarrhus vesicæ, Hæmorrhagi efter Iglebid, atoniske og fungøse Saar, Excrecentser, Fistler, Chancre, Stricture).

Dosis: (Maximaldosis 30 milligrm.) 1-3 ctgrm. < p. d. 2-3 de die opløst i aqua d. eller i Piller; efter en Maaned Brug udsætter man Midlet en Maaned; udvortes i Substans eller opløst i Vand eller Glycerin (Øiensygdomme); det forskrives in vitro nigro s. flavo; til en kaustisk Opløsning tager man til 50 gramm. aquæ dest. i Øiensygdomme 1 gramm, til Application paa Huden 1-2 gramm.; til en adstringerende Opløsning for Urinblæren 1,5-2,5 ctgrm. til 25 gramm. aq. d. Til Indaanding i Pulverisation 5-10-20 ctgrm. til 50 gramm. aq. d.; til Klyster 5-30 ctgrm.

Undgaa de fleste Tilsætninger, især dog chloreta, Mælk Kjødsuppe, salt Mad.

Pil. infernalis n. fr. T. Pil. argentæ n. fr. B. & A. S.
69. Aq. ophth. c. lap. inf. n. e. Gargarisma inf. n. fr. B.
Sol. lap. inf. n. e. Ch. Sol. lap. inf. ad inj. n. e. Ch.

Nitras argenticus bis mitigatus,

svag Helvedessten.

Virkning: som nitr. arg., men mildere til Ætsning.

Nitras kalicus,

kali nitricum depuratum, nitrum depuratum D. 50,
Salpeter. Opløses i 3 D. Vand.

Virkning: Refrigerans, antiphlogisticum, diureticum
(acute Betændelser, exanthematiske Febre, Pneumoni, pleuritis, endocarditis, pericarditis, meningitis, rheumatismus art. acutus, Congestioner, active Hæmorrhagier, især hæmoptysis, acut og subacut parenchymatøs nephritis, især med Vattersot).

Dosis: 30-50 ctgrm. hver 2den Time; undertiden 1 gramm. p. d. i Pulver eller Opløsning.

Undgaa at tilsætte stærke Syrer, Vinsyre, vinsure Salte, svovlsure Metallsalte, Chlorbaryum.

Pulv. refrigerans. Plv. digestivus. Lapis divinus. Mixt. nitrosa n. c. Mixt. nitrosa dulcis A. S. Inf. dig. c. nitro n. fr. T. Mixt. colchico-nitrosa A. S. Sol. nitrosa n. fr. T. Plv. antirheum. n. fr. B. Plv. anticolicus n. fr. v. Plv. nitri saccharatus n. fr. T. Mixt. camph. nitr. 40 & n. fr. v. Dec. peet. c. nitr. kal. M. 69. Inf. senegæ c. nitr. kal. M. 69. Mixt. nitr. kal. M. 69. Mixt. nitr.-stib. M. 69. Pulv. dig. M. 69. Pulv. nitr. kal. sacch. M. 69. Pulv. refr. M. 69. Pulv. temp. camph. M. 69.

Nitras kalicus venalis,

kali nitricum s. nitrum crudum D. 50,
almindeligt Salpeter. Til pharmaceutisk Brug.

Nitras kalicus.

Nitras strychnicus,

strychninum nitricum D. 50,
salpetersurt Strychnin. Opløses i 60 D. Vand.

Virkning: Antiparalyticum (Paralyser, naar der hverken er Betændelse eller grove mekaniske Beskadigelser tilstede,

paralysis ex venere, alcoholica, saturnina, hysterica, traumatica, prolapsus ani, enuresis af Blærelambhed, Uvirksomhed af Tarmkanalens Muskelhinde, spermatorrhoea).

Dosis: (Maximaldosis 15 milligr.) 3-5-10 milligrm. p. d. 1(-2) de die med stor Forsigtighed for den cumulative Virknings Skyld; paa Grund af dens ubehagelige Smag gives den ikke gjerne i Pulver, men som Piller (5 etgrm., solve in aq. ferv. q. s., extr. glycyrrhizæ 3 gramm., rad. glycyrrh. q. s. ut. f. pil. 50; Nr. 1 = 1 milligrm.); udvortes 3-30 etgrm. til 5 gramm. Fedt eller ung. glycerini; endermatisk 7-15 milligrm. p. d.; til subcutan Injection 5 etgrm. til 10 gramm. aq. dest.; (gtt. 15 = 5 milligrm.) 1-2-3-5-6-8 milligrm. pro dosi.

Undgaa at tilsætte Alkalier, Tannin.

Pil. strychnicæ n. fr. B. & A. S. 69.

Oleum amygdalarum,

Mandelolie.

Virkning: Emolliens, lubricans (Irritation af Digestions- og Respirations-Organerne; Excoriationer).

Dosis: alene eller i linctus, Emulsion (30 gramm. Gi arab. plv. 15 gramm. Aq. amygd. am. dil. 150 gramm.).

Undgaa at tilsætte Alkalier, Chlor, Brom, Jod.

Ceratum ad labia. Ung. cetacei.

Oleum cacao,

butyrum cacao D. 50,

Kakao-Smør.

Virkning: Emolliens, leniens (sprukne Læber, excorierede Brystvorter) mest udvortes til Øiensalver og Pomader (med Halvdelen ol. amygd.), pessaria og suppositoria (chloret. morphiæ 12 etgrm., ol. cacao 15 gramm. f. supp. Nr. 4 d. ad ch. cer. s. nomine suo, eller med 25 etgrm. extr. bella-

donnæ ligeledes til Nr. 4, eller ac. gallotann. 3 gramm., ol. cacao 12 gramm., f. suppos. Nr. 4).

Oleum camphoratum,

Kampher-Olie.

Virkning: Irritans, resolvens; udvortes (rheumatiske Muskelsmerter etc.).

Lin ammoniacatum-camphoratum.

Oleum crotonis,

Krotonolie.

Virkning: Drasticum, hydragogum; udvortes rubefaciens, pustulans, derivans (haardnakket Forstoppelse, Blycolik, hydrops, Paralyse, Apoplexi, hydrocephalus acutus, oedema glottidis; udvortes mod Neuralgier, Kighoste, Asthma, rheumatisk Tandpine og Ørepine, chronisk Rheumatisme).

Dosis: (Maximaldosis gtt. 2) $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ -1 gtt. pro dosi, om fornødent gjentaget med Forsigtighed; 1 Draabe = 4-5 etgrm. Gives i oleøs Opløsning, linctus, Piller, Kapsler. (gtt. 2-3, solve in ol. amygd. 30 gramm. m. d. s. 1 Thesefuld til Virkning; gtt. 3. Sap. hisp. albi, r. allhææ ää 2 gramm. f. pil. 15); udvortes til Indgnidning alene eller blandet med p. 3-5 ol. olivarum, ung. hydrargyri eller ætherol. terebinth. crud., oftere gjentaget som pustulans; som rubefaciens gtt. 10-30 til 30 gramm. ol. olivar.

Capsulæ cum ol. crotonis. Syr. laxans n. fr. T. Syr. crotonis n. fr. B. & A. S. 69. Ol. crotonis terebinth. n. c. Med.

Oleum hyoscyami infusum,

oleum hyoscyami coctum D. 50,

Bulmeblade-Olie.

Virkning: Emolliens, anodynum (ofte med ol. camph.,

ung. hydrargyri); mod Ørepine opvarmes den og bringes paa Bomuld ind i Øret.

Ung. acet. plumb. comp.

Oleum jecoris aselli,

oleum jecinoris aselli D. 50,

Levertran.

Virkning: Nutriens og restaurans; sjældent alterans, resolvens (den erethiske Scrophulose, chronisk Tuberkulose, lupus; udvortes eczema, impetigo).

Dosis: Som nutriens med styrkende Kost en Spiseskefuld 3-4 de die (Børn — en Theskefuld eller Desertskefuld) bedst før Maden; undertiden sættes 10-15 ctgrm. jodi til 500 gramm. ol. jecoris; som alterans (lupus) i større Dosis med knappere Kost; udvortes til Indgudninger og Fomentationer.

Oleum lauri,

oleum laurinum D. 50,

Laurbærolie.

Virkning: Stimulans, resolvens, udvortes.

Oleum lini,

Hørfrøolie.

Virkning: Emolliens, udvortes.

Oleum sulphurato-terebinthinum. Lin. ad ambustiones 40. Lin. ad. ambust. M. 69.

Oleum olivarum,

Olivenolie, Bomolie.

Virkning: Emolliens, demulcens; antitoxicum (catarrhalske Affectioner, Irritationstilstande af Digestionsorganerne; Forgiftning med Alkalier); udvortes Excoriationer etc.

Dosis: 1 Desertskefuld — 1 Spiseskefuld 3 Gange d. d. alene eller i Emulsion (30 gramm. Gi arab., sacch. āā 10 gramm. Aq. d. 150 gramm.), linctus; som antidotum alene spiseskefuldvis og Mere.

Linct. antidotus n. fr. B. Sol. mannato-oleosa n. fr v. Empl. canth. E. conii. E. meliloti. E. min. camph. E. ox. plumb. Lin. ammon. Lin. ammon. camph. Ung. ac. plumb. U. ac. plumb. ep. U. bas. fl. U. bas. nigr. U. canth. spl. U. canth. vir. U. ceræ. U. nitr. hydr.

Oleum raparum,

Rapsolie. For Billigheds Skyld Substitut for ol. olivarum.

Ung. univers.

Oleum ricini,

amerikansk Olie.

Virkning: Laxans (almindeligst brugt laxans, der ogsaa anvendes, hvor man frygter for Irritationen af andre laxantia, saaledes ved betændelsesagtige Tilstande af Tarmkanalen, enteritis, perityphlitis, peritonitis, Diarrhe, Dysenteri, fb. typhoidea, nephritis).

Dosis: refract Dosis 1 Theskefuld 4-6 de die; fuld Dosis en Spiseskefuld hver 2den-3die Time til Virkning; til Børn $\frac{1}{2}$ -1-2 Theskefulde; ofte med et Par Draaber æther spir. Den tages bedst i varm salt Kjødssuppe, i varm Mælk, Kaffe; til Klyster 50 gramm.

Capsulæ cum ol. ricini. Caps. cum ol. crotonis. Coll. elasticum.

Oleum sulphurato-terebinthinum,

oleum terebinthinæ sulphuratum, balsamum sulphuris terebinthinatum D. 50,
Haarlemmerolie.

Virkning: Diureticum, uadvortes irritans, resolvens (til

Indgnidning mod Frost; til Forbinding af atoniske, putride, gangrænøse Saar); mod Nyresten tages den som Iusmiddel gtl. 10 hver Aften; passer i ethvert Tilfælde kun for gamle, torpide Individuer.

Opium,

opium levanticum s. smyrnæum s. extractum thebaicum D. 50, Opium. Indeholder i pulveriseret Tilstand 10% Morphin.

Virkning: I mindre Dosis excitans er det i større Dosis sedativum, anodynum, antispasmodicum, hypnoticum, diaphoreticum (gastritis, peritonitis, enteritis, cystitis, nephritis, smertefulde Erektioner (med lupulin, camphora), pneumonia, delirium tremens, feb. typhoidea med Ataxi (her ofte endermatisk), Neuralgi, Cardialgi, Tandpine; Galdestenscolik, Nyrestenscolik, Ulerinkrampe, Krampeveer, Kighoste, tenesmus, hyperemesis, abortus; diarrhoea, dysenteria, cholera; diabetes mellitus; Hæmorrhagier; udvortes mod Tandpine, smertefulde Drypperter, Ulerinsmerter, tenesmus, Diarrhe, Dysenteri).

Dosis: (Maximaldosis 25 etgrm.) 1-3 etgrm. p. d. 4-6 de die som diaphoreticum; som sedativum 3-5-10 etgrm. < 15-25 etgrm. 2-4 d. d. Gives i Pulver, Piller; med stor Forsigtighed til spæde Børn, gravide og diegivende Koner; udvortes (Tinctur) i Klyster, Piller (mod Tandpine), Øienvand $\frac{1}{5}$ - $\frac{1}{2}$ -1 D. opium til 100 D., Salve 1 D. til 4-10 D. Fedt.

Undgaa at tilsætte de ætsende og kulsure Alkalier, Metalsalte, Tannin.

Tr. thebaica. Tr. theb. benzoica. Vin. theb. Vin. theb. croc. Mass. pil. de cynogl. Plv. ipecae. theb. Morphina. Plv. hypnoticus n. c. Med. Pil. obstipantes n. fr. B. Pil. obstipantes mart. A. S. 69. Plv. calomellis e. opio n. fr. B. Plv. hydrargyri opiatum n. fr. T. Plv. pectoralis antispasticus 40. Plv. saturninus e. opio n. fr. B. Pil. calomel. n. fr. B. Pil. hydrarg. theb. A. S. 69. Pil. merc. sublimati n. c. Med.

Aqva opii 50. Extr. opii 50. Pil. merc. c. opio M. 69.
 Pulv. ipec. theb. M. 69. Pulv. merc. c. opio M. 69. Pulv.
 pect. antisp. M. 69.

Oxydum calcicum,

calx s. calcaria viva s. usta D. 50,

brændt Kalk.

Virkning: Causticum; den virker svagere og langsommere end hydras kalieus, griber mindre i Dybden og udbreder ikke sin Virkning synderlig ud over Applicationsstedet. Den anvendes sjældent alene og da ikke paa den med Epidermis dækkede Hud, men kun ved atoniske Saar, til Indskrænkning af for yppigt fremskydende Granulationer eller for stærk ichorøs Afsondring. Den anvendes i Form af Pulver; som Pasta ofte i Forbindelse med hydras kalieus.

Pulvis pro pasta Viennensi. Sol. hydratis cale.

Oxydum hydrargyricum,

hydrargyrum oxydatum rubrum, mercurius præcipitatus ruber
 D. 50,

rødt Qvægsølville.

Virkning: Alterans, antisyphiliticum; udvortes irritans, causticum (sjældent indvortes: syphilis; udvortes mod slappe torpide Saar, især syphilitiske og serophulose, gamle Bubber, blepharitis chr.).

Dosis: 8-10 milligrm. < 3 ctgrm. p. d. 2 d. d. (efter Maden) i Pulver eller Piller (med extr. og r. glycyrrh.); udvortes alene eller blandet med 5-10-20 D. Sukker, i Salve 1 D. til 10-15 D. ung. glycerini, i Øiensalve 1-2-5 D. til 50 D. Fedt. For ikke at irritere paa mekanisk Maade, bruger man til Øiensalve gjerne Præparatet via humida paratum.

Undgaa at tilsætte Syrer, Salte.

Ung. ox. hydrargyrici. Aqva phagadænica indeholder
ox. hydr. Ung. ox. hydr. mitius M. 69.

Oxydum magnesticum leve,

magnesia usta D. 50,

let, brændt Magnesia.

Virkning: Antitoxicum (Forgiftning med stærkere Syrer,
Arseniksyrling, chloretum hydrargyricum og andre Metalsalte).

Dosis: 1-3 gramm. p. d. rørt ud i 20-50 gramm.
lunkent Vand, hvorved der dannes en mættet Vædske; Dosis
gentages flere Gange med korte Mellemrum.

Undgaa at tilsætte Syrer, sure Salte, Metalsalte, Am-
moniak.

Antidotum arsenici.

Oxydum magnesticum ponderosum,

tung, brændt Magnesia.

Virkning: Antacidum, laxans (pyrosis, Forstoppelse).

Dosis: (1 Theskefuld veier 80 ctgrm.). Som antacidum
30-100-150 ctgrm. i Pulver (der ei maa gjemmes for længe),
linctus, Mixtur, trochischi; som laxans 5-8 gramm. i Døgnet.

Undgaa at tilsætte Syrer, sure Salte, Metalsalte, Am-
moniak.

Oxydum plumbicum,

lithargyrum D. 50,

Sølverglød. Til pharmaceutisk Brug.

Empl. oxydi plumbici. Sol. subacet. plumb.

Oxydum stibicum,

stibium oxydatum D. 50,

Spydglandsilte.

Virkning: som kermes min. Expectorans, emeticum, bruges nu dog kun pharmaceutisk.

Tartras stibico-kalicus.

Oxydum zincicum,

zincum oxydatum album, flores zinci D. 50,

Zinkilte. Uopløseligt i Vand.

Virkning: Tonico-nervinum, antispasmodicum, udvortes exsiccans, adstringens (Epilepsi, Eclampsi, Convulsioner hos Børn, chorea, Hysteri, Neuralgi, Kighoste, spasmus glottidis, Cardialgi, Diarrhe, Erosioner og Ulcerationer i Ventriklen og Tarmkanalen; udvortes Excoriationer, Forbrændinger, vædskende Hududslet, overfladiske Saar, decubitus, blepharoadenitis chr.).

Dosis: 5-10-20 < 30 ctgrm. p. d. 2-4 de die i Pulver, Piller, Trochiscer (Ox. zincici, extr. hyosc., extr. valerianæ $\bar{a}\bar{a}$ 5 gramm. f. pil. 100 er pilules de Meglin ph. Gall.; Lebert modificerer dem saaledes: valerian. zincici 5 gramm. extr. hyosc. 250 ctgrm., opii plv. 125 ctgrm. f. pil. 80).

Undgaa at tilsætte Syrer, sure Salte, Metalsalte, Chlor, Brom og Jod.

Pulv. flor. zinci n. fr. v. P. zinci e. bellad. n. fr. B. Plv. zinci e. moscho n. e. Med. Trochisci zinci e. bellad. A. S. 69.

Oxydum zincicum venale,

Zinkhvidt.

Virkning: kun til udvortes Brug enten alene eller med 2-4 D. amyllum som Størpulver; i Salve 1-2 D. til 10 D. ung. glycerini eller Fedt; til Øiensalve 1-2 D. til 20 D.

Ung. oxydi zincici. Ung. ox. zincici & ferri. Sulph. zinc. Acetas zinc.

Oxymel scillæ,

oxymel scilliticum D. 50,

Strandløg-Honning.

Virkning: Expectorans, diureticum.

Dosis: 1 Thesefuld p. d.; 1 gramm. indb. c. 3 etgrm. bulb. scillæ; til spæde Børn som (usikkert) emeticum 1 Thesefuld p. d. til Virkning; ellers tilsat linctus pectorales og diuretiske Mixturer; udvortes i Gurglevand 1 D. til 5 D.

Linct. pectoralis n. fr. v. Linct. pect. comp. n. c. Inf. senegæ comp. 50. Emuls. ammoniacalis 50 & A. S. 69. Elect. anthelminth. 50.

Pasta cacao cum caraghen,

pasta cacao cum lichene caragheno D. 50,

Chocolade med Karaghen.

Virkning: Nutriens, leniens (Hektik).

Pasta cacao cum lichene islandico,

Chocolade med islandsk Mos.

Virkning: Nutriens, tonico-amarum (bronchitis chronica, phthisis, Reconvalescents).

Pasta cacao saccharata,

Chocolade.

Virkning: Nutriens, leniens.

Pasta glycyrrhizæ,

gelatina liqviritiæ D. 50,

Brystlim.

Virkning: Demulcens, expectorans (Hoste, Hæshed, Bronchialcatarrh).

Phosphas natricus,

phosphorsurt Natron. Opløses i 11 D. Vand.

Virkning: Digestivum, laxans, lithontripticum (Dyspepsi, Forstoppelse, Congestioner, Betændelser i de ovenfor Mellemgulvet liggende Organer, urolithiasis; her med carbonas natrius).

Dosis: som digestivum 0,5-1-2 gramm. i Pulver eller Piller eller Opløsning; som laxans, der ved sin ei ubehagelige Smag passer for Kvinder og Børn, næsten altid i Opløsning 15-30 gramm. (5-15 til Børn) delt i flere Portioner med 1 Times Mellemrum; i Vand, Kulsyre vand eller Kjødsuppe.

Undgaa at tilsætte stærke Syrer, Kalkvand, Kalisaltes med svagere Syre end Phosphorsyre, Metalsalte.

Phosphas natricus siccatus,

tørret phosphorsurt Natron.

Skal udleveres fra Apotheket, naar phosphas natrius forskrives i Pulver.

Dosis: bliver $\frac{1}{4}$ mindre end af phosphas natrius, da det har tabt omtrent saameget i Vægt. (Carbon. natr. sicc. Phosph. natrici sicc. $\bar{a}\bar{a}$ 5 gramm. Extr. gentianæ q. s. ut f. Pil. Nr. 80).

Phosphorus,

Phosphor.

Virkning: Excitans, aphrodisiacum; udvortes irritans, pustulans (Typhus ved dyb Coma og truende Collaps, Paralyse af Underextremiteterne, Blære og Endetarm, Impotents; chronisk Rheumatisme, Paralyse, Ischias, Neuralgier).

Dosis: (Maximaldosis 15 milligrm.) 5-10 < 15 milligrm. p. d. opløst i Æther, ætheriske eller fede Olier (som corrigens for den ubehagelige Lugt og for at det ei skal lyse i

Mørke, tilsættes ætherol. cedro gtt. 20 for hver 30 gramm. af Opløsningen); udvortes 5-20-30 ctgrm. til 30 gramm. ol. olivarum. Gives i sort Glas.

Undgaa at tilsætte Ilt afgivende Stoffer, vandige Vædsker, Metaller; megen Forsigtighed med Lys og Ild er nødvendig.

Æther phosphoratus 40. Ol. phosphoratum 40.

Pilulæ jodeti ferrosi,

Jodjern-Piller.

Virkning: Tonicum, alterans (Syphilis eller Scrophulose med anæmiske Complicationer, Svulst af Milten og Leveren, chronisk Uterininfarct).

Dosis: (Nr. 1 indeholder 5 ctgrm. Jodjern) Nr. 1-3 p. d. flere Gange daglig.

Naar man forskriver pil. jod. ferr. Blancardi, udleveres de overtrukne med en Fernis og holde sig længere; pilulæ jodeti ferrosi vernice non obductæ ere billigere, men forandres hurtigere.

Pix pini,

pix navalis s. solida s. nigra D. 50,
sort Beg.

Virkning: Adhærens, irritans til udvortes Brug.

Empl. sticticum. E. de euph. 40. Ung. bas. nigr.

Pulpa tamarindi,

pulpa tamarindorum D. 50,
Tamarinde-Mos,

Virkning: Refrigerans, diureticum, laxans (Betændelser, catarrhalsk Icterus, langsomt Blodløb i Underlivsorganerne).

Dosis: 1 Theskefuld til en Spiseskefuld p. d.; 30-50 gramm. de die tilsat kjølede og afførende Mixturer.

Undgaa at tilsætte kulsure Salte.

Elect. e senna mannatum. Elect. len. 50.

Pulvis cinæ ferratus,

pulvis vermifugus D. 50,

Ormepulver.

Virkning: Anthelminthicum.

Dosis: 50-100 ctgrm. p. d. til Børn, 1-2 gramm. til
Voxne 2 Gge de die.

Pulvis dentifricius niger,

sort Tandpulver.

Pulvis dentifricius ruber,

rødt Tandpulver.

Pulvis digestivus,

Digestivpulver.

Virkning: Aperiens (Forstoppelse).

Dosis: 1 Thesefuld p. d. gjentaget indtil Virkning.

Pulvis effervescens,

Brusepulver.

Virkning: Digestivum, sedativum, analepticum (catarrhus ventriculi, Kardialgi, nausea, hyperemesis); 2 Pulvere udgjøre een Dosis.

Dosis: Nr. 1 p. d. i meget Vand, taget under Opbrusningen. Man forskriver det i Reglen ikke efter Vægt, men et vist Antal Doser.

Pulvis effervescens compositus,

pulvis aerophorus laxans D. 50,

Seidlizer-Pulver.

Virkning: Digestivum, mildt laxans; 2 Pulvere udgjøre een Dosis.

Dosis: Nr. 1 p. d. i meget Vand og tages under Opbrusningen; man forskriver et vist Antal Doser.

Pulvis jalapæ compositus,

pulvis laxans D. 50,

Laxerpulver.

Virkning: Laxans (Forstoppelse).

Dosis: 1 Theskefuld p. d., gjentaget indtil Virkning.

Pulvis ipecacuanhæ thebaicus,

pulvis ipecacuanhæ compositus, pulvis Doveri D. 50,

Dovers Pulver.

Virkning: Sedativum, diaphoreticum, hypnoticum (rheumatismus muscularis, diarrhoea catarrhalis, catarrhus bronchialis).

Dosis: (1 gramm. indeholder 10 ctgrm. opium) som diaphoreticum (sammen med 3-5-10 ctgrm. camphora) 15-30 ctgrm. p. d. 3 de die; som hypnoticum 60 ctgrm. p. d. og da i Reglen før Sengetid.

Pulvis magnesiæ cum rheo,

pulvis magnesiæ compositus, pulvis infantum cum rheo D. 50,

Børnepulver.

Virkning: Antacidum, digestivum, laxans (til spæde Børn mod Syre i de første Veie, Indigestion, Kolik, Forstoppelse).

Dosis: til Børn 30-50 ctgrm. p. d. hver 2-3 Time som laxans. Ogsaa ofte som aperiens til Voxne 1 Theskefuld p. d., gjentaget indtil Virkning.

Pulvis pro pasta viennensi,

Pulver til Ætspasta.

Virkning: Causticum (Vorter, Teleangiektasier, Condylomer, Ulceration og Svulst af portio vaginalis uteri, Chanker, til Aabning af Buboner og kolde Abscesser). Man udrører Pulveret med Vand eller Vinaand til en grødet Masse og anbringer det med en Myrtebladsonde paa Huden, hvor det efter den tilsigtede Ætsvirkning bliver liggende 10-20 Minutter; Omgivelsen af Stedet, som ætzes, beskyttes ved et fenestreret Hefteplaster, og over den anbragte Pasta lægger man et Stykke Plaster. Efter Ættsningen anlægges en Olielap, senere ofte catapl. emoll.

Pulvis pro vaporibus chlori,

pulvis ad fumigationes muriaticas, suffitus chlori D. 50, mineralsk Røgelse.

Virkning: Desinficiens (til at rense Luften i Sygeværelser, idet den udviklede Chlorgas decomponerer Svovlbrinten og andre ildelugtende Gasarter; men til Chlorudvikling benyttes hensigtsmæssigere calx chlorata. Dette desinficiens benyttes kun, hvor den naturlige Ventilation med frisk Lufts Adgang er umulig.

Pulvis refrigerans,

kølede Pulver.

Virkning: Refrigerans, antiphlogisticum (Congestioner, Catarrher).

Dosis: 1 Theskefuld 3-4 d. d.

Pulvis antispasticus n. fr. v. Plv. refrigerans cum kermete A. S. Plv. refr. cum moscho n. fr. B. Pulv. temporans camphoratus 40.

Pyroleum animale,

oleum animale æthereum, oleum animale Dippelii D. 50,
Dippels Olie.

Virkning: Excitans, antispasmodicum, anthelminthicum; udvortes stimulan, irritans (Hysteri, Bændelorm, Paralyser).

Dosis: gtt. 2-5 < 10 p. d., opløst i æther, spir., ætherolea eller som Piller.

Undgaa at tilsætte Syrer, Alkalier, Metalsalte; ligeledes maa Lysets vedvarende Indvirkning undgaaes.

Supercarbonas ammonicus pyroleosus.

Pyroleum animale crudum,

oleum cornus cervi foetidum D. 50,
stinkende Hjortetakolie.

Virkning = pyr. animale; sjældent endnu udvortes mod Hysteri.

Pyroleum animale. Pil. foetidæ 40. Ol. Chaberti 50.

Pyroleum juniperi,

oleum juniperi empyreumaticum D. 50,
branket Enebærolie.

Virkning: som pyroleum pini; irritans, antiparasiticum til udvortes Brug (eczema chronicum, psoriasis).

Dosis: Ublandet eller med 4 D. Fedt (Sapo piecus Hebra = pyr. juniperi, sapon. viridis $\bar{a}\bar{a}$ p. 1. Spir. conc. p. 2, filtr.).

Ung. antiherpeticum n. fr. B. Ung. cadinum A. S. 69.

Pyroleum lithanthracis,

Stenkulbjære.

Virkning: Irritans, desinficiens, antisepticum til udvortes Brug (psoriasis, putride Saar).

Dosis: 1 D. blandes med 20 D. sulphas calcicus, der strøes paa Saar; i Salve (med Fedt) eller alene; men til at ødelægge Contagier og Miasmer foretrækkes acidum phenylicum.

Pyroleum petræ,

oleum petræ, petroleum D. 50,

Stenolie.

Virkning: Stimulans, irritans, antiparasiticum (dermatitis asthenica, Frost, Paralyse, rheumatiske Affectioner, scabies).

Dosis: I Salve 1 D. til 5-8 D. Fedt eller ublandet (pyr. petræ 5 gramm., ætherol. foen. gtt. 10, spir. conc. 40 gramm. mod Frost).

Undgaa at komme for nær til Lys og Ild under Brugen, da den let antændes; den maa ikke forvexles med den amerikanske petroleum.

Empl. minii camph. Ung. ad serophulos Hufelandi 50.

Pyroleum pini,

Tjære.

Virkning: Expectorans, irritans, antisepticum, antiparasiticum (bronchitis chronica, gangræna pulmonalis, phthisis pulm. cavernosa; eczema chr., impetigo, psoriasis, scabies).

Dosis: I Salve 1 D. til 4 D. Fedt; til Indaanding opheder man den over en Spirituslampe i en Skaal med Til sætning af lidt kulsurt Kali; eller et Par Draaber til 50 gramm. Vand til Indaanding i Pulverisation, eller Opholdsværelsets Atmosfære svangres dermed ved Hjælp af en Goudronnière. (Ung. ad scabiem (Hebra) er pyr. pini, sul-

phur. subl. āā p. 1, saponis vir., ax. porci āā p. 2, cretæ albæ p. 2/3).

Ung. pyrolei pini. Aqva picea 40.

Pyroleum succini,

oleum succini rectificatum D. 50,

rectificeret Ravolie.

Virkning: Excitans, antispasmodicum (Hysteri).

Dosis: gtt. 2-5 < p. d. i Piller, eller opløst i spir.; men gives nu næsten aldrig alene.

Tr. balsamica aromatica. Spir. antiparalyticus.

Pyroleum succini crudum,

oleum succini crudum D. 50,

raa Ravolie. Til udvortes Brug.

Pyroleum succini. Spir. paralyticus 50. Pil. gumm. 50. Spir. antiparalyticus M. 69.

Radix alkannæ,

Alkannerod.

Virkning: Colorans til at farve Salver med.

Cer. ad labia. Tr. bals. arom.

Radix althaeae,

radix althaeæ D. 50,

Althæarod.

Virkning: Emolliens, demulcens (ved betændelsesagtige, catarrhalske Tilstande af Luftveiene, Urin- og Kjønsganerne).

Dosis: 10-15 gramm. til 250 gramm. Dec. eller Infus; bedst og billigst dog som koldt Infus; udvortes til Fomentation, Gurglevand, Injection.

Syr. althaeae. Ung. althaeae. Spec. pro thea pecl. Dec.

pectorale n. fr. B. Spec. pro cat. em. Spec. pro thea dem.
Thea dem. n. fr. v. Mass. pil. de cynogl. Pasta alth. 50.
Pulv. pect. n. c. Med. Dec. pect. M. 69. Dec. rad. alth.
M. 69. Pil. merc. c. opio M. 69. Spec. pro thea dem. M.
69. Spec. pro th. pect. M. 69.

Radix angelicæ,

Angelikarod.

Virkning: Excitans, stomachicum, expectorans, dia-
phoreticum (fb. typhoidea og acute Exantherer med adyna-
miske Tilfælde, bronchitis chr., Dyspepsi, Diarrhe efter
Typhoidfeber); næsten obsolete.

Dosis: 25 gramm. til 250 gramm. Infus.

Tr. angelicæ 50. Extr. angel. 40.

Radix armoraciæ recens,

Peberrod.

Virkning: Stomachicum, antiscorbuticum, diureticum,
emmenagogum; rubefaciens (Skjorbug, Vattersot, Amenorrhoe;
Tungelamhed).

Dosis: 30 gramm. til 750 gramm. Infus med Vand,
Øl (at bruge i et Døgn) eller Vin; eller den udpressede Saft
af den friske Rod 1 Theskefuld til en Spiseskefuld p. d.;
udvortes lægges den friske, revne Rod paa Huden som rube-
faciens; som Tyggemiddel Roden i Substans.

Radix artemisiæ,

radix artemisiæ vulgaris D. 50,

Graabynerod.

Virkning: Excitans, antispasmodicum (eclampsia inf.,
epilepsia).

Dosis: 25 gramm. til 250 gramm. Infus eller i Form
af pulvis nuper paratus 1 Theskefuld 2-3 de die.

Radix bardanæ,

Burrerod.

Virkning: Diaphoreticum, diureticum, antidyserasicum
(chronisk Hududslet).

Dosis: 30 gramm. til 750 gramm. Decoct eller Infus.

Spec pro dec. lign. Dec. lign. M. 69. Spec. pro dec.
lign. M. 69. Spec. pro thea am. M. 69.

Radix belladonnæ,

Belladonnarod.

Virkning: Sedativum, antispasmodicum, mydriaticum
(Neuralgier, Cardialgi, Kighoste, Asthma, incontinentia urinæ,
Nyrestenscolik, Ischuri, chorea, spastisk Strictur af uterus,
urethra, rectum, smertefulde Svulster og Saar; Øiensygdomme).

Dosis: (Maximaldosis 20 ctgrm.) 1,5-3-15 ctgrm. p. d.
2 de die; til Børn 5-15 milligrm. p. d. Pulver eller Piller;
til Klyster 0,5-1 gramm. til 125 gramm. inf.; til Fomenta-
tion 10 gramm til 250 gramm. inf.; til Injection 5-8
gramm. til 250 gramm. Infus.

Pil. narcoticæ 40. Troch. bell. proph. n. fr. B.

Radix columbo,

Kolumborod.

Virkning: Emolliens, tonico-amarum (chronisk atonisk
Diarrhe, Dysenteri, Hæmorrhoidaltilfælde).

Dosis: 15-30 gramm. til 250 gramm. Decoct (Diarrhe);
tilberedt som Infus med lunkent Vand virker det som tonico-
amarum.

Dec. columbo n. c. Med. Dec. rad. columbo M. 69.

Radix cynoglossi,

Hundetungerod.

Virkning: Emolliens.

Mass. pil. de cynoglosso. Dec. pect. n. c. Med.

Radix gei urbani,

radix caryophyllatæ D. 50,

Nellikerod.

Virkning: Aromatico-tonicum (chronisk Diarrhe, Dysenter, Diarrhe efter Typhoidfeber).

Dosis: 15 gramm. til 250 gramm. Infus eller i Pulver
I Theskefuld 2-3 d. d.

Pulvis obstipans n. fr. B. & A. S. 69.

Radix gentianæ,

Enzianrod.

Virkning: Amaro-tonicum (Dyspepsi, arthritis).

Dosis: 15 gramm. til 250 gramm. Infus.

Extr. gentianæ. Tr. gentianæ. Tr. amara. Tr. chinæ comp.
Tr. rhei amara. Vinum rhei. Inf. amaro-kalinum n. fr. B. &
A. S. 69.

Radix glycyrrhizae echinatae,

radix liqviritiæ s. glycyrrhizæ D. 50,

russisk Lakritsrod.

Virkning: som r. glycyrrhizae glabrae, men af bedre Smag (kostbarere); naar der forskrives r. glycyrrh. pulv., skal Apothekeren levere denne.

Dosis: i Pulver 0,5-1-2 gramm.; 15 gramm. til 250 gramm. Infus.

Pasta glycyrrh. Spec. pro dec. lignorum. Spec. pro thea demule. Spec. pro thea pect. Pulv. liqvir. comp. A. S. 69. Pulv. pector. 40. Pulv. fol. uvæ ursi dulcis n. fr. T. Pil. jod. ferr. Syr. glyc. 40. Dec. pect. n. fr. B. Dec. uvæ ursi ep. n. fr. B. Dec. lign. M. 69. Dec. pect. M. 69. Dec. uvæ ursi ep. M. 69. Spec. pro dec. lign. M. 69. Spec. pro th. dem. M. 69. Spec. pro th. pect. M. 69.

Radix glycyrrhizae glabrae,

spansk Lakritsrod.

Virkning: Demuleens, expectorans (Bronchialcatarrh) corrigens for Salte, arnica, Infuser og Decoeter; constituens for Pulvere og Piller.

Dosis: 0,5-1-2 gramm. i Pulver; 15 gramm. til 250 gramm. Infus; til Thespecies (med r. althæae āā); til Decoeter sættes den sub finem coctionis.

Radix inulæ,

radix helenii s. enulæ D. 50,

Alantrod.

Virkning: Excitans, stomachicum, expectorans (Dyspepsi, chronisk Bronchialeatarrh, Hæmorrhoidalbesværligheder).

Dosis: 1-2 gramm. p. d. i Pulver, Piller eller vandigt eller vinøst Infus 15-30 gramm. til 250 gramm. col.; bedst i Decoet 10-30 gramm. til 250 gramm., hvoraf en Spiseskefuld hver 2den Time.

Pil. picæ 72. Extr. enulæ 40.

Radix ipecacuanhæ,

Brækrod.

Virkning: Diaphoreticum, expectorans, emeticum, antispasmodicum (Indigestion, Overfyldning af Luftveiene med Slim, chronisk Bronchitis, croup, Kighoste, Asthma, Diarrhe, Dysenteri).

Dosis: (Maximaldosis 2 gramm.); i refract Dosis 2-3 etgrm. (antisp.), 3-10 etgrm. (diaph., expect.), 10-15 etgrm. (nauseosum) 4-6 de die i Pulver, Piller eller Infus 1-2-3 gramm. til 250 gramm. col.; som emeticum 2 gramm. p. d., sjældent paa eengang, bedre i delte Doser af 60 etgrm. til 100 etgrm. p. d. i Pulverform, gjentaget hvert Kvarter indtil

Virkning eller et Infus af 8 gramm. til 100 gramm. col. med Tilsætning af 15 gramm. syr. sacchari, heraf 1 Spiseskefuld hver 10de Minut indtil Virkning.

Undgaa at tilsætte Syrer, Tannin, Metalsalte, Jodkalium.

Pulvis ipecac. theb. Vinum ipecac. Trochisci ipec. Inf. ipecac A. S. 69. Troch. ipecac. theb. A. S. 69. Pulv. emeticus 40. Plv. pectoralis antisp. 40. Pil. obstipantes A. S. Pil. Winslovii n. c. Pil. aloes cum rheo M. 69. Pulv. em. cum ipec. M. 69. Pulv. Doveri M. 69. Pulv. pect. antisp. M. 69.

Radix pimpinellae,

radix pimpinellæ albæ D. 50,

Pimpinellerod.

Virkning: Excitans, expectorans (laryngitis chr.; angina); bruges nu mest som tr. pimpinellae.

Dosis: 15 gramm. til 250 gramm. Infus, hvoraf en Spiseskefuld 4-6 d. d.; til Gurglevand 50 gramm. til 300 gramm. col.

Tr. pimpinellae.

Radix pyrethri,

Bertramrod.

Virkning: Irritans, sialagogum til udvortes Brug (paralysis lingvae, angina tonsillaris & gangrænosa, relaxatio uvulae).

Dosis: I Substans som masticatorium; til Gurglevand 30 gramm. til 250 gramm. Infus.

Tr. pyrethri.

Radix ratanhiaë,

Ratanhierod.

Virkning: Adstringens (chronisk Diarrhe, Dysenteri, Cholera, passiv Metrorrhagi, hæmoptysis, hæmaturia, chronisk

Blærecatarrh og Lungecatarrh; udvortes mod scorbutisk Tandkjød (tr. ratanhia), Hæmorrhagier, Slimflød, fissura ani).

Dosis: 15-30 gramm. til 220 gramm. Decoct med Tilsætning af aq. cinnamomi spir. 30 gramm, hvoraf en Spiseskefuld 4-6 d. d.; til gargarisma 50 gramm. til 300 gramm. Decoct (med tr. myrrhæ) eller til Injection (i vagina).

Undgaa at tilsætte Mineralsyrer, Metalsalte, cort. chinæ.

Extr. ratanhia. Tr. ratanhia. Dec. rad. rat. M. 69.

Radix rhei,

radix rhabarbari moscovitici D. 50,

Rhabarberrod.

Virkning: Amaro-adstringens, tonicum, digestivum, cholagogum; laxans (atonisk Dyspepsi, pyrosis, Cardialgi, catarrhalsk Diarrhe, Gulsot, Forstoppelse).

Dosis: I refract Dosis 3-10-30 ctgrm. (efter Alderen); som laxans 1-2 gramm., om fornødent gjentaget 2-3 Gange; den gives i Pulver eller Piller; til Afføring gives i Almindelighed en Theskefuld af den smaat skaarne Rod.

Extr. rhei. Inf. rhei-alkalin. Pulv. magnesiæ cum rheo. Plv. digestivus. Syr. rhei. Tr. rhei amara. Vinum rhei. Plv. eccoproticus n. fr. v. & n. c. Plv. eccoprot. mitis n. fr. T. Plv. resolvens saponaceus n. fr. B. Plv. hæmorrhoidalis n. fr. v. & A. S. 69. Pulv. ferri cum rheo n. fr. T. Plv. ferri subcarb. cp. n. c. Ch. Plv. rhei salinus 40. Plv. magnesiæ cum rheo A. S. 69. Pil. Winslovii n. c. Pil. laxantes felleæ A. S. 69. Pil. aloet. cum rheo A. S. 69. Elect. mundific. 40. Pil. aloes c. rheo M. 69. Pulv. dig. M. 69. Pulv. eccopr. M. 69. Pulv. rhei-sal. M. 69.

Radix sarsaparillae,

radix sarsaparillæ de Honduras D. 50,

Sarsaparillerod.

Virkning: Diaphoreticum, diureticum, antidyscrasicum
(chroniske Hududslet, secundær og tertiær Syphilis).

Dosis: 30-60 gramm. til 750 gramm. koldt Infus d. d.
(r. sars. grosse pulv. 30-60 gramm., inf. per displacement
aq. comm. frig. q. s. ad rem. col. 750 gramm.).

Dec. mundificans n. fr. v. Dec. Zittm. fort. & mit. 50.
El. mundif. 40. Extr. sars. 40.

Radix sassafras,

lignum sassafras D. 50,

Sassafrasrod.

Virkning: Diaphoreticum, diureticum, antidyscrasicum
(chroniske Hududslet).

Dosis: 30 gramm. til 750 gramm. Decoct eller Infus.
Spec. pro dec. lign. Dec. mundificans n. fr. v.

Radix senegae,

Senegarod.

Virkning: Expectorans (chronisk Lungecatarrh, i det
senere Stadium af acut Bronchitis og Pneumoni hos gamle,
svage Individider).

Dosis: 20 gramm. til 250 gramm. Infus eller Decoct.
Syr. senegae. Inf. senegae comp. 50. Dec. cort. chinae
c. senega 50. Dec. chinae cum senega A. S. 69. Dec.
cort. chinæ c. senega M. 69. Inf. senegæ c. nitr. kal. M. 69.

Radix serpentariae,

virginiansk Slangerod.

Virkning: Excitans (Typhus adynamicus).

Dosis: 15-25 gramm. til 250 gramm. Infus.
Tr. rhei amara. Tr. sacra 50. El. theriac. 40.

Radix taraxaci,

Løvetandrod.

Virkning: Amaro-solvens (chron. Leversygdomme).

Dosis: 30 gramm. til 250 gramm. Decoct; bedre er dog succus expressus radice recentis cum foliis, hvoraf 30-100 gramm. om Morgenen i Foraarstiden (alene eller med fol. menyanthis, nasturtium aqvatium).

Extr. taraxaci: Dec. res. n. fr. v. Dec. tar. cp. M. 69.

Radix valerianae,

radix valerianæ minoris s. sylvestris D. 50,

Baldrianrod.

Virkning: Excitans, carminativum, antispasmodicum, anthelminthicum (febr. typhoidea, Hysteri, Hypochondri, colica flatulenta & uterina, ascaris vermicularis, polydipsia).

Dosis: 30 gramm. til 250 gramm. Infus (macereres i 6-12 Timer) eller 30-50 etgrm. af Pulveret.

Tr. valer. Tr. valer. æth. Inf. valer. n. fr. B. Inf. valer. c. nitro n. fr. T. Inf. valer. acidum n. fr. T. Inf. valer. dulcis n. fr. T. Inf. tonico-nervinum n. fr. T. Inf. vermifugum n. fr. B. & A. S. 69. Spec. antihyst. n. fr. B. & A. S. 69. Inf. valer. comp. A. S. 69. Plv. refrigerans antispast. 40. Extr. val. 50. Tr. val. amm. 50. El. anth. 50. Zinc. valer. 50. Inf. val. M. 69. Inf. val. cp. M. 69. Inf. vermif. M. 69.

Ramuli sabinae,

folia sabinæ D. 50,

Sevenbom.

Virkning: Diureticum, emmenagogum, ecboicum; ud-

vortes irritans (atonia uteri, amenorrhoea; Condylomer, Spanskfluesaar).

Dosis: (Maximaldosis 130 ctgrm.) 30-50-100 ctgrm. i Pulver 3-4 d. d.; bedre i Infus 10-15-30 gramm. til 250 gramm. col.; udvortes som Strøpulver.

Ung. sabinæ. Inf. emmenagogum n. fr. B.

Resina benzoe,

benzoe s. asa dulcis D. 50,

Benzoë.

Virkning: Excitans, udvortes til Røgelse.

Acidum benzoicum. Tr. benzoës. Tr. benzoës comp.

Spec. fumales.

Resina colophonium,

colophonium D. 50,

Kolophon.

Virkning: mildt irritans, hæmostaticum (Blødning efter ubetydelige Læsioner); udvortes i Plastre.

Ung. bas. nigr. Ung. canth. vir. Empl. conii. Pulvis stypticus 50.

Resina guajaci,

resina guajaci nativa D. 50,

Guajakharpix.

Virkning: Excitans, diureticum, antidyscrasicum (Gigt, Rheumatisme, Hæmorrhoidaltilfælde).

Dosis: 30-100 ctgrm. p. d. 3-4 d. d. i Piller, Pulver, Emulsion, Latværg, (res. guajaci 1 gramm., sem. myristicæ 1,5 gramm., r. rhei 2 gramm., bitartrat. kalici 7 gramm., sulph. sublim. 15 gramm., mel. dep. 100 gramm., m. f. elect. 1 Theskefuld 3-4 d. d.).

Tr. guaj. Tr. guajaci ammoniacata. Pil. æthiopicæ 50.
 Pil. antarthriticæ 40. Pil. alter. Plummeri 40. Pil. guajaco-
 antimoniales A. S. Pulv. antirheumaticus n. fr. B. Emulsio
 guajaci 50. Sapo guaj. 40. Emuls. res. guajaci M. 69.

Resina jalapae,

Jalapharpix.

Virkning: Aperiens (Forstoppelse).

Dosis: 15-30 etgrm. p. d., gjentaget efter 3-6 Timer,
 Pulver eller Piller.

Massa pilularum resinae jalapae. Pil. purgantes cum
 hydrargyro 50.

Resina mastix,

mastix D. 50,

Mastix.

Virkning: Excitans, udvortes til Røgelse (arthritis &
 rheumatismus chr.).

Empl. canth. cum euphorbio. Empl. manus dei. Pulv.
 pro suffitu n. fr. v.

Resina pini flava,

resina communis D. 50,

almindelig Harpix.

Virkning: mildt irritans, udvortes i Plastre.

Empl. adhæs. E. citr. E. stict. Ung. bas. fl.

Rhizoma calami,

radix calami aromatici D. 50,

Kalmusrod.

Virkning: Aromatico-amarum, excitans, stomachicum
 (atonisk Dyspepsi, Flatulents); corrigens eller adjuvans for
 martialia, china, sulphas chinicus, rheum, laxantia.

Dosis: 15 gramm. til 250 gramm. Infus, i Piller, Pulver.
 Tr. calami. Vinum chinæ ferratum. Inf. tonico-nervi-
 num n. fr. T. Inf. calami M. 69. Inf. val. cp. M. 69.

Rhizoma curcumæ,

radix curcumæ D. 50,

Gurgemeierod.

Virkning: Colorans for Salver.

Ungv. major. Ungv. nervinum.

Rhizoma filicis,

radix filicis D. 50,

Bregnerod.

Virkning: Anthelminthicum (Bændelorm).

Dosis: 4-8 gramm. (1-2 til Børn) i Pulver, som tages
 tidlig om Morgenen og efter en Times Forløb gjentages; 4
 Timer efter et catharticum (ol. ricini, tub. jalapæ). Til De-
 coct 30-60 gramm. til 250 gramm. col. for en Dag. Den
 Rod, som ikke er frisk nok, er uvirksom. Som Forberedelses-
 eur nyder Patienten Dagen forud kun Kjødspiser, Kjødsuppe,
 Skinke, Sildesalat, Løg.

Dec. filicis n. fr. B. Extr. fil. mar. æth. 50.

Rhizoma galangæ,

radix galangæ D. 50,

Galangarod.

Virkning: Excitans, carminativum (atonisk Dyspepsi,
 Flatulents); corrigens for amara og adstringentia.

Dosis: 50-100 ctgrm. p. d. Pulver, Piller; Infus af
 25 gramm. til 250 gramm. col.

Tr. aromatica. Tr. aromatica acida.

Rhizoma graminis,

radix graminis D. 50,

Græsrod.

Virkning: Demulcens, solvens (mb. chron. hepatis).

Dosis: 60 gramm. til 500 gramm. Decoet for en Dag.

Dec. resolvens 40. Extr. graminis. Dec. tar. cp. M. 69.

Rhizoma iridis,

radix iridis florentinæ D. 50,

Violrod.

Virkning: Expectorans; udvortes odoriferum, ad pilulas conspergendas.

Dosis: 0,5-1-2 gramm. i Pulver, Piller.

Pulv. pectoralis 40. Pulv. pectoralis resolvens 40.

Pulv. dentifricius ruber 50. Pulv. sternutatorius 40.

Rhizoma veratri,

radix hellebori albi D. 50,

hvid Nyserod.

Virkning: Anvendes kun udvortes. Irritans (Fnat).

Ung. helleboratum.

Rhizoma zingiberis,

radix zingiberis albi D. 50,

Ingefær.

Virkning: Excitans, digestivum, carminativum (atonisk Dyspepsi, Flatulents, chronisk Bronchialcatarrh), corrigens for drastica, amara, Metalsalte.

Dosis: 50-100 ctgrm. p. d. Pulver, Piller, Latværgæ, Infus (15-25 gramm. til 250 gramm. Infus).

Tr. aromatica. Tr. aromatica acida. Syr. sennæ

mannatus. Tr. sacra 50. Syr. zingiberis 40. Pulv. aromaticus 40. Tr. zingiberis 40.

Rotulae menthae piperitae,

Pebermyntekager.

Virkning: Carminativum, analepticum, antispasmodicum (Flatulents, Cardialgi).

Saccharum,

saccharum album D. 50,

hvidt Sukker.

Virkning: mest til pharmaceutisk Brug; constituens for Pulvere.

Syr. sacchari.

Saccharum lactis,

Mælkesukker.

Virkning: Constituens for Pulvere, især ved Anvendelsen af tunge, uopløselige Stoffer, der gives i lille Dosis, og af Extracter, naar de gives i Pulverform.

Sal thermarum Carolinensium artificiale,

Karlsbader-Salt.

Virkning: Catharticum.

Dosis: 15-30-50 gramm. p. d. i Opløsning i Vand eller theskefuldvis sat til inf. sennæ, Mineralvande; som digestivum 1-2 gramm. p. d. 3-4 d. d.

Santoninum,

Santonin.

Virkning: Anthelminthicum (ascaris lumbricoides, oxyuris vermicularis).

Dosis: (Maximaldosis 25 ctgrm.) til Børn efter Alderen 3-15 ctgrm. p. d. i Pulverform eller opløst i ol. ricini; til Børn fra 10-15 Aar 15-25 ctgrm. p. d. Det gives Morgen og Aften i 4 Dage; derpaa et laxans; bedst anvendes det i Form af trochisci.

Trochisci santonini.

Sapo albus oleaceus,

sapo hispanicus albus D. 50,

hvid, spansk Sæbe.

Virkning: Antacidum, diureticum, aperiens; udvortes mundans, mildt irritans; sjældent anvendt indvortes; constituents for Piller (med Tilsætning af nogle Draaber Spiritus).

Undgaa at tilsætte Syrer, sure Salte, Tannin, Metalsalte, chlor. ammonicum.

Pil. Beddoes 40. Empl. saponatum. Spir. saponis camphoratus. Pil. resolv. 40. Pil. res. cum aloe 40. Pil. res. cum rheo 40. Pil. aloet. M. v. Pil. sapon. comp. M. v. Pil. ex asa foet. M. v. Sapo terebinth. 40.

Sapo butyraceus,

sapo e butyro D. 50,

Smørsæbe. Anvendes til Tilberedning af Lin. opodeldoc.

Lin. opodeldoc.

Sapo medicatus,

medicinsk Sæbe.

Virkning: Antacidum, diureticum, aperiens, solvens; udvortes mundans, mildt irritans (chroniske Leversygdomme, Galdesten, Gigt, overskydende Urinsyredannelse, Nyregrus).

Dosis: 30-60-100 ctgrm. p. d., sjældent i Pulver, mest i Piller.

Undgaa at tilsætte Syrer, Tannin, sure Salte, Metalsalte, chlor. ammonicum.

Massa pil. resinæ jalapæ. Pulv. resolvens saponaceus
n. fr. B. Pil. æthiop. 50. Pil. aloeticæ martiales n. fr. B.
Pil. colocynthidum n. fr. B. Pil. ad hydropicos 50. Pil.
seill. 50. Sapo stibiatus 50.

Scammonium,

scammonium aleppense D. 50,
Skammonium.

Virkning: Drasticum, der dog paa Grund af sin inconstante Beskaffenhed er fortrængt af tuber jalapæ.

Dosis: (Maximaldosis 80 ctgrm.) som aperiens 15-30 ctgrm. p. d. nogle Gange daglig; som drasticum 50-60-80 ctgrm. p. d. nogle Gange daglig.

Morsuli purgantes rosati. Pil. purgantes contra tæniam A. S.

Secale cornutum,

Meldrøie.

Virkning: Ecboticum, hæmostaticum (adynamia uteri in partu, metrorrhagia, menorrhagia, hæmoptysis, hæmaturia, galactorrhoea, spermatorrhoea).

Dosis: (Maximaldosis 130 ctgrm.). I Fødslen og i meget farlige Blødninger 60 ctgrm. p. d. gjentaget med $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ Times Mellemrum 3-4 Gange; for at forebygge Brækning kan man tilsætte et Par Draaber æther spirituosus; undertiden tilsættes cortex cinnamomi, semen myristicæ eller opium; til længere Tids Brug 10-30 ctgrm. p. d. 3-4 de die (ofte sammen med fol. digitalis, radix ipecacuanhæ, cortex cinnamomi) i Pulver, Piller, Infus af 5-10 gramm. til 250 gramm. col.; til Klyster et Infus af 10 gramm. til 125 gramm. col.

Extr. secalis cornuti. Pulv. hæmostaticus n. e. Med.
Inf. secalis n. fr. B. & A. S. 69. Syr. secalis A. S. 69.

Semen amygdali amarum s. amygdalæ amaræ,
amygdalæ amaræ D. 50,

bittere Mandler.

Virkning: Sedativum; for Smagens Skyld sættes de som corrigens til Præparaterne af semen amygdali dulce (gastralgia, asthma).

Dosis: Nr. 3-5-10 p. d. flere Gange daglig, eller i Emulsion 5-10-15 gramm. til 200 gramm., hvoraf en Spise-skefuld 4-6 d. d.

Aqua amygdalarum am. conc. Lotio benzoica A. S. 69.
Syr. amygd.

Semen amygdali dulce s. amygdalæ dulces,
amygdalæ dulces D. 50,

søde Mandler.

Virkning: Emolliens, demulcens (catarrhalske Affectioner af Digestionsveiene, Urin- og Kjønorganerne).

Dosis: 30 gramm. til 250 gramm. Emulsion; ligeledes til udvortes Brug i Emulsion.

Emulsio amygdalarum. Syr. amygdalarum. Oleum amygdalarum.

Semen cacao,
cacao D. 50,

Kakaobønner.

Virkning: Nutriens, restaurans, emolliens; benyttes therapeutisk ikke i raa Tilstand, men mest i Form af Chocokolade (Anæmi, Tuberculose, Atrophi, Reconvalescents).

Pasta cacao saccharata. Ol. cacao.

Semen calabar s. physostigmatis,

Kalabarbønne.

Virkning: Venenosum, myoticum, anvendes therapeutisk i Form af extr. calabar, tr. calabar.

Dosis: (Maximaldosis 10 ctgrm.) 5-10 ctgrm. de die.
Extr. calabar. Tr. calabar.

Semen colchici,

Tidløsefrø.

Virkning: Diureticum, catharticum (Gigt, Rheumatisme).

Dosis: 5-15 ctgrm. p. d. i Pulver, Piller, men mest som tr. eller vin. colchici.

Undgaa at tilsætte stærke Syrer, kaustiske Alkalier, opløselige Metalsalte, Tannin.

Tr. colchici. Vinum colchici.

Semen cydoniae,

semina cydoniorum D. 50,

Qvædekjerner.

Virkning: Emolliens, demulcens til udvortes Brug.

Dosis: 1-2 D. til 100 D. Vand.

Mucilago cydoniae.

Semen foeni graeci,

Bukkehornfrø.

Virkning: Emolliens, demulcens til udvortes Brug.

Ung. althaeae.

Semen hyoscyami,

Bulmeurtfrø.

Virkning: Sedativum, anodynum, antispasmodicum; de ere svagere end fol. hyoscyami og anvendes mest mod Colik og andre smertefulde og krampagtige Underlivsaffectio-
ner.

Dosis: (Maximaldosis 20 ctgrm.) 5-10-20 ctgrm p. d. i Pulver, Piller, bedst i Emulsion 3-5 gramm. til 250 gramm. col., hvoraf en Spiseskefuld hver 2den Time.

Massa pil. de cynoglosso. Tr. sem. hyoscyami 40.

Semen lini,

Hørfrø.

Virkning: Emolliens, demulcens (catarrhalske Affectioner af Urin- og Kjønsorganerne).

Dosis: 30 gramm. sem. lini integrorum til 500 gramm. Infus de die, hvoraf en Kopfuld ad Gangen; til udvortes Brug grovt pulveriserede og kogte med Vand eller Mælk til Omslag (blandede med āā p. fol. hyoseyami og hb. conii).

Spec. pro thea dem. Spec. pro catapl. emoll. Ungv. althaeae.

Semen myristicae,

nuces moschatæ D. 50,

Muskatnødder.

Virkning: Excitans, carminativum (atonisk Dyspepsi, Flatulents, Kolik, Brækning); corrigens for amara, drastica, secale cornutum.

Dosis: 30-50 ctgrm. p. d. i Pulver, Piller eller vinøst Infus.

Semen nucis vomicae,

nuces vomicae D. 50,

Rævekager.

Virkning: Tonico-amarum, antiparalyticum (atonisk Dyspepsi, Cardialgi, Diarrhe, Dysenteri, Paralyse, især naar den maa føres tilbage til en Rygmarvslidelse og der hverken er Betændelse eller nogen grovere mekanisk Læsion tilstede, altsaa paralysis ex venere, alcoholica, saturnina, toxica, rheumatica, hysterica, epileptica; tremor hos Drankere og Metalarbeidere, Lamhed af Blæren, incontinentia urinæ og ischuria, Uvirksomhed af Tarmkanalens Muskulatur og derpaa beroende Forstoppelse, spermatorrhoea).

Dosis: (Maximaldosis 60 ctgrm). 5-10-30 ctgrm. p. d.

1-2-3 de die Pulver eller Piller; mest som extr. & tr. nucis vomicæ. Kommer der Convulsioner eller tetanisk Krampe, maa der strax høres op med Brugten; Myrekryben og prik-kende Fornemmelser opfordre til at blive staaende ved den anvendte Dosis eller formindske den.

Extr. nucis vomicæ. Tr. nuc. vom. Pil. anticard. n. fr. B.

Semen quercus,

glandes quercus D. 50,

Agern. Til pharmaceutisk Brug.

Semen quercus tostum.

Semen quercus tostum,

glandes quercus tostæ D. 50,

Agernkaffe.

Virkning: Excitans, nutriens, adstringens (Scrophulose, Rhachitis, Atrophi, chronisk Diarrhe).

Dosis: 2-3 Theskefulde infunderes med en lille Kontorkopfuld kogende Vand og behandles som Kaffe med Til-sætning af Sukker og Fløde.

Semen sabadillæ,

Lusefrø.

Virkning: Bruges som Folkemiddel mod Lus i Form af Strøpulver (alene eller blandet med Svovlpulver) eller Decoet af 15-30 gramm. til 250 gramm. col.

Ung. contra pediculos 72.

Semen sinapis albae,

hvid Sennep.

Virkning: Aperiens, stomachicum (Forstoppelse, Dyspepsi, catarrhus chron. ventriculi, Svimmelhed).

Dosis: De hele Korn theskefuldvis eller spiseskefuldvis, undertiden Infus 5-10 gramm. til 250 gramm. col.

Semen sinapis nigrae,

sort Sennep.

Virkning: Stomachicum, antiscorbuticum; udvortes rubefaciens; indvortes anvendes den som diætisk Middel (dyspepsia torpida, catarrhus chr. ventriculi, Flatulents, Appetitløshed, Skjørbug).

Undgaa af tilsætte stærke Syrer, Eddikesyre, opløselige Metalsalte, Alcohol, kogende Vand.

Ung. sinapinum.

Semen stramonii,

Pigæblefrø.

Virkning: Sedativum, antispasmodicum (Asthma).

Dosis: (Maximaldosis 30 ctgrm.) 3-5-10 ctgrm., Pulver eller Piller, men bedst i Emulsion 60-120 ctgrm. indtil 2-3 gramm. til 200 gramm. col.

Tr. stramonii.

Sericum adhæsivum,

emplastrum adhæsivum anglicum D. 50,
engelsk Hefteplaster.

Virkning: Agglutinans, defensivum.

Serum lactis aluminatum,

serum lactis aluminosum D. 50,
alunholdig Mælkevalle.

Virkning: Adstringens (diarrhoea chr., tuberculosis pulmonum med hæmoptysis eller diarrhoea, Tarmblødning i f. typhoidea).

Dosis: 150-300 gramm. p. d. flere Gange d. d.

Sevum ovillum,

Faaretalg.

Virkning: Udvortes constituens for Salver og Cerater.

Solutio acetatis ammonici,

(spiritus Mindereri),

liqvor ammonii acetici D. 50,

Minderers Spiritus.

Virkning: Excitans, diaphoreticum, diureticum (acute eller chroniske rheumatiske og catarrhalske Affectioner, exanthematiske Febre, hydrops scarlatinus; udvortes mod Contusioner, Extravasater, hydarthrus).

Dosis: (1 gramm. indeholder 20 ctgrm. acet. ammoniacus) 2-4 gramm. p. d. 3-4 de die.

Undgaa at tilsætte de ætsende og kulsure Alkalier, Syrer, sure Salte, Metalsalte.

Mixt. diapnoica 40 & A. S. 69. Spir. Mindereri cum laudano n. fr. T. Mixt. diapnoica M. 69.

Solutio ammoniaci,

liqvor ammonii caustici, ammoniacum causticum, spiritus salis ammoniaci caustici D. 50,

Ammoniakvand, Salmiakspiritus.

Virkning: Excitans, diaphoreticum, antispasmodicum, diureticum, expectorans, antacidum; udvortes irritans, rube-faciens, vesicans; sjeldent til indvendig Brug (narcotismus, cholera; Syre i de første Veie, Flatulents, Kolik, Diarrhe eller Forstoppelse hos spæde Børn; chronisk Bronchialcatarrh; rheumatismus muscul. & chron.; med Undlagelse af de 2 førstnævnte Tilfælde foretrakkes ellers et af dens Præparater); udvortes (Rheumatisme, Neuralgier, Asthma, Kirtelsvulster, Contusioner,

Slangebid, Asphyxi, Beruselse, narcotismus) alene eller blandet med en fed Olie, eller som Lugtemiddel.

Dosis: (1 gramm. indeholder 10 ctgrm. vandfri Ammoniak) gtt. 5-10-15 tilstrækkelig fortyndet med Vand, Havresuppe, Saleb eller Mælk.

Undgaa at tilsætte Syrer, sure Salte, Metalsalte, Alun, Alkaloidernes Salte.

Lin. ammoniacatum. Lin. ammon. camph. Lin. opodeldoc. Spir. antiparalyticus. Sol. ammon. spir. Spir. ammoniacatus anis. Tr. guajaci ammoniacata. Lin. ammon. M. 69. Lin. amm. camph. M. 69. Lin. res. M. 69. Spir. antipar. M. 69.

Solutio ammoniaci spirituosa,

liqvor ammonii vinosus, spiritus salis ammoniaci vinosus D. 50, Ammoniakspiritus.

Virkning: som sol. ammoniaci.

Dosis: (1 gramm. indeholder 5 ctgrm. vandfri Ammoniak) gtt. 10-20-30 p. d. 3-4 de die tilstrækkelig fortyndet med Vand eller Mælk.

Liq. antirheum. comp. n. fr. B. & A. S. 69. Tr. val. ammon. 50.

Solutio arseniatis natrici,

solutio natri arsenicici (loco solutionis arsenicalis Pearsoni), opløst arseniksurt Natron.

Virkning: Alterans, antispasmodicum, antitypicum (chroniske Hudsygdomme, psoriasis, eczema, intermittens, asthma, Neuralgier).

Dosis: (Maximaldosis gtt. 50) 1 gramm. = gtt. 16 indeholder 2 milligrm. arseniksurt Natron. Gtt. 20-30-50 <.

Solutio carbonatis kalici,

loco liqvoris kali carbonici D. 50,
opløst kulsurt Kali.

Virkning: som carbonas kalicus; antacidum, diureticum.

Dosis: (1 gramm. indeholder 20 ctgrm. vandfri kulsurt Kali) gtt. 10-30 < (til Børn gtt. 3-10) tilstrækkelig fortyndet med Vand eller Mælk; ofte gives det i aq. cinnamomi eller med $\bar{a}\bar{a}$ acetum scillæ.

Tr. antirachitica n. fr. v.

Solutio chloreti ferrici,

loco liqvoris ferri muriatici oxydati, olei Martis, liqvoris styptici Loffii D. 50,
opløst Jerntvechlor.

Virkning: som chloretum ferricum. Tonicum, roborans, adstringens, hæmostaticum; udvortes adstringens, hæmostaticum, causticum.

Dosis: (Maximaldosis gtt. 15) 1 gramm. indeholder c. 50 ctgrm. chloretum ferricum. Gtt. 8-10-15 p. d. 3-4 de die; udvortes alene eller fortyndet med Vand; saaledes til Injection 15-30 gramm. til 500 gramm. Vand.

Solutio chloreti ferrici spirituosa,

tinctura ferri muriatici D. 50,

Jernchlorid-Draaber.

Virkning: Tonicum, roborans; som chloretum ferricum (erysipelas faciei, ischuria spastica, enuresis, chronisk Diarrhe).

Dosis: gtt. 15-20-30 p. d. 3-4 de die.

Tr. antienuretica A. S. 69.

Solutio chloreti ferrici spirituoso-ætherea,
spiritus sulphurico-æthereus martiatus, liqvor anodynus
martialis D. 50,

jernholdige Hoffmans-Draaber.

Virkning: som en Blanding af chloretum ferricum og æther spirituosus (Svækkelsestilstande efter Excesser in Venere; i Reconvalentsen efter fb. typhoidea eller andre betydelige Sygdomme; Hysteri, Hypochondri, atonisk Dyspepsi, Flatulents).

Dosis: gtt. 10-20-30 p. d. 3-4 d. d. paa Sukker, i aq. cinnamomi spir.; tilsat Mixturer 5-10 gramm. til 200 gramm.

Solutio chloreti stibici,

liqvor stibii muriatici (loco butyri antimonii) D. 50,
Spydglands-Smør.

Virkning: Causticum; dets Ætsvirkning lader sig ikke begrænde; det nærmer sig mest chloretum zincicum som Ætsmiddel, men bruges kun meget sjældent (Bid af gale Hunde, Slangebids, pustula maligna, Chanker, lupus, Vorter, Condylomer). Det anbringes med en Asbestpensel (Chlor. zincici, sol. chloreti stibici $\bar{a}\bar{a}$ 10 gramm., r. althæe pulv. q. s. ut f. pasta mollis. Niemeyer til Ætsning af Chankre).

Solutio chlori,

aqva chlorata, aqva oxymuriatica D. 50,
Chlorvand.

Virkning: Temperans, antisepticum (fb. typhoidea, fb. exanthematicæ, pyæmiæ; apthæ gangrænøsæ, ulcera putrida, leucorrhœa, cancer uteri).

Dosis: 100 D. indeholder mindst 0,32 Chlor; gtt. 20-40-60 p. d., 15-30 gramm. de die, fortyndet med til-

strækkelig Mængde Vand; maa ei tages af en Metalske. Man forskriver det kun i ringe Mængde og i sort Flaske, da det hurtig destrueres, især ved Sollysets Indvirkning; udvortes (hvor dog en Opløsning af Chlorkalk foretrækkes) til Vadskning, Fomentation eller Gurglevand med āā p. aq. d., til Injection 1 D. til 4 D. Vand.

Undgaa at tilsætte saagodtsom Nogetsomhelst, maaske med Undtagelse af syr. sacchari.

Mixt. chlorata. n. fr. B. Linct. oxymuriaticus n. fr. B. & A. S. 69. Mixt. chlorata M. 69.

Solutio hydratis calcici,

aqva calcarizæ, aqva calcis D. 50,

Kalkvand.

Virkning: Antacidum, adstringens; udvortes adstringens, exsiccans (pyrosis, diarrhoea, Dysenteri, Blennorrhoe; Excoriationer, Forbrændinger, chroniske Hudsygdomme, leucorrhoea).

Dosis: 30-100 gramm. p. d. i Mælk eller Kjødsuppe, 150-500 gramm. de die.

Undgaa at tilsætte Syrer, de fleste Salte, Tannin; ogsaa Luften maa holdes borte.

Aqva mercurialis nigra. Aqva phagadænica. Lin. ad ambustiones 40. Aqv. merc. nigra M. 69. Aqv. phag. M. 69. Lin. ad amb. M. 69.

Solutio hydratis kalici,

liqvor kali caustici D. 50,

Kalilud.

Virkning: = hydras kalicus; undertiden anvendt som causticum ved forgiftede Saar; hyppigere anvendes den fortyndet med Vand.

Dosis: (1 gramm. indeholder 20 ctgrm. hydras kali-

cus) sjældent indvortes gtt. 2-4-6 p. d.; udvortes 1-5 D. til 250 D. Vand til Injection; til Fomentation 1-5 D. til 100 D. Vand; til Vadskning 1 D. til 10 D. Vand; 30-50 gramm. til et Fodbad; 150-500 gramm. til et Helbad.

Solutio hydratis natrici,

Natronlud.

Virkning og Brug som hydras kalieus.

Dosis: (1 gramm. indeholder 20 etgrm. hydras natri-cus) gtt. 5-10-15 p. d. i tilstrækkelig Mængde Mælk eller Kjødsuppe; udvortes til Fomentation 1-5 D. til 100 D. Vand, til Vadskning 1-2 D. til 10 D. Vand; til et Fodbad 30-50 gramm., til et Helbad 150-500 gramm.

Solutio jodi spirituosa,

tinctura jodi D. 50,

Jod-Draaber.

Virkning og Brug som jodum; udvortes irritans, causticum. Anvendes til parenchymatøs Injection i Kirtelsvulster etc. med en Pravaz Sprøite for at fordele dem.

Dosis: (Maximaldosis gtt. 20) gtt. 5-10-20 p. d. i et slimet Vehikel; udvortes pensles de paa Huden; til Injection blandes de med 4 D. Vand; men, naar man vil have en klar Opløsning, maa man tilsætte jodetum kalieum; de destrueres hurtigt.

Tr. jodii ad injectiones n. e. Mixt. emmenagoga A. S. 69.

Solutio nitratris hydrargyrosi,

liqvor hydrargyri oxydulati nitrici, liqvor Bellosti D. 50, opløst salpetersurt Qvægsølvforilte.

Virkning: Alterans, causticum; bruges meget sjældent indvortes (syphilis); udvortes (Schanker, Condylomer, Excre-scentser, cancrøse og andre Saar, forgiftede Saar).

Dosis: gtt. 1-2-3 p. d.

Solutio subacetatis ferrici,

liquor ferri acetici D. 50,

eddikesure Jerndraaber.

Virkning: Tonicum, roborans, restaurans, adstringens, hæmostaticum (Chlorose, Anæmi); udvortes mod Blødninger, cancrøse og andre Saar. De farve Tænderne stærkt gule.

Dosis: (1 gramm. indeholder 11,4 ctgrm. oxydum ferricum) gtt. 10-20-30 p. d.; til Fomentation eller Injection (ulcera, blennorrhoeæ, fistulæ) 1-2 D. til 10 D. Vand.

Undgaa at tilsætte de ætsende og kulsure Alkalier, Ammoniak, Chlor, Brom, Jod, stærke Syrer, Tannin.

Solutio subacetatis ferrici spir.-æth.

Solutio subacetatis ferrici spirituoso-ætherea,

tinctura ferri acetici ætherea D. 50,

ætheriske eddikesure Jern-Draaber.

Virkning: Tonicum, hæmatopoeticum, excitans (atonisk Dyspepsi, Hysteri, Hypochondri, Reconvalescents af svære Sygdomme).

Dosis: gtt. 20-30-40 p. d. alene eller tilsat Mixture.

Solutio subacetatis plumbici,

acetum saturninum (loco extracti saturni) D. 50,

Blyeddike.

Virkning: Causticum, adstringens, exsiccans til udvortes Brug.

Dosis: Sjældent ublandet (Condylomer); mest fortyndet med Vand 1-2-3 D. til 50 D. Vand.

Sol. subacetatis plumbici diluta. Sol. subac. pl. dil. M. 69.

Solutio subacetatis plumbici diluta,

aqua saturnina D. 50,

Blyvand.

Virkning: Antiphlogisticum, adstringens til uadvortes Brug til kolde eller varme Fomentationer, Vadskninger, Injectioner, (Hudbetændelser, Contusioner, Excoriationer, decubitus, Forbrænding, intertrigo, eczema, Furunkler, leucorrhoea, Ophthalmier).

Solutio sulphatis ferrici,

opløst svovlsurt Jerntveilte. Til pharmaceutisk Brug.

Antidotum arsenici.

Solutio tartratis kalici,

liqvor kali tartarici D. 50,

opløst vinsurt Kali.

Virkning: som tartras kalicus; temperans, diureticum, aperiens, solvens (plethora abdominalis).

Dosis: gtt. 30-40-60 p. d. eller mere.

Tr. aperiens n. fr. v. Tr. aperiens amara n. fr. v.
Mixt. aperiens aloetica n. fr. B.

Species fumales,

Røgelse. Tjener til vellugtende Røgninger.

Species pro cataplasmate emollienti,

species emollientes D. 50,

blødgjørende Urter. Sættes til blødgjørende Omslag.

Species pro decocto lignorum,

Urter til Træ-Dekokt.

Virkning: som lignum guajaci.

Dosis: Decoct af 60 gramm. til 750 gramm. col.
de die.

Species pro thea amara,

thea amara D. 50,

bitter The.

Virkning: Laxans, diureticum, antidyscrasicum.

Dosis: 1 Spiseskefuld infunderes med en Kontorkop
kogende Vand.

Species pro thea demulcenti,

thea demulcens D. 50,

Slim-The.

Virkning: Demulcens (gonorrhoea).

Dosis: 1-2 Spiseskefulde infunderes med en Kontorkop
kogende Vand.

Species pro thea pectorali,

species pro infuso pectorali D. 50,

Bryst-The.

Virkning: Demulcens, expectorans.

Dosis: 1-2 Spiseskefulde infunderes med en Kontorkop
kogende Vand.

Species pro thea St. Germain,

St. Germain-The.

Virkning: Laxans.

Dosis: 1-2 Desertskefulde infunderes med en Kontor-
kopfuld kogende Vand.

Species resolventes,

fordelende Urter.

Virkning: Bruges til Krydderposer ved rheumatiske
Hævelser, begrændsede Oedemer; Fomentationer.

Fomentum resolvens M. v.

Spiritus alcoholisatus,

spiritus vini alcoholisatus D. 50,

alcoholiseret Vinaand. Bruges terapeutisk kun i fortyndet Tilstand.

Collodium cantharidatum. Lot. cad.-sap. A. S. 69. Lot. carbol. A. S. 69. Lot. hydrac. A. S. 69.

Spiritus ammoniacatus anisatus,liqvor ammonii anisatus, spiritus salis ammoniaci anisatus D. 50
anisholdig Ammoniak-Spiritus.

Virkning: Excitans, antacidum, carminativum, expectorans (Syre i de første Veie, Kolik, Flatulents, chronisk Bronchialecatarrh).

Dosis: gtt. 10-20 p. d. 4-6 d. d.; som Tilsætning til Mixturer, Infuser og Decoeter 5-8 gramm. (inf. senegæ, valerianæ).

Liq. pectoralis.

Spiritus antiparalyticus,

spiritus paralyticus D. 50,

Spiritus mod Lamhed.

Virkning: Irritans, derivans (Contusioner, rheumatiske Muskelsmerter, Lamheder).

Spiritus camphoratus,

spiritus vini camphoratus D. 50,

Kampher-Spiritus.

Virkning: Irritans, resolvens til Indgnidninger og Fontamentationer (Contusioner, Distorsioner etc.).

Undgaa at tilsætte Vand.

Spir. antiparalyticus. Spir. antipar. M. 69. Spir. vini camph. croc. 40.

Spiritus cochleariae,

Kochleare-Spiritus.

Virkning: Antiscorbuticum til udvortes Brug; til Mund-

og Gurglevand ved scorbutisk Affection af Tandkjødet (spir. cochl. 25 gramm., tr. myrrhæ 5 gramm. M. d. s. 1 Theskefuld i lidt lunkent Vand til at skylle Mund og Tænder med).

Spiritus concentratus,

spiritus vini rectificatissimus D. 50,

høist rectificeret Vinaand. Til pharmaceutisk Brug; til therapeutisk Brug anvendes den mest fortyndet med Vand.

Spir. dilutus. Spir. tenuis. Æther. spir. Collodium. Spir. ammon. anis. Sol. ammon. spir. Sol. chlor ferr. spir. Sol. chlor. ferr. spir.-æth. Sol. jodi spir. etc.

Spiritus dilutus,

spiritus vini rectificatus D. 50,

rectificeret Vinaand.

Virkning: Se spir. tenuis.

Dosis: 1 Theskefuld p. d., sjældent alene, mest fortyndet med Vand og tilsat Mixturer; udvortes til Indgnidninger, Fomentationer, Vadskninger, Injectioner.

Sol. subac. plump. dil. Aq. saturnina M. 69. Spir. camph. Spir. sap. camph.

Spiritus lavandulae,

spiritus lavendulæ D. 50,

Lavendel-Spiritus.

Virkning: Excitans, odoriferum, bruges til at stænke i Sygeværelser for at skjule styg Lugt eller for at gjøre Luften vellugtende; hyppigere til Vadskninger og Indgnidninger (Sugillationer, Distorsioner, rheumatiske Muskelsmerter, Lamheder) og som Lugtemiddel ved Besvimelse.

Liqvor arseniitis kalici.

Spiritus saponis camphoratus,

spiritus saponatus, balsamum saponis D. 50,

Sæbe-Spiritus.

Virkning: Irritans, resolvens til Indgnidninger og Vadskninger ved Hævelser, Contusioner, Distorsioner, rheumatiske Muskelsmerter.

Spiritus tenuis,

svag Spiritus.

Virkning: Excitans, stomachicum, carminativum, analepticum; udvortes irritans, derivans, resolvens, hæmostaticum (atonisk Dyspepsi, Flatulents, Kolik, Reconvalescents efter svære Sygdomme, Hysteri, Hypochondri, Synken af Kræfterne som Følge af stærke legemlige Anstrengelser; Besvimelse, Blødninger af Svækkelse; udvortes ved Lamheder, Neuralgier, rheumatiske Smerter, Sugillationer, Distorsioner, pernio, decubitus, Blødninger).

Dosis: 1 Spiseskefuld p. d. alene eller i Mixtur; udvortes alene eller blandet med andre Midler til Indgnidninger, Vadskninger, Fomentationer.

Spiritus vulnerarius,

aqva selopetaria spirituosa D. 50,

Arqvebusade-Vand.

Virkning: Hæmostaticum, irritans, resolvens (ved ubetydelige Blødninger; til Indgnidning ved Sugillationer, Distorsioner etc.).

Spongia cerata,

Vox-Svamp. Til chirurgisk Brug som dilatatorium.

Spongia marina,

Vadskesvamp.

Spongia cerata.

Stigmata croci,

crocus D. 50,

Safran.

Virkning: Excitans, antispasmodicum, emmenagogum; udvortes stimulan, digerens (krampagtige Affectioner hos Kvinder og Børn, Hysteri, Hypochondri, Amenorrhoe).

Dosis: 30-50 etgrm. p. d. (3-5-10 etgrm. til Børn) i Pulver, Piller eller Infus af 2-5 gramm. til 150 gramm. col.; udvortes i Omslag med Hvedebrødskrumme og Mælk mod hordeolum, Furunkler; conspergens for Piller (kostbart).

Liquor. Claudi. Tr. croci. Vin. theb. croc. Empl. de galb. croc. Ungv. acet. plumbici comp. Pil. Rufi 40. Pil. emmenagogæ A. S. & A. S. 69. Mixt. emmenagoga A. S. 69. Empl. oxycroc. 40. Elect. theriac. 40. Syr. croci 50.

Stipites dulcamaræ,

Bittersød.

Virkning: Diureticum, diaphoreticum, expectorans (Rheumatisme, arthritis, scrophuløse Hududslet, chronisk Bronchialeatarrh).

Dosis: 15-20 gramm. til 250 gramm. Infus eller Decoct eller som Thespecies (med hb. violæ tricoloris, rad. sarsaparillæ, lignum guajaci); (elixir anticatarrhale Hufelandi: Extr. cardui bened. 8 gramm. Extr. dulcamaræ 3 gramm. Aq. foeniculi 60 gramm. Aq. amygd. am. conc. 8 gramm. m. d. s. 1 Theskefuld p. d. 4 de die).

Spec. pro dec. lignorum. Spec. corrigentes n. fr. B. Thea mundificans A. S. Dec. mundificans n. c. Ch. Extr. dulcamaræ 50.

Strychnina,

strychninum D. 50,

Strychnin. Næsten uopløseligt i Vand, uopløseligt i æther og spir. alcohol.

Virkning: se nitras strychnicus; bruges næsten ikke.

Dosis: (Maximaldosis 15 milligrm.) 5-10-15 milligrm.; endermatisk 10-15-30 milligrm.; til subcutan Injection egner det sig ikke paa Grund af sin Uopløselighed.

Subnitras bismuthicus,

bismuthum nitricum præcipitatum, magisterium bismuthi D. 50, basisk salpetersurt Vismuthille.

Virkning: Adstringens, antispasmodicum (catarrhus chron. ventriculi, ulcus ventriculi, cardialgia, Brækning, Hikke, Diarrhe).

Dosis: 10-30-60 etgrm. p. d. 2-4 de die Pulver, Piller, trochisci.

Undgaa at tilsætte de ætsende og kulsure Alkalier, Syrer, Svovlmetaller.

Plv. bismuthi A. S. & A. S. 69. Pil. anticard. n. fr. B. Troch. bismuthi A. S. 69.

Succinum,

Rav. Til pharmaceutisk Brug.

Spec. fumales. Pulvis pro suffitu n. fr. v.

Succus sambuci inspissatus,

rob sambuci D. 50,

tyk Hylde-Saft. Anvendes som constituens for Latværges og tilsættes diaphoretiske Mixturer. 30 gramm. til 200 gramm. Mixtur.

Sulphas aluminico-kalicus,

alumen crudum s. vulgare D. 50,

Alun. Opløses i 16 D. Vand.

Virkning: Adstringens (passive Hæmorrhagier, Menor-

rhagier, hæmoptysis, hæmatemesis, enterorrhagia, Slimflod, leucorrhœa, gonorrhœa, Diarrhe, Blodgang; udvortes mod traumatisk og parenchymatøse Hæmorrhagier, stærke Hæmorrhoidalblødninger, angina catarrhalis & diphtheritica, atoniske Saar, prolapsus vaginæ, uteri & recti, Salivation, ophthalmoblenorrhœa).

Dosis: 15-50 ctgrm. p. d. Pulver, Piller, Opløsning; mod indvendige Blødninger ofte opløst i mixt. ac. sulph.; udvortes i Pulverform eller Opløsning, i Øienvand 15-25 ctgrm. til 25 gramm. aq. rosæ; til Injection, Gurglevand eller Fomentation 5-25 gramm. til 500 gramm. Vand; til Indaanding i Pulverisation (catarrhus chr.) 5-20 ctgrm. til 25 gramm. aq. d.

Undgaa at tilsætte de ætsende og kulsure Alkalier, Kalkvand, Blysalte, Æggehvide.

Sulphas aluminico-kalicus ustus. Serum lactis alum. Lapis divinus. Pil. alumin. e. dig. n. fr. B. Plv. cubeb. c. alumine n. c. Ch. Garg. aluminosum n. fr. T. Sol. aluminosa n. c. Dec. cort. quercus e. alumine n. c. Ch. Plv. stypticus 50. Aq. caust. ad cond. (Plenck) n. c. Ch. Garg. alumin. M. 69. Mixt. aluminosa A. S. 69.

Sulphas aluminico-kalicus siccatus,

alumen ustum D. 50,

brændt Alun.

Virkning: Adstringens, causticum (Blødning efter Iglebid, caro luxurians), alene eller blandet med Sukker.

Sulphas atropicus,

svovlsurt Atropin. Let opløseligt i Vand og Vinaand.

Virkning: Sedativum, antispasmodicum, mydriaticum (Neuralgier, Epilepsi, Asthma, Kighoste, enuresis; udvortes i Øiensygdomme, Neuralgier, smertefulde Contracturer).

Dosis: (Maximaldosis 2 milligrm.) 0,5-1 milligrm. < p. d. 1-2 de die i Pulver med Sukker, Piller (5 etgrm. solve in aq. d. q. s. Rad. glye. Extr. glye. āā 5 gramm. f. pil. 100, rad. iridis conspergendæ d. s. 1-2 p. d.) eller Opløsning (1 etgrm. s. in. aq. d. 80 gramm. d. s. 1 Theskefuld = $\frac{1}{2}$ milligrm.); udvortes som mydriaticum 5 etgrm. til 6-30 gramm. aq. d. gtt. 1-2 p. d.; til subcutan Injection 0,5-1-3 milligrm. p. d. (3 etgrm., solve in aq. d. 10 gramm.; gtt. 3 = c. $\frac{1}{2}$ milligrm.); til endermatisk Brug 1 milligrm. p. d. med sacch. 30 etgrm.; til Salve (5 etgrm., camphoræ 30 etgrm., spir. conc. q. s. ad sol., ung. cetacei 5 gramm. m. d. s. at indgnide saameget som af en Bønnes Størrelse).

Sulphas calcicus ustus,

brændt Gips.

Virkning: Til chirurgisk Brug; desinficerende Pulver; se pyroleum lithanthracis.

Sulphas chinicus,

svovlsurt Chinin. Opløses i 800 D. Vand, i 60 D. spir. conc.; letopløseligt i svovlsyreholdigt Vand.

Virkning: Tonicum, antitypicum, antiphlogisticum (Dyspepsi, Chlorose, Anæmi, Reconvalescents, Rheumatisme, Hypertrophii af Milten, især som Følge af Koldfeber; Koldfeber, alle intermitterende Sygdomme, Typhus, Pyæmi, Betændelser, Neuralgier, Convulsioner, Migraine).

Dosis: som tonicum 5-10 etgrm. p. d. 2-4 de die; som antitypicum 60-120 etgrm. i Apyrexien (f. tertiana), 120-200 etgrm. (f. quartana); bedst gives det 60 etgrm. p. d. nogle Timer før den næste ventede Paroxysmus. Det gives i Pulver med Sukker eller aromatica (elæos. menthæ, rhizoma calami, pulv. aromaticus) eller i Piller (med extr. millefolii, menyanth., absinthii) eller i vandig Opløsning med

Tilsætning af nogle Draaber ac. sulph. dil. Det gives ofte sammen med martialia (ferr. red.), digitalis, opium, chlor. morph., camphora. Til endermatisk Brug 10-30 ctgrm. bis d. d.; til hypodermatisk Injection 10-15-20 ctgrm. p. d. umiddelbart før Paroxysmen eller selv under Kuldestadiet; dog egner det sig mindre til subcutan Injection paa Grund af sin ringe Opløselighed og den nødvendige Tilsætning af lidt Svovlsyre. Derfor foretrækker man da ogsaa chloretum chinicum (165 ctgrm. opløst i 10 gramm. aq. dest.), der holder sig klart og uforandret i vandig Opløsning, medens sol. aqvosa af sulphas chin. med tilsat ac. sulph. dil. let decomponeres og skimler. Til Klyster 0,5-1 gramm. med lidt opium til 125 gramm. Vand.

Undgaa at tilsætte de ætsende og kulsure Alkalier, de fleste Metallsalte, Tannin.

Pil. chininicæ n. fr. B. & A. S. 69. Mixt. chinini n. fr. Tr. Mixt. chininica n. fr. B & A. S. 69. Mixt. mucilaginoso chininica n. e. Med. Mixt. acida chininica n. e. Pil. lax. ton. A. S. 69. Mixt. chinica M. 69. Pil. chinicæ M. 69.

Sulphas cuprico-ammoniacus,

cuprum sulphuricum ammoniatum, cuprum ammoniatum D. 50, basisk svovlsurt Kobberveilte-Ammoniak. Opløses i 1½ D. Vand.

Virkning: Tonico-nervinum, antispasmodicum (chorea).

Dosis: (Maximaldosis 15 ctgrm.) 1-3 < 5 ctgrm. p. d. 2-3 d. d. gives i Piller med mica panis albi; Opløsningen i Vand decomponeres let.

Undgaa at tilsætte Syrer, Alkalier, Svovlmetaller.

Pil. cupreæ 40. Pil. cupri ammoniati n. fr. T. Liq. cupri ammoniati n. fr. B.

Sulphas cupricus,

cuprum sulphuricum purum, vitriolum cupri D. 50,
svovlsurt Kobbertveilt. Opløses i $1\frac{1}{2}$ D. Vand.

Virkning: Tonico-nervinum, antispasmodicum, adstringens, emeticum; udvortes adstringens, irritans, causticum (Brækmiddel i croup, laryngitis stridula, bronchitis hos Børn, narcotisk Forgiftning, chorea; chronisk Diarrhe, Dysenteri, Slimflod, gonorrhoea, chron. conjunctivitis, ophthalmia granulosa, causticum ved syphilitiske Excrecentser og torpide Saar, hæmostaticum ved Blødninger).

Dosis: (Maximaldosis 50 ctgrm.) 1-5 ctgrm. p. d. 2-3 d. d.; som emeticum 20-50 ctgrm. (5-15 ctgrm. til Børn), der, om fornødent, maa gjentages; gives i Pulver med Sukker eller amyllum tritici eller i vandig Opløsning med tilsat syr. sacchari. Udvortes i Krystalform eller i Form af Pulver eller Opløsning; til Øienvand 5-15 ctgrm. til 25 gramm. Vand; til Injection 2-5 gramm. til 500 gramm.; til Gurglevand 1,5-2-4 gramm. til 250 gramm. Vand.

Undgaa at tilsætte de ætsende og kulsure Alkalier, Tannin, Æggehvite, Mælk, spirituosa, Bly- og Kalksalte.

Sulphas cuprico-ammoniacus. Lapis divinus. Sol. cupri sulphurici n. fr. T. Liq. sulph. cupr. A. S. 69.

Sulphas ferrosus,

ferrum sulphuricum crystallisatum, vitriolum martis purum
D. 50,

svovlsurt Jernforilte. Opløses i 2 D. Vand.

Virkning: Tonicum, restaurans, hæmatopoeticum, adstringens; desiniciens (passive Hæmorrhagier, Slimflod, chronisk Diarrhe, Chlorose, Anæmi, Orm (ascaris lumbricoides); udvortes mod Slimflod, passive Hæmorrhagier fra rectum, vagina).

Dosis: 5-20 ctgrm. p. d. 2-3 de die, Pulver eller Piller (med aromatica eller amara). Pilules ferrugineuses de Blaud. ph. Gall. = Sulph. ferrosi 30 gramm. Carb. kali siccati 30 gramm. Gi. arab. plv. 5 gramm. Aq. dest. 30 gramm. Syr. sacchari 15 gramm.; f. evaporatione caloris ope pil. 120, in hypocausto siccandæ; Nr. 1 = 25 ctgrm. sulph. ferrosi in hydratocarbonatem conversi. Udvortes 1-10 D. til 500 D. Vand; til et Bad 100-150 gramm.; til Desinfection af Latrinerne benytter man en concentreret Opløsning af sulphas ferrosus venalis.

Undgaa at tilsætte de ætsende og kulsure Alkalier, Bly- og Kalksalte, Tannin; ogsaa Luften maa holdes borte, for at det ikke skal decomponeres.

Mixt. ferri comp. Pulv. cinæ ferratus. Sulphas ferros. sicc. Mixt. acida ferrea n. fr. T. Pil. tonico-nervinæ 40. Pil. aloet. c. marte n. fr. B. Pil. aloet. mart. fortiores A. S. Pil. ctra leucorrhœam A. S. Pil. ferri comp. A. S. 69. Pulv. ferri carb. extemp. n. fr. T. Pil. obstip. mart. A. S. 69. El. ther. 40. Mixt. ferri comp. M. 69.

Sulphas ferrosus siccatus,

tørret svovlsurt Jernforilte. Egner sig især til Ætsning af Condylomer, Excreseentser og Polyper, og som hæmostaticum ved Blødning af ubetydelige Saar.

Sulphas kalicus,

kali sulphuricum depuratum s. arcanum duplicatum s. tartarus vitriolatus D. 50,
svovlsurt Kali. Opløses i 9 D. Vand.

Virkning: Temperans, digestivum; sjældent laxans, da det let giver Koliksmertes (Congestioner, Hæmorrhoider, Under-

livsplethora, Forstoppelse), godt constituens for Pulvere, som indeholde tunge, uopløselige Stoffer og Extracter.

Dosis: 1-2 gramm. p. d. 2-4 de die i Pulver, Piller eller Opløsning; som laxans 15-30 gramm. p. d., som tages delt i flere Portioner med $\frac{1}{2}$ -2 Timers Mellemrum, opløst i Vand eller Kjødssuppe.

Undgaa at tilsætte Baryt-, Kalk-, Bly-, Qvægsølv- og Sølvsalte, Kalkvand, Vinstensyre, Tannin.

Pulv. ipecac. theb. Pulv. jalapæ comp. Elect. anthelminthicum ph. 50.

Sulphas magneticus,

magnesia sulphurica pura s. sal anglicum purum s. sal catharticum amarum D. 50,

svovlsurt Magnesia, engelsk Salt. Opløses i 2 D. Vand.

Virkning: Digestivum, antiphlogisticum, resolvens, laxans (betændelsesagtige Sygdomme, med Undtagelse af Betændelse af Tarmkanalen, Congestioner, Forstoppelse, plethora abdominalis, Leversygdome).

Dosis: Refract Dosis 1-3 gramm. 4-6 d. d. i Opløsning; som laxans 15-50 gramm. i Opløsning, enten paa een Gang eller delt i flere Portioner med $\frac{1}{2}$ -2 Timers Mellemrum; 8-10 gramm. i Opløsning, taget om Morgenen, giver undertiden tilstrækkelig god Aabning; Smagen forbedres ved ac. sulph. dil., syr. acetositis citri, Kaffe.

Sol. salis. angl. n. fr. v. Mixt. pictor. n. fr. B. Mixt. sennæ comp. n. fr. T. Sol. mannato-oleosa 40 & n. fr. v. Inf. sennæ c. sulph. magn. M. 69.

Sulphas natricus,

natrum sulphuricum s. sal mirabile Glauberi D. 50, svovlsurt Natron, Glaubersalt. Opløses i 3 D. Vand.

Virkning: = sulphas magnesicus.

Dosis: som laxans 15-30 gramm. p. d. paa een Gang eller delt i flere Portioner med $\frac{1}{2}$ -2 Timers Mellemrum, gives opløst i Vand, kulsurt Vand, Kjødsuppe, Limonade eller sættes til Mixturer.

Undgaa at tilsætte Kalisalte med svagere Syre end Svovlsyre, Baryt-, Kalk-, Bly-, Qvægsølv- og Sølvsalte.

Sulph. natr. sicc. Mixt. Glauberiana n. fr. B. Inf. sennæ c. sulph. natr. M. 69.

Sulphas natricus siccatus,

natrum sulphuricum depuratum siccatum D. 50,

tørret svovlsurt Natron. Benyttes som sulphas natricus i halv saa stor Dosis.

Sulphas zincicus,

zincum sulphuricum, vitriolum album purum D. 50,

svovlsurt Zinkilte. Opløses i lige Dele Vand.

Virkning: Tonico-nervinum, antispasmodicum, emeticum, adstringens; udvortes adstringens, irritans, causticum (chorea; ulcera & hæmorrhagiæ intestinorum; Brækmiddel i croup og narcotisk Forgiftning; udvortes mod Slimflod, gonorrhoea, ophthalmia, atoniske og hæmorrhagiske Saar, Excoriationer, vædskende Hudsygdomme, Teleangiectasi, ondartede Svulster).

Dosis: (Maximaldosis 50 ctgrm.) 1-2-3 ctgrm. < 3-4 de die i Piller (Sulph. zinc. 1 gramm. Bals. tereb. venetæ. Extr. millefolii $\bar{a}\bar{a}$ 5 gramm. Rhiz. calami q. s. ut. f. pil. 100) eller Opløsning (sulph. zincici 15 ctgrm., aq. dest. 120 gramm., muc. gi arab., syr. sacchari $\bar{a}\bar{a}$ 15 gramm., tr. theb. gtt. 15 m. d. s. 1 Spiseskefuld p. d.). Som emeticum 30-50 ctgrm. p. d., gjentaget hvert 10de Minut indtil Virkning; udvortes i Substans, undertiden smeltet i Form af

Stænger, eller i Opløsning; til Øienvand 5-15 ctgrm til 25 gramm. aq. rosæ; til Injection og Gurglevand 1-5 D. til 500 D. Vand; til Vadskninger og Fomentationer 3-12 gramm. til 250 gramm. Vand; til Salve 1 D. til 15-20 D. Fedt eller ung. glycerini (ung. causticum Mesterton: Sulph. zinci p. 1. Hydratocarb. plumb. p. 1. Calaminæ præp. p. 2. Ol. oliv. q. s.).

Undgaa at tilsætte de ætsende og kulsure Alkalier, Sæbe, Tannin, Kalk-, Baryt- og Blysalte.

Aq. ophth. alba 50. Ung. ad scab. Jasseri 40. Aq. ophth. c. zinco n. c. & n. fr. B. Aqva ophth. vitr. M. 69.

Sulphidum stibicum,

sulphur stibiatum aurantiacum, sulphur auratum antimonii
D. 50,

pommeransfarvet Svovlspydglands. Uopløseligt i Vand og spir.

Virkning: Expectorans, antidyscrasicum (bronchitis, Kighoste, Lungeemphysem, Rheumatisme, Hypertrophi af Leveren, serophuløse Affectioner af Huden, Slimhinderne og Kirtlerne).

Dosis: 1-3-10 ctgrm. i Pulver, Piller, Trochiseer, Saft.

Undgaa at tilsætte Syrer, Alkalier, Metalsalte.

Sapo stibiatum 50. Pulv. alterans Plummeri 50. Linet. expectorans n. c. Med. Pil. alt. Plumm. 40. Pil. aper. cum marte 50. Pil. æthiopicæ 50. Plv. alt. Plumm. M. 69.

Sulphur præcipitatum,

(lac sulphuris),

Svovlmælk. Uopløselig i Vand.

Virkning: Laxans; udvortes irritans, antiparasitium (Hæmorrhoider, Abdominalplethora, Amenorrhoe, chronisk Bronchialcatarrh; chroniske Hudsygdomme, Fnat).

Dosis: 30-50-100 ctgrm. p. d. 2-3 de die i Pulver

eller Latværg (el. sennæ); udvortes (sulph. præc., glycerin, spir. dil. s. saponis camph. āā m. d. s. mod acne; Kummerfelds Vadskevand mod acne : Sulph. præc. 8 gramm. Camphor. 60 ctgrm. Gi arab. 130 ctgrm. Aq. rosæ. Sol. hydr. calcici āā 60 gramm.).

Pulv. hæmorrh. n. fr. B. & A. S. 69. Pasta sulphurata A. S. 69. Lotio sulphurata A. S. 69.

Sulphur sublimatum,

sulphur depuratum lotum, flores sulphuris loti D. 50,
Svovlblomme.

Virkning: se sulphur præcipitatum.

Dosis: 1 gramm. p. d. flere Gange d. d. eller 3-5 gramm. p. d. 1-2 Gange.

Eth. min. Pulv. liquir. comp. A. S. 69. Pulv. anti-rheum n. fr. B. Pulv. pectoralis 40. Pulv. pectoralis res. 40. Pil. pectorales 40. Pil. pectorales eum kermete n. fr. v. Ung. sulphur-sap. 40. Ung. ad scab. Jasseri 40.

Sulphur sublimatum venale,

sulphur depuratum s. flores sulphuris D. 50,
almindelig Svovlblomme. Til udvortes Brug.

Ung. helleboratum. Lot. ad scabiem A. S. 69. Ung. ad scabiem simpl. A. S. 69. Ung. ad scab. comp. A. S. 69. Ung. ad scabiem (Hebra) er sulph. sublim. venal., pyrol. pini s. juniperi āā 25 gramm., axungia, saponis viridi āā 50 gramm., cretæ albæ 16 gramm. m. d. s. Ung. sulph.-sap. M. 69.

Sulphuretum stibicum,

stibium sulphuratum nigrum purum D. 50,
sort Svovlspydglands.

Sulphur. stib. lævig.

Sulphuretum stibicum lævigatum,

stibium sulphuratum nigrum lævigatum D. 50,
 præpareret sort Svovlspydglands.

Virkning: Diaphoreticum, antidyserasicum, der tidligere anvendtes mod (chroniske Hudsygdomme, Scrophulose, Rheumatisme).

Dosis: 30-60-100 ctgrm. p. d. i Pulver eller Piller.

Undgaa at tilsætte Syrer, Chlor, Brom, Jod.

Æthiops antimon. 50.

Supercarbonas ammonicus,

ammonium carbonicum depuratum D. 50,
 kulsur Ammoniak. Opløses i 5 D. Vand.

Virkning: Excitans, diaphoreticum, antispasmodicum; udvortes odore stimulans, irritans (Typhus, fb. exanthematicæ, især i Skarlagensfeber, naar Exanthemet løver med at komme frem, eller naar Sygdommen begynder med typhøse Tilfælde; narcotisk Forgiftning, Hysteri; udvortes ved Besvimelse, torpide Kirtelsvulster).

Dosis: 10-50 ctgrm. p. d. i Pulver ad chartam ceratam (ofte sammen med moschus, camphora) eller i Opløsning.

Undgaa at tilsætte Syrer, sure Salte, Metalsalte.

Supercarb. ammon. pyrol. Pulv. ammoniato-camphor.
 40. Mixt. ammonii carb. A. S. Mixt. supercarb. ammonici
 A. S. 69. Liq. amm. carb. 50.

Supercarbonas ammonicus pyroleosus,

ammonium carbonicum pyroleosum, sal volatilis cornus cervi
 D. 50,
 Hjortetaksalt.

Virkning: Excitans, diaphoreticum, antispasmodicum; udvortes irritans (rheumatisk-gigtiske Affectioner, hysteriske

Kramper og Lamheder; udvortes mod Kirtelsvulster, Forhærdelser, Lamheder).

Dosis: 10-50 ctgrm. p. d., Pulver eller Opløsning.

Liq. supercarb. ammonici pyroleosi. Ungv. ad serophulos Hufelandi 50.

Superoxydum manganicum,

manganum oxydatum nativum D. 50,

Brunsten.

Pulvis pro vaporibus chlori.

Syrupus althaeae,

Althæa-Sirup.

Den bliver let sur om Sommeren; gives enten alene en Theskefuld p. d. eller sættes til Mixturer eller bruges som constituens for expectorantia.

Linct. foetidus n. fr. B. Linct. morphii A. S. Linct. pect. n. fr. v. & 40. Linct. antidotus n. fr. B. Linct. pimpin. A. S. Syr. alth. exp. n. fr. B. Syr. expect. A. S. 69.

Syrupus amygdalarum,

Mandel-Sirup.

Sættes til demulcerende, beroligende Mixturer eller gives fortyndet med Vand, hvorved der dannes en Emulsion; undertiden som constituens og excipiens for skarpe Medicamenter.

Syrupus aurantii,

syrupus corticum aurantiorum D. 40,

Pommeransskal-Sirup.

Sættes til bitre og salinske Mixturer, 1 D. til 7. D. Mixtur.

Inf. secalis A. S. 69. Inf. vermif. A. S. 69. Mixt. aluminosa A. S. 69. M. superc. ammon. A. S. 69. M. anti-scorb. A. S. 69. M. borax. A. S. 69. M. bromata A. S. 69. M. chininica A. S. 69. M. chloretii ferrici A. S. 69. M. chloratis kalici A. S. 69. M. colchica A. S. 69. M. emmenag. A. S. 69. M. jodata A. S. 69. Syr. brom. A. S. 69. Syr. jod. A. S. 69. Syr. cop. n. fr. B. Mixt. colch.-nitr. A. S. Mixt. ad m. Chop. n. c. Ch.

Syrupus cerasi,

syrupus cerasorum D. 50,

Kirsebær-Sirup.

Sættes til kjølede, antiphlogistiske Mixturer, 1 D. til 7 D.
Mixt. acida rubra n. c.

Syrupus fructus papaveris,

syrupus diacodii, syrupus capitum papaveris D. 50,

Valmue-Sirup.

Sættes til sedative Mixturer, 1 D. til 7 D.; undertiden gives den til smaa Børn som sedativum en Theskefuld p. d. alene eller fortyndet med Vand.

Mixt. saleb. Dec. phellandrii A. S. M. antidysenterica A. S. 69.

Syrupus jodeti ferrosi,

syrupus ferri jodati D. 50,

Jodjern-Sirup.

Virkning: = Jodetum ferrosum.

Dosis: (1 gramm. indeholder 10 ctgrm. jod. ferrosi) 0,5-1-2 gramm. p. d. 2-3 d. d. gives med den dobbelte Mængde syr. sacchari (20 gramm. — syr. sacchari 40 gramm. m. d. s. 1 Theskefuld p. d., der vel er omtrent 2 gramm. syr. jod. ferr.).

Syrupus mori,

syrupus mororum D. 50,

Morbær-Sirup. Bruges meget til Penslesaft (acid. hydrochlorati dil. 3-6 gramm. Syr. mori 25 gramm. m. d. s.).

Syrupus rhei,

Rhabarber-Sirup.

Som Afferingsmiddel til smaa Børn, en Theskefuld p. d., om fornødent, gjentaget; sættes til afførende Mixturer, constituens for afførende Latvænger.

Syr. laxans n. fr. T.

Syrupus rheados,

syrupus papaveris rheados D. 50,

Kornvalmue-Sirup. Bruges til at farve og forsøde Mixturer.

Mixt. camphorata.

Syrupus rubi idæi,

Hindbær-Sirup.

Sættes til kjølede, antiphlogistiske Mixturer; fortyndet med Vand som Drik for Febersyge.

Mixt. acida sulphurica. Mixt. acida veg. 40. Mixt. hydr. n. fr. B.

Syrupus sacchari,

syrupus simplex D. 50,

Sukker-Sirup.

Sættes som Smagscorrigens til Mixturer og bruges undertiden som excipiens.

Julapium salinum. Mixt. alba. Linct. expectorans n. c. Med. Linct. oxymuriaticus n. fr. B. & A. S. 69. Dec. cort. chinæ c. senega 50 & M. 69. Jul. salin. M. 69. Linct. pect. c.

kerm. M. 69. Mixt. ac. sulph. M. 69. Mixt. ac. hydrochl.
M. 69. Mixt. chlor. M. 69. Mixt. ferri ep. M. 69. Em.
ol. 40. Mixt. reg. A. S. Syr. morph. ac. n. c. Ch.

Syrupus sambuci,

Hylde-Sirup.

Sættes til diaphoretiske Mixturer.
Mixt. diapnoica 40 & A. S. 69.

Syrupus senegæ,

Senega-Sirup.

Som expectorans for Børn en Theskefuld p. d.; sættes
til expectorerende Mixturer.

Syrupus sennæ mannatus,

syrupus mannæ D. 50,

Manna-Sirup.

Som laxans for Børn en Theskefuld p. d.; sættes til
afførende Mixturer.

Elect. e senna mann. Syr. crotonis n. fr. B. & A. S. 69.

Syrupus tolutanus,

Tolu-Sirup.

Som expectorans ved chronisk Bronchialcatarrh en The-
skefuld p. d. og som Tilsætning til Mixturer.

Tartarus boraxatus,

cremor tartari solubilis D. 50,

Borax-Vinsten. Opløses i lige Dele Vand.

Virkning: Diureticum, emmenagogum, aperiens (Vatter-
sol, Menstruationsanomalier).

Dosis: 1-2 gramm. p. d. 4-6 d. d. i Opløsning (mf.
digitalis, scillæ, secalis corn.); sjældent som laxans 15-30

gramm. p. d., som tages delt i flere Portioner med korte Mellemrum.

Undgaa at tilsætte Syrer, sure Salte, Alkalier, Metalsalte.
Mixt. boraxata n. fr. B. & A. S. 69. Sol. tartari borax. 28.

Tartras ferrico-kalicus,

vinsurt Jerntveitte-Kali. Opløses i 6 D. Vand.

Virkning: Mildt Jernpræparat, roborans, tonicum, hæmatopoeticum (Chlorose, Anæmi, Scrophulose). Udvortes til at forbinde Saar med, især Chankre.

Dosis: 15-30-60 etgrm. p. d. i vandig Opløsning (5 gramm. Aq. dest. 200 gramm. Aq. cinnam. spir. 50 gramm.), eller i Piller (5 gramm. med extr. glycyrrh. 2,5 gramm. muc. gi arab. q. s. ut. f. pil. 50; Nr. 1 = 10 etgrm.); ikke i Pulver.

Undgaa at tilsætte Syrer, ætsende og kulsure Alkalier, opløselige Metalsalte, Tannin.

Tartras ferroso-ferrico-kalicus,

(loco globulorum tartari martiati D. 50),

Jern-Vinsten. Opløses i 16 D. Vand.

Virkning: Til udvortes Brug 30-60 gramm. til et Bad.

Tartras kalicus,

kali tartaricum, tartarus tartarisatus D. 50,

vinsurt Kali. Opløses i $\frac{3}{4}$ D. Vand.

Virkning: Refrigerans, digestivum, solvens, diureticum, aperiens (lette Betændelser, gastriske Tilfælde, Gulsot, Abdominalplethora, Gigt, Urolithiasis, Vattersot).

Dosis: 1-2 gramm. p. d. 4-6 d. d.; som laxans 15-30 gramm. p. d., som tages delt i flere Portioner med korte Mellemrum. Gives i vandig Opløsning og ikke i Pulver.

Undgaa at tilsætte Syrer, sure Salte, Metalsalte.
 Sol. tartr. kalici. Elect. e senna. Inf. sennæ comp.
 Pulv. eecoproticus n. c. Pulv. resolvens saponaceus n. fr. B.
 Tr. aperiens M. 69.

Tartras natrico-kalicus,

tartarus natronatus D. 50,

Seignette-Salt. Opløses i 2 D. Vand.

Virkning: som tartras kalicus.

Dosis: 0,5-1-2 gramm. p. d. 4-6 d. d.; som laxans, der paa Grund af sin mildere Virkning skal passe til Kvinder og Børn, 15-30 gramm. p. d., som gives delt i flere Portioner med korte Mellemrum; Pulver eller Opløsning.

Undgaa at tilsætte Syrer, Kalkvand, Metalsalte.

Pulvis effervescens comp.

Tartras stibico-kalicus,

tartarus stibiatus, tartarus emeticus D. 50,

Brækvinsten. Opløses i 15 D. Vand, uopløselig i spir. conc.

Virkning: Expectorans, emeticum; diaphoreticum, anti-phlogisticum; udvortes irritans, rubefaciens, pustulans (Betændelser, pneumonia, bronchitis, Lungeemphysem, pleuritis, rheumatismus acutus; chorea, mania, melancholia, nymphomania, delirium tremens).

Dosis: (Maximaldosis 40 ctgrm.) som expectorans og mildt diaphoreticum 5-10 milligrm. p. d. (til Børn 1-2 milligrm.), som nauseosum 1,5-3 ctgrm. p. d.; som contrastimulans, sedativum, sudoriferum 3-5-10 ctgrm. p. d. hver 2den Time (i Sindssygdomme undertiden endog 20-30 ctgrm. p. d.) i vandig Opløsning (undertiden sammen med nitras kalicus, chloretum ammonicum, sol. acetatis ammonici, inf. digitalis); som emeticum 5-10 ctgrm. p. d. som, om fornødent, gjen-

lages efter $\frac{1}{4}$ Time, eller efter den større Dosis af 5-10 ctgrm. giver man hvert Kvarter 1,5-3 ctgrm. indtil Virkning. Udvortes 1 D. til 4-8 D. Salve; 1 D. til 3-4 D. Plaster.

Undgaa at tilsætte mineralske Syrer, de ætsende og kulsure Alkalier, Metalsalte, Tannin.

Vinum stib. Sol. emetica n. fr. v. Pulv. emeticus 40.
 Mixt. nauseosa n. fr. T. Mixt. stibiata A. S. 69. Pil. stib.
 A. S. Empl. stib. 50. Ung. stib. mite n. fr. B. Ung. stib.
 rubr. n. fr. T. Ung. stib. comp. 40 & n. c. Ung. stib. 50.
 Mixt. nitrosostib. M. 69. Plv. emet. simpl. M. 69. Plv. emet.
 c. ipecac. M. 69. Sol. emet. M. 69. Sol. nauseans M. 69.
 Ungv. stib. M. 69.

Testæ ostrearum præparatæ,

conchæ præparatæ D. 50,

præparerede Østersskaller. Næsten uopløselige i Vand.

Virkning: Antacidum, adstringens (Syre i de første Veie, Diarrhe); de tjene som Surrogat for den rene, kulsure Kalk (carbonas calcicus præcipitatus); corrigens og constituens til Pulvere.

Dosis: 30-40-120 ctgrm. p. d. i Pulver.

Mixt. alba. Mixt. alba M. 69.

Tinctura absinthii,

Malurt-Draaber.

Virkning: Carminativum, digestivum.

Dosis: 30-40-60 gtt. p. d. (5-15 gramm. de die).

Tinctura aconiti,

Stormhat-Draaber.

Dosis: (Maximaldosis gtt. 30) gtt. 15-20-30 p. d.;
 udvortes til Indgnidninger enten alene eller blandede med spir.
 saponatus camphoratus.

Tinctura amara,

bittre Draaber.

Virkning: Carminativum, digestivum.

Dosis: 30-40-60 gtl. p. d. 3 Gange d. d.

Tinctura arnicæ,

Volverlei-Draaber.

Dosis: Sjældent indvortes gtl. 20-40 p. d.; udvortes til Fomentation (Contusion) 1-2 D. til 20 D. Vand, sol. sub-acet. plumb. dil. eller spir. tenuis, eller til Indgnidninger alene mod Neuralgier, Paralyser.

Tinctura aromatica,

krydrede Draaber.

Virkning: Excitans, carminativum.

Dosis: gtl. 30-40-60.

Tinctura aromatica acida,

sure, krydrede Draaber.

Virkning: Excitans, adstringens, antisepticum (Dyspepsi, atonisk Metrorrhagi, Skjørbug, Typhus).

Dosis: gtl. 30-40-60 p. d. i Havresuppe.

Dec. cort. chinæ acidum n. fr. v. Elix. anodynum n. fr. B. Inf. valerianæ acidum n. fr. T. & n. c. Med. Dec. cort. chinæ acidum 40 & M. 69. Dec. cort. chinæ calis. ac. M. 69.

Tinctura asæ foetidæ,

Dyvelsdræk-Draaber.

Virkning: Excitans, antispasmodicum; udvortes Lugtemiddel (for Hysteriske).

Dosis: gtl. 20-30-40 p. d.

Liq. antihyst. n. c. Ch. Tr. antasthmatica n. fr. v. & 40. Liq. nervinus foetidus n. c.

Tinctura aurantii,

tinctura corticum aurantium D. 50,

Pommerans-Draaber.

Virkning: Tonico-amarum.

Dosis: gtt. 30-40-60 p. d.

Liq. antichlor. A. S. 69.

Tinctura balsamica aromatica,balsamum vitæ Hoffmanni, mixtura oleosa balsamica D. 50,
Hoffmanns Livsbalsam.Virkning: Excitans, carminativum (Kolik, Flatulents,
Hysteri; udvortes mod Kolik, Lamhed).Dosis: gtt. 15-20-30 p. d.; udvortes til Indgnidning
blandet med spirituosa (kostbart).**Tinctura benzoës,**

Benzoe-Draaber.

Virkning: Cosmeticum.

Ser. adh. Lotio benzoica A. S. 69.

Tinctura benzoës composita,

balsamum Commendatoris D. 50,

sammensatte Benzoe-Draaber.

Virkning: Til udvortes Brug irritans; som Folkemiddel
benyttet de som hæmostaticum ved Blødning fra friske Saar;
(atoniske Saar med slet Suppuration).

Dosis: Alene eller blandede med 4 D. Vand.

Tinctura calabar,

Kalabar-Draaber.

Virkning: se extr. calabar.

Dosis: (Maximaldosis gtt. 20) gtt. 10-15-20.

Tinctura calami,

tinctura calami aromatici D. 50,

Kalmus-Draaber.

Virkning: Tonico-amarum.

Dosis: gtt. 20-30-40.

Tinctura cantharidum,

Spanskflue-Draaber.

Virkning: Diureticum, emmenagogum, aphrodisiacum.

Dosis: (Maximaldosis gtt. 60) gtt. 10-20 < 40-50 p. d. i Mælk eller Havresuppe; 1 gramm. (c. gtt. 30) indeholder omtrent det Opløselige af 3 ctgrm. canth.; udvortes til Indgnidninger (Tr. canth. 5 gramm. Ætherol. tereb. 50 gramm. Tr. canth. 10 gramm. Ol. crotonis gtt. 10. Ol. Ricini 30 gramm.).

Mixt. Seymouri n. fr. B. Ung. contra alopeciam A. S.

Tinctura cantharidum fortior,

tinctura cantharidum concentrata D. 50,

stærkeste Spanskflue-Draaber.

Virkning: Til udvortes Brug, til Pensling af Saar og Fistler; meget sjældent til indvortes Brug.

Dosis: (Maximaldosis gtt. 10) gtt. 3-5-10 p. d.; 1 gramm. (gtt. 35) indeholder omtrent det Opløselige af 20 ctgrm. canth.

Ung. contra alop. A. S. 69.

Tinctura cascarillæ,

Kaskarille-Draaber.

Virkning: Obstipans, sættes til stoppende Mixturer.

Dosis: gtt. 30-40-60.

Tinctura obstipans A. S. 69.

Tinctura castorei canadensis,

canadisk Bævergeil-Draaber.

Virkning: Antispasmodicum.

Dosis: gtt. 30-40-50 p. d. (Tr. cast. Tr. valerianæ
 āā 5 gramm. Vin. theb. croc. 3 gramm. m. d. s. 15-30 p.
 d. 3 d. d. Tr. castorei 15 gramm. Liq. Clauderi 50 gramm.
 m. d. s. 1 The skefuld 2-3 d. d.).

Liq. antihyst. n. fr. B. & A. S. 69.

Tinctura castorei moscovitici,

russisk Bævergeil-Draaber.

Dosis: gtt. 20-30-40 p. d. (kostbart).

Tinctura chinæ calisayæ,

tinctura chinæ regiæ D. 50,

China-Draaber.

Virkning: Tonicum.

Dosis: 30-40-50 gtt. p. d.

Tinctura chinæ composita,

elixir roborans ad modum Whytti D. 50,

sammensatte China-Draaber.

Virkning: Tonico-amarum, digestivum.

Dosis: 1 The skefuld p. d. ofte sammen med tr. rhei
 amara.

Tinctura chinoidinæ,

Chinoidin-Draaber.

Dosis: gtt. 30-40-60 p. d. eller mere i aromatisk
 Vand (Tr. chin. 10-30 gramm. Aq. cinnamomi spir. 30
 gramm. m. d. s. 1 The skefuld p. d. 3-4 d. d.).

im.
 . d.
 der
 nd-
 im.
 30

S.

og

1

20

Tinctura cinnamomi,

Kanel-Draaber.

Virkning: Aromatico-tonicum, hæmostaticum (vomitus gravidarum; metrorrhagia); corrigens for absorbentia, tonica og acida.

Dosis: gtt. 20-40-60 p. d. (Tr. cinn. Ac. phosph. dil. $\bar{a}\bar{a}$ 10 gramm. Mixt. saleb 50 gramm. m. d. s. 1 Theskefuld p. d., gjentaget hvert Kvarter).

Mixt. alba M. 69.

Tinctura colchici,

tinctura colchici e seminibus D. 50,

Kolchikum-Draaber.

Dosis: (Maximaldosis gtt. 60) 20-30-50 gtt. p. d.

Tinctura colocynthis composita,

tinctura colocynthis D. 50,

Kolokvint-Draaber.

Dosis: (Maximaldosis gtt. 30) gtt. 10-15-20 p. d. 3-4 d. d. i slimet Vehikel (rheumatisk og arthritisk Hovedpine, atonisk Amenorrhoe); gtt. 30-50 om Aftenen og gtt. 20 om Morgen (til Paralytiske).

Tinctura croci,

Safran-Draaber.

Dosis: gtt. 20-40-50 p. d.

Mixt. emmenagoga A. S. 69. Spir. vini camph. croc. 40.

Tinctura digitalis,

tinctura digitalis purpurea D. 50,

Fingerbølle-Draaber.

Dosis: (Maximaldosis gtt. 25) gtt. 15-20-25; 1 gramm.
er omtrent gtt. 30. Udvortes til Indgnidninger.

Tr. antasthmatica n. fr. v. Tr. diuretica n. c. Med.

Tinctura digitalis ætherea,

ætheriske Fingerbølle-Draaber.

Dosis: (Maximaldosis gtt. 20) gtt. 10-15-20 p. d.

Tinctura digitalis rubra,

elixir antasthmaticum Aaskovi D. 50,

Aaskovs Draaber.

Dosis: gtt. 25-30-50 p. d.

Tinctura gentianæ,

Enzian-Draaber.

Dosis: gtt. 30-40-60 p. d.

Tinctura guajaci,

Guajak-Draaber.

Dosis: gtt. 30-40-60 p. d.

Tinctura guajaci ammoniacata,

tinctura guajaci volatilis, tinctura guajaci ammoniata D. 50,
ammoniakholdige Guajak-Draaber.

Virkning: Excitans, diaphoreticum (chronisk Rheumatisme, atonisk Gigt).

Dosis: gtt. 20-30-40 p. d. i slimet Vehikel og ofte sammen med diaphoretisk Regimen.

Tinctura lavandulæ rubra,

spiritus lavandulæ compositus D. 50,

sammensatte Lavendel-Draaber.

Virkning: Excitans, carminativum (Hysteri, Kolik, Flatulents, Brækning, Besvimelse).

Dosis: gtt. 30-40-60 p. d.; udvortes til Indgnidning (Lamhed) (Tr. lav. rubra, æth. spir. $\bar{a}\bar{a}$ 5 gramm.).

Liq. antirheum. comp. n. fr. B.

Tinctura lobeliæ,

tinctura lobeliæ inflatæ D. 50,

Lobelia-Draaber.

Dosis: gtt. 15-20-30 < 50 p. d. (tr. lob., æth. acet. $\bar{a}\bar{a}$ 5 gramm. m. d. s. gtt. 15-20 hver $\frac{1}{2}$ Time mod nervøs Asthma; tr. lobeliæ 2 gramm. (gtt. 60), syr. senegæ 30 gramm. m. d. s. 1 Theskefuld til Børn).

Tinctura menyantis,

tinctura trifolii fibrini D. 50,

Bukkeblade-Draaber.

Dosis: gtt. 20-40-60 p. d.

Liq. men. ac. Inf. tonico-nervinum n. fr. T.

Tinctura moschi,

Moskus-Draaber.

Dosis: gtt. 20-40-50 p. d. alene eller blandede med andre exciterende, analeptiske og antispasmodiske Lægemedler.

Tinctura myrrhæ,

Myrrha-Draaber.

Virkning: Stimulans, detergens til udvortes Brug (caries, ulcera); til Mund- og Gurglevand 5-15 gramm. til 200 gramm. Vand; til Penslesaft 5-10 gramm. til 40 gramm. mel rosæ.

Linctus ad gingivas n. c. Ch. Garg. myrrh. M. 69.

Tinctura nucis vomicæ,

tinctura nucum vomicarum D. 50,

Rævekage-Draaber.

Dosis: (Maximaldosis gtt. 80) gtt. 10-30 < 40 p. d.;
1 gramm. = gtt. 31 indeholder det Opløselige af 10 etgrm.
semina nuc. vom.

Tr. antienuretica A. S. 69.

Tinctura pimpinellæ,

Pimpinelle-Draaber.

Dosis: git. 20-50 p. d. paa Sukker eller i Saft (an-
gina faucium, raucedo); udvortes i Gurglevand 10-15-25
gramm. til 200 gramm. inf. salviæ.

Linct. pimpinellæ A. S. Linct. pector. comp. n. c.

Tinctura pomi ferrata,

tinctura ferri pomati D. 50,

Draaber af æblesurt Jern.

Virkning: Tonicum, restaurans, hæmatopoeticum (Chlo-
rose, Anæmi, Scrophulose, Rhachitis, Orm).

Dosis: 1 Theskefuld p. d.

Liq. antichloroticus A. S. 69. Inf. vermifugum martia-
tum A. S.**Tinctura pyrethri,**

Bertram-Draaber.

Dosis: gtt. 20-30-40 p. d.; udvortes til at komme i
den hule Tand mod Tandpine; til Mund- og Gurglevand mod
Tandpine, Tungelamhed og angina gangrænosa; til Indgnid-
ninger alene og fortyndede mod Lamhed og rheumatiske Smerter.

Tinctura qvassiaë,

Qvassia-Draaber.

Dosis: gtt. 20-30-40 p. d. (5-10 gramm. d. d.).

Tinctura ratanhiaë,

Ratanhie-Draaber.

Dosis: gtt. 20-30-40 p. d. 3 Gange d. d. eller oftere (navnlig ved passive Blødninger, Diarrhe); udvortes som hæmostaticum ved blødende Tandkjød og sat til adstringerende Mundvande.

Tinctura rhei amara,

bittre Rhabarber-Draaber.

Virkning: Tonicum, stomachicum, aperiens (Dyspepsi, Serophulose, Chlorose).

Dosis: Som tonicum gtt. 20-40-60 p. d.; som aperiens $\frac{1}{2}$ -1 Spiseskefuld p. d. før Middagsmaden eller 2-3 d. d.

Tr. rhei amara anodyna n. fr. T.

Tinctura stramonii,

tinctura stramonii e seminibus D. 50,

Pigæble-Draaber.

Dosis: (Maximaldosis gtt. 40) gtt. 15-20-30 p. d. (1 gramm. omtrent = gtt. 30).

Tinctura thebaica,

tinctura opii spirituosa D. 50,

vinaandholdige Opiums-Draaber.

Dosis: (Maximaldosis gtt. 60) gtt. 5-15-20 < 35 p. d.; 1 gramm. = gtt. 30 indeholder 10 ctgrm. opium; til et Klyster gtt. 20-40.

Tinctura thebaica benzoica,

elixir paregoricum, tinctura opii benzoica D. 50,
beroligende Bryst-Draaber.

Virkning: Excitans, expectorans, diaphoreticum (catarrhalske Brystaffectioner, Kighoste).

Dosis: gtt. 30-40-60 p. d.; til Børn gtt. 5-20; 1 gramm. indeholder 5 milligrm. opium.

Mixt. paregorica expectorans A. S. 69.

Tinctura tolutana,

Tolubalsam-Draaber.

Dosis: gtt. 10-20-30 p. d.; til udvortes Brug som hæmostaticum ved ubetydelige Blødninger fra friske Saar og som cosmeticum.

Syr. tolutanus.

Tinctura valerianæ,

Baldrian-Draaber.

Dosis: gtt. 30-50 p. d. ofte sammen med æther spir. camph., tr. castorei, sol. succinatis ammon. pyrol.

Tinctura valerianæ ætherea,

ætheriske Baldrian-Draaber.

Dosis: gtt. 15-20-30 p. d.

Tragacantha,

gummi tragacanthæ D. 50,

Tragakanth.

Virkning: Demulcens, involvens, mest til at lave Trochiscer; sjældent til indvendig eller udvendig Brug, 1 D. til 50 D. Vand.

Troch. ipec.

Trochisci ipecacuanhæ,

Ipekakuanha-Kager.

Dosis: Nr. 1-2-3 p. d.; Nr. 1 indeholder det Op-
løselige af 15 milligrm. rad. ipecac.

Trochisci santonini,

Santonin-Kager.

Dosis: 2-6-10 d. d. til Børn; Nr. 1 indeholder 3
ctgrm. Santonin.

Tubera jalapæ,

radix jalapæ D. 50,

Jalaprod.

Virkning: Aperiens, cholagogum, drasticum, hydrago-
gum (Forstoppelse, Congestioner til Hjernen, Vattersot, chro-
niske Leversygdomme, Amenorrhoe, Ormetilfælde).

Dosis: I refract Dosis 10-30 ctgrm. p. d.; som ape-
riens 30-50 ctgrm. p. d. 2-3 d. d.; som drasticum 2 gramm.
p. d. eller 50 ctgrm. hver eller hver anden Time indtil Virk-
ning. Til eet Aar gamle Børn 10-15 ctgrm. p. d. med
Tillæg af 5 ctgrm. for hvert Aar mere. Den gives i Pulver,
Piller eller Latvæge; som corrigens tilsættes elæosaccharum
eller pulvis aromaticus.

Resina jalapæ. Pulv. jalapæ comp. Morsuli purgantes
rosati. Pulv. calomellis cum jalapa n. fr. B. Pulv. jalapæ
hydrarg. A. S. 69. Elect. anthelminthicum 50.

Tubera saleb,

radix salep D. 50,

Salebrod.

Virkning: Demulcens, involvens (Diarrhe, Dysenteri).
Dosis: Infus (1 D. infunderes med 100 D. kogende

Vand eller Mælk) eller Decoet (60-120 etgrm. til 200 gramm.
col. for et Døgn).

Mixt. saleb. Inf. saleb. 50.

Ungventum acetatis plumbici,

ungventum saturninum, ungentum nutritum D. 50,
kølede Salve.

Virkning: Adstringens (Excoriationer, Forbrænding,
Decubitus, Eczem).

Ung. saturninum comp. n. c. Ch. Ung. ac. pl. cp.

Ungventum acetatis plumbici compositum,

ungventum hæmorrhoidale D. 50,
Takke-Salve.

Virkning: Sedativum, adstringens; den smøres paa fint
Lærred og lægges hver 3die Time paa smertefulde Hæmor-
rhoidalknuder.

Ungventum althæae,

Althæa-Salve.

Virkning: Leniens, defendens.

Ungventum basilicum flavum,

gul Konge-Salve.

Virkning: Irritans til at forbinde Spanskfluesaar med
for at holde det aabent og til Forbinding af slet suppure-
rende Saar.

Ungventum basilicum nigrum,

sort Konge-Salve.

Virkning: Irritans til at forbinde Spanskfluesaar med

for at holde det aabent og til Forbinding af slet suppurende Saar.

Ungventum cantharidum simplex,

ungventum cantharidum D. 50,

Spanskflue-Salve.

Virkning: Irritans til at forbinde Spanskfluesaar med for at holde det aabent; i denne Hensigt blandes den ofte med lige Dele ung. bas. nigrum.

Ungventum cantharidum viride,

ungventum cantharidum colatum D. 50,

grøn Spanskflue-Salve.

Virkning: Irritans til at forbinde Spanskfluesaar med for at holde det aabent; den volder mange Smerter og fremkalder let Stranguri.

Ungventum ceræ,

(loco cerati albi et cerati simplicis D. 50),

Vox-Salve.

Virkning: Leniens, defendens til at forbinde Spanskfluesaar med for at læge det; Excoriationer, Forbrændinger.
Ung. ox. hydrarg.

Ungventum cetacei,

ceratum cetacei (cold cream) D. 50,

Spermacet-Salve.

Virkning: Leniens mod solbrændt Ansigt, Sprækker i Huden.

Ungventum glycerini,

Glycerin-Salve.

Virkning: Leniens; er et meget brugt Excipiens for Medicamenter til udvortes Brug.

Ungv. jodeti kalici. Ungv. cadinum A. S. 69.

Ungventum helleboratum,

ungventum ad scabiem anglicum D. 50,

engelsk Fnalsalve.

Virkning: Antiparasiticum til Indgnidning mod Fnat Morgen og Aften i 4 Dage.

Ungventum hydrargyri,

ungventum hydrargyri cinereum, ungentum neapolitanum
D. 50,

graa Qvægsølvsalve.

Virkning: Irritans, antiphlogisticum, antiparasiticum, antisymphiliticum (Betændelser, Exsudater og Infiltrationer, morpiones, syphilis).

Dosis: Som antiphlogisticum indgnides 3-12 gramm. d. d. delt i 2-3 Portioner enten i Omfanget af det syge Sted til local Virkning eller andre Steder til constitutionel Virkning; som antisymphiliticum forskrives fra Apotheket Portioner paa 130 etgrm., som indgnides hver Aften vexelvis paa Benet, Laaret, Underarmen, Overarmen og Brystet, og næste Dag afvadskes det indgnedne Sted med lunkent Sæbevand.

Lin. resolvens n. fr. v. Ung. belladonnæ comp. n. c.
Ch. Ung. jodii mercur. n. c. Ch. Lin. resolv. M. 69.

Ungventum hydratocarbonatis plumbici,

ungventum cerussæ, ungentum album simplex D. 50,

Blyhvidt-Salve.

Virkning: Exsiccans, adstringens (ulcera med rigelig Secretion, smertefulde Hæmorrhoidalsvulster); ofte tilsættes ac. gallotannicum.

Ung. hydrat. pl. camph. Ung. cer. cp. n. c. Ch.

Ungventum hydratocarbonatis plumbici camphoratum,

ungventum cerussæ camphoratum, ungentum album camphoratum D. 50,

Kampher-Salve.

Virkning: Exsiccans, adstringens, stimulans (Decubitus, Frostknuder, smertefulde Hæmorrhoidalknuder).

Ungventum jodeti kalici,

ungventum kali hydrojodici D. 50,

Jodkalium-Salve.

Virkning: Resorbens, resolvens (Exsudationer og Infiltrationer). Naar man for at forstærke Virkningen vil tilsætte Jod, tager man helst ung. kali hydroj. 50, da denne ikke indeholder amyllum.

Ung. bell. jod. A. S.

Ungventum majoranæ,

butyrum majoranæ D. 50,

Merian-Smør.

Anvendes meget som Folkemiddel til Indgnidning i Panden, glabella og Næsen mod Snue og Forstoppelse af Næsen hos Paltebørn.

Ungventum nervinum,

Senesalve.

Virkning: Irritans, stimulans (Kolik, Slaphed af Muskler og Ligamenter, atoniske Saar).

Ungventum nitratis hydrargyrici,

ungventum hydrargyri citrinum D. 50,

gul Qvægsølv-Salve.

Virkning: Irritans (chronisk blepharitis, atoniske, syphilitiske og serophuløse Saar, eezema); fortyndes undertiden med ol. olivarium.

Ungventum oxydi hydrargyrici,

ungventum hydrargyri rubrum, ungentum ophthalmicum rubrum, balsamum ophthalmicum rubrum D. 50,

rød Qvægsølv-Salve.

Virkning: Irritans (chronisk blepharitis, atoniske Saar). Fortyndes undertiden med ol. olivarium gtt. 10 til 10 gramm. ungv.

Ungventum oxydi zincici,

ungventum zinci, ungentum nihili albi D. 50,

Zink-Salve.

Virkning: Exsiccans, adstringens (Excoriationer, Forbrændinger, Eezem).

Ungventum oxydi zincici et ferrici,

(loco ungenti lapidis calaminaris).

brun Zink-Salve, Galmeie-Salve.

Virkning: Exsiccans, adstringens (Ulcerationer med rigelig Secretion, Excoriationer, Forbrændinger).

Ungventum pyrolei pini,

Tjære-Salve.

Virkning: Irritans (Fnat; det var især til Børn under 4 Aar, at Tjæresalven brugtes istedfor den mere irriterende grønne Sæbe; chroniske Hududslet, eezema, psoriasis).

Ungventum sabinæ,

Sevenbom-Salve.

Virkning: Irritans til at forbinde Spanskfluesaar med for at holde det aabent.

Ungventum sinapinum,

Sennopskage.

Virkning: Rubefaciens efter $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ Times Forløb (rheumatiske Smerter, Neuralgier etc.).

Ungventum terebinthinatum,

ungventum digestivum D. 50,

Terpentin-Salve.

Virkning: Irritans til at forbinde Spanskfluesaar med for at holde det aabent; atoniske Saar.

Ungventum universale,

balsamum universale D. 50,

Universalbalsam.

Virkning: Adstringens (Excoiationer, Forbrændinger, Eczem etc.).

Ung. sat. comp. n. c. Ch.

Veratrina,

veratrinum D. 50,

Veratrin.

Virkning: Diureticum, antiphlogisticum? mest udvortes irritans, pustulans, antineuralgicum (prosopalgia, hemicrania, odontalgia, ischias, dolores rheumatici & arthritici).

Dosis: (Maximaldosis 10 milligrm) 2-5 < 10 milligrm. p. d. 2-3 d. d. med stor Forsigtighed, gives i Piller og ikke i Pulver eller Opløsning (āā 5 ctgrm. af veratrina og opium plv. med 1 gramm. gi arab. plv. til 20 pil.; Nr. 1 = 2,5

milligrm.

20 gram

Ung

China-V

Vi

Reconv

D

Kolchil

V

arthrit

I

I

Vinur

colchi

Bræk

som

skeft

vine

Kol

milligrm.); udvortes 20 etgrm. til chloroform. eller spir. conc.
20 gramm.; 1 D. til 60 D. Fedt.

Ung. veratri A. S. 69. Ung. veratrinum A. S.

Vinum chinæ ferratum,

vinum roborans D. 50,

China-Vin med Jern.

Virknin'g: Excitans, tonico-nervinum, roborans (Anæmi,
Reconvalescents, Hysteri).

Dosis: 1 Spiseskefuld 2-4 d. d.

Vinum colchici,

vinum colchici e seminibus D. 50,

Kolchikum-Vin.

Virkning: Diureticum, catharticum (Rheumatisme,
arthritis).

Dosis: (Maximaldosis gtt. 60) gtt. 30-40-50 p. d.

Liq. antirheum. ep. n. fr. B. Liq. antirh. A. S. 69.

Vinum colch. op. A. S. Mixt. colchico-nitrosa A. S. Mixt.
colchica A. S. 69.

Vinum ipecacuanhæ,

Brækrod-Vin.

Virkning: Expectorans, emeticum.

Dosis: Expectorans gtt. 5-30 p. d. i Mixtur eller Saft;
som emeticum 1 Spiseskefuld til Voxne, til Børn 1-2 The-
skefulde hvert 10de Minut indtil Virkning.

Vinum rhei,

(loco tincturæ rhei vinosæ D. 40),

vinose Rhabarber-Draaber.

Virkning: Tonicum, digestivum (Dyspepsi, Flatulents,
Kolik).

Dosis: gtt. 30-40-60 p. d. som digestivum; 1 Spiseskefuld p. d. som aperiens.

Vinum stibiatum,

Bræk-Vin.

Virkning: Expectorans, emeticum.

Dosis: (1 gramm. indeholder 4 milligrm. tartr. stibikal., 1 Theskefuld = 5 gramm. indeholder altsaa 2 ctgrm.). Som expectorans gtt. 10-30 p. d. i Mixtur og Saft; som emeticum en Spiseskefuld til Vøxne, en Theskefuld til Børn, der, om fornødent, gjentages.

Vinum thebaicum,

tinctura opii simplex, tinctura thebaica D. 50,
almindelige Opium-Draaber.

Virkning: Sedativum.

Dosis: (Maximaldosis gtt. 60) 1 gramm. = gtt. 25 indeholder 10 ctgrm. opium; gtt. 5-20-40 p. d.

Aq. ophth. merc. M. 69. Mixt. pict. n. fr. B. Mixt. sat.-op. n. fr. B. Tinct. obst. A. S. 69. Inf. cic. ep. n. c. Ch.

Vinum thebaicum crocatum,

tinctura opii crocata, laudanum liquidum Sydenhami D. 50,
Laudanum.

Virkning: Sedativum.


Dosis: (Maximaldosis gtt. 60) 1 gramm. = gtt. 22 indeholder 10 ctgrm. opium; gtt. 5-20-30 p. d.


Spir. Mind. c. laud. n. fr. T. Sol. sat.-op. n. fr. T. Lin. amm. camph. c. opio n. c.




Rettelser og Trykfeil.

- Pag. 7, Linie 9 f. o. Det læs: Den.
- 8, — 5 f. o. bicarbornas læs: bicarbonas.
 - 10, — 10 f. n. syphillistiske læs: syphilitiske.
 - 17, — 15 f. o. vernifugum læs: vermifugum.
 - 17, — 1 f. n. & A. S. 69 læs: Liq. anthirheum. A. S. 69.
 - 33, — 12 f. o. aperitivum læs: aperiens.
 - 36, — 13 f. o. tilføi: Empl. res. n. fr. v. Lin. ammon. camph. M. 69. Lin. res. M. 69. Mixt. camph. M. 69. Ol. camph. M. 69. Pulv. temp. camph. M. 69.
 - 45, — 13 f. n. udvortes mod tilføi: Eczem.
 - 64, — 15 f. o. & A. S. 69 udgaaer.
 - 74, — 9 f. o. efter de die tilføi: en Spiseskefuld.
 - 93, — 15 f. o. Ung. nilr. læs. Ung. nitr.
 - 94, — 1 f. o. efter irritans tilføi: og derivans (tetanus, Convulsioner, Lambed, gigtiske og rheumatiske Affectioner); som localt virkende irritans
 - 101, — 6 f. o. A. S. læs: n. fr. v.
 - 106, — 2 f. n. liqvo læs: liqvor.
 - 130, — 12 f. n. udvortes læs: indvortes.
 - 154, — 10 f. n. & A. S. 69 læs: Liq. antirheum A. S. 69.







Blanco Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Muhle.