



Cart. T m  
135

Dv 1443<sup>4</sup>



*Handwritten text, possibly a signature or title, in cursive script.*

SCOLLARIS M. TRAL

LIBRARIUS M. TRAL

PRINCEPS M. TRAL

Tristo de Cezf

FORMULARIO MAGISTRAL

Y

MEMORIAL FARMACEÚTICO.

REVISADO

Por el Catedrático de Farmacia

Don D. Juan Manuel de la Cruz y López de la Cruz, Profesor  
de Farmacia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla,  
y Don D. Juan Manuel de la Cruz y López de la Cruz, Profesor  
de Farmacia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla.

FORMULARIO MAGISTRAL

DE ENRIQUE Y DE ROSAS

Y

MEMORIAL FARMACEÚTICO.

1810

1810

PRIMERA EDICIÓN

PRIMER CUADERNO.

INDICIA AL CASTELLANO

1810

FORMULARIO MAGISTRAL

Y

MEMORIAL FARMACÉUTICO.

PRIMER CUADERNO.

FORMULARIO MAGISTRAL  
Y  
MEMORIAL FARMACEÚTICO.

RECOLECTADO

POR EL CABALLERO CADET DE GARSSICOURT,  
doctor en estas ciencias, miembro de la Legión de honor Farma-  
ceútica, secretario del Consejo de sanidad de la ciudad de París,  
socio corresponsal de las Academias de Madrid, Turin y Floren-  
cia, de las sociedades de Bruselas, Lieja, Strasburgo, Leon, Ruan,  
Orleans, &c. &c.

Y ENRIQUECIDO DE NOTAS

POR Mr. PARISET,  
médico del departamento para las epidemias, médico de la Casa  
Real de Bicêtre, y miembro del Consejo de sanidad.

CUARTA EDICION.

REVISADA Y AUMENTADA

EN PARÍS AÑO DE 1818,

Y TRADUCIDA AL CASTELLANO

POR D. NICOLÁS MOLERO

EN MÉXICO AÑO DE 1820.

---

MEXICO 1821.

Impreso en la oficina de D. Juan Bautista de Arizpe.

FORMULARIO MAGISTRAL  
MEMORIAL FARMACEUTICO  
AVISO

A LOS SEÑORES MEDICOS Y CIRUJANOS.

Aunque todos los farmaceuticos pueden ejecutar regularmente las fórmulas contenidas en esta recoleccion, el autor previene que se encontrarán constantemente preparadas en su casa calle de S. Honorato núm. 108 en París.

J. Latias & C<sup>os</sup>.  
EX PARIS AÑO 1818  
FOR D. NICOLAS MORENO  
EX MEXICO AÑO DE 1820

MEXICO 1821.

Impreso en la oficina de D. Juan Ramirez de Arizpe.

*AL SR. DR. D. VICENTE CERVANTES,  
catedrático de la Universidad y jardin botánico  
de México, alcalde examinador de Farmacia en el  
tribunal del Proto medicato, socio de la Academia  
médica de Madrid y del colegio de boticarios, con-  
sultor de la sociedad económica de Goatemala y  
corresponsal de la de Puebla.*

¿ **A** quién con mas justicia ofreceré, caro amigo, éste imperfecto trabajo hijo de mi insuficiencia que á vd., cuya dignidad y elegancia en la farmacia y botánica es pública? Vd. arranca á la naturaleza el gran arcano de las propiedades medicinales que envuelve en uno de los ramos mas preciosos de sus producciones; animado de un espíritu filantrópico penetra en el palacio vegetal para imprimir en cada uno de los individuos de este reino aquel sello que distinguiendo las especies de un mismo género debe desterrar toda confusion; alcanza con sus indagaciones las propiedades físicas, químicas y medicinales de los seres de los tres reinos para hacerlos contribuir con aquellas partes propias á llenar el grandioso fin de socorrer á la humanidad aflijida en las turbulencias de las enfermedades. De nada serviría que prescribiese el

médico el antídoto con que debía contrariar un síntoma morboſo ſi la deſtreza del farmaceútico no le daba la preparacion oportuna. Si los venenos ſe hacen medicamentos por el tino práctico con que los juega el médico á la cabecera del enfermo, las medicinas tambien ſe convierten en aquellos, quando una ſábía direccion en el farmaceútico no cuida de la exactitud en las preparaciones que exigen. Vd. en fin, embriagado con el dulce nectar de la ſabiduria ha conſagrado ſus preciosos dias al estudio de ciencia tan benéfica contribuyendo en gran manera al fin que ſe han propueſto los médicos en el tratamiento de ſus enfermos. Oficioſo con los ricos, caritativo con los pobres y eſcrupuloſo con todos, ha merecido, juſtamente, ſer considerado en eſte reino como el primero en ſu profeſion.

Dignaos, pues, recibir eſte corto homenaje, ú toſco y deſordenado producto ſincero de la gratitud y amistad que le profeſa ſu apasionado amigo y ſervidor  
Q. S. M. B.

*Nicolás Molero.*

## PRÓLOGO DEL TRADUCTOR.

*Homine imperito nunquam quiequam injustius,  
qui, nisi quod ipse, nihil rectum putat.*

Ter. in Adelphis.

» **N**o hay cosa mas despreciable, dice Terencio, que la  
» ignorancia de un hombre á quien nada parece bueno  
» sino lo que el hace.“

Esta verdad inconcusa se hace aun mas visible en quienes la ignorancia se halla unida hasta un cierto punto con un orgullo inmoderado, union frecuente por nuestra desgracia, y cuyos estragos extensivos á todas materias no reservan aun al precioso y útil ramo de la literatura.

El ignorante orgulloso está siempre alerta para asestar sus tiros á los escritores, él incapaz de otra cosa desvirtúa la débil potencia de su cerebro mal organizado, en abortivas procreaciones contra sus obras y lanzando criticas picantes y las mas voraces sátiras quisiera impávido destruir, si le fuese concedido, todo trabajo ageno. El sabio por el contrario, se gloria con la lectura de una nueva produccion, donde con un animo imparcial aplaudé lo que tiene de buena y limita sus deseos á una juiciosa correccion en aquella parte que encuentra defectuosa.

Si hubiera tenido en consideracion unicamente la escasez de mis conocimientos, no hay duda que habria desistido del empeño de traducir y publicar la presente obra; pero animado de un sentimiento mas noble cual es el de ser útil, tal cual me lo permitan mis fuerzas, á mis semejantes, me dejé seducir por el alhago de tan

encantadora idea, y no obstante que el poco tiempo que me dejaba libre para su dedicacion, el desempeño de mis serias obligaciones queria ofrecerme un nuevo obstáculo, superé empero tamaño inconveniente sin desatender aquellas, robando á mi descanso el tiempo mas precioso como tambien el mas bien empleado.

El mundo literario á cuyo criterio la expongo, me redimirá de hacer la apología de una obra cuya utilidad se presenta á primera vista si su juicio se acomoda con el que tengo hecho de ella, facilmente decidirá que una coleccion de fórmulas que abraza tanto las que usaron los antiguos quanto aquellos que con sucesos los mas felices practican los modernos, no puede menos que producir un beneficio visible á la humanidad: el farmacéutico que la reuna á sus farmacopeas, suplirá con ella la falta de innumerables autores, cuya reunion seria difícil á unos é imposible á otros, mientras que por otro si encontrará en ella con la mayor facilidad la fórmulá que se le pide, fenómeno muy interesante y que no tendria lugar de otro modo, sino despues de haber perdido mucho tiempo en requerir y consultar los autores que se le citasen, dado caso que se hallasen en posesion de ellos. El médico y cirujano á quienes inconvenientes de la misma categoría deberian negar la consecucion de dichos autores, gozarán por una razon análoga la primera ventaja, al paso que les proporcionará una obra orientandose fielmente de las mixtiones y maridages que hacian los antiguos y siguen los modernos en los simples para asegurar los efectos que esperaban de su aplicacion. El conocimiento teórico y practico de los lectores les hará entre sacar y escoger las que la analisis de su sana razon les presente como mas ventajosas, quedandoles siempre tiempo para desechar aquellas que estimen por ineficaces, ya porque no sean compatibles con los actuales conocimientos químicos, ya en fin porque no se acomoden á lo que su práctica les haya enseñado.

El autor dice juiciosamente en sus advertencias que este libro no puede menos que ser perjudicial en manos de aquellos temerarios que sin otra educacion facultativa ni principios sólidos en la materia quieran solo con su posesion y lectura hacerse profesores; yo agrego que aun nosotros mismos debémos usarlo haciendo en la administracion de las fórmulas todas aquellas precisas variaciones que tan imperiosamente reclaman para el acierto en la medicina las relaciones de clima &c.; pues á la manera que el inmortal Bagliviò nos repite á cada paso en su obra *Romae scribro, et in acre Romano*, debémos tener consideracion (sirviendome de sus mismas expresiones) de que estas fórmulas se escribieron en distintos climas, y que tenémos que usarlas en México.

No parecerá nimia escrupulosidad el presentar á los lectores estas reflexiones si se atiende á que tratamos de una ciencia que abraza un objeto tan plausible y en la que todas sus partes repugnan el estudio superficial por cuanto cada una en su perfeccion posible es como forma el todo que se dirige á la conservacion del hombre, sin grandioso y que nunca sabrá apreciarse justamente. Pero la terapeutica aquella parte de la medicina que trata de curar las enfermedades y que incluye en sí el arte de recetar que no es mas que una parte conmutativa de ella, exige escrupulosísimas reflexiones y meditaciones las mas detenidas como sabiamente se manifiestan en los prolegómenos que sirven de introduccion al tratado de terapeutica del célebre Alibert.

¿Cuán reprehensible no seria la conducta del médico que colocado en la cabecera de su enfermo y hecho cargo de su dolencia tratase de aplicar la misma medicina y en las mismas dosis con que los autores mas esclarecidos asegurasen haber curado enfermedades de aquel género en otros dolientes?

La edad, el clima, el sexo, los diferentes estados de este en el bello, y la idiosyncracia producirán infinitas variedades á que deberá estar atento el profesor, y

sin cuya precisa consideracion y la de los cambios que ellas exijan, la medicina seria inútil y las mas veces arriesgada.

Acaso pueda decirse que ésta, siendo de tanto aprecio, es una de las reflexiones mas sencillas comparada con otras que igualmente deben estar al alcance del médico. En efecto, todo el mundo sabe que Hipócrates cuando trata de la administracion de los remedios insiste nerviosamente sobre la eleccion de la ocasion, Galeno y Bordeau hablan tambien advirtiendo la necesidad que hay de tener cuidado con respecto á los periodos de la enfermedad. Un medicamento tomado inopinadamente léjos de obrar como tal, se convierte en un veneno, que presentando un terrible obstáculo, contraría las benéficas terminaciones y tendencias con que naturaleza próvida poniendose al frente de las enfermedades las supera, ora sea sola, ora bien auxiliada del arte.

El simple ó compuesto que está indicado al fin de una enfermedad, no puede convenir en el principio, aumento ó estado de ella, si se desprecia esta consideracion é indistinta y tumultuosamente se aplican medicinas; si antes que una haya producido aquella accion de que debemos esperar el benéfico efecto se le interrumpe á veces y á veces se le contraría con la propinacion de otra ú otras muchas; y si por último no se observa la marcha paulatina que fija naturaleza en las crónicas y la rápida con que se precipitan las agudas para arreglar á este inalterable órden el dietético y farmaceutico, ¿cómo podrá llamarse este sistema curativo? El médico en este caso será un criminal homicida de su enfermo á quien deberémos acordar el nombre de víctima sacrificada á tan indiscreta y exterminadora conducta, con la que aglomerará y redoblará parosismos, desenvolverá síntomas nuevos, y cambiando de tal modo la enfermedad, se le presentará ésta desconocida, se separará del primer diagnóstico que formó, dudará, no sabrá caracterizarla, interrumpirá una crisis benéfica, y cual piloto tímido que

receloso de zozobrar practica sin examen maniobras que lo sumerjen en el insondable piélago, anticipandole su ruina; así, pues, la muerte prematura del doliente será el triste resultado de su poca reflexion.

Tan nocivo es aplicar medicinas sin consideracion del tiempo de la enfermedad en que deben usarse, como el emplearlas en aquellos afectos que no necesitan de su auxilio. No en todas las enfermedades estamos precisados á echar mano de los recursos farmaceuticos, hay algunas en que éstos saliendo de la esfera de inútiles se acercarian al grado de perjudiciales; en esta debe recurrir el médico á otra fuente de medicinas que no se encuentran en la botica. Galeno, á quien en justicia no se le puede negar la gloria de haber meditado con fruto en las verdades mas preciosas del arte de curar, advirtió la grande diferencia que presenta el hombre con respecto al resto de los animales; la misma naturaleza que lo ha facultado para el doble comercio de transmitir sus ideas y recibir las de sus semejantes, lo ha expuesto en trueque de esta ventaja á mil pasiones devorantes sujetándolo por su medio á infinidad de tormentos; para él están reservadas las escenas mas lastimeras en cuyos tristes bastidores se presentan las desgracias, el odio insoportable, la devoradora ambicion, la emulacion detestable, el torpe tédio y la perplexidad fastidiosa. Esta misma fuerza, esta superioridad de razon es infinitas ocasiones la causa de sus afecciones, él se agita por instantes en un destino cuyos límites le parecen estrechos y que pretende agrandar á toda costa. Aquí es donde se ve precisado el médico á socorrer el afecto moral á la manera que está obligado á hacerlo con el fisico, y á imitacion del médico de Cos debe consolar al enfermo en sus aflicciones, para lo que se necesita que esté dotado de una alma grande y llena de caridad, en una palabra que tenga un caudal de sana moral que es una de las condiciones indispensables para ser buen facultativo.

\*

A mas de esto ¿cuántas ocasiones se han presentado para observar la necesidad en que estamos de excitar las pasiones en las enfermedades largas y peligrosas? La bulliciosa inquietud de la alegría ocasionada por una noticia agradable, la inesperada vista de un objeto amado, el placer de ver saciado un gran deseo, un cambio repentino de los sentimientos que agovian un corazon, una pronta sorpresa, una conmocion extraordinaria del sistema intelectual han producido muchas veces revoluciones las mas felices en el orden, marcha, é intensidad de los síntomas morbosos. El vulgo mismo expectador de algunos de estos hechos, accidentalmente presentados, ha observado y con la conviccion de la experiencia vocifera, que las calenturas intermitentes que conoce bajo el nombre de frios se destierran cuando los enfermos que los arrostran son sorprendidos por algunos de estos afectos. La curiosa historia de las afecciones morales forma, pues, una doctrina de la que se vé el médico precisado á hacer un constante estudio, sin el cual la medicina no seria otra cosa mas que una ciencia seca, árida é insuficiente.

Tales son las consideraciones y conocimientos que deben acompañar al que quiera hacer un benéfico uso de esta obra; circunstancias que no pueden darse mas que en los verdaderos profesores y de ningun modo en los profanadores del templo de Esculapio.

\*

## ADVERTENCIA

### *SOBRE ESTA NUEVA EDICION.*

**N**o habria cosa mas fácil que aumentar este formulario agregando á cada edicion las prescripciones que de una á otra edicion se han presentado en las obras recientes de medicina apoyadas en la recomendacion de los prácticos esclarecidos que las han usado con suceso; pero haciéndose esta recoleccion voluminosa dejaria de ser portátil y manuable y no llenaria el fin con que se ha escrito. Me limito, pues, á hacer en esta edicion algunas correcciones y supresiones que se me han indicado en la crítica de los diarios de medicina, crítica juiciosa que no tiene otro objeto que hacer esta obra mas útil. Reemplazo las fórmulas suprimidas con un número poco mas ó menos igual de otras selectas, empeñandome especialmente en colocar con mas método y regularidad el Memorial Farmacéutico; pero advierto escrupulosamente al comun de los lectores que no se debe considerar esta parte de recoleccion mas que como una tabla de materia hecha para recordar á los médicos algunas ideas que puedan

haber olvidado, y en la que aquel que no tuviese conocimientos en medicina no encontrará mas que indicaciones propias para descaminarlo. El imprudente que buscase en este Memorial un orden cualesquiera de tratamiento expondría la vida de su enfermo, y en caso que lo curase no deberia este suceso mas que á una casualidad muy peligrosa. Aunque he presentado esta observacion en el prefacio, me he creido, no obstante, en la obligacion de reproducirla aqui.

C. L. C. de G.

## PREFACIO.

Aquel vivo deseo de aliviar ó de evitar los males que todo hombre está condenado á sufrir desde que nace, ha creado precisamente aquel arte con cuyo auxilio se conocen en la naturaleza las sustancias que ya en su estado de simplicidad ó de mixtion, ya puras ó modificadas pueden servir de remedio. El empirismo fué la primera guia, la credulidad el primer juez, y en esta ciega experiencia el observador extraviado en el principio por las ideas supersticiosas que atribuian la mayor parte de los males á la maligna influencia de los astros ó de las divinidades; ha buscado para oponerle aquello que en el sistema de los cultos parecia contrario á su maligna influencia. La farmacia y la medicina nacieron al mismo tiempo, y estuvieron largo espacio confundidas. (1) Poco importa que su cuna la haya tenido en Egipto, China ó en la Caldea; el arte de curar estuvo en los principios entre las manos de los párrocos, poetas y charlatanes. Los enfermos eran conducidos á los templos, y en sus columnas se apuntaban en Egipto los remedios que habian producido buen suceso. La administracion de estos remedios iba siempre acompañada de ceremonias, conjuraciones y de deprecaciones; ya se dicesen sustancias inertes ya activas. Todavía se encuentra en la India esta medicina primitiva y religiosa.

Es tal el imperio de las preocupaciones que los progresos de las ciencias físicas no han podido desterrar de la materia médica un gran número de remedios insignificantes que fueron admitidos en otro tiempo por la preocupacion supersti-

---

(1) Entre los griegos y en el tiempo de Epicuro se daba á los boticarios el nombre de médicos sedentarios, porque sentados en sus boticas esperaban á los enfermos. Aristóteles, dice James, ejerció algun tiempo este oficio (Dict. de Medicina tom. 1. pag. 52). Este fué tambien el de Eudamus y el de un cierto Chariton de quien Galeno ha sacado algunas descripciones de medicamentos.

2.  
ciosa. Se ha convenido en deséchar como medios curativos á la disposicion de los hombres, las ceremonias, súplicas y conjuraciones; pero no se ha abandonado aun en los tratados mas recientes, el nombre de muchas sustancias sin propiedades conocidas ó especiales: *los nidos de alciones, las piedras de aguilta ó de golondrinas, los ojos de cangrejos, las uñas de la gran bestia, el bezár, la orchilla, la jada, las lágrimas de ciervos,* y muchas otras que hace mucho tiempo debian haber desaparecido. Muy recientemente es cuando se han sometido á una análisis bastante exacta los remedios heroicos elegidos entre los medicamentos simples. La quina, el opio, la hiepacacuana, las cantáridas y algunos otros se conocen mejor que se conocian. Sin embargo no se han aplicado todavía á la clínica los resultados de estos exámenes químicos y las análisis que no han podido confirmar las observaciones prácticas no pueden ser miradas como completas.

Cuando se lee la historia de la medicina se ve la materia médica (esta parte del arte de curar que consiste en clasificar los medicamentos simples y sus propiedades despues de haber trazado su historia natural) que toma ya una forma regular en los escritos de Dioscorides donde no se encuentran las idéas fabulosas de Nicandro. Sigue despues Galeno y dá grandes impulsos á la farmacia, cuyas fórmulas compuestas se multiplicaron bajo Actio y Rhasis, Avicena, Averroës y otros que adoptaron la Polifarmacia de los Egipcios y de los Arabes. El renacimiento de las letras y de la medicina hipocrática indujo algunos cambios en la preparacion de los medicamentos, pero no los ha simplificado. La alchimia por el contrario, enseña nuevas combinaciones y desde Paracelso hasta Shtal y Boerhave se complicó mas y mas la farmacia. Se creyó en un principio que mientras mas compuesto era un medicamento, mas propiedades tenia. Despues de haber acumulado sustancias sin conseguir mayores resultas cayeron los médicos en el extremo opuesto y han alabado exclusivamente á las sustancias simples, no hay cosa mas razonable, sin duda que la opinion de los prácticos que juzgan que el medio mas cierto de apreciar la accion de los medicamentos en otros órganos es el de simplificarlos. Es necesario convenir en ella, la teoría de todas las ciencias físicas indica esta marcha; ¿pero para seguirla se debe proscribir enteramente la polifarmacia? ¿no vale mas esclarecerla? En la medicina, así como en la política, todas las revoluciones para no ser funestas deben obrarse con mucha lentitud. Es necesario ir paso por paso, guiado siempre por la experiencia, reformar prudentemente y no dejarse seducir por la evi-

dencia de las verdades teóricas, porque muchas veces la práctica no corresponde á la teórica. Las antiguas opiniones difíciles de desterrar piden prudencia. Los sucesos incontestables que han seguido los mas célebres médicos con el empleo de las medicinas compuestas, convidan á seguir el método que les ha producido ventaja, y tal es la debilidad humana que un médico está siempre mas ó menos obligado á condescender con las voluntades, caprichos, ó supersticiones de la mayor parte de los enfermos impacientes, que no estando al alcance de los conocimientos modernos, se figuran que se les desprecia ó que no se conocen sus males cuando no se les prescriben mas que medicinas simples. En el mundo la mayor parte de las gentes acomodadas se jactan de poseer conocimientos generales; creen á la medicina tan firmemente como el enfermo de Demolier, juzgan la ciencia y capacidad de sus médicos por la multiplicidad de las recetas que prescribe, tanto que un práctico muy esclarecido que se desdénaba de hacer á sus enfermos un romance de sus enfermedades, se ha visto disminuir rápidamente de crédito porque ha restringido sus proscripciones á un pequeño número de medicamentos cuyos efectos pueden ser previstos, calculados y mirados como ciertos.

Pero dirán, el médico que conoce sus deberes, que honra su profesión guiado siempre por el amor de la humanidad, no cede á las consideraciones del interés personal; el no sigue mas que su conciencia, no ordena mas á sus enfermos que los medicamentos que conoce y cuyas propiedades ha estudiado: pero en fin se juzga que siempre es mas fácil determinar la acción de un medicamento simple que el de un compuesto. Sobre este principio es sobre el cual los antagonistas de la polifarmacia han establecido todo su sistema. Antes de combatirlo y para apreciar su justo valor será conducente producir sus objeciones en toda su fuerza.

» La mezcla y la confusion de los medicamentos, dicen (1) es uno de los mayores obstáculos que tiene que superar la medicina para su adelantamiento. Mientras que se haga uso de los remedios compuestos de la farmacopéa Galénica, no se podrá saber cosa acerca de sus verdaderas propiedades. La antigua escuela de Cos, empleaba remedios simples. (2)

(1) Fourcroy (del arte de conocer y de emplear los medicamentos) tom. 1. pág. 446.

(2) Se encuentran en Hipócrates muchas preparaciones compuestas.

» no presentaba al enfermo mas que un solo medicamento, y  
 » no los administraba sino uno despues de otro cuando las cir-  
 » cunstancias exigian que se variase su naturaleza. Sino se re-  
 » nuncia á este lujo peligroso, permanecerá la ciencia en el es-  
 » tado en que se halla, agoviada de pretendidas riquezas no  
 » podrá hacer ninguno uso de ellas. En lugar de electuarios  
 » famosos, de decocciones compuestas, de preciosas opiatas, de  
 » multiplicadas pildoras, una materia mineral, vegetal ó ani-  
 » mal ea sustancia, sales cuya naturaleza es bien conocida, al-  
 » gunas preparaciones quimicas simples, es lo que debe cons-  
 » tituir la materia médica.»

Algunos médicos aseguran que con doce ó quince sus-  
 tancias simples y tales como las presenta la naturaleza, pue-  
 den tratar todas las enfermedades, crónicas, agudas internas  
 y externas... Tratar debe entenderse curar. Siendo esto asi, la  
 medicina no tiene mas progresos que hacer y la terapeutica no  
 será un estudio muy difícil. Es necesario felicitarnos de tan gran-  
 de descubrimiento, quemar todos los formularios, todas las far-  
 macopéas, cerrar todos los laboratorios, las oficinas y conservar  
 solamente en cada ciudad un droguista decente que vendiese  
 por mayor y menor las quince sustancias dotadas de tan be-  
 llas propiedades. Pero como muchos prácticos respetables no  
 conocen todavía el beneficio de esta grande simplificación, co-  
 mo ésta *oligo-farmacia* no tiene el asentimiento general, se pue-  
 de aun examinar y preguntar á sus partidarios lo que ellos en-  
 tienden por remedio simple.

No hay equivocacion si se designa por ella el ejer-  
 cicio en sus diferentes especies, la aplicacion ó substraccion  
 del calorico de la luz de la electricidad del magnetismo (suponien-  
 doles una accion sobre nuestros órganos) las fricciones secas, las lo-  
 ciones con el agua pura, los baños &c., pero cuando se cita  
 una sustancia orgánica ó mineral cualesquiera, el quimista os  
 replica y dice: no hay medicamento alguno simple. Tal pre-  
 paracion muy compuesta en apariencia, no admite otros ele-  
 mentos, otros principios que aquellos que se contienen en una  
 sola sustancia tomada aisladamente. La accion de un medica-  
 mento simple, quiere decir, de una sustancia única, es siem-  
 pre mixta, bien que especial; y muchas veces un medicamen-  
 to compuesto obra como obraría un medicamento simple que  
 tuviera la misma propiedad. Puede que fuera tan difícil sustituir  
 una medicina simple á la teriaca como una compuesta al mercurio.  
 La accion es una, de una y otra parte, y relativamente á la  
 accion todos los medicamentos podrian considerarse como sim-  
 ples. En la *Dyámnica* vemos una esfera arrebatada por dife-

rentes cuerpos á la vez, colocar siempre una diagonal sea que ella obedezca á dos ó á veinte impulsiones simultáneas, del mismo modo en la accion de los medicamentos; las causas son multiplicadas, el efecto uno.

Para aclarar mas esta importante cuestion aplicaremos lo que se acaba de decir á cualquiera sustancia mirada como simple en medicina, á un gas á una sal.... ¿Se sabe si un gas obra por su radical ó por el calórico, la luz y la electricidad que contiene, si es una sal, tal como el nitro, la accion es debida al oxigeno, al azoe ó á la potasa? El modo de obrar de los medicamentos es tan misterioso cuando se usan las sustancias solas como cuando las compuestas. (1) No se puede encontrar la razon de esto en la accion particular de los elementos componentes. Esta accion se modifica siempre por la fuerza vital, de lo que resulta que no hay verdaderamente sustituyentes en medicina asi como en las lenguas no hay perfectos sinónimos.

La análisis química ha servido hasta el presente de poco socorro con especialidad cuando ha sido aplicada á los medicamentos sacados del reino vegetal que son los mas. En efecto ¿de qué utilidad es para la medicina el saber que el opio, la cicuta, el euforbio, la quina asi como el azucar, la goma y la harina ofrecen por último resultado oxigeno, carbon é hidrogeno, y que las propiedades tan diferentes de estas sustancias dependen de las proporciones variadas de este principio? (2) ¿Qué debe concluirse de semejantes hechos sino es que los medicamentos deben ser admitidos ó rechazados despues de la experiencia médica, y que si esta regla es recibida y practicada para los remedios simples no hay motivo para que no lo sea para los compuestos?

No estamos tampoco en el tiempo en que se creía que

(1) Los mas sábios médicos no han encontrado mejor razon del efecto narcótico del opio, que aquella dada por el famoso cómico: opium facit dormire quia est in eo virtus dormitiva.

(2) No por esto debe creerse que la análisis química sea enteramente inútil á la medicina, ella le ha hecho grandes servicios. Se le debe la teoria de la respiracion, el conocimiento de la formacion de los cálculos, el de las alteraciones que sufren la orina y los huzos &c. La química á explicado algunas propiedades de los vegetales análogos; y como la analisis vegetal hace diariamente nuevos progresos se deben esperar de esta, aplicaciones aun mas útiles. \*

en una mezcla farmacéutica cada cuerpo obra según sus propiedades particulares y específicas; que el uno iba á reanimar el cerebro mientras el otro fortalecía el estómago y que un tercero deparaba la sangre &c. Tampoco pensamos que hay siempre necesidad de componer una fórmula con una base agente principal, uno ó dos ayudantes, un correctivo y un excipiente. Estas ideas sistemáticas se han abandonado; pero se sabe que medicamento puede ser modificado en sus efectos por uno otro, que el opio y la quina, por ejemplo, cuando ellos se juntan obran de un modo diferente que cuando están separados, que el emético se hace purgante cuando se mezcla con una otra sal. El empirismo ha comprobado que las preparaciones muy complicadas tales como la triaca, el diascordio y el jarabe anti-escorbútico, tienen propiedades que no se encuentran en ninguna sustancia simple, de lo que debe concluirse que es necesario en medicina como en la química admitir esta ley: los compuestos tienen propiedades nuevas y diferentes de sus componentes.

Para proceder con método y formarse una buena teoría sobre los medicamentos sería necesario ensayar todas las sustancias miradas como simples, combinar después las indicaciones dos á dos, tres á tres para ver sus compuestos. ¿Qué resultaría? Se sabe sobre esto bastante para poder afirmar con anticipación que no hay analogía entre la acción de los componentes, y la de los compuestos; no se podría inferir de lo uno, lo otro y todo se reduce en ambos casos á acciones propias individuales, independientes y especiales aunque mixtas. De lo que se sigue necesariamente que los sucesos obtenidos por los medicamentos compuestos muchas veces experimentados pueden considerarse como otras tantas experiencias hechas y como nosotros miramos la experiencia médica como el solo arbitrio que puede decidir la cuestión, habiendo la experiencia sancionado los remedios compuestos, nos parece que estamos suficientemente autorizados para emplearlos en la práctica (1).

---

(1) *Mi opinión coincide perfectamente con aquella que M. el Dr. Macartan y M. Planche han manifestado en una disertación que han leído en la sociedad médica de París en enero de 1812. Ellos han dicho:*

*La experiencia enseña que un medicamento mezclado á otro, parte sus propiedades ó no las goza mas que en un grado inferior y es muchas veces mas útil que empleado aisladamente y á mas*

Concluyese de todo lo precedente que es permitido, que es lícito y útil el hacer una eleccion de formulas acreditadas por el largo uso de prácticos célebres. Sin duda es necesario reformar la Polifarmacia, es preciso hacer desaparecer de las formulas las sustancias inertes que la ignorancia y la supersticion habian colocado en ella, es menester no emplear mas que las sustancias conocidas y de buena eleccion, no asociando aquellos que se destruyen mutuamente; pero es fuerza conservar y respetar los remedios compuestos que han producido sucesos constantes en las manos de los grandes prácticos á lo menos hasta que la experiencia haya dado medios mas seguros y mas simples.

Las farmacopeas actuales son muy numerosas y muy variadas; cada pais, cada escuela tiene la suya; las hay muy voluminosas, pero no hay alguna que reuna las formulas de los médicos modernos, formulas esparcidas en las memorias, en los tratados particulares ó en las obras periodicas. Muchas de es-

fuertes dosis. Se observa por ejemplo que una fiebre intermitente rebelde á la quina sola, cede frecuentemente mezclandole á este febrifugo el tartaro antimoniado de potasa, el acetate ó muriate de amoniaco, el carbonate, el nitrate ó el sulfate de potasa, el polvo de manzanilla romana &c. segun las circunstancias. Se observa que en los casos de fiebres intermitentes de clorosis, de amenorreas, blenorreas, de ciertas leucorreas atónicas &c. donde el sulfate de hierro recomendado con razon por M. Maraecura; es alguna veces mas ventajoso mezclandose la mirra y con especialidad el carbonate de potasa como lo hacia el Dr. Griffuh. En esta última circunstancia hay descomposicion y combinacion. El acido sulfúrico abandona el hierro para formar con la potasa una sal ligeramente laxante que impide la constipacion ordinariamente producida por este metal y se encuentra este precipitado en el estado de oxido carbonizado muy dividido.

La experiencia prueba tambien que la esperanza de llevar muchas indicaciones á la vez lejos de ser siempre quimérica es á ocasiones real. Quién de nosotros no ha observado que en una fiebre adyámica cuando hay calor en las extremidades, sequedad en la lengua y la piel, hipo, susulto de tendones, coma, constipacion tenaz ó diarrea &c. la quina dada sola agrava ordinariamente el mal, mientras que prescripta con los ácidos, con el acetate de amoniaco á fuertes dosis, el alcanfor, los licores fermentados, los anti-espasmodicos, á veces el mercurio dulce, algunos granos del ruibarbo ó el carbonate de cal, despues de las diversas indicaciones aústa en muchos casos estos sintomas alarmantes?

tas prescripciones están en boga y han adquirido una reputación fundada en la de sus inventores, y poco á poco han caído en olvido ó se han alterado porque no se les ha colectado cuidadosamente en un cuaderno. Los médicos que quieren prescribirlas no saben muchas veces de donde tomarlas, ellos las ordenan con frecuencia bajo el simple nombre de sus autores, y el farmacéutico que no siempre tiene una gran biblioteca á su disposición se halla embarazado para encontrar la fórmula y despacharla. Es, pues, hacer un servicio igual á los prácticos y boticarios el reunir aquellas que se piden con mas frecuencia.

Sería un volumen inmenso si se quisiera publicar una coleccion completa de las prescripciones magistrales que han sido impresas separadamente preconizadas y recomendadas; pero la abundancia sería aquí mas perjudicial que la escasez, y es fuerza limitarse á una eleccion razonable. Esta eleccion ha sido hecha mas de las preparaciones que se han abogado en la oficina de mi padre y en la mia desde cuarenta años, que de las obras de los médicos, tales son aquellas de Maloet, Zoaque, Taowchin, Buovart, Barther &c. Pero en leyendo los escritos de los médicos extrangeros se conocerá que de ellos he recolectado las de Franck, Brown, Huxham, Wilis, Pringle, Quarin, Swediaur &c. Ellas estaban poco repartidas en las oficinas, muchas sin embargo adoptadas por algunas boticas se miraban como propias de ellas. En nuestra profesion no debe haber nada secreto y léjos de que lleven á mal ejemplo que yo doy me atrevo á creer que los farmacéuticos, juzgarán de él favorablemente y lo seguirán.

Como esta recoleccion no es una farmacopea metódica y si un simple compeadio, cuyo único fin es evitar á los médicos y farmacéuticos el registrar largo tiempo libros, sigo como mas cómodo el orden alfabetico y para no hacer de esta obra un manual popular donde todo enfermo podría elegir y preparar el medicamento que creyese le convenia; he entrado lo menos posible en los detalles de la preparacion ó manipulacion á fin de que estas formulas no puedan ser empleadas mas que por los médicos y preparadas por los farmacéuticos que con la sola enuacion de las sustancias deben saber cuales son las operaciones necesarias para la ejecucion de lo mandado.

Para facilitar el uso de este formulario he pensado que sería necesario juntarle tres tablas: la primera la de los autores á quienes se debe la fórmula, la segunda la de las prescripciones, la tercera la de las enfermedades á que los médicos las han destinado con especialidad. Así para dar un ejem-

6.  
plo la pocion anti-emética del Dr. Riverio se encontrará en la primera tabla bajo el nombre de Riverio; en la segunda en el lugar de las pociones, y en la tercera en el artículo vomico.

Me he apresurado para colocar en seguida de este formulario el memorial farmacéutico que le termina. Temo que no se me critique el haberme injerido en un arte que me es extraño; y de osar indicar un modo de tratamiento señalando los medicamentos para las enfermedades. Yo no he tenido esta pretension ridicula y peligrosa, digo á los que lean este memorial, como si se consultase un libro de medicina que se expondrán á los mas funestos errores. Es necesario ser médico ejercitado para elejir con discernimiento en una série de medicamentos afectados á un género de enfermedad aquel que convenga á la especie que se quiere tratar. Un remedio excelente en tal fiebre, tal flemacia, es inútil y peligroso en una enfermedad del mismo género si hay contra indicaciones ó complicaciones que no puede juzgar el que no es médico. Por otra parte la edad, el sexo, el clima, el temperamento y muchas otras consideraciones pueden hacer modificar la dosis de una prescripcion. Para que los médicos solos puedan servirse de esta parte de la obra prevengo al lector que no siga en el orden del memorial algun rejimen curativo, primero porque no me pertenece, y por último porque esto no entra en mi plan. No he querido en esta nomenclatura mas que ayudar á los prácticos cuya memoria por feliz que sea no puede tener siempre presente la série de los métodos empleados en todas las enfermedades, y sobre todo las diferentes dosis á que se les prescribe. He querido recordarles las diferentes preparaciones contenidas en este formulario y darles á los farmacéuticos conocimiento de aquellas que se les pueden pedir. Yo pienso que esta especie de cuadro no será inutil á los estudiantes de medicina, porque comparando las diferentes preparaciones indicadas para los mismos casos, señalará las sustancias en que se tiene mas confianza, aquellas que se le asocian mas comunmente y las formas variadas, bajo las cuales se les presentan á los enfermos. Este aproximamiento puede dar á los médicos las ideas de reforma ó de perfeccion. La clasificacion de las medicinas para las enfermedades no es una cosa nueva; muchas farmacopeas ofrecen el ejemplo; yo no he hecho mas que imitarlas y los médicos que cito son los que me han dado las indicaciones. He creido poder decir: los prácticos prescriben ordinariamente en la Hemotisis, la conserva de rosas, el elixir de Minsicht, el extracto de cachunde &c. Pues que en los formularios donde se dá el modo de preparacion de estos medi-

oamentos, no dejan de unir los médicos que ellos son empleados en la Hemotisis.

Insisto sobre esta explicacion porque el mayor disgusto que podria darme la malevolencia, seria el criticar que me excedia en mis escritos ingiriendome en materia de medicina. Como no hay mérito alguno en publicar una simple recoleccion de fórmulas que he tomado de cien autores no puedo proponerme otro fin que la utilidad pública sin sacar gloria alguna de un trabajo que no pide mas que paciencia y exactitud.

C. G. S.

FORMULARIO MAGISTRAL.

FÓRMULAS.

BAÑO DE AGUA MINERAL SULFÚREA ARTIFICIAL,  
imitando las de Valletria.

- De hydro sulfuro de potasa líquido y bien saturado . . . . . VIII onzas.
- De sulfuro de potasa seco . . . . . II idem.
- De sulfuro de cal líquido y bien saturado . . . . . VIII idem.
- De agua comun. . . . . VIII idem.

Se disuelve el sulfureto de potasa seco en la cantidad de agua indicada arriba. Se une esta disolucion á los otros dos licores precedentes y luego se forma un precipitado que se separará por la filtracion.

Dos onzas de este líquido bastan para un baño de doce viages de agua. Cuando se empieza el uso de los baños sulfurosos no se emplea ordinariamente más que onza y media, y despues se va aumentando sucesivamente hasta dos y media onzas.

M. M. Planche y Boullay farmacéuticos de París, han indicado otro método para imitar las aguas de Valletria. He aqui su fórmula.

- Sulfureto hydrogenado de Sosa concentrado á 25° del Hydrom. . . . . X onzas.
- Solucion salina gelatinosa. . . . . IV idem.

Se mezcla el todo al agua del baño al tiempo mismo de usarlo. Se compone la solucion salina gelatinosa con:

- De sulfato de Sosa . . . . . } a IV dracmas.
- De Muriate de Sosa . . . . . }
- De carbonate de Sosa . . . . . } a I idem.
- De cola de Flandes . . . . . }
- De petroleo rectificado . . . . . XX gotas.
- De agua destilada . . . . . I libra.

Se disuelve y se filtra.

Los baños de agua de Bareges convienen en las enfermedades de la piel, en las úlceras y fistulas, en las enfermedades nerviosas atónicas, y en las parálisis y reumatismos crónicos. Se administran estas aguas en duchas para disolver los tu-

mores artríticos, los exostores y anquiloses. Se usan interiormente en las afecciones de pecho catarrales crónicas, en el asma, las obstrucciones de las entrañas y las afecciones venéreas que han resistido á los remedios generales. Son incisivas y diuréticas. Su dosis es de medio azumbre á dos pintas por día, según las circunstancias y fuerzas del enfermo.

### BÁLSAMO DE GENEVIEVE.

De aceite de olivas . . . . . III libras.  
 De cera amarilla en pequeños pedazos }  
 De agua de rosas . . . . . } a VIII onzas.  
 De sándalo rojo en polvo . . . . . II onzas.  
 De buen vino tinto . . . . . III libras.

Se pone todo en un lebrillo de barro vidriado: se deja hervir durante media hora moviéndolo bien con una espátula del palo. Se agrega

De trementina de Venecia fina . . . . . I libra.

Se incorpora todo con la espátula durante uno ó dos minutos, se aparta la basija del fuego y cuando el bálsamo está un poco frío se le añade:

De alcanfor en polvo . . . . . II onzas.

Se remueve con la espátula, se cuele en seguida el bálsamo al través de un lienzo y se deja reposar hasta la mañana siguiente, se esprime el agua que podría contener y se coloca en un bote de loza para conservarlo.

Se aplica este bálsamo sobre las úlceras, las partes gangrenadas, contusas y heridas: se cubre la herida con papel de estraza y se renueva la aplicación dos veces cada día. Se usa mucho en Inglaterra.

### BÁLSAMO DE RICOUR.

(Véase unguento.)

### BÁLSAMO SAJÓN.

De aceite destilado de alucema . . . } a. I y  $\frac{1}{2}$  dracma.  
 De succino . . . . . }  
 De orégano . . . . . } a. I dracma.  
 De mejorana . . . . . }

- De salvia . . . . . a. I dracma.
- De romero . . . . . a. I dracma.
- De macias . . . . . a. II escrúpulos.
- De yervabuena . . . . . a. II escrúpulos.
- De ruda . . . . . a. II escrúpulos.
- Concreto de nuez noscada . . . . . IV onz y I dracma.

Se mezclan en frío y se aplican a los miembros de los niños débiles: á veces se les hacen tomar algunas gotas en azucar para facilitar la digestion.

**BALSAMO ACUSTICO.**

- De aceite de almendras dulces . . . . . I dracma.
- De hiel de bueyes . . . . . II idem.
- De bálsamo de Fioraventi . . . . . media idem.

M. S. A.

Se introduce este bálsamo en el oido á la ayuda de un lechino en el caso de sordera accidental.

**BALSAMO DE OPODELDOC. (1)**

Tomense huesos, contundanse y ponganse á hervir en s. q. de agua hasta que se presente en su superficie un cuerpo untuoso de la naturaleza de la grasa: pásese por tamiz la decoccion y pongásele en un vaso de barro. Por el enfriamiento la gelatina de los huesos se precipita y se separa la grasa. Hagase fundir esta última á un dulce calor y filtrése.

- De potasa del comercio . . . . . I libra.
- De cal viva . . . . . II idem.
- De agua s. q.

Hagase una fuerte legía, filtrése, reduzcase el licor hasta que un frasco contenido tres onzas de agua, pese cuatro onzas con este licor.

- De grasa obtenida de los huesos . . . I libra.
- De potasa cáustica . . . . . VII onzas.

(1) Hay muchas fórmulas del bálsamo de Opedelloc: ésta adoptada por Mr. Klapproth, parece la mejor y ha producido mejores efectos.

\*

Mezclése poco á poco á un fuego suave hasta que esté bien formado el jabon, y que resfriado se disuelva completamente en el agua.

Disuélvase en seguida en tres pintas de agua hirviendo.

De sal marina . . . . . VI onzas.

Filtrése y hágase fundir en ella el jabon. Cuando se enfríe córtese en pedazos cuadrados, que se dejarán puestos al aire durante algun tiempo para quitarle la humedad.

De jabon indicado arriba . . . . . II onzas.

De alcohol rectificado . . . . . I libra.

De agua destilada . . . . . II onzas.

De alcanfor purificado . . . . . VI dracmas.

Hagáse s. l. la mezcla en un matras: cubráse con una vejiga teniendo cuidado de perforarla para dejar salida al aire.

Hecha fundir la mezcla en el baño de Maria, filtrése estando caliente, resfriese un poco y agréguese.

De esencia de romero . . . . . } II dracmas y II es-  
erúpulos.

De tomillo . . . . . } II escrúpulos.

De amoniaco líquido . . . . . } II dracmas.

En este estado cuelese en frascos largos.

El bálsamo de Opodeldoc se emplea en fricciones en las relajaciones, en las torceduras y dolores reumáticos.

NOTA. Algunos farmaceúticos son de opinion que se debe suprimir en esta preparacion el agua destilada y destilar las esencias con el alcohol, con lo que dicen ellos que obtienen el bálsamo mas blanco.

#### BÁLSAMO DEL CABALLERO DE LABORDA

##### Ó DE FOURCROT.

De aceite de olivas . . . . . IV libras.

De polvos de raiz de angélica . . . . . } a II onzas.

De scorzorena . . . . . } a II onzas.

De hipericon . . . . . } a II onzas.

De ballas de yedra . . . . . } a II onzas.

Puestas á cocer en un fuego lento se dejan macerar durante la noche; vuelvase á poner al fuego por la mañana, y cuando empiece á hervir el aceite añadase:

De teriaca . . . . . } a II dracmas.

De azafrán . . . . . } a II dracmas.

De extracto de caébro . . . . . } a II dracmas.

De aloes . . . . . I idem.

Después que hayan cocido cuélese por un lienzo, déjense reposar por algunas horas, aplíquense de nuevo al fuego y añádanse:

De trementina. . . . . X onzas.

Calíentese hasta que no manifieste olor á trementina, entonces apartése del fuego y agréguese:

De incienso macho. . . . .	} a. I dracma y I es-	
Storaque. . . . .		crúpulo.
Benjuí. . . . .		

Remuevase hasta que se enfríe el bálsamo, déjese aclarar durante dos ó tres dias, cuélese por una servilleta y guardense en botellas bien tapadas.

Es esencial remover constantemente este bálsamo mientras esté en el fuego, con una espátula de palo. (Se emplea exteriormente para curar los infartos glandulares de los pechos, las grietas de la piel, las quebraduras, las torceduras, úlceras, sabañones y dolores reumáticos: se aplica con piñeles ó compresas. P.)

### BÁLSAMO ANTI-ARTRÍTICO

DEL Dr. SANCHEZ.

De jabon animal aromático (1). . . . .	I onza.
De espíritu de alucema rectificado. . . . .	IV idem.
De alcanfor. . . . .	II dracmas.
De acéite esencial de yervabuena con sabor de pimienta. . . . .	I dracma.
De canela. . . . .	} a. XV gotas.
De alucema. . . . .	
De nuez noscada. . . . .	
De clavo del comer. . . . .	
De zazafras. . . . .	} I onza.
De éter acético. . . . .	

F. S. L.

Se emplea este bálsamo en fricciones sobre las partes adoloridas cuando no hay fuerte irritación.

(1) El jabon animal aromático se prepara con seis partes de yema de huevo, una parte de esperma de ballena, una parte de aceite concreto de nuez noscada y de la lejía de la sosa cáustica.



De éter acético. . . . . I onza.  
Mezclése primero el alcanfor y la esencia al jabon animal y disuelto todo en el éter al calor del baño de Maria filtrese.

Este bálsamo se usa en fricciones en las afecciones reumáticas, en la ceaticas y en los dolóres artriticos.

### BÁLSAMO ANODINO DE BATH.

De opio sin limpiar. . . . . I onza.  
De jabon blanco (1). . . . . V idem.  
De alcohol rectificado (2). . . . . II libras.  
De alcanfor. . . . . III dracmas.  
De aceite esencial de romero. . . . . IV idem.

Se digiere el opio y el alcohol durante tres dias, se filtra y se le agrega el alcanfor y el aceite esencial, se agita fuertemente para conseguir una completa mezcla.

Se emplea exteriormente este balsamo para calmar los dolóres artriticos ó reumáticos crónicos.

Se toma interiormente en el cólico nervioso en dosis de 20 á 50 gotas.

### BÁLSAMO DE LA VIDA DE LELIEVRE

#### Ó ELIXIR DE SPINA.

De agárico . . . . . } a. II dracmas.  
De raiz de cedoaria . . . . . }  
De mirra . . . . . } a. I onza.  
De aloes . . . . . }  
De teriaca . . . . . }  
De ruibarbo . . . . . VI dracmas.  
De raiz de genciana . . . . . IV idem.  
De azafrán . . . . . II idem.  
De azúcar . . . . . IV idem.  
De aguardiente . . . . . II libras.

Este elixir es un vermífugo muy fuerte, un estomáqui-

(1) Algunos farmacéuticos prescriben diez onzas disueltas en  
(2) Treinta y dos onzas de alcohol.

co muy caliente, provoca un poco la traspiracion; la dosis es de una á tres cucharadas cada dia á largos intervalos.

**BÁLSAMO DE LA VIDA, DE HOFFMAN.**

De aceite esencial de alucema. . . . .	} a. I escrúpulo.
De mejorana. . . . .	
De clavo de comer. . . . .	
De macías. . . . .	
De canela. . . . .	
De limon. . . . .	} a. $\frac{1}{2}$ idem.
De ruda. . . . .	
De succino rectificado. . . . .	
De ambar gris. . . . .	} X onzas.
De alcohol. . . . .	

Se mezcla en un matras, se deja digerir el todo agitando de tiempo en tiempo hasta que se disuelva el ambar, se filtra y se conserva en un frasco cerrado.

Se emplea este bálsamo exteriormente para fortificar los músculos; se dá algunas veces al interior en los cólicos disentéricos, la dosis es desde diez gotas hasta media dracma.

En los cólicos disentéricos ligeros producidos especialmente por las supresiones de traspiracion, este remedio debe ser favorecido por el blando calor de la cama. (Veáse Stoll.)

**BÁLSAMO ABSTRINGENTE DE RICHARD.**

De aceite de trementina. . . . .	IV onzas.
De ácido sulfúrico. . . . .	IV dracmas.
De alcohol. . . . .	III onzas.

Esta fórmula se encuentra en la farmacopéa de Edimburgo.

Se emplea en la Hemótisis á la dosis de uno á dos escrúpulos en una bebida apropiada.

**BÁLSAMO DE LA VIDA, EXTERNO.**

(Veáse linimento estimulante Inglés.)

**CERVEZA ESTOMACAL INGLESA.**

De raiz de gentiana. . . . .	IV onzas.
------------------------------	-----------

De corteza de limon. . . . . III idem.

De canela. . . . . II dracmas.

De aile (1) . . . . . VIII pintas.

Córtense estos ingredientes en pequeños pedazos y pónganse á infundir en frio durante dos ó tres dias.

La dosis es un vaso, de mañana y tarde.

#### CERVEZA DIURETICA INGLESA.

De granos de mostaza. . . . . } a. VIII onzas.

De ballas de enebro contusas. . . . . }

De granos de dauco chirivia. . . . . VI idem.

De la pequeña aile reciente. . . . . XXXX pintas.

Esta bebida se prescribe en las enfermedades de la vengiga y en las hidropesias insipientes.

#### CERVEZA PURGANTE INGLESA.

De sen . . . . . IV onzas.

De aile. . . . . XXXX pintas.

Se toma un medio cuartillo dos veces al dia para poner el vientre libre.

#### CERVEZA ANTI-ESCORBUTICA

##### Ó DE ESCARAMUJO.

De hojas recientes de coclearia. . . . . } I onza y medio es-

De raiz de rabano. . . . . II onzas.

De vástagos de abeto. . . . . I idem.

(1) Aile: especie de cerveza cuyo uso es muy comun en Inglaterra. Se distingue el aile de la cerveza propiamente dicha, por el tiempo que se ha dejado fermentar, de modo que aile es una cerveza poco fermentada.

Quien quiera instruirse á fondo de las justas diferencias del aile y de la cerveza, así como de sus virtudes, lea las observaciones que ha hecho Lemery acerca de estos licores. — El Traductor.

De cerveza. . . . . IV libras.  
 La dosis es de dos onzas por día y algo mas en el  
 escorbuto.

#### CERVEZA PURGANTE DE STDENHAN.

De polipodio de China . . . . .	I libra.
De rapontico . . . . .	} a. IV onzas.
De sen limpio. . . . .	
De pasas. . . . .	} a. III idem.
De ruibarbo en trozos. . . . .	
De rábauo. . . . .	} a. VI idem.
De hojas de coclearia. . . . .	
De salvia. . . . .	} XXXXV pintas.
Naranjas cortadas. . . . .	
De aile. . . . .	

#### CERVEZA ANTI-ESCORBUTICA DE BUTLER.

De betónica. . . . .	} a. I puñado.
De salvia. . . . .	
De agrimonia. . . . .	} a. IV onzas.
De coclearia. . . . .	
De ajeno romano. . . . .	} XVI pintas.
De raiz de álamo blanco. . . . .	
De rábano . . . . .	
De cerveza reciente. . . . .	

Se meten las yervas y las raíces en un saco de lienzo que se sumerge en la cerveza mientras que ella fermenta.

Esta cerveza purga blandamente, se dá en la dosis de una pinta en la mañana durante quince días, en los embarazos de las víceras abdominales, en la cachexia escorbútica biliosa, reumática &c.

#### CERVEZA CEFALICA INGLESA.

De raiz de valeriana silvestre . . . . .	X onzas.
De semilla de mostaza entera. . . . .	VI idem.
De serpentaria virginiana . . . . .	II idem.
De romero ó salvia. . . . .	III idem.
De cerveza blanca reciente. . . . .	LXXX libras.

Se dá esta bebida en la parálisis, epilepsias y vertigos, bebiendo el enfermo 4 ó 5 cuartillos por dia. Pero importa distinguir cual es la verdadera causa de estas parálisis ó enfermedades. Este remedio solo conviene cuando se trata de excitar y hacer revolucion.

### CERVEZA DE QUINA DE MUTIS

#### DICHA PROFILÁCTICA. (1)

De quina roja. . . . .	} a. IV onzas.
— Gris . . . . .	
— Amarilla . . . . .	VIII idem.
De canela. . . . .	IV dracmas.
De nuez noscada. . . . .	núm. I.
De azucar. . . . .	VIII libras.
De cerveza. . . . .	C idem.

Esta cerveza es destinada á los convealescentes despues de las enfermedades agudas.

#### BIZCOCHOS PURGANTES.

De xalapa. . . . .	} V dracmas y medio espúlo.
De azúcar. . . . .	
De harina. . . . .	IV onzas.
De huevos. . . . .	IV dracmas.
Para 15 bizcochos..	núm. VI.

Se dá uno de estos bizcochos á un niño de cuatro á cinco años para purgarlo. Se pueden dar dos á un adolescente.

#### BIZCOCHOS VERMIFUGOS.

De azúcar en polvo. . . . .	media libra.
De harina . . . . .	II onzas.
De raíces de ajajos en polvos. . . . .	I dracma.
De huevos. . . . .	núm. VI.
De esencia de limon. . . . .	XV gotas.
Para 24 bizcochos.	

(1) De yo preservo yo garanto.

Se dá uno de estos bizcochos por la mañana y otro por la tarde á los niños que tienen lombrices.

### BEBIDA ANTIFLOJISTICA

#### DE STOLL. (1)

De cebada mondada. . . . . II onzas.

Hiervase en una s. q. de agua hasta que se revienta y añádase á la coladura que debe ser de dos libras.

De nitráte de potasa. . . . . dracma y media.

De jarave de vinagre. . . . . II onzas.

Se toma una taza cada hora.

Convienec esta bebida en las fiebres inflamatorias, la equinancia &c. Es muy análoga á la tipsana de Tizot.

### BEBIDA ANTI-NARCÓTICA DEL Dr. VAN-MONS.

De café tostado. . . . . III dracmas.

De vinagre de vino. . . . . XII idem.

Calientese junto hasta que hierva, pásese en seguida y agréguese:

De azúcar. . . . . II dracmas.

Se dán dos cucharadas calientes, cada cuatro horas á los que han abusado del opio.

### BOLO DIAFORÉTICO. (2) INGLÉS.

De resina de guayaco en polvo. . . X granos.

De flores de azufre. . . . . } a. I escrúpulo.

De cremor de tártaro. . . . . }

De jarave comun q. s. . . . .

Se toma este bolo en dos dosis en el dia. Convienec en los dolores de reumatismo y en las enfermedades de la piel; se prescribe tambien en la equinancia.

(1) Este término es sacado de la antigua química, tiene por raíces *contra* y *yo instamo*. Se dá el epíteto de *antiflojisticos* á los remedios, refrigerantes.

(2) Del griego que equivale á favorecer la transpiracion.

Con especialidad conviene en los reumatismos crónicos y en la equinancia inflamatoria.

*BOLO FORTIFICANTE DE DESBOIS.*

De polvos de genciana. . . . .	} a. XII granos.
De zedoaria. . . . .	
De azafrán. . . . .	
De bálsamo de copaiba. . . . .	II dracmas.
De elixir de propiedad. . . . .	XX gotas.
De jarave de yervabuena c. s. para hacer 24 bolos.	

Se dán seis cada día compartiéndolos en tres dosis, conviene en las gonorreas que están al acabar, en las flores blancas crónicas, y en la debilidad de estómago.

*BOLOS CARMINANTES DE DESBOIS*

*DE ROCHEFORT.*

De extracto de centauro menor. . . . .	} a. XXXV granos.
De teriaca. . . . .	
De raíz de genciana. . . . .	} a. XII granos pulverizados.
De angélica. . . . .	
Anís en polvo. . . . .	XVI granos.
De castor. . . . .	VI idem.
De aceite esencial de anís. . . . .	X a XII gotas.
De canela. . . . .	IV idem.
De jarave de yervabuena q. s. . . . .	

Dividase en treinta bolos, de los que se tomarán tres cada cuatro horas.

*BOLO ESTOMÁQUICO DE PARMENTIER.*

De azafrán en polvo. . . . .	VI granos.
De canela pulverizada. . . . .	III idem.
De magnesia pura. . . . .	VIII idem.
De jarave de azúcar q. s.	

Mezclése y hágase un bolo,

## BOLO ANTI-ESPASMÓDICO (1)

DE BUCHAN,

De serpentaria virginiana . . . . . media dracma,  
 De asa fétida . . . . . XII granos.  
 De alcanfor . . . . . VI idem.  
 Hágase un bolo c. s. q. de jarave de azafrán,

## OTRO DEL MISMO.

De serpentaria virginiana en polvo . . I dracma.  
 De alcanfor . . . . . } a. X granos.  
 De asa fétida . . . . . }  
 De extracto gomoso de opio . . . . . I grano.  
 De rob de sauco q. s.

Se dán estos bolos en dosis de cinco á seis, en los vapores histéricos, las afecciones nerviosas, y los vértigos.

## BOLO DIGESTIVO DE SMITH.

De hipecacuana . . . . . De V á VI granos.  
 De polvos de diaromatón (2) . . . . X granos.

(1) De contra y yo retiro. Anti espasmódico quiere decir contra la contraccion involuntaria de los músculos producida por una afeccion nerviosa.

(2) Es el nombre de un antidoto del que Nicolás Myrepsi sect. s. c. 454 habla despues de Galeno. De el sin duda se ha tomado la idea de la especie Dianthus que el colegio de Lóndres prescribe del modo siguiente.

Tómese:

De flores de romero . . . . . I onza.  
 De rosas encarnadas . . . . . }  
 De regalís . . . . . } a. VI dracmas.  
 De clavos de especieria . . . . . }  
 De alacema . . . . . }  
 De nuez moscada . . . . . }  
 De galanga . . . . . } a. IV escrúpulos.  
 De canela . . . . . }  
 De gengibre . . . . . }

De jarave de canela q. s. para hacer un bolo que se toma á la hora de acostarse.

Este bolo conviene á las personas que tienen arruinado el estomago despues de una dispeccia (1) ó indigestion.

De cedoaria. ....	} a. IV escrúpulos.
De macias. ....	
De afoes. ....	
De cardomomo. ....	
De semillas de eneldo. ....	

Pulvericese todo junto.

Zwelfer alaba en extremo este remedio para la cardialgia, las fluxiones y debiidades que provienen de indigestion. Es sin duda excelente esta composicion para todas las indicaciones nerviosas y no ocasiona las enfermedades que son consecuencias del uso que se hace de aquellos aromaticos en que entran el almizcle y alcanfor. Ella fortifica el cerebro y evita las enfermedades que se siguen á la vigilia como la apoplegia, epilepsia, paraisis, falta de memoria &c. Calienta el estomago, los intestinos y toda la masa de los humores. Los remedios de esta especie son de una utilidad singular en los habitos cachecticos donde se han empobrecido los humores por los deterstivos y catárticos violentos, y debilitadas las fibras á causa de que ellos fortifican los sólidos, los reaniman y procuran una vibracion y circulacion tan vigorosa á los unos y á los otros que la digestion y la separacion de las partes recrementicias se hacen en seguida como es necesario lo que evita toda recaída. Estas preparaciones son de una necesidad indispensable en las hidropesias despues de la purgacion y deben darse en los intervalos. Por ignorar esta circunstancia sucede que en la mayor parte de aquellos en quienes se confia todo á los purgantes violentos no consiguen la curacion ni pueden evitar la recaída. = Diccionario. = (a)

(a) El traductor que para dar á conocer la palabra diaromaton ha vaciado en este sitio el párrafo anterior traducido del citado diccionario está muy convencido de que los lectores despreciarán un lenguaje que (cual el de la explicacion de sus virtudes) no se acomodó á los conocimientos actuales, pero no obstante conoce que presentandolo, se penetrarán de la otra con que lo administraban nuestros antepasados y los efectos que producía en la economia animal. = El Traductor.

(1) To digiero con dificultad.

## BOLO DE SWEDIAUR CONTRA LA PARALISIS.

De semilla de mostaza molida. . . . . media dracma.

De alcaravea. . . . . } a. IV granos.

De canela. . . . . }

Pulverícese y agréguese:

De jarave de gengible q. s. (1) para hacer un bolo.

Se dan dos cada día, y á ocasiones se agregan algunas gotas del aceite esencial de trementina.

## CANDELILLAS DE DARAN.

De hojas de cicuta. . . . . } a. un puñado.

De nicociana. . . . . }

De corona de rey olorosa. . . . . }

De flores de hipericon. . . . . }

De aceite de nuez. . . . . X libras.

De estiércol de oveja. . . . . II idem.

Se aplasta el estiércol, se le deluye en el aceite y se hacen hervir en él las plantas indicadas arriba, se aparta la decoccion oleosa, y se le vuelve á poner al fuego con

Enjundia. . . . . } a. III libras.

Sebo de carnero. . . . . }

Calientase, y cuando la mezcla está caliente y bien liquida se le mezcla:

De litargirio en polvo. . . . . VIII libras.

Cuando está perfectamente incorporado se agrega:

De cera amarilla. . . . . II idem.

Se continúa moviendo hasta que el todo quede homogéneo.

Se empapan en esta composición los lienzos que quieren hacerse candelillas.

Veáse las modificaciones de esta receta en la tabla de las materias de la medicina doméstica de Buchan.

(1) El jarave de gengible se prepara por infusion como el de cortezas de naranjas.

## CATAPLASMA ANTI-HERMÍTICA. (1)

De hojas de agenjos.....	} a. III onzas,
De atanasia.....	
De goma gutta.....	} a. I onza, IV drac-
De aloes sucotrino.....	
De incienso macho.....	
De aza fétida.....	mas y I escrúpulo.

Pulvericense separadamente cada una de estas sustancias, agréguese, si hay necesidad, una corta cantidad de polvos de agenjos, á fin de poder pulverizar mas facilmente el aza fétida, mezclése en seguida el todo, y unáse una cantidad suficiente de aceite de espliego para una cataplasma de consistencia un poco firme.

## CATAPLASMA ISQUIÁTICA (2) DE WILIS.

De granos de mostaza.....	VIII onzas.
De pimienta blanca.....	} a. I dracma.
De gengible.....	
De oximiél simple q. s. para hacer una cataplasma.	

Se emplea esta cataplasma en la ceática; es una especie de rubefaciente que muchas veces hace flictenas en la piel.

## CAUSTICO DE FRAT COSME.

Veáse polvo anti-calcinomatoso de F. Cosme.

## CERATO DEL Dr. HUFELAND.

De cerato de esperma de ballena.....	I onza.
De oxide de zinc sublimado y lavado.....	} a. XXXVI granos.
De lycopodio en polvo.....	

Mezclese para formar una pomada que se conservará en un sitio fresco.

Se emplea en la exulceracion de los párpados ó para secar algunas heridas ligeras.

- 
- (1) De contra y lombrices.  
(2) De la na.ga.

## CERATO DE TURNER.

De aceite de olivas . . . . . III libras.  
 De cera blanca . . . . . }  
 De piedra calaminar porfirizada, . . . } a VI onzas.

Fundida en el aceite la cera y cuando la mezcla ha tomado un poco de consistencia unáse la piedra calaminar, y para que se mezcle bien meneese bastante tiempo.

Este cerato se aplica contra las quemaduras y escoriaciones cualquiera que sea la causa.

Despues de la inflamacion.

## CERATO DE POTT.

De litargirio . . . . . I libra.  
 De vinagre . . . . . VIII idem.  
 De jabon blanco . . . . . VIII onzas.

Mezclése todo junto y pongase á cocer la mezcla hasta que se disipe toda la humedad, teniendo cuidado de moverlo continuamente; en seguida agréguese:

De aceite de olivas . . . . . }  
 De cera amarilla . . . . . } a. I libra.

Este cerato se emplea sobre las fracturas y las úlceras.

## CERATO DE RECHOUX.

De carbonate de amoniaco concreto. I dracma.  
 De cerato de Galeno sin agua. . . . . I onza.

Triturése en un mortero de marmol para formar una mezcla exacta y uniforme.

Se emplea en fricciones sobre el cuello á la dosis de una dracma cada cuatro horas en los casos de angina en los niños.

## CERATO MERCURIAL DE FALCK.

De precipitado rojo . . . . . IV dracmas.  
 De mercurio dulce . . . . . II onzas.

Porfirícese este polvo, mezclése y juntésele:  
 De acetate de plomo cristalizado. . . . . I onza.

Mezclése de nuevo é incorporese todo en un cerato hecho con:

- De cera fina. . . . . I onza.
- De aceite de nuez. . . . . VI idem,
- De aceite esencial de alucema. . . . . XXX gotas.

Se pone este cerato sobre las úlceras venereas y sobre algunos herpes tenaces.

**CERATO DE KIRKLAND.**

- De greda preparada. . . . . } a. IV onzas.
- De vinagre destilado. . . . . }
- De aceite de olivas. . . . . }
- De diaquilon simple. . . . . VIII onzas.
- De acetate de plomo liquido. . . . . XIV idem.

Pongase el vinagre con la greda en una vasija pequeña, y cuando haya pasado la efervescencia agréguese el acetate y el emplasto que se funde á un dulce fuego moviéndolo continuamente con una espátula de palo. Cuando la liquidacion se ha completado se separa la vasija del fuego; y cuando empieza á resfriarse la mezcla se hecha poco á poco el acetate de plomo liquido, agitando el todo hasta que enteramente se resfrié y la mezcla este exacta.

Este cerato es desecante.

**CERATO OPIADO DEL Dr. LAGNEAU.**

- De cerato simple. . . . . II onzas.
- De opio sucio. . . . . { De XXV granos á  
I dracma.
- Yemas de huevo. . . . . Núm. i.

Diluyase el opio en la yema del huevo y despues mezclése el todo con el cerato. Puede á veces ser ventajoso el agregar á esta mezcla una dracma de alcanfor.

Se usa para los rasgades, úlceras y caneros dolorosos.

**CEROMEL DEL Dr. AITKEN.**

- De cera blanca ó amarilla. . . . . I onza.
- De miel. . . . . IV onzas.

Haganse liquidar y mezclése. Esta mezcla es preferible a muchos unguentos para deterjer y limpiar las úlceras.

\*

la ha  
y pa-  
coria-  
hasta  
verlo  
ceras.  
una  
is de  
ñios.

## COLLAR DE MORAND.

Para las escrófulas.

Este collar se hace de tafetan negro sobre el que se pone una calda de algodón, y sobre esta calda se extienden los polvos siguientes:

De muriate de amoniaco. . . . .	} a. II dracmas.
De muriate de sosa decrepitado. . .	
De esponja calcinada sin estar lavada.	

Se cubre el todo con una muselina que se corta en cuadros ó en rombos.

Se aplica este collar sobre la escrófula por el lado de la muselina.

No debe quitarse de dia ni de noche, y renovar los polvos todos los meses poco mas ó menos.

## COLIRIO DEL Dr. SCARPA.

De acetate de plomo líquido. . . . .	III granos.
De agua destilada de llanten. . . . .	VI onzas.
De mucilago de goma de alquitira. . .	IV dracmas.

De alcohol alcanforado, algunas gotas.

Este colirio se usa tibio en el principio y despues frio en el segundo periodo de la optalmia ( 1 ) aguda.

## COLIRIO DE BRUN.

De aloes hepático en polvo . . . . .	I dracma.
De vino blanco. . . . .	} a. I $\frac{1}{2}$ libra,
De agua de rosas. . . . .	
De tintura de azafrán. . . . .	

Se hace hervir el aloes en el vino blanco y se filtra el licor, al cual se agrega el agua de rosas y la tintura.

Este colirio deterge los pequeñas úlceras de los párpados.

## COLIRIO SECO DEL Dr. LAGNEAU.

De azucar cande en polvo. . . . .	} a I $\frac{1}{2}$ dracma
De tucia ó nitrate de potasa. . . . .	

( 1 ) Ó inflamacion del ojo.

Se emplea para quitar las manchas de la cornea, en seguida de las opthalmias venereas. Es necesario que el polvo sea muy fino, se le sopla dentro del ojo por medio del cañon de una pluma.

#### COLIRIO DE JANIN.

- De agua de llantén. . . . . IV onzas.  
De sulfato de sinc. . . . . V granos.  
De mucilago de semillas de membrillo. IV dracmas.

Este colirio conviene en la inflamacion crónica de los párpados.

#### COLIRIO DE GIMBERNAT.

- De agua destilada. . . . . I onza.  
De potasa caústica. . . . . II granos.

#### M.

Se introducen algunas gotas en el ojo de tiempo en tiempo para quitar las manchas. Se laba en seguida el ojo con una decoccion mucilaginoso.

#### COLIRIO DEL Dr. NEWMANN

#### DE DRESDE.

- De flores de arnica. . . . . I onza.  
De vinagre destilado. . . . . I libra.

Se hace hervir y digerir durante veinte y cuatro horas, y en seguida se añade q. s. del carbonato de amoniaco hasta la perfecta saturacion.

Se emplea este colirio contra la catarata haciendo uso interiormente de la infusion de arnica.

#### CONFECION DEL JAPON.

- De cachunde en polvo. . . . . III onzas.  
De raíz de tormentila. . . . . }  
De nuez noscada. . . . . } a. II idem.  
De incienso. . . . . }  
De opio disuelto en s. q. de vino  
de Portugal. . . . . I  $\frac{1}{2}$  dracma.

De jarave de azucar . . . . . } a. IV onzas.  
De conserva de rosas . . . . . }

Mezclase el todo y hágase electuario.

Se ordena este remedio desde veinte y cuatro granos hasta una dracma. Puede suplir al de Diascordio: es fortificante, estomacal, calmante y ligeramente abstringente.

### CONFECION DEL JAPON.

Segun la farmacopéa de Edimburgo.

De cachunde purificado . . . . . IV onzas.  
De goma kino . . . . . III idem.  
De canela . . . . . } a. I idem.  
De nuez noscada . . . . . }  
De extracto de opio . . . . . I½ dracma.  
De jarave de canela q. s.

Tres dracmas de este electuario deben contener un grano de opio.

Se pulveriza separadamente el cachunde, el kino, la canela, y la nuez noscada para formar un polvo, se hace fundir el opio en s. q. de vino blanco de España: despues se mezcla y se incorpora el todo con suficiente cantidad de jarave de canela que se hace espesar hasta la consistencia de miel.

### CONFECION DE ZUMAQUE

Farmacopéa de Londres.

De hojas secas de zumaque . . . . . } a. I½ onza.  
De semilla de alcaravea . . . . . }  
De ballas de laurel . . . . . }  
De sagapeno . . . . . IV dracmas.  
De pimienta negra . . . . . II idem.  
De miel . . . . . VI onzas.

Se pulverizan las sustancias secas y se incorporan en la miel.

Calefaciente, estomacal, resolutivo, sudorifico, diurético, emenagogo y carminativo. Es util para los de temperamentos frios inertes linfáticos, en la clorosis, afecciones verminosas, &c

**CONSERVA ANTI-ESCORBUTICA DEL Dr. SELLE.**

De coclearia . . . . .	} a. $\text{I}\frac{1}{2}$ dracma.
De berros de fuente . . . . .	
De trevol de agua . . . . .	
De jugo reciente de rabáno . . . . .	
De jugo de naranja agria . . . . .	

De azúcar blanca q. s. . . . .

Hágase una conserva.

Se dán dos ó tres dracmas cada día.

**CREMA PECTORAL DE TRONCHIN.**

De manteca de cacao . . . . .	II onzas.
De azúcar blanca . . . . .	IV dracmas.
De jarave de bálsamo de tolú . . . . .	} a. I onza.
De culantrillo . . . . .	

M.

Se toma esta crema á cucharadas de café en las toses tenaces.

**OTRA DE M. JEANET DE LONGROIS.**

De manteca de cacao . . . . .	} a. I onza.
De jarave de amapolas . . . . .	
De agua de flores de naranja . . . . .	
De aceite de almendras dulces . . . . .	

M.

Se toma del mismo modo que el precedente.

**DECOCCION ANTI-ARTRITICA DE QUARIN.**

De zarza parrilla . . . . .	IV onzas.
De antimonio encerrado en una mu- ñequilla . . . . .	} VI dracmas.
Háganse hervir en once libras de agua hasta quedar en la mitad y agréguese:	
De regalis . . . . .	I onza.
De anís . . . . .	VI dracmas.

La dosis varía según la constitucion del enfermo y la duracion del mal.

## DECOCCION DE ALOES COMPUESTA

## FARMACOPEA DE LONDRES.

De extracto de regalis. . . . .	IV dracmas.
De carbonato de potasa. . . . .	II escrupúlos.
De extracto de aloes. . . . .	} a. I draema.
De mirra. . . . .	
De azafrán. . . . .	
De agua. . . . .	I libra.

Hágase hervir hasta la reduccion de doce onzas y despues agréguese: de la tintura de cardomomo compuesta cuatro onzas.

(Véase en la tabla esta tintura.)

Esta decoccion es estimulante, estómecal, emenagóga hemorroydal, puede convenir en las obstrucciones inveteradas. Es muy energética. Se emplea en dosis moderadas que se van aumentando poco á poco.

## DECOCCION ANTI-SEPTICA DE BOHERHAVE.

De hojas de escordio. . . . .	} a. II onzas.
De aliaría. . . . .	
De manrubio blanco. . . . .	

Despues de hervirlas en cuatro cuartillos de agua, añádase:

De oximiel escilitico. . . . .	VIII onzas.
De nitrate de potasa. . . . .	III draemas.
De vinagre teriacal. . . . .	I onza.

Se dá esta decoccion en la pleurecia en dosis de dos onzas cada cuarto de hora. Ella solo conviene cuando han calmado los síntomas inflamatorios en los temperamentos húmedos ó en las pleurecias putridas.

## DECOCCION BLANCA DE SIDENHAN.

De carbonato de cal pura (1) . . . . .	VI dracmas.
--	-------------

(1) Ó cuerno de ciervo calcinado.

De miga de pan. . . . .	III onzas.
De agua hirviendo. . . . .	II libras.
De agua de canela . . . . .	IV dracmas.
De azucar. . . . .	III onzas.

Esta decoccion se dá en las diarreas crónicas hasta la declinacion de las disenterias y despues de los envenenamientos que han irritado los intestinos. Se dá un vaso cada hora.

#### DIGESTIVO DE PLENCK.

De trementina clara. . . . .	II onzas.
De yema de huevo. . . . .	núm. I.
De miel comun. . . . .	II idem.
De agua de fuente. . . . .	} a. IV idem.
De alcohol. . . . .	

Este digestivo acelera la supuración. Como es líquido se inyecta en los senos de las heridas.

#### AGUA DE LA VIDA DE ALEMANIA.

De jalapa contusa. . . . .	VIII onzas.
De escamonea. . . . .	II idem.
De raices de turbit. . . . .	I idem.
De aguardiente á 21 g.º. . . . .	VI libras.

Hágase hervir el todo á 20 g.º de temperatura por 24 horas y fíltrese.

Esta tintura es purgante, se dá desde dos dracmas hasta dos onzas, segun la constitucion del enfermo.

En Alemania se emplea este remedio en las enfermedades reumáticas y artríticas. Algunas farmacopeas agregan á esta preparacion, media dracma de iris de florenca, una dracma del carbonate de potasa, y otra de azairán, por pinta.

#### AGUA DE LA VIDA PURGANTE

##### DE M. MEZAIZE.

De jalapa. . . . .	III y media libras.
De ruibarbo. . . . .	} a. III y media onzas.
De escamonea. . . . .	
De calamo aromático. . . . .	
De canela. . . . .	

- De ballas de enebro . . . . .  $X\frac{1}{2}$  onzas.
  - De nitrate de potasa . . . . . VIII idem.
  - De azucar negra . . . . . VIII libras.
  - De aguardiente a 20 g.<sup>o</sup> . . . . . XXVIII pintas.
- Infúndanse por ocho dias y filtrese. Este licor purga á la dosis de onza y media.

*AGUA DE TREVEZ.*

- De emético . . . . . Medio grano.
  - De sal de sedlitz . . . . . I onza.
  - De agua . . . . . II libras.
- Se dá como agua mineral purgante á la dosis de una pinta.

*AGUA DE QUERCETAN.*

- De jugo de puerro . . . . . } a. II libras.
- De cebolla . . . . . }
- De rábano . . . . . }
- De parietária . . . . . } a. VIII onzas.
- De limon . . . . . }

Se dá á la dosis de una ó dos onzas en las enfermedades, crónicas de los riñones y vejigas.

*AGUA DIURÉTICA ALCANFORADA.*

- De agua de parietária . . . . . II libras.
- De nitrate de potasa . . . . . IV onzas.
- De alcanfor . . . . . VI dracmas.
- De ácido acético . . . . . IV onzas.
- De alcohol . . . . . VIII idem.

Hágase disolver el alcanfor en el alcohol, mezclése al resto, menezése largo tiempo y filtrese.

Esta agua se emplea en las enfermedades agudas é inflamatorias, en las fiebres pútridas y en las enfermedades sífilíticas.

*AGUA DICHA OXIGENADA DE ALION.*

- De ácido nítrico puro . . . . . I draema.
- De agua . . . . . II libras.

Se dá esta agua en las enfermedades de la piel y en la sífilis á la dosis de dos ó tres vasos en la mañana.

### AGUA MERCURIAL DE PIDERÍT.

De mercurio destilado. . . . . I onza.

De ácido nítrico. . . . . II idem.

Se hace la disolucion á un dulce calor. En seguida tómese una onza y media y agréguese:

De jugo exprimido de la gran celidonia. }

De decocción ó raiz de aristoloquia } a. VI idem.

redonda. . . . . }

Mezclése al calor y fíltrese.

Se emplea esta agua al exterior para lavar las úlceras venereas.

### AGUA VEGETO-MERCURIAL

#### DE PASSAVIN.

De oxide de mercurio roxo. . . . . XIII½ dracmas.

De mercurio fluido . . . . . XII½ onzas.

De subartrite de potasa. . . . . X½ dracmas.

De agua q. s. para formar una pasta.

Tritúrese largo tiempo en un mortero de vidrio colocado sobre cenizas calientes. Después de la extincion del mercurio, y habiendo tomado la mezcla un color blanco, agréguese agua hirviendo para operar la disolucion, fíltrese y evaporese hasta la película.

Se emplea en la sífilis, á la dosis de media onza, seis dracmas, y aun una onza en el jarave simple, se reitera la dosis dos ó tres veces al dia.

### AGUA ETHEREA ALCANFORADA

#### DE PLANCHE.

De alcanfor purificado . . . . . IV dracmas.

De eter sulfúrico muy rectificado. . . I½ onza.

Métanse en un frasco el eter y el alcanfor y agítense para ayudar á la solucion. Viértase en seguida este eter en

\*

un frasco tubulado en su base y que contenga de antemano 28 onzas de agua destilada. Al tubo inferior se adopta un tornillo. Al cuello del frasco se aplica un pequeño tubo que se le abarca con un cilindro de alcorneque enlodado. Cuando se quiere usar esta composición se abre el tubo superior y se hace salir el líquido por el tornillo. (1)

Se dá esta agua eterea pura en cucharadas, ó con un poco de azúcar, ó jarave cualesquiera; conviene en las afecciones espasmódicas.

#### AGUA CORDIAL DE COLADON.

Se quitan las cortezas de muchas naranjas. é infundiéndolas en aguardiente se les destila en el baño de Maria. Se le agrega al espíritu de limon, algunas gotas de la tintura de ambar, y de almizcle y se endulzará con el jarave de azúcar muy blanca.

M. Coladon tiene tan justas proporciones, que en su licor no se pueden distinguir ni el ambar ni el almizcle, y el limon que domina, está muy extendido.

Esto es lo que la hace distinguir de la contrahecha y que nunca vende el agua, sino á los tres ó cuatro años de estar preparada.

Esta agua es mas un licor de mesa que un remedio.

#### AGUA DE ARCABUZAZO DE THEDEN.

De vinagre sin olor. . . . . } a. III libras.

De alcohol rectificado. . . . . } a. III libras.

De ácido sulfúrico débil. . . . . } a. X onzas.

De azúcar blanca comun. . . . . } I libra.

Se mezcla, se filtra y se conserva en un frasco.

Esta agua sirve para deterger las úlceras saniosas, moderar la supuración de las heridas y contener las hemorragias. Se aplican tambien compresas sobre las contusiones, fracturas, y luxaciones.

(1) Se encuentra la descripción de este pequeño aparato en la farmacopea de Brugnatelli. Traducida por M. Planche tom. 2 pág. 210 p. 1. fig. 32.

En las enfermedades pútridas se usa interiormente á la dosis de veinte á treinta gotas, en un vehiculo apropiado.

*AGUA ESPIRITUOSA DE ANHALT.*

De trementina de terebinto. . . . .	VIII onzas.
De incienso. . . . .	I½ idem.
De clavo de comer. . . . .	} a. VI idem.
De nuez moscada. . . . .	
De cubeba. . . . .	} a. media id.
De canela. . . . .	
De bañás de laurel. . . . .	} a. media id.
Semillas de hinojo. . . . .	
Palo de aloes. . . . .	III dracmas.
De azafrán. . . . .	II½ idem.
De alcohol. . . . .	V libras.
De almizcle. . . . .	XXV granos.

Se dá á la dosis de dos á tres dracmas, como estomacal diurético y anti apoplético.

Cuando la apoplejia es puramente serosa, como sucede algunas veces, en una edad avanzada y en los temperamentos humedos.

*AGUA DE MAGNANIMIDAD.*

De hormigas. . . . .	II libras.
De alcohol rectificado. . . . .	III idem.
Háganse macerar durante cinco ó seis dias, destílese al baño de Maria hasta la sequedad y entonces agrega:	
De canela. . . . .	I onza.
De clavo de comer. . . . .	} a. VI dracmas.
De cardomomo menor. . . . .	
De cubebas. . . . .	IV idem.
De cedoaria. . . . .	X idem.

Hágase macerar por tres dias en el alcohol arriba destilado, destílese de nuevo en el baño de Maria hasta la sequedad.

Esta agua espirituosa se recomienda en la debilidad de nervios, se emplea en fricciones, y se dá tambien interiormente á la dosis de dos dracmas.

AGUA DE M.<sup>ma</sup> DE LA VRILLIERE.

Para los dientes.

De canela. . . . .	II onzas.
De clavo de conr. . . . .	VI dracmas,
De cortezas recientes de linon. . . . .	XII idem.
De rosas encerradas secas. . . . .	I onza.
De coclearia. . . . .	VIII idem.
De alcohol. . . . .	III libras.

Se mezclan la canela y los clavos de coner, se parten las rosas y las cascarras de linon, se despedaza la coclearia y macera el todo en el alcohol por espacio de veinte y cuatro horas y se destila al baño de Maria.

## AGUA DE M. LE PREMIER.

De bálsamo de Fioravente. . . . .	Media libra.
De esencia de vulneraria. . . . .	II dracmas.

Esta agua se emplea en las contusiones del cuerpo y de la cabeza; alivia los dolores de reumatismo crónico, se frota en las partes dañadas o se aplican compresas empapadas en ellas.

## AGUA DE BONFERME.

De nueces moscadas. . . . .	} a. IV dracmas.
De clavos de omer. . . . .	
De flores de granada. . . . .	} a. III idem.
De canela. . . . .	
De alcohol. . . . .	VIII onzas.

Se combinan todas estas sustancias, se les hace macerar por ocho días en el alcohol, en seguida se cuece con expresión, se filtra y se conserva para el uso.

Se emplea esta agua para los golpes en la cabeza.

Se le hace respirar al enfermo, y se le frota en las partes dañadas, sobre las que se le aplican compresas embebidas en ella las que se renuevan con mucha frecuencia.

## AGUA ANTI-HERPETICA

## DEL CARDENAL DE LUTNES.

De sublimado corrosivo. . . . .	I dracmas.
De ceruza. . . . .	IV idem.

- 41.
- De sulfato de alumbre. . . . . III idem.  
 De clara de huevo. . . . . núm. I.  
 De agua de rosas. . . . . VIII onzas.

Mezclése y agítese antes de usarla. Se usa en lociones; se empapan compresas en ella y se aplican sobre las partes.

Pero no se deben despreciar los remedios generales tomados interiormente.

*AGUA PARA LOS OJOS*

POR EL Dr. TVÉL.

- De azafrán. . . . . XX granos.  
 De sulfatè de sinc. . . . . III dracmas.  
 De sulfatè de cobre. . . . . I idem.  
 De alcanfor. . . . . II escrupúlos.

Pulvericese el todo, y puesto en una vasija en una pinta de agua, infúndase por 24 horas á un fuego suave y muévase de tiempo en tiempo. Dejese reposar y decantese. Se bañan los ojos con esta agua cuando están enlucados los párpados, y que segregan un humor mucoso.

*AGUA OPTALMICA FORTIFICANTE*

DEL Dr. SELLE.

- De agua destilada de manzanilla. . . . . VIII onzas.  
 De acetate de plomo líquido. . . . . } a. II dracmas,  
 De alcohol alcanforado. . . . . }  
 De sulfatè de sinc. . . . . I idem.

Se emplea esta agua como colirio en la epifora (1) y en la lippitudo (2) causadas por relajacion.

*AGUA DE GONDRÁN.*

- De ácido muriático. . . . . IV onzas.

(1) Lagriméo.

(2) Trasudacion de humor que segregan las glándulas de Meibomi, de lippitudo lagaña.

De aceite de petróleo blanco. . . . . I dracma.

Mezclése agitando la botella; esta dosis es para un baño parcial en los reumatismos.

AGUA DE ALIBOUR.

- De sulfate de cobre. . . . . V dracmas.
- De sinc . . . . . } II onzas VI drac-
- De azafraán. . . . . } mas y media.
- De alcanfor . . . . . I dracma.
- De agua comun. . . . . II y media idem.
- De agua comun. . . . . IV libras.

Metanse estas sustancias en un matrás de capacidad suficiente, agítese la mezcla; dejese digerir durante 20 dias, filtrese.

Se emplea esta agua en las escoriaciones y contusiones, se lavan con ella las heridas purulentas y fetidas, se usa en las quemaduras para acelerar la cicatriz cuando ha pasado la inflamacion y contra las optalmias crónicas.

ELECTUARIO DE QUARIN, CONTRA LA HIDROPESIA.

- De rob de yeso . . . . . } a II onzas.
- De enebro . . . . . } I idem.
- De oximiél escilitico. . . . . IV dracmas.
- De sulfate de potasa. . . . . II idem.
- De jarave de espino cerbal q. s.

Se toma una dracma en cortos intervalos hasta que se consigan suficientes cámaras.

OTRO DEL MISMO.

Despues de la evacuacion de las aguas.

- De quina . . . . . VI dracmas.

De limaduras de fierro no relucientes. } a. II dracmas.  
De teriaca diatesarón (1). . . . . }

De jarave de canela q. s.

Se toma igualmente una draema de mañana y tarde.

**OTRO DEL MISMO.**  
Para cuando la hidropesia se junta á la fiebre eúrtana.

De quina roja en polvo. . . . . I onza.

De raíz de genciana. . . . . }

De muriate amoniaca de fierro sublimado . . . . . } a. I dracma.

De oximiél escilitico. . . . . }

De jarave de cinco raíces aperitivas. } a. II dracmas.

Se dán dos dracmas cada tres horas.

**ELECTUARIO HIDRAGOGO. DEL DR. FOUQUIER.**

De escamonea de valepo. . . . . } a. II dracmas.

De raíz de jalapa. . . . . }

De escamas de scila. . . . . I  $\frac{1}{2}$  dracma.

De resina de jalapa. . . . .  $\frac{1}{2}$  idem.

De jarave de espino cerval q. s.

Se dá en las hidropesias asténicas á la dosis de 12 á 24 granos con fingidos en bolos. Purga fuertemente.

**ELECTUARIO BALSÁMICO ABSTRINGENTE**

**DE BARTHEZ.**

De conserva de rosas. . . . . IV onzas.

(1) Nombre de una composición que se llama así de los cuatro ingredientes que entran en ella y es como sigue:

Tómense. — De raíz de genciana. . . . . } a. II onzas.

De ballasda taurel. . . . . }

De aristoloquia redonda. . . . . }

De miel. . . . . II libras.

Hágase un electuario.

Cuando se agregan dos onzas de raspaduras de márfil se llama Diapente ó composición de cinco ingredientes.

De jarave de tolú. . . . . I dracma.

De adormidoras. . . . . II idem.

Mezclése y hágase un electuario.

Convienae en los espútos de sangre, se dá en la dosis de cinco á seis cucharadas por dia de hora en hora.

Pero no deben despreciarse los remedios generales que están indicados.

### ELECTUARIO ANTI-CACHECTICO

DEL Dr. WARD.

De raiz de álamo blanco en polvo. II onzas.

De semilla de hinojo. . . . . III idem.

De pimienta negra. . . . . I idem.

Mezclése en un mortero y agréguese

De azucar blanca. . . . . } a. II idem.

De miel . . . . . }

Se hacen tomar dos ó tres veces al dia una ó dos dracmas de este electuario en la cachexia, hemorroydal, en la dispeccia ó en el catarro de las entrañas.

### ELECTUARIO SEDATIVO ABSTRINGENTE

DE EDIMBURGO.

Véase confeccion Japónica

### ELECTUARIO ANTHELMÍNTICO

DE VOGLER.

De semen-contra (1) . . . . . II dracmas.

De raiz de jalapa. . . . . I idem. (1)

De mercurio dulce bien lavado. . . . . VI á XI granos.

De agua de canela. . . . .  $\frac{1}{2}$  dracma.

De jarave de flores de durazao q. s.

Se dá este electuario á las personas que tienen ascáridos, lombrices ó la tenia.

(1) Nombre que dán los franceses á la raiz de ajenos de Judea.

La dosis para los niños de dos á cuatro años, es la duodécima parte de la masa indicada para los de 5 á 8 años, la octava, para los adultos, la cuarta. Se dá por las mañanas envuelta en un pedazo de hostia, y encima se bebe una taza de infusion amarga.

### ELECTUARIO VERMIFUGO DE

SPIELMAN.

De estaño puro. . . . . } a. I onza.

De mercurio liquido destilado. . . . . } a. I onza.

Hágase una amalgama s. l. y añádase.

De carbonato de cal purificado. . . . . } a. I idem.

De magnesia inglesa. . . . . } a. I idem.

Mezclése exactamente é incorpórese el todo en =

Conserva de ajénjos. . . . . III idem.

Jarave de yerbabuena q. s. para dar á la mezcla consistencia de electuario.

Se dá una dracma por la mañana y otra á la tarde todos los días.

### ELECTUARIO ANTHELMÍNTICO

DE HEISTER.

De mercurio vivo. . . . . IV dracmas.

Se apaga cuidadosamente con una onza de mucilago de la goma arábica y se le agrega =

De quina en polvo. . . . . I onza.

Jarave de yerbabuena q. s. para darle al todo la consistencia de electuario. La dosis varia segun la edad del enfermo, regularmente se dá un bolo del grueso de una aveñana mañana y tarde.

### ELECTUARIO ANTI-FEBRIL

Pharmacopœa de Viena.

De conserva de ajénjos. . . . . } a. VII dracmas.

—De coclearia. . . . . } a. VII dracmas.

De quina en polvo. . . . . } a. VII dracmas.

\*

De jarave de fumaría q. s. para hacer s. a. un electuario.  
Se dá en la dosis de tres á cuatro dracmas al día.

### ELECTUARIO DE MAGNESIA.

#### Formacopea de Copenhague.

De carbonato de magnesia . . . . . VI dracmas.

De polvos de semillas de anís verdes. IV idem.

De azafrán en polvo . . . . . I idem.

De jarave de chicorias q. s. para hacer s. a. un electuario.

Se usa en los niños cuando tienen agrios. La dosis es segun la edad, desde media hasta dos dracmas.

### ELECTUARIO ANTI-FEBRIL DE BOHERHAVE.

De confecion alkermes . . . . . I dracma.

De gengible curtido . . . . . VI onzas.

De raiz de contrayerba . . . . . } a I idem.

De serpentaria virginiiana . . . . . }

De jarave de cinco raices aperitivas s. q.

Se toma media dracma cada cuarto de hora en las fiebres adinámicas é intermitentes.

### ELECTUARIO ANTI-ARTRÍTICO DE BUCHAN.

De conserva de rosas . . . . . II onza.

De cinabrio de antimonio . . . . . I ½ idem.

De resina de guayaco en polvo . . . . . I idem.

De jarave de gengible q. s.

Se dá este electuario á la dosis de una cucharada de café, dos veces al día en los dolores agudos de reumatismo cuando no se acompañan de calentura.

### ELECTUARIO ANTI-HEMORROIDAL

#### DE REUSS.

De maná en lágrima . . . . . II onzas.

- De sulfato de potasa . . . . .
- De nitrate de potasa . . . . .
- De magisterio de azufre . . . . .

} a. I dracma.

De miel blanca q. s. para dar á la mezcla la consistencia conveniente. Se le prescribe á dos ó tres dracmas por dia.

**ELECTUARIO ANTI-DISENTERICO DE BUCHAN.**

- De confeccion saponacea . . . . . II onzas.
- De bálsamo de lucatel . . . . .
- De ruibarbo en polvo . . . . .

} a. I idem.

De jarave de malvavisco q. s. m. y f. electuario.

Se toma un bolo del tamaño de una nuez noscada dos ó tres veces al dia segun la urgencia del caso.

Este electuario solo conviene hácia el fin de la disenteria.

**ELECTUARIO ANTI-DISENTERICO DE WIRKINSON.**

- De angustura en polvo . . . . . IV dracmas.
- De canela en polvo . . . . . XXXVI granos.
- De miel blanca q. s.

Se dá este electuario á la dosis de una dracma mañana y tarde.

Conviene en la diarrea, en la fiebre adinámica en la hictericia, y en la disenteria ligera.

**ELECTUARIO ANTI-EPILECTICO DE MEAD.**

- De quina en polvo . . . . . I onza.
- De estaño en polvo . . . . .
- De raiz de valeriana . . . . .
- De jarave de azucar, ó de miel q. s.

} a. IV dracmas.

Se dá este electuario á la dosis de una dracma tarde y mañana durante tres meses interrumpiendo por 24 horas el uso de este remedio, cada nueve dias.

## ELIXIR DE LA VIDA DE MATIOLE.

De raiz de galanga menor. ....	} a. IV dracmas.
De gengibre. ....	
De cedoaria. ....	
De calamo aromático. ....	
De hojas de mejorana. ....	
De yerbabuena. ....	} a. II dracmas.
De tomillo. ....	
De serpol. ....	
De salvia. ....	
De romero. ....	
De flores de rosas. ....	} I onza.
De semillas de anís. ....	
De hinojo. ....	
De canela. ....	
De clavos de comer. ....	
De nuez noscada. ....	} a. media onza.
De macias. ....	
De cubeba. ....	} a. I idem.
De palo de albes. ....	
De sandalo citrino. ....	} I½ idem.
De pequeño cardomomo. ....	
De cortezas recientes de limon. ....	} VI libras.
De alcohol á 30 gs. ....	

Este elixir se usa en la epilepsia, es cordial y vulnerario, la dosis es desde una á cuatro dracmas.

## ELIXIR ALKERMES DE LOS ITALIANOS.

De nuez noscada. ....	} a. I dracma.
De clavos de comer. ....	
De canela. ....	
De macias. ....	} IV pintas.
De alcohol. ....	

Se contunden todas estas sustancias y se maceran en el alcohol durante siete á ocho dias; en seguida se hace infundir en cuatro pintas de agua.

De azucar. .... IV libras.

Se mezclan estos dos licores y se les colora con el jarabe de alquermes ó con

Alumbre. .... I½ dracma.

De cochinilla. . . . . I idem.

Se filtra y se conserva para el uso.

Este elixir se da á la dosis de un pequeño vaso de ratafia. Se aconseja en las indigestiones, en las debilidades del estómago, en los cólicos ventosos. Cuando se quiere hacer mas delicado al gusto es necesario destilar la infusion alcoholica y aumentar una cuarta parte de azucar.

### ELIXIR DE DROGAS AMARGAS DE LOS INDIANOS.

De aloes . . . . . III libras.

De mirra . . . . . II idem.

De almáciga en lagrima . . . . . II onza.

De incienso. . . . . I libra.

De azafran . . . . . IV dracmas.

De aguardiente . . . . . L pintas

Se contunden todas estas sustancias separadamente á excepcion del azafrán que se parte lo mas menudo posible. Se macera el todo en el aguardiente agitando frecuentemente la mezela durante seis meses. Despues de este tiempo se destila para obtener las dos terceras partes del aguardiente empleado. Se le agrega s. q. de azucar para formar un licor agradable que se usará despues de la comida.

El residuo de la destilacion filtrado, se emplea á la dosis de un pequeño vaso de licor por la mañana en ayunas como tónico, ó en una dosis mas fuerte como purgante.

### ELIXIR DE MITHIE.

De canela . . . . . } a. II dracmas.

De pimienta larga . . . . . }

De pequeña galanga . . . . . } a. II dracmas.

De gengible. . . . . 1½ idem.

De nuez noscada . . . . . I idem.

De pequeño cardomomo . . . . . I escrúpulo.

De clavos de comer . . . . . I dracma

De alcohol . . . . . VI onzas.

F. S. A.

Este elixir es estomacal, se da á la dosis de dos á cuatro dracmas.

## ELIXIR ACIDO AROMATICO DE BRUGNATELLI.

De alcohol . . . . .	II libras.
De ácido sulfurico . . . . .	III onzas.
De canela . . . . .	III dracmas.
De clavos de comer . . . . .	} a. III dracmas.
De gengible . . . . .	
De hojas de yerbabuena piperina . . . . .	} a. IV idem.
De yerbabuena crespá . . . . .	

Se pone primeramente el ácido y el alcohol en un balon que se coloca sobre el baño de arena en una temperatura de treinta y cinco grados, y que se le sostiene de este modo dos dias: se le agregan en seguida las otras sustancias, y se infunden á la temperatura atmosférica por cinco y seis dias, se cuele en seguida, con expresión, se filtra y se conserva el licor en un frasco de cristal herméticamente cerrado.

Se da este elixir en las hemorragias pasivas, y en las fiebres asténicas, á la dosis de doce á cuarenta gotas en un vehiculo apropiado.

## ELIXIR PECTORAL INGLÉS.

De raíz de álamo blanco . . . . .	} a. III onzas y I dracma.
De iris del Florencia . . . . .	
De escamas secas de Scila . . . . .	} a. I id. XVIII grs.
De raíz de regalis . . . . .	
De semillas de anís . . . . .	XVIII granos.
De azafran . . . . .	II dracmas.
De benjui . . . . .	I id. y XVIII grs.
De mirra . . . . .	II escrupulos.
De goma amoniaco . . . . .	I libra y X onzas.
De aguardiente á XXII grados . . . . .	

Pongáse á macerar el todo por quince dias en un matrás, agítese de tiempo en tiempo y filtresé.

Este elixir es estomacal y pectoral. La dosis es des. de media dracma hasta dos, en una taza de infusión apropiada. Conviene con especialidad en los catarros crónicos.

## ELIXIR BALSÁMICO ESTOMACAL

## T TEMPERADO DE HOFFMAN.

De extracto de agenjos. . . . .	} a. I onza.
De cardo bendito. . . . .	
De centaurea menor. . . . .	
De genciana. . . . .	
De cortezas de naranjas agrias . . .	IV idem.
De vino de España. . . . .	II libras.
De tintura de cortezas de naranjas agrias. . . . .	} II onzas.
De carbonate de potasa . . . . .	

Pongáse á digerir esta mezcla por ocho dias, agítase frecuentemente el matras y filtrése.

Este elixir conocido tambien con el nombre de vino amargo alcahalizado es un poderoso estomacal antermintico y febrífugo. Excita el apetito, la dosis es desde una á dos dracmas.

## ELIXIR BALSÁMICO DE WERLHOFF.

De quina. . . . .	I $\frac{1}{2}$ onza.
De extracto de cardo bendito . . . .	} a. II dracmas.
De genciana. . . . .	
De mirra electa. . . . .	
De cortezas de naranjas agrias . . .	I $\frac{1}{2}$ onza.
De azafrán. . . . .	I dracma.
De carbonate de potasa. . . . .	IV idem.
De vino de España. . . . .	I libra.

Este elixir tiene los mismos usos que el temperado de Hoffman.

## ELIXIR FORTIFICANTE DEL Dr. SELLE.

De extracto de cascarilla . . . . .	} a. I dracma
De genciana . . . . .	
De agua de yerbabuena piperita . . .	IV libras.
De tintura de Marte abstringente. .	IV onzas.

Se dan en el dia algunas cucharadas de este elixir en la debilidad de estomago y de los intestinos en seguida de las enfermedades adinamicas.

## ELIXIR ESTOMACAL DE SOUGHTON,

De los cogollos de agenjos secos. . . . .	} a. I onza.
De camedrios . . . . .	
De raiz de genciana. . . . .	
De cortezas de naranjas agrias . . . . .	
De cascarilla. . . . .	I dracma.
De ruibarbo. . . . .	IV idem.
De aloes. . . . .	I idem.
De alcohol. . . . .	II libras.

Este elixir es estomacal y vermifugo. La dosis es desde diez gotas hasta una dracma, en una taza de tisanas apropiada.

## ELIXIR SAGRADO.

De ruibarbo contuso . . . . .	X dracmas.
De aloes sucotrina en polvo. . . . .	VI idem.
De semillas de cardomomo. . . . .	IV idem.
De aguardiente francés. . . . .	I pinta.

Déjese dos ó tres dias en infusion y cuélese. Se da este elixir estomacal y purgante en la dosis de una á una y media onza. Conviene á los temperamentos humedos.

## ELIXIR UTERINO DE CROLLIUS.

De extracto de artemisa. . . . .	I onza.
De azafrán . . . . .	IV dracmas.
De castor. . . . .	I onza.
De carbonate de potasa. . . . .	I dracma.
De aceite de anís . . . . .	} a. media idem.
— De comino . . . . .	
— De angélica . . . . .	
De alcohol. . . . .	XX onzas.

Este elixir es carminante, nervino, emenagogo. Su dosis es de una á dos dracmas.

## ELIXIR DE RAULIN.

De raiz de genciana. . . . .	} a. II onzas.
De cortezas de naranjas agrias. . . . .	

De cogollos de agenjos secos . . .	}	a. II onzas.
— De camedrios . . . . .		
De ruibarbo . . . . .	}	a. I dracma.
De hojas de sen . . . . .		
De cascarilla . . . . .	}	IV libras.
De aloes sucotrino . . . . .		
De aguardiente á XXV grados . . .		

Se hace una infusion en frio durante ocho ó doce dias y se filtra.

Su dosis es una cucharada regular, que ordinariamente se toma antes de comer ó cenar.

Si esta dosis tomada una sola vez no produjese cámara alguna, se reitera la mañana siguiente.

Convieni este elixir en las enfermedades linfáticas y escrofulosas.

#### ELIXIR ANTI-ESCORBÚTICO DEL Dr. SELLE.

De extracto acuoso de trébol . . . . .	}	a. IV dracmas.
De centaurea menor . . . . .		
De fumaria . . . . .	}	IV libras.
De grama . . . . .		
De agua destilada de manzanilla . .		II onzas.
De espíritu de coclearia . . . . .		II dracmas.
De ácido sulfúrico concentrado . . .		

Se da á la dosis de dos cucharadas cada dia

#### ELIXIR ANTI-ESCORBUTICO DE BOHERHAVE.

De semillas de mostaza . . . . .	}	a. I onza.
De rábanos . . . . .		
De jaramago . . . . .	}	a. II puñados.
De erysimo . . . . .		
De berros . . . . .	}	
De hojas de coclearia . . . . .		
De mastuerzo . . . . .		
De rábanos . . . . .		

Contundanse en un mortero de palo y agréguese:

De flores de hombrecillo . . . . . I onza.

De alcohol q. s. Destílese.

Se da este elixir en el escorbuto á la dosis de una á dos dracmas en una bebida apropiada.

\*

*ELIXIR ANTI-ESCROFULOSO DE PETRITHE.*

De aguardiente . . . . . II libras.  
 De carbonate de amoniaco . . . . . II dracmas,  
 De raiz de genciana . . . . . I onza.

Pongase á digerir por veinte y cuatro horas y déjese en él la raiz de genciana durante muchos dias. Filtrese. Se da una cucharada dos ó tres veces al dia.

*ELIXIR ANTI-VENEREO DE LEMORT.*

De bálsamo de copaiba . . . . . I dracma.  
 De raiz de guayaco . . . . . II idem.  
 De aceite volátil de zazafras . . . . . Media idem.  
 De alcohol rectificado . . . . . IV  $\frac{1}{2}$  onzas.

Se hace infundir el todo á una suave temperatura, se filtra y se conserva en un frasco bien tapado.

Este elixir se da á la dosis de una dracma en una infusion apropiada ó con azucar en polvo.

*ELIXIR SUDORÍFICO DEL Dr. WILLIS.*

De hipecacuana . . . . .	} a. I onza.
De bálsamo de tolu . . . . .	
De flores de benjui . . . . .	} i. II dracmas.
De opio purificado . . . . .	
De azafrán . . . . .	} II escrúpulos.
De alcanfor . . . . .	
De aceite esencial de anís . . . . .	I dracma.
De alcohol rectificado . . . . .	II libras.

Se da este elixir á la dosis de una ó dos dracmas para excitar la transpiracion. Media onza contiene dos granos de opio.

*ELIXIR ANTI-SÉPTICO Ó FEBRIFUGO**DE HUXHAM.*

De quina . . . . . II onzas.  
 De cortezas de naranjas . . . . . I  $\frac{1}{2}$  onza.

De serpentaria virginiana. . . . .	III dracmas.
De azafrán . . . . .	I idem.
De cochinilla . . . . .	II escrúpulos.
De alcohol á 20 grados. . . . .	XX onzas.

Hágase infundir por seis días. Algunas veces Huxham agrega doce granos de alcanfor por onza y llama entonces á esta preparacion elixir alcanforado.

Se da este elixir á la dosis de dos á cuatro dracmas en las fiebres intermitentes despues del uso de los remedios generales que estén indicados.

#### ELIXIR RESOLUTIVO DEL Dr. SELLE.

De tártaro purificado. . . . .	II onzas.
Saturese con el vinagre escilitico y agréguese.	
De extracto acuoso de fumaría. . . . .	} a. IV dracmas.
De la yerba de S. Juan. . . . .	
De treból acuatico. . . . .	
De cardo bendito. . . . .	
De agua destilada de manzanilla. . . . .	IV libras.
De tintura de antimonio de Jacobo. . . . .	} a. I onza.
De marte aperitivo. . . . .	

Mezclése y fíltrese.

Se emplea esta mixtion en las enfermedades cachecticas, en la hidropesia. La dosis es una pequeña cucharada cada dos horas.

#### ELIXIR ANTI-ASMÁTICO DE BOHERHAVE.

De raíz de ázaro . . . . .	XVIII granos.
De cálamo aromático. . . . .	} a. II escrúpulos.
De éaula campanula. . . . .	
De iris de florençia. . . . .	Media dracma.
De regalis. . . . .	$\frac{1}{2}$ idem.
De semillas de anís. . . . .	Media idem.
De alcanfor. . . . .	VI granos.
De alcohol rectificado . . . . .	VIII onzas.

La dosis es desde dos hasta treinta granos en una taza de té ó de tipsana apropiada.

Este elixir conviene especialmente en el asma humeda.

## ELIXIR PAREGÓRICO DE LÓNDRES. (1)

De ácido benzoico sublimado. . . . .	} a. III dracmas.
De azafrán. . . . .	
De aceite esencial de anís. . . . .	$\frac{1}{2}$ idem.
De extracto seco de opio. . . . .	II idem.
De amoniaco . . . . .	I libra.

Dijeráse por cuatro días y fíltrese.

Este elixir calma los dolores que provienen de las congestiones catarrales húmedas, calma la tos y disminuye la dificultad de respirar, se dán de 50 á 60 gotas. Se debe considerar este elixir como diaforético incisivo y calmante.

## ELIXIR PAREGÓRICO DE EDIMBURGO.

De ácido benzoico. . . . .	IV dracmas.
De extracto seco de opio. . . . .	II idem.
De espíritu volátil aromático. . . . .	I libra.

Dijeráse por cinco días y fíltrese á una temperatura baja.

Tiene el mismo uso que el anterior.

## ELIXIR ANTI-APOPLÉTICO

## DE JACOBINO DE ROUEN.

De sándalo rojo pulverizado. . . . .	VI dracmas,
Del blanco . . . . .	} a. V idem.
Del cetrino. . . . .	

(1) Se encuentra en la farmacopea inglesa una tintura alcohólica de opio anisado que lleva también el nombre de elixir paregórico. Se compone del modo siguiente.

De extracto seco de opio. . . . .	} a. I dracma.
De ácido benzoico sublimado . . . . .	
De alcanfor purificado. . . . .	XXVI granos.
De aceite volátil de anís. . . . .	II escúpulos.
De alcohol á 24 grados. . . . .	XXIII onzas.

De semillas de anis. . . . .	} a. I onza.
De ballas de enebro . . . . .	
De canela . . . . .	I onza y V dracmas.
De macias . . . . .	} a VIII idem.
De regalis . . . . .	
De galanga . . . . .	
De imperatoria . . . . .	
De clavos de comer . . . . .	
De semillas de angélica . . . . .	} a. V idem.
De contrayerba . . . . .	
De polvos de víboras . . . . .	
De alcohol rectificado (1) . . . . .	VII libras.

Háganse digerir por espacio de un mes y filtrese.

Este elixir seria peligroso en las constituciones ple-  
tóricas y conviene solo en las humedas.

#### ELIXIR FEBRIFUGO DE WHIT.

De quina gris . . . . .	III onzas.
De raiz de genciana . . . . .	} a. II idem.
De corteza de naranjas . . . . .	
De alcohol rectificado . . . . .	I libra.
De agua de canela ordeada . . . . .	VIII onzas.

Infúndanse por veinte y cuatro horas y filtrese.

Este elixir se dá á la dosis de media onza en las fie-  
bres adinámicas, la leucorrea, y hectiricia.

#### ELIXIR FETIDO DE FULDE.

De castor . . . . .	IV dracmas.
De asa fétida . . . . .	II idem.
De opio . . . . .	XXXVI granos.
De espíritu de cuerno de ciervo . . . . .	I dracma.

(1) Después de M. D. . . . farmacéutico de Rouen, el agua ó eli-  
xir de los jacobinos contiene á mas:

De casia lignea . . . . .	III dracmas.
De anis molido . . . . .	IV idem.
De palo de aloes . . . . .	} a. I idem.
De raiz de imperatoria . . . . .	

De alcohol rectificado. . . . . IV onzas.

Se digiere el todo por cuatro dias y se filtra. Conviene este elixir en los espasmos y afecciones histéricas: la dosis es de una á una y media dracma en una bebida apropiada, ó solo.

*ELIXIR AMERICANO DE COURCELLES.*

De flores de hipericon. . . . . VIII libras.  
 De sauco. . . . . V idem.  
 De hojas de naranjo. . . . . VI idem.  
 De raices de enula campanula. . . . . XVI idem.  
 De caña de provenza. . . . . } a. II idem.  
 De granos de enebro. . . . . }  
 De flores de tilia. . . . . II½ idem.  
 De romero . . . . . II idem.  
 De hojas de bálsamo. . . . . IV idem.  
 De raices de azaro. . . . . I idem.  
 De opio. . . . . II idem.  
 De alcohol. . . . . CXX pintas.

De agua q. s. para que el licor quede á 24 grados. Esto debe dar doscientas pintas de elixir que se le colora con la amapola. (1)

(1) Como es imposible en Francia preparar el elixir americano, tal como Courcelles lo ha compuesto, no habiamos dado en la primera edicion mas que la fórmula reformada, pero añadiremos aquí el verdadero para los que estén en América.

De raices de azaro. . . . . }  
 De palmitos (cocos aculeatus). . . . . } a. I onza.  
 De calabazas . . . . . }  
 De opio puro. . . . . II½ idem.  
 De corteza de madera de hierro (erythroxylum). . . . . } V I idem.  
 De justitia asurgens . . . . . II idem.  
 De hojas de avocates . . . . . II libras.  
 De flores de hipericon. . . . . I idem.  
 De sauco. . . . . VIII onzas.  
 De hojas de naranjo. . . . . IV idem.  
 De flores de idem. . . . . II idem.  
 De raiz de énula campanula. . . . . IV libras.

El elixir americano se dá á la d6sis de una fuerte cucharada de caf6, que segun los casos puede reiterarse dos 6 tres veces al dia, se toma solo 6 en un vaso de tipsana apropiada.

El elixir de Courcelles ha gozado la mayor reputacion, puede que se hayan exagerado sus propiedades, se daba en los dolores de parto, en las enfermedades lacteas, en las diarreas, en las leucorreas, supresiones, en los vomitos, las debildades de est6mago &c.

ELIXIR ANTI-ARTRITICO DE LA

ISLA DE FRANCIA.

- De aloes sucotrina . . . . . X draemas.
- De mirra . . . . . XII idem.
- De resina de guayaco . . . . . X idem.

Se reducen estas sustancias en polvos finos, y se disuelven separadamente cada una, en una pinta de alcohol á 21 gs. se mezclan en seguida estas tinturas á partes iguales.

Este elixir es estomacal, emenagogo, y vermifugo, excita la transpiracion, provoca las oriuas y disipa los dolores de reumatismo, y gota.

Su d6sis es de una á dos cucharadas en ayunas; una hora despues se toma una infusion de t6, de azucar, de tilia 6 de flor de naranja.

- 
- De caña de azucar . . . . . } a. III libras.
  - De aristoloquia rotunda . . . . . } a. III libras.
  - De arundo donax . . . . . } II idem.
  - De ballas de enebro . . . . . } III onzas.
  - De flores de tilia . . . . . } a. II idem.
  - De sumidades de romero . . . . . } a. II idem.
  - De croton balsamiferum . . . . . } IV idem.
  - De alcohol á 32 gs. . . . . } a. IV libras.
  - De aguardiente á 21 . . . . . } a. IV libras.

Despues de haber macerado todas las plantas en el alcohol, y colado la tintura, se quema el residuo y se infunden las cenizas en el licor, con cinco onzas de flores de amapolas, y con tres onzas de rubia, y se filtra.

le-  
l6-  
ia-

os.  
on

no,  
ri-  
qui

**EMPLASTO DE FOUQUET.**

- De manteca sin sal. . . . . II onzas.  
 De diapalma. . . . . IV idem.  
 De cera blanca. . . . . II idem.  
 Disuélvase y agreguese en los dolores de parto.

De minio. . . . . II idem.  
 Este emplasto es resolutivo y se aplica sobre los hom-

bros.

**EMPLASTO ANTI-HISTÉRICO.**

- De galvano . . . . . III onzas.  
 De tacamahaca en polvo. . . . . }  
 De cera virgen. . . . . } a. I½ idem.  
 De trementina de Venecia. . . . . }  
 De comino en polvo. . . . . } a. I idem.

Se extiende una suficiente cantidad en un pedazo de badana, y se aplica sobre la boca del estómago. Puede rociarse con treinta ó cuarenta gotas de láudano líquido.

**EMPLASTO DE GOMA ELÁSTICA****DE SWEDIAUR.**

- De resina elástica dividida en pequeñas láminas. . . . . } IV onzas.  
 De aceite volátil de trementina rectificado. . . . . } XV½ idem.  
 De aceite de olivas. . . . . }  
 De cera blanca. . . . . } a. II idem.

Se hace fundir en un dulce calor la resina elástica en el aceite de trementina. Cuando está concluida la solución, se agregan la cera y el aceite, y se hacen hervir igualmente hasta que se haya evaporado todo el aceite volátil, y cuando se enfria la masa, se le conserva en un bote de loza.

Este emplasto muy aglutinante, consolida las heridas y las pone á cubierto del contacto del aire.

**EMPLASTO ANTIVENEREÓ DE BOERHAVE.**

- De flores de azufre. . . . . II onzas.  
 Apáguese en ellas dos dracmas de mercurio vivo y agreguese.  
 De sal de saturno. . . . . III dracmas.

Mezclése exactamente ó incorpórese todo en

De emplasto de meliloto . . . . .	} a. IV onzas.
De galvano . . . . .	
De amoniaco . . . . .	

Se aplica este emplasto sobre los bubones venéreos, ó en los testículos inflamados, por una afección sífilítica.

#### EMPLASTO DE PELITRE

##### DE FULLER.

De galvano . . . . .	} a. I onza.
De sagapeno . . . . .	
De goma amoniaco . . . . .	
De raíz de pelitre en polvo . . . . .	} a. IV dracmas.
De granos de mostaza . . . . .	
De cera amarilla . . . . .	I onza y IV dracmas.
De trementina q. s.	

Se liquidan á un fuego moderado con la trementina, y se agregan en seguida las gomas resinas que han sido purificadas por la solución en el vino, ó en el alcohol débil, y reducidas á una consistencia mole y viscosa, y cuando la masa emplástica está medio enfriada, se incorporan el pelitre y la mostaza, que se reducen en polvo muy fino.

Este emplasto es fundente, estimulante, resolutivo, incisivo, y se aplica sobre los tumores indolentes.

#### EMPLASTO DE CANET

De diaquilón . . . . .	} a. VIII onzas.
De diapalma . . . . .	
De colcortar . . . . .	
De aceite de olivas q. s.	

Se deshace el colcortar sobre un pórfido con un poco de aceite y se mezcla en seguida á los emplastos fundentes.

Este emplasto es madurativo, tira á la supuración y deseca juntamente.

#### EMPLASTO FUNDENTE DE LA MOTHE.

De cera amarilla . . . . . IV onzas.

\*

- De aceite de olivas. . . . . II libras.
- De minio en polvo muy fino. . . . . I idem.
- De alcanfor. . . . . II dracmas.
- De olivano en polvo. . . . . } a. III idem.
- De almáciga. . . . . }
- De mirra. . . . . }
- De alumbre de piedra. . . . . }
- De trementina de Venecia. . . . . } a. I½ onza.
- De piedra iman. . . . . }

F. S. A.

Se recomienda este emplasto contra los panadizos. Se le emplea con suceso en los engurgitamientos glandulosos de los pechos. Se extiende sobre lienzo.

**EMPLASTO ESTIPTICO**

**DE SWEDIAUR.**

- De oxido de fierro rojo. . . . . } a. IV dracmas.
  - De pez de Borgoña. . . . . }
  - De aceite de olivas q. s. para hacer un emplasto.
  - De opio. . . . . II escrúpulos.
- Este emplasto se aplica sobre los lomos en la leucorrea y en la debilidad dorsal.

**EMPLASTO DEL ABATE DOTÉN.**

- De aceite de hipericon. . . . . } a. I libra.
  - De minio . . . . . }
  - De pez resina . . . . . IV onzas.
  - De incienso macho . . . . . II idem.
  - De jabon blanco. . . . . I½ idem.
- Hágase un emplasto. s. a.

**EMPLASTO AMONLACO MERCURIAL**

**DEL Dr. SELLE.**

- De mercurio. . . . . III onzas.
  - De bálsamo de azufre simple. . . . I dracma.
- Mezclése exactamente y agreguése poco á poco =

De goma amoniaco líquida. . . . . II libras.

Este emplastro es un excelente resolutivo de las congestiones de naturaleza sifilitica.

### EMULSION DE QUARIN.

*Contra la ceatica lombar.*

De aceite de almendras dulces. . . . . I  $\frac{1}{2}$  onza.

De jarave de malvavisco. . . . . II idem.

De yemas de huevo q. s.

Despues de haber incorporado todas estas sustancias se agrega.

De agua comun. . . . . X idem.

De carbonate de potaza. . . . .  $\frac{1}{2}$  dracma.

Se toma esta emulcion en tres vasos con media hora de distancia el uno del otro.

Cuando la enfermedad es debida al abuso de los ácidos.

### EMULSION DEL Dr. WILLIS.

*Contra las afecciones reumáticas.*

De raiz fresca de manto de Sta. Maria. } a. II dracmas.

De goma arábica . . . . . } a. II dracmas.

De esperma de ballena. . . . . II escrúpulos.

De agua comun. . . . . V onzas.

De agua de nuez noscada. . . . . IV dracmas.

De jarave de corteza de naranja. . . . . IV idem.

Hágase fundir la goma en una parte de agua de modo que se forme un mucilago que se agitará con la esperma de ballena para hacer una pasta mole. Agréguese la raiz de manto de Santa Maria que antes se habrá reducido en pulpa, triturese el todo para hacer una mezcla exacta. Echese poco á poco el agua y el jarave y cuelese la emulcion.

### EMULSION DE CADET. (i)

*Para terminar las gonorreas inveteradas.*

De bálsamo de copaiba. . . . . } a. I onza.

De jarave de tolú, . . . . . } a. I onza.

(i) El cirujano.

De agua de rosas. . . . . VI onzas.  
 De goma arábica . . . . . I idem.  
 De espíritu de nitro dulce. . . . . I dracma.  
 M. F. S. A.

Se toma la mitad de esta emulsion al tiempo de acostarse y al despertar la otra mitad. Se reitera cuatro ó cinco dias seguidos.

#### EPILATORIO DE PLENHO.

De cal viva. . . . . I libra.  
 De almidon . . . . . X onzas  
 De sulfureto de arsénico . . . . . I idem.

Se mezclan los polvos y se les agrega suficiente cantidad de agua para formar una pasta muy mole que se aplica sobre las partes del cuerpo que se quieren limpiar de pelos. Cuando se seca la pasta se lava con agua tibia ó fria.

#### ESPECIES VERMIFUGAS.

El agenjo marino (*abstintium seriphium gallicum* Lin.) . . . . . III partes.

— Atanasia . . . . . }  
 — Manzanilla . . . . . } a. partes iguales.  
 — Graciola . . . . . }

Cortado el todo muy menudo y dividido en pequeños paquetes de una onza, se hacen infundir en vino blanco.

Se hacen beber uno ó dos vasos diarios antes de comer.

#### ESPECIES QUE SUSTITUYEN AL TÉ.

De la farmacopea Austriaca.

— Hojas de verónica . . . . . }  
 De hiedra terrestre. . . . . } a. III onzas.  
 De tusilago . . . . . }  
 De escabiosa. . . . . }  
 De toronjil . . . . . } a. media idem.  
 De salvia . . . . . }

Se les corta y se les hace infundir del mismo modo y en la misma dosis que el té: se toman cuatro ó cinco tazas en ayunas en las reumas y los catarros.

**ESPIRITU DE OLLIN DE REUS,**

Destílese con cuidado el ollin negro compacto y brillante, separado de la llama del aceite empirreumático, y destílese de nuevo, volviendo al tiempo en tiempo, agitando el licor. Este licor se administra á la dosis de veinte á treinta gotas en un vehiculo apropiado. Se le prescribe en las afecciones histéricas y nerviosas.

**ESPIRITU ETHEREO AROMÁTICO.**

De la farmacopéa de Londres.

De canela contusa . . . . . III dracmas.

De semillas de cardomomo . . . . . I½ idem.

De pimienta larga . . . . . I idem.

De gengibre . . . . . I idem.

De espíritu de éter (1) sulfúrico . I libra.

Hágase macerar durante cuatro dias en una basija de barro cerrada y filtrése.

**ESENCIA SCILÍTICA DE KEUP.**

De carbonato de potasa . . . . . IV dracmas.

De vinagre scilitico preparado con el vinagre destilado . . . . . I libra.

Mezclése y hecho evaporar hasta la consistencia de miel, agréguese.

De alcohol á 36 grados . . . . . VI onzas.

Hágase digerir por algunos dias y decántese. Se da esta esencia en el asma y la hidropesía; á la dosis de cuarenta á sesenta gotas en un vehiculo apropiado.

**ESENCIA DULCE DE HALLER.**

De acetate de potasa . . . . . II dracmas.

De azucar muy blanca . . . . . II onzas.

De agua de rio . . . . . I½ idem.

---

(1) El espíritu de éter es una mezcla de una parte de éter sulfúrico y dos de alcohol.

Se hace hervir esta mezcla en un cazo de plata ó porcelana hasta que el todo parezca negro, y se agrega cuando esté frio:

De alcohol á 30 grados. . . . . I libra.

Se funde la azucar acaramelizada y el acetate de potasa, agitando de tiempo en tiempo el licor y se filtra.

Esta esencia se prescribe á la dosis de veinte gotas en una bebida diurética. Conviene en algunas enfermedades de la vejiga para provocar la orina.

#### ESENCIA CARMINATIVA DE WEDELIUS.

De raíz de cedoaria . . . . . I onza.

De carolina . . . . . } a. media idem.

De cálamo aromático . . . . . } a. media idem.

De galanga . . . . . } a. media idem.

De flores de manzanilla romana . . . . . } a. II dracmas.

De semillas de anís . . . . . } a. II dracmas.

De alcaravea . . . . . } a. II dracmas.

De clavos de comer . . . . . } a. II dracmas.

De ballas de laurel . . . . . } a. II dracmas.

De macias . . . . . I idem.

De cortezas de naranjas secas . . . . . II idem.

De espíritu de limon . . . . . I libra.

De nitro . . . . . V dracmas.

F. S. A.

Esta tintura es estomacal, carminante y emenagoga.

La dosis es desde media hasta una dracma.

#### ESENCIA ALEXIFARMACA DE STHAL.

De raíz de imperatoria . . . . . } a. IV dracmas.

De carolina . . . . . } a. IV dracmas.

De angélica . . . . . } a. IV dracmas.

De pinpinela blanca . . . . . } a. IV dracmas.

De contrayerba . . . . . } a. IV dracmas.

De énula campánula . . . . . } a. I onza.

De dictamo blanco . . . . . } a. I onza.

De asclepias . . . . . } a. I onza.

De valeriana silvestre . . . . . } a. I onza.

De alcohol rectificado q. s.

Los prácticos alemanes prescriben este remedio en las

fiebres lentas, y muchas veces en las exantemáticas, en la viruela, sarampión. La dosis es de 20 á 30 gotas ó mas cuando hay tendencia á la adynamia. P.

### ESENCIA DE WARD.

De alcanfor . . . . . I onza.

De espíritu volátil aromático de Silvio. VIII idem.

Se emplea esta esencia en fricciones en los casos de parálisis, de reumatismos crónicos, en la cefalalgias y convulsiones.

### ESENCIA ANTI-HISTERICA DE LEMORT.

De castor. . . . . IV dracmas.

De asa fetida. . . . . II idem.

De aceite volátil de sabina. . . . . } a.  $\frac{1}{2}$  idem.

De ruda . . . . . } I idem.

De lúccino . . . . . X onzas.

Macérese, destílese, y agréguese al producto.

De alcanfor . . . . . I dracma.

De carbonato aceitoso de amoniaco . II onzas.

Destílese de nuevo hasta la sequedad, ó bien hágase macerar algunos dias y filtrése.

Se dá esta á la dosis de 20 á 40 gotas en un vehiculo apropiado. Conviene en las afecciones nerviosas del utero.

### ETER ACÉTICO ACERADO DE KLAPROTH.

De acetate de fierro líquido. (1). IX onzas.

De eter acetico . . . . . } a. II idem.

De alcohol . . . . . }

M.

Se dá este eter como anti-espasmodico á la dosis de 15 á 40 gotas.

(1) Disolucion saturada de oxide de fierro rojo en el ácido acético concentrado.

*ETER MURIATICO DE BRUGATELLI*

De muriate de potasa oxigenado. . . X onzas.

De alcohol concentrado. . . . . V idem.

Mezclése y agréguese poco á poco.

De ácido sulfúrico. . . . . V idem.

Déjese digerir en frio toda la noche, y la mañana siguiente decántese el eter sobre nadante. Si conserva ácido sulfúrico, agréguese una porcion de muriate sobre oxigenado de potasa y fíltrese, ó destílese á un fuego suave sobre la potasa líquida. Como esta preparacion no es muy exacta me parece conveniente dar la siguiente.

*ETER MURIATICO DE THENARD.*

Se ponen en una retorta, capaz solamente de contener en su vientre la mezcla, partes iguales en volumen, de ácido muriatico y de alcohol lo mas concentrado posible, se le agita bien para poner en contacto todas sus moléculas; hecho esto, se echan en la retorta tres ó cuatro granos de arena para evitar los saltos que sin esta precaucion podia verificarse en el curso de la operacion: despues se le coloca en un fuego desnudo sobre un hornillo ordinario enmedio de una rejilla de alambre, y se adapta á ella un tubo de Welter, que va á introducirse en un frasco de tres tubos, doble en capacidad que la retorta que se emplea, y medio lleno de agua á 20 ó 25 grados, de modo que el tubo penetre en el agua á la profundidad de siete á ocho dedos, en seguida se introduce en la segunda tubulosidad un tubo derecho de seguridad, y en la tercera se introduce uno curbo que va á introducirse bajo los frascos llenos de agua al mismo grado que la precedente. Cuando el aparato está dispuesto de esta manera se calienta poco á poco la retorta, y á cosa de veinte ó veinte y cinco minutos despues que está aplicado el fuego se ven levantarse volvoritos de la parte inferior del liquido y con especialidad de la superficie de los granos de arena. Estos volvoritos no tardan en multiplicarse y en breve se obtiene un gas etéreo. Pasan al mismo tiempo ácido, alcohol y agua; pero quedan en el primer frasco. De quinientas dracmas de ácido concentrado y de un volumen de alcohol igual al de quinientas dracmas de ácido se pueden sacar hasta treinta litros de eter muy puro.

Este gas es absolutamente sin color, el olor es fuertemente etéreo y el sabor sensiblemente dulce.

No tiene accion alguna ni sobre la tintura de tornasol, ni sobre el jarave de violeta, ni sobre el agua de cal. A 18 grados del termómetro centigrado y á 75 de presión el agua disuelve su volumen. A 11 grados de temperatura el gas etéreo se hace líquido. Es de una trasparencia distinguible. Derramado sobre la mano entra súbitamente en evolucion y produce un frio considerable.

#### ETER BALSÁMICO DE TOLÚ DE Mr. MOREAU.

De eter sulfúrico . . . . . II onzas.

De balsámo de tolú electo . . . . . III dracmas.

Se pulveriza el bálsamo y se le hace digerir en el eter que le disuelve en frio casi en su totalidad. Se filtra prontamente.

Se emplea el eter balsámico bajo forma de vapor por medio de un frasco conocido bajo el nombre de inspiratoric. (1)

Se usa en los catarrós faringeos ó pulmonares, en la afonia, en las irritaciones nerviosas del pulmon, sufocaciones, opresiones, &c.

#### ETER ACÉTICO CANTARIDADO DEL Dr. DOUBLE.

De eter acético rectificado . . . . . II onzas.

De cantáridas en polvo . . . . . I dracma.

Se pone á digerir en un frasco bien tapado durante muchos dias, filtrése prontamente y á una temperatura muy baja para evitar la evaporizacion.

Este eter se usa en fricciones en seguida de la apoplejía, de la parálisis, el engurgitamiento lento del tejido celular en los reumatismos crónicos y sin inflamacion. Obra como rubefaciente y su accion es muy pronta.

(1) Se encuentra la descripcion de este aparato en el boletín de farmacia (año de 1811 pág. 485); sirve para la inspiracion de varios eteres compuestos, sea con el de tolú, sea con el bálsamo de azufre anisado, la digital purpuréa, la cicuta, el opio, &c.

Se encuentra este frasco en casa de M. Desrochen locero y frasquero, calle 77 Rouseau frente del hospital de las Postas.

**ETER SULFÚRICO CALIBEADO.**

*Véase tintura nervino-tónica de Bestuchef.*

**ETER NÍTRICO THEREBENTINADO.**

De alcohol de vino . . . . . II libras.

Mézclase con aceite de trementina q. s. muévase con cuidado y agréguese poco á poco.

De ácido nítrico concentrado . . . . . II libras.

Destílese á un suave calor y saquése la mitad de la mezcla.

Usos. Los cálculos biliares, la ictericia tenaz, las obstrucciones hepáticas y los reumatismos.

Se administra interior y exteriormente.

La dosis es de 20 á 40 gotas mezclado con miel ó en una yema de huevo confitada.

**ETHIOPE ANTIMONIAL DE HUXAM.**

De antimonio crudo preparado . . . III onzas.

De mercurio revivificado de cinabrio. IV idem.

De flores de azufre . . . . . II idem.

Mezclense perfectamente estas sustancias en un mortero de barro ó de agata, y tritúrese hasta que el mercurio se apague completamente que no se perciba con el lente el mas mínimo globo. Para facilitar esta extincion perfecta, rocíese de tiempo en tiempo el mercurio con un poco de agua.

Este polvo es un poderoso vermífugo. Se da á la dosis de ocho á diez granos. Se prescribe en la de uno á dos escrúpulos á los adultos, en los engurgitamientos linfáticos, en los tumores glandulosos del cuello, en la atrofia y la sarna venérea. Se emplea contra los depósitos artríticos, la amaurosis, el cirsinóma, &c.

Se usa exteriormente para limpiar las úlceras sífilíticas.

**ETHIOPE VEGETAL DE RUSSEL.**

Tómese la vara llamada roble marino (fucus vesiculosus), quémese en una basija descubierta, y se obtendrá un polvo negro y fino.

Se toma á la dosis de una dracma, como fundente y resolutivo en los engurgitamientos glandulosos contra los lamparones.

En mezclandole partes iguales de azucar muy fina se obtiene un dentrifico, para disipar la rehsjacion escorbútica de las ensias, y para afirmar los dientes.

Con la misma vara se prepara la jalea de fucus de Russel. (Véase esta fórmula en la tabla.)

**EXTRACTO DE COLOQUINTIDA COMPUESTO.**

*Farmacopéa de Londres.*

- De pulpa de coloquintidas . . . . . VI dracmas.
- De extracto de aloes . . . . . I½ onzas.
- De escamonea . . . . . IV dracmas.
- De semillas de cardomomo . . . . . Idem.
- De javon de almendras . . . . . III idem.
- De agua caliente . . . . . I libra.

Macérese la pulpa de la coloquintida en el agua á un dulce calor por cuatro días: cuélese el licor y agréguese el aloes, la escamonea y el javon; evaporese hasta la consistencia conveniente y al fin échese la semilla de cardomomo.

Este extracto es un drástico fuerte, y no se debe emplear mas que en pequeñas cantidades.

**FEBRIFUGO DEL Dr. AUDOUART.**

- De opio en bruto purgado de sus partes leñosas . . . . . } I dracma.
- De alcanfor . . . . . } a media idem.
- De aloes sucotrinao . . . . . }

Tritúrese el todo en un mortero y agréguese una conserva ó un jarave simple para formar una masa de píldoras de las que se forman sesenta bolos.

Se dan estos bolos de uno en uno con el intermedio de dos horas entre los parosismos ó con mas frecuencia segun la urgencia. La dosis es de cuatro, ocho ó diez en el dia. El médico debe arreglarse segun las fuerzas, los abscesos, y el estado del enfermo. Cada bolo debe considerarse como que reemplaza una dracma de quina. Inmediatamente despues de cada bolo se hace tomar un vaso de vino aguado ó de infusion de flores ó de hojas anti-espasmódicas.

con  
e la  
las  
iel ó  
mor-  
curio  
te el  
ro-  
na.  
a dó-  
dos  
s, en  
sarna  
tauro-  
ticas.  
iculo-  
á un

FEBRIFUGO DEL Dr. MARC.

Agua mineral.

- De sulfato de fierro . . . . . I dracma.
- De agua de fuente. . . . . II libras.

Se toma desde medio hasta un vaso de dos en dos horas entre los abscesos en las fiebres intermitentes.

El sulfato de fierro conviene únicamente á las personas húmedas.

BOLOS.

- De sulfato de fierro. . . . . I dracma.
  - De raiz de valeriana en polvo. . . . . II idem.
- Miel q. s. para formar ocho bolos que se dán cada dos horas en número de uno á dos entre los abscesos.

FOMENTO RESOLUTIVO

DE RICHTER.

- De agua . . . . . X libras.
- De vinagre . . . . . I idem.
- De nitrato de potasa. . . . . IV onzas.
- De muriate de amoniaco. . . . . II idem.

Se empapan compresas en esta disolucion y se aplican sobre las contusiones, equimosis, luxaciones y fracturas.

FOMENTOS DEL Dr. JUSTAMOND.

- De muriate de amoniaco. . . . . I idem.
- De espiritu de romero. . . . . I libra.

M.

Se aplican lienzos empapados en este licor sobre los tumores lacticinosos de los pechos; los que se renuevan con mucha frecuencia.

Las mas veces estos tumores lacteos no requieren tratamiento alguno particular, el tiempo y un régimen conveniente es quien los cura. Sin embargo puede emplearse esta fomentacion cuando el tumor es indolente y que tarda mucho en resolverse.

## FOMENTO DEL Dr. RICHARD.

*Contra la gangrena.*

Hágase una decoccion con una onza de quina en cuarenta y ocho onzas de agua hasta que se reduzcan á treinta y dos y agréguese.

De flores de manzanilla romana. . . . . } a. IV dracmas.  
De atanasia. . . . . }

Cuando dé un hervor cuélese la decoccion y cuando se enfrie mezclésele.

De alcohol alcanforado. . . . . II onzas.

De ácido muriático . . . . . I idem.

## FRONTAL SONNIFERO.

De hojas de veleño. . . . . } a. I idem.  
De flores de adormideras encarnadas. . . . . }

Fróntense estas plantas secas hasta reducir las en polvos y agréguese.

De opio en bruto disuelto en s. q. de vinagre 6 granos.

Hágase una pasta que se aplicará sobre la cabeza del enfermo entre dos lienzos en las fuertes cefalalgias.

## GARGARISMO DE QUARIN.

*En la parálisis de la lengua.*

De raíz de pelitre pulverizada . . . . I½ dracma.

De muriate de amoniaco . . . . . II idem.

De agua de salvia. . . . . VIII onzas.

De espiirtu de coclearia . . . . . VI idem.

Póngase en digestion por toda la noche y por la mañana agréguese despues de colarse.

De miel. . . . . IV dracmas.

Con esto se lavará la boca el enfermo.

## JALEA DE FUCO DE RUSSEL.

De fuco (1) . . . . . } a. II libras.  
De agua de mar, . . . . . }

Pónganse en maceración por quince días y se formará una especie de jalea de consistencia de miel colada.

Se emplea con suceso para frotar las glándulas tumefactas y engorgitadas cuando los remedios internos han empezado á resolver estos tumores.

Este fuco seco se dá tambien interiormente á la dosis de un graao como fundente. La planta debe cojerse por el mes de julio, en cuyo tiempo están llenas de un jugo galeinoso.

## JALEA DE COLES ROJAS. (2)

De coles rojas, . . . . . X onzas.  
De cola de pescado, . . . . . II idem.  
De azucar, . . . . . I½ libra.

Se hacen hervir las coles en s. q. de agua: se echa en ella la cola despues de haberla remojado sobre las ceuizas calientes en muy poca agua, cuando la cola está fundida se cuece la decoccion, se vuelve á aplicar al fuego y se le agrega la azucar. Se le clarifica con clara de huevos: se le cuece y se junta el todo con consistencia de jalea.

Conviene en los reumáticos y tísicos: se dá á la dosis de una hasta cuatro onzas al dia.

## JALEA DE LICHÉN.

De lichén islándico, . . . . . III onzas.  
De cola de esturion grande, . . . . I½ dracma.  
De azucar, . . . . . VII onzas.

Conviene esta jalea en las personas amenazadas de tisis pulmonal.

(1) Véase *Ethiope vegetal*.

(2) Entre las varias especies de coles, la roja ha sido mirada como un específico admirable contra las enfermedades del pulmon, principalmente bajo la preparacion de jarave.

Se dá por las mañanas en ayunas á la dosis de tres á cuatro cucharadas.

**JALEA VERMIFUGA.**

*De musgo de Córcega.*

- De musgo de Córcega . . . . . VI½ libras.
- De vino rojo . . . . . XII pintas.
- De azucar prieta . . . . . XXIV libras.

Póngase el musgo en el baño de Maria, échese por cima el vino tinto, déjese en infusion veinte y cuatro horas, hiervase, cuelese, agreguese el azucar y vuelvase á poner al fuego. Clarifíquese y vuelvase á colar, reduzcasele en seguida hasta cerca de treinta libras; se reduce á jalea en enfriandola.

Esta jalea conviene en los niños que tienen gusanos, se les dán tres cucharadas cada dia, cada una una hora antes de cada comida, se continúa por tres ó cuatro dias.

**GOTAS DE ELLER**

**Ó LICOR ANTI-ARTRÍTICO.**

- De licor anodino mineral de Hoffman. } a. II dracmas.
- De espíritu de cuerno de ciervo succinado . . . . . }

Se prescriben de veinte á cuarenta gotas en los reumatismos crónicos, accesos de gotas, espasmos &c.

*Nota.* El licor de cuerno de ciervo succinado se hace mezclando exactamente una onza de sal volatil de succino en una suficiente cantidad de cuerno de ciervo hasta que se complete la solución.

**ACEITE BEZOÁRDICO DE WEDEL.**

*Esta preparacion no es otra cosa que el aceite alcanforado de los farmacéuticos.*

**ACEITE CARMINATIVO ETEREO**

**DE DANOIS.**

- De aceite destilado de manzanilla . . . . . } a. II onzas.
- De menta piperita . . . . . }

- De alcarábea. . . . .
  - De cominos. . . . .
  - De anis. . . . .
  - De hinojo. . . . .
- } a. XXXVI gotas.

Mezclése con cuidado.

Se emplea exteriormente para hacer fricciones sobre el vientre en el colico ventoso ó catarral.

Interiormente se usa tambien á la dosis de seis á ocho gotas mezcladas con azucar ó con la yema de un huevo.

*ACEITE ALOÉTICO BATAVE.*

Se pone en una retorta de barro bien tapada una libra de aloes hepático en polvo, se mezcla con dos onzas de mirra y cuatro dracmas de inciense; en seguida se procede segun arte á la destilacion en el baño de arena y se obtiene un licor cargado de aceite amargo, cuya aplicacion tópica ha sido recomendada contra las lombrices de los niños.

*ACEITE ACÚSTICO.*

- De aceite de ruda por ligera infusion. . . . . IV dracmas.
  - De bálsamo tranquilo. . . . . II idem.
  - De aceite de trementina sulfurado. . . . .
  - De tintura de asa fetida. . . . .
  - De ambar gris. . . . .
  - De castor. . . . .
  - De aceite de succino rectificado. . . . .
- } a. X gotas.

Este aceite fortifica el órgano del oido, se introduce en las orejas por medio de un algodón empapado en él.

*ACEITE VERDE DE METZ.*

*Ó DE FEUILLET.*

- De oxido de cobre verde. . . . .
  - De sulfato de sinc. . . . .
  - De aceite de lino. . . . .
  - De olivas. . . . .
  - De trementina. . . . .
  - De aloes sucotriao. . . . .
- } a. I½ dracma.
- } a. VI onzas y II dracmas.
- } II onzas.
- } II dracmas.

De aceite volatil de gengible . . . IV dracmas.

De clavos de comer. . . . . I idem.

Este aceite no se emplea mas que exteriormente, corroe las carnes fungosas, deterge las úlceras, cicatriza y evita la gangrena. (Se llama tambien esta preparacion bálsamo de Metz.)

**INFUSION DE HOLLIN COMPUESTA**

**DE PIDERIT.**

De cenizas graveoladas. . . . . III onzas.

Cuélese con una infusion de flores de sauco en cantidad de 36 onzas y agréguese.

De muriate de amoniaco. . . . . I onza.

De hollin compuesto y reluciente. . . II idem.

Se dá esta infusion á la dosis de una dracma en una onza de buen vino dos ó tres veces cada dia para facilitar las menstruaciones ó reproducir en el cutis una erupcion cutanea suprimida. Se prescribe contra las obstruccionen engurgitaciones linfáticas, el asma, la ictericia, la cachexia, los dolores artriticos, y las cuartanas.

**INYECCION DEL Dr. PRINGLE.**

De sulfate de sine. . . . . } a. IV dracmas.

De alumbre calcinado. . . . . }  
De agua pura. . . . . II libras.

Mezclése y hágase la solucion.

Se emplea esta inyeccion en la leucorrea. La dosis es de una onza á la vez.

Cuando la enfermedad se acerca á su fin entonces suele ser perjudicial esta inyeccion.

**INYECCION DEL Dr. TUNG.**

De acetate de plomo líquido. . . . . II dracmas.

De vinagre destilado. . . . . VIII onzas.

De agua de rosas destilada. . . . . 1½ libras.

M.

Se usa como la precedente.

\*

73.  
INYECCION DEL Dr. CLARE.

- De oxido gris de plomo. . . . . XX granos.  
De sulfato de sinc. . . . . VI idem.  
De agua de rosas. . . . . IV onzas.

Mezclése y agítese.

Se emplea esta inyeccion en la blenorragia.

La observacion precedente es aplicable á esta preparacion.

INYECCION SEDATIVA

DEL Dr. HAMILTON.

- De extracto de opio. . . . . } De I á III dracmas.  
De agua caliente. . . . . I libra.

Despues de la solucion agréguese.

- De acetate de plomo liquido. . . De I á III dracmas.

Tiene el mismo uso que la precedente.

JULEPE NOSCADO DE FULLER.

- De agua de rosas. . . . . VI onzas.  
De azahar. . . . . I idem.  
De canela ordeada. . . . . II idem.  
De peonia compuesta. . . . . I½ idem.  
De almizcle . . . . . }  
De ambar gris. . . . . } a. II granos.  
De carbonate de amoniaco. . . . . I escrupulo.  
De azafran. . . . . I gota.  
De esencia de clavo. . . . . II dracmas.  
De confeccion de alquermes. . . . . I½ onza.  
De jarave de claveles. . . . .

M. et f. s. a.

Se dá este julepe á la dosis de cinco cucharadas cada tres horas en las afecciones espasmódicas y en las fuertes contracciones del estómago.

JULEPE ESCOCES PARA LA ANGINA.

INFLAMATORIA.

- De agua de poleo. . . . . III onzas.

79.

De jarave de malvavisco. . . . . } a. I onza.  
De tolú. . . . . }

M.

Se dá á cucharadas de cuarto en cuarto de hora.

Este julepe es solo un corto auxilio, el que no debe excluir el uso de los remedios que exige esta enfermedad como son la sangría, los eméticos, los vejicatórios, los baños, las fricciones, los anti-espasmódicos mas enerjicos &c.

### LEXIA LITHONTRITICA

DE SAUNDER.

De escamas de ostras calcinadas. . XXIV onzas.

De potasa recientemente calcinada. . VIII idem.

De agua hirviendo. . . . . III libras.

Filtrese el licor despues de haber reposado un día.

Se dáa tres dracmas por dia en una infusion de semillas de lino, á la que se agrega=

De magnesia calcinada. . . . . XV granos.

### LINIMENTO DE AJO.

Se le prepara machacando el ajo en un mortero con partes iguales de unto sin sal, se frotan con él las plantas de los pies dos ó tres veces al día, pero el mejor modo de usarlo es extenderlo sobre un lienzo y aplicarlo en forma de un emplasto. Se renueva tarde y mañana por que el ajo pierde prontamente su virtud.

Es un buen remedio contra el coqueluc y contra muchas toses pertinaces. (Extractado de Buchán.)

### LINIMENTO CARMINANTE DE WHIT.

De bálsamo anodino de bates. . . . . I onza.

De aceite de macias. . . . . IV dracmas.

Esencial de yerbabuena. . . . . II idem.

Mezclése perfectamente.

Se toma cerca de una cucharada ordinaria con lo que se le unta al enfermo hacia la region del estómago cuando se acuesta.

## LINIMENTO DE MUSTARD.

De unguento epispástico. . . . . I onza.  
 De esencia de trementina. . . . . III dracmas.  
 De alcanfor. . . . . IV idem.  
 Se emplea en la gota y reumatismo.

## LINIMENTO RESOLUTIVO DE POTT.

De aceite esencial de trementina. . II onzas.  
 De ácido muriático. . . . . 1 idem.  
 M.  
 Se usa en los reumatismos y dolores artríticos, se fro-  
 tan las lupias y tumores enquistados.

## LINIMENTO DE HUFELAND.

Contra los tumores glandulosos y con especialidad con-  
 tra los que provienen de un vicio escrofuloso.  
 De unguento de altea. . . . . I onza.  
 De hiel de bucy reciente. . . . . } a. III dracmas.  
 De javon blanco. . . . . }  
 De aceite de petroleo. . . . . II idem.  
 De sal volatil de cuerno de ciervo.  $\frac{1}{2}$  idem.  
 De alcanfor. . . . . 1 idem.  
 Se emplea en fricciones á la dosis de una cucharaz-  
 da de café cada tres horas.

## LINIMENTO CONTRA LAS HEMORROIDES

POR EL Dr. ANDRYS.

De aceite de olivas. . . . . }  
 De miel de narbona. . . . . } a. I onza.  
 De trementina de Venecia. . . . . }  
 F. Linimentum s. a.

## LINIMENTO ANTI-OPTÁLMICO

## DE PLENCK.

De sulfato de alumbre en polvo. . . I dracma.

De clara de huevo . . . . . núm. 1.

De agua de rosas. . . . . I onza.

Infundase el alumbre en el agua, agréguese la clara de huevo y cuélese la mezcla.

Se aplica sobre los ojos en la optalmia húmeda por medio de pequeñas compresas empapadas en él.

## LINIMENTO SAPONÁCEO

## DE KAEMPE.

De javon alcalino de sosa . . . . . I onza.

De alcohol á 30 gs . . . . . IV idem.

De alcanfor . . . . . LX granos.

Se rapa el javon y se mete en una basija con el alcohol, despues se le pone al fuego agitando la mezcla con una espátula de barro, y cuando el alcohol se enfrie se le mezcla exactamente el alcanfor.

Esta preparacion análoga al bálsamo de opodeldoc, tiene los mismos usos.

## LINIMENTO ANTI-ARTRITICO

## DE HOME.

De alcanfor. . . . . I escrúpulo.

Disuélvase en dos dracmas de aceite de trementina y agréguese.

De sal volatil de cuerno de ciervo } XV gotas.  
succinado. . . . . }

De semillas de cominos en polvo. . II dracmas.

De unguento nervio. . . . . IV idem.

De javon negro comun. . . . . I onza.

M. et F. Linimentum.

Se usa en fricciones en las afecciones reumáticas prolongadas y particularmente en la céatica nerviosa,

### LINIMENTO ANTI-ARTRÍTICO

#### DE DESBOIS DE ROCHEFORT.

De aceite. . . . .	I onza.
De amoniaco líquido . . . . .	II dracmas.
De agua teriacal. . . . .	I onza.
De laudáno . . . . .	I dracma.

### LINIMENTO VOLATIL DE PLENCK.

De aceite de almendras dulces. . . . .	I onza
De amoniaco líquido. . . . .	I dracma.
De alcanfor . . . . .	XXXVI onzas.

Se hacen con este linimento ligeras friegas sobre el abdomen en la perineumonía, pleurecía, en la inflamacion del bajo vientre, el cólico ventoso y la timpanitis.

Se dán fricciones tambien en el cuello en la angina del pecho.

### LINIMENTO DIURÉTICO

#### DE KUSER.

De aceite de trementina. . . . .	I onza.
De yemas de huevo frescas ó cocidas. . . . .	II idem.

Se agitan en un mortero de barro hasta que se mezcle perfectamente, despues se le vá echando poco á poco sin dejar de agitarlo.

De agua de yerbabuena piperita . . . III onzas.

Se hacen fricciones sobre la region inguinal con este linimento. Se emplea contra la isguria espasmódica.

### LINIMENTO ANTI-ESPASMÓDICO

#### DEL Dr. SELLE.

De ungento de altea . . . . .	II onzas.
-------------------------------	-----------

De alcanfor. . . . . } a. I dracma.  
De laudano líquido de sydeham. . . }

Este linimento es muy eficaz en todos los movimientos espasmódicos de los intestinos. Se frota el bajo vientre todos los días con algunas dracmas, en diferentes veces y se cubre con una lanilla caliente.

### LINIMENTO SAPONACEO ALCANFORADO

#### DE FERRIAR.

De unguento digestivo amarillo . . . I onza.  
De jabon verde ó de trementina. . . IV dracmas.  
De alcanfor. . . . . II idem.

M.

Tiene los mismos usos que los dos precedentes.

### LINIMENTO ESTIMULANTE INGLÉS.

#### Ó BÁLSAMO DE LA VIDA EXTERNO.

De jabon medicinal. . . . . VIII dracmas.  
Dividase y agréguese =  
De aceite esencial de trementina. . . VIII onzas.  
De espíritu de serpol. . . . . IV libras.  
De amoniaco líquido . . . . . De II á VIII onzas.

Algunas ocasiones se le agrega una libra de agua para hacer una embrocacion resolutive.

Se emplea el bálsamo de la vida externo en la parálisis, la falsa anquilosis, los tumores frios, la arthrodynia &c.

### LINIMENTO DE RONCALLÍ.

Se toma una vejiga de hiel de buey entera, se agrega á la bilis que contiene tres onzas de muriate de sosa en polvo y tres cucharadas de aceite de nuez, se agita la mezcla y se pone esta vejiga durante algun tiempo á un dulce calor.

Se embeben hilas en este linimento y se aplican dos ó tres veces al día sobre los tumores escrófulosos. El provoca la resolucion ó supuracion de estos tumores con tal que tambien se haga uso de algunos remedios internos.

Estos son los que de ordinario se emplean: se purga primero al enfermo con la jalapa y el cremor de tártaro y se le pone al uso de un cocimiento de la raíz de baldana y de polipodio.

En seguida se les prescriben unas píldoras compuestas con el jabon, la goma amoniaco y el ruibarbo partes iguales de estas dos últimas sustancias. Estas píldoras y la bebida deben continuarse por algunas semanas.

Si los tumores escrofulosos pareciesen muy inflamados, se suspende el uso del linimento y se aplican por cima algunos tópicos suaves ó cataplasmas emolientes.

Hay tambien necesidad algunas veces de aplicar sobre los tumores indolentes de estas escrófulas el remedio hongrois compuesto de goma amoniaco disuelta en el vinagre y espesada hasta la consistencia de emplastro.

#### LICOR AMONIAL ANISADO.

*Pharmacopée de Berlin.*

De alcohol. . . . . I libra.

De amoniaco liquido. . . . . III onzas.

De aceite volátil de anis. . . . . IV dracmas.

La dosis es de diez gotas para los adultos mañana y tarde y cinco para los niños.

Se prescribe este licor en las enfermedades adinámicas y con especialidad en el asma espasmódica.

#### LICOR ANTI-NEFRITICO

DEL Dr. ADAMS.

De cabezas de adormideras . . . . VI onzas.

De agua de fuente. . . . . II libras.

Hágase hervir hasta que se reduzcan á ocho onzas, esprimase muy bien y despues de colarlo agréguese.

De nitrato de potasa. . . . . I onza.

Se dán dos dracmas mañana y tarde, en un vaso de una decoccion tibia de granos de lino ó de malvaisco.

Se emplea este licor en las afecciones dolorosas de las vias urinarias.

## LICOR CAUSTICO DE PLENCK.

De mercurio sublimado corrosivo. . . . .	} a. II onzas.
De sulfato ácido de alumbre . . . . .	
De alcanfor . . . . .	} a. II dracmas.
De cerusa . . . . .	
De vinagre concentrado . . . . .	} a. XXIV onzas.
De alcohol rectificado . . . . .	

Hágase la mezcla s. l.

Este licor destruye los condilomas las escrecencias venereas sin alterar la piel sana; se le aplica dos veces al día por medio de una compresa ó una planchuela de hilas. Aplicado del mismo modo cicatriza los rasgades.

## LICOR DEL Dr. SWEDIAUR.

*Para las aptas.*

De borax en polvo . . . . .	II dracmas.
De tintura de mirra . . . . .	} a. I onza.
De agua de rosas destilada . . . . .	
De miel rosada . . . . .	II idem.

Se empapa un hisopo en este licor y se tocan las aptas muchas veces al día.

## LICOR DE PRESSAVIN.

Se toman partes iguales de tartre ácido de potasa y de mercurio precipitado de su nitrato por la potasa. Se disuelve esta mezcla en veinte veces de su peso de agua destilada y se filtra el licor.

Este tartre de mercurio líquido se emplea á la dosis de dos cucharadas en medio azumbre de agua destilada, se toman tres ó cuatro vasos por día con una tipsana apropiada.

El licor de Pressavin es anti-herpético y anti-venéreo.

## LOHC DE ALMIDON.

*Farmacopéa de Edimburgo.*

De almidon . . . . .	II dracmas.
----------------------	-------------

\*

De cachunde. . . . . I dracma.  
 De jarave de tolú . . . . . }  
 De clara de huevo batida en un po- } a. I onza.  
 co de agua. . . . . }  
 Hágase un lohc s. a.  
 Se emplea en las diarreas rebeldes.

#### LOHC SAPONACEO.

##### *Farmacopéa de Edimburgo.*

De jabon medicinal. . . . . I dracma.  
 De aceite de almendras dulces. . . I onza.  
 De jarave de limon. . . . . I½ dracma.  
 Mezclése y hágase un lohc.

#### LOHC DE GORDON.

De jarave de col roja . . . . . I libra.  
 De azafrán gatinois (1) . . . . . III dracmas.  
 De agua. . . . . VIII onzas.  
 Hágase hervir un momento y cuélese. Se dá á cucharadas en el asma húmeda, en las reumas y enfermedades de pecho.

#### LOCION ODONTALGICA DE PLENCK.

De raiz de pelitre. . . . . II dracmas.  
 De muriate de amoniaco . . . . . I idem.  
 De extracto de opio. . . . . II granos.  
 De agua destilada de espiego . . . }  
 De vinagre destilado . . . . . } a. II onzas.  
 Digiérase por algunos dias esta mezcla y filtre.

---

(1) Gatinois término derivado de la palabra francesa *Gatine* con la que expresan un mineral que se encuentra en las minas de fierro y que lo hace mas facil de fundir. *Gatine* en algunas provincias de la Francia significa árido y de esto verosimilmente se ha deducido el nombre *gatinois*. = El Traductor.

En los dolores se toma de tiempo en tiempo en la boca una cucharada de esta locion. Se tiene cuidado de no tragarla.

#### LOCION CONTRA LA TIÑA.

- De sosa sulfurada. . . . . VI onzas.  
 De jabon blanco. . . . . III dracmas.  
 De agua de cal. . . . . XVIII onzas.  
 De aguardiente . . . . . VI dracmas.

M. s. a.

Cada dos dias se envuelve la cabeza con un lienzo empapado en esta preparacion.

#### CONSERVA DE TRONCHIN.

- De pulpa de casia. . . . . } a. I onza.  
 De maná en lágrima . . . . . }  
 De aceite de almendras dulces. . . . . } a. IV dracmas.  
 De jarave de violetas. . . . . }  
 De agua de azahar. . . . . II idem.

Se toma á cucharadas de hora en hora por la mañana: la mitad un dia y la otra el dia siguiente. Se toma encima un caldo ligero.

Esta conserva es un purgante dulce que conviene á las personas delicadas en las enfermedades catarrales.

#### CONSERVA DE ZANETTI.

- De maná en lágrima. . . . . II onzas.  
 De jarave de malvavisco . . . . . I½ idem.  
 De casia cocida. . . . . } a. I idem.  
 De aceite de almendras dulces. . . . . }  
 De manteca de cacao . . . . . VI dracmas.  
 De agua de azahar. . . . . I½ onza.  
 De kermes mineral. . . . . IV granos.

Se administra como minorativo en las reumas. Puede suplir á la conserva de Tronchin. Se prescribe á la dosis de una dos ó tres cucharadas de café segun la edad del enfermo y la intencion del médico.

*MIXTURA PECTORAL DE QUARIN.*

De goma amoniaco disuelta en una yema de huevo . . . . .	} II dracmas.
De extracto de émula campánula . . . . .	
De agua de hisopo . . . . .	II escrúpulos.
De oximiél escilítico . . . . .	VIII onzas.
De jarave de hisopo . . . . .	} a. I½ dracma.

Se administra á cucharadas esta mixtura en la apoplejía acompañada de tos, con silvido y dificultad de volver una materia pituitosa y tenaz que amenaza sofocacion.

*MIXTURA PECTORAL  
DE BOHERHAVE.*

De vinagre escilítico . . . . .	VI dracmas.
De oximiél escilítico . . . . .	III onzas.
De sulfato de sosa . . . . .	I dracma.
De cocimiento de cebada . . . . .	VIII onzas.
De agua destilada de hisopo . . . . .	IV idem.

Se dá una onza de esta mixtura tibia cada media hora en la periacumonia.

Cuando la expectoracion es abundante y un poco difícil,

*MIXTURA ANTI-LETARGICA*

*DEL Dr. FRANCK,*

De espíritu de menta piperita . . . . .	VI onzas.
De láulano líquido de sydeham . . . . .	IV dracmas.
De eter sulfúrico . . . . .	VI idem.

Mezclése y hágise tomar al enfermo cada cuarto de hora una cucharada de café de esta mezcla.

Es necesario suponer que este letargo se produce por una debilidad nerviosa profunda.

Para emplear este medicamento el médico debe consultar la observacion del Dr. Franck.

*MIXTURA DE QUARIN EN LA ICTERICIA.*

- De extracto líquido de diente de Leon. } a. IV dracmas.  
 De acetate de potasa . . . . . }  
 De extracto de cicuta. . . . . } Desde X hasta XX  
 De agua de hinojo. . . . . } granos.  
 De jarave de cinco raices. . . . . VI onzas.  
 De jarave de cinco raices. . . . . I idem.  
 Se dán dos cucharadas cada tres ó cuatro horas.

*MIXTURA ANTI-SIFILÍTICA*

*DE SIRILLO.*

- De miel egipciaca . . . . . II½ dracmas.  
 De agua pura. . . . . II onzas.

M.

Se aplica dos veces cada dia sobre las úlceras venereas una compresa empapada en esta mixtura.

*MIXTURA RESOLUTIVA DEL Dr. SELLE.*

- De muriate de amoniaco. . . . . } a. II dracmas.  
 De vino emetico. . . . . }  
 De oximiél simple . . . . . II onzas.  
 De agua de manzanilla destilada. . X idem.

M.

Se dá esta mixtura á la dosis de media taza cada hora en las fiebres donde hay que combatir éstasis tenaces.

*MIXTURA ANTI-CATARRAL RUSA.*

- De elixir paregórico inglés . . . . . V onzas.  
 De tintura de scila. . . . . I idem.  
 Se toma á cucharadas de café por mañana y tarde.

*MIXTURA HYDRAGOGA**DE VAN-SWIETEN.*

De rob de enebro . . . . . IV onzas.  
 Diluyase en una pinta de agua destilada de bayas  
 de enebro y agréguese=

De espíritu de enebro . . . . . II onzas.

Se dá cuatro ú ocho veces cada dia, desde media cu-  
 charada hasta dos. Cuando las enfermas están muy alteradas  
 se agregan algunas veces á la mixtura cuatro dracmas de es-  
 píritu de nitro dulce.

*MIXTURA ODONTALGICA**DE CADET.*

De eter sulfúrico . . . . . }  
 De láudano líquido . . . . . } a. I dracma.  
 De bálsamo del comendador . . . . . }  
 De aceite esencial de clavo . . . . . XX gotas.

M.

Se empapa un poco de algodón en esta mixtura y se  
 aplica sobre el diente afecto.

*MIXTURA ANTI-ASMATICA**DE BRUNER.*

De goma amoniaco muy pura . . . II dracmas.  
 Disuélvase en agua destilada de hi- }  
 sopo . . . . . } IV onzas.  
 De vino del Rhin ó blanco generoso. II idem.

M.

Se dá esta mixtura á la dosis de una onza tres ve-  
 ces al dia.

*MIXTURA CATHARTICA ARABE.*

De sulfureto de antimonio pulverizado. XII granos.  
 De escamonea en polvo . . . . . I escrúpulo.

De jarave de limon . . . . . I onza.  
Mezclése para una dosis.  
Esta fórmula es útil en la hidropesia ascitis.

**MIXTURA RESINO-JABONOSA DE PLENCK.**

De resina de guayaco . . . . . } a. I onza.  
De jabon de almendras . . . . . }  
De alcohol rectificado . . . . . VIII idem.

Hágase una tintura s. a. y filtrése.  
Se emplea esta tintura líquida ó se le hace evaporar hasta su sequedad. Se dá el jabon seco á la dosis de diez y ocho granos, ó la tintura á la dosis de una dracma en una bebida apropiada. Conviene este remedio en la gota y el reumatismo.

**MIXTURA SAPONACEA PURGANTE DEL MISMO.**

Se prepara como la precedente empleando la jalapa en lugar del guayaco.

Purga á los niños sin promover dolores de vientre. Se dá á la dosis de una á una y media dracma líquida, y de diez á veinte granos seca.

**MIXTURA DE QUARIN.**

Contra la hémotisis.

De agua de flor de amapola . . . . . VIII onzas.  
De goma arábica . . . . . IV dracmas.  
De sulfato ácido de alumbre y de potasa . . . . . } Media idem.  
De jarave de diacodion . . . . . I onza.

Se usa á cucharadas  
Solo debe usarse en las hemotisis pasivas. En los casos contrarios deben preceder los remedios generales, la sangría, &c.

**MIXTURA DE BOYLE.**

Contra las aptas.

De jugo de la grande siempre viva . . . . . } a. I onza.  
De miel . . . . . }

De sulfato ácido de alumbre . . . I escrúpulo.  
Se lavan las aptas diariamente

**MIXTURA DE WHITT.**

Contra los cálculos biliares.

- De eter sulfúrico . . . . . I onza.
- De esencia de trementina . . . . . IV dracmas.

Se dan de doce á veinte gotas ó algo mas en un terron de azucar, se hace beber encima una taza de suero clarificado ó de agua de cebada. Se debe continuar este remedio durante muchos meses. Si irrita se prescribe un régimen refrigerante.

Este remedio es el que recomendaba Durande, médico de Dijon. Cullen le cree sin virtud contra los cálculos biliares; pero muchos prácticos lo emplean con suceso, y Quarrin recomienda que se ensaye.

**MIXTURA LITONTRITICA DE DURANDE.**

- De eter sulfúrico . . . . . VII dracmas.
- De esencia de trementina . . . . . IV idem.

Algunas veces el médico asociaba al eter la yema de huevo, otras veces aumentaba ó disminuía la proporción del aceite volatil de trementina ó le asociaba el jarave de violetas ó de corteza de naranja y á veces el jarave de diacodion ó el de amapolas.

El remedio de Durande muy análogo al de Whitt no se emplea mas que como disolvente de los cálculos biliares.

Se toman doce ó veinte y cuatro gotas por la tarde en un poco de azucar.

**MIXTURA BALSÁMICA DE FULLER.**

- De bálsamo de copaiba . . . . . IV dracmas.
- De yemas de huevos . . . . . núm. 2.
- De jarave de azucar blanca . . . . . II onzas.
- De vino blanco . . . . . VIII idem.

M.

93.

Se da esta mixtura á la dosis de una cucharada mañana y tarde en la tos catarral crónica y en la blenorrea crónica.

#### MIXTURA FUNDENTE DE MUTZEL.

De tartitre de potasa . . . . . IV dracmas.  
De extracto de genciana . . . . . } a. II idem.  
De centaurea . . . . . }  
De agua . . . . . VIII onzas.

Se da media onza cada dos horas á los enfermos que tienen obstrucciones en el higado.

#### MIXTURA DE MIRRA ALCALIZADA DE GRIFFIHT.

De mirra elesta . . . . . II dracmas.  
De carbonate de potasa . . . . . I idem.  
Tritúrese con exactitud y agréguese.  
De agua de yerbabuena . . . . . VIII onzas.  
De alcohol de idem . . . . . I½ idem.  
De sulfato de fierro . . . . . De XX á XXV gs.  
De jarave de tolú . . . . . I idem.

M.  
Se toman cuatro cucharadas tres veces al dia á saber: en la mañana, dos horas despues de comer, y al acostarse.

Conviene en la caquexia hidrópica, en la debilidad que sigue á las fiebres adinámicas, en la leucorrea &c.

#### MIXTURA PARA LA ANGINA INFLAMATORIA.

De asa fétida . . . . . II dracmas.  
De espíritu de mindereros . . . . . I onza.  
De agua de amapola . . . . . III idem.

Se dá esta mixtura á cucharadas todas las horas, quando han empleado los remedios generales.

#### MIXTURA ACIDA DEL Dr. SELLE.

De ácido sulfúrico . . . . . I dragma.

\*

De oximiél simple. . . . . IV onzas.  
 De agua pura. . . . . XX idem.  
 En las fiebres pútridas se toman cada hora una taza  
 llena de esta mixtura. En la sarna se empieza por menor dó-  
 sis.

*MIXTURA DIAFORÉTICA DEL MISMO.*

De antimonio diaforético lavado. . . II dracmas.  
 De espíritu de minderereros. . . . IV idem.  
 De agua de flor de sauco . . . . . VIII onzas.

M.

Se emplea esta mixtura en las fiebres agudas, en las  
 que se procura facilitar la traspiracion y refrescar.

Se dá media taza cada hora.

*MURIATE DE AMONIACO CUPREO.*

DEL Dr. VAN-MONS.

De muriate de cobre. . . . . } a. partes iguales.  
 De idem de amoniaco . . . . . }

Disuélvase en agua y agréguese gota á gota el amo-  
 niaco líquido que baste hasta que se forme un precipitado, lá-  
 vese y séquese.

Se emplea en la epilepsia mezclado con la valeriana sil-  
 vestre.

Dosis. Desde dos granos hasta veinte ó treinta ca-  
 da dia, al menos que no excite nausea.

*MURIATE DE AMONIACO Y DE FIERRO.*

De sulfato de fierro. . . . . } a. partes iguales.  
 De muriate de amoniaco . . . . . }

Hágase disolver en q. s. de agua hirviendo, cuando  
 se enfríe y precipite la disolucion por el amoniaco líquido se  
 lava el precipitado.

Se usa en las escrófulas, la caquexia, la raquitis y en  
 las enfermedades linfáticas.

Dosis. De doce á veinte y cuatro granos.

## MURIATE DE SOSA Y DE ORO.

De oro muy puro . . . . . } a. partes iguales.  
De muriate de sosa . . . . . }

Disuélvase el oro en el ácido nitro muriático, agréguese el muriate de sosa, filtrése y evapórese á un fuego suave hasta la sequedad. Se emplea contra la tisis que sigue á las enfermedades venereas ó se administra cuando el mercurio deja de ser útil.

Dosis. De tres, seis, doce ó diez y ocho granos por día incorporado con el jarave de goma arábica.

## MURIATE CALIBEADO DE MERCURIO DE HARTMANN.

De muriate de mercurio dulce . . . . . III partes.

De muriate de fierro amoniacal . . . . . I idem.

Tritúrese y mézclese exactamente.

Se dá este polvo á la dosis de veinte á treinta granos en las enfermedades escrofulosas, en los engurgitamientos linfáticos y contra las lombrices intestinales.

## UNGUENTO DE MONTPELLIER.

De unguento de altea . . . . . }

Del rosado . . . . . }

Del de populeon. . . . . }

De miel. . . . . }

Mézclese exactamente.

Este unguento se emplea contra las hemorroides.

## UNGUENTO BLANCO ALCANFORADO.

De la Farmacopéa de Viena.

De blanco de cérúza . . . . . II onzas.

De enjundia. . . . . IV libras.

Se derrite y agita hasta que la masa tome consistencia de unguento, y se agrega.

De alcanfor en polvo. . . . . { II onzas y seis  
dracmas.

Se mezcla y se guarda el unguento.

Se emplea contra las quemaduras y contusiones seguidas de inflamacion.

UNGUENTO EPISPÁSTICO SIN CANTÁRIDAS,

De semillas de mostaza . . . . .	IV idem.
De pelitre . . . . .	} a. I idem.
De estafisagra . . . . .	
De pimienta larga . . . . .	I escrúpulo.
De euforbio . . . . .	IV onzas.
De trementina q. s.	

Se emplea este unguento para sostener la supuración de un exuntorio. No extiende su acción á la vejiga como las cantáridas.

UNGUENTO DE PIDERIT.

De miel amarilla y granujenta . . . . .	} a. VII onzas.
De pulpa de cebolla cocida . . . . .	
De cera amarilla . . . . .	} a. I onza y III dracmas.
De resina ordinaria . . . . .	
De jabon negro . . . . .	

Después de haber cocido la cebolla bajo cenizas y de haberle sacado la pulpa, se derrite la cera y la resina, después se le agréga la miel, la pulpa de la cebolla y el jabon negro.

Se sostiene al fuego hasta que se evapore toda la humedad, y se remueve continuamente la mezcla con una espátula de palo, hasta que se resfrie enteramente.

UNGUENTO DE PROPOLIS (1) DE CADET.

De propolis purificado en agua hir- viendo . . . . .	} IV onzas.
De aceite de olivas . . . . .	

Se disuelve el propolis en el aceite á un dulce calor y después de haberlos mezclados bien se cuéla el unguento caliente.

(1) Entiéndese por propolis una especie de betun con que las abejas tapan las colmenas.

Se emplea para las úlceras antiguas y en el tratamiento de las hemorroides.

### UNGUENTO DEL Dr. PLENCK.

*Contra los sabañones.*

De pella de puerco . . . . .	} a. II onzas.
De sebo de buey . . . . .	
De aceite de laurel . . . . .	
De cera . . . . .	

Derritase á un fuego lento y cuando se enfrie agréguese.

De alcanfor disuelto en . . . . . IV dracmas.  
Alcohol rectificado . . . . . II onzas.

Mezclése exactamente s. l.

### UNGUENTO DE FALK.

*Contra los tumores hemorroidales.*

De limaduras de estaño puro . . . . .	} a. II dracmas.
De mercurio vivo . . . . .	

Hágase una mezcla y agréguese.

De unguento rosado . . . . . I onza.  
De mercurio precipitado rojo . . . II dracmas.  
De aceite destilado de menta piperita. XX gotas.

Este unguento se aplica en una planchuela sobre los tumores hemorroidales;

### UNGUENTO MERCURIAL BLANCO DE ZELLER.

De mercurio precipitado blanco . . I dracma.  
De cerato ó pomada de rosas . . . I onza.

Mezclése exactamente.

Se emplea este unguento como coméstico, y en las enfermedades cutanéas, psóricas, herpéticas, ó venereas, se hacen ligeras fricciones á la dosis de una dracma ó menos segun las circunstancias.

UNGUENTO DE RICOUR.

- De aceite rosado . . . . . XII onzas.  
 De cera blanca . . . . . VIII idem.  
 De ceruza . . . . . IV idem.  
 De litargirio . . . . . II onzas.  
 Agréguese al fin de la mezcla en caliente.  
 De bálsamo del Perú líquido . . . IV dracmas.  
 Se aplica este unguento sobre las úlceras indolentes.

UNGUENTO PARA LA TIÑA.

- De harina de trigo . . . . . }  
 De pez negra . . . . . } a. V libras.  
 De pez de Borgoña . . . . . }  
 De vinagre destilado . . . . . XXX idem.

Se diluye al calor la harina en el vinagre y se le agréga la pez negra y la de Borgoña fundida.

Se extiende este unguento sobre una badana y se aplica tibio sobre las partes afectas de tiña, se levanta al cabo de doce horas, se lava la herida y se sigue el tratamiento racional seguido en esta enfermedad.

UNGUENTO CONTRA LA TIÑA.

- De carbon de madera . . . . . }  
 De flor de azufre . . . . . } a. IV onzas.  
 De sebo . . . . . II idem.  
 Mezclése despues de haberlo pulverizado bien.

De manteca de puerco . . . . . XV onzas.  
 Cada tres dias se unta la cabeza por mañana y tarde despues de haberla lavado con el agua de jabon.

UNGUENTO DE LA ABADIA DE BÉE.

- De enjundia . . . . . }  
 De pez de Borgoña . . . . . } a. I libra.  
 De resina . . . . . }  
 De brea . . . . . } a. V onzas.  
 De cera amarilla . . . . . X idem.

99.  
De olivano en polvo . . . . . X dracmas.

F. S. A.

Este unguento tiene el mismo uso que el de Ricour.

*UNGUENTO DEL DUQUE.*

De aceite de nuez . . . . . VIII onzas.

De flor de azufre . . . . . II dracmas.

Póngase todo en el baño de arena por media hora ó hasta que el azufre se disuelva y se enrojezca el aceite, entonces se le funde y se le colora con q. s. de buglosa encarnada:

Se le agréga.

De enjundia . . . . . VIII onzas.

De cera amarilla . . . . . I idem.

Se pasa por un lienzo y se pone el unguento en un mortero de marmol donde se le mezcla con el bálsamo de azufre indicado arriba.

*UNGUENTO DEL Dr. SWEDIAUR.*

*Para las rasgades.*

De almendras amargas mondadas . . VIII onzas.

De miel . . . . . VI idem.

De alcanfor . . . . . IV dracmas.

De mostaza en polvo . . . . . I½ onza.

De alumbre calcinado . . . . . } a. II idem.

De olivano en polvo . . . . . }

Tres yemas de huevo.

Mezclése y formese una pasta.

Hácense con esta preparacion ligéras fricciones sobre los rasgades y se lava algunos momentos despues con el agua tibia, ó lo que es mejor pongase unos guantes ó bayetas encima.

Las inmersiones frecuentes en el agua caliente y las lociones en el aguardiente alcanforado y la tintura de benjui son medios equivalentes sino preferibles, lo que no excluye el uso de los guantes.

*UNGUENTO OHPITALMICO DE SMELLOME.*

De alcanfor disuelto por el alcohol . . . . . } a. VI dracmas.  
De oxido blanco de sinc . . . . . }

De oxido verde de cobre. . . . . II dracmas.

Después de haberlo triturado y mezclados agréguese en un mortero caliente sin dejar de agitarlo.

De manteca de puerco. . . . . VI onzas.

De clara de huevo. . . . . núm. VI.

F. S. A.

Se aplica un poco sobre el borde de los párpados en las optalmias crónicas.

#### OPIATA FEBRIFUGA DE Dr. COE

De diaprun (1) disuelto . . . . . I onza.

De jarave de flores de duraznos. . . . . } a. I onza.

De quina roja en polvo. . . . . } a. I onza.

De muriate de amoniaco . . . . . I escrúpulo.

Hágase una opiata que deberá dividirse en doce tomas, Se toma una en la mañana, otra á la tarde, y una hora despues se toma un caldo.

#### OPIATA CONTRA LA LEUCORREA DE TISSOT.

De conserva de rosas encarnadas. . . . . III onzas.

De conserva de romero. . . . . } a. I idem.

De quina. . . . . } a. I idem.

De macias. . . . . } a. II dracmas.

De cachunde. . . . . } a. II dracmas.

De esencia de canela. . . . . III gotas

Incorpórese c. s. q. de jarave de cortezas de naranjas.

Se dá esta opiata á la dosis de dos dracmas mañana y tarde.

#### OPIATA ESTOMATICA DE HERVECIO.

De limon confitado . . . . . I onza.

De nuez noscadas confitadas. . . . . III dracmas.

De clavos de comer confitados. . . . . I onza.

---

(1) Nombre que dán los franceses, á una especie de electuario en que entra la pulpa de las ciruelas.

- 101.
- De gengible confitado. . . . . II idem.
  - De opiata de salomón. . . . . IV dracmas.
  - De canela. . . . . III idem.
  - De cascarilla. . . . .  $\frac{1}{2}$  idem.
  - De aceite esencial de canela . . . . X gotas.
  - De clavos de comer. . . . . II escrúpulos.
  - De jarave de claveles q. s. . . . .

Este estomático es afrodisiáco. La dosis es desde un escrúpulo hasta una dracma.

**OPIATA FEBRIFUGA DE TISSOT.**

- De polvos de centuara . . . . . }
- De mirra . . . . . }
- De ajenjos. . . . . } a. I onza.
- De conserva de enebro. . . . . }

De jarave de ajenjos q. s. para hacer una opiata es-  
pesa.

La dosis es de dos dracmas.

**OPIATA DEL Dr. LARRET.**

- De bálsamo de copaiba. . . . . }
- De azucar. . . . . }
- De goma arábiga. . . . . } a. VI onzas.
- De laca carminante. . . . . }  $\frac{1}{2}$  idem.
- De agua de yerbabuena piperita q. s. . . . . I dracma.

Esta opiata termina las gonorreas rebeldes. Se toma mañana y tarde una ó dos dracmas envueltas en pedazo de hostia. Durante el uso de esta opiata es necesario comer poco, abstenerse de crudezas y moverse.

**OPIATA Ó PASTA DEL Dr. WARD.**

*Para las hemorroides.*

- De raíz de émula campánula. . . . . }
- De tomillo . . . . . }
- De pimienta negra . . . . . } a. III libras.
- De pimienta negra . . . . . } I idem.

Redúzcanse estas sustancias en polvo fino y pásense por  
\*

un tamiz de seda, incorpórense en una mezcla con dos libras de miel y otro tanto de azucar.

La dosis es el grueso de una nuez moscada que se toma tres veces por dia, tomando encima un vaso de tipsana apropiada.

#### OPIATA VERMIFUGA DE MALOET.

De sal de seignet en polvo. . . . .	} a. I dracma.
De jalapa en idem. . . . .	
De valeriana idem. . . . .	
De oximiél scilítico. . . . .	IV onzas.

Mezclése exactamente.

Se dá de media á una onza por dia á las personas atormentadas de gusanos y lo mismo para la tenia.

#### OSMAZÓME DE THENAR.

Se elije un músculo sin grasa, se pica muy bien y se derrama encima poco á poco, agua fria y se le amasa, se pasa esta agua al través de un lienzo fino y se hierve, se espuma al principio y despues se le filtra y se evapora hasta la consistencia de extracto.

La osmazóme dada á la dosis de una dracma excita por su sabor, los órganos digestivos y los dispone á absorber los principios digestivos. Sirve á excitar el apetito en los convalecientes sin sobre cargar sus estómagos.

Se prepara con esta sustancia un polvo nutritivo muy cómodo para los caminantes.

Del modo siguiente.

De osmazome seco. . . . .	} a. I onza
De jelatina desecada. . . . .	
De goma arábica . . . . .	II dracmas.
De clavos de comer. . . . .	} a. XII granos.
De pimienta contusa. . . . .	
De semillas de apio. . . . .	
De chirivia. . . . .	

Se hierven tres onzas de este polvo en una pinta de agua, se le agréga un poco de sal, se cuéla y se forma un caldo muy agradable y muy sano.

## OXIMIEL PECTORAL DE DANOIS.

De raíz de parietaria . . . . . I onza.

De iris de Florencia . . . . . IV dracmas.

Se parten estas raíces y se hacen hervir en 36 onzas de agua de fuente. Se cuele la decoccion y se le agréga.

De miel blanca . . . . . I libra.

De goma amoniaco . . . . . I onza.

Disuelta en s. q. de vinagre.

Se aplica nuevamente el todo al fuego y se hierve hasta la consistencia de jarave.

Esta preparacion se dá en el asma húmeda y la tos, á cucharadas de tiempo en tiempo.

## OXIMIEL PECTORAL DE EDIMBURGO.

De goma amoniaco . . . . . I onza.

De raíz de énula campánula . . . . . } a. IV dracmas.

De lirio de Florencia . . . . . }

De miel . . . . . VIII onzas

Despues de haber mondado, cortado y contundido las raíces del lirio y de la énula campánula, se le hierven en 20 onzas de agua hasta la reduccion de 7 onzas. Por otra parte se hace disolver la goma amoniaco en tres onzas de buen vinagre. Se mezcla esta disolucion al cocimiento de las raíces, despues se decanta, se cuele al través de un lienzo denso, se agréga por último la miel y se hierve hasta la consistencia conveniente.

Se prescribe este oximiel á la dosis de una á una y media onza por día en las afecciones catarrales.

## PASTILLAS DE MONSIEUR CHAUSIER.

*Para la tisis laringéa y angina inflamatoria.*

De alcanfor . . . . . XXI granos.

De opio . . . . . VI idem.

De azucar . . . . . III dracmas.

De mucilago q. s.

Se comparte esta dosis en pastillas 50 y se dán de cuatro á seis diariamente al enfermo. Cada una contiene medio grano de opio.

bras

se

psa-

onas

y se

pa-

es-

ta la

exci-

ab-

o en

muy

muy

muy

muy

muy

s.

ta de

a un

**PASTILLAS DE ÉNULA CAMPANULA.**

De polvos de énula campánula. . . . .	$\frac{1}{2}$ onza.
De lirio. . . . .	I dracma.
De azucar. . . . .	I libra.
De mucilago q. s.	

Se dán estas pastillas á la dosis de media onza por dia en el escorbuto, la hidropesia y la clorosis.

**PASTILLAS DEL MOGOL.**

De azucar. . . . .	III $\frac{1}{2}$ onzas.
De goma arábiga. . . . .	I idem.
De clavo de comer. . . . .	} a. II $\frac{1}{2}$ dracmas.
De macias . . . . .	
De nuez noscada. . . . .	} VII idem.
De extracto seco de opio. . . . .	
De almizcle . . . . .	V granos.
De agua de rosas q. s.	

Se hacen las pastillas ó píldoras de seis granos.

Estas pastillas se toman despues de las comidas á la dosis de una ó dos para facilitar la digestion y excitar las fuerzas.

**PASTILLAS VERMÍFUGAS DE BARTHEZ.**

De azucar. . . . .	I libra.
De mercurio dulce. . . . .	II dracmas.
De mucilago q. s.	

Háganse pastillas de la magnitud de una moneda de 20 sueldos.

Estas pastillas se dán á los niños, atacados de lombrices á la dosis de una ó dos por dia, los adultos pueden tomar de seis á ocho.

**PASTILLAS DE PELITRE DEL Dr. LACOMBE.**

De infusion alcoholica de pelitre. . . . .	I onza.
De azucar pulverizada. . . . .	X idem.

De mucilago de goma tragacanto q. s. para formar una masa mole y homogénea que se divide en 150 pastillas.

La dosis es de cuatro á nueve por día en la angina gutural, la laringea, el catarro pulmonal, la neumonia crónica, el asma, el coqueluc y la disposicion á la tisis, por último en todos los casos en que el defecto de espectoracion depende de la atonia de las membranas mucosas sin fiebre y sin lesion orgánica de los pulmones.

#### PASTILLAS DE GENG-SENG (Especie de panax).

De geng-seng en polvo. . . . .	V onzas.
De vainilla . . . . .	X idem.
De esencia de ambar. . . . .	X gotas.
De tintura de cantaridas . . . . .	V dracmas.
De aceite de canela. . . . .	X gotas.
De azucar. . . . .	X libras.
De mucilago q. s.	

Dividase en pastillas de veinte y cuatro á treinta granos.

Estas pastillas excitantes dicen que sirven para reanimar los órganos de la generacion. Se toman de cuatro á cinco con una hora de distancia.

#### PASTILLAS DE MERCURIO SACARINO

DEL Dr. LAGNEAU.

De mercurio revivificado de cinabrio	II onzas.
De goma arábica . . . . .	I idem.
De vainilla . . . . .	I dracma.
Obien de esencia de vergamota. . . . .	VIII gotas.
De azucar en polvo. . . . .	X onzas.

Háganse s. a. 566 pastillas que cada una contiene dos granos de mercurio.

#### PASTILLAS DEL Dr. DUBOIS.

Para las engurgitaciones de los cartilagos Tyroides.

De esponja quemada en polvo. . . . I onza.

- De carbonate de sosa. . . . . IV dracmas.  
 De polvo de canela. . . . . II idem.  
 De jugo de orosur. . . . . } II onzasy VI dracmas.  
 De mucilago de goma tragacanto q. s.  
 Háganse s. a. pastillas de diez granos para dar una cada tarde.

*PASTILLAS PECTORALES INCISIVAS*

*Y CALMANTES DEL Dr. A. JOBARD.*

- De hipecacuana . . . . . II dracmas.  
 De opio gomoso . . . . . I idem.  
 De escamas de scila secas . . . . . LXIV granos.  
 De oxide de antimonio sulfurado rojo. LXII idem.  
 De azucar blanca. . . . . III dracmas.  
 De mucilago de goma tragacanto q. s.  
 De esta cantidad deben hacerse como 400 pastillas; pero es necesario hacerlas mas pequeñas para los niños. Se toma una cada hora.

*PASTA PECTORAL DE PARMENTIER.*

- De arrope de ubas. . . . . XXVIII onzas.  
 De goma arábica. . . . . II libras.  
 De agua de azahar. . . . . III dracmas.  
 De agua comun q. s.

Despues de haber echado la goma arábica en el agua se le agrega el arrope de ubas, se evapora el todo hasta la consistencia de jarave espeso, se le aromatiza con el agua de azahar, y se pone este jarave en los moldes de hoja de lata que se colocan en una estufa para acabar la evaporacion y se le dá la consistencia de pasta.

*PASTA CONTRA LOS RASGADES.*

- De almendras amargas mondadas . . . VIII onzas.  
 De miel. . . . . VI dracmas.  
 De alcohol saturado de alcanfor . . .  $\frac{1}{2}$  onza.  
 De harina de mostaza negra . . . . IV dracmas.

De alumbre quemado. . . . . } a. II onzas.  
 De olivano en polvo. . . . . }  
 De yemas de huevo . . . . . num. 8.

M. S. A.

Se toma de mañana y tarde como el grueso de una nuez de esta composición, se frota la piel afecta mezclándole un poco de agua, en seguida se lava con agua tibia ó bien despues de frotarse las manos se ponen unos guantes durante un cuarto de hora.

Puede usarse mientras que los rasgades no están abiertos.

#### PÍLDORAS FEBRIFUGAS INGLESAS.

De tártaro stibiado. . . . . XVIII granos.  
 De sal de ajénjos . . . . . } a. I dracma.  
 De muriate de amoniaco. . . . . }  
 De quina . . . . . I onza.  
 De jarave de quina q. s. . . . .

Formese del todo doce bolos de los que se tomarán cuatro cada dia antes del absceso, á la mayor distancia posible del absceso próximo.

#### PÍLDORAS DE SCILA COMPUESTAS.

*Farmacopéa de Londres.*

De cebolla albarrana seca. . . . . I dracma.  
 De gengible. . . . . } a. III idem.  
 De jabon medicinal. . . . . }  
 De goma amoniaco. . . . . II idem.

Mezclense juntamente los polvos, incorporensese con el jabon agregando la s. q. de jarave para dar á la mezcla una consistencia pilular.

Se emplean con suceso estas pildoras en las afecciones catarrales crónicas de las vias aereas &c. á la dosis de doce, quince, diez y ocho ó veinte y cuatro granos por dia, segun la edad y estado del enfermo. Puede aumentarse la dosis.

#### PÍLDORAS TÓNICAS DE BACHER.

De extracto de eléboro negro . . . . . }  
 De mirra electa . . . . . } a. I onza.

De cardo bendito en polvo. . . . . Onza I dracma.

Se toman del eleboro negro de Suiza una onza cinco drácmas se le despedaza y pone en un matráz con 4 libras de alcohol débil y cinco y media onzas de agua que tenga en disolucion tres drácmas y media de potasa carbonada. Despues de 24 horas de infusion se caéla al través de un lienzo, se filtra la coladura y se conserva aparte, en seguida se toma el residuo que queda en el lienzo y se pone en el mismo matráz con vino del Rhin ó de grave hasta que se sobrenaden como dos traveses de dedo, se deja en infusion por 48 horas, despues de este tiempo se pasa el licor, se exprime el residuo, se reunen los licores y se evaporan hasta la consistencia de pildoras. Con este extracto, agregando el cardo bendito y la mirra reducidos en polvo muy fino, es con lo que Bacher componia sus pildoras.

*Nota.* Es importante emplear el eleboro negro que crece en Suiza ó todavia mejor el *eleborus hyemadis*.

#### PÍLDORAS UTERINAS DE STAHL.

Contra el catarro de esta entraña.

De extracto de cardo bendito. . . . .	}	a. I dracma.
De idem de fumaria. . . . .		
De goma amoniaco disuelta en vinagre scilitico. . . . .	}	a. I escrúpulo
De la mejor mirra . . . . .		
De aloes sucotríno. . . . .	}	I escrúpulo ó $\frac{1}{2}$ dracma.
De goma de yedra. . . . .		
De azafrán pulverizado . . . . .		XV granos.

Mezclese y con la cantidad suficiente de jarave comun háganse pildoras de á grano.

Su dosis quince pildoras al dia.

Los buenos efectos que Stahl ha conseguido en muchos casos con estas pildoras, las han hecho recomendar por los autores en varias disertaciones publicadas en Alemania.

#### PÍLDORAS STOMAQUICAS DE CADET.

De aloes. . . . .	}	a. VIII granos.
De sal esencial de quina. . . . .		
De resina de guayaco. . . . .		

- De jabon medicinal . . . . . XXIV granos.  
 De goma amoniaco . . . . . VI idem.  
 De eptiope marcial . . . . . IV idem.

Para doce pildoras que toman dos al sentarse á la mesa.

### PÍLDORAS TÓNICAS DE STOLL.

- De limaduras de fierro . . . . . }  
 De extracto de centaura menor . . . . . } a. II dragmas.  
 De goma amoniaco . . . . . }

### PÍLDORAS ANTI-DISENTERICAS DEL Dr. WILLIS.

- De cera amarilla . . . . . IV idem.  
 De esperma de ballena . . . . . }  
 De cachunde . . . . . } a. I idem.  
 De aceite esencial de canela . . . . . XII gotas.

Háganse pildoras de seis granos.

Se emplea este medicamento en las disenterias crónicas pasivas. Se toman tres pildoras cada dia.

### PÍLDORAS ABSTRIGENTES DE CAPURON.

- De cachunde . . . . . XII granos.  
 De alumbre . . . . . VI idem.  
 De opio . . . . . II idem.

Mezclése y háganse pildoras de cinco granos.

Se toman una ó dos cada dia en las gonorreas que están á su fin.

### PÍLDORAS DE ALUMBRE DE HERVECIO.

- De alumbre de roca . . . . . II onzas.  
 De sangre de drago en polvo . . . . . I idem.

Se liquida el alumbre en una cuchara de fierro, y se agrega la sangre de drago y se forma una pasta que se divide en pildoras de á tres granos, mientras que la masa se conserva caliente.

Estas pildoras son abstringentes se dán de seis, doce y hasta 36 granos en las grandes deperdiciones, hemorragicas

\*

III.

Se dán tres por la mañana á los enfermos afectados de obstrucciones y tres una hora antes de comer.

*PÍLDORAS DE ACONITO MERCURIZADAS*

*DEL Dr. DOUBLE.*

De extrato de acónito napelo . . . I escrúpulo.

De sublimado corrosivo . . . . . II granos.

Tritúrese largo tiempo en un mortero de barro para conseguir una mezcla muy exacta y dividase en 20 píldoras iguales.

Convienen estas píldoras contra los herpes inveterados complicados con afecciones psórica y venerea contra las enfermedades venereas antiguas los engargitamientos linfáticos, las escrofulas &c.

Se dán á la dosis de una píldora por mañana y tarde. Cada diez dias se aumenta una píldora.

*PÍLDORAS DEL Dr. MERAT.*

*Contra la danza de S. Vito.*

De nitrate de plata fundido . . . . VI granos.

De extracto de opio gomoso . . . . I dracma.

De almizcle en polvo . . . . . II escrúpulos.

De alcanfor . . . . . IV idem.

F. S. L. ochenta y seis píldoras.

Cada píldora contiene

$\frac{1}{16}$  granos de nitrate de plata.

$\frac{3}{4}$  grano de opio.

$\frac{1}{2}$  grano de almizcle.

I grano de alcanfor.

Se dán dos diarias al principio de la curacion una por la mañana y otra á la tarde, mas adelante se pueden dar tres y cuatro. Se bebe al mismo tiempo una tipsana anti-espasmódica cualquiera.

Se podrian emplear estas píldoras contra ciertas epilepsias.

pasivas y flujo hemorroydal inmoderado, en el esputo y vómito de sangre pasivos.

*PÍLDORAS ANTI-HISTERICAS DE BUCHAN.*

De aloes sucotríno . . . . . }  
De ruibarbo . . . . . } a, I dracma.  
De jabon medicinal . . . . . }

De jarave comun q. s.

Háganse píldoras de cinco á seis granos.

Se dán de cinco á seis, dos ó tres veces al dia en la ictericia despues del período del espasmo.

*PÍLDORAS DE GREDIN.*

*Contra la ictericia.*

De extracto de belladama . . . . . XXIV granos.

De polvos de hojas de la misma planta. XV idem.

Háganse píldoras de medio grano.

Se dán dos todos los dias una por la mañana y otra por la tarde. Los enfermos experimentarán un calor considerable en todo el cuerpo, una frecuencia en el pecho, una especie de embriaguez y sudores. Estos síntomas se acompañan con cámaras verdosas y abundancia de orinas, la curacion se completa con el ruibarbo y el sulfate de magnesia.

*Extracto de Quarin.*

*PÍLDORAS FUNDENTES DE LEMONNIER.*

*Médico del Rey.*

De azafrán de marte aperitivo . . . II escrúpulos.

De mirra electa . . . . . }  
De goma amoniaco . . . . . } a, I idem.  
De gálvano . . . . . }

De aloes sucotríno . . . . . }

De muriate de mercurio dulce . . . } a, XII granos.  
De azufre dorado de antimonio . . . }

Incorpórese todo c. s. q. de jarave de cinco raices aperitivas y háganse píldoras de tres granos cada una.

**PÍLDORAS ORIENTALES.**

- De opio purificado. . . . .
  - De azafrán. . . . .
  - De canela. . . . .
  - De nuez noscada. . . . .
  - De cardomomo. . . . .
- } a. partes iguales.

De jarave de azahar q. s.

Se hacen píldoras de tres granos.

Se emplea esta preparacion para procurar un sueño acompañado de desvarios estáticos.

Se dán dos ó tres de ellas por la tarde una hora antes de acostarse.

**PÍLDORAS MARCIALES DE SIDENHAM.**

De limaduras de hierro porfirizadas. II onzas.

De extracto reciente de agenjos q. s.

Se forma una masa de píldoras á la que á veces conviene agregarle, segun la prescripcion del médico, una dracma de canela en polvo, y á veces media idem de aloes.

Estas píldoras son tónicas fortificantes, se toman á la dosis de un escrúpulo dos veces al día en la hipocondría, histérico, caquexias, &c.

**PÍLDORAS ANTI-ESPASMÓDICAS DE PIDERIT.**

- De asa fétida. . . . .
  - De castor. . . . .
  - De ácido succino concreto. . . . . XXXVI granos.
  - De aceite animal de Dippel. . . . . XX gotas.
  - De tintura de mirra q. s.
- } a. I dracma.

Se forma s. a. una masa que se divide en píldoras de cinco granos.

Se agrega algunas veces, segun la prescripcion del médico, una cierta cantidad de extracto de opio.

La dosis es de doce á treinta y seis granos.

*PILDORAS DE LOS TRES DIABLOS DE MAETZIUS.*

De trosiscos de alhandal . . . . . } a. IV granos.  
 De escamonea de alep. . . . . }  
 De muriate de mercurio dulce . . . VIII granos.  
 De jarave comun q. s.

Háganse s. a. cuatro pildoras que segun el autor es la dosis mas alta que puede tomar el mas robusto.

Maetzius prescribe estas pildoras en la gonorrea para relajar el vientre, disminuir la inflamacion del canal de la uretra y favorecer la crisis; no pueden emplearse estos medios derivativos sino con la mayor precaucion.

Las mas veces son inútiles.

*PILDORAS ANTI-CATARRALES DEL Dr. PARISET.*

De tartrite antiimoniado de potasa. } a. III granos.  
 De opio gomoso . . . . . }  
 De goma arquiira . . . . . X granos.

Agréguese la suficiente cantidad de conserva de rosas para hacer sesenta pildoras, de las que se tomarán dos por la mañana y dos á la tarde.

Esta preparacion produce preciosos efectos, con especialidad en los catarros envejecidos que por exceso de irritacion se resiste al tiempo y á los remedios.

*PILDORAS ANTI-CATARRALES Y CALMANTES*

*DEL Dr. PETIT.*

De manteca de cacao . . . . . } a. II escrúpulos.  
 De goma arábiga . . . . . }  
 De extracto gomoso de opio . . . XII granos.  
 De jarave de hipecacuana q. s.

Háganse pildoras de cinco granos que se impregnarán de polvo de raiz de malvavisco.

Se dá una todas las tardes al tiempo de acostarse.

*PÍLDORAS ANTI-SIFILÍTICAS DE ALIBERT.*

- |                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| De muriate de mercurio dulce. . . . . | } a. II onzas. |
| De resina de guayaco. . . . .         |                |
| De malvavisco en polvo . . . . .      | } IV idem,     |
| De jarave de membrillos q. s.         |                |

Háganse píldoras de cuatro granos.

La dosis es de cinco á seis píldoras por dias.

*PÍLDORAS LAXANTES Y FUNDENTES*

DEL Dr. SANCHEZ.

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| De sublimado corrosivo' . . . . .        | } a. VIII granos.             |
| De turbit mineral. . . . .               |                               |
| De mercurio sublimado dos veces. . . . . | } X idem.                     |
| De alcanfor . . . . .                    |                               |
| De almizcle . . . . .                    | } a. $\frac{1}{2}$ escrúpulo. |
| De raiz de gengibre . . . . .            |                               |
| De azúcar. . . . .                       | } a. II dracmas.              |
|  |                               |

Tritúrese exactamente en un mortero de vidrio, y agré-

guese:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| De extracto de jalapa. . . . .                 | } a. II idem.             |
| Catártico de la farmacopéa de Londres. . . . . |                           |
| De píldoras de Rufo. . . . .                   | } a. I idem.              |
| De gálvano. . . . .                            |                           |
| De extracto de orosul. . . . .                 | } a. $1\frac{1}{2}$ idem. |
| De asa fétida. . . . .                         |                           |
| De sal de duobus . . . . .                     | } $\frac{1}{2}$ idem.     |
| De bálsamo del Perú. . . . .                   |                           |
| De elixir de propiedad no ácido q. s.          |                           |

Hágase una masa de píldoras, la que se dividirá en píldoras de cuatro granos.

Se tomarán á la dosis de cuatro, seis, ocho, diez, doce, quince cada dia aumentandolas graduadamente.

Cada píldora contiene  $\frac{1}{11}$  de sal mercurial.

**PÍLDORAS MERCURIALES DE MOSCATI.**

De mercurio soluble de moscati. (1). II escrúpulos.  
 De extracto reciente de quina. . . II dracmas.  
 Gomoso de opio . . . . . XII granos.

Háganse veinte píldoras, de las que se tomará una por la mañana y otra á la tarde.

Si el enfermo goza de una buena constitucion, y no ha experimentado tialismo durante la administración de las otras preparaciones mercuriales, prescribe el Dr. Moscati cuatro escrúpulos de oxide de mercurio, un escrúpulo de opio y media onza de extracto de quina, y divide la masa en veinte bolos que se toman del mismo modo mañana y tarde. Si el sugeto, por el contrario es debil y ha sufrido el tialismo, M. Moscati restringe la prescripcion á un solo escrúpulo de oxide de mercurio, doce granos de opio, con media onza del extracto de la quina.

Otro medicamento que M. el Dr. Franhc ha visto contribuir de un modo notable á los buenos efectos del oxide de Moscati es la decoccion de la corteza del mesereon; él aconseja que tambien se le prescriba de este modo.

De corteza de raiz de mesereon. . II granos.

Hiervásele en una piata de agua y cuélese. Agréguese á la coladura tres onzas del jarave de altea.

Se toma esta decoccion en las veinte y cuatro horas. Si produjese calor en el paladar ó estómago, se reducirá la dosis de mesereon á una sola dracma para la misma cantidad de agua, o bien se le agrega un poco de leche de goma arábiga, de raiz de orosul, del malvavisco ó zarparrilla, segun lo exigiese el caso.

**PÍLDORAS PURGANTES FUNDENTES**

DEL Dr. SAIFFERT.

De extracto de genciana. . . . . IV dracmas.

(1) Se puede emplear el mercurio de Hahenmaun ó el de Moscati. (Véanse estos nombres en la tabla.)

De hiel de bucy. . . . . III dracmas.  
De escamonea . . . . . idem.

Mezclése y dividase en ciento sesenta y dos píldoras.  
Se dan de cuatro á seis en ayunas ó antes de comer  
todos los dias.

**PÍLDORAS UTERINAS DE KEMPE.**

De gálvano purificado. . . . . }  
De muriate de amoniaco . . . . . } a. I onza.  
De asa fétida . . . . . }  
De sulfáto de potasa. . . . . } a. IV dracmas.  
— De hierro. . . . . }  
De vinagre scilítico . . . . . XXIV onzas.

Pongáse todo al fuego y agítese hasta que espesada  
la mezcla adquiera la consistencia de extracto.

Agréguense á la masa resfriada cuarenta y ocho go-  
tas de aceite de succino, mézclése y dividase en píldoras de  
á cuatro granos.

Se dán á la dosis de doce, veinte, treinta y treinta  
y seis granos al dia en la caquexia y en la clorosis.

**PÍLDORAS SUDORIFICAS CALMANTES**

**DEL Dr. DUMERIL.**

De extracto de beleño . . . . . II dracmas.  
Gomoso de opio. . . . . XII granos.  
De oxido de antimonio sulfurado na-  
ranjado . . . . . } a. XXIII granos.  
De hidro sulfuro rojo . . . . . }

Háganse s. a. setenta y dos píldoras iguales.

La dosis es de dos á cuatro, mitad en la mañana  
y mitad á la tarde, segun la edad y el estado del enfermo:  
estas píldoras son anti-espasmodicas, y convienen en las toses  
nerviosas tenaces; promueven el sudor.

**PÍLDORAS DE BOULLAT.**

*Contra la gonorrea.*

De jabon medicinal. . . . . I onza.

De nitro. . . . . } a. IV dracmas.

De alcanfor. . . . . } a. IV dracmas.

De extracto acuoso de opio . . . . I idem.

De jarave de niafa q. s. . . . .

Para hacer s. a. pildoras de cuatro granos cada una.

Se dán de dos á seis granos por ella.

#### PÍLDORAS FUNDENTES DE H. SMITH.

De goma amoniaco. . . . . } a. I½ dracma.

De jabon medicinal. . . . . } a. I½ dracma.

De raiz de scila. . . . . } a. ¼ idem.

De polvo de diaromatón. . . . . } a. ¼ idem.

De aceite volátil de gengibre. . . . XX gotas.

De jarave de cortezas de naranja q. s.

Háganse pildoras de cinco granos.

Cada tres dias se toman cuatro de estas pildoras y encima se beben cuatro onzas de una decoccion de rubia.

Convienen en la ictericia y afecciones hepáticas.

#### PÍLDORAS FUNDENTES DE RICHTER.

De goma amoniaco. . . . . } a. II dracmas.

De asa fetida. . . . . } a. II dracmas.

De jabon medicinal. . . . . } a. II idem.

De raiz de Valeriana. . . . . } a. II idem.

De flores de arnica montánica. . . . }

De tartrite de potasa antimonial disuelto en agua. . . . . De VIII á X granos.

Se dán estas pildoras en los mismos casos que las precedentes, cada tres ó cuatro dias.

#### PÍLDORAS INCISIVAS DEL Dr. J. J. DE ROUX.

De scila en polvo. . . . . I dracma.

De extracto gomoso de opio. . . . VI granos.

De kermes mineral. . . . . VIII idem.

De manteca de cacao q. s. para hacer treinta y seis pildoras.

Convienen estas pildoras en las afecciones catarrales, en las que se dán tres ó cuatro diarias.

\*

## PÍLDORAS DE LA DIGITAL DE WITHRING.

De hojas secas de la digital purpúrea. }  
De asa fétida. . . . . } a. I dracma.

Se dán una ó dos de estas píldoras todas las mañanas en las afecciones hipocondriacas.

## PÍLDORAS PURGANTES DE HAEN.

De extracto católico. (1). . . . . I onza.  
De jalapa . . . . . }  
De escamonea. . . . . } a. IV idem.  
De alcohol para ablandar las sustancias q. s.

Se hacen píldoras de cuatro granos.

Este violento drástico no se dá mas que á la dosis de diez á veinte granos en la hidropesía y en las enfermedades asténicas.

## PÍLDORAS DE PLUMIER.

De muriate dulce de mercurio. . . . }  
De azufre dorado de antimonio. . . . } a. III dracmas.  
De jugo depurado de orosul. . . . }  
De mucilago de goma arábica q. s. }  
Formense píldoras de seis granos.

Se toman estas píldoras á la dosis de dos ó tres mañana y tarde en las enfermedades de la piel ó en las enfermedades sífilíticas. Se bebe sobre cada dosis un vaso de decoccion de los leños sudoríficos ó de zarzaparrilla.

(1) El extracto católico se hace con

Extracto de aloes . . . . . I onza.  
—De eléboro negro . . . . . II dracmas.  
—De coliquintidas. . . . . I idem.  
De resina de jalapa. . . . . }  
De escamonea. . . . . } De cada cosa I½  
dracma.

Algunas veces se emplea para purgar á la dosis de diez á diez y ocho granos, pero este drástico violento no conviene mas que á los temperamentos flemáticos.

## PILDORAS ESCOCESAS.

Hay muchas fórmulas que llevan el nombre de píldoras escocesas en los recetarios ingleses. La receta del Dr. Anderión es la siguiente.

De goma guta. . . . .	} a. II dracmas.
De aloes sucotrino. . . . .	
De aceite volatil de anís. . . . .	
De jarave simple q. s.	XXX gotas.

Se hacen píldoras de cuatro granos. Ellas purgan á la dosis de tres á cuatro. Cuando solo se quiere tener el vientre libre se toma una sola al acostarse. Los ingleses llaman tambien á estas píldoras *Scotch pills*.

## OTRA RECETA.

De goma guta. . . . .	} a. I dracma.
De aloes sucotrino. . . . .	
De polvo de canela compuestos. . . . .	
De jabon medicinal. . . . .	II idem.

## OTRA RECETA.

De tártaro emético. . . . .	De $\frac{1}{2}$ á I grano.
De aloes sucotrino. . . . .	XVI idem.
De mucilago de goma tragacanto s. q.	

Háganse del todo cuatro píldoras que se envolverán en polvos de iris.

Estas píldoras se hacen muchas veces vomitivas y fatigan á los enfermos. Debe darse solamente el nombre de píldoras escocesas á las dos primeras fórmulas que tienen mucha analogía.

Ellas son purgantes, se dán á la dosis de una ó dos,

## PILDORAS EMÉTICAS DE BOHERHAVE.

De emético. . . . .	IV granos.
De miga de pan q. s.	

Háganse cuatro píldoras.

Se toman en las fiebres intermitentes. La dosis es de una á dos antes de los paroxismos.

## PÍLDORAS RELAJANTES DE BUCHAN.

- De jabon blanco. . . . . I  $\frac{1}{2}$  dracma.  
 De sagapeno . . . . . I eserúpulo.  
 De extracto de diente de leon. . . . . II idem.  
 De aloes sucotrino . . . . . I idem.

Mezclése y háganse píldoras de tres granos cada una.  
 La dosis de estas píldoras que se dán en la constipacion es de tres á nueve que se toman en dos veces mañana y tarde.

## PÍLDORAS HIDRAGOGAS DE JANIN DE LEON.

- De sen. . . . . I libra.  
 De ácido tartaroso. . . . . II onzas y I  $\frac{1}{2}$  dracma  
 De agárico. . . . . }  
 De mechoacán. . . . . } a. VI onzas y II  
 De ruibarbo. . . . . } dracmas.  
 De escamonea. . . . . }  
 De raiz de brionia . . . . . }  
 De hermodactilo. . . . . }  
 De turbith gomoso. . . . . }  
 De goma guta. . . . . }  
 De troiscos de alhaldal . . . . . } a. II onzas.  
 De muriate de mercurio dulce. . . . . }  
 De tartriqe de potasa antimoniado. . . . . }  
 De carbonate de fierro. . . . . } a. VIII y  $\frac{1}{2}$  idem.  
 De nitrate de potasa. . . . . }  
 De jalapa. . . . . } a. I libra.  
 De aloes sucotrino. . . . . }  
 De sulfureto negro de mercurio. . . . . V onzas.  
 De agua comun. . . . . VI libras.

Hiervanse el sen y el ácido tartaroso por un cuarto de hora en seis libras de agua, cuélese en seguida con fuerte expresion, póngase el licor en una olla de fierro que se aplicara al fuego, agréguense poco á poco las otras sustancias que deberán haberse portirizado y mezclado exactamente, agítese esta mezcla sin interrupcion, y dejesele á un dulce fuego hasta que haya adquirido una consistencia pilular, quítese del fuego la olla y divídase la masa en píldoras de cuatro granos. Envuelvase en el polvo de jalapa y dejense desecar.

Son muy purgantes: la dosis es relativa á la edad y temperamento del enfermo.

**PILDORAS SCILÍTICAS.**

*De la farmacopéa de Edimburgo.*

- De jabon medicinal . . . . . I dracma.
- De scila pulverizada . . . . . } a.  $\frac{1}{2}$  dracma.
- De nitrato de potasa . . . . . }
- De bálsamo de copaiba q. s.

Formese una masa que se divide en píldoras de á cuatro granos.

Se dán en la hidropesía, y retenciones de orina.

La dosis es de tres á cuatro en ayunas.

**PILDORAS INCISIVAS DE CADET.**

II

- De hiepecacuana . . . . . II dracmas.
- De scila en polvo . . . . . IV idem.
- De extracto gomoso de opio . . . . . XV granos.
- De manteca de cacao . . . . . I onza.
- De jarave de goma q. s.

Conviene estas píldoras en las reumas y en los ca- tarros. Se dán dos de mañana y tarde.

**PILDORAS ANTI-ARTRITICAS DE VICG-DE ASIR.**

- De raiz de guayaco . . . . . } a. I dracma.
- De muriate dulce de mercurio . . . . . }
- De jabon medicinal . . . . . IV idem.
- De extracto de hiel de buey desecado . . . . . II idem.
- De guayaco en polvo q. s.

Háganse píldoras de cuatro granos.

La dosis es de dos á cuatro, mitad en la mañana y mitad á la tarde.

**PILDORAS FUNDENTES DEL MISMO.**

- De extracto de hiel de buey desecado . . . . . } a. III idem.
- De centuara menor . . . . . }

na.  
si-  
na-  
a  
re  
ho  
ma  
em.  
em.  
tipe  
esco  
pi  
arto  
aer-  
se  
cias  
agi-  
fue-  
tese  
airo  
r.

De corteza de Winter . . . . . } a. I dracma.  
 De eptiope marcial. . . . . }  
 Háganse pildoras de á cuatro granos.  
 Se prescriben en las obstrucciones. La dosis es de cuatro á seis diarias.

**PILDORAS STENICAS DE BROW.**

De kermes mineral, . . . . . XV granos.  
 De opio puro . . . . . } a. X idem.  
 De muriate dulce de mercurio . . . . . }  
 De bálsamo del Perú q. s.  
 Para hacer pildoras de un grano de las que se toman una ó dos por la mañana é igual cantidad á la tarde.  
 El Dr. Brow aconseja estas pildoras en la tisis pulmonal, la hidropesía y el asma.

**PILDORAS INCISIVAS PECTORALES DE BUCHAN.**

De cebolla albarrana seca, . . . . . }  
 De goma amoniaco, . . . . . } a. II dracmas.  
 De granos de cardomomo, . . . . . }  
 De jarave comun q. s. para pildoras de cuatro granos.  
 Se dán tres ó cuatro de estas pildoras, dos ó tres veces al dia en la tisis incipiente.

**PILDORAS DE KEYSER**

De acetate de mercurio. . . . . II onzas.  
 De azucar, . . . . . VI idem.  
 De goma arábiga . . . . . I idem.  
 De malvavisco en polvo . . . . . } a. IV dracmas.  
 De almidon . . . . . }  
 De mucilago de goma arábiga q. s.  
 Háganse pildoras de un grano que se envolverán en azucar.  
 La dosis es de dos á cuatro diarias, en las enfermedades sílíticas.

**PILDORAS MERCURIALES DE RENOUE.**

De mercurio destilado . . . . . V dracmas.

De aloes sucotrino. . . . .	V dracmas.
De ruibarbo. . . . .	III idem.
De escamonea . . . . .	II idem.
De agárico blanco . . . . .	I idem.
De sasafrás. . . . .	} a. I escrúpulo.
De canela. . . . .	
De macias . . . . .	
De miel de narbona q. s.	

Convienen estas píldoras en las enfermedades de la piel, son un poco purgantes. La dosis es desde doce hasta cuarenta y ocho granos.

#### PÍLDORAS MERCURIALES DE BRUGNATELLI.

De mercurio purificado. . . . .	} a. I onza.
De conserva de rosas. . . . .	
De almidon. . . . .	II idem.

Apáguese el mercurio en la conserva, agréguese si hay necesidad un poco de mucilago, únase á él el almidon y dividase la masa en cuatrocientas ochenta píldoras iguales.

Cada cuatro granos contienen uno de mercurio.

Se dán en las enfermedades sifilíticas.

#### PÍLDORAS MERCURIALES DE PLENK.

De mercurio destilado. . . . .	I dracma.
De mucilago de goma arábica. . . . .	VI idem.

Apáguese exactamente el mercurio y en seguida agréguese.

De extracto de cicuta. . . . .	I idem.
--------------------------------	---------

Háganse píldoras de dos granos.

Se dán cuatro á seis de estas píldoras al dia, en las enfermedades venereas.

#### PÍLDORAS MERCURIALES DEL Dr. SEDILLOT AINE.

De pomada mercurial. . . . .	III onzas.
------------------------------	------------

De jabon medicinal. . . . .	II idem.
-----------------------------	----------

De almidon ó polvo de regalis. . . . .	I idem.
--	---------

Mezclése y háganse píldoras de cuatro ó seis granos.

Se toman dos ó tres cada dia en las enfermedades venereas graves.

**PÍLDORAS MERCURIALES DE CADET.**

De mercurio fluido y purificado. . . II onzas.  
 De trementina . . . . . }  
 De flores de azufre. . . . . } a. II dracmas.  
 De goma guta . . . . . }  
 De maná en lágrimas . . . . . I onza.  
 De jalapa en polvo. . . . . IV idem.  
 De jarave de espinoserval s. q.

Háganse píldoras de á cuatro granos.

Se dán estas píldoras á la dosis de tres á seis cada dia, en las afecciones venereas ó herpéticas.

**PÍLDORAS DE QUARIN CONTRA EL ASMA.**

De esponja marina calcinada . . . . IV dracmas.  
 De extracto de fumaria. . . . . }  
 De goma amoniaco . . . . . } a. II idem.  
 De flores de azufre. . . . . }  
 De sulfure de antimonio. . . . . I idem.

Háganse píldoras de tres granos.

Se toman seis y por grados hasta diez ó doce tres veces al dia.

Conviene especialmente en el asma causada por las escrófulas ó en el asma húmeda.

**PÍLDORAS ANTI-EPILEPTICAS INGLESAS.**

De nitrate de plata. . . . . I grano.  
 De miga de pan. . . . . I dracma.

Mezclése exactamente y divídase en veinte píldoras de modo, que cada una no contenga mas que la vigésima parte de grano.

Se dá una solamente.

**PÍLDORAS DE QUARIN CONTRA LA EPILEPSIA.**

De raiz de valeriana silvestre . . . VI dracmas.

De gálvano. . . . . } a. I½ dracma.  
 De sagapeno. . . . . }  
 De asa fétida. . . . . I idem.

Háganse píldoras de tres granos.

Se dán de dos á cuatro á las mugeres hístéricas que padecen abscesos de epilepsia.

#### PÍLDORAS BLANCAS DE BARTHEZ.

De jalapa . . . . . ½ onza.  
 De azafrán de marte . . . . . II dracmas.  
 De muriate de mercurio dulce. . . . ½ idem.  
 De cochinillas. . . . . II escrúpulos.

De jarave de cinco raices q. s.

Háganse píldoras de á cuatro granos.

Se dán dos de estas píldoras al dia en las enfermedades escrofulosas.

#### PÍLDORAS CARMINANTES DEL MISMO.

De asa fétida. . . . . II dracmas.  
 De aloes sucotriño . . . . . }  
 De sal de marte. . . . . } a. I idem.  
 De gengibre en polvo . . . . . }

De elixir de propiedad q. s.

Háganse píldoras de á cuatro granos.

Se dán cuatro ó cinco todas las tardes al tiempo de acostarse el enfermo.

#### PÍLDORAS ANTHELMINTICAS DE SCHMUCHER.

De semillas de cevadilla. . . . . } a. IV dracmas.  
 De miel. . . . . }  
 De aceite volatil de hinojo. . . . . IX gotas.

Háganse píldoras de cinco granos.

La dosis es para los adultos de seis de mañana y tarde, para los niños una ó dos.

#### PÍLDORAS ANTI-CAQUECTICAS DE HAEN.

De jabon medicinal. . . . . IV dracmas.

\*

- De goma amoniaco . . . . . III dracmas.  
 De la masa de píldoras de rufo. . .  $\frac{1}{2}$  idem.  
 De tintura de mirra q. s.  
 Se hacen píldoras de tres granos.  
 Se dán cuatro cada tres dias en la palidez del rostro y supresion de los menstros.

*PÍLDORAS STOMAQUICAS DE SMITH.*

- De resina de aloes sucotrino. . . . .  
 De sagapeno. . . . . } a. I dracma.  
 De ruibarbo en polvo. . . . . }  
 De polvos de diaromatón. . . . . }  
 De aceite esencial de yerbabuena . . . . . } a. X gotas.  
 De clavo de comer. . . . . }  
 De bálsamo líquido del Perú q. s.  
 Háganse píldoras de á cuatro granos.  
 Se dán tres ó seis de estas píldoras todas las tardes en la dispepcia é indigestiones.

*PÍLDORAS TÓNICAS DEL Dr. HULN*

*Ó PÍLDORAS DE MOSCOU.*

- De extracto de raíz de columbo. . . . .  
 De raíz de genciana. . . . . } a. II dracmas.  
 De leño de quasía. . . . . }  
 De hiel de buey. . . . . }  
 De polvo de genciana q. s.  
 Dividanse en píldoras de á cuatro granos.  
 Se dá este remedio á la dosis de una ó dos píldoras inmediatamente despues de comer. Se bebe encima una taza de infusion de quasía fria.  
 Conviene en las debilidades de estómago y digestiones trabajosas.

*PÍLDORAS CUPREAS DE SWEDIAUR.*

- De sulfato de cobre amoniacal . . XVI granos.  
 De miga de pan . . . . . IV escrúpulos.  
 De carbonato de amoniaco líquido q. s.

Se divide la masa en 86 pildoras. Cada pildora debe contener una sexta parte de grano de sal de cobre. Y Se dán dos ó tres diariamente en la epilepsia y en las enfermedades rebeldes.

**PILDORAS DEL Dr. SANTA MARIA PARA TERMINAR**

**LA GONORREA.**

De conserva de rosas encarnadas. . . IV onzas.  
 De sangre de drago. . . . . IV dracmas.  
 De muriate de mercurio dulce. . . I idem.  
 De bálsamo de copaiba. . . . . I onza.

M.  
 Se dá media dracma dos veces al dia, se puede aumentar hasta dos escrupúlos en las personas robustas. El uso del agua acerada ó cortada con un cuarto ó una mitad de buen vino, en las principales comidas favorece perfectamente los efectos de este remedio.

**PILDORAS DE QUARIN.**

*Para terminar las gonorreas.*

De goma arábica . . . . . IV dracmas.  
 De almásiga en lágrimas . . . . . II idem.  
 De extracto de tormentila. . . . . I idem.  
 De trementina cocida q. s.

Háganse pildoras de á cuatro granos.  
 Se toman de cinco á seis por la mañana, é igual número á la tarde.

**PILDORAS ANTI-HISTÉRICAS DEL Dr. SELLE.**

De gálbano. . . . .	} a. IV dracmas.
De asa fétida. . . . .	
De extracto de angélica. . . . .	
De castor. . . . .	} a. I idem.
De azafrán . . . . .	
De opio. . . . .	$\frac{1}{2}$ idem.

C. s. q. de esencia de castor; háganse píldoras de á dos granos.

Se pueden dar desde cinco hasta ocho antes y despues de comer en los espasmos histéricos.

#### PÍLDORAS BÁLSAMICAS DE BOHERHAVE.

De mirra. . . . . II dracmas.

De esperma de ballena. . . . . IV idem.

Mezclése exactamente y agréguese.

De trementina de chiò. . . . . IV idem.

De polvo de oliváno q. s. para hacer píldoras de tres granos.

Se toma una cada tres horas en la tisis pulmonal.

#### PÍLDORAS TARTÁREAS DE SCHRODER.

De extracto seco de aloes preparado }  
con el ácido tartaroso . . . . . } IV onzas.

De goma amoniaco en lágrimas . . . . . I½ idem.

De sulfato de fierro. . . . . } a. IV dracmas.

De extracto de azafrán. . . . . }  
De acetate de potasa. . . . . } I onza.

De extracto de genciana. . . . . VI dracmas.

De tintura de fierro tartarizada. q. s.

Háganse píldoras de á seis granos.

Se prescribea estas píldoras en las fiebres intermitentes, la ictirecia, la clorosis y las obstrucciones.

La dosis es de cuatro á ocho. Purgan ligeramente.

#### PÍLDORAS DEL Dr. DUPUY CONTRA EL HIDROTORAX.

De polvos de digital purpúrea. . . . . }  
De asa fétida. . . . . } a. I dracma.

De extracto de trebol de agua. . . . . }  
De polvo de cebolla albarrana. . . . . } a. I½ idem.

Mezclése exactamente y háganse ciento ocho píldoras.

El enfermo tomará cuatro á la mañana y cuatro á la tarde.

Se auxilia el efecto de estas píldoras, con una bebida de parietaria nitrada, y á veces se le hace mas activa agrégandole tres veces al dia media onza de oximiél scilítico.

**PÍLDORAS ANTI-ICTERICAS DEL Dr. GOEROLT.**

De calomelanos. . . . . I dracma.  
 De extracto de saponaria. . . . . II idem.  
 Mézclense, y háganse setenta y dos píldoras, de las  
 que tomara el enfermo una ó dos diariamente.

**POMADA ANTI-OPHTÁLMICA DE M. DESAULT.**

De oxide rojo de mercurio. . . . . }  
 De oxide semividrioso de plomo. . . . . } a. I dracma.  
 De tucia preparada. . . . . }  
 De alumbre calcinado. . . . . }  
 De muriate sobre oxigenado de mer- } XIII $\frac{1}{2}$  granos.  
 curio. . . . . }  
 Mézclése todo sobre el porfido, incorpórese con la s. q.  
 de unguento rosado, ó con cerato no lavado. Se puede colo-  
 rar la pomada con  
 Cinabrio. . . . . I onza.

*Nota.* Para aplicar convenientemente esta pomada en las enfermedades de los ojos y los herpes, es necesario leer lo que M. Alibert dice á cerca de la teoria de las ophtalmias. (Véase su tratado de materia médica.)

**POMADA DE LEON PARA LOS OJOS.**

De unguento rosado. . . . . I onza.  
 De oxide de mercurio rojo. . . . .  $\frac{1}{2}$  dracma.  
 Se extiende ligeramente esta pomada sobre el borde de los parpados engurgitados que trasudan un humor mucoso y que se pegan durante el sueño.

**POMADA OPHTÁLMICA DE JANIN.**

De unto sin sal. . . . . IV dracmas.  
 De tucia. . . . . } a. II idem.  
 De bolo arménico. . . . . }  
 De precipitado blanco. . . . . I idem.  
 Se lava muchas veces el unto sin sal en el agua de

de  
 de  
 es  
 sal  
 119  
 res  
 sem  
 tab  
 v  
 203  
 en-  
 IX.  
 an.  
 il-  
 á  
 bi-  
 re-

rosas y se mezcla exactamente en un mortero de vidrio, las drogas bien pulverizadas.

*POMADA DE GRANDJEAN.*

De unguento populeon. . . . . I½ libra.  
De cera amarilla. . . . . IX onzas.  
De aceite de olivas. . . . . I libra.  
De cantáridas. . . . . XII dracmas.

F. S. A. Una pomada.

Esta pomada es epispástica, se le aplica tras de las orejas para atraer la fluccion que se presenta en los ojos.

*POMADA DEL Dr. FABRE.*

De enjundia. . . . . I onza.  
De muriate de amoniaco . . . . . I dracma.  
De emético. . . . . ½ idem.  
De alcanfor. . . . . XXV granos.  
De almizcle. . . . . X idem.

Tritúrese con cuidado.

Se emplea esta pomada en los infartos indolentes del hígado, y otras obstrucciones análogas.

Se hacen fricciones con ellas sobre la region del hígado. Se empieza por la cuarta parte de una dracma y se aumenta sucesivamente segun el grado de sensibilidad de la piel.

*POMADA OXIGENADA DE ALION.*

De enjundia. . . . . I libra.  
De ácido nítrico. . . . . ½ onza.

Derritase la enjundia y agréguese poco á poco el ácido agitándolo con celeridad. Póngase al fuego la mezcla hasta la ebulicion. Déjese resfriar.

Esta pomada es anti herpética.

*POMADA MERCURIAL.*

Con la manteca de cacao.

De mercurio purificado . . . . . } a. I onza.  
De manteca de cacao muy reciente. . . . . }  
De aceite de huevo idem. . . . . XX gotas

Esta pomada cuya fórmula es debida á M. Planche, y cuya preparacion está descripta cuidadosamente en el diario de Farmacia Coct. 1815 pág. 453, es muy útil para las fricciones, no se enrancia y tiene un olor muy agradable.

POMADA MERCURIAL DE CIRILLO.

- De muriate sobre oxigenado de mercurio . . . . . } I dracma,
- De enjundia . . . . . } I onza.

Mezclése y tritúrese en un mortero de vidrio por espacio de seis ó diez horas, á la última hora agreguese:

- De muriate de amoniaco en polvo. . . . . X granos,

Se hacen fricciones con esta pomada en las plantas de los pies, á la dosis de una dracma; pero es necesario que el enfermo no se haya debilitado mucho antes de tomar este remedio.

POMADA DE LA CONDESA Ó POMADA VIRGINAL.

- De agallas de roble . . . . . } a. II dracmas.
- De nueces de ciprés. . . . . } a. II dracmas.
- De cascara de granada . . . . . } a. III idem.
- De hojas de mirra . . . . . } a. III idem.
- De sumaque . . . . . } a. III idem.
- De sulfato de zinc . . . . . IV idem.

Pulvericense estas sustancias separadamente, mézclense y pásense por un tamiz muy fino, incorpórese con la s. q. de unguento rosado.

Otros prescriben la conserva de rosas en lugar del unguento; pero entonces debe llamarse á esta preparacion opiata, y no pomada.

Se emplea esta preparacion abstringente para constringir los orificios muy dilatados.

POMADA DE LA SULTANA.

- De cera blanca . . . . . III dracmas.
- De esperma de ballena . . . . . I onza.
- De aceite de almendras dulces . . . . . II idem.
- De bálsamo de la meca . . . . . XII gotas.

las

las

del

hi-  
au-  
piel.

áci-  
has-

De leche virginal en agua de rosas. I dracma.  
Se derrite la cera y la esperma de ballena, se pone el todo en un mortero de marmol y se le agréga la leche virginal y el bálsamo, y se bate hasta que la pomada quede muy blanca.

Ablanda la piel y quita el rubor de ella.

**POMADA DE TURBIT DEL Dr. ALIBERT.**

De turbit mineral. . . . . II onzas.

De manteca de puerco. . . . . II libras.

Se reduce á polvo muy fino el turbit mineral, se derrite la manteca á un dulce calor, se incorpora con ella el polvo, y se le remueve con la mano del mortero hasta que se enfrie completamente la grasa, se le pone en un bote de loza y se conserva para el uso.

Esta pomada ha producido algunas ventajas en algunos hérpes. (1)

**POMADA ANTI-PSORICA DEL Dr. ALIBERT.**

De sub-carbonate de potasa. . . . . I onza.

De flores de azufre. . . . . II idem.

De manteca de puerco. . . . . IV idem.

Triturense primero la potasa y el azufre, agréguese despues la manteca y mézclese exactamente.

**POMADA DEL Dr. BOYER.**

De jugo de siempre viva. . . . . } a. III onzas.

De enjundia lavada. . . . . }

De aceite de almendras dulces . . . . IV idem.

F. S. A.

Esta pomada es dulcificante y refrigerante, calma las irritaciones de la piel.

(1) *Vease la obra del Dr. Alibert sobre las enfermedades de la piel observadas en el hospital de S. Luis ó Hérpes.*

**POMADA DEL Dr. AUTENRIETH.***Contra la coqueluche.*

De tartrite de potasa antimoniado. V partes.

De enjundia. . . . . XVI partes.

Se toma de ella un volumen igual al de una avellana y se hace una friccion sobre el epigastrio. Sobrevienen sobre la parte frotada unas pústulas semejantes á la viruela volante, pero el Dr. Autenrieth asegura que con este remedio han cesado los mas tenaces romadizos.

**POMADA ANTI-PSORICA DEL Dr. THOMANN.**De polvo de carbon recientemente } II dracmas.  
preparado . . . . . }De manteca fresca. . . . . } a. III onzas.  
De enjundia. . . . . }

Se tritura hasta que la mezcla sea íntima. Despues que se haga tomar un baño tibio al enfermo, se le frota la mañana siguiente con dos dracmas de esta pomada: despues se le lava con una disolucion de jabon tibia. El dia siguiente se hace una nueva friccion, y al fin de cinco á seis dias debe extinguirse la sarna.

**POMADA DE THIERRY.**

De unguento populeon . . . . . VIII onzas.

De basalicón . . . . . III idem.

De cera amarilla . . . . . II idem.

Derritase el todo, muevase, y agréguese.

De cantáridas bien pulverizadas . . IV dracmas.

Esta pomada es epispastica y sirve para reanimar los vejicatorios.

**POCION DIURÉTICA DE Mr. HALLER.**

De agua de las tres nueces. . . . IV onzas.

De agua destilada de yerbabuena. I idem.

De oximiél scilítico. . . . . IV dracmas.

M. S. A.

\*

Se dá al enfermo una cucharada cada hora.

POCION DEL Dr. AUDRT.

De mercurio crudo . . . . . VI granos.  
 De agua de rosas. . . . . } a I onza.  
 De jarave de adormideras. . . . . }  
 De agua de azahar. . . . . II idem.  
 Apáguese el mercurio en el jarave y mézclese en seguida con el agua.

Se dá una cucharada mañana y tarde en la cardialgia gastrodinia y los vómitos espasmódicos.

POCION BALSÁMICA DE CHOPPART.

De agua destilada de yerbabuena. . . }  
 De alcohol. . . . . } a. II onzas.  
 De bálsamo de copaiba. . . . . }  
 De jarave de culantrillo. . . . . }  
 De agua de azahar. . . . . } a. I dracma.  
 De espíritu de nitro dulce. . . . . }

M.

Tómense dos cucharadas por la mañana, otra al medio dia, y otra á la tarde, continúese su uso por doce dias. Conviene este remedio en la blenorragia, en la leucorrea y gonorrea sifilitica aun en el período agudo. El enfermo debe mover la botella cada vez que quiera usarla.

POCION DE HIPECACUANA DE HALLER.

De hipecacuana en polvo. . . . . I½ dracma.  
 De cortezas de naranjas. . . . . I idem.  
 De cremor de tártaro. . . . . XXXVI granos.

Hiervánse en cuatro onzas de agua de fuente, cuélese y agréguese á la coladura media onza de oximiél scilítico.

Se dá esta pocion á cucharadas en las indisposiciones gástricas, en la ictericia, fiebres intermitentes, en el asma, la tos estomacal y en la hidropesía.

POCION DIURETICA DE BUCHAN.

De cocimiento de cebada . . . . .  $\frac{1}{2}$  azumbre.  
 De jarave de maivavisco . . . . . XI onzas.  
 De aceite de almendras dulces . . . . . IV dracmas.  
 De nitrato de potasa . . . . . IV onzas.

Se dá á tazas de cuatro á cuatro horas en la dis-  
 suria ó en la estranguria.

POCION DE Mr. JEANROY CONTRA EL COQUELUCHE.

De raíz de hipecacuana . . . . . I onza.  
 De hojas de sén . . . . . II dracmas.

Infúndase en una pocion de agua hirviendo, cuélese  
 y agréguese.

De oximiél scilítico . . . . . } a. I onza.  
 De jarave de hisopo . . . . . }

Se dá esta pocion á los niños á la dosis de seis cu-  
 charadas de café, en el espacio de la mañana.

POCION ANTI-SCORBUTICA DEL Dr. FRANCK.

De cocimiento de quina . . . . . V onzas.  
 De extracto de quina . . . . . VI dracmas.  
 De agua espirituosa de canela . . . . . II onzas.  
 De jarave de adormideras blancas . . . . . I idem.

Tómese á cucharadas de media en media hora.  
 Se usa esta pocion cuando el escorbuto ha llegado  
 á un alto grado.

POCION LAXANTE DE VIENA.

De hojas de sén . . . . . VI dracmas.  
 De pasas de corinto . . . . . } a. II escrúpulo.  
 De polipodio . . . . . }  
 De cilantro . . . . .  $\frac{1}{2}$  dracma.  
 De cremor de tártaro . . . . . I idem.  
 De maná en lágrimas . . . . . I onza.  
 De agua . . . . . X onzas.

Reduzcánse á seis.

Esta pocion purga muy bien.

**POCION CONTRA LA AFO-NIA DEL Dr. MONGENOT.**

De . . . . . } a. II dracmas.  
 De yedra terrestre . . . . . }  
 De flores de gordolobo . . . . . I idem.  
 De iris de Florencia . . . . . II escrúpulos.  
 Echense sobre el todo seis onzas de agua hirviendo,  
 déjese en infusion hasta que se resfrie cuélese y agréguese.  
 De róm . . . . . } a. I onza.  
 De jarave de jaramago . . . . . }  
 De jarave de tolú . . . . . IV dracmas.  
 De tintura de canela . . . . . I escrúpulo.  
 Se toman dos cucharadas de esta pocion cada dos ho-  
 ras en el catarro bronquinal, el asma, la afonia &c.

**POCION CATARTICA DEL Dr. MENDÉ.**

De sulfate de sosa . . . . . } a. IV dracmas,  
 De maná en lágrimas . . . . . }  
 De tartrite de potasa antimoniado . . . . . II granos.  
 Disuélvase en cuatro onzas de agua destilada,  
 Agréguese en seguida,  
 De oximiél scilítico . . . . . I onza,  
 Se dá una cucharada cada dos horas.

**POCION EMENAGOGA DE DESBOIS.**

De agua destila de artemisa . . . . . V onzas.  
 De azahar . . . . . IV dracmas,  
 De aceite esencial de ruda . . . . . } a. VI gotas,  
 De sabina . . . . . }  
 De jarave de azahar . . . . . I½ onza.  
 Se toma á pequeñas cucharadas.

**POCION DE QUARIN.**

Contra la tos sufocante.

De oximiél scilítico . . . . . }  
 De aceite de almendras dulces . . . . . } a. X dracmas.  
 De jarave de malvayisco . . . . . }

De goma amoniaco. . . . . I dracma.  
 De yema de huevo q. s.  
 Despues de haber mezclado estas sustancias con toda exactitud agréguese.  
 De agua de hisopo. . . . . VI onzas.  
 La dosis es una onza cada tres ó cuatro horas.

**POCION DE HUFELAND.**

*Contra las hidropestas spasmódicas.*

Hiérvanse cuatro dracmas de raiz de scila en diez onzas de agua de fuente que se disminuirá por la ebulicion, hácia el fin agréguese.  
 De polvo de raiz de valeriana. . . II dracmas.  
 Cúelese la decoccion y agréguesele.  
 De goma resina de guayaco en polvo. II idem.  
 De mucilago de goma arábica. . . III idem.  
 De tintura ácre de antimonio. . . II idem.  
 De laúdano líquido de sydehan. . . XX gotas.  
 De espiritu de nitro dulce . . . . II dracmas.  
 De corteza de naranja. . . . . I onza.  
 Se dá una cucharada de dos en dos horas.

**POCION DEL Dr. ANDRI.**

*Contra los envenenamientos por los ácidos minerales.*

De agua comun. . . . . IV onzas.  
 De jarave de altea . . . . . I idem.  
 De magnesia. . . . . I dracma.  
 De jabon medicinal. . . . . III idem.  
 Se dán tres cucharadas al enfermo cada 7 minutos.  
 Cuando han calmado los vómitos, se dá un lohc hecho con aceite de almendras dulces, jarave de altea, goma arábica, magnesia y agua destilada.

**POCION CONTRA EL COQUELUCHE**

**POR EL Dr. ROBERT-THOMAS DE SALISBURY.**

De acetate de plomo cristalizado. . De II á V granos.

De agua de rosas. . . . . II onzas.  
 De jarave de violetas. . . . . I dracmas.  
 M. S. A.  
 Se dá una cucharada de cuatro en cuatro horas.

**POCION CONTRA LA TENIA.**

De aceite volatil de trememina. . . . . III onzas.  
 De miel. . . . . VI dracmas.  
 De agua destilada de yerbabuena. . . . . III idem.

M.

Se toma la tercera parte de esta bebida, en la mañana, y los otros dos tercios algun tiempo despues.

**POCION PURGANTE Y VERMIFUGA**

**DEL Dr. MACARTAN.**

De agua de menta piperita. . . . . III onzas.  
 De aceite de ricino. . . . . II idem.  
 De jarave de culantrillo. . . . . IV dracmas.  
 De carbonate de potasa. . . . . I escrúpulo.

Se tritura primero en un mortero de vidrio el carbonate de potasa y el aceite de ricino, se le agrega en seguida el jarave y cuando está hecha la mision se diluye con el agua de yerbabuena.

Se toma esta pocion en dos veces con media hora de distancia.

**POCION ANTI-TETANICA DEL Dr. TOURNIER.**

De almizcle puro. . . . . } a. I dracma.  
 De alcanfor. . . . . }  
 De agua de luce. . . . . II idem.  
 De infusion muy fuerte de flores de }  
 arnica. . . . . } IV onzas.

Hagase una pocion que se tomara á cucharadas de bora en hora.

Se le pueden agregar dos, tres y hasta cuatro escrúpulos de nitro, segua el estado del aparato urinario.

Se dá esta pocion en el tetanos traumático.

**POCION ANTI NEFRITICA DEL Dr. WILLAMS.**

NORFORD.

- De decoccion de cebada perlada. . . . . II libras.  
 De goma arábiga . . . . . III onzas,  
 De agua de ballas de enebro com- } II idem.  
 puesta (1) . . . . . }  
 De jarave de altea . . . . . I½ onza.  
 Se dá la mitad de la dosis al dia en los cólicos nefríticos.

**POCION COPAIBADA DADA POR WILLIS.**

- De bálsamo de copaiba . . . . . III onzas.  
 De aceite de enebro . . . . . XXX gotas.  
 De agua comun . . . . . VI onzas.  
 De alcohol . . . . . } a. I idem.  
 De jarave de altea . . . . . }  
 De mucilago de goma arábiga q. s.

La dosis es de dos cucharadas dos veces al dia.

Se administra esta mixtura como diurética en los casos de nefritis crónica, y como detersiva contra las úlceras de la uretra.

**POCION DE JUSIEU CONTRA LOS ESPUTOS CRUENTOS.**

- De agua de llanten. . . . . } a. II onzas.  
 De buglosa . . . . . }  
 De jarave de consuelda mayor. . . . . I dracma.  
 De esencia de rabel . . . . . III gotas.  
 De agua de azahar. . . . . ½ dracma.

M.

Hágase una pocion que se tomará en dos dosis.

(1) Véase la farmacopéa de Londres.

POCION DE SPIELMANN CONTRA LOS DOLORES DE  
VIENTRE DE LOS NIÑOS.

De agua de yerbabuena destilada. . . } a. II onzas.  
De agua de manzanilla destilada. . . }  
De jarave de flores de adormideras. . . } a. IV dracmas.  
De jarave de manzanilla . . . . . }

M.

Se dá esta pocion á cucharadas de cuarto en cuarto de hora.

POCION PURGANTE DEL Dr. ANDRT.

De agua de azahar. . . . . } a. I onza.  
De jarave de flores de durazno. . . }  
De espíritu de romero. . . . . } I dracma.  
De diagridio . . . . . } VII granos.

Conviene esta pocion con especialidad, á las personas que tienen repugnancia á tomar medicamentos ordinarios compuestos de maná, sén, y sales.

POCION ANTI-EMETICA DE RIVERIO.

De carbonate de potasa. . . . . I escrúpulo.

Disuélvase en cuatro dracmas de agua de fuente.

Se le agréga al irlo á tomar el enfermo cuatro dracmas del zumo de limon y un poco de azucar blanca.

Algunos prefieren el jarave tartaroso.

Esta pocion calma los accidentes ocasionados por la gran violencia de los eméticos. (1)

(1) M. Chaucier aconseja preparar la pocion emética del modo siguiente.

De ácido tartárico en polvo . . . . . I dracma.

De carbonate de potasa cristalizado } II idem.  
y pulverizado . . . . . }

De azucar blanca en polvo . . . . . I onza.

Mézclase exactamente para una dosis que se diluye en

## POLVO ANTI-ARTRÍTICO DEL Dr. MARC.

De Rhododendrum Chrysantum (1). X granos.

De polvo de regalís. . . . . II dracmas.

Mézclase y dividase en diez partes.

Se dá este polvo á la dosis de un paquete en la mañana y otro á la tarde. Se aumenta diariamente un paquete hasta que se produzca un sudor abundante ó que se aumente la secreción de la orina. Algunas veces hay necesidad de administrar hasta treinta granos por dia. Es digno de observarse que en muchos individuos que hacen uso de este remedio los sudores adquieren un olor aromático que se semeja al de estos polvos.

## POLVO ANTI-PSORICO.

Hágase fundir el azufre en canuto, en un crisól. Cuando esté líquido agréguesele una décima parte de cal viva en polvo; remuévasele sobre una placa de bronce. Cuando esté frio y endurecido reduzcasele en polvo y pásesele por un tamiz de seda.

Se forma en esta operacion un sulfureto de cal y un oxide de azufre, si se le puede llamar así al azufre rojo, proximo á pasar al estado de ácido sulfuroso.

Se usa este polvo del modo siguiente.

Los sujetos que tengan sarna cojerán un polvo (como cuando se coge un polvo de tabaco) lo echan en la pal-

---

un vaso de tpsana ó de agua destilada apropiada y se hace tomar en el instante ó bien. =

De ácido cítrico. . . . . I dracma.

De carbonate de sosa pulverizado. . . II idem.

De azucar blanca . . . . . I onza.

Puede tambien emplearse el ácido oxalico concreto y mezclado con diferentes carbonates alcalinos terrecos segun el objeto que se propone el médico.

(1) Rhododendrum Chrysante planta perteneciente á la de candria monogimia crece en Siveria. Los rusos la emplean para la curacion de los herpes, de la sarna del cancer, de las enfermedades venereas, y reumáticas, su uso no está todavia adaptado en Francia.

\*

ma de la mano izquierda, y echando dos ó tres gotas de aceite de olivas forman una especie de pomada, entonces con la palma de la otra mano hacen, por un frotamiento activo, penetrar esta mezcla en la piel. Se ponen despues unos guantes por espacio de una hora, despues de la que pueden lavarse las manos.

Esta simple aplicacion del polvo en las manos continuada mañana y tarde por diez ó doce dias basta para curarse la sarna cuando no está complicada.

Esta preparacion, que no casucia la ropa, puede aromatizarse al agrado de los enfermos. Se debe agregar el uso de las bebidas apropiadas.

#### POLVO ARSENICAL DE JUSTAMOND.

De sulfato de antimonio . . . . . I onza.

De oxide blanco de arsénico . . . . . IV dracmas.

Mézclese y fundase en un crisol: cuando se resfrie la masa pulvericese y agréguesele.

De extracto de opio . . . . .  $\text{II}\frac{1}{2}$  idem.

Se polvorean con esta composicion las escrecencias, las úlceras fungosas y rebeldes.

#### POLVO ANTI-CARCINOMATOSO DE F. COSME.

De cinabrio . . . . . II dracmas.

De cenizas de suelas viejas de zapatos. VIII granos.

De sangre de drago . . . . . XII idem.

De oxide blanco de arsénico . . . . . II escrúpulos.

Se mezcla y se hace un polvo muy fino.

Se empapa este polvo con un poco de agua y se extiende con un hisopo sobre las úlceras cancerosas que se tapaz con un lienzo. Al fin de tres ó cuatro dias cae la escara.

#### POLVO ARSENICAL DE PLUNCQUET.

De renúnculo flammule . . . . . I onza.

De manzanilla hedionda . . . . .  $\frac{1}{2}$  idem.

De flores de azufre . . . . . I dracma.

De oxide blanco de arsénico . . . . . II idem.

Hágase un polvo muy fino.

Se mezcla una parte con un poco de clara de huevo y se empapan de esta mezcla las úlceras ó los carcinomas. Al fin de cuarenta y ocho horas cae la escara.

**POLVO ANTI-SEPTICO DE SWEDIAUR.**

De polvos de raíz de arnica montánica. }  
De quina . . . . . } a. partes iguales.  
De alcanfor. . . . . }

M.

Se aplica sobre las úlceras rebeldes ó que están atacadas de gangrena.

**POLVO DEL PRINCIPE.**

Este polvo empleado en Inglaterra en las enfermedades sifiliticas y escrofulosas no es otra cosa que el mercurio precipitado per se, ó de otro modo el óxido rojo de mercurio perfectamente lavado y despojado de todo lo que pudiese contener de salino y de soluble tanto en el agua como en el alcohol.

Su uso es principalmente externo, se pone en uso para curar las úlceras sifiliticas, callosas ó fungosas y la optalmia crónica.

**POLVO FEBRÍFUGO Y PURGANTE DE HERVECIO.**

De quina . . . . . IV dracmas.  
De sulfato de potasa . . . . . I onza.  
De nitrato de potasa . . . . . I dracma.  
De azafrán . . . . . } a. XII granos.  
De goma guta . . . . . }  
De diagridio . . . . . IV dracmas.  
De tartrite ácido de potasa . . . . XIV idem.  
De emético . . . . . II idem.  
De sulfureto rojo de mercurio . . . VI granos.  
De jalapa . . . . . II onzas.  
De jugo de ajo . . . . . I idem.

Se da este polvo á la dosis de diez y ocho granos hasta media dracma en las fiebres intermitentes.

Se emplea tambien como vermífugo.

## POLVO FEBRÍFUGO DE BOULLEMER.

- De ojos de cangrejos . . . . . I dracma.  
 De muriate de amoniaco . . . . .  $\frac{1}{2}$  idem.  
 De mirra . . . . . I escrúpulo.

Se pulverizan y se mezclan estas sustancias, se les divide en tres partes iguales que tomará el enfermo en tres dias; la primera dosis dos horas antes del parosismo, la segunda la mañana siguiente á la misma hora, y al otro dia la tercera.

## POLVOS DE GTMS Ó JAMES. (1)

- De sulfato de antimonio . . . . . II dracmas.  
 De fosfato de cal calcinado . . . . .  $1\frac{1}{2}$  idem.  
 De nitrato de potasa . . . . . IV idem.

Se dan estos polvos en las fiebres adynamicas á la dosis de una ó una y media dracma.

## POLVOS DE GRTMALDI.

- De escamonea . . . . . II onzas y I dracma.  
 De oxide amarillo de fierro . . . . . II onzas y  $1\frac{1}{2}$  dracma  
 De magnesia blanca . . . . . } a. IV dracmas.  
 De cremor de tártaro . . . . . }  
 De negro humo . . . . . VI idem.  
 De perlas finas preparadas . . . . . } a. VIII idem.  
 De besár oriental . . . . . }

(1) Esta fórmula se hizo despues de la análisis publicada por M. Pearion y despues de la de M. Pultes (análes de química, tomo 56, pág. 77); pero en el diario de medicina inglés se ha publicado ultimamente una fórmula del polvo de James que difiere mucho de las que he dicho. Es así.

- De antimonio diaforético bien lavado . . . . . { De XII á XXIV  
 dracmas.  
 De muriate dulce de mercurio sublimado seis veces . . . . . } I dracma.  
 Mezclese exactamente.

De aceite esencial de enebro. . . . . } a. III dracmas.  
 De bálsamo de copaiba. . . . . }  
 Se dá este polvo á la dosis de cuarenta y ocho granos en las enfermedades de la piel y en ciertas fiebres.

**POLVO CORROBORANTE DE WERLHOFF.**

De corteza perubiana. . . . .  $\frac{1}{2}$  dracma.  
 De canela. . . . . VI granos.  
 M.

Hágase un polvo para una dosis.

Werlhoff lo hacía tomar á los convalecientes de las fiebres intermitentes.

**POLVO CÁUSTICO DE KRUGER.**

De muriate de mercurio sobre oxigenado. . . . . } a. X granos.  
 De sulfato de cobre. . . . . }  
 De nitrato de plata. . . . . VI idem.  
 Pulverícese y mézclese.

Se pone un poco de este polvo sobre las berrugas ó escrecencias sifilíticas que se quieren destruir, y se humedecen con un hisopo.

**POLVO DEL CONDE DE WARWICK.**

De diagridio sulfurado. . . . . II onzas.  
 De antimonio diaforético. . . . . I idem.  
 De cremor de tártaro. . . . . IV dracmas.

M.

Este polvo es purgante á la dosis de doce á veinte y cuatro granos.

**POLVO ANTI-CATARRAL.**

De la farmacopea de Viena.

De goma arábica. . . . . } a. I escrúpulo.  
 De regalís. . . . . }  
 De almidon. . . . . }

De iris de Florencia. . . . .	}	III dracmas I es-
De flor de azufre . . . . .		crúpulo.
De azafrán oriental . . . . .		I dracma y I escrúp.
De azúcar. . . . .		I dracma.
		III onzas.

Se dá este polvo á la dósís de una ó dos dracmas.

#### POLVO VOMITIVO DE HERVECIO.

De emético. . . . .	I onza.
De hipecacuana. . . . .	IV dracmas.
De cremor de tártaro . . . . .	VIII onzas.

Se trituran cuidadosamente estas tres sustancias mezcladas y se pasa la mezcla por un tamiz de seda.

Se dá á la dósís de diez y ocho granos para excitar el vómito sin sacudidas violentas. A veces es purgante.

#### POLVO STOMÁQUICO DE BIRCKMANN.

De raíz de aro. . . . .	II onzas.
De calamo aromático. . . . .	} a. I idem.
De saxifraga. . . . .	
De piedras de cangrejos . . . . .	IV dracmas.
De canela fina . . . . .	III idem.
De sulfato de potasa. . . . .	II idem.
De muriate de amoniaco. . . . .	I escrúpulo.

Se dan de dos á cuatro dracmas en las debilidades de estómago ocasionadas por las saburras mucosas.

#### POLVOS PECTORALES DE WEDELIUS.

De raíz de orosur. . . . .	}	a. II dracmas.
De iris de Florencia. . . . .		
De flor de azufre . . . . .		IV idem.
De ácido benzoico. . . . .		I escrúpulo.
De azúcar blanca. . . . .		II onzas.
De aceite volátil de anís. . . . .	}	a. X gotas.
De hinojo. . . . .		

Mézclese y hágase un polvo.

En los catarros neumónicos crónicos, se dan uno ó dos escrúpulos.

**POLVO OLOROSO DE INGLATERRA.**

De canela. . . . . II onzas.

De semillas de cardomomo . . . . . }

De raíz de gengibre . . . . . } a. I onza.

De nuez noscada. . . . . }

Mézclase y hágase un polvo.

Se dan de cinco á veinte granos en la dispeccia sin calor, las flatuosidades, eructos y la astenia general.

**POLVO ANTI-CAQUECTICO DE HARTMANN.**

De carbonato de fierro. . . . . IV dracmas.

De canela. . . . . I½ onza.

De azucar. . . . . II idem.

Se dá este polvo desde media hasta dos dracmas en la caquexia.

Conviene con especialidad en la caquexia mucosa.

**POLVO ANODINO DE HERVECIO.**

De opio. . . . . IV dracmas.

De mirra . . . . . I½ libra.

De cascarilla . . . . . I idem.

De bolo arménico . . . . . IV onzas.

De canela . . . . . I libra.

De coral rojo preparado . . . . . IV onzas.

Se prescribe en las disenterias, en los cólicos de estómago, en las pleuresias. La dosis es desde diez y ocho granos hasta dos escrúpulos.

Con respecto á la disenteria no se debe emplear este polvo ni al principio ni en el estado de esta enfermedad, y si solo hacia el fin.

**POLVO DE HALT.**

De semillas de membrillos . . . . . }

De adormideras blancas. . . . . } a. I dracma.

De almidon. . . . . }

De almendras dulces peladas . . . . . II idem.

De azucar cande. . . . . VI idem.

De goma arábica . . . . . } a. I dracma.  
 De tragacanto. . . . . }  
 De orosur. . . . . }  $\frac{1}{2}$  idem.

Hágase un polvo y mézclase bien.

Se dá en los espustos de sangre, en las diarreas y debilidades de estómago. La dosis es desde media dracma á dracma y media en el día.

Este polvo no se puede conservar largo tiempo: solo debe prepararse la cantidad que se ha de usar en pocos dias.

#### POLVO SEDATIVO DE WETZLER.

De polvos de raíz de belladona . . . . . I escrupulo.  
 De azucar en polvo. . . . . } I dracma y I escrupulo.

Mézclase exactamente y divídase en ochenta y seis tomas

Cada toma contiene la cuarta parte de un grano de la belladona.

Este remedio es mirado por Mr. Schaeffer, Mr. Hufeland, y Mr. Wetzler como un específico en el coqueluche de los niños. Mr. Mare que lo ha usado con suceso en París cita treinta y cinco curaciones de esta enfermedad obtenidas de ocho á quince dias.

Se administra este polvo á la dosis de una toma mañana y tarde á los niños de menos de dos años y de cuatro tomas para los niños de tres á cuatro años y de seis á los de cuatro á seis. Se va aumentando por graduacion de modo que la dosis para los niños de mas edad sea de doce tomas en veinte y cuatro horas, quiere decir de grano y medio de belladona.

Este remedio produce tambien buen efecto en la tos nerviosa de los adultos.

#### POLVO DE ANTIMONIO MARCIAL DIAFORÉTICO

##### DE KEUP.

De limaduras de fierro. . . . . } a. VIII onzas.  
 De sulfato de antimonio nativo. . . . . }

Muclase, mézclase y pongase en un crisol á fuego rojo y muévase con una espátula de fierro hasta que tomen la exterioridad de escoria, apartese del fuego y cuando esté fria

la masa muélase nuevamente con tres veces su peso de nitro seco y échese á cucharadas el polvo en un crisol escandecente, cuando la combustion y calcinación se hayan terminado, póngase este material en la s. q. de agua para disolver las sales que contiene.

Los óxidos se precipitan bajo la forma de un polvo amarillo. Se agrega una gran cantidad de agua para hacerla mas ligera y separar lo mas pesado de lo mas sutil. Recojida esta última por el filtro se seca con cuidado.

Se dá á la dosis de cinco á seis granos en la caquexia, la ictericia y en la debilidad de los intestinos.

#### POLVO INCISIVO DEL Dr. MONGENOT.

De emético . . . . .	I grano.
De kermes. . . . .	II idem.
De iris de Florencia. . . . .	I escrúpulo.
De azucar. . . . .	} a. I dracma.
De goma arábica . . . . .	

Dividase en veinte y cuatro tomas, se dá una de media en media hora.

En las afecciones catarrales con sofocacion por defecto de espantos ó por atonia.

#### POLVO TEMPERANTE LAXATIVO DEL Dr. BOUILLON

##### DE LA GRANGE.

De nitro bien pulverizado. . . . . III libras.

De ácido boracico. . . . . I idem.

De tartrite de potasa. . . . . IV½ idem.

Mézclense estas tres sustancias y pásense al través de un tamiz de seda muy fina.

Para una pinta de agua se toman.

De sulfato de sosa esflorecido . . . . . II½ dracmas.

De polvo atemperante dicho arriba. . . . . ½ idem.

Se funde y se filtra.

*Nota.* Si los farmacéuticos quieren preparar este agua mineral, pueden servirse del sulfato de sosa ordinario.

Entonces se ponen para una pinta de agua.

De sulfato de sosa. . . . . VI dracmas.

De polvo temperante laxativo. . . . . ½ idem.

\*

Se emplea con suceso este polvo en las enfermedades linfáticas y otras donde se lleva intencion de dividir los humores sin irritar mucho el canal intestinal.

Un paquete ó papel de estos polvos disuelto en una pinta de agua y tomado en cuatro vasos con media hora de distancia purga convenientemente.

A la dosis de un vaso cada mañana, se le emplea con suceso en algunas afecciones catarrales y en ciertas detenciones de orina.

#### POLVO DE TUNQUIN REUSS.

De almizcle . . . . . XVI granos.

De raíz de valeriana en polvo. . . I escrúpulo.

De alcanfor . . . . . VI granos.

Hágase un polvo.

Se dá á la dosis de doce granos en las enfermedades convulsivas, histéricas, epilépticas, espasmódicas, en la manía é hidrofobia.

#### POLVO DE ROSENSTEIN PARA LAS NODRIZAS.

De magnesia inglesa. . . . . I onza.

De cortezas de naranja en polvo. . . } a. I dracma.

De semillas de hinojo en polvo. . . } a. I dracma.

De azucar blanca. . . . . II idem.

Mézclese exactamente y dividase en tomas de una dracma.

Se dán dos ó tres por dia. Este polvo aumenta la leche en las nodrizas, impide que se agrie y facilita las digestiones.

#### POLVO FEBRIFUGO DE JUNCKER.

De azufre dorado de antimonio. . . } a. I dracma.

De magnesia. . . . . } a. I dracma.

De sulfato de potasa. . . . . } a. I dracma.

Dividase este polvo en cuatro partes que se tomarán á iguales distancias durante la apirecencia.

Estos polvos recomendados por Unzer (dez. Arzt. XII pág. 106) como suplentes á la quina, no producen otro efecto sensible que el de disminuir y en fin hacer cesar la fiebre; y si

este efecto no se consigue al cabo de algunos días, es indicio de que hay necesidad de recurrir á los evacuantes, como en los casos en que se administra la quina muy pronto. En seguida se vuelve al uso de los polvos antifebriles. (1)

#### POLVOS DE SCILA COMPUESTOS DE STALL.

De escamas de scila recientes . . . } a.  $1\frac{1}{2}$  dracma.  
De raíz de asclepias venetosigo. . . }

Contúndase la scila en un mortero de marmol, cuando se haya reducido á pulpa, agréguese el polvo de asclepias. Désíquese el todo á la estufa; pulverícese de nuevo, y pásese por tamiz.

Se dá este polvo á la dosis de 3. á 5 granos en el asma, la hidropesía, y el catarro pulmonal crónico.

#### POLVO DEL CONDE DE PALMA.

De polvo de sentinelli . . . }  
De polvo de valentini . . . } Segun la indicacion.  
De polvo de zwingen . . . }  
De panacéa inglesa . . . }

Se aconseja bajo estos diferentes nombres el uso del carbonate de magnesia.

#### POLVO VERMIFUGO DE BRUGNATELLI.

De estaño de Málaga en limaduras. III onzas.

De azufre sublimado . . . . . I idem.

Fúndase esta mezcla en un crisol sobre carbones ardiendo hasta que se presente una llama muy viva; apártese del fuego el crisol, cúbrasele, déjesele enfriar, pulverícese y tamícese el sulfureto. Conservesele en una vasija de vidrio.

Se dá este polvo sea solo ó mezclado con azucar ó magnesia. Se le prescribe á la dosis de media á una dracma cuatro veces al dia á las personas que tienen lombrices, ó latencia.

(1) Ensayo sobre los medios de disminuir el consumo de la quina por Mr. Lauth profesor de la facultad de Strasbourg.

**POLVO DE KINO COMPUESTO.***Pharmacopée de Londres*

- De kino . . . . . I onza y II dracma.  
 De canela . . . . . IV dracmas.  
 De opio . . . . . I idem.

Pulverícese separadamente cada sustancia y mézclese.

Este polvo es stíptico y abstringente. Contiene cuatro granos de opio en cada dracma. Se le prescribe á la dosis de un escrúpulo en las hemorragias internas.

**POLVO DEL Dr. ODIER.**

- De oxido bismuto . . . . . I dracma.  
 De magnesia calcinada . . . . . } a. X idem.  
 De azucar . . . . . }

Háganse papeles de veinte granos cada uno.

Se dá uno cada tres horas en la gastrodinia y la dispepsia. (Véase bibliot. médica, marzo 1816 pág. 366.)

**POLVO DE GREDA COMPUESTO.***Pharmacopée de Londres.*

- De greda preparada . . . . . VIII onzas.  
 De canela . . . . . IV idem.  
 De raiz de tormentila . . . . . } a. III idem.  
 De goma acacia . . . . . }

De pimienta larga . . . . . IV idem.

Se pulveriza separadamente este polvo, y cada sustancia y se mezclan con exactitud.

Se prescribe este polvo á la dosis de seis á doce granos tres veces al dia en los embarazos mucosos del estómago y en las diarreas.

**POLVO DE SCILA NITRADO DE VANHELMOT.**

- De escamas de scila desecadas . . . I dracma.  
 De raiz de asclepias venectosigo . . V½ idem.

De nitrate de potasa purificado. . . } VII. dracmas y I  
 . . . . . } essrúpulo.

Se hace un polvo homogéneo y muy fino. Como que la seila aunque muy seca atrae con mucha facilidad la humedad de la atmósfera, es necesario tener cuidado de hacer desecar el nitrate de potasa para quitarle una parte de su agua de cristalización.

Se prescribe este polvo á la dosis de doce granos dos veces al dia en la ascitis.

### POLVO SIPTICO DE CORBATCH Ó ESPECÍFICO

#### ABSTRINGENTE DE MAETZIO.

De disolucion saturada de muriate }  
 de fierro. . . . . } IV onzas.

Hágasele evaporar hasta la mitad, y agréguesele un peso igual de acetate de plomo seco, continúese la evaporacion á un dulce calor hasta la sequedad; pulvericese y tamícese.

Es necesario preservar este polvo del contacto del aire porque atrae la humedad.

Se le emplea interior y exteriormente para toda especie de hemorragias. Se dá interiormente á la dosis de cuatro á doce granos.

Es necesario administrar este remedio con mucho tino y precaucion, el plomo que contiene puede hacerlo muy dañoso.

#### POLVO DE PLUMMER.

De muriate dulce de mercurio. . . . }  
 De azufre dorado de antimonio. . . } a. Partes iguales.

Se toma á la dosis de cinco á seis granos por mañana y tarde bebiendo encima uno ó dos vasos de una decocion de zarzaparrilla.

Conviene en las enfermedades sifiliticas y escrofulosas.

#### POLVO DE MERCURIO SACARINO DEL Dr. LAGNEAU.

De mercurio vivo. . . . . } II dracmas,

De azucar blanca. . . . . } IV idem.

Tritúrese hasta la extincion completa del mercurio y dividase en treinta partes iguales.

Se emplea en la sífilis de los niños ó de las personas delicadas, á los cuales se les da en una taza de chocolate ó de café. La dosis es de diez granos.

**POLVO VERMIFUGO PURGANTE DE BALL.**

De ruibarbo . . . . . } a. I dracma.  
De escamonea . . . . . }  
De muriate dulce de mercurio . . . . . }  
De azúcar muy fina . . . . . III idem.

La dosis para un niño es de diez á doce granos una ó dos veces por semana; para un adulto una dracma.

**POLVO VERMIFUGO DE ESTAÑO.**

De estaño reducido en polvo muy fino. I onza.  
De etiope mineral. . . . . II draemas.

Mézclase y dividase en seis tomas iguales.

Se dá una de estas dosis en un poco de jarave de miel ó de triaca dos veces al día.

**POLVO TÓNICO INCISIVO DEL Dr. LASSONE.**

De kerues . . . . . II granos.  
De hipecacuana. . . . . IV idem.  
De carbonate de sosa. . . . . } a. XII idem.  
De etiope marcial. . . . . }  
De cáchunde. . . . . }  
De de canela. . . . . } a. I escrúpulo.  
De iris. . . . . }  
De polvo de regalis. . . . . I dracma.

Se usa este polvo en los embarazos gastricos del modo siguiente: despues de haber dividido la masa en veinte y cuatro ó treinta dosis se toman tres dosis con un trago de agua y un poco de hostia humedecida, dejando siempre de una á otra dosis un cuarto de hora de distancia.

El tiempo de tomarla es una ó dos horas antes de la comida.

## POLVOS DE DOWER.

- |                                |   |                |
|--------------------------------|---|----------------|
| De sulfato de potasa . . . . . | } | a. I onza.     |
| De nitrato de potasa . . . . . |   |                |
| De hipecacuana . . . . .       | } | a. II dracmas. |
| De opio desecado . . . . .     |   |                |

Se usa en las reumas y dolores reumáticos desde medio, á un escrúpulo.

Este polvo es diurético, diaforético, calmante, y ligeramente purgante.

## POLVO ANTI-ARTRÍTICO DE PERARD.

- |  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| De semillas de cardo bendito . . . . . | } | a. I onza y II dracmas. |
| —De cartámo . . . . .                  |   |                         |
| De cremor de tártaro . . . . .         | } | a. IV dracmas.          |
| De scñ. . . . .                        |   |                         |
| De canela fina . . . . .               | } | I idem.                 |
| De escamonea . . . . .                 |   |                         |
| De raíz de zarzaparrilla . . . . .     | } | a. II idem.             |
| De palo de guayacán . . . . .          |   |                         |

Hágase un polvo s. a.

La dosis es una dracma todos los meses para evitar los ataques de la gota.

## POLVOS DE QUARIN CONTRA LA TOS CONVULSIVA.

- |                                 |                    |                        |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|
| De flores de azufre . . . . .   | I dracma.          |                        |
| De goma arábica . . . . .       | }                  | a. $\frac{1}{2}$ idem. |
| De architira . . . . .          |                    |                        |
| De extracto de orozur . . . . . | }                  | a. II idem.            |
| De azúcar . . . . .             |                    |                        |
| De kermis mineral . . . . .     | De II á IV granos. |                        |

El enfermo tomará media dracma cada cuarto de hora.

## POLVO DEL Dr. MARC.

Contra el coqueluche y el catarro nervioso.

- |   |             |
|---|-------------|
| De raíz de belladona en polvo . . . . . | III granos. |
|---|-------------|

De polvo de orozur . . . . . I escrúpulo.  
De azucar . . . . . I dracma.  
Para doce tomas,

**POLVO APERITIVO DEL Dr. SELLE.**

De magnesia inglesa . . . . .	} a. IV dracmas.
De cremor de tártaro . . . . .	
De flores de azufre . . . . .	
De ruibarbo en polvo . . . . .	
De flores de manzanilla en polvo . . . . .	
De oleo sacaro de hinojo . . . . .	

Este polvo produce muy buenos efectos en las obstrucciones y debilidades de las víceras del bajo vientre con especialidad cuando hay una plétora abdominal. Como ellos producen el flujo hemorroydal, no se administran mas que en los casos en que este flujo puede ser útil. La dosis es de una cucharada de té que se dá diferentes veces al dia.

**POLVOS DE LA PRINCESA CARIGNAN.**

De visco cuercino . . . . .	} a. I onza y III dracmas.
De raiz de dictamo blanco . . . . .	
De cuerno de ciervo preparado . . . . .	
De raiz de peonia . . . . .	} a. V idem.
De carbonato de amoniaco . . . . .	
De succino preparado . . . . .	II½ onzas.

Este polvo que se emplea en las convulsiones de los niños se dán en leche, en caldo ó en agua de azahar, la dosis es de 18 granos para un niño de un año ó menos, de treinta y seis para los de dos años, de dos escrúpulos para los de tres años, y de una dracma para los de cuatro años en adelante.

**POLVO DE VERNIX.**

De sulfato de sinc. . . . .	} a. I onza.
De cobre . . . . .	
De alumbre calcinado . . . . .	
De cerusa . . . . .	
De tierra sellada . . . . .	

Se emplea este polvo exteriormente para contener la sangre.

**POLVO DE KNOX.**

De muriate sobre oxigenado de cal. . . III partes.  
De muriate de sosa pulverizado. . . VIII idem.

Se conserva este polvo en un frasco bien tapado, cuando se echan una ó dos onzas en un vaso de agua abandona bastante cantidad de gas ácido muriático oxigenado para hacerse un anti-contagioso muy útil; pero el desprendimiento sería mucho mas considerable si se echasen algunas gotas del ácido sulfúrico en el agua que tiene el polvo en disolucion.

Los ingleses la miran como un excelente preservativo del contagio sífilítico, por cuya razon la emplean en locion antes y despues del acto venereo.

**POLVO CONTRA EL CANCER DE Mr. ROUSSELOT.**

De sulfate de mercurio. . . . . I onza.  
De sangre de drago . . . . . IV dracmas.  
De oxide de arsénico . . . . .  $\frac{1}{2}$  idem.

Se rocía éste polvo sobre las úlceras cancerosas, pero es necesario mucha moderacion en el empleo de este remedio, la aplicacion del arsénico al exterior no deja de tener su riesgo cuando en las partes donde se aplican hay vasos linfáticos absorbentes, tales son los lugares afectados de cánceres.

**POLVO CONTRA LA GASTRODINIA DEL Dr. ROBERT**

**THOMAS.**

De oxide de bismuto. . . . . De III á X granos.  
De goma tragacanto. . . . . I escrúpulo.

M.

Se repite esta dosis tres veces al dia.

**PURGANTE DEL Dr. WILSON.**

De vidrio de antimonio pulverizado. IV onzas.  
De ácido sulfúrico concentrado. . . I libra.

\*

Téngase en digestion la mezcla durante cuarenta y ocho horas.

Destílese en seguida al baño de arena y lávese el polvo que quede en la retorta hasta que haya perdido toda su acritud, hágasele secar, mézclese con un peso igual de sulfato de sosa y con el doble de sulfato de potasa. Póngase esta mezcla en un crisol. Téngasele en infusion un cuarto de hora y pulverícese en seguida.

Se dá esta preparacion en las enfermedades sifilíticas, escrofulosas y herpéticas desde dos hasta diez granos.

*Nota.* Este procedimiento es defectuoso, pero yo debo presentarlo tal cual lo dá el autor.

#### RATAFIA DEL COMENDADOR DE CAUMARTIN.

*Contra el mal de piedra..*

De raíces de gatuna . . . . .	} a. II onzas,
De cynnorrhodon. . . . .	
De malvabisco. . . . .	
De grama nudosa. . . . .	
De cabezuela. . . . .	
De grande consuelda. . . . .	I onza.
De nuez noscada. . . . .	VI dracmas.
De semillas de anís. . . . .	I idem.
De ballas de enebro. . . . .	I onza.
De aguardiente. . . . .	X lib. y III onzas.
De azucar. . . . .	II id. y V dracmas.

Se maceran las raíces en el aguardiente por quince días, se cuéla con expresion, se disuelve el azucar en el licor y se filtra.

La dosis es un pequeño vaso en la mañana y otro á la tarde. Se ayuda esta medicina con el uso de una infusion de hinojo marino.

#### RATAFIA DE LOS CARIBES.

De resina de guayaco. . . . .	II onzas.
De mistela. . . . .	III pintas.

Contundase la resina y póngase á digerir en la mistela durante quince días.

Se emplea este remedio contra la gota á la dosis de media onza por día.

Endulzando y aromatizando esta ratafia resulta un licor agradable.

### REMEDIO DE MADAMA NOUFFER.

*Contra la tenia ó lombriz solitaria.*

La víspera en la tarde debe tomar el enfermo una sustancia de pan. En la mañana siguiente toma tres dracmas de helecho macho en polvo muy fino y diluido en tres onzas de tipsana del mismo helecho ó de flores de tilia; echa dos ó tres veces de la misma tipsana en el vaso para no dejar nada de polvos. Dos horas despues toma un bolo purgante compuesto.

De panacéa mercurial. . . . .	} a. X granos.
De resina de escamonea. . . . .	
De goma guta. . . . .	VI idem.
De confeccion de jacintos q. s.	

Se divide esta cantidad en dos ó tres tomas que tomará con la distancia de un cuarto de hora, y encima una ó dos tazas de té.

Cuando el enfermo es niño se proporciona el bolo purgante á su edad.

### REMEDIO ANTI-SIFILÍTICO Ó MERCURIO SOLUBLE

#### DE HANEMANN MODIFICADO POR MOSCATI.

Pongase en una redoma de vidrio.

De muriate de mercurio. . . . . IV dracmas.

De disolucion de sosa cáustica . . IV onzas.

Coloquese la redoma sobre cenizas calientes, durante media hora, la sal, de blanca y cristalina, se pone negra, se oxida y empieza á reducirse en polvo.

Este mercurio oxidado ad minimum, se dá á la dosis de dos, cuatro, ó seis granos, ya en polvo ya en pildoras en las enfermedades venéreas. El Dr. Franch ha obtenido sucesos en casos desesperados asociandolo á la quina ó al opio, segun las circunstancias.

#### MERCURIO SOLUBLE.

*Segun el método del profesor Moretti.*

Se toman seis onzas de ácido sulfúrico concentrado

y cinco onzas de mercurio purificado, se ponen estas dos sustancias en una retorta de vidrio que se coloca en el baño de arenas, se le adopta un recipiente y se procede á la destilacion.

Se vá aumentando el fuego por grados hasta que no se desprendan vapores: es oportuno advertir que hácia el fin de la operacion el fuego debe ser un poco fuerte á fin de que todo el sulfato mercurial llegue al maximum de oxidacion. Concluida esta primera operacion se deja resfriar la vasija y se saca la sal de la retorta, se echa esta sal en un mortero de vidrio ó de marmol, y se tritura con otras cinco onzas de mercurio metálico hasta que se combine completamente.

Se hierve la masa pardusca que resulta con s. q. de lejia cáustica ó potasa pura disuelta en agua, despues se filtra el todo: si el oxide contiene aun un poco de sulfato de mercurio sin descomponer se le hace hervir de nuevo con la potasa, hasta que tomando una pequeña porcion del oxide de mercurio y haciendole hervir con el ácido acético se disuelva completamente en este ácido, entonces se lava bien el precipitado con el agua pura y se seca á la sombra.

#### REMEDIO CONTRA LA TENIA. (1)

De raiz de elecho macho. . . . . IV onzas.

De agua comun . . . . . III libras.

Hágase hervir hasta que la decoccion se reduzca á dos libras, y agréguese.

De jarave de coralina de Córcega . . II onzas.

Tal és la bebida de que hará uso el enfermo.

Tres horas despues de la comida tomará el bolo siguiente.

De muriate de mercurio dulce . . } a. II granos.

De cuerno de ciervo calcinado . . }

De conserva de rosas q. s.

En la tarde se dá una onza de aceite de almendras dulces, la mañana siguiente tomará el enfermo un purgante compuesto de

Escamonea en polvo . . . . . XVIII granos.

De raiz de elecho macho pulverizado. I onza.

(1) Esta fórmula es extractada de los elementos de terapéutica y de materia médica del Dr. Alibert.

De goma guta. . . . . } a. XIX granos.  
De mercurio dulce. . . . . }

Este purgante se divide en tres tomas.

Se modifica el remedio segun la edad del enfermo y segun que la tiña resiste mas ó menos á su accion.

#### REMEDIO DEL Dr. BARLOW.

*Contra la tiña.*

De sulfureto de sosa reciente. . . . . III onzas.  
De jabon medicinal . . . . . I  $\frac{1}{2}$  dracma.  
De agua de cal. . . . . VIII  $\frac{1}{2}$  onzas.  
De alcohol rectificado. . . . . II dracmas.

Mézclése exactamente y filtrése.

Se lava muchas veces la cabeza del enfermo con esta agua mañana y tarde, se le deja secar sin tocarle. Las costras se levantan, caen y dejan las partes subyacentes enteramente sanas: no hay necesidad de cortar los cabellos ó sajar la cabeza para hacer uso de esta agua.

#### REMEDIO DEL Dr. BICKER.

*Contra la tiña.*

De azufre dorado de antimonio. . . }  
De mercurio dulce. . . . . } a. partes iguales.  
De azucar blanca. . . . . }

Se dá este polvo á la dosis de medio á un grano mañana y tarde.

Se hacen igualmente fricciones mañana y tarde en las partes afectas con el unguento siguiente.

De cardenillo. . . . . }  
De mercurio dulce . . . . . } a. I escrúpulo.  
De pomada reciente. . . . . } X dracmas y II es-  
crúpulos.

Las costras caen con prontitud frotandolas con una brocha ordinaria. Se lavan en seguida los niños con el agua tibia con un poco de jabon y del sulfureto de potasa. Se ordena una dieta conveniente.

Cuando ha desaparecido la tiña debe lavarse la cabeza durante largo tiempo, con una disolucion tibia del carbonato de potasa.

REMEDIO ANTI-SPÓRICO DEL Dr. JADELOT.

Este remedio es un baño sulfuroso muy análogo al del agua de Vallatria artificial; pero mas simple.

Se compone con el sulfureto de potasa seco ó líquido.

Si se emplea el sulfureto seco la proporción es de gramma por arroba de agua, ó cuatro ó cinco onzas por ciento cincuenta libras de agua, quiere decir, setenta y cinco azumbres.

Si se usa el sulfureto líquido señalando treinta y cinco grados en el arcometro, de las sales se echan ocho onzas ó doscientas cincuenta y seis grammas en nueve ó diez cubos de agua.

Los enfermos afectados de sarna reciente ó antigua se curan regularmente despues de haber tomado cinco, diez ó mas de estos baños. Es necesario permanecer en ellos de una á una y media hora.

Deben tener una temperatura de veinte y seis á treinta grados de (Reaumur.)

REMEDIO DEL Dr. CHESTON.

*Contra el cancer de los labios y las úlceras malignas.*

Derrámese sobre cuatro onzas de hojas recientes de laurel real dos libras de agua hirviendo, déjese enfriar y agréguese á la coladura cuatro onzas de miel colada.

Esta composición se aplica al exterior en locion y por medio de compresas.

REMEDIO DE LA CARIDAD.

*Para el cólico de los pintores.*

Cuando la enfermedad es reciente (importa mucho atacarla desde los principios) se pone al enfermo una lavativa compuesta con suficiente cantidad de buen vino y de aceite de nuez mezclados y bien batidos. Una ó dos horas despues se le pone otra compuesta de este modo.

De sén. . . . . II dragmas.

De electuario de diafenicon. . . . I onza.

De benedicta laxativa. . . . . IV dracmas.

De miel mercurial. . . . . II onzas.

La pulpa de una coloquintida.

Se hierven todas estas sustancias en un azumbre de agua y se cuele.

Despues del efecto de esta lavativa se repite la del aceite y el buen vino. El día siguiente se hace vomitar al enfermo con tres ó cuatro granos de emético lavado, y en seguida de la acción del vomitivo se le hace tomar una dracma de la triaca con un grano de láudano opiado.

Al tercero dia de enfermedad se repiten las lavativas y se le hace vomitar de nuevo, el cuarto dia se purga con la medicina siguiente.

De sén. . . . . } a. I onza.

De tamarindo. . . . . } a. I onza.

De sal de epton. . . . . } a. I onza.

De cremor de tártaro . . . . . II idem.

Se hierve el todo en una pinta de agua, se cuele y se disuelve en la coladura.

De electuario de diafenicón. . . . . } a. IV dracmas.

De jarave de espino serval . . . . . } a. IV dracmas.

Se da esta pocion purgante en muchos vasos á tres cuartos de hora de distancia uno de otro en la mañana.

Se sostendrán los remedios que acabamos de indicar con la media dracma de teriaca y el grano de laudano opiado dado todas las tardes y por la tipsana sudorífica siguiente. (1)

De palo de guayacán . . . . . } a. II idem.

De zazafras. . . . . } a. II idem.

De raiz de china . . . . . } a. II idem.

De zarzaparrilla . . . . . } a. II onzas.

De bardana . . . . . } a. II onzas.

(1) Segun M. Merat de Raumarroire la tipsana sudorífica laxante debe componerse del modo siguiente.

De guayaco, raiz de china y zarzaparrilla. . . . . } De cada cosa una dracma.

Hiérvase durante una hora en tres pintas de agua, reduzcase á dos y agréguese

De zazafras. . . . . I onza.

De sén y regalís. . . . . De cada cosa  $\frac{1}{2}$  onza.

Hiérvase ligeramente y cuelese. (Véase disertacion sobre cólico metálico por M. Merat 1 volum. en octavo. París 1813 en casa de Rigot librero).

Se macerará el todo durante doce horas en una vasija de barro barnizado y en tres azumbres de agua que se dejará hervir y reducir á dos.

Los enfermos beberán muchos vasos al dia.

Cuando las fuerzas del enfermo están muy abatidas se dará tambien la pocion cordial siguiente.

De agua de mellisa simple . . . . .	} a. I onza.
De cardo bendito . . . . .	
De las tres nueces . . . . .	II idem.
De confecion de jaciutos . . . . .	III dracmas.
De jarave de claveles . . . . .	I onza.

M.

La dosis de esta pocion es una cucharada ordinaria por hora.

Cuando se ha atacado á la enfermedad desde los primeros dias de su existencia se obtiene las mas veces la curacion al fin de una semana. Si entonces no están enteramente calmados los dolores es preciso continuar la marcha que acabamos de indicar y repetir los purgantes con toda la frecuencia que permitan las fuerzas del enfermo.

En los dias de intermedios de las purgas se pueden dar los bolos siguientes.

De aloes sucotrina . . . . .	} a. X granos.
De extracto de ruibarbo . . . . .	
De eleboro . . . . .	} a. XIV idem.
De diagridio (1) . . . . .	
De jalapa . . . . .	I idem.

De jarave de espino serval q. s. para hacer cinco ó seis bolos, que el enfermo la vispera del purgante tomará.

#### REMEDIO DE QUARIN.

Contra la disenteria.

De polvo de salicaria . . . . .	I½ dracma.
De agua de flores de amapolas . . . . .	XVI onzas.
De jarave de altea . . . . .	I idem.

Se agita la mezcla y se toman tres y media onzas cada tres horas.

En el principio y cuando se trata de demulcir.

(1) Diagrídio — Diagrídio = Escamonea preparada con el zumo de limon.

**OTRO DEL MISMO EN LA DISENTERIA MALIGNA.**

De agua de torongil. . . . . VIII onzas.

De cachunde (1). . . . . III dracmas.

De alcanfor triturado con goma arábica. . . . . } VIII granos.

De jarave de kermes. . . . . I onza.

Se dá á cucharadas de hora en hora.

Cuando el cuerpo ha sido convenientemente purgado; y no hay inflamacion.

**OTRO DEL MISMO CUANDO LOS PRECEDENTES SON**

**INSUFICIENTES.**

De conserva de rosas encarnadas. . . . . } a. VI dracmas.

De jarave de arrayán. . . . . } a. VI dracmas.

De polvo de raiz de tormentila . . . . . I idem.

De hipecacuana. . . . .  $\frac{1}{2}$  idem.

De opio purificado. . . . . IV granos.

Mézclese exactamente.

Se toma una dracma cada hora ó cada dos horas.

Cuando las cámaras son casi colicuativas.

**REMEDIO CONTRA EL ENVENENAMIENTO POR LOS**

**HONGOS.**

Publicado por órden de Mr. el prefecto de policia sobre la declaracion del consejo de Sanidad.

**Extracto.**

La primera indicacion que debe llenarse es la de la salida de los hongos venenosos. Así es que debe emplearse un vomitivo tal como el tártaro emético; pero para que este remedio

(1) Cáchou; ó cachunde; mezcla del almizcles ambar, orosur que con el catecú, y el mucilago de tragacanto forman para hacer polvos ó trociscos.

sea eficaz es necesario darlo á una dosis suficiente, y asociarlo á una sal propia á excitar la accion del estómago á diluir y dividir el humor gleroso y mucoso, cuya secrecion se hace mas abundante por la impresion de los hongos.

Se disolverá pues en medio azumbre de agua caliente cuatro ó cinco granos de tartarite de potasa antimoniada con dos ó tres dracmas de sulfato de sosa.

Se hará beber al enfermo esta disolucion á vasos tibios con mas ó menos frecuencia, aumentando la dosis hasta que haya evacuaciones. En los principios el vómito es suficiente algunas veces para arrastrar los hongos y calmar los accidentes, pero si se han diferido los socorros convenientes, sino se han presentado los accidentes sino mucho tiempo despues de haberlos comido, se debe presumir que parte de los hongos venenosos han pasado á los intestinos, en cuyo caso es necesario recurrir á los purgantes, á las lavativas hechas con la casia, el sén y alguna sal neutra para determinar evacuaciones prontas y abundantes. Se empleará en este caso con suceso una mistura hecha con aceite de resino y jarave de durazno, que se aromatizará con algunas gotas del licor anodino de Hoffman, y que se tomará á cucharadas con mas ó menos apróximacion.

Despues de estas evacuaciones que son de una necesidad indispensable, es necesario para remediar los dolores é irritacion producida por el veneno recurrir al uso de los mucilaginosos y demulcentes que se asociarán á los fortificantes y nervinos.

Tambien se prescribirán á los enfermos el agua de arroz gomada, una ligera infusion de flores de sauco mediadas con leche, á la que se agregará el agua de azahar, el agua de yerbabuena simple y un jarave. Se emplearán tambien con ventajas las emulciones, las pociones oleosas aromatizadas con una cierta cantidad de eter sulfúrico. En algunos casos hay precision de recurrir á los tónicos, á las pociones alcanforadas, y cuando haya tension dolorosa de vientre, será preciso emplear las fomentaciones emolientes, y á veces aun los baños y sangrias, pero el uso de estos remedios solo debe determinarse por el médico que los modificará segun las circunstancias particulares; por que la eficacia del tratamiento consiste esencialmente, no en los específicos ó antidotos de que se abusa muchas veces, y sí en la justa y competente administracion de los remedios simples igualmente bien conocidos.

REMEDIO DEL Dr. MEGLIN.

Para curar el tic (1) doloroso de la cara.

- De extracto de beleño negro . . . . .
- De raíz de valeriana silvestre. . . . .
- De oxido de zinc sublimado. . . . .

} a. II escrúpulos.

Háganse segun arte píldoras de tres granos.

Empezarán los enfermos por una y sucesivamente aumentarán hasta seis, despues hasta ocho mañana y tarde, teniendo cuidado de contener la progresion cuando ellas causan nauseas. Se continúa en seguida la misma dosis mañana y tarde hasta que hayan calmado los dolores.

REMEDIO DE PURMANN.

Contra los tumores blancos de las articulaciones.

- De solucion de muriate de sosa. . . . . II libras.
- De vinagre concentrado . . . . . I idem.
- De hojas de salvia. . . . . II puñados.
- De sulfate de cobre . . . . . XII dracmas.
- De sulfate de alumbre . . . . . V½ idem.

Hiérvase la mezcla por media hora.

Se aplica tibia al rededor de la articulacion tumefacta.

REMEDIO ANTI-LACTISINOSO DEL Dr. WEISS.

- Gallium lecteum . . . . .
- De flores de sauco . . . . .
- De hipericon . . . . .
- De tila . . . . .
- De hojas de sén . . . . .
- De sulfate de sosa . . . . .

} a. I escrúpulo.

} a. I dracma.

(1) Los franceses llaman tic á una enfermedad de los caballos que consiste en morder los pesebres, á mi me ha parecido aplicarla al trismo. = El Traductor.

Se infunda todo en medio azumbre de suero hirviendo, al cabo de una hora se cuéla el licor.

El enfermo toma este remedio por la mañana en tres vasos con media hora de distancia por espacio de doce ó quince dias.

#### REMEDIO ODONTÁLGICO DE VOGLER.

De almáciga. . . . .	} a. II drácmas VIII
De oro pimentel. . . . .	
De sangre de drago electa . . . . .	XXXVI granos.
De opio desecado. . . . .	I onza.
De aceite volatil de romero. . . . .	VIII gotas.
De espíritu de coclearia q. s.	

Despues de haber pulverizado separadamente la almáciga, el oro pimentel, la sangre de drago y el opio se les humedece con el aceite volatil de romero, se les agita en un mortero de marmol agregando poco á poco el espíritu de coclearia en suficiente cantidad para formar una masa uniforme de consistencia mole, emplástrica y semi-ductil.

Se usa contra los dolores de muelas extendiendo sobre la encia una porcion de esta masa emplástrica del grueso de un guisante.

#### REMEDIO ANTI-VENEREO DEL Dr. PETRICHE.

De hojas de torongil. . . . .	IV onzas.
De hojas de sén. . . . .	$\frac{1}{2}$ idem.
De agua comun . . . . .	XXIV libras.
Infúndase á un dulce calor en una vasija tapada durante una hora, cuélese y tómesese. . . . .	
De la infusion dicha. . . . .	I idem.
Disuélvase en ella de azucar blanca. . . . .	IV onzas.
Póngase este medio jarave en una botella de medio azumbre y agréguese. . . . .	
De carbonate de amoniáco puro . . . . .	} I dracma ó dracma y media.

Se divide segun las circunstancias esta cantidad en cuatro dosis ó en mas.

REMEDIO CONTRA LA TENIA.

Publicado por orden del colegio de médicos de Prusia.

A.

De limaduras de estaño puro de } I onza.  
 De cornualia . . . . . }  
 De polvos de raíz de helecho macho VI dracmas.  
 De semillas de ajénjos de judea . . IV idem.  
 De polvos de raíz de jalapa . . . . } a. I idem.  
 De sulfate de potasa . . . . . }  
 De miel q. s. para dar á la mezcla la consistencia  
 de electuario.

M. S. L.

B.

De raíz de jalapa en polvo . . . . } a. II escrúpulos.  
 De sulfate de potasa . . . . . }  
 De polvos de escamonea de alep. . I escrúpulo.  
 De goma guta en polvo . . . . . X granos.  
 De miel q. s.

El enfermo debe tener una dieta durante el uso de este remedio, evitar los alimentos salados y no tomar mas que pan, sustancia de pan y legumbres ligeras.

Se dá cada dos horas una cucharada de tomar café del electuario A, y se continúa de este modo por dos ó tres dias hasta que experimente en los intestinos las sensaciones determinadas ordinariamente por la presencia de la lombriz.

Entonces se hace tomar el electuario B. del mismo modo que el precedente hasta que se arroje la lombriz. En el caso en que esta expulsion no tenga lugar se le excita por medio de algunas cucharadas del aceite de resino ó bien se pone una lavativa con una onza de dicho aceite.

Se debe en general reglar la dosis de estos remedios segun la edad, el sexo y la constitución del enfermo.

REMEDIO DEL Dr. KUTTINGER

Contra la tenia.

Este remedio es el mismo que el de Mr. Mathieu far-

maceútico de Berlin; consiste en dos electuarios. Se compone el primero del modo siguiente.

- |   |              |
|---|--------------|
| De limaduras de estaño puro . . . . .     | I onza.      |
| De raiz de helecho macho . . . . .        | VI dracmas.  |
| De semillas de ajenjos de judea . . . . . | IV idem.     |
| De raiz de jalapa en polvo . . . . .      | } a. I idem. |
| De sulfate de potasa . . . . .            |              |

Se dá este electuario de dos en dos horas á la dosis de una cucharada de café; se pone al enfermo á cubierto de un alimento salado y muy nutritivo. Despues de tres dias de este tratamiento se dá el segundo electuario compuesto de

- |  |                     |
|--|---------------------|
| Jalapa pulverizada . . . . .           | } a. II escrúpulos. |
| De sulfate de potasa . . . . .         |                     |
| De raiz de escamonea de alep . . . . . | I idem.             |
| De goma guta . . . . .                 | X granos.           |
| De miel q. s.                          |                     |

Se administra este electuario como el primero con atencion siempre á la edad y fuerzas del enfermo.

#### REMEDIO.

*Contra los accidentes ocasionados por las setas dañosas.*

- |   |             |
|---|-------------|
| De aloes sucotrinno P. P. . . . .           | XX dracmas. |
| De mirra . . . . .                          | XII idem.   |
| De resina de guayaco . . . . .              | X idem.     |
| Métanse estas sustancias cada una aparte en |             |
| Aguardiente á 22° . . . . .                 | I libra.    |

Agitense con frecuencia las botellas durante doce ó quince dias, en seguida decantense los licores y mézclense. (1)

Luego que se resienta la menor incomodidad despues de haber comido las setas se toma un vaso de los que se usan para licor, de este remedio y cada vez que se vomite se toma un medio vaso. Algun tiempo despues que ha cesado el vómito se toma té con mucha azucar. Conviene tambien este elixir en las indigestiones y cólicos del estómago y bajo vientre, en la supresion de las reglas por debilidad y de la trans-

(1) Las heces de esta mezcla son buenas para curar las heridas y contusiones.

piracion. Es vulnerario y se emplea contra la gota y dolores reumáticos.

**REMEDIO.**

*Contra el ptyalismo.*

De sulfato de sosa . . . . . L partes.  
De carbón . . . . . X idem.  
De azufre . . . . . VI idem.

Fúndase en un crisol cubierto, lávese, filtrese, y cristalice.

Se dá este remedio á la dosis de un escrúpulo repetido cuatro veces al dia. Hace cesar la excesiva salivacion causada por el mercurio.

Se emplea tambien en las enfermedades crónicas del hígado.

**JABON MERCURIAL DEL Dr. CHAUSSIER.**

De unguento mercurial doble . . . III½ onzas.  
De solucion de sosa cáustica . . . III idem.

Se pone en un mortero de vidrio el unguento mercurial. Se le tritura en el, echando poco á poco la solucion de sosa, se continua, la trituracion hasta que la mezcla haya adquirido la mayor tenacidad, entonces se le pone en un molde ó caja de cartón y adquiere con el tiempo la consistencia que le es propia.

Sirve este jabon para hacer con el fricciones en las enfermedades venereas, psóricas y herpéticas.

**JABON ACETICO ETEREO DEL Dr. PELLETIER.**

De jabon animal . . . . . I dracma.  
De éter acético . . . . . I onza.

Disuélvase el jabon en el éter acético al calor del baño de Maria y filtrese.

Se emplea este jabon en fricciones en los dolores reumáticos.

**SAL DE GUINDRE.**

De sulfato de sosa en polvo . . . VI dracmas.

De nitrato de potasa . . . . . XII granos.  
 De emético . . . . .  $\frac{1}{2}$  grano.  
 Para una dosis.  
 Se funde ó disuelve esta mezcla en un azumbre de tip-  
 sana ó caldo de yerbas para purgarse.

*JARAVE PECTORAL DULCIFICANTE DEL Dr. SELLE.*

De jugo de orozuz. . . . . I onza.  
 De agua destilada de manzanilla. . . II libras.  
 De jarave de altea. . . . . VIII onzas.  
 Se dá este jarave en la tisis cuando hay mucha sen-  
 sibilidad en el parings. Lubrifica las partes y favorece la ex-  
 pectoracion.

*JARAVE PECTORAL RESOLUTIVO DEL MISMO.*

De goma amoniaco. . . . . } a. II dracmas.  
 De muriate de amoniaco. . . . . }  
 De oximiél scilítico . . . . . I onza.  
 De vino emético. . . . . II dracmas.  
 De jarave pectoral indicado arriba. VIII onzas.  
 Se dá este jarave con suceso en la tisis siempre que  
 la expectoracion se hace con dificultad, que es fuerte la fiebre,  
 y el vientre está bastante libre. La dosis es una cucharada  
 cada hora.

*JARAVE PECTORAL PARA LA COQUELUCHE.*

De oximiél scilítico . . . . .  $I\frac{1}{2}$  onza.  
 De jarave de hipecacuana . . . . . } a. II idem.  
 De diacodion . . . . . }  
 De azahar . . . . . IV dracmas.  
 Se toma este jarave á la dosis de dos cucharadas de  
 hora en hora en una taza de infusion de las cuatro flores pec-  
 torales.

*OTRO CITADO POR RIVET.*

De quina electa . . . . . } VI onzas y II drac-  
 mas.

De sumidades de centaurea menor . . . . .	} I onza y $IV\frac{1}{2}$ dracmas.
De sên de la Paltha. . . . .	
De raiz de orozuz . . . . .	} a. IX onzas y III idem.
De anis verde . . . . .	
De flores de sauco . . . . .	} III onzas y I dracma.
De hipecacuana. . . . .	
De extracto gomoso de opio . . . . .	V dracmas.
De azucar blanca . . . . .	$IV\frac{1}{2}$ idem.
De agua comun q. s.	VIII libras.

Hágase una infusion prolongada de todas estas sustancias excepto del opio y de la azucar. Cúelese con expresion, disuélvase en seguida la azucar y el opio y acábese s. a.

La dosis es desde una cucharada de café hasta una ordinaria en media taza de infusion de hisopo.

#### JARAVE PECTORAL INGLÉS.

De agua . . . . .	XVI libras.
De dátiles. . . . .	II idem.
De azufaifas. . . . .	I idem.
De raiz de altea . . . . .	IV onzas.
De raiz de orozuz. . . . .	VIII idem.
De culantrillo de canada . . . . .	} a. IV idem.
De cabezas de adormideras blancas.	

Hágase una decoccion, cúelesele y agréguesele ocho libras de azucar y evapórese hasta la consistencia de jarave.

#### JARAVE PECTORAL BALSÁMICO DE CHARLES.

De hipecacuana contundida . . . . .	$II\frac{1}{2}$ dracmas.
De vino tinto de borgoña . . . . .	I libra.
De infusion de amapolas . . . . .	I idem y II onzas.
De extracto de opio . . . . .	XX granos.
De infusion alcoholica de bálsamo de toli . . . . .	} III dracmas.
De azucar contundida. . . . .	

Se dá á la dosis de una á una y media onza en una taza de infusion pectoral. Conviene en las toses tenaces, en el coqueluche y en los catarros agudos.

\*

**JARAVE PECTORAL DE BOUVART.**

De pasas de corinto . . . . .	II libras.
De azucar . . . . .	III½ idem.
Asaduras de becerro . . . . .	núm. 2.
De goma arábica . . . . .	IV onzas.
De agua . . . . .	VI azumbres.

Se hierve el todo por espacio de seis horas, se cue-  
la y se evapora hasta la consistencia de jarave. Se toman dos  
cucharadas ordinarias mañana y tarde en una taza de agua tibia.

**JARAVE DEL Dr. DESESSARTS.**

*Contra la tos de los niños.*

De hipecacuana . . . . .	I onza.
De sén mondado . . . . .	III idem.

Macérese por dos horas en veinte y cuatro onzas de  
vino blanco, decántese, fíltrese el licor separadamente.  
Agréguese al residuo.

De sulfate de magnesia . . . . .	III idem.
De sumidades de serpol . . . . .	I idem.
De flores de amapolas . . . . .	IV idem.
De agua hirviendo . . . . .	VI libras.

Déjese cuatro horas en infusion, decantese, fíltrese el  
licor al que se le agregará.

De agua de azahar . . . . .	II libra.
De azucar blanca . . . . .	XV idem.

Y el vino blanco de la maceracion.

Mezclése y disuélvase en frio. La dosis es de una á  
dos onzas.

**JARAVE DEL Dr. GARDANNE.**

*Contra la tos.*

De hipecacuana contusa . . . . .	} V dracmas y I } escrúpulo.
De vino blanco . . . . .	

Infúndase por un cuarto de hora y agreguese

De sén . . . . .	IV onzas.
------------------	-----------

Contínuese la infusion durante dos horas y agréguese

- De serpol . . . . . VI dracmas.  
 De cortezas de naranjas agrias . . . Vid. y I escrúpulo.  
 De sal vegetal . . . . . IV onzas.  
 De agua hirviendo . . . . . IV libras.  
 Déjese en infusion por cuatro horas, cuélese y agréguese  
 De jarave de altea . . . . . II libras.  
 De agua de azahar . . . . . XII onzas.

Se dá este jarave á los niños á la dosis de dos cucharadas de café al día, la primera una hora antes del desayuno, y la segunda una hora antes de comer.

#### JARAVE DE COCHINILLAS.

- De raices de espárragos . . . . . }  
 De orozuz . . . . . } a. II dracmas.  
 De pasas . . . . . }  
 De hojas de parietaria . . . . . }  
 De malvas . . . . . }  
 De azucar . . . . . XII onzas.

Hágase un jarave, despues agréguese

- De jugo de borraja . . . . . } a. II idem.  
 De buglosa . . . . . }  
 De cochinillas . . . . . I½ idem.

Se machacan las cochinillas, se le diluyen en el jugo, y se les filtra. Sobre cuatro onzas de este jugo agréguese

- De azucar . . . . . VIII onzas.

Fúndase en el baño de Maria y mézclese este jarave con el primero.

Conviene en la tos y coqueluche de los niños.

#### JARAVE PECTORAL DEL Dr. MALOET.

- De azufaiñas . . . . . }  
 De dátiles . . . . . } a. I onza.  
 De ubas de corinto . . . . . }  
 De raiz de orozuz . . . . . II dracmas.  
 De culantrillo . . . . . IV idem.  
 De extracto de opio . . . . . VI granos.  
 De azucar prieta . . . . . II libras.

Hágase un jarave s. a.

Se dá á la dosis de una onza en una taza de una infusion pectoral.

## JARAVE DE HIGADO DE AZUFRE.

De sulfureto de potasa . . . . .	II dracmas.
De agua de hinojo . . . . .	VIII onzas.
De azucar . . . . .	I libra.

F. S. A.

Este jarave debe contener seis granos de sulfureto de potasa en cada onza.

Se dá en los herpes, en las enfermedades de la piel, la angina inflamatoria, los catarros y la tisis pulmonal.

La dosis es de media á una onza.

## JARAVE DE COCINERO.

De zarzaparrilla . . . . .	II libras.
De flores de borraja . . . . .	} a. II onzas.
De rosa . . . . .	
De sén. . . . .	} a. II dracmas.
De anís. . . . .	
De miel. . . . .	IV libras.

El médico agrega á este jarave la cantidad de sublimado corrosivo que juzgue necesaria desde tres granos hasta ocho.

Se designa el número de granos con el nombre de cochura, así se dice de jarave de la tercera de la cuarta cochura para decir que contiene tres ó cuatro granos de sublimado.

## JARAVE DEPURATIVO DEL Dr. LARRET.

De jarave de zarzaparrilla . . . . .	} a. III libras.
De cocinero . . . . .	
De sublimado corrosivo . . . . .	} a. XX granos.
De amoniaco . . . . .	
De extracto gomoso de opio . . . . .	
De licor mineral de Hofman . . . . .	II dracmas.

Se dá este jarave á la dosis de una onza por la mañana en ayunas, una taza de cocimiento de zarzaparrilla.

Conviene en las afecciones venereas constitucionales ó degeneradas, en las enfermedades herpéticas y otras afecciones de la piel.

*JARAVE CONTRA LA COQUELUCHE POR BOULLAT.*

De hipecacuana en polvo. . . . . IX dracmas.

De quina en polvo. . . . . VI onzas.

De opio en bruto. . . . . I dracma.

Prepárese en la s. q. de agua fría para quitar las partes solubles y hágase disolver en el licor filtrado.

De azucar. . . . . VI libras.

Evapórese en seguida al calor del baño de Maria hasta la consistencia de jarave.

Se dá este jarave desde una cucharada de café hasta una ordinaria, repetido muchas veces al dia segun la edad de los niños.

*JARAVE VERMIFUGO DE BOULLAT.*

De musgo de Córcega lavado. . . . XII onzas.

Hiervase con la s. q. de agua para espesarlo, cuélese.

Agréguese media botella de vino blanco, una clara de huevo, cuatro libras de azucar y una mezcla de

36 granos de cochinillas y

24 idem de alumbre.

Désele un hervor, fíltrese y hágasele cocer hasta la consistencia conveniente.

Se dá este jarave á cucharadas, extendiendolo en un volumen de agua.

*JARAVE ANTI-ARTRÍTICO Y ANTI-HIDRÓPICO.*

De escamonea pulverizada. . . . . IV dracmas.

De azucar en polvo . . . . . IV onzas.

De aguardiente refino . . . . . VIII idem.

Colóquese el todo en una vasija conveniente, enciendase el aguardiente y déjese quemar la materia agitandolo de tiempo en tiempo.

Cuélese con expresion al través de un lienzo y agréguese cuatro onzas de jarave de violetas. La dosis es de una á dos dracmas en seis onzas de agua de peregil.

*JARAVE DEPURATIVO AMARGO DEL Dr. BOVILLON DE LA GRANGE.*

De raiz de rábano . . . . . II libras.

- Seca de genciana . . . . . I libra.  
 De hojas de coclearia . . . . . III idem.  
 De trebol febrino . . . . . II idem.  
 De vino blanco . . . . . XVI idem.  
 Macérese por algunos dias y entonces póngase  
 De azucar . . . . . I libra XII onzas.  
 Del mismo vino dicho arriba . . . I libra.

Hiérvase á un dulce calor.

Se unirá á cada libra de este jarave una onza de jarave hecho con el espíritu de coclearia.

Este jarave depurativo menos calefaciente que el jarave anti-escorbutico de Codex, se prescribe en los mismos casos y á las mismas dosis.

#### JARAVE VINOSO CARDIACO DE WIRTEMBERG.

- De canela de Ceilan . . . . . III dracmas.  
 De clavos de comer . . . . .  $\frac{1}{2}$  idem.  
 De gengibre . . . . . I escrúpulo.  
 De agua de rosas . . . . . }  
 De vino generoso . . . . . } a. XIII dracmas.  
 De azucar blanca . . . . . }

Se infunden las sustancias aromáticas en un balon con el agua de rosas y el vino blanco por treinta ó treinta y seis horas. Se filtra en seguida el licor y se disuelve el azucar al calor del baño de Maria.

Se dá este jarave á la dosis de una ó dos onzas en la convalecencia de las enfermedades adynamicas, en la tendencia á la caquexia, en una palabra, en todos los casos en que se quieren animar las fuerzas del sistema digestivo. Se extiende este jarave en una infusion apropiada.

#### JARAVE PURGANTE DE Mr. MAJAUTT.

- R. De jabonera . . . . . IV onzas.  
 De ballas de enebro . . . . . }  
 R. De alcaparras . . . . . } a. II dracmas.  
 De china . . . . . }  
 De aro . . . . . I onza.  
 De hojas de arnica . . . . . }  
 De trebol febrino . . . . . } a. IV idem.  
 De fumaría . . . . . }

De flores de sauco. . . . . }  
 De rasuras de guayaco . . . . . } a. II onzas.  
 De sasafra . . . . . }  
 De vino tinto. . . . . XII azumbres.

Hiérvase y agréguese.

De azucar prieta. . . . . XV libras.

Se cuele y se evapora hasta la consistencia de jarave.  
 Cuando está concluido el jarave se le agrega á cada  
 azumbre media dracma de álcali volatil.

Se dá desde dos dracmas hasta onza y media en las  
 enfermedades escrofulosas, herpéticas, psóricas y sífilíticas.

#### JARAVE DE BELET.

De nitrato de mercurio perfecta-  
 mente puro y hecho al frío. . . I  $\frac{1}{2}$  dracma.

De eter nítrico rectificado. . . . .  $\frac{1}{2}$  idem.

De jarave de azucar blanca. . . . . I libra.

Se deshace el nitrato de mercurio en un mortero de  
 vidrio con la menos agua posible y se mezcla esta solución con  
 el jarave frío y el eter nítrico, agitandolo en la botella donde  
 se debe conservar.

Esta fórmula es la que Mr. Bovillon Lagrange ha pu-  
 blicado en el boletín de farmacia y es la mas exacta.

Se dá este jarave de Belet á la dosis de una cucha-  
 rada ordinaria por la mañana en medio vaso de agua.

#### JARAVE DE MERCURIO GOMOSO DEL Dr. LAGNEAU.

De mercurio vivo. . . . . I escrúpulo.

De goma arábica. . . . . I dracma.

De jarave de chicorias con ruibarbo q. s.

Tritúrese en un mortero de vidrio, y cuando el mer-  
 curio esté bien dividido y mezclado á las otras sustancias agré-  
 guese.

De jarave de chicorias con ruibarbo. I  $\frac{1}{2}$  onza.

#### JARAVE ANTI-ESCORBUTICO DEL Dr. PORTAL.

De raiz de genciana. . . . . IV dracmas.

De rubia . . . . . } a. II idem.

De quina . . . . . }

De raiz de rábano silvestre. . . . .  $\frac{1}{2}$  onza.  
 De berro de fuente. . . . . } a. q. s.  
 De coclearia. . . . . }  
 De muriate oxigenado de mercurio. II granos.

Se hacen hervir las raices con la quina en dos libras de agua hasta que se reduzcan á una, se cuele la decoccion y se agrega libra y media de azucar, se clarifica con dos claras de huevo, se hace hervir esta mezcla hasta la consistencia de jarave y se cuele.

De otra parte se machacan en un mortero las hojas de berros, de coclearia y las raices de rábanos, se exprimen para sacar seis onzas de zumo que se filtran en frio, se agrega onza y media de azucar pulverizada, se calienta al baño de Maria hasta que el azucar se disuelva, se cuele y se agrega este jarave al primero.

Por último se disuelve el sublimado en cerca de una dracma de alcohol y se mezcla exactamente con el jarave.

Se dá este jarave á la dosis de una onza á dos en una tipsana apropiada, conviene en las enfermedades de la piel, en las afecciones escrofulosas, escorbúticas y en las enfermedades venéreas inveteradas.

#### JARAVE VERMÍFUGO Y PURGANTE.

De sén. . . . . I onza.  
 De raices de agenjos de Judéa. . . }  
 De carolina de Córcega . . . . . } a. IV idem.  
 De ruibarbo. . . . . }  
 De cortezas de naranjas . . . . . II idem.  
 De canela. . . . . I idem.  
 De azucar. . . . . XXVI libras.

Se dá este jarave á la dosis de una á una y media onza.

#### JARAVE ANTI-ASMÁTICO.

De goma amoniaco electa. . . . . II onzas.  
 De vino de chablis primera cualidad. VIII idem.

Despues de haber molido la goma amoniaco se le disuelve en el vino triturandola en un mortero de marmol, se cuele al través de un lienzo, se pone el vino en el baño de Maria con una libra de azucar, y se calienta hasta la consistencia de jarave.

Se dá este jarave desde una dracma á una onza.

JARAVE DE WILLIS.

- De sulfureto de potasa. . . . . II onzas.
- De vino de España . . . . . III libras.
- De azucar . . . . . II idem.

Se digiere por el espacio de veinte y cuatro horas el sulfureto de potasa en el vino, en seguida se filtra y se disuelve el azucar. Se evapora el jarave en el baño de Maria hasta la consistencia competente.

Se dá este jarave á la dosis de una cucharada ordinaria mañana y tarde en las flemacias del pecho. (1)

JARAVE CALIBEADO DE WILLIS.

- De sulfate de fierro muy verde. . . I onza.
- De agua hirviendo. . . . . VIII idem.
- Hecha la disolucion y filtrado agréguese.
- De goma arábica. . . . . II dracmas.
- De azucar blanca. . . . . I libra.

Hágase un jarave s. a.

Se emplea como tónico y abstringente en la clorosis, la hidropesía, las cachexias y la leucorrea. La dosis es de una á dos onzas.

SOLUCION ANTI-VENEREA DE WEIKAR.

- De sublimado corrosivo. . . . . } De cada cosa  $\Lambda$ I
- De muriate de amoniaco . . . . . } granos.
- De agua destilada . . . . . II onzas.
- De laudano liquido. . . . . XXXVI gotas;
- De aceite volatil de canela. . . . I gota.

M.

(1) El Dr. Chaussier ha modificado la fórmula de Willis. El juzga con razon que el vino debe descomponer una parte del sulfureto de potasa: él aconseja para preparar el jarave con el agua conforme á las proporciones siguientes.

- De sulfureto de potasa. . . . .  $I\frac{1}{2}$  dracma.
- De agua destilada de hisopo. . . . VI onzas.
- De azucar blanca contundida. . . . X idem.

\*

li-  
le-  
on  
n-  
  
de  
pa-  
ga  
de  
ga  
  
na  
  
en  
el,  
la-  
  
za.  
  
di-  
se  
de  
sis-

Se dá esta solucion á la dosis de treinta á cuarenta gotas mañana y tarde en una agua de goma ó en leche. Conviene con especialidad esta preparacion mercurial á las personas delicadas cuyos estómagos no pueden soportar el licor de Wan Swieten y los otros remedios mercuriales.

### SOLUCION CITRO-MURIÁTICO FEBRÍFUGA

DE BROUSSONET.

Se disuelve muriate de sosa en jugo exprimido de limon hasta la perfecta saturacion y se filtra.

En las fiebres adinámicas se dá á los enfermos una cucharada de hora en hora.

### SOLUCION ARSENICAL DE PRUSIA.

De oxido de arsénico sublimado y bien pulverizado . . . . .	} a. IV granos.
De sub-carbonate de sosa . . . . .	
De agua destilada . . . . .	XII onzas.

Calientese el licor en un baño de arena, filtrése y conservese la solucion en una botella bien tapada.

Los médicos de Berlín lo emplean en las fiebres intermitentes tenaces; no debe tomarse de una vez mas que la vigésima parte de un grano.

NOTA. Las preparaciones arsenicales son tan peligrosas que no se podrán tomar las precauciones suficientes para administrar este remedio.

### SPADRAPO ABSTRINGENTE DE COUSTONAU.

De cerusa . . . . .	} a. $1\frac{1}{2}$ dracma.
De piedra calaminar . . . . .	
De cera amarilla . . . . .	IV onzas.
De aceite de olivas . . . . .	VI idem. (1)

Se liquida sobre un fuego muy suave la cera con el aceite, se le mezclan exactamente los polvos preparados, y se extiende este emplasto sobre unas tiras de lienzo muy fino.

Este spadrapo se usa cuando se quiere disminuir la secrecion muy abundante de las úlceras de los cauterios ó vejigatorios.

**AZUCAR NARANJADA PURGANTE.**

- De jalapa en polvo . . . . . II onzas.  
 De azucar . . . . . XIV idem.  
 De tartitre acidulo de potasa soluble. IV dracmas.  
 De aceite esencial de naranjas. II idem.

Hágase un oleo sacaro y mezclesele la sal y la jalapa.  
 La dosis es de dos á tres dracmas en medio azumbre  
 de naranjada cocida para purgar á las personas que repugnan  
 los medicamentos.

**SUPOSITORIO FORTIFICANTE DE REUSS.**

- De raiz de tormentila . . . . . } a. II dracmas.  
 De corteza de encino . . . . . }

Pulverícense estas sustancias y agréguese la suficiente  
 cantidad de miel para poder hacer ocho supositorios. Se emplean  
 estos supositorios en la proferencia del recto, en la debilidad  
 de este intestino y despues de las hemorragias.

**SUPOSITORIOS CONTRA LAS HEMORROIDES.**

- De alcornoque quemado . . . . . I dracma.  
 De manteca fresca . . . . . II idem.  
 De cera . . . . . I idem.  
 Háganse s. a. tres supositorios.

**TABLILLAS ANTI-CATARRALES DE TRONCHIN.**

- De goma arábica en polvo. . . . . VIII onzas.  
 De kermes mineral. . . . . } a. I idem y I es-  
 De semillas de anís . . . . . } crúpulo.  
 De extracto de orozuz por infusion. II onzas.  
 De azucar blanca . . . . . II libras.  
 De extracto gomoso de opio. . . . . XII granos.  
 De mucilago de goma arquitira q. s.

Háganse segun arte tablillas del peso de seis granos.  
 Se tomarán seis ú ocho en el curso de la mañana.

## TINTURA DE DAFFTS.

De sén . . . . .	I onza.
De jalapa . . . . .	} a. IV dracmas.
De cilantro . . . . .	
De cremor de tártaro . . . . .	
De aguardiente . . . . .	Quartillo y medio.
De azúcar . . . . .	VI onzas.

Se dá este purgante agradable á la dosis de una hasta tres onzas esperando un largo intervalo de una toma á otra.

## TINTURA DE RUIBARBO DE SPIELMANN.

De ruibarbo contuso . . . . .	I onza.
De agua destilada . . . . .	IX idem.
De acetate de potasa . . . . .	I dracma.

Mézclese todo, déjese en infusion por cuatro horas, fíltrese. Se dá en los erutos, y flatuosidades para fortificar el estómago á la dosis de media onza en un vehículo apropiado, conviene tambien en la ictericia.

## TINTURA SAGRADA.

De aloes . . . . .	I onza.
De pimienta de la Jamaica (1) . . . . .	} a. I dracma.
De gengibre . . . . .	
De vino de España . . . . .	VIII onzas.

Macérese por ocho dias y fíltrese.

Se dá en la dyspeccia, en las indigestiones y en la descompostura del estómago á la dosis de una cucharada en un vehículo apropiado.

## TINTURA FEBRIFUGA DE CLUTTON.

De ácido sulfuroso . . . . .	} a. II onzas.
Del sulfurico . . . . .	
De muriate de sosa . . . . .	

(1) Es una especie de nitro.

185.  
De alcohol . . . . . III onzas.

Se deja en digestion por espacio de un mes, en seguida se destila hasta la sequedad. Se agrega al licor destilado.

De angélica . . . . . }  
De aristolóquia . . . . . } a. I½ idem.  
De semillas de cardomomo . . . . . }

Hágase digerir por ocho dias y fíltrese. En cinco ó seis libras de agua edulcorada con miel ó un jarave se agrega á esta tintura lo bastante para darle una acidéz agradable.

Se dá á pasto á los enfermos que tienen una fiebre arreglada cualquiera.

### TINTURA DE LAVANDA (1) COMPUESTA

#### DE LÓNDRES.

De espíritu de espliego . . . . . III libras.  
De romero . . . . . I idem.  
De canela . . . . . }  
De nuez moscada . . . . . } a. I½ onza.  
De sandalo rojo . . . . . I idem.

Dijérase seis dias y fíltrese.

Se dá á la dosis de diez gotas á una dracma con dos dracmas de azucar en la debilidad nerviosa.

### TINTURA NERVINO-TÓNICA DE BESTUCHEF.

Tómense limaduras de fierro puro, distúelvanse en suficiente cantidad de ácido muriático, al que se agrega una cuarta parte de ácido nítrico, fíltrese la disolucion que debe estar en términos que no quede ni una porcion de fierro sin disolverse. Evapórese en una retorta de porcelana en el baño de arena. Expóngase la masa desecada en una bóveda, tella abrae la humedad y se líquida con el nombre del aceite de Marte. Fíltrese este licor, mézclese con doble de su peso de éter sulfúrico, agítese hasta que despues de dejarlo reposar haya tomado el éter un color amarillo de oro, decántese el éter y mézclese con doble de su peso de alcohol muy rectificado, agítándose la mezcla en un frasco tapado hermeticamenté.

(1) Lavanda espliego.

Se dá esta tintura á la dosis de veinte á treinta gotas en un vehiculo acuoso. Conviene en las enfermedades espasmódicas y asténicas.

### TINTURA DE HOLLIN.

*Pharmacopée de Edimburgo.*

De hollin brillante . . . . . I onza.  
De asa fetida . . . . . IV dracmas.  
De alcohol debil . . . . . I libra.

Se prescribe esta tintura contra los vientos, flatusidades, en las convulsiones sintomáticas causadas por la denticion y en las enfermedades histéricas.

La dosis es de quince á treinta gotas en una bebida apropiada.

### TINTURA ANISADA DEL Dr. ALIBER.

De polvos de hipecacuana . . . . . I onza.  
Digierase en cuatro onzas de espíritu de anís.  
Se le agrega alguna vez un poco de azucar.

La dosis de esta tintura es de una á dos onzas en las reumas.

Es muy conveniente para las niños, porque el perfume que le acompaña entorpece el mal gusto de la hipecacuana.

### TINTURA VOLATIL DE GUAYACO DE LONDRES.

De resina de guayaco . . . . . I onza.  
De espíritu volatil aromático de Silvio . . . VI idem.

Se dá en la gota, caldiagia, cólico nefrítico, y disuria.  
La dosis es de una dracma á media onza, en una taza de leche ó agua tibia, dos veces al dia.

### TINTURA DE JACOBO, DE ANTIMONIO.

Se hiérve una fuerte legia de escorias recientes de régulo de antimonio con un aceite graso recientemente esprimido hasta que el todo haya adquirido la consistencia de un ja-

bon se disuelve este jabon en la tintura acre de antimonio que se le llama ordinariamente azufre líquido de antimonio, se filtra.

Esta tintura es resolutive y diurética. La dosis depende del modo con que ella ha sido preparada. Se empieza por algunas gotas y se aumenta sucesivamente la dosis segun lo exijan las circunstancias. Se dá en las gonorreas crónicas y en las obstrucciones de las visceras abdominales.

### TINTURA DE MALATE DE FIERRO.

*De la Farmacopéa Austriaca.*

De limaduras de fierro porfirizadas. I libra.

De jugo reciente de manzanas } III idem.

agrias. (1) . . . . . }

Déjese algun tiempo sobre el metal este jugo teniendo cuidado de agitarlo con frecuencia. Cuando parezca el jugo saturado se le decanta y se agrega otro nuevo hasta que se haya disuelto todo el fierro, se juntan estas disoluciones y se hacen evaporar hasta reducir las á la mitad de su peso, entonces se pone una parte de alcohol sobre seis de la disolucion; se dijere por algun tiempo la mézcla y se filtra.

Se dá esta tintura en la clorosis, la debilidad de estómago, y en el carreau ú obstrucciones mesentericas de los niños.

### TINTURA DE ALMACIGA COMPUESTA.

*De la Farmacopéa Austriaca.*

De almaciga en lágrimas . . . . . } a. II onzas y IV

De mirra . . . . . } dracmas.

De olivano . . . . . }

De alcohol rectificado . . . . . IV libras.

Se dijeren las resinas hasta que la tintura parezca completa, y se filtra.

Se emplea para los sabañones, las grietas y rasgades.

Es necesario que precedan al uso de esta tintura los pedilubios, manilubios calientes &c.

### TINTURA NERVINA Y TÓNICA.

*De la Farmacopéa de Berlin.*

De valeriana . . . . . } a. I½ onza.

De menta piperita . . . . . }

(1) Se puede sustituir con ventaja el jugo de membrillos.

De alcohol . . . . .	II libras
De castor . . . . .	I onza.
De azafrán . . . . .	IV dracmas.
De esencia de yerbabuena . . . . .	I idem.

F. S. S.

Se dá á la dosis de veinte á treinta gotas en los espasmos y debilidades del estómago.

#### TINTURA ANTI-ESPASMÓDICA DE KEUP

De raíz de valeriana . . . . .	I onza.
De licor anodino mineral de Hofman.	IV idem.

Mézclese, infúndase durante quince días y decantese.

Se dá esta tintura en el cólico ventoso, y se le mezcla mitad de esencia de corteza de naranja, y despues de haberlo mezclado bien se dán todas las horas cuarenta gotas en un vaso de infusion de manzanilla.

#### TINTURA DE RUIBARBO INGLESA.

De ruibarbo de China . . . . .	II onzas.
De semillas de cardomomo . . . . .	IV dracmas.
De alcohol . . . . .	II½ libras.

Dijerese por ocho dias y filtrese.

Se dá esta tintura á la dosis de media á una onza en un vehiculo apropiado; conviene para disipar las flatuosidades y restablecer las digestiones perezosas.

#### TINTURA TEBAICA DE BAMBERG.

De opio en bruto . . . . .	II onzas.
De clavos de comer . . . . .	I dracma.
De agua de cañeta ordeada . . . . .	VIII onzas.
De alcohol . . . . .	IV idem.

Se macera el todo por seis días y se filtra.

Esta es una especie de laudano que se puede sustituir al de Sideham.

#### TINTURA LIXIVIAL DE VOGLER.

De raíz de genciana . . . . .	VI onzas.
De cortezas secas de naranja . . . . .	II idem
De cenizas graveoladas . . . . .	XV idem.
De agua hirviendo . . . . .	XI idem.

Dijerose por dos dias y agréguesele.

De alcohol rectificado . . . . . II onzas.

Filtrese.

Se dá una dracma dos ó tres veces al dia en la atrofia, los engurgitamientos glandulosos, en la estranguria y gonorrea cuando son atonicas.

### TINTURA ESTOMÁQUICA DE MOSCATI.

De cortezas de naranjas agrias . . . . . I onza.

De cascarilla pulverizada . . . . . } a.  $\frac{1}{2}$  idem.

De hojas secas de chamedrios . . . . . } a. VIII idem.

De agua destilada de cortezas de limon. } a. VIII idem.

De hojas de ajenjos . . . . . } a. VIII idem.

De alcohol á 32° . . . . . } a. VIII idem.

Infúndase por tres dias á un dulce calor y filtrese.

La dosis es de media onza á seis dracmas al dia antes de almorzar y comer.

### TINTURA ESTOMÁQUICA AMARGA.

De Edimburgo.

De raiz de genciana . . . . . II onzas.

De cortezas secas de naranjas agrias. I idem.

De canela blanca . . . . . IV dracmas.

De cochinillas . . . . .  $\frac{1}{2}$  idem.

De alcohol débil . . . . . } I libra y VII onzas.

Infúndase por cuatro dias y filtrese. La dosis es de cuatro á seis dracmas por la mañana en ayunas, ó una hora antes de comer.

### TINTURA DE CARDOMOMO COMPUESTA.

Farmacopéa de Londrés.

De semillas de cardomomo . . . . . } a. II dracmas.

De alcaravea . . . . . } a. II dracmas.

De cochinillas . . . . . } a. II dracmas.

De canela . . . . . IV idem.

De pasas sin huesos . . . . . IV onzas.

\*

De alcohol . . . . . I libra.

Macerese por cuatro dias y filtraese.

Se dá una cucharada pequeña en un vehiculo apropiado en la debilidad y pereza de la digestion &c.

TINTURA ETEREA DE KLAPROTH.

(Véase éter acético ferruginoso de Klaproth.)

Se prepara esta tintura con el óxide de fierro ad maximum el que le dá un color rojo. Cuando el acetate de fierro es ad minimum la tintura es verde.

TÉ DE LA SALUD.

De Mr. de San-German. (1)

De semillas de anis. . . . . } a. I libra.

De raspaduras de álamo blanco . . . . . } a. VIII onzas.

Del rojo . . . . . } a. VIII onzas.

De semillas de verdolagas. . . . . II libras.

De sén. . . . . I idem.

Hágase un polvo s. b.

Este polvo fortificante y al mismo tiempo laxante se da á la dosis de una cucharada de café para seis tazas de agua hirviendo que se edulcora con azucar y se bebe por la mañana en ayunas.

TIPSANA DE VINACHE.

De zarzaparrilla . . . . . } a. I½ onza.

De raiz de china . . . . . } a. I½ onza.

De guayaco. . . . . } a. I½ onza.

(1) Mr. de San-German no era médico, era muy celebre en clase de curandero y parece que esta infusion produjo entre sus manos buenos efectos.

- De safras . . . . . } a. IV dracmas.  
 De sén. . . . . }  
 De sulfureto de antimonio . . . . . II onzas.

Se pone el sulfureto pulverizado en una muñeca de trapo, se le hace hervir con la zarzaparrilla, la china y el guayaco en tres azumbres de agua; cuando está la decoccion reducida á una tercera parte se le agrega el sén y el safras. Se cuele, se deja depositar y se decanta.

Conviene esta tipsana purgante y sudorifica en las enfermedades de la piel y en la sífilis.

### TIPSANA REAL.

- De tamarindos . . . . . II onzas.  
 De sén. . . . . }  
 De sulfato de sosa . . . . . } a. IV dracmas.  
 De anís. . . . . }  
 De cilantro . . . . . }  
 De velesa. . . . . } a. I puñado.  
 De pipinela. . . . . }

Se echa sobre el todo un azumbre de agua hirviendo, se deja media hora en infusion cuidando de agitarlo con frecuencia y se cuele. Esta tipsana purga muy bien.

### TIPSANA DE FELTZ.

- De zarzaparrilla . . . . . II onzas.  
 De raíz de china . . . . . I idem.  
 De sulfureto de antimonio . . . . . IV idem.  
 De cola de pescado . . . . . }  
 De corteza de box. . . . . } a.  $1\frac{1}{2}$  idem.  
 De yedra. . . . . }  
 De agua comun . . . . . XII libras.

Póngase el sulfureto de antimonio en una muñeca de lienzo claro y hágase s. a. una decoccion que se prolongará hasta la evaporacion de la mitad del licor.

Cuélese al traves de una estameña, dejése reposar algunos minutos, decántese y disuélvase en la coladura.

De sublimado corrosivo . . . . . III granos.

Se emplea esta tipsana en las enfermedades venereas á la dosis de un azumbre al dia.

## TIPSANA DE BUCHAN.

De cebada perlada . . . . . II onzas.  
 Hiérvasse en cuatro azumbres de agua y agréguese.  
 De pasas. . . . . }  
 De higos. . . . . } a. II onzas.  
 De raíz de orozuz. . . . . }  
 Continúese hirviendo hasta que se reduzca á la mitad y disuélvase dos granos de nitro.  
 Esta tipsana es emoliente y pectoral.

## TIPSANA DE VIGAROUX.

De raíz de zarzaparrilla . . . . .  $V\frac{1}{2}$  dracmas.  
 De iris de Florencia. . . . . }  
 De aristoloquia larga . . . . . }  
 De raeduras de guayaco . . . . . } a.  $VIII\frac{1}{2}$  idem.  
 De sasafrás. . . . . }  
 De jalapa. . . . . }  
 De polipodio. . . . . }  
 De raíz de china. . . . . }  
 De cremor de tartaro. . . . . } a.  $VIII\frac{1}{2}$  idem.  
 De sulfureto de antimonio. . . . . }  
 De semillas de anís. . . . . }  
 De nueces frescas con las cascarras } núm. 12.  
 quebrantadas. . . . . }

Pónganse todas estas sustancias á infundir en una vasija de suficiente capacidad, ponganse encima dos azumbres de vino blanco, tápese y déjese en infusion por seis horas, echen- se entonces en la misma vasija cinco azumbres de agua hirviendo. Cubrase la vasija y metase esta en otra media llena de agua hirviendo, prolónguese la infusion por doce horas, cuélese entonces, y colóquese en botellas que se rotularán núm. 1.

Echese sobre el residuo un azumbre de vino blanco, déjese en infusion como anteriormente, agréguese cinco azumbres de nueva agua hirviendo, procédase del mismo modo que anteriormente, cuélese y colóquese en botellas que se rotularán núm. 2.

Se emplea esta tipsana en los dolores reumáticos y en los que son ocasionados por las enfermedades venereas inveteradas mal tratadas. Se empiezan á usar las botellas rotuladas núm. 2. Cuando se concluye una de estas se continúa por las del núm. 1 y se sigue alterandolas de este modo hasta que el médico crea oportuno interrumpirlas ó suspenderlas.

## TROSISCOS DEL Dr. CHAUSSIER.

De alcanfor . . . . .	I dracma.
De opio . . . . .	I escrúpulo.
De goma tragacanto . . . . .	$\frac{1}{2}$ idem.
De azucar . . . . .	IX dracmas.
De agua q. s.	

Para hacer ciento cincuenta trosiscos.

Se dá á la dosis de cuatro á seis por dia en la tisi<sup>s</sup> laringea ó en la angina.

## VEGIJATORIOS DEL Dr. LOUTER VILLERMAT.

Tómese:

De pez de Borgoña . . . . .	I onza.
De resina . . . . .	III dracmas.
De cera amarilla . . . . .	1 onza y V dracmas.
De trementina . . . . .	$\frac{1}{2}$ onza.
De unguento basalicón . . . . .	} a. I onzas.
De cantáridas en polvo impalpable . . . . .	
Aromatícese con q. s. de esencia de espliego.	

## OTRO.

Tómese:

De pez negra . . . . .	IV onzas.
De cera amarilla . . . . .	} a. $1\frac{1}{2}$ libra.
De colofonia . . . . .	
De aceite de olivas . . . . .	II id. y VIII onzas.
De cantáridas en polvos muy finos . . . . .	X onzas.
F. S. A.	

Agréguese de nuevo

De cantáridas . . . . .	I onza y II dracmas.
De esencia de espliego . . . . .	$\frac{1}{2}$ onza.

## OTRA.

De cantáridas en polvo fino . . . . .	$II\frac{1}{2}$ onzas.
De cera amarilla . . . . .	X idem.
De pez negra . . . . .	$1\frac{1}{2}$ onza.

De resina . . . . . II onzas.  
De enjundia. . . . . VIII idem.

M. Louyer Voyer prefere estos vejicatorios porque ellos no tienen los inconvenientes que el de Cádiz que obra sobre las vías urinarias.

#### VEJIGATORIO PERPETUO DE JANIN.

De cantáridas en polvo muy fino. . . I onza.  
De euforbio. . . . .  $\frac{1}{2}$  dracma.  
De almaciga. . . . . } a. III onzas.  
De trementina. . . . . }

Hágase un emplasto s. a.

#### VEJIGATORIO INGLÉS.

Se prepara al modo ordinario que los tafetanes con la cola de pescado, como el tafetán dicho inglés y en lugar de una tintura de bálsamo del Perú se aplican sobre la cola muchas capas de tintura de cantáridas hecha con el alcohol debilitado á diez y ocho ó veinte grados.

#### VEJIGATORIO DE M. WAUTERS.

De olivano pulverizado . . . . . V dracmas.  
De semillas de pimienta negra . . . III idem.  
De muriate de sosa pulverizado. . . III dracmas.  
De jabon blanco. . . . . } VI onzas y II dracmas.

Dijérase esta mezcla en siete onzas de alcohol hasta que este disuelto el jabon, se cuece por algunos minutos y se agita con una espátula. Se extiende este unguento sobre una badana y se renueva todos los dias la curacion.

Este remedio es un rubefaciente que obra en dos ó tres dias. Es util en los reumatismos. En algunas personas obra con bastante energia y en otras son lentos sus efectos.

#### VEJIGATORIO DE M<sup>r</sup>. BONVOISÓN.

Se toma un pedazo de tafetán de Inglaterra del ta-

maño que se quiera dar al vejigatorio, se ablanda por el lado que está gomado con el ácido acético muy concentrado y se aplica sobre la piel.

#### VEJIGATORIO DE LECOMTE.

De cera amarilla . . . . . X onzas.

Derritase y agréguese.

De trementina. . . . . VI idém.

De cantáridas pasadas por un tamiz muy fino. . . . . VI dracmas.

Aromatícese á voluntad con una mezcla hecha de aceite de espliego y de vergamota.

#### VEJIGATORIO AMONIACAL.

Se hace con agua de cal y el aceite de jabon calcareo que tiene la consistencia de crema, y se le agrega el álcali volatil.

Se empapa un lienzo de esta mezcla y se aplica sobre la piel en el sitio donde se quiere hacer una flictena. Es muy bueno irritar antes la piel frotandola con un pedazo de franela. Es necesario cortar en redondo el lienzo que se quiere empapar en la mezcla. (1)

#### VINO DE HUXAN.

De vino de Málaga. . . . . I onza.

De emético. . . . . I grano.

Se dá á la dosis de treinta á cuarenta gotas en las enfermedades ocasionadas por la supresion de la transpiracion.

(1) Cuando este vejigatorio no contiene mas álcali que el necesario para ser rubefaciente, lo aplican los ingleses en las muñecas en los que padecen fiebres intermitentes antes del poroxismo. Algunos farmacéuticos hacen este jabon con partes iguales de enjundia derretida y amoniaco liquido. El obra en un cuarto de hora como rubefaciente, y en tres horas como vejigatorio.

## VINO FEBRÍFUGO DE S.....

De quina roja. . . . .	} a. V dracmas y XVIII granos.
De cortezas secas de naranjas. . . . .	
De raiz de genciana. . . . .	
De flores de manzanilla . . . . .	
De vino de España . . . . .	II libras.
De alcohol á 20°. . . . .	I onza.

Se prescribe en las fiebres intermitentes á la dosis de una ó dos onzas por mañana y tarde.

## VINO AMARGO Ó ELIXIR DE DUBOIS.

De genciana. . . . .	I½ onza.
De carbonate de potasa. . . . .	I dracma.
De aguardiente. . . . .	I azumbre.

Dijeráse por quince dias y filtrese para usarlo.

Se dan una, dos, tres ó cuatro cucharadas de café ú ordinarias segun la edad.

## VINO FEBRÍFUGO.

De vino de España . . . . .	II libras.
De alcohol á 35 g°. . . . .	VIII onzas.
De quina roja contundida. . . . .	II idem.
De palo de la isla de Surinan. . . . .	I dracma.

Macérese durante ocho dias. Se dá á la dosis de una á dos onzas por la mañana en ayunas.

## VINO AMARGO.

De raiz de genciana . . . . .	VIII dracmas.
De quina. . . . .	} a. II idem.
De cortezas de naranjas. . . . .	
De cortezas de Winter. . . . .	
De alcohol. . . . .	IV onzas.
De vino de España. . . . .	II libras.

Macérese por cuatro dias y filtrese. Se dá en los mismos casos y en las mismas dosis que el vino de quina.

## VINO STOMAQUICO DE PLENCK.

- De quina electa contundida. . . . IV dracmas.  
 De raiz de genciana seca y cortada en láminas muy finas. . . . VI idem.  
 De vino tinto de buena cualidad. . . II libras.  
 Macérese por cuatro dias, cuélese, filtrése y conservese para el uso.

Se dá este vino á la dosis de una á dos onzas en las fiebres adinámicas, intermitentes, en las debilidades de estómago y en las enfermedades agudas.

## VINO ANTI-HIDRÓPICO DE FULLÉR.

- De iris de Florencia. . . . II dracmas.  
 De énuła campánula. . . . } a. I½ onzas.  
 De scila . . . . . }  
 De cortezas de sauco. . . . } a. I onza.  
 De yesgo . . . . . }  
 De cortezas de Winter. . . . II idem.  
 De séa . . . . . }  
 De eleboro negro . . . . . } a. II dracmas.  
 De jalapa . . . . . }  
 De agarico . . . . . }  
 De vino blanco . . . . . IV libras.

Infundanse en frio.

La dosis es de cuatro onzas por la mañana en ayunas.

## VINO ANTI-LEUCORRÉAHICO.

- De quina gris. . . . . VI onzas.  
 De azafrán . . . . . III idem y I escrup.  
 De quasia amarga . . . . . } a. I½ onza.  
 De cálamo aromático. . . . . }  
 De canela. . . . . } a. VI dracmas.  
 De flores de sauco . . . . . }  
 De alcohol . . . . . III libras.  
 De tintura de Marte . . . . . XII onzas.  
 De agua pura. . . . . XVIII libras.  
 De jarave comun . . . . . VI onzas.  
 De agua de azahar . . . . . I½ libra.

\*

Se dá á la dosis de dos onzas mañana y tarde en la leucorrea y blenorragia.

VINO SCILITICO DE RICHART.

- De scila . . . . . I onza.
- De cortezas de naranja . . . . . } a. II dracmas.
- De cálimo aromático . . . . . }
- De vino blanco . . . . . XXIV onzas.
- De oximiél scilítico . . . . . II idem.

Póngase en digestion por tres dias y agréguese. Se dá este vino á la dosis de tres á cuatro cucharadas al dia en la hidropesía.

VINO AMARGO Y DIURÉTICO DE M. CORVISAT.

- De quina en polvo . . . . . I onza.
- De corteza de Winter . . . . . } a. II idem.
- De limones . . . . . }
- De raiz de asclepias . . . . . }
- De angélica . . . . . } a. I idem
- De scila seca . . . . . }
- De hojas secas de agenjos . . . . . } a.  $\frac{1}{2}$  dracma.
- De torongil . . . . . }
- De ballas de enebro . . . . . } a. II idem.
- De macias . . . . . }
- De vino blanco . . . . . IV libras.
- De alcohol á 36.º . . . . . II onzas.

Contundase todo y metase en una botella, dijierase al baño de arena á una suave temperatura durante veinte y cuatro horas agitándolo de tiempo en tiempo. Cuélese, exprímase y filtrése en papel de estraza, dividase el licor en cuatro partes y tápese bien.

La dosis es cuatro cucharadas al dia una antes de cada comida.

VINO ANTI-APOPLECTICO.

- De raices de rábanos . . . . . I  $\frac{1}{2}$  onza.
- De jalapa . . . . . IV dracmas.
- De cancla . . . . . II idem.

- De nitrato de potasa . . . . .  $\frac{1}{2}$  dracma.  
 De ruibarbo . . . . . II idem.  
 De vino blanco . . . . .  $\text{II}\frac{1}{2}$  libras.  
 Dijerase en frio por cuatro dias, filtrese y agréguese.  
 De espíritu aromático aceitoso de Silvio. II dracmas.  
 La dosis es de tres á cuatro onzas por la mañana en  
 ayunas.

**VINO AMARGO Y DIURÉTICO DE LA CARIDAD.**

- De iris de Florencia . . . . . VI dramas.  
 De raiz de álamo blanco . . . . . }  
 De scila . . . . . } a. III onzas.  
 De manrubio . . . . . }  
 De sén mondado . . . . . I idem.  
 De agarico blanco . . . . .  $\text{I}\frac{1}{2}$  dracma.  
 De gengibre . . . . . II escrúpulos.  
 De crémor de tártaro . . . . . III dracmas.  
 De vino blanco . . . . . III libras.  
 De tintura de genciana . . . . . III dracmas.  
 F. S. L.

Se dá á la dosis de una onza ó dos por mañana y tarde.

**VINO DEL Dr. FORDICE.**

- De quina en polvo . . . . . II onzas.  
 De clavos de comer . . . . .  $\frac{1}{2}$  dracma.  
 Infundase en una libra de vino generoso durante dos  
 dias, en seguida decántese. Echese sobre el polvo una libra  
 de agua hirviendo, macérese por dos horas, filtrese y mezcle-  
 se esta infusion con el vino.  
 Se dan cuatro cucharadas al dia á las personas afec-  
 tas de blenorragia que se ha hecho crónica.

**VINO DE RUIBARBO COMPUESTO.**

- De ruibarbo en polvo . . . . . II onzas.  
 De canela blanca . . . . . I dracma.  
 De alcohol . . . . . II onzas.  
 De vino de España . . . . . I libra.  
 Macérese por siete dias y filtrese.

Se dá en las diarreas y en las debilidades de estómago á la dosis de una ó dos onzas.

**VINO ANTI-ICTERICO.**

- De vino blanco generoso . . . . . I libra.  
De naranjas agrias . . . . . Núm. 2.  
De azafrán. . . . . I dracma.

El enfermo tomará cuatro cucharadas ordinarias en ayunas ó igual cantidad una hora antes de comer, hacia el fin de la ictericia.

**VINO DIURÉTICO INGLÉS.**

- De raíz de zedoaria. . . . . II dracmas.  
De escamas secas de scila. . . . . }  
De ruibarbo en polvo . . . . . } a. I idem.  
De baillas de encebro . . . . . }  
De canela en polvo . . . . . } III idem.  
De carbonate de potasa. . . . . I½ idem.

Infundase en un azumbre de vino blanco añejo. Fil-tresc.

Se dá en la hidropesía á la dosis de tres ó cuatro vasos al dia.

**VINO DE GUAYACO ELEBORADO DEL Dr. LEWIS.**

- De raeduras de guayaco . . . . . }  
De raíz de eleboro negro. . . . . } a. II onzas.  
De granos del pequeño cardomomo. . . . . }  
De cortezas secas de naranja . . . . . } a. I dracma.  
De vino blanco. . . . . IV libras.

Infúndase por una semana ó mas, en seguida cuélese el vino. Este vino estimulante y desostruente se emplea contra la hidropesía y las reumas, se toma de parte de tarde en pequeñas dosis.

**VINAGRE COLCHICO DE REUSS.**

- De raíz de colchico fresco en pedazos y cortado en otoño . . . . . I onza.

De vinagre bueno . . . . . XII idem.

Macérese durante cuatro dias, esprimase ligeramente la raiz y agréguese al licor.

De alcohol . . . . . VI dracmas.

Filtrese y guardese este vinagre en un frasco.

Se dá este remedio desde una dracma hasta una onza en la hidropesia ascitis.

Se le mezcla algunas veces con el laudano, y se edulcora con un jarave.

#### VINAGRE ALCANFORADO DE SPIELMANN.

De alcanfor . . . . . I dracma.

Pulvericese en un mortero de marmol agregandole veinte gotas de alcohol. Tritúrense con el dos onzas de azucar, echense encima diez onzas de buen vinagre, agitese hasta que el licor se sature todo lo posible, filtrese y conservese este vinagre en un frasco herméticamente cerrado.

Se emplea este remedio en las fiebres malignas, pútridas y en los exántemas. Se dá á la dosis de media onza.

Se usa exteriormente como anti-séptico para combatir la gangrena.

#### VINAGRE BEZOARDICO DE BERLIN.

De raiz de angélica . . . . .	} a. IV onzas.
De valeriana . . . . .	
De yerbabuena . . . . .	
De flores de manzanilla . . . . .	
De ballas de enebro . . . . .	
De laurel . . . . .	} a. I dracma.
De azafrán oriental . . . . .	
De alcanfor . . . . .	
De vinagre blanco . . . . .	VI idem.

Déjese en digestion y cuélese en seguida.

Se emplea este vinagre en las fiebres malignas y nerviosas, en la peste y otras enfermedades contagiosas, y en el escorbuto.

Se empieza por una dracma dada varias veces al dia y se le aumenta en seguida segun que se juzga oportuno.

## WAKAKA DE LAS INDIAS.

De cacao mondado. . . . .	I $\frac{1}{2}$ onza.
De azucar. . . . .	IV idem.
De bainailla . . . . .	VI dracmas.
De canela . . . . .	} a. I idem.
De achiote seco . . . . .	
Hágase un polvo s. a.	

Este polvo aromático y fortificante reanima el apetito de los viejos y de los convalecientes. Se pone una cucharada ordinaria en una sopa de arroz, de fideos, ó en una taza de leche. Los españoles lo toman á la dosis de una dracma en una taza de chocolate.

## FIN DEL FORMULARIO MAGISTRAL.

## MEMORIAL FARMACEÚTICO.

De los principales medicamentos internos clasificados por sus usos en las enfermedades mas ordinarias.

*Conviene leer lo que se ha dicho en el prefacio sobre este memorial.*

### AFECCIONES LACTEAS.

Medicamentos y dosis.

### MEDIOS GENERALES.

Minorativos y sudoríficos.

### MEDIOS PARTICULARES.

Espíritu de minderos . . . Media dracma.  
Elixir de coureellas . . . De una á dos idem.

### AFECCIONES HISTERICAS. (*Histérico.*)

### MEDIOS GENERALES.

Infusion de valeriana . . . De dos á cuatro dracmas por  
azumbre.  
Enemas laxantes con adición de asa fétida ó de castor.  
Pocion éterea con aceite de succino.  
Tintura amoniaca de valeriana.  
Aguas minerales tónicas.  
Éter combinado con el almizcle, con el opio y con el alcanfor.

## MEDIOS PARTICULARES.

- Píldoras marciales de Sydenham Dos escrúpulos al día.  
 Polvos de Tunquin. . . . . De doce á veinte y cuatro granos al día.  
 Píldoras anti-histéricas del Dr. Selle. . . . . De cinco á ocho.  
 Poción emenagoga de Desbois.

AFECCIONES NERVIOSAS. (*Véanse spasmos, vapores.*)

## AGRIOS DE ESTÓMAGO. ACESCENCIA GÁSTRICA.

- Magnesia calcinada . . . . . Media dracma en un vaso de agua con azúcar ó en una taza de leche.  
 Píldoras de jabon. . . . . De dos á cuatro por mañana y tarde.  
 Marfil calcinado . . . . . De doce granos á dos escrúpulos.  
 Cuerno de ciervo calcinado . . . . . De doce granos á media dracma.  
 De electuario de magnesia. . . . . De media á dos dracmas.  
 Lilio ó licor confortativo de Paracelso. . . . . De diez á treinta gotas en medio vaso de infusion de flores de tilia ó en una taza de té.  
 Espíritu carminativo de Silvio. . . . . De doce gotas á una dracma, en un ventículo apropiado.  
 Polvos de Kent. . . . . De doce granos á media dracma.  
 Confeccion de hyacinthos. . . . . De diez y ocho granos, á dracma y media.  
 Pastillas de hojos de cangrejos. . . . . De una á cuatro dracmas.

AMENORREA. (*Véase supresion de las Reglas.*)ANASARCA. (*Hidropesia del tejido celular.*)

## MEDIOS GENERALES.

- Escarificaciones.  
 Cauterio por debajo de las rodillas.  
 Eméticos, purgantes, diaforéticos, y diuréticos.

## MEDIOS PARTICULARES.

- Baños de estufa muy calientes.

- Fricciones secas y linimento volatil.
- Pediluvios calientes y salados.
- Digital purpurea en infusion ó tintura.
- Tartaro soluble.
- Espiritu de nitro dulce . . . De media á una dracma en una pocion diurérica.
- Tintura de tabaco. . . . De un escrúpulo á una dracma.
- Píldoras de Bacher.
- Esencia de trementina. . . . Seis veces al dia tres gotas.

( Véase el artículo general hidropesia. )

ANGINA TONSILAR.

MEDIOS GENERALES.

- Sanguifuelas detrás de las orejas.
- Emético . . . . . Uno, dos ó tres granos.
- Laxantes suaves sales purgantes.
- Exuntorios á la nuca, si es considerable la inflamacion.
- Gargarismos ligeramente abstringentes y acidulos.

MEDIOS PARTICULARES.

( Cuando se manifieste la afeccion febril. )

- Diaforéticos.
- Suero de leche, agua de cebada. Cataplasmas emolientes al cuello.

ANGINA MALIGNA.

MEDIOS GENERALES.

- Una dracma de quina de dos en dos horas.
- Gargarismos anti septicos.
- Hipocacua en pequeñas dosis unida á los diaforeticos.
- Bebidas vinosas y acidulas.

MEDIOS PARTICULARES.

El Dr. Tomas de Salisbury aconseja contra la angina gangrenosa una decoccion de pimienta cayenina (dos cucharadas para un azumbre de agua hirviendo) uniéndole medio cuartillo

\*

de vinagre. La dosis es de dos cucharadas de esta mezcla cada media hora.

ANGINA TRAQUEAL (*Véase angina inflamatoria.*)

AFONIA.

Éter balsámico de Tolú  
Poción del Dr. Mongenot.

APOPLEGIA SANGUINEA. (1)

MEDIOS GENERALES.

Sangrias de las yugulares.  
Purgantes drásticos.  
Enemas estimulantes.

(*Cuando se presenta la apoplegia en seguida de una indigestion se emplea el emético.*)

MEDIOS PARTICULARES.

Vino de Huxam. . . . .	De dos á tres onzas en enemas.
Electuario diacolocynthidos (2)	De una dracma á una onza.
Este es un purgante muy fuerte.	
Electuario diafénico. . . . .	De una dracma á una onza; es mas suave que el anterior.
Píldoras de Rudius. . . . .	De doce granos á dos escrúpulos. Purgan con mucha fuerza.
Gotas cefálicas de Inglaterra.	De diez gotas á media dracma.
Agua teriacal. . . . .	De una á cuatro dracmas.
Agua general. . . . .	De dos á cuatro dracmas.
Elixir de los jacobinos de Ro- wen. . . . .	De media á dos dracmas.
Vino anti-apoplectico . . . .	De tres á cuatro onzas
Éter acetico cantaridado . .	De dos á tres dracmas.
Mixtura pectoral de Quarin	A cucharadas cada cuarto de hora.
Agua espirituosa de Anhalt	De dos á tres dracmas.

(1) *Véase la tabla de los remedios extérnos.*

(2) *Farmacop. de Palacios.*

## APOPLEGIA SEROSA.

## MEDIOS GENERALES.

No deben usarse sangrias, á lo menos si se hacen, con grande reserva y solo en los casos particulares.

Purgantes drásticos.

Estornutatorios.

Vejigatorios á la cabeza, al dorso, ó á los miembros.

Sinapismos á los pies.

(*Despues del ataque*) Elixires cefalicos.

Purgantes amargos.

Vino anti-apoplectico.

## ASCITIS-MEDIOS GENERALES.

Drásticos diúreticos.

Fricciones de aceite sobre el vientre.

De tiempo en tiempo un emético.

## MEDIOS PARTICULARES.

(*Véase el artículo general Hidropesia.*)

## ASMA.

## MEDIOS GENERALES.

Magnesia unida con el ruibar-

bo. . . . . Seis granos de cada cosa.

Lavativas emolientes.

Hipocacuana como vomitivo.

Éter opiado.

Goma amoniaco y scila.

Pediluvios calientes.

## MEDIOS PARTICULARES.

Opio y carbonate de cal combinados.

Tintura de la digital . . . Quince gotas dos veces al dia.

Quina é infusiones amargas.

Sulfate de fierro.

- Tintura de castor y azafrán . . . . . De cada cosa media dracma en un vaso de infusion de valeriana.
- Agua de brea. . . . . Tres vasos al dia, por la mañana, al medio dia, y á la tarde, no debe comerse hasta pasadas dos horas
- Píldoras de asa fetida y de goma amoniaco (partes iguales, de cuatro á cinco al dia.)
- Vino scillitico . . . . . De una á tres onzas mitad en la mañana y mitad á la tarde.
- Vino de émula campánula. . . . . De cuatro dracmas á tres onzas.
- Elixir anti-asmático de Boerhave. . . . . De veinte á treinta gotas en una taza de tipsana pectoral.
- Elixir paregorico Inglés . . . . . De cincuenta á cien gotas.
- Extracto de aristoloquia . . . . . De seis granos á media dracma.
- Extracto de scabiosa . . . . . De seis á veinte y cuatro granos.
- Extracto de álamo blanco . . . . . De ocho granos á media dracma.
- Oxiniel scillitico . . . . . De una dracma á una onza.
- Pocion de hiepacuana de Haller.
- Polvos de scila de Sthal . . . . . De tres á cinco granos.
- Infusion de hollia de Piderit. . . . . De una dracma á una onza en vino.
- Mixtura de Bruner . . . . . Una onza tres veces al dia.
- Agua de Villatria artificial. . . . . De uno á dos azumbres al dia.
- Jarave de calabria. . . . . De ocho dracmas á una onza en una infusion pectoral.
- Pastillas de azufre. . . . . De dos dracmas á una onza.
- Píldoras de cinoglosa . . . . . De tres á seis granos.
- Jarave de nicociana . . . . . De dos dracmas á dos onzas; es purgante.
- Trosiscos de scila . . . . . De un escrúpulo á tres dracmas.
- Jarave anti-asmático . . . . . De una dracma á una onza.
- Píldoras de Quarin . . . . . De cinco á doce.
- Esencia scillitica de Kemp. . . . . De cuarenta á sesenta gotas.
- Looch de Gordon.

### BLENORREA.

- Mixtura balsámica de Fuller. . . . . Una cucharada mañana y tarde.
- Vino del Dr. Fortice . . . . . Cuatro cucharadas al dia.
- Pocion balsámica de Choppart.

CACHEXIA. (*Véase Marasmo.*)

## CALCULOS BILIARIOS.

Mixtura de Wiitt . . . . . De doce á veinte gotas en azucar.

## CALCULOS DE LA VEJIGA.

Cerveza diurética Inglesa. . . De dos á tres vasos.

## CANCER.

Píldoras de acónito del Dr:

Double . . . . . Una á mañana y tarde.

Píldoras mercuriales . . . . . Dos al día.

Extracto de cicuta . . . . . De uno á cuatro granos. Se aumenta poco á poco la dosis hasta doce y mas.

## ENFERMEDADES CANCEROSAS Y ESCROFULOSAS.

Elixir anti-escrofuloso de Pey-

relh. . . . . Una cucharada ordinaria.

## CARDIALGIA.

Tintura de guayaco de Lón-

dres . . . . . De una dracma á media onza.

## (1) CARREAU DE LOS NIÑOS.

Tintura de malate de fierro. De un escrúpulo á una dracma.

CATARRO. (*Véase Romadizo.*)

## MEDIOS GENERALES.

Agua de cebada acidula con el jarave de limon (*Si hay diatesis inflamatoria, sangria ó sanguijuelas.*)

---

(1) *Obstrucciones mesentéricas de los niños.*

Antimoniales y diaforéticos á pequeñas dosis.  
 Bebidas mucilaginosas aciduladas.  
 Espiritu de mindererros. . . . Media onza tomada en dos horas.  
 Oximiél scilítico. . . . . Media onza.  
 Looch endulzado con el jarave de Tolú.  
 Emulcion con la goma amoniaco el opio &c.

#### MEDIOS PARTICULARES,

Tintura de digital. . . . . Treinta gotas,  
 Mirra scila y goma amoniaco combinados,

#### CATARRO CRÓNICO. (Véase tabla de las enfermedades.)

Elixir pectoral Inglés. . . . De media á dos dracmas en una  
 taza de infusion de las cua-  
 tro flores.  
 Elixir paregórico . . . . . De cincuenta á cien gotas.  
 Looch de Gordon. . . . . A cucharadas.  
 Conserva de Tronchin. . . . A cucharadas de hora en hora.  
 Píldoras del Dr. J. J. Leroux. De tres á cuatro al día.  
 Píldoras anti-catarrales del Dr.  
 Pariset. . . . . Dos de mañana y tarde.  
 Píldoras anti-catarrales del Dr. Petit. (Véase su uso en este vo-  
 lumen.)  
 Mixtura anti-catarral Rusa. . A cucharadas de café  
 Polvo anti-catarral de Viena. De una á dos dracmas.  
 Polvo de Wedelio . . . . . De uno á dos escrúpulos.  
 Jarave pectoral Inglés. . . . De una á dos onzas en una infusion  
 apropiada,  
 Tipsana de Buchan.

#### CATARRO LARINGEO,

Éter balsámico de tolú del Dr. Moreau.

#### CATARRO DE LA VEJIGA. (Véase mal de piedra.)

#### CEFALARGIA JAQUECA DOLOR DE CABEZA.

(Véanse remedios externos.)

#### CLOROSIS. (Color pálido.)

MEDIOS GENERALES.

- Emético.
- Infusión de genciana y de quasía.
- Preparaciones marciales.
- Aguas minerales ferruginosas.
- Purgantes drásticos á pequeñas dosis.

MEDIOS PARTICULARES.

- Tintura de quina de mirriate de fierro y de cantáridas. Mezclados en proporción conveniente.
- Limaduras de fierro porfirizado. . . . . De dos á 24 granos. Se diluye la limadura de fierro ó en un vino generoso ó en una tipsana amarga.
- Azafrán de marte ó eptiope marcial. . . . . De dos á 24 granos.
- Pastillas de enula campanula. Media onza.
- Vino calibeado. . . . . De dos dracmas á dos onzas. Se dá solo en una infusión apropiada.
- Tintura de ajénjos. . . . . Diez gotas ó una dracma en un vaso de tipsana.
- Pastillas marciales del código. Dos al dia.
- Pildoras tónicas de Stoll . . De cuatro á seis.
- Pildorastartáreas de Schroderz. De un escrúpulo á dracma y media.
- Pildoras calibeadas. . . . . De seis granos á media onza.
- Pildoras marciales de Koempf. De doce á treinta y seis granos al dia.
- Confeccion de ruda. . . . . De diez y ocho granos á dos dracmas.
- Elixir americano. . . . . Tres cucharadas de café al dia.

CÓLICO DE ESTÓMAGO.

- Gotas amargas. . . . . De dos á ocho en una infusión de plantas estomáquicas.
- Elixir teriacal. . . . . De diez á treinta gotas.
- Polvos de coral de Hervecio. De diez y ocho granos á dos escrúpulos.

Teriaca de Venecia . . . . .	212. De diez y ocho granos á dos dracmas.
Contra veneno. . . . .	De diez y ocho granos á una dracma.
Diascordio. . . . .	De diez y ocho granos á dos dracmas.
Mitridato. . . . .	De doce granos á una dracma.
Filonio romano . . . . .	De una á dos dracmas.

### CÓLICO BILIOSO.

#### MEDIOS GENERALES.

Infusion de manzanilla.  
Lavativas laxantes.  
Purgantes con jarave de espino serval, jalapa y calomelanos.  
Poción calmante con un grano de opio.  
Franelas calientes é impregnadas en una decoccion emoliente aplicadas en el hipogastrio.

#### MEDIOS PARTICULARES.

Tintura anodina de coral de Herveio . . . . . De veinte gotas á media dracma.  
Agua generala . . . . . De dos á cuatro dracmas.  
Miel mercurial. . . . . De una á cuatro onzas en lavativas.  
Jarave de amapola. . . . . De dos dracmas á onza y media.  
Teriaca diatessarón (1) . . . . De doce granos á dos dracmas.  
Mitridato. . . . . De doce granos á una dracma.  
Filonio romano . . . . . De media á dos dracmas.  
Bálsamo tranquilo . . . . . De media á dos onzas en lavativas.  
Bálsamo de la vida de Hofman. De diez gotas á media dracma.  
Laúdano de Sydeham . . . . . De diez gotas á una dracma.  
Opio de Rousseau. . . . . De dos á diez gotas.

### CÓLICO VENTOSO.

#### MEDIOS GENERALES.

Agua de yerbabuena y de azahar.  
Agua de anis.

(1) *Farmacopéa de Palacios.*

Jarave de diacodion.

Enemas calmantes.

Fomentos calientes sobre el addomen.

Tintura de jalapa y de sén compuesta.

### CÓLICO DE LOS PINTORES.

Remedio de la caridad.

### CÓLICO HISTÉRICO.

### MEDIOS GENERALES.

Pocion anti-espasmódica con la tintura de castor, el éter sulfúrico, la tintura de opio, el agua de azahar, el aceite animal de Dippel.

### MEDIOS PARTICULARES.

Acete de risino. . . . . De media á dos onzas con una

onza de jarave de limon.

Éter sulfúrico. . . . . De diez á treinta gotas.

Tintura de Bestucheff. . . . . De quinze á cuarenta gotas.

### CÓLICO MISERERE.

(Cólera Morbo.)

### MEDIOS GENERALES.

Agua de cebada ó semillas de lino.

Agua de pan ó de harina de avena.

Tipsana de pollo.

Fomentos sobre el estómago con una decoccion de adormideras y una cuarta parte de aguardiente alcanforado.

Pildoras de opio . . . . . Medio grano cada hora.

Lavativas opiadas.

Baño caliente.

(Hacia el fin.) Vino de quina, polvos de columbo, ruibarbo.

### CÓLICO NEFRÍTICO.

Espíritu de nitro dulce. . . . . Una cucharada de café, con mi-

\*

tad de laudano en un vaso de tpsana de parietaria.  
 Agua imperial. . . . . De dos á cuatro dracmas.  
 Licor anti-nefritico de Adams. Dos dracmas mañana y tarde.  
 Fálsamo de butua brava. . . . De media á dos dracmas.  
 J. rave de altea compuesto. . . De una á cuatro dracmas en un vaso de tpsana.  
 Poción del Dr. Norford.  
 Balsamo de Fioraventi. . . . De cinco á diez gotas en té.  
 Espiritu de nitro dulce. . . . De veinte á sesenta gotas.  
 Poción capivi. . . . . A cucharadas de media en media hora en una tpsana diurética.

CONSTIPACION.

Electuario lenitivo. . . . . De una á tres dracmas.  
 Mermelada de Tronchin. . . . Una cucharada todas las tardes.  
 Pildoras relajantes de Buchan. De tres á nueve mañana y tarde.

CONVULSIONES DE LOS NIÑOS.

Magnesia calcinada. . . . . De ocho á diez granos. Se mezcla á otro tanto de ruibarbo en una tpsana anti-espasmódica.  
 Tintura de hollin. . . . . De doce á trece gotas.  
 Polvo de la Princesa de Carigna. . . . . De diez y ocho granos á una dracma.  
 Teriaca. . . . . De diez á veinte granos.

CONVULSION DE LOS ADULTOS.

Extracto de estramonio. . . De medio á dos granos dos veces al día.  
 Extracto de beleño . . . . De uno á tres granos.  
 Polvo anti-espasmódico. . . De un escrúpulo á una dracma.  
 De guteta . . . . . De dos granos á una dracma.  
 Dorado de Zell . . . . . De seis granos á un escrúpulo.  
 De Tunquin. . . . . Doce granos.  
 Teriaca diatessarón. . . . . De diez y ocho granos á dos dracmas.

COQUELUCHE.

MEDIOS GENERALES.

Vejigatorios volantes sobre el pecho, ó pomada del Dr. Autenrieth.  
 Laxantes suaves.  
 Emético á pequeñas dosis repetidos.

Oximiél scilítico.  
 Almiracle, castor, alcanfor, aceite de succino.  
 Embrocaciones de éter opiado sobre el pecho.

#### MEDIOS PARTICULARES.

Digital unida al opio.  
 Decoccion de la quina.  
 Jarave de ruibarbo. . . . . A cucharadas de café dos ó tres veces al dia  
 Kermes mineral . . . . . La cuarta parte de un grano ó un medio grano mezclado con s. q. de jarave diluido en un poco de agua.  
 Jarave de adormideras. . . . . De una á cuatro dracmas en una taza de infusion de hisopo ó de póleo.  
 Tintura anisada de Alibert. . . . . Una onza á pequeñas cucharadas. Se mezcla esta tintura con un poco de jarave pectoral y un poco de agua.  
 Jarave del Dr. Desessarts. . . . . Una onza por cucharadas en un poco de tipsana pectoral.  
 Jarave del Dr. Maleot. . . . . A cucharadas de hora en hora en una taza de infusion de hisopo de flores pectorales.  
 Jarave de Rivet. . . . . Idem.  
 Jarave para el coqueluche. . . . . Idem.  
 Jarave de dátiles. . . . . Idem.  
 Jarave contra la tos. . . . . Idem.  
 Polvo sedativo de Wetzler. (*Véase su uso en este volumen.*)  
 Jarave de Boulay. . . . . A cucharadas tres ó cuatro veces en la mañana.  
 Polvos del Dr. Marc.  
 Poción de Dr. Jeanroy. . . . . Seis cucharadas en la mañana.  
 Elixir paregórico inglés. . . . . De cincuenta á cien gotas. (1)

#### GOLPES Y CAIDAS. (2)

Especies vulnerarias. . . . . Un puñado en infusion.  
 Aguas vulnerarias. De esmeraldas, de la generala, de torongil, de colonia. . . . . De dos á cuatro drammas en la in-

(1) *Véase la tabla de los remedios externos.*

(2) *Véase la tabla de los remedios externos.*

fusion indicada arriba. Se hacen fricciones con estas aguas espirituosas sobre las partes ofendidas, sobre las sienes y frente. Se respira fuertemente.

### ESPUTO DE SANGRE. (*Hemoptysis*.)

#### MEDIOS GENERALES.

- Bebidas acídulas y abstringentes.  
 Laxantes. Como el tamarindo, el fosfate de sosa, sulfate de potasa.  
 Tinturas de kino, de cachunde, y de opio mezcladas.  
 Sulfite de fierro y de opio. De cada cosa dos granos en doce granos de conserva de rosas.  
 Digital purpúrea en polvo. . . A la dosis de un grano en diez granos de conserva de rosas.

#### MEDIOS PARTICULARES.

- Mixtura de Quarin . . . . . Á cucharadas.  
 Píldoras de alumbre de Hervecio De seis á doce.  
 Conserva de rosas. . . . . De tres á cuatro onzas al dia.  
 Laudano liquido. . . . . De diez á doce gotas en un vaso de agua de cebada.  
 Elixir vitriólico de Miasicht. De diez á cuarenta gotas en un vehiculo apropiado.  
 Jarave de grande consuenda. De dos dracmas á una y media onza.  
 Polvo abstringente. . . . . De doce granos á una dracma.  
 Píldoras abstringentes . . . . De seis granos á un escrúpulo.  
 Hockiac. . . . . De un escrúpulo á una dracma en una bebida pectoral.  
 Alumbre de Hervecio . . . . De seis granos á media dracma.  
 Píldoras de elecno compuestas. De seis granos á media dracma.  
 Trosiscos de Karave . . . . De doce granos á una dracma.  
 Poción de Jussieu. . . . . En dos dosis.  
 Polvo de Haly . . . . . De media dracma á dracma y media.  
 Polvo de kino compuesto . . . Un escrúpulo.  
 Bálsamo abstringente de Richard De uno á dos escrúpulos.  
 Electuario balsámico y abstringente de Barthes. . . De cinco á seis cucharadas al dia.  
 Extraccio de cachunde. . . . De medio escrúpulo á una dracma.

## CALAMBRES DEL ESTÓMAGO

- Almizcle. . . . . Diez granos en media dracma de triaca.  
 Julepe moscado de Fullér. De cuatro á cinco onzas á cucharadas de cuarto en cuarto de hora.  
 Polvos de Haly . . . . . De media á una y media dracma.

## ANGINA TRAUQUEAL.

## MEDIOS GENERALES.

- La sangría, el émético.  
 Vejigatorios al pecho ó á la parte anterior del cuello, ó bien fricciones ligeras sobre el cuello con un linimento alcanforado, al que se le agrega algunas gotas de tintura de cantáridas.  
 Minorativos para sostener el vientre libre.

## MEDIOS PARTICULARES.

- Tintura de digital purpúrea. Cinco gotas cada cuarto de hora.  
 Fricciones sobre el pecho con una mezcla de éter y de tintura de opio á partes iguales.  
 Tintura de seila. . . . . Media dracma.  
 Vino de hipecacuana . . . . . Media onza.  
 Julepe escocés. . . . . De cuatro á cinco onzas.  
 Mixtura para la angina inflamatoria. . . . . Á cucharadas.  
 Sulfureto de potasa . . . . . De uno á seis granos diluidos en el jarave de hipecacuana.  
 Muriate dulce de mercurio. Un grano en un bolo con miga de pan y azucar. Se repite cada dos horas este remedio.  
 Jarave de higado de azufre. De media á una onza.  
 Pastillas de Mr. Chaussier. De cuatro á seis al dia.

## TOS SOFOCATIVA.

- Mixtura para la angina inflamatoria.  
 Poción de Quarin. . . . . Una onza cada tres horas.

## TOS CONVULSIVA.

- Polvo de Quarin . . . . . Media dracma cada cuatro horas.

Elixir paregórico . . . . . De cincuenta á cien gotas.

BAILE DE S. BITO.

Píldoras del Dr. Merat . . . De dos á cuatro al dia.

HERPES. ENFERMEDADES DE LA PIEL. (1)

Sulfureto de antimonio . . . De doce á diez y ocho granos  
mezclados con partes iguales de  
azucar para tomar de una vez.

Nitrate de potasa . . . . . De media dracma á una al dia  
en una infusion de fumaria.

Bolo diaforético inglés.

Licor de Presarvin . . . . . De uno á tres vasos de ratafia al dia.

Píldoras de Plumier . . . . . Seis al dia en dos tomas.

Píldoras de aconito del Dr.

Double . . . . . Una mañana y tarde.

Polvos de Grimaldi . . . . . Cuarenta y ocho grados. (Purgante.)

Jarave de higado de azufre . . . De una á dos onzas.

Depurativo de Majault . . . De una á dos onzas.

Tipsina de vinache . . . . . Un azuambre.

Extracto de fumaria . . . . . De un escrúpulo á una dracma.

De scabiosa . . . . . De seis granos á un escrúpulo.

Jarave de fumaria . . . . . De dos dracmas á una y media onza.

De espino serval . . . . . De dos dracmas á dos y tres onzas.  
(Purgante.)

Jarave de Vellet. (Véase la tabla de las fórmulas.)

Confeccion de Hamec . . . . . De una dracma á una onza. (Purgante.)

Pastillas antimoniales de Kun-

ckel . . . . . De una á cuatro dracmas.

Pastillas de azufre . . . . . De una dracma á una onza.

Píldoras de panacea-mercurial . . De seis granos á un escrúpulo.

Píldoras de Belloste . . . . . Dos al dia, seis á ocho para purgar.

Píldoras de Renaudot . . . . . De doce á cuarenta y ocho granos.

Purgante del Dr. Wilson . . . De dos á diez granos.

Agua oxigenada de Alion . . . Dos ó tres vasos en la mañana.  
(Véase la tabla de las enfermedades.)

(1) Véase la tabla de los remedios externos.

## DESFALLECIMIENTO. (1)

Agua de la reina de Ungría,  
de la generala, de colonia,  
de torongil, vulnerarias, de  
esmeraldas . . . . . De dos dracmas á una onza di-  
latadas en un poco de agua.  
Con ellas puras se frotan las sien-  
es y la frente del enfermo.

## DIABETES.

## MEDIOS GENERALES.

Los antimoniales unidos al opio.  
Vejigatorios sobre las regiones lombares.  
Goma kino, cachunde, sulfato de zinc.  
Ácidos sulfúrico y nítrico.  
Quina, hierro y mirra mezclados.

## MEDIOS PARTICULARES.

Dieta puramente animal, y sin ningun alimento vegetal.  
Pildoras saponaceas aloeticas.  
Sulfureto de amoniaco. . . . De tres á cuatro gotas cuatro ve-  
ces al dia en un vehiculo apro-  
piado.  
Limonada nítrica.

## DIARREA.

## MEDIOS GENERALES.

Dosis ligeras de hipecacuana.  
Ruibarbo y canela mezclados.  
Polvos de James.  
Cocimiento de cebada, de arroz, de malva, de cuerno de ciervo.  
Agua de goma arábica, agua panada.  
(Si hay agrios en el estomago) los absorbentes unidos á los opiados.

## MEDIOS PARTICULARES.

Sulfate de sosa y de magnesia.

(1) Idem.

Fosfate de sosa.	
Aceite de risino y tintura de opio.	
Quina, conserva de Cinorrhodon. Preparaciones marciales, cachunde.	
Goma kuino. Cuando la enfermedad proviene de una acrimonia tenáz.	
Quando se han ingerido sustancias venenosas.	
Quando hay asenia general ó local.	
Agua de cal, leche y goma arábica. En la diarrea crónica.	
Marfil calcinado. . . . .	De doce granos á dos escrúpulos.
Cuerno de ciervo calcinado. Idem.	
Tintura de coral anodina de	
Hervocio. . . . .	De veinte gotas á media dracma.
Rob de sauco. . . . .	De un escrúpulo á una dracma.
Extracto de ciento en rama. . . . .	De doce á cuarenta y ocho granos.
Miel de nenufar. (1) . . . . .	De una á cuatro onzas.
Miel rosada. . . . .	De una dracma á una onza en una enema.
Jarave de ninfa. . . . .	De dos dracmas á una y media onza.
Jarave de rosas secas. . . . .	Idem.
Jarave de grande consuela. Idem.	
Jalea de cuerno de ciervo. . . . .	De dos, á cuatro, y seis onzas.
Conserva de rosas y de cinorrhodon. . . . .	De dos dracmas á una onza.
Polvos de Kent . . . . .	De doce granos á media dracma.
De coral de Hervocio . . . . .	De diez y ocho granos á dos escrúp.
Confeccion de jacintos. . . . .	De diez y ocho granos á dracma y media.
Orvietarum (2) Proctancius. . . . .	De doce granos á una dracma.
Diascordio. . . . .	De un escrúp. á dracma y media.
Polvos de greda compuestos . . . . .	De seis á doce granos tres veces al dia.

(1) *Nenufar*, dán los franceses este nombre á una planta que crece en los mares y lagos. Una parte de sus raices se nutre en el fondo del agua y la otra nada por encima. La medicina emplea sus frutos raices y con especialidad las flores: su virtud es narcótica = El traductor.

(2) *Orvietarum* Nombre de un antidoto célebre así llamado, segun Lemery de Orvieto, villa de Italia, donde fué inventado ó segun otros de Geronimo Cerrantes Orvietan, célebre charlatán que fué su inventor. Véase la preparacion en la Palestra farmaceutica de Palacios. = El traductor.

- Catolicón doble . . . . . De dos dracmas á dos onzas.  
 (*Minorativo.*)  
 Píldoras de hehecho compuestas De seis granos á media dracma.  
 Trosiscos de Karave . . . . De doce granos á una dracma.  
 Aceite de almáciga . . . . De media á una onza en enemas.  
 Electuario anti-disentérico. . De una á tres dracmas.  
 Polvos de Haly . . . . . De media á una y media dracma.  
 Cocimiento blanco de Sideham. Un vaso cada hora.  
 Looch de almidon.  
 Píldoras anti-disentéricas de  
 Wilis. . . . . Tres.  
 Remedio de Quarín . . . . Tres y media onzas cada tres horas.

### DISENTERIA.

#### MEDIOS GENERALES.

- Emético.  
 Laxantes suaves.  
 Hipocacuana mezclada con un polvo aromático.  
 Enémas, emolientes y opiadas.  
 Bebidas mucilaginosas, leche y jarave de goma.  
 Agua de arroz.

#### EN EL SEGUNDO PERIODO.

- El ruibarbo y el opio combinados.  
 El beleño.  
 Opio y quina mezclados.  
 El cachunde, la goma kuino.  
 Vino mezclado al cocimiento de palo campeche y cortezas de granadas, leche terciada con agua de cal.

#### MEDIOS PARTICULARES.

- Sulfate de zinc unido al opio.  
 (*Véase el artículo diarrea.*)

### DISPECCIA.

#### MEDIOS GENERALES.

- Magnesia y ruibarbo.

\*

Agua de yerbabuena y laudano.  
 Laxantes suaves combinados con los aromáticos.  
 (Si hay caldiargia y vómitos) Rubefacientes al estómago.

Para establecer el tono del estómago.

Infusion de genciana con tintura de mirra y cardomomo.  
 Quina, canela, y raiz de columbo.  
 Cocimiento de hombrecillo y de raiz de ratania con corteza de naranja.  
 Aguas minerales ferruginosas.  
 Aguas de Selso de Pymont.

#### MEDIOS PARTICULARES.

(Véase el artículo indigestion.)

#### DISURIA, STRANGURIA.

Pocion diurética de Buchan. . . Una taza de cuatro en cuatro horas  
 Trosiscos de vejiga de perro.  
 (Planta) . . . . . De doce granos á una dracma.  
 Pocion diurética del Dr. Halle.

#### LAMPARONES. (Véanse escrófulas.)

#### EMBARAZO GÁSTRICO.

#### SABURRAS EN LAS PRIMERAS VIAS.

(Necesidad de purgar.)

Tártaro estibiado . . . . .	De uno á tres granos como vomitivo.
Pulpa de Casia . . . . .	De una á una y media onza.
Pulpa de tamarindos. . . . .	De dos dracmas á una onza (1)
Catolicón doble . . . . .	De dos dracmas á dos onzas.
Electuario de zarza purgante simple . . . . .	De tres dracmas á dos onzas.
Zarza purgante solutivo. . . . .	De dos dracmas á una onza.

(1) Conviene el tamarindado en las estaciones calientes cuando conviene al mismo tiempo purgar y refrescar al enfermo.

De escorzonera . . . . .	De una á seis dracmas.
Pastillas de citrón . . . . .	De dos á seis dracmas.
De diacartamo . . . . .	De tres dracmas á una onza.
Píldoras anti-cibum . . . . .	De doce granos á una y media dracma. ( <i>Purgante suave.</i> )
Angélica . . . . .	Idem.
Panchymagogu . . . . .	De diez granos á media dracma.
Purgantes de Hervecio . . . . .	Idem.
Aloeticas . . . . .	Idem.
Hidragogas de Boncio . . . . .	Idem.
De Rudio . . . . .	De medio á dos escrúpulos.
Cerveza purgante inglesa . . . . .	Medio cuartillo dos veces al dia.
Bizcochos purgantes . . . . .	Número 1.
Aguardiente purgante de Mezaize . . . . .	Una y media onza (1)
Pocion laxante de Viena . . . . .	De una á cinco onzas.
De hípecacuana de Haller.	
Purgante del Dr. Andry.	
Mermelada de Zanetti . . . . .	De dos á cuatro cucharadas de café.
Extracto de coloquintidas compuesto . . . . .	De diez granos á media dracma.
Aguardiente aleman . . . . .	De dos dracmas á dos onzas. (2)
Agua de Trevis . . . . .	Un azumbre.
Elixir sagrado . . . . .	De una á diez y media onzas.
Visceral de Hofman . . . . .	De una á dos dracmas.
Jarave de Rhamnus catarticus, de flor de durazno, de nicociana, de rosas compuesto, de chicorias compuesto, magistral abstringente . . . . .	De dos dracmas á dos onzas.
Polvo cornáquino . . . . .	De media á dos dracmas. (3)
Vomitivo de Hervecio . . . . .	Diez y ocho granos.
De Grimaldi . . . . .	Cuarenta granos.
Del conde de Warwick . . . . .	De doce á veinte y cuatro granos.
Electuario lenitivo . . . . .	De cuatro dracmas á una y media onza.

(*Se usa tambien en lavativas.*)

- 
- (1) Este purgante conviene solo á las personas sémáticas.  
 (2) Idem que el anterior.  
 (3) Es preciso abstenerse de él en las enfermedades inflamatorias.

Sal de Guindre. . . . .	Seis y media dracmas.
De azucar naranjada purgante. . . . .	De dos á tres dracmas.
Tipsana real . . . . .	Un cuartillo.
Tintura de Affy. . . . .	De una á tres onzas.
Sagrada . . . . .	De una á dos dracmas.
Pildoras escocesas. . . . .	De una á una y media dracma.
Polvo tónico é incisivo del Dr. Lasion. ( <i>Véase la fórmula</i> ) . . . . .	
Purgante del Dr. Wilion. . . . .	De dos á diez granos.

#### ENVENENAMIENTOS.

##### *Por los óxidos metálicos.*

Emético. . . . .	De dos á tres granos.
Hipecacuana . . . . .	De veinte y cuatro á veinte y ocho granos.
Vinagre scillítico. . . . .	De tres á cuatro cucharadas.
Carbonate de sosa de potasa. . . . .	Una dracma, un azumbre de agua.
Sulfureto de potasa . . . . .	Seis granos en un vaso de agua ó en píldoras.
Sulfate de fierro. . . . .	De diez á doce granos.
Tinta . . . . .	Una cucharada en un azumbre de agua.

##### *Por las sales metálicas.*

Amoniaco líquido . . . . .	Treinta gotas en un vaso de bebida.
Agua de cal. . . . .	De seis á diez y seis onzas.
Quina . . . . .	De una á cuatro dracmas.
Bálsamo de azufre. . . . .	De una á dos dracmas.
Trementina . . . . .	De un escrúpulo á una dracma.

#### POR EL PLOMO.

Remedio de la caridad.

#### POR LOS ÁCIDOS.

Agua de jabon. . . . .	De un cuartillo á un azumbre.
Magnesia calcinada . . . . .	De un escrúpulo á una dracma.
Pocion del Dr. Andry. . . . .	
Teriaca. . . . .	De una á dos dracmas.

Jarave de diacodion. . . . De cuatro dracmas á una onza.

POR EL OPIO.

Limonada vegetal y mineral. De un cuartillo á un azumbre.  
Éter. . . . . De un escrúpulo á una dracma.

POR LOS HONGOS.

Tratamiento indicado. (*Véase la tabla de las fórmulas.*)

ENTERITIS (*Véase inflamacion de los intestinos.*)

EPILEPSÍA.

MEDIOS GENERALES.

La epilepsia puede ser fruto del estímulo que induce la dentición, puede tambien producirse por la supresion de una evacuacion, por sahurra intestinal, por un tumor, por una lesion oculta de algunos nervios &c.

*Su tratamiento varia segun la causa.*

(*Cuando hay plerora.*) Sangrias locales exuntorios.

Digital á la dosis de un grano.

Opio y valeriana. . . . . Dos granos en el principio y despues dos dracmas.

Almizcle y opio.

Éter, aceite de succino, aceite animal de Dippel, Arnica montánica, belladona y beleño.

Flores de zinc . . . . . De tres á cuatro granos en píldoras.

Almizcle . . . . . De cinco á doce granos en píldoras con el extracto del musgo quercino.

Alcanfor. . . . . De ocho á diez y seis granos. } (1)

Castor . . . . . De tres á diez y seis granos. }

Asa fétida. . . . . De medio á un escrúpulo. }

(1) *Sustancias simples que se usan solas ó mezcladas.*

## MEDIOS PARTICULARES.

Quina.	
Fierro amoniacal.	
Flores de zinc . . . . .	Cinco granos en pildoras.
Nitrato de plata . . . . .	Tres granos en veinte pildoras de las que se tomarán dos al día.
Elixir anti-epileptico.	
De vida de Matiolo . . . . .	De una á cuatro dracmas interior- mente. Se frotan tambien las sienes y debajo de la nariz.
Elixir vitriólico de Minsicht.	De veinte á cuarenta gotas en un vehículo acuoso.
Gotas anodinas inglesas.	De diez gotas á media dracma.
Gotas cefálicas de Inglaterra.	Idem.
Extracto de extramonio . . . . .	De medio á dos granos.
De beleño . . . . .	De uno á tres granos.
De valeriana . . . . .	De doce á cuarenta y ocho granos.
Polvo anti-espasmódico . . . . .	De un escrúpulo á una dracma.
De eutela . . . . .	De dos granos á una dracma se- gun la edad.
De oro de Zell . . . . .	De seis granos á un escrúpulo.
De Tunquin . . . . .	Doce granos.
Teriaca diatesarón . . . . .	De doce granos á dos dracmas.
Electuario diacoloquintidos. (1)	De una dracma á una onza.
Aceite animal de Dippel . . . . .	De cinco á treinta gotas mezcladas con eter.
Alcohol amoniacado . . . . .	De veinte á cuarenta gotas en un vehículo apropiado.
Eter sulfúrico, nitro muriá- tico . . . . .	De diez á veinte gotas con azu- car.
Cerveza cefálica inglesa . . . . .	De cuatro á cinco vasos al día.
Pildoras anti-epilepticas in- glesas . . . . .	Una de cada vez.
Del Dr. Merat . . . . .	De dos á tres al día.
Cupreas de Swediaur . . . . .	De dos á tres.
De Quarin . . . . .	De dos á cuatro.
Electuario del Dr. Mead . . . . .	Una dracma de mañana y tarde.

(1) *Farmacopéa de Palacios, llamase así por entrar como prin-  
cipal ingrediente la coloquintida.*—El traductor.

ERUPTOS (*Véanse flatuosidades.*)

- Polvo diaromatón . . . . . De cinco á veinte granos.  
 Elixir fortificante de Selle. } a. una dracma.  
 Carminativo de Wedelius. }  
 Tintura de ruibarbo de Spielman, media onza en un vehiculo apropiado.  
 De Bestuchef . . . . . De veinte á treinta gotas

## ESQUINANCIA ANGINA, MAL DE GARGANTA.

(*Véanse remedios externos.*)

- Pulpa de tamarindos . . . . . De dos dracmas á una onza.  
 Oximiel simple . . . . . Idem.  
 Miel rosada . . . . . De una dracma á una onza.  
 Jarave de moras . . . . . De dos dracmas á onza y media.  
 De vinagre . . . . . De dos dracmas á una onza.  
 Polvo temperante de Stahl. Doce granos.  
 Bebida anti-floxística de Stholl. Una taza cada hora.  
 Bolos diaforeticos ingleses . Dos al día.

EXTINCIÓN DE LA VOZ. (*Véase aponia.*)

## DEBILIDAD DE ESTÓMAGO, POSTRACION DE FUERZAS.

## ATONIA.

- Vino de ruibarbo compuesto. De una á dos onzas.  
 Amargo . . . . . Idem.  
 Stomaquico de Plenck . . . . . Idem.  
 Wakaka de las Indias . . . . . De una dracma á una onza.  
 Vino de quina . . . . . De tres á cuatro onzas á la hora de comer, lo mismo á la tarde.  
 De ajenjos . . . . . De dos á seis onzas id. id.  
 De enula campánula . . . . . De cuatro dracmas á cuatro onzas.  
 Bálsamo de la vida de Leliebre. De una á tres cucharadas con una hora de intermedio.  
 Esencia de Wedelio . . . . . De media á una dracma.  
 Elixir de la vida de Mathiolo De una á cuatro dracmas.  
 Visceral de Hofman . . . . . De una á dos dracmas.

De Stoughton . . . . .	De diez gotas á una dracma en una taza de té.
Extracto de ajenjo. . . . .	De medio escrúpulo á una dracma.
De centaurea menor. . . . .	De medio escrúpulo á media dracma.
Licor de Paracelso. . . . .	De diez á treinta gotas en un vehículo estomacal.
Extracto de genciana . . . . .	De medio escrúpulo á media dracma.
De ruibarbo . . . . .	Idem.
De enebro . . . . .	De un escrúpulo á dos dracmas.
De aloes . . . . .	De dos á cuatro granos.
Agua teriacal . . . . .	De una á cuatro dracmas.
Jarave de ajenjos . . . . .	De dos dracmas á una y media onza.
De quina. . . . .	Idem.
De kermes . . . . .	De dos dracmas á una onza.
De yerbabuena . . . . .	De dos dracmas á una y media onza.
Elixir de Garux . . . . .	Idem.
Tintura estomáquica de Moscati.	De cuatro á seis dracmas dos veces al día.
Stomáquica amarga de Edimburgo . . . . .	De cuatro á cinco dracmas.
De cardomomo compuesta (Lond). . . . .	De dos á cuatro dracmas.
Agua espirituosa de Anhalt . . . . .	De dos á tres dracmas.
Polvo de diarrhodon . . . . .	De un escrúpulo á una dracma.
De los tres sándalos. . . . .	Idem.
Letifianse. . . . .	Idem.
De ambar compuesto. . . . .	Idem.
De aro de Berckman.	
Confeccion de jacintos . . . . .	De diez y ocho granos á una y media dracma.
De alkermes . . . . .	De un escrúpulo á una idem.
Teriaca. . . . .	De diez y ocho granos á dos dracmas.
Orvietan . . . . .	De diez y ocho granos á dos dracmas.
Mitridato (1). . . . .	Idem.

(1) *Contra veneno, medicina compuesta de varias drogas.* = El traductor.

- Diascordio . . . . . De un escrúpulo á dracma y media.
- Filonio romano . . . . . De treinta y seis granos á una dracma.
- Opiata de Salomon . . . . . De un escrúpulo á una dracma.
- Electuario de hiera piera. . . . . De una á seis dracmas.
- Pastillas de bainillas . . . . . De una dracma á una onza en el discurso del dia.
- De clavos de comer. . . . . De una á cuatro dracmas.
- De canela . . . . . Idem.
- De cachunde . . . . . Idem.
- De mogoles. . . . . Idem.
- De ruibarbo . . . . . Idem.
- Píldoras balsámicas de Sthall. . . . . De dos á doce granos.
- De Bacher . . . . . Idem.
- Calibeadas . . . . . De seis granos á un escrúpulo.
- Polvo de antimonio marcial de Keap . . . . . De cinco á seis granos.
- Tintura de ruibarbo inglesa . . . . . De media á una onza.
- Vino amargo de la Caridad. . . . . De una á dos onzas mañana y tarde.
- Trosiscos de Cypheos. . . . . De un escrúpulo á una dracma.
- Bálsamo Sajon. . . . . Quince gotas en un terron de azucar.
- Cerveza estomatica inglesa . . . . . Un vaso mañana y tarde.
- Cerveza de quina de Mutis. . . . . Un azumbre al dia.
- Bolos fortificantes de Desbois . . . . . Seis al dia.
- Confeccion Saponacea. . . . . De uno á dos escrúpulos.
- Elixir de Michie . . . . . De dos á cuatro dracmas.
- Alkermes de los italianos . . . . . De dos á tres dracmas.
- Opiata estomatica de Hervecio . . . . . De un escrúpulo á media dracma.
- Polvo de Haly . . . . . De media dracma á dracma y media.
- Corrovorante de Werlhoff. . . . . Cuarenta y dos granos.
- Tintura nervino tónica de Berlin. . . . . De una á dos dracmas.
- Bolo digestivo de Smith. . . . . De una á dos dracmas.
- Agua de Magnanimidad . . . . . De una á una y media onza.
- Elixir sagrado . . . . . De cinco á veinte granos.
- Polvo diaromatón . . . . . De cinco á veinte granos.
- Tintura de ruibarbo de Spielman . . . . . Media onza en un vehiculo apropiado.

\*

Bolo estomático de Parmentier.

Tintura de malate de fierro. De un escrúpulo á media dracma.

Pildoras del Dr. Huhn . . . De una á dos.

Tintura sagrada. . . . . Una cucharada en un vaso de agua con azucar. (Véase la tabla de las enfermedades.)

DEBILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE LA GENERACION.

Pastillas de gens-eng . . . (1) Cuatro ó cinco con una hora de distancia.

(1) Gens-eng ó Gins-Eng, ó Ging-Seng. Los naturalistas botánicos no han decidido si el gens-eng y el ninzin son dos plantas diferentes ó bien una misma; pocos de los viajeros que han estado en la China y en el Canadá de donde son indigenas estas plantas, estan acordos entre sí. M. Geoffrós en su materia médica tom. 2 pág. 192 dice que estas plantas, son de diferente género y que solo se asemejan en su figura y virtudes. Agrega tambien que los médicos europeos usan poco estas plantas y por último que la raíz del gens-eng es mas preciosa que la del ninzin. He consultado todo lo que sobre este objeto se ha escrito y presentaré al lector el extracto de lo que se lee en las cartas edificantes y curiosas tom. X pág. 172, en la pequeña obra del P. Lafitean dirigida al regente de Francia en 1718 y en la thesis de medicina de M. Vardemonte sostenidas en los colegios de la facultad de París en 1736. Pondré en seguida del gens-eng la descripcion del ninzin á fin de que acompañandolas el lector forme su juicio. Indicaré tambien el modo de preparar las raices, los lugares en que ellas crecen, y el orden y método que observan los que quieren cogérlas.

DESCRIPCION DEL GENS-ENG.

Esta planta que los chinos llaman pet-si y los iróquios garentoquen (estos dos términos significan en las dos lenguas pier-nas de hombre) se ha conocido en Francia desde que los embajadores de Siam se la llevaron á Luis XIV. El gens-eng tiene una raíz de dos pulgadas de largo y casi el mismo grueso que el dedo pequeño, un poco aspero, brillante y como medio trasparente, las mas veces dividido en dos ramas, y á ocasiones en mas; fibro-

Wakaka de las Indias . . . <sup>231.</sup> De cuatro dracmas á una onza.

so hácia la base, rosado exteriormente y por dentro amarillo de un gusto ligeramente acre, un poco amargo y aromático, su olor despide un aroma no desagradable. El cuello de la raíz es un tupido tortuoso de nudos, donde se descubren oblicua y alternativamente, tanto de uno como de otro lado los vestigios de diferentes tallos que arroja cada año. El tronco del gens-eng es de la altura de un pie, liso de un rojo obscuro. De lo alto del tallo se elevan tres ó cuatro ramas cóncavas á modo de gotieras y dispuestas en rayos, cada una de las cuales sostiene cinco hojas desiguales y dentadas, el reverso de las hojas tiene algunos nervios que se entrelazan. Del sitio donde nacen las hojas se eleva un pedunculo simple, desnudo y casi seis pulgadas de largo, terminado por un ramo de pequeñas flores amarillas cuyo caliz es muy pequeño, los pétalos y estambres son en número de cinco, el estilo de la flor está separado por un estigma y colocado, sobre un embrión redondo, que cuando perece se convierte en una balla esférica, canalada y partida en tres ó cuatro ballas, cada una de las cuales contiene una semilla aplastada y en forma de piñon.

Si se cree la obra china titulada Pensau-Kam-Mou-Li-Tchi-Sin; las virtudes de la raíz del gens-eng, son admirables, los Asiáticos creen que es una panacea soberana, y los chinos echan mano de ella para todas sus enfermedades como último recurso, los médicos han escrito volumenes enteros acerca de este específico, que ellos llaman con el título de simple espirituoso, espíritu puro de la tierra, y receta de inmortalidad. Pero citaré algunas propiedades de esta raíz; no hay diarrea, debilidad de estómago, desorden intestinal, engurgitamientos, parálisis ni convulsiones, que no cedan al gens-eng. Esta raíz segun ellos es maravillosa para reparar instantaneamente las fuerzas debilitadas, aumentar la respiracion, reanimar la vejez y aun á los agonizantes retardar la muerte, afirmar la médula de los huesos y todos los miembros, en fin para reparar rapidamente las pérdidas que ocasionan los placeres de Venus y reproducirlos con prontitud con tal de que se coma y beba sobriamente. Es de admirar que no se haya unido á este panegtrico del gens-eng el que cure las enfermedades venereas. Los médicos holandeses la recomiendan en las convulsiones, el síncope, los vértigos, y para fortificar la memoria, pero es necesario evitar el abusar de ella por que inflama la sangre.

## FIEBRE ADINAMICA.

Electuario anti-febril de Bo-  
herhave. . . . . Media dracma cada cuatro horas.

## DESCRIPCION DEL NINZIN.

Difiere el ninzin del gens-eng en que el que nace en el Japon y en la Corca es mas espeso, mas mole hácia dentro, é inferior en propiedades.

Kampfer designa esta planta del modo siguiente. — *Sisarrum montanum* Cordense, radice non tuberosa. Dice que la planta del ninzin cuando es nueva no tiene mas que una pequeña raiz simple semejante á la del nabo redondo, de tres pulgadas de largo y el grueso de un dedo pequeño, guarnecida de algunas fibras capilares ó bellosas, carnosa blanca, entre cortada de pequeños anillos y dividida á veces en dos ramas de donde le viene el nombre de nin-zin que significa planta cuya raiz tiene en la tierra la figura de los muslos de un hombre: esta raiz tiene un gusto de chirivía y olor de nabo. Cuando es mas antigua adquiere la altura de un pie, su raiz es muchas veces doble, y gruesa: del cuello de su raiz nacen dos tallos que en seguida se convierten en ramas y se cambian en raíces, su tallo se eleva á la altura de cerca de dos pies y es casi del grueso del dedo pequeño acanalado y lleno de espinas como el rosal, de cada uno de sus nudos nacen ramos. Este tallo es sólido en su base pero hueco en el resto y en las ramas; las hojas que abrazan los nudos son ligeramente canchadas y cóncavas, muy semejantes á las del nabo, en el último acrecentamiento de la planta se hallan divididas en tres lobulos.

Los pedunculos de las flores que terminan los ramos están llenos en su base de pequeñas hojas estrechas y dispuestas en parasol.

A cada flor succede un fruto que en cayendo se parte en dos granos aplastados de un lado desnudos, semejantes á los de anís rojos en su madurez teniendo el gusto de la raiz con un ligero calor.

En las axilas de los ramos nacen botones redondos verdes carnosos de un gusto dulzon, los cuales cuando cae la planta ó ellos sobre la tierra producen una planta de su genero que segun Haller es umbelífera.

El ninzin es despues del gens-eng y el té la mas célebre de todas las plantas del oriente á causa de la utilidad de

Elixir de salud . . . . . Una onza.

su raiz. La planta del ninzin que se ha llevado de Corea al Japon y que se cultiva en los jardines de la ciudad de Meaco, se cria mejor que en su misma patria, pero no tiene virtud; ella tiene poco menos las mismas que el gens eng. El ninzin que nace en las montañas de Kataja, (en la provincia de Siamsai) y en la de Corea donde el aire es muy frio, dura mucho tiempo, su raiz es viva pero sus hojas caen en el otoño. En el Japon produce en poco tiempo tallos cargados de frutos y muere las mas veces en un año. En el Canadá donde ella se llama garont ó gen, es bastante gruesa. Los japoneses y chinos pretenden que las principales virtudes de la raiz de ninzin son las de fortificar y nutrir, ellos la hacen entrar en todos los remedios á falta del gens eng principalmente en todos los cordiales; pero antes de usarla la preparan como el gens-eng.

#### RECORTA DEL GENS-ENG, SU VENTA EN CHINA &c.

En el invierno es el tiempo en que se arranca el ninzin y el gens-eng. Cuando este tiempo se apróxima se ponen guardias en todas las entradas de la provincia de Siamsai para evitar que lo roben.

Los lugares donde crecen las raíces del gens-eng se hallan situados entre los treinta y nueve y cuarenta y siete grados de latitud septentrional y entre diez y veinte de longitud oriental contando desde el meridiano de Pekim. En este largo intervalo se descubren largas montañas y espesas florestas que lo rodean poniendolo casi impenetrable. En el espesor de estas montañas y florestas, sobre el borde de los rios, al rededor de las peñas, al pie de los árboles y en medio de toda especie de yerbas se encuentra la planta gens-eng. Esta planta es enemiga del calor y crece siempre á la sombra. No es de admirar que se encuentre en el Canadá, cuyas florestas y montañas son bastante semejantes á las de la China principalmente hácia los cincuenta y siete grados. Los sitios donde crece el gens-eng se hallan enteramente separados de la provincia de Canton llamada Leaotong en las antiguas cartas chinas, por una barrera de bosques que circunda toda esta provincia y á cuyo alrededor rondan continuamente los guardas para impedir que vayan los chinos á buscar la raiz. Sin embargo por mas vigilancia que haya la animosidad que induce la ganancia hace cerrar los ojos á los peligros. Este cebo ha hecho encontrar á los chinos el secret de desinzararse en ciertos desiertos, á veces en número de dos y tres

Febrífugo de Witte . . . . . Media onza.  
 Solucion febrífuga de Broussonet . . . . . De una dracma á media onza.

*mil, á pique de perder la libertad y el fruto de su trabajo si son sorprendidos saliendo de la provincia ó volviendo á entrar en ella. Diez mil tártaros están encargados de hacer la recorta del gens-eng, y despues que este ejército de hervolarios dividen el terreno en varias partes cada tropa ó número de ciento ó doscientos se colocan en una misma línea hasta un punto señalado guardando de diez en diez una cierta distancia y buscan con cuidado y al traves de yerbas y espinos la planta de que se trata, abandonandose insensiblemente sobre un mismo rumbo, de cuyo modo recorren en ciertos dias el terreno que se les ha señalado. Cuando se ha concluido el término los mandarines colocados en sitios propios para que puedan comer sus caballos mandan visitar á las cuadrillas por intimidarles sus órdenes, é informandose si está completo el número, en el caso de faltar alguno como muchas veces sucede bien por haberse perdido en aquellos intrincados desiertos ó por haber sido devorado por las bestias, se le busca unos ó dos dias y se vuelve á empezar como anteriormente. Los tártaros experimentan las mayores fatigas en esta expedicion, no llevan cubiertas ni camas, solo van cargados de carnes asadas al horno para comer durante todo su viage. Se dán por contentos con acostarse debajo de los árboles cubriéndose con hojas ó con las cortezas que encuentran. Los mandarines les mandan algunas ocasiones varios huevos y caza que ellos dejan. De este modo pasan estos diez mil hombres seis meses del año desde fin á principio del otoño hasta el fin de la primavera, para buscar una raíz cuya principal virtud es verdaderamente producir una crecida renta al Emperador de la China. Se reserva para este príncipe la que ha sido cortada sobre las montañas de Tsa Twang-Seng-, como la mejor. Aunque entre nosotros se han hecho algunas tentativas para hacer venir el gens-eng en grano no se ha podido conseguir.*

*Todo el gens eng que se reúne en Tartaria cada año y cuyo total nos es desconocido debe llevarse á la aduana del Emperador de la China que saca dos onzas por los derechos de capitacion de cada uno de los tártaros que se emplean en esta recorta; en seguida el Emperador paga el resto á un cierto precio y hace revender el que no quiere á un precio mucho mas alto en su imperio donde no se vende mas que en su nombre y este despacho es siempre seguro por este medio, es como las naciones europeas que trafican en la China se proveen y en particular la compañía holandesa de las Indias orientales que vende casi todo el gens-eng que se consume en Europa.*

#35.

Mistura de mirra de Griffith. Cuatro cucharadas tres veces al dia.

El precio del gens-eng es tan caro entre los chinos que venden la libra de él por tres de plata. Los holandeses lo venden á peso de oro y lo distribuyen á los europeos bajo el nombre de ging-geng y á los japones bajo el gens eng, por este motivo es tan raro el gens eng. El de los comerciantes de la Europa está muchas veces mezclado con el ninzin que es mas comun, y entonces produce una ganancia mas alta y un despacho mas seguro. Se pretende que los holandeses lo han plantado en el cabo de Buena Esperanza. Pasemos á su preparacion.

#### PREPARACION DEL GENS-ENG.

Los tártaros llaman al gens-eng orotha, que quiere decir primera de las plantas. Para conservar la raiz entierran en un mismo sitio toda la que pueden juntar en diez, doce ó quince dias, mondan y limpian cuidadosamente estas raices cuando las sacan de la tierra con un cuchillo hecho de una especie de caña de la India, porque evitan religiosamente el tocarlo con acero. Algunas veces separan la tierra con una brocha, la empapan en seguida en un cocimiento de mijo ó de arroz, en seguida la secan con cuidado al humo de una especie de mijo amarillo que está encerrado en un vaso con un poco de agua, entonces tienden las raices sobre pequeños pedazos de madera colocados sobre el vaso y se secan poco á poco bajo un lienzo ó con otro vaso que las cubre. Algunas veces se hacen secar estas raices sosteniendolas al vapor de una caldera cubierta y colocada sobre el fuego la cual contiene el agua del mijo amarillo y del arroz. Por estos procedimientos las raices adquieren cuando están secas un color amarillo ó rojo con una especie de dureza y parecen como resinosas y medio transparentes. Despues de haber secado bien estas raices se retraen sus fibras y cuando corre viento del norte tienen cuidado de colocarlas en seco en vasos de cobre bien á proposito y que fermenten bien. Se hace un extracto de muchas pequeñas raices y se conservan las hojas de las plantas para unir las con el té.

Diccion Univ. de Hist. Natural de M. Valmont de Bomare. — Tom. 4 pág. 57 y siguientes.

#### RAIZ DE GINSENG.

Esta raiz era en otro tiempo un objeto de comercio el mas

Polvo de Gyms . . . . . De una á una y media dracma.  
 Vino amargo . . . . . De dos á tres onzas.

### FIEBRE INTERMITENTE (2)

(Durante el primer periodo del frio.)

Hipocacuana . . . . . De veinte á treinta granos ó tártaro emetico de uno á tres.

precioso para los chinos. Los misioneros jesuitas habian contribuido, con especialidad, á establecer su alta reputacion. Fumberg dice que aun al presente es muy solicitada por los japones que hacen de ella mucho aprecio.

Historia natural. Los bótanicos convienen con mucha generalidad en reducir la raiz del ginseng al panax quinque folium de Linceo (Poligamia Dioecia) de la familia de las umbelíferas. Crece esta planta en las partes septentrionales de la China, se le coge en las montañas de la Tartaria. Se encuentra con abundancia en el Canadá.

Propiedades físicas. La raiz del ginseng se vende por fragmentos faciformes, compactos del espesor del dedo pequeño, su color es de un blanco que tira á amarillo, está revestido de una corteza rugosa y señalada por anulaciones. No tiene olor. Tiene un sabor agradable ligeramente amargo.

Propiedades químicas. La ciencia no posee algun conocimiento sobre la analisis química del ginseng.

Propiedades medicinales. La raiz del ginseng se ha mirado como un remedio cierto para reanimar las fuerzas vitales, pero hay mucha inexactitud en los hechos que se han alegado para atestiguar sus virtudes.

Modo de administrarla. Esta raiz pulverizada se toma á la dosis de una ó dos dracmas, puede darse hasta media onza en cocimiento. Se usa á veces en tintura ó en extracto.

Nuevos elementos. deterapéutica y materia médica por J. J. Alibert, edicion cuarta tom. 1 pág. 100 y 101. — El traductor.

(2) No es de tan poca consideracion, el fijarse en uno ú otro de los dos eméticos que indica el autor y si por el contrario la justa preferencia del uno ó el otro segun las circunstancias, es quien salva ó redime á los enfermos de la penosa repeticion de estas calenturas.

Además de suponer con Home de que una atonia predominante en el grandioso sistema digestivo es la causa próxima de

Cordiales diaforéticos, tales como el vino antimoniado, y alcanforado, pocion cordial y sudorifica.

(Durante el principio de los accesos.)

Las intermitentes, debemos convenir en que ora se considere como un efecto de esta debilidad ó bien quiera atribuirse á otra causa, el resultado es que una exaservacion biliosa se acompaña siempre con estas calenturas, con las tercianas especialmente; el amargor de la boca, el gusto amargo que imprime en ella, los materiales que en caso de vómitos llegan á precipitarse, las cualidades físicas de estos &c. no dejan duda en la asercion.

En este caso la indicacion de hacer vomitar se acompaña de la idea de destruir este material bilioso de que se ha hablado y para lo que sin disputa el tártaro estibiado debe preferirse por cuanto se ha reconocido en el una accion disolvente sobre la bilis.

Mas de una vez en mi corta práctica he observado que propinando esta preparacion, y haciendola tomar al enfermo al mismo tiempo de hacerse sensible el frio, se ha sofocado la accesion del calor y un blando sudor provocado por el vómito ha juzgado la enfermedad.

Cuando no ha tenido lugar este benéfico efecto he sostenido á los enfermos durante el paroxismo á una dieta ténue y he prescrito, el electuario siguiente.

De corteza perubiana, buena y bien pulverizada . . . . .	} onza y media.
De serpentaria de virginia en polvo .	
De cremor de tártaro pulverizado. .	Dos draemas.
De canela en polvo . . . . .	Un escrúpulo.

M. y C. S. Q. de jarave de corteza de cidra F. E. S. A., despues de haberlo mezclado agréguese. De éter sulfúrico y licor A. M. de H. á escrúpulo y medio.

Hago llevar á la casa del enfermo este electuario ordenando que inmediatamente pase el sudor se someta á su uso el enfermo en esta forma. Cada hora debe tomar una cucharada de él diuido en un pocillo de naranjada preparada con la naranja de la China, una taza de caldo á la hora siguiente y otra cucharada á la que se le sigue sin que este orden se interrumpa hasta la total conclusion del electuario.

Han sido tan felices los resultados que he obtenido con este tratamiento que no habiendo engañado mi esperanza ocasion alguna, aun en los casos de inveteracion de estas calenturas que

\*

Éter sulfurico. . . . . De un escrúpulo á una dracma.  
 Tintura de opio . . . . . De 30 á 40 gotas. (D. Lind.)

(Durante las intermisiones.)

Quina . . . . . Dos escrúpulos cada dos ó tres horas. Se dá en infusion ó decoccion, en polvo ó en enemas en diferentes dosis.  
 Quasia . . . . . Una dracma en infusion.  
 Angustura. . . . . De una á dos dracmas para decoccion.  
 Corteza de Winter. . . . . Idem.  
 Salix caprea. . . . . Idem.  
 Raiz de Ratania. . . . . Veinte granos en polvo.  
 Corteza de sauce blanco. . . . . Dos dracmas para dos tomas á dos horas de distancia.  
 De castaño de Indias. . . . . Dos dracmas infundidas en cuatro onzas de cardo bendito.  
 De cerasus padus. . . . . Una dracma.  
 De fresno . . . . . Dos dracmas en una taza de infusion de hojas del mismo, cada cuatro horas.  
 Serpentaria de virginia. . . . . Idem.

PREPARACIONES PARTICULARES.

Vino de quina. . . . . Un vaso mañana y tarde.  
 Febrifugo de S. . . . . Una ó dos onzas en la mañana.

he asegurado siempre á los enfermos que me han solicitado en semejantes afectos que haciendo el debido uso de este plan, se verán redimidos de la invasion siguiente, lo que con doble satisfaccion de profesor y enfermo se ha visto verificado en Cadix, Veracruz y México que han sido los principales teatros donde he ejercido la medicina.

Por dos ocasiones he experimentado en mi mismo los preciosos efectos de esta preparacion, una en Veracruz, en el mes de agosto de 1815 donde fui atacado de una esquisita terciana, y otra en México en los mismos dias en que me ocupaba en esta traduccion, por haber sido atacado de igual afecto, y en uno y otro punto el dia en que me someti á este plan fué el mismo en que se desterraron los accesos. = El traductor.

- Elixir febrifugo de Witt . . . Media onza.
- Anti-septico de Huxam . . . De dos á cuatro dracmas en una  
bebida apropiada.
- Febrifugo del Dr. Audouard.  
Del Dr. Marc.
- Jarave de quina . . . . . De dos dracmas á una y media  
onza.
- Solucion de muriate de potasa. De dos á doce gotas.

( El Dr. Fowler, el Dr. Darwin. )

- Esencia alexifarmaca de Sthall. De veinte á treinta gotas.
- Mistura ácida del Dr. Selle. . Una taza cada hora.
- Resolutiva del Dr. Selle. . . . Media taza cada hora.
- Tintura febrifuga de Cluttón . En una tipsana hasta una ligera  
acidéz.
- De quina compuesta de Huxam. De dos á cuatro dracmas.
- Extracto de centaurea menor. . . . .
- De genciana. . . . . } De seis á doce granos.
- Seco de quina. . . . . }
- Electuario de psyllium . . . . De una dracma á seis. (Es pur-  
gante.)
- Anti-febril de Boherhave. . . . Media dracma cada cuarto de hora
- Opiata febrifuga de Tisot. . . . Dos dracmas.
- Febrifugo del Dr. C. (Véase la fórmula.)
- Pildoras febrifugas inglesas. Cuatro al dia antes de los accesos.
- Eméticas de Boherhave . . . . De una á dos.
- Tartáreas de Scroder . . . . De cuatro á ocho.
- Polvo de Grimaldy. . . . . Cuarenta granos. (Es purgante.)
- Febrifugo y purgante de Her-  
vecio. . . . . De diez ocho granos á media drac-  
ma.
- Polvo de Boulemer. . . . . Cuarenta y cuatro granos al dia  
por tres dias.
- De James . . . . . De una á una y media dracma.
- Febrifugo de Juncher. . . . . Dracma y media en cuatro tomas.
- Corrovorante de Worlhoff. . . Cuarenta y dos granos.

FIEBRE REMITENTE, MEDIOS GENERALES.

( En los primeros paroxismos. )

- Limonada agua de tamarindo.
- Cremor de tártaro soluble . . De una á dos dracmas.

Emético. . . . . De uno á tres granos.  
Minorativos, ó enémas purgantes.  
Muriate de mercurio dulce. De seis á doce granos.

( En la mayor intensidad del paroxismo. )

Afusiones de agua fria, aspersiones de agua y vinagre.

( Durante la remitencia. )

La quina en decoccion acidula con el ácido sulfúrico débil, ó la quina en polvo. A la dosis de una y media onzas ú dos dracmas en intervalos determinados.

MEDIOS PARTICULARES.

La solucion arsenical de Fowler. . . . . Ocho ó doce gotas.

FIEBRES CONTINUAS,

MEDIOS GENERALES.

- Decoccion de cebada ó de simiente de lino.
- Limonada ó suero
- Ligeras infusiones de yerbabuena ó manzanilla.
- Hipecaeuana. . . . . De veiate á treinta granos.
- Mercurio dulce unido á algunos granos de jalapa.
- Infusion de tantrindos, nitrada.
- Diaforeticos, tales como el vino de antimonio, el polvo de jamaes &c.
- Anti-espasmodicos, como el éter, el alcanfor, el almizcle, amoniaco; solos ó mezclados.
- Ácido nítrico alcoholizado.
- Quina en infusion ligeramente acidulada.
- Quasia . . . . . Dos dracmas en infusion en doce onzas de agua; si hay alguna accion purgante se agrega á la infusion de la quina seis gotas de tintura de opio ó media dracma de tintura de cachunde.

## FIEBRE INFLAMATORIA.

## MEDIOS GENERALES.

Después de las sangrias se aplican sobre la frente compresas de agua fría, de éter.

Digital purpurea. . . . . Dos dracmas en infusión.

(*Si hay nauseas.*) Poción emética.

(*Si hay constipacion.*) Laxantes suaves.

Limonada nitrada ó dos dracmas de cremor de tártaro soluble.

(*Medios externos segun el estado del enfermo.*)

Los amargos y la quina durante la convalecencia.

## PREPARACIONES PARTICULARES.

Bebida anti-flojística de Stoll. Una taza cada hora.

Mixtura diaforética de Selle. Media taza cada hora.

FIEBRE NERVIOSA. (*Tifus ligero.*)

## MEDIOS GENERALES.

(*Estos varian segun los estados que presenta la enfermedad.*)

(*Si hay nauseas.*) Se facilita el vómito.

(*Si hay constipacion.*) Laxantes suaves.

Afusiones de agua fría durante el paroxismo.

(*Si se presenta diarrea.*) Se dá el cachunde, la goma, Kino, el agua de canela, la tintura de opio.

El vino de quina hácia el fin de la enfermedad.

Los anti-espasmódicos como el almizcle, el anisaco, el alcanfor y el opio.

FIEBRE PUTRIDA Y MALIGNA. (*Tifus confinado.*)

## MEDIOS GENERALES.

Hipocacuana. . . . . Quince granos con uno de emético en una infusión de manzanilla.

Purgantes suaves calomelanos.

Abluciones de agua fría, seguidas en un vaso de vino caliente.

- Pocion infusion de columbo. Onza y media; tintura de opio cinco gotas; ácido muriático, doce gotas.
- La quina á la dosis de media onza en decoccion, con tres dracmas de serpentaria de virginia en libra y media de agua. Se le agréga una onza de tintura de canela.
- Las aguas acidulas gascosas.
- La angustura . . . . . De una á dos dracmas en cocimiento.
- La genciana. . . . . Idem.

MEDIOS PARTICULARES.

- Espíritu volatil y aromático de Silvio. . . . . De seis á treinta gotas.
- Solucion febrifuga de Broussonnet.
- Agua diuretica alcanforada de Fuller . . . . . De una á dos onzas.
- Esencia alexifarmaca de Sthall. De veinte á treinta gotas.
- Elixir anti-septico de Huxam. De media á una dracma.
- De Mithic. . . . . Idem.
- Vino amargo . . . . . De dos á tres onzas.
- Febrifugo de S. . . . . De tres á seis onzas.
- Bálsamo de Vincequerro. . . De ocho á diez gotas en azucar.
- Orvietanum prostantius. . . De un escrúpulo á una dracma.
- Polvo de Werlhoff. . . . . Dos escrúpulos.

FIEBRE ESCARLATINA.

MEDIOS GENERALES.

- Tipsana diluyente acidula.
- Hipocacuana. . . . . De veinte á treinta granos.
- Laxantes calomelanos. . . . Cinco granos, ruibarbo doce granos.
- Lavativas purgantes.
- Diaforéticos suaves.

MEDIOS PARTICULARES.

- Decoccion de quina. (*En la escarlatina anginosa.*)
- Pocion amoniacal alcanforada.

## FIEBRE MILIAR.

## MEDIOS GENERALES.

- Enemas laxantes.  
 Minorativos.  
 Vino de quina á pequeñas dosis.  
 Mixtura alcanforada. (*Farmacopéa de Londrés.*)

## FIEBRE ORTIGOSA.

- Emético.  
 Cremor de tártaro soluble. . . De una á una y media onza.

## FLATUOSIDADES, VIENTOS ERUPTOS.

- Éter sulfúrico . . . . . De quince á treinta gotas.  
 Laudano de Sideham. . . . . De un escrúpulo á una dracma.  
 Agua de Menta piperita. . . De cuatro dracmas á una onza.  
 Quina . . . . . De doce á diez y ocho granos.  
 Tintura de ruibarbo Inglesa. De media á una onza.  
 Pildoras carminantes de Buchanan. . . . . De cuatro á cinco al acostarse.  
 Confeccion del Japon. . . . De treinta y seis á cuarenta y ocho granos.  
 Tintura de ajenjos. . . . . De diez gotas á una dracma en un vaso de infusion de anís.  
 Elixir de propiedad de Paracelso. . . . . De seis gotas á media dracma.  
 Opiata de Salomón. . . . . De un escrúpulo á dos dracmas.  
 Electuario de ballas de Laurel. Idem.  
 Esencia de Wedelius . . . . De media á una dracma.  
 Tintura de Ollin . . . . . De quince á treinta gotas.  
 Vino de ruibarbo compuesto. De dos á tres onzas.  
 Amargo. . . . . Idem.  
 Tintura de ruibarbo de Spielman . . . . . Media onza.

## FLORES BLANCAS.

(Véase *Leucorrea.*)

## FLUXION DE PECHO.

(Véase *Perineumonia.*)

344  
FLUJO INMODERADO DE LA REGLA.

(Menorragia.)

MEDIOS GENERALES.

Laxantes poco irritantes.  
Limonada nitrada ó agua de tamarindos.  
Compresas empapadas en oxierato aplicadas al dorso y á las partes de la generación.  
El alumbre, el cachunde, la goma kino, el bolo arménico, el sulfato de zinc.  
Inyecciones abstringentes en la vagina.

MEDIOS PARTICULARES.

Digital purpurea. . . . . A la dosis de un grano.  
Opio un grano mezclado con cinco de ruibarbo.  
Quina amarilla.  
Angustura.  
Mirra y óxido de fierro.  
Aguas minerales ferruginosas.

SARNA.

Flores de azufre. . . . . De diez á diez y ocho granos.  
Cremor de tártaro soluble. . . De dos escrúpulos á una dracma.  
Extracto de escabiosa. . . . De seis á veinte y cuatro granos.  
Jarave de fumaria. . . . . De dos dracmas á una y media onza.  
De zarzamora . . . . . De dos dracmas á tres onzas.  
(Purgante.)  
Confeccion Hamech . . . . . De dracma á onza. (Purgante.)  
Pastillas antimonioales de Kunkel. . . . . De una á cuatro dracmas.  
Pildoras de panacea mercurial De seis granos á un escrúpulo.  
Jarave de hígado de azufre. De una á dos onzas. (1)

GASTRITIS.

) Véase la inflamacion del estómago. (

LAMPARON, INFARTO GLANDULOSO.

Eptiope vegetal de Russel. Una dracma.

(1) Véase la tabla de las enfermedades externas.

- Jalea de musgos de Russel. Una dracma. (1)  
 Infusion de olin de Piderit. De una dracma á una onza en vino.  
 Tintura lexivial de Wogler. . Una dracma, dos ó tres veces al dia.

## GONORREA VIRULENTA.

## MEDIOS GENERALES.

- Agua de cebada ó de semilla de lino. Solucion de goma arábica en leche. Decoccion de raiz de altea.  
 Laxantes suaves.  
 Enemas emolientes con la adiccion de cabezas de adormideras.  
 Baños tibios.  
 Sanguijuelas al perineo.  
 Inyecciones sedativas.

## MEDIOS PARTICULARES.

- Pildoras de alcanfor y de nitro. Seis ó doce granos al dia.  
 De calomelanos y trementina. De cinco á seis.  
 Trementina cocida . . . . . De un escrúpulo á una dracma (2)  
 en las gonorreas inveteradas.  
 Jabon de Starkey. . . . . De medio escrúpulo á una id. en las gonorreas inveteradas.  
 Bolos fortificantes de Desbois. Seis al dia id.  
 Pildoras abstringentes de Capuron. . . . . Una ó dos al dia.  
 De Boulliar. . . . . De dos á seis al dia.  
 Poción balsámica de Choppart.  
 Emulsion de Cadet. . . . .  
 Opiata del Dr. Larrey. . . . . De dos á cuatro dracmas al dia.  
 Pildoras de Quarin . . . . . De cinco á seis en la mañana.  
 De Maetzió. . . . . De dos á cuatro al dia.  
 Del Dr. Santa Maria . . . . . Media dracma dos veces al dia.  
 Tintura de antimonio de Jacobo . . . . . De diez á veinte gotas.

(1) Véase la tabla de las enfermedades externas.

(2) Para sesenta pildoras.

## GOTA.

## MEDIOS GENERALES.

Ligeros diafóreticos. Bebidas diluyentes.  
Laxantes y minorativos.

## MEDIOS PARTICULARES.

Confeccion opiada de la farmacopéa de Londrés, á la dosis de un escrúpulo ó de una dracma.

Quina . . . . . De media dracma á media onza.  
Elixir de guayaco. . . . . De media á una dracma.  
Extracto de guayaco. . . . . De medio escrúpulo á media dracma.

Polvo amargo. . . . . Idem.  
Aguardiente Aleman. . . . . De una á dos onzas para purgar.  
Polvo de Perard . . . . . Una dracma.  
Electuario Cariocostin. . . . . De una á seis dracmas para purgar.

Tablillas antimoniales de Kunkel . . . . . De una á cuatro dracmas.

Ratafia de Caribes. . . . . Dos cucharadas pequeñas en la mañana.

Elixir de la Salud. . . . . De una á tres dracmas.

Anti-artrítico de la Isla de Francia.

Pildoras de Vick-de Azir . . . . . De dos á cuatro al día.

Decoccion anti-artrítica de Quarin. . . . . De uno á tres vasos.

Electuario anti-artrítico de Buchan. . . . . Una cucharada, de café dos veces al día.

Gotas anti-artríticas de Eller . . . . . De veinte á treinta.

Tintura volatil de guayaco. . . . . De una dracma á media onza en una taza de leche.

Mixtura resino-jabonosa de Plenck. . . . . Una dracma en una bebida apropiada.

## PIEDRA DE LA VEJIGA.

Agua de cal . . . . . Un cuartillo.

Potasa cáustica . . . . . De treinta á cuarenta gotas en un azumbre de agua, mucilaginoso.

Trementina cocida. . . . . De un escrúpulo á una dracma.

- #47.
- Espíritu de nitro dulce. . . . . De diez á veinte gotas en un  
vehículo apropiado.
- De coclearia . . . . . De quince gotas á una dracma.
- Jarave de cinco raices aper-  
tivas. . . . . De dos dracmas á una onza.
- Ratafia del comendador de  
Caumartin. . . . . Un pequeño vaso por la maña-  
na en ayunas.
- Bálsamo de butua brava. . . . . De media á dos draemas.
- Remedio de Stephens. (*Véase la farmacopéa de Baumé.*)
- Extracto de énula campánula. . . . . De ocho granos á media dracma.
- Jabon de Starkey . . . . . De doce granos á una dracma.
- Lejia de Saunder . . . . . Tres dracmas al dia.
- Agua real . . . . . De una á cuatro dracmas.
- Bálsamo de Fioraventi. . . . . De cinco á diez gotas en una  
bebida diurética.

#### HEMATEMESIS.

(*Véase vómito de sangre.*)

#### HEMATURIA.

(*Véase orina cruenta.*)

#### HEMORRAGIAS.

- Píldoras cupreas de Swediaur. . . . . De dos á tres.
- Aluminosas de Hervecio. . . . . De seis á doce.
- Polvo estíptico de Colbateh. . . . . De cuatro á doce granos.
- De kino compuesto . . . . . Un escrúpulo.
- Elixir ácido aromático de  
Brugnatelli. . . . . De doce á cuarenta y ocho granos.

#### HEMORROIDES.

#### MEDIOS GENERALES.

- Laxantes ligeros, como electuario lenitivo, aceite de ricino  
cremor de tártaro.
- Sanguijuelas aplicadas al ano.
- Unguento emoliente, tal como el populeon ó cerato opiado.
- Bebidas ligeramente nitradas y sulfurosas.

## MEDIOS PARTICULARES.

Tintura de digital. . . . .	De treinta á cuarenta gotas ca la mañana.
Inyecciones abstringentes.	
Conserva de rosas. . . . .	De una á tres onzas.
Quina. . . . .	Media dracma.
Electuario lenitivo. . . . .	De una tres dracmas.
De Reus. . . . .	De una á tres dracmas al dia.
Alumbre apagado de Hervecio.	De seis granos á un escrúpulo.
Píldoras abstringentes. . . . .	Idem.
Trosiscos de Karave. . . . .	De doce granos á una dracma.

## HEMOTIPSIS.

(Véase esputo cruento.)

## HEPATITIS.

(Véase inflamacion del hígado.)

## HIDROPESÍA.

Scila en polvo . . . . .	De seis á ocho granos con vein- te y cuatro de nitro en un va- so de agua de canela.
Vino diurético inglés. . . . .	Tres ó cuatro vasos al dia.
Kermes mineral . . . . .	Un grano dos ó tres veces al dia.
Rob de zarza purgante. . . . .	De un escrúpulo á una y me- dia dracma.
Extracto de cohombro silvestre.	De uno á seis granos.
De eleboro negro . . . . .	De uno á doce granos.
Resina de Jalapa . . . . .	De cuatro á doce granos en pil- doras.
De scamonea . . . . .	Idem.
De turbit. . . . .	Idem.
Pocion de hipecacuana de Hallér.	
De Hufeland . . . . .	Una cucharada cada dos horas.
Polvo de scila de Stal. . . . .	De tres á cinco granos.
Vinagre colchico de Reus. . . . .	De una dracma á una onza.
Electuario de Quaria . . . . .	Una dracma
Espíritu de coclearia. . . . .	De quince gotas á una dracma.

- Vinagre scilítico. . . . . De una á cuatro dracmas.  
 Miel de cohombro silvestre. De una dracma á cuatro onzas en  
 enemas.  
 Oximiel colchico. . . . . Una dracma dos veces al dia en  
 una infusion.  
 Electuario diaphenix. . . . . De una dracma á una onza.  
 Jarave de zarzamora. . . . . De dos dracmas á tres onzas. (Pa-  
 ra purgar.)  
 Polvo hidragogo. . . . . De medio escrúpulo á dos.  
 Píldoras de Starkey. . . . . De seis á ocho granos.  
 Tonicas de Bacher. . . . . De tres á seis granos. Se toman  
 por la tarde.  
 Hidragogas de Boncio. . . . . De medio escrúpulo á media dracma  
 De Rudio . . . . . De doce granos á dos escrúpulos.  
 Trosiscos de Alhandal. . . . . De dos escrúpulos á una dracma.  
 Cerveza diurética inglesa. . . . . Un azumbre al dia en la invasion  
 de la enfermedad.  
 Vino de Fullér. . . . . Cuatro onzas por la mañana en  
 ayunas.  
 Píldoras hidragogas de Janin. De doce granos á media dracma.  
 Sténicas de Breun. . . . . De una á dos en la mañana.  
 Jabon de Starkey. . . . . De ocho á diez granos.  
 Electuario de Quarin. . . . . Una dracma cada hora hasta que  
 no se haya evacuado suficiente  
 mente.  
 Polvo de scila nitrado de  
 Vanhelmont. . . . . Doce granos dos veces al dia.  
 Mixtura hidragoga de Vans-  
 Wieter. . . . . Una cucharada cuatro ó seis ve-  
 ces al dia.  
 Catartica arabe.  
 Vino scilítico de Richart. . . . . De tres á cuatro cucharadas.  
 Elixir resolutivo del Dr. Selle. Una cucharada de café cada dos  
 horas.  
 Píldoras purgantes de Haen. De diez á veinte granos.  
 De Wilhering . . . . . De uno á dos.  
 Vino de guayaco elevorado  
 de Lewis. . . . . Un vaso pequeño de parte de  
 tarde.  
 Electuario hidragogo de Fou-  
 quier. . . . . De doce á veinte y cuatro granos.  
 Pastillas de émula campánula . . . . . Media onza.

## HIDROPESÍA DEL ABDOMEN.

(Véase acitis.)

## HIDROPESÍA DEL PECHO.

(Véase hidrotorax.)

## HIDROPESÍA DEL TEJIDO CELULAR.

(Véase anasarca.)

## HIDROFOBIA.

Pocion anti-lyssica del Dr. Selle.

Polvo de Cob. . . . . Cuarenta granos. (Véase rubia.)

## HIDROTORAX, HIDROPESÍA DE PECHO.

## MEDIOS GENERALES.

Tónicos y diuréticos combinados.

Preparaciones scillíticas.

Cremor de tártaro combinado con la digital.

Preparaciones antimoniales diaforéticas.

Vejigatoriós al pecho.

Opio en pequeñas dosis.

## MEDIOS PARTICULARES.

Mezcla del aire atmosférico y del oxígeno dado á respirar.

Proporciones: aire vital  $\frac{4}{5}$ . aire ordinario  $\frac{1}{5}$ .

Pildoras del Dr. Dupuy. . . . . Cuatro mañana y tarde.

## HIPOCONDRIA.

## MEDIOS GENERALES.

Minorativos carminantes, eter, almizcle y opio combinados.

Asa fétida, alcanfor, valeriana y aceite de succino mezclados.

Agua de Vichy y sus análogas. Aguas de Sedlitz.

Baños, fricciones secas, ejercicio.

Infusiones de yerbabuena ó de Salvia.

## MEDIOS PARTICULARES.

- Quina . . . . . De doce á treinta y seis granos  
entre dos comidas.  
Píldoras calibeadas. . . . . De seis granos á media dracma.  
Tónicas de Stoll. . . . . De cuatro á seis granos.  
Extracto de eleboro negro . . . . . De uno á doce granos.  
Polvo absolyente. . . . . De seis granos á media dracma.  
Píldoras tónicas de Bucher. . . . . De tres á seis granos de tarde.  
De Rudio . . . . . De doce granos á dos escrúpulos.  
Splénicas inglesas . . . . . De tres á seis idem.  
Marciales de Sideham . . . . . Dos escrúpulos al dia.

## INDIGESTION.

- Elixir de Garux. . . . . De dos dracmas á una y media  
onza.  
Bolo digestivo de Smith. . . . .  
Electuario del Dr. Ward . . . . . De una á dos dracmas.  
Píldoras estomáquicas de Smith . . . . . De tres á seis.  
Tónicas de Huh. . . . . De una á dos idem. (*Véase dispepsia.*)

## HISTÉRICO.

(*Véase afecciones histéricas.*)

## ICTERICIA.

(*Véase amarilléz.*)

## INFLAMACION DEL ESTÓMAGO.

(*Gastritis.*)

## MEDIOS GENERALES.

- Sangrias, vejigatorios sobre el epigastrio.  
Eucemas emolientes y laxantes.  
Baño caliente y pediluvios.  
Bebidas mucilaginosas.

## MEDIOS PARTICULARES.

- Pocion anti-emética de Riverio.

Disolucion de acetate de sosa.  
Opio gomoso á pequeñas dosis.

INFLAMACION DEL HIGADO. (*Hepatitis.*)

MEDIOS GENERALES.

- Sangrias ó sanguijuelas y ventosas escarificadas.
- Calomelanos unidos á la jalapa ó á otro catartico.
- Vejigatorios sobre el lugar adolorido.
- Enemas emolientes.
- Pediluvios, diaforéticos suaves.
- Pulpa de tamarindo . . . . De una dracma á una oaza.
- Nitrate de potasa . . . . De seis á doce granos en una tipsana diurética.
- Espíritu de nitro dulce. . . De seis á ocho gotas en una tipsana diurética.

MEDIOS PARTICULARES.

- (*Cuando hay síntomas de supuración.*) . . . . . Una dracma de quina cada dos horas.
- (*En la hepatitis aguda cuando se sospecha la formación de un escirro.*) . . . . . Fricciones mercuriales sobre la region del higado. Píldoras mercuriales al interior.
- (*En la convalecencia.*) . . . La quina, la genciana, la raiz de columbo unida á la sal de Sedlitz.

INFLAMACION DE LOS INTESTINOS.

(*Enteritis.*)

MEDIOS GENERALES.

- Sangrias, sanguijuelas sobre el abdomen, laxantes suaves, tales como el aceite de risino, el sulfato de magnesia, el rui-barbo.
- Enemas emolientes, fomentos calientes al abdomen.
- Vejigatorios sobre la parte afecta.
- Semi-cupios.

Cuando hay constipacion. Ca-

lomelanos, . . . . . Doce granos en píldoras muy pequeñas dadas mañana y tarde.

### INFLAMACION DE LOS RIÑONES.

(Nephritis.)

#### MEDIOS GENERALES.

Sangría, aplicacion local de sanguijuelas, cataplasmas emolientes.  
Enémas emolientes, bebidas diluyentes tales como el agua de cebada, la semilla de lino, infusion de malvas, laxantes ligeros, baños calientes, diaforéticos suaves.

#### MEDIOS PARTICULARES.

Decoccion de hojas secas de durazno, de uba ursi.  
Agua ferruginosa y quinada.

### INFLAMACION DE LA VEJIGA.

(Cistitis.)

#### MEDIOS GENERALES.

Laxantes refrigerantes, inyecciones emolientes y opiadas.  
Opio al interior á pequeñas dosis.

#### MEDIOS PARTICULARES.

Bálsamo del Canadá.  
Píldoras de cicuta ó de beleño.

### INSOMNIO.

Jarave de diacodion. . . . De media á una onza.  
Opio de Rousseau. . . . De dos á diez gotas en una infusion de flores de amapolas.  
Laudano de Sideham. . . . De diez gotas á una dracma en una pocion calmante.  
Píldoras orientales. . . . De dos á tres por tarde.

### ISCURIA.

(Véase retencion de orina.)

## AMARILLÉZ.

## MEDIOS GENERALES.

Sangría (si el enfermo es pletórico, y se queja de dolor en la region del hígado, si ha habido suprecion de reglas, ó de hemorroides; si hay síntomas de inflamacion.)

- Vómitivos. Hipecacuana. . . . . Treinta granos.  
 Píldoras sapon aloeticas. . . . . De cinco á seis al dia.  
 Fomentos, y fricciones sobre el estómago é hígado.  
 Aguas termales sulfureas, cremor de tartaro soluble.

## MEDIOS PARTICULARES.

- Cañamones. . . . . Dos onzas en decoccion en dos azumbres de cerveza edulcorada con azucar: medio cuartillo todas las mañanas.  
 Spiritu de trebol febrino. . . . . De una dracma á una onza.  
 De angélica compuesta. . . . . De treinta á sesenta gotas.  
 Tintura de Bestuchef. . . . . De quince á cuarenta gotas.  
 Bolo digestivo de Smith.  
 Electuario del Dr. Wald.  
 Poción de hipecacuana de Haller.  
 Polvo de antimonio marcial de Keup. . . . . De cinco á seis granos.  
 Diaromatón. . . . . De cinco á veinte granos.  
 Tintura sagrada. . . . . Una cucharada en vaso de agua de azucar.  
 Spiritu de nitro dulce. . . . . De veinte á sesenta gotas en un vaso de una bebida diurética.  
 Mixtura de Quarin. . . . . Dos cucharadas cada tres horas.  
 Píldoras anti-histericas de Buchan. . . . . Cinco á seis al dia.  
 De Greding. . . . . Una de mañana y tarde.  
 De Starkey. . . . . Seis á ocho granos.  
 Fundentes de Vicq-de Azyr. . . . . De dos á cuatro al dia.  
 Cremor de tartaro soluble. . . . . De una á dos dracmas.  
 Extrato de trifolio febrino. . . . . De doce á veinte y cuatro granos.  
 Spiritu de coclearia. . . . . De quince gotas á una dracma.  
 Electuario de Zaragatona. . . . . De una á seis dracmas.

- Elixir de Witt. . . . . Media onza.  
 Vino anti-histérico. . . . . Cuatro cucharadas al día.

## LETARGO.

- Agua de la generala. . . . . De dos á cuatro dracmas.  
 Electuario diacolocoyntidos. . . De una dracma á una onza. (Como  
 purgante.)  
 Píldoras de Rudio. . . . . De doce granos á dos escrúpulos.  
 Mixtura del Dr. Franck. . . Una cucharada de café de cuar-  
 to en cuarto de hora.

## LEUCORREA.

## MEDIOS GENERALES.

- La quina, los ferruginosos, el ácido sulfúrico.  
 Los baños frios locales.  
 Inyecciones con el sulfato de zinc ó de alumbre una dracma  
 en un azumbre de agua.  
 Catecú y goma kuino.  
 Bálsamo de copaiba y del Canadá.  
 Píldoras de aloes y de mirra.  
 Vinos generosos. Alimentos nutritivos.  
 Aguas minerales ferruginosas.

## MEDIOS PARTICULARES.

- Jabon de Starkey. . . . . De ocho á diez granos.  
 Vino del Dr. Fordyce. . . . . Cuatro cucharadas al día.  
 Quina . . . . . De un escrúpulo á una dracma.  
 Ruibarbo. . . . . Una dracma en píldoras con el  
 jarave de zarza purgante.  
 Agua de Boule. . . . . Una onza mezclada con vino.  
 Poción balsámica de Choppart.  
 Vino anti-leucorreatico. . . . . Dos onzas mañana y tarde.  
 Emplastro stíptico de Swediaur.  
 Polvo diarrhodon . . . . . De doce granos á una dracma.  
 Píldoras calibeadas. . . . . De seis granos á media dracma.  
 Abstríngentes . . . . . De seis granos á un escrúpulo.  
 Píldoras de helecho compues-  
 tas. . . . . Idem.  
 Tónicas de Stoll . . . . . De cuatro á seis.  
 Bolo fortificante de Desbois. . . . . Seis al día.

256.

Elixir de Witt . . . . . Media onza.  
Americano . . . . . De media á dos dracmas.  
De G~~r~~ux . . . . . De dos dracmas á una onza.  
Opíata de Tissot . . . . . Dos dracmas mañana y tarde.  
Anti-leucorreica . . . . . De dos á cuatro escrúpulos.

**MAL CADUCO.**

(*Véase epilepsia.*)

**ENFERMEDADES DE LA PIEL.**

(*Véanse herpes, sarna, tiña &c.*)

**ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS.**

Agua de Quercetan . . . . . De una á dos onzas.  
Esencia dulce de Halles . . . . . Veinte gotas en una bebida diurética.  
Lexia de Saunder . . . . . Tres dracmas al dia.  
Licor anti-nefrítico del Dr. Adams . . . . . Dos dracmas mañana y tarde.

**MAL DE GARGANTA.**

(*Véase equinancia.*)

**ENFERMEDADES DE LOS NERVIOS.**

(*Véase vapores.*)

(*Spasmos convulsiones.*)

**MANIA.**

Polvo de Junquín . . . . . Doce granos.

**MARASMO CACHEXIA, ATONIA, GENERAL.**

Electuario anti-cachetico de Ward . . . . . De una á dos dracmas tres veces al dia.

Elixir fortificante del Dr. Selle. . . . .	Una cucharada pequeña de dos en dos horas.
De Mithye. . . . .	Idem.
Jarave vinoso cardiaco de Wirtemberg. . . . .	De una á dos onzas.
Elixir resolutivo del Dr. Selle	Una onza ó dos cucharadas.
Infusion de olin de Piderit	Una dracma á una onza de buen vino.
Elixir pectoral . . . . .	De media á dos dracmas en una taza de infusion.
Mixtura de mirra de Griffith	Cuatro cucharadas tres veces al dia.
Osmazóme de Thenar . . . .	De una á dos dracmas.
Pildoras de Haen. . . . .	Cuatro cada tres dias.
Marciales de Sideham. . . .	Dos escrúpulos al dia.
Marciales de Kocmpf . . . .	De doce á treinta y seis granos al dia.
Polvo antimonial de Keup . . .	De cinco á seis granos.
Corrovorante de Werlhoff.	Dracma y media.
De diaromatón. . . . .	De cinco á veinte granos.
Tintura de Labandula compuesta . . . . .	De diez gotas á una dracma.
Polvo de Hartmann . . . . .	De media á dos dracmas.

## MENORRAGIA.

(Véase flujo inmoderado de las reglas, y pérdida de sangre del útero.)

## NEFRÍTICO.

(Véase cólico.)

## NEFRITIS.

(Véase inflamacion de los riñones.)

## OBSTRUCCIONES.

Mixtura fundente de Murtiel.	Media onza cada hora.
Polvo Ecoprotico del Dr. Selle	De dos á cuatro cucharadas de café al dia.

- Tintura de antimonio de Jacobo. . . . . De diez á veinte gotas.  
 Jarave de nicociana . . . . De dos dracmas á dos onzas.  
 Conserva de coclearia . . . De una á seis dracmas.  
 Polvo de los tres Santaux. De doce granos á una dracma.  
 De aro de Berckman . . . . Idem.  
 Electuario de fiere piera. . De una á seis dracmas  
 Benedicto laxante . . . . De una dracma á una onza.  
 Opiata mesenterica . . . . De media á dos dracmas.  
 Píldoras de Starkey . . . . De seis á ocho granos.  
 Píldoras tartareas de Schoder. De un escrúpulo á una y media dracma  
 Balsámicas de Sthal. . . . De uno á doce granos.  
 Scosezas . . . . . De dos á cuatro al dia.  
 Vino calibeadó . . . . . De dos dracmas á dos onzas, se le dá muchas veces en una infusion de artemisa.  
 Tintura de Marte de Ludovico. De cinquenta á ochenta gotas.  
 Extracto de chicoria silvestre. De seis granos á dos dracmas.  
 De berros . . . . . De doce granos á media dracma.  
 De fumaria . . . . . De un escrúpulo á una dracma.  
 De hombrecillo . . . . . Idem.  
 Oxiniel scilitico . . . . . De una dracma á una onza.  
 Jarave de coclearia . . . . De dos dracmas á una y media onza.  
 De berros . . . . . Idem.  
 De perifollo . . . . . Idem.  
 De cinco raices aperitivas. Idem.  
 De flores de durazno . . . Idem Como purgante.  
 Píldoras de Lemonier . . . . Seis al dia en dos tomas.  
 Infusion de olin de Piderit. De una dracma á una onza en vino.  
 Agua de Barage artificial . De uno á dos azumbres al dia.  
 Decoccion de aloes compuesta de la farmacoepa de Londres.

## COLOR PÁLIDO.

(Véase clorosis.)

## PALPITACION DE CORAZON.

(Véase enfermedades de los nervios spasmos, y afecciones histéricas.)

- Polvos absorventes. . . . . De seis granos á media dracma.

- Letificante . . . . . De doce granos á una dracma.  
 Confeccion, alquermes . . . . . De un escrúpulo á una dracma.

## PARALISIS.

## MEDIOS GENERALES.

- (Si la enfermedad se origina de causas que producen la apoplejia.) Sangrias y purgantes.  
 (En todos los casos.) Fricciones secas, sinapismos y rubefacientes.  
 Urticacion baños calientes, estimulantes al interior como semilla de mostaza, ajos, rábanos, sales volátiles alcalinos

## MEDIOS PARTICULARES.

- Alcohol amoniaco . . . . . De veinte á cuarenta gotas en un vehículo apropiado.  
 Éter sulfúrico . . . . . De diez á treinta gotas.  
 Tintura de Bestuchef . . . . . De quince á cuarenta gotas.  
 Cerveza cefálica inglesa . . . . . Cuatro ó cinco vasos al día.  
 Bolo de Swediaur . . . . . Dos al día.  
 Gargarismo de Quarin . . . . . Para la parálisis de la lengua.  
 Emetico . . . . . De uno á tres granos en enemas.  
 Electuario lenitivo . . . . . De cuatro dracmas á una y media onza.  
 Amoniaco líquido . . . . . Doce gotas, tarde y mañana.  
 Vino emético . . . . . De dos dracmas á cuatro onzas.  
 Espiritu volatil aromático de Silvio . . . . . De seis á veinte gotas.  
 Rob de zarza purgante . . . . . De un escrúpulo á dracma y media para purgar.  
 Agua teriacal . . . . . De una á cuatro dracmas.  
 Electuario diacolocynthidos . . . . . De una dracma á una onza. (*Purgante enérgico.*)  
 Diaiphenix . . . . . Idem purgante.

## PERDIDA DE SANGRE DEL UTERO.

- Jarave de Simphytum majus . . . . . De dos dracmas á una y media onza.  
 Elixir vitriolico . . . . . De ocho á veinte gotas en una bebida abstringente.  
 Píldoras abstringentes . . . . . De seis granos á un escrúpulo.

- Alumbre apagado de Herve-  
cio . . . . . De seis granos á media dracma.  
Pildoras de elecho compuestas. Idem.  
Trosiscos de Karave . . . . . De doce granos á una dracma.

## VIRUELA.

(Véase esta enfermedad.)

## PERINEUMONIA.

## MEDIOS GENERALES.

- Sangrias del brazo. Sanguijuelas al pecho.  
Vejigatorios al punto adolorido.  
Vapores de una decoccion de plantas emolientes y de antimoniales en pequeñas dosis.  
Cocimiento de cebada ligeramente acidulado con el jugo de limon.  
Pedilubios.

## MEDIOS PARTICULARES.

- Oximiél scilítico. . . . . De una á una y media onza en bebida pectoral.  
Pildoras nitrosas alcañforadas. De seis á doce granos.  
Pildoras cinoglosas. . . . . De tres á seis granos.  
Cocimiento anti-septico de Boherhave. . . . . Dos onzas cada cuatro horas.  
Mixtura pectoral del mismo. Una onza cada media hora.  
Jarave de Willis. . . . . Una cucharada mañana y tarde.  
Emulsion de almendras. . . . . De tres á cuatro onzas.

## PERINEUMONIA FALSA.

(El mismo tratamiento que para la perineumonia verdadera.)

## FRENITIS.

(Inflamacion del cerebro y de sus membranas.)

## MEDIOS GENERALES.

- Después de la sangria, hielo y oxierato en la cabeza.  
Purgantes energicos. Pedilubios calientes rubefacientes y sinapismos, bebidas frias y acidulas. Enémas laxantes.

## MEDIOS PARTICULARES.

(*En la frenitis sintomática.*) Bolo diaforético.  
 Extracto ó polvo digital purpúrea. . . . . De un escrúpulo á media dracma.

## TISIS LARINGEA.

(*Véase angina laringea.*)

Éter balsámico de Tolú.  
 Julepe Escosez á cucharadas.  
 Mixtura para la angina inflamatoria.  
 Pastillas del Dr. Chaussier. . De cuatro á seis al dia.

## TISIS PULMONAL.

## MEDIOS GENERALES.

(*Periodo inflamatorio.*) Sangrias laxantes suaves y bebidas anti-ilexísticas.  
 Leche de burra, de muger, de vaca.  
 Camisas de franela.  
 Aguas termales sulfúreas.  
 Vejigatorios volantes.

## MEDIOS PARTICULARES.

La respiracion de los vapores de éter.  
 Digital purpúrea, á pequeñas dosis en tintura ó cocimiento.  
 Sulfate de cobre dado como vomitivo en el primer periodo, de tres á seis granos, mezclados con otro tanto de hipocacua.  
 Bebida compuesta de agua de cebada, de jarave de tolú goma amoniaco, y vinagre escilítico.  
 Lichen islandico  
 Acido benzoico . . . . . De ocho á diez y seis granos cada dos dias.  
 Pildoras incipientes de Buchan. . . . . De tres á cuatro en la invasion de la enfermedad.

\*

Píldoras bálsamicas de Boher- have. . . . .	Una cada tres horas.
Jarave pectoral del Dr. Selle.	Una onza cada hora.
Leche de goma amoniaco. . . . .	De cuatro á ocho cucharadas al dia.
Jarave de Simphytum majus.	De una á una y media onza.
Conserva de rosas. . . . .	De tres á cuatro onzas al dia.
Quina . . . . .	Un escrúpulo cada tres horas.
Elixir vitriolico. . . . .	De veinte á treinta gotas en un vaso de . . . . .
Vino calibeado . . . . .	Tres cucharadas al dia.
Azufre lavado. . . . .	De doce granos á una dracma.
Polvos de goma tragacanto.	De seis granos á una dracma.
Pastillas de azufre. . . . .	De una dracma á una onza.
Píldoras de cinoglosa. . . . .	De seis á ocho granos.
De Moston . . . . .	De uno á seis granos.
Bálsamo de Lucatel . . . . .	De media á dos dracmas.
Elixir pectoral . . . . .	Idem.
Jalea de Lichen islandico. . . . .	De dos á ocho onzas.
Chocolate de Lichen. . . . .	Quatro onzas.
Píldoras estenicas de Breun.	De una á dos en la mañana.
Jarave de higado de azufre.	De media á una onza.
Agua de cal . . . . .	De una á cuatro onzas. Se le da en leche ó mezclada con el jarave pectoral.
Agua de brea. . . . .	De dos á seis onzas. Idem.
Jarave bálsamico de tolú, de lombarda, de tortuga de caracol, pectoral ingles. . . . .	De dos dracmas á una y media onza.

### PIEDRA DE LA VEJIGA.

(Véase mal de piedra.)

### ORINA CRUENTA (Hematuria.)

### MEDIOS GENERALES.

Solucion de goma arábica, cocimiento de cebada y malvas mez-  
clados.

Enemas emolientes, agua alcalina gaseosa, alcanfor y opio  
mezclados.

## MEDIOS PARTICULARES.

Cocimiento de uva ursi.  
Idem de hojas de durazno.

## PITUITA.

Mixtura balsámica de Fullér. Una cucharada mañana y tarde.  
De mirra de Griffith . . . Cuatro cucharadas tres veces al día.  
Elixir anti-asmático de Boerhave. . . . . De dos á treinta gotas en una infusion pectoral.  
Cordial de Paracelso. . . . De diez á treinta gotas en un vehiculo apropiado.  
Polvo de goma tragacanto. De seis granos á una dracma.  
De iris compuesto. . . . De doce granos á media dracma.  
Pildoras de cinoglosa . . . De tres á seis granos.  
De Moston. . . . . De uno á seis granos.  
Trosiscos de agárico. . . . De un escrúpulo á una dracma.

## PLEURECIA.

## MEDIOS GENERALES.

Sangrias. Pedilubios y diaforéticos en el principio.  
Bebidas emolientes, pectorales, y mucilaginosas. Vejigatorios sobre el punto del dolor. Media leche nitrada.

## MEDIOS PARTICULARES.

Laxantes suaves. Poción hecha con una onza del aceite de olivas cuatro onzas de mucilago, tres dracmas de oximiel scilítico, dos onzas de agua de poleo.

(Véase el artículo perineumonia.)

## RACHITIS.

## MEDIOS GENERALES.

Inmersiones en agua fría. Fricciones con franelas secas.

Regimen nutritivo, ..... 264.  
Hierro amoniacal y oxide de  
zinc mezclados. Quina de una dracma á cuatro al dia.

#### MEDIOS PARTICULARES.

Fosfates de cal y de sosa. . . Un escrúpulo al dia.  
Lociones con media onza de potasa, en una libra de agua.

#### RABIA.

(Véase *hydrofobia*.)

#### MEDIOS GENERALES.

Incisiones, cauterio actual, ventosas escarificadas, y vejiga-  
torios sobre la herida.  
Fricciones mercuriales. Opio á altas dosis.  
Alcali volatil. . . . . Doce gotas en un vaso de agua  
cada tres horas.  
Vinagre ó vino con exceso. (*Si el enfermo no puede beber*) se le  
dá el ácido tartarico ó citrico en polvo.

#### MEDIOS PARTICULARES.

Seis granos de pimienta larga envueltos en hostia. (*No hay mas que  
un remedio seguro: la cauterizacion.*)  
Cinabrio. . . . . Un escrúpulo.  
Almizcle . . . . . Diez y seis granos, mezclese en  
un vaso de aguardiente.  
Asafétida . . . . . De doce granos á un escrúpulo.  
Alcanfor. . . . . De diez á doce granos.  
Opio. . . . . Uno, dos ó tres granos.  
Quina. . . . . Media dracma tres veces al dia.

#### ATRASO DE LAS REGLAS.

#### MEDIOS GENERALES.

Fumigaciones emolientes. Aplicaciones de vejigas llenas de agua  
caliente  
Tintura de sabina y de castor.  
Tintura de olin, de mirra y de cantáridas, mezcladas en pro-  
porciones convenientes, y tomadas en pequeñas dosis.

## MEDIOS PARTICULARES.

Tintura de éléboro blanco. . . . .	De una á dos cucharadas de café al dia.
Elixir de propiedad de paracelso . . . . .	De seis gotas á media dracma.
Espíritu volatil aromático de Silvio. . . . .	De seis á treinta gotas.
Bálsamo del Comendador. . . . .	De diez á cuarenta gotas.
Extracto de berro de ajeno, de artemisa, de aristoloquia.	De doce granos á media dracma.
Infusion de ollin de Piderit.	De una dracma á una onza en vino.
Extrato de cohombro. . . . .	De un escrúpulo á media dracma.
De azafrán. . . . .	De cuatro á veinte y cuatro granos.
De valeriana. . . . .	De doce á cuarenta y ocho granos.
De vincetoxicum. . . . .	De medio escrúpulo á media dracma.
Elixir americano. . . . .	De una á dos dracmas.
Agua de yerbabuena compuesta.	De una á cuatro dracmas.
Espíritu de coclearia. . . . .	De quince gotas á una dracma.
Pildoras de Haen. . . . .	Cuatro cada tres dias.
Carminantes de Buchan. . . . .	De cuatro á cinco al acostarse.
Tartareas de Schroder. . . . .	De un escrúpulo á una y media dracma.
De Fullér. . . . .	Dos en la mañana y dos en la tarde.
Balsimicas de Sthal. . . . .	De dos á doce granos.
Tónicas de Bucher. . . . .	De tres á seis granos.
Histericas. . . . .	De seis granos á media dracma.
Calibeadas. . . . .	De seis granos á un escrúpulo.
Trosiscos de mirra. . . . .	De un escrúpulo á una dracma.
Histericos. . . . .	De doce granos á una dracma.
Pocion emenagoga de Desbois.	Á cucharadas de cuarto en cuarto de hora.
Jarave de calabria. . . . .	De dos dracmas á una onza.
Jarave de canela, de ajeno, de artemisa. . . . .	De dos dracmas á una y media onza.
Teriaca. . . . .	De doce granos á dos dracmas.
Orvietan. . . . .	De diez y ocho granos á una dracma.

Electuario de ballas de Laurel.	De un escrúpulo á dos dracmas.
De hiera picra. . . . .	De una á seis dracmas.
Venedicto laxante. . . . .	De una dracma á una onza, se usa tambien en enemas.
Pastillas marciales. . . . .	Dos al dia.
De azafrán . . . . .	De una á cuatro dracmas.
Límaduras de fiero porfirizadas. . . . .	De dos á veinte y cuatro granos, se le mezclan con una opiata amarga ó purgante. Tambien se dán divididas en vino de España.
Azafrán de Marte. . . . .	De uno á diez y ocho granos.
Vino de ajenjos. . . . .	De una á seis onzas en ayunas.
Calibeadó. . . . .	De dos dracmas á dos onzas con una infusion de artemisa.
Tintura de ajenjos. . . . .	De diez granos á una dracma en una taza de té.
Esencia de Wedelio. . . . .	De media á una dracma.
Elixir teriacal. . . . .	De diez á treinta gotas.
Miel de cohombro silvestre. . . . .	De una dracma á cuatro en enemas.
Elixir uterino de Crolius. . . . .	De una á dos dracmas.

#### RETENCION DE ORINA HISCURIA.

##### MEDIOS GENERALES.

- Opiados diuréticos y dulcificantes en bebidas y enemas.  
 Medios quirurjicos, sondas y candelillas.  
 Tintura de muriate de fiero. . . . . A la dosis de diez gotas de cuarto en cuarto de hora.  
 Pildoras de opio y de calomelanos y alcanfor mezclados.

##### MEDIOS PARTICULARES.

- Espiritu de nitro dulce . . . . . De cinco á seis gotas en una pocion emoliente.  
 Jabon medicinal. . . . . Una drama en pildoras.  
 Pulpa de casia . . . . . De una á una y media onzas.  
 De tamarindo. . . . . De dos dracmas á una onza.  
 Ratafia del comendador de Caumartin. . . . . Un vaso pequeño, por la mañana en ayunas.  
 Polvo temperante de Sthal. Doce granos.

- Cerveza diuretica inglesa. . . Un azumbre al día.  
 Vino diurético amargo de Corvisart . . . . . Cuatro cucharadas al día.  
 Vino amargo de la Caridad. De una dracma á dos onzas, mañana y tarde.  
 Esencia dulce de Hallér. . . Veinte gotas.  
 Poción diuretica del Dr. Hallér. Una cucharada cada hora.  
 De Buchan. . . . . Una taza cada cuatro horas.  
 Agua de Quercetán . . . . De una á dos onzas.  
 Pildoras scilíticas de Edimburgo . . . . . De tres á cuatro.  
 Linimento diurético de Kuser.

## REUMATISMO AGUDO.

## MEDIOS GENERALES.

- Sanguijuelas aplicadas sobre el sitio del dolor.  
 Tintura digital. . . . . De diez á veinte gotas cada cuatro horas.  
 Enemas laxantes ó ligeros minorativos.  
 Vejigatorios volantes ó linimentos rubefacientes.  
 Diaforeticos á pequeñas dosis.

## MEDIOS PARTICULARES.

- Polvos de hiepacuana compuestos. (*Farmacop. de Lond.*) De diez á doce granos.  
 Polvo antimonial. (*Farmacop. de Lond.*)  
 Quina, á la dosis de una dracma, mezclada con diez granos de nitro.  
 Calomelanos mezclados al opio.  
 Fricciones con el éter acetico.  
 Decoccion de tamarindos. . . Un cuartillo.  
 Espiritus de mildereros. . . De doce á treinta gotas en una bebida calmante.  
 Cremor de tártaro soluble. . De una á una y media dracma.  
 Goma de guayaco. . . . . De un escrúpulo á media dracma en un vaso de suero.  
 Laudano líquido . . . . . De quince á veinte gotas.  
 Extracto de trebol de agua. De medio escrúpulo á media dracma.  
 De aguardiente alemán. . . De una á dos onzas para purgar.

Rob de sauco . . . . .	De un escrúpulo á una dracma.
De zarza purgante. . . . .	De un escrúpulo á una y media dracma.
Extracto de guayaco . . . . .	De doce granos á media dracma.
Píldoras de Vick de Aziz. . . . .	De dos á cuatro mañana y tarde.
Bolo diaforético inglés . . . . .	Dos al dia.
Licor anti-artrítico de Eller . . . . .	De veinte á cuarenta gotas.
Polvos de Dower . . . . .	Media dracma.
Emulsion del Dr. Willis.	
Tipsana de Vigaroux . . . . .	Un azumbre.
Vino de guayaco elaborado de Leuwis . . . . .	Un vaso pequeño por la tarde.
Emulsion de Quarin.	
Cerveza de Sidehám. . . . .	Un azumbre en la mañana.

## REUMATISMO CRÓNICO.

## MEDIOS GENERALES.

Diaforéticos enérgicos, tales como el vino antimonial. Tintura de guayaco antimonial.  
 Opio combinado á los calomelanos, y al polvo antimonial.  
 Infusion de Rhododendron. ( 1 )  
 Baños de vapores. Duchas.

## ROMADIZOS CATARRALES.

Tipsana de Tissot . . . . .	Una pinta.
Especies pectorales. . . . .	Un puñado infundido en agua hirviendo edulcorado con la miel.
Tipsana de Buchan. . . . .	Un azumbre.
Jarave pectoral balsámico de Charles. . . . .	De una á una y media onza.
Miel scilítica. . . . .	De dos dracmas á una onza.

( 1 ) *Rhododendrum*. La rosa en griego se llama *Rhodon* y el laurel *Daphne*, de donde el Nerio se vino á llamar *Rhododaphne* ó *Rhododendro*: por que sus flores se parecen á las rosas y en sus hojas se asemeja al laurel. Se llama en las boticas esta planta comunmente *Oleander* y en Castilla tiene por nombre *Adelfa*.

Andrés de Laguna sobre Dioscorides *Anaxabreo fol. 429.*

- Hidromel simple. . . . . Un azumbre.
- Jarave de violetas, de crisimo compuesto, de tusilago, de culantrillo, de malvavisco, de borraja, de buglosa, de lombarda, de tortuga, de cabrito, de vaca, de caracoles, pectoral inglés, de Desessarts de Maloet, de Bouvart, de Rivet, de dátiles. . . . . De dos dracmas á onza y medio
- Pastillas vecchicas de Spitzley, de malvavisco, de goma arabiga, de iris. . . . . Ad libitum.
- Anti-catarrales de Tronchin. . . . . De seis á ocho al dia.
- De hipecacuana. . . . . Idem.
- Mixtura balsámica de Fullér. . . . . Una cucharada mañana y tarde.
- Pastillas del Dr. Jobard. . . . . Dos cada hora.
- Pildoras incisivas del Dr. Leroup. . . . . De tres á cuatro.
- Polvo pectoral de Wedelio. . . . . De uno á dos escrúpulos.
- Anti-catarral de Viena. . . . . De una á dos dracmas.
- Manteca de cacao. . . . . De dos á cuatro dracmas mezcladas con azúcar.
- Azucar rosada. . . . . De una á seis dracmas.
- Dé cebada, de manzanas. . . . . Ad libitum.
- Pasta pectoral de Parmentier. . . . . Ad libitum.
- Oximiél pectoral de Dancis. . . . . A cucharadas todas las horas.
- Pectoral de Edimburgo. . . . . De una á una y media onza.
- Pasta de malvavisco, de jarave de ubas. . . . . Idem.
- Jugo de regaliz, de Blosi, de regaliz, de anisado, de regaliz blanco. . . . . Idem.
- Crema pectoral de Tronchin. . . . . Idem.
- Pildoras de cinoglosa. . . . . De tres á seis granos.
- Balsámicas de Morton. . . . . De una á seis.
- De seila compuestas. . . . . De diez á veinte y cuatro granos al dia según la edad.
- Jarave de Willis. . . . . Una cucharada mañana y tarde.
- Jalca de lombarda. . . . . De dos á cuatro onzas.
- Mermelada de Tronchin. . . . . Onza y media á cucharadas de hora en hora.

\*

- Polvo de Dower . . . . . Media dracma.  
 Poción de Jeanroy . . . . . Seis cucharadas de café.  
 Crema pectoral del Dr. Jean-  
 net de Longrois . . . . . Á cucharadas de café cada media  
 hora.

## SARANPION.

## MEDIOS GENERALES.

- Enemas emolientes y laxantes suaves.  
 (Cuando hay opresion de pecho.) Un rubefaciente entre las dos  
 escapulas.  
 (Si hay tos frecuente.) Poción calmante, cocimiento de cebada, pe-  
 dilubios.  
 Antimoniales ligeramente opiados.  
 Tintura de digital purpurea. De diez á doce gotas.

## MEDIOS PARTICULARES.

- Emulcion de almendras . . . De tres á cuatro onzas con un  
 poco de jarave de adormidera  
 Agua de la Generala . . . . De dos á cuatro dracmas.  
 Bálsamo de Vincequerro . . . Ocho ó diez gotas, en azúcar.  
 Esencia Alexifarmaca de Sthal. De veinte á treinta gotas.

## SCIATICA.

(Véase reumatismos.)

## ESCORBUTO.

- Tipsana de rábanos de coclearia, de berros, desde un vaso  
 hasta un azumbre.  
 Cocimiento de abeto . . . . Una pinta al dia.  
 Conserva anti-escorbútica del  
 Dr. Selle . . . . . De dos á tres dracmas.  
 Agua de Beaufort . . . . . De cuatro dracmas á una onza  
 en un vehiculo apropiado.  
 Elixir anti-escorbútico del Dr.  
 Selle . . . . . Dos cucharadas al dia.

Anti-escorbútic® de Boher- have . . . . .	De una á dos dracmas en una tipsana.
Pocion anti-escorbútica del Dr. Franck. . . . .	Á cucharadas.
Vino anti-escorbútic® . . . . .	De cuatro á seis onzas en ayunas.
Gotas anodinas inglesas . . . . .	De diez gotas á media dracma.
Cefálicas inglesas . . . . .	Idem.
Espiritu volátil aromático de Silvio . . . . .	De seis á treinta gotas.
Tintura de goma seca . . . . .	De diez gotas á media dracma.
Extracto de berros . . . . .	De doce granos á media dracma.
De fumaría . . . . .	De un escrúpulo á una dracma.
Espiritu de coclearia . . . . .	De quince gotas á una dracma.
Jarave de coclearia, de ber- ros, de perifolio, anti-es- corbútic® . . . . .	De dos dracmas á una y media onza.
Conserva de coclearia . . . . .	De una á seis dracmas.
Pildoras de panacéa mercurial. Jarave del Dr. Portal. . . . .	De seis granos á un escrúpulo. Una onza.
Depurativo de Majaulk . . . . .	De una á dos onzas.
Cerveza anti-escorbútica . . . . .	Dos vasos al día.
Pastillas de émula campánula . . . . .	Media onza al día.

#### ESCRÓFULAS.

#### MEDIOS GENERALES.

Baños frios, baños del mar.	
Calomelanos mezclados con el tartrite de antimonio.	
Sulfareto de mercurio . . . . .	Á la dosis de quince granos.
Pildoras de Plummer.	
Decoccion de guayaco, de zarzaparrilla, de zazafras y de me- reoron mezclados. ( <i>Dicha tipsana de Lisboa.</i> )	
Muriate barítico líquido . . . . .	De tres á doce gotas.
Extracto de cicuta.	
Decoccion fuerte de hojas de tucilago.	
Agua de cal combinada con la quina.	
Carbonate de Sosa . . . . .	De un escrúpulo á una dracma.
Columbo, cascarilla y genciana, mezclados con los aromáticos.	
Limonada nítrica.	
Preparaciones marciales, agua mineral ferruginosa.	

## MEDIOS PARTICULARES.

Resina de guayaco. . . . .	Seis granos en tres tomas al día.
Extracto de cicuta. . . . .	De dos granos á una y dos dracmas graduadamente.
Confeccion Tiames. . . . .	De una dracma á una onza. (Purgante.)
Pildoras de panacéa mercurial . . . . .	De seis granos á un escrúpulo.
De Beloste . . . . .	De dos á tres al día, de seis á ocho para purgar.
De aconito del Dr. Double . . . . .	Una por mañana y tarde.
Elixir de Raulin . . . . .	Una cucharada antes de comer.
Eptiope antimonial de Huxam. . . . .	De ocho á diez granos.
Elixir aurífico de Rotrou. . . . .	De seis á doce gotas.
De Peyrillu. . . . .	Una cucharada.
Jarave deparativo de Majanlf. . . . .	De una á dos onzas.
Anti-escorbútico . . . . .	De cuatro dracmas á una onza al día.

## ESPASMO:

Extracto de azafrán . . . . .	De cuatro granos á un escrúpulo.
De valeriana . . . . .	De doce á cuarenta y ocho granos.
De almizcle. . . . .	De uno á tres granos.
De agua de yerbabuena compuesta . . . . .	De una á cuatro dracmas.
De la Generala. . . . .	De dos á cuatro idem.
Eter sulfúrico. . . . .	De doce á veinte y cuatro gotas en un pedazo de azúcar.
Polvo anti-espasmódico . . . . .	De un escrúpulo á una dracma.
Bolo anti-espasmódico de Buchan. . . . .	Seis al día.
Pildoras anti-espasmódicas de Piderit . . . . .	De doce á treinta y seis granos al día.
Tintura anti-espasmódica de Kemp . . . . .	Cuarenta y ocho gotas cada media hora.
Tebaica de Bamburg. . . . .	De diez y seis á cuarenta gotas.
Julepe moscado de Fuller . . . . .	De dos á seis onzas.
Pildoras sténicas de Brown. . . . .	De una á dos por la mañana.

- Tintura nerviosa tónica de  
 Berlín . . . . . De una á dos dracmas.  
 Polvo de Guteta . . . . . De dos granos á una y media  
 dracma.  
 De oro de Zell . . . . . De seis granos á un escrúpulo.  
 Extracto de artemisa . . . . . De doce granos á media dracma.  
 Aceite volátil de succino . . . . . De diez á doce gotas.  
 Eter sulfúrico . . . . . De diez á treinta gotas.  
 Muriático . . . . . Idem.  
 Tintura de Bestuchef . . . . . De diez y seis á cuarenta gotas.  
 Eter acético acerado de Kla-  
 proth . . . . . De quince á cuarenta gotas.  
 Polvo anti espasmódico de  
 Sthal . . . . . Treinta granos mañana y tarde.  
 Sedativo de Wetzlez . . . . . (Véase su uso en esta obra.)  
 De Tunquin . . . . . De doce á veinte y cuatro granos.  
 Espíritu de olin de Reus . . . . . De veinte á treinta gotas.  
 Agua eterea alcanforada de  
 Planché . . . . . Á cucharadas con el jarave de  
 azahar.

## STRANGURIA.

(Véase disuria.)

## SUPRESION DE LA TRANSPIRACION.

- Elixir sudorífico de Willis. De una á dos dracmas.  
 Infusion de olin de Piderit. Una dracma en una onza de buen  
 vino.

## SUPRESION DE LAS REGLAS.

(Véase atraso de ellas.)

## SINCOPE.

(Véase desfallecimiento.)

- Tintura de castor . . . . . Una ó dos cucharadas de café.  
 Confeccion de alquermes . . . . . De un escrúpulo á una dracma.  
 Agua de la Reina de Ungria. De diez á veinte gotas.

## TIÑA.

- Extracto de hombrecillo . . . . . De veinte y cuatro granos á me-  
 dia dracma.

- De scabiosa. . . . . De seis á veinte y cuatro granos.  
 Confecion Hamech. . . . . De una dracma á una onza. (Co-  
 mo purgante.)  
 Píldoras de panacéa mercurial. De seis granos á un escrúpulo.  
 Remedio de Barlow.  
 Remedio del Dr. Bircher. (1)

## TETANOS TRAUMATICO.

Pocion anti-tetánica de Fournier.

## TRISMO DOLOROSO DE LA CARA.

Píldoras del Dr. Meglin. . De una á diez y ocho.

## DOLORES DE VIENTRE.

Elixir americano. . . . . De una á dos dracmas.  
 Pocion de Spielman. . . . . Á cucharadas.

## DOLORES DE VIENTRE DE LOS NIÑOS.

Pocion de Spielman. . . . . Á cucharadas cada cuarto de hora.

## TOS SOFOCANTE.

(Véase angina traqueal y la tabla de las enfermedades.)

## TUMORES SCIRROSOS.

Píldoras mercuriales. . . . . De dos á tres al dia.  
 Jarave de zarzaparrilla. . . De una á una y media onza.  
 Extracto de cicuta. . . . . De dos á tres granos. Se aumen-  
 ta la dosis graduadamente todos  
 los dias. (2)

## TIMPANITIS.

Enémas purgantes. Laxantes unidos con los aromáticos.

(1) Véase la tabla de las enfermedades externas.

(2) Idem.

Asafétida y eter. Infusion de rábanos y gengible.  
 Hielo aplicado sobre el vientre. Fricciones con la trementina,  
 los aceites y el alcanfor.

### ÚLCERAS INTERNAS.

Trementina hervida . . . . . De un escrúpulo á una dracma  
 en píldoras.  
 Bálsamo de Meca, del Perú  
 y de Tolú. . . . . Idem. (1).

### VAPORES, ENFERMEDADES DE LOS NERVIOS.

#### NEUROSES.

Elixir vitriólico . . . . . De quince á treinta gotas.  
 Cremor de tártaro soluble . . . . . De dos dracmas á media onza en  
 agua de avena.  
 Píldoras nitroso alcanforadas. De diez á treinta granos.  
 Almizcle . . . . . De cinco á veinte granos.  
 Gotas anodinas de Inglaterra. De diez gotas á media dracma.  
 Polvo anti-espasmodico . . . . . De un escrúpulo á una dracma.  
 De guteta . . . . . De dos granos á una y media drac-  
 ma. Segun la edad del enfermo.  
 (Véase espasmo.)

#### VAPORES HISTÉRICOS.

Píldoras de asafétida. . . . . De ocho á diez y ocho granos  
 dos veces al día.  
 Polvo de Tunquin. . . . . De doce á veinte y cuatro granos.  
 Elixir de propiedad de Para-  
 celso. . . . . De seis gotas á media dracma.  
 Espíritu volatil y aromático  
 de Silvio. . . . . De seis á treinta gotas.  
 Extracto de artemisa . . . . . De doce granos a media dracma.  
 De valeriana. . . . . De doce á cuarenta y ocho granos.  
 Agua de yerbabuena compues-  
 ta. . . . . De una á cuatro dracmas.

(1) Véase la tabla de las enfermedades externas.

De la Generala. . . . .	Idem.	De dos dracmas á una y media onza.
Jarave de artemisa . . . . .		De un escrúpulo á dos dracmas.
Electuario de ballas de laurel. . . . .		De seis granos á media dracma.
Píldoras históricas. . . . .		De cinco á seis.
Anti-espasmodicas de Buchan		De cinco á ocho mañana y tarde.
Píldoras anti-hísticas del Dr.		De quince á treinta gotas.
Selle. . . . .		De veinte á cuarenta gotas.
Tintura de ollía. . . . .		
Esencia anti-hística de Le-		

### VAPORES ENFERMOS DE LOS NERVIOS.

#### MEDIOS GENERALES.

Eméticos, enemas, emolientes, bebidas dulces, suero, laxantes, suaves.

#### MEDIOS PARTICULARES.

Antimoniales á pequeñas dosis.		
Elixir teriacal. . . . .	De diez á treinta gotas en una	bebida cordial.
Espiritu volátil y aromático		
de Silvio. . . . .	De seis á treinta gotas.	
Bálsamo del Comendador. . . . .	De diez á cuarenta gotas en azucar.	
Agua de la Generala. . . . .	De dos á cuatro dracmas.	
Jarave de claveles compuesto. . . . .	De dos dracmas á una y media onza.	
Elixir de Garux. . . . .	De dos dracmas á una onza.	
Confeccion de jacintos. . . . .	De diez y ocho granos á una y media dracma.	
Espiritu de nitro dulce. . . . .	Una cucharada de café en una	bebida diurética.
Esencia alexifarmaca de Sthal. . . . .	De veinte á treinta gotas.	

#### VIENTOS.

(Véase *flatosidades*.)

#### SIPHILIS.

Jarave de Cocinero. . . . .	De dos dracmas á una y media onza.
De Bellet. . . . .	De dos dracmas á una onza.
Píldoras de Beloste. . . . .	De dos á tres al día.
Ligor de Vans Wiettem. . . . .	Una cucharada de café en una
	bebida apropiada.

- Píldoras mercuriales. . . . . Dos por mañana y tarde.  
 Gragea de Kayser . . . . . Idem.  
 Píldoras del Dr. Sedillot . . . . . Idem.  
 Jarave de zarzaparrilla . . . . . De dos dracmas á una y media onza.  
 Depurativo del Dr. Larrey . . . . . Una onza en la mañana.  
 Solucion de Veikar . . . . . Treinta ó cuarenta gotas mañana y tarde.  
 Rob anti-sifilitico . . . . . De una á dos onzas.  
 Licor de Presavin . . . . . De tres á cuatro vasos pequeños al dia.  
 Tipsana de Vinache . . . . . De tres á cuatro vasos.  
 De Zeltzibon . . . . . Un azumbre al dia.  
 Agua oxigenada de Alion . . . . . Dos ó tres vasos en la mañana.  
 Mercurio soluble de Hanhe-  
 man . . . . . De uno á diez y seis granos.  
 Píldoras mercuriales de Brug-  
 natelli . . . . . De dos á cuatro.  
 De acónito del Dr. Dou-  
 ble . . . . . Una por mañana y tarde.  
 Pastillas de mercurio sacarino del Dr. Lagneau.  
 Polvo de mercurio del mismo.  
 Remedio anti-venereo de Peyrilhe.  
 Píldoras de Alibert . . . . . De cinco á seis al dia.  
 De Moscati . . . . . Una por mañana y tarde.  
 Jarave de mercurio gomoso del Dr. Lagneau.

#### LOMBRICES INTESTINALES.

- Aceite de ricino . . . . . De media á dos onzas con jara-  
 ve de limon.  
 Píldoras de Schmucher . . . . . Seis mañana y tarde.  
 Opiata vermífuga de Spang . . . . . De media á una onza.  
 Poción del Dr. Marcaton . . . . . En dos veces una hora de distancia  
 Poción contra la tenia. Agua hervida con mercurio. (1)  
 Extracto de agenjos . . . . . De dos dracmas á una y media onza.  
 De flor de durazno . . . . . Idem como purgante.

(1) Los experimentos del Dr. Cervantes prueban que la acción de esta medicina es ninguna, y que el azogue no comunica parte alguna al agua donde se hierve. = El traductor.

- Vermífugo y purgante. . . . . De dos dracmas á una y media onza.  
 Azucar vermífuga . . . . . De seis á veinte y cuatro granos.  
 Polvo vermífugo . . . . . De seis granos á una dracma.  
 Pastillas de ruibarbo. . . . . De una á cuatro dracmas.  
 Pildoras de Beloste. . . . . De dos á tres al dia: seis ú ocho  
 para purgar.  
 Bizcochos vermífugos. . . . . Uno al dia.  
 Polvos de Bouvard. . . . . Doce granos.  
 Remedio de madama Nouffer.  
 Musgo de Corcega en jalea. . . . . Tres cucharadas al dia.  
 Vino de agenjos. . . . . De dos á seis onzas en ayunas.  
 Bálsamo de la vida de Leliebre . . . . . De una á tres cucharadas.  
 Extracto de aristoloquia. . . . . De doce granos á media dracma.  
 De centaurea menor. . . . . Idem.  
 De genciana . . . . . De veinte y cuatro granos á una  
 dracma.  
 De ruibarbo . . . . . De doce granos á media dracma.  
 De aloes . . . . . De doce granos á media dracma.  
 Pildoras de panacea mercurial. . . . . De seis granos á un escrúpulo.  
 Polvo de estaño . . . . . De dos escrúpulos á una dracma.  
 Pastillas vermífugas. . . . . Dos al dia.  
 Elixir visceral de Hoffman. . . . . De una á dos dracmas.  
 Electuario antelmintico de Vogler. (*Véase la fórmula.*)  
 Pastillas vermífugas de Bar-  
 ther. . . . . De una á dos al dia.  
 Polvo vermífugo de Brugna-  
 telli . . . . . De media dracma á una cuatro  
 veces al dia.  
 Remedio de Prusia contra la tenia. (*Véase la fórmula.*)  
 Jarave vermífugo de Boullay. . . . . A cucharadas tres ó cuatro ve-  
 ces al dia.  
 Electuario vermífugo de  
 Spielman. . . . . Una dracma mañana y tarde.  
 Antelmintico de Heister. . . . . Una dracma mañana y tarde.  
 (1)

## VÉRTIGOS.

- Cerveza cefálica inglesa. . . . . Cuatro ó cinco vasos al dia.  
 Bolos anti-espasmodicos de Bu-  
 chan. . . . . De cuatro á seis al dia.

## VÓMITOS.

- Espíritu carminativo de Sil-  
 vio . . . . . De doce gotas á una dracma.

Conserva de rosas. . . . .	De dos dracmas á una onza.
Polvo diarrhodon . . . . .	De doce granos á una dracma.
Opiata de Salomon . . . . .	De un escrúpulo á dos dracmas.
Abstringente . . . . .	Idem.
Pocion de Riverio . . . . .	En dos tomas.
Vino de Quina. . . . .	De una á tres onzas.
Elixir Vitriólico. . . . .	De quince á veinte gotas en un vaso de vino.

## VOMITO DE SANGRE.

## MEDIOS GENERALES.

Bebidas abstringentes y aciduladas.

Ligeros laxantes como el aceite de ricino.  
Tintura de muriate de fierro. Treinta gotas en un poco de agua fria, dada todas las horas.

## MEDIOS PARTICULARES.

Tres cucharadas de la pocion siguiente cada cuatro horas.

De esperma de ballena. . . . . Media onza. Claras de huevos. q. s.

Triturese en un mortero y agréguese.

De agua de poleo. . . . . Una onza.

De fuente. . . . . Cinco onzas.

De nitro. . . . . Una dracma.

Jarave de Tolú. . . . . Dos idem.

Tintura de opio. . . . . Una gota.

## DE LOS MEDICAMENTOS EXTERNOS.

## ABCESOS.

Caraplasmas emolientes de harina, de lino, y raiz de altea.

Pulpa de cebolla cruda.

Unguento de Lamere.

De Piderit.

De basalicón.

Bálsamo de Genevieve.

## ANCHILOSI. FALSO.

Linimento estimulante inglés.

## APHTAS.

- Licor del Dr. Swediaur.  
 Mixtura de Boyle.  
 Vinagre alcanforado.

## APOPLEXÍA.

- Bálsamo nervino.  
 Opodeldoc.  
 Éter acético cantaridado del Dr. Double.

## BLENORREA REBELDE.

- Inyeccion del Dr. Clare.  
 Abstringente.  
 De J. Hamilton.  
 De nitrate de plata. (*Dilatado en agua.*)  
 De licor de Vans-Wicem. (*Dilatado en agua.*)

## QUEMADURAS.

- Cerato de Furner.  
 Unguento blanco alcanforado de Viena.  
 Pupuleon.  
 Blanco de Bhasis.  
 Balsamo de Genevieve.  
 Agua de Alibour.  
 Jabon amoniaco calcareo.

BUBONES. (*Falsos.*)

- Emplasto de cicuta.  
 De los cuatro fundentes.  
 De Canet.  
 Amoniaco mercurial del Dr. Selle.

## BUBONES VENEREOS.

- Cataplasmas de cebolla mezcladas con basilicón.  
 Emplasto de vigo con mercurio.  
 Antivenereo de Boherhave.

Emplasto de jabon, polvoreado con sal de amoniaco.  
Amoniaco mercurial del Dr. Selle.

CANCER.

Cataplasma de chirivia pulposa.

Emplasto de cicuta.

De vigo con mercurio.

Unguento populeon.

Tintura de muriate de fierro.

Polvos de Pluquet.

Arsenical de Justamond. (1)

CATARATA.

Colirio de Newmann.

CARNOSIDADES DE LA URETRA.

Candelillas y sondas de goma elastica. Emplasticas de Darán.

CAUTERIOS.

El moxa.

El papel caústico.

El lienzo de Gautier.

CEFALARGIA.

Frontal hypnotico.

Bálsamo hypnotico.

Tabaco de los Vosges.

Polvo capital de S. Angel.

Agua para la emicranea.

Esencia del Dr. Ward.

---

(1) El empleo de este polvo y el unguento arsenical de Fray Cosme, debe acompañarse de la mayor precaucion, poniendolo en las pequeñas úlceras a muy cortas dosis, se han visto algunos envenenamientos causados por estos tópicos.

## CANCROS.

(Véase úlceras venereas.)

## DIVIESOS.

Emplastro de Richter.  
Fundente de la Motte.  
De Canet.

## CONTUSIONES, LUXACIONES, TORCEDURAS.

Bálsamo de Genevieve.

De Arcogus.

Vulnerario.

Opodeldoc.

Nervino.

De Fourcroy.

Agua de Alibour.

Fomentos de Richter.

De Justamond.

Aromático (cocimiento de ajenos, de laurel y romero.)

Unguento blanco alcanforado de Viena.

Fomentos de brionia (cocimiento de raíz de brionia con adición de vinagre y sal marina.)

Emplastro de Andrés de la Cruz.

De vetónica.

Divino.

Esencia del Dr. Ward.

Aguardiente alcanforado.

Espíritu de Mindereros.

Linimento volatil.

Espíritu aromático de Silvio.

## CÓLICO VENTOSO.

Aceite carminativo etereo de Danois.

## TOS FERINA.

Linimento de ajo.

Pomada del Dr. Autenrieh.

## GOLPES EN LOS PIES.

Emplasto de cera verde.  
De diaquilon.

## GOLPES EN LA CABEZA.

Agua de Bonferme, respirada y aplicada con compresas.  
Fomentación de Richter.

## HUNDIMIENTO DEL PECHO, Y DE LAS MANOS.

Aceite de huevo en linimento.  
Unguento populeon.  
Bálsamo de Fourcroy.

## ANGINA INFLAMATORIA.

Cerato de Rechour.

## HERPES CORROSIVOS.

Cataplasma de pulpa de chirivía.  
Unguento de nicociana.  
Emplasto de jabon, y de betonica (colocado entre las espaldas, cuando los herpes están en el rostro.)  
Pomada oxigenada.  
Agua del cardenal de Luynes.  
Unguento mercurial blanco de Fullér.  
Jabon mercurial del Dr. Chaussier.  
Baños de agua mineral sulfurea. (Berage)

## DESFALLECIMIENTOS.

Agua de Luc. . . . .	} Para respirar.
Amoniaco liquido. . . . .	
Éter. . . . .	
Vinagre radical. . . . .	

## DOLORES ARTRÍTICOS.

Bálsamo Opodeldoc.

De acero.

Nervino.

Aceite de laurel.

Unguento rosado.

Linimento saponaceo de Koempt.

Linimento de Homé.

#### ESCROFULAS.

(Véanse tumores y ulceras escrofulosas.)

#### DESOLLADURAS. LIGERAS ESCORIASIONES.

Cerato de Furner.

Agua vegeto mineral.

Polvo de Lycopodio.

De corteza de roble.

Bálsamo del Comendador.

#### SABAÑONES.

##### MEDIOS GENERALES.

(Antes de la ulceracion.) Baños estimulantes, agua animada con el ácido muriático, ó con la mostaza.

Fricciones con el espíritu de romero, ó la esencia de trementina.

Aplicacion de compresas empapadas en aguardiente alcanforado, ó bálsamo de Opodeldoc.

Unguento del Dr. Swediaur.

Pomada para los sabañones.

Tintura de almáciga compuesta. (Farmacop. Austriaca.)

Licor del Dr. Swediaur.

Solucion del sulfato de ácido de alumbre.

Cocimiento de Beleño.

Cerato de Furner.

Unguento de tucia.

Emplastro de cerusa.

Bálsamo de genevieva, cuando están ulcerados.

Franquilo.

De Fourcroy.

#### ENGURGITAMIENTOS GLANDULOSOS.

##### LAMPARONES.

Collar del Dr. Morand.

Linimento de Hufeland.

De Roncali.

Bálsamo del caballero Laborda.

Emplasto de jabon, polvoreado con sal amoniáco.

Jalea de musgos de Russel.

Emplasto fundente de la Motte.

#### INFARTOS LACTEOS.

Espíritu volatil de sal amoniáco ( extendido en agua. )

Linimento volatil.

Fomentos de Justamond.

#### EQUINANCIA.

Bálsamo tranquilo de Chomel, en fricciones al cuello.

#### ESCRECENCIAS CARNOSAS, FUNGOSIDADES

##### DE LAS ULCERAS.

Alumbre calcinado en polvo.

Licor cáustico de Plenk.

#### ESCRECENCIAS VREENEAS,

Licor cáustico de Plenk.

Polvo de Rurger.

#### DEBILIDAD MUSCULAR.

Bálsamo de Saxonia.

De Fioraventi.

De Opodeldoc.

Nervino.

De la vida de Hofman.

Agua de magnanimidad.

Bálsamo bulnerario.

Unguento marciato.

Emplasto exyrocéo.

Stiptico de Crolio.

Aguardiente alcanforado.

## DEBILIDAD DEL OIDO.

Bálsamo acústico, aceite acústico, en inyección.

## DEBILIDAD DORSAL.

Emplasto stiptico de Swediaur.

## DEBILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE LA GENERACION.

Loción de agua fria.

## FISTULA DEL ANO.

Unguento populeon.

Opiata ó pasta del Dr. Ward.

## FRACTURAS.

Agua de Alcabusazo.  
Fomentacion de Richter.

## SARNA.

Unguento citriao mercurial.

Pomada antipsorica del Dr. Thomann.

Polvo anti-psorico.

Jabon mercurial del Dr. Chaussier.

Azufre lavado. Partes iguales, con la enjundia, para formar una pomada.

Infusion de eleboro blanco, agua mercurial en lociones.

## GANGRENA.

Bálsamo de Opodeldoc.

De Arcocus.

De storaque.

De Genevieva.

Unguento egipciaco.

Emplasto de Nuremberg.

Tintura de quina.

Vinagre alcanforado.

Emplasto de triaca.

Unguento basilicon diluido con aceite de trementina.

Fomento del Dr. Richard. (†)

### RASGADES.

Bálsamo de Fourcroy. Cerato de Turner. Pomada de nata de leche.

De cohombro, de caracoles. Para los labios. Cerato de Galeno

aceite de huevo.

### GRANDES ENGURGITAMIENTOS, LUPIAS, LAMPARONES

(Véase tumores.)

Emplasto de diavotano. De cicuta. Bálsamo tranquilo. De Cho-

mel Collar de Morand. Linimento de Hufeland. De Roncali.

### GONORREA.

Inyeccion calmante.

Tónica.

Abstringente.

Del Dr. Pringle.

Del Dr. Young.

Solucion de piedra admirable.

### GOTA.

(Véase Reumatismo.)

Bálsamo de acero.

Tranquilo.

---

(†) El carbon molido y aplicado sobre las partes gangrenadas, ayuda mucho en la naturaleza a la limitacion y desprendimiento de la parte caída en mortificacion. Este experimento repetido siempre con suceso en el colegio de Cádiz, se acredita aun con los hechos domésticos; un pedazo de carne de vaca ó ternera que principia á manifestar por su olor, un principio de putrefaccion, lo de tierra luego que se hierve encerrada en una bolsa de lienzo, que contenga carbon molido.

Del Dr. Sanchez,  
Bálsamo acetico alcanforado de Pelletier.

## HEMORROGIAS.

Agarico de China.  
Polvo de goma de enebro.  
Stíptico de Colbatch.

## HEMORROIDES.

Manteca de cacao en supositorios.  
Unguento de Montpellier.  
Opiata y pasta del Dr. Ward.  
Loción de zinc alcanforada.  
Unguento populeon ó unguento rosado. (1.)  
Linimento del Dr. Andry.  
Unguento de Falck.  
Supositorios de corcho quemado.

## HIDROPESIA.

Unguento de artanita.

## INFLAMACIONES DE LA PIEL. COMEZONES.

Pomada de nata de leche.  
Cerato opiado.  
Unguento de pompholigo. (2.)  
Loción de opio.  
Agua de Goulard.

## LEUCORREA FLORES BLANCAS.

Inyeccion de Pringle.

De Young.

Emplastro estíptico del Dr. Swediaur. Aplicado sobre la region lombar.

(1) Linimento compuesto de dos onzas de populeon, cuatro dracmas de laudano y dos yemas de huevo.

(2) O de Tucia. Nicolai. *Atx. Farmacop. de Palacios* página 452.

## LUFIAS.

Linimento resolutivo de Pott.

## LUJACIONES.

(Véase contusiones.)

Bálsamo nervino. De opodeldoc. Emplasto de Andrés de la Cruz. Oxicroceo (1) Fomentos aromáticos. aguardiente alcanforado.

## MALES CASUALES.

(Véase golpes Panadizos.)

## MAL DE CABEZA.

(Véase Cefalalgia.)

## MAGULLAMIENTOS.

Agua de M. Lepremier.

Esencia del Dr. Ward. (Véase Contusiones.)

## OBSTRUCCIONES.

Unguento de agrippa.

Emplasto de cicuta.

Pomada del Dr. Fabre.

## ODONTALGIA.

Elixir odontalgico de Lerroy.

Espíritu de coclearia.

Mixtura para los dientes.

Laudano.

Opio gomoso aplicado sobre la carie.

---

(1) De Nicolao Pharmacop. Aug. Ren. Palacios pág. 492.

## OPHTALMIA.

## MEDIOS GENERALES.

( En la ophthalmia aguda. )

Sanguijuelas en las sienas, ó ventosas escarificadas.  
 Minorativos cada tres ó cuatro dias.  
 Pedilubios calientes.  
 Colirios refrigerantes, y abstringentes, al que se agregan cuarenta ó cincuenta gotas de tintura vinosa de opio.

( En la ophthalmia purulenta. )

Cataplasmas hechas con el albumen y alumbre, ó con la pulpa fresca de criadillas de tierra ó de naos raspados.  
 Colirio del Dr. Ward; hecho con dos onzas de agua celeste y de agua alcanforada, dilatado en cuatro onzas de agua destilada.

## MEDIOS PARTICULARES.

Bálsamo de Sanives.  
 Agua del Dr. Ivel.  
 Fortificante de Selle.  
 Colirio de Hervecio.  
 Seco de Lagneau.  
 De Scarpa.  
 De Jania.  
 De Gimbernat. Para las manchas.  
 De Brun.  
 Pomada de Grandjean. Como epispastico detras de las orejas.  
 De Janin.  
 De Leon.  
 De Desart.  
 Unguento de Tucia.  
 Linimento anti-optalmico de Plenk.  
 ( Cuando depende la ophthalmia de un vicio venereo, es necesario recurrir á los mercuriales. Si es escrofulosa se emplean la quina los tónicos &c. )

## PANADIZO. MAL CASUAL.

Bálsamo de Genevieva.

Emplasto de Lamotte.

### PARÁLISIS Y LETARGO.

Bálsamo de Opodeldoc.

Nervino.

Aceite de laurel.

Agua de Bernaval.

Tintura de cantáridas.

Linimento estimulante inglés.

Éter acético cantáridado del Dr. Double.

### HERIDAS SIMPLES Y RECIENTES.

Emplasto de resina elástica.

De diapalma.

De musilago.

De minio.

Agua Siptica.

Emplasto aglutinante.

Esencia vulneraria.

Agua roja para las heridas.

De Ebuli. (1)

Bálsamo de Genevieva.

Del Comendador.

Polvo de Vernix.

Bálsamo de Lucatel.

Unguento de basilicón.

Nutric.

De la Mére.

De Vigo simple.

### HERIDAS ANTIGUAS

Detercivos de apio.

Digestivos de Pleuhc.

Unguento de Pompholigo.

Bálsamo de Arceo.

Unguento de Propoles de Cadet.

(1) *Farmacopéa de Palacios* pág. 509.

De storaque.  
 Cerato de Saturno.  
 Unguento blanco de Rhasis.  
 Agua aluminosa de Bates.

## HERIDAS EN LA CABEZA.

Emplasto de vetónica.

## PIOJOS GUSANOS.

Unguento gris.  
 Polvo de Stafisagria.

## RASGADES.

Licor cáustico de Plenhc.

## REUMATISMOS.

Bálsamo Opodeldoc en fricciones.  
 Anodino de Bates. Idem.  
 Aceite de Laurel.  
 Éter acético cantaridado.  
 Linimento de Homé.  
 De Desbois de Rochefort.  
 Agua de Gordran en baños.  
 Bálsamo acético alcanforado de Pelletier.

## CEATICA.

Detercivos de apio.  
 Tintura de cantáridas.  
 Bálsamo Nervino.  
 Acético alcanforado de Pelletier.  
 Emplasto de vetonica.  
 Jabon de Stalkey.  
 Linimento volátil.  
 Emplasto de pez de Borgoña.  
 Unguento martiatum (1)  
 Cataplasma ixquiatica de Willis.

(1) De Nicolao. Farmacop. de Palacios pág. 456.

Linimento de Mustard.  
De Ferrier.

Agua de Gordran.  
De M. Lepremier.

Éter acetico cantaridado del Dr. Double.

### ESPASMO.

Linimento del Dr. Selle.

### STRANGURIA.

Inyeccion oleosa. Candelillas emolientes.

### SORDERA ACCIDENTAL.

Bálsamo y aceite acusticos.

### MANCHAS EN EL OJO.

Colirio de Gimbernat.

### TIÑA.

Infusion de raiz de Veratrum, en locion.

Luciones de agua de jabon.

De agua de cal.

Emplasto de pez negra.

Unguento de la Pitie.

Alumbre calcinado. Sobre los bordes fungosos.

Sulfate de cobre. Idem.

Remedio del Dr. Bicher.

### TUMORES.

Emplasto de Canet.

Unguento de Brionia.

Emplasto de betonica.

De meliloto.

De cicuta.

De jabon.

De diaquilón.

Divino.

- De manus Dei.
- De Vigo simple.
- De Fouquet.
- De pelitre de Fullér.

TUMORES INFLAMATORIOS.

- Cataplasmas emolientes.
- Embrocaciones oleosas.

TUMORES SIFILÍTICOS.

- Accite de laurel.
- Unguento de nicociana.
- Emplasto de vigo con mercurio.
- Amoniaco mercurial del Dr. Selle.

TUMORES SCIRROSOS.

- Emplasto de belladona.

TUMORES ESCROFULOSOS.

- Unguento marciatum.
- De estoraque.
- Digestivo.
- Basalicón activado con el precipitado rojo.
- Emplasto de cicuta.
- Magnetico.
- Espiritu volátil aromático de Silvio.
- Emplasto de pelitre de Fullér.

TIMPANITIS.

- Linimento volátil de Plenhc.

ÚLCERAS..

- Bálsamo de Genevieva, aplicado sobre un papel de estraza.
- Cerato de Pott.
- De Kirkland.
- Emplasto fundente de la Mott.
- De Fouquet.
- Del Abad Doyen.

- Acceite verde de Metz.
- Unguento de Ricour. Cuando están indolentes.
- De la abadia de Bec.
- Bálsamo de Lucatel.
- Unguento de Nicociana.
- Mundificantes de apio.
- Unguento egipciaco.
- Supurante de Piderit.
- Emplasto de esperma de ballena.
- Magnetico.
- De diapalma.
- De minio.
- De Nuremberg.
- De ceruza.
- Agua de Alibour.

ÚLCERA CANCEROSA.

Polvo de Rouselot.

ÚLCERA BENIGNA.

- Agua de Goulard.
- Ecerado del Dr. Ailhaen.
- Cerato del Dr. Hufeland.

ÚLCERAS DE MAL.

CARÁCTER.

- Locion alcanforada.
- Linimento arsenicál. (1)
- Solucion de sublimado corrosivo.
- Polvo arsenical de Justamond. . . }
- Arseñical de Pluñquer. . . } (2)
- Anti-carsinomatoso de Fr. Cosme. }

---

(1) De arsénico blanco . . . Dos granos.  
 De aceite de olivas. . . Una onza.

(2) Véase acerca de estos polvos la nota de la página.

Disolucion de muriate de cobre amoniacal.  
 Disolucion de nitrate de plata.  
 Agua de cal en lociones.  
 Polvo de carbon.

### ÚLCERAS FÉTIDAS.

Cataplasmas farinaceas, hechas con partes iguales de polvo de carbon.

### ÚLCERAS INVETERADAS.

Polvo de corteza de Xanthoxylon aplicados á la superficie,

### ÚLCERA ESCROFULOSA.

Agua fagadenica.

### ÚLCERA PÚTRIDA DE LA GARGANTA.

Tintura de arnica en gargarismo.

### ÚLCERAS VENÉREAS.

Unguento Bruno.  
 Mercurial blanco de Zeller.  
 Cerato mercurial de Falck.  
 Opíado de Lagneau.  
 Agua de Piderit.  
 De cal.  
 Mercurial.  
 Fagadenica.

### VAPORES HISTÉRICOS.

Bálsamo histérico. En friccion.  
 Emplasto anti-histérico.

### BUBAS.

Unguento napolitano en fricciones.  
 Emplasto amoniaco mercurial del Dr. Selle.  
 Pomada mercurial de Cirillo. En fricciones.

Manteca de cacao.

Jabon mercurial del Dr. Chaussier.

LOMBRICES INTESTINALES.

Cataplasma anti-helmintica.

Unguento de artánita.

Aceite de betabel aloetizado.

FIN DEL MEMORIAL FARMACEUTICO.



Materia de casa de...  
Japon natural del Dr. Comandante...  
TOMBRICES INVESTIGACIONES

Catálogo anti-helmíntico...  
Unqueno de...  
Año de...  
...

FIN DEL MANUAL FARMACÉUTICO

...



...

...

...

...

# SUPPLEMENTO

## AL FORMULARIO MAGISTRAL.

---

*Fórmulas usadas con suceso en esta Ciudad.*

### BÁLSAMO DE GONZALEZ.

Rp. Enjundia de gallina . . . . Una libra.  
 Bálsamo de calabaza . . . . } De cada uno dos libras.  
 Aceite de huevo. . . . . }  
 Bálsamo anodiao. . . . . } De cada uno ocho onzas.  
 Espíritu de sal amoniaco. . . . }  
 Mezclese.

Uso. Antipleurítico.

### BÁLSAMO DE GOATEMALA Ó DEL OBISPO.

Rp. Semilla de bálsamo. . . . . Dos onzas.  
 Espíritu de vino. . . . . Una libra.  
 Triturese la semilla, infundase por seis ú ocho dias  
 en el espíritu, filtrése y guárdese en basijas bien ta-  
 padas.

Uso. Anti-epileptico.

### POMADA OXIGENADA.

Rp. Mantea de puerco. . . . . Una libra.  
 Ácido nítrico . . . . . Dos onzas.  
 Derrítase la grasa, mezclésele el ácido agitandolo con fre-  
 cuencia con un tubo de vidrio, mantengase en el fuego has-  
 ta la ebulicion, déjese enfriar y guárdese para el uso.

### POMADA ESTIBIADA.

Rp. Tártaro estibiado . . . . . Una onza.

300.

Manteca de puerco. . . . . Una libra.  
Mezclése en un mortero hasta la perfecta incorpo-  
racion.

POMADA OPTALMICA.

Rp. Unguento rosado. . . . . Una onza.  
Precipitado rojo . . . . . Doce granos.  
Alcanfor. . . . . Seis idem,  
Mezclése.

EMPLASTO DE LARRIVA.

Rp. Minio. . . . . Ocho onzas.  
Aceite de olivas . . . . . Catorce idem.  
Cera amarilla. . . . . Una libra.  
Sebo. . . . . } De cada uno cuatro escrúp.  
Alcanfor. . . . . }  
Pongase á coser al fuego lento el minio con el se-  
bo y el aceite en la cantidad suficiente de agua has-  
ta la consistencia de emplasto, añádase la cera y el al-  
canfor y formense magdaleones.

POLVOS DE SANDOVAL.

Rp. Rosa rubia. . . . . Una libra.  
Cebolleja. . . . . Ocho onzas.  
Haganse polvo y mezclese.  
Uso. Errhino.

JARAVE DE GOMA MANGLE.

Rp. Mucllago de dicha goma. . Ocho onzas.  
Azucar. . . . . Diez y seis idem.  
Hagase jarave S. A.  
Uso. Pectoral.

UNCION FUERTE PARA ALBEITARES.

Rp. Unguento de altea. . . . . } De cada uno una libra.  
De Zacarias . . . . . }  
De Aragon . . . . . }

Polvos de cantáridas . . . } De cada uno cuatro onzas.  
 De pimienta larga . . . }  
 De euforbio . . . . . Dos idem.  
 Mezclése.

Uso. Escarótico

UNGUENTO DE MARAVILLA.

Rp. Raiz de dicha planta, lim-  
 pia y cortada en taleolas. Una libra.  
 Manteca de puerco. . . . Dos idem.  
 Pongase á fuego lento hasta que consuma la humedad.

UNGUENTO Ó INTENCIONES DE LOPEZ.

Rp. Unguento de calabaza. . . } De cada uno una libra,  
 De rosa. . . . . }  
 Derritase al fuego lento y añádase separado de él  
 y medio frio.  
 Precipitado rojo . . . . . Cuatro onzas.  
 Minio . . . . . Una idem.  
 Mezclése.

Uso. Optálmico.

UNGUENTO DE JUBERA.

Rp. Aceite de agenjos . . . . }  
 De almáciga . . . . . } De cada uno una libra.  
 De yerbabuena . . . . . }  
 Rosado . . . . . }  
 Cera amarilla . . . . . Una libra y cuatro onzas.  
 Polvos de yerba buena . . . } De cada uno una onza.  
 De agenjos . . . . . }  
 De diarrodon . . . . . } De cada uno dos y media id.  
 Aromáticos. . . . . }  
 Derritase la cera con los aceites, cuélese y agre-  
 guense los polvos mezclandolos exactamente.

Uso. Estomacal.

UNGUENTO DE OSORIO.

Rp. Sebos. . . . . } a. seis libras.  
 Manteca. . . . . }

\*

Estoraque líquido . . . . . Seis onzas.  
 B<sup>o</sup>. negro . . . . . Ocho idem.  
 Aceite esencial de espliego: }  
 Idem de romero . . . . . } a. dos dracmas.  
*Uso.* Estomacal.

#### TABLETAS DE BARTOLACHE.

*Rp.* Etiope marcial . . . . . Cuatro onzas.  
 Azucar en polvo . . . . . Una libra.  
 Canela . . . . . Veinte escrupulos.  
 Mucilago de goma arábica. Q. S.  
 Mezcléense y háganse tabletas.

#### JARAVE DE ZANETI.

*Rp.* Maná en lágrima . . . . . Dos onzas.  
 Jarave de altea . . . . . Una y media idem.  
 Cocimiento de Sén . . . . . Una idem.  
 Aceite de almendras dulces. Idem.  
 Manteca de cacao . . . . . Tres dracmas.  
 Mezclése á fuego lento y añádase.  
 Kermes mineral . . . . . Cuatro granos.  
*Uso.* Pectoral.

#### CERATO AROMÁTICO DE PIÑA.

*Rp.* Emplasto de tacamaca . . . . . Una onza.  
 Aceite de tomillo . . . . . }  
 De succino blanco . . . . . } a. seis gotas.  
 Mezclése.

#### VINO ANTI-EPILEPTICO.

*Rp.* Vino de Jeréz . . . . . Seis onzas.  
 Agua de canela espirituosa }  
 Idem rosada . . . . . } a. cuatro idem.  
 Sumo de grana Kermes . . . . . Una idem.  
 Azucar blanco . . . . . Dos idem.  
 Polvos letificantes de Galeno. Dos dracmas.  
 Hojas de oro . . . . . Número 4.  
 Esencia de nuez moscada . . . . . Cuatro gotas.  
 — Mezclése.

## PURGA PARA LOS NIÑOS DE PECHO.

- Rp. Magnesia pura . . . . . Veinte y cuatro granos.  
 Jabon de España. . . . . Ocho idem.  
 Esencia de anís. . . . . Dos gotas.  
 Mezclése.

## TINTURA DE DRIMIS.

- Rp. Espíritu de vino. . . . . Una libra.  
 Corteza de drimis . . . . . Dos onzas.  
 Triturese la corteza, infundase en el espíritu por ocho días y filtrése.

## POLVOS ANTI-EPILEPTICOS.

- Rp. Polvos de quina. . . . . }  
 De serpentaria . . . . . } a. media onza.  
 De valeriana. . . . . }  
 De cálamo aromático . . . . . Una dracma.  
 De succino . . . . . Un escrúpulo.  
 Mezclense y dividanse en papeles del peso de nueve granos.

## CERATO DE MAZO.

- Rp. Cera amarilla . . . . . Una onza.  
 Pez griega. . . . . Dos idem.  
 Sebo. . . . . Media idem.  
 Mezclése.

## Notas para la mejor instruccion de esta obra.

- Semen contra: es la raiz de agenjos de Judea.  
 Nerprum-Rhamnus catarticus. Zarza purgante.  
 Psyllium. Zargatona.  
 Consoude. Symphitum.  
 Chou-rouga. Lombarda.  
 Bezár. Piedra que se cria en las entrañas de ciertas cabras de las Indias.  
 Orchilla. Musgo que sirve para tinte.  
 Jada. Especie de esmeralda baja de color.

FIN DEL SUPLEMENTO.

BURCA PARA LOS NIÑOS DE PECHO

Rp. Mantequilla para . . . . .  
Vicio y curio grande . . . . .  
Ocho idem . . . . .  
Una onza . . . . .

TINTURA DE PRIMIS

Rp. Espiritu de vino . . . . .  
Una libra . . . . .  
Cinco de duros . . . . .  
Tinturas la comora, tinturas en el espíritu por ocho  
dias y filtrase.

POLVOS ANTIEPILEPTICOS

Rp. Polvos de dolina . . . . .  
De serpentina . . . . .  
De castoreo . . . . .  
Una dracma . . . . .  
De anacardo . . . . .  
Mielazas y dividase en partes del peso de nuc  
ve granos. caraban y comora.

CERATO DE MAXO

Rp. Cera amarella . . . . .  
Una onza . . . . .  
Res gilegia . . . . .  
Dos idem . . . . .  
Mielazas . . . . .  
Mielazas . . . . .

Nota para la mejor intencion de esta cura.  
Debe comora en la cura de genio de Judo.  
Nepenthes, Nymphaea, Nymphaea, Nymphaea.

Genio de Judo . . . . .  
Nymphaea . . . . .

Genio de Judo . . . . .  
Nymphaea . . . . .

FIN DEL SUPLEMENTO.

A  
A  
A  
=  
=  
=  
=  
A  
A  
A  
=  
=  
A  
A  
A  
B

# TABLA

## DE LOS AUTORES CITADOS

### EN EL FORMULARIO MAGISTRAL.

A.	Pág.	B.	Pág.
Adams. Licor anti-nefri- tico . . . . .	84.	Ball. Polvo vermífugo purgante . . . . .	154.
Aitken. Encerado . . . . .	29.	Bamberg. Tintura tebaica.	188.
Alibert. Píldoras anti-si- filíticas . . . . .	114.	Barlow. Remedio contra la tiña. . . . .	161.
= Pomada de Turbith. . . . .	132.	Barthez. Electuario bal- sámico abstringente . . . . .	43.
= Pomada anti-psórica. . . . .	132.	= Pastillas vermífugas. . . . .	104.
= Remedio contra la tenia.	170.	= Píldoras blancas . . . . .	125.
= Tintura anisada. . . . .	186.	= Píldoras carminativas . . . . .	125.
Alibour. Agua vulneraria.	42.	Bath. Bálsamo anodino . . . . .	17.
Alyon. Agua oxigenada.	36.	Belet. Jarave mercurial.	179.
= Pomada oxigenada . . . . .	130.	Bestuchef. Tintura nervi- no tónica . . . . .	185.
Anderson. Píldoras esco- cesas . . . . .	119.	Bicker. Remedio contra la tiña . . . . .	161.
Andry. Poción contra los envenenamientos. . . . .	137.	Birckmann. Polvo estomá- quico . . . . .	146.
= Poción purgante. . . . .	140.	Boherhave. Cocimiento anti-séptico . . . . .	34.
= Linimento contra las he- morroides. . . . .	80.	= Electuario anti-febril . . . . .	46.
Anhalt. Agua espirituosa.	39.	Bonferme. Agua estimu- lante . . . . .	40.
Andouart. Febribugo. . . . .	71.	Boherhave. Elixir anti-es- corbútico . . . . .	53.
Authenrieth. Pomada con- tra el coqueluche . . . . .	133.	= Elixir anti-asmático. . . . .	55.
		= Emplasto anti-venereo . . . . .	60.
B.		= Mixtura pectoral . . . . .	88.
Bacher. Píldoras tónicas.	107.	= Píldoras eméticas . . . . .	119.

	Pág.		Pág.
=Píldoras balsámicas.	128.	=Píldoras anti-hiéricas.	111.
Birckmann. Polvo estomá- quico . . . . .	146.	=Píldoras relaxantes.	120.
Bonvoisin. Vejigatorio .	194.	=Píldoras incisivas pecto- rales . . . . .	122.
Borde ó el caballero la Borda. Bálsamo contra el reumatismo . . . . .	14.	=Pocion diurética .	135.
Bovillon de Lagrange. Pol- vo temperante laxativo.	149.	=Típsana pectoral.	192.
=Jarave depurativo amargo	177.	Butter. Cerveza anti-es- corbutica . . . . .	20.
Boullay. Método para imi- tar las aguas de Valla- ria . . . . .	11.		
=Píldoras contra la gonor- rea . . . . .	116.	C.	
=Jarave contra la tos con- vulsiva . . . . .	177.	Cadet. Emulcion para ter- minar las gonorreas in- veteradas . . . . .	63.
=Jarave vermífugo . . . . .	177.	=Mixture. Odontálgica .	90.
Boullemer. Polvo vermi- fugo . . . . .	144.	=Unguento de Propolés .	96.
Bouvar. Jarave pectoral.	174.	=Píldoras estomáquicas.	108.
Bouyer. Pomada dulcifi- cante . . . . .	132.	=Píldoras incisivas.	121.
Boyle. Mixture contra las aphtas . . . . .	91.	=Píldoras mercuriales .	124.
Broussonnet. Solucion ci- tro-muriática . . . . .	132.	Canet. Emplasto madu- rativo . . . . .	61.
Brown. Píldoras esténicas.	122.	Capuron. Píldoras abstrin- gentes . . . . .	109.
Brugnatelli. Elixir ácido aromático . . . . .	50.	Carignan. ( Princesa de ) Polvos . . . . .	156.
=Eter muriático . . . . .	68.	Caumarin. (Rafasia del Co- mendador de) . . . . .	158.
=Píldoras mercuriales .	123.	Charles. Jarave pectoral balsámico . . . . .	173.
=Polvo vermífugo . . . . .	151.	Chaussier. Pastillas para la angina inflamatoria.	103.
Bruner. Mixture anti-as- mática . . . . .	90.	Jabon mercurial . . . . .	171.
Brua. Colirio . . . . .	30.	Trosiscos . . . . .	193.
Buchan. Bolos anti-espas- módicos . . . . .	24.	Cheston. Remedio contra el cáncer de los labios.	162.
=Electuario anti-artrítico.	46.	Chomel. Bálsamo tranquilo.	16.
=Electuario anti-disente- rico . . . . .	47.	Choppart. Pocion balsá- mica . . . . .	134.
=Linimento de ajo . . . . .	79.	Cirillo. Mixture anti-sif- litica . . . . .	89.
		=Pomada mercurial.	131.
		Clare. Inyeccion. . . . .	78.

Pág.	Pág.
Clutton. Tintura febrifuga . . . . . 184.	Dumeril. Píldoras sudoríficas calmantes . . . . . 116.
Coladon. Agua cordial . . . . . 38.	Dupuy. Píldoras contra el hidrotorax . . . . . 128.
Colbatch. Polvo Stiptítico . . . . . 153.	Durande. Mixtura lithontrítica . . . . . 92.
Corvisart. Vino amargo diurético . . . . . 198.	E.
Cosme. Polvo anti-carcinomatoso . . . . . 142.	Ellér. Licor anti artrítico . . . . . 75.
Courcelles. Elixir americano . . . . . 58.	E.
Cocinero. Jarave depurativo . . . . . 176.	Fabre. Pomada . . . . . 130.
Crollius. Elixir uterino . . . . . 52.	Falk. Unguento para las hemorroides . . . . . 97.
D.	=Cerato mercurial . . . . . 28.
Daffys. Tintura purgante . . . . . 184.	Feliz. Tisana anti venerea . . . . . 191.
Danois. Oximiel pectoral . . . . . 103.	Ferriar. Linimento saponaceo alcanforado . . . . . 83.
Darand. Candelillas medicinales . . . . . 26.	Feuillet. Aceite verde de Metz . . . . . 76.
Danois. Aceite carminativo . . . . . 75.	Fordice. Vino compuesto . . . . . 199.
Desault. Pomada anti-epitálmica . . . . . 129.	Fouquet. Emplasto resolutivo . . . . . 60.
Desbois. Bolo fortificante . . . . . 23.	Fouquier. Electuario hidragogo . . . . . 43.
Linimento anti-artrítico . . . . . 82.	Foureroy. Bálsamo contra el reumatismo . . . . . 14.
=Bolos carminantes . . . . . 23.	Fournier. Poción anti-tánica . . . . . 138.
=Poción emenagoga . . . . . 136.	Frank. Mixtura anti-leptargica . . . . . 83.
Dessésarts. Jarave contra la tos . . . . . 174.	=Poción anti-escorbótica . . . . . 135.
Double. Éter acético-cantaridado . . . . . 69.	=Emplasto de pelitre . . . . . 61.
=Píldoras de acónito mercuriales . . . . . 110.	=Julepe moscado . . . . . 78.
Doyen (el abad) Emplasto fundente . . . . . 62.	Mixtura balsámica . . . . . 92.
Dower. Polvos . . . . . 135.	=Vino anti-hidrópico . . . . . 197.
Dubois. Pastillas contra las engurgitaciones del cartilago tiroides . . . . . 105.	G.
=Vino amargo . . . . . 196.	Gardanné. Jarave contra la tos . . . . . 174.

	Pág.		Pág.
Gimbernat. Colirio . . . . .	31.	=Elixir balsámico, estomá- quico y temperado . . . . .	51.
Georoly. Pildoras anti-hic- tericas . . . . .	129.	Home. Linimento anti-ar- trítico . . . . .	81.
Gondran. Agua anti-artri- tica . . . . .	41.	Hufeland. Cerato . . . . .	27.
Gordón. Lohc . . . . .	86.	=Linimento contra los en- gurgitamientos . . . . .	80.
Grandjean Pomada para los ojos . . . . .	130.	=Pocion contra la hidrope- sia . . . . .	137.
Greding. Pildoras contra la histeria . . . . .	111.	Huhn. Pildoras tónicas . . . . .	126.
Griffith. Mixtura de mir- ra alcalizada . . . . .	93.	Huxam. Elixir anti-sépi- co . . . . .	54.
Grimaldi. Polvo febrífugo . . . . .	144.	=Eptiope anti-monial . . . . .	70.
Guindre. Sal purgante . . . . .	171.	=Vino emético . . . . .	195.
Gyms ó James. Polvo fe- brífugo . . . . .	144.		
<b>H.</b>			
Haen. Pildoras purgantes . . . . .	118.	Jacobo. Tintura de antimo- nio . . . . .	186.
=Pildoras anti-caquecticas . . . . .	125.	Jacobinos de Rouen. Eli- xir anti-apoplético . . . . .	56.
Haller. Esencia dulce . . . . .	65.	Jadelot. Baños anti-psy- ricos . . . . .	162.
Hallér. Pocion diurética . . . . .	133.	Janin. Colirio . . . . .	31.
Haller. Pocion hipecacua- na . . . . .	134.	=Pildoras hidragogas . . . . .	120.
Haly. Polvo calmante . . . . .	147.	=Pomada optálmica . . . . .	129.
Hamilton. Inyeccion seda- tiva . . . . .	78.	=Veigatorio perpetuo . . . . .	194.
Hartmann. Polvo anti-ca- quectico . . . . .	147.	Jeanet de Longrois. Cre- ma pectoral . . . . .	33.
=Muriate de mercurio ca- libeado . . . . .	95.	Jeanroy. Pocion contra el coqueluche . . . . .	135.
Hervecio. Opiata estomá- quica . . . . .	100.	Jobard. Pastillas pectora- les y calmantes . . . . .	106.
=Pildoras de alumbre . . . . .	109.	Junker. Polvo febrífugo . . . . .	150.
=Polvo anodino . . . . .	147.	Justamond Fomentos . . . . .	72.
=Polvo febrífugo y pur- gante . . . . .	143.	=Polvo arsenicál . . . . .	142.
=Polvo vomitivo . . . . .	146.	Jussieu. Pocion contra el espueto de la sangre . . . . .	139.
Heister. Electuario antel- mítico . . . . .	45.		
Hoffman. Bálsamo de la vi- da . . . . .	18.	<b>K.</b>	
		Kenp. Esencia scilitica . . . . .	65.

Pág.	Pág.
==Polvo de antimonio Mar- cial. . . . . 148.	Leroux (J. J.) Píldoras in- cisivas . . . . . 117.
==Tintura anti-espasmódica 188.	Lemonier. Píldoras fun- dentes . . . . . 111.
Kæmpe. Píldoras uterinas. 116.	Lemort. Elixir anti-vené- reo. . . . . 54.
Keyser. Píldoras anti-vené- reas . . . . . 122.	==Esencia anti-histérica. . 67.
Kirkland. Cerato. . . . . 29.	Lewis. Vino de guayaco celeborado. . . . . 200.
Klaproth. Eter acético fer- ruginoso. . . . . 67.	Loustonau. Encerado abs- tringente . . . . . 182.
==Bálsamo Opodeldoc. . . 13.	Louyer. Villermay. Veji- gatorios. . . . . 193.
==Tintura éterea . . . . . 190.	Luynes. Agua anti-herpe- tica . . . . . 40.
Knox. Polvo preservativo. 157.	
Kaempf. Linimento saponá- ceo. . . . . 81.	
Kruger. Polvo caústico. . 145.	
Kuser. Linimento diurético. 82.	
Kuttenger. Baños contra la tiña. . . . . 169.	
L.	M.
Laborda. Bálsamo anti-ar- trítico . . . . . 14.	Macartán. Poción purgan- te y vermífuga. . . . . 138.
Lacombe. Pastillas de peli- tre. . . . . 104.	Maerzio. Píldoras de los tres diablos. . . . . 113.
Lagacau. Cerato opiado . 29.	Polvo stiptico . . . . . 153.
==Colirio seco. . . . . 30.	Majault. Jarave purgante. 178.
==Pastillas de mercurio sa- carino . . . . . 153.	Maloet. Opiata vermífuga. 102.
==Polvos de mercurio sa- carino . . . . . 105.	==Jarave pectoral. . . . . 175.
==Jarave de mercurio . 179.	Marc. Febrífugo. . . . . 72.
Lamothe. Emplastro fun- dente . . . . . 61.	==Polvo anti-artrítico. . 141.
Larrey. Opiata contra la gonorrea . . . . . 101.	==Polvo contra el coque- luche . . . . . 155.
==Jarave depurativo. . 176.	Mathiole. Elixir de la vi- da. . . . . 48.
Lascone. Polvo tónico in- cisivo . . . . . 154.	Mead. Electuario anti-epi- léptico . . . . . 47.
Le Comte. Vejigatorio . 195.	Meglin. Remedio contra el trismo doloroso de la cara. . . . . 167.
Leliebre. Bálsamo de la vida . . . . . 17.	Mende. Poción catártica. 136.
	Merat. Píldoras contra el baile de S. Vito. . . . . 110.
	Mesaise. Agua de la vi- da purgante . . . . . 35.
	Mithie. Elixir estomático. 49.

\*

	Pág.		Pág.
Morand. Collar contra los lamparones . . . . .	30.	Petit. Píldoras anti-catar- rales . . . . .	113.
Mereau. Eter balsámico de tolu . . . . .	69.	Peyrithe. Elixir anti-es- crofuloso . . . . .	54.
Moretti. Mercurio solu- ble . . . . .	159.	=Remedio anti-venereo . . . . .	168.
Moscati. Píldoras mercu- riales . . . . .	115.	Piderit. Agua mercurial . . . . .	37.
=Tintura estomáquica . . . . .	139.	=Infusion de ollin com- puesta . . . . .	77.
Mongenot. Poción contra la aфонia . . . . .	136.	=Unguento supurante . . . . .	96.
=Polvo incisivo . . . . .	149.	=Píldoras anti-espasmódi- cas . . . . .	112.
Mustard. Linimento . . . . .	80.	Planche. Método para imi- tar las aguas de Baresges . . . . .	11.
Mutis. Cerveza de quina . . . . .	21.	=Pomada mercurial con la manteca de cacao . . . . .	130.
Mutzel. Mixtura fundente . . . . .	93.	=Agua etérea alcanfora- da . . . . .	37.
N.			
Newmann. Colirio . . . . .	31.	Plenk. Digestivo . . . . .	35.
Noufer. Remedio contra la tenia . . . . .	169.	=Epilatorio . . . . .	64.
Norford. Poción anti-ne- fritica . . . . .	139.	=Linimento anti optálmico co . . . . .	81.
O.			
Odier. Polvo . . . . .	152.	=Linimento volátil . . . . .	82.
Opodelóc. Bálsamo . . . . .	13.	=Licor cáustico . . . . .	85.
P.			
Parizet. Píldoras anti-ca- tarrales . . . . .	113.	=Locion odontalgica . . . . .	86.
Parmienter. Bolo estomá- quico . . . . .	23.	=Mixtura recino-jabonosa . . . . .	91.
=Pasta pectoral . . . . .	106.	=Mixtura saponacea pur- gante . . . . .	91.
Passavin. Agua vegeto mercurial . . . . .	37.	=Unguento contra los sa- bañones . . . . .	97.
Pelletier. Bálsamo acético alcanforado . . . . .	16.	=Píldoras mercuriales . . . . .	123.
=Jabon acético étereo . . . . .	171.	=Vino estomáquico . . . . .	197.
Perard. Polvo anti-artri- tico . . . . .	155.	Plumier. Píldoras anti-si- filiticas . . . . .	118.
		Plummer. Polvo anti-ve- nereo . . . . .	153.
		Plunequet. Polvo arce- nical . . . . .	142.
		Portal. Jarave anti-escor- butico . . . . .	179.
		Pott. Cerato . . . . .	28.
		=Linimento resolutivo . . . . .	80.
		Premier. Agua vulneraria . . . . .	49.

	Pág.		Pág.
Presavia. Licor mercurial . . . . .	85.	=Espíritu de olin. . . . .	65.
Principe. (Polvo del) . . . . .	143.	=Polvo de tunquin. . . . .	150.
Pringle. Inyeccion. . . . .	77.	=Supositorios fortificantes. . . . .	183.
Purmann. Remedio contra los tumores cronicos. . . . .	167.	=Vinagre Cholchico. . . . .	200.
Q.		Richard. Balsamo abstringente. . . . .	18.
Quarin. Decoccion anti-artrítica . . . . .	33.	=Fomentos contra la gangrena. . . . .	73.
=Electuario contra la hidropesia. . . . .	42.	=Vino scilitico. . . . .	198.
=Emulcion contra la ccática . . . . .	63.	Richter. Fomentos resolutivos. . . . .	72.
=Gargarismo contra la parálisis de la lengua. . . . .	73.	=Pildoras fundentes. . . . .	117.
=Mixtura pectoral . . . . .	88.	Ricour. Unguento. . . . .	98.
=Contra la histericia . . . . .	89.	Rivet. Jarave pectoral. . . . .	172.
=Contra la hemorisis. . . . .	91.	Riverio. Poción anti-emética . . . . .	140.
=Pildoras contra el asma. . . . .	124.	Robet Thomas. Poción contra la coqueluche. . . . .	137.
=Contra la epilepsia. . . . .	124.	=Polvo contra la gastrodinia. . . . .	157.
=Para terminar las gonorreas . . . . .	127.	Roncalli. Linimento anti-escrofuloso . . . . .	83.
=Poción contra la tos sofocante . . . . .	136.	Roscinstein. Polvos para las nodrizas. . . . .	150.
=Polvo contra la tos convulsiva . . . . .	155.	Roux. Pildoras incisivas. . . . .	117.
=Remedio contra la disenteria . . . . .	164.	Rousselot. Polvo contra el cancer. . . . .	157.
Remedio contra la disenteria maligna . . . . .	164.	Russel. Eptiope vegetal. . . . .	70.
Quercetan. Agua diurética; . . . . .	36.	=Jalea musgo. . . . .	74.
R.		S.	
Raulin. Elixir. . . . .	52.	Saiffert. Pildoras purgantes fundentes. . . . .	115.
Rechoux. Cerato . . . . .	28.	San German. The de la salud. . . . .	190.
Renou. Pildoras mercuriales . . . . .	122.	Santa Maria. Pildoras contra lo gonorrea. . . . .	127.
Reuss. Electuario anti-hemorroydal. . . . .	46.	Saint Yves. Balsamo ophthalmico. . . . .	16.
		Sanchez. Balsamo anti-artítico. . . . .	15.

Pág.	Pág.		
==Píldoras laxantes funden- tes. . . . .	114.	Sthal. Esencia alexifar- maca. . . . .	66.
Saunders. Lexia litoutri- tica . . . . .	79.	==Polvo de scila com- puesto. . . . .	151.
Scarpa. Colirio. . . . .	30.	Stholl. Bebida anti-floxis- tica. . . . .	22.
Schmucher. Píldoras antel- mínticas. . . . .	125.	Stholl. Píldoras tónicas . . . . .	109.
Schroder. Píldoras tarta- reas. . . . .	128.	Southern. Elixir estomá- quico . . . . .	52.
Sedillot. Píldoras mercu- riales. . . . .	123.	Syhenham. Cervesa pur- gante . . . . .	20.
Selle. Conserva anti-escor- butica. . . . .	33.	==Cosimiento blanco. . . . .	34.
—Agua ophtálmica. . . . .	41.	==Píldoras marciales. . . . .	112.
==Elixir fortificante . . . . .	51.	Swediaur. Bolo contra la paralisis. . . . .	26.
==Elixir anti-escorbútico. . . . .	53.	==Emplasto de resina elastica . . . . .	60.
==Elixir resolutivo. . . . .	55.	==Emplasto stíptico. . . . .	62.
==Emplato amoniaco mer- curial. . . . .	62.	==Licor contra las aptas. . . . .	85.
==Linimento anti-espasmó- dico. . . . .	82.	==Unguento para los ras- gades. . . . .	99.
==Mixtura resolutiva. . . . .	89.	==Píldoras cupreas. . . . .	126.
==Mixtura acida. . . . .	93.	==Polvo anti-septico. . . . .	143.
==Mixtura diaforetica. . . . .	94.	Sthal. Píldoras contra el catarro uterino. . . . .	108.
—Píldoras anti-septicas . . . . .	127.	T.	
—Polvo aperitivo. . . . .	156.	Thedén. Agua de alcabu- saso. . . . .	38.
—Jarave pectoral. . . . .	172.	Thenard. Éter muriático. . . . .	68.
Smellome. Unguento ophtálmico. . . . .	99.	==Ozmazome . . . . .	102.
Smith Bolo digestivo . . . . .	24.	Thierry. Pomada epispásti- ca. . . . .	133.
—Píldoras fundentes. . . . .	117.	Thomann. Pomada anti- psorica. . . . .	133.
—Píldoras estomáquicas . . . . .	126.	Tournaier. Poción anti-te- nica. . . . .	138.
Schmucher. Píldoras an- thelmínticas. . . . .	125.	Tisot. Opiata anti-leucor- reica. . . . .	100.
Spielman. Electuario ver- mífugo. . . . .	45.	==Opiata febrífuga . . . . .	101.
—Poción para los dolores de vientre. . . . .	140.	Treves. Agua purgante . . . . .	36.
—Tintura de Ruibarbo . . . . .	184.	Tronchin. Crema pectoral. . . . .	33.
==Vinagre alcanforado. . . . .	201.		
Spina. Elixir de vida. . . . .	17.		

==Mermelda purgante. . 87.  
Turner. Cerato. . . 28.

V.

Vanhelmon. Polvo de scila nitrado. . . 152.  
Van-Swieten. Mistura hidragoga . . . 90.  
Van-mons. Bebida antinarcotica. . . 22.  
==Muriate de amoniaco cupreo . . . 94.  
Vernix. Polvo abstringente. . . 156.  
Vicq-de-Azir. Pildoras anti-artriticass . . 121.  
==Pildoras fundentes. . 121.  
Vigaroux. Tipsana. . 192.  
Vinache. Tipsana purgante. . 190.  
Vogler. Electuario antihelmintico. . . 44.  
==Remedio odontalgico. . 168.  
==Tintura lexivial. . . 188.  
Vrillere. (Madama de la) Agua para los dientes. 40.

W.

Ward. Electuario antiaquectico. . . 44.  
==Esencias. . . 67.  
==Opiata para las hemorroydes. . . 101.  
Warwick. Polvo purgante. 145.  
Wauters. Vejigatorio . 194.  
Wedel. Aceite Besoárdico. 75.  
Wedelio. Esencia carninativa. . . 66.

Pág.  
==Polvo pectoral. . . 146.  
Weikar. Solucion antivenerca. . . 181.  
Weiss. Remedio anti-lactisinoso. . . 167.  
Werlhoff. Elixir balsámico. 51.  
==Polvo corroborante. . 145.  
Wetzler. Polvo sedativo. 148.  
Whitt. Elixir febrifugo . 57.  
==Linimento carminante . 79.  
Willams. Pocion anti-nefritica. . . 139.  
==Mistura contra los calculos biliaarios. . 92.  
Wilkinson. Electuario anti-dissenterico. . . 47.  
Willis. Cataplasma isquiatica. . . 27.  
==Elixir sudorifico . . 54.  
==Emulcion anti-artritica. 63.  
==Pildoras anti-dissentericas. . . 109.  
==Pocion Copaibada. . 139.  
==Jarave sulfuroso. . 181.  
==Jarave caliveado. . 181.  
Wilson. Purgante. . 157.  
Withering. Pildoras de digital. . . 118.

Y.

Young. Inyeccion . 77.  
Yvel. Agua para los ojos. 41.

Z.

Zanetti. Mermelada purgante. . . 87.  
Zeller. Unguento mercurial blanco. . . 97.

# TABLA

## DE LAS FÓRMULAS CONTENIDAS EN EL FORMULARIO MAGISTRAL.

	Pág.		Pág.
<b>A.</b>			
Azucar naranjada purgan- te. . . . .	183.	=Para los ojos del Dr. Yvel. . . . .	41.
=Aguardiente de Alemania. . . . .	35.	=De Alibour. . . . .	42.
=Purgante de Mezaise . . . . .	35.	=De Godrán . . . . .	41.
Agua de Treves. . . . .	36.	Aceite besoardico de We- del. . . . .	75.
=De Quercetan . . . . .	36.	=Carminativo étereo. . . . .	75.
=Diuretica alcanforada de Fuller . . . . .	36.	=De vetabel aloetisado. . . . .	76.
=Oxigenada de Alion . . . . .	36.	=Acustico. . . . .	76.
=Mercurial de Piderit. . . . .	37.	=Verde de Metz de Zaullet. . . . .	76.
=Vegeto mercurial de Pas- savin . . . . .	37.	<b>B.</b>	
=Éterea alcanforada de Plancher . . . . .	37.	Baños. De agua mineral sulfurosa artificial ini- tando á los de Vallatria. . . . .	11.
=Cordial de Coladon . . . . .	38.	=Anti-psoricos del Dr. Jadelot. . . . .	162.
=De alcabusazo de The- den. . . . .	38.	Bálsamo de Genevieva. . . . .	12.
=Espirituosa de Anhalt. . . . .	39.	=Saxon. . . . .	12.
=De magnanmidad. . . . .	39.	=Acustico. . . . .	13.
=De Madama de Villie- re. . . . .	40.	=Opodeldoc . . . . .	13.
=De M. Leprimier. . . . .	40.	=Del caballero Laborda ó de Foureroy. . . . .	14.
=De Bonforme y de Ar- magnac . . . . .	40.	=Anti-artrítico del Dr. Sanchez. . . . .	15.
=Anti-herpética de Luy- nes . . . . .	40.	=Ophthalmico de S. Yves. . . . .	16.
=Oftálmica fortificante del Dr. Selle . . . . .	41.	=Tranquilo de Chomel. . . . .	16.

	Pág.		Pág.
==Acético alcanforado de Pelletier. . . . .	16.	==Isquiatica de Willis. . . . .	27.
==Anodino de Balh. . . . .	17.	Cerato del Dr. Hulfeland. . . . .	27.
==De la vida de Leliebre. . . . .	17.	==De Turner. . . . .	28.
==De la vida de Hoffman. . . . .	18.	==De Pott. . . . .	28.
==Abstringente de Richard . . . . .	18.	==De Rechoux. . . . .	28.
==De Ricour. ( Véase unguento. ) . . . . .	98.	==Mercurial de Falck. . . . .	28.
==De la vida exteño. ( Véase linimento estimulante. . . . .	18.	==De Kirklan . . . . .	29.
Cerveza. Diurética inglesa. . . . .	19.	==Opiado de Lagneau. . . . .	29.
==Purgante . . . . .	19.	Ceromel ó encerado del Dr. Aitken . . . . .	29.
==Estomáquica inglesa. . . . .	18.	Collar de Morand contra los lamparones. . . . .	30.
==Anti-escorbútica. . . . .	19.	Colirio de Brun. . . . .	30.
==Purgante de Sydehan. . . . .	20.	==Seco de Lagneau. . . . .	30.
==Anti-escorbútica de Butler . . . . .	20.	==De Gimbernat . . . . .	31.
==Cefálica inglesa. . . . .	20.	==De Janin . . . . .	31.
==De quina de Mutis . . . . .	21.	==De Newman. . . . .	31.
Bizcochos. Purgantes. . . . .	21.	Confección japónica. . . . .	31.
==Vermífugos . . . . .	21.	Conserva anti-escorbútica de Selle. . . . .	33.
Bebida. Anti-flojística de Stoholl. . . . .	22.	Crema pectoral de Tronchin . . . . .	31.
==Anti-narcótica de Vans Mons . . . . .	22.	==De Jeanet de Longrois. . . . .	31.
Bolos. Diaforéticos ingleses. . . . .	22.		
==Fortificante de Desbois. . . . .	23.	D.	
==Carminantes del mismo. . . . .	23.	Decoccion anti-artrítica de Quarin. . . . .	33.
==Anti-espasmódico de Buchan . . . . .	24.	==De aloes compuesta . . . . .	34.
==Stomaquico de Parmentier . . . . .	23.	Decoccion anti-séptica de Boherhave . . . . .	34.
==Digestivo de Smith. . . . .	24.	==Blanca de Sydeham. . . . .	34.
==Contra la parálisis. De Swediaur . . . . .	26.	Digestivo de Plenck. . . . .	35.
		Droga amarga de los indios ( Véase elixir. ) . . . . .	49.
C.			
Candelillas de Daran. . . . .	26.	E.	
Caráplasma anthelmintica. . . . .	27.	Electuario de Quarin contra la hidropesia. . . . .	42.
		==Hidragogo del Dr. Foucher . . . . .	43.

Pág.	Pág.
==Balsámico abstringente	==Anti-venéreo de Lemort. 54.
De Barthez . . . . . 43.	==Sudorífico de Willis. . . . . 54.
==Anti-cauético del Dr.	==Anti-séptico de Huxan. 54.
Ward . . . . . 44.	==Anti-asmático de Boher-
==Antelmintico de Vogler. 44.	have . . . . . 55.
==Vermifugo de Spielman. 45.	==Resolutivo de Dr. Selle. 55.
==Anthelmintico de Heister. 45.	==Paregorico inglés. . . . . 56.
==Anti-febril de Viena. . . . . 45.	==Anti-apoplético de los
==De magnesia de Copenha-	jacobinos de Rousen. 56.
gue . . . . . 46.	==Paregorico de Edinbur-
==Anti-febril de Boherhave. 46.	go. . . . . 56.
==Anti-artrítico de Buchan. 46.	==Febrífugo de Whit. . . . . 57.
==Anti-disentérico de Wil-	==Fétido de Fulde. . . . . 57.
kinson . . . . . 47.	==De Desbois. (Véase vino
==Anti-epileptico del Dr.	amargo). . . . . 57.
Mead . . . . . 47.	==Americano de Courcelles. 58.
==Anti-hemorroidal de Reus. 46.	==Anti-artrítico de la isla
==Anti-disentérica de Bu-	de Francia . . . . . 59.
chan . . . . . 47.	Emplasto anti-histórico. . . . . 60.
Elixir de Mathiolo. . . . . 48.	==De Fouquet . . . . . 60.
==Alkermes de los italia-	==Anti-venéreo de Boherha-
nos . . . . . 48.	have . . . . . 60.
==De drogas amargas de	==De resina elastica del Dr.
los indianos . . . . . 49.	Swediaur. . . . . 60.
==De Mithse . . . . . 49.	==De pelitre de Fuller. . . . . 61.
==Acido aromático de Brug-	==De Canet. . . . . 61.
natelli . . . . . 50.	==Fundente de Lamotte. 61.
==Pectoral inglés. . . . . 50.	==Del Abad Doyen. . . . . 62.
==Balsámico stomáquico y	==Stiptico de Swediaur. 62.
temperado de Hoffman. 51.	==Amoniaco mercurial del
==Balsámico de Werliot. . . . . 51.	Dr. Selle. . . . . 62.
==Fortificante del Dr. Selle. 51.	Emulsion de Quarin contra
==Sagrado. . . . . 52.	la ciatica. . . . . 63.
==Stomáquico de Stough-	==Del Dr. Willis contra
ton . . . . . 52.	el reumatismo . . . . . 63.
==Uterino de Crollio. . . . . 52.	==De Cadet para terminar
==De Raulin. . . . . 52.	la gonorrea . . . . . 63.
==Anti-escorbútico del Dr.	Epilatorio de Plenk. . . . . 64.
Selle . . . . . 53.	Species vermifugas . . . . . 64.
==De Boherhave . . . . . 53.	==Prothe . . . . . 64.
==Anti-escrofuloso de Pei-	Espíritu de ollin de Reus. 65.
rilhe . . . . . 54.	Espíritu etéreo aromático. 65.

	Pág.		Pág.
Esencia escilitica de Keup.	65.	Inyeccion de Dr. Clare.	78.
==Dulce de Halér.	65.	==Del Dr. Pringle.	77.
==Carminativa de Wedelio.	66.	==Del Dr. Young.	77.
==Alexifarmaca de Sthal.	66.	==De Hamilton.	78.
==Anji-histérica de Lemot.	67.		
==De Wadar	67.	J.	
Eter acético ferruginoso de Klaproth.	67.	Julepe moscado de Fullér.	78.
==Muriático de Brugnatelli.	68.	==Escocés para la angina inflamatoria	78.
==Muriático de Thenard.	68.	==De fucos de Russel.	74.
==Balsámico de tolu de Moreau	69.	==De Lichen islándico.	74.
==Acético cantaridado de Double	69.	Vermifugo de musgo de Córcega.	75.
==Sulfúrico ferruginoso de Sthal	70.	Jabon mercurial del Dr. Chaussier.	171.
Eptiope antimonial de Huxham	70.	==Acético etéreo del Dr. Pelletier.	171.
==Vegetal de Russel	70.	Jarave pectoral dulcificante del Dr. Selle.	172.
Extracto de coloquintidas compuesto	71.	==Pectoral resolutivo del mismo	172.
F.		==Para el coqueluche.	172.
Febrifugo de Dr. Audouart	71.	==Otro citado por Rivet.	172.
==Del Dr. Maret.	72.	==Pectoral balsámico de Charles.	173.
Fomentos resolutivos de Richer	72.	==Pectoral inglés.	173.
==Del Dr. Justamond.	72.	==Pectoral Bouvart.	174.
==Del Dr. Richard.	73.	==Del Dr. Dessesarts. Contra la tos.	174.
Frontal sipnotico.	73.	==Del Dr. Gardanne.	174.
G.		==De cochinillas.	175.
Gargarismo de Quarin en la parálisis	73.	==De higado de azufre.	176.
Gotas anti-artríticas de Eller	75.	==Pectoral del Dr. Malcot.	175.
L.		==Depurante del Dr. Larrey	176.
Inyeccion de ollia compuesta de Piderit.	77.	==De Cocinero	176.
		==De Boullay contra la coqueluche	177.
		==Vermifugo del mismo	177.
		==Anti-artrítico y anti-hidrópico	177.

Pág.	Pág.
==Deparativo amargo de Bouillon . . . . . 177.	Licor anti-nefrítico de Adams . . . . . 84.
==Vino cardiaco de Willemberg . . . . . 178.	==Amoniaco anisado . . . . . 83.
==Depurativo de Mr. Majault . . . . . 178.	==Cáustico de Plenck . . . . . 85.
==De Bellet . . . . . 179.	==Anti-venéreo de Prersavin . . . . . 85.
==De mercurio gomoso del Dr. Lagneau . . . . . 179.	==Del Dr. Swediaur para las aptas . . . . . 85.
==Anti-escorbútico del Dr. Portal . . . . . 179.	Lohc de almidón . . . . . 85.
==Anti-asmático . . . . . 180.	==De Gordón . . . . . 86.
==Vermífugo y purgante . 180.	==Saponaceo . . . . . 86.
==De Willis . . . . . 181.	Locion odontálgica de Plenck . . . . . 86.
==Calibeado del mismo . 181.	==Contra la tiña . . . . . 87.
L.	
Lejía litontrítica de Saunders . . . . . 79.	Mermelada de Tronchin . . 87.
Linimento carminativo de Wiitt . . . . . 79.	==De Zanetti . . . . . 87.
==De ajo . . . . . 79.	Mixtura pectoral de Boherhave . . . . . 88.
==De Mustard . . . . . 80.	==Pectoral de Quarín . . . 88.
==Resolutivo de Pott . . . 80.	==Anti-letárgica de Franck . 88.
==De Hufeland. Contra los engurgitamientos . 80.	==De Quarín en la hictericia . . . . . 89.
==Contra las hemorroides de Andry . . . . . 80.	==Anti-sifilítica de Cirillo . 89.
==Anti-oftálmico de Plenck . 81.	==Anti-catarral rusa . . . . 89.
==Saponaceo de Koempf . 81.	==Resolutiva del Dr. Selle . 89.
==Volátil de Plenck . . . . 82.	==Hidragoga de Van-Swieten . . . . . 90.
==Anti-artrítico de Home . 81.	==Odontálgica de Cadet . 90.
==Anti-artrítico de Desbois de Rochefort . . 82.	==Resino saponacea de Plenck . 91.
==Anti-espasmódico de Selle . . . . . 82.	==Anti-asmática de Bruner . 90.
==Diurético de Kuser . . . . 82.	==Catártica árabe . . . . . 90.
==Saponaceo alcanforado de Ferriar . . . . . 83.	==De Quarín contra la hemotisis . . . . . 91.
==Estimulante inglés . . . . 83.	==Saponacea purgante de Plenck . . . . . 91.
==Anti-escrofuloso de Roncalli . . . . . 83.	==De Boile contra las aptas . . . . . 91.
	==De Whit contra los cálculos biliares . . . . . 92.
M.	

Pág.	Pág.
=Litontrítica de Durande. . . . . 92.	=Del Dr. Dubois. . . . . 105.
=Balsámica de Fuller. . . . . 92.	Iasta pectoral de Parmen-
=Fundente de Mutzel . . . . . 93.	tier . . . . . 106.
=De mirra alcalizada de	=Contra los Rasgades. . . . . 106.
Griffeth. . . . . 93.	Pildoras febrifugas ingle-
=Para la angina inflamato-	sas . . . . . 107.
ria . . . . . 93.	=De Scila compuestas.
=Acida del Dr. Selle. . . . . 93.	(Farmacopea de Londres.) 107.
=Diaforética del mismo . . . . . 94.	=Tónicas de Bucher. . . . . 107.
Muriate de amoniaco cu-	=Estomáquicas de Cadet. 108.
preo de Van-mons. . . . . 94.	=Anti-disentéricas de Wi-
=De amoniaco y de fierro. 94.	llis . . . . . 109.
=Sosa y de oro . . . . . 95.	=Abstringente de Capu-
=De sen mercurisado de	rón . . . . . 109.
Hariman. . . . . 95.	=De alumbre de Herve-
	cio . . . . . 109.
O.	=Anti-hictéricas de Bu-
Opiata anti-leucorreatica de	chan . . . . . 111.
Tisot . . . . . 100.	=Idem de Gredin. . . . . 111.
=Febrífuga del Dr. <b>COS.</b> 100.	=De acónito mercuriales.
=Febrífuga de Tisot . . . . . 101.	Del Dr. Double. . . . . 110.
=Stomaquica de Helvecio. 100.	=Fundentes de Lemonier. 111.
=Del Dr. Larrey. . . . . 101.	=De Merat, contra el bai-
=Del Dr. Ward, para las	le de S. Vito. . . . . 110.
hemorroydes . . . . . 101.	=Orientales. . . . . 112.
=Vermífuga de Maleot. 102.	=Uterinas de Stal. . . . . 108.
Osmazome. De Thenard. 102.	=Mercuriales de Sydehan. 112.
=Miel pectoral de Danois. 103.	=Anti-espasmódicas de Pi-
=Idem de Edimburgo. . . . . 103.	derit . . . . . 112.
	=De los tres diablos de
P.	Maetzio. . . . . 113.
Pastillas de émula campá-	=Anti-catarrales del Dr.
nula . . . . . 104.	Pariset . . . . . 113.
=De Dr. Chaussier para	=Anti-sifilíticas del Dr.
la angina inflamatoria . 103.	Alibert . . . . . 114.
=Vermífugas de Barther. 104.	=Laxantes del Dr. San-
=Mogoles. . . . . 104.	chez . . . . . 114.
=De pelitre de Lacombe. 104.	=Anti-catarrales del Dr.
=De Gens-seng . . . . . 105.	Petit. . . . . 113.
=De mercurio sacarino del	=Mercuriales de Moscati. 115.
Dr. Lagneau . . . . . 105.	=Purgantes del Dr. Sai-
=Pectoral del Dr. Jobard. 106.	ffert . . . . . 115.

	Pág.		Pág.
==Maticales de Koempf.	116.	==Stomáquicas de Smilh.	126.
==De Boullay contra la gon-		==Tónicas de Huln.	126.
norrea . . . . .	116.	==Cupreas de Swediaur.	126.
==Sudoríficas del Dr. Du-		==De Santa Maria contra	
meril . . . . .	116.	la gonorrea . . . . .	127.
==Fundentes de Richter.	117.	==De Quarín para terminar	
==Fundentes de H. Smith.	117.	la gonorrea . . . . .	127.
==De digital de Withering.	118.	==Anti-histéricas del Dr.	
==Incisivas del Dr. J. J.		Selle . . . . .	127.
Leroux . . . . .	117.	==Balsámicas de Boherhave.	128.
==Purgantes de Haen.	118.	==Tartáreas de Schroeder.	128.
==Plumier . . . . .	118.	==Del Dr. Dupuy contra	
==Escosesas del Dr. Ande-		el hidrotorax . . . . .	128.
rion . . . . .	119.	Pomada anti optálmica de	
==Relaxantes de Buchan.	120.	Desault . . . . .	129.
==Eméticas de Boherhave.	119.	==Optálmica de Jeanin.	129.
==Hidragogas de Janin.	120.	==De Leon para los ojos.	129.
==Scilíticas de Edimburgo.	121.	==De Grandjean . . . . .	130.
==Anti-artríticas de Vicq de		==Del Dr. Fabre . . . . .	130.
Azir . . . . .	121.	==Mercurial de Cirillo . . . . .	131.
==Fundentes del mismo . . . . .	121.	==Idem ó de manteca de	
==Incisivas de Cadet . . . . .	121.	cacao . . . . .	130.
==Incisivas pectorales de		==Oxigenada de Alion.	130.
Buchan . . . . .	122.	==De la Sultana . . . . .	130.
==Esténicas de Brun . . . . .	122.	==De la condesa ó pomada	
==De Keyser . . . . .	122.	virginal . . . . .	130.
==Mercuriales de Renou.	122.	==De Turbit del Dr. Alibet.	132.
==Mercuriales de Brugua-		==Anti-psoricas del mismo.	132.
telli . . . . .	123.	==Idem del Dr. Boyer . . . . .	132.
==Idem de Plenk . . . . .	123.	==Anti-hictérica de Goero-	
==Idem de Sedillot . . . . .	123.	ly . . . . .	129.
==Idem de Cadet . . . . .	124.	==Antip-sorica de Thomann.	133.
==Anti-epilépticas inglesas.	124.	==Del Dr. Authenrieth con-	
==De Quarín contra el asma.	124.	tra el coqueluche . . . . .	133.
==Del mismo contra la epi-		==De Thierry . . . . .	133.
lepsia . . . . .	124.	Pocion balsámica de Chop-	
==Blancas de Bartz . . . . .	125.	part . . . . .	134.
==Carminantes del mismo.	125.	==Diurética de Dr. Hallér.	133.
==Antelminticas de Schun-		==De hipécacuana de Ha-	
cher . . . . .	125.	llér . . . . .	134.
==Anti-esqueticas de Haen.	125.	==De M. Jeanroy contra	
==De Mosew . . . . .	126.	el coqueluche . . . . .	135.

Pág.	Pág.
==Diuréticas de Bucham. . 135.	—Febrífugo y purgante de Hervecio . 143.
==Anti escorbútica del Dr. Franke . . 135.	—Febrífugo de Boullemer. 144.
==Laxante de Viena. . 135.	—De Gins ó James. . 144.
==Del Dr. Mongenot, contra la afección . . 136.	—Cáustico de Kruger. . 145.
==Catárticas del Dr. Mende . . 136.	—Corroborante de Werlhoff . . 145.
==De Quarín contra la tós sofocante. . 136.	—De Grimaldi. . . 144.
==Emenagogas de Desbois. 136.	—Vomitivo de Hervecio . 146.
==De Hufeland, contra la hidropesía . . 137.	—Anti-catarral de la Farmacopéa de Viena. . 145.
==Del Dr. Andry contra los envenenamientos por los ácidos minerales. . 137.	—Del conde de Warwick. 145.
==Contra la coqueluche de Dr. Rover Thomas. . 137.	—Pectoral de Wedellio. . 156.
==Purgante y vermífuga del Dr. Marcatan . . 138.	—Stomáquico de Birckmann . . 146.
==Contra la tenia. . 138.	—Anti-caquectico de Hartmann . . 148.
==Anti-stánica del Dr. Norford . . 139.	—Diaromatón inglés. . 148.
==Anti-nefrítica del Dr. Tournier. . . 138.	—De Haly. . . 148.
==Capivi dado por Willis. 139.	—Anodino de Hervecio. 148.
==De Jussieu contra el esputo de sangre. . 139.	—Sedativo de Wetzler. . 148.
==Anti-emética de Riverio. 140.	—De antimonio marcial de Kemp . . 148.
==De Spielman contra los torminos . . 140.	—Incisivo del Dr. Mongenot . . 149.
==Purgante de Dr. Andry. 140.	—Temperante laxativo de M. Bovillon de Lagrange. 149.
Polvos anti-psóricos. . 141.	—De Tunquin. (Reuss.) 150.
==Arsenicál de Justamond. 142.	—De Roseinstein, para las nodrizas. . . 150.
==Anti-carcinomatoso de Fr. Cosme . . 142.	—Febrífugo de Juncker. 150.
==Arsenicál de Pluncquet. 142.	—De scila compuesto de Sihal . . . 151.
==Anti-ártrítico del Dr. Marc . . 141.	—Vermífugo de Brugnatelli . . . 151.
—De la Princesa. . 143.	—Del conde de Palma . 151.
—Anti-séptico de Swe-diaur . . . 143.	—De greda compuesto. . 152.
	—De Odier. . . 152.
	—De kino compuesto. (Farmacopéa de Londres.) . 152.
	—De scila nitrados, de Vanhelmont . . 152.

	Pág.		Pág.
—Stítico de Colbatch.	. 153.	—Del Dr. Chestón contra el cáncer de los labios y las úlceras malignas	. 162.
—Vermífugo purgante de Ball.	. 154.	—De la caridad para el cólico de los pintores	. 162.
—De mercurio sacarino del Dr. Lagneau	. 153.	—De Quarín contra la disenteria.	. 164.
—De Plummer	. 153.	—De Quarín contra la disenteria maligna.	. 165.
—Tónico incisivo del Dr. Lasonet	. 154.	—Contra el envenenamiento por los hongos.	. 165.
—Vermífugo de estaño.	. 154.	—Del Dr. Meglin el trismo doloroso	. 167.
—De Dower.	. 155.	—Anti-lactisinoso del Dr. Weiss	. 167.
—Anti-catarral del Dr. Marc	. 155.	—De Purmann contra los tumores crónicos de las articulaciones	. 167.
—Anti-artrítico de Perard.	. 155.	—Odontálgico de Vogler.	. 168.
—De Quarín contra la tós convulsiva.	. 155.	—Anti-venéreo del Dr. Peirilhe	. 168.
—Esfractico de Selle.	. 156.	—Contra la tenia por el colegio de médicos de Prusia	. 169.
—De la Princesa de Carignan	. 156.	—Contra la tenia por Kuttinger	. 169.
—De Knox.	. 157.	—Contra los accidentes ocasionados por los hongos	. 170.
—De Vernix.	. 156.	—Contra el tialismo.	. 171.
—De Rouselot, contra el cáncer	. 157.		
—De Roberto Tomás, contra la gastrodinia.	. 167.	S.	
—Purgante de Dr. Wilson.	. 167.	Solucion anti-venérea de Weikart.	. 181.
R.		—Citro muriática de Broussonnet	. 182.
Ratafia del Comendador de Caumartin contra la piedra de la vejiga.	. 158.	—Arsenicál de Prusia	. 182.
—De los caribes.	. 158.	Sparadrap abstringente de Coustonau.	. 182.
Remedio de Madama Nouffer contra la tenia.	. 159.	Supositorio fortificante de Reuss	. 183.
—Anti-sibilítico de Hancmann	. 159.		
—Contra la tenia.	. 160.		
—Del Dr. Baslow contra la tiña	. 161.		
—Del Dr. Bicker, idem.	. 161.		
—Anti-psorico del Dr. Jaclot	. 162.		

	Pág.		Pág.
=Contra las hemorroydes.	183.	Trosiscos del Dr. Chaus-	
Sal de Guindre.	171.	sier	193.
T.			
Tablillas anti-catarrales de		V.	
Tronchin	183.	Vejigatorio de M. Wau-	
Tintura de Daffys.	184.	ters.	194.
=De ruibarbo de Spiel-		=Perpetuo de Janin.	195.
man.	184.	=Inglés	195.
=Sagrada	184.	=Del Dr. Louyer Viller-	
=De lavándula compuesta.		may	193.
(De Lóndres.)	185.	=Amoniaca.	195.
=Febrífuga de Clutton	184.	=De M. Vonvoisin.	194.
=Nervino tónica, de Bestu-		Vino de Huxham.	195.
chef	185.	=Febrífuga de S.	196.
=De ollín de Edimburgo.	186.	=Amargo.	196.
=Anisada del Dr. Alibert.	186.	=Amargo ó elixir de Du-	
=De antimonio de Jacobo.	186.	bois	195.
=Volátil de Guayaco. (De		=Febrífuga.	196.
Lóndres.)	186.	=Anti-hidrópico de Fullér.	197.
=De malate de fierro	187.	=Estomáquico de Plenk	197.
=De almáciga compuesta.	187.	=Anti-leucorreico.	197.
=Nervino tónica de Ber-		=Scilitico de Richard.	198.
lín	187.	=Amargo diurético de	
=Anti-espasmódica de		Corvisat.	198.
Keup	188.	=Anti-apoplectico.	198.
=De ruibarbo inglesa.	188.	=Anti-hictérico ó contra	
=Tebaica de Bemberg.	188.	la amarillés.	200.
=Lexivial de Vogler.	188.	=Amargo y diurético de	
=Stomáquica de Moscati.	189.	la caridad	199.
=Stomáquica amarga de		=Del Dr. Fordice.	199.
Edimburgo	189.	=De ruibarbo compuesto.	199.
=Éterea de Klaproth.	190.	=De guayaco elaborado del	
=De cardomomo compues-		Dr. Lewis	200.
ta. (Lóndres.)	189.	=Diurético inglés.	200.
Thé de sanidad de M. de		Vinagre colchico de Reus.	200.
S. German	190.	=Alcanforado de Spielman.	201.
Tipsana de Vinache.	190.	=Bezoárdico de Berlín.	201.
=Real.	191.	Unguento de Mompellier.	95.
=De Feltz.	191.	=Blanco alcanforado de	
=De Vigaroux.	192.	Viena	95.
		=Epispastico sin cantári-	
		das	96.



# TABLA

## DE LAS ENFERMEDADES

	Pág.		Pág.
<b>A.</b>		Cálculos biliares.	209.
Abcesos . . . . .	279.	=De la vejiga . . . . .	209.
Afecciones lacteás. . . . .	203.	Cancer . . . . .	209.
=Nerviosas. . . . .	204.	Cardialgia. . . . .	209.
=Uterinas. . . . .	203.	Carnosidades en el canal	
Agrios del estómago. . . . .	204.	de la uretra . . . . .	281.
Amenorrea. . . . .	204.	Catarata . . . . .	281.
Auasarca . . . . .	204.	Catarro agudo. . . . .	209.
Angina. . . . .	205.	=Laringeo . . . . .	210.
=Tonsilar. . . . .	205.	=Crónico. . . . .	210.
=Maligna. . . . .	105.	=De la vejiga . . . . .	210.
=Tracheal. . . . .	217.	Cauterios . . . . .	281.
Ankilosis falso . . . . .	279.	Cefalargia. . . . .	210.
Angina inflamatoria. . . . .	283.	Clorosis . . . . .	210.
Aplonia . . . . .	206.	Condilomas. . . . .	285.
Aptas . . . . .	280.	Colico de estómago. . . . .	211.
Apoplejía sanguinea. . . . .	206.	=Bilioso . . . . .	212.
=Serosa . . . . .	207.	=Miserere. . . . .	213.
Ascitis. . . . .	207.	=Nefritico. . . . .	213.
Asma. . . . .	207.	=Nervioso. . . . .	213.
Atraso de las reglas. . . . .	264.	=De los pintores. . . . .	213.
<b>B.</b>		=Ventoso. . . . .	212.
Blenorrea . . . . .	208.	=Histérico. . . . .	213.
Bubones venéreos. . . . .	280.	Constipacion. . . . .	214.
<b>C.</b>		Contusiones. . . . .	282.
Cachexia . . . . .	209.	Convulsiones de los adul-	
		tos. . . . .	214.
		=De los niños. . . . .	214.
		Coqueluche. . . . .	214.
		Caidas y golpes. . . . .	215.
		Calambres del estómago . . . . .	217.
		Cistitis . . . . .	253.

	Pág.		Pág.
<b>D.</b>		<b>G.</b>	
Daaza de S. Vito.	218.	=Intermitente . . .	236.
Debilidad de estómago.	227.	=Pútrida . . .	241.
=Del oído.	236.	=Exantemática . . .	242.
=De los miembros.	236.	=Quartana . . .	236.
=De los nervios.	235.	Fistula del ano . . .	286.
=De los órganos de la ge- neracion.	230.	Flatuosidades . . .	243.
=Dorsal . . .	236.	Flores blancas . . .	243.
Desfallecimiento . . .	219.	Fracturas . . .	286.
Depositos artríticos . . .	283.		
Diarrea . . .	219.	<b>H.</b>	
Diviesos . . .	282.	Heridas . . .	291.
Dolores artríticos . . .	283.	=De la cabeza . . .	292.
=De las articulaciones . . .	283.	=Fungosas . . .	285.
Dispepcia . . .	221.	=Inveteradas . . .	291.
Disenteria . . .	221.	=Simples . . .	291.
Disuria . . .	222.	Hundimiento . . .	283.
		Hematuria . . .	247.
<b>E.</b>		Hemorrhoides . . .	247.
Espujo cruento . . .	216.	Hepatitis . . .	248.
Escréfulas . . .	234.	Herpes . . .	252.
Estrechamiento del canal de la uretra . . .	281.	Hidrofobia . . .	250.
Embarazo gástrico . . .	222.	Hidropesia . . .	248.
Envenenamientos . . .	224.	Hidrotorax . . .	250.
Engurgitaciones glandulo- sas . . .	284.	Hipocondria . . .	250.
Epilepsia . . .	225.	Histórico . . .	251.
Erupios . . .	227.		
Esquingancia . . .	227.	<b>I.</b>	
Escoriaciones . . .	284.	Ictericia . . .	251.
Escresencias . . .	285.	Indigestion . . .	251.
Espujo de sangre . . .	216.	=Del estómago . . .	251.
Enteritis . . .	252.		
Emolisis . . .	248.		
<b>F.</b>			
Fiebre adinámica . . .	232.		
=Inflamatoria . . .	241.		



	Pág.		Pág.
Trismo doloroso.	274.	=Cancerosas.	294.
Tós convulsiva.	271.	=Indolentes.	296.
Tós ferina.	282.	=Rebeldes.	296.
Tumores.	293.	=Sifilíticas.	296.
=Sifilíticos.	294.		
=Lacteos.	285.		V.
=Indolentes.	294.	Vapores histéricos.	296.
=Inflamatoriós.	294.	Viruela.	276.
=Scrofulosos.	294.	Vientos.	276.
=Scirrosos.	274.	Vicios sifilítico.	276.
Timpanitis.	274.	Vértigos.	278.
Torminos.	274.	Vomitos.	278.
		Vomitos de sangre.	279.
	U.		
Ulceras.	294.		

N. E. N.

*C. S. E.*

## FÉ DE ERRATAS

<u>Pág.</u>	<u>Lín.</u>	<u>Dice.</u>	<u>Léase.</u>
-------------	-------------	--------------	---------------

### EN LA DEDICATORIA.

Plana 2 <sup>a</sup> .	16.	ú toscó. . . . .	si toscó
------------------------	-----	------------------	----------

### EN EL PRÓLOGO.

Plana 1 <sup>a</sup> .	2.	quicquam . . . . .	quicquam
Id. id.	8.	nise quod ipse nihil . . . . .	nisi quod ipse facit nihil
Plana 2 <sup>a</sup> .	12.	aquellos . . . . .	aquellas
Id. id.	26.	proporciorá . . . . .	proporcionará
Id. id.	27.	una obra . . . . .	una otra
Plana 3 <sup>a</sup> .	11.	acre . . . . .	aere

### EN EL PREFACIO.

2	24.	Actio . . . . .	Actio
5	34.	virtu . . . . .	virtus
8	16.	abogado . . . . .	elaborado
285	17.	escrecencias vreenecas. . . . .	venereas.

NOTA. Las páginas desde 157 hasta 172 deben ser de 147 hasta 162.

En la pág. 321, columna segunda, las líneas desde 17 á 20 dicen 148, léase 147.

FIN DE ERRATAS.

FIN DE ERRATAS

18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20

EN LA DEDICATORIA

18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20

EN EL PREFACIO

18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30

EN EL PREFACIO

24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30

NOTA. Las páginas desde 177 hasta 178 deben ser de las mismas. En la pag. 202, columna segunda, las líneas desde 17 a 20 dicen 178, 179, 180, 181.

FIN DE ERRATAS





1000, -

