

324. HEPTANDRIA MONOGYNIA.

Febris intermittentibus domandis, in cortice Aesculi expertus est, licet non adeo securas. Spinosus fructus, cortex, in carbones combustus, ad pulchre nigre tingendum inservire potest. Fructus siccatus, pulverisatus, dat pulvorem sternutatorium vehementem. Farina fructus exhibet bonum pabulum equis præcipue in Tussi, & Orthopnoea, si consueto eorum pabulo misceatur. Maturus crudus fructus, cervis est gratum pabulum, & ad saginandos porcos adhibetur. *Onom. Botan.* Ex eodem fructu Amylum quoque exquisitum parari potest: ut *Cel. Hist. Nat. Profess. de Well* ipsem et levissimum, & albissimum experimenti gratia paravit, mihi pro sua in me benevolentia, ut solet, id etiam communicare favit.

OCTANDRIA

MONOGYNIA.

**D**APHNE MEZEREUM: floribus sessilibus, ternis, caulinis; foliis lanceolatis, deciduis. *Oed. Dan. 268.*

Planta hæc corticem æque, ac semina officinis largitur: utrumque sub diverso, nec proprio nomine, cortex, Laureolæ audit; semina, sub seminum Coccognidii nomine veniunt. Planta acris, septica, toxica, vim corrodentem, rubefacientem, excoriantem, stimulantem, pellentem, vomitoriam, cardialgicam,

gicam, febrilem possidet à LINNE'. Pessimum  
hujus plantæ effectum TRAGUM vidisse, BUCH-  
WALDUM in Dania observasse, Dodonæum  
eandem cruentam alvum causare reliquissse, re-  
fert Cel. de CRANTZ. GUERIN. pag. 36. de  
*Vegetab. venenat.* *Alsat.* ex WEDELIO Hy-  
dropicum per sex septimanæ omnibus frustra  
adhibitis quotidie vomentem, ex HOFFMAN-  
NO a quatuor baccis lethalem fere Hyperca-  
tharin, & Hyperemisin, &c. adducit.

Petrus de ABBANO Cap. 32. „ Cui suc-  
„ cus Mezereon datus fuerit in potu, patietur  
„ fluxum ventris, & sitem, & anxietatem, &  
„ excoriationem intestinorum. “ Et cap. 47.  
„ Cui in potu data fuerint grana Coccognidii,  
„ patietur vomitum, & fluxum ventris, & tri-  
„ bulationem in stomacho. “ Nihilominus ta-  
men planta, quam ob acredinem summam apes  
ipsæ evitant, tam in usum Medicum, quam  
hinc inde in vita communi cum fructu adhibe-  
tur. Radice Medici olim setacei loco ute-  
bantur in morbis oculorum præcipue; qūæ,  
perforata auri externa, traducebatur. Non-  
nulli decocto abluerent cancrofos Tumo-  
res. MATTHIOLUS à contusis recentibus fo-  
liis in Ischiatide ad locum dolentem applicatis,  
ubi vesicas traxerunt, optimos vidi effectus.  
HILL. unicum hoc esse remedium credit, à cu-  
jus externo usu nodorum podagricorum recen-

tium

126 OCTANDRIA MONOGYNIA.

tium resolutio expectari possit. Corticem externe contra Spasmos applicant Dalenses, & ex eodem baccisque unguentum in Ulceribus cacoethicis parant. GUNNER. fl. Norv. 18.

In usum internum quoque plantam hanc Medici trahere ausi sunt; ac imprimis masticationem foliorum ægris imperabant, scopo sialagogi: corticis foliorum, seminum, tum seorsim, tum mixtorum, decocto ut Medicamento draftico, in Hydrope præcipue usi sunt. Plura videri possunt in *Dissert. Cl. GMELIN.* Baccæ acerrimæ sunt; sex numero lupum occidunt. Pictores his ad conficiendum rubrum colorem utuntur.

**DAPHNE LAUREOLA:** racemis axillari- bus quinquefloris; foliis lanceolatis, glabris. Racemi axillares, laterales, nutantes, bracteis concavis, alternis, absque floribus in suis alis. Flores quinque, terminales racemi, in umbellam congesti. Flores tristes, colore, odore, tempore.

Planta hæc dat officinis corticem sub nomine corticis Mezerei: acris, septica, toxica est; vi corrodente, rubefaciente, excoriante, draftica, nota: à LINNÉ.

**DAPHNE CNEORUM:** floribus fascicula- tis, terminalibus, sessilibus; foliis lanceolatis, nudis, mucronatis. Thymelea minor seu Daphnoides alpinum. *Gesn. fasc. 5. t. 3. f. 6.*

Cor-

Corticem quoque planta hæc officinis tribuebat cum Daphne Laureolæ viribus convenientem. DALE.

DAPHNE GNIDIUM: Panicula terminali; foliis linear-lanceolatis, acuminatis. Caulis humifusi. Folia annua glabra. Flores congesti, cincti foliis, suaveolentes, supra rubri. Bis quotannis florens.

Omnes harum Plantarum partes insigni gaudent acrimonia. TRAGUS hac planta impostores multos ad orci fauces misisse monet. WEDELIUS adducit hydropicum hypercatharsis inde correptum, & per sex continuas septimanas quotidie vomentem. A quatuor baccis comestis lethalem fere hypercatharsim, & hyperamefin vidit I. M. HOFFMANNUS, intollerabili oris, & faecium æstu stipatam, subsequente Febre acuta, & summo virium dispendio, & tandem cuticulæ à toto corpore secessu: à duodecim granis Virginem cum sanguine animalm evomuisse à LINNE' testatur: à baccis comestis ardorem in lingua ad stomachum usque, Vomitum cum Febre ardentissima, quæ presso pede subsequebatur, & tanto virium lapsu, ut mors in propinquuo esse visa fuerit, Acta Helvetica: hæc SPIELMANNUS: ubi etiam adnotat ultimam hanc speciem Gallis proprie Garou dici, ejusque corticem reliquis efficaciorem à nonnullis contendit. Tum Pa-

rifi.

128 OCTANDRIA TRIGYNIA.

rifinos duarum primarum specierum folia recipere, hujus autem ultimae radicem.

Folia vesicas excitare MATTHIOLUS monet; & idem de radice notissimum esse PETITUS affirmat. Cortice ab aliquot retro lustris loco fonticuli in Gallia uti solent, teste laudato SPIELMANNO: ubi plura hac de re videri possunt. Baccæ ardentes, fauces adurentes, pro granis Gnidiis, vel pro Coccognidio in officinis Anglicanis asservabantur, DALE. LINNE' semina Coccognidii ex Daphne Mezereo defumi vult.

PASSERINA CILIATA: foliis lanceolatis, subciliatis, erectis; ramis nudis. Berg. cap. 126.

Folia cauſtica vi prædicta in nonnullis officinis asservantur. DALE.

T R I G Y N I A.

POLYGONUM HYDROPIPER: floribus hexandris, semidigynis; foliis lanceolatis; stipulis submuticis.

Herba, quæ in officinas recipitur sub Persicariæ, vel Hydropiperis nomine prostata: acris, urens, luteo-tinctoria; incidente, corrodente, stimulante, diuretica potissime vi pollet: à LINNE', DALE . Internus ejus usus præcipue in Hydrope; externus, in cataplasmate crudo ad Tumores oedematosos discutiendos.

Oves

Oves plantam non adtingunt. Pro flavo colore conficiendo infervire potest. *Onom. Botan.*

## T E T R A G Y N I A.

**P**ARIS QUADRIFOLIA: *Oed. Dan. 139.*  
Calyx quadriphyllus. Petala quatuor angustiora. Bacca quadrilocularis.

Integra planta odoris est ingrati, narcotici, suspecti; gallinas necat, & internus ejus usus hominibus etiam, Spasmos ventriculi, & Vomitus excitat. Antiqui Medici externum ejus usum in Bubonibus pestilentialibus, & Inflammationibus laudarunt: uti & baccarum succum, qui multum viribus cum succo Papaveris convenire creditur, ut refrigerantem, & in oculorum Inflammationibus præcipue efficacem, commendarunt. Seminibus in Mania & contra assumta venena utebantur. In arte tinctoria folia locum habere possunt; in quem finem colligenda sunt ante florescentiam plantæ, siccanda, & cum filis, prius cum Alumine mactatis coquenda.

## E N E A N D R I A

### M O N O G Y N I A.

**A**NACARDIUM OCCIDENTALE: Filamenta quidem decem, sed unico castrato. E

I

nuce