

Medicamento hoc rustici ut plurimum uti solent. BOERHAAVE, DALE.

CORONILLA EMERUS: fruticosa; pedunculis subtrifloris; corollarum unguibus calyce triplo longioribus; caule angulato.

Folia olim officinalia erant. Vulgus hæc foliis Sennæ substituit, ut scribit RUPPIUS. Fœminæ medicastræ vocant Senesblätter, & utuntur his loco foliorum Sennæ: BUXBAUMIUS, DALE.

PSORALIA BITUMINOSA: foliis omnibus ternatis; foliolis lanceolatis; petiolis lævibus; floribus capitatis. Suffruticosa.

Radix, folia, semen, officinas Pharmaceuticas intrant. Urinæ difficultati, Comitilibus, Hydropicis, fœmininisque affectibus auxiliantur. Radix alexipharmacæ est. DIOSC. DALE.

P O L Y A D E L P H I A
P O L Y A N D R I A.

HYPERICUM ANDROSÆNUM: floribus triginis; fructibus baccatis; caule fruticoso, ancipiti.

Folia, flores, semen, planta officinis largitur, partium tenuium Diuretin ciet, ac præcipue in lumbricis fugandis eminet: DALE.

HYPERICUM QUADRANGULUM: floribus trigynis; caule quadrato, herbaceo.

Herba, flores, semen, in officinis affer-
vantur: Herba, & flores ejusdem cum præce-
denti sunt usus: LOBEL. Semen ad Ischiaticos
affectus utile est; biliosa per alvum purgat.
DIOSC. DALE.

HYPERICUM PERFORATUM: floribus
trigynis; caule ancipiti; foliis obtusis, pellu-
cido punctatis. Antheræ puncto atro. Stigma-
ta sanguinea.

Herba, flores, semen officinalia sunt, &
viribus cum Hyperico Androsæmo omnino
conveniunt: **DALE.** Hippocrates Hypericum
abstergendi, & apperiendi ergo adhibebat. Dari
quoque interne tam vulnerario scopo, quam
aperiente; & hinc Melancholicis commenda-
ri, afferit **SPIELMANNUS.** Galeno ad conso-
lidanda Vulnera, & Ulcera laudabatur.

HYPERICUM CORIS: floribus trigynis;
calycibus ferrato-glandulosis; foliis subverti-
cillatis.

Semina officinas intrant; urinam menses-
que cident: teste **DIOSC. DALE.**

S Y N G E N E S I A P O L Y G A M I A A E Q U A L I S.

LACTUCA SCARIOLA: foliis verticalibus;
carina aculeatis. Folia inferiora runcinata,
obliqua, seu verticalia; caulina superiora,

am.