

tuantur. A principio, medicamenti dosis Ludovico aureo vendebatur. SPIELMANNUS, ubi plura de hac radice videri possunt, uti & apud *Cel. de CRANTZ*.

**IMPATIENS NOLITANGERE:** pedunculis multifloris, solitariis; foliis ovatis; geniculis caulinis tumentibus. *Oed. Dan.* 588.

Herba olim officinas pharmaceuticas intrabat; vi diuretica insigni pollet, ut Diabetem etiam inducat. Hanc facultate perniciofa, & deleteria scatere, refert DODONÆUS, DALEGUERIN loc. cit. pag. 58. nullo exemplo quantum novit, hanc noxiam invenit.

## G Y N A N D R I A D I A N D R I A.

**SERAPIAS LATIFOLIA:** bulbis fibrosis; foliis ovatis, amplexicaulibus; flor. pendulis *Fl. Suec.* 819. Serapias bulbis fibrosis, nectarii labio obtuso, crenato, petalis æquali; fructibus pendulis. *Huds. angl.* 341. Serapias bulbis fibrosis; floribus secundis, labello planiusculo, petalis ovatis. *Scop. carn.* 155. Serapius bulbis fibrosis, caule multifloro, floribus spicatis, nectarii labio petalis breviore. *Ger. prov.* 132. Epipactis foliis amplexi caulis ovato-lanceolatis, labello lanceolato *Hall. flor.* 40. *Act. Helv.* 4. p. 102. Epipactis seu Helleborine *Cum. epit.* 187. *Riv. Lex.* 1. 6. Hellebori-

borine floribus è viridi & purpureo variis, labello acuminato, foliis brevissimis *Hall. helv.*  
*275.* Helleborine latifolia montana *Bauh. pin.*  
*186.* *Folia amplexicaulia. Spica multiflora, longa. Petioli longi. Flores Fructusque penduli. Nectarium lineis nullis.*

Herba olim in officinis Pharmaceuticis aservabatur. Viribus cum Helleboro albo (*Vetratio albo L.*) à quibusdam convenire creditur. DALE.

## HEXANDRIA.

**A**RISTOLOCHIA SERPENTARIA: foliis cordato-oblongis, planis; caulis infirmis, flexuosis, teretibus; floribus solitariis. Caulis genicula valde nodosa. Flores ad radicem,

Radix Serpentariae Virginianæ officinarum ex hac planta desumitur; quæ versus finem Sæculi superioris, inter Anglos, & Gallos; sub initium hujus inter Germanos cœpit in usum recipi. Acris, aromatica, diuretica, anthelmintica vi gaudens LINNAEUS. Contra Pestem laudat WILLIS. Purgantium vim infringere HARTMANN refert, teste *Cel. de CRANTZ.* A vi venenis resistendi, in America laudatam radicem, Europæi a virtute alexipharmacæ commendant: SPIELMANNUS. Vires antisepticas PRINGLE vidit. *Idem*

**ARISTOLOCHIA PISTOLOCHIA:** foliis cordatis, crenulatis, subitus reticulatis, petiolatis, florum solitariis. Bractea cordata, sessilis, parva, insidens basi pedunculi.

Radix plantæ hujus in officinis affervatur; viribus cum reliquis convenit. DALE.

**ARISTOLOCHIA ROTUNDA:** foliis cordatis, subsessilibus, obtusis; caule infirmo; floribus solitariis.

Radix quoque Aristolochiæ rotundæ in officinis nota, foetida, aromatica, amara, acris, exurens; vim incidentem, vomitoriam, pellentem, diureticam, emenagogam, abortivam possidet: à LINNÉ.

**ARISTOLOCHIA LONGA:** foliis cordatis, petiolatis, integerrimis, obtusiusculis; caule infirmo; floribus solitariis.

Radix plantæ hujus, sub eodem nomine in officinis affervatur; iisdem cum præcedenti viribus gaudet: à LINNE.

**ARISTOLOCHIA CLEMATITIS:** foliis cordatis; caule erecto; floribus axillaribus confertis. *Tipula pennicornis* fæcundat flores D. SCHREBER.

Radix hujus sub nomine radicis Aristolochiæ vulgaris in officinis habetur; graveolens, amara, acris, pellens, vomitoria à LINNÉ.

## POLYANDRIA.

**A**RUM ESCULENTUM: à caule; foliis peltatis, ovatis, integerimis; basi emarginatis.

Arum hoc esculentum, uti & Arum Colocasia, Africæ, & Americæ peregrinæ, feræ, editur coctum in dupli aqua, vel assatum. Nutrit egregie, sapidissima omnium fertur. Crudum, acerrimum, corosivum, & lethale.

*Amœn. Acad. 6. p. 122.*

**A**RUM MACULATUM: à caule; foliis hastatis, integerimis; spadice clavato. *Oed. Dan. 505.*

Radix plantæ hujus, & herba officinales sunt; acris, caustica, recens, corrodens, rubefaciens, vesicans à LINNÉ. Majori dosi noxia, etiam lethalis CRANTZ. Ab infuso foliorum Vomitum cruentum STEHELINUS, HALLERUS; à majore recentis radicis dosi Cardialgia rapi juvenem vidi ILLUSTRISS. L. B. DE STÖRCK.

Radix hæc in autumno collecta, uti & integra planta possidet evidentem accredinem, quæ in eadem primo vere effossa non observatur; hæc exsiccata, aut in Vino, vel Aceto macerata, mitior omnino evadit; sique ad usus Medicos, vel in substantia, vel alio modo præparata, apta redditur: magno

cum successu ad fundendam pituitam, ad erigendas collapsi ventriculi vires, obstructions Hypochondriacorum solvendas, Asthma, Paralyses debellandas &c. a Medicis adhibetur: cuius etiam externus usus, ad Ulcera inveterata, cariosa ossa &c. forma cataplasmatis notus.

Expresso radicis succo, radix in nonnullis Regionibus in escam cedit; quod alimentum hyemis tempore communissimum habetur, & in annonæ penuria in aliis quoque Regionibus, ubi planta hæc crescit, in eundem scopum, simili modo præparata, secure cedere potest. Nonnulli radicem hanc, succo orbam, Saponi substituunt, aut illam huic immiscent; Amylum ex radice hac parari quoque potest. Folia iisdem, ast minoribus quam radix, pollent viribus. Baccæ in Arte tinctoria ad rubrum colorē conficiendum inserviunt. Succus ex radicibus recentibus expressus, Syrupum violarum viridem reddit, & ab omnibus acidis coagulatur; quibus adfusis, acerrima etiam radix maximopere mitescit. GMELIN.

**DRACONTIUM POLYPHYLLUM:** scapo brevissimo; petiolo radicato lacero; foliolis tripartitis; laciniis pinnatifidis.

Spatha longitudinaliter dehiscens, tantum fætorem putridissimi cadaveris spargit, ut olfactientes, adtonitos reddat, & catalepticos; sed quod mirum, cum post aliquot dies farinam ejaculare incipiunt Antheræ, una eadem-

que

que hora intoxicatus iste fætor, totus quantus penitus abolitur. *Hort. clif.* p. 434.

DRACONTIUM FÆTIDUM: foliis subrotundis. *An Bothos potius species?*

Una ex maxime fætentibus plantis ut KALM in suo itin. p. 59. vix florem præ fætore se examinare potuisse afferat; & si paulo magis hunc odorasset, dolores capitis se acquisivisse testetur. Folia, quæ flore jam explicato prodeunt, ab animalibus non attinguntur; ursis exceptis, qui dum e domicilio hyberNALi egrediuntur, plantam hanc avide appetunt. Quod radicem adtinet, hanc Cel. KALM ex relatis Doctoris COLDEN in omnibus casibus, ubi radix Ari maculati, adhiberi posse afferit; ac præcipue in Scorbuto infervire.

CALTA PALUSTRIS: foliis cordatis; spatha plana; spatice undique hermaphrodito. *Oed. Dan.* 422.

De planta hac quid *Illustriſſ. a LINNE'* in sua *Fl. Lapp.* p. 250. habet, referre sufficiet.

„ Omnes fere paludes tegit hæc planta in „ certis Lapponiæ sylvestris tractibus. Radix „ saporis est adurentis, & caustici ignis fere „ instar, attamen mirum dictu, ex ea panem „ confidere docuit homines dura necessitas. -- „ Radices primo vere & antequam folia ex- „ plicantur, vel autumno, aliquot jugera e „ paludibus limofis facillimo negotio extra-

„ hun-

„ huncur, cum supra terram inque limo fere  
 „ fluido crescant, eradicatae lavantur, a fibris  
 „ capillaribus liberantur, in sole vel clybano  
 „ exsiccantur, exsiccatae consinduntur in fru-  
 „ stula magnitudinis pisii, lapide molari in fa-  
 „ rinam conteruntur. Farina haec suaveolens,  
 „ & alba cum aqua pura coquitur per horam  
 „ in consistentiam pultis, seu juscili, deponi-  
 „ tur dein olla cum contento hocce per diem  
 „ unum vel quatuor (quo diutius eo melius)  
 „ aqua supernatans decantatur, residuum ex-  
 „ siccatur acrimonia omni castratum. Haec  
 „ farina miscetur cum farina cerealium, vel  
 „ Pini, & exinde conficitur panis secundum  
 „ artem. Panis hic albus est dulcis, & gra-  
 „ tissimus praesertim recens. Usus hujus pa-  
 „ nis primarius, & receptissimus apud Westro-  
 „ bothnienses, Ostrobothnienses, & Nova-  
 „ colas Lapponiae.

### MONOECIA TETRANDRIA.

**B**UXUS SEMPER VIRENS: MASC. Calyx triphyllus. Petala duo. Germanis rudimentum.

FEM. Calyx quadriphyllus. Petala tria. Styli tres. Capsula trirostris, trilocularis. Semina duo.

Lignum, folia, sed raro, in officinis repe-  
riuntur. Ligni decocto Lues Gallica æque  
cura-