

Herba, flores, semen, in officinis affer-
vantur: Herba, & flores ejusdem cum præce-
denti sunt usus: LOBEL. Semen ad Ischiaticos
affectus utile est; biliosa per alvum purgat.
DIOSC. DALE.

HYPERICUM PERFORATUM: floribus
trigynis; caule ancipiti; foliis obtusis, pellu-
cido punctatis. Antheræ puncto atro. Stigma-
ta sanguinea.

Herba, flores, semen officinalia sunt, &
viribus cum Hyperico Androsæmo omnino
conveniunt: **DALE.** Hippocrates Hypericum
abstergendi, & apperiendi ergo adhibebat. Dari
quoque interne tam vulnerario scopo, quam
aperiente; & hinc Melancholicis commenda-
ri, afferit **SPIELMANNUS.** Galeno ad conso-
lidanda Vulnera, & Ulcera laudabatur.

HYPERICUM CORIS: floribus trigynis;
calycibus ferrato-glandulosis; foliis subverti-
cillatis.

Semina officinas intrant; urinam menses-
que cident: teste **DIOSC. DALE.**

S Y N G E N E S I A P O L Y G A M I A A E Q U A L I S.

LACTUCA SCARIOLA: foliis verticalibus;
carina aculeatis. Folia inferiora runcinata,
obliqua, seu verticalia; caulina superiora,

am.

SYNGENESIA POLYGAMIA AEQUAL. 199

amplexicaulia, sagittata; carina lœvi; margine scabro.

Herba, & semina, quæ officinas intrant, cum subsequenti viribus conveniunt. DALE. Lacte ut et subsequens scatet amaro, quod exsiccatum, rubicundum, inflammabile evadit. *Onom. Botan.*

LACTUCA VIROSA: foliis horizontalibus, corona aculeatis, dentatis. Caulis inferne aculeatus. Folia sagittata, sessilia, margine, & imprimis carina aculeatis. Varietas prioris ex GERARDO, & HALLERO.

Herba, & semina in usum Medicum trahuntur; dolores mitigant DIOSCORIDES. Narcoticam eam esse, & soporiferam; ideo, ut recte observat RAJUS, viribus Papaveri similem; quod fumus ipse Vertigines creans denotat, DIOSCORIDES, & PLINIUS tradiderunt: tum Opii vehemens, & virosus odor, quem planta spirat, abunde id evincit: DALE. Succus ejus inspissatus succi Papaveris locum tenere potest. *Onom. Botan.*

CATANANCHE CÆRULEA: squamis calycinis inferioribus ovatis. Variat flore pleno. Folia cana, fragilia.

Herba officinalis; detrahit bilem pituitosque humores. DIOSC. DALE.

CARTHAMUS TINCTORIVS: foliis ovatis, integris, ferrato-aculeatis.

Nauseosa, luteo-tinctoria planta, Carthami flores, & semina, vi purgante, & diuretica prædita, officinis largitur: à LINNE'. Florum præcipuus usus est tinctorius; semina vi, pituitam viscosam, & aquas vomitu, ac dejectione educendi, gaudent: teste DALE. Multa apud Arabes de seminum Carthami vi alvum ducendi mentio fit: eorum successores, ad unciam unam sub forma emulsionis illa adhibuerunt; hodie prorsus eorum usus evituit: SPIELMANN. Colitur in Ægypto copiosius planta, ubi ter quotannis colliguntur corollæ, quarum magnus in opere tinctorio usus est; quæ insignem mercem Ægyptiis constituunt. Harum corollarum præparandi modus prout FRIDERICUS HASSELQUIST in suo in *Palestinam. itin. parte 2. p. 522. & 523.* reliquit, sequens est.

„ Recentes colliguntur corollæ, collectæ „ inter duo saxa premuntur, ut crudior succus „ exprimatur, qui recipitur; pressæ in aqua „ fontana, quæ in Ægypto salita, lavantur „ plus una vice, quo ipso adhuc succus acris „ restans eliminetur, lavatæ pugillatim aqua „ eximuntur; pugillus quivis manu bene com- „ primitur, & figuram à pressione manus ac- „ ceptam servat. Pugilli compressi supra te- „ cta ædificiorum plana subjectis stragulis arun- „ dinaceis expanduntur, hucusque coloris ci- „ trei; expansi stragulis teguntur die, ne solis „ æstu cito & nimis exsiccentur, nocte nudos

„ re-

digit

purg
lum
infus
rvs
alvus
bland
una,
drop
sin e
quæ
vim

„ relinquunt aeri, & rori expositos. Rore
 „ madefacti colorem mutant ex citreo in rubro
 „ flavescentem (flavum) aere nocturno sub ca-
 „ lido sensim siccantur, quem in finem sem-
 „ per adstantes homines sæpiuscule situm pugil-
 „ lorum mutant, latus inferius aeri exponen-
 „ do & contra; siccati servantur usui mercimo-
 „ nio à Gallis, Venetis, Florentinis, & An-
 „ glis avide coempto sub nomine *Saffranon*.
 „ Folia tenera inter acetaria adhibentur in
 „ Ægypto. Smirnæ in pulverem redacta lacti
 „ recens mulcto immittuntur, ad illud coagu-
 „ landum; qua ratione conficiunt caseum Ægy-
 „ ptii. Psittaci species Æthiopicæ vescitur se-
 „ minibus, quæ reliquis animalibus certo ve-
 „ nenum, illi vero gratissima vesca. ,

EUPATORIUM CANNABINUM: foliis
digitatis.

Radix, & herba officinas intrat: radix
 purgans, emetica, diuretica à LINNE'. Pugil-
 lum unum fibrarum ex radice hujus herbæ in
 infuso cum Vino ipse sibi propinavit GESNE-
 RVS eo cum successu, ut post spatium horulæ
 alvus soluta fuerit cum copiosa urina, sed æque
 blande ac ex Helleboro nigro: radicis uncia
 una, in aquæ unciis octo cocta, valde in Hy-
 drope purgare dicitur; nimia autem dosis eme-
 sin efficit. Folia purgant etiam majori dosi;
 quæ adhucdum satis non est determinata. Ob
 vim ejus purgandi eximiam unica est planta,

202 SYNGENESIA POLYGAMIA AEQUAL.

quam SABATHI in *Flora sua Romana figura* illustravit Amæn. Acad. 7. p. 351.

Ad aperienda viscera abdominalia olim lavabatur; ad resarandos Menses, curandam Hydrozem commendabatur; extus contra Oedemata, & Hydrocelen in usum trahitur; SPIELMANNVS.

SANTOLINA CHAMÆ - CYPARISSUS: pedunculis unifloris; foliis quadrifariam dentatis.

Amara, fragrans, viribus balsamicis, tonicis, pellentibus, diaphoreticis, carminativis, anthelminticis prædita: à LINNÉ.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

TANACETUM VULGARE: foliis bipinnatis, incisis ferratis. Radices calidore æstate prodit.

Amara, luteo-tinctoria, nidorosa, halitiosa planta. Pellente, sudorifera, emenagoga, anthelmintica &c. vi gaudet. Hystericis, Hydrozicis utilis à LINNÉ. Ad vermes maxime laudari, nec non ad morbos uteri; aperiendi etiam scopo nauseofum hoc medicamentum à quibusdam adhiberi; SPIELMANNUS afferit.

ARTEMISIA ABSINTHIUM: foliis compositis, multifidis; floribus subglobosis, pendulis; receptaculo villoso.

Ama-

Amara, nidorosa, halituosa planta; vi antacida, anthelmintica, stomachica, pellente prædita à LINNE'. HIPPOCRATES plantam hanc ad Icterum; GALENUS Hypochondriacis laudat. Febres inde curatas ALBRECHT, Ascitem VOLCKAMER vidit, & ad arcendum Calculum præeunte *Illustriſ*. à LINNE' laudat. Longo usu Podagram avertisse expertus est HALLER, qui & ejus vires ad Icterum, & Hydrozem vidit. EUGALENUS autem antiscorbuticas, ad Vermes necandos nidumque eorum destruendum, non inefficax esse medicamentum, expertus: hæc SPIELMANNUS, qui etiam monet, probe notandum esse, sub ejus usu motum humorum augeri.

ARTEMISIA VULGARIS: foliis pinnatifidis, planis, incisis, subtus tomentosis; racemis simplicibus, recurvatis; florum radio quinquefloro.

Amara planta; uterina, pellens, à LINNE'. Hinc ad mala Virginum, Mulierum, Puerarum ex retentis Menstruis, vel Lochiis laudatur; potu, fotu, infuso: *Cel. de CRANTZ.* Ejus infusi ope Menses per decennium obstrutos curatos fuisse testatur ZACUTUS, SPIELMANNO referente.

Mox ab Orientalibus ad morbos articulorum usitata; non tam ratione Artemisiæ, quam quia cauterium est, operatur: Idem laudatus SPIELMANNUS.

ERIGERON VISCOVUM: pedunculis unifloris, lateralibus; foliis lanceolatis, denticulatis, basi reflexis; calycibus squarosis; corollis radiatis. *Mant.* 468. *Virga aurea major*, foliis glutinosis graveolentibus. *Tournef. inst.* 580. *Vaill. act.* 579. Pedunculi diphilli, uniflori, vix foliis longiores. Flores radiati.

Folia olim officinalia erant: suffitu venenatas planta bestias fugat, culices abigit, pulices necat: **Diosc.** **DALE.** Acris, & narcotica planta capras, quæ hanc comedunt, interimit. *Onom. Botan.*

ERIGERON GRAVEOLENS: foliis sublinearibus, integerrimis; ramis lateralibus, multifloris; *Mant.* 468. Flores radiati.

Herba quæ itidem officinalis est, viribus cum precedenti convenit. **DALE.**

ASTER TRIPOLIUM: foliis lanceolatis, integerrimis, carnosis, glabris; ramis inæqualibus; floribus corymbosis.

Radix ab Antiquis in usum medicum trahebatur in vino pota ad drachmarum duarum pondus; aquam per alvum extrahit urinasque dicit. **Diosc.** **DALE.**

INULA HELENIUM: foliis amplexicaulibus, ovatis, rugosis, subtus tomentosis; calycum squamis ovatis.

Radix acris, aromatica, alexiteria, sudorifera, pellens; eximia vi incidendi glutinosa, & stimulandi solida, pollet. In Astmate, Fluore

SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERF. 205

re albo, morbis Ventriculi, Cutis, valet: *Cel.*
de CRANTZ, qui etiam refert in Tremore a Mer-
curialibus relicto etiam prodesse. Pulvis radi-
cis hujus prunis injectus, pulices, muscas abigit:
à *LINNE*. In Hypochondriacis affectionibus
quoque laudatur.

INULA DYSENTERICA: foliis amplexi-
caulibus, cordato-oblongis; caule villoso, pa-
niculato; squamis calycinis setaceis. *Oed. dan.*

410.

Folia Ictericos juvant, Menes trahunt,
Stranguriam solvunt *SCHW.* Decoction herbæ
ad urinam ciendam a Vulgo commendatur. In
officinis Anglicis male substituitur *Arnicæ*: **BUX-**
BAUM. DALE.

INULA PULICARIA: foliis amplexicauli-
bus, undulatis; caule prostrato: foliis subglo-
bosis; radio brevissimo.

Herba ab Antiquis officinalibus adnumeraba-
tur; aperiens, penetrans, extergens, cerebrum
purgans, pituitam a capite eliciens, sternutato-
ria, pulices necans, *SCHW. DALE.*

ARNICA MONTANA: foliis ovatis, inte-
gris; caulinis geminis, oppositis. *Oed. dan.*
t. 53.

Arnicæ herba, & flores in officinis asser-
vantur; nauseosa, virosa planta, Vomitus, Car-
dialgiam, cum periculo movet, *Breslavienses*:
etiam valentioribus *GMELIN. Fl. Sib.* Satura-
tius infusum dolores acerbissimos facit, oleosis

206 SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERF.

vix domandos; ut in se ipso expertus COHAU-
SEN: videatur de hac BRUCKNER Select. Med.
Francof. t. 1. & Libellus Cel. COLLIN.

Vires narcoticas, diureticas, emenagogas,
errhinas, à LINNE plantæ huic tribuit.

Primus FEHR ejus insignes vires in effusis
aut stagnantibus humoribus non paucis observa-
tionibus probavit; quibus plurima nova aliorum
accessere. Uſus hujus etiam in Arte Veterina-
ria notus in contusionibus; licet planta hæc plu-
ribus sputum sanguinis caufet animalibus. *Onom.*
Botan.

DORONICUM PARDALIANCHES: foliis
cordatis, obtusis, denticulatis; radicalibus pe-
tiolatis; caulinis amplexi caulibus. Semina ra-
dii nuda. Caulis ramosus.

Licet MARANTÆ figmentum à MATTTHIO-
LO sustentatum, hanc plantam esse Aconi
Pardalianches Veterum effecerit; ut plu-
ctores radices has venenatas justo magis repu-
taverint; quod falsum commentum experimento
SPIELMANNO teste, in se ipso facto refutavit
GESNERUS; nihil tamen obest, quin planta
hæc, licet non ut dirum venenum, saltem ut
subvenenata vi Arnicæ prædita, cum LINNÆO
consideretur. Radix in officinas Pharmaceuti-
cas recipitur; quæ ut calefaciens, Tumores
discutiens, à SCHRÖDERO laudatur. Vires me-
dicatæ, diversæ plantæ huic adscriptæ, cum
nulla observatione sint confirmatæ, hodie evi-
luerunt.

SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERF. 107

luerunt. Flores Ceræ materiem apibus suppeditant.

TAGETES PATULA: caule subdiviso, patulo.

MORISSON *Hist. Oxon.* 3. p. 16. sequentia de hac planta habet.

„ Chrysanthemum, quod flos Africanus
„ dicitur, deleteria facultate esse præditum,
„ succus ostendit & caput gravans odor. Deleterias has vires DODONÆUS *pempt.* p. 255.

„ & 256. experimentis confirmat. „ Memini,
„ inquit, in puerō, qui flores mandere incep-
„ perat, labia, & os inflata me vidisse, sicuti
„ crebro iis accidit, qui Cicutæ fistulis luden-
„ tes, aut modulantes, intra labia eas aliquam-
„ diu continuerunt, feli etiam flores cum cali-
„ culis recenti caseo permistos, dedimus; quæ
„ mox valde inflata, & paulo post mortua fuit;
„ mures quoque, qui semen arroserant, mor-
„ tui fuerunt reperti. „ Quæ omnia venenatissimam & deleteriam hujus herbæ facultatem
ostendunt.

MATRICARIA PARTHENIUM: foliis
compositis planis; foliolis ovatis, incisis; pe-
dunculis ramosis.

Amara, nidorosa, halituosa planta; ano-
dyna, emenagoga, lactifuga vi prædita à LIN-
NE'. Ictero dicata fuit; menses etiam evo-
cat, uterus purgat, dolores à partu sopit, po-
tu, fotu, clysmate: *Cel. de CRANTZ.* Praeter

recen-

recensitas vero jam virtutes, quas planta possidet, purgat per urinam nonnunquam, & per alvum: **DALE.**

Folia & flores in officinis prostant.

Ruricolæ in animalium etiam morbis hac planta utuntur, præcipue in difficii respiratione, nausea, difficii malaque digestione. *Onom. Botan.*

ACHILLEA PTARMICA: foliis lanceolatis acuminatis, argutè ferratis.

Folia in officinis usu veniunt, gustu acri, fervido; pulvis horum naribus adtractus, Sternutamenta movet à **LINNE'**.

Radicis acrimonia vel odore percipitur; gustatata amari, fervidi saporis est; & mansa salivam provocat; olim in doloribus dentium laudabatur. Flores æque ac folia intra digitos contriti, vel in pulverem redacti, errhinæ sunt naturæ.

ACHILLEA MILLEFOLIUM: foliis bipinnatis, nudis; laciis linearibus, dentatis, caulis superne fulcatis.

Narcotica planta, inebrians, tonica, evacuationes fistens, in officinis invenitur à **LINNE'**. Hæc cum Humulo cerevisiæ injecta, reddit Cerevisiam inebriantem, & potatores fere insanos, *Fl. suec. 2. n. 770. Amen. Acad.*

6. p. 175. Oleum destillatum florum coloris saphirini, sedans, antispasmodicum est; infusum florum in Spasmis, Doloribus post partum,

Dolo-

SYNGENESIA POLYG. SUPERFL. 209

Doloribus Cardialgicis, Colicis hæmorrhoidalibus utile; in sanguinis ejectionibus, Hæmorrhagiis majoribus, spasticis viscerum contractiōibus, eximum: **HOFFMANNUS** de *Præstant.* *Med. domeſt.* hæc *Cel. de CRANTZ.* **SPIELMANNUS** vero herbam olim ad pestem præcavendam, *Celebrem KOELICHEN* testem refert: tum **STAHL,** & **HOFFMANNI** auctoritate, valde ad Obstructiones viscerum abdominalium, & inde oriundos motus præternaturales spondos, fuisse commendatam. **IDEM** laudatus **HOFFMANNUS** per longum usum infusi ex Millefolio parati, non paucos ab affectione calcu-losa, cui diutius obnoxii fuerunt, liberatos vidiit, teste **SPIELMANNO.**

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

HELIANTHUS ANNUUS: foliis omnibus cordatis, trinervatis; pedunculis incrassatis; floribus cernuis.

Traumatica planta; hujus semina oblonga, tumidiuscula, & nonnihil compressa, cocta ad Venerem stimulant, & liberalius devorata, capitidis dolorem excitant. **DALE.**

CENTAUREA BENEDICTA: calycibus duplicito-spinosis, lanatis, involucratis; foliis semi-decurrentibus, denticulato-spinosis.

O

Ama-

210 SYNGENESIA POLYG. FRUSTR.

Amarissima planta; balsamica, antacida, tonica, pellens, purgans, sudorifera, diuretica, subemetica à LINNE'. In decocto calido scopo sudorifero planta exhibetur; hoc in Pestle recommendat PALMARIUS, addito aceto; pulvis languenti ventriculo exhibetur; succus subemeticus unciæ unius, duarum dosi, decocto, vel aqua stillatitia dilutus, Febris intermittentibus, Viscerum obstructionibus, Ictero, utilis. *Cel. de CRANTZ.*

CALENDULA OFFICINALIS: seminibus cymbiformibus, muricatis, incurvatis omnibus.

Amara, subnarcotica planta; pellentes, emenagogas, sudoriferas, exanthematicas vires possidet: à LINNE'.

Folia; & flores in officinis asservantur; flores sudores movent, Variolas expellunt, Ictero medentur, Menses cient, partus promovent. **DALE.** Succus expressus plantæ vesicas cuti applicatus excitat, Verrucas tollit. *Onom. Botan.*

ECHINOPS SPHAEROCEPHALUS: capitulis globosis; foliis sinuatis, pubescentibus.

Radix semenque plantæ hujus olim in officinis occurrebat; hanc potam copiosum sanguinem per nares pellere, & lienosos evidenter adjuvare; semen vero urinam ciere *Diosc.* reliquit. **DALE.**

ECHI-

SYNGENESIA POLYG. FRUSTR. 211

ECHINOPS RITRO : capitulo globoſo; foliis pinnatifidis, ſupra glabris.

Radix viribus cum prima convenit. DALE.

ECHINOPS STRIGOSUS : capitulis fati- culatis; calycibus lateralibus, ſterilibus; foliis ſupra ſtrigofis.

Radix Cœliacis efficax eſt; urinam ciet; decocta dentium dolori prodeſt. DALE.

LOBELIA LONGIFLORA : foliis lanceo- latis, dentatis; pedunculis breviffimis, latera- libus; tubo corollæ filiformi longiffimo Jacq. Americ. 219. t. 27. Mant. 482. Succus cor- roſivus.

Interne Hypercartharſin creat, nullis reme- diis cedentem tandemque lethalem. Cel. Pro- fessor de JACQUIN Hist. Americ. Stirp. p. 220. ubi etiam ſequentia adjungit. „ Succo ejus in- „ fecta manus, ſi oculos fricat labrave, in- „flammationem inducit urentem, cuius incius „ feci experimentum. Equus hanc ſi comedit, „ rumpi medius fertur, unde nomen apud Hi- „ spanos fortita eſt, Rebenta cavallos, id eſt „ equorum disruptor.

M O N O G A M I A.

LOBELIA SIPHILITICA : caule erecto; foliis ovato-lanceolatis, subferratis; calycum ſinubus reflexis. Mant. 482.

Lobeliae hujus radix in officinis Pharmaceuticis invenitur; acris, nauseosa, lactescens, pellens, emetica, purgans à LINNÉ. Saporem Nicotianæ habet, quem degustata diu linguæ impressum relinquit vomitusque excitat. *Onom.* *Botan.* Ubi etiam describitur methodus exhibendi plantam in morbis Venereis ab Americanis usitatissima, quam hic leviter adjungam. Fit nimis inde cum aqua potio vehementer purgans, etiam vomitus creans; quæ si justo fortior sit, mortem etiam inducere potest. In hunc finem accipiuntur quatuor, sex, vel & plures radices siccæ, vel recentes, cum aqua decoquuntur, decoctum ægro statim ac evigilat mane hauriendum propinatur; quantitas non determinatur, sed tantum eibere debet, quantum valet; reliquum per decursum diei assumendo. Si vehementer alvum potio hæc ducere observetur, tunc dein minus saturata fieri debet. Quod diætam ægri attinet, hæc in simplicibus consistat, oportet; a spirituoso forte que potu abstineat est necesse. Tertio die præter internum usum abluendæ sunt eodem decocto etiam partes externæ, malo hoc maxime adfectæ, idque indies repetendum. Sic progrediendo cura ægri in spatio duarum triumque septimanarum perficitur &c. Curam hanc Mercuriali cura securiorem, & feliciorem afferit CALM. *Onom.* *Botan.* Verum & hoc medicamentum evacuando tantum curare *Illustriſſ.*

L.

L. VAN SWIETEN Tom. V. pag. 576. refert.

VIOLA ODORATA: acaulis; foliis cordatis; stolonibus reptantibus. *Oed. Dan. 309.*
Mant. 483.

Radix an purgans? an emetica?
Semina diuretica, emetica: à LINNÉ, de CRANTZ.

VIOLA IPECACUANHA: foliis ovalibus, margine subtusque pilosis. *Viola grandiflora*, *Veronicæ folio villoso*. *Barr. æquin. 113.*
an satis diversa à *Viola diandra*.

Ipecacuanhæ radix in officinis notissima, vix aliquot pollices longa, linea vix crassior, varie flexa, substantia extus nigricante, grysea, intus albissima instructa, in rugas circulares efformata, quæ nervum filiformem, lævissimum, luteum ambunt, ad saporem salinum accedit. SPIELMANN.

Radix hæc familiare, & tutum est emeticum; cocta parum purgat, quæ, magis si coquatur, diuretica, sudorifera, emenagogæ evadit: DALE, à LINNE', de CRANTZ.

Primus PISO radicis hujus mentionem fecit. GRAS Medicus anno 1672. ejusdem aliquid in Europam adduxit; circa annum vero 1690. quidam mercator magnam quantitatem harum radicum Parisios advexit, effecitque apud Ludovicum XIV. ut experimenta in Nosocomiis copiose cum hac radice jussu Regio insti-

tuantur. A principio, medicamenti dosis Ludovico aureo vendebatur. SPIELMANNUS, ubi plura de hac radice videri possunt, uti & apud *Cel. de CRANTZ*.

IMPATIENS NOLITANGERE: pedunculis multifloris, solitariis; foliis ovatis; geniculis caulinis tumentibus. *Oed. Dan.* 588.

Herba olim officinas pharmaceuticas intrabat; vi diuretica insigni pollet, ut Diabetem etiam inducat. Hanc facultate perniciofa, & deleteria scatere, refert DODONÆUS, DALEGUERIN loc. cit. pag. 58. nullo exemplo quantum novit, hanc noxiam invenit.

G Y N A N D R I A D I A N D R I A.

SERAPIAS LATIFOLIA: bulbis fibrosis; foliis ovatis, amplexicaulibus; flor. pendulis *Fl. Suec.* 819. Serapias bulbis fibrosis, nectarii labio obtuso, crenato, petalis æquali; fructibus pendulis. *Huds. angl.* 341. Serapias bulbis fibrosis; floribus secundis, labello planiusculo, petalis ovatis. *Scop. carn.* 155. Serapius bulbis fibrosis, caule multifloro, floribus spicatis, nectarii labio petalis breviore. *Ger. prov.* 132. Epipactis foliis amplexi caulis ovato-lanceolatis, labello lanceolato *Hall. flor.* 40. *Act. Helv.* 4. p. 102. Epipactis seu Helleborine *Cum. epit.* 187. *Riv. Lex.* 1. 6. Hellebori-