


177
IUS
16
177

Dv 2513

UNIVERSITÄTS- und
Landesbibliothek
Düsseldorf

V 2655





Amstelodami,
Ex officina Petri vanden Berge, in vico (vulgo)
de Blacueburgwal, sub signo montis Parnassi.
1668

Meaus, Franz

80 714960 c

LB. 137 610

M.R.O. -

DE RECTA
CURANDORUM
VULNERUM.
RATIONE,
ET

Aliis ejus artis præceptis libri II.
FRANCISCO ARCÆO
*Fraxinalensi, Doctore Medico &
Chirurgo, auctore.*

EJUSDEM
De febrium curandarum ratione.



AMSTELODAMI,

Ex officina PETRI vanden BERGE, in vico (vulgo)
de Blauweburgwal/ sub signo montis Parnassi.
A^o. 1658.

DI. RECTA
GERANDORUM
VULNERUM
RATIONE.

ET
Alia vna ad praeparandum II.
FRANCISCO ARCEO
Farrinaus, Delineator &
Chirurgus, auctor.
Lipsiam
De Sebastiani Kriegermanni typographo.



A. M. D. C. L. X. V. I.
Ex Officina Typographicae Sebastiani Kriegermanni
in Spandeburgensi, sub signo Crucis Iohannis
No. 104.

BENEDICTI
ARIÆ MONTANI

Hispalensis in
FRANCISCI ARCÆI
Fraxinalensis libros de utraque
Medicinæ praxi.

P R Æ F A T I O .



*D*uo mihi juniore in Me-
dicinæ disciplina præ-
cipuè contigere præce-
ptores, gravissimi ambo
ac doctissimi, optimique viri : alter
Petrus Mena , qui , cùm Compluti
eam Philosophiæ partem summa
cum laude professus diu fuisset , in
Philippi Catholici Regis familiam
postea venit , atque in illa aula ma-
gna ægrotantium utilitate versatus
diem suum ex calculi morbo obiit ,
cum grandior jam ætate esset , ne-
que

P R Æ F A T I O .

que se chirurgo sciendum com-
mittere præ imbecillitate posset. Is
præclara ingenij ac judicij sui mo-
numenta reliquit , quorum bona
pars in lucem jam prædiit , reliqua ,
ut spero , propediem est proditura.
Ille cùm sæpe mecum de ea medi-
cinæ parte ageret , quæ , quòd in
vulneribus , ulceribus , luxatis , dis-
tortis ac fractis membris curandis
versatur , manuumque dexteritate
¶ officio præcipuè utitur , à Græcis
chirurgia dicta est (ut certissima ac
totius artis tutissima , sic etiam
quondam præstantissima habita , at-
que à maximis viris exculta ; nunc
verò imperitia ¶ ignobilitate o-
mnium ferè utentium abjectissima
ac tantum non extincta penitus)
nunquam cessabat mihi summope-
rè commendare , ac miris laudibus
præ-

P R Æ F A T I O .

prædicare Francisci Arcæi Docto-
ris Medici Hispani in omni artis
huius parte dexteritatem ac felici-
tatem admirabilem , sed in chirur-
giæ præcipuè exercitatione atque
usu obstupendam quandam præ-
stantiam ; eum autem ut mihi præ-
ceptorem conciliare studerem suade-
bat, si cognoscere animus esset, quid
quantumque illa Medicinæ parte
effici posset. Cùm autem annos jam
triginta duos natus in rupis meæ
Aracenensis agri secessu essem , ac-
cidit ut à magni & illustris in po-
strema ac Lusitanicæ finitima Bethi-
cæ parte siti oppidi (cui Llerina no-
men est) magistratu , atque à pro-
vinciæ illius gubernatore, præcipuè
verò ab inquisitionis patribus , qui
tribunal ibidem habent , sacri verbi
populo per Quadragesimæ tempus

P R Æ F A T I O .

enuntiandi & exponendi causa per eundem Franciscum Arcæum jam aliàs mihi puero notissimum & paternæ consuetudinis necessitudine penè conjunctissimum legatum ad eam rem missum advocarer. Cui petitioni ego libenter concessi, propter summam muneris, quod Deo gratum fore sperabam, honestatem, propter eorum, à quibus abvocabar, auctoritatem, atque adedò propter magnam meam erga legatum ipsum voluntatem: qui suam mihi domum ad hospitij usum ultrò obtulit, & chirurgiæ artem, qua ipse uteretur, per loci ac temporis opportunitatem communicaturum sese pollicitus est. utranque igitur conditionem libentissimè accepi, atque habui per menses quatuor ferè perpetuos suavissimis moribus ac ser-

PRÆFATIO

sermonibus hospitem doctissimum-
que chirurgiæ artis magistrum; à
quo non tantum illius disciplinæ
præceptis & institutis instructus,
verum assiduis & frequentibus
curationum exemplis auctus con-
firmatusque fui, quorum variam
& exactam rationem longissimum
esset recensere. Huic viro eodem
illo tempore cum gratior esse in-
dies mihi viderer, auctor fui, ut
suam illam vulnerum & quorun-
dam difficillimorum morborum
curandi rationem vel breviter,
dilucidè tamen, describeret, at-
que ad humani generis usum in
lucem ederet: quoniam illius in
hac parte diligentiam & officium
à compluribus doctissimis viris,
præcipuè verò à Mena meo pu-
blicæ utilitatis cum primis stu-
dio-

PRÆFATIO.

dioſo, poſtulari intelligebam. Ille autem quamvis plurimis ac frequentibus per omnem illam provinciam curationibus occupatiſſimus eſſet; tamen quòd pietate per omnem vitam maximè ducatur, (utpote qui in curandis innumeris pauperibus, in quorum ſumptus pecuniam etiam ſuam impendit, magnam diligentiae ac temporis partem ponit) ſucceſſivis horis in ipſis aliquando itineribus, nonnunquam domi duo volumina conſcripſit; quorum altero chirurgiae, quae vulnera atque ulcera curat, & morbi gallici præſtantiſſimam curandi methodum & apertiſſimam tradit, adeo ut ad manifeſtas demonſtrationes illam medicinae partem redegiſſe videatur. altero verò februum genera omnia, & quosdam diffi-

P R A E F A T I O .

difficillimos morbos ut ptisim , quemadmodum ipse rectè expediteque curare soleat , docet: utrumque nobis in Hispania perlectum , ac doctissimis medicis Hispanis, Italis & Belgis ostensum vehementerque probatum Christophoro Plantino nostro studioforum omnium amicissimo ac publicæ literariæ rei studiosissimo prælis suis mandandum tradidimus. Ut autem opus non sine digno ornamento , quanquam genio ipso suo ornatissimum esset , tamen cultius prodiret in publicum , voluit doctissimus ac mihi suavissimus amicus Alvarus Nonnius Hispanus , qui Antverpiæ literarum ac disciplinarum variarum studiis ingeniosissimam dat operam , ac medicinam magno cum ægrotantium usu exercet , alteram partem , chirurgicam

* 6

vide-

P R Æ F A T I O .

videlicet, brevibus atque eruditis annotationibus illustrare, ut ostenderet quàm aptè, quamque diligenter antiquorum medicorum doctrinam Arcæus noster persequatur, quod quibusdam in Hispania medicis persuaderi vix poterat, qui curationum ab illo factarum miraculis turbati, dicere solent vulgatam & communem curandi viam ab ipso negligi, aliamque novam à se inventam muniri, cum tamen ille summa modestia profiteatur se observatissimis antiquorum vestigiis insistere, quæ ab imperitorum turba perturbata atque obscurata jamdiu fuere. Unum autem illud est, quod Arcæum sæpe conquestum audivi, pessimè & artis dignitati & publicæ sanitati nostræ ætatis medicos consuluisse, qui hanc nobilissimam

P R Æ F A T I O .

*mam pariter atque certissimam me-
 dicinæ partem vel fastidientes vel
 negligentes, & manuum exercen-
 darum laborem declinantes, ad
 empiricos, atque adedò ad ineptissi-
 mos tonsores relegaverint, passique
 fuerint libros à recentioribus au-
 ctoribus de hac disciplina conscri-
 tos in vulgares linguas perverti,
 magis quàm converti. Quamo-
 brem ille me frequenter per episto-
 las absentem rogavit obtestatus-
 que est, ut quam religiosissimè pos-
 sem, ipsius nomine principes o-
 mnes, rerum publicarum magistra-
 tus, academiarum præsides ac do-
 ctos & publicæ utilitatis amato-
 res cunctos obsecrarem, ne unquam
 hos à se Latine editos libros in vul-
 gares linguas verti paterentur,
 quos ad imperitorum atque tonso-
 rum*

P R Æ F A T I O .

rum manus deferri ipse minimè
velit , sed à peritis hanc artem bello
ac pace utilem exerceri , vel ab ijs,
qui manus exercitatas habent , pe-
ritorum præsentia iudicio & consi-
lio expediri. Vivit adhuc hoc tem-
pore Franciscus Arcæus , annum
agens ferè octogesimum , eademque
dexteritate utramque Medicinæ
partem facit , ac si quadragesimum
ætatis nondum excessisset : à quo
librum utilissimum expectamus va-
riorum tum instrumentorum , tum
medicamentorum quæ summo cum
utilitatis fructu per ipsum excogita-
ta sunt. Horum autem librorum ,
quos nos publici commodi quo ma-
ximè tenemur studio scribendos
edendosque curabamus , doctrinam
quisquis diligenter observaverit ,
magnum , ut nobis frequenti exem-
pto

P R Æ F A T I O .

plo persuasimus, & sibi & hominum sanitati procurandæ operæ precium certissimè faciet. Antverpiæ x. Kalend. Majas, Anno M. D. LXXIII.

A D

A D
BENEDICTUM
ARIAM MONTANUM
Theologum celeberrimum.

ALVARUS NONNIUS.



Iuxta veterem Stoicorum sententiam homines hominū causa sint generati (doctissime Aria) quicunque de communi hominum salute, magis indies, commerentur, hi proculdubio, omnium maximi simul, & optimi sunt habendi. Quod quidem cū variis disciplinis præstari possit, nulla certè plenius, quàm medendi ratione id fit, adeò ut studiosos hæc ars, aut immortales reddiderit, aut æternæ consecraverit
me-

memoriæ. In hoc albo cum sit
Arcæus tuus, atque unus qui
hanc artem colendo, exercen-
doq; tantum nominis sui splen-
dorem apud suos compararit,
quantum vivus nemo: quid cre-
dis suæ celebritati accessurum,
si quæ ipse manibus inter rudes
exercuit, calamo, scriptoque
doctis testetur? Certè sublimi
(ut ille ait) feriet sydera verti-
ce. Quæ quidem gloria, indu-
stria tanta, tanta diligentia, la-
bore & incredibili solertia par-
ta, nisi per te in lucem prodeat,
unà cum suo auctore langue-
bit, ac oblivione peribit. evulga
itaque, quæ nescit chirurgorum
vulgus, ac tam salutaria reme-
dia clam apud te esse noli; ne
tu minus in communicando
promptus, quàm ille in opem
ferendo

ferendo alacris esse videre : &
ne videar frustra abs te hoc pe-
tere , sed optimo jure poscere ;
ita equidem sentio , vulnerum
librum ita esse utilem , ut neces-
sarium illum existimem : ete-
nim non solum ea docet , quæ
cum multis mendarum & erro-
rum portentis , incultè & impe-
ritè à Barbaris scripta sunt : ve-
rum ita nostrorum chirurgor-
um inscitiam refellit , ut mor-
tales ab illorum tyrannide
(quos Galenus rectè latronibus
comparat) vindicasse mihi vi-
deatur. Præterea aliqua discet
nostra ætas , quæ aut nescivit
antiquitas , aut pro deplorato
reliquit ; feliciter , & methodo
facili curare ; idque remediis à
se multa exercitatione , & judi-
cio comparatis , aut petitis ex ,
Hip-

Hippocratis, & Galeni fontibus.

Ordo vero quanquam ita adamussim observatus non sit, ob assiduam artis actionem, & ægrorum curam; magna tamen artis complexione commendatur: nam *Μάλυσσις* est perpetua, qua vulnera in suas differentias (ut ita dicam) genericas dividuntur; ac in simplicia & composita in suas veluti fibras finduntur. Præfagia deinceps cujusque propria notantur: postremò curandi methodus particularis subnectitur. Quo sanè ordine vix alius (meo iudicio) statui, aut excogitari melior potuisset. Sequitur hoc caput; capitis vulnus: hoc enim ob periculi magnitudinem, & præstantiam partis primò sese offert.

offert. Post hoc, ea vulnera,
quæ in utroque ventre acci-
piuntur, in supremo videlicet
& imo, ita exponuntur, ut de-
siderari, neque ad cognitio-
nem periculi, neque ad sana-
tionem, possit nihil: cætera
verò, quæ in aliis ab his parti-
bus infliguntur, vel sub simpli-
ci vulnere complexa sunt, vel
tanquam nimis facilia ab aucto-
re contemnuntur, partium sin-
gularum affectarum tempera-
turam, situm, connexum, sub-
stantiam, figuram actionem,
usum tradit appendice quadam
medica huic libro adjecta, quæ
hoc habet singulare: ferè nul-
lum circa vulnus symptoma
occurrere posse, cujus non
expedita hinc, facilisque elici
curatio possit. Verum ad chi-
rur-

rurgiam revertor : in qua abso-
lutis vulneribus, ulcera curan-
da proponuntur, unico dun-
taxat capite comprehensa. at-
que hic admonendum existi-
mo, totum caput *ἱατρικὴ*
esse, & veluti ex pugillaribus ad
memoriæ subsidium de prom-
ptum : quo pacto plerique Hip-
pocratis libri circumferuntur.
Quamobrem, nec omnia defi-
nita sunt, nec ulla est circum-
scripta methodus, ubique verò
perfecta elucet curatio Verùm
hæc brevitatis pulcherrima mor-
bi Gallici curatione compensa-
tur : in qua illud est insigne ;
quòd falsæ parrilliæ verum de-
coquendi modum, à nemine
traditum ostendat. Quæ qui-
dem omnia, brevi scholio in
singula capita declarata sunt,
cate-


cæterum quo inceperat, eo
terminabitur epistola, facturum
te rem tuis moribus dignam, si,
qui vitæ sanctitate, & sapientia,
aliis exemplo es; hac etiam li-
beralitate mortales adjuves.

Vale.

FRAN.

F

De



utr
ass
ten
tro
stu
&
tun
nen
lib
der
tur
run
&
fist

FRANCISCI ARCAEI
FRAXINALENSIS

Doctoris Medici & Chirurgi, de
recta curandorum vulnerum ra-
tione, & aliis ejus artis præceptis
libri duo.

EX LONGO atque assi-
duo curandi usu multa-
rum, neque tamen vulga-
rium rerum peritiam in
utraque medicinæ parte Dei beneficio
assecutus, & propriam, curationis ar-
tem, & præstantissima quædam in u-
troque genere remedia publicæ utilitatis
studio conscribere in animo statui meo:
& quorundam etiam tum morborum,
tum vulnerum atque ulcerum curatio-
nem addere, quæ in antiquis medicorum
libris, aut desperata prorsus, aut desi-
derata hæctenus fuerant. Continent igitur
libelli nostri, præter omnia recentio-
rum vulnerum genera & nova etiam
& antiqua ulcera, atque ea quæ vulgo
fistulæ in pectore appellantur, quorum
quæ

quæ in usu est curatio, phtbificas ple-
rumque, interdum verò in hecticis fe-
bres & agrotationes eos qui hujusmodi
patiuntur protrudit: quarum nos certam
atque saluberrimam curandi methodum
operè hoc Deo duce docebimus: idem &
in altero de medicina opusculo facturi,
quod ex multorum morborum desperata
hactenus, nunc verò proposita curatione
commendabile fore speramus. Hæc verò
curandi ratio atque hic ordo à nobis ob-
servabitur, ut à capite ad pedes usque
de vulnerum omnium generibus, &
quis brevissimus unicuique curandi mo-
dus, quæ remedia aptissima comperta
fuerint, ostendamus.



D E

D E

I D
inc
fac
ni
ve

N

quam
scripsi
cum p
quæ b
quant
Deo
inveni
nerunt
atque
genus
aliis a
mentis
quæ v
aut fax
tur. qu
nem d
quæda
alta fig

DE VULNERIBUS
IN CAPITE TAM EX

incisione quàm ex contusione
factis, quæ tamen ultra pericranium
sive almocati non penetraverint.

CAP. I.

Nemo profectò ex auctoribus
iis qui nostra ætate curandorum
vulnerum rationem docuere,
aut melius aut plenius quam
Joannes Vigensis iudicio nostro
scripsit: cujus nos & doctrinam &
artem cum primis probantes,
nonnulla tamen quæ brevius &
certius expediri possint, quantum
diligenti studio, longo usu,
Deo id præstante, hujus &
aliorum inventis addere conabimur.
Igitur vulnere in capite ut varia
ratio, sic alia atque alia curatio
est. Vnum namque genus eorum,
quæ vel gladio vel aliis ad
scindendum comparatis instrumentis
sunt. Alterum verò, eorum est,
quæ vel fuste, vel malleo, vel conto,
aut saxo, aut alio denique casu
accipiuntur. quod genus in
vniuersum contusionem dicimus.
Ex his quædam majora, quædam
verò minora sunt, atque alii
alta figuris habitudinibusque
notantur;

A

quæ

ple-
fe-
nodi
tam
lum
&
ri,
ata
ione
verò
ob-
que
&
mo-
erta

E

2 DE CURAN. VULNER.

Indocti
chirurgi
aliquan-
do fal-
sam opi-
nionem
habent.

Cum
Cra-
nium de-
teganr.

quæ tamen omnia ultra pericranium non pertingunt : atque ad hujusmodi curanda vulnera vel tonfores vel chirurgi plerunque indocti accersiri solent : quibus illud in primis commune omnibus ferè est, ut vulnera omnia, quæcunque in capite fiunt, magna crucis figura incisa, adaperiant, & (ut illorum verbo utar) manifestent ; atque cranium ipsum detegant. Deinde vulnus omne id quod ab ipsis factum est, intinctis ovorum albo stupis & lychnis consistipent, perinde quasi capitis os vel fractum vel incisum fuisset. Hujus verò erroris causa est commune quoddam apud illos nullo certo illustri auctore præceptum, quo vulnera capitis universa manifestari atque aperiri oportere tradunt ; ut in secunda curatione ; an capitis os fractum incisumve fuerit, cognoscatur. Ex quo istorum errore multi iis qui sic affecti sunt, afferuntur incommoda. Imprimis enim curationem tardio rem ac longiorem effici necesse est. Namque secundum artem, curata octavo vel ad summum decimo die bene haberent, quamvis quantitate magna essent. Contra isti vix altero vel tertio interdum mense curant, cujus etiam vitii Galenus Thessalum arguebat 4. methodi. Præterea vulnus ad cranium usque ape-

aperientes, agrotum ipsum in summum
vitæ discrimen non rarò conjiciunt :
quippe non exiguam ossis partem aëre
frigido tentante corruptam extrahi hoc
modo curatis necesse sit : quod quidem
os neque corruptum aliàs, nec incisum
fuerat. Namque eam in omni humani
corporis osse superficiei partem, quam
aër attingit, corrumpi necesse est. Nec
rarò evenit, ut non superficies modò,
sed ipsum os totum secundum crassitu-
dinem corrumpatur, ultra id, quod à
circum ambiente aëre tentatum fuerat :
accedit enim ad aëris incommoditatem
illa digestivorum ac varii generis olei
copia quam adhibent, cum ab ipsis an-
concocta vulnera sint, necne, prorsus
ignoretur. Quam quidem ob rem nos ut
tantæ prolixitati totque incommodis oc-
curamus, curandi rationem doctissimis
antiquorum & nostri temporis Chirur-
gis probatam subjungemus : addito me-
dicamento quodam à nemine hætenus
tradito, cujus admirabilem efficaciam
experiri cuilibet licebit. Atque primum
quidem omnium de vulneribus simpli-
cibus quæ scindentibus fieri solent in-
strumentis, ut gladio, pugione, &
similibus : deinde de altero genere dis-
feremus.

Igitur an capitis os fractum, an inci-
sum

4 DE CURAN. VULNER.

sum sit, ut non incerta coniectura dignoscamus, is qui vulnus habet, imprimis rogandus est, quonam instrumento sit vulneratus; num simul ut acceperit, in terram corruerit, an mente fuerit commotus. Quod si ad cranium vulnus non pertinuerit, tonsis primùm circumiacentibus capillis, caro carni, cutis cuti, quàm fieri possit aptissimè, committenda est.

Id si citra acus usum fieri possit, fuerit profectò commodissimum. Quod si longitudine magnum vulnus fuerit, aut acu uti oportebit. aut filo tantum longiori vulnus est alligandum, modò id loci ac situs commoditas admittat, idque fiet vulneris ipsius labris aptissimè conjunctis. Atque hæc profectò alligandi forma in omni vulnerum generè, ubi commodè exerceri possit, mihi vehementer probatur.

Namque diductæ carnis labra & partes hoc modo melius cohærent. Hoc ubi expeditum fuerit, si vulnus grandiusculum sit. in partem illius inferiorem flammula *ex tenui lino* ovi albo intincta inferatur instrumento illo quod tenta vulgo dicitur, additis super vulnus lineis peciis duplicibus ovi albo similiter intinctis, deinde vulnus non plurimis fortum pannis alligetur, atque ita usque ad sequen-

sequentem diem sinatur. Neque verò in tertium diem, ut mendosè à nonnullis fit, curationem differri tutum est. In secunda verò curatione neque digestivis ullis, neque rosaceo opus est, qualia vulgò in usu esse solent: magis enim nocuisse quàm profuisse, diuturna ac certa observatione nobis est compertum. Neque verò ad hoc solùm, sed ad omnia etiam genera hujusmodi digestivorum usum supervacaneum existimamus. Erit autem hæc certa curatio. Paretur petia ex emplastro illo quod à Vigone in antidotario descriptum est, hoc modo:

Rx. Olei rosati omphacini & completi ana. ℥ ij,

olei mastichini, olei myrtini ana ℥ j.

pinguedinis hircinæ ℥ j. ℞.

succi Betbonicæ ℥ j.

Bulliant omnia simul usque ad consumptionem succorum, deinde colentur: & colaturæ addatur,

masticis ℥ x. gummi elemij ℥ vj.

terebinthinæ ℥ ij. ℞.

Ceræ albæ quantum sufficiat: iterum ad ignem bulliant parum & fiat cerotum in bovæ forma.

Simul etiam cum hoc maximus usus erit linimenti cujusdam à nobis inventi, cujus ea vis est, ut concoquat, digerat, mundificet, atque carnem etiam inducat,

A 3

Hoc item præcipit Hippocrates lib. de articulis potissimum ubi inflammatio timeatur. lege lib. de officina medici.

De Certa vulnerum curatione.

6 DE CURAN. VULNER.

Nota quod dupliciter fit hoc linimentum, aliquando cum emplastro de gummi elemii, aliquando cum gummi elemii.

Lineamentum inducantia Carnem.

cat, cujus certissimi in omni periculo faciendo usus, nunquam me pœnituit: & cui omnes ij quicunque fuerint experti, balsami nomen non immeritò fecerint. Ejus autem illa descriptio est.

R̄. Terebinthinae claræ & emplastri de gummi elemii ana ℥ i. ℞.

Pinguedinis castrati ℥ ij.

pinguedis porcinae antiquæ ℥ j.

Liquefiant ad ignem, & fiat linimentum.

Hoc linimento, quoties usus erit, ad ignem liquefacto, gallinae plumæ extremo vulnus leviter inungitur: deinde Cerotum, cujus jam nobis facta mentio est, toti vulnere sine ullis lincis filis est imponendum. Igitur sequenti die confecti, & satis commodè concocti puris copiam invenies. Quod si post primos dies largior puris copia fuerit, bis singulis diebus vulnus curari oportuerit. Neque verò linimenti hujus vis satis laudari potest. Nam præterquàm quòd commodissimum pus conficit, membrum ipsum ultra id quod naturæ ac medicinæ ratio postulat, vel inflammari vel apostema admittere non sinit: neque etiam locum aliis ex partibus hiare aut aperiri patitur; quod sæpe in minoribus etiam vulneribus accidit: ejusmodi autem accidentia difficilius plerunque quàm vulnus ipsum curantur: adde etiam quòd hujus medica-

dicamenti virtute minimum dolorem aegroti sentiunt ; & curatio multo maturius & commodius perficitur quàm si aliis qui descripti sunt modis paretur.

Quæ verò vulnera, vel saxo, vel fuste, vel casu facta fuerint, neque tamen in osse læsionem habere videantur, hoc modo curabimus.

Primum aqua vitæ laventur, aut vino ex myrrha, thure vel sarcocolla decocto, quatenus hoc modo immunditia omnis abstergetur, quæ ex saxo aut pulvere aut temerè affuso & concreto sanguine fuerat contracta. Confert etiam eadem lotio ad carnem citiùs inducendam. Hoc itaque modo loti vulneris labra, quemadmodum superius diximus, sunt conjungenda: quæ si diducta adeò videantur ut conjunctioni resistent, pulvinis triangularibus vel quadratis iisdem ovi albo intinctis utendum est : additis lineis peciis, quales antea descripsimus, cum de vulneribus gladio factis diceremus. Quod si neque hoc modo conjungi vulneris partes patiuntur, acu filoque uti expediet, & vulnus ipsum consuere, orificio inferius relicto, quò excrementa (si vulnus magnum fuerit) purgentur. Postera deinde die curatio eodem modo ineatur, quò in vulneribus incisione factis iniri oportere docuimus ; labris

§. DE CURAN. VULNER.

videlicet balsamo illo nostro leviter inunctis, atque emplastri pecia superposita: Namque his duobus remediis vulnera omnino usque ad cicatricis obductionem curantur.

Grandioribus verò vulneribus opportunè, ut diximus, consutis locus in inferiori parte apertus est relinquendus, quò tenuis è lino flammula inferatur: eam autem flammulam balsamo nostro intinctam in secunda & in cæteris deinceps curationibus adhiberi oportet: emplastrum verò quod impositum fuerit, bis per singulos dies abstergendum est. Porro cùm vulnus probè digestum esse cognoscetur; cognoscetur autem non ex pure, sed ex sanie bona jam ex orificio manante; flammula opus non erit, sed ceroto sive emplastro sæpius absterfo.

In quibus autem contusionibus nullum vulnus præter tumorem vel carnis mollitudinem fuerit deprehensum, nec ulla rupti ossis suspicio accesserit (id autem ex commemoratis jam signis & diligentis chirurgi iudicio est petendum) curationem hoc modo fieri expediet, *albo ovi vehementer agitato olei myrtini unciam, & myrtini pulveris ℥ item unam addito*, atque hæc optimè simul agitata in linea stupa quam prius aceto, & aqua æquali portione intinxeris, manu-

In contusione valet.

nuque compresseris, extendito hanc stupam, cum his fomentis loco affecto imposito, & postera die ex divino beneficio bene habebit: quod si nondum omnino sanatum esse judicaveris, idem remedium iterum repetito, quod bis impositum quantumvis magnam contusionem curabit.

A N N O T A T I O.

Igitur vulnerum in capite] Cum multæ sint eorum vulnerum quæ in capite infliguntur, rationes sive indicationes; ut quæ à loco particulari capitis sumuntur, & quæ ab adjunctis colliguntur symptomatis dolore, intemperie, phlegmone (ut tertio methodi medendi Galenus tradit) quæ ab προνουέ-
vois, sive antecedentibus capiuntur, obvia sunt maximè, & in curatione sunt primæ. tales proponuntur ab auctore; dum quæ telo fiunt vulnera, primo divisi: quæ certè telorum consideratio, tanti apud Hippocratem fit, ut noxas inde metiatur, & æstimet. Dixit enim ea vulnera quæ gladio, vel acuto telo fiunt, aut solùm carnem denudare; aut ita os findere, ut noxa & vulneris sedes idem plerumque sint: magis tela orbicularia gravia, teretia, obtusa, os deprimere, findere, collidere; unde in his sollicitum de rima vult, in iis non nisi raro.

Namque secundum artem] Nec mirum, simplicia enim vulnera curanda proponuntur; quæ eò citius coalescere debent, quò magis siccum est caput, & aliorum membrorum minùs redundantias in se recipit.

Accedit illa digestivorum copia] Quanta detrimenta his oleorum generibus accipiant ægri, dici non potest: nam bonam carnem putridam reddunt, curationem producant, & in varia discrimina ægros perducunt; etenim madefacientia non modò ulceribus capitis, sed in aliis omnibus vitanda sunt, quum non prius quàm siccescant vulnera, ad sanitatem perducuntur, ut scripsit Hippocrates lib. περὶ ἰκκῶν.

Igitur an os fractum sit] Hæc apud Hippocratem leguntur copiosè lib. περὶ τραυμάτων, & Galenum sexto Therapeutices, Aeginetam, & Celsum lib. vj. ad quos lectorem remitto.

Quod si] Si vulnus accepium ad tantam magnitudinem percussim, cæsimve inflatum est, ut sola deligatura oræ ipsius nec committi, nec adduci possint, sutura, aut fibulis (quas ἀγκυρῆες vocant) eas ipsas oras adducendas præcipit Galenus tertio methodi.

Ex tenui lino albo ovi] Vfus communis obinuit, ut recentibus hujusmodi vulneribus ovi candidum aliquandiu agitatum ex levi stupa exceptum admoveatur, nec ab re, eam sanguinis profusivum supprimat, dolo-

rwm

rem sedet, refrigeret, & phlegmonas fieri prohibeat, ut est auctor Galenus lib. II. de Simpl. medicam. facultatibus.

In secunda curatione] Rosaceo opus non est, quia sine alio symptomate, simplex est unitatis solutio: ubi tamen aut dolor aut inflammatio timeatur, adhiberi solet, ut lib. 4. Paulus ait, & Galenus secundo *ἔπι τόπος*, rosam, & rosaceum approbat.

Omnia genera] Videlicet ovi vitellum, iberebintinam & rosaceum: de ultimo diximus: Vitellus ulcus diuinum & sordidum reddit: resina nonne ab Hippocrate (in libro de articulis) ubi ulcus est, expelliur? Præterea uniuersa hæc miscella emplastica Galeno est, quæ omnis putrescendi, laxandi, & pus mouendi vim habet.

Lenimenti cuiusdam] Lenimentum ab auctore inuentum est egregium, atqui in eo vulnere maximè, quod aut cum contusione, dolore, inflammatione fuerit conjunctum; etenim dolorem sedat suillus adeps, & quia vetustate rancidus fit; ea ratione abstergendi insignem vim habet.

Primum aqua vitæ] Ita Arnoldus cruenta & recentia vulnera aqua vitæ abluta celerrimè ad sanitatem perducit.

Curationem hoc modo] Plures sunt in contusione indicationes seruandæ (ut Galenus ait I 4. *methodi medendi*) inter has potissima, dolorem sedare, & parti læsæ, ne

12 DE CURAN. VULNER.

*fluxionem recipiat, robur adferre, unde ob-
servatum est communi usu, ovi album cum
myrtillis adhibere. ita Lanfrancus, & Raziis,
verùm rosaceo primo perfundunt.*

DE CONTUSIONE

cum fractura ossis, sine appa-
rente vulnere.

CAP. II.

SI nullo vulnere apparente cranium
læssum subesse judicetur (id verò ju-
diciū, ex hominis casu & mentis mo-
tione & consequenti vomitione sumi-
tur) addita interdum oculorum caligine;
sumitur etiam judiciū ex notatione fu-
stis vel saxi, quo petitus homo est, ex
loci, unde instrumentum emissum fue-
rit, distantia, ex viribus, animi ira,
atque impulsu ejus qui percusserit. Nam
qui ira percitus, & nullo metu retarda-
tus, adversarium ferit, majores multo
atque validiores vires adhibet.

His igitur atque similibus animadver-
sionibus an cranium læssum fuerit. facile
judicatur: id quod non obscure Avicen-
na docet, sen 5. tractatu 3. & primo de
fractura cranii. Multoties, inquit acci-
dit ut findatur cranium, & non findatur
cutis, imò apostemetur & tumefiat caro,
& cutis quæ est super cranium. Atque
illud

illud quidem hujus à me facti iudicii exemplum non incommodè succurrit.

Ex duobus rixantibus hominibus alter ab altero percussus est saxo : is verò qui accepit, galea caput armaverat, qui tamen gravissimo turbatus ictu protinus in terram corruit : statim autem dum ab accurrentibus sustollitur evomuit. His ego conjecturis, & galeæ aliquantulum compressæ contemplatione, ossis rupturam subesse iudicavi : loco igitur aperto, contusionem ipsam vulnere factò formavi. Postera verò die cranium eo instrumento, quod à Græcis abaptiston, nobis trepanum dicitur, terebravi, quanquam vix capillaris & subtilissima rimula in osse ostenderetur. Offendi autem satis magnam concreti ac teterrimi cruoris copiam, quæ in duram matrem defluserat : eo igitur modo atque ordine, quem sequenti capite subjungemus, curatus brevi sanatus est, nullo gravi symptomate invadente.

ANNOTATIO.

Magna est inter doctissimos chirargos questio an si integra cute calvaria perfringatur, os scindi debeat & membrana patere. Celsi, & Pauli opinio scindendum esse os, ut admonet auctor : tamen alia videtur esse Hippocratis

14 DE CURAN. VULNER.

tis libro περι τραυμάτων, quam Iacobus Perusinus è natura petitis argumentis confirmat: vide Vidium Vidum Florentinum Commentario in eundem librum.

DE FRACTURA

CRANII.

CAP. III.

SÆpe ab indoctis atque inexpertis chirurgis in capitalis ossis ruptura ob artis ignorationem, atque ob iudicii defectum, non sine gravissimo periculo peccatur: dum nihil ab istis de ossium ruptura cogitatur; &, an in cerebri telis, membranis & articulis quicquam læsum aut punctum fuerit; disquirere negligitur. Solent namque inferioris ossis (quam vitream tabulam vocant) partes non rarò discindi, discuti, atque etiam disijci, ac dissipari: id autem vitium sæpius etiam in inferiori quàm in superiori tabula factum esse deprehenditur: quam quidem rem gravissima imprimis symptomata, deinde verò mors ipsa consequitur. At verò non rari sunt, quibus levissimum est, ubi nulla fractura, nec fracturæ quidem suspitio ulla cogit, caput ipsum incisione aperire: ubi verò certam rupturam suspicari meritò possis, nihil omnino aperiunt. His autem rebus
artis

artis ignorantia, & intelligendi negligentia, & laboris ac studii in rebus cogitandis fuga in causa est. Adde his animi superbiam, & cupiditatem: nam congerendis nummis impensè in invidiosis studentibus, doctioribus parere curantibus, & periculum facientibus adesse dedignantur. Ex ea adè re evenit, ut probatorum medicorum atque chirurgorum copia, multis in locis regionum nostrarum, ab hinc quadraginta annis, atque eo amplius desideretur. Nam quam multis theoreticæ atque artis cognitionem in utroque medicinæ genere tribuamus; accidit tamen, ut cum ab initio expertissimis in praxi ipsa non assueverint, cum optima scientia obscura jungatur experientia: quòd jam pridem, hujus artis usus, atque operatio, ad empiricos & tonsores redacta sit: qui vel nihil aliud norunt, quàm quòd à suis ejusdem farinae magistris didicerunt: vel, quòd miserimum est, suam quique libidinem, suum privatum errorem, nullo, neque indocto etiam, auctore sequuntur. Hinc etiam fit, ut si gravis aliqua & magni momenti curatio contingat, tametsi nonnihil jam illis cognitionis vel ex temporis longitudine, vel ex ingenii felicitate, vel alia ratione sibi pepererint; tamen instrumentorum aut inven-

inventorum, aut inveniendorum usu, quibus ea res effici possit, careant: cum nulla talia ipsis vel videre, vel cogitare unquam contigerit. Si quæ verò illis fortè sint, neque ea norunt, neque iisdem uti didicerunt: id quod frequenti periculo deprehendimus. Quotus enim quisque in hac citeriori Hispania est, cui abapitisti (sive terebellum sive trepanum vocare malis) usus notus sit, imò istis plerumque terebrandi officium, ut periculosissimum, & lætale omnino damnatur, asserentibus fieri non posse, dum trepano utaris, quin eæ, quæ cerebrum circumstant, membranæ, omnino vitientur, & multa præterea alia in erroris sui defensionem jactantibus. Atque una causa est, quæ me, ut opus hoc aggrederer, compulerit: ut nonnulla vulgo difficillimæ curationis habita exprimerem, non quod magnam aliquam ipse mihi scientiam arrogem, sed quòd longitudine temporis, exercitatione, atque multo usu, mediocri eruditione, & assidua lectione adhibita, plurimos, multis in locis, divino auxilio fretus, curaverim, & multorum etiam medicorum, & chirurgorum variis & frequentibus affuerim curationibus. Docebimus autem eos quorum id scire intererit, quis agendi modus in capite curando sit, quis
 vario-

variorum instrumentorum usus, trepanorum videlicet, atque educteriorum & eorum quæ levatoria vocantur, ac multorum præterea quæ à me inventa excogitataque sunt. Interdum etiam curationes referre minimè pigebit, quæ à me dextro numine feliciter peractæ hactenus fuere, & quotidie etiam peraguntur, non solum in capite, sed in pectore etiam, in ventre atque intestinis. Sed nunc porrò ad cranii rupturam, unde digressi sumus, jam redeamus. Hæc ubi ex signis (ut jam diximus) cognita fuerit, cum vulnere ex arte factò locus etiam fuerit apertus, rimulam ostendet manifestam. Majorem autem rupturam interius, quàm exterius, subesse is facile dijudicabit, qui lapidis ictu percussam testam plus vitii in concava quàm in convexa sui parte fecisse viderit.

Sed & si nihil omnino ruptum intus foret, tamen aliquam partem fuisse commotam, non est negandum: eam verò commotionem venæ alicujus ruptio secuta est, ex qua effusus atque concretus cruor in tabem & pus corrumpitur: cui cum ad purgandum, evaporandumque, nullus pateat locus, fit ut quæ circa cerebrum fuerint pelliculæ, & membranulæ, deinde & cerebrum etiam ipsum, inflammentur & corrumpantur.

Atque

Vide Soranum qui de vulneribus capitibus etiam scripsit.

18 DE CURAN. VULNER,

Paulus
lib. 6.

Atque hujus quidem rei manifesta paulò post signa apparent, quæ cum apparuerint, actum profecto de homine ipso est, Præterea etiam fieri potest, ut quamquam venæ non rumpantur, ex vehementi tamen concussione, ex ictu, ex dolore etiam accepto, plurimus intra venas ipsas evocetur sanguis, & loci propterea inflammatio itidem & corruptio consequatur.

Vide
Hippo.
lib.
proprio.

His igitur omnibus periculis nulla re commodius quam trepano curetur. Namque ubi cranium terebello apertum est, & membranæ conspici possunt, quamquam inflammatas corruptasque locus sit, tamen curari plerunque, & sanari contigit: & cruor ille ex ossis vitio, vel concussione, concretus conspicitur, & abstergitur.

Igitur illud in hoc eventu primum omnium curandum est, ut vulnus aperiatur, apteturque locus, atque stupis ovi albo maceratis conspiciatur, deinde verò ligetur.

A sequenti verò die, ad septimam usque hujusmodi sirupus ægroti mane propinabitur, cujus usus opportunæ purgationis officium præstabit. Alias namque purgationes vehementer nocere hoc modo affectis comperimus.

R̄. Sirupi rosati ℥ ij.

aquæ

aquæ plantag. ℥ iij. misceto.

Tandiu autem exquisita diæta uti oportuerit, quoad carnis jam indigere cognoscatur.

Sequenti verò die, hoc est primæ curationi proximo, secunda curatio balsami nostri illitu & emplastro de gummii elemii impositione peragenda est, loco demum probè colligato.

Tertio autem die terebello ad aperendum uti oportuerit, cujus instrumenti ratio, & usus à nobis suo loco docebitur, sed cranium ipsum, ab inferiori vulneris parte, trepano aperendum est; statim autem ubi apertum fuerit, os cochleari illo, quod in theca chirurgica est, oleum rosatum, & muliebre lac, cum rosaceo melle, æqua singulorum portione, ad candelæ flammam calefactum conjicito: quantitas tamen ipsa cochlearis mensuram non excedat. Hoc ubi expeditum fuerit, rotundam bombycini rubri (Hispani sandalum vocant) portiunculam, inter os ipsum & cerebri membranulas indito, quo membranæ pulsando, nihil à rupto lædantur offe. Foramen autem filis lineis in circum confirmatis ocludito, cranium deinde, ex liquefacto balsamo nostro, pluma leviter inungito: totum postmodò vulnus, ubi inunctum fuerit, filis
non

20 DE CURAN. VULNER.

non nimium compressis oppleto, & emplastro de gummi elemii, aut de minio superposito, curationem absolvo. Hoc profecto modo curatis, postera die pus optimè & commodissimè coactum, atque confectum conspicitur: quamobrem arbitror non oportere digestiva illa, neque his, neque aliis ullis vulneribus adhibere, quæ vulgo ex ovi vitello, oleo rosaceo, terebinthina constant: neque caput ipsum oleo rosaceo inungere, sed nec membrum ullum aliud vulneratum, namque hoc balsamo nostro optimum pus citissimè conficitur: nec locus inflammatur. Atque facilè testari possum, me diu hoc, quem descripsi, curationis modo usum, nunquam neque in maximis vulneribus panituisse: sive membrana fuerit corrupta, sive cerebrum ipsum fuerit comminutum, & cerebri pars aliqua pereat, & quantum ego judico, eorum digestivorum, atque inunctionum usus, in causa esse solet, ut vulnerum curationes ad alterum, atque ad tertium usque mensem proferantur: corrumpuntur enim, atque putrescunt plusquam satis est, vulnera, & complexio deterior fit, membrumque ipsum debilitatur, quod contra omnino contingit, si eo modo quo diximus curentur.

Nam

Nam & sanitatis tempus rarò mensem excedit: ossa autem si quæ extrahenda sunt, vigesimo quinto die aut ante remittuntur pro fracturæ ratione. Nam ex majori fractura, citius eruantur.

ANNOTATIO.

Cranii fractura, est divisio calvarie: quarum sunt hæc differentiæ, fissura, excisio, expressio, depressio, in infantib. contusio, & (ut Galenus addit) cameratio. Hæc fractura si manifesta est, eo usque scalpello explorari debet, donec fugiat rima nostrum oculum: atqui nec ita contenti esse debemus; si Hippocrati creditur: verùm atramento tingenda calvaria est, atque id sequenti die est radendum: ut videre est apud eundem. nobis enim propositum non est, universa, quæ ad hanc rem faciunt, tradere: sed quo quæque loco sint promenda indicare.

Et si nihil omnino ruptum fuerit]
Nescio qua ratione id deprehendimus Ant-
verpiæ hoc anno, ut quamplurimi citra cal-
varie lesionem, ex cerebri, seu menyngum
concussione (effluente è venis sanguine)
obierint. Quod malum eò magis fuit capitale,
& funestum; quò minus illi qui sic affecti
erant, in solita Symptomata incurrerent: nam
quum septimo aut ad summum decimoquarto
die Symptomatibus ab Hippocrate descriptis
hæc

22 DE CURAN. VULNER.

hæc se noxa manifestet, hi illis diebus bene valere, non febrire, non vomere cœperunt: decimosextimo, aut vigesimo, &, quod magis est mirandum, quinto & vigesimo, hæc sese ostenderunt: mortuique sunt omnes. De hac re Celsum vide, & Ioannem de Vigo proprio capite.

Illud igitur] Chirurgiam ita aggredimur: pilos præradimus: ad ipsum vulnus duas sectiones facimus, quæ ad rectos angulos sese secant. Paulus ad similitudinem X. Græcæ literæ faciendum admonuit.

Stupis ovi albo maceratis] Paulus Egineta posam exhibet, & vinum cum rosaceo apponit.

Jam diu exquisita diæta] Victu inquam inflammationem arcente, quem veteres febrilem apellant.

Tertia die] Hippocrates monet, ne ad tertium diem differatur, præsertim aëris constitutione calida, & Galenus in secundo de Officina medici, sequenti die id fieri vult, nisi aliquod novum symptoma superveniat.

Statim ubi apertum est os] Merito statim dixit: nam membrana quàm celerimè purganda & siccanda est: ne si madens sit, hebes fiat, & attollatur: quæ cum ita accidunt, periculum est ne putrescat.

Oleum rosaceum] Constat Galenum patefacta membrana, non modò inflammatione urgente, sed etiam doloris causa, lenien-

nien
anim
nem
supr
Apo

DI

T

est
rum
can
igit
secu
dur
gat
con
quæ
est
quæ
non
bra
nes
me
ma
tia
ter

nientibus uti, libro secundo 27. *τόπος*, ubi animadversione dignum puto, quòd sanguinem columbinum calidum, ex ala detractum, supra cerebri membranam induci probet, Apollonium secutus.

DE USU TEREBRÆ, Sive anabaptisti.

CAP. III.

Tertio die postquam vulnus factum est, terebræ officio uti oportebit, est namque duplex terebræ genus, alterum masculum, fœminam alterum vocant Græcis *ἀλὸς τριγών* dictum. principio igitur, mas super cranio collocandus est, secundum infimam vulneris partem, dum modò, nullam commissuram attingat, hunc ad perpendiculum semper constitutum rotare eoque oportet, quoad in osse tantum penetrarit, quanta est ejus nummi argentei crassitudo, quam Hispani *Real de à quatro* dicunt, nonnihil etiam amplius. Est autem terebræ mari anceps ligula, in medio quam nespulam vocant, quæ fabrilis taladri modo penetret. atque hæc centrum format in osse: terebræ autem circumferentia circulum in osse describit. Fœminæ terebræ nihil in medio est, ejus tamen circum-

24 DE CURAN. VULNER.

circumferentiam, mari omnino æqualem esse oportet; hunc etiam ad perpendiculum collocatum circumvolvimus, leniterque agitamus, donec superior ossis tabula perfcindatur, interim autem, cùm opus esse visum fuerit, ramente abstergenda sunt. Eodem modo in inferiorem tabulam accuratè agere conveniet, sed antequam omnino terebra penetret, versus aliquam descripti circuli partem sinistra manus terebram continens, est inclinanda, ut ex ea parte totum scindatur os, ex altera verò parte nihil ulterius penetret, tunc ex theca instrumentum, quod commodius videbitur, est adhibendum; quo totus ille circulus, qui descriptus abscissusque fuerit, extrahatur, nullo in pelliculis omnino nocumento.

Post hoc lenticulare illud ferrum, candelæ flamma nonnihil calefactum, ex illo orificio asperas ossium particulas circumradimus, ne dum pulsatione naturali dura mater movetur, illis asperitatibus quicquam lædatur. Curetur autem locus sandalo, & balsami liquore, ut jam docuimus.

Cùm verò aut fractura ipsa, aut confusio in ossibus magna fuerit, ita ut cranium compressum sit, trepano uti nihil opus erit, sed ossa ipsa in suam
pri-

pristinam constitutionem, sunt reducenda. Complures enim ego hoc modo affectos, à chirurgis terebro, & levatoriis dictis, curatos malè habuisse vidi: cùm enim ea operatio, sine magna ossium depressione fieri minimè possit, fit ut pelliculæ facilè rumpantur, & cerebrum etiam comminatur. adde quòd cùm ab istis ossa non eruuntur, sed donec ipsa, sponte sua emittantur, putrescere sinuntur, in lethale discrimen ægroti conjiciuntur. Reducenda ergo sunt in locum proprium ossa, quàm fieri possit commodissimè, & ex iis pars aliqua, ut orificium fiat, eruenda est, ne pelliculæ compressis ossibus lædantur, & ne qua interiora curentur, apertio desit. Nec verò ossa fracta omnia statim eruere oportet, nocet enim tantum in pelliculis spacium apertum, atque patens esse, aère nanque circunvago læduntur.

Est autem diligenter considerandum, perspiciendumque, an inferioris tabulæ portio, aliqua aut rupta, aut compressa, aut super duram matrem (quam vocant) incumbens, lateat; namque plerumque majorem portionem inferius, quàm superius, commoveri, ac rumpi, ut in testis ruptis, accidere jam sæpissimè conspeximus. Nec rarò mihi accidit, ut majorem ossis portionem, interius com-

B motam,

motam, deprehenderim, quam ut ex orificio possem eruere: quod ubi contigit, os ipsum instrumentis leniter rumpere, & in plures particulas divisum, eruere consuevi. Et quoniam instrumentorum magnus est usus, cuiusmodi ego utar instrumentis, pictura in fine libri addita, docebo, Perspiciendum itaque fuerit, an ossis portionem aliquam erui oporteat, quam nisi erueris, pelliculas ipsas compressas continua pulsatione læsas rumpi necesse est: cognoscitur autem hoc facile, si quis diligenter inspiciat. Nam pelliculæ ipsæ compressiores, atque à cranio plusquam par est distantes, apparent. Ergo ossibus in locum suum reductis, & partibus iis, quas erui oportuit, erutis, si qua asperitas reliqua sit, ad quam dura mater continua sua pulsatione offendat, eam asperitatem lenticulari ferro abradi conveniet. Postera, autem die, postquam ossa correctæ, atque eruta fuerint, si duræ matris color niger esse videbitur, pro lacte, oleo, & melle rosaceo, de quibus superius diximus, tantum rosaceo melle cochleare illud chirurgicum plenum, atque ad candelæ lumen calefactum, iniicito, atque cendalum, inter duram matrem, & cranium, insinuato: prodest enim hoc, & ut materies omnis quæ corrumpi possit,

set, melius expurgetur, & ut pulsatione sua nihil dura mater lædatur. Atque hoc rosato melle facillime dura mater mundior efficitur: si ex contusione nigrior fortè, atque impurior facta erat. Cùm verò nigredo illa in meliorem colorem conuerti jam cœperit, pro rosato melle, ad restituendas pelliculas, hoc linimento uteris, quod duobus à Joanne Vigone descriptis, præstantius atque præsentius esse, frequenti experimento intellexi.

*R. sirupi rosati ex infusione ℥j. S.
florum & foliorum hypericonis, florum
rosmarini, grana ana parum, ter-
binthine vini odoriferi ℥ij.*

Olei omphacini quartam unam, croci parum: bulliant usque ad consumptionem vini, deinde colentur. Addimus oleum illud omphacinum, & ad liquoris præstantiam, & ad dolorem sedandum; tametsi auctor ipse hujusmodi oleum prætermiserit, tamen nos ut non prætermittendum commendamus, crocum etiam nos floribus dum coquuntur, subtiliter addimus. Solent autem ante decimum quartum diem hoc linimento membranæ omnes plenissimè restitui.

In universali autem vulneris curatione, balsamo illo nostro procedendum est, quo ad vulnere necessaria accreuerit caro; & ossa omnia quæ erui oportuerit,

28 DE CURAN. VULNER.

fuert jam eruta. eruuntur verò ante vigesimum quintum diem, quo tempore tendanda illa erunt; nam facillè ferro levatorio cedunt, si sensim trahas. Hoc balsamum, præterquam quòd optimum pus conficit, & non nimium, illud etiam in exteriores vulneris partes commodissimè expellit, neque plus intra vulnus relinquit, quàm quod ad vulneris coctionem, & curationem commodum est. ruborem etiam aptissimum carni addit, & cranium opportunè humectat. Atque hoc modo vulnera curanda sunt, semel quidem singulis diebus, donec ossa omnia sint eruta; quibus jam erutis, licebit ægroto, è lecto surgere, qui jam deinceps singulis diebus bis est curandus. Balsami autem hujus digestivi nostri hujusmodi descriptio est.

R. Gummi elemii, & terebinthinæ abietinæ quam vulgo de abiete vocant, ana ℥i. S. sepi castrati antiqui, & liquefacti ℥ij. pinguedinis porcine antiquæ liquefactæ ℥j. misce, & ad ignem linimento facito.

Hujus balsami semuncia quantumvis magnum vulnus curari poterit. Usus autem est hujusmodi vulnere absterfo, atque iis rebus, quas jam præscripsimus, super pelliculas impositis balsamum vase aliquo, ad ignem liquabis, ita ut non nimium calefiat, ne scilicet calore nimio

mio ægrotum lædat, ex eo quòd liquatum fuerit, pluma gallinacea, vulneris partes omnes, & labia atque ipsum etiam capitis os, leviter inungito. Satis enim est id leviter fieri, ubi inunxeris, vulnus lichinis siccis opplete. Super hæc autem linum cum emplastro ponito, quod emplastrum gummi elemii dicitur: cujus descriptionem apud conciliatorem invenire licet, differentia centesima prima. Namque hoc emplastri genus vulneribus capitis sanandis accommodatissimum esse longo usu comperi. Ejus autem hæc descriptio est.

℞. Gummi elemii ℥ iij.

resine pineæ purissimæ, armoniaci, gummi bederacei cereæ ana ℥ ij.

terebinthinæ ℥ iij. ℞.

olei rosacei ℥ j. ℞.

bulliant omnia simul præter armoniacum, cum cyatho uno, & dimidio vini odorati, usque ad consumptionem vini. ultimo loco addatur armoniacum dissolutum, cum aceto & gummi bederæ pulverizato, & malaxentur cum vino & aqua vitæ, & fiat emplastrum. Non minoris etiam usus emplastrum illud esse frequenti experimento intellexi, cujus descriptionem ex Joanne Vigone petas licet, in capite de fractura cranij cui ille nomen fecit Emplastrum ex be-tonica. Utilissimum pariter ad hanc

eandem rem illud est, quod Acelinus Januensis Barchinonensibus chirurgis tradidit, cujus hæc descriptio est.

R. Terebinthinae claræ ℥ j. ℞.

cere alba ℥ s,

resinae pini ℥ vj. ℞.

Conficiantur simul, & fiat emplastrum, quod malaxetur cum aceto albo, in quo infusum sit emplastrum hoc à nobis descriptum. Infundi autem oportebit per sex dies in prædicto aceto, ita ut omnino immergatur, & cum succi betonicae partibus duabus & yerbenæ parte una; malaxentur omnia, & maceretur iterum per sex alteros dies in succis prædictis: posthæc malaxetur cum lacte mulieris: redigaturque in formas magdalionum nullius major est usus apud Celtiberos omnes quàm hujus emplastri, cujus me etiam nunquam pænituit.

Igitur cum pelliculae restitutæ jam fuerint, illius quem descripsimus, liquoris usus nihil eo opus de cætero erit, sed pelliculae ipsæ, atque ad eò totum vulnus pluma ex balsamo intincta leviter est inungendum, donec totum os carne obductum, obtectumque sit (namque hujus medicamenti vis præsentissima, certissimaque ad eam rem est) fila autem, & lichni mollius, & lenius addenda

denda sunt, ne videlicet iis carnis impediatur accretio, incrementumve. Nec verò carnis inductio impedit, quo minus ossa corrupta, si quæ fuerint, tempore remittantur. Est autem opportunum ad eam rem tempus ferè vigesimusquartus, aut vigesimusquintus dies, quibusdam etiam, & ante hoc tempus remittuntur: sed ubi vulnus magnum est, atque ubi locus terebra perforatus fuerit, plerunque vigesimoquinto die, ossium remissio fit.

Nec verò hæc quæ de ossibus extrahendis diximus, sic interpretari debemus, ut ossa sua sponte remissura, atque eruptura intelligamus, ut plerique chirurgorum putant: sed necesse est, ut ab artifice extrahantur eo instrumento ferreo, quod vulgo caprinus pes dicitur: hoc enim ubi apprehenderit, & paululum contenderit, statim ossa ipsa cedunt, & sequuntur: quod si prima die non succedat, sequenti facile expedietur res. Itaque curandum est, ut tempestivè, & opportunè ossa extrahantur. Ubi autem extracta fuerint, licebit jam aegroto surgere è lecto, idquæ tuto.

Post hæc verò deinceps, in sanando vulnere, exiccatione uti conveniet, aluminis ulsti injecto pulvere, & lineis filis impositis, addito, etiam super hæc

32 DE CURAN. VULNER.

emplastro. nec verò frequens adeò debet esse hujus pulveris usus, sed parcè agendum est: atque hoc modo triginta dierum spatio vulnera curantur, nullo magno, nec ægrotantis labore, nec chirurgi negotio.

A N N O T A T I O.

Terebella nota antiquis fuit: & bis, ni fallor, apud Hippocratem lib. de capitis vulneribus mentio fit. ejus usus veteribus periculosus est existimatus: unde Galenus scalpulum magis probat: quod per cava scalpra adhibetur tandem os excidit: excisorio eo lenticulari tantopere à Galeno laudato: vide Æginetam capite proprio. Advertendum est usum terebræ alienum esse: ubi ossa sunt vehementer perfracta, aut ubi per se imbecilla sunt, aut contusa: excipit Hippocrates puerorum os, quod non admodum imbecillum est.

Nocet enim] Doctissime annotavit auctor, quod Galenus ait in octavo de usu partium, videlicet quàm celerrimè excidenda ossa esse, ne refrigeretur cerebrum.

Postera autem die] Paulum Æginetam sequitur. advertendum est, si spontanea sit nigrities, perduretque ita, ut jam profunda petat, insiti caloris mortificationem significare, atque ita sanè desperandum esse.

D E

DE VULNERIBUS

Capitis gladio, aut alio incisorio instrumento factis.

CAP. V.

AN vulnus in capite factum quod cranium etiam inciderit, profundum penetransve sit, facillè ex longitudine cognoscimus: nam ex capitis rotunditate, & loci, in quo vulnus est ratione certa, penetrationis capitur conjectura. Igitur si vulnus profundum, penetransque est, formandum in primis fuerit, neque opus fuerit cranium incidere ex transverso; satis enim fuerit, ipsius jam incisæ carnis labra una cum pericranio utrinque diducere, atque in trianguli figuram conformare. Sequentè autem die, balsamo illo, quod vocamus, liquato, & calido, curare incipiendum est, addito emplastro ex gummi elemii. Tertià verò die, trepano sive abaptisto utendum est: ossa verò ex inferiori parte perforanda, etiam si suspitio sit, membranulas omnes incisas fuisse; ex eo enim loco, omne pus, sanies, omnisque noxius purgatur humor. Aperto ergo jam loco, membranulas rosaceo melle curabis, unà cum linimento (quod balsamum vocamus) carnem inducente,

B 5

quod

34 DE CURAN. VULNER.

quod descriptum à nobis est. Hoc enim dura mater mundior fit, & carnem inducit: unguendus autem hoc medicamento totus incisus locus est, officio plumæ, ut omnia loca subeantur, & mundentur, neque inutilis autem & supervacuus in his vulneribus rasorii instrumenti usus est, quem Legram vocant: namque tanta membranarum porrio radendo defecta nocentem aërem admitteret, & neque membranæ ipsæ ita commodè mundarentur, carnemve inducerent opportunam, quemadmodum id usu terebellæ commodissimè præstatur. Nanque hoc modo curata vulnera facillimè expurgantur, carnemque inducunt, & ossa si quæ extrahenda sint, eodem ferè tempore quo contusa vulnera remittunt.

Si verò hæc vulnera, ultra priorem ferè cranii tabulam, non pertineant, in huiusmodi cognoscendis, & curandis, iudicio diligentiaque magna opus est. Non enim rarò usu venit, ut hæc vulnera fiant ab eo homine, qui gladio strenuè uti nesciat, nec vulnerando, scindendove leviter manu percutiat, sed obtundat, potius quàm scindat, perinde ac si fuste res acta esset: ita lædat, ex quo ictu caput conquassatur, magis quàm vulnus accipiat, & cranium ipsum,
con-

concava sua superficie, atque ea parte
 qua cerebri membranas attingit: magis
 etiam commovetur, quam ex superiori
 parte fuerit tactum, aut concisum, ita
 ut gravius ense, quàm fuste lædatur.
 accedit etiam, ut ex ea pertusione non-
 nullæ interdum venæ rumpantur, ex
 quibus, qui sanguis erumpit, facillè cor-
 rumpitur, & mortis indicia, deinde
 mors ipsa sequitur. Quamobrem ubi
 huiusmodi quippiam contigerit, hæc
 quæ diximus omnia cogitare, docti me-
 dici imprimis interest; atque si id com-
 modè fieri possit, gladium ipsum quo
 factum vulnus fuerit contemplari, a-
 cutus ne sit an obtusus, & hominem
 etiam, qui vulnus fecit, an dexteritate
 valeat, an viribus magis valeat, consi-
 derare: similiter etiam, quo ferro usus
 fuerit, acutòne, ac levigato, an pugio-
 ne, securi, pilo aliòve potius quam
 acuto. multa præterea huius generis æsti-
 manda, pensandaquæ sunt. Signa etiam
 ipsa observari oportebit quæ in eo, qui
 vulnus acceperit, sunt secuta: si statim
 evomuit, si corruit, si visu sensuque fuit
 perturbatus: namque huiusmodi accide-
 re nihil solet, ubi vulnus leviter tantum
 acceptum est; neque aliud quàm incisio,
 est factum: adeò enim leviter ferre, &
 pati ut non capite, sed pilo ictum tulisse

sibi videatur, id autem ex veloci evenit
 contusione. Propterea ubi huiusmodi
 quid aciderit, cum difficilis admodum
 conjectura, indicatioque sit, illud ego
 tutissimum consultissimumque esse arbi-
 tror, ut locus trepano aperiatur. namque
 nullum ex hoc periculum timemus,
 etiamsi nihil interius, cum læsum fuisse
 inveniamus: nullum inquam periculum,
 nullamve curationis dilationem: contra
 verò si hoc negligatur, maximum cer-
 tissimumque periculum, & plerunque
 mors ipsa sequitur. Atque equidem ple-
 rosque eorum qui ex vulnere in capite
 accepto pereunt, hac causa perire arbi-
 tror. Nam in huiusmodi eventibus, nihil
 aliud chirurgi quam radere, & legra
 uti consueverunt, quoad illis ad scissuræ
 finem pervenisse visum fuerit, atque ita
 sibi & officio suo satis fecisse se putant:
 ubi autem minus illi timent, tum læta-
 lia signa apparere incipiunt, quorum
 rara illis cognitio est. Atque hoc modo
 omnes pereunt, ut nullus hæc pericula
 possit evadere: neque verò hoc mirum,
 aut incredibile videri debet, cum rarissi-
 mi in regionibus nostris sint, quibus tre-
 pani notus sit usus, etiam si medicinam
 aut chirurgiam fuerint professi. Nam
 plerosque hanc curandi rationem impro-
 bare, atque ut periculo aleæve plenam
 dam-

damnare, audio, qui illud non vident, ex duobus certis, & ad certa membra commodissimis instrumentis, alterum hoc esse, quod à Joanne Vigone, atque à Guidone, tum ab aliis auctoribus imprimis commendatur: illis enim (ut propriis eorum verbis utar) trepanus in capitis, & falx in ani curationibus vehementer probantur. Quid autem falx sit, aut quis ejus usus, equidem ferè omnibus nostratibus medicis ignotum esse arbitror, neque si inter multa instrumenta, id temerè oblatum sit, agnitum iri ab illis puto. Sed ad rem redeamus. Sentio igitur, ubi nihil eorum quæ observanda nobis proposita sunt, metuere in capitis vulneribus contigerit, nihil præter legræ usum opus alio instrumento esse. Jam autem instrumentum triplex esse oportet, majusculum, videlicet, medium & minimum, quorum hujusmodi usus esto: si scissura quantum est prioris tabulæ altitudo, aut etiam altius penetraverit, majuscula legra est agendum, deinde media, tandem minima. Si verò levior, & minus profunda, incisio in osse fuerit, satis erit locum lævem, planumque minima legra reddere; ne videlicet latibulum, aut recessus reliquus sit, quo pus confectum penetret; & cum abstergi non possit, os ipsum corrumpat.

38 DE CURAN. VULNER.

Hoc autem ubi jam expeditum fuerit ;
 secunda curatione . balsamum adhiben-
 dum est, etiamsi nondum pus fuerit con-
 fectum. Hoc enim medicamento oportu-
 nissimè conficietur pus, ut antè docui-
 mus. deinde filis locus impleatur, non
 nimium compressis; addaturque alterum
 ex his, quæ superius descripta nobis sunt,
 emplastris. Hoc igitur modo, rectissimè
 & citissimè vulnera quæque curantur,
 nulla sæpe ossium iactura. nam quam-
 vis ab aëre interdum tangantur, tanta
 hujus medicamenti vis est, ut si bona
 naturæ constitutione ægrotus sit, omnia
 facile corrigantur, & restituantur, ut pe-
 riculo facto manifestum erit. Quod verò
 ad diætaram victus rationem, & loco-
 rum opportunitatem attinet, hujusmodi
 erit: Si hyems fuerit, cubiculum, si fie-
 ri commodè possit, in superiori domus
 parte sit, dummodo tectum satis probè
 contignatum sit: & non tegula tantum
 à pluviis tueatur: nam si hæc haberi
 minus possint, in cubiculo inferiori le-
 ctum parari consultius fuerit. Æstivo
 autem tempore inferius cubiculū est
 commodissimum, ne videlicet ab æstu
 ægrotus lædatur: cubiculi verò ostium
 clausum semper esto, & velo objecto,
 aërem subeuntem arceto; lucerna in super
 noctu, diuque in cubiculo ardeat, cujus
 calor

calor satis commodè ambientem aërem temperare valet. quod si frigidior adhuc locus hyeme esse videbitur, carbones incensi inferantur interdum: neque enim nimis calidum esse conducet, propterea lucernam semper ardere, & fores clausas esse præcipimus: additò ante ostium velo. Contingit enim sæpe, ut qui ingreditur, fores claudere negligat. Con-
suevere nonnulli chirurgi, sindone super astantia capita injecto instar tentorii facere, & ita operam curationi dare: atque equidem ea re si modo locus, ut diximus, paratus sit, nihil opus esse arbitror, imò & nonnunquam nocere id puto. candelarum enim calor, sindone objecta reflectitur, & vapores ex ægrotantis capite exhalantes transpirare non sinit; id autem molestissimum, noxiumque esse, maximè verò in calidis regionibus est manifestum. in frigidis autem id melius admitti potest. sæpe autem in bello capitum profunda vulnèra, aperto cælo, atque sub dio, curari contingit, ubi neque cubiculum, neque sindon, neque ignis sit: igitur ea, quæ de parando loco dicta nobis sunt, satis esse arbitramur. Sed ubi curandi tempus erit, geminam lucernam utrinque supra admovisse, retulerit, quam proximè id fieri possit, quò aër ambiens calefiat, & tem-
pere-

40 DE CURAN. VULNER.

peretur, eaque fatis luminis adhibebunt, & frigus quod nocere posset commodè arcebunt. namque nihil ferè frigidi, in cubiculo, ita ut diximus, parato erit: & si quid subesse suspiceris, id totum lucernæ corrigent admotæ, quam profectò rem facile usus ipse ostendet.

In ipso quidem curationis initio, nos eos, qui ex vulnere in capite laborant, passulis atque modico pascimus pane, cum in prandio, tum in cœna: aqua verò ex aniso & ordeo, aut ea quæ ægrotantis habitudini maximè conducere videtur; atque hoc victu, usque ad septimum diem, utimur, nisi quid aliud fortè re ipsa, aut aliunde orta, postulet necessitas. Quod si habitudine biliosa homo fuerit, semel in die carne ex pullo ut vescatur permittere, aut ex pulla, donec septimam evaserit diem. Jure autem carniùm interdicens omnibus qui hujusmodi patiuntur, ut potè quod nocere vehementer soleat. *Ab initio autem curationis fruptum singulis diebus mane propinamus, nempe rosati ex infusione ℥ ij.*

cum aquæ plantaginis ℥ ij.

Idque septem diebus consequenter faciendum curamus. Providere etiam sedulò oportet, ut singulis diebus venter exoneretur, sive id sponte sua, sive clystere addito præstari possit. Purgativum verò

verò medicamentum nullum, neque cassiam exhibemus, quoniam frequentibus periculis observavimus, eam rem illis vehementer nocere, quamvis simplicissimum medicamentum sit, nihilque habeant solutivi omnino ad mixtum. Si quis autem contrà contenderit, is profectò rem ipsam experimento cognosceret. Nam cum caput princeps membrum sit, fieri non potest ut nihil à purgante medicamento moveatur, ob eam quæ cerebro cum ventriculo est, communicationem: ex quo fit, ut prodesse nihil, nocere autem plurimum, ægrotis possit. Et quidem hanc rationem nobis ab hinc quinquaginta annis semper successisse, cum ante id tempus, non ita ex sententia eveniret, dum cassiam fistulam ægrotis exhibere consueveramus. Satis ergo fuerit horum siruporum usu humores attenuare, calorem temperare, viresque reficere, concoctricemque juvare ventriculi atque hepatis virtutem: sanguinis aliorumque humorum reprimere ebullitionem. At verò cum ossis fractura certa non est; suspitio tamen est occultam aliquam esse rupturam, aut certè sanguinem è venis effusum, qui corruptus mortem possit afferre. Hanc rem certa quidem experimenti ratione licebit deprehendere pileolo quodam confecto quod ex Berta-

palix

paliæ sententia describemus quamvis ab eo auctore non ita aperitè præceptum sit.

℞. Cere novæ citrinæ, thuris, santali
ana ℥ij.

terebinthinæ, & aceti fortissimi & farina
fabacæ ana ℥j.

Misce ad ignem, & fiat emplastrum, quod extendatur per totum caput, ad instar pilei, capite tamen prius derafo. nam qua parte ruptura in osse super ea parte cerotum diminutum atque exsiccatum invenietur, idquæ trium tantum dierum spatio ostendetur; aliis autem partibus ubi fractura nulla suberit, emplastrum æquale atque uniforme omnino apparebit. Si verò nihil fuerit ruptum, eadem in univèrsum emplastri facies erit.

ANNOTATIO.

Num calvariam pervadant] Multa sumuntur indicia: primo capite à telo sunt petita, nunc à parte in qua insiguntur, ut si in aliqua commissura, si in anteriori verticis parte: hinc & alia præsagia, & curandi modum capit Hippocratis: etenim infirmissime sunt istæ partes minus posticæ, quia os durius, minusque cerebri continent.

Trianguli figuram] Cavendum est ne tempora unquam incidantur, nec locus superior juxta arteriam, quæ per tempora fertur.
siqui-

siquidem nervorum distentio sequeretur : violatis iis musculis, quos in libro de articulis Hippocrates *νεοτραπτας* appellat.

Si Statim vomuit] Hæc leges apud Hippocratem libro septimo aphor. aphorismo 59. & aphorismo 50. libri sexti, multa in coacis prænotionibus, & in libro de Vulneribus capit.

Semel in die carne] Biliosi magis nutrimento egent, minusque jejunia ferunt; apud Hippocratem libro, ni fallor, secundo de ratione victus in acutis, noxæ quæ ex jejuniis accidere solent, recensentur, animi deliquium, capitis vertigo, ventriculi imbecillitas: quæ omnia ibi, & in Galeni Commentario exponuntur.

Purgativum nullum] Etenim cum cerebrum ceteras partes quodam modo contineat, à nulla verò contineatur, aliarum partium redundantias non recipit: non eget ergo purgatione. Hoc addam medicamentum catarticum ab Hippocrate exhiberi, si erysipelate caput infestetur, ac tale medicamentum, quod bilem ducat.

DE CONTUSIONIBUS

Capitis in infantibus. & pueris.

CAP. VI.

Existunt persæpe in pueris septennio minoribus contusiones, aut casu, aut

44 DE CURAN. VULNER.

aut ictu, aut alio quovis instrumento impetive factæ, similes omnino apostematibus, aut iis vitiiis, quæ in æreis, aut plumbeis vasis conspiciamus, ita ut cute illæsa, & posteriori etiam cranii tabula minimè rupta, prior tamen persæpe lædatur. Namque ejus ossis per ætatem teneritudo, aliquando in causa est, ut nonnunquam cranium illæsum, sæpe etiam læsum, & ruptum deprimatur, & pelliculæ cerebrum ambientes rumpantur: quod nos persæpe deprehendimus, ejusque rei exemplum nuper editum est, cum in oppido Llerena Beticæ provinciæ, quadrimus puer nobis curandus fuisset oblatus, quem lignea porta è fenestra decidens, gravissimè percusserat, secundum eam quæ coronalis commissura dicitur, ex quo ictu, utrumque os, atque utraque etiam membrana rupta sunt, atque etiam cerebri pars ter per totum curationis spacium emissa est. Sanatus tamen est puer, citra vulneris manifestationem, & sine ulla ossium jactura, neque ultra vigesimum diem dilata est curatio. Ad hujusmodi autem compressiones, in puerorum capitibus curandas, nulla vulneris majore (quàm ipso casu facta est) manifestatione fuerit opus: & si nullum vulnus factum erit, nihil est aperiendum, quamvis omnia ossa læsa, com-

com
que
mo
con
ide
H
præ
vict
huc
con
scari
nife
tion

Ry. t

ol

o

C
modi
natu
stru
prie
Ry. t

m

la

pe

z

comminutaque esse cognoscantur, atque hæc tutissima ratio curandi in ejusmodi vulneribus erit. Nam quidquid contra quàm diximus, vulgo fieri solet, id certissimum habet periculum.

Hujus autem hæc curationis ratio est, præter temperatum pueri, & salubrem victum, aut saltem nutricis, si lacte adhuc alatur, diversiones aliquas facere conveniet, aut brachia ipsi aut crura scarificanda sunt. Si contusio nullum manifestum vulnus ostenderit, prima curatione hoc remedio utimur.

R̄. Olei rosarum, camomellini ana ℥. S. Sub loco contuso ponatur. Seq. Emplast.
olei myrbini ℥ j.
ovi unius album, cum vitello, cum parte aliqua farine fabarum, & ordei ana, & myrtillorum pulvere ℥ j.

Omnia commodè misceantur, & fiat ad modum emplastri, idque sub contuso loco ponatur. Postera verò die, aliud emplastrum adhibemus; loco tamen probè prius novacula abrafo.

R̄. Sordiciei alvearis apum, vel si id haberi minus possit, cere novæ sordide, & mellis communis pulverizati ℥ j.
lapidis Hematitidis in pulverem redacti ℥. S.
pumicis lapidis, & cymini, & absinthii, & surfuris communis ℥ ij.
Misce omnia ad ignem, & fiat emplastrum,

46 DE CURAN. VULNER.

strum, quod loco depresso imposito, latiore etiam ambitu duorum digitorum; mira enim vis hujus emplastri est, ut intra duodecim dies ossa contusa compressaque tollat: nullumque ad eam rem medicamentum efficientius esse puto.

Quod si præter ossis depressionem, & rupturam, vulnus etiam fuerit, principio ovi albo, & vitello simul agitato curandus est, additis peciis mollibus, atque tenuibus, stupa pulvilis, quibus vulnus tegitur. Postera autem die, utemur balsamo, à nobis in hoc libro sæpe commendato: vulnus autem hoc leviter ex pluma inungendum est; cujus præsentissima virtus, facile hoc in genere etiam perspicietur; mirè enim concoquit, emundat, carnemque inducit: liquefactum autem esse oportet, non nimis tamen, ne quid ægrotus uratur; aut ne quid de medicamenti vi nimio calore decedat. (Illud verò maximè est cavendum, ne quod omnino os extrahatur, quamvis omnia comminuta esse constiterit) filis autem siccis vulnus operiendum est, neque iis nimium pressis. Super hæc verò; id quod modò descripsimus, emplastrum est addendum, calidum quidem illud, quod profectò magna cum curantis voluptate, & admiratione, sine ullo

Hippoc.
lib. de
officina
medici.

ullo
cont
ossa
qui
Poss
& al
jam
freq
ex a
auxi
mult
bus
quos
non
tem
hem
noxe
bem
ris q
vuln
nere
dece
Succ
corpe
tum;
borat
quar
etiam
verò
tus,
ferres

ullo discrimine, omne pus quod intus conficitur, exugit, & compressa quoque ossa brevissimè tollit, in eumque restituit, qui secundum naturam fuerat, situm. Possumus enim tutò affirmare, nobis hac & aliis curandi rationibus, quæ descriptæ jam sunt, per annos plus quinquaginta, frequentissimo experimento usis, semper ex animi sententia successisse, & Dei auxilio, cui nos omnia accepta referimus, multos è maximis & gravissimis vulneribus liberatos, testari possumus, inter quos hactenus novem jam sunt, quibus non exigua cerebri pars perierat. Fecè autem innumeri, quibus prior meninx vehementer fuerat lacerata, ex his autem novem, quos retulimus, prius apud urbem Xeres Pacensis diœceseos, familiaris quidam Joannes Bazzani, qui gladio vulnus in capite acceperat, ex quo vulnere membranæ ruptis, tantum cerebri decessit, quantum duo tritici grana sunt. Successit citissima paralytis, & alterius corporis partis, & linguæ impedimentum, qua usque ad quartum mensem laboravit, ex qua tamen affectione, postquam ex vulnere sanatus est, melius etiam habere in dies cœpit. Secundus verò fuit puer quidam, decem annos natus, mali calce percussus in fronte, ut ferreæ soleæ margine ossa etiam compri-

primerentur. Huic per continuos sex dies de cerebro, quantum lens est, singulis curationibus deperit, atque hinc nihil mali, præter vulnus, est consecutum.

Tertius ex oppido, *Fuentes de Leon*, appellato erat, qui telo obtuso, ex balista jacto, petitus, & capillos, & ossa, & carnem super cerebrum coacta habebat: prima autem, secunda, atque tertia cura hæc omnia extracta à nobis sunt, pulsatione enim ipsa paulatim expellebantur: una verò, & cerebri pars prodibat commissa: in quo rem nobis non negligendam animadverti: id autem fuit quod duodecimo die, molle quiddam, & candidum excrescere intus cœpit instar adipis, quod sequenti curatione ita exuberaverat, ut supra carnem omnem emerit; nos autem hermodactylorum pulverem injecimus, eo modo reductum, coactumque iri arbitrati. Cùm autem tertia curatione supra cutem, etiam nimium excessisse deprehendissemus, ferro rem agere consilium fuit. Igitur forcipe, quatenus cranium æquabat, resecurimus; id autem quod resectum est, nucem juglandem magnitudine superabat; nihil verò neque sanguinis, neque alterius rei secutum est; postera verò die nihil apparebat, sed plana omnia,

nia, bonoque colore constabant. Sannatus igitur hic homo est, sed tamen quoad vixit, morbo regio laboravit; cuius prima accessio septima die fuit, & dum curaretur, alteram & tertiam passus est accessionem.

Supervixit autem usque ad quartum & trigessimum annum.

Quartum autem curavimus in oppido Llerena Marchionis de Falces, qui eam provinciam administrabat famulum: hunc alius ex domesticis quidam æreo petierat candelabro, in coronali ossis parte; omnis autem ea ossis pars, qua vulnus accepit, comminuta, atque super cerebrum fuerat vehementer coacta; opus igitur fuit secunda, tertia, & quarta curatione: ea ossa omnia extrahi oportuit, quæ loco mota, cerebrum graviter premebant, maximè quæ ex inferiori tabula erant, cerebri substantiam continentes pelliculas ruperant, ex quibus duo ossa ita magna erant, ut per vulneris hiatus, magna cum difficultate erui potuerint; ab his autem pelliculæ, & cerebrum ipsum vitiata fuerant, quamobrem singulis curationibus, à secunda, ad quintam usque, ternæ, quaternæque ex cerebri substantia portiones, eæque non exiguæ decesserunt. Interfuit autem dum curaremus, Benedictus Arias Montanus

C

Theo-

Theologus nostras, qui apud nos eo tempore chirurgiam, artis potius, quàm operis causa docebatur: quinque ergo continuis diebus ossa, & cerebri partes prodierunt, quæ pulsatione ipsa pellebantur. Atque hic juvenis gravibus symptomatibus affectus est, dum curaretur; nam dextro latere convulsionem, sinistro verò paralyfim, atque etiam regium passus est morbum. Hæc autem omnia, undecima die aggressa, ad vigesimam usque, cum summo etiam fastidio duravere; post hæc melius habere cœpit: tandem divina ope omnino incolumis evasit. Dum nos Llerenæ (quod oppidum inter Bethicam & Lusitaniam est) publico populi stipendio, chirurgiam, & sacrae inquisitionis magistratus honesta mercede exerceremus, admirandum periculum accidit, apud oppidulum Valverde, decem miliaribus Llerena distans: quod hic referre decrevimus, quòd ejus hominis restituti historiam nemo audire possit, quin Deo auctori, atque unico humanæ salutis præsidi gratuletur. Ea verò res sic habet. Dum operarii quidam prægrandes lapides machinis, & arte in turrem, quæ tunc ædificabatur, tollerent (productum autem opus jam erat, & templum cui hærebat, altitudine superabat) unus ex lapidibus decidens, quen-

quendam eorum qui machinam vollebant, in capite plenè percussit, qua sagittalis commissura est; is autem subito corruit, simulque cum lapide terram attigit: erat autem lapis cubitali latitudine, & longitudine; duodecim verò digitorum altitudine, & pondere quatuor & viginti librarum.

Jacuit autem homo in eodem loco, per horæ dimidium, nihil omnino sentiens: inde autem pro mortuo penè, aut intra horam saltem expiraturo, domum est sublatus. Hic cerebri commotionem passus, tres integros dies non solum sermonis, sed motus etiam expers; movebatur autem ab adstantibus, non secus, ac si mortuus fuisset.

Magna autem ossium pars, depressa cerebro incubuerat; sanguis verò oculis, atque auribus eruperat: caput autem ipsum, & collum tumidum, atroque colore conspiciebatur. Post octavam autem diem, sponte sua apertum est caput, à sincipite, atque ab occipite, & ex altero etiam latere: maturuerant enim jam apostemata: Nos igitur ossa in locum suum restituiimus; membranæ autem inflammationem passæ sunt; tertia die locutus est, imperfectè tamen, & ut commotæ mentis homines solent, apertis oculis, imò & patentibus epilepticorum

more erat: sed nihil omnino videbat, neque cernere cœpit usque ad vigesimam diem, indiesque visu etiam proficiebat. Secundum verò post mensem rectè jam cernere, ut sanus cum esset, potuit, cùm vulnus jam sanatum fuisset. Nam ad vigesimam quintam, plurima ossa remissa sunt. Statim autem è lecto surrexit, tamen tunc rectè ingredi non valebat; atque ita diuina magis, quàm humana ope sanatus est: eualit autem pætis & transuersa tuentibus oculis, qui etiam curatione procedente, quarto mense restituti sunt, rectèque intuebatur: vivit hic adhuc, uxoremque duxit. Nam juvenis tunc erat, oculos verò aliis auxiliis restituumus.

ANNOTATIO.

Quæ de puerorum ossibus tradit, docentur à Galeno sexto methodi medendi.

Ad hujusmodi autem compressiones] Non est ampliandum vulnus, nec aperiendum, nec si integra cute calvaria perfringatur. incidenda illa est: hæc Hippocratis videtur esse mens, atque præter auctoritatem accedit ratio, nam ubi os perumpitur integra cute, calor non expirat, & per se digerere saniem potest, & ossa solidare. quod in fracturis manifestè videmus: fragmenta enim cùm nudata non sunt solidantur. Ex

Ex quo vulnere tantum cerebri] *Qua-
cumque parte cerebrum vulneretur, si telum
aliè infederit (teste Hippocrate) res lethalis est:
apud varios auctores varia euenta, qualia ab
auctore recensentur. Galenus etiam multos
convalescere scribit, quibus telum summam
duntaxat partem attigerat. illud commemo-
randum, quod Smyrnæ in Ionia juvenem sa-
natum dicat; cui telum ad alterum ex anterio-
ribus cerebri ventriculis penetravit.*

DE CURATIONE vulnerum in facie.

CAP. VII.

Vulnera quæ in facie facta sunt,
quam rectissimè à principio sunt cu-
randa; id autem fiet si providebimus, ut
probè acu, & filo commissa, conjuncta-
que labra sint, non pluribus, non paucio-
ribus, quàm opus est, punctis, ita ut caro
carni, cuti cutis aptè cohæreant, nullo
in vulnere orificio relicto, nisi ita ma-
gnum, & profundum fuerit, ut ossa
etiam penetret: cùm enim sic habuerit
orificium reliquisse, flammulamque sub-
didisse expediet, qua noxia omnis hu-
miditas expurgetur, & pus etiam quod
conficitur, cùm magnum, & profun-
dum vulnus est: alioqui verò nullum
pus expectare oportuerit, si rectè cura-
tio

tio fiat. Sæpe autem contingit, ut acu nihil opus sit, quando videlicet vulnera non transversa, sed in longum accipiuntur, quam rem nos sæpissimè præstitimus hoc modo: Fili longi atqui contorti (quale id quo consuere solemus) alterum extremum alteri, ex auriculis innotamus, atque super vulnus ipsum, cuius labra rectè commissa sunt, transmissum sæpe capiti circumdamus, crebris & sese propè contingentibus spiris, donec totum vulnus commissum, cohærensque atque conclusum sit (namque hoc modo vulneris labia aptissimè cohærent) deinde lini quadras pecias, cum ovi albo imponimus, & post septem horas ovi albo ablato, cataplasmata utrinque admoveamus super ipsa fila, quæ ubi exsiccata fuerint (exsiccantur autem intra quatuor horas) acu & filo committenda sunt, ut quantum fieri possit, simul cohæreant: tunc verò alia fila, quæ caput circumdabant, & vulnus committebant, rumpi licet. cataplasmata autem hoc modo fiunt. Albo ovi simul cum aqua rosarum conquassato, pulvis hic additur, & optimè etiam commisceatur, ut moderata constet Spissitudine.

℞. Boli armenici ℥ j. ℞.

thuris, mastice, sarcocollæ ana ℥ ij. ℞.

myrrhæ, aloes ana ℥ j. ℞.

traga-

tragacanti pisti, sanguinis draconis ℥ ij.
farinæ bordei, farinæ fabarum ana ℥ iij.

Misceantur. ex his duo cataplasmata hinc & hinc vulnere admoveantur (distent autem utrinque à vulnere digitum.) Super ipsum vulnus petias ex lino imponimus ovi albo intinctas, quantum est inter cataplasma spaciū, latas, & vitta usque ad posteram diem, nam postera die auferuntur petiæ quas ovi albo intinctas imposuimus, & balsamo illo à nobis descripto, locum ex pluma inungimus, superinducto emplastro tenui ex hoc ceroto quod nobis maximè semper est probatum, ex descriptione Joannis de Vigo.

R̄. Olei rosati, olei myrtini ana ℥ j.

terebinthinæ claræ ℥ ij.

pinguedinis vitulinæ ℥ x.

massichis ℥ j. ℞.

*Vini odoriferi cyathum unum, rosmari-
 vini, mille folii, plantaginis, consolidæ mi-
 noris, centaureæ majoris ana manip. ℞.*
*Bulliant omnia usque ad consumptionem vini: deinde colentur, & cum cera fiat cerotum; malaxetur autem cum vitello ovi; atque hac una curandi ratione si rectè fiat, quatuor aut quinque diebus oris vulnera curantur, nulla cicatrice relicta. Idem efficitur & magno illo unguento basilico, quod à Joanne Vi-
 gone*

56 DE CURAN. VULNER.

gone in antidotario describitur: idem
 etiam ceroto de minio, præstat, dum-
 modo illo nostro balsamo illinatur.
 Quod si necessariò acu, & filo utendum
 sit, eligendæ sunt acus quàm tenuissimæ,
 & filum quod acubus etiam subtilitate
 respondeat; multi enim ex tonsoribus,
 qui vulgo apud nos vulnera curant, so-
 lent iis acubus oris vulnera consuere,
 quæ femoribus consuendis aptatæ sunt,
 & puncta eousque hæere sinunt, quoad
 ipsa sua sponte rupta, carnem etiam se-
 cum rumpant: curant autem eo modo
 quo facta in corpore vulnera curari ab iis
 solent, digestivis atque oleis adhibitis;
 atque ita ex simplici vulnere compo-
 situm reddunt. Vulneribus igitur puncto,
 & filo commissis, lineæ peciæ ovi albo
 conquassato, intinctæ superponuntur,
 atque usque in posterum diem sinantur;
 tunc enim adglutinanda cataplasmata
 sunt, quemadmodum dictum est, & vul-
 nus balsamo ex pluma inungendum, ad-
 dendumque emplastrum aliquod ex tri-
 bus quæ commemorata nobis superius
 fuerunt; deinde vulnus est ligandum.
 Sequenti autem die cataplasma commit-
 timus; consuta, & puncta forfice rum-
 pimus, & balsamo locum inungimus, ad-
 dimusque cerotum: atque hæc omnium
 in univèrsam faciei vulnerum brevissi-
 ma, & certissima curatio est. Con-

Contigit nobis in oppido Frexenal, ut hominem curaremus, cui facies vulnerata ferro fuerat, ab ipso nasi & superciliorum confinio, usque ad utriusque labii utrinque extremitatem, & diductionem: ita ut nasus cum mandibula superiori, ac dentibus supra mentum deciderint, qui autem illi domi abstabant, imprudentissimè se gesserant. nam lineo panno vulnus obstruentes, eam faciei partem quæ dejecta fuerat, sic temerè jacere sinerunt. cum nos vocati accessimus, eam partem; nasum inquam, & mandibulam, jam frigidam, & penè mortuam, depræhendimus, ut acus difficillimè potuerit penetrare; tamen totum locum acu commisimus, atque ut mandibulæ superioris ossa suis ossibus, ut natura fert, interius cohærent. Idque hoc modo: ligavimus vittam duobus digitis latam, fronti circumdedimus, cui ab inferiori parte limbus esset, cui fortiter fila committi possent: ei vittæ duas assuimus alias à sincipite in occiput, & ab aure in aurem, in crucis modum, angustiores illas quidem, quæ tantum latiore illam tenere possent. Hæc ubi parata fuere, acui grandiori filum longum indidimus, atque ex vitta ambiente fila, inter aurem & frontem ligavimus, quod inter primum molarum dentem, & caninum transmi-

simus, atque ad vittam retulimus, quæ frontem cinxerat: deinde rursus dentes è regione petendo, atque hoc modo affuentes, mandibulam cum naribus, simul aliis quibus conveniebat, ossibus commisimus, deinde cutem acu junximus; ita ergo, ut diximus, colligatum tenuimus, quoad membra invicem coaluissent: tandemque divina ope restituumus, ut nullum accepisse unquam vulnus videri posset.

Eadem etiam ratione homo à nobis curatus est, quem taurus petierat cornuque sub mento ab aure ad mandibulam usque superiorem; eam etiam faciei partem aperuerat, quæ sinistrum oculum à naso disjungit, cum cornu extremitas (ut ij qui aderant; maximè autem homo ipse affirmabat) plus decem digitis prominisset: consuimus autem acu locum, qua cornu subierat, & qua prodierat etiam; mandibulam verò ipsam, ut in superiori curatione dictum est, alligavimus, atque exterius quidem juxta præcepti nostri rationem curavimus; interius autem os ipsum frequenter lavari jussimus, decoctione ex hordeo, rosa, balauistiis, & melle rosato etiam admixto, atque ita brevissimè curatus est; multis tamen ossibus è palato deciditibus, quæ cornu fuerant commi-
nuta,

nuta, atque in palato ipso foramen relic-
tum, quantum pollex digitus subire
posset. Ubi autem omnia sana, cutisque
fuerat inducta, foramen illud super cor-
tice levi, affabreque adaptata, lino etiam
circumvestito obturavimus; qua ratione
provisum est, ut & loqui & edere atque
bibere rectè posset. Noctu tamen aufe-
rendum curabat, ne foramen magis ape-
riretur; interdum autem reponebat.

ANNOTATIO.

*Vulnera frontis, & ceterarum faciei par-
tium apud Hippocratem diversam curatio-
nem habent: etenim vulnerum capitis solum
siccantibus Hippocrati & Galeno perficitur:
Galeno potissimum qui cum sexto Terapenti-
ces duas curationes inter se contrarias propo-
neret; Eudemi profectò eligit, qua se usurum
dicit, si in Asia degeret: Hippocratis verò;
nam toto libro de Vulneribus capitis, vinum
rejjicit, nec linimentum, nec cataplasma ad-
hiberi vult. Verùm fronti, aliisque faciei par-
tibus hæc commodè adhibentur, ut apud eos-
dem diligens lector advertet.*

60 DE CURAN. VULNER.
LIBER SECUNDUS

De profundis in pectore
vulneribus.

CAP. I.

Multos perſæpe vidimus, qui penetrantia pectoris vulnera curantes, tamen aut numquam ſanant, aut citiſſimè lethum adferunt, etiamſi lethalia ſua natura non ſint: quòd huiusmodi curationis opus, & rationem à peritis magiſtris minimè acceperint. quod ſi nonnullos ex iis qui huiusmodi patiuntur, vivere contingat; tamen perpetuis fiſtulis (quas vocant) laborare videmus. Hos ubi diu fruſtra medici curaverunt, cavam ex plumbo aut ex argento indentes fiſtulam relinquunt, atque huiusmodi oratione ſolantur: ſe noluiſſe illis locum omnino claudere, quoniam pus intus concluſum, cum non habeat qua parte expurgetur, cum non habeat qua parte expurgetur, mortem certam afferret: expedire autem illis eam fiſtulam ſemper conſervari qua ſordes, vulnerisque excrementa expurgentur, atque hoc modo vitam, quoad Deus conceſſerit, producent, atque ita incuratos dimittunt. Cauſa autem eſt, quòd recens adhuc vulnus curare nesciverint: neque aliud fieri poſſe in ea re putant, quàm quod ab eis fit.

Quam

US
 penes,
 itiffi-
 thalia
 li cu-
 s ma-
 non-
 antur,
 sistu-
 Hos
 ayam
 sistu-
 ora-
 cum
 intus
 parte
 rret.
 mper
 e ex-
 nodo
 odu-
 Causa
 ulnus
 i pos-
 is fit.
 quam

Quam quidem ob rem eam, quam nos in huiusmodi vulneribus rationem tenemus, describere placuit, quaque curamus omnia, quæ ad nos recentia deferuntur, modò necessariò lethalia non sint, qualia ab auctoribus produntur diaphragma & mediastinum penetrantia: hæc omnia manifesti omnibus periculi sunt; à doctoribus autem passim enumerantur: cætera verò omnia, quamvis corpus ipsum perforatum sit, tamen divina ope sanantur, cujusmodi nobis innumera tam recentia, quam ab aliis etiam derelicta, intra quadragesimum diem, ejusdem auxilio sanare contigit. Idem autem cuilibet medico continget, qui rationem à nobis reddendam, modumque sequi voluerit: sive recentia, novaque vulnera, sive antiquiora, ab aliis derelicta fuerint; neque manuum opera ad eam rem indigebit.

Communis ferè omnium scriptorum nostrorum opinio est, vulnera profundo in pectore accepta, incurabilia ut plurimum esse, quorum periculum si quis fortè evaserit, tamen perpetua fistula, aut phthisi laboraturum eum affirmant. hujus autem sententiæ inprimis Vigo est, qui quanquam optimè ea quæ ad curationem pertinent, docuerit, tamen experimentorum, & practicæ defectu

C 7 (cujus

62 DE CURAN. VULNER.

(cujus præcipua in chirurgia laus est) desperatam promittit curationem. Nos autem, Deo opem ferente, certam promittimus, in difficillimis etiam eventibus, etiam pulmone perforato. Curationis autem ratio hæc est. Si vulnus recens fuerit, is qui accepit, nudus in lecto collocandus est: ubi autem vulnus profundum, penetransque esse perspicitur, probè compositus, cruribus distentis, plano que corpore cubare jubeatur, vulnere inferius constituto: ut omnis sanguis quem effundi è vulnere necesse est; extrà manet, neque quidquam cruoris intra pectus residat; fieri enim non potest, ut non ex interioribus venis, atque etiam exterioribus, plurimum sanguinis intra pectus confluerit. Hoc modo igitur constitutus ægrotans cubet, quoad chirurgus ea, quæ paranda ad curationem videbuntur, paraverit: ubi autem omnia præsto fuerint, perspiciat denuò an sanguis effluat: quod si adhuc effluit, sinat libenter, atque tussire interim: interim anhelitum continere jubeat, donec quidquid cruoris intra pectus est, defluxisse omnino intelligat. quod si vulnus magnum est, aut lancea, aut latiori gladio factum, committi acu oportebit, uno aut etiam altero puncto omisso, ut aperti sive orificiî tantum relinquatur, quan-

quantum digitus subire possit, per quam apertionem flammula albo ovi intincta subdatur; sic tamen ut tota non immitatur: erit enim longior, quàm pro vulneris ratione, & cuius pars aliqua exterius emineat. quod si flammula utimur, nullus metus est ut tota intra vulnus inducatur; contrà autem, si lichinus sit: facilè enim à vulnere exorbestur huiusmodi, quale periculum duobus, non diu est, nostratibus medicis, accidit; alter enim imprudenter lichnum crassum, quantus digitus est, intra pectus protrudit, quem nos decimum post diem, non sine negotio & diligentia extraximus, statimque sanatus homo ex vulnere est. Alteri autem malvæ caulis, filis involutus, intra pectoris decidit penetralia, diuque intus latuit, neque quicquam conari profuit, ut extraheretur. Sed fila tantùm, secundum post mensem, extracta vix fuerunt, caulis autem ipse nullo modo educi potuit: profundum enim vulnus nimium erat, orificiumquè secundum furculam habebat: ille ergo ægrotus, multa macie confectus, & omni destitutus virtute perierit. Igitur ubi flammulam subdideris, pecias ovi albo intinctas cum pulvisculis imponito, vittaque rectè ligato. Hoc modo autem curatus, super vulnus ipsum cubet, pulvinis utrinque appositis, ut vul-

64 DE CURAN, VULNER.

vulnus in vacuam, inferioremque partem incumbat, quo omnis sanguis, atque noxius omnis humor eò confluat: atque nullum omnino lichinum induci oportet; ea enim res dupliciter nocere solet, & quòd cruoris exitum impedit, & quòd dolorem ægrotanti affert, atque ejus indendæ frequentia fistulam efficere solet. Flammula autem indita, vulnus semper apertum, quantum satis est, habet, qua noxia humiditas emanet, & neque dolorem affert, neque aërem inde transmittit. Venam etiam secare oportebit, ex adversa primùm parte, deinde ex conjuncta, ut opus esse expedireque medicus intellexerit; ægrotantis etiam virtute perspecta. Exhibere autem & hanc potionem conveniet, quæ sanguinem reprimere, & purgare potest; ea autem manè quatri-duo est illi ebibenda.

℞. *Rhabarbari electi* ℥ ss.

rubie tinctorum mumie ana ℥ j.

terre sigillatæ ℥ ss.

aque scabiosæ buglossæ, & vini granatorum ana ℥ j.

Expedi etiam ejusmodi apozema parari, quo anhelitus, & respiratio corrigatur, faciliorque sit; eadem autem cibus simul medicamentum, & potus est, quo vulnus maximè recreatur.

℞. *Hordei mundi confusi, & passularum*
enu-

enucleatarum ana pug. iiij.

radicium buglossæ ℥ iiij.

liquiriciæ rase aliquantulum contrita

℥ i. ℞.

seminum communium ℥ ij.

Iujubarum numero xx. prunorum subtiliter incisorum numero xv. radicum petroselinii contusi manip. j. fiat decoctio secundum artem in lib. xiiij. aquæ pluvialis usque ad consummationem tertie partis; deinde coletur cum forti expressione, cui adde penidiorum ℥ iiij.

sirup. rosarum, & de duabus radicibus sine aceto ana ℥ iiij.

sachari libram ℞.

cinamomi pulverizati ℥ j. ℞.

Fiat apozema: ex hac autem quarta quaque hora libram bibet, tepidam quidem, si hyems fuerit; nihil autem aliud aut edere, aut bibere toto triduo licebit: triduum autem horis metiendum est; hoc enim & sufficienter alit, & difficultati respirandi medetur, cujusmodi pati solent omnes qui profundum in pectore vulnus habent; reumatum etiam fluxum reprimat, & sanguinem, qui intus remanet, corrigit, atque expurgat. Procurandum etiam quotidie est, ut vel sponte, vel clysterii adjutorio, ventrem exoneret; quarto autem die licebit prandere carnem, aut pulli gallinacei, aut pullæ

pullæ coctam cum petroselini radicibus, addito croco & cinamomo. Vesperi verò passas uvas, acinis remotis, comedet, aut amygdala. A prandio autem, & à cœna aquam bibat, cum petroselini radicibus, & liquiritia & cinamomo decoctam; interdiu autem nihil omnino bibat.

Secunda autem curatione ita perficitur: ex tenui lino stammula paretur, qualis illa prima fuerat, quæ prima curatione indita est. hæc autem illo à nobis sæpe repetito balsamo liquefacto intincta in vulnus indatur: id enim medicamentum concoquere, & carnem inducere compertum est. Inditur autem quoad carnis soliditas pertineat; porta quadam exteriori eminente. Super hoc autem emplastrum basilicon, ex descriptione Joannis de Vigo, aut Gratia Dei, circa vulnus aut ipsum defensivum in lino extensum adhibeatur: foramine tamen facto, qua vulnus est, ita ut defensivum à vulnere, undique tribus, aut quatuor digitis distet. Fiet autem ex rosaceo, & aceto, & bolo armeno, atque ita singulis diebus semel curetur, quoad satis puris confectum fuerit. Nam postera die pus erit, idque bonum: quinta autem, ac sexta plus etiam erit: tunc autem bis, aut ter, aut etiam sæpius in die curandum est. prospicere autem oportet, ut ægrotus, quoad fieri possit,

possit, commodissimè, & diutissimè in
 vulnus ipsum incumbat, quo pus ex-
 trà promanet. *Nullo verò pacto permit-
 tendum ut lichnus indatur; namque hujus-
 modi perpetuas, in his vulneribus, fistu-
 las moliantur.* Ubi verò carnem vulnus
 induxerit (Id autem decima aut ad sum-
 mum duodecima continget die) nihil
 omnino, neque flammula, neque aliud
 quippiam est indendum: sed in tantum
 emplastrum adhibere convenit quo fue-
 ris à principio usus, aut emplastrum
 minii, quale Joannes Vigo describit, id-
 què sæpius in die est abstergendum, ne
 pus nimium redundans intus penetret.
 Demùm ubi nihil jam puris excreatum
 sit, caroque jam aucta fuerit, aluminis
 usti pulvis adhibendus est, cicatrixquè
 jam est procuranda. Signa quæ ab aucto-
 ribus observanda traduntur, quibus mor-
 tis, aut liberationis fieri judicium possit,
 in iis qui vulnera in pectore profunda
 acceperint, hujusmodi sunt: In primis
 post tertium diem, à medico observan-
 dum est, an difficulter etiam ut antè respi-
 ret. Nam si aut æquè difficilis, aut diffi-
 ciliior etiam respiratio sit, lethale id est:
 sin aliter, bonum, & bona prædictione
 dignum. Atqui affirmare possumus, nul-
 lum qui hoc modo curatus fuerit peritu-
 rum, etiamsi pulmonem ipsum perfora-
 tum

tum habeat, nisi vulnus cordi proximum, aut in ipso corde sit; ea enim res citissime mortem affert. Deinde si ii qui hoc modo habent, intra tertium diem convulsionem, aut tremorem cordis patiuntur, iis mors prædici potest.

Si in primis diebus ubi apozema jam ebiberit, eveniat, ut ex vulnere copiosior, quàm antea, puris portio defluat, signum est vulnus ad fistulam tendere, ægrotumque ipsum ad phthisim perducere. id etiam periculum est, cum intra pectus ex vulnere cruor defluerit. Namque is cruor ubi ex venis emanaverit, concrefcit: deinde in aquosum colorem, & substantiam corrumpitur, & qualis aqua, ex elutis carnibus, relinquitur; inde autem magna erumpit copia, cum gravitate, etiam fœtore, anhelitus etiam gravis, & teter ipsi ægro est: aqua verò ipsa purior in dies promanat: huiusmodi etiam ad fistulam tendit, atque ad certam mortem, nisi opportunè fuerit provisum. Quid autem in huiusmodi eventibus sit agendum, in eo loco in quo de penetrantibus in pectore fistulis, docebimus.

Si in primis diebus ad quartam usque ægrotus graviter, aut pectore aut tergo doleat: facillè huic malo occurreretur ad-moto emplastro, quale à Joanne Vigone certo capite describitur, cujus quamvis
in

in multis quæ curavimus in pectore vulneribus, rarus admodum nobis fuerit usus; certus tamen, & præsentissimus est cognitus. Semel enim contigit hoc uri, cum in oppido de *Fuente de cantos*, juvenem quendam curarem, qui duabus sagittis fuerat fauciatus, in dextrum latus per cavum à pectore ad oppositam tergoris partem trajectis, atque utrinque prominentibus; aded autem vehementer homo angebatur, ut jacere nullo modo posset: sed in lecto sedebat; cruribus tamen extrà ad terram usque pendentibus. hujus autem emplastris & descriptæ à nobis apozemæ auxilio, & venarum etiam sectionibus, ante tertium diem meliùs ex illis doloribus, & quietis carentia habuit, atque succedente, ex animi sententia, curatione vigesima die sanatus omnino est. Emplastrum autem ejusmodi est.

℞. *Camomillæ, Meliloti, anethi, absynthii*
ana manip. j.

fursuris triturati, pug. ij. ℞.

farinæ fabarum, farinæ hordei, farinæ
lentium ana ℥vj.

rosarum pug. j.

omnibus trituratis & cum sapa sufficienti

& parum vini albi, fiat ad ignem em-
plastrum solidum: addes autem olei ro-
sarum ℥. ij. ℞.

olei

olei camomelini anethini, singulorum ℥ ij.
cera ℥ ij. ℞. croci ℥ ij.

Locum in quo curandus est, calidum esse oportet, cubiculi ostio clauso, & velo ante ostium extenso, intra cubiculum incensi carbones. Malum est enim vulnera profunda, penetrantiaque frigido aëre tentari. Agendæ autem nobis Deo gratiæ sunt, quod plures hac ratione curaverimus, quàm enumerare facile sit, ex quibus unus fuit in oppido Calzadilla, qui ense à tergo trajectus est, sinistro latere secundum spinam; ensis autem tribus digitis infra sinistram mamillam plusquàm duobus palmis prominuerat: acceperat etiam homo duo in capite vulnera, quorum alterum ad duram usque matrem pertingebat. Alium etiam curavimus in oppido Cumbres baxas, atque is sagitta helleboro intincta fuerat sauciatus, sinistro latere quatuor super mamillam digitis; eminuit autem telum à tergo inter costas mendosas nuncupatas, secundum alterum lumbum, inter secundam & tertiam costam. namque ex altiori loco fuerat petitus. Hic autem hoc modo à nobis est curatus, ubi vulnera conspeximus, veneni averitendi causa hanc exhibuimus potionem.

℞. Cassiæ lignæ, aristolochiæ rotundæ ana
℥. ℞.
anisi piperis ana ℥ j.

℞.

Terantur cum modico vino, & exhibeatur poculum. statim verò utraq; parte, quæ telum subierat, quaq; prodierat, ignitum cauterium admovimus datilari dicto instrumento: deinde etiam duobus alteris gladiaribus cauteriis, quæ parata nobis ad ignemque admota fuerant, ab illis ad humeros usque, undique à tergo, à pectore ultra ducenta vulnera, scarificationum modo fecimus, invicem digiti spatio distantia. Namque tota hæc corporis pars, veneno tentata intumuerat jam, & pulmonis instar emollita erat: hæc ubi expedita sunt, parato jam nobis emplastro, totum pectus, & terga: qua viri vis pertingere videbatur; quaq; igni à nobis fuerat cautum.

Rx. Milii aliquantulum tostii ℞ j.

farine fabarum ℞ ss.

furfuris triturai ℞ viij.

camomille, meliloti, aneti aliquantulum triti ana m. iij.

coriandri, cumini ana ℞ ij.

ex omnibus cum sapa sufficienti fiat emplastrum solidum addendo olei camomelini, anethini ana ℞ iiij.

olei laurini & rutacei ana ℞ ij.

Hoc emplastro per triduum usi sumus: quod quoties amoveremus, exuctæ ex scarificationibus aquæ pallidi coloris latis largam copiam abstergebamus. toto autem

autem hoc triduo, ægotus gravissima symptomata, atque animi deliquia patiebatur: interdum etiam rabidorum more, vestes, culcitasque dentibus appetebat, & furiosus, irrequietusque, toto volubatur lecto; tanta illi ex veneni vi anxietas, tanta acerbitas erat. Principio autem apozema homini propinavimus, atque eo ad quartam usque diem fuimus usi, ut nihil præterea aut cibi, aut potus exhiberemus.

R. Hordei mundi contusi, passularum enucleatarum contusarum ana pug. iiij. radicum lingue bovine ℥ iiij.

liquiritiæ rasæ aliquantulum contritæ ℥ j.

℞.

seminum communium ℥ ij.

seminis citri ℥ j.

piperis, cassiæ lignæ, castorei ana ℥ j.

vini granatorum ℥ j. ℞.

jujubas num. xx. prunorum subtiliter incisorum numero xv. radicum petroselini contusi m. j. fiat decoctio secundum artem in lib. xv. aquæ pluvialis usque ad consumptionem tertiæ partis: deinde colentur cum forti expressione, & addantur penidiorum ℥ iiij.

sirup. rosarum; & de duabus radicibus absque aceto ana ℥ iiij.

cinamomi pulverizati ℥ j. ℞.

sachari rubei ℥ ℞.

Fiat

Fiat apozema. Post quartam ægrotus quievit. Nos autem virtutem magis ac magis firmabamus, jure avium exhibito, in quo anisum, cassia lignea, petroselinique radices, decocta erant. Vulneta etiam ipsa melius in dies habuere, ita ut ad vigesimam ferè diem, salutari Dei ope restitutus, omnino fuerit.

A N N O T A T I O.

Interna thoracis vulnera inter se differunt; prout magis, aut minus gravia fuerint. Quædam enim sunt cum internorum viscerum noxa: quædam illis illæsis insiguntur, atqui hæc aut in anteriori parte fiunt, aut in posteriori: unde etiam medicus sua præfagia capiat, necesse est. Quæ enim vulnera in posteriori parte sunt; magis sunt periculosa, & lethalia ob multitudinem à vertebri manantium nervorum, nec non spinæ, & diaphragmatis propinquitatem.

Communis omnium scriptorum] Quæ vulnera interna viscera ledunt, plerumque deplorata Græcis auctoribus, & Latinis recentioribus judicantur. Verùm tamen alia aliis magis minusve periculi in se habent; corde leso vivere nullo modo quis potest: pulmone vulnerato, potest quidem: at nisi triduo vulnus coalescat, credit Galenus, hos tabidos evadere, lib. quinto methodi medendi. si diaphragma

D

suis-

faucietur: jam febris adest continua, phrenesis (undo *opéras* antiquis medicis dictum fuit) convulso, & peripeumonia, quia suppurati intereunt.

Curationis autem ratio hæc est] Duplex est chirurgorum opinio: sunt qui vulneris oras statim conjungi, obturarique volunt, ne cor aëris frigiditati exponatur, & ne vulnere aperto vitalis spiritus exhauriatur: alii auctoris nostri sequuntur methodum.

Perpiciat denuò an sanguis effluat] Optimè vult auctor sanguinem in thoracis capacitatem receptum effluere; alioqui ibi collectus, peripeumoniam hominem redderet. Hæc est Hippocratis mens libro de *Hulceribus*, à Galeno exposita 4. methodi, quæ auctore tradit, ratione ad virtutem habita intelligenda sunt: nam si ea largiori hemorrhagia labefacta-
retur; tunc reprimenda certè est.

Petia ovi albo intinctæ cum pulvisculis] Pulvisculis non (ut ita dicam) restrictivis, alioqui sanguinem ad cordis regionem impelleres, atque ita suffocares, ut adnotavit *Albucaasis*.

Sanguinem reprimere] Bene addidit (reprimere) nam si de acervato & concreto sanguine in thorace metus sit, plurimum aciei cum aqua ægro potui dandum, ut ait *Galenus*.

Signa, quæ ab auctoribus observanda traduntur] Multa sunt, quæ ab auctoribus scribuntur signa, ut quæ ex loci positione, aut
ab

ab ipsa excreta substantia sumuntur: Verbi gratia; num dextero lateri; num sinistro inflatum vulnus sit; si cruor qui è vulnere fluit niger sit, & copiosus; si albus & tenuis, spumofus: præterea anhelitus difficultatem advertunt, & num per vulnus spiret considerant, auctor *Albucasin* sequitur.

Si primis diebus] Si adhibitis ex arte præfidiis melius non habeat, saniesque copiosior sit; signum est ex pulmone saniem in thoracem fluere, & *empyema* efficere: vide *Æginetam* capite de *Tabe*.

DE CURATIONE
fistularum quæ in pectoris male curati vulneribus perpetuo relinquuntur, ex quo fit ut phthisi & hectica febre ægri laborent.

CAP. II.

HUJUSMODI fistulas, à multis ex nostratibus chirurgis ac exteris desperatas, atque illarum ea, quæ apud auctores leguntur remedia, imbecilla omnino esse, deprehendimus; nullas tamen ad nos abhinc quadraginta annis allatas fuisse invenimus, quas cum magna Dei salutaris laude facile non curaverimus. Nos enim hujusmodi affecti, multi etiam ex Italia, & Gallia, atque ex omnibus Hispaniæ provinciis, petiverunt, quibus

ex acceptis in præliis vulneribus, in hanc
difficilem fistularum naturam occalluc-
rant, ex quibus etiam copiosæ, atque per-
petuæ puris promanant fluxiones, tum
ex vulnere ipso, tum ex ore etiam. Hos
autem continuæ febres, perpetuaque ma-
cies comitatur: tota autem hæc affectio
nullo ferè ægrotantis labore, atque exi-
guo medici negotio, quadraginta diebus
curatur, atque in bonam omnino valetu-
dinem, fortemque habitus consistentiam
mutatur. Declarat autem & id oris color,
& corporis obesior etiam habitudo. Ne-
que verò ea res nos turbare possit, quòd
copioso fluxu penè virtus exhausta, aut
quòd os aliquod in costis corruptum es-
se, exploratum sit: etenim si id commo-
dè extrahatur, facillimè, atque citissimè
ulcera ipsa carne inducta, restituentur.
quod si nullum os corruptum sit, nulla
alia re opus est, nisi ut ulcus emplastro
admoto curetur, nigro, aut nostro fulvo,
sive leonini coloris, aut utroque, unà
commixto: id autem ægrotus ipse sibi
sæpius abstergendum curabit, atque hoc
modo ulcera sanantur; interiorum au-
tem locorum hujusmodi curatio est.

Purgando in primis nobis ægrotò si-
rupus ille tribus, aut quatuor diebus ma-
nè ebibatur.

R̄. *Sirup. rosarum ex infusione & mellis ro-
sati colati.* ℥j. aque

aque scabiosæ ℥ iij.
deinde huiusmodi exhibeantur pillule.

℞. massæ pillularum aggregatarum, & de
agarico ana ℥ ℥.

acuantur cum diagredii ℞. iij.
& formentur v.

Vbi jam verò purgatus fuerit, hoc apozema
paretur.

℞. Polipodii quercini probè contusi ℥ ij.
vel iij.

radicum helenii contusarum m. ij.

hysopi, capillorum veneris recentium, li-
quiritie secundo pulverizate ana m. ij.

folliculorum senæ p. j.

epithimi ℥ ℥.

passularum enucleatarum benè contusa-
rum p. iiij.

fiat decoctio secundum artem in lib. xij.

aque, quoad remaneant ℥ viij.

deinde colentur forti expressione; colaturæ
autem addatur sacchari rubei ℥ ℥.

mellis communis ℥ j.

Bulliat parum & spumetur: ex hoc au-
tem tepido singulis diebus manè uncia
duodecim bibantur: vesperi etiam tan-
tundem. ubi autem totum decoctum
consumpserit, duabus illis, ejusdem ge-
neris, pilulis quod concoctum fuerit
purgabitur. postera verò die ac deinceps
ejusmodi decocto utetur, ex ligno san-
cto, quod vulgo guayacum vocatur, fa-

brorum, asperiori lima probè derafo, & in pulverem velut redacto; uncias octo fumito ex ejusdem ligni cortice, non eo quidem qui ligno adhæret (namque hujus virtus à ligno ipso exsucta, atque exhausta est) sed ex eo qui seorsum à ligno secretus, ex Oceani novo orbe asportatur, ζ x. probè contusi, & cribro decussariore, addito etiam anisi pugillo, alteroque seminis lactucae & liquiritiae contusae ζ ij. idque in ollam nitro interius obductam dimidia arrobae Hispanicae capacem injiciatur, cum vini albi veteris, ac generosi poculis duobus, quae veterum medicorum mensura lib. viij. sunt tantundem etiam aquae usualis addatur, & per diem integrum, hoc est, horarum viginti quatuor, macerentur; deinde lento igne coquantur, quoad tertia pars fuerit absumpta; in ipso autem ultimi fervoris articulo rosarum recentium vel ex siccatarum pugillum conjicito, atque hermodactylorum in pulverem redactorum, atque in ipso mortario eadem decoctione solutorum ζ j. in eandem ollam effundito, simulque ab igne removeantur; ubi parum una ebullitione ebullierint. operculo autem rectè obducta omnia, quoad frigerint, finito, ubi frigida fuerint, colentur: id verò quod primum effusum fuerit, purum atque defecatum,

Hoc
est lib.
12. cum
dimidio.

80 DE CURAN. VULNER.

dies temperantius, ac parcius agere omnino curandum est; facile namque perferri poterit triginta dierum abstinentia, neque ideo debilior evaserit: namque decoctum satis ipsum alere, & nutrire, imò & pinguedinem inducere valet, quanquam solis passulis utatur; quamvis etiam febre continua, aut hectica laboret; *omnino autem alio potu interdicendum fuerit*: neque verò si in primis diebus insuavius videatur, molestè id ferendum est: nam tertio, aut ad summum quarto die, id suavius jam experiri licet, & nulli àlii quantumvis generoso vino posthabendum. Igitur omnem victus rationem medici consilio permittimus: dummodo illud animadvertatur, magnam scilicet, in hac potione, ad alendum inesse vim: etsi maximo alias fastidio ægrotus teneatur, vehementer cibi excitari appetentiam. Peractis autem triginta diebus, bis per diem carne vesci, ad 40. usque licebit. Opus etiam erit, ut triginta primis diebus continuis in lecto cubet. quod si tandiu perferre non possit, serenis & calidis diebus, tertia ante meridiem hora, surgat; vesperti autem, ante cubet, quàm potionem biberit, & vestibus stragulis quàm commodissimis frigus prorsus arceat: cubile autem clausum semper esse oportet, lucernamque ardere, ut calidus locus

locus conservetur, & velo ante cubilis ostium extenso, frigidus aër subire prohibeatur. Nullo autem alio cibo uti permittatur, si modò sanari cupiat.

Ipius verò fistulæ curatio emplastro in lino, aut arietina pelle extenso, atque imposito, perficitur, quod tamen sæpius per diem oporteat abstergi; id enim antiquis ulceribus mirum in modum prodest: id verò hujusmodi est.

*Rx. Cerussa & Lithargyri ana ℥ ij.
olei communis antiqui & aceti fortissimi ana ℥ ss.*

Bulliant lento igne baculo interim agitata, quoad in punctum ceroti coalescat. Hujus ceroti, vel tantilla portione in lino extenta, ulcus sanabitur, quam ægrotus ipse sibi sæpius per diem abstergat. Hoc igitur modo curatus, qui hujusmodi passus fuerit, sanus optimeque affectus, & obesior etiam evadet; quamvis diuturna tabe, quamvis & hectica febre, aut phthisi consumptus fuerit, omnibus etiam membrorum omnium, organorumque nutritivorum, spiritualium, & animalium facultatibus, rectissimè si unquam alias habeat.

A N N O T A T I O.

Fistula, quam οὐρηξ Græci vocant, nomen ab arundineis fistulis capit, ut ait Ægineta:

gincta : est sinus qui callo obductus durusque temporis progressu factus, cum sibi subjectis conglutinari non potest: ut Galenus ait libello de tumoribus præter naturam. magna ex parte ex abscessu parum feliciter curato oritur: fitque in omni corporis parte, quarum qualibet sua propria habet symptomata: ut apud Celsum est videre, & Aëtium lib. 14. Auctor eas solum proponit curandas, quæ ex malè tractatis in pectore vulneribus oriuntur.

Quod si nullum os] Expedita curatio est in fistula simplici, recenti, intra carnem: contra si fistula, vel os, vel cartilaginem, vel musculos læsit, si articulum occupavit: si vel ad vesicam, vel ad pulmones, vulvam, vel ad grandes venas, aut intestina penetravit; semper enim periculosa est, sæpe lethalis, ut Paulus ait lib. 6. cap. 78.

Ex ligno sancto] Hæc curatio jam approbatata est, & à Tagautio tradita: & non injuria certè. Hoc enim ligni genus manifestam desiccandi vim habet, putredini particulari beneficio resistit, & roborandi insigni pollet facultate: qui omnes scopi queruntur in sordido, putri, diutinoque ulcere qualis fistula est.

Ipsius fistulæ curatio] Topica remedia plurima sunt, quæ ex Galeno, Paulo Aëtio Celso peti poterunt. adnotabo Hippocratem scribere libro de Fistulis, seseli radicem fistulis impostam earum callos eximere, quod Pau-

Paulus Spondilii radici tribuit.

Hectica febrī & phthisi] quod sit utriusque discrimen, norunt qui medicinam salutarunt: addam febrim ad phthysim esse epigynomenam, seu consequentem atrophiam ad marasimum, ut Galenus lib. de Marasmo adnotavit. Quae praeterea auctor pollicetur, à nemine promissa vidi, nec legi. Omnes enim à corrosione natam talem insanabilem statuunt, ut dixit Hippocrates libro de Glandulis, & Galenus quinto methodi ita ait: nisi tertio die haec curetur affectio, deploratam reddi.

Apozema ad vulnera pectoris & pulmonis, & ad tabidos.

℞. Hordei mundati contusi, passularum mundatarum contusarum ana p. iiij. radicum breglossae contusae m. iij. glycyrrhizae rase modicè contusae ℥ j. ℞.

cardui benedicti m. ij. seminum communium ℥ ij.

jujubas numero xx. Pruna tenuiter incisa numero xv. Radicum petroselini contusarum m. j. decoquantur secundum artem in lib. xiiii aquae pluviae usque ad consumptionem tertiae partis; & fiat colatura cum forti expressione; cui addantur penidiorum ℥ iij.

Syrupi rosati, Syrupi de duabus radicibus sine aceto ana ℥ iij.

facchari ℞. ℞.

cinamomi ℥j. ℞.

Et fiat apozema. De quo capiat singulis diebus summo mane ℥xij.

Et totidem vespere, quousque totum absolvatur. illud animadvertendum est, quod quotiescunque ebibendum est, fiat apozematis in vase commotio & agitatio, ut quod in fundo resederit, misceatur. Apozemate ebibito illi noctu exhibeantur pilulæ duæ è massa aggregatarum, ut quod commotum est & concoctum, evacuetur. Pro sequenti die parata habeatur aqua altera, cum qua omnino sanabitur, & habitum corporis optimum recipiet. Illius præparatio talis est.

℞. Ligni sancti, id est, guajaci ℥ viij.

corticis ejusdem ligni ℥x.

feminum communium ℥i. ℞.

glycyrrhiza rasæ modicum contusæ ℥ij.
passularum mundatarum contusarum pug.
ij, decoquantur in 12. libris aque, & totidem vini optimi ad tertias: tunc adde hermodactylorum ℥ij.

optimè contusorum, & eodem decocto dissolutorum paulisper interim bulliant, & ab igne amoveantur; atque eo modo relinquuntur usque in diem proximum: tunc summo mane fiat colatura prior purioris aquæ, quæ in vase aliquo seponenda est; hæc enim pro potu in prandio, & cœna exhibenda est. Illius verò quod superest
cola-

colatura cum forti expressione fiat, & in vas aliud seponatur: de hac enim summo manè uncia 6. ægro bibendæ sunt, & totidem vespere duabus horis post meridiem. priori pro potu utetur in mensa. Ut autem ea quæ secundo paranda est aqua majorem vim habeat: fæcibus quæ ex priori decocto supersunt, aqua affundenda, & decoquenda ad ℥ ij. consumptionem colo transfundatur: huic enim colaturæ vinum addendum erit, pro secundi decocti præparatione. Dum æger decoctum hoc bibit, pane & passulis vescatur ad dies octo & plures, nisi debilis sit: aqua enim hæc multum nutrit; deinde singulis diebus in prandio carnibus vesci poterit; in cœna passis contentus sit usque ad diem trigesimum: deinde bis in die carnes comedere poterit ad diem usque quadragesimum. Si hyems sit, usque ad diem trigesimum cubiculum egredi non debet, quod optimè clausum sit; & igne calefactum. Hoc remedio tabidi sanantur, & qui fistulis in pectus penetrantibus laborant.

DE CANCRI IN

mamillis foeminarum contin-
gentis curatione.

CAP. III.

CAncri foeminis maximè accidunt ,
iis præsertim , quæ aut natura , aut
electione steriles sunt , cujusmodi sunt
moniales , aut alias continentes mulieres
quæ cœlibem vitam agunt : accidunt
etiam & viris , sed id rarius. Horum au-
tem curatio digna nobis visa est , quam
hoc in libro scriberemus , quando iis , qui
rectè noverint , facilior multo est , quàm
antiqui auctores credidere. Unde illud
omnibus serè nostri temporis medicis
passim decantatur : cancrum occultum
non curari omnino. quod si curandus sit,
palliatiua quam vocant , curatione uten-
dum censent ; non autem abscindendum
esse. id quod si de cancro exulcerato præ-
ciperetur , rectè quidem dictum fuisset ;
namque huiusmodi cancris exulceratis ,
palliatiua tantum curatio confert. Nam-
que aliter si curentur , maturius , & cer-
tius omnino periculum timeri necesse
est ; adhibitis enim medicamentis , cele-
rior multo corrodi , absumique solent ,
maximè si corrosiua admoveantur reme-
dia , aut quouis modo sanguinem ex illis
effun-

effundi contingat: cæteros verò qui ul-
 cerati non sunt, curare non ita difficile
 est, atque isti opinantur, qui nullam
 cancerorum omnino curationem descri-
 bunt, aut præcipiunt; neque quomodo
 extrahi possint dicunt, cum tamen ex-
 trahi omnino integri, sine ullo periculo,
 possint, quantumvis magnos esse con-
 tingat. Quæ autem ab auctoribus cura-
 tio cancerorum omnium præcipitur, cu-
 jus omnis circa resolutionem intentio
 est, ea inefficax omnino est, quam nos
 sæpissimè vanam experti sumus, quan-
 tumvis diligentes in ea paranda, variis-
 que resolutivis exercenda, fuerimus;
 qualia remedia & à Vigone, & à Celso,
 Guidone, aliisque auctoribus præcipi-
 untur. Quam ob rem quemadmodum
 hujusmodi cancri, citra noxam, & ex-
 trahi, & curari omnino possint, commu-
 nis utilitatis causa scribere placuit. Ea
 autem brevissima agendi ratio est, quam
 docebimus: primùm de curatione inte-
 gra cancerorum, qui exulcerati non sunt:
 deinde etiam eorum, qui exulcerati fue-
 rint, optima palliativa cura differemus,
 qua nos plures viros, & foeminas diu
 produximus, atque ne ea causa perirent,
 cavimus diligenter, imprimisque homi-
 nem quendam sacerdotem ultra vigesi-
 mum etiam annum hoc curationis gene-
 re

re ita conservavimus, ut antequàm diem clauderet extremum, omnino sanus esset obiit autem annorum plusquàm 80. Principio hujus affectionis signa certissima ipsorum cancrorum incrementa sunt; ea enim primum producta, ciceris magnitudinem non superant: uno autem, atque altero, & pluribus etiam annis grandiora, & ad tactum duriora fiunt.

Sunt & alia signa ab auctoribus tradita quæ ex ipsis libris petere licebit.

Galeno
4. me-
tho. Cel-
so pró-
prio ca-
pite.

Igitur ubi cancrum excindere volumus, ipsum in primis affectum corpus purgatione præparasse oportuerit sirupis, per quatuor, aut quinque dies exhibitis, quorum ad atram, aut adustam bilem concoquendam probata natura sit (ex his enim humoribus malum hoc enascitur ac coalescit) deinde purgatio est adhibenda, quæ cum affectione. & hominis natura optimè convenire judicabitur. Tertia à purgatione die, secunda, aut tertia hora à prandio duorum ovorum vitelli unà cum albo probè agitata sunt: addito si placuerit rosaceo modico. Præsto etiam erit magna lichinorum copia ex tenuissima lini stupa comparatorum; præterea, & pulvisculi cum vitta, quinque digitos lata, & gausapis quoque bona pars paretur, atque etiam acus femoribus consuendis idonea, cum
fatis

fatis
verè
citrè
tem
chia
con
dun
hon
tine
flex
à ci
tem
Car
tur
lam
ipso
fue
iis r
dat
rit,
hen
cul
ape
dei
mo
me
gui
loc
cor
tin
tere

fatis tenaci filo, eodemque duplo: ipse verò homo, aut in pulvinis, aut in culcitra resupinus collocetur: utrinque autem duo alii homines sint, qui illius brachia firmiter contineant: ne ipse sibi, contra nitendo, impedimento esse possit, dum curatur. Chirurgus verò imminet hominisque crura suis ipse cruribus contineat, genibus supra culcitram ipsam flexis, & firmis: homo autem superiori, à cingulo, parte nudus esto: linteum autem utrinque sit, quo sanguis defluat. Cancer autem ipse manu apprehendatur, qui si contra ipsius mammae papillam erit, sapienter est divertendus, ne ipsa pereat excisa. quod si versus axillam fuerit, divertendus etiam est, ne quid ex iis musculis, qui ex axilla oriuntur, lædatur. ubi verò ita rectè constitutus fuerit, manúque sinistra firmiter comprehensus, tantum cutis acutissima novacula aperiatur, quantus cancer ipse est. apertio autem in longitudinem fiat, deinde ex altero canceri latere, caro commota abscindatur, & separetur: ita tamen ut cancer non feriat. quod si sanguis erumpat, globulo ex bombyce facto locus opplendus est: quem, si id fieri conveniat, alter eorum qui brachia continent, digito comprimat, atque ex altero etiam latere carnem à cancro separet.

ret. hæc autem operatio celerrimam Chirurghi postulat expeditionem, cum summa tamen diligentia, ac sedulitate, atque maturitate conjunctam, ne quid temere peccatum sit. Ubi autem utrinque cancer detectus, à carneque separatus sit, acu, filoque medius transfigitur, filumque ipsum alteri filo innodatum, alicui eorum qui adsunt committatur, à quo contentè sublata manu tenendum est, atque hinc & hinc contra eam partem, qua Chirurgus secat, divertendum. ubi verò ex utroque latere probè fuerit à cætera carne cancer separatus, inferiori ex parte penitus est abscindendum, idque quam fieri possit expeditissimè, digitis admotis, ut totus cancer abscindi sentiat, nihilque ex eo penitus relinquere: hoc verò commodissimè fieri solet gladiolo illo, quo Italici chirurghi ad tumores aperiendos utuntur, cujus figura scarificatorio gladiolo persimilis est: aciem autem utrinque acutam habet; utendum autem curva acie, cuspidemque acutissima; namque illa pars commodius ea quæ inferiora sunt resecat, idque nullo erumpentis sanguinis, aut alterius rei nocumento fit, adèd autem celerem operationem esse volumus, ut plus in trahendo cancro, filoque colligando, quàm in eodem penitus eruendo moræ sit: nam-

nam
pler
deb
quã
etur
intu
dun
dun
rint
dilig
ovo
miu
que
nim
pon
tinè
ben
gest
stro
mu
effie
fit,
nim
tim
ipsu
ca n
rit,
con
balt
vul
bit

namque hujusmodi abscissiones fœminis
 plerunque contingunt ; quibus natura
 debilior , animusque magis dejectus
 quàm viris est. Cùm abscissum extra-
 ctumque penitus fuerit , ne quid ex eo
 intus reliqui sit , diligenter est perviden-
 dum , adeò autem durum est , ut metuen-
 dum hoc rarò sit. Hæc ubi expedita fue-
 rint , sanguis omnis qui in vulnere fuit ,
 diligenter abstergatur , ac mox lichini
 ovo intincti indantur ; ita tamen ne ni-
 mium compressi dolorem augeant : ne-
 que enim totus locus opplendus densa
 nimis lichinorum inculcatione est. im-
 ponendæ autem stupæ eodem ovo in-
 tinctæ , pulvillique , & vittæ sunt adhi-
 bendæ. Postero verò die eadem hora di-
 gestivo curabitur , aut balsamo illo no-
 stro , cujus magna ad concoquendum ,
 mundandum , carnemque inducendam ,
 efficientia est ; id pluma leviter unguendo
 fit , additis etiam filis siccis , non tamen
 nimium compressis , ut caro ipsa paula-
 tim coalescat , & sese committat : circa
 ipsum verò vulnus , superquæ , atque cir-
 ca mammam , defensivum addi oportue-
 rit , ex rosaceo , cera , & bolo armenico
 confectum. ejus autem quod diximus
 balsami usu quam citissimè emundabitur
 vulnus , caroque inducetur , atque sana-
 bitur. Super balsamum autem empla-
 strum

92 DE CURAN. VULNER.

strum basilicon, lino extensum imponimus. tandem ubi satis jam inductæ carnis erit, cicatrix filis siccis impositoque basilico, aut leonato dicto emplastro procurabitur, aut ex gummi elemii emplastro composito: quodcunque autem sit, sæpius per diem abstergendum. exulceratis autem cancris nulla alia præter palliativam curatio est: nam quidquid adhibueris, vehementer nocueris. nostra autem in hoc genere huiusmodi curandi ratio est, ut qui hoc malo infestatur, certis quibus commodum videtur temporibus, in anno purgetur; deinde per singulos menses binis aut ternis pillulis atram bilem purgantibus utatur noctu sub ipsum cubandi tempus; eæ autem aut ex fumaria commodissimæ sunt, aut ex helleboro, aut lapide lazuli, aut epithimo, aut fætidæ, aut eæ quæ ex nitro ab Alexandro Traliano descriptæ sunt; his enim corpus purum conservatur, humorque ipse minuitur, potius quàm augetur. In vulnere autem ipso unguentum pompholigos ponimus, aut illud quod à Joanne Vigone in antidotario describitur. hoc in lino extenso sine filis utimur, namque fila etiam nocere deprehendimus: etenim si vulnere tenacius adhæreant; sanguinem eliciunt, isque sanguis nocumentum adfert. Porrò quod proba-

prob
semp
R. C
S
ungu
su

vi
ba

lin
ph
tu
ca
C

vide
in ce
duce
duas
plun
in he

Q
pari
est,
adno
quiro
borun

probatissimum in hoc unguentum nobis
semper fuit, illud in primis est.

R. Olei rosati, olei omphacini ana ℥ ℥.

Sepi hircini & vitulini, unguenti rosati,
unguenti populconis ana ℥ ij. ℥.

succi solatri & succi plantaginis, succi
acetosæ ana ℥ j. ℥.

vini granatorum ℥ ij. ℥.

bulliant omnia lento igne usque ad consum-
ptionem succorum & vini; & postea
colentur: addatur cerusæ ℥ ij. ℥.

libargyrii ℥ v.

plumbi usti, antimonie ana ℥ x.

tutie Alexandrine ℥ j. ℥.

camphoræ secundum artem trituratæ ℥ j.

Cere albæ q. s. & fiat unguentum molle,
videlicet liquefacta cera, cum oleis &
in colatura ponantur reliqua mineralia,
ducendo corpus ipsum unguenti per
duas horas cum pistello in mortario
plumbeo, atque hoc optimum omnium
in hoc genere medicamentorum est.

ANNOTATIO.

Quod universo corpori est elephantiasis, id
parti corporis seu particulari membro cancer
est, ut Galenus ait secundo ad Glauconem.
adnotandum est canceri nomen medicis esse æ-
quivocum, seu homonymon; atqui ad duo mor-
borum genera extendi, nempe ad cancrosum
tumo-

tumorem, tam in summa corporis parte hærentem, quàm in penitioribus, & latentibus corporis partibus, & ad cancrum ulceratum. de utroque agit hoc capite auctor; cùm uterque affectus ex atra bile, seu melancholico humore gignatur, tali videlicet succo, cujusmodi est fex in vino, & amurca in oleo, ut decimo quarto therapeutices Galenus ait.

Cancris foeminis] Ita Celsus libro quinto: verùm & viris accidunt cancri; quibus potissimum per mariscas assuetæ purgationes suppressæ sunt, ut annotavit Galenus secundo ad Glauconem.

Unde illud] Mirari subit, quo pacto curationes utriusq; cancri, ulcerati & non ulcerati, hic mulet auctor: etenim ulcerati cancri hanc chirurgiam, & excisionem postulant, alii non ita, ut nos docuit Hippoc. lib. 6. aphoris. aphoris. 38. Cancros, inquit, occultos omnes melius est non curare: curati enim sæpius pereunt; non curati verò longius perdurant. præter auctoritatem experientia est, nam, ut Galenus ait in Commentario; compertum est omnes, qui hujusmodi cancros sectione aut ustione curare tentarunt, illos magis irritasse, & brevi homines interemisse. An ne novos, & incipientes cancros in summaque corporis superficie hærentes curat sectione auctor? quod permittit Avicennas, & ante eum Galenus; abditos verò non curat.

Cura palliativa] Palliativam curationem

nem v
terdun
necessi
Adno
tertio,
in inte
theæ d
Na
occulti
tatem h
Qu
rum]
pelli, n
malign
media;
tur, ex
Igit
cri cura
lem cor
verbis p
inquit,
rare an
per purg
bit: ubi
ris, sic
sanguin
premen
his crass
similite
cuit, u
vetera z

nem vocat, qua dolori occurrimus: nam interdum neglecta causa ad accidens se convertit necessitate coactus medicus (ut ait Galenus.) Adnotare volui, quod Paulus tradit libro tertio, capite 67. utendum esse mitigatoriis in interno corporis cancro, ut malva, & altheæ decocto.

Namque huiusmodi cancris] Solùm de occultis cancris, in abditoque latentibus veritatem habet, ut infra docebitur.

Quæ ab auctoribus curatio cancerum] Nam propter succi crassitiam, nec repelli, nec discuti potest, tantaque est eius vitii malignitas, ut mitiora planè contemnat remedia; vehementioribus, veluti lardo, irritetur, excandescat, atque efferatur.

Igitur ubi cancrum] Docet auctor cancri curationem, quæ per chirurgiam fit; qualem concessit Galenus 14. methodi, ut suis verbis probabitur, quæ subjiciemus. Cæterùm, inquit, si quando Cancrum per chirurgiam curare audebis; cæpisse quidem ab evacuando per purgationem melancholico humore oportebit: ubi verò totum quod vitiatum est, excideris, sic ut nulla supersit radix, secus effluere sanguinem nec properè eum inhibebis: imò premendo potius vicinas partes, exprimes ex his crassiorem sanguinem: mox aliis ulceribus similiter curabis. hæc ex Galeno adducere placuit, ut cognoscat lector, quàm ad amissim vetera in usum revocet auctor.

Exul-

Exulceratis cancris] Diximus de cancris, qui sine ulcere molestant. non alienum fuerit, si notas hujus in memoriam revocemus in cancro ulcerato præter dolorem, duritiem, tumoremque ulcera erosa, ac inæqualia conspiciuntur; plurima ex parte sordida labris tumidis, aspectu horrenda, & concreta humorum colluvie ingrata: hæc medicamentis lenire studet. Nos omnes scopos ita perstringemus; In primis epithymo humorem melancholicum vacuato, id est, leniter purgato. Si ætas, viresque permittunt, sanguinem mittito: deinde medicamentis atram bilem purgantibus, lenibus, mox validioribus utitor: victus tenuis esto, quique à melancholico succo longissimè absit: loco affecto solani succum, aut medicamentum ex pompholyge adhibeto.

R. Olei rosacei] Medicamento hoc contra Achoras Apollonii auctoritate utitur Galenus, libro primo $\alpha\theta\epsilon\tau\iota\kappa\alpha$: à Theodorico verò, in cancris usurpatum, unde auctor in suum usum convertit.

DE VULNERIBUS

ventris & partium ejus, cum penetratione & citra.

CAP. IV.

Quæcunque in ventre vulnera fiunt, quæ tamen non penetrant, neque contenta in ipso membra non lædunt; ea

ea si rectè curantur, periculi omnis ex-
 pertia sunt, præter illa, quæ secundum
 umbilicum, duobus aut tribus digitis, in
 circuitu accipiuntur, quibus nonnihil
 adversi accidere potest, ob octo illos ner-
 vos qui in umbilicum pertingentes ea lo-
 ca percurrunt, atque etiam in posteriore
 parte ventris, hoc est à tergo, secundum
 dorsum accipiuntur, periculum adferunt;
 tamen non penetrant: fieri enim potest,
 ut nervi illi, qui ex nuca ortum habent,
 lædantur. Ab hujusmodi ergo vulneri-
 bus metuere consultum erit; quippe
 mortem afferre interdum solent: à cæ-
 teris verò quamvis penetrantibus; quam-
 vis zirbum atque. intestina, illæsa tamen
 prodentibus; nihil mali timendum est, si
 modò curata rectè sint. Ubi autem mem-
 bra in ventre contenta incommodum
 acceperint, periculum imminet; multos
 tamen liberari contingit. Igitur eorum,
 quæ nullam membris læsionem attule-
 rint, hujusmodi curatio est. Eminentia
 intestina cum Zirbo ipso lavanda imprimis
 sunt cum decoctione vini, & camo-
 millæ, & meliloti, absinthii, anethi,
 & rosarum: deinde in suum locum co-
 genda, atque reducenda sunt. Zirbi au-
 tem portio, quæ prominuerat, adhuc
 etiam amplius nonnihil producenda, at-
 que qua parte ventris cuti æquatur, fu-
 E nicu-

R.

can-
 ienum
 cemus
 itiem,
 con-
 is su-
 umo-
 tis le-
 ringe-
 incho-
 lo. Si
 itito:
 ganti-
 vi&u
 o lon-
 , aut
 o.

contra
 Gale-
 ico ve-
 e suum

U S
 pe-

funt,
 neque
 dunt;
 ea

niculo tenui, & tenaci est colliganda eo
 nodo qui ab Hispanis suillus dicitur:
 tenacissimus enim nodus est, & qui nihil
 unquam remittit. Super ipsum verò no-
 dum dimidii digiti spacio Zirbus resece-
 tur, & sectio candenti ferro quoad penè
 nodum tangat, cauterizetur, atque interi-
 us statim referatur; funiculi tamen par-
 te exterius relicta. Quod si apertio ipsa,
 qua intestina prodierant, grandior sit,
 acu & filo consuatur, parvo orificio re-
 licto, qua curatio compleri possit. Ex
 quatuor autem modis, quibus partes il-
 las mirhach, & siphach dictas, auctores
 consuendas præcipiunt, illa nobis maxi-
 mè probatur, & diuturno usu atque uti-
 litate commendatur, videlicet ut primùm
 ex altera parte mirhach, & siphach acu
 trajectis, ex altera mirhach tantum tra-
 jiciatur; atque hæc tria nodo commit-
 tantur; deinde filum secetur, ex eadem-
 que parte unde opus inceptum est mir-
 bach solum siphach relicto trajectis;
 ex altera verò mirhach, & siphach traje-
 ctis secundus nodus fiat. tertium autem
 punctum primo, quartum secundo simi-
 le sit, & sic deinceps, quoad opus per-
 fectum fuerit: atque hoc modo mirhach,
 & siphach optimè committi solent, ita
 ut nunquam amplius intestina erumpere
 ea parte possint: id quod (nisi ut diximus
 cura-

curatum erit.) non rarò accidere deprehensum est. hæc ubi rectè curata sint, ovorum album probè concussum addendum est: neque verò tentam adhibere est opus, cujus vice funiculus ille, quo Zirbus colligatus est, fungitur. Postera verò die, balsamo illo nostro vulnus est curandum, cujus ad concoquendum, mundandum, carnemque inducendam vis est, flammulaque hoc medicamento intincta indatur, vulnusque ipsum eodem etiam liniatur, addita insuper pecia ex ceroto minij, aut basilico magistrali; utrumque enim apprimè commodum est: hoc autem in vulneribus magnis, atque etiam minoribus, est intelligendum: nam quæ angustiora sunt, etiam concocta, digestaque esse tam interius, quam exterius oportebit. Nihil verò opus erit aut rosaceo, aut alio quovis oleo uti. Tertia demum, aut quarta post die, funis ultro remittit. quod si deinceps copiosum pus non sit, satis erit altero ex iis, quæ diximus, cerotis uti. Si quid autem puris erit, sæpius, in die detergendum est, atque hoc modo intra decimum quintum diem curatio perficitur. In ipso verò curationis initio, sanguinem mittere, secundum ægroti habitudinem, oportebit, atque sirupos exhibere rosatos, ex infusione cum aqua plantaginis.

Victus autem ratio tenuis cum exiguo
 pane sit; aqua verò non copiosa exhi-
 benda est, eaque candenti ferro deco-
 cta. si verò præter vulnus ipsum ventris,
 ex intestinis ipsis aliquid ruptum esse
 contigerit, atque id ex gracilioribus sit,
 quæ ad dexteram supra ipsum umbili-
 cum sunt, hujusmodi omnia quæcum-
 que fuerint, lethalia ab auctoribus ju-
 dicantur, atque ira plerunque est creden-
 dum: ex quo genere unum tantum mihi
 hæctenus curare contigit; cui gracilia in-
 testina yiciata fuerant; periit autem
 quarta die. Ex aliis autem quibus cras-
 siora intestina læsa esse contigit, tres cu-
 ravimus intestino colon dicto, fauciatos:
 quartum verò longone intestino rupto,
 ex illis uni tribus in locis colon ruptum
 erat; omnes tamen, divina ope, ante
 vigesimum diem sunt restituti. omnia
 hæc intestina acu, & filo consuimus eo
 consuendi genere quo chirothecarum
 artifices utuntur. erga omnes etiam eo
 curationis genere usus sum, quod à Jo-
 anne Vigone traditum est, quod omni-
 um optimum esse judicamus, si quis re-
 ctè, atque facili manu utatur: omnia
 igitur illius præcepta secuti sumus; illa
 re excepta, quòd cibum nullum exhi-
 buimus, tantumquæ descripta ab eodem
 potione usi sumus, quòd ij quos curaba-
 mus,

mus
 esse
 lera
 spat
 mus
 & co
 mul
 dur
 ius
 R.

co

er
 &

in

fi

& fi

bo p

med

folie

nibu

duu

post

mus, robustiores, & vegetioris naturæ esse intelligeremus, atque ad inediam tolerandam fortiores. Non enim extra Hispaniam adeò tenui diætâ uti auderemus, ubi & cibi tenuiores multo sunt, & corpora ipsa magis delicata, atque ad multum cibum, aut ad nullum sumendum minus idonea sunt. Est autem huiusmodi apozema.

R. Pomorum citoniorum mundatorum, & subtiliter incisorum numero quatuor, caudæ equinæ, sumach, myrtilorum, ana manipulos iij. rosarum pug. ij. balausliarum ℥ ss.

coquantur in libris xvj. aquæ pluvialis usque ad consummationem tertie partis: deinde addantur iburis, massicis, sarcocolle, ana ℥ iij.

croci ℥ ij.

& colentur, cum forti expressione; & addatur mellis rosati colati, & sirupi rosati ana ℥ vj.

tragacanthij pulverisati ℥ ss.

sirupi myrtilorum ℥ iij.

& fiat apozema. hac potione nos pro cibo potuque utebamur, atque etiam pro medicamento, ad interiora membra consolidanda. Quidam autem ex illis hominibus, cum nihil aliud per totum quatri-duum sumpsisset; facile tamen ferebat: post hæc verò coctæ in huiusmodi aqua

avis jus tantum exhibebamus, nonnunquam & juri exiguam panis micam (panatellam Itali vocant) cum id fieri oportere intelligerimus, addebamus, Hoc etiam modo sacerdotem quendam curavimus, qui dum in templo esset, vulnus lancea acceperat, obvius factus quibusdam, qui alium inimicum in templo latitantem quærebant, eundemque esse putabant. Vulnus verò in ventre superiori lateris dextri parte fuerat factum. duos etiam quoque, alterum jecore, splene alterum rupto curavimus. Item alium vesica rupta, qui tertia die periit, cæteri omnes Dei ope liberati sunt, qui & ipse medicinæ auctor auxiliatorque est. Quædam verò res digna nobis visa est, quam silentio minimè præteriremus; namque ad divinam sapientiam, & misericordiam laudandam argumentum, & materiam suppeditare, etiam, ut omnia alia, potest, qui tantam naturæ vim, tantam rebus efficientiam esse vult. Res Guadalupæ me præsentè accidit, anno à Christo nato millesimo quingentesimo decimo sexto: ea hujusmodi est. Homini cuidam, ex illius cœnobii famulis, cui pascendarum caprarum cura erat, dum in agro esset, stulta quædam libido incescit calamum spicæ cum spica ipsa per propriæ virgæ meatum intrudendi;

spica

spica autem arida jam granisque omni-
 bus decussis erat. Narrabat autem ille ni-
 hil se doloris percepisse dum intruderet.
 ubi verò educere vellet, non potuisse,
 quòd spicæ aristis in carnem fixis, vehe-
 menti dolore teneretur: tandem se fatius
 esse duxisse totam penitus protrudere,
 quam eam partem quæ intrusa erat ex-
 trahere, atque intra paucos dies ad vesti-
 cam usque sibi esse transmissam. Cùm
 autem per totum annum & dimidium
 mali nihil sensisset, in urinam conversam
 à se mixtam fuisse putaverat. Post hoc
 verò tempus, in sinistro crure apostemate
 laborare cœpit, cujus curandi causa ad
 ejus monasterii hospitium, quod paupe-
 ribus curandis dedicatum est, venit: quo
 in loco dum curaretur, dumque tumore
 jam maturus, apertusque à nobis esset,
 accidit ut quodam die manè cum ulcus
 absterissemus, parvam paleam in ipso
 ulcere fortè videremus. ego verò ratus
 eam cum filis pridie mixtam carni inhæ-
 sisse, forpiculis tollendam curabam, &
 demum calamus cum spica facillimè tra-
 hentem secuta sunt. Attoniti autem rei
 miraculo nos omnes medici, atque alii
 qui adstant, quid illud rei esset, divi-
 nare non poteramus, donec senex ille
 nostro rûmore excitatus, caput attollens,
 & spicam mihi in forpiculis hærentem
 E 4 videns,

videns, ait, Egomet mihi abhinc anno
& dimidio per virgæ meatum intrusi;
atque ita rem omnem, quomodo facta
fuerat, & dies quibus penitus a se fuerat
protrusa, narravit. Quo in loco summa
nobis admiratio, summa divinæ provi-
dentia laudandæ occasio orta est: nam-
que ita Deus homini consuluit, ut vesi-
cæ pellis paulatim rumperetur, atque ex-
ruptæ spicam ad proximam carnem ex-
pelleret; deinde rursus vesicæ pellis coi-
ret, atque caro tumescens maturesceret,
& maturò tumore atque curatò spica
prodiret, & tandem senex ille intra pau-
cissimos dies liberaretur, nam penitus
sanatus est.

A N N O T A T I O.

*Tractatis iis vulneribus, quæ in superiorem
ventrem instiguntur, ad ea quæ in inferiori
ventre accipiuntur, transit. Hippocrates libro
secundo de Ratione victus, in morbis acutis,
ventres divisit, ut diaphragmata superiorem
contineri velit; alterum omento. Chirugi
docti triplicem faciunt, superiorem, medium
inferiorem; qua divisione capitis ventriculos
complectuntur. vide Alphonsum Ferrium li-
bro tertio de Scolopetorum vulneribus.*

Ab hujusmodi ergo] Dividenda sunt
hæc vulnera ut pectoris divisiimus: aut enim
interna

interna ledunt; videlicet ventriculum, hepar, lienem, intestina, aut non. Si interna ledant, funesta sunt per aphorismum Hippocratis sextilibri. Si vesica, &c. Si non ledunt; minus sunt periculosa: præterea, majus periculum imminet læsa posteriori parte; ob vertebrarum, spine, nervorumque ex ea manantium vicinitatem; anteriori parte non tantum.

Igitur eorum quæ] Hæc curandi ratio ab Albucasi traditur. adnotatu dignum est; omni in vulnere sanguinis fluxionem prodisse: ventris verò vulnera ab Hippocrate (lib. de Ulceribus) excipi. quem locum ita explicamus; ne nobis contradicere, qua de thoracis vulnere, videamur. Veretur Hippocrates ne dum ex vulnere oris sanguis erumpit, aliqua ex parte ad internam regionem feratur. quod ubi accidat, mala affert complurima. Si quidem, ut alio loco idem demonstrat, ubicumque sanguis in ventrem præter naturam fluxerit; necesse est supperet: nam extra venas suam naturam retinere non potest, (ut Galenus ait) Quam ob rem vulnera ventris eo loco tantum accipienda sunt qua usque ad spatium interius peneirent: quo periculum est, ne sanguis se conferat: cætera quæ summam tantum partem attingunt, nihil proprium exigunt: sed ab imminente inflammatione, non secus, quàm quæ sunt aliarum partium, fluxu sanguinis, sine ullo periculo vindicantur.

Victus autem ratio tenuis] Non solum

106 DE CURAN. VULNER.

*victus est observandus, verum medicamento-
rum etiam ratio, quæ à Galeno est petenda
quarto methodi medendi.*

DE VULNERIBUS
Simplicibus & Compositis.

CAP. V.

OMnia in universum recentia vulne-
ra, quocunque in membro facta
sint, præterquam ea, quæ in capite fiunt,
à nostratibus chirurgis imperitis, & em-
piricis eodem modo atque iisdem reme-
diis, curari solent, sive simplicia illa,
sive composita sint: tamen non inficias
eo, multos in Hispania doctos esse chi-
rurgos, quos artis peritia, sedulitas, &
fidelitas omni laude dignos reddidit;
præter hos autem, cæteri plerique om-
nes, eodem ordine, iisdemque omni-
no medicamentis utuntur; eandem insi-
stunt viam, quam prætergredi nullo mo-
do, aut posse; aut debere quenquam,
putant. Id aded ex eo evenit, quod ea
quæ legerint, neque intelligunt ipsi, ne-
que eos qui intelligunt, interrogandos
ducunt, neque doctiores consulere, ne-
que expertos magis adire, & duces sequi,
commodum sibi, aut honestum arbitran-
tur. Plerumque autem usu venit, ut hu-
jusmodi hominibus minus ex animi sen-
tentia

tenti
com
frust
nibu
liato
quet
perit
utin:
nis, p
supe
res v
nes,
etiar
sistut
strati
hujus
ri sol
dum
factu
ctis
aded
am c
rat,
acub
fatis
figur
cont
relin
carni
quod
nem

tentia curatio succedat: qua in re, ubi communia illis remedia tentata omnia frustra fuerint, unum illud tandem omnibus commune refugium est, ut expositos pecuniis homines, diaquilone, quem illi socrociū vocant, dimittant; perinde ac si sani omnino essent: atque utinam merces ipsa imperfectæ curationis, perfectissimæ etiam æstimationē non superasset. huiusmodi homines cum plures vidimus, qui suas huiusmodi curationes, vel corruptiones potius, nominibus etiam appellatis, nunquam prædicare desistunt. Sed huius mali culpa in magistratibus publicis est. Quodomo autem huiusmodi vulnera omnia ab istis curari soleant, in primis fuerit nobis notandum. Igitur sive gladio, sive hasta vulnus factum fuerit, primam curationem punctis expediunt. Quidam autem in hoc adeo dari, crudelesque sunt, ut plus etiam consuendo, quàm qui vulnus fecerat, feriendo noceant: crassioribus enim acubus usi, plus etiam ex carne, quàm satis fuerat, apprehendunt, altiusque infigunt: labra etiam vulneris non raro contorta, convoluta ubi nodos fecerint, relinquunt: cutis enim cuti, & non caro carni hoc modo committitur, propterea quòd cutem ipsam, mediam inter carnem constituent: nonnunquam etiam

adeo leviter, & summo ex margine cutem comprehendunt, ut vulneris labra non cohaereant; nam extremis partibus commissis, caetera cava, inaniaque manent, his, atque aliis huius generis modis, prima omnino curatio conficitur, si forte verò accidit, ut ossa aliqua scissa sint; tamen si non omnino soluta fuerint; ea tamen non levi hominis dolore, maximo autem detrimento penitus extrahunt, illa vulgata apud se malè tamen cognita sententia abusi, extirpare superfluum: atque etiam si quid è carne recipientum neque penitus abscissum fuerit; tamen ipsi praescindunt, asserentes id à natura non esse recipiendū: maximè verò si vulnus in manu sit, atque digitorum pars, carni & ossibus concisis, tamen aliqua ex parte hæreat, isti omnino praescindunt: fieri enim nullo modo possunt, ut discissa ossa iterum cohaerent, atque hoc modo etiam saeviunt: si manus qua brachio annectitur, feriat; neque tamen omnino separetur, aut pes, aut quodcunque aliud, ex totius corporis membris sit.

Secundam autem curationem in omni vulnere genere, digestivo ex rosaceo, & ovo faciunt: puncta praeterea & futurae, quae ab ipsis factae in simplicibus vulneribus sunt, ita neglecta sinunt, quo

quo ad ipsæ carnem ultrò dirumpant, atque ita tam digestivis, quàm satis copioso rosaceo, aut lumbriceo oleo, adhibitis: idquæ ex eorum more, plurimis diebus, tum punctis, & futuris, ex simplici vulnere, compositum reddunt; atque etiam, cum magno substantiæ detrimento & jactura, ulcera efficiunt, & ob eam etiam causam, in vulneribus quæ ab istis in facie curantur, deformius cicatricum ex futura, quàm ex ipso vulnere vitium relinquitur.

Postquam autem tot dies digestivo usi fuerint, ut non concoqui, digerique solum, sed putrescere etiam locus ipse possit, plurimum, imò nimium melle rosatum ad emundandum adhibent, satisque largè infundunt: fila etiam & linteum cum basilico addunt. Quod si vulnera (propterea quòd ab ipsis corrupta putruerint) rosato melle, neque satis, nec citò adedè mundantur, solenne est apostolorum unguentum admovere: ultimum videlicet istorum inscitæ perfugium; hoc autem longo utuntur tempore. Hujus verò unguenti cùm calida, atque exulcerans, & ad corrodendum nimis idonea vis, & natura sit, efficitur ut humore copiosius ad locum attracto, vulnera ipsa putrida potius & sordida quàm recentia dici possint; maximè autem

tem si victus ratio talis adhibetur, qualem nos à multis, qui in pretio vulgo habebantur, adhibitam esse intelleximus, quibus cum nulla utilium, atque nocentium rerum certa, ac constans aut ars, aut ratio, aut cognitio sit, proprium tantum arbitrium secutis, committi per se solet, ut membra ipsa ubi vulnera sint, inflammentur, & aliis, atque aliis locis, sponte sua hient, & aperiantur, atque ex exiguo malo maximum reddatur. Quemadmodum autem recentia vulnera vulgo curari soleant, hæcenus notavimus; nunc verò deinceps ut à nobis curentur, exponemus.

Omnia igitur recentia vulnera, quocunque in membro facta fuerint, sive ea majora, sive minora sint, sive in juncturis, sive in quacunque totius corporis parte fuerint, eò, qui à nobis describitur, modo parva, aut nulla ægrotantis molestia, exiguoque medici ipsius labore curari possunt, nullo etiam malorum symptomatum metu; spero autem gratam omnibus fore cognitionem rei à nobis ad hominum utilitatem inventæ, atque frequentissimis experimentis probatæ, Deo omnium bonorum auctore docente, in qua re inveniendâ, atque constituendâ naturæ rationem ducem sumus sequuti: ea autem sic habet. Si vulnus
exi-

exiguum sit, opusque esse videatur, ut acus officio committatur, puncta locis carnosis, non nervosis infigantur, statimque ovorum album in lini tela addatur: prius autem sanguis profluere sinendus est; id enim si non nimium fuerit, conferre deprehenditur: nullis autem huiusmodi parvis vulneribus, nisi in juncturis sita sint, flammula ulla indenda est, sed consuta, atque ovo curata commodè ligari oportuerit. Postera verò die hoc modo curari conveniet (dummodo in facie facta non sit, nam de his suo jam loco dictum à nobis est) linimento illo liquefacto, sæpe à nobis ob utilitatem appellato balsamo, vulnus ex pluma leniter inungatur: deinde nullis additis filis, emplastrum basilicum, magistrale dictum, cujus descriptio apud Joannem de Vigo est, in linea tela extensum, imponatur: sequenti die pus idoneum optimeque confectum reperietur; atque hoc modo curatio procedet, quoad caro jam induci conspiciatur; tunc autem puncta abscissa detrahantur, atque eodem basilico emplastro sæpius per diem absterfo, omnino sanabitur: quod si commodum visum id fuerit, nigro vocato emplastro uti licebit, sic enim quamcitissimè sanabitur.

Si fortè magnum vulnus fuerit, consuen-

fuendum in primis est, eo modo qui à nobis est præscriptus; ex inferiori autem parte flammula ex lino albo ovi intincta forpicula subtiliter indatur, addanturque ovi etiam albo intinctæ flammulæ: & deinde colligetur. Postera autem die, hoc modo curabitur: venam ex adverso latere secato, ac per sex, aut septem sequentes dies, sirupum rosatum, cum plantaginis aqua, exhibeto; & si id res postulare visa fuerit, purgato. Victu autem tenui per dies illos utitor, ut passulis, amygdalis, pane exiguo, pomis assis, aut camusis, quæ & cruda permittere possis, atque hujus generis aliis cibariis: aquam verò ex hordeo decoctam præbeto, addito etiam in dedoctione aniso; bibat autem à prandio, & à cœna tantum. quod si infirmioris naturæ homo fuerit, semel in die pullo, aut pulla vesci poterit. Vulneris autem curatio hæc est; cataplasmata primò admoveenda sunt, quæ postera die ubi jam tenacius hæserint, consuantur, atque hac secunda curatione, flammula balsamo nostro liquefacto intincta ex inferiori vulneris orificio, indenda est; namque id medicamentum mirum in modum concoquit, expurgat, carnemque inducit: deinde vulnus ipsum eodem balsamo pluma leniter inungatur, deinde commemoratum sæpius basilicum emplastrum,

Mala
 sunt in
 Hispania
 nobilio-
 ra:

strum
 in li
 ita:
 dier
 tem
 que
 du
 coh
 quo
 stro
 loris
 mur
 & le
 que
 atqu
 opo
 sti r
 alun
 duce
 cicat
 bora
 vo d
 desc
 hac
 quo
 facit
 vuln
 maje
 ipsu
 verò
 no o

strum, aut id, quod Gratia Dei dicitur, in lini tela extensum imponatur, atque ita ad septimum, aut ad octavum usque diem, curatio procedat; namque hoc tempore concoctio, expurgatio, carnisque inductio perfici solet. Ubi autem inducta caro sit, & vulneris labra utrinque cohaerint, cataplasmata amovemus, & quod reliquum in curatione est, emplastro ex minio, aut nigro, aut leonini coloris dicto, perficimus; vel quod optimum in hoc genere est, æquis ex nigro & leonino portionibus commixtis, atque vulnus ipsum, & emplastrum decies, atque duodecies etiam singulis diebus oportuerit abstergere, juxta puris confecti rationem: cicatrix verò, ut fieri solet, aluminis usti pulvere, & filis siccis obducenda est. atque ubi jam cutis facta, cicatrixque fuerit deducta, locum corroborare conveniet, emplastro confortativo dicto, quod à Vigone in Antidotario descriptum est, namque id vehementer hac in re confert. id quod oxicrocion, quod vulgo in usu omnibus est, minimè facit. Igitur eo quem docuimus modo, vulnera omnia, cum minora, tum etiam majora, facillimè citra nimiam membri ipsius inflammationem, curantur. neque verò opus est aut rosaceo, aut alio omnino ovo membrum inungere; namque,

ut

mol

114 DE CURAN. VULNER.

ut diximus, nullam nimiam inflammationem metuere est. Initio autem curationis, defensivum ex bolo armenio adhibere retulerit, aut linteum aceto intinctum, addita aquæ portione dupla: id ubi exsiccatum sit, rursus erit intingendum.

Si in locis nervosis vulnus factum fuerit, cujus generis manus, pedes, juncturae, atque musculorum capita sunt, hoc modo curandum est. Cum primum recens vulnus oblatum medico fuerit, atque is nimium sanguinis effluxisse deprehenderit, linteum super venas extendat, manūque compressa fluxionem tandiu cohibeat, quoad sistatur. Quod si parum adhuc defluxisse comperit, ut non nihil amplius defluere sinat, confert: id tum experimento, tum etiam Avicennæ auctoritate, didicimus: Fortassis, inquit, sanguinis cursus, quantitate moderata, convenit in ulceribus; namque hoc modo membrum non inflammat. Vulnera autem deinde acu, & filo committantur; ita tamen ut neque ultra quàm satis sit profundè acus infigatur, nec nimium etiam ex cute comprehendatur: sed quatenus, ut labra aptè cohæreant, convenite videantur. Nervi verò, si ulli secti fuerint, simul conjungantur, coaptenturque, acu tamen non tangantur; periculum

Supr. ex
Hippoc.

lun
ris,
nih
imè
pot
que
ori
dur
éta
line
ræ
tur
apt
ten
feri
sidi
me
&
ho
par
nan
que
poi
bur
ipfi
est
feri
sivi
R.

lum enim est certissimi in ea parte doloris, & spasmus metuendus imprimis est: nihilo autem minus propterea curabitur; imò minus tamen membrum evadet, aut potius mancum, si nervi consuantur. atque consuto vulneri parvum quodquam orificiū, ex inferiori parte, est relinquendum, quo flammula ovorum albo intincta subdi possit: super puncta autem ipsa, lineæ telæ portiones ovorum albo saturæ imponantur, deinde ligatio procuretur, si manus, aut digitus fuerit, tabella aptanda sic est, ut membrum ipsum extensum relinquatur. Veruntamen in inferiore parte vulnus factum, nullam desiderat tabellam: sed ita constituendum membrum est, ut modicè contractum, & manus ipsa semicompressa sinatur: hoc enim modo, nervi, qui ex inferiori parte sunt, facilius sibi cohærebunt, namque extensa manu, neque jungi, neque invicem possunt aptari. Sanguinis porrò missiones, quæ necessariae videbuntur, procurandæ sunt: & membrum ipsum propterea quòd nervosus locus est, atque attritionibus, doloribusque ferendis opportunus; hujusmodi defensivo est muniendus.

R̄. Olei rosati, myrthini ana ℥ ij.

olei camomillini ℥ i,
boli armeni ℥ ij. ℞.

℞ cum

116 DE CURAN. VULNER.

Et cum sufficienti cera fiat unguentum. Hoc admovendum est, ut quatuor digitis à vulnere ex superiori parte distet; ex inferiori autem nullum est admovendum: nam qui ex inferiori admoveant, non leviter errabunt; deinde juxta eam quam diximus rationem, membrum ligabitur.

Secundam curationem linimentum illud ex balsamo parabit, flammula in eo intincta, atque ex orificio subdita, vulnereque ipso toto, ex pluma eodem balsamo liquefacto, inuncto, atque super hæc cerotum imponendum est latiori aliquanto lineæ telæ portione extensum; quo in genere atque in aliis, etiam hoc omnium præsentissimum esse comperimus.

R̄. Olei rosati violati & camomillini ana

℥ ij.

axungie gallinacæ, & medullæ crurium vituli, ana ℥ j.

vermium terrestrium vino nigro lotorum,

℥ ij.

butyri recentis ℥ j. ℞.

mucilaginis albæ libram unam: bulliant omnia simul usque ad consumptionem mucilaginis, deinde colentur: cui colaturæ addantur lithargyri subtiliter trituri ℥ v.

minii ℥ vj.

℞

Et iterum cum cera alba sufficienti, fiat
cerotum, addendo

terebinthinæ ℥ ij. S. mastichis ℥ j.

Et fiat cerotum. Omnibus recentibus vul-
neribus utile in primis est: atque hoc
modo pus optime concoquitur, & ex-
purgatur, & caro demum inducitur, citra
ullum periculum, aut symptomatis in-
commodum, citra omnem etiam mem-
brorum, in quibus vulnera facta fuerint,
tumorem. Ubi jam satis emundatum
vulnus, atque caro commodè inducta
fuerit, nigrum aut leonini coloris adhi-
beatur emplastrum, aut ex utroque
commixtum genere: id autem sæpius
singulis diebus abstergendum est, atque
hoc modo cutis facillimè, citissimeque
aptatur: libet autem horum quæ tanto-
pere nobis laudatæ, atque probatæ sunt,
emplastrorū compositiones subjungere.

Leoninum emplastrum.

R. Ceruse ℥ iij.

Olei rosati ℥ ss.

unguenti basiliconis ℥ j.

bulliant omnia simul lento igne semper ba-
culo agitando usque ad punctum ceroti,
deinde addatur viridis æris pulveri-
zati ℥ iij.

ac etiam bulliant quoad colorem flavum,
aut subrubeum accipiat, fiat cerotum.

Em-

Emplastrum nigrum.

℞. Lithargyrii ℥ j.
olei antiqui, & aceti fortissimi ana ℥ 3.
miscanter in caccola quoad inspissentur; deinde ad ignem fiat empastrum.

Postquam autem vulnus sanatum sit, confortativo emplaistro membrum ipsum corroborandum est, sive manus ea, sive alius nervosus locus sit, sive pars alia quæ firmitudine restitutioneque indigeat: hoc autem quo nos quadraginta annos, & eo amplius usi sumus, tum ad hoc genus, tum ad fracturas etiam luxationes semotiones ac dislocationes curandas, atque ad dolorem omnium membrorum levandum omnino utile esse prædicare possumus, cui confortativi nomen meritò indidimus, Ejus autem medicamenti descriptio in hujus operis fine à nobis addita est.

A N N O T A T I O.

Vulnus, & ulcus apud auctorem nostrum differre videntur: quæ ad modum apud Arabes (quos sequitur) quoque distinguuntur. Vulnus esse volunt continui solutionum recentem, cruentam, sine pure: ulcus vero cum pure esse volunt conjunctum, ut Averrois ait 2. & 3. colliget. Græci verò, & qui eorum libros Latini nos fecerunt; utrumq; idem signi ficare volunt.

ut legenti manifestum erit. Vulneris itaque differentie, à vario solutionis continui modo sumendæ sunt, quas quidem tractat Avicennas in secunda Fen. primi canonis. Illa ego adnotabo, quæ ad hujus capituli absolutam tractationem pertinent. Vulnerum discrimina sumuntur vel subjecti ratione (ut tertio artis parvæ Galenus ait) ut alia in homogenea parte fiunt; in heterogenea alia: ita auctor sigillatim horum meminit. vel capiuntur ab essentia (ut tertio methodi Galenus) qua ratione vulnus simplex dicitur, cui nec morbus, nec symptoma ullum complicatur; contra compositum vocat, cui tale aliquid adjungitur, ut quarto methodi videre est. Vel sumuntur à quantitate ejus quod solutum est, seu divisum: & etiam hæc vulnera tractat auctor. verùm fucius de his nostris ad capituli vulnera adnotationibus.

Secundam curationem] Non egent iis simplicia vulnera, quæ cùm agglutinationem tantam postulent, siccis egent, ut Hippocrates ait libro de Ulceribus.

Prius sanguis profluere] In curatione vulneris siccare consilium est, & contendere quantum fieri potest, ne inflammatio subsequatur: quæ ubi sit, sanescere plagam non patitur. quò respectans auctor in ea sententia est, ut sanguis vel ab vulnerato loco, vel à proximo effundatur: sic enim futurum existimavit: ut detracto impedimento; facil-

3.
dein-
n sit,
ipsum
, sive
rs alia
ndige-
ta an-
am ad
luxa-
es cu-
nnum
utile
sforta-
us au-
hujus

tostrum
Arabes
Vulnus
m, cru-
ure esse
. & 31
os lati-
volunt,
ut

facillimè ad sanitatem perveniat. quæ sententia non solum est Hippocrætis; verùm ab ipso ingeniorum fonte adnotata Iliad. δ. ἄμ' ἐμυζήσας, ἐπὶ ἢ μα φάρμακα ἰδδὸς πόσσε, τὰ δὲ ποτὲ πατεὲς εἶλα φρονέων πόπε χελεγον.

Si fortè magnum vulnus] Trifuriam vulnera magna, graviâque Galeno 4. methodi redduntur, nempe vel propter affectus magnitudinem, vel propter laborantis partis præstantiam, vel propterea quod sunt cacoëthe: cuiusmodi sunt in articulis accepta vulnera: Vulneris igitur magnitudo, inquit cum Galeno auctor, cum virium robore mittendi sanguinem indicat: etiam si qui vulneratus est, proflus redundantiæ sanguinis sit expers: idque non solum ne pars læsa, aut circumscripta loca phlegmone tententur, sed ut impetum ruentis sanguinis compescamus, & largius profluvium compescatur.

Postera autem die] Neque tamen in omni vulnere venæ sectio necessaria est, quia capitū vulnera, ut Hippocrates ait, ea non egent: ratio est in nostris adnotati ex Hippocrate declarata. videtur que auctor ad composita transisse vulnera; illa enim, quia plerumque aut sunt cum dolore, aut inflammatione conjuncta, utriusque horum, aut alterius solum respectu, venæ sectione egent.

Purgato] Medicamento, leni, & facili, quodque humori in corpore redundanti, & membro sauciato analogia respondeat.

Si

Si in locis nervosis vulnus] *Accuratior horum vulnorum curatio petenda est ex Galeni sexto Therapeutices, & Avicennæ libro sue medicinae quarto. Certè ista vulnera majorem diligentiam postulant: etenim his sauciatis, aut punctis ex sentiendi, quod obtinent, acumine, inflammatio, & dolor consequitur; unde convulsiones, febresque his oboriuntur, & delirium, ob nervorem cum cerebro communicationem & commercium, ut apud Galenum est libro tertio artis medicinalis. Curatio est communis cum ea quæ aliis vulneribus adhibetur; hoc excepto, quod dolor ad se, aliis neglectis, medicum revocet. Scopii sunt, extranea, quæ interciderunt, remove, vulneris labra dissidentia committere: præterea commissa atque in unum conjuncta servare: quartò particulae lesæ substantiam conservare. cætera apud auctorem.*

DE ULCERIBUS

atque eorum curatione.

CAP. VI.

Rari admodum chirurgi sunt, quibus antiqua ulcera curanda suscipiantur, multi verò quos eorum curandorum ratio omnino fugit; inter Hos autè nonnulli sunt, quibus ubi aliquod fortè hujusmodi ulcus occurrit, eum qui patitur omnino non curari suadent, atque il-

F

lam

Si

lam ad persuadendum causam afferunt; fore, ut si ulcus illud sanatum, conclusumque sit, eum tam sit antiquum, humor ea parte effluere, atque expurgari consuetus, in aliam corporis partem influens, vehementius multo noceat, atque mortem etiam afferat. quæ quidem istorum opinio, atque sententia, nulla alia re, quam curationis ignoratione nititur: etenim quamvis verum omnino esset humorem, qui ad eam partem confluit, aliò derivatum incommodum maximè fore; tamen in eo vehementer errant, quòd fieri posse putent, ut humore ipso non purgato, & correcto, ulcus omnino consolidetur. Nam nisi purgetur humor, eam quam tot annis tenuit dedoceatur, nisi aliis etiam beneficiis, & remediis corrigatur: ulcus ipsum obduci, committique minimè potest: quod si obducatur, statim deintegro aperitur. quidquid enim superflui noxijque humoris in corpore est, ab omnibus aliis fortioribus membris; ad illud omnium infirmissimum, & debilissimum expellitur: atque hæc ratio ad eos qui hujus sententiæ sunt redarguendos satis idonea. Est & aliud chirurgorum genus, qui vulgo empirici dicuntur. hi cum more suo ex aliis in alia loca vagentur, aliam sequuntur viam, suis ipsorum com-

con
util
gen
sive
que
sibi
ceri
per
tue
tibu
diu
opp
coa
mig
ign
di
eant
rem
cura
etur
nob
mus
sim
tur
nibu
imp
pars
fed
ctus
buse
tion

commodis, magis quàm agrotantium
 utilitati idoneam: nullum enim ulcerum
 genus, siue cancrofa, siue sordida sint,
 siue omnino incurabilia, istis offertur,
 quod non facillimum, & brevissimum
 sibi curatu fore jactent, & promittant:
 certum autem tempus ad curationem
 perficiendam, idque non longum sta-
 tuentes, de mercede prius cum agrotan-
 tibus decidunt, & constituti precii dimi-
 dium ad paranda unguenta, aut ad alias
 opportunas res initio exigunt. quod ubi
 coactum sit, nullo remedio adhibito aliò
 migrant, atque omnia mala hæc una
 ignoratio efficit. siquid autem hujusmo-
 di chirurgi omnes efficere conantur,
 eandem omnes insistent viam, iisdem
 remediis omnia in universum vulnera
 curant: quam ob rem operæpretium fa-
 cturi visi sumus, si eum modum quo à
 nobis hujusmodi curari solent, docere-
 mus: qui modo diuturno jam, & certif-
 simo usu, nobis constat. Universam igitur
 ulcerum rationem quatuor intentio-
 nibus compleri statuimus (purgationis
 imprimis observato usu, namque hæc
 pars omnino necessaria est, & non semel,
 sed sæpe etiam repetenda.) Deinde & vi-
 ctus rationem temperatam, cibus poti-
 busque idoneis, haberi oportet. Inten-
 tiones autem illæ sunt, imprimis ulcus
 ipsum,

ipsum, si res postulare videtur, est concoquendum, hoc est, idoneis digestivis utendum, ut in nervoso loco ex ovo, & terebinthina, in carnosio verò, ex rosaceo, & ovo: cavendum autem ne hæc quam digestionem vocamus, ad multum usque tempus producat. Satis fuerit tamdiu concoxisse, quoad optimum pus album, atque æquale confectum sit. Secunda verò intentio mundificatione completur: hanc autem mundificationem varia, pro variis ulcerum constitutionibus, abstergentia remedia efficiunt: nec enim omnia omnibus apta sunt. Tertia autem intentio, opportune carnis inductione præstatur. Quarta porro consolidando fit, ad eamque rem, aliis atque aliis rebus opus est. juxta aliam atque aliam ulcerum, affectionumque rationem: illud tamen omnibus ulceribus commune est, ex Galeni sententia, quòd quocunque in tempore exsiccantia postulant medicamenta, atque abstergentia, namque omnia in universum ulcera, duplici humiditatis vitio abundant: altera humiditas crassior, subtilior altera est. hæc vitia nisi corrigantur, sanari ulcera non possunt: operæpretium est etiam cavere, ne hujusmodi exsiccantia medicamenta, quibus ad curanda ulcera opus fuerit, nimis calida sint, ne membrum ipsum

Exsiccantia ulceribus postulant medicamenta.

Nota.

ipsum
dica
cum
atque
neque
nimis
men
opo
gene
cor
aute
circ
que
rum
enin
put
nulli
sunt
min
cess
ferre
Avis
caus
re o
que
grot
rem
nulli
sum
adh
dole

ipsum plus æquo calefiat, cujus immodicæ affectionis signum erit, locum cum quo ulcus ambitur, inflammatum, atque rubicundum, aut lividum esse: neque verò minus fugiendum est, ne nimium etiam frigidis utamur medicamentis, si quæ hujusmodi adhiberi oportuerit; namque nativus calor hoc genere debilitatus, membri atque ulceris corruptioni occasio esse potest. hujus autem rei illud signum est, quòd ipse circum ulcus membri color nigrior, atque obscurior existat. Multæ porrò horum omnium ulcerum species sunt; alia enim corrosiva, virulenta alia; quædam putrida, quædam etiam sordida, nonnulla cavernosa: dolorifera verò alia sunt, & quæ præterea multa alia discrimina horum legimus, & experimur. Necessè etiam chirurgo est, ut dolorem afferro quàm maximè fugiat. Cave (inquit Avicenna) à dolore, quia nihil est æquè causa apostematis ut dolor. itaque cavere oportet, quemadmodum nullus neque medicamentis, neque manibus ægroto dolor afferatur. quam quidem ob rem, nos ex quo hanc artem exercemus, nullo unquam causticorum genere usi sumus, quòd ejusmodi cuicumque loco adhibeantur, non levem afferre soleant dolorem: ex dolore verò attractio, ex

attractione membri ipsius debilitatio, atque malæ qualitatis affectio consequitur, ob confluentem eum in locum humorum nimiam atque etiam noxiam copiam.

Igitur in huiusmodi corrodentibus, & virulentis ulceribus, qui modus à nobis servari solet, hic est: Principio ægrotus commodè purgandus est. deinde ulcera, si antiqua non sint, sed ab anno aut minori etiam tempore inceperint, cura nobis est ut pulvere illo Joannis de Vigo emundentur, quo pulvere pluribus etiam diebus; semel in unoquoque die, utimur, additis filis, & unguento basilico imposito: si verò calida viscera sunt, super pulverem & fila lithargyrium unguentum imponimus, atque hoc pulvere tandiu utimur quoad vlcus expurgatum, mundatumque sit; quam rem ipsa carnis facies, ipse etiam color facilè indicat: est enim rubicundus, atque splendens in carne color, & in qua granosum quid ad mali punici granorum instar apparet: visitur etiam pus, idque & purum, & commodum. Præterea & illo etiam argumento dignoscitur, cùm emplastrum ab ulcere removetur, si pulvis ipse unà cum filis ulceri inhæreat, & quod inde emanat pus, exiguum, aut ferè nullum sit, & defluentis salivæ instar habeat: ea res mun-

mundationis, & puritatis in ulcere indicio est. Hoc autem modo constitutis ulceribus, emplastrum à nobis leonatum dictum, lino extensum imponimus, cuius vis est, ut si quid reliquum fuerit, expurget, neque carnem ultrà quàm par est, excrescere sinat, atque etiam cicatricem mirè inducat. hoc sæpius in die est abstergendum; maximè autem si humorem ab ulcere exuxerit. In universum autem, hoc cerotum frigidis ulceribus, aut in frigidiori membro constitutis prodest. Quòd si calida ulcera sint, in hujus quod diximus ceroti vicem, nigrum emplastrum adhibemus, quod optimum profectò in hoc genere: id autem sæpe etiam abstersisse retulerit. Si carnem excrescere contingat, aluminis usti pulvis inspergatur, additis etiam ex lino filis: sed quo die pulvere utimur, semel tantum eodem die curamus. Atque hoc modo ulcera, quæ neque antiqua, neque callosa sunt, curari commodissimè solent. Si verò hujusmodi ulcera nimis antiqua, aut callosa, & mali habitus sint, atque intemperantibus insunt hominibus, ægrè jis quos diximus modis curatata sanabuntur; aut si accidat id, longiori etiam tempore fiet, maximè si ex morbo gallico nata fuerint, ut ex his pleraque esse solent. Certissimus

Cerotum in locis frigidis

Nigrum Emp. In locis calidiss.

igitur ad huiusmodi curanda ulcera modus est igni, cauterioque uti, rescissa, prius omni mala carne, quæ in illis est, at latentibus cavernis, si quæ sunt, apertis & manifestatis, atque labris ipsis etiam circumcisis. Neque verò ad hanc expediendam rem ægrotum alligari, aut à pluribus teneri opus est: sed hac ratione agere conveniet, sive in crure, sive quacunque alia in parte ulcus fuerit, corpore imprimis commodo medicamento purgato, in sedili quopiam oblongo eques constituatur ægrotus, crure, in quo ulcus fuerit, super ipsum sedile extento, pone ipsum verò ægrotum, homo alter eques etiam sedeat, ejus cruribus ægrotus capite & cervicibus atque etiam humeris incumbat, brachiâque eidem tenenda committat; tertius autem homo quispiam femori ægroti eques etiam insideat, & tibiam ipsam manibus teneat, neque ullo alio homine opus erit: cauteria verò crassa sunt, quantus est pollex ad ossis olivæ instar conformata, quæ olivaria dicuntur, quibus ulcus quantum opus esse videbitur. inurendum est: sed tertio alio cauterio in fine est utendum tesserae instar quadrato cæteris etiam majore, quo ulceris labra, atque partes in ipso omnes coæquandæ, complanandæque sunt, hoc ubi expeditum sit, complures

plur
rofa
verò
dein
aute
defe
& ce
plun
facti
sicca
Post
ovot
conco
tion
impe
dixit
ment
dein
lino
scara
subla
tendi
facec
nerv
addi
bus v
pulv
nam
ores
idqu
vis a

plures lineæ telæ partes ovi albo atque rosaceo intinctæ adhibeantur, super eas verò pulvilli, exicrato saturati, & pugnus deinde expressi addantur: in membro autem ipso, ex superiori ulceris parte defensivum ex rosaceo, bolo armenico & cera apponatur, aut pro eo linum triplum, aut quadruplum oxicrato madefactum, atque expressum. quod ubi exsiccatum sit, rursus est intingendum. Post die autem quam hæc acta sint, ovorum albo & vitellis cum rosaceo concussis & commixtis lineæ telæ portiones complures intingantur, & ulcери imponantur, addito etiam, ut superius diximus, defensivo: hoc verò medicamento duobus tantum diebus utimur: deinde autem butyrum satis abundè in lino extensum, bis singulis diebus quoad scara aufertur, adhibeatur. Scara demum sublata, digestivis ad concoctionem utendum est: si locus carnosus est, ex rosaceo & ovi vitellis digestivum fit: si nervosus fuerit locus, terebinthinam addi retulerit, quatuor ad summum diebus vulnus probè digeritur: quod deinde pulvere Joannis de Vigo expurgatur, namque is pulvis & crassiores, & tenuiores etiam materias commodè emundat, idque aded sine dolore fit; si tamen pulvis arte sit confectus: pulveri autem ipsi

Melius
& citissime
scara aufertur, si loco butyri vitello & oleo rosaceo utaris.

fila sicca superindimus, & lineam ex
 minii ceroto quadratam peciam addi-
 mus; id enim, aut ejus vice basilicum,
 optimum hoc in genere, atque opportu-
 nissimum est: postquam verò satis mun-
 dificatum ulcus fuerit, illud nostrum
 leonatum dictum, ad carnem inducen-
 dam, atque cicatricem obducendam,
 apprime utile fuerit, addito aluminis
 usti pulvere, cum caro jam excreverit,
 filis puris impositis, & ipso ceroto leo-
 nato superinducto: ad eam etiam rem
 nigrum emplastrum confert, utrumque
 enim mirum in modum mundificat,
 commodamque inducit carnem: utrum-
 vis autem adhibueris, sæpius per diem
 abstergendum est. Porro putrida aut sor-
 dida ulcera cauteriis etiam optimè &
 brevissimè curantur, omni putrida & su-
 pervacanea carne, quæ in eis invenitur,
 prius abscissa; quemadmodum in supe-
 riori curatione dictum nobis est. nam-
 que naturalis ignis vis multa in hujus-
 modi curationibus utilia efficit (poten-
 tialem enim ignem ut longè naturali
 minoris, deteriorisque efficientiæ & ma-
 joris interim detrimenti, gravioris affe-
 ctionis causam minus probamus) etenim
 qui à potenciali igne dolor affertur, gra-
 vior multo, & diuturnior est: qui verò
 ex naturali igne accipitur, vehemens
 qui-

De
 cauteriis
 sicce.
 Actual.
 & po-
 tential.

quidem ipse est : sed tandiu tamē solummodo durat, quandiu actu membrum adurit ; quæ verè à nobis naturalis ignis utilitates observatæ sunt, nam & membrum ipsum, cui adhibetur, vehementer cum primis confortat, atque natam, & residentem in eodem membro affectionem malam corrigit, complexionemque rectificat ; corruptionem etiam, ne ulterius procedat, prohibet, & coërcet, materias insuper, & fluxiones malignas, atque corruptas exugit, & siccat. denique venenum extinguit, venenosasque fluxiones exhalari cogit, quemadmodum & in furenti anthrace fit. Atque in carcinomē & estiomē, si id quod malum, mortificatumque est, præcidatur, & cauterio actuali locus inuratur, id quod malignæ, & corruptæ affectionis in membro est, ab eo quod bene habet, secernitur, & membrum ipsum magis vigen, meliorisq; affectionis redditur : id ipsum autem & in ulceribus ubi corrupta ossa fuerint, efficitur : quæ si comburas, corrupti ossis partem omnem, ab ea quæ sana est, natura secernit, Septimus autem ignis effectus est, quòd ea, quam efficit scara, sanguinis fluxionem cohibet. Octavus verò usus in frigidis apostematibus aperiendis est, namque actualis cauterii ignis, nativum membrorum,

in quibus apostemata sunt, calorem corroborat, & adauget. Nonus ignis usus à Mesue, & Arnolde traditus; à nobis verò frequenti admodum experimento observatus est, eas fluxiones quæ à capite in oculos, atque in pectus aliquando descendunt, divertere; id enim præsentissimè efficitur, cauterio in coronali commissura inulto, aut ardenti acu seta cervices super nucam trajecta. Decimus ejus ignis usus ad fistulam quampiam amplificandam, callositatemque auferendum est. Undecimo autem valet ad rotunda, & callosa ulcera in aliam figuram curationi commodiorem conformanda. Duodecimo etiam si quid superflua, & malè exuberantis carnis in est, commodè igni exurit, defluxiones præterea, quæ oculos infestare solent, temporibus cauterio ustis sistuntur: ac denique si quid mali, & nocentis humoris ex alio in alium locum vitiosè fluit, commodissimè derivatur igni: quæ autem à nobis de ignis usu, partim ex auctorum lectione, partim ex longo experimento, cognita observataque sint, in unum congesta, hoc in loco scribere libuit, quòd & quorundam in legendo ægligentia consulerè, & hujus curationis rationibus abunde satisfacere cupiebamus.

ANNO-

ANNOTATIO.

Quum de vulnere diceremus, explicata est
ulceris natura; nunc illud indicasse sufficiat,
habere ulcera, ut alia affectionum genera,
duplicem causam, antecedentem (ut vocant)
& conjunctam: ut si ex vulnere male tracta-
to ulcus remaneat; aut si victus intemperatio-
re ratione in aliquo membro illud erumpat, ut
multis locis Galenus. conjuncta est causa, in-
temperies illa, quam malitiam complexionum
vocant Arabes.

Universam igitur ulcerum curatio-
nem] Multa hic dici possunt de ulceribus,
eorumque curatione, quæ abundè à Galeno
sunt explicata libro 3. & 4. methodi medendi,
eodque lectorem remitto; nam ulcerum varie
differentiæ, diversæ causæ, & varia curandi
ratio hoc compendio tradi non possunt, nedum
perfectè doceri.

Purgationes omnino] Plerumque egrè
sanabilium, & rebellium ulcerum causæ sunt
hæ: aut subjectæ carnis intemperies; aut con-
fluentis succi vitium; aut ejus quod ad partem
affluit, copia: ut Galenus adnotavit quarto
methodi, quæ omnes causæ, purgatione si non
zolluntur, certè minuuntur.

Quarta porro consolidando fit] Et
quia duplex excrementum in ulceribus redun-
dat (alterum tenuius, quod sanies, Græcis
ἰσχυρὸν dicitur, alterum crassius quod sordes
F 7 vocant.)

vocant) fit ut duplici curatione opus sit : etenim ex tenui ulcus fit humidum , quod siccantibus opus habet : alterum ex crasso sordidum , quod detergentibus indiget.

Multæ præterea] Omnia talia dysepulotica Galenus nominat : quæ nunc tractat auctor, cacoëthe dicuntur : sunt enim ægrè sanabilia , dolosa , malefica , contumacia. atque hæc cùm inveterata sunt , chironia , & telephia nominantur. Quorum omnium ulcerum tractatio & diffinitio à Galeno est petenda 3. & 4. methodi , ex Celso , & Ægineta. addo his ulceribus quæ Avicennas ægrè sanabilia , occultam quandam nobis proprietatem habere dicit. Hæc enim , inquit , neque putrida sunt , neque corrosiva , neque ambulativa ; sed sunt neutrius dispositionis plana , claudentia se , & recidivantia sæpe , & rursus se aperientia , & renovantia.

DE VULNERIBUS CAVERNOSIS.

CAP. VII.

CAvernosâ dicta ulcera , plerumque ex tumoribus præter naturam , & magno aliquo apostemate fiunt , quæ plus iusto maturari permessa , vel acuto , vel cæuterio aperiuntur , atque lichinus ovorum albo intinctus inditur , deinde digestivum ex vitello ovi , & rosaceo quo-

quotidie adhibetur; præterea ad mundificandum rosato melle lichini saturi intruduntur, basilico unguento aut alio, ex ijs quæ in usu sunt, superposito; curantur autem, singulis diebus semel, aut ad summum bis: cùm verò curatur, lichinis extractis, & pure quod interius fuerit expurgato, rursus obturantur. atque hic curationis modus tamdiu prolatur, quoad à tædio jam affectis, ægrotus insanatus relinquitur, quem ut honestius dimittant, ceratum linteum diaquilone majori, aut ab aliis armoniacato diaquilone extenso, imponitur; (cum tamen an hoc an illud noceat, an conferat, planè ignoretur) atque hac re integra sanitas ægrotantibus promittitur, iussis id ceratum bis uno quoque die repurgare, & abstergere. Hoc autem modo curata quædam sanari non possunt, quædam & ultra annum protrahuntur. Fiunt etiam & ejusmodi cavernosa ulcera ex vulneribus recentibus, & nervorum puncturis, atque in carnosis quoque locis, non bene curatis vulneribus, sæpe facta fuisse vidimus: atque ex simplici vulnere, eoque parvo, non solum magnum, & carnosum ulcus aliquando evasisse conspeximus, ex quo nimium puris deflueret, sed qui hujusmodi paterentur, ethica tandem feбри correptos periisse.

perisse. atque eò nostræ res redactæ sunt, ut cùm hæc omnia committantur quotidie; minus tamen curæ iis sint, quibus maximè esse debuerunt; id adeò ob nostra hominum scelera, evenire arbitror. Quemadmodum autem hujus generis cavernosa ulcera curanda sint, cum ab aliis antiquis, & novis auctoribus, tum à Joanne Vigone rectè, & dilucidè præceptum est, atque omnia eo modo quem ille docuit, optimè curantur. In primis enim duo mundificantia medicamenta proponit, quorum alterutro ulcus, per parvulum clysterem lavari possit: deinde & absterivo, ordei decocto, & rosato melle composito; hinc aliquo eorum quæ carnem inducere possunt; ac tandem ligatione, eo modo quo à nobis dicitur, additis omnia sanantur citissimè, & cavitates, & cavernæ coherent, & caro carni committitur. Atque nos quidem hac Joannis Vigonis curatione usi innumera ferè hujusce generis ulcera sanavimus. Verum enimvero cùm hoc modo, atque his lotionibus à Vigone descriptis, hæc antiqua ulcera quamvis callosa, quamvis puri faciendo, atque emittendo longo habitu assueta, sanari facilè posse videremus, neque quicquam in ea re excessus esse; alium curandi modum faciliorem multo,

mu
que
ape
divi
ex
qui
exp
lupt
pro
qua
vita
ratu
ape
deff
null
re, a
tum
ea a
moi
fuer
ita u
fit:
cont
loce
latu
præ
festu
pus
evae
tura
cuti

multo, atque breviorē excogitavimus,
 quo in apostematibus, cū primum
 aperiuntur, uteremur; qui modus ex
 divino beneficio optimè, atque omnino
 ex animi sententia successit: id quod,
 quicumque in curandis apostematibus
 experiri voluerint, non sine magna vo-
 luptate certum, atque facillimum esse
 probabunt: nam tertio, aut ad summum
 quarto die omnis illa apostematum ca-
 vitas commissa, atque conglutinata cu-
 ratur, nihilque hians relinquitur, præter
 apertionem, quæ arte facta est, quo pus
 deflueret, atque exprimeretur. idque
 nullo aut agrotantis periculo, aut labo-
 re, aut alia difficultate; etiam si magnus
 tumor sit, multisque cavernis excavatus.
 ea autem curatio huiusmodi est. Si tu-
 mor, vel exitura, sive apostema magnum
 fuerit, imprimis optimè aperiendum est,
 ita ut minimus digitus orificio indi pos-
 sit: omne verò opus, quidquid intus
 contineatur, defluere permittatur, atque
 loco ipso leniter comprimendo, expel-
 latur; quanquam communi scribentium
 præcepto hoc repugnare videatur. mani-
 festum enim rectè rem cogitantibus est,
 pus retentum magis quam si omnino
 evacuetur, nocere posse: namque na-
 tura pure interius interjecto, carnem
 cuti committere, & conglutinare nequit.
 Igitur.

Igitur pure expulso, lichinus ex stupa confectus, & crassus quantum est orificium, quo pus defluserat, indatur. Super hoc autem pulvillus imponatur, ac deinde ligetur, atque ad posterum usque diem sinatur. Postera die ligatura solvitur, ulcusque omni si quod subest, pure expurgetur, deinde fistula ex plumbo orificio indatur, quantum ipsum orificium est, qui ad cavitatem usque pertingat, neque ulterius adigatur. Super hæc cerotum linteo extensum, ex basilico admoveri potest, foramine ad ipsum osculum facto, quo & plumbum contineatur, ne excidat: deinde ex utroque cavitatis latere, singuli pulvilli triangulares ponantur, ita ut totum cavitatis spacium utroque pulvillo impleatur: ulceris verò orificium, qua plumbea facta fistula est, liberum relinquatur, neque pulvillis obturetur, neque ligatione occupetur, quo omne, quod intus fuerit, pus expurgetur, tum vitta (quæ biceps dicitur) locus, pulvillis contentus, colligetur mediocriter comprimendo, ita ut ægrotus non doleat. Ligatio autem à remotiori ulceris parte inchoanda est, leniter premendo, atque pus quod intus est, orificium versus adigendo: vitta autem utraque manu in utramque partem involvenda est: atque hoc modo pus omne

ex-

exp
pos
luta
fuei
qui
nar
ribu
& c
veni
& l
ceba
post
dem
conj
si ne
loco
vitta
utan
hian
omr
do c
villi
ulce
aliqu
cetui
dieb
dum
ulce
est,
ta fu
lore

exprimitur. sic verò ligatum ulcus, in
 posterum diem relinquatur, quo die so-
 luta ligatura, quantum cavi relictum
 fuerit metimur, ut pervideamus, nun-
 quid loci sit quò pulvilli non pertigerint:
 namque omnia quæ pulvillis triangula-
 ribus subiecta fuerant, conjuncta jam,
 & conglutinata inveniuntur. hæc ubi in-
 venta sint, rursus pulvilli eodem modo,
 & loco non permutati, sed ut antea ja-
 cebant, repositi ligabuntur, atque ad
 posterum usque diem relinquuntur; eo-
 dem enim die omnia optimè cohære-
 re, conjunctaque esse deprehendentur. quòd
 si nonnihil humoris, aut puris aliquo in
 loco relictum esse videatur, eo pulvilli
 vitta referandi sunt, quorum usu eodem
 utantur, & pus exprimetur, & locus ipse
 hians coalescet, & committantur partes
 omnes optimè. Hæc autem ubi hoc mo-
 do curata, atque observata fuerint, pul-
 villi triangulares illi amoventur, atque
 ulceri ipsi linum, leonato ceroto, aut
 aliquo alio quod commodissimum judi-
 cetur, imponatur: hoc autem singulis
 diebus septies, aut etiam octies abstergen-
 dum est, atque hæc optima, & certissima
 ulcerum hujusmodi curandorum ratio
 est, quæ nunquam, si rectè administra-
 ta fuerit, medicum fallat: neque aut do-
 lore, aut difficultate aliqua ægrotus af-
 ficietur.

ficietur. qua in re, nos longo atque assiduo experimento testari verè possumus, innumera ferè ejusmodi ex tumoribus præter naturam effecta ulcera cùm primum apostema adapertum est, curare cæpisse, & exitum ipsum semper è sententia evenisse, etiamsi ob nimium puris defluxum nobis foret contendendum. Aliorum verò antiquorum ulcerum, ille quem præscripsimus, curandi modus optimus, præstantissimusque est: nam cùm ob diuturni mali causam, callosa interius illa & fistularum instar sit, & locus ipse totus pessimè habeat, ejusmodi curationem maximè requirunt. Postquam autem ulcus sanatum fuerit, ceratum ex confortativo, quo membrum ipsum reficiatur, addendum est; atque hoc tertio quoque die amotum, & sudore absterfo, denuo est reponendum, quoad membrum in pristina sanitate & vigore confirmatum sit.

Quæ verò minorà apostemata, sive exituræ fuerint, hoc modo quam brevissimè curantur. Cum primum ferro incisa, aperta que fuerint, lichinus stupeus ovi albo intinctus indatur; qui postero die auferitur: deinde leonatum, sive medium cerotum in lino extensum, imponatur, atque ulcus decies, aut etiam pluries singulis diebus abstergetur: hoc enim

enim modo brevissimè ex divino beneficio sanatur.

A N N O T A T I O.

Cavernosum ulcus, quod sinuosum Latini vocant, est cujus orificium strictum est; profunditas verò latior: multosque anfractus habet, & cuniculos, citra tamen callositatem, & duritiem, qua ratione à fistula differt: semper enim est cum duritie & callo conjunctum.

Plerumque ex tumoribus præter naturam] *Causas tradit auctor ejusmodi ulcerum, quæ aut sunt abcessus, sive suppurantis affectus tardius dissecti, & vulnera perperam curata: vulnera inquam quæ tereti, plano, rotundo potissimum telo fiunt, ut sensit Hipp. lib. πει τετρατον. Pus namque longo nimis spatio in suppurato abcessu, aut in profundo vulnere, quod non ritè expurgatur, retentum ac de litescens, malignitatem, ac veluti acrem ac erodentem naturam acquirit, & cuniculos tandem molitur, qui difficile admodum carne impleri, & glutinari queunt: ad affectam namque partem, quæ jam imbecillitatem contraxit, undique ex circumfluentibus ac vicinis partibus, imò ab universo corpore supervacanei humores confluunt: atque ita agrè sanabile redditur ulcus.*

Quam

Quamquam communi scribentium præcepto] Docet auctor hujus vulneris chirurgiam, quæ ratio est Galeni, Aëtij, Pauli, Guidonis. Etenim sinus qui deorsum vergit; aut ad latus declinat, vel intro fertur: si inquam illi situm dare non possis, quo liberè sanies effluat, nihil promovebis unquam, si ve carnem generare, si ve glutinare velis, nisi prius collectioni purulentæ effluxum mollius fueris, nempe facto, ut auctor docet, in imo sinus vulnere, vel tota cavitate dissecta. Verùm adnotandum est, non semper hanc chirurgiam locum habere: quando videlicet plaga in sinuoso ulcere fieri non possit, nec commodè dissectari: atqui tunc recurrendum est ad detergentia, ut Galeni exemplo docemur secundo ad Clauconem, quo loco melicrato utitur Galenus, nunc vino cum eo.

DE ULCERIBUS

capitis quæ aut ex tumore scirrhuso nascuntur, aut ex morbo gallico cum ossis corruptione.

CAP. VIII.

VLcera capitis, quæ maxima ex parte fiunt ex tumoribus scirrhusis morbi gallici causâ subortis, super ipsum pericranium consistunt: cui quoniam est nervosum, & minij sensus, & cum dura me-

menynge copulatum, dolores inferunt permagnos. præterea ejusmodi tumores, seu apostemata cum circa cranium versentur, humorque ex quo pendent, crassus sit, frigidusque, ac gravis naturæ, extemplo corrumpit ipsum ante maturationem, & ubi pus est generatum, factòque deinde pure, aut sponte rumpi solet apostema, aut opera chirurgi est aperiendum. Curationis methodus si os corruptum fuerit, quod peritus artifex facile cognoscet, contactu solo, absque aspectu, ac per hoc quod pateat, sine pericranei detectione. Consentaneum enim est rationi, humore putri super os ipsum incumbenti, præsertim longo tempore, ut in ejusmodi fit malis, ejus fieri corruptionem. quod si ita habeat, oportet cranium manifestare, aperto apostemate crucis in modum, secundum ejus totam longitudinem: deinde formandum est ulcus suis linimentis, seu lichinis in albumine ovi & oleo rosaceo subactis, madentibus, ita ut fortis fiat compressio, ad hoc ut cranium, quod supponimus esse corruptum, maneat detectum. Altero die adhibeatur medicamentum maturans, ex vitello ovi & oleo rosaceo, cum modico croci: maturatòque ulcere, quod quatuor dierum spatium fiet, intendere oportet statim ad cor-

R.
ium
schi.
Pau-
ver-
r: st
ibevè
, si-
, nisi
litus
imo
Ve-
chi-
blaga
modè
d de-
r se-
crato

J S
cir-
rbo

par-
iosis
sum
n est
dura
me-



corrupti ossis extractionem: quod ad
 hunc modum efficiatur. Ponatur vitrioli
 Romani usti pulvis super cranium cor-
 ruptum omni ex parte: verum caveas
 ne ulceris labra nimium attingat qua
 parte caro est; desuperque apponantur
 linimenta sicca quæ totum ulcus re-
 pleant, ne labra coire valeant, quæ vo-
 lumus manere aperta, diductaque. pul-
 veris hujus appositio fieri debet quoti-
 die, quousque denigrari videatur cra-
 nium: quo denigrato, procuranda est
 ejus emollitio, ut promptè decidere
 possit; quod fiet optimè, si singulis
 diebus linimenta ex oleo rosaceo cranio
 admoveantur ipsi; reliquum verò ulcus
 linimentis aridis repleatur: ac super
 omnia hæc unguentem basilicum in co-
 rio extensum cooperiatur. Fient ista
 quidem, donec os undique separari vi-
 deatur, quod quidem deprehendes, si for-
 piculis contrectatum, circum labra un-
 dique sectum apparuerit. Hoc tempore
 curari debet balsamo illo, quo tracta-
 tione de vulneribus capitis usi sumus;
 inuncto osse pluma, seu calamo, in eo
 ad ignem liquefcenti intincto; hoc
 namque linimentum carnem producit
 inter os corruptum, & sanum: qua in
 medio crescenti paulatim os sublevari
 solet. quocirca necessarium est, in eo
 interim

interim temporis spatio, & suis intervallis, os illud ferramento aliquo prehensare, fortiter quidem, nam levis apprehensio non satis est, ob ejus difficilem separationem, donec foras egrediantur. Osse deinde egresso, ac perseveranti curatione, cum prædicto balsamo, & ulcere cum aridis linimentis pleno, ac de super appposito emplastro, ex gummi elemij, aut de minio, perfecta succedet sanatio. Verùm si præfatum ulcus inveteratum fuerit, & inscitia chirurgorum, ut sæpe usu venit, totum cranium corruptum sit, adeò, ut dura meninx, tum crassa materia, tum carne superflua, valde sordida sit; oportet ejusmodi ulcus pulvere Joannis Vigonis curare ad eum modum quo reliqua ulcera. Cæterùm ne hujusmodi pulvis dolorem inducat, ob id quod caput princeps sit, & multum sensus; expediet eum, sequenti ratione, præparare prius.

R. Joannis Vigonis pulveris ℥ ij.

*in mortario stanneo in quo aquæ rosacæ
℥ j.*

conjecta quoque sit: pistillo agitentur paulum, ac deinde effusa aqua statuat in mortarium ad ignem, donec pulvis desiccetur, iterumque æquabili aquæ quantitate injecta, ac cum pulvere in mortario agitata, effundatur aqua, & desiccetur

G

tur

tur pulvis ad ignem, ut antea. Pulvis dictus admoveri potest menyngi duræ, tutò admodum; atque hoc mundificabitur ad unguem. quod si fortè acciderit, quemadmodum sæpe contingit, ut intra cranium, & duram menyngem, multum pus sit collectum, ob communio- nem mutuatam, inter pus cranium insidens, & id quod per cranium corruptum, ad membranam accedit, quemadmodum ego vidi in quatuor agrotantibus homi- nibus, oportet tunc eorum compressis naribus jubere ut cohibeant respiratio- nem ter, quaterque singulis diebus, ut pus, illud foras egrediatur è durame- ninge. atque ita fieri expertus sum cum sælichi successu, exhibito interim decocto ligni Indici secundum eam me- thodum quam mox dicemus capite de Morbo gallico.

A N N O T A T I O.

Si ulcera à vulneribus differunt, quòd hæc cruenta, recentiaque sint; illa diuturniora, magisq; purulenta; methodus curandi tantum differet, quanto ulcera vulneribus sunt magis humida: unde majori etiam desiccatione egent. verùm cum non nuda ulcera proponat auctor, sed composita; composita sunt tractanda me- thodo: si morbi gallici vitio oriuntur, in he-
pate

pate et
section
humor
dum;
illud,
tanden
ut Gal
Cu
ptum
spici po
8. cap
occafio
multi
nunqua
docuit
princip
petat l
ex puri
aliquot
tenuius
magnit
Fractus
Ope
venæ,
alioqui
dolorosa
si ea pa
ulcus,
gatur,
demissis
mento c

pate est hujus mali prima labe: ergo venæ sectione & purgatione vacuandus maleficus humor est; atque ad partem affectam veniendum: à qua est profligandum symptoma illud, sive inflammatio aut tumor, aut dolor: tandem siccantibus est perficienda curatio, ut Galenus vult libro secundo 27. τόπος.

Curationis methodus, si os corruptum fuerit] Ossis corruptio si oculis perspicui potest, est certissima, ut ait Celsus lib. 8. cap. 2. Verùm si oculis hæc non detur occasio, conjecturis est deprehendenda. ut si multi dies abierint, & non coalescat ulcus: nunquam enim osse vitiato coalescet, ut docuit Galenus libro de Vsu parium, & in principio libri de Ossibus: ex quo loco causam petat lector. aut si tecum expenderis, num ex puris generatione, vel retentione os vitium aliquot contraxerit: præterea num ex ulcere tenuius copiosiusque pus manet, quam ulceris magnitudo postulet. vide Galenum 3. de Fracturis, de osse quod abcessurum erat.

Oportet cranium manifestare] Nisi venæ, aut arteriæ, aut nervi id prohibeant: alioqui facilis est hujusmodi curatio, & minus dolorosa, ut ait Celsus lib. 8. cap. 2. Verùm si ea parte os alteretur, quo dilatarî non possit ulcus, sic ut vitiatum & corruptum os detegatur, tunc vel penicillis in fundum usque demissis, aut spongia vino lota, vel medicamento carnem exedente ulcus ampliabimus.

Ponatur vitrioli Romani] Advertendum est, ante horum medicamentorum appositionem, corpus esse vacuandum, illudque semper agendum, ne ulcus inflammatione corripiatur.

Quo denigrato procuranda est] Non in omni ossis alteratione hæc procuranda nigrities est: nam hoc esset malum malo addere; omne enim os, quod absque carie sit alteratum, scalpello abraderi satis est, ut Paulus ait lib. 6. cap. 77. Quod quidem tamdiu abradis, donec aliquid sanguinis appareat; quia quod vitiatum est, aridum sit necesse est, ut Celsus ait. advertat itaque diligens lector, auctorem nostrum de eorum ossium alteratione mentionem facere, quæ corruptionem adjungam habent: quod totum profecto excidendum est, (artificio hoc capite tradito, aut alio simili) ut auctor est Paulus libro sexto capite de Fistula.

Ex vitello ovi & oleo rosaceo] Mirabitur fortassis aliquis, cur hæc miscellam capite de Vulneribus capitis damnarit; hic verò illam doceat. Tolleitur hic scrupus, si utriusque diffinitiones perpendas: vulnus enim cum solum divisio sit continui, ad glutinari postulat; ulcus cum præterea saniem habeat, quæ concoqui debet & abstergi, merito tale medicamentum flagitat quod utriusque est particeps facultatis.

Nota .

DE CURANDO MORBO

GALLICO.

CAP. IX.

Lues ista gallica non unico modo infestare coepit inter initia miseros homines, sed varijs atque varijs; ac proinde non ita facilis fuit ejus curationis inventio: novitate ergo mali, tum medici, tum chirurgi commoti, videntesque passim hanc luem cum nullo non morbo conjunctam, grassari per populum, maximè insudarunt ad inquirendam methodum, qua posset tam pertinax morbus propulsari integrè. Itaque cum expendissent diligenter admodum morbum hunc gallicum, speciem afferre scabiei omnis generis, nonnunquam cum impetigine, aut vitiligine, alopecia, achoribus, verracis utrislibet: nonnunquam verò cum tumoribus pituitosis, aut melancholicis, aut ulceribus corrodentibus, atque sordidis, crancrosisque, pariter atque serpentibus, unà cum ossium corruptione: nonnunquam item cum doloris omni specie, cum febribus ethicis, & pluribus alijs morborum differentiis esse comitatum invenerunt tandem varias curandi rationes, adeò ut nemo sit hoc morbo affectus, qui non facillimè ac tuto ab eo

150 DE CURAN. VULNER.

liberari queat, si suffumigia, unguentaque excipere volueris, quæ non sine multo sudore admoventur. Verum quia pauperes nequeunt præ inopia maximis sumptibus sufficere, visum est mihi operæpretium, ex duabus curandi methodis, quas semper sum expertus, optimas, quibusque curatu difficillimos ægros, vel in marasmo constitutos, ad salutis portum perduxi plurimos, eam quæ per unguenta fit, primùm scribere. Præparato igitur corpore per tres aut quatuor dies, syrupo sequenti qui ad hunc modum scribit.

Rx. Syrup fumiterræ & mellis rosati ana ℥ i.

aque fumiterræ ℥ iij.

deinde purgabuntur his pillulis quæ de hermodactylis dicuntur, & arthretice, aut si mavis, purgentur cum catapotijs aggregativis, aut aureis, aut de nitro secundum Alexandrum, aut de fumo terræ, aut de agarico, pro laborantis, & morbi conditione. quod si illis magis placuerit potio cathartica, propinet catholicon, aut electuarium Indum, aut hamec confectio, aut dia sena, unà cum agarici trochiscato, aut similibus. Interea temporis comedat laborans semel singulis diebus vervecinas carnes, aut gallinam assam; vesperi uvas passas.

Pur-

Purgato semel corpore, accipiat sequentis decocti summo mane ℥ ij. & totidem hora secunda post meridiem: hycme verò, quarta hora post cœnam. fit autem decoctum hoc modo.

℞. Polipodii quercini ℥ b.
folliculorum senæ ℥ j.
rhyni & epibimi ana pug.

fiat decoctio secundum artem in librâ aque novem usque ad consumptionem tertiæ partis: in cuius colatura misce sacchari rubri ℥ viij.

mellis communis ℥ j.
& fiat apozema. Hujus medicamenti portione expurgabitur æger citra ullum laborem, ac cum proba humorum coctione: qua peracta decoctione, capiet catapotia duo pro arbitrio medici nocte intempesta. Tertio deinceps die ungendum est corpus, noctu post cœnam unguento sequenti, quod inter alia primas mihi habere videtur:

℞. Axungie porcine ℥ viij.
butyri ℥ j.
olei laurini chamemeli, anelbi, dialtheæ ana ℥ ss.
argenti vivi extincti ℥ iij.

fiat unguentum; ungantur juncturæ propria si fieri potest manu ipsius laborantis, nam hoc est egregium, ac primum pedes, malleoli & plantæ, genua, popli-

tes, inguina, lumbi; deinde verò axillæ, humeri, cubitus & manus ipsæ, apostematæque omnia, dummodo non teneant caput. Infricandum est autem unguentum, adeo ut penitus imbibatur, maneatque laborans in lecto quietus, ac mediocriter coopertus, ita ut inter edendum unquam manum exercere permittatur. Altera autem die, ac deinceps sequentibus repetatur inunctio, qua dictum est ratione, donec os, gingivæque intumescant; quod interdum duobus diebus interdum verò tribus, aut quatuor usque venire solet. quamprimum igitur apparuerit oris nocumentum, & gingivarum tumefactio, cessandum est ab unctioe, & non antea.

Cæterum quo tempore ungitur corpus, edat æger vervecis carnem, aut gallinam, aut hædum elixum, aut assum, meridie, ac vesperi: bibatque vinum dilutum, ac album: absoluta verò inunctioe, abstineat à carnibus, ac aliis: prandeat solum jus cicerum cum mica una, aut altera panis; cœnet amygdalatum, bibens decoctum anisi, ac glycyrrhizæ: nec liceat illi vinum accipere per mensem proximum, donec sanitati sit restitutus, quantum ad os attinet: postea verò quàm sanatum fuerit os, poterit comedere semel in die castrati arietis car-

carne
tuor
robor
victu
per c
niam
justo
quam
retur.

N
hæc ca
tum n
non su
tum e
compe
liqueri
langu
Quia
seorsu
thodo
in pub
hunc n
adveri
essenti
tracta
an in
cens;
memb
sa cor

carnem aut gallinam, præstolatus quatuor plus aut minus dies ampliorem corroboracionem: debet enim ægrotus hac victus ratione perseverare, interea dum per os expuitur paulatim pituita, quoniam contraria ratione servata, ac plus justo comedenti ægrotato; vacuatio illa, quam exoptamus, vehementer, præpediretur.

ANNOTATIO.

Non decreveram quicquam adnotare in hæc capita: tum quia nemo est qui medici tantum nomen gerat, cui tota hæc curandi ratio non sit explorata; frequentique usu periclitata: tum etiam quia ita multos singula adnotasse comperio, ut sequentibus nihil dicendum reliquerint, præsertim indies, magis ac magis languescente morbo, & fere jam senescente. Quia tamen unctiones, suffitus & guajacum seorsum proponit auctor, brevibus, qua methodo quæque sint admovenda, exhibendare, in publicam causam scribam. Qui igitur rectè hunc morbum curare velit, ad hæc in primis advertat necesse est, (nam causas, effecta, essentiam ab alijs, qui ex professo hanc rem tractarunt, petere licet,) primum quidem an inveterata sit ægritudo, num verò recens; & quomodo processerit, & ad quæ membra: si nervosa jam occupavit, si ossa corrupta; tum si benignior sit, an sera.

& si multæ sit materię, an pauce, & an tenacis, ac tractabilis magis; tota ne introrsum sit, an extrorsum; & si ulcera multa sint, an plus dolorum, quàm pustularum, vel contra, similiter & gummositarum: & ut uno verbo dicam, omnes differentiæ hujus morbi ante oculos habendæ sunt. his ergo perspectis, scito eam labem, quæ jam ossibus insedit, extra spem esse, nisi fortè ea ossa uri possint, quare aut curationem repudiant, aut malum rediturum pronunciant.

Præparato igitur corpore] Quia permixta sunt omnia, tum seminaria, tum materia, propter lentorem: an amplius simul sunt pustulæ, & gummositates videndum est. Si quod unum ingenium & remedium est, quod omnia exequatur & omnibus valeat: & an plura requirantur; & quæ ea sint: nam sunt qui tentarunt per purgationes solas omnia absolvere: alij per inunctiones, alij per suffitus, alij per ea quæ in sudorem convertant materiam, alij per ea quæ in sudorem convertant materiam, alij per ea, quæ obsistunt contagioni: alij verò modo uno, modo alio auxilio, ad diversa utuntur: noster auctor rectè proponit digerendam, præparandamque materiam esse, quæ mox educenda est: oportet autem calida esse & attenuativa, & ut dicunt, incisoria.

Purgato semel corpore] Facta prima evacuatione rectè facere mihi videntur, quæ
rursus

versus concoquant & purgent; vidimus enim qui factis exactè purgationibus, probè fuerint sanati: sunt qui secundos syropos etiam solutivos faciant; addendo illis aut senam aut agaricum, aut hermodactylum, eum scilicet, quem nobis exhibent officinæ.

Tertio deinceps die] Suaderem ego omnia tentare prius quam ad hæc acerba venire; etenim fastidio plena est curatio hæc & periculo; quis enim non formidet argenti vivi vim, penetrationem, & repercutiendæ facultatem? nam dum crura, brachia unguis, materiam intrò pellis; & contra Galeni methodum, ex ignobili ad princeps viscus detrudis experimento tamen comprobatum est, extremo hoc beneficio multos deploratos convaluisse: atqui ne præter rationem esse videatur tale experimentum, ita iudico, medicamenta hæc iis constare, quæ seminaria excurrunt, & totam materiam exsiccant, & abstergunt, & liquant, & in sudorem vertunt; ut hanc compositionem ponderanti manifestum fiet.

Quàm primum igitur apparuerit] Non est compescenda hæc saliva, verum permittenda est, & os vino abluendum est; aut aluminis decocta. tanta subinde oris est exulceratio, ut nec mandere, imò nec bibere primis diebus possint ægri: dentes labefactantur, sætet anhelitus, ac multos tremulos obiisse compertum; aliis post inunctiones rediisse.

diisse. dicam quod Parisiis vidi: *Adolescens quidam fuste percussus ad tempora, convulsus periit tertio die; aperto capite inventum est os cariosum; cui hydroargyri portio inventa est. observandum itaque est, ne caput inungas, neve magna huius sit medicamenti pars: verum aliis magis, minusve addatur.*

DE RATIO CURANDI per suffitus.

CAP. X.

IN primis paretur cathedra in medio perforata, instar pelvis, in qua exonerari solet alvus; paretur etiam papilio ex linteaminibus distentis, arcu rotundo, ex vimine, aut alia materia structo; ita ut totum receptaculum, in quo collocandus est æger, trium palmorum sit capax: cooperiatur de super papilio aliis lodicibus ita aptè, ut fumus exire neuriquam permittatur ulla ex parte: in quo loco ubi sederit ægrotus, statuatur in vase aliquo prunæ ardentes subter cathedram, in quas injici debet trochiscus unus ex novem quos paravimus, singulis vicibus. ac postquam per horam exuderit, cavendum est strenuè quo minus frigeat: quinimò involutus linteaminibus & lodicibus, quibus in papilione regebatur, transferatur in lectum, in quo totam

tot
ide
pro
hib
que
ma
om
cap
len
rati
R.

gra
cur
rin
egi
est
sun
pa
sun
ul
m
su
est
la

totam diem atque noctem jaceat. Hoc idem repetetur per duos alios dies, ac pro singulis suffumigiis tres trochisci adhibeantur suo ordine, donec novem quos dicemus, absolvantur, ac consumantur. victus autem ratio eadem est omnino servanda, quæ in proximè dicto capite descripta est. Siquidem consimilem patietur ægrotus in ore noxam. Paratur suffumigium hoc modo.

℞. Cinabri ℥ ij. ℞.

in partes crassiores triti thuris, styracis liquidi ana ℥ i. ℞.

misce: & formentur novem pastilli rotundi.

A N N O T A T I O.

Invenere item empirici & suffitum: ægrotum collocant in matella, pannis optimè circumtegunt, ut ne etiam os extet, tum cynabarium cum thure mistum, quo suffitum incalcescit æger mirum in modum, ac sudat. acerbissimum est medicamentum: quo ego nunquam ausus sum uti ad corpus totum: ad certas autem partes, ut crura & brachia, quum sphaelceli sunt, vel ferè gummositates vel dolores, vel ulcera malè morigerata, etiam præstantissimum arbitror. Ceterùm ab eo abstinendum suadeo: nec empiricis credendum, quibus nihil est temerarium magis, quando ausi sunt pilulas ex argento vivo propinare: in quo errore

quondam fuisse legimus Brasavolam doctissimum medicum. utuntur cynnabari, quoniam in ipso est potentia argentum vivum.

DE RATIONE CURANDI

Morbum Gallicum cum decoctione guajaci.

CAP. XI.

HUJUS medicamenti potio maximam habet prærogativam in curando morbo Gallico, sive cum ulceribus fatigaverit, sive cum doloribus, aut tumoribus, scabie, febre ethica, aut quibusque aliis affectibus, imò verò egomet hoc medicamento curavi podraga laborantes, ac quamplurimos præ morbo Gallico tabefactos, & motu omni orbatos, pedibus, ac manibus qui in horas vehementia dolorum marcescebant. Ergo præparato corpore cum serapiis, humoribus peccantibus accommodatis, ut cum syrupo fumiterræ, melle rosaceo, syrupo borraginis, epithimi, & aliis; purgandum est corpus cum catapotijs, aggregativis, aut de hermodactylis, aut aureis, aut arthreticis, aut fumiterræ, prout expedierit: factaque semel purgatione, præparetur iterum ad secundam purgationem sequenti decocto.

R. Po-

R̄. Polipodii quercini multum contusi
 ℥ iij.

folliculorum senæ ℥ j.
 thymi epithimi ana pug. j.
 fiat decoctio in aquæ ℥ vi.

ad tertiæ partis consumptionem, cui
 adde hermodactylorum pulveris in mo-
 dum triorum ℥ j.

ac deinde in expressione, & colatura for-
 titier effecta, misce mellis communis ℥ j.
 sacchari rubri ℥ semis; ac bulliant
 simul donec desumentur.

Singulis itaque diebus summo mane, &
 vespere duabus aut tribus horis post me-
 ridiem accipiat hujus syrupi libræ semis-
 sem, donec universus exhaustus sit: ita
 tamen ut qualibet vice tota decoctio a-
 gitetur prius: qua absoluta præparatio-
 ne, purgetur secundo corpus semidrach-
 ma catapotioem dictorum.

Altero autem à purgatione die, inci-
 piet assumere decoctum ligni guajaci ad
 hunc modum parati antea.

R̄. Ligni sancti molliti valde ℥ viij.
 corticis ejusdem ligni apud Indos separa-
 ti ℥ xij.

vini albi odorati ℥ xij, aquæ tantun-
 dem, macerentur per diem naturalem
 in vase vitreo, ac deinde lento igne,
 ac cooperta olla coquantur paula-
 tim ad tertiæ partis consumptionem,
 cu

160 DE CURAN. VULNER.

cui adde hermodactylorum valde tritorum \bar{z} ij.

quos cum decocto in vase simul valde agitabis, quo melior fieri possit commistio, ac deinde in ollam conjicies, reliqua decoctione plenam, ac tegas, ac mox ab igne separes.

Quæ ubi refrixit, ac subsederit, fiat gemina colatura in duplici vase; altera quidem majori quantitate, ac clarior per se servetur in vase mundo pro communi potu in prandio, & cœna; altera verò expressione multa fiat, ac reponatur item in alio vase mundo, de qua summo mane ac vesperi duabus aut tribus horis post meridiem; hyeme verò quatuor horis post cœnam, libræ semissem sumet, ut dictum est, calidam quidem hyeme, reliquo tempore non est opus calefacere. quòd si decoctionem prædictam volueris efficaciorē facere, pro aqua capias decoctum fæculentæ materiæ, quæ ex priori superfluit, ad tertie partis consumptionem; & addas vinum, & reliqua quæ diximus in descripta jam decoctione fiant; donec tota jam bibita sit: victus ratio servanda est, quo tempore purgatur corpus, & præparatur syrupis, tunc carnes vervecinas seu castrati arietis elixas meridie concedimus; passas verò uvas vesperi: quo verò

tem-

tem
dore
bitè
fulas
ferre
fuer
adec
pull
solas
genc
dien
est a
usqu
mini
men
aut a
cuer
furg
& di
ut d
tuat
tem
habi
bit p
riter
cere
mus
hen
apu
tuti
pori

tempore bibit decoctum guajaci, ac sudorem sustinet, debet jacere in lecto debite velatus, comedetque, ac coenabit passulas solas, cum modico pane, si vires ferre potuerint, Si verò æger debilior fuerit, aut delicatior, quàm qui rigidam ad eò pati valeat abstinentiam, prandeat pullum elixum absque jure: coenet verò solas passulas. Hac demùm ratione regendus est æger, ad trigessimum usque diem: quo transacto, poterit bis, hoc est ad prandium & coenam, edere carnes, usque ad quadragesimum diem, plus aut minus pro morbi conditione: caveat tamen ne interea temporis, aut vinum, aut aquam aliam bibat ægrotus ac si placuerit tempore calido surgere è lecto, surgat quidem transactis viginti diebus, & duabus à sudore horis: sic enim fiet, ut dicta methodo servata sanitati restituatur æger cum optima membrorum temperatura, & totius corporis specioso habitu. eademque profus ratione licebit podagra laborantes, & paralyti, pariter ac convulsione, ad sanitatem reducere, modo illud memoriæ mandaverimus, corticem scilicet ligni sancti detrahendum esse apud Indos; quoniam qui apud nos decorticatur, est debilioris virtutis. Similiter lignum sine cortice asportatum ad nos non probatur, eo quòd vires

R.
 rito-
 agi-
 ssio,
 liqua
 mox
 fiat
 lera
 rior
 om-
 lera
 ona-
 qua
 t tri-
 verò
 mis-
 qui-
 n est
 nem
 ere,
 ntæ
 ad
 ddas
 de-
 tota
 est,
 pa-
 i seu
 cedi
 verò
 em-

vires gerat exhaustas, & cito nudum
corrupatur; non probatur etiam li-
gnum absque corde, ob eandem ratio-
nem.

ANNOTATIO.

Nascente hoc morbo, statim se Empirici
ad inunctiones transferebant, quæ (ut dixi-
mus, è causticis fiunt; edocti, quod ab Ara-
bibus acceperant, ulcera cacoëthe, & quæ
ipsi vocant, hujuscemodi curari præsidii. sed
certè ego satius existimo, talia admove-
re, quæ posteriores medici tanquam acerba minus ap-
probavere, & nullius esse periculi cognovè-
re qualis est ligni guajaca usus, eventum, expe-
rimentoque quotidiano, & ratione approba-
tus. de quo ligno varii auctores ita singula ad-
notarunt, ut quare proste (è natura ipsius de-
promptis causis) nobis dicendum reliquerint.
Sciendum itaque est hanc arborem exactissime
omnia præstare, quæ in hoc expetuntur morbo
nam quoniam è subtilissimis constat partibus,
iisque calidis circa tertium gradum, & siccis,
& resinosa est; potest plurimum exsiccare
modis omnibus, hoc est per caliditatem, per
siccitatem, per se (ut ajunt Philosophi) &
per imbibitionem; potest & sudorem provo-
care, tum & subiliare, & materiam liquare
& abstergere, ac demùm eò quòd resinosa sit,
putrefactioni resistere. Videtur autem & vim
quan-

quandam medicatam habere; propter quod
& album movere solet. Ceterum illud no-
tandum est (quod à perpauca est animadver-
sum) antiquum lignum magis acutum esse,
magis dissolvere, eliquare, magis subtiliare,
quam recens. Quare ubi crassior est materia,
& gummositatis multæ, id est magis eligen-
dum. Recens verò exsiccat quidem magis ea
siccitate, quæ per qualitatem exsiccare potest;
minus per eam, quæ fit à caliditate: quare
ἀπλωε, vel simpliciter exsiccat minus (ratio
petatur ex quarto Meteor. Aristotelis:)
confortat autem magis. itaque in delicatiori
temperatura, materia magis subtili hoc eli-
gendum est. Verùm quia corticis mentionem
facit noster auctor, approbatque summo ap-
plausu recens medicorum turba; hæc addam
de eo, multos indiscretè hoc uti, putantes
magis exsiccare, quoniam siccior videtur: sed
certè ignorant sicciozem esse ea siccitate, quæ
à qualitate fit sicca, & ab imbibitione; non
autem ea, quæ à caliditate: quare & minus
colliquat, & subtiliat minus, & dissolvit,
& sudorem minus movet.

Vini albi odorati] Non in omni tem-
peratura, hac est utendum miscella: quis enim
non formidet tale decoctum biliose tempera-
turæ exhibere; quare indiscretè magno (meo
judicio) detrimento ægrorum usurpavetur:
annotatum enim est multos à potu vini illius
malè affectos in insanabilem ægriudinem de-
cidisse.

cidisse. Quare qui complexionibus calidas, & siccas habent, habitudines extenuatas, materiam morbi adustiore; ij cavere ab eo potu debent: securius accipient, qui crassi sunt, & humidi, & quibus materia morbi segnior est, & multi lentoris, & in locis remotis; in iis enim non inutile erit addere, quod exportet virtutem ligni, & quod subtiliet etiam.

DE CURANDO MORBO

Gallico cum decocto rubi
parillæ.

CAP. XII.

Medicamentum hoc confectum maxime ad morbum gallicum, & hydropem, quartanas fluxiones, atque stranguriam, podagram, & alios morbos, dummodo debite applicare quis illud sciat, & ut convenit, decoquere. Vulgo siquidem errant graviter, qui huius medicamenti ℥ iij. in aquæ tribus libris decoquunt, ad duarum partium consumptionem, alij ℥ ij. rubi decoquere jubent in aquæ libris duabus, ad medietatis consumptionem, alij ℥ iiij. in aquæ tribus libris elixant ad duarum absorptionem, de qua decoctione manent & sero propinant: deinde vero faculentam illam materiam iterum coquunt in aqua pro potu communi, dum prandent

dent ac cœnant. in quibus omnibus etiam, meo iudicio, aut non satis advertunt, quid fieri debeat, medici sola traditione contenti: qui si considerassent, secus multo facerent, nolentes temperamento harum radicum & decoctione prudenter agris officere. Offendi equidem aliquando $\frac{3}{5}$ vj. hujus rubi in tribus aquæ libris decoqui, ad duarum consumptionem, & proportione communi superstitem materiam iterum coqui in libris quinque aquæ, ad duarum itidem consumptionem. qua ratione, atque alijs, de quibus dudum diximus, quamquam ægri à morbo gallico liberarentur, acquirunt tamen hepatis & renum distemperantiam præcalidam, facileque in morbum revertuntur. ea causa; est enim rubus calidi & sicci temperamenti, prope tertium gradum; quæ cum coquatur in tam parva aquæ quantitate, & tanto tempore cooperta olla, ac tanto pondere, multo magis calfacit; ac perinde non conducit ad ejus morbi melancholici jam facti medicationem. quòd si (ut dicemus) decoquatur in minori, scilicet dosi, & aquæ majori quantitate, ac minori tempore. poterunt decocto uti tam manè, quàm vesperi; tum jacentes, tum ambulantes, sine sudore, & sudantes, tempore frigido, & calido,

dummodo à reliquis potibus abſtineant, & eo ſolo inter prandendum, & cœnandum ſint contenti. adde etiam, hac decoquendi rubi ratione futurum facilè, ut unica ſola libra curentur ægri. quantumvis cunctis membris ſint reſoluti, ſcilicet minori ſumptu, abſque biſcocti panis uſu, & abſque tam tenui victu, quàm tenuis eſt is quo alij utuntur. In primis itaque præparato corpore, ſyrupo ex fumo terræ, & melle roſaceo, cum aqua fumo terræ, aut cum alijs ſyrupis pro morbi conditione: deinde purgabitur cum pilulis de nitro Alexandri, de hermodactylis, aut arthreticis, aut fœtidis, aut aggregativis, aut fumo terræ, aut aureis, ſi ſcabie quoque laboraverint. Secundo ſumet apozema deſcriptum cap. ſuperiori, & purgabitur ſecundo etiam his abſolutis, incipiet bibere decoctum rubi vitigineæ, aliàs ſalfæ parillæ præparatum.

℞. Rubi parillæ ℥ iij.

ſectæ ad hunc modum minutim, ac deinde contuſæ ſenæ ℥ ſſ.

agua ℥ xij. in vaſe mundo, in quo macerentur per viginti quatuor horas: poſt ea verò lento igne coquantur, uſque ad trium librarum aquæ conſumptionem, aut eo amplius. quo tempore hermodactylorum tritorum ac ſubactorum in eodem decocto ℥ j. ad-

addas
coop
mota
netur
ſi ſiti
pore
volue
efficet
plena
nis,
duaru
adde
hunc
ctam
aſſequ
come
gallin
dictat

Sal
ſmitac
lingua
reſera
laces
didit e
mat, n
ebuli
nec un
conſp

addas, ac simul cum alijs permisceas, cooperta olla; sinanturque ab igne semota refrigerare, & hujus colatura propinetur in prandio & cæna ad libitum, ac si sitis infestaverit, reliquo etiam tempore, modica tamen quantitate. ubi volueris potionem paulo efficaciorē efficere, coque iterum in olla aqua plena facem illam primæ decoctionis, quæ mansit post colaturam, ad duarum librarum consumptionem, & adde reliqua ut dictum est. sientque ad hunc modum reliqua decocta ad perfectam usque curationem; quam utique assequetur æger viginti dierum spatio, comedens vervecis carnem elixam aut gallinam, cœnas passulas, & bibens prædictam decoctionem.

A N N O T A T I O.

Salsa parilla à similitudine, quam cum smilace aspera habet, ab Hispanis propria lingua vocata est; & cum iisdem sit viribus, reseruatque smilacis naturam, faciliè inter smilaces illam posuerim. Matthioli crederet esse radices: tamen non constanter affirmat, nec est affirmandum, cum longè sit crassior ebuli radix, ut apud Dioscoridem videre est, nec unquam ad nos tantæ crassitudinis delata conspicitur. Hujus radices tam frequens est usus,

usus, tam recepta medicina, ut aquam hac radice decoctam non secus apud Hispanos invenias, quàm quæ glycyrrhiza coquitur. Et jam persuasum est, non in lue hac gallica valere tantum, sed etiam egregiè omnem, qui à materia pendet frigida, affectum sanare. Advehitur ex nova vocata Hispania: quamquam hæc jam repudietur, alia meliori inventa, in eodem regionis tractu (Honduras vocant;) nam & crassior est hæc minusque pallet, sed flavescens magis, magis etiam intus candidat. Probatum quæ recens est, non caviosa; quæque manu fracta, friabilis non sit. Auctor noster circa tertium gradum hanc radicem calidam statuit; Monardus, qui copiosè de hac scripsit, ad secundum gradum tantam: quæ quidem sententia apud me est potior; etenim gustata nulla sentitur acrimonia, nec decocta ullum talem saporem reddit. Coquendi modus ab auctore traditur, quo loco merito tantos in radice fervores damnat, cum radix igne torreatur, & extraneo calore caleseat magis; sic ut hepatis, & renibus officiat. sunt & aliæ rationes, cur fervere tantopere non solum hæc; verum aliæ etiam non debeant: petendæ ab iis qui de compositione medicamentorum scripsere, Montano, Rondelletio, Morzuo, Busdorpio. Nos enim satis fecisse videbimur, si loca monstraverimus, unde copiosior sit petenda cognitio.

DE CURATIONE

distorti pedis pueri à nativitate
claudi.

SAepe accidit, ut infans nascatur aut altero, aut utroque pede distorto, aut incurvo, aut repando, ita ut ægrè admodum possit incedere. Eaque de causa hoc loco volui methodum tradere, qua plurimos valde claudos liberaui, inter quos existit unus curatu difficillimus, Llerenæ incola: sed tamen dicenda industria tandem sanitati fuit restitutus. Imprimis ergo utatur puer debita victus institutione, laventurque pedes per triginta dies blanda manu cum subijuncta decoctione.

R. Radicum althææ ℞ j.

seminis fenigræci, seminis lini ana ℥ iiij.

florum chamæmeli, & meliloti ana m. j.

capit & pedes vervecis unâ cum lana & cute aliquantulum contusa. deinde bulliant in aqua sufficienti ad separationem ossium; & postea colatura facta, fiat balneum ad solem meridianum, & verno tempore; quoniam hyeme non conducit, ne frigore lædantur nervosæ partes atque articuli: ubi verò peracta fuerit lotio, quæ tamdiu durabit, quamdiu in calore persisterit, detergendus est ma-

H

dor

DE

dor linteo, unganturque pedes sequenti unguento.

R. Olei vulpini, olei de lilio amygdalarum dulcium ana ℥ j.

unguenti agrippæ & dialtheæ ana ℥ j. S. medullæ crurum vituli & vaccarum ana ℥ ss.

pinguedinis gallinæ, anatis, anseris, ardeæ ana ℥ vi.

pinguedinis ursinæ & taxi ana ℥ j.

pinguedinis porcine ℥ ss.

bulliant omnia simul in libra una decoctionis prædictæ usque ad ejus consumptionem, & post colaturam, cum pauca cera fiat linimentum, donec imbibi videatur blandè infricandum: his verò per triginta dies confectis, sedeat minister, ac recipiat puerum super genua; manibus ac cruribus revinctis, aut manibus prehensis: deinde accedens chirurgus, pedem claudum primum luxet magna vi, nitaturque reponere in debitum locum, & figuram optatam: quod fiet promptissimè, tum ob prægressam præparationem, tum præterea ob ipsius pueri tenerriam ætatem. Facta repositione, mox apponatur linteum tenue, oleo myrthino madens, calenti super totum articulum, absque rugis, ne dolore fatiget deligatio; deinde verò desuper ponantur splenia in sequenti linimento intincta, & debitè expressa.

R.

R.
p
b
s
p
m
R
E
th
m
ir
fa
fi
in d
rum
pres
dioc
beno
ac p
posi
rum
riar
ab in
dum
splen
dæ
cile
quin
verè

℞. Trium ovorum albumina, olei ompaci-
ni, myrthini ana ℥j. ℞.

pollinis triticeæ farinae, & hordeaceæ ana
℥ij.

boli armenii triti ℥℞.

sanguinis draconis ℥iiij.

pulveris statim describendi, quem decet esse
preparatum pro tota curatione, ℥℞.

misc. Ex his autem constat pulvis.

℞ Boli armenii ℥j. ℞.

thuris mastichis, sarcocolle ana ℥ij. ℞.

myrrhæ, aleos ana ℥j. ℞.

tragacanthi, sanguinis draconis ana ℥.iiij.

farinæ hordei fabarum ana ℥℞.

fiat pulvis subtilis, hæc itaque splenia
in dicto linteo madentia madeant ite-
rum in aqua rosacea, & aceto, atque ex-
pressa super particulam extendantur me-
diocri calore: mox plantæ pedis adhi-
benda est solea lignea, compar quidem,
ac paulo major quàm culcitra desuper
posita; deliganda est fascia trium digito-
rum latitudine, quamquam in contra-
riam partem trahere contendat pedem,
ab interiori parte exorsa, paucis admo-
dum circumvolutionibus. Rursum super
splenia, dicto modo deligata, adhiben-
dæ sunt tres ferulæ, quæ neutrquam fa-
cilè flectantur, ex salice concinnatæ,
quinque digitorum longitudine; unius
verò pollicis latitudine extentæ: quæ

172 DE CURAN. VULNER.

ubi stupis fuerint testæ affabrè, aqua & aceto quemadmodum splenia madere debent: ac deinde prima statui debet postica parte, ita ut lignæ soleæ immitti videatur; aliæ verò duæ à lateribus, super quas omnis deligatio facienda est, nec laxa, nec nimis compressa, ad eum modum qui dudum dictus est. altero autem die medeberis pedi alteri eadem methodo, usque ad septimum diem, subinde præstolatus, ne quidquam aliud molitus. quo transacto, sequenti ratione aut alter pes, aut ambo, si utroque claudicaverit, sunt curandi.

Rx. Terebinthine ℥ ij. ℞.

olei myrrhini ℥ ij.

rosati ℥ i.

sturis, mastichis ℥ i. ℞.


myrrhe, aloës ana ℥ ij.

sanguinis draconis, boli armeni ana ℥. ℞.

pollinis & pulveris rubei antea descripti ana ℥ j.

miscè, & applicetur tepidum in spleniis, cum ferulis & ligaturis, ut dictum est. Deinceps verò repetenda est ista medicatio septenis quibusque diebus, usque ad vigesimum primum diem, à prima septimana; curandumque est summo opere, quemadmodum pedes recti prorsus maneant, sequenti machinamento cum calceis constructo.

Capè



ER.
na &
idere
t po-
mitti
, su-
est,
eum
o au-
idem
, su-
aliud
tione
clau-

S.
ripti

niis,
n est.
nedi-
isque
rima
ope-
orsus
cum
Cape

Cape laminam ferream unius digiti longitudinis, crassitudinis trientis argentei, longitudinis pedalis, ipsius pueri paulo minus: hanc flectes instar calcaris, calcique adaptabis, cui ex utroque latere qua malleoli insunt, duas alias laminas affues, longitudinis sex digitorum, tertiam consimilem in parte posteriori has deinde tres longas, & quæ sursum per crus ipsum ascendunt, cinges circulari alia parte summa; ita tamen ut parte anteriori aperta sit: posteriori verò clausa, ac totum machinamentum sit firmum: aliæ duæ ex utroque latere calcaris dirigendæ sunt in duas illas laterales: super hoc calcar ferreum strui debet calceus pro pede claudo, ex pelle hircina exteriorius, & ovina interiorius, duplici soleo; ita tamen ut calcar inter utranque pellem intersit, & ad circularem illam laminam calcei collum attingat. unde constat, calceum apertum esse debere parte anteriori, & qua pedis pectini insidet, ligandumque esse ligamento ad eam rem conveniente. Ergo antequam calceentur pedes, substituatur emplastrum Joannis de Vigo, confortativum super univsum articulum, quo tumores atque humores, intra articulum hærentes, dissolvantur; & ipse articulus firmior reddatur. Facta deinde calceatione super emplastrum,

neu-

neu
qua
debi
quò
tum
pote
re, c
etia
mo
cei
mer
exce
ceat
R.

fi
r.

d

t

n

b

neutiquam discalceabitur æger, nisi quarto quoque die; in quo mundari debet emplastrum, atque mollificari. quòd si illud interea temporis dissolutum fuerit, denuò admoveatur aliud. poteritque æger ea rarione jam incedere, donec sex menses transierint, quibus etiam transactis, emplastroque tum amoto, non proinde relinquendi sunt calcei jam dicti; imò verò per alios sex menses noctu atque diu calceatus degat, excepto tempore illo in quo lavari placeat. Emplastri confortativi descriptio.

℞. Olei myrbini rosati omphacini ana ℥

℥.

succi radicum alibæ ℥ ij.

radicis fraxini, & foliorum, radicis symphyti minoris, & foliorum, myrthi & foliorum ejus, foliorum salicis ana m. ij. bulliant omnia prius aliquantulum contusa in vini nigri & aque pari mensura ad medietatis consumptionem, cum myrrha & thuris ana ℥ ℥.

deinde in colatura addas sevi hircini liquefacti ℥ ℥.

terebinthine ℥ ij.

masticis ℥ i.

bulliant iterum simul ad consumptionem decoctionis. postremoque in colatura adde lithargyrii aurei & argentei ana ℥ iij.

H 4

bolli

176 DE CURAN. VULNER.

*bolii armenij triti subtiliter terra sigillata
ana ℥ ij.
minij ℥ x.*

*coquanturque simul lento igne & agita-
tione perpetuacum spatula, fiatque cerotum
addita cera.*



FRAN-

FRANCISCUS
ARCÆUS
MEDICUS BENEDICTO

Ariæ Montano Theologo S.



HIRURGICAM curandi rationem, nobis assidua lectione, & longo usu comparatam, cujus editionem tu à me diu non postulaveras modò, sed religione etiam objecta flagitaveras; quanquam ipsa medicinæ exercitatione vehementer occupatus, tandem tamen ad publicam utilitatem conscripsi: quam cum longiorem & copiosiorrem esse illa ipsa curandi negotia non sinerent, certam tamen, & diligenti experimentorum fide comprobatam esse, effecerunt. Cujus rei testimonia, illustrissimaque exempla, cum nobis abundè occurrerent, quædam solum addere placuit ad difficiliores rationes spectantia, quorum tu, dum Llerenæ euangelicam pietatem publicè docens à me chirurgiam disceres, testis affuisti; nam ferè eodem tempore hæc omnia exempla simul edita sunt.

H S

D E

DE VULNERIBUS

in capite Exemplum.

Quantum simplicibus capitis vulneribus, in quibus cranium læsum non sit, loci ad aperiendum consuetudo vulgata contra id quod initio præcepimus, tum nocumenti tum moræ ad sanandum afferre possit, præter alia multa exempla, unum illud satis confirmat, quod in Joanne Gometio de columbis Cazzallensi editum est, qui Philippi Regis nostri stipendiis terras montesque mineralium investigandi causa rimatur: is dum altè defosso specu unà cum operario inquisitione suæ operam daret, ad conspectam repente glebam, quæ metalli specimen habere videbatur, manu tollendam sese festinus demittit, quem socius imprudens librato jam atque improvise ictu ligonis altero dente obliquè, ac non graviter percussit in dextera capitis parte, super os quod laterale dicitur: nec verò vulnus ad cranium pertigit, neque ullam rupti ossis significationem dedit, quoniam revera os minimè fuerat læsum. Huic imperitus chirurgus, vulnus adaperiens, vehementer auxit, crucemque tribus digitis quadratam incidit, & cranium satis pro arbitrio detexit:

deinde

deinde
 usus
 decit
 hiber
 even
 pars,
 porti
 terur
 cisco
 meta
 ræqu
 nem
 stipe
 addu
 ossis
 tam
 proc
 dem
 gent
 mag
 men
 quo
 dies
 ita b
 stro
 cura
 stru
 ipsu
 dur
 con
 mag

deinde multos dies digestivis, & oleo
 usus est, adeò profuse, ut ultra quin-
 decim regios nummos oleò, & ovis ad-
 hibendis impendisse dictus sit: ex quo
 evenit, ut non modò detecta cranij
 pars, sed multo etiam major undique
 portio corrupta fuerit. tandem post al-
 terum jam mensem cum ego à D. Fran-
 cisco Mendocio, qui Regis mandato
 metallorum rationibus & operibus, cu-
 ræque omni præerat, accessitus homi-
 nem visissem, Llerenam, ubi publico
 stipendio medicam artem exercebam,
 adduci iusti. Huic cum satis magnam
 ossis partem extrahere opus esset, quæ
 tamen angustiori vulneris apertione
 produci non posset, cumque ego tantun-
 dem aperire recusarem, orificium ad ar-
 gentei nummi, quem regium vocant,
 magnitudinem trepanis feci, ita ut
 membranæ extarent, atque ea parte pus
 quod intus corruptum erat, quodque in
 dies conficiebatur, purgari posset; atque
 ita balsamo illo à me descripto & empla-
 stro, de gummi elemij, & filis tam diu
 curationem profecutus sum, quo ad in-
 strumentis leviter quotidie expertus, os
 ipsum circumquaque abscissum esse, &
 duram matrem superinducta jam carne
 constare intellexi. Igitur ut os ipsum
 magnum minori multo foramine extra-
 herem,

180 DE CURAN. VULNER.

herem, instrumentum mihi ad trepani instar comparavi, quo foramen facerem, quantum ferreus fusus foeminarum nostratum facere possit: quo ferro contiguus ferri pertusionibus in crucis modum os totum corruptum perforavi; opus autem ipsum à medio loco inceperam, qua superius vulneris ipsius osculum patebat, quod ad argentei nummi magnitudinem paraveram. Foraminum verò intercapedinem, levatore dicto instrumento interrupti: facillè enim os ipsum rumpenti cedebat. Hæc ubi jam expedieram, unam primum ex his quatuor portionibus instrumento attollens, extraxi, & alteram deinde, & tertiam: quartam, quæ maxima erat, in posteram diem reliqui; quam tandem extraxi. Totum autem os laterale appellatum, & petrosi etiam ejusdem lateris bona pars, & coronalis quoque non exigua portio, quæ in anteriorem partem vergit, extracta est; ex petroso prodit quantum ferè ad auriculæ originem extenditur. His autem ossibus extractis, dura mater quæ jam interim inducere carnem coeperat, ultra modum etiam induxit, adeò ut exuperantem carnem ex orificio illo, quod jam pridem feceram, bis fuissim coactus rescindere: adeò autem duram experiebar, ut forcipibus vix possem rescin-

refe
hab
cessi
sum
suis
plen
ossa
dict
tum
post
extr
mul
est t
por
ris c
& c
li ta
qua
divi

B
dug
pit
run
diit
me
tud
ter

rescindere. Post hæc autem cùm melius habere statim cœpisset, Cazzallam discessit à quo post mensem ferè accersitus sum, quòd in capite super occipitis ipsius os, magnum tumorem ac pure etiam plenum haberet. quem cùm aperuisssem, ossa multo etiam magis, quàm quæ prædicta sunt, corrupta esse deprehendit: tum vero Llerenam ad me venire iussu, postera die satis ex arte subtiliter ossa extraxi tria etiam prædictis æqualia, sed multo magis corrupta. Relictus autem est toto ferè occipitis osse carens, atque portione etiam non exigua alterius lateris ossis sinistri. vulnera autem ipsa carne & cute undiquaque obducta sunt: molli tamen & tactui cedente constitutione, quæ paulatim durefcit homo autem ipse divino beneficio liberatus bene habet.

De Barriga exemplum.

Barriga satis apud Llerenenses notus homo, vulnus longiori (quem verdugum, nostri vocant) in pectore accepit, secundum sinistram mamillam duorum digitorum spatium ferè distans, prodiit autem gladius recta via iuxta spinam medullarem, quanta digiti unius crassitudo est, à spina devians, paulum subtergi osse prominens, & pulmonis pinna
five

siue ala sinistra, non longè à corde, ut
 situs ipse indicat, trajecta est. Curatus
 autem est ea ratione, quæ à nobis primo
 posterioris libri capite descripta est:
 dumque curatio procederet, decima,
 postquam vulneratus est die, sanguis ex
 pulmonis vulnere satis copiosus erupit,
 ob continuum pulmonis motum, qui in-
 tra pectus ipsum confluens concretus
 est. proxima autem curatione, magnæ
 concreti sanguinis portiones, unà cum
 pure confecto ex vulnere prodierunt,
 non sine adstantium admiratione, quòd
 majores etiam viderentur partes, quàm
 ut exitura capi & emitti posse crederen-
 tur. His animadversis accidentibus, cum
 nimiam quotidie puris copiam bis sin-
 gulis diebus curatum effundere viderem,
 intentionem mutare decrevi: atque eo
 modo quo fistulas curari docuimus, ex-
 perire constitui, statimque incepti. Cum
 autem per duos dies eam quæ illic de-
 scripta est, aquam bibendam exhibuis-
 sem, omnis sanguis concretus unà cum
 pure tandem prodijt, duobus alteris die-
 bus pus etiam defecit, statimque febrì
 liberatus est: ac brevissimè sanus, adedò
 atque adedò pinguis evasit, ut magna iis
 qui hominem viderint, divinarum lau-
 dum materia oblata sit, vivit ille & opti-
 mè habet.

D E

DE

QUODAM LUDOVICI

Zapatae familiari exemplum.

Homo hic D. Ludovici Zapatae familiaris pugione lato quater petitus à tergo & percussus est sinistro latere: sed ex illis vulneribus unum sex digitorum spatio sub humero acceptum est. quod scapulare os cum tentasset, resiliente ferro, inter os ipsum, & carnem, quantum septem transversis digitis mensus saepe sum, descendit, quo ad scapulae regione transmissa inter costarum spatia mucro obtrusus ad cavitatem ipsam corporis penetravit. Ante autem quam ego accersitus accederem, copiosum sanguinem ex omnibus vulneris partibus diffusum, in cavitatem ipsam promanasse, ex ijs quae postea acciderunt, conjecturam facio: ille verò sanguis foris promanare non potuit, quod cute & carne obductum vulnus deorsum penetrabat, quo influxus commodius tendere verosimile est: nam prima mucronis apertio altior erat quam ut sanguis commodè erumperet. Ita ego cum primam curationem incepissem, nequi negrescens directum invenirem, non magis quam caetera penetrasse existimassem, nisi

nisi

184 DE CURAN. VULNER.

nisi diligentius etiam tacto loco, & digito immisso, vulnus illud deorsum ulterius, quam ipse digito persequi possem, descendere cognovissem. Cum igitur ad cavitatem penetrare vulnus deprehendissem, locum eregione costarum, quâ penetrare intellexi, aperui, incisa ex directo cute & carne, ita ut immissus digitus ad interiora facile admitteretur, & pulmonem etiam qui secundum spinam est, attingeret.

Curatus autem est eo quem descripsimus, modo in vulneribus pectoris penetrantibus. Ac primis quidem curationibus nullum pus confectum est, sed quædam tantum humiditas exigua admodum effluebat. Quarta vero die aqua sanguineo colore effluit, qualis ea est in qua carnes lavantur, in dies autem consequentibus curationibus, copiosius effluebat, adeo ut singulis curationibus vas, quod scutellam vocamus, impleret. utque commodè, & citò efflueret, ægrum tussire, aut respirationem continere jubebam: quater autem per singulos dies à me curabatur. præter id autem quod inter curandum effluerat, noctu ac diu fluxus ipse non sistebatur, adeo ut lectus lacunæ instar haberet. Igitur quarta die, cum huiusmodi aquæ effluxum sine ulla puris specie perseverare adhuc

adhu
bis p
exhib
biber
aqua
nis n
sed it
liqui
to et
prod
naci
deflu
bat,
dem
tò ab
quan
quan
aut
que
batur
to ac
ob re
dei i
rum
rum
mod
post
bri h
que
copi
est;

adhuc conspexissem, aquam illam no-
 bis proximo exemplo indicatam ægroto
 exhibere institui: statim autem ex quo
 bibere cœpit, per duodecim dies major
 aquæ sive saniei copia, sine ulla homi-
 nis noxa, aut gravi aliquo sensu prodijt;
 sed ita aded ut secundo die subalbida &
 liquida prodierit; tertio autem die mul-
 to etiam albior, quoad ita alba & densa
 prodijt, vase, in quo excipiebatur, te-
 nacius hærens, ut vix etiam inclinata
 deflueret. parcius autem in dies prodi-
 bat, usque ad duodecimam, qua tan-
 dem defecit, atque vulneris ostium subi-
 to ab interiori parte occlusum est: quod
 quanquam ego ferramentis nonnun-
 quam adaperirem; nihil tamen aut puris,
 aut eiusmodi humoris remittebat; ne-
 que spiritus ea ex parte, ut antea, redde-
 batur: atque ita curatio processit, ægro-
 to adhuc continua febre correpto. quam
 ob rem tribus diebus aquæ illi binos hor-
 dei integri pugillos, & passularum tusa-
 rum cum suis acinis ternos; tamarindo-
 rum verò uncias binas addidi. atque hoc
 modo febris evanuit. Decima autem die
 post hæc gravi pectoris difficultate & fe-
 bri laborantem hominem offendi; eúm-
 que ex vulnere illius aquæ, sive saniei
 copiam prodijisse sine pure deprehensum
 est; tenta indita plus adhuc saniei deflu-
 xit.

xit. atque hoc modo per sequentes sex dies habuit, minus in dies aquæ ex vulnere emittens. Post hæc & fluxus constitit, & vulnus sanatum omnino est: atque homo ipse egregiè adhuc Dei salutaris ope valet.

De modo componendorum medicamentorum, & de nonnullis medicamentis, tum simplicibus tum compositis, ad omnes peccantes humores.

Hi, qui medicinam facere aggrediuntur, commoda & incommoda à medicamentis provenientia potissimum intelligere debent. hæc autem apud Avicennam, & Scriptores alios legi poterunt. cognoscendæ etiã sunt simplicium medicamentorum qualitates, nec non quas corporis partes respiciant. Sunt enim medicamenta; quæ peculiarem corporis partem roborant, ut Mentha totum corpus calefacit, sed stomachum potissimum, quod fit per quandam illius herbæ, & stomachi sympathiam, ut alibi diximus de Betonica, Melissa, Cucurbita, Chamæpity, Nuce Moschata, Chamædry, Lauro, Centaurio, quæ caput respiciunt. Considerandum etiã est

est in decoctis præscribendis, ut quæ crassioris substantiæ sunt, primo loco ponantur; nam primo, & diutius decoquendæ sunt radices. secundo loco herbæ, tertio semina, quarto fructus, quinto flores, sexto aromata. Illud etiam sciendum est, quòd radices, & semina pondere, herbæ manipulis, flores pugillis; fructus verò numero mesurantur. Exemplum contra obstructionem & calidam hepatis intemperiem syrupus ita describendus erit.

℞. Corticum citri radicum centaurij ana ℥ ij.

corticum radicum apij fœniculi, petroselinii, quæ per noctem in aceto infusæ fuerint, ad calorem illarum contemperandum, ana ℥ j.

secundo loco, endiviæ non lotæ, scariolæ, hepaticæ, lactucæ, scolopendrij capill. ven. ana. m. iij.

tertio loco, quatuor seminum frigidorum majorum, & minorum ana ℥ ij.

quarto loco, prunorum sjuubarum sebesten ana numero xxx.

quinto loco, florum violarum nymphææ, rosarum ana p. j. vini malorum granatorum ℥ v.

santalorum omnium ana ℥ iij.

sacchari albi q. satis est, & fiat syrupus.

Exemplum in intemperie frigida.

℞. Cor-

Ad frigid. hepatis.

188 DE CURAN. VULNER.

℞. Corticum radices raphani, fraxini, geniste, apij, feniculi, petroselini, graminis, asparagi ana ℥ j.

menthae, melissae, chamædryos, chamæpityos ana m. j.

quatuor seminum frigidorum majorum ℥ ij.

florum chamæmeli, meliloti, stæcadis, rosmarini, geniste ana pug. j.

caricas pingues num. xx.

squinati cinnamomi ℥ j.

sacchari mellis ana ℥ ℥.

Notandum est, quòd in compositione syruporum laxativorum ponenda sunt, quæ laxandi vim habent inter flores, si tenuiorum partium sint; si verò sint partium crassiorum, inter aromatica, vel femina, & flores conjunge, pro ratione decoquendorem. Exemplum pro melancholico humore.

Pro humore melancholico.

℞. Corticum superius dictorum ℥ j.

herbarum superius dictarum ana ℥ j.

deinde adde.

℞. Senæ cuscute, polypodij quercini, seminum cartami, agarici ana ℥ ij.

florum ameos violarum stæcadis ana p. j. potes deinde addere aromatica, & saccharum. post decoctas herbas facienda tamen primò est colatura herbarum & radicum, cui addenda sunt laxativa & aromatica. Illud maximè observandum in

me-

medicamentis præscribendis, ut herbarum manipulis radices unciis, flores pugillis, fructus numero præscribantur. In laxativorum compositione doses cognosci debent: est enim plus discriminis in illis quàm in aliis medicamentis. & quia simplicium medicamentorum veræ doses tradi non possunt, nisi cum delectu & ratione; ideo medicamentorum facultates peculiariter sunt cognoscendæ, & alia etiam quæ in illis exhibendis respicere oportet; quæ sunt, ægrotantis vires, temperatura, ætas; regio ipsa, & anni tempus, & ejusdem constitutio. ideo difficile est simplicium & compositorum medicamentorum doses tradere & docere, & pro ratione eorum, ex quibus componuntur, doses augendæ sunt vel minuendæ. Exemplum. Diacatholicon ex fortibus medicamentis non constat; ejus dosis est ℥j. electuarium de succo rosarum, & diaphœnicon medicamenta fortiora recipiunt, nempe dacrydium: eorum dosis est ℥ss. cum sola exhibentur: cum verò aliis admiscantur, dosis erit immutanda. Exemplum in evacuatione cholerae & phlegmatis. cum. s. æquis portionibus commiscenda sunt medicamenta, dosis ita constituenda erit.

℞. *Electuarii diacartami, electuarii de succo rosarum ana ℥. ij.*

Doses
compos.
medi-
cam.

non autem ana ℥ ℥.

notandum etiam, quod si cholera magis redundat quàm phlegma, tunc in majori dosi exhibendum erit electuarium de succo rosarum: si e contra major sit copia phlegmatis, diacartami dosis augenda erit. & hac ratione composita medicamenta miscenda sunt. Eadem ratione in simplicibus medicamentis procedendum.

purgatio ℞. Rhabarbari electi, turpeti gummosi ana ℥ ℥.

spicæ Zinziberis ana ℥ j.

fiat pulvis cum saccharo. & nota, quòd rhabarbari dosis est ℥ j. ℥.

Turpeti dosis illi æqualis est, sed ratione compositionis cum simul miscentur, dosis est minuenda. si verò simplex medicamentum exhibendum fuerit, in sua dosi integra exhibebitur. Exemplum in evacuatione cholerae.

Cholera purgat. ℞. Electuarij de succo rosarum ℥ ℥.

exhibeatur in aurora, in evacuatione phlegmatis.

℞. Diacartami ℥ ℥.

in evacuatione melancholiae.

℞. Diasene ℥ j.

hic dosis augenda est; nam medicina non est fortis, notandum est quod propter medicamentorum commistionem compositorum doses aliquando augentur, aliquando minuuntur ut. ℞

Me-
lancho-
liam
purgat.

℞. el
dia
dia
tri
pul
spe
ma
cap
por

in las
immut
mus.
dicio
nuam
contu
Ex

usq
cor
à Me
endiv

T
us
&

co
quæ
A

℞. electuarij de succo rosarum ℥j.

diacartami ℥ij.

diacatholici ℥ij. ℞.

triferae sarracenicæ ℥iij.

pulveris trium santalorum ℥j.

specierum diagalange ℥j.

mastichis capill. ven. ana ℥j.

capiatur modo opiatae. s. in sex diebus,

nam opiatae una dosis est ℥vj.

poteris & tuo iudicio his addere de opiatis

aliis ℥ij. vel iij.

in laxativis præscribendis; quibus non immutatis ad plures dies uti consuevimus. id observandum est, ut nostro iudicio illorum dosim augeamus vel minuamus, prout ægrotantes laxiori, aut contumaciori sunt alvo.

Exemplum in educenda cholera rhabarbari dosis ℥j.

usque ad ℥iij.

corrigitur cum G. vj. spicæ & aliis quæ à Mesue traduntur, & nocte una in aqua endiviæ macerandum est.

Tamarindorum dosis est à ℥ij.

usque ad ℥j.

& corriguntur cum aqua casei. dacrydij dosis est ℞.

corrigitur cum G. ij. mastichis, & aliis quæ tradit Mesues.

Myrobalanorum citrinorum dosis est à

℥ij. ad ℥v.

in

in infusione verò à ʒ v. ad ʒ xx.

myrobalanorum cepulorum tritorum dosis
est à ʒ ij. ad ʒ iij.

in infusione verò à ʒ iij. ad ʒ x.

myrobalanorum empellitricorum tritorum
ab aureo uno ad aureos tres in infusione
ab aureis tribus ad aureos sex, corriguntur

Aloes. *aliqua quæ dicuntur à Mesue.*
Aloes dosis est à ʒ ʒ. ad ʒ ij.
in infusione ab aureo uno ad aureos tres,
ad ʒ ij. corrigitar tragacanthii ʒ ʒ.

alii quæ affert Mesues : ex solventibus
medicamentis aliqua tutò, aliqua non
sine discrimine exhibentur ; ideo illorum
dosim omitto. Est etiam compositorum
medicamentorum tradenda dosis, eo-
rum, inquam, quæ choleram educunt,
quæ pro ægrotantium viribus augenda
est, vel minuenda.

Electuarii de succo rosarum dosis est ʒ ʒ.

diaprunis solutivi dosis est à ʒ ij. ad ʒ ʒ.

trifere sarracenicæ dosis est ʒ j.
de pilulis choleram educentibus.

Pilularum aurearum dosis est ʒ j.

pilulæ communes ad ʒ ij. exhibentur.

Pilularum è fumaris dosis est ʒ j.

pilularum è rhabarbaro ʒ j. ʒ.

hæc autem omnia pro iudicio medici
& ægroti viribus. Sunt præter hæc alia
solutiva, sed his ut plurimum utimur.
mutantur & doses medicamentorum in
pe-

pecu
dose
regie
rendi
fit sc
boru
sunt
majo
de m
Turp
ex
co
ag
in
co
ex
co
co
Eled
Bene
Hier
Hier
Hier
Diac

peculiaribus regionibus, tunc eorum doses à medicis & pharmacopolis illius regionis sunt addiscendæ. Animadvertendum etiam est, an in medicamentis sit scammonium, colocynthis, aut elleborus: quæ enim hæc recipiunt, fortes sunt medicinæ, ideo non exhibentur in majori dosi quàm ad ℥ iij. aut ad ℥ ℥. de medicamentis pituitam ducentibus.

Turpetum à ℥ j. ad ℥ ij.

exhibetur in infusione ad ℥ iiij.

corrigitur cum zinziberis ℥ ℥.

agarici dosis est à ℥ j. ad ℥ ij.

in decoctione verò ad ℥ v.

corrigitur sale gemmæ colocynthis à ℥ j. ad ℥ ℥.

exhibetur: corrigitur tragacantho. Poly-

podij dosis est à ℥ ij. ad ℥ ℥.

corrigitur ℥ j. anisi. Hermodactylorum

dosis est à ℥ j. corriguntur cum ℥ j. zinziberis. Cartami dosis est à ℥ iij. ad ℥ ℥.

corrigitur tragacantho & mastiche.

Turpe-

tum do-

sis ℥ j.

Agarici

dosis

℥ j. ad

℥ ij.

Colocyn-

this dosis

a. ℥ j. ad

℥ ℥.

polypo-

dij dosis

℥ j. ad

℥ ℥.

Electuariorum pituitam educentium doses.

Benedicta	} Diaturpeti	} omnium				
Hiera ruffi			} Electuarium	} dosis est		
Hiera pura					} de citro	} ℥ ℥.
Hiera logadii						
Diacartam						

I Pilule.

ur.

edici.
ec alia
timur.
um in
pe-

Pilulæ.

Pilulæ {

 ex agarico : cocia : lucis :

 arthreticæ : ex hermodactylo :

 ex eupatorio. è hiera :

 alephanginæ : ex euphorbio :

 è castorio : è quinq; myrobalanis

 ex mezenno.

Notandum, quòd electuaria Indum
 majus & minus phlegma educunt, &
 ejusdem ferè sunt facultatis; in hoc dif-
 ferunt, quòd electuarium Indum mi-
 nus non est adeò calidum. Turpetum &
 scammonium choleram & pituitam educunt.
 Diaphænicon medicamentum est compo-
 situm, & ad egritudines & febres compo-
 sitas utile est, & ad chronicos morbos est medi-
 camentum tutissimum : confert coli doloribus
 & egritudinibus ventris, humoribus crudis
 & frigidis; & est solutivum aptissimum.
 Electuarium Indum majus educit redun-
 dantes humores speciatim pituitosos &
 putridos à stomacho, & membris nutri-
 tioni inservientibus, & flatus in illis
 contentos dissolvit.

*Dosis simpl. medicamentorum edu-
 centium melancholiam.*

Senæ dosis est à ʒ ij. ad ʒ iiij. infusæ
 verò dosis est ab ʒ ʒ. ad ʒ j. corrigitur
 autem ʒ j. Zinziberis, aut glycyrrhizæ,
 aut

aut x
 lazuli
 si nov
 dem c
 ʒ. ʒ.
 ter la

Dosis

ru

Diafæ

Diac.

Hiera

Trife

Hi

& rel

& vis

cit : c

turæ

tus d

juvat

fistul

Pil

Pil.

N

gidis

dican

regio

aut xilobalsami, aut cuscute. Lapidis lazuli dosiſ est à ʒ j. ad ʒ ij. corrigitur, si novies lavetur. Lapis armeniacus eadem doſi exhibetur. Epithymi doſiſ est ʒ ʒ. corrigitur, si aqua rosacea bis aut ter lavetur.

Dosiſ compositorum medicamentorum educentium melancholiam.

Diasenæ	} Diacar- } omnium } tami } doſiſ ʒ j.
Diacatholici	
Hieræ ruffi	
Triferæ Sarraceni	

Hiera ruffi caput purgat, stomachum & reliquum corpus ab humoribus crassis & viscidis; & atram bilem tantum educit: confert mania, epilepsia, oris tumoræ, & paralyſi, & melancholia: flatuſ discutit, stomachi concoctionem juvat; & est medicamentum conferens fistulis, ulceribus canerosis, & lepra.

Pilulæ humorem melancholicum educentes.

Pil.	{	è fumo terræ.	} omniū doſiſ } est à ʒ j. } ad ʒ iiij.
		ex elleboro	
		ex lapide lazuli.	
		ex epithymo foetida.	

Notandum, quòd in regionibus frigidis & transmarinis in majori doſi medicamenta exhibenda sunt quàm in aliis regionibus.

Confectio Hamech confert ægritudinibus ab atra bile & humoribus adustis, ut mania, melancholia, vertigini, oblivione, & ægritudinibus cutis, ut scabiei, morpheæ, lepræ, carbunculo, elephantia, & impetigini.

His absolutis, doceamus dosim medicamentorum quæ tuta sunt, & audester exhiberi possunt. Primo loco de his quæ bilem purgant, loquemur. Secundo loco ea quæ pituitæ conferunt, exponam. Tertio loco ea quæ humorem melancholicum respiciunt, explicabo. In universum, dico quod istorum debiliorum medicamentorum, aquarum, & electuariorum roborantium, & non solventium dosis est $\frac{z}{j}$.

Syrupi ad bilem.

Syr. de endivia	Syr. acetosus simplex
Syr. è capill veneris	Syr. è ribes
Syr. violaceus	Syr. de limonibus
Syr. de agresta	Syr. de acetositate citri
Oxyfacchara simplex	Syr. de portulaca
Oxyfacchara comp.	Syr. de papavere
Syr. è berberis	Syr. de jujubis
Syr. è cydonijs.	Dosis cujuslibet horum syruporum est ab $\frac{z}{j}$. usque ad $\frac{z}{ij}$.

Aquæ bilem contemperantes.

(Scariolæ : endivia : lactucæ :
Aqua il plantaginis : acetosæ : limonum :
portu-

Aqua

E

Elect

Rosat

Diatr

Abbat

Diapr

Dosi

No

sis est

assum

tabell

tuari

tuend

satis e

& qua

cenda

sed un

aut du

piende

Co

Conf.

Conf.

Conf.

Conf.

Conf.

Conf.

Aqua { portulacæ: nymphææ: rosacea
 { scolopendrij: capil. ven. cichorij
 { curcurbitæ: cucumeris.

Electuaria bilem cohibentia.

Electuarium è tribus santalis:
 Rosata novella: Electuarium de gemmis:
 Diatragacanthum frig. Diarhodon:
 Abbatis: Diamargariton frigidum:
 Diapruni: Diacydonium.

Dosis cujuslibet istorum est ℥j.

Nota, quod cujuslibet electuarij do-
 sis est ℥j. non tamen unica vice tota est
 assumenda, sed singulis vicibus singulæ
 tabellæ sunt capiendæ; & nisi adsint ele-
 ctuaria, eorum loco conservæ substiti-
 tuendæ. atque horum non traditur dosis:
 satis enim est communem mensuram,
 & quantitatem novisse, neque commis-
 cendâ omnia simul sunt, quæ scripsimus,
 sed unum tantum per se exhibendum,
 aut duo vel tria commiscenda sunt, ca-
 piendo uniuscujusque partes æquales.

*Conservæ ad bilem, & earum
 dem dosis.*

Conf. rosarum	Conf. nymphææ
Conf. violarum	Conf. capill. ven.
Conf. corticum citri	Conf. buglossæ
Conf. papaveris	Conf. acetosæ
Conf. borraginis	Dosis cujuslibet haram

198 DE CURAN. VULNER.

harum conservarum est ab ℥ss. ad ℥ij. plus minus, prout ægro convenit. vel sic componantur.

℞ Conservæ rosarum & violarum ana ℥ss. conservæ capil. ven. ℥. j.

pulveris trium santalorum, specierum diarbodon ana ℥ j.

sacchari quod satis est misce, & fiat conditum auro cooperitū. possunt etiam addi ea quæ roborant viscera; ut os de corde cervi ad ℥j. vel ij. aut siquid aliud tibi visum fuerit, ut spodiū & santala, quorum dosis ut plurimum est ab una ℥ ad ℥ij. His etiam conditis adduntur aliquando lapides, quorum dosis ut plurimum est ℥ j. vel ij. & quandoque limatura auri, cujus dosis est ℥ss. ℥ j. & sic de aliis.

Syrupi ad pituitam.

Syr. è stœchade,	Syr. de Hyssopo,
Syr. byzantinus	Syr. de prassio,
Syr. de mentha,	Syr. è calamintha,
Syr. de artemisia,	Syr. de eupatorio,
Oxymel scilliti.	Syr. è glycyrrhiza,
Syr. de absinthio,	Oxymel simplex.

Dosis est omnium æqualis ℥ ij.

Aqua verbenæ	Saxifragiæ	Melissæ
Calaminthæ	Enulæ camp.	Salviæ
Aqua majoranæ	Satureiæ	Hyperici
Euphragiæ	Menthæ,	

est

O
est ℥
ad ℥
aqua
nis,
tur:
cupis

Diaf
Elef
Aro
Diac
Diat
Diat
Diat
Diat
Diat
Diat
Diat

The
Aur
Dof
stua
vel.
exhi
℞ 1
fa

Omnium dictarum aquarum dosis est ℥ iij. ut semper aquæ dopla ratio sit ad syrupum quem diluit. Sunt & aliæ aquæ, ut feniculi, petroselini, graminis, asparagi; quarum ℥ iiij. exhibentur: si verò plures aquas simul miscere cupis, earum doses augendæ.

Electuaria ad pituitam.

Diafurfurum	Dianthos cū muscho
Elect. plir. cū moscho	Diatrion pipercon
Aromaticū rosatum	Diaprassium
Diacostu	Diacalamintha
Diamentha	Diacymion
Diarhodon nilci	Diacastoriu
Diagalanga	Garyophyllatum
Diamarathru	Diazinziber.
Diaireos simpl.	Dianisu
Diahissopum	Dosis cujuslibet
Diacaryon	est à ℥ ij. ad ℥ iiij.

Opiatæ ad pituitam.

Theriaca Mithridatum Trifera mag.
 Aurea Alexandrina (sine opio.
 Dosis istarum est à ℥ j. ad ℥ ij. Cum electuariis uti volueris, eorum dosis est ℥ j. vel. ℥ ℥. ut tu vis. si eadem in tabellis exhibere libet, dosis erit ℥ j. hoc pacto.
 ℞ Diaireos specierum diahissopu ana ℥ ℥.
 sacchari quod satis est, & fiant tabellæ ponderis ℥ j. vel ij.

Conservæ ad pituitam.

Conservæ { auri : cryngiorum : anthos :
 { salviæ : enulæ camp.
 { corticum citri : ireos :
 { cyperi : zinziberis : citruli.

Nota, quòd istarum conservarum dos-
 sis est à ʒ j. ad ʒ iij. vel minus, & ea-
 rum plus requiritur pro condito facien-
 do quàm pro tabellis. dosis in tabellis
 semper est à ʒ j. ad ij. in conditis ab ʒ j.
 ad ij. & si plura commiscenda sunt, sin-
 gulorum est minuenda dosis. & hoc de
 omnibus aliis intelligendum, & multi-
 tudo mistorum à medicis non probatur.

Syrupi ad humorem melancholicum.

Syrupi { de agresta : de buglossa :
 { de borragine : de eupatorio :
 { è fumaria : byzantinus :
 { è calamintha : è scolopendrio :
 { è lupulis : de epithymo :
 { è tamarice.
 { Dosis ab ʒ j. ad ʒ ij.

Aquæ ad humorem melancholicum.

Aquæ { borraginis : Buglossæ : Tamaricis :
 { fraxini : Lupulorum : Genistæ :
 { fumarie : Rosarum : Melissæ :
 { calaminthæ : Scolopendrij.
 { Dosis ʒ ij. vel iij.

Ele-

ER.

thos:

ituli.

n do-

& ea-

icien-

bellis

3 j.

o fin-

oc de

multi-

tatur.

cum.

a:

rio:

rio:

um.

ticis:

istæ:

iffæ:

Ele-

Electuaria humori melancholico conferentia post evacuationes & purgationes exhibenda.

Pliris arcoticon Diambra
Lætificans Galeni Elect de gemmis
Diatrion: Santalon: Diarhodon Abbatis.
Diamargariton.

Dosis istorum est ʒʒ.
Si electuaria parata, & ad manus non habeas accipe eorundum species. Singulorum dosis erit ʒ j. si multa simul commisceantur addito saccharo eo modo, quo pulvis ducis parari consuevit, hoc pacto.

℞. Specierum elect. pliris cum moscho, specierum lætificantis Galeni, specierum elect. de gemmis ana ʒ j.

sacchari quod satis est, fiat electuarium in tabellis, vel ad modum pulveris ducis, cujus singulis diebus summo mane exhibendum erit cochleare unum cum aqua buglossæ.

Conservæ ad humorem melancholicum.

Conf. { borraginis: buglossæ:
violarum: anthos: capill. ven.
rosarum: Dosis istarum est
ab ʒʒ. ad ʒ j.

I s Opia-

*Opiatæ ad humorem melancho-
licum.*

Requies magna cum aqua endiviæ, Ru-
bea trochiscata, diarhodon. dosis ista-
rum est ʒ j.

Nota, quòd præter dictas aliæ etiam
sunt rationes componendorum medica-
mentorum, quibus medicus indiget, ut
sunt clysteres, pessi, vomitoria, apo-
phlegmatismi, errhina, & alia. ut itaque
junioribus medicis consulamus, brevif-
simè & per compendium illorum com-
ponendorum rationem explicabimus,
& rudiori quodammodo, ne horum
ignorantia errent, & à pharmacopolis
irrideantur.

*Clyster ad ægritudines è frigida
materia.*

℞. Quatuor emollientium ana m. j.
absinthij, centaurij, abrotani, borraginis
ana m. j.
quatuor seminum calidorum minorum
ana ʒ ij.
florum rosmarini, stuehadis, geniste,
majoranæ ana m. j.
caricas pingues numero x.
cicerum rubeorum pug. ij.
fiat decoctio in aqua: in qua dissolvantur
benedictæ. Hieræ picræ ana ʒ ss. olei

olei liliacei, laurini ana ℥j.
 mellis communis despumati ℥j. salis ℥j.
 & fiat clyster, qui tepidus injiciatur.

Nota, quod in clysteribus herbæ illæ
 ponendæ sunt, quæ respiciunt partem
 affectam. ut si ægritudo in capite sit,
 addendæ erunt betonica & salvia, si in
 hepate, absinthium & eupatorium; si in
 matrice, nepeta si validiores cupis, ad-
 dere poteris diacartamum, aut alia pitui-
 tam educentia, ut agarici ℥j. aut turpe-
 tum si corrigantur.

Clyster in materia calida.

R̄. Malvæ, betæ, parietariæ, flo. cucurbitæ,
 lactucæ, endiviæ ana m. j.

quatuor sem. frigidorum mundatorum
 minorum ana ℥j.

flo. chamæmeli, buglossæ, borraginis
 ana p. j.

Pruna, jujubas, sebesten, ana numero xij.
 fiat decoctio in aqua, in qua dissolve dia-
 cartami ℥j.

electuarij de succo ros. ℥iij.

olei violacei ℥ij.

mellis ℥j.

salis ℥j.

succi betæ ℥ij.

fiat clyster, qui injiciendus est in modica
 quantitate.

Nota, quod si ægritudo composita

fuerit, debent medicamenta componi ; calida. s. & frigida miscenda sunt femina similiter : si ægritudo autem simplex fuerit, unius generis medicamentis uteris. & si particulare aliquod membrum roborare exoptas, adde simplicia, quæ membrum illud respiciant. in calida materia clysteribus addi poterunt folia bliti albi, & aliarum herbarum frigidarum, ad caliditatem intestinorum contemperandam. Alii succos etiam addere consueverunt, nempe cucurbitæ, aut betæ, aut melonum.

In materia frigida.

Julebum in materia frigida.

℞. Syr. è stœchade, de hyssopo, de mentha, de radicibus ana $\mathbb{Z} \text{ij}$.
 aquarum menthe, betonicæ, apii, melissæ, ana $\mathbb{Z} \text{v}$.

fiat julebum. aromatiza $\mathbb{Z} \text{ij}$.

cinnamomi & $\mathbb{Z} \text{i}$.

zinziberis, clarifica, ut decet, & utere.

Notandum, quòd si morbus in capite fuerit, aut pectore, aut stomacho; tunc ea medicamenta, quæ membrum illud respiciunt, augenda erunt. Si caput laboret, Syrup. è stœchade, aut oxymel scilliticum, in majori dosi exhibendi erunt quàm alii. si pectus sit malè affectum, tunc dosis sir. è prasio, aut de hyssopo augenda erit. Si stomachus malè ha-

habeat, syrupum de eupatorio, & aquam absinthij augebis. si renes oxymel diureticum, & aquam quinque radicum. si matrix, syrupum artemisiæ, & ejusdem aquam. & semper affectis membris sunt accommodanda medicamenta.

Fulebum in materia calida.

℞. Syrupi de endivia, è capill. ven. ana ℥ ij.
oxyfacchari comp. ℥ v.
aquarum lactucæ, endiviæ, buglossæ, acetosæ ana ℥ iij.
miscæ, & clarifica, & aromatiza cum ℥ ij.

sanialorum rubeorum, & alborum. Et nota, quòd syrupus violaceus non debet admisceri oxyfaccharo, vel syrupo acetoso: nunquam enim dulcia acidis sunt permiscenda in ægri tudinibus pectoris, vel tussi: in passionibus nervorum exhiberi non debet oxyfaccharum, aut syrupus acetosus, nec intinctus cum aceto, aut rebus acidis factus, illis convenit: & pro ratione membrorum affectorum medicamenta illa respicientia sunt exhibenda. ut si caput calida intemperie laboret, syrupum è nymphæa, & ejusdem aquam augebis: si verò cor laboret, syrupus de buglossa, & rosaceus augendi si stomachus vel hepatis, syrupus endiviæ, & aqua ejus.

Julebum in materia melancholica.

℞ Syrupi ex epithymo, de buglossa, de borragine, de sumaria ana ℥ ij.
 aquarum lupulorum, tamaricis, sumariae, melissae, buglossae, ana ℥ iij.
 misce, clarifica, aromatiza cum ℥ j.
 santalorum & cinnamomi. & illud animadvertite, ut medicamenta, quae membrum affectum respiciunt, non obliviscaris, ut saepius admonuimus.

Julebum ad omnes humores.

℞ Syrupi è radicibus de hyssopo ana ℥ ℥ss.
 Syrupi è sumaria, de endivia ana ℥ ij.
 Syrupi de epithymo, de buglossa ana ℥ iij.
 aquarum melissae, acetosae, borraginis, buglossae ana ℥ iij.
 misce, clarifica, aromatiza cum ℥ j.
 cinnamomi & utere.

*Julebum ad ventris fluxum
compescendum.*

℞ Syrupi myrtihini, Syrupi è cydoniis: Syrupi rosati ℥ iij.
 aquarum prunellorum, plantaginis, soliorum quercus ana ℥ iij.
 misce cum aqua rosarum, clarifica, & fiat julebum.

Ju-

Fulebum contra pestem.

℞. Syrupi de limonibus, de acetositate citri,
de agresta ana ℥ ij.
syrupi de endivia, & syrupi de prunis
agrestibus ana ℥ ℥.
aquarum artemisiae, acetosae, rosarum bu-
glossae, endiviae ana ℥ iij.
misce & addita ℥ j.
santalorum alborum; fiat julebum.

De solventibus pituitosum
humorem.

℞. Fol. rosmarini, stachadis, borraginis,
buglossae ana p. j.
quatuor seminum frigidorum majorum &
minorum ana ℥ j.
cicerum rubeorum p. j.
absinthij, betonicae, hyssopi, borraginis
ana m. ℥.
senae, thymi, epithymi, cuscute, agarici
ana ℥ j.
glycyrrhizae rase ℥ ℥.
passularum mundatarum ℥ j.
fiat decoctio in aqua, in cuius colatura
dissolve turpeti ℥ j.
Zinziberis ℥ ℥.
& fiat potio. Aliter.
℞. Diacartami ℥ ℥.
dissolve in aqua menthae, & fiat potio.

Me-

Medicinæ solutiæ fortes quæ indigent corrigentibus, hæ sunt :

Dacridium, agaricus, scammonium, colocynthis, elula, turpetum, euphorbium, elleborus, mezereon, aloes, caraputia, lapis lazuli, lapis armeniacus, fena.

Medicamenta quæ non indigent corrigentibus.

Casia fistula, tamarindi, pruna, rhabarbarum, fumaria, polypodium, myrobalanorum omne genus, epithymus, manna, passulæ, borrago, & familia.

Ad calorem febrilem.

R̄. Conservæ rosarum, violarum, nymphææ, acetoſe ana ℥ ss.

ſpecierum antidoti diarhodon ℥ ij.

Syrupi, roſati, & de acetofuate citri, quod ſatis eſt.

De medicamentis, prout peculiarem corporis partem reſpiciunt, & primo ad frigidas capitis ægritudines.

Syrupus è ſtœchade, oxymel, mel roſatum : aqua ſalviæ; rutæ, betonicæ.

Ad

Ad calidas capitis ægritudines.

Syrupus violatus, è nymphææ : aqua melissæ, endiviæ, lactucæ.

Ad ægritudines frigidas pectoris.

Syrupus de epithymo, è glycyrrhiza, de prassio, de hyssopo : aquæ calaminthæ, enulæ.

Ad calidas ægritudines pectoris.

Syrupus violatus, jujubarum, papaveris, aquæ nymphææ, & lactucæ.

Ad ægritudines frigidas cordis.

Syrup. de borragine, de buglossa : aquæ melissæ, & enulæ camp.

Ad calidas ægritudines cordis.

Syrupus de agresta, violatus è nymphææ : aquæ violarum, rosarum, nymphææ.

Ad calidas ægritudines stomachi.

Syrupus de mentha, de absinthio, è calamintha : aquæ pulegij, levistici.

Ad frigidas ægri. intestinorum.

Syrupus è mentha, de absinthio : aquæ pulegij & sambuci.

Ad

Ad calidas ægrit, intestinorum.

Syrupus myrthinus, de agresta, de cydoniis, rosatus: aquæ portulacæ, & plantaginis.

Ad ægrit. frigidas hepatis.

Syrupus de epithymo, de eupatorio, è fumaris: aquæ fumaricæ, & scabiosæ.

Ad ægrit. calidas hepatis.

Syrupus è papavere, syrupus acidus, oxysaccharum: aquæ fumaricæ, cichorij.

Ad frigidas. ægrit. splenis.

Syrupus è scolopendrio, è calamintha, oxymel, scilliticum: aquæ sceniculi, & de radicibus.

Ad calidas ægrit. splenis.

Syrupus è nymphæa, è capillis veneris, aquæ capill. ven. cichorij.

Ad ægrit. frigidas renum.

Syrupus de radicibus, oxymel, aquæ abrotani, & saxifragiæ.

Ad ægrit. calidas renum.

Syrupus de agresta, è portulaca, aquæ plantaginis, & portulacæ.

Ad

Ad ægrit. frigidas matricis.

Syrupus de hyssopo, de artemisia,
de radicibus, de calamintha: aquæ artemisiae, salviae, melissae.

Ad ægrit. calidas matricis.

Syrupus de endivia, de portulaca:
aquæ virgæpastoris, endiviae.

Ad ægrit. frigidas juncturarum.

Syrupus è stœchade, acidus, scilliticus:
aquæ calaminthæ, pulegij.

Aloes humores biliosos, & pituitam purgat.

Agaricus pituitosos humores, & adustos; pulmonem, nervos juncturas.

Casia fistula bilem, & pituitam educit.

Rhabarbarum, bilem flavam, capitis humiditates, & omnium membrorum.

Elleborus albus, humorem melancholicum, & adustam bilem purgat ab universo corpore.

Fumaria adustos humores, cor, hepatis, & cerebrum expurgat.

Sena, humorem melancholicum, & adustam bilem.

Polypodium, bilem adustam; & humorem melancholicum educit.

Qua.

<i>Quatuor semina frigida minora.</i>	{	Semen lactucae
	{	Semen portulacae
	{	Semen endiviae
	{	Semen scariolae.
<i>Quatuor semina frigida majora :</i>	{	Melonum
	{	Cucurbitae
	{	Cucumeris
	{	Citruli.
<i>Quatuor semina calida majora :</i>	{	Foeniculi
	{	Anisi
	{	Cumini
	{	Carvi.
<i>Quatuor semina calida minora :</i>	{	Ammeos
	{	Amomi
	{	Apij.
	{	Dauci.
	{	Malva
<i>Quinque herbae emollientes.</i>	{	Parietaria
	{	Blitum
	{	Branca-ursina
	{	Mercurialis.
<i>Quatuor flores communes.</i>	{	Rosae
	{	Violae
	{	Flores borraginis
	{	Buglossae.
<i>Quinque radices communes.</i>	{	Apij
	{	Petroselinil
	{	Ruscinae
	{	Asparagi
	{	Foeniculi.

Qua-

Quatuor aquae cordiales :	{	Aqua scabiosæ
		Endiviæ
		Cichorii
		Buglossæ.
Herbæ capillares :	{	Adiantus
		Polytrichon
		Scolopendrium
		Cuscuta.
Quatuor unguen- ta calida :	{	Unguentum de althæa
		Unguentum aregon
		Unguentum marciatū
		Unguentum agrippæ.

Diamargariton frigidū magistrale.

℞ Margaritarum albarum ℥ iij.

hyacinthi ℥ j. ℞.

coralli rubei, boli armenii, succini ana ℥ j.

spodii, rasuræ eboris, cornu cervi, usli

ostis de corde cervi, serici crudi, corticis

citri, sem. papaveris albi, sem. acetosæ,

sem. portulacæ ana ℥ j. ℞.

tormentilla, glycyrrhizæ, amyli, ligni

aloës ana ℥ j. ℞.

santali albi, & rubei ana ℥ ij.

santali citrini, coriandri preparati, gum-

mi arabici, gummi tragacanthi, ro-

sarum rub. ana ℥ ij. camphoræ ℥ j.

quatuor sem. frigidorum mundatorum ana

℥ i.

moschi ambaris ana ℥ v.

auri & argenti ana numero x. misce, &

fiat pulvis.

Pul-

Pulveres roborantes magistrales.

℞. Glycyrrhizæ rosarum anisi ana ℥ ij.
 sem. papaveris, succi glycyrrhizæ, amyli,
 sem. portulacæ, sem. lactucæ, sem.
 scariolæ, sem. cydoniorum, flo, bor-
 raginis ana ℥ iij.

diapapaveris ℥ iij.

gummi ℥ j.

gummi arabici, santalorum alborum, &
 rubeorum ana ℥ iij.

cinnamomi, styracis, sem. bombacis.

sem. malvæ, berberi, florum nym-
 phæ violarum ana ℥ ij.

ambaris moschi ana G. vj.

misce, & fiat pulvis.

Pulvis ad casum.

℞. Rhabarbari ℥ j.

mumiæ ℥ ij.

rubeæ tinctorum ℥ j. ℞.

misce, & fiat pulvis.

Confectio hyacynthorum magistralis.

Cordia-
 lis con-
 fectio.

℞. Hyacimbi, coralli rubei, terræ sigillatæ,
 tormenilla, dictamni, grani tinctorii,
 sem. citruli, croci, myrrhæ, rosarum
 santalorum omnium, ossis de corde cer-
 vi, sem. acetosæ, sem. portulacæ,
 rasuræ ana ℥ iij.

sapphiri, margaritarum, topazii serici
 crudi, auri argenti ana ℥ ij.

cam-

camphoræ moschi ana ℥ j.

ambaris ℞. vj.

Syrupi limonum quod satis est, misce, &
fiat confectio cordialis.

Diamoschu magistrale.

℞. Galangæ, Zedoariæ, doronici, ben albi,
& rubei, calami aromatici, garyophil-
lorum, ocimi, serici combusti, carda-
momi, mastichis, melissæ, menthe sive
spodii, ligni aloes, coriandri
preparati feniculi, anisi ana ℥ j. ℞.
spicæ, cinnamomi, rosarum, absinthii
ana ℥ j.

mellis crudi quod satis est, misce.

Theriaca è citro magistralis.

℞. Sem. citri mundatorum, ℥ iij.

sem. acetosæ ℥ ij.

dictamni, sem. cydoniorum, sem. bom-
baccis ana ℥ v.

medulle nucum ad pondus omnium. Syru-
pi de acetositate citri quod satis est mis-
ce, & fiat confectio.

Limonata smaragdorum.

℞. Smaragdi ℞. x.

hyacinthi ℥ j. ℞.

sem. peoniæ, cinnamomi, rad. peoniæ
ana, ℥ iij.

sem. citri, dictamni ana ℥ vi.

coralli rub. grani tinctorii, sem. acetosæ
ana ℥ iij. croci

croci ʒ j.

visci quercini, rasuræ eboris, galange
limonatæ ana ʒ ij.

mellis quod satis est, misce.

*Confectio ad humores melancholicos
Gentilis.*

℞. Senæ, cinnamomi, croci, sem. anethi,
apij petroselini ana ʒ j.

melissæ, corticis, citri, caryophyllorum,
ben. albi & rubei, zedoariæ, sem. oci-
mi caryophyllati ana ʒ j.

ihymi. epithymi, flo. buglossæ, rosarum,
borraginis, polypodij ana ʒ ij.

turpeti ʒ v.

hermodactylorum ʒ iiij.

lapidis lazuli, lapidis armeniaci, myro-
balanorum, cepulorum, empeliico-
rum ana ʒ vj.

dacridij ʒ ij.

cum duabus partibus mellis, & una sac-
chari, fiat confectio.

Confectio cælestis Guidonis.

℞. Sem. juniperi ʒ j. ʒ.

caryophyllorum, mastichis nucis moscha-
ræ, Zinziberis, Zedoariæ, ana ʒ ij.
utriusque aristolochiæ, gentianæ, tormen-
tillæ, dictamni, enulæ

ana ʒ ij. ʒ.

salviæ, rutæ, balsamitæ, polij montani,
menthæ ana ʒ j.

bac-

baccarum lauri, doronici, croci, sem. citri,
 ocimi, mastichis, olibani, boli armenij,
 terre sigillate, spodij, ossis de corde
 cervi, rasuræ eboris, margaritarum,
 fragmentorum smaragdi, zapphiri,
 coralli rubei, ligni aloes, santalorum
 rubeorum, moschata, lignea ana ℥ ℥.
 conservæ rosarum, conservæ nymphææ,
 iberiatæ ana ℥ j.
 sacchari ℞ iij.

fiat electuarium cum aquis scabiosæ rosa-
 rum, & modico camphoræ.

*Composita medicamenta aboum
 laxantia.*

Diacatholicon	Nicol.
Diasena	Nicol.
Electuar. de succo ros.	Nicol.
Catharticum imperiale	Nicol.
Diaprunis solut.	Nicol.
Hiera picra comp.	Gal.
Diaprunis	Nicol.
Hiera ruffi	Mes.
Diacartamum	Arnol.
Hiera logadij	Nicol.
Confectio contra melancholiã	Gentilis
Hiera picra	Gal.
Confectio hamech	Mes.
Benedicta	Nicol.
Elect. elefscoph.	Mes.
Diacassia	Nicol.
	Ele-

K

Electuarium diacartamum magistrale.

℞. Specierum diatrageacanthi ℥ ss.
 pulpe cydoniorum ℥ ij.
 zinziberis, hermodactylorum ana iiij.
 pulpe cartami ℥ vj.
 dacridii ℥. iij.
 turpeti ℥ j.
 mellis rosac. ℥ ij.
 sacchari ℥ xvj.

De conditis.

Conserva rosarum	Mes.
Conserva acori	Mes.
Conserva violarum	Mes.
Citra condita	Mes.
Conserva borraginis	Mes.
Conserva buglossæ	Mes.
Conserva nymphææ	
Conserva stœchadis	
Loch de pino	
Loch de succo scillæ	
Loch de caulibus.	

Syrupi:

Syrup. è fumaria. S.	Mel rosatū colatū
Syr. è fumaria com.	Mel emblicorum
Syr. de mentha	Syr. de stœchade
Syr. byzantinus.	Syr. è succo borrag.
Syr. de absinthio	Syr. rosaceus
Syr. de eupatorio	Diamoron
Sy. de scolopendrio	Diacaryon
	Syr.

Syr. acetosus simpl.	Miva aromatica
Syr. acetosus comp.	Syr. è glycyrrhiza
Syr. de acetositate citri	Syr. de pomis
	Syr. de praffio
Syr. de agresta	Syr. de hyffopo
Oxymel scilliticū.	Syr. de endivia
Miva cydoniorum	Syr. capill. ven.
Syr. myrtinus	Oxymel diureticū

De Pilulis.

Pilulæ	{	de rhabbaro :	è lapide lazuli:
		aléphantinæ :	affajeret
		è fumaria :	de lapide ar-
		aggregatiuæ :	menio :
		de opopanace :	è sagapeno :
		foetidæ majores :	de mezereoo:
		foetidæ minores :	aureæ :
		stomachicæ min :	de hiera :
		stomachicæ mai :	cochiæ :
		contra pestem :	
linguæ subditæ	Nicol :		
bechicæ	Joan. Dam :		
de hermodactylis :			
è quinque generibus miroba-			
lanorum Nicol :			

Notandum, quòd cùm quis humorem viscidum, & pituitosum educere vult, medicamento salis gemmæ modicum adjiciat: irritabit enim expultricem facultatem. Dosis scrupulum unum non excedat.

DE
FEBRIUM
CURANDARUM
RATIONE

Francisci Arcæi Fraxinalensis
Medici & Chirurgi.

DE
FEBRI TERTIANA
pura five simplici.

CAP I.

PRINCIPIO accedenti Me-
dico æger rogandus est, que-
madmodum sese de ventris
beneficio habeat; cui durius
atque difficilius sibi esse respondenti,
communi clystere succurrere oportebit:
qui sic componitur.

℞. *Foliorum malvarum, foliorum violarum,*
brancæ ursinæ ana manip, j.

fursuris pug. ℥.

fiat decoctio: de qua sumantur uncie xij.

in quibus dissolvatur casie fistule ℥j.

addanturque olei violarum ℥ij.

salis communis ℥j. ℥.

fiat

fiat clyster : qui plerunque post paroxif-
mum, non ante adhibendus est.

¶ Deinde syrups exhibeantur acetosi, intybi
vel violarum ana ℥ ij.

cum aquis cichorei, & intybi ana ℥ j. ℞.

Quarta verò die, quæ est intentio so-
lutionis, post secundum paroxifmum,
lenitiva potio propinanda est; si tamen
neque nimiam materiam, neque intra
vasa abditam esse cognoveris.

℞. Casie fistule mundæ ℥ j.

dissolvatur in aqua intybi quantum satis
sit : vel;

℞. Florum violarum, borraginis, & buglos-
fi, ana ℥ j. ℞.

bordei mundi pug. j.

liquiritiæ rase & conquassate manip. ℞.

fiat decoctio, in qua dissolvantur casie fi-
stule ℥ ij.

& fiat potus : cui adde syrups violarum
℥ j. ℞.

¶ Quod si biliosa materia nimia, aut
intra vasa contenta fuerit, hanc potio-
nem exhibere oportebit minorativam.

℞. Rhabarbari electi temperati in aqua in-
tybi ℥ j.

pilorum spicæ, grana iiij.

casie fistule mundæ ℥ j.

diaprunis solutivi ℥ j.

dissolvatur in aqua intybi, vel buglossi quan-
tum satis fuerit, & fiat potio. Vel illam.

℞. Pru-

℞. Prunorum damascenorum numero xv.
 tamarindorum ℥vj.
 violarum ℥j.
 bulliant suaviter, & fricentur, & colentur: in qua colatura dissolvatur diaprurnis solut: casie fistule per setaceum trajectæ ana ℥vj.
 diacridii ℥ss.
 fiat potio ad uncias iiij.

Sæpe autem evenit, ut evacuata materiæ parte, hujusmodi minorativis natura potentior supra residuum evadat, & materia ipsa, aut corrigatur, aut naturali virtute sine alio medicamine expurgetur. Si verò virtutem nondum valere intellexeris, ulterius pergendum tibi est, & syripi concoctivi quotidie; enæmata verò tertio quoque die adhibenda sunt. Et si post tertiam accessionem rubens urina, & maximè crassa apparuerit, basilicam dextri lateris venam incidito, qua sanguis bili commixtus, atque putrefactioni proximus evacuetur. Si verò urina rubea, ignea, & non crassa, apparuerit sanguinem etiam mittere expediet, ad evacuandam bilem, & ebullitionem cohibendam: namque ferventi ollæ si partem vel modicam brodij subduxeris, ebullitio compestitur. Sed hæc sanguinis missio posterior ad quartam usque unciam fiat; nam priorem ad sextam fieri

ri lic
 rare
 cò sa
 conf
 quo
 cessa
 A
 prod
 mod
 hibe
 rit,
 virtu
 aliqt
 ita u
 miti
 ipfis
 cipij
 ℞.
 a
 & te
 pare
 rem
 tent
 S
 raq
 cult
 ℞.
 que
 chle
 non
 stiti

ri licebit : namque in posteriori refrigerare non evacuare intendimus. Hæc ad-
cò sanguinis missio in juvene carnosò ,
constantisque virtutis opportuna est ; in
quo facillè hoc remedio bilis ebullitio
cessabit.

Animadvertendum est , valde etiam
prodesse spontaneum vomitum in hujus-
modi accessionum principiis : neque co-
hibendum esse , nisi nimius fortasse fue-
rit , & qui assumptum cibum regerendo ,
virtutem debilitaret. Quòd si tardior
aliquanto natura ad vomitum videatur ,
ita ut tentatum perficere non possit , vo-
mitivo medicamento adjuvanda est in
ipsis , ut diximus , paroxysmorum prin-
cipijs.

℞. *Aque communis* ℥ iiij.

aceti & sacchari ana ℥ j. misc.

Vomiti-
vam.

& tepidum propinato , efficiet enim &
paroxysmum , & morbum ipsum lenio-
rem & breviorum , ex Hippocratis sen-
tentia.

Si verò nimius vomitus esset , natu-
ræque imbecillitatem argueret , ventri-
culus hoc syrupo facillè corroboratur.

Adver-
sum vo-
mitus.

℞. *Syrupum de agresta* ℥ vj.

quem per duas horas ante cibum co-
chleari paulatim exhibe ; quo vomitum
nondum sistente , pulverem hunc con-
stituito.

K 4

℞.

R̄. Corallij rubei ℥ iij.

zuchari ℥ ij.

cinnamomi ℥ ℥. misce :

ex quo pulvere sumatur ℥ j.

mixto cum prædicti syrupi cochlearibus
duobus.

Poteris etiam parare facculum ventri-
culo applicandum hujusmodi.

R̄. Rosarum rubearum ℥ iij.

coriandri præparati, menthe ana ℥ ij. ℥.

corallij rubei, balaustrorum ana ℥ j.

conquassentur, & fiat facculus.

Poteris & ad eandem rem admovere
micam panis tostam, & aceto infusam,
mortario pistam, & subactam
cum myrtiolorum,

& corallij ana ℥ j.

cinnamomi ℥ ℥.

ventriculo exterius imposito.

¶ Cum medicus curationem urgens,
tamen febrim non cessare, nec deficere
deprehendit, hujusmodi apozema ex-
hibeat.

R̄. Tamarindorum subtiliter incisorum, &
deinde probe contusorum ℥ ij.

hordei contusi, & passularum bene con-
tusarum sine acinis ana p. iij.

pruna incisa & contusa num. xv.

conservæ nenusarum, & conservæ violarum
ana ℥ ij.

fiat decoctio secundum artem, in lib.
xij. aquæ

CURAND. RATIONE. 225

aque, quoad libras octo relique fiant. Ex-
primito deinde & colato: cui colaturæ
adde syrupi violati, & oxysacchari so-
lutivi, & syrupi de duabus radicibus
ana ℥ iij.

fiat apozema de quo ægrotus singulis die-
bus manè bibat ℥ xij.

vesperique tantundem. Adhibebis etiam
illud enæma sive clysterem.

℞. Succi betæ lib. i. olei rosarum ℥ ij.

salis ℥ j. ℞.

zuchari rubei ℥ ij.

castie fistulæ ℥ j.

misce, & fiat enæma-

Jam verò concoctionis signis appa-
rentibus, si naturâ sponte sua ad eva-
cuandum non moveatur, eradicativò
medicamento utendum est hujusmodi.

℞. Passularum extructis acinis p. j.

prunorum damascenorum sine ossibus
num. xx.

florum violarum, borraginis & buglossæ
ana ℥ ij.

fiat decoctio, in qua dissolvatur rhabar-
bati infusi in aqua intybi per noctem ℥ j.

pilorum spice gran. iiij.

castie fistulæ, & diaprunis solutivi ana ℥ iij.

fiat potio. Cui addas syrupi violarum ℥ j.

& aromatizetur cum pulveribus diabo-
don Abbatis, & rosata novella ana ℥ j.

& hoc delicatiorib. hominib. exhibetur:

robustioribus verò hujusmodi aliud.

℞. Diaprunis solutivi ℥ ℥.

diaprunis scilicet ℥ v.

cum aqua intybi fiat potio.

Si paroxifmus sudore terminatur, eo-
que nimio, qui ex nimia virtutis debili-
tate, aut ex caliditate nimia proveniat;
hoc remedio compescitur sudor.

℞. Olei myrtilorum, & rosarum ana ℥ j.

misce: & si hoc minus valeat, illo al-
tero utendum est.

℞. Gummi Arabici infusi in aqua rosarum,

& balaustiorum ana ℥ ℥.

mucilaginis psyllij ℥ j.

olei citoniorum & rosarum ana ℥ iij.

miscantur, & inungatur corpus.

Cùm sudorem ex nimia virtutis debi-
litate profluere cognoveris, brodiis &
falsatis ægrotus tibi reficiendus est, ad-
mixto agrestæ succo, vel hoc pulvere.

℞. Corallij rubei ℥ ij.

margaritarum, & balaustiorum ana ℥ j.

zuchari tabarzet ℥ ij.

misce, & fiat pulvis.

Quod si his omnibus rectè curatis,
calor tamen non deficiat, sed ad exte-
riores partes magis extensus, ob nimiam
subtilitatem sitim efficit, vehementer ca-
lesfaciens; consultissimum fuerit julebum
aliquod parare, quo ægrotus cùm vo-
luerit, utatur; idque vires restauret, &
bilis

bilis ardorem refrigerando reprimat.
hujusmodi.

R̄. Pulveris electuarij diatrium santalorum,
& pulveris diadragacāthi frigidi ana ℥ss.
crystalli ℥j.

Zuchari tabarzet ℥iiij.

misce, & fiat conditum auratum: at-
que hoc ditioribus opportunum erit.

R̄. Margaritarum orientalium perforata-
rum, & non perforatarum, fragmento-
rum rubinorum, smaragdorū, &
hyacinthorum in subtilem pulverem
contusorum ana ℥j.

crystalli ℥ss.

ossium de corde cervi num. 4.

femini citri mundati, quatuor seminum
frigidorum ana ℥j. ℞.

foliorum auri & argenti ana num. iiij.

zuchari tabarzet ℥iiij.

conservae violarum, intybi, & buglossae
ana ℥ss.

pulveris trium santalorum ℥j.

Zuchari ℥iiij.

fiat in modum conditi & quando vol-
uerit bibere, accipiat duo cochlearia
istius conditi cum aqua hordei ℥vj.
cum qua admisce tria hujus julebi.

R̄. Juleb violarum, & acetosi. s. ana ℥iiij.

misce in amphora parva h.ec pro ditioribus;

& succi granatorum, aquae cucumeris,

& cucurbitae, & intybi ana ℥vi.

mucilaginis psyllij ℥ ℥.

*aceti albi unciam unam, cum zucchero
sufficienti; fiat iuleb: in cuius clarifi-
catione ponantur quatuor seminum fri-
gidorum minorum, santalorum rubeo-
rum & alborum, spodij ana ℥ j.*

camphoræ ℥ ℥.

hoc ægroto potum appetenti exhibito.

Licebit quoque super linguam ægro-
ti ariditate laborantis, electuarium dia-
dragacanthi frigidi apponere, vel pilu-
las, bechicas, bichichias vocatas; vel pru-
na damascena, vel lactucam, vel pomum
frigidum, vel aqua rosarum, & aceto
gargarizare; vel aliquid de syrup. vio-
larum lambendum, vel cucumeris par-
tem mandendam permittere.

Si verò nimia simul & caliditate & sic-
citate laboret, misceto has res, & ad
gargarismum exhibeto.

℞. Aquæ arnoglossæ ℥ iij.

aquæ rosarum ℥ ij.

rhodomellis ℥ j. misce.

Si glutienti difficultatem nimia ariditas
effecerit, lavet os & guttur aqua frigida;
& deinde syrupum violatum frequen-
ter lambat.

Si ægrotus anxie habeat ob ætatis car-
lorem, vel quòd fumus ex bile cor petat,
confectio cordiali iuvandus est.

*℞. Theriacæ, citri, conservæ rosarū ana ℥ j.
cum*

CURAN. RATIONE. 229

cum syrupo acetositate citri : fiat confectio pauperioribus commoda. Dittioribus verò;

℞. Diamargaritonis \mathfrak{z} j. \mathfrak{ss} .
 seminis citri mundati, & seminis acetosi,
 & bombacis ana \mathfrak{z} ij.
 cum syrupo buglossæ : fiat Confectio.

Item hoc modo.

℞. Confectionis hyacinthorum \mathfrak{z} j. \mathfrak{ss} .
 pulveris diamargaritonis \mathfrak{z} iij.
 misce cum syrupo violarum: fiat confectio.
 cujus cochlear unum ægrotò cùm anxie
 habet cum aquis rosarum & buglossæ
 bibendum exhibebis.

Si capitis dolore nimio, ex fumis à ventriculo ad caput sublatis, afficiatur ægrotus, enæmatis prædictis sæpius etiam adhibitis, & crurium fricatione succurrendum est. Præterea etiam & pedum lotionem ante somnum utendum huiusmodi.

℞. Florum rosarum rubrarum, foliorum vitis, & camomillæ ana m. ij.

florum camomillæ, & meliloti ana p. j.
 bulliant in aqua communi, qua per singulas noctes pedes laventur: & coxæ etiam ligenter, ut fumis à capite retractis dolor remittatur. frica etiam pedes cum linteo crasso, in quo nonnihil salis aceto madefacti positum sit. juverit etiam caput hoc medicamento confortare.

K 7

℞.

℞. *Aque rosarum* ℥ iiii.

olei rosarum ℥ ij.

aceti ℥ ℥.

santalorum rubeorum ℥ i.

misce, & fiat frontale in forma sacculi. Item.

℞. *Coriandri preparati, rosarum rubeorum ana* ℥ ℥.

corticum papaveris, florum camomille ana ℥ iij.

conquassentur, & in sacculo indita, atque rosarum aqua irrorata, capiti imponantur.

Vigilia etiam nimia ex humiditatis, à caliditate & siccitate febris consumptæ, defectu ægrotis nonnunquam accidit: cui coctis lactucis in cœna exhibitis, commodè aliquando subvenitur. Id cum minus sufficiat, papaveris cortices lactucis coquendis addantur. Sin hoc etiam non satis esse videatur, unguentum hoc applica.

℞. *Unguenti populeonis* ℥ ℥.

requiem Galeni ℥ iij.

misce. Quod si neque his etiam remediis dormierit, hanc potionem duabus horis ante mediam noctem exhibeto.

℞. *Syrupi papaveris, & nenusaris ana* ℥ j.

opij thebaici ℥ ij.

misce, & bibat. Licebit etiam soporiferum hoc naso indere.

℞.

℞. *Aquæ nenusaris* ℥. ℥.
requiem Galeni G. iij.
oppi thebaici G. iij.
aceti modicum

his mixtis, madefiat coccum vel bombyx, & intra nasum indatur.

Præterea illud attentè considerandum est, solere nonnunquam post crism, caloris nonnihil residere; id quod ex ardoris ac sitis sensu, & caliditate intra hepar, atque in volis manuum; ex urinæ etiam tinctura deprehenditur. Illud in hac re perspicui operæpretium erit, an videlicet caliditas illa ex mala complexionione, simul cum materia, an sine materia etiam proveniat. Si materia non adsit, electuario quopiam complexionionis malæ calidæ correctivo uti oportuerit: ut;

℞. *Electuarium*, *diatrium santalorum*, aut *diamargaritonis frigidi*; & quo ego in regione nostra commodè usus sum, *confectionis buglossæ*, cum aqua *intybi*, vel *capillorum veneris*, vel *cichorei*, vel *nenusaris*. Proderit etiam singulis diebus binas tabellas hujus generis manè edisse, cum aqua aliqua commoda, vel syrupum aliquem caloris extinctivum bibere; ut violatum, vel zucharum rosatum comedere, vel hordeatum sorbere; cui quatuor frigida semina addita sint. Ipsa verò hepatis regio
 bis

corrigitur, quæ renibus tertianam patientis ægroti sæpe accidit. Renes autem ipsi exterius inunguntur hujusmodi unguento.

℞ Olei rosati magistri Arnoldi ℥ j.
aceti modicum : misce, vel unguento rosato santalato. His igitur remediis diligenter adhibitis, sanitas ægrotanti, Deo propitio, restituitur.

Illud tamen animadvertere in omni hoc curationis capite oportuerit, ea quæ à nobis de evacuationibus initio dicta sunt, de communi curationis genere, & opportunitate esse accipienda. namque de ea, quæ coacta cura dicitur, aliud est iudicium. Si enim in ipsis morbi initiis biliosam materiem, furentem, periculumque comminantem cognoveris, & membri alicujus raptum, vel causonem timeris, fortiori medicamento eradicatorio aliquo initiis ipsis obsistendum est. Cujus generis illud.

℞. Rhabarbari temperati in aqua intybi ℥ j.
pilorum spicæ G. iij.
diaprunis solut. ℥ ij. ℞.
casee fistule mundæ ℥ j.
dissolve in aqua nenusaris, & buglossæ quantum satis fuerit. Aromatizetur autem cum ℥ j.

diarhodonis Abbatis. Deinde descriptam à nobis viam insitito; atque hoc modo ter-

i, ro-
modè

mple-
no-ve-
tivo,
tebit,

fistula

dato-

℞.

onfe-
ar una
pillo-
libus.
emata
edu-
antia;

bro re-
parato
r: ex

ti ℥ ij.
e effi-
calida
cor-

tertianæ febris curam habeto; peritissimos autem practicos nocturna diurnaque manu versato.

DE CÛRATIONE

tertianæ febris nothæ ex biliosa & pituitosa materia.

CAP. II.

Tertianæ spuria appellata, hujusmodi indicia sunt. Paroxismus ultra sedecim horas durans, urina crassæ substantiæ, & citrino colore; capitis gravedo, & similia. Principio igitur cognoscendum est, an materia vitiosa, nimia sit, an modica; si modica fuerit, ut plurimum digerendo & evacuando, curatio instituitur. Igitur cum materiam inobedientem fuisse intellexerit medicus, fortius aliquod enæma, quam pro simplici tertiana, parabit; majori multitudine, crassitie, & viscositate id postulante. Id autem hujusmodi erit.

R̄. Malvæ, bismalvæ, mercurialis ana man. j. coquantur: in decoctione dissolvatur cassie fistule ℥j. confectiois benedictæ ℥vj. olei communis ℥ij. salis ℥i. ℞.

& efficiatur enæma. Deinde concoctivos syropos singulis diebus manè exhibeat. ut: ℞.

℞. Syrupi acetosi, scilicet intybi, & rhodomellis ana ℥ ss.

aquarum intybi, cichorei, & buglossæ ℥ j.
misce, atque tribus diebus utere.

Post quos minorativum medicamentum propinandum est: ut illud;

℞. Casie fistulæ mundæ, rhodomellis ana ℥ j.
electuarij, diacartami ℥ iij.

cum aqua buglossi, fiat potus exhibeaturque ante ortum solis, nisi paroxismus impediat: nam si tunc invaserit, medicamentum hora quietis est exhibendum, quæcunque illa sit. Quoniam verò febris tertiana notha plerunque ex materia crassa & viscosa fit, idcirco una portione evacuari non potest. Quamobrem alij etiam syrupi parandi sunt, qui & provocare magis, & materiam conjunctam dissolvere magis possint. ut:

℞. Syrupi acetosi composui de duabus radicibus ℥ j.

rhodomellis ℥ ss.

aquarum capillorum veneris, & saniculi ana ℥ j. ss.

ex quibus manè singulis diebus bibat ægrotus. Quod si post sumptam potionem urina crassior appareat omnino sanguinem mittere expediet, usque ad ℥ vi.
& si iterum idem deprehendatur, iterum vena basilica scindenda est, modò virtus constet, & alia particularis causa non inter-

intercedat: ut dolor capitis, qui ex cephalica sanguinem mitti postulat, alias basilica plerumque scindenda est: namque biliosæ febris fons ut plurimum in hepate est. Syrupis autem sumptis, & concoctionis apparentibus signis, eradicativa potio paratur.

℞. *Casie fistulæ mundæ*, & *rhodomellis ana* ℥ j.

rhabarbari electi infusi in aqua intybi ℥ j.
pilorum spice ℞ iij.

electuarii, *diacartami* ℥ iij.

bis in communi decoctione dissolutis potus paratur. Rhabarbari autem dosis ad proportionem abundantis bilis augenda est: diacartami verò ad pituitæ abundantia rationem addenda. Illud etiam ab Avicenna commendatum medicamentum commode in mixtione bilis & pituitæ exhibetur.

℞. *Turbith albi* & *gummosi* ℥ j.

scammonii ℞ vi.

salis gemmæ ℞ ss.

aque feniculi. & *rhodomellis ana* ℥ j.

fiat potius. Consultissimū autem est, correctis, & fermentatis potius medicamentis, quàm simplicibus fortiter solventibus, quæ sua natura venenosa plerumque sunt, ut probe Mesues notat: ita si turbith & diacartami simul copia sit, diacartami electuario tutius evacuamus, quod

quod correctius medicamentum sit.

Quod si turbith, agarico, vel scammonio uti libeat, videndum an biliosa materia cum pituitosa mixta, pituitæ, humiditatem faciat, an non; ut in hemitritæ: si faciat, diacartamum exhibendum est, in cujus confectione scammonium intrat, & ad unam omnino formam redacta sunt: & sic purgabitur materia unita unitate formæ. Si verò utraque seorsum separata materia est, agarico vel turbith, vel scammonio evacuare, Avicenna auctore, non nocuerit.

Postquam verò hoc medicamentum adhibitum fuerit, si tamen febris nondum absit, quod materies multa, vel crassa, vel viscosa est, atque ob eam rem secundum jam mensem morbus excedit, sollicitè provideat medicus, an hypochondriorum partes bene tractabiles maneant, an non quas si oppilatas deprehenderit, vel ob bilis crassitudinem, vel copiam, vel viscositatem; fomentatione aliqua iuvabit. ut.

℞ *Florum camomille, & meliloti ana m. j.*

absinthii m. j. ℥.

spicæ, rosarum rubearum ana ʒ. ℥.

bulliant in tribus libris aquæ, & cum spongia intincta, atque deinde expressa fomentetur locus; ac deinde huiusmodi unguento aliquo inungatur.

℞.

ex ce-
alias
nam-
um in
is, &
eradi-

mellis

ubi ʒ. j.

potus
d pro-
la est:
lantia
ab A-
entum
ituitæ

ʒ. j.
t, cor-
amen-
venti-
mque
si tur-
diamus,
quod

R̄. Olei de spica, absinthij & rosarū ana ℥j.
cere quantum sufficiat, & fiat unguen-
tum: vel huiusmodi aliquo emplastro
uti conducet.

R̄. Florum camomille, meliloti, absinthij,
squinati, spica, seminis carabi, triso-
rum ana ℥j.

incorporentur etiam cum oleo absinthij, ca-
momille & spica, quantum sufficiat. fiat
emplastrum quod regioni oppilatae im-
ponatur. Delicatiores verò, & inhye-
me ob frigiditatem inungi & fomentari
recusantes, emplastri genere quopiam
idoneo iuneris. ut:

R̄. Masse emplastri de meliloto, & diaqui-
lonis, majoris, quantum sufficiat: & fiat ad
formam idoneam, atque oppilato loco
imponatur. Enæmatum autem adhiben-
dorum obliuisci interim non oportet,
quæ utilissima etiam ad hanc rem sunt;
qualia jam descripsimus. Illud etiam
enæma commodum ad oppilationem
fuerit.

R̄. Florum camomille, florum violarum
ana m. j.

betæ, mercurialis ana m. ℞.

seminis cartami ℥iij.

fiat decoctio ad ℥xij.

in quibus dissolvatur confectionis hieræ lo-
godionis ℥j.

olei sesamini ℥iij.

fiat enæma. vel.

R̄. Se-

R̄. Seminis anisi, marabri, brance ursine,
foliorum violarum m. ℥.
fiat decoctio ad ℥ viij.
in quibus dissolvantur.
confectionis benedictæ.
& hieræ picræ ana ℥ ℥.
olei camomille & rosarum ana ℥ j.
salis communis ℥ j. ℥.
fiat enæma. vel;

R̄. Ficum siccarum num. vj.
sebesten num. iiij.
foliorum violarum m. ℥.
turbit, & seminum cartami ana ℥ iiij.
bliti m. j.
fiat decoctio, in qua dissolvatur
castie fistule munde ℥ j.
olei camomillini ℥ ij.
salis communis ℥ j. ℥.
miscæ & fiat clyster. vel;

R̄. Prunorum damascenorum, meliloti, &
sursuris ana m. j.
fiat decoctio, in qua dissolvatur
rhodomellis & Zuchari rubei ana ℥ iiij.
olei sesamini ℥ j. ℥.
salis communis ℥ j. ℥.
miscæ & fiat enæma.

Ad ejus verò materiæ, quæ febrem
adhuc fovet & tardat, expulsionem &
correctionem, hujusmodi apozema
præbetur, quod partim extinguat, par-
tim etiam adaperiat.

R̄. Ta-

ana ℥ j.
nguen-
plastro
sint hij,
, trito-
hij, ca-
at. fiat
tæ im-
in hyc-
nentari
apiam
diaqui-
fiat ad
o loco
dhiben-
portet,
n sunt;
etiam
tionem
violarum
hieræ lo-
R̄. Se-

℞ Tamarindorum subtiliter incisorum, ac
deinde bene contusorum ℥ ij.
radicum recentium probe contusarum, in-
tybi, cichorei & apii ana m. iij.
hordei bene contusi, & passularum de-
tractis acinis contusarum ana p. iij.
conservæ nenusaris ℥ ij.

prunorum damascenorum subtiliter inci-
sorum num. xv.

fiat decoctio ex arte, in lib. xij.

aque, quousque remaneant lib. viij.

& facta forti expressione, & colatura,
adde syrupi violati, & oxysacchari
scilicet & syrupi de duabus radicibus,
ana ℥ iij.

misce, & fiat apozema: ex quo singulis
diebus manè ℥ xij. bibito, & vesperi
tantundem. Conferet etiam plurimum
apozematis loco syrupus apozematus
præstantis in ea re virtutis. ut;

℞ Aquarum absinthii, apii & feniculi, &
scariolæ ana ℥ iij.

& de byzantiis, & acetosi, & de duabus
radicibus ana ℥ iij.

azari, squinanti, santalorum rubeorum
ana ℥ j.

que in ligatura ponantur: & fiat apoze-
matus. Item.

℞ Pulveris trochiscorum de eupatorio ℥ ij.
pulveris diatrium santalorum ℥ j.

Zuchari infusi in aqua absinthij & feniculi
ana

CURAN. RATIONE. 241

ana quantum sufficiat, & fiat electuarium
in tabulis. Item :

℞. Casie fistule preparate cum zucchero,
& electuarij diacartami ana ℥j.
rhabarbari ℥j. ℞.

quatuor seminum frigidorum majorum
mundatorum ana ℥℞.

cum syrupo capillorum veneris : fiat confe-
ctio opiata. vel;

℞. Turbith albi & gummosi ℥ij.
agarici ℥j.

casie fistule ℥ij.

diacridij C. x.

cum syrupo acetoso de duabus radicibus, &
fiat confectio opiata. vel;

℞. Hieræ logodionis, & casie fistule ana ℥j.
misce. vel;

℞. Pulveris hieræ picre Gal. ℥iij. ℞.

casie fistule preparate ana ℥j.

quatuor seminum frigidorum mundatorum
ana ℥j.

cum syrupo acetoso : fiat confectio. & ;

℞. Aquarum scariolæ & feniculi ana ℥iij.

misce. Hoc igitur modo producenda cu-
ratio est, concoquendo, & evacuando

medicamento forti debili mixto. nam
duabus diebus exhibebis ex prædicto sy-
rupo apozemato ℥viij. cum binis tabu-
lis prædicti electuarij : quarta autem die

cochlear unum prædictarum confectio-
num dissolutarum cum ℥vj. dictæ aquæ:

ana
L atque

atque ita concoquendo, & evacuando, conservando virtutem cum medicina forti in virtute, & debili in evacuatione, liberabitur Deo auxiliatore ægrotus.

¶ Si quis verò à confectionibus hujusmodi abhorrens, refugiat, hujusmodi pilulis curabitur.

℞ *Massæ pilularum rhabbari, & de a-*
garico ana ʒ ʒ.

cum aqua fœniculi formentur pilulæ ciceris magnitudine ad usum; quas per intervalla accipiat ægrotus, sicut de confectionibus dictum est: id autem fiet, cum ægrotus dormire intendit. Cum nimia quantitate materia est, ut in tertianis nothis plerumque accidit, illud pervidendum est, num adeo copiosa sit, ut concoctionis expectatio periculum mortis minetur ob materiæ suffocationem: namque in hoc genere eradicationibus medicamentis statim ab initio, ut jam diximus, uti oportuerit; quanquam materia ipsa concocta non sit; id quod ab Hippocrate aperte præcipitur in principii morborum, &c. At verò minore existente copia, ut plerumque fit, minorativum medicamentum ante syruporum etiam usum adhiberi convenit. ut illud:

℞ *Florum violarum, borraginis & buglossæ*
ana ʒ ʒ.

pru.

CURAN. RATIONE. 243

prunorum damascenorum enucleatorum
num. xij.

passularum detractis acinis pug. j
bulliant in aqua communi, in qua dissol-
vatur rhodomellis, & casie fistule
mundæ ana ℥j.

rhabarbari electi temperati in aqua in-
tybi ℥j.

pilorum spicæ C. iij.
electuarij diacartami ℥iij.
fiat potus.

Accidit etiam aliquando tertianam ex
bilioso humore cum atra bili mixto pro-
venire, prospiciendum est, an melan-
cholicus ille humor ex aduisione sui ip-
sius, videlicet melancholici humoris na-
turalis cum bili, an etiam non naturalis,
sed accidentali aduisione factus sit. Si na-
turalis est, naturalibus prædictis inten-
tionibus est procedendum per enæmata
concoquendo, atque evacuando etiam,
quorum huiusmodi descriptio sit.

℞. Hordei, mercurialis, malvæ, violarum,
spinacie, borraginis ana m. j.

fiat decoctio; in qua dissolvatur pulvis
hiere galle ℥ij.

casie mundæ ℥j.

olei communis ℥ij.

salis communis ℥j.

fiat enæma: & tunc applica etiam syru-
pos. ut;

L 2

℞.

℞. Syrupum buglossi, & acetosæ, scilicet ana ℞ iij.

aquarum buglossæ, & intybi ana ℥ j. ℞.
vel magistralera aliquem hujusmodi.

℞. Florum buglossæ, borraginis, & violarum ana m. j.

radicis petroselini & saniculi ana m. ℞.

melissæ, scolopendræ ana m. j.

fiat decoctio, & cum lib. j.

Zuchari, & aceti ℥ iij.

fiat syrupus: & adde aquarum buglossi & cichorei: atque ex his bibat singulis diebus, mane & vesperi: ubi verò concocta materies fuerit, hujusmodi potionem exhibeto.

℞. Florum buglossæ, violarum, borraginis; seminis anisi & marathri ana ℥ ij.

liquiritiæ rase conuasatæ m. j.

fiat decoctio; in qua dissolvatur castiæ

fistulæ mundæ, & confectionis diasenæ

ana ℥ ℞.

electuarij de succo rosarum ℥ iij.

fiat potus: dulcoretur cum syrupo violarum.

Advertendum tamen est, non oportere, ut diætâ ad eam frigiditatem declinet, quæ in tertianæ simplici exigitur, ob melancholici humoris admixtionem; qui frigidæ complexionis est.

Si verò ex bili calida tertiana proveniat, cujus pars aliqua adusta in melanchol-

chol
præc
sunt.
est,
quod
tendi
rati
tibi
& di
igitu
℞. J

fol
fia

vi
sal

fiat e

conf

℞. S

ve
aq

misc

℞. S

an

cum a

ratur

℞. J

aq

ac

cum 3

℞. Q

an

choliā conversa fuerit non naturalem
 prædicti canones tibi etiam observandi
 sunt. nam aut regulariter procedendum
 est, aut irregulariter, si non regulariter,
 quod materia nimia sit, eradicativo u-
 tendum est. si verò nimia non sit, mino-
 rativo. Si autem regulariter agendum
 tibi fuerit, enæmatibus, concoctione,
 & deinde evacuatione opus erit. Erit
 igitur usui hujusmodi clyster.

℞. Foliorum violarum, hordei mundi, &
 foliorum malvarum ana m. j.

fiat decoctio: in qua dissolvatur medul-
 læ casie fistulæ ℥ j.

vitelli ovorū duorum, olei violarum ℥ iij.

salis ℥ j. ℞.

fiat enæma. Syrupum verò hujusmodi
 constitues concoctivum.

℞. Syrupi violarum & intybi ana q. s. iij.
 vel ℥ j.

aquarum intybi & lupulorum ana ℥ j. ℞.

misc. vel;

℞. Syrupi buglossæ & oxysacchari scilicet
 ana q. s. iij.

cum aquis, &c. Magistralis etiam sic pa-
 ratur.

℞. Aquæ fumarie ℥ vi.

aquæ buglossæ, rosarum intybi ana ℥ iij.

aceti ℥ j.

cum zucchero: fiat syrupus. vel;

℞. Quatuor seminum frigidorum communiū
 ana ℥ j. L 3 florum

florum violarum, borraginis, & bugloſæ,
roſarum, & ſcariolæ ana p. j.

succi borraginis, ſumariæ, & pomorum
grati odoris acetoforum ana ℥ iij.

ſcolopendræ m. j. ℞.

bulliant ſimul in lib. j.

aquæ ad conſumptionem tertiæ partis, & cum
tribus lib. zuchari: fiat ſyrupus: de quo
accipiat ſingulis diebus manè ſeptena co-
chlearia cum prædictis aquis. Materia
autem concocta, potionem hanc ex-
hibeto.

℞. Confectionis hamech ℥ iij.

caſtæ mundæ ℥ j.

diſſolvatur in aqua intybi, & fiat potus;
dulcoreturque cum ſyrupi violarum
℥ j. vel;

℞. Epithymi, folliculorum ſenæ, hordei
mundi, florum violarum, borraginis &
bugloſſi ana ℥ j. ℞.

fiat decoctio: in qua diſſolvatur rhabar-
bari inſuſi in aqua intybi ℥ iij.

caſtæ mundæ ℥ j.

diſſolvatur in ſero caprino, & fiat potus. vel:

℞. Confectionis hamech, electuarij de ſucco
roſarum ana ℥ ij. vel iij.

incorporentur, & fiat bolus cum zucharo.
Quod ſi febris nondum diſceſſerit, com-
modis & idoneis medicamentis, ut in
tertiana notha celebriori agendum eſt,
concoquendo & evacuando adhibita
forti

forti & debili medicina, ut confectio
aliqua huiusmodi.

℞. Confectionis hamech, electuarij de succo
rosarum ana ℥ ij.

quatuor seminum frigidorum mundatorum
omnium ana ℥ iij.

incorporentur cum syrupo violarum, & fiat
confectio. vel;

℞. Confectionis diasene, casie preparate
cum zucchero ana ℥ j.

rhabarbari electi ℥ ij.

pilorum spice G. viij.

misce cum syrupo violarum, & fiat confe-
ctio. Item:

℞. Pulveris diarium santalorum, trochisco-
rum rasis, & de rhabarbaro ana ℥ j.

conservae buglossi ℥ iij.

zuchari insusi in aqua intybi, quantum suf-
ficiat. fiat electuarium in tabulis. Item.

℞. Syrupi buglossae, intybi, capillorum ve-
neris ana ℥ iij.

aquam lupulorum, & radicum diuetica-
rum ana ℥ iij.

cum zucchero sufficienti fiat syrupus apoze-
matus, de quo ægrotus sumat duabus
diebus uncias binas cum duabus tabulis:
& si libuerit confectionis partem sumere,
sumat. vel ex his pilulis.

℞. Massae pilularum de rhabarbaro, & In-
diarum ana ℥ ℥.

diacridij G. viij.

*cum aqua intybi fermententur pilulæ
num. xij. ad usum singulis vicibus.*

DE TERTIANA continua.

CAP. III.

Tertianæ continuæ dictæ à minori
paroxifmo inchoari solent, quæ an
simplices sint, videndum in primis est.
Id autem tertianæ simplicis signis indica-
tur, atque eodem omnino modo quo
simplex tertiana curatur. Quòd si com-
positam esse cognoveris, quonam modo,
aut quo humore componi contingat,
continud est considerandum. nam vel
cumbili atra, vel cum pituita compo-
nitur. Rursus atra bilis in naturalem &
accidentalem dividitur. Accidentalem
autem eam dicimus, quæ ex aduisione
fiat. Utriusque autem materiæ conco-
quendæ atque evacuandæ formulam su-
perius descripsimus.

Illud tamen cognoscere operæpre-
tium est, hanc continuam tertianam, ut
interpolata, graviorem, deteriora etiam
efficere symptomata, tam in membris
mobilibus, quam in internis; atque in
his etiam quæ per directionem cum cor-
de continua sunt; ea autem symptomata
hu-

C
hujus
pitis g
te ma
nendu
nimia
delatu
bus,
à nobi
confo
verò
illi sin
quibu
dixim
simpli
mi sin
stione
fronta
R. O
cast
san
misce
gere l
R. O
cum
lum h
R. C
ana
flor
san
conq
auter

hujusmodi plerumque sunt. Primum capitis gravedo, ac dolor; cui levando ante materiam purgatam nihil est apponendum. Eum autem dolorem si vapor nimia febris excitatus, atque ad caput delatus effecerit, diversoribus enæmatis, fricationibus, lotionibus pedum à nobis jam descriptis, levabis: deinde confortantibus illis capiti adhibitis. tum verò considerare oportuerit, an fumi illi simplices sint, hoc est, calidi ac sicci quibus sanguinis missio conveniet, ut diximus in dolore capitis, in tertiana simplici, ac pura: Si verò compositi fumi sint, ex vaporum humidorum adustione, ut ferè in tertiana notha accidit, frontale adhibebis hujusmodi.

℞. Olei rosarum & camomillæ ana ℥j.

casie lignee ℥j.

santalorum rubeorum ℥j.

misc. Idem in unguenti formam redigere licebit. ut;

℞. Olei camomillini & rosarum ana ℥j.

cum cera fiat unguentum. Item sacculus hujusmodi si libeat, imposito.

℞. Coriandri præparati, rosarum rubearum ana ℥ij.

florum camomillæ, meliloti ana ℥iiij.

santalorum rubeorum ℥j.

conquassentur, & fiat sacculus. Purgata autem materia, apozema illud commo-

L 5

dè

dè dabis, quod in cap. de tertiana notha descripsimus.

Accidunt etiam nonnunquam hujusmodi febre laborantibus angores, ob caliditatem nimiam atque mobilitatem humorum: in quibus cordialia opportunè parantur, puræ ac mixtæ materiæ ratione habita; & iis adhibitis in pura, quæ de pura tertiana docuimus: in mixta verò materia hujusmodi cordialibus utitor; maximè si bili pituita misceatur.

℞. Pulveris diamargaritonis ℥ ℥.

theriacæ de citro, limonata, smaragdorum ana ℥ ℥.

misce cum syrupo buglossi: fiat confectio cum aquis buglossi, & intybi. Vel alia etiam magistralis confectio paretur.

℞. Confectionis hyacinthorum, confectionis alchermes, pulveris diamargaritonis frigidiana ℥ j. ℥.

misce cum syrupo acetositis citri; fiat confectio. vel;

℞. Conservarū buglossæ & rosarū ana ℥ ℥. seminis citri mundati, seminis acetosæ & borraginis ana ℥ j. ℥.

cum syrupo acetositis citri: fiat confectio. vel;

℞. Radicū tormentillæ & zedoariæ ana ℥ ij. ben albi & rubei ana ℥ j. conservæ rosarum ℥ ℥.

℥.

CURAN. RATIONE. 251

Syrupi violarum quantum sufficiat: fiat confectio. De omnibus istis compositionibus poterit ægrotto hora angustia unum cochlear exhiberi cum aquis prædictis. Qui si delicatior sit, & hujusmodi confectioes accipere recusaverit, electuarium in tabulis constituito. vt;

Rx. Pulveris electuarij diamargaritonis ℥ j.
pulveris diacameronis ℥ ij.

zuchari infusi in aqua buglossæ quantum sufficiat: fiat electuarium in tabulis. Si tamen nimia etiam siti, delicatioreque complexione laborat, hujusmodi restaurativum cordiale utrique intentioni idoneum conficito.

Rx. Conservæ buglossi & rosarum ana ℥ iiij.
conservæ cichorei ℥ ij.

pulveris electuarij diatrium santalorum,
diamargaritonis frigidi ana ℥ j.

corticum citri cum zucharo conditi ℥ iiij.
zuchari ℥ iiij.

misce, & fiat conditum inauratum. Vel hujusmodi epithema imponito.

Rx. Florum buglossæ, corticum citri, florum
borraginis & violarum ana ℥ ℥.

santalorum omnium ana ℥ j. ℥.

corallij rubei ℥ ℥.

trochiscorum de campbora ℥ j.

aque melissæ & rosarum ana ℥ iiij.

misceantur, & fiat epithema. Si quicquam

quam præterea symptomatis superveniet, consule caput de tertiana canonis tertii, & hoc modo Dei beneficio ægrotus valebit.

DE CURATIONE

Causonis.

CAP. IIII.

Sitis vehementissima, atque æstus, & linguæ ariditas, citrinusque ac niger color, & accessionum vix perceptibile discrimen, æqualiâque ferè symptomatum tempora: vigiliæ præterea, inquietudines, mentis perturbationes, capitis gravedines, temporum pulsationes, oculorum cavitas, urinæ citrinus color, pulsus velox ac vehemens, causonis indicia sunt. Duo autem ejus morbi genera sunt: unum quod ex bilioso humore fit, & causon cholericæ appellatur: id ex tertianæ simplicis signis dignoscitur, cujus curatio hoc modo instituitur. Principio statuere oportuerit in hoc morbo, in quo nimia intensio & adustio est, omnem moram, induciasque omnes esse periculosas; laudarique in primis celeritatem. Igitur urinæ turbiditate, crassitie, ac rubedine perspecta, hujusmodi enæma parari jubebis.

R̄. Violarum, malvarum, lactucæ, sempervivæ, foliorum nenufaris ana m. j,
fiat

CURAND. RATIONE. 253

fiat decoctio ad ℥ xij.

in qua dissolvantur vitelli ovorum duo, olei
violarum ℥ iiij.

castie fistule mundæ ℥ j.

zuchari rubei ℥ j.

miscē, & fiat enæma. vel;

℞. Decoctionis foliorum violarum lib. i.

succi cucurbitæ ℥ iiij.

olei rosarum & violarum ana ℥ j. ℞.

Camphoræ C. iiij.

Salis communis ℥ j.

miscantur, & fiat enæma. Aut aliud
quodvis ex iis quæ in cap. de tertiana
simplici pura præcepimus. sed in hac fe-
bri frigidioribus semper utendum est,
propter majorem caloris intensiorem.
Enæmate autem adhibito, statim san-
guis ex vena communi, si nimis abun-
dans videatur, mittendus est; vel ex ba-
silica. Neque verò sanguinis missio tar-
danda est: quandoquidem phrenitis pe-
riculum vehementer timetur, caliditate
in horas adaueta, bilem ipsam acuate,
atque ad princeps membrum, quale ce-
rebrum est, tollente; unde vel phrenitis,
vel deliria fiunt. At verò sanguinis mis-
sio parcè fiat, ne nimium bilis ipsa effe-
vescat. Hujusmodi venæ sectio Enenta-
tiva phlebotomia ab Arnaldo dicitur.

¶ Si autem urina apparuerit citrina i-
gnea, sine admixtione sanguinis, enæma-

tibus & evacuationibus instituenda curatio est; ob vehementem autem morbi sine induciis celeritatem, hujusmodi potionem ordinabis.

℞. *Florum violarum, borraginis ana ℥ ʒ .ss.*
prunorum damascenorum n. xx.

fiat decoctio: in qua dissolvantur *caste fistule mundæ, & tamarindorū ana ℥ vi.*
rhabbari electi infusi in aqua intybi

℥ j. .ss.

pilorum spicæ, G iij.

miscantur, & fiat potus, dulcorentur cum syrupo violarum ℥ j. vel;

℞. *Castæ fistule mundæ ℥ j.*

diaprunis laxativi ℥ ij. .ss.

dissolvatur in decoctione communi & tamarindorum ℥ .ss.

& fiat potus. Consule etiam caput de tertiana simplici & pura.

¶ Postera die manè clysterem constitues, qua caliditas mitigetur, & materia fervens ex intestinis pellatur, ne longius detenta lædat, excoriationemque efficiat, unde dysenteria eveniat. Ejus hic modus esto.

℞. *Hordei mundi p. iij.*

foliorum violarum, & betæ ana man. j.
bulliant cum capite hædi, vel cum cruribus, & clunibus pulli; & in ejus decoctionis ℥ xij.

dissolvantur vitelli ovorum trium, olei violarum ℥ ij. fiat

fiat enæma. Ordinabis etiam syrupos dig-
gestivos, de quibus accipiet singulis die-
bus manè. ut;

℞. Syrupi violarum, acetositis citri, vel
nenufaris ana ℥j.
cum aquis.

Caliditate autem intensiore existente;

℞. Syrupi papaveris ℥j.
Syrupi intybi & acetositis citri ana ℥ss.
misc. Item etiam aque cucurbitæ, lactu-
cæ, buglossi, vel aque nenufaris, &
cichorei.

Et poteris facere syrupum magistralem.

℞. Caput papaveris, capillorum veneris vi-
ridium, intybi, lactucæ, scariole, por-
tulacæ, rostri porcini, florum viola-
rum, & nenufaris ana ℥j.

quatuor seminum frigidorum ana ℥ij.

fiat decoctio: & singulis sesquilibris
adde zuchari lib. j. ℞.

& in clarificatione addatur aque intybi,
& succi malorum granatorum acetoso-
rum ana lib. ℞.

& fiat syrupus: ex quo singulis diebus
mane bibat ℥ij. cum tribus unciis aqua-
rum prædictarum; & vesperi etiam tan-
tundem. Interim tamen enæmata singu-
lis diebus accipienda non intermittantur,
ut lenis alyus semper conservetur; nisi
tamen: ipsa sponte sua satisfaciat. Quo-
niam verò vehemens sitis, hujus febris
furi-

furibundo ardore efficitur, aquã ex hordeo mudo decoquere oportuerit, & condita parare: quã quamvis multa fatis in capite de tertiana simplici, tamen alia cordialia frigidiora describi possunt, quã idonea magis ad hanc rem sint, quod major siccitas & calor in hoc morbo sit. ut;

R̄. Margaritarum perforatarum, & non perforatarum, hyacinthorum, sapphirorum, smaragdorum ana ℥ ℥.

seminis melonum, cucurbitæ, cucumeris & citruli mundatorum ana ℥ j. ℥.

trochiscorum de rosis ℥ j.

confectionis hyacinthorum ℥ ℥.

ossis de corde cervi num. iij.

auri & argenij ana panes iij.

zuchari candi violati ℥ j. ℥.

conservæ nenusaris, violarum & buglossi ana ℥ j.

zuchari tabarzet ℥ iij.

miscæ, & fiat conditum inauratum. Utiliter etiam & ad hunc morbum epithemata cordis regioni imponenda parantur, qualia in cap. de tertianæ curatione descripsimus; & alia etiam hujusmodi.

R̄. Serici crudi minutim concisi, ossis de corde cervi ana ℥ j.

spodij. ℥ ℥.

croci ℥ ℥.

camphoræ G. vj.

fragmentorum lapidum pretiosorum ℥ j. ℥.

san
aq
vin
misc
panni
natur
H
cinnè
R̄. A
aqu
acc
san
spo
cas
misc
Eider
mede
R̄. S
un
misc
Rene
R̄. O
suc
spo
cere a
tum.
ungu
aqua
niture
rerun
ris ad

santalorum & coralli rubei ana ℥ j.

aque rosarum lib. i.

vini albi odorati, & aceti albi ana ℥ ℥ ss.

misce, & fiat epithema, in qua granæ pannus madefactus cordis regioni imponatur.

¶ Hepatis quoque epithema non inconcinnè adhibetur. ut;

℞. Aquæ intybi & cucurbitæ ana ℥ iiij.

aque lactucæ, & rosarum ana ℥ ij. ℞.

aceti ℥ j.

santalorum omnium ℥ j.

spodij ℥ ss.

camphoræ C. vj.

misce, & impone hepatis ut epithema. Eidem etiam hujusmodi unguento rectè medeberis.

℞. Spodij, santalorum rubeorū ana ℥ j. ℞.

unguenti rosati santalati ℥ j. ℞.

misce, & fiat unguentum pro hepate.

Renes etiam sic inungito.

℞. Olei rosarum Arnaldi: olei violarum,

succi lactucæ ana ℥ ss.

spodij ℥ j.

cera albæ quantum sufficiat, & fiat unguentum. Non incommodè quoque hujus unguenti loco pannus ex lino, aceto, & aqua rosarum & rosaceo intinctus imponitur. Conferet etiam agrotis frigidarū rerum olfactio, qua calidi & sicci vaporis ad cerebrum ascensus reprimatur. ut;

℞. A-

℞. *Aque florum nenufaris* ℥ iij.

aque rosarum ℥ j. ℞.

santalorum citrinorum ℥ j. ℞.

santalorum rubeorum ℥ j.

miscantur omnia in vasculo: quæ sæpe agitans ægrotus olfaciat. vel huiusmodi confectum pomum olfaciendum præbeto.

℞. *Santalorum rubeorum*, *coralli rubei*, *florum nenufaris*, & *violarum ana* ℥ ij.

balaustiorum ℥ j.

camphoræ ℥ ℞.

pulverizentur subtiliter, & cum aqua rosarum, & exigua aceti portione fiat pomum perforatum, & suspendatur ad collum, quod semper fricando olfaciat. Frontale etiam ad vapores prohibendos imponere conducet.

℞. *Aque rosarum* ℥ iij.

florum nenufaris & *violarum ana* ℥ j. ℞.

aceti ℥ j.

santalorum rubeorum ℥ ij.

boli armenici ℥ j.

misceto, atque linum intingito quod fronti & temporibus imponatur. Quod si immodica vigilia adsit, vel soporiferis remediis is capite de tertiana simplici descriptis, vel aliis huiusmodi utere.

℞. *Pulveris papaveris albi* ℥ iij.

quem oui albo, & aqua rosarum distemperabis: adde aceti aliquantulum, & olei etiam

CURAND. RATIONE. 259

etiam papaverum, vel nenusaris, atque epithematis modo fronti imposito.

¶ Jam verò cum nimia caliditate corpus nimium resolyi deprehenderis, hujusmodi unguento pectus & nucam inungito. ut;

℞. Olei violarum ℥j. ℞.
olei nenusaris, & pinguedinis gallinæ ana ℥j.

fiat unguentum cum cera, & pauca aqua plantaginis lavetur, & ungatur pectus & nuca.

His diligenter perfectis, materiam ipsam hoc modo eradicare curabis, vel eradicativas potiones primum ordinabis, quas in capite de tertiana descripsimus, vel hujusmodi aliàs.

℞. Diaprunis solutivi ℥.iiij.
dissolvantur in aqua decoctionis tamarindorum ℥j.

& fiat potus: dulcoretur cum syrupo violarum ℥j.

& aromatizetur cum pulveribus diamargaritonis frigidi ℥j.

materia autem eradicata, urinæ provocativis uteris cum evulsione seminum frigidorum, & syrupo capillorum veneris, & electuario diatrium santalorum, & trochiscis de camphora, & de rosis: & si huic supervenerit fluxus ventris, ut nonnunquam accidere Avicennas ait, ap-

sape
nodi
præ-

fi-

ros-
num
um,
ntale
nere

j. ℞.

quod
quod
feris
i de-

stem-
olei
etiam

applicabis trochiscos de spodio ex eiusdem descriptione.

℞. Trochiscorum de spodio, seminis acetosæ
ana ℥ j. ꝑ.
aque cucurbitæ ℥ vi.

miscæ, & singulis diebus manè accipiat ægrotus ℥ j. cum ℥ iij. aquarum prædictarum: & ad resumptionem caliditatis hepatis procede sicut in tertiana simplici cum unctioibus & epithematis.

¶ In pituitoso causone, curatio instituitur evacuando in principiis, & concoquendo iisdem, de quibus antè diximus, medicamentis, cum de tertiana notha ageremus; & eodem etiam apozemate; quandoquidem eadem materia est. Atque hæc febrium ex bili pura simplici, vel composita, curandi ratio est.

DE FEBRIUM QUÆ ex sanguine fiunt curatione.

CAP. V.

Sanguineæ febris synochæ dictæ signa hæc sunt Febris assidua, & inseparabilis rubedo in facie, venarum, arteriarum, atque temporum inflatio, & lassitudo corporis totius cum somnolentia, atque respirationis difficultate. Præterea urina rubra, & crassa, pulsus plenus & undosus.

Prin-

Principio igitur huiusmodi enæma parari iubeto.

℞. Foliorum malvarum, & violarum ana m. j.

fiat decoctio: de qua accipe lib j. & ℥ j.
in qua dissolvatur castæ fistulæ mundæ ℥ j.
olei violarum ℥ j. ℞.

salis ℥ ij.

fiat enæma. Si tamen ægrotus enæma pati nolit, & morbus inducias dat, huiusmodi potionem exhibeto. ut;

℞. Capillorum veneris, florum buglossi, borraginis & violarum ana m. ℞.

prunorum damascenorum num. viij.

tamarindorum ℥ j. ℞.

fiat decoctio: de qua accipiat ℥ iiij.

in quibus dissolve castæ fistulæ mundæ, & Syrupi violarum ana ℥ j.

vel illud Avicennæ exhibebis:

℞. Syrupi violarum ℥ j.

succi granati dulcis ℥ j. ℞.

aquæ intybi, zuchari ℥ ij.

misce, & fiat potus.

Hoc accepto, nisi repletio nauseatica adsit, vena communi incisa sanguinem usque ad animi etiam (si opus fuerit) deliquium mittito: plerumque autem potior est numeri multiplicatio, quam quantitatis.

Persæpe autem accidere solet, ut in plethorico corpore venæ difficillimè inveniri

niri possint, atque ex consequenti, neque sanguinis missio fieri. Huic verò sanguisugæ applicandæ sunt in coxis, tibus, & spatulis: si verò sanguisugis commodè uti nequeas, ventosæ in coxis, & scapulis cum scarificatione apponantur, aut hæmorrhoidæ, aut menstrua, aut sanguis ex naribus provocentur.

Post sanguinis autem missionem, cum nondum plenè febris abierit, syropos quosdam malæ complexionis correctivos, & concoctivos exhibebis.

Rx. Oxyfacchari scilicet, & Syrupi intybi ana ℥j.

aquarum intybi & cichorei ana ℥j. S. vel Syropos violarum, nenufaris, & acetostatis citri, vel papaveris, prout major vel minor refrigerandi necessitas postulaverit. Neque tamen interim enæmata prætermittenda sunt, dum Syrupi concoctivi sumuntur.

Quoniam verò febris hæc somnum inducit, descriptis à nobis pedum lotionibus, crurum frictionibus fortibus ad divertendum uti oportuerit: nec non & faciem lavare, atque sæpius etiam aquam inspergere rosarum aceto commixtam, aut rosarum solam. Laboranti etiam nimia siti ægroto conditum dabis, quale in tertianæ simplicis curatione descripsimus,

simu
dam
nimi
tus h
cond
Rx. C
nis
qu

sa
m
au
zucha
ana
inau
cordi
tiam
ne. S
urina
oster
systo
cium
conv
ne ut

simus, & cum eo aquam hordei bibendam, vel aquam frigidam copiosè, si nimia adsit caliditas; neque aliunde potus hic impediatur. Utile autem & hoc conditum ad eam rem fuerit.

Rx. Conservæ rosarum, buglossi, & borraginis, & violarum ana ℥j.

quatuor seminum frigidorum mundatorum omnium ana ℥j. ℞.

santalorum rubeorum ℥j. ℞.

margaritarum ℥j.

auri & argenti ana p. iiii.

zuchari tabarzet, & zuchari candidi violati ana quantum sufficit, & fiat conditum inauratum. Epithema etiam hepatis & cordi utiliter imponitur, & renibus etiam, ut dictum est in capite de Causone. Si tamen perseverat adhuc febris, & utina rubea ac crassa, & quasi perturbata ostenditur, ad lividitatem vergens; & systole præterea impulsu augetur, indicium est synocham febrim in synochum converti, quamobrem synochi curatione utendum est.

ne-
verò
xis,
ugis
co-
ppo-
nen-
ovo-
cum
upos
cesti-
ntybi
℞.
retosf-
or vel
ilave-
i præ-
onco-
num
lotio-
ous ad
on &
quam
itam,
im ni-
quale
scrip-
imus,

DE CURATIONE

febris sanguineæ ex sanguine putrefacto, quæ Synochus dicitur.

CAP. VI.

Accidentia omnia quæ in febris synocha observata sunt, vehementiora tamen, cum urinæ lividitate, rubedine, & crassitie, angustiaque nimia, respirationisque major frequentia, ex nimio caumate in spiritualibus membris: caliditas præterea & mordicatio, ut in synocha, ob materiæ purreddinem synochum hæc omnia indicant.

Igitur enæmate in primis applicato, sanguis ex communi vena pro virtutis & necessitatis ratione mittendus est: tantum autem sanguinis, quantum in synocha extrahi oportuerit, ne bilis ipsius frenum auferatur. At verò venæ sectionem ob debilitatem sui recusanti ægroto potus phlebotomiæ loco exhibetur, qualem Avicennas in capite de curatione hujus febris præcepit. Vena jam secta, reliqui sanguinis corruptionem cavere operæpretium est: id commodè fiet syrupis concoctivis. ut;

℞. Syrupi intybi & violarum ana ℥j.
 aquarum cichorei, & intybi, & buglossi
 ana ℥j. de

de quibus accipiat ægrotus singulis diebus manè & vesperi. vel magistrale hujusmodi.

℞. *Imybi, scariola, cichorei ana m. ij.*

quatuor seminum frigidorum ana ℥ j.

santalorum rubeorum ℥ ss.

cum zucchero; fiat syrupus: accipianturque ex eo singulis diebus manè ℥ ij. cum aqua cichorei. Ad accidentia verò, quæ ex hac febre fiunt curanda, ut capitis vehementem dolorem, nimiam sitim, linguæ nigredinem, caufonides, & tertianæ simplicis curationem à nobis descriptam consulito, vel hujusmodi ad eam rem Juleb constituito.

℞. *Syrupi acetositis citri, syrupi acetosæ, aquæ nenusaris, succi granatorum muzzorum, aquæ cucurbitæ, & nenusaris ana ℥ iiij.*

fiat juleb: & aromatizetur cum ℥ j.

santalorum rubeorum, camphoræ ℥ iiij.

& immittatur in vase; ex quo ægrotus bibat. Confert etiam sacculus plenus semine citoniorum & psyllij: conferunt pilulæ sub lingua contentæ hujusmodi.

℞. *Succi uræ acerbæ, succi acetosæ, succi lactucæ, & violarum; succi granatorum, aceti albi ana ℥ j.*

coquantur lento igni, & addatur zuchari. candidi & albi ana quantum sufficiat; & fiant pilulæ, quæ teneantur sub lingua

M

qua

gua ad refrigerandum, & sitim removen-
dam. Alia etiam remedia ex capite de
simplici tertiana petere licebit. utile
tiam erit huiusmodi restaurativum.

℞. Santalorum alborum, & rubeorum, &
quatuor seminum frigidorum majorum &
minorum ana ℥ ij.

succi liquiritiæ ℥ ij. ℞.

gummi draganti, gummi Arabici, &
aginidi ana ℥ j.

camphoræ G. xij.

conservæ nenusaris ℥ j. ℞.

zuchari albi quantum sufficiat. misce, fiat
conditum auro coopertum. Ad curan-
das etiam anxietates, epithemata, con-
fectiones cordiales, aliaque remedia ex
nostra tertianæ simplicis curatione tibi
petenda sunt: aut huiusmodi cerotum
regioni cordis imposito.

℞. Pulveris electuarij diamargaritonis frigi-
di, confectionis alchermes ana ℥ j.

santalorum rubeorum, seminis citri man-
dati, corallorum rubeorum, florum
violarum, buglossæ, & nenusaris
ana ℥ ij.

croci ℥ ℞.

nonnihil terebinthinæ & cere: malaxenter
cum aqua rosarum, & vino albo: fiat cero-
tum extensum super pannum granæ, &
regioni cordis imponatur. Materiam
jam concoctam, si evacuari oportere
judi-

judicaveris, evacuato. Quoniam verò sanguis ex eo putrefit, quod ex bilis materia est, ob eam rem cum sanguinis mundificativis, bilis evacuativa miscenda sunt. ut:

℞. Rhabarbari electi infusi in aqua lactis caprarum ℥ j.

pilorum spicæ G. iiii.

diaprunis simplicis, & diacatholiconis ana ℥ v.

confectionis bamech ℥ ij.

dissolvatur in aqua lupulorum, & buglossæ, quantum sufficiat; & fiat potus, addendo syrapi violarum ℥ j. commodè etiam purgabis casia, & electuario de succo rosarum in potabili forma, vel in forma boli, hoc medicamento.

℞. Confectionis bamech ℥ ℞.

electuarij de succo rosarum ℥ ij.

incorporentur cum casia fistula extracta per setaceum; & fiant boli confecti cum zucchero, & desuper deaurentur.

Cùm sanguis ob suam adustionem putrefactus est, & subtilior fit, & concoctio est æquatæ substantiæ, licebit & hoc syrupo magistrali concoquere. ut:

℞. Iujubarum num. C.

que coquantur in 5. lib. aque, usque ad consumptionem tertie partis: quibus adde zuchari ℥ viij.

& fiat syrupus. vel sic:

M 2

℞. Car-

℞. Carnis pyri ℥ j.

jujubarum num. xx.

granatorum musci ℥ j.

fiat decoctio in lib. ij. aquæ, usque ad
consumptionem tertiæ partis, & cum
zucharo fiat syrupus.

Præterea si sanguis post venæ jam in-
cisionem remanens, crassus esse judice-
tur; id quod urina crassa, & somnolen-
tia, deinde nimius corporis pruritus, &
lassitudo arguit, concoctivis & attenuan-
tibus uti oportuerit. ut;

℞. Syrupi acetosi scilicet, oxymellis. s.
ana ℥ iij.

aquarum capillorum veneris, & intybi
ana ℥ iij.

vel magistrale hoc :

℞. Aquæ cichorei, capillorum veneris, &
intybi ana ℥ iij.

aceti ℥ j.

zuchari ℥ iij.

fiat syrupus aromatizatus cum pauco cin-
namomo.

Sanguinem verò ab humore phleg-
matico corruptum; medicamentis utri-
que parti idoneis juvabis. Idem efficies
commodis etiam remediis, cum sanguis
à bili & melancholia vitiatus fuerit.

Purgata autem materia, residuum ca-
liditatis. epithematis hepatis, renibus,
& cordi accommodatis, curatur; &
electua-

CURAN RATIONE. 269

electuariis ac confectioibus, ac juleb
interius exhibitis: de quibus in capite
de cura tertianæ simplicis, & caufonis
egimus. Atque ita sanguineæ febris cu-
ratio expeditur.

DE CURATIONE
Febris phlegmaticæ.

CAP. VI.

CAlor & color ad albedinem ten-
dens, rigor, ac frigus lentum, sine
horripilatione, cum oris insipiditate,
aut acredine exigua, vel nulla fitis, uri-
na alba, neque crassa nimis, pulsus de-
bilis parvus, rarus, & mollis cum diver-
sitate, verum non multa, ob materiæ
lenitatem, febrem quotidianam à pitui-
ta dulci, insipida, vel acri provenien-
tem indicant. Adjuvant præterea oppor-
tunitates temporis, ut hyems: accessio-
nis horæ, ut nox: ætatis, ut senectus:
complexio, ut pituitosa; aut febricitan-
di consuetudo, quia is plerumque phleg-
matica febre laborare solet. Curatio au-
tem sic instituitur. Clyster in primis, si
res id postulet, applicatur; & potio ali-
qua, si ægrotus libenter accipiat.

Quoniã rigor vehemens nimiũ ægro-
tum lædit, initio ipso calefacti panni linei
extremitatibus ipsis frigidis adhibeantur:

M 3

vel

vel si id non satis est, laterem calidū pan-
no involutum pedibus adhibere oportu-
erit. Quòd si parum etiam hoc pro-
fuerit, laterem calidum roremarino stra-
tum, & vino inspersum, rubro panno
lano obvolutum admoveto. Principio
autem accessionis oblata nausea ultrò,
sed non perfecta, propinato vomitivo
communi adjuvatur, quo materiae com-
munes evacuentur, non autem conjun-
ctæ, ne corpus inflammetur. ut;

℞. Aquæ ℥ iiij.

mellis & zuchari ana ℥ j.

miscē tepidum, & applicetur. vel;

℞. Oxymellis scilicet ℥ iiij.

aque decoctionis raphani ℥ iiij.

miscē. namque hic vomitus, & accessio-
nem, & morbum levat. Calore jam in-
cipiente, fricationes in tempore fiant,
ut materia citius attenuetur, calefactaque
expellatur citius. Paroxismo autem tran-
sacto, commodè enæma adhibetur. ut;

℞. Florum camomille, malvæ, bliti ana m j.
sursuris pug. j.

fiat decoctio: ex qua accipe lib. j.

hieræ picræ Galen. ℥ ℥.

casia fistulæ mundæ ℥ j.

salis communis ℥ j.

olei communis ℥ iiij.

fiat enæma. vel potionem sic parato.

℞. Casiæ fistulæ mundæ, & rhodomellis
ana ℥ j. cinna-

CURAN. RATIONE 271

cinnamomi ℞. iij.

aquæ buglossi ℞ iij.

fiat potio.

His expeditis, si urina crassior & rubicunda appareat, sanguinem minuto ex communi vena, si nimia est, plethoria: sin minus, ex basilica, usque ad ℞ vj. Minutione autem facta, si multitudo pituitæ appareat (quod raro accidit) hujusmodi minorativum constituito.

℞. Casiæ fissulæ mundæ, & rhodomellis ana ℞ j.

agarici ℞ j.

salis gemmæ ℞ ℥.

cum aqua feniculi & intybi fiat potus. vel;

℞. Turbith electi ℞ iij.

zingiberis ℞ ℥.

bulliant parum, & colentur cum expressione: qua colatura dissolvatur casiæ fissulæ, & rhodomellis. Hujusmodi minorativorum usus in principio commode adhibetur, nisi multa pituitæ copia appareat: deinde verò syrupi propinantur utiliter ad opportunam concoctionem; quales illi sunt.

℞. Rhodomellis, & syrupi acetosi ana ℞ j.

quibus adde aquarum feniculi, & inty-

bi ℞ j. ℞.

& mista exhibeto. vel;

℞. Oximellis simplicis ℞ i.

syrupi intybi ℞ ℥.

M 4

aqua-

aquarum absinthij, & feniculi ana
℥j. ℞. vel;

℞. *Aquarum feniculi, intybi, & absinthij,*
ana ℥j.

syrupi acetosi, & absinthini syrupi ana ℥j.
 adde *cinnamomi* aliquantulum, & ex-
 hibetur singulis diebus manè ad conco-
 ctionem. Placet autem Avicennæ hujus-
 modi ægrotis sic temperatas potiones
 ex forti & tenui exhibere. id quod ille
 singulis noctibus fieri præcipit; quarum
 potionum illa exempla sunt.

℞. *Turbiti electi ℥j.*

zinziberis ℞. iij.

aque feniculi ℥j. ℞.

fiat potio: exhibeaturque noctu quoad
 materia concocta esse judicetur; cum
 jam virtus per quotidianam, expulsio-
 nem minorativam potentior efficiatur.
 Veruntamen hæc ratio paucis probatur,
 vel ex ejusdem auctoris consilio, qui
 corpus laxativis medicamentis assuefieri
 non vult. deinde quod multi ægroti, ob
 delicatam corporis constitutionem &
 consuetudinem, singulis noctibus hu-
 jusmodi laxativas potiones sumere recu-
 sant. Consultius ergo fuerit harum vice
 enæma quotidianum parare. ut;

℞. *Seminis anisi, florum camomillæ, florum*
violarum ana m. j.
blivi man. ℞.

fiat

fiat decoctio : in cuius lib. I.

solvito olei communis, & rhodomellis

ana ℥ j. ℥.

biere picra Gal. electuarij diacartami

ana ℥ iij.

parabisque enæma. Commodè etiam
magistrale potisma concoctionis causa
paratur, hoc modo.

℞. Eupatorij, absinthij ana m. ij.

radicum feniculi, apij, glycyrrhizæ
ana m. j.

passularum sine nucleis pug. ij.

rosarum rubearum, seminis ameos ana
pug. ij.

Apoze-
ma-

seminis intybi, & feniculi ana ℥ j.

coquito secundum artem in lib. xij. a-
quæ, quoad tertia pars absumpta sit.

Deinde fortiter expressa colato :

cui colaturæ addes mellis despumati lib. I.

& zuchari rubei lib. ℥.

Ex hac potione singulis diebus bis, ma-
nè & vesperi ℥ xij. tepidum exhibeto.

Ubi autem concoctionis signa apparue-
rint, eradicativum medicamentum pa-
rabis. ut;

℞. Electuarij diacartami ℥ ℥.

castre fistule munde, & rhodomellis ana
℥ j.

dissolvantur in aqua feniculi, & intybi
quantum satis sit, & fiat potio. vel;

℞. Agarici ℥ ℥.

M 5

ele-

ana

℥ j.

ex-

co-

electuarij diacartami ℥ iij.

casie fistule munde ℥ j.

dissolvantur in decoctione communi quantum
satis sit, & exhibeto. vel;

℞. Pulveris hieræ picræ Galeni ℥ j.

casie fistule munde, & mellis rosati
ana ℥ j.

cum aqua buglossi fiat potio. vel;

℞. Electuarij diacartami in tabulis ℥ ℞.
vel ℥ vj.

massæ pilularum de agarico ℥ j.

cum aqua feniculi: conficiantur pilulæ
quinquæ. vel;

℞. Massæ pilularum stomacalium ℥ j.

formentur pilulæ quinque. vel;

℞. Polypodij quercini contusi ℥ j.

florum buglossæ, borraginis & anisi ana
℥ ℞.

passularum detractis nucleis ℥ j.

coquantur, & excolentur: & in cola-
tura dissolve myrobalanorum ebulo-
rum ℥ iij.

turbith ℥ j.

zinziberis ℥ viij.

casie fistule munde ℥ j.

& fiat potus.

Quod si post hujus medicamenti u-
sum, neque materia; neque febris om-
nino recesserit, perspiciat medicus an
oppilatio aliqua ægroto etiam sit: quam
hujusmodi remedio curabit.

℞.

R. Olei nardini ℥j.

olei absinthij, & mastichis ana ℥ss.

pulveris mastichis ℥j.

garyophyllorum, ligni aloes, gallæ mu-
scatæ ana ℥j.

coralli rubei corticum citri ana ℥ss.

cere quantum satis sit: fiat unguentum,
quo ventriculi regio ungetur, qua hora
febris remittit.

Materia autem imminuta, si is qui
quotidianam febrem patitur, siti etiam
laboraverit, vel quod ex putrida in ven-
triculo pituita fumi guttur & linguam
infestant, atque exsiccant, hujusmodi
condito juvabitur.

R. Conservæ buglossæ, rosarum, & ameos
ana ℥ss.

corticum citri conditi cum zucchero ℥iij.

pulveris diarhodonis Abbatis ℥j.

electuarij de gemmis ℥ss.

pulveris aromatici rosati ℥j.

cum zucchero fiat conditum auro obdu-
ctum; vel bibat ægrotus cum corticibus
citri zucchero conditi aquam coctam cum
fœniculo & petroselino. Est autem hu-
jusmodi materia lentior sanè, & quæ
difficile evellatur, cui applicato minora-
tivo, interim dum exhauritur, remedio
etiam sunt electuaria in tabellis cum a-
quis certis, vel syrupus aliquis apoze-
matis modo exhibitus, quæ concoquen-

di & confortandi vim habent. ut ;

℞. *Electuarij aromatici rosati descriptione*

Gabrielis ℥ j. ℞.

aquæ absinthij ℥ viij.

vel aquæ absinthij & fœniculi ana ℥ iiij.

syrupi absinthij, & intybi ana ℥ iiij.

azari & bioscyami ana ℥ j.

positum in ligatura, fiatque syrupus apozematus, ex quo per duos, aut tres dies ægrotus sumat. vel si libet, de trochiscis ex absinthio, & eupatorio. Licebit etiam consequentur uti medicamento ex forti & debili mixto per intervalla. ut;

Forte
debile.

℞. *Cassie fssulæ per setaceum cribrum extra-
ctæ* ℥ j.

diacartami ℥ iiij.

agarici ℥ j.

salis gemmæ ℞. v.

myrobalanorum ebulorum ℥ iiij.

rhodomellis ℥ j.

misceto, & fiat confectio opiatae similis: vel, decernes illi ex pilulis jam descriptis quantum conveniat cum materiam abscindere volueris: atque hoc modo sanitas ægroti, Deo volente, parabitur. Quod si quotidiana febris à pituita crassa, mucilaginosa, vitrea, vel cruda efficiatur, victus ratio sive diæta, ad calefactionem & attenuationem inclinabit: eo quod pituita hæc frigidior, crassiorque

que sit. Igitur ubi accedens medicus ægrotum vehementer rigore correptum inveniet (vehemens namque frigus ex causæ vehementia & fortitudine procedit) apponet calidas vestes, & laterem calidum panno laneo cum roremarino, & vino irrorato; extremis corporis partibus admovebit, in quibus frigus maxime apparet: deinde ordine superius præscripto enæma decernet quale jam diximus, vel lenitivum medicamentum, ut docui, vel;

℞. *Hyssopi man. j.*

Callitrici man. ℥.

liquiritiæ, passularum ana ℥. ℥.

fiat decoctio: de qua ℥. iiij.

commodè sunt, ut dissolvatur castæ fistule munde, oxymellis. s. ℥. j. ℥.

quam potionem exhibeto.

Ubi autem sic lenita materia fuerit, si videatur opportuna esse sanguinis missio, quod urina crassa, turbida, atque rubea appareat, secabis venam: deinde concoctionem molietis hoc modo.

℞. *Oxymellis. s. & rhodomellis ana ℥. j.*

aquarum fœniculi & absinthij ana ℥. j. ℥.

misce, & apparentibus signis concoctionis, exhibeto medicamentum aliquod ex iis quæ à nobis descripta jam sunt, quod magis placeat. His verò expeditis,

si ulteriorem concoctionem desiderabis,
ejusmodi syrupo efficies :

R̄. Radicis asparagi, sœniculi, brusci ana ℥ ij.
hyssopi, buglossæ, melissæ ana man. j.
seminis anisi, & sœniculi ana ℥ j.
ameos ℥ ss,
passularum ℥ vj.

fiat decoctio : in qua adde mellis despu-
mati lib. i. & aceti optimi ℥ ij,

fiatque syrupus : de quo sumat singulis
diebus manè ℥ ij. tantundemque vesp̄ri.
deinde persequere curationem eo modo,
quo in quotidiana febr̄i ex pituita dulci,
adhibitis stomacho unguentis vel saccu-
lis. ut;

R̄. Floris majoranæ, camomillæ, melilori
ana ℥ iiij,
rosarum rubearum ℥ ij.
casie lignæ ℥ i.
zinziberis, cinnamomi ana ℥ j.
thuris, massichis ana ℥ ij.

Ex his conquassatis impleto sacculum
pro stomacho. Utere etiam trochiscis
confortantibus stomachum, atque syru-
pis concoctivis, & medicamento forti-
debili, ut antea præcepimus.

At verò si quotidiana febris ex pituita,
melancholico humore per mixta oriatur,
quod ex signis atræ bilis in capite de
quartana à nobis indicandis facillè depre-
hendetur; perspiciendum imprimis fue-
rit,

rit, an atræ bilis permixtæ nimia copia sit: nam hoc modo medicamentis atræ bili curandæ idoneis proportionaliter uti oportuerit. Igitur ægioto hujusmodi affecto, enæma imprimis est subji- ciendum. ut;

℞. *Florum camomille, anisi, marathri ana m. ℥.*

centaureæ m j.

fiat decoctio: in qua dissolvatur casie fistule mundæ ℥ j.

olei communis ℥ iij.

confectionis hieræ picræ Galeni ℥ iij.

fiat enæma. Deinde concoctionem oportunitis syrupis moliri conveniet. ut;

℞. *Syrupi buglossæ ℥ j.*

oximellis ℥ j. ℥.

miscæ, & exhibeto cum aqua fœniculi & buglossæ ana ℥ j. ℥.

his absolutis, minorativum medicamentum prospicies. ut;

℞. *Confectionis diasenæ ℥ vij.*

electuarij diacartami ℥ iij.

dissolvantur in decoctione communi quantum satis sit, & fiat potio, quam exhibeto. Quod si hoc remedio virtus potentior supra residuum materiæ non reddatur, sed concoquentibus etiam medicamentis indigere adhuc visa sit, hoc modo curationem proseguere.

hoc

hoc modo curationem prosequere.

℞. Oxymellis diuretica, & rhodomellis
ana ℥ i.

Syrupi buglossi ℥ ℥.

aquarum absinthij, & feniculi ana ℥ j ℥.
vel illum etiam magistralem. ut;

℞. Scolopendræ man. j.

florum buglossæ, & borraginis, cuscute,
absinthij ana m. j.

radicis asparagi, brusci, & petroselinii
ana ℥ j. ℥.

liquiritiæ, & passularum ana ℥ j.

seminis anisi & feniculi ana ℥ iij.

polypodij, epithymi ana ℥ ℥.

coquantur omnia in lib. iij.

aque, usque ad consumptionem medietatis,
additis deinde mellis lib. j.

zuchari ℥ iij.

aceti ℥ j. ℥.

fiat syrupus aromatizatus cum cinnamomo, & nuce muscata, de quo cum aqua absinthij vel feniculi, & buglossæ, vel petroselinii, vel radicum diureticarum, poteris ægrototo exhibere ad perfectam concoctionem. Uteris verò interea commodis enamatibus ad alvi exonerationem. Quòd si ægrotus propter febris æstum suat, remedio erit conditum sive restaurativum accipere huiusmodi.

℞. Pulveris lætitiæ Galeni ℥ j.

pulveris diarrhædonis Abbatis ℥ ij.

cons-

conservæ buglossæ ℥ j.

conservæ violarum ℥ iij.

zuchari ℥ iiij.

misceto, & fiat conditum auro obdu-
ctum: de quo cum bibere volet, bina
aut terna cochlearia sumat, bibatque a-
quam decoctam cum fœniculo, & cin-
namomi parte modica.

Si verò angoribus & afflictionibus
afficiatur, ei symptomati, hujusmodi
confectione medeberis.

℞. Confectionis de gemmis, letitiæ Galeni,
& confectionis de musto dulci ana ℥ iij.
misce, & cū syrupo jujubæ fiat confectio.

Vel pro pauperibus.

℞. Conservæ buglossæ contusæ ℥ j.
limonate simplicis ℥ iij.
aromatici rosati ℥ ij.

misce, & cum syrupo buglossæ fiat con-
fectio: cujus accipiet æger cochleare u-
num cum aqua buglossæ. Et si vomitus
à natura incompletus fiat, eodem, ut
superius dictum est, modo proceden-
dum, materiæ deinde per syropos, ut de-
cet, præparatæ eradicatio tentanda est
hujusmodi medicamento.

℞. Pulpæ casie fistule ℥ j.

diacartami ℥ iij. ℞.

myrobalanorum Indorum ℥ ij. ℞.

dissolvantur in aqua buglossæ, & fiat
Potus. vel;

℞. Thy-

R. Turpeti ℥ j.

agarici ℥ j.

zinziberis ℥ ℥.

salis gemmæ spicæ ana C. vi.

bulliant parumper in ℥ iiii.

decocti glycyrrhizæ passularum capit. vene-
ris, thymi, epithymi, cuscute, poly-
podii: fiat deinde colatura cum forti

expressione; cui adde casie fistulæ ℥ j.

rhodomellis ℥ j. ℥.

& fiat potus. vel;

R. Specierum hieræ picæ Gal. j ℥. ℥.

casie fistulæ rhodomellis ana ℥ j.

misce, & cum aqua absinthii fiat potio.

Pilulis idem efficies hoc pacto.

R. Pilularum de agarico ℥ ij.

pilularum Indarum ℥ j.

cum aqua stillatiua buglosæ fiant pilulæ
septem. Si verò febris his adhibitis præ-
sidiis non cessat, tunc subsequens confe-
ctio magistralis, julebum, & electua-
rium, quibus summo manè per interval-
la utatur, utiliter præscribi poterunt.

R. Diasenæ. s. ℥ j. ℥.

agarici ℥ ij.

diacartami ℥ j.

trochiscorum de absinthio ℥ ij.

casie fistulæ cum saccharo præparatæ ℥ ℥.
misce, & fiat confectio.

R. Aromatici rosati, specierum lætificantis

Galeni, trochiscorum de absinthio ana ℥ ij.

sac-

sacchari infusi in aqua absinthii quantum
satis est, & fiat electuarium in ta-
bellis.

℞. Aquæ absinthii, Aquæ radice petroselini
ana ℥ iij.

aquæ scolopendrii ℥ vi.

aquæ sumariæ ℥ ij.

sacchari ℥ iiij.

aceti ℥ j. ℞.

miscæ, & fiat julebum: aromatiza nuce
moschata & cinnamomo. Hoc Julebo
cum tabulis triduo uti poterit, quarta die
confectione jam descripta utatur.

Si verò æger lienis obstructione labo-
ret ab humore adusto & melancholico,
hujusmodi illi poteris unguentum ad-
movere.

℞. Olei è capparibus, irini ana ℥ j.

trochiscorum è capparibus ℥ ij.

aceti scillitici ℥ iij.

cere quantum satis est, ac fiat unguentum
reliqua quæ ad hanc curationem atti-
nent, quære in capite de quartana: &
hæc satis sint de curatione febris, quæ à
pituita fit humori melancholico admista.

Si verò quotidiana febris à falsa pitui-
ta oriatur, cui bilis admista sit, quod ex
falsedine in ore cognoscitur, tunc, prout
in tertiana notha dictum est, curationem
aggredere cum clysteribus, & superius
descripta potione, aut;

℞. Ca.

vene-
poly-
forti
e ℥ j.

℞.

otio.

ilulæ
præ-
onfe-
ctua-
rval-
it.

℞.

antis
℞ ij.
fac-

℞. Capillorum ven. m. j.
 lupulorum, florum borraginis, buglossæ,
 cucurbitæ, ana quartam partem m. j.
 passularum glycyrrhizæ ana ℥ iij.
 fiat decoctio in aqua ad ℥ iij.
 in quibus dissolvatur castæ fistulæ, &
 rhodomellis ana ℥ j.

& fiat potio. quod si urina crassa rubea-
 que appareat, quod sanguinis redundan-
 tiam indicat: si æger plethoricus sit,
 communis vena secanda est: si non aded
 humorum plenitudine abundet, basilica
 secabitur, atque syrupi concoquentes
 præparantesque præscribentur, videlicet:

℞. Syrupi acetosi compositi de duabus radi-
 cibus, de endivia ana ℥ j.
 aquarum stillatiuarum endivie feniculi
 ana ℥ j. ℞.

misc: quibus ut decet exhibitis, mate-
 riam hoc medicamento minues.

℞. Diacartami ℥ iij.

rhobarbari ℥ j.

spicæ G. iij.

castæ fistulæ ℥ j.

misc, & cum aqua endivie fiat potio. vel;

℞. Lupulorum cuscute ana m. j.

florum borraginis, buglossæ, capillorum
 veneris ana m. ℞.

passularum glycyrrhizæ ana ℥ iij.

decoquantur in aqua. vel;

℞. Colaturæ ana ℥ iij.

CURAN. RATIONE. 285

in quibus dissolvantur casie fistule ℥vj.

electuarij de succo rosarum ℥iiij.

& fiat potus. vel;

℞. Agarici ℥ij.

salis gemmæ spice ana G. vj.

insundantur in oxymelite scillitico. deinde fiat expressio fortis: cui adde casie fistule ℥j.

zurpeti ℥ij.

zingiberis G. vij.

& cum prædicto decocto fiat potio. quod si æger fuerit delicatior, illi pilularum alephanginarum ℥j. tuto exhibebitur. His nisi febris eradicetur, tunc ad ea quæ valentius concoquant, accedendum.

℞. Syrupi byzantini acetosi s. ana ℥j.

aquarum stillatarum absinthij, fœniculi, endivie ana ℥j.

misc. vel fiat syrupus magistralis hoc pacto.

℞. Scariolæ, endivie, buglossæ, quinque radicum ana m. j.

radic. fœniculi apij ana ℥ij.

florum buglossæ, borraginis violarum ana ℥j.

quatuor sem. communium frigidorum ℥ss.

glycyrrhizæ passularum ana ℥ss.

anisi majoranæ ana ℥ij.

fiat decoctio secundum artem in ℔iiij.

aquæ ad tertias. deinde fiat colatura
cum

cum forti expressione,

& addendo sacchari libram ℥.

& tantundem mellis despumati: fiat syrupus, quo utetur manè & vesperi cum jam dictis aquis. Vtilius parabitur subsequens apozema.

℞. Radicum feniculi, asparagi, apii, cicchorii, endivie, eryngii, optimè contusarum ana m. j. ℥.

passularum mundatarum optimè contusarum p. iij.

glycyrrhizæ rasæ m. j.

bordei mundati & contusi p. ij.

anisi majoranæ, dauci cretici ana m. j.

flo. buglossæ, borraginis violarum ana ℥ ℥.

decoquantur in xij. libris aquæ ad tertias, fiat deinde fortis expressio & colatura.

Cui adde sacchari rubei & mellis communis despumati ana ℞ ℥.

& fiat apozema: de quo singulis diebus summo manè libram unam, & tantundem sub vesperum accipiet. si interim siti torqueretur, utatur subscripto condito.

℞. Specierum diamargariton, specierum diarbodon, ana ℥ j.

conservæ buglossæ, violarum borraginis ana ℥ ℥.

cum saccharo fiat conditum, auri bra-

cteis

CURAN. RATIONE. 287

ſteis tegatur. Si anguſtiis laboret, ſubſcripto electuario roborante utatur.

R̄. Theriacæ citri, conſervæ bugloſſæ contuſæ ana ℥℥.

ſpecierum diamargariton frigidi ℥i.

miſce, & cum ſyrupo bugloſſæ fiat confectionio, qua æger dum anguſtiis premitur, cum aqua bugloſſæ & endiviæ uti poterit. Si verò huic feбри ſtomachi obſturtio conjungatur, unguento ſuperius deſcripto illi occurre, nec obliſcaris clyſteres frequentes injicere, ut materiam continuò lenias. Humoribus jam ſyrupos ſatis præparatis, aliquo ex jam deſcriptis medicamentis purgare tentabis: poſt purgationem hepar & ſtomachum his quæ in capite de tertiana notha deſcripta ſunt, electuariis roborabis, & jam dictis confectionibus uti, prout in declinatione aliarum februm dictum eſt. & hæc ſunt quæ ad febris, quæ ex phlegmate falſo fit, curationem attinent.

Si verò febris à pituita fiat, in qua partes exteriores calidæ ſint, internæ verò frigidæ, epialos appellatur. fit autem propter diverſitatem partium phlegmatis; tenuiores ſiquidem partes putrefactæ calorem accendunt: craſſæ verò, adhuc putredinem non expertæ, in internis partibus corporis manentes eadem refrigerant. hujusmodi febris hæc ratio-

ſyru- cum ſubſc- i, ci- nè con- ntuſa- n. j. n ana- ertias, atara. is com- liebus ntun- terim con- ierum raginis i bra- &eis

ratione curanda est. Primum illud animadvertendum est; quòd hæc febris sit ab humore crasso in internis corporis partibus detento; & quod stomachi habenda ratio est, qui à phlegmate, & crasso potissimum, multum læditur. statim itaque injiciendus est clyster ad communes materias educendas, vel potio hujusmodi exhibenda.

℞. Rhodomellis castæ fistulæ ana ℥ j.
cum aqua fœniculi, fiat potio. qua exhibitata, præscribendi sunt syrups pituitam incidentes.

℞. Oxymelitis. s.

rhodomellis ana ℥ j.
aquarum fœniculi, buglossæ ana ℥ j. ꝑ.
misc. Ut verò stomachum, qui in pituitosis febribus maximè laborat, robores, tali uti poteris.

℞. Rob. vivæ immaturæ ℥ iij.

oxymelitis. s. ℥ iij.
aquarum fœniculi, absinthii ana ℥ iij.
desecetur & aromatizetur modico cinnamomi. Hujus exhibendæ sunt ℥ ij. vel cochlearia septem cum duabus tabellis aromatici rosati ex descriptione Gabrielis. Interim enæmatibus aliquanto acrioribus utendum, videlicet:

℞. Centaurii majoris, chamæmeli, meliloti
ana m. j.

medullæ cartami ℥ vj.

semi-

seminis anethi ℥ vij.

fiat decoctio in aqua, in qua dissolve

bieræ picræ Gal. ℥ j.

olei anethini ℥ iij.

& fiat enæma. vel;

℞. Summitatum sol. caulium rubeorum centaurij minoris, cucurbitæ, pulegij ana m j.

seminis anisi, saniculi ana m. ℞.

agarici ℥ ij.

medullæ cartami ℥ vj.

miscantur, & fiat decoctio ad ℥ j.

in qua dissolve hieræ Galeni ℥ j.

olei anethini ℥ iij.

salis gemmæ ℥ j.

& fiat enæma. Aliud etiam enæma hoc pacto præscribere poteris.

℞. Gallum unum antiquum virgis diu flagellatum, & occisum, quem subscriptis rebus infarcis.

℞. Polypodij, turpeti ana ℥ iij.

stachadis, seminis anethi, meliloti, chamæmeli ana ℥ iij.

cinnamomi ℥ j.

bordei mundi ℥ iij.

his optimè permistis, infarciatur gallus: atque ita infarctus decoquatur in aqua,

quousque caro ab ossibus separatur.

℞. Ius ita paratum, vitellos ovorum tres,

casie fistulæ ℥ j.

miscæ, & fiat enæma. Poteris interim quoniam

N

piam

piam auxilio vomitum illi provocare ex Avicennæ sententia.

℞. Phasolorum ℥ j.

seminis anethi, seminis raphani, calaminthe ana ℥ ℥.

commisceantur in ℥ j.

aquæ ad 3 as. colaturæ addantur oxymelitis. s. ℥ ij.

& tepida exhibeatur. & si intra horam unam non evomuerit, penna oleo intincta gutturi indita vomitum provocabis: cum verò purgatione noxiam materiam purgare tibi visum fuerit, consule caput de febre quotidiana ex phlegmate vitreo & gypseo. vel facias hoc pactò.

℞. Polypodij quercini, folliculorum senæ, seminis anisi, fœniculi ana ℥ iiij.

bulliant in aqua, & fiat colatura: in qua dissolve castæ fistule rhodomellis ana ℥ j.

diacartami ℥ iiij. ℞.

& fiat potio: & stomachi præcipuè curam habeas illum roborando unguentis, emplastris, sacculis, de quibus abundè superius diximus. Si verò his adhibitis præsidiiis febris non cessat, prout in superioribus adnotavimus, ad confectio-nes, syrupos, apozemata, pilulas, & electuaria deveniendum; atque iis, quousque febris omnino recedat, utendum: eadem quæ in hac febre, sunt etiam in

in

in lipyria febre observanda; & materia peccante perspecta, syrupi illam præparantes sunt præscribendi, & jam dicta enãmata injicienda, & purgationes exhibendæ. Similiter si febris sit septimana, aut sextana, consideranda materia est, à qua fiunt; & pro varietate peccantis materiæ ejusdemque crassitie & tenuitate syrupi variandi sunt, & variandæ confectiones, & potiones. Si verò fuerit quotidiana continua, phlegmatis, à quo fit, ratio habenda est, crassum ne sit an tenue, & pro illius diversitate varianda sunt præsidia. & hæc sunt quæ ad curationem pertinent febris, quæ à falso, dulci, vitreò, & cujuscunque speciei phlegmate ortum habet.

DE CURATIONE

Febris quartanæ ab humore melancholico.

CAP. VIII.

SI medicus ad ægrum accedens videat illum melancholicæ temperaturæ, coloris plumbei vel cinerei vel fusci, atque ejusdem membra gracilia fuerint & macilenta, qui in cibis, leporibus, & carne bubula, & antiquo casco usus fuerit, & multis leguminibus, & alimentis sanguinem adurentibus, copiosis aro-

matibus, pipere, eruca, sinapi, & similibus, & qui ira & diurna tristitia laboraverit, à quibus corpus admodum exsiccari consuevit, aut in quo præcesserint febres compositæ, aut erraticæ, aut diurna tertiana, in quibus humorum tenuiores partes absumentur, crassiores verò relinquuntur, & febris à principio cum frigore invadat; illa verò progrediente cum rigore frigori conjuncto ex tenuioribus humoris melancholici partibus putrefactis, si paroxysmus horas 24. perduret, & duos intermittat dies, & quarto revertatur, ægrum quartana febrili laborare judicabit: in qua, quemadmodum & in aliis febribus, procedendum est, concoquenda est materia peccans, & purganda, cum sit ex genere putridarum. itaque à communium superfluitatum evacuatione exordiendum; & si alyus adstricta sit, tale injiciendum enæma.

℞. Seminum anisi, feniculi ana pug. j.

foliorum malvarum man. j.

cartami ℥ ss.

bulliant in aqua ad ℥ j.

in qua dissolve mellis communis, & olei

ana ℥ iij.

& fiat enæma. Poterunt communes materiæ tali potione educi.

℞. Castæ fistulæ, rhodomellis ana ℥ j.

dis-

dissolvantur in decocto communi, & fiat potio. consequenter exhibendi sunt syrups concoquentes.

R̄. Oxymeluis. s.

Syrupi è buglossa ana ℥j.

aquarum buglossæ, endivie ana ℥j. S.
quibus ad dies aliquot exhibitis, tali medicamento peccantes humores minues.

R̄. Diasenæ, castæ fistule preparatæ cum saccharo ana ℥. S.

myrobalanorum Indorum ℥ij.

miscæ, & cum decocto communi fiat potio. Hac exhibitâ, si materia peccans adhuc contumax sit, & natura illam superare, & expellere non potest, ad concoquentia & purgantia validiora deveniendum, & symptomatibus, quæ hujusmodi febrem comitari consueverunt, occurrendum: inter hæc potissimum frigus est, à quo æger in paroxismi principio maximè affligitur. in illius itaque principio ea sunt exterius applicanda, quæ superius capite de febrî phlegmatica simplici dicta sunt, lateres. s. roremarino cooperti, & vino rubeo aromatico aspersi manibus & pedibus applicandi, quousque frigus recedat. vel hoc pacto:

R̄. Rosmarini, thymi, ruæ, chamædryos, chamæpityos, gariophyllorum, nepetæ, marrubij, menthe, chamæmeli, foliorum lauri portiones ali-

mi-
bo-
sic-
rinc
liu-
te-
res
pio
gre-
o ex
par-
24-
&
fe-
ad-
len-
bec-
ere
su-
um;
um

olei
na-
dis-

quas. fiat decoctio in vino albo, & aqua communi, in qua fortiter bulliant immixti lateres, & calidi linteis revoluti extremitatibus applicentur. Aut in prædicto decocto madefiat spongia, & expressa dorso admoveatur. hæc enim ratione frigus quàm citissimè removebitur. Quod si hæc non satis sint, tunc uxorem, si juvenis illa sit, aut juvenulam aliam arctè æger amplexetur: est enim remedium optimum. vel illi spinam & dorsum inunge oleis, anethino, rutaceo, chamæmelino, absinthino, & costino: hujusmodi enim sunt, quæ partibus exterioribus applicare consuevimus. Interius verò, & potissimū signis concoctionis apparentibus, talia exhiberi poterunt.

℞. Theriacæ magnæ Gal. ℥j.

aquæ fœniculi ℥j. ℞.

miscæ, & fiat potio exhibenda in principio paroxysmi. aliter:

℞. Succij apij depurati ℥j.

mithridati ℥j. ℞.

miscæ, & fiat potio. aliter:

℞. Succij absinthij ℥j.

castæ lignæ ℥j.

miscæ, & fiat potio. aliud:

℞. Vini in quo decocta sit agrimonie ℥j.

theriacæ Galeni ℥j. ℞.

& fiat potio, hæc potio in paroxysmi principio exhibenda: spina verò & dorsum

CURAN. RATIONE. 295

sum duabus horis ante paroxysmum prædictis oleis inungentur, & stragulis optimè cooperiendus æger ad frigoris incommoda evitanda. Si paroxysmus cum vomitu invadat, utile erit illum provocare, & à debilioribus incipere, & ad validiora transire, ut superius diximus capite de curatione febris phlegmaticæ. poteris enim illi exhibere aquam calidam, cui admisceantur oleum & aqua florum aurantium. Si non satis sit, tunc exhibendum oxymel simplex cum decocto raphani, ut dictum est. Supervenientem sitim subsequenter sedabis: decoquantur in aqua fœniculum & cinnamomum aut petroselinum, de qua bibat cum sequenti condito.

℞. Conservæ violarum buglossæ, borraginis ana ℥ ℥.

specierum frigid. diamargaritôn ℥ ℥.

leuificantis Galeni, & specierum aromatici rosati ana ℥ j.

sacchari q. s. est

misce, & fiat conditum aureis bracteis obductum. Poterit & tale parari julebum, quod aquæ admistum ebibere poterit.

℞. Aquæ buglossæ, scolopendrij, majoranæ, scariolæ ana ℥ iiij.

sacchari quod satis est, & fiat julebum. Si interim concoctionis signa appareant,

M 4

aut

aut sanguinis, & urina crassa sit, turbida & colorata; basilica sinistri brachij, aut salvatella manus sinistrae secari poterit. & validiora concoquentia praescribentur. ut;

℞. Syrupi de epithymo, oxymelitis diuretici ana ℥ ij.

aquarū feniculi, & majoranae ana ℥ j. §
misce, vel;

℞. Syrupi byzantini acetosi simpl. ana ℥ j.

aquarum absinthij, & buglossae ana ℥ ij.
vel paretur syrupus magistralis hoc pacto.

℞. Radicum apij, feniculi, granorum rusci, radicem asparagi, sambuci, fraxini, geniste, tamaricis ana m. j.

commisceantur, & aceto fortissimo temperentur horis 24. deinde adde utriusque cichorij, stæchadis, utriusque calamintb.e, eupatorij ana ℥ j.

scolopendrij m. §.

absinthij, menthae, endivie, scariolae, melissae ana ℥ ij.

quatuor seminum frigid. minorum, spicae celticae ana ℥ j. §.

mellis rosae. ℥ ij.

sacchari ℥ j.

& fiat syrupus, de quo ad humores concoquendos manè & vespere exhibebis cum cicerum rubeorum decocto concoctis humoribus purgatio hoc pacto praescribetur.

℞. Gly-

℞. Glycyrrhizæ rase ana ℥ ℥ ℥.
 polypodij folliculorum senæ ana ℥ iij.
 florum borraginis. stachadis, lupulorum,
 buglossæ ana ℥ ij.
 passularum mundatarum P. s.
 decoquantur in aqua ad ℥ iij. ℥.
 quibus infundantur myrobalanorum Indo-
 rum pulveris Epithymi ana ℥ ij. ℥.
 fiat deinde fortis expressio, & colatu-
 ra, cui addantur diasenæ, castiæ fi-
 stulæ ana ℥ ℥.

& fiat potio. Aliter.

℞. Myrobalanorum Indorum citrinorum
 ana ℥ ij.

infundatur in ℥ ij. ℥. aque lactis ad ho-
 ras 12. deinde calefiat, & fiat fortis
 expressio, cui adde

castiæ fistulæ dissol cum aqua buglossæ ℥ j.

Pulveris epithymi ℥ j.

zingiberis G. vj.

rhodomellis ℥ ℥.

misce, & fiat potio. Utiliter etiam exhi-
 beri poterit ℥ j. pilularum Indarum
 quæ à proprietate humorem melancho-
 licum educunt. Aliter;

℞. Lapidis armeniæ loti ℥ j.

pulveris senæ ℥ j. ℥.

agarici ℥ ℥.

castiæ fistulæ ℥ j.

misce, & cum aqua majoranæ fiat potio.

Aliter in pulveris forma;

N 5

℞.

℞. Pulveris sene, pulveris epithymi ana
 ʒ ʒ.
 lapidis lazuli ʒ j. ʒ.
 zinziberis ʒ ʒ.
 cinnamomi ʒ j.
 salis gemme ʒ. iiij.
 sacchari ʒ x.

misce, & fiat pulvis, cujus dosis est ʒ ʒ
 cum aqua sceniculi, & buglossæ, aut ab-
 sinthij. Si verò humoribus per purgatio-
 nes eductis adhuc febris perseveret, prout
 in aliis dictum est, ad confectioes, sy-
 rupos, apozemata, & electuaria deve-
 niendum. ut;

℞. Syrupi byzantini ʒ viij.
 syrupi de buglossa ʒ iiij.
 aquarum quinque radicum tamaricis, &
 majorane ana ʒ iiij.
 cinnamomi: trochiscorum è capparibus
 ana ʒ j.

his in linteo, ligatis, fiat syrupus in mo-
 dum apozematis. confectio talis sit.

℞. Pulveris epithymi, sene ana ʒ ʒ.
 diasene ʒ j.
 lapidis armeniati ʒ j. ʒ.
 cum syrupo de epithymo: fiat confectio.
 Electuarium hoc pacto paretur.

℞. Specierum rosate novelle, trochiscorum
 de capparibus ana ʒ j. ʒ.
 sacchari infusi in aqua buglossæ q. satis est;
 misce & fiat electuarium in tabellis. Con-
 fectio

fectio alia non aded ventrem solvens.

℞. Trochiscorum de capparibus ℥ iij.

trochiscorum de absinthio ℥ j. ℞.

myrobalanorum Indorum ℥ iij.

conservæ buglossæ, diacori contusi ana

℥ ℞.

cum syrupo buglossæ, fiat confectio. Ali-
ter hac ratione parari poterit.

℞. Confectionis dialacæ ℥ ij.

ponantur in vase vitreo. his perpetuo so-
licitus, ut alvus laxa sit, pro quo tali
enæmate uti poteris.

℞. Malvæ, bliti, florum chamæmeli ana m j.

surfuris p. j.

fiat decoctio, in qua dissolve sacchari

rubei ℥ iij.

benedictæ ℥ j.

olei communis ℥ iij.

mellis ℥ ij.

salis gemmæ G. x.

misce, & fiat enæma. & quia hujus fe-
bris radix in splene sita est, ut plurimum
illi splenis obstructio conjungitur. sunt
itaque spleni præsidia admovenda, &
primo unguento hujusmodi uti poteris.

℞. Olei è tamarice, è capparibus irini ana

℥ ℞.

aceti modicum cera q. s.

fiat unguentum. Vel;

℞. Olei è capparibus irini ana ℥ j.

aceti scillitici ℥ ℞.

trochiscorum è capparibus ℥ ij.
pinguedinis anatine, pingued. galline
ana ℥ iiij.

cere q. s. est,

& fiat unguentum. Utile etiam erit fo-
 mentum, tale.

℞. *Corticum radicum capparum, corticum*
radicis tamaricis, petroselini, mentastri,
seminum rutæ ana ℥ iiij.

salis nitri ℥ ij.

caricas nigras num. x.

florum chamæmeli, meliloti, seminum
anisi, sæniculi ana m. ℥.

commisceantur, & bulliant omnia in
 partibus duabus aquæ, & una aceti acer-
 rimi; & cum spongia foveatur locus af-
 fectus. In eundem usum parabitur em-
 plastrum tale.

℞. *Viriusque emplastri diachylon ana quod*
satis est, pulveris radicum ireos ℥ j.

malaxentur cum oleo capparum, & ta-
maricis: misce & fiat emplastrum, quod
extendatur super alutam ad formam
splenis. Ad idem unguentum.

℞. *Foliorum malvæ bismalvæ. radicum*
lilij ana ℥ j.

farinæ seminis lini ℥ iiij.

caricarum pinguum passularum munda-
tarum ana ℥ iiij.

contundantur omnia simul, & infun-
 dantur in aceto acerrimo per horas octo;
 deinde

CURAN. RATIONE. 301

deinde bulliant in aqua ad spissitudinem usque: deinde adde unguenti dialtheæ, olei amygdalarum dulcium ana ℥j.

cerae quod satis est, & fiat unguentum. Vel;

℞. Ammoniacy bdellij ana ℥j.

insundantur per noctem in aceto, & dissolvantur: & accipe picis navalis, corticum radices ireos, opopanacis, seminum sinapi, foliorum & radices scolopendrij ana ℥℥.

mucilaginis seminum lini ℥vi.

olei de capparibus irini ana ℥j. ℥.

cerae quod satis est, misce; & fiat unguentum Vel. paretur hujusmodi sacculus ad splenis flatus dissolvendos.

℞. Foliorum ruta, mentastri, calaminthe, eupatorij, absinthij, parietariae, scolopendrij, betonicae ana m. ℥.

calescant super calidam tegulam, & aspergantur vino albo, & modico aceti, & fiat sacculus, qui calidus spleni est admoveendus. quod si & in stomacho per splenis consensum flatus generentur, fiat talis sacculus.

℞. Milij, panici, sursuris frumentacei, salis modice triti ana p. j.

misce, & calescant in vase aëneo continè illa movendo. ex his demum calidis factus sacculus stomacho & spleni appli-

candus, discutit enim flatus stomachi & splenis. & quoniam multoties obstructione ablata flatus in stomacho & splene remanere consueverunt, sequenti utaris sacculo.

℞. *Seminum anisi, carui, fœniculi, florum buglossæ ana* ℥ i. ℥.

radicum ireos ℥ iiij.

florum chamæmeli meliloti, stœchadis citrinae & Arabicæ ana ℥ iiij.

corticum citri siccorum ℥ iiij. ℥.

commisceantur, & ex illis fiat sacculus spleni applicandus. Poteris similiter post cibum subscripti pulveris aliquid exhibere ad vim concoctricem roborandam, & flatus discutierendos.

℞. *Cinnamomi* ℥ ℥.

seminum anisi, fœniculi ana ℥ ℥.

glycyrrhizæ ℥ iiij.

flo. buglossæ ℥ j.

zingiberis ℥ j.

fiat pulvis tenuissimus, cui adde sacchari tantundem, atque illo utaris post cibum.

Quia verò ægritudo chronica est, & ægri cum multis medicamentis assumptis non curati medicis fidem adhibere & obtemperare diutius nolunt, tunc æger naturæ relinquendus est, & per intervalla à medicamentis abstinendum, & alia præsidiorum genera tentanda sunt. Verbi gratia, injiciendus illi timor est,

nar-

narrando rumorem esse, illum furtum commisisse maximum, & pro illo ad suspendium quæri, aut aliud simile, ut quod aliquis illum capere quærit, & ad fugam est concitandus. Possset etiam timor illi incuti, si ruina domus illi nunciatur, aut in fluvium divolvatur, ut madescat: multi enim hac ratione curati sunt. Cogimur autem nos, cum alia præsidia non profunt, ad hujusmodi devenire. Locusta collo appensa à proprietate quartanam curare dicitur: quod non ratione, sed experimento tantum est comprobatum. Aliquando fit quartana febris cum mistione sanguinis, tunc admiscenda sunt, quæ sanguinem coquere, & puriorem reddere possunt.

℞. Syrupi de endivia, de buglosa ana ℥j.
 aquarum cichorij, buglossæ ana ℥j. ℞.
 post ebibitos syropos hujusmodi erit adhibenda purgatio.

℞. Diacatholici ℥j.
 diasene ℥iij.

electuarij de succorosarum ℥ij.

dissolvantur in aqua lupulorum, & fiat potio. Si verò humori melancholico cholera admista sit, tunc ijs quæ melancholicum humorem concoquunt, & purgant choleram, concoquentia & purgantia in debita proportione sunt admiscenda. Concoquentibus his uti poteris.

℞. Sy-

℞. Syrupi violacei è buglossa ana ℥j.
 aquarum scolopendrij, lupulorum sumari-
 e ana ℥j.

purgatio poterit per hæc fieri.

℞. Confectionis hamech ℥iij.

castie fistule ℥j.

cum aqua scabiosæ, & buglossæ: fiat potio,
 eadem proportione, ut siti, & alijs sym-
 ptomatibus occurras, procedendum est,
 & præsidia quæ in hoc capite exposita
 sunt, his quæ in capite de curatione ter-
 tianæ simplicis præposuimus, sunt ad-
 miscenda. Si verò humori melancholico
 admistum sit phlegma, talibus conco-
 quentibus uti poteris.

℞. Rhodomellis syrupi de buglossa ana ℥j.
 aquarum buglossæ, & feniculi ana ℥j.

Vel;

℞. Syrupi acetosi simplicis, oxymelitis sim-
 plicis ana ℥j.

aquarum absinthij, scabiosæ, sumari-
 e ana ℥j.

miscæ eadem ratione commisceri pote-
 runt confectiones, opiata, electuaria
 apozemata, utriusque humoris ratione
 habita. Ex his patet, qua ratione quar-
 tana febris curari possit, siue simplex sit,
 siue composita. Pariter curari poterit
 quartana continua: aut enim fient ab
 humore simplici, aut composito: si à
 simplici fiat, his quæ humorem melan-
 cho-

cho
 fun
 bus
 mel
 dus
 eva
 & i
 dar
 & f
 tan
 qua
 tius
 di r
 just
 tur
 æg
 ma
 dia
 me
 Hi
 sce
 us
 opti
 qui
 alij
 cun
 vir
 Est
 cuj
 tur
 die

CURAN. RATIONE. 305

cholicum concoquere & evacuare possunt, insistendum: si verò ab humoribus permittis oriatur, tunc humor qui melancholiæ conjungitur considerandus, & pro illius natura concoquentia & evacuante sunt injungenda, ut docuimus & ita absoluta est curatio febrium putridarum. Et si sint febres aliquæ quintanæ & sextanæ, ut Nicolus dicit, sunt quartanæ quinta vel sexta die repetentes: quare materia quæ morbum facit, potius indicat melancholiam, quia est tardi motus, quamvis fieri potest, ut hujusmodi febres ab alijs humoribus oriatur. Sunt tamen signa consideranda, ut ægrotudines dignoscantur, & pro ratione materiæ peccantis sunt applicanda præsidia. Hæc quidem præsidia sunt, quibus medici prudentes uti consueverunt; illis Hispani medici neque uti, neque ea discernere volunt. Vno præsidij genere sapius usus sum, quod tale est, ut pro illo omnes Deo optimo maximo gratias reddere debeamus, qui talem vim huic medicamento, prout & alijs multis, concesserit. est autem tale, ut cum primum quis illo uti cœperit, statim illius vires, commodum & utilitatem percipiat. Est autem hoc medicamentum salsa parilia; cujus decoctum eo quo dicimus modo paratum, ebibitum quartanas brevi curat. Paucis diebus etiã cujuscunque speciei hydropem sanat,

nat, adeò ut illam magno miraculo Deus creasse videatur, & ejusdem usum nobis ostendat, ad hujusmodi & alias plurimas ægritudines propulsandas, cum tam brevi illas curet; nec insuavis adeò sit, ut quispiam abhorreat. Modus autem in quartanis curandis observandus talis erit. Præmittendæ sunt evacuationes aliquæ, prout hoc eodem capite declaravimus. Evacuatio- ne facta, atque eadem, si oporteat ite- rata, decoctum falsæ pariliæ eo, quem hic tradimus, modo paratum, in pran- dio & cœna loco aquæ, aut vini pro- potu est exhibendum; neque sudores provocandi sunt, aut alia adhibenda diligentia, nisi aliquæ huic febrî aptæ evacuationes factæ fuerint. ab his cura- tionem auspicaberis. Primo quinque diebus summo manè hujusmodi syrupus exhibendus.

℞. Oxymelitis. s.

Syrupi de buglosa ana ℥j.

aquarum buglosæ, endiviæ ana ℥j. ℞.
quibus absolutis, peccantes humores tali medicamentò minuendi.

℞. Diasenæ, electuarij Indi ana ℥℥.

myrobalanorum Indorum ℥ij.

miscæ, & cum decocto communi fiat po- tio: deinde ad ea quæ validius conco- quunt & evacuant, deveniendum, vide- licet;

℞. Ra-

CURAND. RATIONE. 307

R̄. Radicum apij, feniculi, cichorii, eryngij,
 contusarum ana ℥ ij.
 polypodij quercini optimè contusi ℥ iij.
 folliculorum senæ ℥ j.
 scolopendrij, dauci cretici ana m. j.
 thymi, epithymi ana p. j.
 decoquantur in aqua ℥ xij.
 & aceti ℥ j. ꝑ. ad ℥ x.
 fiat deinde colatura cum forti expres-
 sione; cui adde sacchari rubei ℥ viij.
 rhodomellis ℥ iiij.
 mellis communis despumati ℥ v.

miscē, & fiat apozema, è quo æger sin-
 gulis diebus summo manè ebibat xij. ℥
 & totidem vespere. Aliter etiam pote-
 rit parari apozema hoc pacto.

R̄. Florum borraginis P. vj.
 epithymi P. ꝑ.
 polypodij ℥ iiij.
 senæ P. iij.
 myrobalanorum Indorum ℥ ij.
 ligni sancti ℥ j.
 terantur optimè, & decoquantur in ℥ xij.
 aquæ ad quartæ partis consumptionem:
 deinde fiat colatura cum forti
 expressione, cui adde mellis commu-
 nis ℥ j. ꝑ.
 sacchari ℥ iiij.
 conservæ, borraginis, stœchadis ana ℥ ij.
 & fiat apozema. Concoctos humores
 tali medicamento purgabis.

R̄.

Deus
 nobis
 is æ-
 illas
 ab-
 cu-
 ten-
 hoc
 itio-
 ite-
 nem
 ran-
 pro
 ores
 nda
 ptæ
 ura-
 que
 pus

 ꝑ.
 tali

 po-
 co-
 de-

 Ra-

*Rx. Masse pilularum Indarum aggregativa-
rum ana ℥ ℥.*

Dacridii ℥. ij.

miscæ, & fiant pilulæ v. absolutis eva-
cuationibus, salsæ pariliæ decoctum hoc
pacto parabitur.

Rx. Salsæ pariliæ ℥ iiij.

contusæ in mortario, & minutissimè
incisæ, & decoquantur in aquæ ℥
xvj. cum senæ ℥ ℥.

fiat autem decoctio lento igne, quous-
que absumentur libræ iiij.

tunc illi adde epithymi ℥ ℥.

*hermodactylorum electorum & contuso-
rum ℥ ij.*

qui prius cum modico parati decocti
dissolvantur, & parumper insuper bul-
liant; deinde amoveantur ab igne; vas
optimè claudatur, quousque decoctum
frigeat: fiat colatura, qua utatur pro
potu in prandio & cœna, quantum ægro
satis est. Facta prioris decocti colatura,
aqua his quæ supersunt facibus in eo-
dem vase affundenda, & fiat altera deco-
ctio ad consumptionem ℥ j. alterum
hoc decoctum servandum est, ut in illo
quæ secundo coquenda erit salsa parilia
decoqui possit, cum sena epithymo, &
hermodactylis, ut jam diximus. erit au-
tem illi tantum aquæ superaddendum,
ut mensura prius à nobis constituta ℥
ex-

expleatur. Hujusmodi verò decoctum
 ad vigesimum diem usque bibendum
 erit: hoc enim temporis spatio quartana
 curat, & in diebus x. hydropem. Interim
 necesse est, ut recta & accurata
 victus ratione æger utatur, comedat
 carnes boni succi, ut vervecinas, & gal-
 linarum elixas; à jure tamen carniū
 abstineat. Carnibus tantum vescatur &
 modico pane. Hædorum etiam carnes,
 & montanarum avium, his conveniunt:
 in cœna à carnibus abstineat: & passulis
 vel amygdalis cum modico pane vesca-
 tur, & ex parato decocto bibat, ut di-
 ximus. Illud animadvertendum est,
 quòd si quartana matutinis horis invase-
 rit, ut æger cibum, & potum usque in
 vesperum differat, & febris declinatio
 expectanda; si vespere febris invadat,
 tunc sex vel octo horis ante illius princi-
 pium æger cibandus erit.

Medici omnes, qui hucusque de tabe
 scripserunt, curari illam non posse affir-
 mant. quòd autem, aut nullo modo, aut
 difficillimè curari possit, ex eo fieri af-
 firmant, quia tabes fit ex acris & eroden-
 tis humoris in pulmonem defluxu, ex
 quo ulcera in pulmone fiunt: quæ qui-
 dem curari non possunt, quia pulmo
 propter respirationem in perpetuo motu
 est; ulcera vero si sanari debeant, quie-
 tem

tem requirunt. neque quæ hucusquæ scripta sunt præsidia, profuisse visa unquam sunt, neque medicus qui tabem curet, adhuc est inventus, cum multos in pectore & dorso vulneratos curaverim, quibus omnino transfossus fuerat pulmo. qui omnes meis remediis sanati sunt, neque ullus, quod Dei bonitati adscribo, unquam periit. conjectura quadam ductus argumentabar. Si hi, quibus maximâ sunt in pulmone vulnera, & pulmo omnino transfossus est, & propter illius motum perpetuum tam copiosè sanguis effluit, his remediis, Deo iuvante, sanantur omnes: quare & tabidi non sanabuntur, quorum ulcera in pulmone tam parva sunt? cum hæc animo revolverem, atque illos sanari posse judicarem, in uno curationem sum expertus, qui ita convaluit, & sanus evasit, ut nullus unquam melius: & tabidi febre continua laborantes, hoc remedio convalescunt, pingues fiunt, & boni habitus, & bene colorati, ut nihil supersit expetendum. Modus curationis talis est: Primo præcedente humorum præparatione purgandi sunt, & tribus diebus illis exhibendus huiusmodi syrupus.

*R̄. Syrupi rosati, syrupi è capillis veneris
ana $\frac{3}{4}$ j.*

aque

*ag
quar
R̄. l
an
acua
die
pier
est,
om
segu
latu
& p*

CURAN. RATIONE. 311

aque scabiosæ ℥ iij.

quarta die has pilulas devorent.

℞. pilularum aggregativarum de agarico
ana ℥ ℥.

acuuntur & formentur pilulæ v. sequenti
die subscriptum apozema capere inci-
pient, quod die purgationis parandum
est, & coquendum; & in eodem vase
omnia relinquenda sunt usque in diem
sequentem, nam tunc summo manè co-
latura cum forti expressione facienda est,
& præparatio absolvenda.

F I N I S.



quæ
un-
bem
iltos
ave-
erat
nati
itati
tura
hi,
lne-
, &
co-
Deo
e ta-
ra in
ani-
osse
ex-
eva-
bidi
dio
ha-
erfit
est:
ara-
bus
eris
que

Handwritten notes in the upper left corner, possibly including the number '11' and some illegible characters.

Arcan's

26
—————
112

