



PHARMACOPOEIAE
MEDICO-CHYMICÆ,
LIBER II.
DE OFFICINA.

C A P V T I.

De definitione & distributione Officinae.



OFFICINA est pars pharmacologiaz, quæ seriem rerum medicamentaliū secundū clas- ses officinales describit.

N. Subiungimus classibz preparato- rum composita queque famosiora ac cele- briora, utpote que non modo non patiun- tur ad specialiores libros referri, sed & vi- sa sunt regularum illustrationi inseruire.

Classes officinales voco, quæ offi- cinis sunt visuales, sive extempora- neo usui eae destinantur, sive asserua- tioni usiūque futuro. Suntque classes haec tū Natuorum, tū Præparatorum.

Natuia sunt triplicis fortis : vel enim sunt naturæ macrocosmicæ, vel vegetabilis, vel animalis.

E regno macrocosmico sunt minera-

lia vulgè dicta : Terræ, Aquæ, Lapi- des, Metallica seu mercurialia, salia, & sulphura.

Ex familia Vegetabilium sunt: 1. Aro- matica, Cortices, Flores, Folia seu her- bæ, Fructus, Fungi, Ligna & Visca, Radices, Semina. 2. Succi, Olea, Re- finæ, Gummi-resinæ, Gummi.

Ex animalium prosapia sunt: 1. An- nimalia integra ; Partes carnosæ, membranosa, Cornua, Ossa, crusta- cea seu testacea, Lapilli, Lac, Fella, Medullæ, Pinguedines seu axungia, Sanguis, Seuæ, Stercora, Vrina, Vn- gues & Vngulæ, Coagula.

Et hæc singula generatim hoc li- bro describuntur, serie suorum præ- paratorum subiectâ.

Præparata sunt: Aceta, Aquæ, Bal-

94 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

sami, Boli, Calces, Cataplasmata, pides, Liquores (per deliq.) Magisteria, Clysteres, Condita, Confectiones, Masticatoria, Morselli, (Rotulæ) Conservæ, Decocta, Electuaria, Elixyria, Emplastra, (cerota) Emulsiones, Moreti, Olea, Potiones, Pilulæ, Poma ambræ, Præparata, Pulveres (Trageæ) Species, Salia, Spiritus, Succi, Syrupi, Tincturæ, Trochisci, Vnguentæ Gelatinæ, Infusiones, Iulepi, Lanates, (Balsami Vnguentatij, Linimenta.)

C A P. II.

De Terris.

Terræ Officinales sunt solum quas experientia medicamentalibus viribus imprægnatas edocuit. Tales sunt terræ minerales dictæ.

Terra Armena, bolus armena, terra seu orientalis.

Bolus vulgaris, Bohemica, Brundifia, &c.

Terra Lemnia, T. sigillata Turcica.

T. Silesiaca. T. sigillata Silesiaca Lignicensis, Strigenis.

Creta, Germ. Kreid.

Gypsum, Gyps.

Marga, Mergel.

Lithomarga, medulla saxorum, Steinmarck.

Ochra, Ochergeel.

Rubrica fabrilis, Germ. Ræthe, Rætelstein.

Tripolis, Terra Tripolitana.

Vires: *De Viribus terrarum.* quia generali penicillo depingi nequeunt, l. 3. sigillatim agemus.

Præparata communiora sunt. 1.

Præparata in specie sic dicta. 2. Distillatæ aquæ, spiritus, &c. Vide partim infrâ in classib[us] præparatorum, partim lib. 3.

C A P. III.

De Aquis.

Quas officinales tum nativæ, tum artificiales seu præparatas, libro superiore diximus.

In classe nativarum sunt: Aqua fontana, Germ. Springwasser.

putealis, Brunnenwasser.

fluvialis, fließend wasser.

Glacie, Martiæ, Mertzeneiswasser.

Lacustris, Stehend wasser.

Pluvia, nivea, Regen und Schneewasser.

Tonitralis, Donnerregenwasser.

Ros maialis, Meyenthaler.

His adiungi possent aquæ minerales, quales sunt acidulae ac thermæ, verum quia officinæ peregrinæ sunt, eas hîc loci prætermitto.

N. *Vnicum quod hic montam est, quoties aqua simpliciter mentio fit, fontanam intelligi, eamque puram, limpidam, levem. Levitas enim uti spirituum copiosorum*

rum nota est. E.g. in *Vino*, *cerevisia*, &c. ita & in aqua bonitatis indicium non videtur existit.

Præparata visitatoria ex aquis, præ-

ter pluviam destillatam, rarissima sunt, nisi scil. decocta, &c. quæ aquæ ope fiunt hoc referre velis.

C A P . I V .

De Lapidibus.

Lapidis vox tūm inter nativa locum obtinuit, tūm inter præparata. In nativorum numero sunt. 1. Minerale lapides, de quibus hīc. 2. crustacei lapides, quales in capitibus quorundam piscium: de quibus in animalibus. 3. cortices lapidei nucum. 4. acini duriusculi, &c.

Lapides minerales officinales sunt:

1. *Lapides pretiosi*, seu *Gemmæ*.
Amethystus.
Carneolus, Sarda.
Chrysolithus, Germ. *Chrysolith*,
Gold: oder grüneeler Stein.
Granatus orientalis, *Granat*.
Hyacinthus.
Rubinus orientalis.
Sapphyrus.
Smaragdus.
Quibus addi possunt, Margarita.
Corallia.
Lapis Bezoar Orientalis & Occidentalnis.
Ex his quinque καὶ ἔξοχοι pretiosi dicuntur.
Granatus, Hyacinthus, Sapphirus,
Sarda, Smaragdus.

2. *Lapides minus pretiosi*.

[Lapis Aëtites, Aquilæ. G. *Adlerstein*.]

Alabastrum, alabastrites, *Alabaster*.

Amiantus, alumien plumosum, *Federweiss*.

L. Armenus. *Armenierstein*.

L. Calaminatis, *Galmeystein*.

Crystallus, *Chryſtall*.

Hæmatites, *Blutstein*.

L. Iudaicus, *Iudenstein*.

L. Lazuli, *Cyanus*, *cæruleus*, *Lazurstein*.

L. Lyncis, *Lyncurius*, *Belemnites*, *Luchsstein*, *Donnerkeil*.

Magnes, *Magnetstein*.

Marmor, *Marmelstein*.

L. Nephriticus, *Griesstein*.

Osteocollus, *Sabulosus*, *Vellstein*, *Steinbeinwelle*, *Beinbruch*.

Pumex, *Bimbsstein*.

L. Scissilis, *Schiefferstein*.

L. Serpentinus, *Ophites*, *Serpentinstein*.

Silex, *Kieselstein*.

Smiris, *Smirgel*.

L. Specularis, *Selenites*, *Aphrodisius*, *Frazveneiff*.

Spongites, *Spongæ lapis*, *Schrammenstein*.

Talcum, *Talck*.

Huc calculus humanus,

Vires.

96 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Vires : *Lapidosa omnia, teste Galeno l.* (impropriè sic dictum.) 3. Magisterium. 4. Liquor seu oleum. 5. Elixir. 6. Essentiae. 7. Flores. 8. Syrupi. 9. Ingrediuntur quoque alias medicamentorum compositorum formulas. De quibus pleniùs lib. 3. ut & infra in præparatis.

Preparationes pro diuersa sua natura lapidum diuersæ quoque sunt. Unde & diuersa præparata : Videlicet 1. Præparata in specie sic dicta. 2. Sal præparatis.

C A P. V.

De Metallis, & que eis affinia sunt.

Metalla sunt.

A Vrum foliatum finum. Germ. *geschlagen fein Gold, Blattgold.* duplicatum, *halbgeschlagen Gold.*

Vilius, mixtum, bicolor, Zwickelgold. N. *Est aurum alcoholisatum ad scribendum, Mischelgold.*

Argentum foliatum finum, Blatt-silber, geschlagen Silber. duplicatum, *halbgeschlagen Silber.*

Æs, Cuprum, Kupffer. æris squamæ crassiores, *Kupffer-Hammerschlag.*

æris flos. Viride æris, Spangrün. Ferrum, *Eisen.*

Ferri batituræ, squamæ, Hammer-schlag. Limatureæ, *Feilach.*

Scoriæ, Schlacken.

Plumbum, Bley.

vstum, calcinatum, gebrand Bley. Stannum, *Zinn.*

Metallorum præparationes. Vide sis, lib. 3.

Metallis affinia sunt.

Mercurius, Quecksilber.

Cinnabaris, Zinnober.

Antimonium, Spiegelglas.

Huc Excrementa a Metallis segregata.

Bismuthum, VVissmuth.

Cadmia nativa metallica, Cobal-tum, Muckenpulver.

C. Faecitia.

Lithargyros Auri.

Argenti.

Pompholyx, Nihili album, Tutia.

Præparata singulorum dabuntur, lib. 3.

C A P. VI.

De Salibus.

SAlia in Officinis nativa sunt & præparata seu artificialia.

Nativa sunt.

Alumen rupeum, Rochæ, Alauum.

Saccharinum, N. Præparatum est.

Scissile, Spaltalaun.

Sal. ammoniacum, Salmiæ.

commune, gemein Saltz, Speisæ Saltz.

gem

C A P V T VII. & VIII.

97

Gemmeum, <i>Steinsalz.</i>	Cœruleum, <i>cypreum, Cyprisch</i>
Nitri. Sal petræ. <i>Salpeter.</i>	<i>Vitriol.</i>
Vitriolum album <i>Galizenstein,</i>	<i>Viride. Gemin Vitriol.</i>
Angstein, <i>VVeis vitriol.</i>	

C A P . VII.

De Sulphureis.

Sulphur Caballinum <i>Casschvvebel.</i>	Naphtha.
Citrinum, <i>gelber Schwefel.</i>	Petroleum. <i>Steinöhl.</i>
Vivum lebendiger Schwefel.	Sperma ceti. <i>VVollraht.</i>
Ambra, Ambra Grisea, <i>Amber-</i>	Succinum. Carabe. t. Candidum.
rechter Ambar.	<i>Agtstein, Bornstein, VVeis.</i>
Bitumina.	2. Citrinum, <i>gelber Bornstein.</i>
Asphallos, Bitumen Iudaicum.	De singulis his agetur plenius
Iudenpech, Brillenpech.	lib. 3.
Carbo petræ, <i>Steinkolen.</i>	N. <i>Crustacea, E. g. concha, &c. in</i>
Gagates.	<i>animalibus describentur.</i>

C A P . VIII.

De Aromatibus.

Inter vegetabilia primum locum	Cassia lignea, <i>Mutterzimmet.</i>
Imerito sibi vendicant aromata,	Cinnamomum. <i>Canella, Zimmet,</i>
quippe quæ, uti reliquis communio-	<i>Canell.</i>
ra sunt, ita & in præscriptionibus	Costus Arabicus Verus, Cinamo-
(receptis ut vocant) simpliciter præ-	mum album, <i>vveis Zimmet.</i>
scribuntur, non factâ mentione ali-	Crocus Orientalis, <i>Orientalisch</i>
quâ sive ex radicum numero illa sunt,	<i>Saffran.</i>
sive ex fructuum, florum, corticûm-	Austriacus, f. Vngaricus, Oester-
ve. Talia sunt.	reichischer odor <i>Vngarisch Saffran.</i>
Antophylli, <i>Muttermälein.</i>	Cubebæ, <i>Cubeben.</i>
Calamus aromaticus, <i>Calmus,</i>	Folium Indum. <i>Malabathrum.</i>
<i>VVirtzrohr.</i>	<i>Indischblat.</i>
Cardamomum majus, <i>Großcardo-</i>	Galanga maior, <i>großer Galgan.</i>
<i>mälein.</i>	Minor, <i>Galgan.</i>
Minus, <i>Klein Cardomälein.</i>	Grana paradisi, <i>Cardamomum</i>
Caryophylli, <i>Nägeln.</i>	<i>Arabum, Paradiskärner.</i>

N.

Macis, *Muscari-blüet.*

Nuces moschatae, myristicæ. Nuciferae, *Muscarnüsse.*

Piper album, *VVeißpfeffer.*

longum, *langer Pfeffer.*

nigrum, *schwarzter pfeffer.*

Schœnanthum, *Camelshœu.*

Spica Celtica, Romana, saliunca, *Celtisch Spick.*

Zedoaria, *Zitruvan.*

Zingiber finum album belletinum, *Belladin Inguver-gutter vweisser Thron*

Ingvver.

— de buli vel tubei, *geel oder robter Ingvver.*

Vires: Aromata in genere sunt calida & evidenter secca, partium tenuum,

hinc incident, attenuant, aperiunt, &c.
Vide in singulis plenius.

Preparata ex aromatibus fieri possunt formularum variarum. Aptas sc. nata sunt subire infusionem, decoctionem, confectionem, pulverisationem, adeoque immisceri possunt Electuariis, Trochisciis, &c. Potiora tamen & minus vulgaria quæ inde conficiuntur, sunt: Extracta, Aquæ, Olea, Salia, Magisteria.

N.Vis aromatum quia in parte volatili potissimum consistit, prestat inde conficer preparata volatilioris naturæ, ut sunt destillata, &c.

C A P. IX.

De Corticibus.

1. Cortices officinis usitatores sunt.

EFruictibus: cort. Aurantiorum, *Pomerantzschalen oder Rinde.*

Castanearum, *Castanienschälfen.*

Citri, *Citronenschalen.*

Glandium, Cupulæ glandium, *Eichen Hütlein.*

Granatorum, Malicorium, *Granat-Appfel Rinde.*

Iuglandis viridis, *grüne Nusschalen.*

Limonum, *Limonenrinde.*

2. Ex arboribus & radicibus.

Cort. Acaciae, pruni sylvestris, *Schlechedornrinde.*

Radic. Cappar. *Capparrinde.*

Frangulae, alni nigri, *Faulbaumrinden.*

Fraxini (interiores,) *Escherwinde.*

Guajaci, *die Rinde vom Franzosenbaum.*

Laureolæ, *Mezerei, Coccognidij.*

Rad. Lauri, *die Rinde vom Lorbeerbaum.*

Rad. Mandragoræ.

Quercus, *Eichene Rinde.*

Sambuci, ex frutice ac radice (medij,) *Holderrinde.*

Tamarisci, *Tamar-Rinde.*

Thuris.

Tiliae (interiores,) *die Rinde vom Lindenbaum.*

Praparata: Vt cortices substantia differunt, alij nimitem conueniunt cum fructibus, alij cum herbis, quidam

dam cum lignis : ita & diuersis inser- sunt, conditi cortices (fructuum quo-
uiunt præparatis. Communiora tamen rumdam) item Extracta, &c.

C A P . X.

De Floribus.

Flores Officinales sunt.

Flores Acaciæ, pruni sylvestris,
Germ. Schlehdornenblüt.
Amaranti purpurei, Floramor.
Anethi, i. e. coma seu Umbellæ,
Dillenblüt.
Anthos, seu Rosmarini, Rosma-
rienblüt.
Aquilegiae, Agleyblüt.
Basilici, Basilienblumen.
Betonicae, Betonicke.
Borraginis, Borragenbl.
Buglossæ, Ochsenzungbl.
Calcatrippæ, seu consolidæ rega-
lis, Rittersporenbl.
Calendulae, Calthæ, Ringelbl.
Caprifolij, Periclymeni, Speck-
lilien.
Cartami, Cnici, Flor, VValdsaf-
fran.
Centaurij minoris ; Taufengul-
denbl.
Cerasorum, Kirschenbl.
Chamæmeli seu Camomillæ vul-
garis, Camillenbl.
Romanæ, Ræmisch Camillenbl.
Cheiri, gelbe Violen.
Cichorei, VVegvveisbl.
Cyani, f. Baptifeculæ, blauu Korn-
blumen.

Fabarum, Bonenblüt.
Genistæ, Ginster, Pfriemenblüt.
Flor. Granatorum, Balaustia, Gra-
natenbl.
Hepaticæ albæ, nobilis, Leber-
kraublüt.
Hyperici, Iohannisblüt.
Iuglandis, Nussbl. Iuli Iuglandis.
Lavendulæ, Lavendebl.
Ligustri, Hartriegel.
Liliorum alborum, vveiss Lilienbl.
Antheræ liliorum alborum.
Liliorum convallium, Meyerbl.
Malvæ hortensis, VVinter Rosen.
Meliloti, Steinkleeb.
Nymphaeæ albæ, vveiss Seeb.
Luteæ, gelbe Seeb.
Pœoniæ, Peonienbl.
Papaveris erratici, Rhœadis, Klap-
perrosen.
hortensis, Magfamenbl.
Persici, Pferdigbl.
Populi, i.e. gemmæ seu oculi, Pap-
pelknospen.
Primulæ veris, paralyfis.
Rosarum albarum, seu potius pal-
lidarum, vveiss Rosen.
Damascenarum.
Rubeatum.
Salviae, Salvyblüt.

100 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Sambuci, Holderbl.
Saxifragæ albæ, Steinbrechbl.
Scabiosæ, Apostembl.
Schœnanthi, Camelbeuu,
Siliginis, Kornbl.
Spicenardi, Spicanardi.
Stœchados arabicæ, Stechasbl.
Tanaceti, Reinfarnbl.
Tiliaæ, Lindenblut.
Tunicæ, Grasnagelain.
Huffattichblüt.

Verbasci, VVulvrautbl.
Violatum martiarum, Violen.

Ex his famosiores sunt 4. qui peculiari nomine cordiales dicuntur:
Borruginis, buglossæ, rosarum, violarum.

Præparata ferè omnis generis ex pore adimitur.

floribus compilari queunt, Decocta,
Destillata, Electuaria, Infusiones, Vnguenta, Emplastra, &c. minus vulgaria tamen sunt: Succi inspissati, Extracta, Tincturæ, Essentiæ, seu spiritus, ac olea, &c.

N. Flores qui constant ex parte volatili, vix quicquam, vel parum salis exhibebunt, apriorésque sunt ad medicamenta, qua sine diutina exhalatione parata prostant.

Vires. Vires florum eti in genere describi nequeant, cum pro diversitate herbarum variant: attamen hoc loci nosare expedit, recentes esse humidiores, adeoque serè vi lenitivâ, seu laxatiuâ pollere, que marcescentibus cum tem-

C A P. XI.

De Foliis, seu Herbis.

F Oliorum & herbarum nomina in praxi seu receptis s̄epissimè confunduntur, norāntque folia à caulinibus separata. Hæc si minutiora fuerint, summitates dici solent.

Herbe usitatores in officinis sunt:

Abrotanum mas, Stabvvurz.

N. Fæmina cyparissus est

Absynthium ponticum, Ræmisch

V Vermuht.

Vulgare, frusticum, gemein VVer-
muht.

Acetosa, Saurampff.

Acetosella, Alleluja, Buchampffer,
Hasenklee.

Agrimonia, Odermenig.

Alchimilla, Simmnu.

Alkekengi, Halicacabus, Iudenkirschenbleitter.

Alsine, Morsus gallinæ, Hünerdarm.

Althea, Bismalva, Ibiscus, Eibischkraut.

Anagallis, Gauchein.

Anethum, Dill.

Antirrhinum, Hundskopff, Dorant.

Aristolochia longa, lange Öster-
lucy.

Arnica, Muttervvurz.

Artemisia, Beyfuss.

Aſarum,

Asarum, Haselwurz Kraut.	Cynoglossum, Hundszung.
Auricula mutis, Pilosella, Maus- ohrlein.	Cyparisus, hortulana, Gartency- preß.
Balsamita, si symbrium aquaticum, Bachmünze.	Dictamnus creticus, Cretischer Di- cam.
Basilicum, Basilien.	Ebulus, Attich.
Becabunga, Bachbungen.	Endivia sativa, Endivien.
Betonica, Betonien.	Sylvestris, Sonchus.
Borrage, Borretsch.	Epithymus, Thymfelde.
Branca ursina, Beerenklavv.	Equisetum, cauda equina, Rost- schwanz, Schafftienbezz.
Buglossum, Ochenzunge.	Eupatorium Arabum, Ageratum,
Bursa pastoris, Tschelkraut.	Leberkraut.
Calamintha, Kornmünze. montana, Bergmünze.	Euphrasia, Augentrost.
Capillus Veneris, adianthum ni- grum, Frauenvaar.	Farfara, Tuſſilago, Hufſtattich.
Caprifolium, matrisylvæ, pericly- menum, VVeltzvinde Specklilien.	Fœniculum, Fenchelkraut.
Cardiaca, Hertzgeßann.	Filipendula, Saxifraga rubra, rote Steinbrech.
Carduus Benedictus, Cardobene- dictkraut.	Fragaria, Erdbeerkrat.
— Mariæ, Mariendistel.	Fraxini folia, Eschenlaub.
Cerefolium, Kärbelkraut.	Fumaria, Erdrauch.
Ceterach, Asplenium, Mitezkraut.	Galega, ruta capratia, Geisraute.
Chamædrys, Iva moschata, Ga- manderkraut.	Geranium, Herba Ruperti, Storch- schnabel.
Chamæpitys, Iva arthetica, Ni- drigpin.	Gratiola, Erdgalle.
Chamæmelum, Romanum, Ca- momilla, Römisch Camillen.	Hedera arborea, Ephevv, Eppich.
Vulgare, gemein Camillen.	Terrestris, Gundermann.
Chelidonium majus, Schäll- kraut.	Hepatica alba, Gramen Parnassi, vveiss Leberkraut.
Cichorium, VVegvart.	— Aurea nobilis, golden Leberkraut.
Cicuta, VVüterich.	— Fontana, Lichen, Brunnenleber- kraut.
Cochlearia, Löffelkraut.	H. Stellaris, matris sylva, Sternle- berkraut, VValdmeister.
Consolida regalis, Rittersporn.	Herniaria, millegrana, Harnkraut, Bruchkraut.
Cuscuta, Cassutha, Flachsfe- de.	Horminum vulgare, Scarlea, Scharley.

102 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Hyoscyamus albus, <i>vveiss Bilfenzky.</i>	Nicotiana nostras, <i>Toback</i> , Nicotian.
Hypericum, <i>S. Johanniskr.</i>	— Peruviana seu Indica, <i>Indiansch Toback</i> .
Hylsopus, <i>Ysp.</i>	Nummularia, <i>Pfennigkraut</i> , <i>Egelkraut</i> .
Illecebra, fabaria, <i>Donnerkraut</i> .	Nymphaea alba, <i>vveiss Seeblumenkraut</i> .
Lactuca, <i>Lattich</i> .	— Lutea, <i>gelb Seeblumenkraut</i> .
Lauri folia, <i>Lorbeerbletter</i> .	Origanum vulgare, <i>Dosten</i> .
Lentes palustres, <i>VVafferlinsen</i> .	— Creticum, <i>Cretisch Dosten</i> .
Levisticum, <i>Liebstäckel</i> .	Papaveris folia, <i>Monbletter</i> , <i>Magsamen</i> .
Ligustrum, <i>Hartriegel</i> .	Parietaria, <i>Helxine</i> , <i>Tagund.Nacht</i> , <i>S. Peterskraut</i> .
Linaria, <i>vvilder Flachs</i> , <i>Harnkr.</i>	Paris, <i>Einberrkraut</i> .
Lotus urbana, trifolium odoratum, <i>Siebengezeit</i> .	Pastinaca sylvestris, <i>Vogelsnest</i> .
Lupuli Iuli, <i>Hopffenspräflein</i> .	Pentaphyllum, <i>quinquefolium</i> .
Maiorana, <i>Meyran</i> .	Fünffingerkraut.
Malva vulgaris, <i>Hasenpappeln</i> .	Perfoliata, <i>Durchwach</i> .
Marrubium album, <i>Prassium</i> ,	Persicaria, <i>Pulicaria</i> , <i>Fläbkr.</i>
<i>vveisser Andorn</i> .	Persici folia, <i>Pferdingbletter</i> .
Marum.	Petroselinum vulgare, <i>apium hortense</i> , <i>Petersfilien</i> .
Matricaria, <i>Mutterkraut</i> .	Pimpinella Germanica, <i>Teutsch Bibenell</i> , <i>Bockspeterlein</i> .
Melilotus, <i>Steinklee</i> , <i>gelb Steinkee</i> .	P. Italica, <i>Sanguisorba</i> , <i>vvvelsch Pimpinell</i> .
Melissa, <i>Melissenkr.</i>	Plantago major, <i>breit VVegerich</i> .
Menta, <i>Spitzbalsam</i> .	— minor, <i>spitz VVegerich</i> .
— Crispa, <i>Krausbalsam</i> .	Polygonum, <i>Centumnodia</i> , <i>VVegdrift</i> , <i>VVeggrass</i> .
— Saracenica, <i>Fravvenmütz</i> .	Polium Creticum, <i>Cretischer Poley</i> .
Menthastrum, <i>menta equina</i> , <i>Rossmünze</i> , <i>VValdmünze</i> .	Portulaca, <i>Burtzelkraut</i> .
Mercurialis, <i>Bingelkr.</i>	Potentilla, <i>Anserina</i> , <i>Gensemrich</i> .
Mezereum, <i>Seidelbast</i> , <i>Kellershalskraut</i> .	Primula veris, <i>Schlüsselblumenkraut</i> .
Millefolium, <i>Schafgarbe</i> .	
Mororum folia, <i>Maulbeerbletter</i> .	
Morsus Diaboli, <i>Succisa</i> , <i>Abbis</i> .	
Myrti folia, <i>Myrtenblätter</i> .	
Nasturtium aquaticum, <i>Brunnenkress</i> .	
hortense, <i>Gartenkress</i> .	
Nepera, Cattaria, <i>Kaizenkraut</i> , <i>Katzennünze</i> .	

Prū

Prunella, Brännellen.	Serpillum, Quendel.
Pulegium, Policy.	Solanum, solatrum nigrum,
Pulmonaria arborea, muscosa,	Nachtsharten.
Eichlungen-moess.	Tamariscus, Tamariskenbletter.
—veta, maculosa, Lungenkraut.	Tanacetum, Reinfabrn.
Pyrola, VVintergrün.	Taraxacum, Dens Leonis, Pfaffen-
Quercus folia, Eichenlaub blett-	räbrlein.
ter.	Thymus, Thymgen, Thym, Thy-
Rosmarinus, Rosmarin.	mian.
Rubi Cimæ, comæ seu summita-	Tomentilla, Tormentill, Nabel-
tes, Brumbeergipfel.	kr.
Ruta, VVeinranthen.	Valeriana, Phu majus, groß Bal-
Ruta muraria, adianthum album,	drian.
Maurrauten.	— minor, phuminus, Baldrian.
Sabina, Savina, Sevenbaum.	Verbascum, thapsus barbatus,
Salicis folia, VVeydenbletter.	VVulk. Koenigskerz.
Salvia hortensis maior, grosse Sal-	Verbena, Eisenkraut.
bey.	Veronica, Ehrenpreiss.
— minor, cruciata, nobilis, Creutz-	Vinca pervinea, Singrün, In-
salbey.	grün.
— sylvestris, vvilde Salbey.	Violaria, blavv Violkr.
Sambuci cymæ, seu summitates,	Virga aurea, consolida Saracenica.
Holderkeimen.	Heydnisch VVundkraut.
Sanicula, Sanickel.	Vitis folia, VVeinrebenlaub.
Saponaria, Seiffenkry.	Vrtica mortua, taube Neffel.
Satureja, Thymbra sativa, Pfeffer-	— urens, Brennneffel.
kr. Sadaney, Hünerfüll.	Huc muscus arborum.
Saxifragia alba, vveiss Stein-	N. Ex his peculiariter numeran-
brech.	tur.
Scabiosa, Apostemenkr.	5. Herba emollientes: malva, althæa,
Scolopendria, lingua cervina,	violaria, mercurialis, branca ursina:
Hirschzunge.	quibus alij quoque betam, parietaria-
Scordium, Lachenknoblauch.	triam & atriplicem adjiciunt,
Sedum majus, semper-vivum,	5. Herba capillares: capillus vene-
Hauswurz.	ris, ruta muraria, polytrichon au-
— min. Vermicularis, Mazzvr-	reum, trichomanes, ceterach, scolo-
pfeffer.	pendria.
Senæ folia.	Preparata non omnes eadem ex-
Senecio; Creutzveijskr.	hibit, sed pro diversitate substantiæ dive

C A P. XII.

De Fructibus.

Fructus in genere denotat omne quod plantæ ultimè proferunt, adeoque & semina, grana, &c. In specie tamen id nominis sibi reservant, fructus majores, quales pyra, poma, pruna, cerasa & his similia.

Fructus usitatores sunt.

Fructus: Acaciarum, prunorum sylvestrium, i. e. Pruna, Schleben.

Alchermes, Grana tinctorum, grana kermes, Ferberkærner, Scharlachbeer.

Alkekengi, Baccæ Halicacabi, Indenkirschen, Boborellen.

Amygdalæ amaræ, bitter Mandel.

— Dulces, süß Mandel.

Anacardia, Elephanten Lauf.

Avellanæ, Haselnüsse.

Aurantia acida, saure Pomerantz.

— Dulcia, süße Pomerantzen.

Been, grana, Benkærner.

Cappares, Kappern.

Cassia fistula in cannis, Cassien in Rahrlein.

Cerasa acida passa, seu exiccata, gedærre Kirschen.

Citri poma, Citronen Aepffel.

Cocculæ, Kockelkærner.

Colocynthidis poma, Colocynth apffel.

Cidonia poma exiccata, Quitten schnitten.

Cynosbati excinatæ, Hagebotten.

Dactyli, Dattelkorn.

Ebuli baccæ, Attich Beerlein.

Ficus communes, Caricæ Hispanice, Laubfeigen, grosse Korbfeigen.

— Marsilianæ caricæ marfil. Korbfeigen, kleine Marsilienfeigen.

Fraga exiccata, gedærre Erdbeeren.

Gallæ cōmunes, gemeine Gallapfæfel.

— Turcicæ, Türkische Gallapfæfel.

Granata mala, punica mala, Granatapfæfel.

Hederae baccæ, Ephevveeren.

Iuiuba, Zizypha, rohte Brustberrlein.

Juniperi baccæ, VVacholderbeeren.

Lauri baccæ, Lorberbeeren.

Limones, Limonia mala, Limonien.

Mespila sicca, gedærre Mespel.

Myrobalani, belliticæ.

— Chebulæ.

— Citrinæ.

— Emblicæ.

— Indæ, seu nigræ.

— Nux aquatica, Tribuli aquatici, VVaffernüsse.

— Cupressi, Cupressnüsse.

— Indica, Indianische Nüsse.

— Moschata, Muschatsnüs.

— Vomica, Kraenauglein.

— Juglans, VVesche Nüss.

Olivæ, Oliven.

Fructus, Papaveris capita sine semini

C A P V T

seminibus, Germ. *Mag samēn Käppf.*
 Passulae maiores, Ger. *grosse Rosinen.*
 — *Minores*, *Cotinthiacæ*, Germ.
Kleine Rosinen, *Corinthen.*
 Pineæ nuces, Germ. *Pinen.*
 Pistacia, Fistici, Germ. *Pistacien.*
 Prunella, Ger. *VV ein Pfäumlein,*
Prunellen.
 Pruna acida sicca, Ger. *sauere Pfäumen,*
Tz uetschen.
 — *Citrina, gelbe Spilling.*
 — *Hispanica, Spanische Pfäumen.*
 — *Vngarica, G. Vngrische Pfäumen.*
 Rubi Idæi baccæ exiccatæ, Germ.
Himbeeren.
 Sambuci baccæ, G. *Holluenderbeeren,*
 Sebesten, Myxæ, *schunartze Brust-*
beeren.

XII. & XIII.

105

Siliquæ ceratiotorum, Xyloceratio-
 rum, Ger. *Iohannisbrodt.*
 Soiba exiccatæ, Germ. *gedärre Spe-*
yerling.
 Sumach, Rhus, *Gruberkærner.*
 Tamarindi, *sauure Datteln.*
 Vuæ seu baccæ paridis, vuæ lupi-
 næ, *Einbeer, VV olfsbeer.*
 Preparata. Fructus aridiores, soli-
 diores, & minus succulenti nihil pec-
 culiare habent ab herbis, capropter
 & easdem suppeditant præparato-
 rum formulas. Fructuum succulen-
 torum verd partus præcipui sunt:
 Succi inspissati seu Extracta, Succi
 fermentati seu vina, Spiritus s. Quin-
 ta Essentia, Olea & Tartara.

C A P . XIII.

De Fungis.

Fungi Officinales sunt.
Fungus, Agarici, G. *Lercheschuuam.*
 Cynobati, Spongiolæ è Rosis
 luccis, G. *Schlaffkautz, Rosenschuuam.*
 Juniperi, *VVacholderchuuam.*
 Sambuci, Ger. *Holderchuuam.*

Huc Boletus cerui, G. *Hirschbrunst.*
 Preparata. Communem ut natu-
 ram habent cum herbis: ita & com-
 munem aptitudinem, quâ præpara-
 tionem subire possint.

C A P . XIV.

De Lignis & Viscis.

Sunt Officinalis usitatoria.
Lignum Aloës, Xylo-aloës, Agal-
 lochum, Germ. *Paradisholtz.*
 Aspalatus, Ger. *Rhodifer Dorn.*
 Brasilium, Ger. *Brasiliensholtz.*
 Buxi, Ger. *Buchsbaumholtz.*
 Colubrinū, serpentinū, *Gifft holtz.*
 Coryli, Ger. *Haselholtz.*

Cupressi, Ger. *Cypressenholtz.*
 Ebenum, Ger. *Ebenholz.*
 Guaiacum, sanctum. G. *Franzen-*
senholtz.
 Juniperi, *VVacholderholtz.*
 Nephtiticum, Ger. *Griesholtz.*
 Rhodium, Ger. *Rosenholtz.*

O

Santalum album, *vneiß Sandelb.*
 — citrinum, *gelb Sandelb.*
 — rubrum, *robt Sandelholz.*
Sassafras, Fenchelholz, Sassafras.
Suber, Pantoffelholz.
Tamariscus, Tamarii kenholz.
Viscum Corylinum, Haselmistel.
 — Quercinum, *Eichenmistel.*
 — Tiliaceum, *Lindenmistel.*

Preparata. Ligna & visca præter vulgariores medicamentorum formulas, V.g. decoctionem infusionem & inde refulentes alias, quibus potissimum adaperari apta nata sunt; exhibent minus vulgariter Extracta, Aquas, Spiritus, Olea, Salia. His fuliginem adiungere licet cum suis præparatis, de quibus peculiariter, l. 4.

C A P. X V.

De Radicibus.

Radix est pars ima vegetabilium, quasi primæ concoctionis officina. Eapropter cùm concoctio sit nutrimenti fixioris volatilisatio & spirituisatio (πνευματοσις) radixque nutritatur nutrimento minus elaborato, quam partes reliquæ, sequitur substantiam radicum esse naturæ præ reliquis fixioris.

*V*isitatores radices Officinales sunt.
 Radix Ac etosa (excorticata), *Savurampferrwurtz.*
Acori vulgaris, Pseudo-acori, Schwerterwurz.
 — veri, calami aromatici, *Calmus.*
Allij, Knoblauch.
Althæa, bismaluæ, ibisci, Eibischwurzel.
Angelicæ, Angelickwurz.
Anthoræ veræ, Heilgiffi, Giffheilwurz.
Apij (vulgaris,) Eppichwurz.
Ari, Aaronwurzel, Fickerwurz.
Teutsch Ingwurz.

Arisari. Klein Aaronwurz.
Aristolochia longæ, lang vvelsch Osterlucey.
 — veræ rotundæ, *vvelsch rund Osterlucey.*
vulgaris, gemein Lang Osterlucey.
 — fabaceæ, *runde gemeine Osterlucey.*
Armoraciæ, raphani sylvestris, Meerrettig.
Afari, Haselwurz.
Asparagi, Spargenwurz.
Bardane, Perlonatae, grosse Klettenwurz.
Bistortæ, Serpentariae, Natterwurz.
Borraginiæ (excorticata) Borreßwurz.
Brusci, Rusci, Mausdornwurz.
Bryoniae, Stickwurz. Zaunruben.
Buglossæ, Ochsenzungenwurz.
Cardopatiæ Carlinegnigræ, Eberwurz.
Caryophyllata, Benediktwurz.
Centaurei maioris, Rhapontici Offic.

Che

C A P V T

Chelidonj maioris, Schällvv.
 Chinae, Chinevv.
 Cichorei, VVegvvarvv.
 Consolidæ majoris, Symphyti,
 Beinvvilie, VVallvvurz.
 Cucumeris asinini, Eselkärbisvv.
 Curcumæ, Geelsuchtvv.
 Cyclaminis, Arthanitæ, Schwieein-
 brotvv.
 Cynoglossæ, Hundszungenvv.
 Cyperi longi, langer vilder Gal-
 gan.
 — rotundi, rund vñild Galgan,
 Cypervv.
 Dictamni albi, Fraxinellæ, vveisser
 Dipramvv.
 Doronici, Gemsenvv.
 Eboli, Attichvv.
 Ellebori albi, vveiss Niesvv.
 — nigri veti Stiriaci, schwartz
 Niesvvurz, præp.
 — nigri vulgaris, gemein Christ-
 vurz.
 Endiuæ, Endivienvv.
 Enulae Campanæ, Helenij, Alant-
 vurz.
 Eryngii, Mansrevv.
 Esulæ minoris, klein VVolffs-
 milchvv.
 — præparatae.
 Filicis, Farnvv.
 Filipendulæ, Saxifragiæ rubæ,
 robt Steinbrechvv.
 Feniculi, Ferkelvv.
 Gentianæ, Emzianvv.
 Glycyrrhizæ, Liquiritiæ, Süß-
 holz.
 Graminis, Queckengrassv.

X V.

107

Hermodactyli, vveisse Zeitlo-
 sen.
 Hirundinariæ, Vincetoxici,
 Schwalbenvv.
 Hyoscyami (excorticati,) Bil-
 samvv.
 Imperatoriæ, Ostrutij, Mei-
 steruvv.
 Iridis Florentinæ, vvolriegend Viol-
 vurz.
 — Nostratis, Gladioli, Sch-
 wertevvurz.
 Juniperi, VVacholdervv.
 Lapathi acuti, Oxylap. Mengel-
 vurz.
 Leuisticæ, Liebstäckelvv.
 Liliorum alborum, vveiss Lilien-
 zribel.
 Maluæ, Pappelvv.
 Mandragora, Alraunvurzel.
 Mechoacannæ, Mechoacæ albæ,
 vveisse Rhabarbar.
 — nigrae, Gelapæ, Chelapæ,
 Chiolappa, schwartz Rhabarb.
 Meu, Behrvv.
 Mezerei, Laureola, Seidelbast,
 Kellershals.
 Morsus diaboli, Succisa, Abbi-
 vurz.
 Nymphaeæ albæ, Nenupharis, vveiss
 Seeblumenvv.
 — luteæ, gelbe Seeblumenvv.
 Ononis seu restæ bouis, Her-
 bechelvv.
 Pastinacæ sylv. Pastinackev. Vo-
 gelnestvv.
 Pentaphylli, quinquefolij, Fünff-
 fingerkrautvv.

108 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Petasitis, Pestilentzvurz Neunkrafftzvurz.
 Petroselini, Petersfliennu.
 Peucedani, Harfrangau.
 Pœoniaæ, Peonicusvurz fœminæ.
 — Mascuæ.
 Pimpinellæ Germanicæ, Bibenelluz.
 — Italicaæ, sanguisorbz, Blutkrautu.
 vnelich Bibenell.
 Plantaginis, VVegbreituu. VVe-
 gorichvurz.
 Polypodij quercini, Filiculæ, En-
 gelſuß.
 Pyrethri, Bertramvu.
 Rapa, Ruben.
 Raphani domestici, Rettich.
 — Marini, Meerrettich.
 Rhabarbari veri.
 — Monachorum, Münch Rhabar-
 bar.
 Rhapontic veri, Rhapontick.
 Rhodia, Rosenvurz.
 Rubiæ tinctorum, Ferberrætie.
 Rusci, Brusci, Mauffdornvu.
 Sarfæ pariglieæ, Salsaparilla, Sar-
 saparill.
 Saryrij, Ger. Stendelu, Rnaben-
 kyanru.
 Saxifrage semen saxifragiæ, Stein-
 breckvurz.
 Scabiosæ, Apostomuvurz.
 Scillaæ, crudæ & præparat. Meerz-
 zubel.
 Scorzonera, Giffvurz.
 Scrofulatiæ, Scrophulariæ, Braun-
 vurz.
 Sigilli Salomonis, Polygonati,
 VVeissvurz.

Siferis, Secacul, Zuckermobren
 Zuckerzvurz.
 Taraxaci, Pfaffenmahrleinvu.
 Tormentillæ, Tormentillu.
 Turpethi albi, Turbitb.
 Tussilaginis, Farfaræ, Brandlattich,
 Hufblattichvu.
 Valerianæ maioris, Phu magni,
 groſſ Baldrianvu.
 — Minoris, klein Baldrianvu.
 Verbasci, VVollkyanuvurz.
 Verbena, Eisenkrautvurz,
 Vticæ, Nesselvurz.
 N. Ex his vſu crebriori famosiores
 sunt.
 1. Radices aperientes maiores : apij,
 fœniculi, asparagi, petroselini, rusci.
 2. — minores : graminis, rubiz, e-
 ryngij, cappatis, Ononidis.
 Præparata : Quod de herbis diximus & similibus nativis, idem de ra-
 dicibus dicendum : promptuarium
 nimirum radices esse vnde ad omnis
 generis medicamenta, tam interna
 quam externa depromi potest. Hoc
 tamen de radicibus notare expedit,
 partes fixiores præ reliquis in radici-
 bus contineri, aptiores itaque eas
 esse ad exhibenda medicamenta
 parte fixiori celebria, veluti
 sunt : Extracta, Salia,
 Decocta, &c.
 * *

CAP.

C A P . XVI.

De Seminibus.

- S**emen Acetosæ, Ger. Sauvampfer-
men.
Agni casti, viticis, Schaffmullenkærner.
Altheæ, Eibischsamen.
Ammeos verti cretici, Ammeys.
— vulgaris, gemein Ammeys.
Amomi.
Anethi, Dillsamen.
Aniū, Anissamen.
Apij, Eppichsamen.
Aquilegiæ, Agleyssamen.
Alparagi, Spargensamen.
Attriplicis, Mæltensamen.
Aurantiorum, Pomeranzzenkern.
— excorticatum.
Bardanæ, Grosiklettensamen.
Basilici, ozymi, Basiliensamen.
Bombacis, Gossypij, Cotti, Xyli,
Baumwollensamen.
— excorticatum.
Brusci, Ger. Bruskenkærner, Meu-
sedornsamen.
Bursæ pastoris, Teschelkrauts.
Calendularum, Ringelblums.
Cannabis, Hanffämen.
Cardui benedicti, Cardobenedictës.
— Mariae, Mariendistels.
Carthami vel cnici, Feldsaffrans,
Florsamen.
— excorticat. pulpa carthami.
— conquaßatum.
Carui, Carueos, VViesenkümmel.
Feldkümmel.
Cataputriæ maioris, Ricinum,
grotts. Treibkærner.
- minoris, Esulæ vulpinæ, Ger.
Treibspringkærner.
Cerefoli, Kærbelsamen.
Cicera alba, vneiss Kichern,
vneisse Ziefererbßen.
— rubra, rohte Kichern.
Cichorij, VVeggvarts, VVeggvveiss.
Cinzæ, Santonicæ, VVrmf.
Citri, citrei mali, Citronenkern.
— excorticatum
Coccognidij, Klein Kellerhalss.
Colocynthidis, Colouint.
Coriandri, Coriander.
— præparatum.
Cucumeris, Cucumberern.
— excorticatum.
Cucurbitæ, Kürbesamen.
— excortic.
Cydoniorum, Quittenkern.
Cymini, Cumini, Ræmisckkümmel.
Daçtylorum, Ossa daçtylor. Ger.
Dattelkern.
Dauci communis, VVildmæhren.
Vogelnestämen.
— Cretici.
Ebuli, acini ebuli, Attichsamen.
Endiuiaæ, Scariolæ, Endiviens.
Erucæ, rweisser Senff, gelber Senff,
vulgò.
Fabarum, Fabæ, Bonen.
Feniculi, Fenichisaren.
Fenigräci, Bosikkgras.
Fraxini, linguæ aus, Eschbaum.
Fumariæ, Erdrauchsamen.

110 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Genistæ, Pfrimmenſamen.
 Granatorum, Granatkærn.
 Halicacabi, Alkekengi, Inden-
 kirschf.
 Hordei elec̄ti, Gerſten.
 — exortic.
 Hyoscyami albi, Bilsenſ.
 Hyperici, Johannis krautſ.
 Hyſſopi, Eiſopſ.
 Lactucæ, Lattichf.
 Lapatihij acuti, Mengelvurzſ.
 Lentiuñ, Lentes, Linſen.
 Leuisticī, Liebſtockf.
 Limonum, Limonenkern.
 — exorticat.
 Lini, Leinsamen.
 Loti satiuæ, Siebengezeitſ.
 Lupinorum, Lupini, Feygbonen.
 Maioranæ, Majorans.
 Malua, Papelf.
 Melissæ, Meliffenſ.
 Melonum, Melonenkern.
 — exortic.
 Milij, Hirsche.
 — Solis, lithospermon, Meer-
 hirsch.
 Myrti, Myrrenſ.
 Napi, Buniadis, Steckrubenſ.
 Naſturtij (hortensis,) Garten-
 kresſ.
 Nigellæ, Melanthij, Nigellæ Ro-
 manæ, schwartz Kummel, schwartz
 Coriander.
 — præparat.
 Nuclei cerasorum exortic. Kir-
 schenkern.
 — Mespilorum, Nespelk.
 — Morellorum seu perficorum
 armeniacor. Morellenkern.

— Persicorum, Pferdingkærn.
 Orobi; Erua, Eruens.
 Oryzae, Reiß.
 Pœoniæ, Peonienkern, foeminae ac
 masculæ.
 — exortic.
 Papaueris albi, vveisser Magſ.
 — nigri, schwartzter Magſ.
 Pastinaca satiuæ, Pastinacſ.
 — sylvestris, Vogelnestſ.
 Perfoliatæ, Durchwachſ.
 Petroselini Macedonici, Maſſiliens-
 is, Macedonisch Peterlein.
 — vulgaris, apij veti, Peter-
 silienſ.
 Pimpinellæ Germanicæ, Biben-
 nells.
 — Italicae, Sanguisorbae, vvelſch
 Pimpinellſ.
 Pisorum, Pisa, Erbſen.
 Plantaginis, VVegerichſ.
 Porri, Lauchf. Schittlauchf.
 Portulacæ, Buntzelkrautſ.
 Pseudo-melanthij, Kornratelſ.
 Psyllii, Flæhf.
 Raparum, Rubenſ.
 Raphani, Rettichf.
 Rosmarini, Rosmarinf.
 Rusci, Rüſtenkærner.
 Rutæ, VVeinrautens.
 Sambuci, i. e. acimi.
 Satureia, Sadaneif.
 Saxifragæ albæ, vveiss Stein-
 brechf.
 Sesami vulgaris, Flachsdotter.
 Seselios Cretici, Maſſiliensis, Cre-
 tischer Seselſ.
 — vulgaris, Sileris montani,
 Silermontanſ.

Sina

C A P V T XVI.

ii

Sinapis, <i>Senffsamen</i> , rohter <i>Senffs</i> .	Semina 4. calida maiora, anisi, fœniculi, carui, cumini.
Spicæ nostratis, <i>Spicanards</i> .	— minora; ammeos, amomi, apij, dauci.
Staphidis agricæ, <i>Lenskærner</i> .	Semina 4. frigida maiora: Cucu- meris, cucurbitæ, citrulli, melo- num.
Sumach. <i>Vida fructus</i> .	— minora: Endiuiaæ, scariolæ, la- ctucæ, portulacæ.
Thlaspi, <i>Bavrensenffs</i> . <i>VVegkyes</i> .	Preparata ex seminibus, pro re na- ta fuint infusiones, decoctiones, emulsiones, &c.
Thymi, <i>vvcisb Quendels</i> .	N. Ex his sunt nonnulla in praxi fa- mistoria, adeoque peculiariter calida vel frigida dicta. Sic sunt.
Trifolij odorati, <i>Edekkies</i> .	
Violarum martiarum, <i>blaev Viol</i> .	
Vrticæ majoris, <i>Neffs</i> .	
Romanæ, <i>Ræmischnesself</i> .	

N. Ex his sunt nonnulla in praxi fa-
mistoria, adeoque peculiariter calida vel
frigida dicta. Sic sunt.

C A P . XVII.

De Succis.

Sanguini animalium responderet succus nutritius in vegetabilibus. Eapropter ut è sanguinis elaboratione & incorporatione, peritomata diuersa resultant, sterlus scilicet resina, fel, humor vitriolatus seu melancholicus, sudor, axungia, mucilago, lapilli; quinimò & sanguis ipsumem quandoque erumpit: Ita in vegetabilibus analogice correspondent succi diuersorum saporum, olea, resinæ, gummata viscosa & resinosa, tartari, salia, &c. Hactamen diuersitate, quod animalia excretoriis sunt dotata, quibus ferè peritomata excernuntur, vegetabilia verò raro, nisi velis. 1. Quod gaudient poris inseruentibus exhalationi subtiliori. 2. Quod cum floribus tum moschina seu zibettina, i. e.

beneolens prorumpat melligo, tum quoque nonnunquam grauolens quidam succus. Hinc fit ut crassiora intra ipsum vegetabile ferè manent, arteque opus habeant, quâ sequestrantur. Accidit nihilominus in quibusdam quod ex nimia redundantia ipsamet sibi exitum querant, eodemque dato, V. g. incisione, &c.) promptius effluant. Sunt huius generis peritomata. 1. Aquea; succi. 2. Terrestria; Gummi. 3. Sulphurea; Olea, Balsama, Resinæ, Gummiresinæ. 4. Salina, Saccharum, Tararus.

N. Succi qui sponte vel trunci incisione profluvunt; et si plures dari possint, V. g. succus betula, qui in Finlandia & Suecia verno tempore ex vulnerata betula copiosè exhibetur, postmodusque potus

III PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

potius vice à mulierculis etiam nobilioribus habetur, item succus seu lacryma vi-

ris, &c. attamen, nos non nisi officinales hic damus, è quibus inter nativa recen-

fentur;

Succi alterantes.

Vinum.

Acetum.

Succus acaciae.

—Glycyrrhizæ.

—Hypocisthid.

Opium.

Præparations horum. Vide infra de succis, & speciatim lib. 4.

Purgantes.

Manna.

Aloë.

Elaterium.

De his vide itidem lib. 4.

C A P. XVIII.

De Oleis & Balsamis.

Olea, & balsama in Officinis pro-

natiuis habita, sunt:

Oleum oliuarum.

—Omphacinum.

Balsamus de Tolu.

— de Mecha, s. balsamus verus.

— Peruvianus.

Liquidambar.

Styrax liquida.

Vires: Vide singulatim. lib. 4.

C A P. XIX.

De Resinis.

R^Esina, p^{ar}tiv^m lacryma seu liquor est pinguis ac oleaginosus tum sponte ex arboribus profluens, tum interdum accidente vulneratione. Est que duplicitis consistentiæ; liquidiuscula aut duriuscula.

Resina liquidiuscula sunt.

Terebinthina Cypria seu Veneta.

— Vulgaris.

Pix liquida:

Resina duriuscula sunt.

Resina anime. Offic. Gummi anime.

Caranna.

Coopal.

Elemi. Offic. Gum. Elemi.

Lacca.

Pix græca. Colophonia.

Tacamahaca.

Thus,

Vires: Resina omnis calefacit, siccatur, digerit, mollit, tenuit, partium, magis minus, discutit, tussi. ac tabi conuenit, anodynæ est & vulneraria. Usus resinarum tum internus est, tum præcipue externus in vnguentis, Emplastris, &c.

Preparata. 1. Vexamen chymicum resinarum in destillatione præcipue consistit, quam non incongruè rectificationem dixeris, quippe quâ non secus ac in rectificatione oleorum, primum Δ leniori, pars oleosa pri-

C A P V T X I X . X X . & X X I . 113

rior subtilior & clarior elicetur: igne
dein fortiori, pars crassior & colora-
tior, coloris scil. flavi: igne tandem
magis validiori, oleum coloris rubei
propellitur. Hæc si seorsim excipere
libet, triplicis genetis nancisceris
olea, quorum primam quod clarum,
spiritus dici solet; subsequens fla-
vum, olei nomen retinet; ultimum
rubrum, balsamum appellatur. De-
nique quia resinae crassiores sunt sub-
stantiae, relinquunt & crassiores re-
manentiam, cui colophoniæ nomen,

imposuere, à Colophone regione,
vnde olim advehit consuevit. Mo-
dum destillandi vides in oleis.

2. Præter destillationem, subjici-
untur nonnunquam & Extractioni,
quæ tamen potius depuratio quam
Extraction dicenda erit.

3. Fit & lotio resinarum, dum in
væm puram demerguntur & agitan-
tur, cuius rei gratia non abs re erit,
resinas ad ignem fundere, & hinc in
væm conjicere.

C A P . X X .

De Gummi-Resinis.

Gummi-resinas voco, concretas
garborum lacrymas in oleo qui-
dem promptius, attamen & in aqua
(licet difficuler) solubiles. Tales sunt:
Caphura.
Mastiche.

Styrax calamita.

Huc. Myrrha, &

Bdellium.

Vires & preparata quia ferè disre-
pant. Vide lib. 4.

C A P . X X I .

De Gummatis.

Gummi seu gummata sunt con-
creti liquores, aqueis faciles so-
luti, profusi tum è stirpibus ferula-
ceis, tum ex fruticibus, tum ex arbo-
ribus excelsis. Ex his sunt quæ ferula-
cea vulgo dicuntur, à ferulaceis ar-
boribus, vnde stillant. Suntque

Gummi Ammoniacum.

Galbanum.

Euphorbium.

Oppopanax.

Sagapenum.

Sarcocolla.

Vires, calida sunt, emollient, discu-
tiant, tartaream mucilaginem refotunt.
Vsum internum vide Speciatim, lib. 4.

Preparata. 1. Gummi depuratum.
Nimirum quia gummi pleraque he-
terogeneis (arenâ, fabulo, &c.) con-
spurcata afferuntur, expedit illa de-
purare. Hoc fit solvendo in liquore
aqueo, (calido) solutum colando,
exprimendo, & denique lento calore
inspissando.

P

114 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

2. Extractum Viscosum seu vi-felicius oleum, quam ex integro gummi scus, Vide infra in Extractis.

Vires. Conveniunt cum gummatis mucilaginosis, quia non est nisi pars mucilaginosa a parte resinoso segregata.

3. Extractum resinosum, Vide item infra in Extractis.

Vires. Virtutes que integro gummi adscribuntur, latitant pricipue in resina, unde & resina in medicamentis tam internis quam externis, successu feliciori adhibentur. Ex iisdem destillatur quoque

4. Oleum stillatitium. Vide infra in Oleis.

Gummata mucilaginosa sunt: Gummi Arabicum.

Cerasorum. Sandaracha.

Tragacanthum.

Vires. Sunt Emplastica, incrassant, acrimoniā habent, asperitates lenientis.

C A P. XXII.

De Animalibus Officinalibus integris.

A Pes siccæ, Germ. gedærre Bienen.

Bufo exiccatus, gedærre Kräten.

Cantharides siccæ, Spanische Mücken.

Cicadæ siccæ, Heuschrecken.

Lumbrici siccati, gedærre Regenwurm.

Millepedæ siccæ; aselli, Eselchen.

Scinci.

Scarabæi pilares.

Serpens exiccatus.

Huc Mumia.

C A P V T XXIII.

De partibus Carnosis Vstitutionibus.

C Or Galeritæ.

Lupi.

Epar Lupi.

Porci.

Ranatum.

Tauri.

Lien Bovis.

Pulmo Agni.

Suis.

Vrsi.

Vulpis.

Vires: Partes carnosæ, ut & ipsam animalia carnosæ integra sive viva, sive discepta & adhuc calentia ea sint, si extinsecus membro alicui imponuntur, vim habent fomentatiuum, paregoricam, discutientem. Hinc usus maximi in phrenitide, cephalalgia, vigiliis. Applicari nimurum possunt capiti, cervici, plantis pedum. Imposita tumoribus pestentialibus

C A P V T XXIV. XXV. & XXVI. 115

*bis, uti & ictibus animalium venenato-
rum, premissa tamen ventosarum appli-
catione, eliciunt virus: Attritus à calceau-
mentis attractos, ab inflammationibus
timentur. In specie pars qualibet suum si-
mile respicit, Epar epata, Lien Lienes,
&c. Specialiora dabuntur lib. 5.*

*Preparata visitatoria ex partibus
carnosis sunt, Decocta, Extracta, De-
stillata, &c. Vide suis locis.*

C A P . XXIV.

De Partibus Membranosis.

I ntestinā Lupi.	Tauri.
Vulpis.	Secundina cervina.
Testiculi Apti.	Vmbilicus Infantis.
Castoris seu Castorium,	Rete ex animalibus.
Germ. Bibergeil.	De singulis. Vide lib. 5.
Priapus cervi.	

C A P . XXV.

De Cornibus.

C ornu Alcis.	diversa tamen natura animalium, de qua signillatim, lib. 5.
Bovis.	<i>Preparata.</i> 1. Cornu preparatum (in specie sic dictum.) 2. Cornu v- stum, Vide calcinat. c. 43. 3. C. phi- losophicè calcinat. Vide ibid. 4. Ma- gisterium. 5. Galreda, Gelatina. 6. Liquor seu spiritus. 7. Oleum. 8. Sal volatile. 9. Extractum. 10. Quinimò nec decoctionibus infusionibusve vires suas denegant.
Bubali.	
Cervi.	
Hirci.	
Rhinocerotis.	
Tauri.	
Huc Vnicornu.	
Vires. Frigida & sica habentur, di- scutunt, incidunt, viplurimum sudorem movent, atque alexipharmacæ sunt, pro-	

C A P . XXVI.

De Ossibus.

C ranium, humanum (non inhu- matum.)	Dens Apri.
	Elephantis. Ebur.

P 2

116 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Lupi.
Os de Corde cervi.
Ossa Hominis.
Lupi.
Tauri.
Talus Leporis.
Porci.

Vires. Ossa in genere vim habent
exiccandi, discutiendi, adstringendi seu
fluxiones sistendi, ossa, ligamentaque cor-
roborandi. Calcanei combusti, ut scribit

Rhaes, summè pollent aduersus colicos
cruciatus. Specialiora vide l. 5.

Prepar. Ossa ut Cornibus ferè co-
gnata sunt substantia: ita & præpa-
rationibus. Hinc fuit. 1. Os præpa-
ratum (in specie sic dictum.) 2. Gal-
teda seu Gelatina. 3. Magisterium.
4. Liquor seu spiritus acidulus. 5.
Oleum. 6. Sal volatile. 7. Spiritus es-
sentificatus. Vide infra suis locis.

C A P. XXVII.

De Crustaceis seu Testaceis.

Apides cancerorum, seu Oculi can-
cerorum Germ. Krebsaugen.
Carpionis, Karpfenstein.
Percarum.
Trutarum.
Mandibula Lucij.
Conchæ, concharum testæ ob-
longæ.
Entalium.
Dentalium.
Mater perlarum.
Testæ ovorum.
struthionis.

Vires. Crustacea omnia, quia natura
sunt saline & tartarea, medicamenta
suppedant excellentissima ad resolven-
dum tartarum seu calculum, ad strangu-
riam, dysuriam, Isthmiam, difficultates

& suppressiones urinae, ad colicas passio-
nes, ad tartareos morbos pulmonum, &c.
Extrinsicus usus sunt creberrimi in deti-
friciis, precipue si cremata fuerint, hinc &
in rimis cutis solidandis exiccandi, &c.

N. Omnia genera lapidum, qui in ca-
pitibus piscium reperiuntur, trita & cum
vino exhibita, colicum dolorem compe-
scunt, & calculum qui in renibus defixus
iacet, atterunt & committunt. VVec-
ixer. ex Galeno & Avicenna, &c.

Preparata nihil ferè peculiare ha-
bent à preparationibus lapidum mi-
neralium, de quibus lib. 3. Hinc fieri
possunt. 1. Calcinata. Vide c. 4. 2.
præparata (strictè dicta.) 3. Sal (im-
propriè ita dictum.) 4. Magisterium.
5. Liquor seu oleum per deliq.

C A P. XXVIII.

De Lapillis.

Apilli quamvis in animalibus | cavitatibus reperiantur; attamen sunt
plurimis, plurimisque animalium | rati, ac præter lapidem Bezoar (de
quo

C A P V T X X I X .

117

quo lib. 5.) ferè nulli, qui in officinis
prostent. E re foret nihilominus, ob-
insignem vim, quam in calculo resol-
vendo obtinent, in promptu nonnulli-
los habere. Quales sunt:

Lapilli in Ventriculo & Vesica felis tauri.

Calculus humanus, Ludus Para-
celso dictus, &c.
Lapilli hirundinum.
Preparata eadem exhibere possunt,
quæ alij lapides.

C A P . X X I X .

De Lacē & sero Lactis.

Lac est sanguis vi mammorum pro-
fœtūs nutrimento elaboratior
redditus. Ex variis lactis generibus
præ reliquis inserviunt medicinæ:

Lac Albinum, (quod tamen no-
stratis minus usitatum.)

Caprinum.

Humanum.

Ovillum.

Vaccinum.

Optimum est ex animali sano, non
nimis pingui, ætatis mediae, recens
mulctum, colore candidum, quod
vngui instillatum cogitur.

Vires. Refrigerat, humectat, molit,
paregoricum est, acrimoniam mitigat.
Hinc usus insignis in dysenteria (clysma-
tum) in phthisi, &c. Extrinsecus in
oculorum distillationibus, capitis dolore
(excellit tremor.)

N. Lac eti optimè nutrit, tamen non
omnibus aquæ commodum est: Necet
enim in visceris intemperie & febre; quia
facilè corruptitur, malumque adangere
aptum est. Capiti itidem & nervoso gene-
ri minus convenit.

Preparata ex lacē, butyrum scil.

Lac coagulatum, Serum & Caseus,
inter nativa meritò recensentur.

Butyrum convenit, ut consisten-
tiâ, ita & viribus generalibus, cum
axungiis.

Lac coagulatum vim habet refri-
gerantem ac anodynæ.

Caseus in medicina rarissimi est
usus. Recentem imponunt nonnulli
Epati ad æstum febrilem compri-
mendum; vetustum sunt qui com-
mendent ad resoluendos tophos po-
dagricos.

Serum lactis, seu Aqua lactis, fit
duplici modo, per se & per admistio-
nen rei separationem iuvantis. Per
se secrentur caseosa substantia à se-
rolo, si lac (non nimis recens) calori
exponatur. Admiserentur quæ separa-
tionem iuvent: coagulum v. g. vitu-
li, agni, &c. liquor acidulus, herba
acidula, v. g. acetum. Spir. Vitri, ace-
tosa.

N. Sunt qui serum cum petroselino fa-
tum, poscam italicam appellant.

Vires, Calfac. & siccat, abstergit, al-
vum subducit, vivum ciet. Hinc usus

118 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

crebri in Infusionibus purgantibus, ab integrum tractatum, de facili mestergentibus, &c. Extrinsecus exterget dicina per seru & lactis usum conscripta securius. Datur per se ab 3y. ad 1b.

N. Integrum tractatum, de facili mestergentibus, &c. Extrinsecus exterget dicina per seru & lactis usum conscripta securius. Datur per se ab 3y. ad 1b.

Ioannes Costau.

C A P. XXX.

De Felle.

Fel est portio chymi excrementi tia, flava, amarissima, acerrima, in epate ab utiliore parte separata, in que vesiculam propriam collecta, unde per aluum subducitur, & trans eundo aluum sollicitat.

Visitatoria sunt.

Fel Bouis seu Tauri.

Caprae.

Ovis.

Suis.

Vrsi.

Fel omne desumendum est ex animalibus mediæ ætatis, quæ neque famem neque sitim passa sunt, neque exercitio nimium defatigata, neque ita percita: intellige, nisi exaltatum fel desideraueris.

Vires. Fel omne calefacit, siccatur, inci-

dit, terget, discutit, expultricem stimulat, lumbricos amaritudine fugat. Hinc medetur (extrinsecus) hebetudini ac albedini oculorum, purulentie aurium, &c.

N. Differunt autem inter se non modo secundum magis & minus, sed & viribus peculiaribus, tum à natura alimenti, quo animal pascitur; tum à natura ipsiusmet animalis dependentibus. Inter quadrupedum fella efficacissimum est taurinum: Inter avium, praefantissimum habetur fel perdix & gallina. In generali tamen, avium fella fortiorum virium censentur, quam terrestrium.

Preparata. Fieri quidem possunt. Extracta cum V. ex fellibus siccatis. Verum præter Tineturam illam Cosmeticam ex felle taurino cōfectam, nullum in praxi vidisse memini.

C A P. XXXI.

De Medullis.

Medulla, Medulla, est pinguedo ossium cavitatibus, velut nutrimentum infusa.

Suntque Officinales.

Medulla Bubula seu bovina.

Canina.

Ceruina.

Equina.

Hircina.

Hœdina.

Ovilla.

Vitulina.

Vires. Calfacit, emollit, rarefacit, vlerca explet. Hinc proficius medullarum usus in tumoribus induratis & scirrhosis, &c.

N. Optima, habetur cervina, dein vitulina: Medulla Hircina, & bubula, tum acrier

C A P V T X X X I I . & X X X I I I . 119

acrior est, tum siccior, ideoque ad mollien-
dum minus iuncta.

Est & medulla spinae dorsalis cere-
breque, id est, substantia molliuscula
in cavitatibus eorum collocata. Ve-

rūm excepto cerebro leporino, reli-
quæ vsus sunt rarissimi.

Preparata exinde fieri possunt
principia, Aqua still. & Oleum.

C A P . X X X I I .

De Pinguedinibus seu Axungis vel adipibus.

Axungia.	Agnina, Ger. Lammer.
Adeps.	A schmalz oder fett.
Pinguedo.	Anatina.
Anserina.	Anserina.
Aprugna.	Apriugna.
Ardeæ.	
Aschij, f. Thymalli pescis.	
Canina.	
Caponis.	
Catoris.	
Cati sylvestr.	
Ciconiæ.	
Cuniculi.	
Erinacei.	
Gallinæ.	
Humana.	
Leporis.	
Lucij pescis.	
Lupi.	
Muris montani.	
Ovis ex lana. OEsypus.	
Porcina seu suilla.	

Serpentum.
Taxi seu Melis.
Vrsi, fœminæ & masculi.
Vulpis.
Vulturis.
Huc. Butyrum & præcipue majale.
Vires. Calfacient, humectant, emol- liunt, abstergunt, digerunt, pus movent, anodynæ sunt plus minus. Nimirum quia pinguedo vires quadantem secundum naturam animalis sui fortitudo, propter hu- ius natura fuerit, ita & illius. Imbecillior est suilla (quia sus frigidior & humidior;) bac paucò fortior vitulina; hinc gallina- cea; efficacissima omnium est amœrina.
N. Quoties adipis absolute fit mentio, recipe suillam, recentem, sine sale, can- didam.
Preparat. Oleum stillatum.
N. Quomodo axungia lavetur & af- seruetur. Vide lib. 1. cap. 29.

C A P . X X X I I I .

De Sanguine.

A nimæ. Hebr. Dam. Arab. Dem.	trimentum ex chylo in Venis & E-
Est proximum animalium nu-	pate elaboratum, adeoque de natura animalis

120 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

animalis magis participans quam ipse chylus. In Officinis quidem nulli prostant, adhiberi tamen nonnunquam solent, maximè recentes.

Sanguis Anatis.

Anseris.

Asini.

Canis.

Columbae.

Equi.

Hirci.

Hedii.

Hominis.

Muliebris menstruus.

Leporis.

*Perdicis.

Tauri.

Turturis.

Vires. Calefacit, adstringit, sanguinis fluxus coibet, magis minus pro natura diversa animalium, nutrimentique; quam ratione & viribus peculiaribus inter se differunt. Avium sanguis, quia nitrosa plerunque scatet facultate, incidit, abstergit, calculum atterit, oculorum suffusioni confert; ut columba, milvi, vulturis.

Preparata. Anatomia sanguinis exhibet. 1. Vm seu spiritum. 2. Oleum. 3. Sal volatile. 4. Sal fixum. His adiunge balsamum antipodagricum & magisterium, cuius formulas vide lib. 5. de homine.

C A P. XXXIV.

De Seuis.

Sevum Ceruinum:
Damæ.
Equinum.
Hircinum.
Hœdimum.
Ovillum.
Taurinum.
Vitulinum.

Huc. Cera.

Vires. Sunt calida & humida mode-

rate, vel gr. 1. mollient, discentiunt, aliquantulumque adstringunt.

Preparata rara per se exhibent, ut plurimum emplastris aliisque inungendorum formulis inseruiunt. Si quis tamen ea destillationi submittere velit, poterit id probè ad modum, quo Gummi-resinæ destillantur.

C A P. XXXV.

De Stercore & Vrina.

Stercus nihil est aliud, quam nutritimenti assumpti pars inutilior, crassior, feculentior, à parte utiliori in ventriculo & intestinis virtute chylificâ aliquantulum immutata, & hinc per anum excreta,

N. Con

C A P V T X X X V .

121

N. Constat 1. spiritu volatili forente flagribili (Δ fætidum vocant.) 2. Sale fixiori (quo agri facundantur) tum quoque 3. terreis ac 4. aquæs portionibus quæ prioribus illis subiectum præbent.

Stercora in Medicina visitatoria sunt.

Stercus. Anserinum.

Afininum.

Aprinum.

Bovinum s. vaccinum.

Caninum seu Album græcum

Officinarum.

Ciconiæ.

Columbinum.

Equinum.

Gallinaceum.

Humanum.

Lupinum.

Muris. Muscerda.

Ouillum.

Passerculi.

Pauonum.

Suillum.

Vires. Virutes stercorum eruenda sunt, tum ex naturæi alimentaria, tum ex natura animalis, cuius vi chylifica aliquantulum eas immutari diximus. Animalium excrements (quia harum natura plurimum calidissima est) tota sunt.

nitrosa, unde & mirificam vim habent, discutiendi, incidendi, attenuandi, dissolundi, aperiendi, abstergendi, (scil. maculas cutis) diuersimode, tamen prout se diuersæ aues sunt, diuersisque vinunt alimentis. Iumentorum stercora vim continent anodynæ, refrigerantem, discuentem, exhibenturque intus & extra.

Preparata præcipua quæ inde exhiberi possint sunt.

1. Aquæ stillatitiae. 2. Olea stillat.

3. Salia.

N. Præter ∇ m ex stercore vaccino (omnium florum dictam) non memini alias esse visitatas.

De Vrinis.

Vrina est veluti colamen chymi & sanguinis, constans ex Sale viscosa que terra humiditatæ phlegmaticæ immixta.

Raræ etsi sint quæ in usum medicum veniunt, tamen viribus non carent insignibus præcipue.

Vrina humana.

Caprina.

Vires. Calefaciunt, siccant, abstergunt, &c.

Præparata. Spiritus Salque volatile, videl. s. de homine.

C A P . X X X V I .

De Vnguis & Vngulis Officinalibus & de.

Coagulis.

Vngula visitatores sunt.

V. Vngula Alcis.

Afini.

Bouis.

Canis.

Equi.

Lyncis,

His addere licet Vnguem odoratum seu blattam byzantiam.

Vires. *Vide seorsim lib. 5.*

Preparata. Præparata in specie sordida. Magisterium, quibus addi quoque potest oleum stillatium.

Coagulum nihil aliud est, quam lactis in Ventriculo quadrupedum, quæ adhuc fugunt, concretio & condensatio. Sic sunt.

Coagulum Agni.

Equi. Hippace.

Hœdi.

Leporis.

Vituli.

Excipendum coagulum antequam ipsa animalia aliud quipiam præter lac maternum degustauerint.

Vires. *Coagulum omne, teste Galeno, acris & digerentis est facultatis, adeoque exsiccatoria.*

C A P. XXXVII.

De Acetis.

ACETA quæ in Officinis prostant, vel mera sunt, vel qualitatibus medicamentalibus aliunde imprægnata.

De meris, horumque præparatiōnibus agetur peculiariter lib. 4. cl. 2.

Aceta qualitatibus aliunde imprægnata) præter pauca alia de quibus d. l.) sunt ex Aceto vini optimo, ac vegetabilibus, suntque vel insolata siue infusa saltem, vel quoque, quæ paucissima tamen sunt, destillata.

Modus fieri: p. Materiam insolandam puram atque exsiccatam. præpara ad infusionem, (vt sit in decoctionibus incidente sc. qua incidentia sunt, contundendo que comundenda, &c.) Hinc imple lagenam vel vitrum ac affunde acetum vini acerr. donec ad lagenæ ceruicem pertingat: Orificio bene clauso colloca in locum tepidum, vel temperatū & acetum viribus rerum infusarum imprægnabitur.

N. Vegetabilia aliquantulum arefa-

Et a recipere oportet; ne squalore suo acetum corrumpant.

Modus destillandi non discrepat à destillatione aceti simplicis de qua lib. 4. class. 2.

--- Aceta Officinalia simpliciora fiunt per solam insolationem: suntque vifatiora.

Acetum Anthosatum ex inf. flor. rum anthos.

Calendulatum ex floribus.

Caryophyllatum ex flor.

Cort. citr.

Fragor. è fructib.

Lauendul. è flor.

Menthæ: ex foliis.

Papau. rhæd. è fl.

Roisat ex flor.

Rub. Idæi: è fructibus.

Rutae. è fol.

Sambuci: ex florib.

Scordij: è fol.

Scylliticum.

Violar. purpur. è floribus.

Aceta

Aceta composita sunt.

1. *Acetum Alexicacum s. Destillatum alexic. F. F. v. infra. No. 1.*
Bezoardicum. 2.
Prophylacticum FF. 3.
Rutaceum. F. F. 4.
Theriacale August.

1. *Acetum Alexicacum seu Destillatum alexic. F. F. i.e. Francofurtense.*

¶. Rad. Tormentill.
Zedoar.
Bistort. a. 3ij.
Angellic.
Imperator.
Hirundinar. a. 3i^ß.
Pimpinell.
Dictann. alb.
Aristoloch. rot. veræ. a. 3ij.
 Herb. Card. bened.
Galeg.
Scord. a. Miß.
Sed maj.
Endiu. a. Mij.
 Fl. Calendul. Miiss.
Rosat. rub.
Nymph.
Borrag.
Tunic.
Sambuc. a. M. j.

Potma citria recentia minimeque putrida N. viij.

Incisis incidentis, ac contusis contundendis affunde  acerr. lib. X. stent in infusione  postea de-

stillentur per  vitreum.

2. *Acetum Bezoardicum. FF. Cl. Dn.*
D. de Spina.

¶. Rad. Enul camp. 3ij.

Angellic.

Ostrut.

Valerian,

Vincetoxic.

Chelidon.

Pimpinell. a. 3vj.

Gentian.

Diptamn. alb.

Aristoloch. rot.

T tormentill.

Scabios.

Succis.

Petasit.

Zedoar. a. 3^ß.

Bacc. Junip. M. iiiij.

Myrrh. elect. 3^ß.

Fol. Rut.

Chelidon. maj.

Scord.

Chamædr.

Card. bened. a. Mij.

*Incidantur & contundantur vt
est moris, dein affunde.*

Aceti vini acerr. lib. viij.

Spir. Vini lib. iij.

Theriac. Androm. 3ij.

Spir.  i. 3^ß.

Camphor. 3ij.

*Digerantur per dies aliquot (14.)
dein exprimantur, filtranturque per
chartam.*

3. *Acetum Prophylacticum F. F. Cl. Dn.*

D. Arnoldi UVeickard.

¶. Rad. Angellic.

Zedoar.

Leuistic.

Pimpinell. germanæ.
Rut. à Mj.
Turbith. cl. 3ij.
Cort. citr. recent. 3ij.
Baccar. Iuniper. bene matur.
3ib.
Laur. 3j.
Incisa & contusa, vt moris, mace-
tentur cum acet. acerr. Mens. ij. po-
stea destilletur per **X** vitreum. Ser-
uetur pro vſu.
Vires. *Inſignes vires bezoardicas*
aceta hac recenſitatria obtinent, quibus
non modo contagiosos morbos praecanere.

ſed & per ſudorem, vrinamue expellere
pollent.
4. *Acetum rutaceum. F. F.*
ꝝ. Fol. Rut.
Scord.
Card. bened.
Tanacet. à Mj.
Bacc. Iuniper.
Rad. Angelic. à 3ij.
Zedoar.
Cort. citr. à 3ib.
Incitantur minutim, ac infun-
dantur in **H** optimi lib. vj.
Viribus conuenit cum prioribus.

C A P. XXXVIII.

De Aquis destillatis.

A Quæ, in Officinis, diuersimode paratae prostant, simulac diuersæ naturæ: aqueæ ſcil. i. e. ad naturam aqueam accedentes, vel spirituosa, i. e. spirituum naturam refe-
rentes.

Modus parandi vel destillatio eft
vel infuſio, decoctiōne, vel commix-
tio.

N. Modos deſtillandi Vide lib. 1.
Deſtillatio aquarum pro diuersitate materiarum diuersimode per-
ragitur, idque non modo ratione
caloris diuersi, verum etiam ratione instrumentorum variantium.

In regno MACROCOSMICO
aque ferè ſingulæ peculiares de-
ſtillandi modos obtinent, ideo-
que ſpecialiter deſcribendæ erunt
ib. 3.

In R. VEGETABILI deſtil-
lantur aquæ ex herbis, floribus,
fructibus, radicibus, lignis & aroma-
tibus.

Ex herbis & floribus viridibus.

I. ꝝ. Herb. vel Flores q. v. incide
minutim conquaſſae, ac affunde
Vm(ne empyreuma contrahat) de-
ſtillaque per **M**.

N. 1. Ex herbis floribusue viridibus
tenuerib⁹ (quorum vis facile euane-
scit) ut & frigidioribus, deſtillantur
aque per **M**: Ex aromaticis autem
ut & calidioribus, quorum vis non
ita volatilis, profundiusque inheret,
commodius per vefcam eliciuntur.

N. 2. Herba ordoꝝ quo facilius ex-
pirat eotepidiori **M**. vtendum.

N.

N. 3. Si nobiliores experis aquas, affunde distillatam super materiam nonum, ac destilla denuo.

N. 4. Non absire fuerit premittere macerationem dici unius ac alterius, vel fermentationem, addito, si liber, tantillo **O**lis vel fecum cerevisie, præcipue si olea experuntur.

N. 5. Si colorem natuum spiritibus & aquis destillatis conciliare volueris, pone eos in **X** et transeat ∇ extillans: Perum enim vero, minus durabilis ∇ illa futura est.

2. **R**. Succum ex herbis expressis ac destilla.

Ex herbis siccis. **R**. Herbam quamcunque vis, incide & affusa aqua calida macera aliquandiu; hinc destilla.

N. Ex herbis calidis & odoratis melioris nota ∇ & olea destillantur, si siccata destillationi subjiciantur.

Ex Fruetibus. **R**. Fructus maturos. E.g. poma, scinde minutim vel conquassa ac destilla per **M**.

N. Ex mollioribus exprimi potest succus ac destillari.

Ex Seminibus. **R**. Semina grossè contusa, macera cum ∇ hinc destilla per vesicam.

Ex Radicibus. **R**. Radic. conquassa, macera cum ∇ ac destilla per Vesicam.

N. Rara sunt ∇ & ex solis radicibus destillatae.

Ex Lignis. Ex lignis quæ eliciuntur, spirituosæ imprimis sunt, ideoque ad spiritus referenda. Videri quoque possunt earum destillatione-

nes in oleis destillatis.

Ex Aromatibus. **R**. Aromata grossè contusa, macera cum menstruo idoneo per aliquot dies (4. 5. 6. dein) destillentur per vesicam. Sic stillat ∇ & oleum. Haec separa & si opus rectifica. *Vide de oleis stillat.* quia uno & eodem actu ∇ & olea ex aromatibus proliciuntur.

N. 1. Menstruum in singulis dabitur.

N. 2. Aquæ he spirituosa sunt.

In Regno ANIMALI eliciuntur aquæ 1. ex animalibus integris moliusculis, mucilaginosisque 2. ex partibus moliusculis, V. g. Cerebro spinaliue medulla 3. E sanguine. 4. E nouellis cornibus. 5. Estercore.

1. Ex animalibus integris mucilaginosis: **R**. Animalia (lota si placuerit) scinde minutissime, conquaesse; hinc destilla ex **M** vel **B**. affusa, si placuerit, ∇ convenienter: Sic paratur ∇ lumbricorum, cochleatum, ut & spermatis ranarum.

2. Ex Medulla Cerebri patatur eodem modo, addita ∇ cephalica v.g. tiliæ, pœoniæ, &c.

3. Sanguinis destillatio eti si itidem è **M** perfici queat: præferritur tamen que sit igne nudo ex cucurbita fistili. *Vide de oleis c. 70. & spiritib* c. 81.

4. E Cornibus quomodo liquor stillat. *Vide de oleis.* E nouellis cornibus, e. g. ceruorum fit Δ per Retortam vel Cucurbitam humilem è **M** aut **B** affuso paucō Vino vel & sine

126 PHARMACOP. MED. CHYM.

additione. Vide lib. 5. de Ceruo.
5. E Stercore, fit itidem per MB. vel
cineres, proditque primum V. hinc
oleum.

Sunt itaque.

*Aqua Officinarum Simplices ac
Phlegmaticae.*

Aqua Abrotani.	ex toto.
Absynthij.	Buglossæ ex flor.
Acaciæ flor.	ex tot.
Acetosæ.	Bugrsæ pastoris.
Acetosellæ.	Calamentæ.
Adianti.	Calami officinarum.
Agrimoniæ.	Calcatrippæ.
Albuminis ouorum.	Calendulæ.
Alchimillæ.	Capillorum Veneris.
Alkekengiæ baccis.	Caprifolij flor.
Altheæ.	Cardui benedicti.
Alſines.	Mariæ.
Anethi.	Carui.
Angelicaæ.	Cariophyllatae.
Anguriæ.	Centaurij minoris.
Anisi.	Centumnodiæ.
Apij.	Cerasorum nigr.
Aquilegiaæ.	Cærefolij.
Artemisiaæ.	Chamæmeli.
Asparagorum.	Chamæpiryos.
Aurantiorum ex florib. dici- tur V Naphæ , &c.	Cheyri fl.
Auriculæ muris, excortic.	Chelidonij maior.
Bardanaæ simpl.	Cichor.
Basilici.	Cinamom communis.
Beronicæ.	Citri ex cortic.
Berulæ succi.	Consolidæ med.
Bistortæ.	Coriandri.
Borruginis ex flor.	Crassulæ.
	Cuscutæ.
	Cyani fl.
	Cydoniorum.
	Cymini.
	Ebuli è flor.
	Endiuiaæ.
	Enulaæ.
	Eupatorij Auicen.
	Euphragiaæ.
	Fabarum fl.
	Fœniculi,

Flo

C A P V T X X X V I I I .

327

Florum omnium, l <small>æ</small> tamini-	Nuclum Iugland. immatur.
nis.	Nymphæa alb.
Fragariae.	Nummularia.
Fragorum.	Origani,
Fumarie.	Ononis.
Genista.	Pœonia.
Graminis ex rad.	Papaveris albi.
Geranij.	Parietaria.
Hederæ terr.	Pentaphylli.
Hepaticæ nob.	Pericaria maculosa.
Herniariae.	Pericorum florum.
Hyoscyami.	Petasitidis ex toto.
Hyperici.	Pimpinellæ.
Hyssop.	Plantaginis.
Imperatoriae.	Pluuialis.
Lactucae.	Portulacæ.
Lapatij acuti.	Prassii.
Lauandulae.	Primula veris.
Leuisticæ.	Pulegij.
Ligustri fl.	Pyrolæ.
Lilior. alborum.	Querc. fol.
Conuall.	Raphani Rustic.
Linarie.	Vulgatis.
Lumbricorum.	Rorellæ.
Lupulorum.	Roris maialis.
Maioranæ.	Rosarum pallid.
Maluae.	rubear.
Matricariae.	Rotismarini.
Matris-syluae.	Rubi idæi ex bace.
Meliloti.	Rutæ.
Melissæ.	Saluiæ.
Mellis.	Sambuc. flor.
Menta crispæ.	Saniculæ.
Mentastri.	Sauinæ.
Mercurialis.	Satyrij.
Millefolij.	Saxifragæ alb.
Morsus Diabol.	Scabiosæ.
Nasturtij aquatica.	Scolopendrij.
Nicotianæ.	Scordij.

Scor

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Scorzonerae. | Asthmatica. 5. |
| Scrophulariae. | Bardanae composita. A. |
| Semperuii. | Caponis composita. A. |
| Senecionis. | Carbunculi. 6. |
| Serpilli. | Carminatua. 7. |
| Sigilli Salom. | Cephalica aromatica. 8. |
| Siliginis fl. | Cephalica F. F. 9. |
| Solatri. | Cinamom. c. Maluar. |
| Spermatis ranarum, | c. v rosarum. |
| Tanaceti. | Communitatis ophthalmica. |
| Taraxaci. | 10. |
| Thymi. | Cordialis Herc. Saxon. cal. 11. |
| Tiliae flor. | frigida. 12. |
| Tomentillae. | Damascena odorifera. 13. |
| Trifolij. | Diuretica ex nucleis F. F. 14. |
| Trinitatis. | Embryonum S. Balsamus puer- |
| Tunicae fl. | orum. A. |
| Tussilaginis. | Epileptica Langij. A. |
| Valerianae. | Febrifuga. 15. |
| Verbacei. | Fortis. A. vide & l. 3. c. 23. |
| Verbenae. | Hirundinum. A. |
| Veronicae. | Hyterica 16. |
| Violarum ex fl. ex toto. | Iuniperi c. Spir. vini. |
| Vitium lacrymæ. | Lauendulæ compos. 17. |
| Vrticæ. | Magnanimitatis. 18. |
| Zedoariae. | Mirabilis. A. |
| <i>Aqua fortiores cum Vino atque.</i> | |
| <i>Δæ composita.</i> | |
| Aqua Anthaltina. <i>infra. No. 1.</i> | Nephritica. 19. |
| Anisi cum Vino adusto. | Ophthalmica. <i>vide collyr.</i> |
| cum Maluatico. | Philosophorum. 20. |
| Antidoralis, (Alexipharmacæ | Pectoralis. 21. 22. |
| Matthioli Aug.) | Picarum. 23. |
| Aperitiua. 2. | Regia. <i>vide in O l. 3. c. 23.</i> |
| Apoplectica Sennetti. 3. | Saluiae composit. 24. |
| Apoplect. Crollij. <i>infra 4.</i> | Splenetic. 25. |
| Arthritica. Aug. | contra Tremorem. 26. |
| | Theriacalis Bezoardica. A. |
| | Theriacalis contra pestem. |
| | 27. |
| | Theriacalis Croll. seu Spir. the- |
| | riac. . |

riac. camphorat. 28.
 de Trib. Mixtura simplex. 29.
 Trifantis. 30.
 Vitæ aurea Langij. A.
 Vita Matthioli. A.
 Vita comm. A.
 Vitæ mulierum. 31.
 Virtutum. 32.
 Vomitiva Plateri. 33.
 N. Non possum quin in limine aquarum compositarum, Pharmacopœia tyronem erroris commonefaciam, quem in nonnullarum destillatione comperio. Videlicet admisceri destillandis eiusdem farina materias, guarum vis contumacior est, quam ut destillationis opere elevari cum ceteris queat. Tales sunt Gemme, Margarita, Corallia, ossa, cornua, asrum, &c. Eapropter si qua talia occurverint, ne frustra sumptus impendant, præstat eadem destillato admiscere, sive sub formula preparatorum id fiat, sive, quod melius, sub forma Magisterij, sive quod adhuc aptius, sub forma liquoris.

1. Aqua Anhaltina.

2. Terebinth. el. lb. 8.
 Thur. masc. 3j.
 Lign. Aloës pulv. 3ij.
 Gran. Mastich.
 Garyophyll. (aliis fl. anthos.)
 Nucist.
 Cubeb. (aliis Galang.)
 Cinamom. 3. vi.
 Croc. Or. integr. 3iiß.
 Sem. Fœnic.
 Bacc. Laur. 3ß.
 Pulverisata infundantur in V lb.

v. digerantur per ♂ (6.) additis Moschi in petia ligati g. xv. Hinc destillentur lentissimo MB. Quod clarum est separetur à turbido.

N. Præstat Moschum rostro alembici imponere.

Vires: Calf. ficc. discutit; stomachum, cor, & reliqua viscera corroborat. Hinc efficax est in animi deliquis. Extrinsecus crebrior eius usus est; confert in catarrhis atque doloribus à causa frigida subortis, in Artibride quam Vagam vocant, in Paralyse, Epilepsia, Apoplexia, Vertigine, Tremore, Lethargo, &c. si membris affectum tamen bene fricitur.

2. Aqua Aperitiva.

3. Rad. Eryng.	
Scorzonera.	
Filic.	
Centaur. maj.	
Brusc. 3. 3ß.	
Fœnic.	
Cort. Cappar.	
Tamarisc.	
Fraxin. 3. 3ij.	
Citri odorat. 3iiß.	
Sem. Vitic.	
Car. bened.	
Cichor. 3. 3ß.	
Endiv.	
Scariol.	
Nasturt.	
Citr. 3. 3ij.	
Herb. Polytrich.	
Adianth.	
Ceterach.	
Cuscut.	

128. PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Scolopendr.
Betonic.
Endiv. à. Miß.
Sum. Thym.
Epithym.
Lupul.
Flor. Hyperic.
Genist.
Bortag.
Meliſs. à. Mj.
Passular. min. 3l.
Infundantur in ∇ . Lupul.
Scolopendr.
Card. bened.
Veronic. à. lb.
Vin. Rhenan. libiiſs.
Additis. Cinam. 3iſs.
Spec. Dialacc. 3iſs.
Stent in loco calido per ♂ ♂ (2)
probè clausa, postea ♀ lentur in M.
Δ. lento.
Vires. Maximarum est virium in
reserandis obſtructionibus totius corporis,
maximè vero Lienis, Epatis & Meſen-
terijs, adeoque comprehendabilis in affectu
hypochondriaco, aliisque affectibus affini-
bus. Dofis cochl. i.

3. Aqua apoplectica Crollij.

g. Lil. Convall.
Fl. Tiliae,
Pœoniae,
Primul. veris,
Maioran.
Lauandus.
Salviae,
Betonic.
Rorismat.

Cerasor. nigror. & dulcium, 2
crescente decerptorum. q. p.

Tritis omnibus & mixtis (vel ſcor-
sim flores, ſcorſim cerasa deſtille-
tur) adde farinæ ſinapi lb. i. vel ij. affu-
ſaque ∇ comm. q. f. fermententur
ac deſtilleſur in M. Spiritui elici-
to adde Elixyr. Epilept. Croll. à. cir-
cul. aliquandiu.

N. Ad fermentationem promoven-
dam in ∇ . illa coniuncti tantillum lupu-
li ac fermenti coqui potest, vel etiam fer-
mentum addere licet ſine coctione.

Dof. cochl. f.

4. ∇ . Apoplectica Semneri.

g. Fl. lil. conuall. q. v. infunde in
Vini optimi Menf. ij. ♂ (14.) po-
ſtea deſtilletur ac ſetua. In deſtilato
infunde poſtmodum.

Fl. Lavand. recent. q. placet.
Cubebar.
Cinamom.
Nuc. Mosch.
Macis,
Galang. à 3iſs.
Viſc. quern.
Rad. Pœon. à. 3vij.

Stent in maceratione yafe clauso
♂ (14.) Hinc deſtillo.

N. Peſſum & flores tiliæ addi.
5. ∇ . Asthmatica F. F. Germ. Luf-
fervaffer.

g. Rad. Enul. Camp.
Vngul. Caball. à 3iſs.
Gentian. 3iij.
Garyophyllat.
Zinzib. alb. à 3iij. 2j.
Baccar. Laur.

Juniper.

C A P V T XXXVIII.

129

Iuniper.	ā. 3ij. 9j.
Cinamomi, acerr.	
Cardamomi,	ā. 3ij.
Fol. Salu.	
Majoran.	
Hyssop.	
Marrub. ā. Ms.	
Irid. Fl.	
Polypod. q.	
Liquirit.	
Iuiub.	
Sebest.	
Vvar. paſſul. min.	
Dactyl.	
Pinear.	
Amygd. d. ā. 3ij.	
Squill. præp.	
Sem. vrtic. Rom.	
Fœnic.	
Ocym. ā. 3ij. 9j.	
Fic. ping. 3j.	
Mellis despumat. 3iij.	
Vini Malvat. 1biiij.	
Spit. Vini 1biiij.	
Stent simul in infusione dies aliquot (8.) dein destillentur per X . addantur Sacchari 3xvij.	
N. 1. Alij addunt & pulmonem <i>Vulpis.</i>	
N. 2. Sunt qui Spiritum Vini omitunt, atque solum Vinum Malvaticum, pondere sc. 1bviij. recipient.	
N. 3. Destillato addunt Moschi, gr. vii.	
Vires. Aqua hec, licet vi tituli pulmonibus solis dicata videatur, uspote quibus specificè opitulatur, crassam ac taretam mucilaginem attenuando, asperitatem leniendo, respirationem facili-	

tando, &c. nihilominus tamen nec insig-
nibus caret viribus, quibus insuper de-
bili ventriculo subvenire potis est, crudis-
tates eius emendando, frigiditatem cor-
rigendo, &c.

Dosis, prout spirituosa fuerit, à cochl.
2. ad 1.

6. V. Carbunculi.

Flor. Rorismar.	
Lilior. conuall.	
Violar.	
Borrag. ā. 3vj.	
Herb. Majoran.	
Salv. min.	
Lavandul.	
Endiu.	
Spic. ā. 3j.	
Nucis moschat.	
Zinzib.	
Macis.	
Garyophyll.	
Cinamom.	
Cardamom.	
Gran. Paradisi.	
Cubebar.	
Galang.	
Visc. querc.	
Avellanar.	
Sem. Pecon.	
Ras. c. c. ā. 3j.	
Incidantur & infundantur in Vini Malvat.	

V. Lauand.

Spic.	
Rosar.	
Fragor. ā. 1blij.	

R 2

130 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Vini alb. generosi. ibij.

Postea adde:

Auti foliat.

Margarit.

Ols. de c. c.

Lap. percar. a. 3*β*.

Moschi. q. v.

F. s. a. destillatio in MB.

N. Olem, margaritas, &c. minus res
etè subjici destillationi, relictus destillato
admisceri.

Vires. Vsus huius aque spirituosa in-
ternus frequens est, in aquis cordialibus
ac cephalicis: miram enim vim habet
spiritus vitales, animales, ac naturales su-
scitandi, calcendi, viscera omnia ac
principiè nervosum genus corroborandi,
extrinsecus ibidem usus eius creber est
in Epithematibus cordialib. ac pulsuum,
in Catarrhis frigidioribus, Paralyticis
membris, cephalalgia, &c.

7. V. Carminativa Germ. Grim-
menvasser.

8. Flor. Chamomill. Rom. M. xxx.
Incidantur & contundantur, in-

fundanturque per horas 2*4*. in

Aq. Chamomill. lb. x. (alij xv.)

Vini generosi lb. vij.

Hinc exprime fortissimè, in colat-
ura iterum infundantur hor. 2*4*. alij
flores Chamomill. com. (M. xxiv.)
extinxantur, colentur. In colatura
macerata.

Fl. Chamomill. M. xij.

Flaud. cort. arant. 3*β*.

Herb. Absynth. pect. M. ij.

Centaur. min.

Puleg.

Origan. a. Miif.

Sem. Aneth. 3*iiij*.

Anis.

Fœnic. an. 3*j*.

Carv.

Cumin.

Card. bened.

Mariæ an. 3*j*.

Bacc. Juniperi.

Lautian. 3*β*.

Stent hor. 2*4*. tunc MB. lento de-
stillata.

Vires. Magnarum est virium in
morbis, à flatibus subortis, e. g. passione
colica, inflatione ventriculi & sim. Pre-
terquam enim quòd flatus discutit, virus
quoque obtinet paregoricam.

8. V. Cephalica aromatica.

9. Nuc. moschat. 3*j*.

Galang.

Calam. atomat. ana. 3*β*.

Macis,

Garyophyllor.

Cinamom. an. 3*j*.

Flor. Lavand. M. i*β*.

Vini Rhenani mensur. ij. stent in
infusione, postea destillentur.

Vires. Non capiti solum, sed & ven-
triculo maximopere convenient, imbecilli-
tati eorum succurendo, cruditates inde-
orsas corrigendo, & discutendo. Sen-
tient. in Institut.

9. V. Cephalica F. F. vel Epileptica,
Germ. Schwindelvasser,

10. Flor. Liliot. convall. lb. j*l*.

Pœon.

Laven

Lavendul.
Beronic.
Tiliae,
Primul. Veris, ana. 3ij.
Her. Botryos cum flor. Mj.
Rad. Pecon. 3ii.
Aristoloch. 3iB.
Diptamn. alb. 3j.
Sem. Pecon. 3ii.
Cubebar. 3i.
Piper. nigr. 3iB.
Visc. quern. 3j. 3ij.
Coryl. 3ij.

Macerentur in Vini malvat. Men-
sur. ij. per septimanas 3. Dein destil-
lentur in MB.

N. 1. *Duplici modo* ∇ *hec in officinis*
nostris parata prostat. I. ut iam descripta
est. 2. cum castorei 3iB. quod vel simplici
infusione, vel repetita destillatione ∇ *m*
cephalicam cum castoreo dictam consti-
tuit.

N. 2. *Quoniam* ∇ *a huic ingredientia*,
codem tempore recentia haberi ne-
queunt, ne exiccando quid virium pereat,
singula, prout collecta fuerunt infundun-
tur, seorsim destillantur, destillatimque
loco menstrui reliquis affunditur.

Vires. *Non immerito Apoplecticam*
nominaueris, utpote cui morbo praeipue
consecrata est. Succurrere tamen apta
est, & reliquis capitibus affectibus, catar-
rborum flatulimque nequitia introductis.
Quales sunt Vertigo, Gravido capititis,
Epilepsia.

10. *Aqua communitatis ophthalm-*
mica.

¶. Herb. Euphrag. Mij.

Chelidon.
Foenic.
Verben.
Siler. mont. an. Mij.
Rut.
Meliſſ. ana. Mj.
Caryophyllor.
Macis.
Piper. long. ana. 3iB.
Macerentur per noctem in ∇ ro-
far. alb. Vini alb. ana.
Destilla l. Δ. in MB.
Vires. *Acuit visum, fôrdes oculorum*
detergit, maculas aufert, ulcera sanat,
&c. scil. instillata.

∇ *communitatis paulò aliter.*

¶. Sum. Euphrag. Mij.
Chelidon.
Verben.
Beronic.
Chamæpit.
Aneth.
Hormin.
Anagall. flor. rub. a. Mj.
Sem. Ameos. 3f.
Rad. Caryophyllat. 3j.
Fl. Anthos. MB.
Piper. long. 3ii.
Macerentur in Vini albi q. s. per
integrum, & destillentur.
Vires easdem obtinet cum priori.
11. *Aqua cordialis Herculie Sa-*
xonia calida.
¶. Cort. citri,
Fol. Meliss.
Ocym.
Vincetoxic.

132 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Fl. Caryophyll.

Rosmar.

Satureja.

Sum. Dipramn.

Scord.

Petrosel.

Fœnic. ana. Mj.

Infundantur in f. q. Vini odorati, aut malvatici, per ♂ (3.) postea destillentur : in destillato iterum infundantur:

Caryophyllor.

Macis,

Nucif.

Lign. Aloës, ana. 3ij.

Destillentur denuò.

N. Addi possunt grana aliquot Moschi & Ambre.

Dosis à 3ij. ad 3β. &c.

12. Aqua Cordialis eiusdem frigida.

¶. Succ. Borrag.

Bugloss.

Meliss.

Acetos.

Oxylapath.

Trinitat.

Bistort.

Cyan. cætul.

Calendul.

Limon.

Citr. ana. lib. j.

Acet. lib. j. (alij lib. β. alij lib. j. δ.)

Sem. citr.

Portulac.

Flor. Nymph. alb.

Violar.

Rosar. ana. 3j.

Terr. sigillat. Strig.

Bol. armen. Or.

Terr. Lemn. ana. 3ij.

Spec. Diatr. Santal. 3ij. (alij omittunt.)

Camphor. 3j.

Infundantur species in succis, macerenturque ♂ (3.) Hinc destillentur per XX. vitreum in MB.

Dosis 3j. ad 3ij. &c.

13. V. Damascena odorifera.

¶. Iresos Fl.

Caryophyll.

Cubebar.

Cinamom. acerr.

Gran. Paradif.

Calam. arom. ana. 3j.

Maioran.

Thym.

Fol. laur.

Fl. Anthos.

Rosar. rubr. ana. Mj.

Lavandul. 3ij.

Vini optimi Menf. iij. Macerentur ac destillentur : Destillato liquori addantur

Moschi 3β.

Zibeth. gr. vij. M.

Vites. Calfacit. siccata, incidit, discutit, cor ac caput in primis roborat.

14. V. Diuretica ex nucleis F. F. seu Liquor diureticus, Germ.

Kernwasser.

¶. Flor. Sambuc. siccata. 3vj.

Amygd. amar. 3v.

Nuc. per sic. 3xij.

Cerasor.

Inci

Incisa ac grossè contusa macera
in Vini maluat. mens. iij. hinc destil-
la in **M**

Vires. *Insignium virium in atteren-
do calculo, abstergendis vriteribus, vri-
naque cienda.*

Dosis cochl. j.

15. **V.** *Febrisfuga.*

Rad. Scorzonera.

Pentaphyll.

Tortmentill.

Dictamn. ana. 3ij.

Sem. Citt. excoct.

Card. bened.

Mariæ.

Acetos. ana. 3ii.

Santalor. omn. ana. 3j.

Galeg. Mi.

Fl. cordial. ana. Mii.

Raf. c. c. 3ii.

Contusis affundantur.

V. Tortmentill.

Cichor.

Card. bened.

Mariæ.

Pap. errat. ana. q. f.

Macerentur in vitro clauso ♂ (3.).
postea adde

Pomor. citri contus. No. vij.

Succ. Endiv.

Acetos.

Card. bened.

Plantag. ana. lib. j.

Borrax.

Scord. ana. lib. f.

Destillentur in **M**.

Vires. *Conuenit in febribus precipue*

*malignis; malignitatem quippe discutit,
puredini resiftit.*

Dosis 3j. vel 3ij. iiij.

16. **V.** *Hysterica Crollij.*

Rad. Diptann.

Sem. Dauci, ana. 3j.

Cinamom. ac.

Cass. lign.

Meliss. ana. 3ij.

Croc. Or. 3ij.

Castor. rec. 3iij.

Ex omnibus mixtis F. pulvis, cui
affundantur **V.** Rutæ lib. ij. & stent
dies (4) in infusione. Hinc destilla
in **M**.

Convenit utero prauis humorib-
us molestato. Discutit, suffocationi
succurrat.

16. *Aqua Lavandula com-
posita.*

Nucif.

Cubebar.

Zingib.

Cinamom. opt.

Galang.

Calam. arom.

Macis.

Caryophyll.

Visc. quern. ana. 3iiij.

Rad. Pœon.

Eruc. ana. 3iiij.

Flor. Til.

Pœon.

Anthos.

Saly. ana. Mii.

Lavandul.

Lil. convall. ana. M. xxiv.

Vini

134 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Vini optimi q. f. F. infusio & de-
stillatio in MB.

Vires. Calfacit, exiccat, cephalica est.
& arthritica, intrinsecus & extrinsecus
adhiberi apta.

18. *Aqua Magnanimitatis.*

℞. Formic. (præstant majores, aci-
dulum odorem exhibentes) Mij.

Spirit. Vini Mensur. 1. vel q. f.

Digere vase clauso donec putrefac-
tione in liquorem abierint. Hinc
destilla per MB. aromatizaque tan-
nillo cinamomi.

Vires. Calfacit intense, incidit. V-
sus eius præcipuus est in atrophia sive in-
trinsecus, sive extrinsecus adhibere ve-
lis.

N. 1. Si species anacard. infuderis, in-
signe conficies extractum, ad memoriam
roboram.

N. 2. Sunt qui animositatemeius post
excitari volunt, unde & nomen accepit;
fides sit penes expertum. De collectione
sunt qui monent, preferendas esse formi-
cas, que plenilunio cum ovis simul colli-
guntur, hæque ad plenilunium usque sub-
sequens digerere iubent.

N. 3. Nonnulli ℥ lib. ij. aquæ magna-
nimitatis descriptæ, addunt.

Confect. Anacard. 3ij.

Castor. recent. 3j.

El. Buglos.

Anthos. ana. M. j.

Cinamom. opt. 3β.

Digeruntque per aliquot dies, hinc
destillant.

*Alia aquæ magnanimitat. de-
scriptio.*

℞. Formicar. major. (Majo vel Iu-
nio collect.) q. v.

Spir. Vini rectificat, ad eminent
digit. 3.

Digestis adde,

Fl. Anthos,

Ros. rubr.

Bugloss.

Meliss.

Maioran. ana. Mj.

Castorei el. 3ij.

Spec. Diamosch. dulc. 3β.

Confect. Anacard. 3j.

Aqu. Buglos.

Betonic.

Tiliae, ana. lib. j.

Tritis terendis misce ac mensuram di-
gerantur, deinde destillentur in MB,
& cum proprio sale rectificentur.

Vires. Cordialis est & cephalica pre-
priori, magnarumque virium ad memo-
riam roboram.

19. V. Nephritica.

℞. Rad. Enul. Camp.

Ononid.

Pimpinell.

Raphan. ana. 3j.

Petrosel.

Levistic. ana. 3vij.

Fol. Levistic.

Petroselin. ana. Mj.

Saxifrag. c. toto 3ij.

Nucl. persic. No. xxx.

Fl. Genist.

Meliss.

Anthos

C A P V T

XXXVII.

135

- Anthos, ana M^g.
 Sambuc. Mj.
 Bacc. Iunip.
 Myrtill.
 Halicacab.
 Sem. anis. 3ij.
 Incidentur & infundantur in Vi-
 ni alb. opt. lib. xij. per ♂ (8.) dein
 destillentur.
 Vires. Diuretica ac lithontriptica
 est. Dosis cochl. i.

 20. V. Philosophorum.

 21. Flor. Sambuc. rec. lib. ij.
 Nymph. lib. ii.
 Herb. Lactuc.
 Portulac.
 Solan. c. toto, ana. lib. j.
 Hyoscyami alb. lib. f.
 Fl. Papav. errat.
 domestic. ana. lib. g.
 Rosar.
 Violar. ana. 3iiij.
 Succ. Semperviv. lib. iij.
 Plantag.
 Acetof. ana lib. ij.
 Endiv. lib. i.

 Omnia recentia contusa & incisa
 stent in infusione in cella frigida ♂
 (17.) postea destilla in M^g. vel cine-
 re ad siccitatem, sexies reiterando,
 sempérque destillatum affundendo
 super novas herbas, omissis succis,
 tandem rectifica: rectificato ad-
 de sal ex fecibus extractum, depura-
 tumque sepeli in terram frigidissi-
 mam per mensem.

- Vires. Omnibus morbis calidis con-
 venit, &c.

 21. V. Pectoralis Clariss.
 D. D. Lud.
 von Hornigk.

 22. Hépat. Vitul. N. i.
 Pulmon. Vulp. N. i.
 Herb. Pulmonar.
 Hepat.stellat.
 Salviae,
 Rutæ,
 Hyssop. ana. Mj.
 Rad. Enul. c.
 Gladiol. an. 3g.
 Sem. Anis.
 Carv.
 Fœnic. an. 3g.
 Fl. Borrag.
 Bugloss. ana. 3ij.
 Infundantur per hor. 24. in
 Vini veteris generos. M. ij.
 Aqu. Scabios.
 Card. bened. an. 3iv.
 Hyssop. 3ij.
 Dein destilla in M^g.
 Vires. Confortat Pulmones ac E-
 par, crassam mucilaginem attenuat, ex-
 pectorat, flatus discutit, obſtructiones re-
 ferat, &c.

22. V. Pectoralis, F. F. II

 23. Fol. Scabios.
 Veronic. an. M. ij.
 Capill. ♀.
 Salv.
 Hyssop.
 Marrub.

136 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Epatic. ana. Mj.
 Fl. Borrag.
 Buglos.
 Violar. an. Mf.
 Rad. Enul.
 Ireos fl.
 Petrosel.
 Liquirit. ana. 3*b.*
 Sem. Anis.
 Foenic.
 Vtric. an. 3*j.*
 Cinamom. el.
 Croc. Or. an. 3*f.*
 Incis. & contusa digerantur in
 Aq. Scabios.
 Veronic. ana. lib. i.
 Hyslop. lib. 3*b.*
 Vini alb. lib. iii.
 Digerantur per ♂ (2) destilli per
M. adde Sacchari cand. q. s.
 Vires. Eadem cum priori obtinet.
 23. ∇ . Picarum-composita. ad
 24. Sem. Paeon.
 Rad. Paeon.
 Pyrethri. ana. 3*j.*
 Aristoloch. L. 3*ijj.*
 Visc. queru. 3*b.*
 Castorei. 3*j.*
 Fl. Stoechad. ar. 3*j.*
 Lil. convall. 3*b.*
 Paralyf.
 Paeon. ana. 3*vj.*
 Lavendul.
 Rosmar. ana. 3*v.*
 Salv.
 Maioran.
 Betonic.

Hyslop. ana. 3*b.*
 Cinamom.
 Caryophyllor.
 Cardamom.
 Nucif.
 Cubebat. ana. 3*b.*
 Singulis grosso modo contusis &
 incisis infundantur, o. dicitur
 in Aq. Lil. convall. lib. i. p. 100
 Flor. Tiliae lib. 3*b.*
 Primul. Veris. lib. j.
 Deinde adde pullos picarum, N.
 xii. qui pennis maiusculis abiectis
 conquassentur & addantur infusioni
 praedictae; post macerationem F.
 Destillatio in **M.**
 N. Sunt qui picas in ∇ . liliorum lib.
 i*b.* ad consumptionem medietatis antea
 coquunt, infusionique postmodum addunt.
 Verum quia coctione illa volatilis pars
 prorsus evanescit, quid postmodum ele-
 vetur non video.
 Vires. Cephalica & antiepileptica in-
 signis est. Dosis cochl. 1. vel. 2.
 24. ∇ . Salvia composita. F. F.
 25. Salv.
 Majoran.
 Thym.
 Lavendul.
 Epithym.
 Betonic. ana. Mj.
 Nucif.
 Cinamom. ana. 3*b.*
 Rad. irid.
 Cyper. rot.
 Calam. ar. ana. 3*j.*
 Storac. cal.
 Benz.

- Benz. ana. 3ij.
Infunde in lib. iiiij. Spir. Vini. rec.
S. 4. dein destill. per MB.
Vires. Calescere & siccatur. Cephalica & arthritica est penetrantissima,
et sui conveniens, tam internè quam ex-
ternè.
25. Aqua Splenética, F. F.
26. Rad. Filic. 3ij.
Polypod.
Apij, ana. 3ij.
Aristol. rot.
Leuistic.
Acor. aq. (pseudoac.)
Cal. arom. ana. 3ij.
Cort. Cappar.
Tamarisc.
Lign. fraxini,
Rhabarb. elect. ana. 3ij.
Sem. Leuistic.
Cary.
Anis.
Cymin. ana 3ij.
Sum. Absynth.
Fumar.
Cuscut.
- F. Agrimon.
Fol. Ceterach.
Scolopendr. an. Miß.
Vini generof. lib. viij. stent in di-
gestione (S. 2.) Hinc destillentur
per MB.
Vires. Lienem roborat, aperit, vri-
nam promovet, &c..
26. V. Contra Terrorem, Germ.
Schreckwaffer.
27. Flor. Lil. convall. Miſl. (vel plur.)
Superfundere Vini albi generof.
Mensur. iij. stent simul in loco fri-
gido, S. (14.) postea destilla per MB.
Destillato iterum adde
Cinamom. 3ij.
Cubebar. 3ij.
Caryophyll. 3ij.
Macis,
Galang.
Zinzib.
Zedoar.
Croc. Oran. 3ij.
M. Stent bene obturata aliquan-
diu. Hinc adde
Flor. Lavendul. recent. Mj.
Spic. nostrat. Mf.
Stent iterum aliquot dies.
Hinc destilla in MB. Ex fecibus ex-
trahere S., destillatōque adde,
N. Sunt quā destillatum ante Salis ad-
mixtionem super ocul. 69. preparat. 3ij.
destillat. Verum ut suprà monui, re-
ticius destillato admiscetur.
Vires. Convenit gravidis terrorem
passis, præcavet abortum, fœtūque con-
fortat.
27. V. Theriacalis s. contra Pestem,
28. Succi Galeg.
Acetos.
Scord.
Citri, ana. lib. 1.
Theriac. opt. 3ij.
Mista digerantur aliquandiu, postea
destillentur. Dosis cochl. 1.
adj. &c.

138 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

28. V. Theriacalis Croll. s. Spiritus
Theriacalis camphoratus.

29. Theriac. Andromach. 3v.

Myrrh. rubr. 3ij.

Croc. Orient. 3g.

Camphor. 3ij.

Mixtis superfunde V rectificatis. 3x. stent in loco tepido, cucurbita imposito alembico, bene clausa, ♂. (24.) Hinc destilla in MB. à lentissimo calore gradatim ascendendo. Sic Spiritus prodit elegans, quem reaſfundit materiæ in cucurbita, digere, atque denud destilla, idque vice tertia.

N. Sunt quis Camphoram in XX ponunt, alij contrà Camphoram omittunt, Spiritumque Theriacalem simplicem vocant

Vires. Egregius esse usus est in Pestes, ciet sudorem; resistit veneno. Sennert. in Institut. Hartmannus in Croll. Finck. in Enchirid. &c. Dosis 3. i.

29. V. De Tribus. Mixtura de tribus. Mixtura simplex.

Diaphoreticum in peracutis.

30. Spirit. 3i rectif. 3ij.
♀ 3j.

Aq. Theriacal. Camphorat. 3v. M. Vires. Ciet sudorem, resistit purporedini, magnarumque virium censetur in febribus malignis.

Dosis, 3j plus minus.

30. Δ. Trifantis.

31. Nuc. Mosch. lib. 1.

Macer.

Zinzib.

Granor. paradis.

Caryophyll. an. 3iB.

Rhabatb. opt. 3j.

Castor.

Spicæ nard. ana. 3B.

Ol. laurini, 3ij.

M. & fac ut aromata mancant integra, infunde Vini optimi lib. xiiij. maceráque in vitro clauso septiman. 4. Dein cola, speciésque omnes contunde ad pulmenti formam, addanturque postea liquori colato, iterum stent per ♂. 3. saepius agitando. Denique destilla in MB

Vires. Cephaliu & veterina est, crassos flatus discentit.

31. V. Vitæ Mulierum, Germ. VVciber Aqua Vit.

32. Cinamom. acerr.

Nucif.

Macis,

Zinzib.

Garyophyllor.

Gran. paradis.

Cubebar.

Cardamom. an. 3ij. (alij 3iB.)

Piper.long. 3j. (alij rectius 3B.)

Galang. 3B. (alij rectius 3j.)

Zedoar. 3j. (alij omittunt.)

Pulverisentur singula seorsim permisceanturque. Hinc adde Fol. Sale. min.

Menth. crisp.

Fenic. ana. Mj. (alij Melissæ & meliūs,)

Affunde Vini generosi Mens. iii. mace

C A P V T

XXXVIII.

139

maceraque vase clauso ♂ (14) postea destilla in MB. vel vesica stan-no oblitera.

Vites. Utrum corroborat, suffoca-tiones eius compescit, statim discessit, id-que adeò feliciter, ut generosis ac nobili-bus mulieribus Palatinatus, instar Pa-nacee in morbis uterini habeatur. Cor-roborat insuper ac calfacit ventriculum, caput, ac reliqua viscera. Exiccat ca-tarrhos.

Dosis à cochl. fl. ad 1. &c.
Medull. destillatoria, Clar. D. D.

VEICKARD. in Thes. Pharmac.

32. V. Virtuum/

¶. Cinamom. cl.

Gran. Paradisi, ana. 3j.

Nucif.

Caryophyll.

Zinzib. ana. 3fl.

Macis,

Galang. an. 3ij.

Salv. 3vj.

Vini Rhenani lib. vj.

Incisa & contusa infundantur per
24. F. destillatio.

Vires easdem obtinet cum precedenti.

33. Aqua vomitina Plateri.

¶. Nuc. jugland. virid.

Rad. raphan. an. part. ij.

Acet. Vini, part. iij.

Conquassatis nucibus & rapha-no, F. digestio leni calore, dies (5.
vel 6.) postea destilla ex MB.

Dosis ab 3fl. ad 3ij.

N. Nonnulli fortiorum reddunt, ad-dendo nonnihil aqua benedictæ.

C A P. XXXIX.

De Aquis reliquis.

Praeter aquas destillatas sunt & a-pliae officinales, ex destillatissimis sc. simpliciis fontana, &c. accedente rerum aliarum incoctione, infusio-ne, admixtione, resultantes.

Modus parandi nihil discrepat à modo decoctionis, infusionis, alijs tradito.

Vitiationes huius formula sunt.

1. V. Ophthalmica, F. F.

Ophthalmd. Bruni; 2.

Ophth. Quercet. 3.

Saphirea. 4.

Viridis. Collyr. Virid. 5.

Perlarum. 6.

Lac virginis. 7.

Caustica. 8.

1. V. Ophthalmica, F. F.

¶. Ophth. alb. 3ij.

Baccar. Laut. excoct. 3ij.

Aq. rosar. alb.

fœnic. an. lib. j.

Bulliant I. Δ. in cucurbita vitrea ad consumptionem medietatis, hinc adde Camphoræ 3ij. M. Filtra per chartam.

2. V. Ophthalm. Bruni. Collyrium

Bruni.

¶. Vini albi.

V. Rosar. alb. ana. 3iij.

Aloës Hepatic. subtiliter pulv. 3j.

F. Collyrium.

140 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Vires. Commendatur ad palpebrarum scabiem pruriginosam.

3. ∇ . Ophthalmica Quercetani.

$\text{v}.$ Croc. metall. 3j. vel 3ij.

Infunde in ∇ Euphrag. fœnic. aut simil. 3v. vel vj.

Vires. Virtus mira est contra amblyopiam, amauostim & suffusionem.

4. ∇ . Saphirea ad oculos.

$\text{v}.$ Lixivij H cum ∇ fontan. facti, & filtrati, q. v.

In hoc solve \star parum.

Id ubi exacte solutum fuerit, a quam hanc in ænam pélvim congię per noctem, & Saphiri acquireret colorem, &c. estque diaphana in vitro seposita.

Vires. Ad omnia fere oculorum vitia, immo ad ulcera quavis mundanda utilissima; cancrum, ambustionem, aliaque multa vitia, sanare perhibetur. Oculis aliquot gutta tantum imponuntur, prout scilicet multum parumve salis arisve continerit. Efficaciter est ad pelles oculorum auferendas. Potest diluti ∇ still. fœniculi, Euphrag. &c.

N. Est usitatissima Agyrta.

5. ∇ . Viridis. Collyrium viride.

$\text{v}.$ Aerug. æris 3ij.

Auripigment. cinnini, 3j.

Aq. ros. alb.

Plantag.

Vini alb. ana 3ij.

M. Bulliant simul, maneatque liquor super materiam.

Vires. Vire est in Pterygio, si oculo instilletur.

Huc pertinent Aquæ Cordiales, Germ. Krafftvasser, quæ si lac colore amulentur, lac emulsione dicuntur, sicut que ex ∇ Stillatioris, pulveribus, aliisque cordialibus.

6. Aqua perlarm, in Officina visualis,

$\text{v}.$ Aqu. Rosar.

Borrag.

Buglos. ana 3ij.

Manus Christi perlat. 3j.

Sacchar. cand. 3 β . M.

Aliæ.

7. Aqu. acetos.

Borrag.

Buglos.

Rosar. ana 3ij.

Manus Christi perlat. 3ij.

Margarit. præparat. 3 β .

Syrup. Granat. 3j. M.

Vires. Vulgo notissima sunt, virose ad quas in extremis, tanquam ad ultimum levam cōfugitur. cochl. subinde propinato.

Huius quoque loci sum & alijs liquores Aquei; vt.

7. Lac. Virginis.

$\text{v}.$ Aqu. solan.

nymph. lactuc.

Aceti ana 3ij.

Dissolvantur in his.

Lithargyr. argent. 3j.

Cerul. candid. 3ij.

Camphor. 3j.

Stent aliquot horis dum resedent, quæ crassa sunt; tum transcolentur per filtrum, aut cibrum setaceum.

viss

Vsus magnus lactis huies est, non solum in decorandis Virginibus, acquirendisque nitore faciet, sed & inseparabile emendanda, sanguineque fistendosum ad passum frontem id est, passagum more rugatum explanandam, exporrigitur amque.

N.¹. Aliud vide apud August.

8. *Aqua caustica, F. F.*
8. *Spirit. Vini rectific. 3iij.*

Pulv. Gattyophyl. 3j.

Zinzib.
Cinamom.

Pulv. Cetus.

Alum. roch. ana. gr. viij.

Anti zib.

Misceantur optimè, & serventur
in vase optimè clauso.

Vites. Mundificat vulnera inver-
terata, excrecentias exedit.

C A P . X L .

De Balsamis Odoriferis.

Balsami significations varia de-
dimus libt. 1. Earum tres sunt,
que peculiarem sibi in Officina ven-
dican locum. Balsami scil. odorifi-
eri, Balsami destillati, & Balsami
vnguentarij: de prioribus hic loci
agere convenit, de posterioribus
infra.

Balsami odoriferi sunt medicamen-
ta, cum vnguentis crassitie certan-
tia, imò plerunque duriora: parata
vt olea odorifera corpore crassiori
retineantur, quo minus exhalent.

Corpora, quib. olea illa incorpo-
ratur, sunt 1. Cera alba depurata.
2. Oleum nucis moschatæ expre-
sum, tum per se, id est, non depu-
ratum, tum depuratum. 3. Me-
dulla vituli lota. 4. Manna depu-
tata.

N. *Quercetani Calestem Mannam,*
quam in Pharmacop. Rest. cap. 26. ma-
ximoperè deprivat, alijs Saccharum de-
puratum interpretantur, alijs aliter. Ve-

rum enim verò nihil aliud à Quercetano
intelligi, quam ceram depuratam, ex
scriptis ejus parallelis liquet. Nimirum
in tetrode, acetum Philosophicum ex a-
cido liquore. Manna Calestis parare do-
cet, id quod de melle intelligi, cera scil.
germano fratre, demonstratur in enoda-
tione menstruorum, cap. 57, infrā.

Depuratio cere & olei Nucistæ
fit per V, in primis tisatum, eius
beneficio color & odor s. a. extra-
hitur, relicto corpore albo, hujus
loci idoneo.

N. Aly 8. Cera alb. p.vj.Ol. amygdal. d. recent. p. 1. V ad eminentiam
digiti unius; digerunt dierum (3.) hinc ab-
stracta humiditate in MR. Corpus reli-
quum balsamis conficiendis adhibent.

Modus vulgaris. 8. Corpus re-
quisitum, admisce olei q. s. vt f. in-
star linimenti, quod tingunt colore
debito.

Modus praestantior. 8. Corpus
(Ol. Nucist. depurat.) adde extra-
ctum

142 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Etum rei, cuius Balsamus expetitur,
hinc admisce quoque oleum.

N. Proportio inter extractum &
oleum est ferè tripla, Oleis oil. 3 Extracti.

Balsama visitatoria sunt.

Balsam, Angelicæ.

Anisi.

Apoplecticum.

vide infra 1. 2. 3.

Arantiorum.

Caryophyllorum.

Cinnamomi.

Citri.

Cubebatum.

Lavendulæ.

Maceris.

Majoranæ.

Menthæ.

Nucis moschatae.

Rorismatini.

Rosarum.

Rutæ.

Succini.

Zedoarizæ.

De his vide suis locis, libr. 4.

1. Balsamum apoplecticum Crollij secundum F. F.

2. Ol. Nucist. expr. 3ij.

Ambr. nigr. 3ij. grif. 3ij.

Mosch. opt. 3il.

Zibeth. 3ii. f.

Ol. Cinam. 3f.

Majoran.

Lauend. ana. 3f.

Caryophyll. gr. vij.

Succin. 3ff.

Cum Balsamo Indico, q. s. f. Balsamum.

2. Aliter.

3. Confect. anacard. 3ij.

Ol. succin.

Lavendul. ana. gran. iiij. vel
plura.

Zibeth. 3ij.

M. F. Balsam.

Vires. Confortat caput, frigidosque
humores discutit, adeoque in Apoplexia,
Syncope, Paralyse, & similibus affecti-
bus convenit, naribus inditus, vel quoquo
modo applicatus.

N. Multieribus ob suavitatem mi-
nus commode adhibetur.

3. Aliud, Cl. D. D. Arn. VV eickhardi.

4. Ol. mastich. vulg. 3j.

stillat. caryophyll. gran. vij.

Succin. alb. gran. iiiij.

Lil. convall. gran. iiiij.

Cum pauca cera virginea, F. Bal-
samum.

Vires. Confert ad effectus capitis fri-
gidos, VV eickhard. Thesaur. Pharma-
cetic. lib. 6.

C A P. X L I.

De Balsamis destillatis.

Balsami destillati nihil sunt aliud matibus, & similibus, interveniente
quam destillati Spiritus, cum Olei Vini Spiritu prolecti.
portione ex resinis, gummatis, aro-

visitatores sunt.

Balsamus

Balsamus vita, vide infra 1.
 nervinus, 2.
 anti-arthriticus, 3.
 Petri de Ebano, v. in dispensat. August. Oleum Balsami.
 Huc pertinet & Liquor seu Balsamus Saponis, v. infr. 4.

1. *Balsamus vita.*

¶. Myrrh. cl.
 Aloës epat.
 Oliban.
 Balsam. Indic.
 Bdell.
 Ammoniac.
 Sarcocoll.
 Mastich.
 Gum. Arabic.
 Storac.
 Ladan.
 Baccar. laur.
 Axung. Castor. an. 3vj.
 Croc. 3iſſ.
 Nucif.
 Cinamom.
 Caryophyll.
 Gum. anime.
 Zedoar.
 Galang.
 Spic. Roman.
 Cardamom.
 Cubebar. ana. 3ij.
 Pulverisata & mixta infundantur
 in **V** rectific. ad eminent. digiti 1.
 digeranturque aliquandiu. Hinc deſtillentur per Retortam (vitream)
 in cineribus : A que lentissimo

lampadis rectificantur.
 Dein adde:
 ¶. Ol. Anthos,
 Maioran.
 Chamomill.
 Puleg.
 Hyslop.
 Salv.
 Rut.
 Spic.
 Lavendul. an. 3j.
 Thymi,
 Satureja,
 Cubebar.
 Zedoar.
 Nucif. expr. an. 3g.
 Cinamom.
 Caryophyllor.
 Rosar.
 Citri,
 Arantior.
 Foenic.
 Anis.
 Carvi, ana. 3ij.

M. F. Balsamus, digerendo ali-
 quandiu.

Vires. Cordiale est insigne, bala-
 sumque nostrum mirabiliter recreat,
 putredinem arct, sopitos spiritus vi-
 tales & animales excitat, cerebrum
 humidum ac debile confortat, flatus
 discutit, adeoque commendatur in
 Apoplexia, veterinis affectibus, lipo-
 thymia, &c. Quinimò adeò celebre his-
 ce in oris audit, ut instar Panacea in
 omnibus ferè morbis magnatibus expe-
 tatur ; usus eius tam externus, quam
 internus est.

144 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Dosis gutt. ij. iiiij. & plur.

2. *Balsamus nervinus.*

℞. Ol. Terebinth. ℥. j.

Lauri ℥ij. Misce.

Hnc adde Gum. Galban.

Elem. ana. ℥vj.

Heder.

Oliban. ana. ℥ij.

Mastich. ℥j.

Myrrh.

Aloës epat.

Laudan.

Castor. ana. ℥ij.

Pulverisata admisce oleis, stentque & aliquot (.) Dein

3. Galang.

Caryophyllor.

Cinamomi ana. ℥v.

Nucif.

Zedoar.

Cubebar. ana. ℥v.

Diptaini alb.

Consol maj. ana. ℥ij.

Pulverisata infunde in tibis. vel q. f. V. Hinc misce cum prioribus, ac destilla per XX vel 6 vitream in .: primò prodibit Spiritus, dein oleum flavum, ultimò nigricans: collige simul oleum flavum ac spiritum pro balsamo.

Vires. Calfacit, confortat nervos, Paralysin & Contraicturam sanat, ex-
trinsecus illitus.

3. *Balsamus anti-arbitriticus.*

℞. Mumie,

Mastich.

Thur.

Myrrh. an. ℥ij.

Gummi ammoniac.

bdelliij

opopanax.

Tartari, ana. ℥v.

Mellis

℞ Roman. ana ℥. ij.

Spir. Vini ℥. vj.

Destillentur per alembicum in receptaculum amplum, cum quintuplici cohobatione.

Corroborat articulos, corumque defluxiones exiccat, dolores arbitricos lenit.

N. Paulò aliter habet VVieckhard, Thes. Pharmac. lib. 6.

4. *Liquor seu Balsamus*

Saponis.

℞. Saponem Venetum incisum, affunde Spiritum Vini, atque semel ac iterum destilla; affunde denud eundem, & relinque in loco calido, postea per chartam filtra: est instar olei brunnei, seu spadicei coloris.

Vires. Sublevat podagricos dolores, si locus affectus eo illuminatur.

CAP.

C A P . X L I I .

De Bolis.

B Oli in officinis pro vſu nulli ex bilioſum.

Tant, ſed ex præſcriptione vſui extemporaneo parantur, idque vel miſcendo ſolū, vel iſpiffando, &c.

Fiunt ex Eleſtuarii, pulpis, conſervis, pulveribus in conſiſtentiam minū fluidam deglutibilemque re-dactis.

N. Cavendum ne ſapore ingrato abominabilis evadat,

Exempla.

I.

ꝝ. Rhabarb. pulveris. 3j.

Conſerv. Rosar. rec. 3ß.

Cum Syr. rosar. ſolv. F. Bolus.

II.

ꝝ. Eleſt. lenitiv. de manna. 3ß.
diaphaenic.

diacatholic. an. 3ij.

Cum ſaccharo alb. F. Bolus pro vice vna.

N. Addi potest & pulvis conveniens.
Vires. Purgat humorem ſerofum ac

III.

ꝝ. Conſerv. rosat. antiqu. 3ij.

Laudan. opiat. gran. ijß.

F. Bolus.

Conſert in fluxu alvi, & ſim. dolorem ſedat, ſomnum inducit.

IV.

ꝝ. Calliæ rec. extract. 3j.

Sem. anis. 9j.

Cum Oleo amygdal. dulc.rec.

F. Bolus in nephritide.

V.

ꝝ. Prunor. damasc. num. x.

Sebēſten. num. viij.

Pafful. enucl. 3ß.

Coquantur cum aqua, colen-türque fortiter. Hinc adde:

Pulp. caſs. 3ij. coquantur denuò ad ſpiſſitudinem mellis. Tunc adde:

Pulv. ſen. 3ij.

Cum Sacchar. F. Bolus pro 2. vi-cibus, &c.

C A P . X L I I I .

De Calcibus ſeu Caltinatis.

C Alcinationem ſex fieri modis di-ximus libr. i. Ex his duo, non niſi ignem requirunt, reliqui aliud ali-quit (Δ potentiale vocant) iſu-per expetunt, cuius beneficio calci-natio peragatur.

Mineralium calcinationes dabi-mus ſigillatim, libr. 3.

Vegetabilia, v. gr. herbe, radices, ligna, cortices, aliaque ολόγια igne comburuntur luculento, donec in cinerem fuerint redacta.

N. Simili modo incinerari possunt, & capita mortua ex destillationibus residua, si super laminam ferreanam vel infusibili comburantur.

Animalia, horumque partes molliores comburuntur ut plurimum infusilibus (clausis & lutatis) ad nigredinem usque. Sic aves comburuntur cum pennis, lepus cum pelle, &c.

Cornua, triplici exponuntur calcinationi : Ustioni, vaporationi & corrosioni ; quam præcipitationem alij vocant.

Ustione comburuntur cornua, donec per nigredinem albida facta sint. Idque plerunque in fornace figurinâ fieri solet. Hinc cornua vista dicta.

Vaporosæ calcinationis modus hic est : Cornua suspenduntur ponunturve in capitello, partére superiore Vesicæ, quæ aliquotâ liquoris portione adimpta sit : hinc subitus accendit ignis, ut vapor vi caloris elevatus, cornua penetrando, friabilia paulatim candidaque redat.

N. Opus hoc est ferè ♂ 3. diciturque philosophicè calcinari.

Liquor adhiberi poterit vel simplex, destillatæ appropria ta, vel succus decoctumve medicæ intentioni respondens. Liquor autem ne quâ penitus exhaleret, recentem subinde affundere oportet.

Corrofiva calcinatio fit affusis liquoribus acidis, v. g. aceto, spiritu

Oli, Oli, & sim. quibus scil. ossa vel cornua grossè contusa, rasâe solvuntur, corroduntur, postmodumque in calcem (quam magisterium vocant) præcipitantur. Vide c. 67.

N. Simili modo calcinantur & crustacea.

Modus porrò calcinationis ut diuersus est : ita calcinata diuersorum sunt nominum. Hinc calces, cineres, croci, salia vista.

Sic sunt:

Calx Osis, vide lib. 3.

Dox, vide lib. 3.

Cineres plurimi, è quibus tamen officinis 4. visitatores, adeoque καλλιέργεια, 4. Cineres dicti,

Absynthij,
Fabarum è stramine.

Genistæ,

Sarmentorum Iuniperi.

Crocus Metallorum, vide
lib.

Martis aperitivus lib.

—adstrictivus, 3.

Veneris.

Visti, f. combusti Cancri,

Cervorum pulli,
Cuculus,

Erinaceus,

Hitundo,

Lepus,

Passer troglodytes,

Serpens,

Cornu cerui vista,

— alcis,

Vngula equi.

CAP. XLIV.

CAP. XLIV.

De Cataplasmatis.

Cataplasmata fiunt ex rebus medicamentalibus, quæ vel pulverisata, vel quoquo modo in pultis consistentiam, live per se, sive adhibita humiditate redigi possunt: præcipue tamen parantur ex herbis, (viridibus siccis ve) radicibus, floribus, seminibus, oleis, fructibus, axungiis, farinis, micias panis, & similibus.

Modus fieri adhibetur pro re nata; cum, vel sine igne. Sine igne fit ex herbis viridibus, contusis aut eatum succis expressis, aliisve liquoribus convenientibus, quibus reliqua admiscentur, ut fiat pulticula instar. Ignis beneficio coquuntur res cum liquore conveniente in cataplasma: vel fructus succulentis ut mollescant elixantur, hinc exprimitur pulpa per setaceum, eique reliqua admiscentur.

N. 1. *Liquor pro rei necessitate varius est, aqua, lac, vinum, & simil.*

N. 2. *Sicca prestat optimè pulverisare, viridia conquaßare, & ad putrificationem coquere.*

Officinalia nulla extant.

Exemplo ergo sint:

Cataplisma resolutivum Foresti. 1. contra cruentum, *Terbād* 2. de nido hirundinis. 3. *Anacollema*. 4. *Sinapismus*, s. *Vesicatorium*. 6.

1. *Cataplasmare resolutivum Foresti.*
2. *Flor. Chamomill.*

Stoechad.

3. *Sum. Absynth.*

Rut.

Caulium & stipitum eorum.

Salv.

Sabin. an. Mj.

Coque omnia simul in lixivio

ex cinere quercus vel sambuci, vel vitis albæ; deinde pistentur, addendo pulverem, qui

g. Alumin.

Sulphur.

Gallar.

Cypres.

Sal. commun. an. 3ij.

Aloës,

Baccar. Laur.

Pyrethr.

Sem. caul. an. 3ij.

In fine addatur stercus recens columbarum vel caprarum.

Vires. *Resolvit crassos humores, ac tumores inde ortos, ut varices, elephantiam Arabum. Forest. lib. XXIX. observat. 25.*

2. *Cataplisma contra Cruorem, vulgo Terband.*

g. Boli armén. 3ij.

Creta 3j.

Prunor. Sylvestr. sicc. 3j.

Pulverisa quam minutissimè, & coque cū aceto acerrimo, hinc admisce:

148 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Radic. symphyt. pulverisat. pa-

Cataplasmatis notandum,) applica-

rum.
In fine adde Farinæ avenac. q. s.
ad consistentiam cataplasmati, sub-

tum.

ad instillando nonnihil olei myr-

tilorum.

Vires. *Cruorem ex casu vel contusio-*
ne collectum resolvit & seccat. Felix
Vires. in Chirurgia.

Huc pertinent & *Anacollemata*,

ex terra sigillata, bolo armeno, sanguine
draconis, cerasa, pice, resina, succino,
lapid. calamin. succo acacia, & similibus
adstringentibus & exiccatibus.

quæ nihil aliud sunt quam Cata-

3. *Cataplasma de nido hirundinis*

Mysicht.

* Nidi hirundinis, num. i.

Alb. græci, 3ij.

Rad. Altha.

Lil. alb. an. 3j.

Caricar. ping.

Dactylor. ana. num. iii.

Coque in V ad remanentiam pul-

tis, postea adde :

Ol. Violar.

Farin. Chamæmel.

Fœnigr.

Sem. Lin.

Tritic. ana. 3vj.

Cerebr. cati. 3j.

Pulv. noct. combust.

hitund. combust. ana. 3ij.

Vitell. ovor. num. ij.

Croc. Orient. 3j. M. F. Catapl.

Commendatur in angina desperata
colla sapina tepide (id quod de omnibus

g

Mastich.

Thur.

Myrrh. ana. 3ij.

Bol. arm.

Pulv. later. an. 3j.

Croci 3j.

Cum Albumin. ovi, Ol. rosac. &
pauxillo acet. F. Frontale.

Vires. Prodest in lippitudine aliquæ
affectionis oculorum, fronti impositum.

Alijud.

Argillæ vstæ.

Farinæ volatil. Staubmeel.

Boli armen. an. 3j.

Suc. Acac.

Hypocist. an. 3ij.

Cum Album. ovi, & modico ace-

to, F. Frontale.

Vires. Convenit in Hemorrhagi-

narium.

Huc referendi sunt & Sinapis

vesicatoriæque in forma

Cataplasmatis.

Hæc sunt ex sem. Sintapi, nastur-

tij, viticæ; radic. thapsizæ, cyclamin.

bryon. scillæ, allij, Euphorb. can-

tharid. & similibus, susceptis pulpâ

ficuum, fermento, melle, oxyme-

lite.

C A P U T I X L V . 149

lite, sapone & similibus.
 s. E. gr. *Sinapis mus.*
 Re. Pulpæ caricat. (in \ddagger coctar.)
 3ij.
 Sem. sinap. 3j. M.
 Ruborem cuti inducit.
 6. *Vesicatorium.*

Re. Cantharid. præparat. (i. e. alis
 & capitibus abscessis,) num. xxx.
 Fermenti acris, 3j.
 Cantharides pulverisatae suscipi-
 antur fermento, humectando, si
 opus si, aceto actri.

C A P . X L V .

De Clysteribus.

Clysmus, Clyisma, Enema est li-
 quor imprægnatus facultate me-
 dicamentali, per syphonem in inte-
 stina intromittendus.

Duo ergo continet. 1. Liquo-
 tem. 2. Facultates, quibus liquor
 imprægnatur.

Liquor is, est decoctum (planta-
 rum, pisorum, carnis, &c.) vel si-
 milis humor. Medici intentioni com-
 modus. E. gr. Vrina, lac, serum la-
 etis, oleum, & simil.

Facultates Clysterorum variae esse
 possunt, purgantes, alterantes, ano-
 dynæ, lithontripticæ, carminativæ,
 abstringentes, adstringentes, & cæt.
 Inter cæteros tamen vñstatiōes sunt
 clysteres purgantes, qui vñpluti
 mūm compositi sunt, hñntque ex
 partibus (4. 5.) decocti alienius e-
 mollientis, partib. (1. 2.) olei, ad-
 ditis insuper purgantibus ac stimu-
 lantibus, aliis v. gr. Electuariis, spe-
 ciebus & similib.

N. Purgantium dosis duplo maior
 esse potest in clysteribus, quam in assu-
 mendis: oleum additur ubi emoliendum

erit; omittitur ubi fortiter purgandum
 & revellendum.

Dosis est ab 3ij. in infantibus, ad
 xij. vel xv. in adultis.

Modus parandi liquecet uno ac
 altero exemplo:

Re. Vrina lb. 1. F. Clyisma in Hy-
 drope.

Re. Oleum Olivat 3v. vi. viij. F.
 Clyisma ad leniendam alvum.

Re. Herb. emoll. ana. M. ij.

Rad. Alth. 3j.

Fl. Chamomill. M. 6.

Fic. ping. N. v.

Vitell. ovi, num. 1.

Coque in f. q. aquæ ad lb. 1.

In colatura dissolv. caſſ. pro Cly-
 steribus 3yj. Bened. laxat. 3b. Ol.
 Chamæmel. 3ij. Sal gemma. 3j. vel
 Sacchar. rubr. 3b. ad 3j. F. Clyſ-
 ma.

N. Sunt qui ſal commun. vel gem-
 ma. ad 3j. Usque iniicitur. Verum quia
 podex locus maximè ſenſibilis eſt, pre-
 ſtat doſin hanc immixtare.

Huc referendi quoque ſunt Cly-
 steres vterini (ματσούχυτα) qui
 ſtiderunt

itidem sunt liquores medicamentales per syphonem (*ματσεγχύτην*) in uterum fundendi. Liquor itidem hic varius adhiberi potest, aqua stillatitia, decoctum, succus vel simile quid, cui pro rei exigentia admiscentur pulveres, Eleutharia, olea & simil.

Dosis pro vice vnâ sufficiens est 3ij. vel v. vij præter propter.

Exemplo sint.

1. R. Decocti Equiseti & Tormentill. 3ij. Olei Myrtin. 3iij. Trichisc. de spod. 3j. M. F. Clyster, in mensum fluxu.

2. R. Hydromel. 3ij. v. mell. 3iij. F. Clyster ad eluendum uterum.
3. R. Succ. mercurialis depurati, vel decoct. rubiae tintæ. Eryng. aut cyclaminis, vel radic. aper. vel salviae, matricariae, nepetae 3ij. Pulv. myrræ 3ij. F. Clyster ad promovenda menstrua.

Ad hunc locum pertinent & Injections penis, quæ itidem ex liquore conueniente fiunt, sive decoctum is sit, sive aqua stillatitia, vel similis.

C A P. XLVI.

De Conditi.

Conditorum constitutionem absolvunt res condienda, ac liquor condiens, quibus pro libitu aromatizans accedit.

Res conditi aptæ sunt, *radices, cortices, caules, fructus, nucæ, & flores* a liquo.

Duo in rebus condiendis præcipue consideranda occurunt.

1. Quia res condienda vi liquoris intus ac extus perfundi postularat, mollem illam esse nec nimis crassam oportet.

2. Quia esui condita præcipue destinantur, haud ingrata ac gusto abominabilia ea sint, fas est. Hinc si durior & amarior res condienda fuerit, maceretur antea in ∇ frigidâ dies (5, 6, 7, 8, pro re nata) sanguinis diebus aquam deplendo, recen-

témque dando, vel coquatur insuper donec mollescat, amarorque quodammodo extrahatur. Cave autem ne nimiâ extractione solum cadaver condiendum relinquatur. His adde, si crassior, major, solidior res condienda foret, secundam eam esse, pro exigentia, secundum longitudinem, latitudinem, tessulatum, &c.

N. 1. Loco aquæ nonnunquam lixivio macerare expedit, his aquâ simpli- ci dulcorare.

N. 2. Quod si libnerit condita aromati-

zare, aromata condiendis infigi poterunt. Liquor, quo res condiuntur est Saccharum clarificatum & syrupsatum, id est, in aquo liquore dissolutum ad syrupsu consistentiam, nonnunquam mel depuratum, aliquando muria.

Sic

C A P V T X L V I .

151

Sic conduntur:

I. Radices.

¶. Radices benè purgatas (integras si teneræ fuerint, vel sectas, si crassiores) exemptis si opus sit lignosis partibus, redige ad mollitiem, & si opus sit, ad saporem gratiorem, ut docui: hinc sicca, & cum Sacchari ana, circiter, tantillóque decocti proprij, vel aquæ, coque ad consumptionem humiditatis, consistentiamque Syrupi.

II. Cortices.

Cortices nihil à radicibus peculiare habent.

III. Caules.

¶. Caules (à pellicula exteriori purgatos) reduc ad mollitiem, hinc coque cum ana Sacchari in decocto soluti, ad consistentiam.

IV. Fructus.

¶. Fructus molliores (e. gr. cerasa, baccas, ribes, berberes, mala persica, & simil.) affunde Sacchari Syrupisati, vel mellis part. dimidiam, coque ad consumptionem humiditatis. (aliás situm contrahit.)

Durores, vt poma citria, cytonia, & simil. priùs ad mollitiem redigendi sunt, amariores ad saporem gratiorem. Limonia & olivæ muriae imponuntur.

V. Nuces.

¶. Nuces virides, perfora stylo, macera dies (9. 10.) in V frigida l. a. hinc coque vt mollescant; secatas aromatifa, configendo cina-

momo aut caryophyllis, cùmque sacchari ana. ac aquæ q. s. coque.

VI. Flores.

Flores conduntur affusione Sacchari syrupsati. Sunt autem pauci qui hac ratione integri conduntur, scilicet flores citri, arantiorum, & interdum rosarum. Ex reliquis fiunt potius conservæ. Capparum flores sale; genistæ sale & aceto conduntur.

N. Sunt qui flores albumine ovi conquassato illitos saccharo pulverisato apergunt, solis calori exponunt, florésque bac ratione integros coloratosque conservant.

Condita officinalia visitatoria sunt.
Condita Aurantia poma integra ac in partes dissecta.

Aurantiorum flores

— cortic.

Berberes.

Borrugin. rad.

Calami aromat. radic.

Cassia.

Cerasa amarena.

Cichor. rad.

Citria poma integra.

— in taleolis.

Citria maxima cum Carne, Germ.

Citrinat.

Citria sicca, truckener Citrinat.

Citri cortices, eingemachte Citron-Schalen.

— flores.

Consolid. maj. rad.

Corna.

152 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Cydonia, eingemachte Quirtin.	ckerbierlein, oder muscateller Bieren.
Cynosbati baccæ, eingemachte Ham- butten.	Rhabarbarum.
Enula rad.	Ribes.
Eryngij rad.	Satyrij rad.
Laetucæ Hisp. caules siccæ, truckne <i>Latuc.</i>	Scorzonera rad.
Mala armeniaca præcoccia, einge- machte Mælelen, oder <i>Mammeleucken.</i>	Sorba, eingemachte Speyerling.
Mespila integra.	Zedoatæ rad.
Mirobalani Bellitic. afferun- Chebulæ tur con- Citrinæ dita ex Embllicæ India.	Zingiber Chinense. — commune. Huc & passim laxativæ.
Nuces Indicae, scilicet moschatae, cum involucris, ganze Musa- cauñis mit den Schelffen.	Sunt & que conduntur aceto, sale, & simil. ut Modus condendi est.
Nuces moschatae, scilicet sine involu- luctis, eingemachte Muscat- nüs ohne Schelffen.	1. Consperge cum sale ac com- prime, vt sal in exudante humiditate liquefaciat.
Nuces Iuglandes.	N. Si res condienda minus succulen- ta fuerit, affundi poterit modicum Væ.
Perfica.	2. Affunde \ddagger stentque vt penetrat, vel si nimium liquoris sit, exhalat aliquantulum.
Pimpinellæ rad.	Sic prostant.
Piper nigr. in racemis ex India affertur.	Condit. Cappares.
Pruna sylvestria, eingemachte Schleben.	Cucumeres.
Pruna citrina, eingemachte Spelling.	Oculi genistæ.
Pyra muscatella, eingemachte Zu-	Limonia poma.
	Olivæ.
	Portulacæ summitates.

C A P. XLVII.

De Confectionibus Saccharatis.

Confectiones Saccharatae;
id est :

R E Saccharato obductæ, sunt.
1. Saccharatae sc. seu Saccha-

raceæ simpliciter ita dictæ. 2. Con-
fectiones Saccharo candi seu candi-
fato incrustatae. His 3. subjungere
licet Sacchara succis florum certo-
rum

rum sub colore horundem imprægnata. Sacchara infuscata non immerito vocaveris.

*Modus conficiendi confectiones
Saccharatas.*

R. Rem conficiendam, inde pelvi cupreae (Germ. *Confect Kessel.*) saccharumque syrupsatum paulatim instillando, continuo supra calorē versa, ut humiditate absumptā Saccharum rei conficiendae adhæreat, ac tandem instar crustæ eandem obducatur.

Res qua hoc modo conficiuntur sunt *semina*, nuclei exorticati, aromatica, radices, cortices, ut & flores ac summitates, sed raro.

N. 1. *Semina si opus sit, præparantur prius macerando in \ddagger , ut semen Coriandri.*

N. 2. *Si amariora conficienda fuerint, corrigi volunt anteā, ad modum, quem in conditis docuimus.*

Res quā confectiones confiunt, est Saccharum Canatiense, interdum Saccharum candisatum.

Plerunque primū amylo res conficiendæ obducuntur, hinc Saccharum superducitur. Vnde duplicitis generis confectiones prostare solent; fine scil. ex mero saccharo, & minus fine ex amylo & saccharo, vti dictum, præparatae.

Modus conficiendi confectiones saccharo candidato incrustatas non differt fere à modo condiendi, nisi solā brodij condientis saccharati consistentiā, nimirum hoc si cras-

sius fuerit, saccharum in crystallos concrescit, resque injectas q. crustā obducit.

Confectiones visitationes Saccharatas.

Confectio Amygdalarum dulcium,
Germ. überzogene süsse Mandeln.

Amygd. amarar.

Anisi, überzogen Anis Samen.

Laxativi, Purgier Ani. Zucker.
Calami aromatici, überzogen Kal-

mus.

Cardamomi minoris, Cardamomen

Confect.

Carvi, id est, seminis, überzogen

Kümmel.

Caryophyllorum, überzogen Negel.

Cichorei rad. überzogen Cichorenvv.

Cinæ. Santonici, sem, lumbicotū,

überzogen VVurmsamen.

Cinamomi, Zimmet Confect, über-

zogen Zimmer.

Coriandri, überzogen Coriander.

— magni, mit großer Crispatur.

Corporis sine anima, confectio

Moschardina, moschata, Bisem

Zucker.

Cubebatum; überzogen Cubeben.

Dauci communis, überzogen vvoid

Mæbrensamem.

Feniculi.

Lavendulae florum.

Macis.

Majoranæ sem.

Pimpinellæ rad.

Pinearum.

Zedoaria.

Zingiberis.

154 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

*Confectiones. Candifata scilicet Saccharo
candi incrufatae.*
Confeccio Acori, Candifirten Calmus.
Aurantior. cort.
Caryophyllorum.
Cinnamomi.
Citronata, i. e. cort. citri
maior.

Citri cort. i. e. minor.
Macis.
Nucis moschat.
Zingiberis.
Sacchara insuccata
Saccharum rosaceum
— violaceum, &c.

C A P. XLVIII.

De Conservis.

Res conservandæ conservandaæ
vt plurimū flores sunt, raro
herbae, rariū radices, rarissimè caro
fructuum.

Modus.

*Bz. Quod conservare volueris,
conquaſla (mortario p̄cipue lapi-
deo pistillōque ligneo) atque inter
quaſlandum admisce Saccharum.*

Proportio Sacchari variat: In re-
bus humidioribus ac mucilaginosis
conservandis, recipitur duplum:
in siccioribus, ad triplum usque a-
scenditur, additūque nonnihil vā
stillatitiae.

*Flores & herbas recentes conser-
visare oportet, attamen si nimiā hu-
miditate scateant, in umbra exicca-
ri aliquantulum expertunt.*

*N. 1. Sunt qui ex floribus ac sac-
charo S.S.S. faciunt, ſolique idipſum ex-
ponunt. Alij Iulepum conficiunt, eū-
que admixendo conſervationem abſolvunt.*

*N. 2. Poteris iidem, ſi volueris,
flores vel herbas conſervandas in mi-*

*nutiſſimas antea incidere partes, hinc
addito Saccharo conſervare, vii dittum.*

Radices prius coquenda sunt, dein
conquaſlandæ, vel etiam per ſetaceum
trajiciendæ, hinc conſervandæ.

Caro fructuum omnino per ſe-
taceum trajici expertit.

*Conſerve uſitatores
ſunt.*

Conſerv. Absynthij Romani ē ſum-
mitatibus.

Acaciæ flor.

Acetosæ fol.

Acetosella fol.

Anthos, id est, flor. roſmar.

Betonic. fl.

Borragini. fl.

Buglossæ fl.

Calendul. fl.

Cardui bened. ſumm.

Cichorij ex fl.

Citr. pulpæ, ſ. medullæ.

Cochlearia fol.

Consolidæ major. flor.

Euphragie ſummit.

Fumaria ſuumit.

Gale

Galegæ summ.	Primulæ veris fl.
Genistæ flor.	Prunellæ fl.
Heder, terr. compos. Aug.	Pulegij summit.
Liliorum alb. fl.	Rosatum albar.
Lavendulæ fl.	rubrarum, recens & antiqu.
Liliorum convall.	Plata.
Maioranae summit.	Salviæ fl.
Malv. fl.	Sambuci fl.
Melis. fl.	Scabiosæ.
Menthæ fol.	Scordij.
Nymphaea alb. fl.	Tiliæ fl.
Papav. errat. fl.	Tunicæ fl. i. e. caryophyll. hort.
Portulacæ fol.	Tussilaginis fl.
Pœoniæ fl.	Veronicæ summit.
Perficornum fl.	Violarum martiarum.

C A P . I L.

De Decoctis.

DEcocta fieri possunt ex rebus o-
mnibus, quæ prona sunt vires
elixatione brodio suo communicare,
adēque ex mineralibus, vegetabilibus,
& animalibus.

E Mineralibus non respuunt decoctionem Terræ crudæ calcinatæ,
Lapides calcinati, Metalla calcina-
ta, Antimonium crudum & calcinatum, Qus crudus, cinnabaris, Li-
thargyrium, Ar. Nimirum aqua
etiam simpliæ incoctæ vires quasdam
impertiunt, maximè tamen, si adhi-
bitus fuerit liquor facultate pene-
trante gravidus, qualis Vinum, Ace-
tum, Aquæve stillatitiae. Quin &
Metalla ignobiliora, potissimum si
calcinata ea fuerint, verbi gratiâ, mi-
nium, cerusa, limatura ferri calcina-

ta, & sim. decoctioni apta sunt. De-
coquuntur autem hæc omnia, in pul-
veres redacta.

Ex Animalibus decoctioni parent
partes carnosæ, membranosa, cor-
nua tum cruda raspara, tum calci-
nata, & simil.

Verum enimverò, hîc loci de
Decoctis potissimum agemus potu-
lentis, in praxi vistationibus, quæ
Apozemata communiter dicuntur.
Hæc parantur in primis è vegetabili-
bus: videlicet è radicibus, cornicibus,
herbis, floribus, baccis, fructibus, lignis.
Superadditis tamen nonnunquam sed
raro nonnullis è mineralibus aut
animalibus.

Liquor in quo res ex communite-
re elixantur, est aqua fontana, (hæc ad-

hibenda, quoties alius alicuius mentio nulla fuerit facta,) aqua pluvia, aqua destillata, (sed non adeo commodè ob spirituosa portionis exhalationem, nisi coctio in diplomate instituatur,) serum lactis, hydromel, Vinum. Hoc præstat in fine coctionis superinfundere.

Quantitas liquoris ad res coquendas varia sumi solet, prout sc. res longiorem vel breviorem coctionem experientur. Duriores siquidem ac solidiores, ut diutius sunt coquendæ, ita maiorem liquoris quantitatem requirunt, quippe coctione liquor paulatim exhalat. Sumitur autem e. gr. proportio quadrupla, sextupla, decupla, duodecupla, &c. Respondent enim Manip. 1. 3. 3v. vel 3v. Pugillo 3ij. vel 3ij.

Modus parandi absolvitur.

1. Præparatione ad decoctionem.

2. Decoctione, 3. Clarificatione.

1. Præparatio fit incidendo, contundendo, radendo, limando, &c.

2. Decoctione fit vulgariter. 1. A nudo. 2. Vase aperto æneo stanno obducto. 3. Ordine observato, s. a. Est autem coquere s. a. materias coquendas non simul & semel injicere, sed diversis vicibus, priùs posteriùs, prout naturæ volatilioris, fixioris, mollioris, durioris, solidioris, res fuerint. Nimurum si cornua, ligna, cortices, radices, folia, semina, aromata ac flores dectioni destinantur, primùm cor-

nua, ligna, cortices & radices aliquandiu coquenda sunt; hinc folia ac semina superinjicienda; tandem quoque sub finem decoctionis, aromata & flores, vt pote quorum vis faciliè in auram evanescit.

N. Res duriores macerantur priùs aliquandiu.

3. Depuratio fit vulgariter albumine ovi, cum quo decoctum expressum, vel saltem colatum ebullit, quod dein per colum trajicitur. Vide lib. I. cap. 14. Clarific.

Vsurpatio: Quia saponis mindus grati ferè sunt decocta, gratia conciliatur Saccharo Syrupove, additâ ad singulas doses 3j. plus minus, pro palato ægroti. Quinimò & aromaticus sapor superaddi ferè solet, nonnihil ex aromatibus commiscendo.

Sunt decocta celebriora.

Decoctum

Alterans, vide infra N. 1.

Antimoniale, v. infra.

Aperitivum majus Aug.

----- cum Rhabarb. A.

----- minus s. lenitivum
minus A.

Capillorum venetus, A.

Carminativum Clysmaticū, Cord.

Clysterum remollientium, Cord.

Commune ad dissolvenda solutiua, Cord. Renod.

Commune Medicinale cum & si-
ne sena. A.

Epati

Epaticum 2.
Epatis vituli, 3.
Epithymi, A.
Florum & fructuum, A.
Fumaria.
Hystericum, 4.
Majale, 5.
Pectorale simplex & compositū A.
Purgans Quercetan. 6.
Splenis bovis, 7.
Senz, v. A.

Decoctum Alterans.

R. Santal, rubr. 3*lb.* (alij 3*vj.*)
Succ. citri recent. 3*lb.* (alij 3*j.*)
Sacchar. clarificat. 3*j.*
Aqu. fontan. purifs. 1*lb.* iij.

Stent in maceratione per noctem, manè coquantur ad 1*lb.* collectur, ac serventur pro v̄su.

N. Alij addant & Spir. Ⓣ i 3*j.*

Aliiter.

R. Santal. rubr. 3*lb.*
Sem. citr. 3*lb.*
Fl. Rosar. rubr. p. i*lb.*
Sacchar. candi. 3*j.*
Spir. Ⓣ i 3*lb.*
Aqu. fontan. 1*lb.* iij.

Digerantur per noctem, hinc decoquantur ad 1*lb.* iij*lb.*

Colatura adde

Rob. ribium,
Succ. citri,
Sacchar. depurat. an. 3*i.*

Vires. *Refrigerat, cor virésque confortat.*

Decoctum Ⓣ ale Cl. D. D.

Lud. ab Hornig.
R. Rad. sassafr. 3*j.*
Lign. visc. Querc.
Lentisc. an. 3*vj.*
Fol. Beton. M. j.
Parata pro decoctione coq. in
aq. pluvialis limpida Mensur. 1*lb.*
bulliant per 1*lb.* horæ, postea inde
3*j.* crudi 3*j.* in petiā ligati, & por-
tò bulliant donec mensura vna &
dimidia sit consumpta.

Vires. *Catarrhis medetur, sca-
biémque curat, impuritates tum per
insensilem transpirationem, tum per al-
vum educens. V̄sus : manè hanſus cali-
dè assumptus.*

*Decoctum Epatis-
cum.*

R. Rad. Aristoloch. rot. 3*j.*

Rhabarb. opt. 3*lb.*

Chamæleon. nigr. 3*ij.*

Rad. Petrosel.

Cichor. an. 3*vj.*

Cardopat. 3*ij.*

Herb. Endiv.

Scabios.

Betonic.

Acetos. an. M*B.*

Sem. Foenic. 3*j.*

F. Decoctio in V̄ font. 1*lb.*
iiij. ad consumpt. tertiae partis.

Decoctum Epatis Vituli.

R. Epar vitul. in frusta incisum.

Santal. rubr.

Cinamom. ana 3*lb.*

Spic. nardi.

Rosat.

158 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. IL

Rosat.rubr. ana p. i.

Conserv. flor. cichor. 3j.

Trochif. Rhabarb.

Eupator. ana 3vj.

Coque in phiala capaci benè occlusa, calore balnei ferventis horas 7. vel 8. donec hepar totum ferè in liquorem redactum sit, quem ad perfectionem decoque, addendo si velis saccharum.

Vires. Conducit in omnibus Epatis affectibus, & imbecillitatibus; in fluxu praesertim hepatico & hydropisi.

Dosis 3ij. iiiij. mane ac vesperi.

Quercetan. in Pharmacop. Rest. cap. 26.

N. Eodem modo fieri quoque possunt decocta Pulmonum non solum Vulpis, sed & Vituli & agni, addendo pectoralia affectibus pulmonum congrua. *Quercetan.*

Decoctum Hystericum.

¶. Herb. puleg.

Artemis.

Abrotan.

Matticar.

Meliss.

Verben.

Serpill. ana M. j.

Rad. Pimpinell.

Baccar. Lauri, ana 3ij.

Castor. 3j.

Sabin. 3ij.

M. & lege artis F. decoctum.

Vires. Ciet menses, uterumque rebatur.

Decoctum Majale.

¶. Herb. Fumar. Mj.

Summ. Lupul.

Cichor.

Agrimon.

Asplen.

Absynth. pont.an. Ms.

Rad. Polypod. 3ß.

Glycyrrhiz. 3ß.

Fol. Sen. 3ij.

Sem. Anis. 3ij.

Omnia quæ haberi possunt recentia, misce cum reliquis, ac coque in seri lactis tb. iiiij. ad tertias.

Colatura adhuc calidæ infunde per noctem,

Rhabarb. el. 3ij.

Spie. Indic.gran. viij.

Schœnanth. 3ß.

Ebulliant semel ac iterum, hinc colentur.

Vires. Sanguinem purificat.

Dosis 3iv.

Decoctum purgans pro delicatis.

Quercetan.

¶. Follicul. sen. f. st. 3vj.

Aqu. pomorum redolentium, aut fragorum q. f. pro vnâ vice.

Macera vase clauso per horas 24. addendo parum succi Limonum, hinc bulliant, fortiterque exprimantur: adde.

Succi pomorum redolentium recentis, 3iñ.

Sacchari candi si libet.

Clarifica cum albumine ovi, ac aromatiza cum v cinamomi.

Vires. Leniter purgat sine fastidio.

Decoctum splenis bovis.

¶. Splenem bovis integr. in frusta incisum.

Cina

Cinamom. grossè contus. 3j.

Caryophyllor. 3*g*.

Croc. 3ij.

Vini alb. seu malvatic. q. s. ad humectandam solummodo materiam.

Inde in vitrum capax, quod benè clausum in MB. ferventissimo, hor. 24. ebulliat, donec splen in particulas minutissimas coctus & consumptus fuerit, magnaque Iuris exquisitissimè cocti, & fragrantissimi copia restet.

Vires. Specificum est ad duritatem & obstructionem lienies, & mensum suppressionem.

Dosis 3*iiij*. continuando per quatuor aut quinque dies, cum mensis fluere soliti sunt. Quercetan. in Pharmac. Restit.

N. Potest itidem redigi in formam Extracti, vide infra.

Plures decoctorum formulas qui expetit, adeat Quercetanum in Pharmacop. rest. VVeckerum, Poterium, & simil.

C A P . L.

De Eclegmatis, Lohoch, Linetibus.

Materiam præbent pectoralia: videlicet pulveres, confertia, mucilagines, syrapi, decocta, mella, pulpæ, sapæ, & simil.

Modus parandi.

¶. Pulveres convenientes, fructus, gummi arabicum, Tragacanthum, succum glycyrrhizæ, amyllum, &c. incorpora (in mortario, pilo que ligneo) cum mellis, syrapi, mucilaginis, decocti, & simil. liquoris glutinosi, q. s. donec exactè mixta, & mellis consistentiam natæ fuerint.

Ex tempore quæ præscribuntur, fiunt ex Eclegmatis visualibus, pulverbis, confervis; cum syrup. q.s. incorporatis, vel ex solis syrupis, cu saccharat. cadi vel penidiati, q.s. mixtis.

N. 1. Decosta, itidem ac succi, in formam Eclegmatis cum Saccharo coqui possunt.

N. Proportio pulveris est ferè vnc. 3. ad syrup. vnc. ij.

Eclegmata visualia sunt.

Lohoch, ad asthma, s. scyllæ

compos.

de Cassia, vid. infra.

N. 1.

de Caulib.

de Farfara.

de Papavere.

Passulatum, N. aliud

vide infra 2.

de Pino.

de Portulaca.

de Pulmone vulpis.

Sanum & expertum.

è succo scyllæ.

1. Lohoch de Cassia pro Clysteribus.

¶. Fl. Herb. Malvæ,

Mercurial.

Parietar.

160 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Violar,	g. Passular. minor. vnc.iiij.
Betæ,	Sacchar. cand. vnc. ij.
Absynth. ana.	Aqu. Scabiosæ,
Coq. in f. q. aqu. ad tb. iv.	Foenic.
Adde pari pondere Medull. cass.	Farfar. ana vnc. ij.
& mellis despumati ana F. Lohoch.	F. l. a. Eclegma.
2. Lohoch. passularum, f. Electua-	Vites : Confert in Tussi: acrimoniam
- rium passulatum.	Catarrbororum mitigat.

C A P. L I.

De Eleætuariis & Mixturiis.

Electuaria sunt, vel molliora, (in consistentia confectionum opiatarum) vel solidiora in tabulis. Priora sunt huius loci.

Modus parandi varius est, adeoque potius exemplis, quam regulis demonstrabilis.

Electuaria vulgaria (confectiones opiatæ communiter appellatae) fiunt è pulveribus minutissimis, melle despumato calente, (raro saccharo syrupsato) susceptis, quibus solubilia si admiscenda ea sint, seorsim diffoluta subinde affunduntur, postmodumque ad fermentationem loco tepido reponuntur.

Reliqua fiunt solâ ferè mixturâ scil. pulverū, electuariorum visualium, conditorum (in frusta dissectorum) conservarum, extractorū seu essentiarum, & simil. quæ suscipiuntur liquore, maximèque syrups q. s. ad consistentiam. Et hæc dicuntur vulgo *mixture*.

N. Adduntur & interdum pauca guttula oleorum siccititorum, vel spirituum Θ^i , Θ^i ve.

Sunt Electuaria, tum alterantia, tum purgantia.

Electuaria alterantia visitatoria sunt.
Electuarium

Diacorum Aug.

Pseudoacori, vide infrā. N. 1.

Alexipharmacum 2.

de Ciconia 3.

Alkermes, f. Confectio Alkermes.

De Allio, 4.

Anacardinum ; f. confectio Anacardina, f. confectio Sapientum. A.

Antidotus Matthioli, A.

Archigenis, A.

Athanasia magna, A.

Aureum Alexandrinum, A.

Camphoratum, 5.

Chalybeatum A.

Chalybeatum, Horatij Augenij, 6.

Corroboran Specificum Croll. 7.

Cordial. 8.

de Croco, 9.

Diacodium, A.

Diureticum Montag. A.

de Ferri scoriis, A.

de baccis lauri Rhasis, A.

Micleta Nicolai, A.

Mithridatium. A. C.

Nucum. 10.

Diao

Diaolibanum, C.
 de Ovo,
 Papæ s. Guidonis contra pestem A.
 Philonium Mesuæ, A.
 perficum Mes. A.
 maius, f. Romanum Nicol. A.
 Tharsense Galeni, A.
 Regum. 11.
 Requies Nicolai cum saccharo, A.
 Resumptivum Fernelij.
 C.
 Dia-satyrium, A.
 Scorbuticum, 12.
 Dia-scordium Fracastor. A.
 Theriaca Andromachi, A.
 Diateffaron, A.
 Communis, A.
 Triphera magna, A.
 minor, A.
 Saracenica, A.
 El. Vitæ Arnold. de V. N.
N. Quia species aromaticæ ad eleetuaria, cum melle vel saccharo conficienda, ordinatae olim fuerunt, & harum plereque Eleetuarij nomine communiter adhuc veniunt, quas vide infra; Praestaret tamen species ab Eleetuaris distingueret.
 Eleetuaria lenientia visitatoria sunt:
 Eleetuar.
 Diacassia cum manna, A.
 Diacatholicum, Antidotus Catholica Nicolai, A.
 Diaprunis simpl. A.
 solutivum. Diadamascenum, A.
 Hiera piersa Galeni, f. simplex, A.
 Lenitivum Florenzolæ, A.
 de Manna, A.
 Triphera Persica Damasceni, A.

Eleet. *Purgantia visitatoria.*
 Eleetuar.
 Diasarum Fernelij, *vide infra.* 1.
 Antimoniale, 2.
 Benedicta laxativa, Nicol. A.
 Diabalzemer, f. Elect. Sennatum
 A. Renod.
 Diacarthami, f. Diacnicu, A.
 Caryocostinum, C.
 Catharticum Imperiale, Nicol. C.
 de Cistro solutivum, A. C.
 Diacydonites, f. Diacydonium la-
 xativum, A. N. *ad Gelatinas*
 referri potest.
 Episcopi, f. Elescoph. A.
 Hamech, f. confectio Hamech
 maior, A.
 Hiera composita, A.
 Logadij, A.
 Pacchij, Archigenis, Ruffi, f.
 Diacolocynthidos, A.
 Indum maius, A.
 Diaphoenicum Mesuæ, A.
 Fernelij, A.
 de Psyllio, Montagnanæ, A.
 Rosarum Mesuæ, A.
 de Suco rosarum Niccol. A.
 N. *Vistatius est in Tabulis.*
 Diaſebesten, Montagnanæ, A.
 Diaſenna Nicolai, A.
 Huc Paſſulæ laxativæ, A. C.
 ELECT: ALTERANTIA.
 1. Eleet. *Pseudoacori stomachicum.*
 2. Rad. *Pseudoacor. à cortice ex-*
 teriorē mundat. It. i. minutissimè in-
 cise & conqualitatæ infundantur in
 Vini rubr. f. q. ♂ ρ (3.4.) Hinc co-
 X 2

162 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

que ad consumptionem vini, molitiemque radicum,

Postmodum adde mellis depurat. libij. vel iij. iterum parum coctis addantur Zinzib. optimi minutim incis. 3. iij. vel iiiij. misceantur optimè l. Δ ab consistentiam; hinc remove ab Δ, & immisce.

Puly. Cinam. acer. vnc. 6.

Piper. long. 5ij.

Galang.

Nucif.

Macis.

Cubeb.

Cardamom. ana 3iij.

Gran. paradisi.

Piper. nigr. ana 3. i. plus minus F. Elect.

N. Alij admiscent amygdal. dulc. & pineas excoct.

Vires. Confortat stomachum & caput frigidum, excrementa incidente, exiccando, &c.

Dosis ad magnitud. avellane vel juglandis; manè ac vesperi.

Electuarium Alexipharmacum,
Cl. D. D. Petri de Sp. F. F.

¶. Rad. Diptamn.

Garyophyllat.

Cyper. rot. an. 3iij.

Afari 3vj.

Ireos flor. 3ij.

Fol. Rut.

Fl. Rosar. rubr. an. 3iij.

Fl. Diptamn. Cret. 3ij.

Spic. Indie. 3iij.

Cinamom.

Croc. Or. an. 3iij.

Baccar. Iunip.

Laur. an. 3. vj.

Mastich. 3iij.

Agar. troch.

Myrrh. el. an. 3ij.

Bol. arm. præp.

Spec. liberant. an. 3vj.

Contundantur subtilissime, & critrentur. Postea

¶. Nuc. jugland. 3ij.

Fic. pingu. 3ix.

Conquassentur simul, additòque modico vini, trajiciantur per cibrum ad pultis consistentiam. Deinde.

¶. Sacchar. opt. libij. 3ij.

Dissolve cum aquæ q. s. Δ lento.

Postea adde.

Mellis despumat. libij.

Coque ad aquæ consumptionem.

Deinde adde

Pulticulam illam sicuum & nucum, Theriac. Andr. 3ix.

Conserv. ros. rubr. libij.

Succ. Absynth. inspiss. 3iij.

Misce optimè cum spatula lignea: dein removeantur ab igne, & agitantur continuò, donec refrigent, postea adde pulveres, misceanturque perfectissimè, in fine adde

Ambræ grise. drach. 1.

Mosch. 3j.

F. Electuar.

Vires. Vix eius creberrimus fuit in sevissima illa nupera peste, in qua tam præservando, quam curando profuisse compertum est.

Ele-

Elektuar. Alexipharmacum de Ciconia; Arcanum Alexipharmacum.

v. 1. Recentem ciconiæ sanguinem, distilla per M remanentem in cucurbita sanguinem exicca & pulveris. Hinc

2. Extrahe Sal ex ventriculo ciconiæ incinerato, beneficio aquæ illius ex sanguine destillatae, idque pulverisatæ illi sanguinis remanentiae admisce.

Hisce 3. addantur in vitro satis capaci:

Succin. alb. el. 3. i.

Corall. tub.

Baccar. matur. vuæ inversæ.

Essent. Mumiaæ.

Rad. Anthor. an. 3. 3.

Lap. Bez. Or. drach. iiiij.

Theriac. opt. vnc. iiij.

Hoc cum oleo pini (ex nucl. express.) incorpora, deinceps tantum olei superaddendo, ut digitos 3. vel 4. latos emineat. Tandem insolentur aliquandiū orificio yasis diligenter obstructo; quod enim vetustius, eo melius.

Vires. *Efficacissimum est contra omnia metallica, animalia & vegetabilia venena, que tum vomitu, tum secesse, tum sudore expellit.*

Dosis vnc. 3. cum haustu vae vini, vel lactis tepidi. Croll.

N. Loco ⊖ ex ventriculi cinere extracti, mallem ipsas tunicas pulverisatas admiscere.

4. *Elektuarium, s. mixtura de Allio.*

v. Digit. allij, num. iiiij.

Frixis & contusis cum melle &

mithridatij, drach. iiij. addo

Sperm. ceti,

Granot. juniper. ana 3j.

Castorei 3ij.

Pulv. parietar. 3j.

Oxymel. Squillit. q. s. F. Elekt.

Vires : *Insignium virium est contra colicam.*

5. *Elektuarium Campboratum Kegleri.*

v. Rad. Diptamm. alb.

Tormentill. an. drach. ij.

Zing. alb. vnc. ij. (rectius 3 3. 3.)

Sacchar. cand. vnc. ij.

Margarit. præparat. vnc. 3.

Nuc. vomic.

Ols. de c. c. an. drach. ij.

Camphor. vnc. 1.

Theriac. Andr. vnc. iv.

Sacchari alb. in aq. acetos. solut. q. s. F. Elektuarium.

Vires. *Alexipharmacum ac sudoriferum est, maximique usus in morbis malignis.*

Dosis drach. j. ad ij. &c.

Paulò aliter.

v. Rad. Diptamm.

Tormentil.

Zedoar. ana vnc. 3.

Zingib. drach. ij.

Herb. card. bened. vnc. 3.

Turb. alb. & gum.

Nuc. vomic. ana. vnc. 3.

164 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Rhabarb.
Oſ. de c. c.
Oc. $\text{v}\frac{1}{2}$ an. drach. i.
Camphor. vnc. i.
Sacchar. cand. vnc. i.
Theriac. Androm. vnc. vi.
M. F. Electuarium.

6. Electuarium Chalybeatum Horatij
Augenij.

ꝝ. Piper.
Zinzib. ana vnc. ſ.
Cardamom.
Caryophyllor.
Doronic. aut Angelic.
Croci. ana drach. ij.
Tamarisci. vnc. ſ.
Sem. Basilic.
Anis. ana drach. ſ.
Limatur. chalyb. præp. lib. ſ.
Mellis despumati. lib. iij.
F. Electuarium.

Vires. Confert in intemperie frigida
mulierum.

7. Electuarium corroborans ſpecificum,
ſ. Medicamentum ſpecificum omnium
ſeptem membrorum principaliuum.

Crollij.
ꝝ. Ol. succini ter vel quater (per V
Majoranæ , vel ſimil.) reſtificati
drach. ij.
Spirit. $\text{D}\frac{1}{2}$ -li veri,
Salis cranij human. (vel magiſte-
rij.) ana vnc. ſ.
Tincturæ croc. Or.
Granor. alkerm. ana. 3ij.
Sal. margarit.
Corallor. ana $\text{z}\frac{1}{2}$ j.

Ol. Cinamom.
Macer. ana $\text{z}\beta$.
Laet. $\text{z}\frac{1}{2}$ j.
Extr. Spodij $\text{z}\beta$.
Antimon. diaphoret. $\text{z}\beta$.
Magift. $\text{z}\frac{1}{2}$ i $\text{D}\frac{1}{2}$ -lati $\text{z}\frac{1}{2}$ j.
Tinetur. croc. ♂.
Extr. chelidon.
Rhabarb. ana z . ſ.
Liquor. crystall.
calcul. microcosmic. ana z . j.
Cum extracta & inſpiſſata The-
riacæ eſſentia, melle iuniperino, con-
ſerva roſarum, addendo pro libitu
ſaccharo roſaceo, F. electuarium,
addita Moſchi & Ambræ, ana dra-
chma i.

N. Propriet. ventriculi ſympathiam
cum reliquis membris, addantur spirit.
 $\text{D}\frac{1}{2}$ -i Veneris drach. ij. atque Ol. Nuciſt.
ſtillat. drach. ſ.
Dofis à gr. 5, 6, 7. uſque ad 20. &c.

8. Electuarium ſeu mixtura cor-
dialis.

ꝝ. Conserv. roſar. vnc. viii.
Borrag.
Bugloſ. an. vnc. iij.
Violar. vnc ij.
Nymph. vnc. iß.
Confect. Alkerm. vnc. ſ.
Pulp. citr. condit. vnc. iiiij.
Fl. citr. condit. vnc. ij.
Spec. Diarthrod. Abb. z . ij.
Margarit. præparat. 3. ij.
Cotallor. vtrorumque, ana 3ij.
Lign. Aloës pulv. z iiiij.
Ambr. gryſ. gran. vj.

Fol.

Fol. O num. x.

Cura syrupo acetos. citri q. s.
F. mixtura.Vires. *Spiritus vitales, Balsamum-*
*que naturae corroborat.**Dosis ad magnitudinem avellana.*
9. *Eleetuar. de Croco.*8. *Croc. Or. vnc. i.*

Rad. Zedoar.

Tormentill.

Nuc. vomic. an. drach. ij.

Camphor. 3j.

Sem. Eruc.

Rad. Dipsamn. alb.

Angelic. an. drach. ij.

Petasit. drach. iiiij.

Theriac. venet. v. 3vj.

Mithridati, vnc.vj.

F. *Eleetuarium.*Vires. *Alexipharmacum est, Kegle-*
*riano nihil vel parum cedens.*10. *Eleetuar. Nucum.*

8. Nuc. jugland. num. xx.

Ficuum ping. num. xv.

Rut. vnc. i.

Sal. commun. 3ß.

Mellis, vnc. ij.

M. F. *Eleetuarium.*Vires : *Alexipharmacum est.*11. *Eleetuar. Regum.*

8. Pineat. vnc. iiß.

Rosat. rubr. drach. ij.

Amygd. dolc. vnc. 6.

Santal. cittini. 3ij.

Ambr. grif. 3ß.

Moschi, gran. iiij.

Sacchari albifs. in V. rosat.

fragrantiss. solut. ff. 1.

Vires. *Refrigerat, exiccat, nutrit,*
*corroborat, &c.*11. *Eleetuarium Scorbuticum.*

8. Cons. cochlear. 3iiß.

Chamædr.

Meliß.

Rosat. incarnat.

Acetosit. citri, an. 3. vj.

Condit. calam. arom.

ZZ.

Rad. Pimpinell.

Cort. citri, an. 3ij.

Extr. Absynth.

Juniper.

Sem. Sinap.

Eruc. an. 3ij.

Cardamom.

Cinamom. an. 3j.

⊕ti, 3iß.

Ol. Anis. 3j.

Cinam. 3ß.

Cum Spir. de Cinam. & de cochlear.

q. f.

F. Mixtura.

Vires. *Referat obstrunctiones mesen-*
terij lienisque tenorem corroborat; ideoque
*in scorbutico affectu virium est insignium.**Dosis magnitudine inglandis parva*
mane ieiuno stomacho assumpta.

ELECTVARIA PVRGANTIA.

1. *Diapharum Fernely.*

8. Syrup. menth.

violar. ana vnc.viiiij.

Coquantur in mellis crassitiem,
sub finem subducto igne insperge :

Radicis peponis arefacta,

Semi

166 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Seminum raphani & vrticæ mace-
ratorum in ∇ rosatum, & arefacto-
rum, & tritorum, ana vnc. 1.

Rad. asar. contritæ & cretæ $\frac{3}{ij}$.

Cinamom.

Sem. Fœnic. an. drach. iiij.

Confice in electuarium li-
quidum.

Vires. Omnis generis humores cir-
ca ventriculum & praecordia exuberan-
tes, vomitione ducit, non continuato, sed
ex intervallis factio impetu, sepi atque
prægnanti tutum ac facile.

Dosis drach. ij. vel vnc. 8. ex aqua
bordei, vel ex mulsa.

2. Electuarium \ddag ale Crollij.

2. Vitri ♀ correct. per \ddag vide lib. 3.

Theriac. Androm. an. vnc. ij.

Nuc. moschat.

Mastich.

Cort. arant.

Corall. rubr. præp. an. drach. ij.

Caryophyllor.

Sem. Fœnic.

Coriandr. præp. an. vnc. ij.

Pulverisentur optimè & commi-
scantur, F. Massa pilularum, cum
mivæ cydoniorum, q. s.

Vires. Purgat minori violentia, quam
vitrum, ac in primis per secessum.

Dosis debiliori pilula una magnitudi-
ne pisi, fortiori due.

C A P. LII.

De Elixyriis.

Elixyr in officinis est liquor spiri-
tuosus, facultatibus præcellentibus,
mediante infusione imprægnatus. Hinc convenit ut plurimum cum
Tincturis liquidis.

Modum parandi singula ferè
suum obtinent.

Vstitutiona sunt:

Elixyr Citri. N. I.

Camphora. 2.

Epilepticum Ant. Freyen. 3.

Crollij. 4.

Cratonis. 5.

Iuniperinum, vide libr. 4.

Pestilentiale. 6.

Nephriticum. 7.

Elixyr Proprietatis 8.

Vterinum Croll. 9.

Vite Martbiol. August.

maius Quercet. 10.

minus Quercet. 11.

1.. Elixyr Citri.

2. Cortic. citr. recent. ab albican-
te medulla separatör. lb. iiij.

Vi non rectif. lb. xij.

Macerentur aliquandiu, postea
destillentur per vesicam cum refrigera-
torio, donec phlegma stillare
incipiat.

Huic spiritui, cum pauxillo croci
tincto, adde

Succ. citri purific. lib. ii.

Habebis Elixyr citri.

N. Sennertus addit quoque ∇ mro-
sarum lib. in qua soluta Sacchar. cand.
vnc. x.

Vires.

Vires. Elegans est cordiale & antidotus contra pestem & aeris contagia.
Dosis cochl. i. singulis auroris, ieiuno ventriculo, nisi Epatis calidior tempries, vel capititis imbecillitas prohibeant, eo enim casu, satiato ventriculo melius confert. Tenzel. in exegesi.

2. Elixyr Camphora. s. \sqrt{V} ; Camphoratus, ∇ pestilentialis Hartmanni.

η . \sqrt{V} opt. libj.
Camphor. select. (tempore Aestivo) 3vj. 9j. (Hyemali v.) 3x. 9ij. M. incisâ priùs camphorâ ; & statim solvetur sine Δ , appende in nodulo croc. Or. 9B. & fieri \sqrt{V} aurei coloris. Serua in vitro benè clauso.

Vires. Utileissimus est in peste, tam præservando, quam curando.

N. Poterit itidem adhuc semel destillari. Hartmanni præst. loc. de peste.

3. Elixyr Epilepticum, D. D.
Freyen.

η . Spirit. Corall.

i, an. 3if. 3ij.

Θ is cran. human.

sangu. human.

Succin. volatil. an. 9j.

M. stent in digestione, ♂ (14.) servetur in vitro benè clauso.

Dosis guttula aliquot.

4. Elixyr Epilepticum Crolli.

Qlum ad flavedinem calcinatum ; imbibe \sqrt{V} , vt f. massa.

η . Huius massa libiſ.

Rasur. cranij human.

Visc. Quercin.

Vngul. alcis,

Granor. Pœon. an. vnc. 1.

Omnia scindantur & tundantur, postea mixta destillentur per Retortam gradatim.

Hujus egressi liquoris lib. i. rectificetur in MB. supra.

Castorei,

Spec. Diamosch. dulc. ana 3B.

Anacardin. (fruct.) 3vj.

Postea adde \sqrt{V} , libiſſij.

Sal. Pœon. drach. 1.

Liquor. salis perlar.

Liquor. salis corall. an. 3j.

Ol. anis.

succin. ana 9ij.

M. & digere in MB. per mensem.

Dosis cochl. s. vel integrum in ∇ pœon. & simili, continuando dies (9)

5. Elixyr antiepilepticum Cratonis.

η . Ciner. cornic. ex nido extract.

Turtur.

Cran. human. calc. ana 3. j.

Gran. Tiliae autumno collect. 3ij.

Stercor. leonin. 3. g.

Affunde \sqrt{V} ad eminent. digit.
3. extrahe f. a. ex fecibus calcinatis elixivia sal, addéque extractionibus. Postea adde vini malvatici tantundem (cum \sqrt{V}) & sacchar. candi vnc. iiiij. Dosis cochl. s. ad 1.

6. Elixyr pestilentiale.

η . 1. Flor. $\frac{1}{2}$ r. 3. iiij.

Ol. Juniper. (è bacc.) rectifi-

cat. 3. viij.

Succin. rectific. 3. ij.

Y.

168 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Digerantur ut fiat solutio florum.

2. ℥. Theriacæ Androm. lb. 1.

F. Extractio cum V optimo,
abstrahere Vi.

3. ℥. Rad. Enul. c.

Angelic.
Baccar. Iunip. an. vnc. iij.

Extrahatur Tinctura cum eodem
spiritu, abstrahaturque itetum Vi.
Misce iam extractum hoc cum ex-
tracto Theriacæ, ac affunde olea illa
essentificata, prius tamen filtrata.
Circula omnia simul lentissimo ca-
lore.

Vires. Secretum est, quod in peste &
morbis epidemis ad miraculum operari
solet, tam preservando, quam per sudor-
rem contagium expellendo.

Dosis, in preservacione guttula ali-
quot; in curatione à 3j. ad 3ij. in vino,
aceto rosaceo, aqua scordij, vel alio ali-
quo liquore appropriato. Croll.

7. Elixyr Nephriticum.

℞. Baccar. myrtillor.

Heder.

Alkekeng.

Iuniper. ana 3ij.

Herb. Adianthi,

Veronic.

Rusc. ana p. 1.

Rad. Cyper.

Pimpinell.

Ononid. ana 3b.

Succ. Limon. 3ij.

Fl. Genist.

Bugloss.

Sem. Melon.

Cucurbit, an. 3j.

Nucl. avellanar. c. pellib. N. iiiij.

Vi rectific. q. f.

F. infusio in cella subterranea.

8. Elixyr proprietatis.

Elixyr hoc desumptum est ex
Paracelso, Archidox. libr. 8. num. 6.
vbi omisso menstruo. (origine, vt lo-
quitur) ℥. Myrrh. Aloëpat. Croc.
ana, circulat in arena lenissimo ca-
lote per menses duos, dein elicit
oleum per, ℜ idque cum anatico
pondere circulati (vide de extractis)
per mensem circulat. Menstruum
illud omissum varias opiniones pe-
redit, vnde & diversi processus, in-
ter quos tamen visitatissimus est hic
Crollianus.

℞. Myrrh. Alexandr.

Aloës Epatic.

Croc. Orient. vel Vngar. an. 3iiij.

Pulverisata humecta V alcoho-
lisato, hinc affunde Ol. A. p. c. ad
em. digit. 2. 3. extrahere tinctu-
ram ac decanta. Relata materie
affunde V, & vterius extrahe, de-
cantaque. Tandem quæ restant fe-
ces, destillationi submittit, destilla-
tumque prioribus adde.

N. Elixyr hoc si aliquandiu digestio-
ni commiseris, gratius fit sapore, atque
efficacius operatione.

Vires. Parium, est tenuium, calfa-
cit & exiccat, à putredine conservat,
sudorem ciet; proficuus eius usus est in
morbis malignis, hypochondriacis, vte-
rinis, stomachi cruditate, atque inde ap-
petitu

*petitu imminuto. Extrinsecus mundi-
ficit valde vulnera sordida.*

*Dosis à gutt. viij. ad xij. & plures.
Croll.*

9. Elixyr Uterinum.

℞. Castor. flb.

Croc. vnc. ij.

*Extrahe tinturas, sc. cuiusque
seorsim cum ℥V, abstrahere, ad rema-
nentiam extractorum, quibus mix-
tis adde :*

Extr. artemisi. ʒiiij.

Sal. matt. perlata. ʒi.

Ol. stillat. angelic.

anis.

succin. an. ʒij.

*Digerantur mixta omnia per
o 8.*

*Dosis huius Elixyris ʒij. vel ʒij. in-
gruente paroxysmo qualicunque hysteri-
co, tunc illico sanantur, provocato sudore.
Quod si singulis mensibus appetentibus
menstruis aequali dosi utantur, non rever-
tetur morbus. Croll.*

10. Elixyr vita manus Quercetan.

℞. Rad. Zedoar.

Angelic.

Geotian.

Valerian.

Tomentill.

Scorzoner.

Galang.

Lign. Aloës,

Santal. citr. an. ʒiiij.

Fol. Meliss.

Ment. rubr.

Maioran.

Basilic.

Hyslop.

Thym.

Fol. Chamæpit.

Chamaedr. ana Mß

Gran. Laur.

Iuniper.

Cort. Limon.

Arantior. sicc.

Sem. Pœon.

Sesel.

Aneth.

Fœnic.

Anis.

Citri

Card.bened.an. ʒij.

Caryophyllor.

Cinamom.

Macis.

Zingib.

Cubebar.

Cardamom.

Piper.long.

rot.

Spic. nard. an. ʒiβ.

Benzoini,

Myrrh.

Oliban.

Succin.

Mastich. an. ʒvj.

Fl. Rorismar.

Salv.

Pœon.

Steechad.

Calendul.

Lavendul.

Hyperic.

170 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Centaur. min.

Betonic.

Fl. Lil. convall.

Tiliae, ana. p. ij.

Cichor.

Rosar. rub.

Bugloss. an. p. i.

Mellis optimi,

Sacchar. alb. ana lb. i.

Aqua Vitæ optimè rectificatæ lb. x.

Digerantur f. a. ♂ (8, 10.) vase

Hermet. clauso. Hinc f. expressio-

que destilletur, (ponendo in ro-

strum, moschi, 3lb. ambr. gris. croc.

ana 3j.) igne, initio gradus 1. &

extillabit √ clara, quam collige

seorsim : dein auge Δ ad grad. 2. &

prodibunt spiritus nebulosæ. Tan-

dem Δ adhibe fortiorē adhuc,

vt extillet oleum, & maneat in fun-

do materia sicca, nec tamen perfe-

ctè arida, ne empyreuma extillatum

sapiat. Ex hac residua materia ex-

trahe tinteturam f. a. cum √ illâ pri-

ori clarissimâ, & effunde. Demum

misce tres illos liquores, ac destilla-

denuò per gradus ut priùs, singulis

seorsim suscepis. Ex materiâ in

vraque destillatione residuâ, post-

quam incinerata fuerit, elice θ be-

neficio √ illius clariss. primò extilla-

ta, eamque √ in sale imbutam misce

cum spiritu & oleo, ac circula.

Vires Huius Elixiris ineffabiles sunt

virtutes, ad curandas & præcavandas
Vertigines, Epilepsias, Apoplexias, Pa-
ralyses, Manias, Melancholias, Asthma-
ta, Syncopes, Hypothymias, Stomachi, &
aliarum partium debilitates, cachexias,
hystericas passiones, & alia id genus sum-
ma & deploranda symptomata.

Dosis, guttula aliquot in √ vel deco-
cto conveniente.

ii. Elixir vita minus eiusdem Querc.

ii. Rad. Gentian.

Centaur. min. an 3ij.

Galang.

Cinamom.

Macis

Garyophyllor. an 3j.

Flor. Salv.

Rorifmar. an. p. ij.

Vini albi generos. lb. vj.

Macerentur in MB. ♂ ♀ (8.)
dein exprimantur fortiter. Expressio
destilletur per XX in cinere ad sic-
citatem. Residuæ materiæ extrahe
tineturam cum √ illa destillata, f. a.
Postmodum incinera materias reli-
cas, & elice sal cum √ card. ben-
edict. vel simili (vel etiam fontana)
sal inspissatum & purificatum adde
tinctoria superiori & circula.

Vires. Specificum est remedium ad
omnes cachexias, stomachi capitisque
imbecillitates.

Dosis cochlear.

CAP.

C A P . L I I I .

De Emplastris, Ceratis, & Dropacibus.

Cerata (cerota) nihil ferè ab Emplastris differunt, nisi quòd paùlo sint molliora & tractabiliora, adéoque non raro inter se confunduntur.

Fiunt ex rebus pinguibus, oleis videlicet, resinis, (qua faciunt ut cuti tenaciùs adhaereant) axungii, medullis, gummatis, iisque cerà q. s. suscepitis, additisque nonnunquam & pulveribus.

Modus fieri.

B. Liquabilia, fundéque ad ignem, hinc immisce sensim pulveres, agitáque continuò donec refrigerescant.

N. 1. Proportio cera ad olea est $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ ad resinas $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$

N. 2. Proportio pulverum ad olea est $\frac{1}{3}$

N. 3. Gummata siqua proganganda fuerint, ac solvenda in aceto similiive liquore aquo, vel si humor aqueus (acetum, decoctum, succus, mucilago) addendus fuerit, cum ipsis initio tantisper coquendus est, donec planè exhalarit.

Emplastra modo sunt eodem. 1. Funditur cera cum oleo, hinc admiscentur resinae, adipes, gummata, ut similiter liquefcant, tandem subducto igne admiscentur pulueres, continuòque agitantur, donec refrigerescant.

N. 1. Antequam planè refrixerint

melaxari solent aqua frigida, inque cylindros s. magdaleones redigi.

N. 2. Si lithargyrium addendum sit, primum id in oleo erit coquendum.

N. 3. Proportio exactè definiri nequit, recipiuntur tamen ferè ad aridorum $\frac{3}{4}$ j. olei, pinguedinis vel mellis $\frac{3}{4}$ j. cere lb. 1. resinarum $\frac{3}{4}$ viij.

N. 4. Loco cere alia nonnunquam recipiuntur, e. gr. ladanum & simil.

Cerata usitatoria sunt

Cerotum ex Betonica.

Capitala.

Cerine Ctesiphontis.

Diachalciteos.

Diapadma.

de Galbano, s. matricalis.

Infrigidans Galeni.

Oesypi.

Diapiper.

ex pelle arietina.

pro Herniofis.

Isis.

Sacrum, s. Diadictamnū.

Emplastrum diadictam.

Santalimum.

Sparadrappum Vigonis.

Stomachale.

Emplastra usitatoria sunt:

Emplastrum

Album coctum, Aug.

Apostolicum, A.

Arthriticum, vide infra. N. 1.

172 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Asclepiadis, *VVeck.*
 Barbarum maius, *VVeck.*
 minus. *Dissaldeus in Cordum.*
 Basilicum majus, *Aug. VVeck.*
 minus, A.
 è lapide calaminari, *Zelzepflaster A.*
 Cephalicum, 2.
 Ceroneum, A.
 de Cerusa, *Renod.*
 Diachylon. simpl. s. album, A.
 composit. s. empl. de mucaginiib⁹. A.
 magnum, A.
 parvum, A.
 cum gummis, A.
 Citrinum, A.
 de crusta panis, A.
 Diaphoreticum, 3.
 Divinum, *Renod. VVeck.*
 ad Fonticulos, F. F. 4.
 ad fracturas ossium, *Ren.*
 de tribus farinis, *VVeck.*
 Gryseum è lapide calaminari, A.
 Gummatum Paracelsi, 5.
 ad Hydropem, A.
 de Ianua, *Ren.*
 Ifis flavum, *Dissaldeus in Cordum.*
 de baccis Lauri, A.
 Mastichinum, *Renod.*
 Magneticum, 6.
 de Meliloto, A.
 de Minio, A.
 Mundificativum, 7.
 Nervinum, A.
 Nigrum sticticum, A.
 Oppid. ldoch, 8.9.
 Oxyroceum commun. A.
 Vigonis. A.

Diaphenicum calidum, A.
 frigidum, A.
 è ranis Vigonis, *Renod.*
 de Rhabarbaro, A.
 Sparadrap. *Renod.*
 de stercore canis, *Vigoris, VVeck.*
 Spleneticum, 10. 11. 12.
 Sticticum, 13.
 Stomachicum. *VVeck.* aliter ha-
 bet *Renod.*
 Diasulphur, 14.
 Tetrapharmacum, A.
 Triapharmacum, A.
 ad tophos, A.
 de Tacamahac, 15.
 Viride, *Cordi, VVeck.*
 Vesicatorium, 16.
 Filii Zachariae, A.
 Dropaces, 17.

1. *Emplastrum Arthriticum,*
 F. F.

2. *Emplastr. Diachyl. magn. 3vj.*
 Oxycroc.
 Diapalm. an. 3ij.
 Medull. cervin.
 Axung. Vrsin. an. 3iſ.
 Tacamahac. in vino dissolut. 3ij.
 M. F. f. a. *Emplastrum*, quod
 oleo vulpino malaxetur.
 Vires. *Doloribus arthriticis maxi-
 mè proficuum est, lenit, discutit, resolvit*

2. *Emplastrum Cephalicum, F. F.*

3. *Resin. pin. 3ij.*
 Ladan.
 Myrrh.
 Mastich.

Mastich. 3vj.
Gum. Tacamahac.
Galban.
Opopan. an. 3*b.*
Visc. Tiliæ, 3v. 3ij.
Sem. Pœon. mat. 3ij. 3ij.
Cubebar. 3ijj.
Ol. Succin.
Nucif. an. 3*b.*
Gummatis in $\frac{1}{2}$ dissolutis f. s. a.
Emplastrum, addendo Terebinthinae 3ij*b.* M.
Vires. Capitis cayarrhos exiccat,
idemque corroborat, proin confert in
Apoplexia, Epilepsia, Vertigine & si-
milib.
3. Emplastrum Diaphoreticum.
¶. Ceræ citrin. 3xv.
Bdell. pulver. 3v.
Colophon.
Pic. naval. ana 3ijj.
Succin. citrin. 3ij.
G. Ammoniac. 3ij.
F. Emplastrum l. a. malaxando
cum Ol. ovorum.
Vires. Discutit, serosam humidita-
tem elicit & absunt.
Vsis est precipui in Ischiatica, intu-
mescentia pedum, & simil.

Emplastrum Febrifugum Stro-
belbergeri.

¶. Terebinth. cypr. opt. 3*b.* lique-
scat in vase cupreæ super Δ mode-
ratum; huic injice.

Aranear. Vivar. in hypocaustis
vel locis mundis captar. N. xv.

Misceantur & agitantur cum pi-
stillo ligneo, usque dum color
Terebinthinæ fiat cinereus, & vix
aliquid de araneis deprehendatur.:
Tum iterum tepefactæ mixturæ ad-
de:

Telar. aranearum mundarum quan-
tum prædictæ araneæ texere, vel ha-
rum loco, adhuc 10. araneas medio-
res: iterum fortiter agitantur: In-

terea etiam immiscendo

Asphalti opt. pulveris. &

*. albi*s.* ana 3*b.*

Tentantur usquedum refrigerescat
materia, & acquirat consistentiam
Emplastri nigerrimi. Reponantur
per 14. $\sigma.$ tandem rursus ad Δ mol-
lescat, & manib. oleo febrifugo inun-
ctis malaxetur modicè.

Vsis. Formentur inde Empla-
stra instar $\frac{1}{2}$ Thaleri, quæ auro vel
argento obducta, coriisque recta,
imponantur pulsib. utriusque carpi,
horâ vnâ ante paroxysmum, relin-
quendo per 9. $\sigma.$ Tunc eadem ho-
ra in profluentem aquam projican-
tur.

N. Oleum febrifugum vi-
de c. 72.

Emplastrum hoc est de quo Strobel-
bergerus introductionem typis expressam,
omissâ descriptione Anno 1666 divulga-
vit, descriptionem itaque transmisit mihi
Clariss D. D. Job. Christoff Eisen-
menger Physicus Ord. Imperialis Heil-
brunnensis, amicus meus integerrimus,
cujus verba ne de genuina descriptione
dubites.

174 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

dubites, hic subiungo. Et sunt: Hanc descriptionē mibi communicavit illustris Comitis Caroli à VVolckenstein (qui non solum à Atana huius beneficio liberatus, sed & 100. Thaleris à D. Strobelbergero emit:) Frater Adamus Comes a VVolckenst. p.t. Ord. Teuton. Commendator in Heilbrunn.

4. Emplastrum ad Fontinellas.
F. F.

34. Cerus.

Lithargyr. an. 3vj.

Ol. Rosar. fb. j.

Aqu. Rosat. 3vij

Coque l. Δ. in fine adde ceras alb. 3iiij.

F. l. a. Emplastrum.

Vires. Arcet inflammationem.

5. Emplastrum Gummatum, Paracelsi.

34. Gumm. Serapin.

Bdell.

Opopanax.

Galban. an. 3j.

Solve in H_2cola , colaturæ adde Mastich.

Thur. masc. an. 3ij.

Ceras alb. ad pondus omnivm.

F. Emplastrum.

Vires. Mundificat vulnera & consolidat, discessit tumores.

6. Emplastrum magneticum.

34. Gumm. Serapin.

Ammoniac.

Galban. an. 3ij.

Solve in H_2cola & inspissa:

Hinc

34. Terebinth. laric.

Ceræ, ana 3β.

Liquefac ad ignem, atque subducto igne admisce exactè gummi, & tandem

Ol. Succini, 3ij.

atque tandem

Lapid. seu magnetis arsenicalis drach. iiij.

Terra \oplus i, 3j.

F. Emplastrum ac malaxa cum Ol. Scorpionum.

Vires. Viceribus aut carbunculis pestilentialibus applicatum subito rumpit, venenum ex imo instar magnetis potenter attrahit, nec apertum vclus coire patitur, ante perfectam extractionem omnis venenositatis. Hartman. in Præl.

N. Lapidem, s. magnet. Arsenic. Vide in Lapidibus.

7. Emplastrum mundificatum.

34. Ceræ fb. i.

Resin alb. 3iiij.

Terebinth. laric. 3j.

Ol. bufonum,

Scorpion. ana 3ij.

Styrac. liquid. 3vj.

Suc. chelidon. expr. 3iiij.

Aristoloch. rot. 3β.

Gumm. ammoniac. in $\text{H}_2\text{solvent}$.

& inspissat. 3iβ.

Myrrh.

Sarcocoll. an. 3j.

F. l. a. Emplastrum.

Vires. Mundificat vulnera venenata ac fistulosa. Hartm. in præl.

8. Em-

3. Emplaſtrum Oppodeldoch , ſecun-
dum Fel. VVüriz.

¶. Ceræ Virgin. lb. ij.
Terebinth. lb. i.
Ol. commun. 3iij.
His liquefactis adde
Succi Chelidon.
Fol. querc.
Alchimill.
Veronic. an. 3iB.
Coque ad consumptionem hu-
miditatis, dein admifce
Gumm. cum  depurat. & in-
ſpiſſat.
Ammoniac.
Galban.
Opopan. an. 3vj.
Colophon. 3iB.
Succin. 3B.
Mastich.
Myrrh.
Oliban.
Sarcocoll. an. 3iij.
Omnibus benè mixtis & paulu-
lum refrigeratis adde agitando
L. Hæmatit. præparat. 3iB.
Croc. ♂ 3iij.
♀. 3j.
Tut. præparat. 3iij.
Lapid. calaminar. 3x.
Tandem in fine admifce
Terræ  edulcoratæ q. f.
ad colorem brunnum, i. e. purpu-
reum conciliandum,
F. Emplaſtrum.
*Eadem vires ac applicationem cum
ſtūdico Crolli obtinet.*

N. Terebinthinam addere præstat
ante pulveres.

9. Emplaſtrum Oppodeldoch
Paracelsi.

¶. Gumm. Galban.
Opopan. an. 3iij.
Ammoniac.
Bdell. an. 3j.
Macerentur per ♂ (8. vel plu-
res) in Xocola & inſpiſſa ad conſi-
ſtent. mellis: Dein
¶. Lithargyr. pulv. lb. 3(alij lb. iB.)
Ol. commun. lbis.
Coque lento Δ continuo agi-
tando, donec brunnum ſue ſpadi-
ceum colorem acquirat : hinc adde
Ceræ lb. i.
Quà liquefacta, immifce etiam
ſuperiora gummata, & paulo pōſt
Ol. Laurin. 3iij.
Movę diligentissimē, donec ni-
mirum omnia exactiſſimē fuerint
mixta, remove ab igne, ac adde
Croc. ♂,
Mum. transmar.
Magnet. præparat.
Magift. corall. alb.
rubror. an. 3B.
Lapid. calamin. præp.
Myrrh rubr.
Thur. masc.
Mastich.
Rad. aristoloch. rot. an. 3iij.
Hos pulveres infunde pedeten-
tim in liquefactum Emplaſtrum,
omnia exacte miſcendo :

Postremo

176 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

¶. Balsam. succin. ʒj. (ol. crassioris)

Ol. laurin. ʒj.

Terebinth. ʒβ.

M. & liquefac seorsim, solve in
eodem

Camphoræ ʒij.

& tandem Croc. Or. ʒβ.

Solutionem hanc seorsim fa-
ctam, cum Emplastro calido misce
exactissime, ut fiat Emplastrum, quod
malaxa oleo hypericonis.

Vires. Curat omnia vulnera, pun-
ctum & cæsim inficta sine omni pure. Ex-
crescentiam carnis impedit, eius tan-
tum, quantum opus est producendo, ulce-
ra antiqua prius mundificata similiter
curat.

N. Si fortius desideras, & ad sananda
quevis esthiomena & corrodentia ulcera
proficuum.

¶. Croci metallor. Colchotar.

Qij per se præcipit. ana q. v.

M. pulverisando, atque pulveris
huius ʒβ. misce ad liquefacti Empla-
stri ʒβ. superaddendo aliquid Tere-
binthinæ. Harrmann. in Gross. & in
Practicâ.

10. Emplastrum Spleneticum.

¶. Gumm. Ammoniac. ʒiβ.

Bdell.

Galban. ana ʒij.

Aceto dissolutis & purgatis adde
Pulv. rad. Beyon.

Ireos, an. ʒβ.

Furfur. frumenti bene cibrati
ʒ. i.

Vng. Dialth.

Empl. de Melilot. an. ʒβ.

Axung. Anat.

Anser.

Gallin. ana ʒij.

Ol. Irin.

Terebinth.

Resin. an. ʒiβ.

Ceræ ʒij.

Mucilag. sem. lini,

Fœnigr. an. ʒij.

F. f. a. Cerotum.

11. Emplastrum Spleneticum de
Cicuta, F. F.

¶. Cicut. cum toto incise & pul-
veris. ʒix.

Succ. exprefs. eiusdem ʒij.

Ol. cappar. ʒxvij.

Irini ʒvi.

Misce, digeréque in MB. per 4.
dein coqu. Hinc colentur cum
forti expressione.

In hac dissolye:

Ceræ novæ ʒiiij.

Gumm. ammoniac. in succ.

cicut. sol. ʒiβ.

M. F. Emplastrum.

Vires. Lienem obstruēlum aperit,
roborat, duritatem emollit, &c.

12. Aliud Empl. Spleneticum Foresti,
Ceratum de Ammoniaco
dictum.

¶. Ammoniac. in Ȑ. dissol. ʒj.

Vng. Dialth.

Empl. de melilot. an. ʒβ.

Furfur. frumenti cibrat. ʒj.

Pulv. rad. Bryon.

Ireos

Ireos, an. 3 <i>β.</i>	Aristoloch. long.
Pingued. anat.	rotund. ana 3 <i>j.</i>
Anser.	Mum. transmarin.
Gallin. an. 3 <i>iiij.</i>	Magnetis,
Bdellij,	Hæmatit. ana 3 <i>iiβ.</i>
Galban. an. 3 <i>iiβ.</i>	Corall. albor.
Ol. irin. 3 <i>iiβ.</i>	rubeor.
Bulliant leniter in mucilaginibus	Matr. perlar.
sem. lini & fœnugr. an. q. f. & vt in	Sanguin. Draconis,
formam debitam cerati coëcant, ad-	Terræ medicat. Strigens.
de Ceræ 3 <i>β.</i>	Vitriol. alb. ana 3 <i>j.</i>
Terebinth. &	Fl. Antimon.
Resin. pini, an. 3 <i>iiβ.</i>	Croc. ♂ ana 3 <i>iij.</i>
F. Emplastr.	Camphor. 3 <i>j.</i>
Vires. Plurimum emollit & resolvit	1. Gummata s. solvantur & depu-
duritiem scirrhosam, eoque nomine ar-	rentur solvendo in aceto, exprimen-
canum Foresto fuit. Obs. l. 20. 12.	do & rursus inspissando.
13. <i>Emplastrum Sticticum Crollij.</i>	N. Dosis potest angeri propter feces
abiciendas.	2. Oleo lini & olivarum admi-
scetur. Lithargyrum utrumque,	coquendo & agitando, donec oleum
Lap. calaminat. ana 1 <i>β.</i>	coloretur, postea addatur lapis ca-
Lithargyr. auti & arg. ana 3 <i>iiij.</i>	laminaris, & paulo post, minium.
Ol. Lini,	Coquantur ad sufficientiam (horas
Olivat. ana 1 <i>βiβ.</i>	duas) cuius proba est, si supra un-
Laurin. 1 <i>β.</i>	guem gutta concrescat & conden-
Ceræ,	fetur.
Colophoniae, ana 1 <i>β.</i>	3. Tandem addatur circa finem
Vernicis,	Vernix, Oleum Lauri, cera, colo-
Terebinth. ana 1 <i>β.</i>	phonia; omnibus benè mixtis
Gumm. Opopanax.	& liquefactis affunde successivè
Galban.	gummata liquefacta, diligentique
Serapin.	agitatione misce, idque calore len-
Ammoniac.	tissimo (cave ne bulliat) postea
Bdellij, ana 3 <i>iiij.</i>	admisce pulveres; ultimò Campho-
Carabe citrin.	ra resoluta in oleo Juniperino ad-
Oliban.	datur.
Myrrh. Alexandr.	Z. 2
Aloës epat.	

178 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

N. Si forte nimis durum esset, addatur adhuc aliquid cera & colophoniae. (prestat terebinthina) Proba iusta de coctionis hac est; guttula aliquot frigescant, (in aquam sc. frigidam stillata, vel supra tabulam metallicam,) ha refrigerata si digitis adhaerent nimis molles, signum est imperfecta coctionis, coquatur igitur ulterius ut durescat. Tum affunde in frigidam, ac malaxa bene (hor. 3. vel 4.) manibus inunctis oleo ex chamomelin. rosar. juniper. lumbricor. hypericon ana q. v. mixto.

Vires. Prodest contra inveterata ulcera & vulnera recentia, consolidando, mundificando, purgandis arcendo. Maturat cere facit apostemata cuncta.

14. Emplastrum Diaesulphur. Rulandi.

gr. Balsam. Ar. Ruland. 3ij.
Cerae. 3*β*.

Colophon. 3ij.

Myrrhe, ad pondus omnium.

Omnibus præter myrrham liquefactis & bene commixtis inspergatur myrrha subtilissimè trita, lentoque Δ coquantur, ($\frac{1}{4}$ horæ) semper agitando. Hinc ab igne remove, agitaque donec refrigerescant.

Vires. Curat omnis generis ulcera. Sennert. in Institut.

15. Emplastrum Stomachicum de Tacamahaca.

gr. Tacamahac. 3ij.
Storac. 3*j*.
Ambari momentum.

F. Emplastr. cum oleo aliquo appropriato, v. g. mastich. &c.
Vires. Emplastrum est stomacho longè utilissimum, siquidem roboret, appetitum ciet, concoctionem iuvat, & flatus discutit. Monard.

16. Emplastrum Vesicatorium, Clariss.

D. D. Petri de Spina, pro vñ F. F.

17. Cantharid. sine alis & cap. 3*β*.

Myrh.

Mastich.

Camphor.

A*λ*æ fœtid. an. 3*β*.

Butyr. recent.

Terebinth. lot. an. 3ij.

Ol. rosat. 3*β*.

Cera 3*j*.

F. f. a. Emplastrum.

Vires. Supra corium crassissimè extensum hor. 8. vel 10. Vesicam excitat.

N. Vide idem apud Cl. Gregor. Horstium l. 4. observ. part. 1. ubi omittere suadet Asam fœtidam.

17. De Dropace.

Ad Emplastra pertinent & Dropaces, qui sunt Emplastra, à pice, vt nomen, ita & substantiam sortita, licet interdum quoque malagmatis instat fiant.

Modus fieri.

Liqua picem, addito tantillo olei, & simil. hinc immisce immiscenda materialia.

N. Materialia sunt piper, pyrethrum, rosmarinus, euphorbium, castoreum, bitumen,

tumen, $\frac{1}{2}$ r, sal petrae, commune, cinis
farmentorum.

℞. Picis aridae $\frac{1}{2}$ j. Olei $\frac{1}{2}$ ij. F. Dro-
pax simplex.

℞. Picis $\frac{1}{2}$ ij. ol. citon. vel mastich.
 $\frac{1}{2}$ β. M. Confert in vomitione ven-
triculo impositus.

℞. Picis siccæ, ceræ nov. ana $\frac{1}{2}$ β.
axung. suilla $\frac{1}{2}$ vj. $\frac{1}{2}$ viv. $\frac{1}{2}$ j. Li-
quentur in crassitum Emplastri.

℞. Picis, ceræ, colophon. ana $\frac{1}{2}$ ij.

○ $\frac{1}{2}$ iβ. bitum. $\frac{1}{2}$ j. $\frac{1}{2}$ viv. $\frac{1}{2}$ ij. piper.
euphorb. ana $\frac{1}{2}$ j. cantharid. $\frac{1}{2}$ β. ca-
stor. $\frac{1}{2}$ j. F. Dropax.

Vires. Inserviant Dropaces preci-
pue membris calfaciendis sanguini allici-
endo, & consequenter atrophie emen-
dande.

Adhibetur calfactum (derasis ante
capillis) avelliturque artequam omnino
refrigescat iterumque calefit. & applica-
tur, idque totius donec pars rubeatur.

C A P . L I V .

De Emulsionibus.

EMULSIO, ab emulgendo sic dicta,
Est medicamentum liquidum, lac-
colore æmulans, ex medulla fru-
ctuum, seminumve lactescientium, in-
terveniente liquore appropriato,
prolectum.

Exhibitent lacteum humorem, a-
mygdalæ, sem. 4. frig. maior. sem.
papaver. (alb.) portulac. lactuc. card.
mariae, card. benedicti, cannabis, vi-
olar. bombacis, Napi, Aquileg. Ciri-
tri, &c. nuclei pœon. nucum pine-
arum, pistaciæ, persicarum.

Lacteæ substantia elicienda satis-
facere poterit liquor aqueus qui-
cunque, veruntamen quia intrinse-
cis emulsione ferè sumuntur, gra-
tos adhibere liquores fas erit. Tales
sunt aquæ stillatitæ, aqua fontana,
(cum panis frustulo decocta) deco-
ctum hordei, glycyrrhizæ, cicerum,
C. C. passularum, iuiubarum & simil.

Quantitas liquoris varia est, mo-

dò maior, modò minor, prout cra-
sior, vel dilutior emulsio expetitur.
Communiter autem sumuntur, tri-
plum, quadruplum ad decuplum, &c.

Modus fieri.

℞. Lactescientia, quaæ adhibere ani-
mus est, (excorticata, si excorticari
possint, vt amygd. sem. frig. majo.)
pista in mortario (præstat lapideo)
subinde nonnihil liquoris (ne attri-
tu pinguefcant) instillando, hinc af-
fundere liquoris medicatatem circiter,
exprime per linteum. Residuum,
(quia substantia lactescens vix tota
vice vnâ emulgetur,) contunde de-
nuò, ac emulge cum reliquo liquore.

Vsf. Per se propinari poterit, vel
etiam aliis exhibendis inservire, vt sunt
potissimum pulveres cordiales minera-
les, vel his similia magisteria, &c.

N. I. Quod si ingrataforet, dulcorari po-
terit Saccharos, vel rotulis exēpli gratiā,
manus Christi, iudeo viol. rosar. vel simil.

N. 2. Cave, acida commisceat, quippe his substantia laetescens ad subsidendum prompta est.

Quia emulsiones ex medicaminibus sunt quae facile corruptuntur, ex tempore ad praescriptum patati solent.

Sic sit

Lac, id est. Emulſio amygdalorum dulcium.

℞. Amygd. dulc. excorticat. lib. 3.

decoct. hordei mensur. 1. F. emulſio.

Emulſio nephrocathartica.

℞. Sem. violar. purpur. ℥. vel 3vi. cum ∇ veronic. F. emulſio.

Emulſio ad vrina acrimoniam.

℞. Amygd. infus. in ∇ roſat. 3ij.

Sem. melon. papav. alb. an. 3j. hordei mundi diutissimè cocti 3ij. F. emulſio in ∇ hord. ℥. adde iulep roſ. 3ij.

C A P. L V.

De Errbinis.

Errhina variis parantur formulis; videlicet liquoris, extracti, linimenti, pulveris, &c.

Liquores tum simplices adhiberi possunt, verbi gratia, succus betae, maioranae, ruta, &c. Tum compositi.

Errbini liquidæ formula sit

1. Errb. Cratonis.

℞. Pulv. nigell. 4. diebus in acer. roſ. infus. atque pulv. 3j.

Aqua. maioran. cum succ. herbar. expr. 3ij.

Purgat caput. Crato.

2. Errb. Montani.

℞. Succ. bet. recent. 3ij.

Aqua. majoran. 3ij.

Ol. amygd. 3j.

Misc. cum brodio pulli.

Vires. Commendatur admodum ad eliciendos catarrhos per nares. Ususque eximi⁹ dicitur in tinnitus durum.

Exiratium Nasale,

P. de Spina.

℞. Succ. recent. anagall. 3ij.

betæ,

nicotian. foem. an. 3ij.

betonic. ℥. 3.

Turpeth. gummi. 3v.

Agaric. albiss. 3ij.

Infundantur in f. q. aqua. scabiosæ; digeranturque in vase clauso (8.) Hinc decantetur, abstrahanturque ad consistentiam extracti mollieris.

Vires. Potentissimè educit pituitam, & humorē salsos à capite per nares, & catarrhosque ad fauces & pulmones diffillantes ad nares divertit.

Linimenta, vide infra de Vnguentis.

C A P.

C A P . L V I .

De Epithematis.

Epithema et si etymologicè omne eid sonat, quod parti alicui imponitur, sive liquidum id sit, sive durum : attamen in praxi denotat recentioribus (veteribus enim malaginata, vnguentaque notabat, medie corporis regioni accommodata) medicamentum liquidum, quod spongia, panno, linteo, stupu suscepsum parti alicui imponitur.

Fiunt Epithemata ex ∇ stillatiis, succis, decoctis, emulsionibus, aliisque liquoribus convenientibus, sive solis, sive cum pulveribus, speciebus, electuariis, & similib. commixtis.

N. Penetrationis ergo additur non manquam aliquid vini odoriferi, acetii, spirituum seu aquarum spirituosarum.

Liquor. lib.	Pulver 3j. ad 3 <i>lb.</i> (&
Proportio ylta)	

Vini vel spiritus 3j.
plus minus.

Adhibentur ferè tepidè, præcipue capiti & cordi; artub. v. etiam frigidè applicati possunt.

Epithemata in officinis parata nulla extant, sed ex tempore miscentur, cuius rei gratia species certe in promptu haberi solent.

Vt
Species pro Epithemate Cordis.
Epatis
quibus & alias substituere licet.

Exempla erunt:

I. Epithema Cordiale.

Aqu. Rosar. 3 <i>ijij.</i>	Corall. rubr. præparat. Santal. cinni. albi, an. 3 <i>lb.</i> Cort. citri, 3 <i>j.</i> Croc. 3 <i>lb.</i>
Nymphæa	
Violar. an. 3 <i>ij.</i>	
Bugloss.	
Meliss. an. 3 <i>lb.</i>	
Vini alb. odorif. 3 <i>j.</i>	
Pulv. sem. acetos.	
Portulac.	

M. fiat Epithema.

Vires. Cordi refrigerium ad fert, syncope correptos excitat, panno scarlato suscepsum, cordisque regioni tepide impositionem.

II. Epithema Epaticum.

Aqu. portulac.	Rosar. Plantag. Acetos. Intyb. an. 3 <i>ijij.</i> Sem. portulac. acetos. Endiv. an. 3 <i>j.</i>
Plantag.	
Acetos.	
Intyb. an. 3 <i>ijij.</i>	
Sem. portulac.	
acetos.	
Endiv. an. 3 <i>j.</i>	

Troch. de camphor.
Santal. citr. an. 3*ij.*
Aceti parum.

M. F. Epithema.

Vires. Epatis & sanguinis astum demulcent, & hinc fistit haemorrhagiam narium Epati tepide impositionem.

III. Epi-

<i>III. Epithema in febribus malignis.</i>	Theriac. Andr. 3 <i>lb</i> . Croci 9 <i>lb</i> .
<i>g. Aqu. Rosar.</i>	M. F. Epithema , cui & tantillum camphoræ admisceri poterit
Sambuc.	Vires. <i>Carpis</i> & fronti applicatum estum febrilem mirum in modum in febribus malignis præcipue mitigat , Cephalalgiam lenit somnum conciliat.
Laetuc. an. 7 <i>lb</i> .	
Acet. rosac.	
Rutac. ana 7 <i>lb</i> .	
Spec. Diatr. Santal. 3 <i>lb</i> .	
① præparat. 3 <i>lb</i> .	

C A P. L V I I.

De Extractis, ac i. de Menstruis.

Extractorum campus latissimus

est , fieri nimis possunt ex mineralibus , vegetabilibus ac animalibus . Liquor , cuius beneficio extracta fiunt , [Menstruum vulgo dici solet] varius occurrit . Spiritus vini , spiritus juniperi , spiritus mellis , spiritus Terebinthinæ , Vinum , Hydro-mel , serum lactis , ros maialis , vti & huius spiritus , acetum destillatum , ∇ stillatitia , (sive ex aqua fontana pluvialive , sive ex vegetabili vno , aut pluribus , & simil . elicita illa sit .) Nec enim quivis humor , cuivis extractioni convenit , sed certus certæ ; sulphureus sulphureæ , salinus salinæ , &c.

Inter alia autem menstrua famosissima sunt . 1. ∇ i. 1. ∇ vita \square sa-ta Quercetani . 3. ∇ temperata Basiliij . 4. Acetum Philosophicum Quercetani . 5. Menstruum vniuersale , aqua cælica Lullij dicta , de quibus paucis differere placet .

1. *Spiritus Vini.*

Spiritus Vini menstruum adeò famosum est , vt quoque catholicum nonnullis dicatur : & adhiberi solet , vbi simpliciter menstrui-mentio facta fuerit . Verum enim verò , num in extractione purgantium cōmodè adhibetur , non immeritò dubitatur : ansam dubitandi præbet natura illius sulphurea , quæ parti salinæ extra-hendæ , quali purgatrix facultas inhæret , minus commoda est : Rationi huic adstipulatur experientia , quâ constat , vim purgaticem , quam ∇ intactam reliquit , postmodum alij paruisse menstruo . Eapropter cū farrago sat copiosa menstruorum suppetat , quæ non modò minus sunt laboriosa ac minus pretiosa , sed & purgantibus qualitatibus extra-hendis commodiora , satius erit loco ∇ laboriosi ac pretiosi aliud quoddam menstruum eligere , e. gr. aquam de-stillatam convenientem .

Adhibetur ∇ tum simplex , tum acuatus , *vide libr. 4.*

N. Sunt

N. Sunt qui **V** cerebris destillationibus per serpentinæ, id est, serpentales canales destillatam, & in substantiam pingueum redactum, circulatum majus Puracelis esse volunt, sed male.

2. **V** vita **¶** sata Quercetani.

Quercetanus inter Medicos Hermeticos haud postremus, peculiaria prædicat menstrua, quæ tamen sibi reseruavit. Inter hæc sunt **V** vita tartarisata, ac acetum philosophicum. De **V** vita **¶** sata in *Pharmac. restit. cap. 26.* Hæc tenus inquit haud dubie animadvertisi in variis eiusmodi purgantibus extractis, varia quoque menstrua & dissolventia, apta tamē congrua à nobis usurpari, & quorum magni & egregii effectus abunde satis patet. Sed verus & peritus Chymicus, qui ingeniosa quadam arte & industria sciverit preparare **V** m vitæ tartarisata, huiusque perfectam cognitionem adeptus fuerit, is poterit inde eruere dissolventem quoddam suum menstruum generale, quo extrahet Essencias omnium rerum purgantium, radicum, foliorum, herbarum, seminum, fructuum & florum; is inquam vere gloriari poterit, de summo & elegantissimo nature mysterio, de quo non licet plura addere, ne iustam doctorum iram & reprehensionem incurram, &c. Hæc Quercetanus de s. **V** vita tartarisata, cui patrum cedere videtur, nisi proorsus eadem sit (vt multi opinantur,) ea, scilicet quam dabimus l. 4. Cl. 1. de *Vino*.

3. **Aqua temperata Basili.**

Occurrit itidem de menstruo hoc Basiliano varietas non parua. In hoc tamen conveniunt omnes, quod ex **V** originem trahat, quem alij auunt sale communi, alij sale sarmamentorum, alij spiritu salis, de quibus plenius lib. 4. de *Vino*.

4. **Acetum Philosophicum Quercetani.**

Aceti sui Philosophici crebro meminit Quercetanus, eique primas inter aceta tribuit. Verum adeo ænigmaticas illius reliquit descriptiones, ut mentem genuinam vix assequi licet. *Acetum Philosophicum*, inquit, (in terrad. de antidot. *Sophia*,) ex acido liquore roris seu manna caelestis, cum eademmet minera per digestiones, & fermentationes Philosophicas sit & preparatur, & paulo post, componimus & conficimus, inquit, (*acetum Philosophic.*) ex mixtione & convenienti proportione, fermentatione ac unione aërea aciditatis animalis & mercurialis acoris aquæ, cum vegetabili terrestri. Hæc sunt descriptiones à Quercetano reliqtæ, quatum obscuritas diversas peperit interpretationes, adeoque diversas aceti illius præparationes. Libavio fit ex rore martio & manna; aliis fit, ex mellis & salis liquefacti ana lib. 1. **X.** lib. ij. quæ digesta simul destillantur cum rectificatione aliquoties reiterata. Mòdum utrumque eti non penitus rejiciam, attamen neuter mentem Authoris satis explicasse videtur,

A a

Nimirum secundum hunc acetum philosophicum fieri colligitur, ex aceto hydromelitis vinosi, & sale vel proprio sale. Etenim mel quid aliud est quam ros seu manna cœlestis, industria apum (vnde & animale audit) congestum?

Hinc ipsem Quercetanus reiecit aliis acetis, verbi gratia, è vino & simil. utpote quæ ad solutionem & extractionem rerum metallicarum inidonea sint, præsert aceta hydro-melitum vinosorum, scil. quæ cum manna cœlesti, naturam animalem percurserunt, & præter vegetalem induerunt. Vide Tetrad. pag. mibi 406. Per terrestre vegetable Vini tatarum intelligi ex eo liquet, quod vinum omnium vegetabilium nobilissimum facit, adeoque nō vegetabile vocari ait.

5. Menstruum Universale.

De Menstruo vniuersali satius esse duco tacuisse, quam aliquid incerti tradidisse: Veruntamen non possum quin moneam, posthabitibus rebus particularibus ad subjectum universale esse aspirandum, idque querendum non quale pedibus calculatur, sed quatenus Vesta ea est nitidissima, id est, tartareâ veste involuta.

Modus parandi Extracta.

¶. Materiæ, ex qua Extractum parare liber, q. v. para ad infusione grolsè pulverifando, scil. inciendo, radendo, & simil. hinc af-

funde menstruum, (e. gr. V) ut superemineat digit. (2. 3. 4.) repone in tempore, (MB. cineris, fimi, &c.) extrahéque l. a. Tandem depletiones omnes confunde & abstrahe l. Δ. (e. gr. MB.) ad consistentiam debitam.

N. 1. Extracta cum menstruis nondum abstractis, confusa, Tinctura dicuntur.

N. 2. Cribriora sunt huiusc Extracta ex purgantibus, rariora ex alterantibus, quippe horum succi loco actitulo Extractorum, Essentiarumve ferè affervari solent.

Sic parantur Extracta:

Ex MINERALIBVS, modo iam descripto, vt patet lib. 3.

N. Extracta mineralium pleraque Tinctura nomen retinent, de quibus infra.

Ex VEGETABILIBVS, scil. 1. ex herbis. 2. floribus, 3. seminibus, 4. fructibus, 5. radicibus, 6. lignis & coriicibus. 7. aromatibus, hinc 8. ex resinis, 9. ex gummatis.

I. Herbarum extracta sunt rara, quippe [vti dictum,] succi eorum loco prostant, Fieri tamen possunt.

1. Modo generaliter dato ex herbis scil. siccis.

2. Ex succis inspissatis (si subtilliora extracta expertis.) cum V sua propria dephlegmata (spiritu) quod Extr. dein filtrandum & ad consistentiam redigendum.

3. Quercetanus. ¶. Herbas vi-

rides

ridēs , conquassat , elicitque ∇m leniter destillando **V.** Fecibus omnino siccis , (nihil tamen adustionis redolentibus ,) & in pulvrem grossum redactis , affundit ∇ illam destillatam , extrahitque s. a.

II. Florum extracta in specie sic dicta , rara itidem sunt. Succi econtra expressi inspissatique (qui communiter Extractorum ac Essentiarum nomine veniunt) crebriores , de quibus in succis agitur. Extracta prioris generis sunt.

*¶. Flores vel gemmas (e. gr. hypericonis) incide ac affunde **V.** reific. vt vndique madefiant , macerata (♂ 8.] dein expime. Expressionem purifica per digestionem ac subsidentiam (non cum albumine ovi , quod in omnibus tinturis , in quibus aliquid resinæ latitat , benè notandum.) Partem puriorem à fecibus decanta ; ∇m destillando abstrahit ; remanentemque tinturam coagula ac serva. Sic paratum visuale est extractum , seu essentia croci , quæ nonnunquam tinturæ titulo venit.*

N. Fieri itidem possunt cum aquis propriis , vel alienis , convenientibus tamen , præcipue si acidula ea fuerint redita guttulis aliquot spiritus $\frac{1}{2}$ is , vel Vitrioli.

*III. Seminum extracta eodem cum reliquis parantur modo , beneficio **V.***

IV. Fructuum extracta (propriè sic dicta ,) rariora itidem sunt , cre-

briores succi inspissati , quæ venuunt nomine saparum , rob. mellium & succorum. Fieri nihilominus quoque possunt ex fructibus siccatis per **V** , vel quod melius cum sua propria Aqua vitae , (spiritu) quæ postmodum abstrahitur relieto extracto in consistentia mellis. *Quercetanus in Pharmac. rest.* Sic fiunt extractum baccar. iuniperi , baccat. lauri. Vide & tinturas.

V. Radicum extracta visualia pleraque sunt succi. Sufficit enim si succulentæ ex sunt , faciliorisque expressionis , (non mucilaginosæ) solummodo ea coquere , exprimere ac inspissare. Nihilominus tamen parari quoque possunt extracta subtiliora , nimirum

*i. Ex radicibus minis succulentis , modo generaliter dato cum **V** parantur.*

N. Quercetanus in extractis bezardicis pavandis adhibet spiritum iuniperi , abstractamque ∇m (in inspissatione) reservat pro usu ibidem bezardico.

Sic fiunt extracta Angelic. Aristoch. Enulæ , Gentian. (cuius suēcus magis visualis est) Imperatoria , Pœoniae , Tormentillæ , Zedoariae.

*ii. Ex radicibus succulentis ac mucilaginosis , fit i. Succus inspissatus , hinc ex succo seu mucilage inspissata , l. a. cum **V** extractum confit. Sic paratur extractum Symphyti.*

186 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

3. Huc referre licet & succos qui digestione rubicundiores evaserunt, ideoque sanguinis titulum nacti sunt.

4. Radicem succulentam quancunque vis, purifica optimè, contrunde ac exprime succum; hunc in phiola digere calore M^o, donec in rubeum convertatur colore. Materiā in tubedinem conversa, omnique hypostasi sive crassamento ab ea separato, separetur liquor, qui colore albo inde destillabitur, extracto in fundo remanente sub forma sapæ rubicundæ. *Quercetanus in Pharmac. restitut. c. 26.* Sic fit extractum ex radice Hyoscyami, cuius virus est in anodyni cuiusdam & laudani compositione. Sic paratur & extractum Eculæ.

N. Ex radice Symphyti & Satyri similiter ferè modo, extracta sanguinea, seu sanguines eliciuntur. Nimirum pulpa illarum cum pane ac vino digerantur, defecentur ac inspissentur. Utrum enim verò non extracta sed succi sc. proprie dicti sunt. Vide suis locis lib. 4.

VI. Lignorum & Corticum lignorum extracta, duplicis generis ferè acquirent posunt, Viscolum scil. ac Resinosum.

Viscosum, quia naturæ est aquæ, nihil aliud est quam succus inspissatus, capropter & menstruo paret aquo, coctioneque interveniente facillimè elicetur.

Resinosum (resina, gummi alijs) sulphureo feliciter obedit menstruo, in quo excellit V, quem

aqua admiscere fas est.

Modus eliciendi extracta resinoſa,
ſeu *Gummata.*

¶. Rasur. ligni (v. gr. Guajaci) q.v. (lb. 7. 8.) affunde V optimum, (ex vino, fecibus vini, vel hydromelite vinoso,) digere vitro clauso V dies (12. 15.) & rubescet: deinde exprime fortissime, ut egrediatur quoque liquor spissus rubicundus & oleaginosus. Hinc fiat abstractio, donec materia in fundo maneat, in consistencia mellis, bulliendoque bullas emittat, non secus ac mel ipsum. Tunc calentem materiam effunde in V frigidam, & coagulabitur instar aloës, aut gummi rubei. *Querc.* *Pharmac. rest. cap. 26.*

N. 1. In conficiendis bujuscæ generis extractis, non incongrue loco V i. adhibere quoque licet hydromel quoddam vinorum, aut V as stillat. convenientes, v. gr. V. ulmarie, cardui benedicti, fumarie, & similiū, quas tamen acidulas reddere oportet cum succo Limonum aut simili. Quinimò & sola fontana, interveniente sufficiente coctione, resinosum tractum elicere potis est.

N. 2. Idem extractum cum V i. rectificatis, allectum, precipitatur non nunquam affusione V a, diciturque magisterium; ut magisterium Cinnamomi, Ialappe, &c.

Extracta Viscosa.

¶. Rasuram ligni q. v. coque cum aqua

aqua quam sufficienter, hinc exprime, clarifica, & inspissa q. s.

VII. *Aromatum* extracta ut eò promptius obdiant, V non nihil addere convenit, v. gr. &c. Caryophyllor. grossè contul. 3ij. V still. 3xij. V 3lij. macera vase clauso. Dein exprime, clarifica per digestio- nem, abstrahe aliquantulum in M, (ob spiritum qui primum extillat,) reliquum evaporate sine ad consistentiam debitam. Eodem modo fieri possunt & extracta ex aliis aromatis, v. gr. ex calamo aromatico, cardamomo, cubebis, cinamomo, &c.

VIII. *Resinarum* extractio non nisi depuratio est, quâ Resina in V rectificatissimo solvuntur, colan- tur, ac demum abstracto V inspif- fatur, vel affusa aqua, quâ sulphurea V natura diluitur ac debilita- tur, præcipitantur. Et hæc nonnun- quam titulo magisterij veniunt, aut resinae, e. gr. Resina vel Magisterium scammonij, & simil.

IX. *Gummatum* extracta sunt por- tiones gummatum, tûm viscosa, tûm resinosa, invicem scil. sepa- ratæ. Convenit igitur hæc separa- tio, iis solùm, quæ parte viscosa ac mucilaginosa constant, vt ferula- cea, fitque. &c. Gummi aliquod ferulaceum, solve lento calore, (præ- stat in cucurbita cæco alembico oc- clusa, vel vase simili,) solutum ac- depuratum repone aliquot diebus, & subsidebit pars resinosa. Hinc decantetur liquor turbidus, (à resi-

nosa parte subsidente) clarificetur- que (si opus) depurando curv al- bumine ovi, vel per linteum colan- do, vt clarus evadat; dehinc inspi- setur lenissimo calore V. Sic ha- bes viscum, i. e. extractum visco- sum.

Resinosa illa subsidentia len- to quoque calore exiccata, exhibet resinam, i. e. resinum extra- ctum.

N. Extrahit quoque resinam V re- tificatissimus.

In ANIMALIVM familiâ Extracta suppeditare possunt par- tes carnosæ, quæque his assimili- latæ membranosa, v. gr. Matrix. Hinc sterora, fellæ, ossa, cor- nua.

Ex carnibus, carnosisque partibus fieri possunt Extracta, si lora exic- centur, atque cum V, vel simili ap- propriato spiritu extrahantur, post- modumque ad consistentiam debi- tam inspissentur.

N. 1. Praestat, si primam ante- quam exiccantur, in V myrrâ esen- tificato, aliquot & macerentur. Vi- de extractum splenis bovis, lib. 5. Item extractum Mumia humana, lib. 5.

N. 2. Quercetan. Pharmac. rest. cap. 26. inspissat decocta, additique appro- priata, (vide supra in decoctis,) atque ita extracta carnosâ parat.

Ex stercoribus animalium, si qua extracta parare animus sit, per V id optimè perficies, quippe hic foetorem corrigit.

Ex fellibus. *g.* Fella exiccata, extrahe cum *V.* vide in *Bove*, lib. 5.

Ex ossibus. *g.* Ossa (v. gr. 2. vel 3. crania recentia) tere crassò modo, affundéque aquam vitæ, [iuniperi seu salvie,] vt (dig. 4. 5.) supernatet, digere vase accuratissimè clauso, (c. 12.) pòst coletur & exprimitur fortissime. Sic liquor exhibit rubicundus instas sanguinis, qui oleofus & resinosis erit. Iterum affundatur fecibus novum menstruum, digerendo, (c. 4. vel 5.) cola & exprime. Expressos liquores destilla in alembico, donec remaneat extractum in forma Sapæ. Quercet.

N. Digeri & depurari poserit.

E cornibus. Extracta cornuum sunt è teneris (cervorum) cornibus, vel è cornibus etiam induratis, sed adhuc recentibus, mediante itidem v. vitæ appropriatâ, qua acidula priùs reddita sit cum liquore *A*lis acidulo. *Querc.* *Pharmac. restit. c.* 26.

EXTRACTA uitatoria ALTERANTIA.

1. Alterantia simplicia.

Absynthij.
Acori.
Agallochi, f. Ligni Aloës.
Angelicæ rad.
Aristoloch. rot. rad.
Card. benedict.
Caryophyllor.
Castorei.
Centaur. min.
Chelidonij maior.

Croci.
Cubebar.
Dictamn. f. fraxinellæ.
Enulæ camp.
Galangæ.
Gentianæ.
Guajac.
Imperator. rad.
Melissæ.
Menthæ.
Majoranæ.
Myrrh.
Petasitid.
Pœon.
Rutæ.
Sabinæ.
Satyrij rad.
Scabiose.
Scordij.
Symphyt.
Tormentilla.
Valerian.
Zedoar.
Zingiber.

2. Alterantia Composita.

Extr. Laudanum opiatum, cum & sine Moscho & Ambra, vid. lib. 4.
Bezoardicum Querc. vid. infrā.
N. 1.
Pestilentiale 2.
Pulmonum 3.
Theriacæ 4.
Theriacæ benedicta 5.
Theriacæ cælestis 6.
1. Extractum Bezoardicum Quercetani, pro Laudano suo.
g. Rad. Angelic.
Zedoar.

Zedoar.
Galang.
Tomentill.
Cort. citri,
Lign. Aloës,
Santal. rubr.
citrin. an. ʒij.
Gran. Alkerm.
Dictamn.
Spic. nard.
Garyophyll.
Nuc. moschat.
Macis,
Cinamom,
Benn alb.
rubr. an. ʒiſ.
Camphor. ʒi.
F. Extractio cum ∇ vita Iuniperina.
Vires. Eximiariū est Virium in arendo Veneno, morbisque contagiosis, qualis pestis, febres malignae.

2. Extractum pestilentiale.

g. Rad. Angelic.
Olsnit.
Imperator.
Zedoar.
Vincetoxic. an. ʒiſ.
Tomentill.
Gentian.
Petasit.
Succif.
Pimpinell. an. ʒij.
Sem. Levistic. ʒiij.
Angelic.
Meliſ. an. ʒij.
Sem. Citt. ʒij.

Gran. Juniper. M. ij.
Fol. Veronic.
Meliſ.
Arthemis.
Scord.
Galeg.
Scabios.
Card. bened. an. Miſ.
Fl. Hyperic. M. i.
F. Extr. cum V & inspissetur.
Vires. Maximarum est virtutum in arcendo aere pestilentiali, eodemque morbo & similib. malignis affectibus curandis & praecavendis. Sudorem mouet.
Dosis à ʒij. ad ʒij. &c.
3. Extractum Pulmonum.
g. Pulmon. Vulpis, incide in frusta minutissima, ac adde
Herb. Veronic.
Hyſlop.
Scabios. ana Mſ.
Sem. Anis.
Fœnic. ana ʒj.
Coque in phiala capaci bene occlusa in MB ferventi, horas 7. vel 8. donec pulmones in liquorē redacti fuerint. Hinc colla, colaturamque inspissa l. a. addendo Sacchari q. liber, ad consistentiam extracti.
Vires. Imbecillitati ac affectibus pulmonum confert.
N. 1. Eodem modo fieri quoque possunt extracta Epatis, Splenis, & similium, ex decoctis supra ē Quercetano allatis,

N. 2.

190 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

N. 2. Praefat modus quem supra
generaliter dedimus.

4. Extractum Theriace, seu
Essentia.

Theriaca simplex & alcolisata.

¶ Theriac. Androm. opt. extractus a. tinturam cum V vite iuniperina, vel V ex tophis cervinis, vel simili V bezoardica sive theriacali. Decantatas tinturas destilla ad remanentiam Essentiae Theriaceae in consistentia mellis, quam servapro visu, titulo extracti theriacae simplicis: vel adde salem ex incinerata remanentia elixiviatum, sub nomine Extracti, si Essentiae Theriaceae alcolisatae.

N. De hoc Theriaca & similibus extractis, duo que moneam, habeo.

Primum suggestit ingredientium diversitas, quā vix credibile est, singulorum essentias & quē unī soli menstruo patere. Nec est quod oggerant, fermentando cuncta in unam naturam coactuisse: Dubium enim haud leve, utrum fermentando natura rerum adeò immutari possit, ut quæ ante menstruum rerum prorsim respuebant, facta fermentatione id ipsum amicè amplectantur.

Secundum, quod monere duxi, ipsa met præbet fermentatio, quippe quæ potissimum rerum fermentabilium partem in Q. E. exalteat, id est, volatilis, spirinalem ac volatilem reddit. Exempla sint Vinum, Cerezista, succifruulum fermentati, & similia. Eapropter cum

tinctura destillationi submitatur, quā volatilior pars abstrahitur, quis infringeret Extractum in fundo distillatorij remanens, potissimā sua parte esse extum.

Vt has difficultates evitent, sum qui species seorsim menstruis idoneis extraheant, atque Extracta postmodum coniungunt. Verum enimvero, nec hi ad metam ad quam collimant, pertingere videntur. Etenim compositionem Theriaca subeunt non pauca natura aromatica, subtilioris, tenuioris, volatilioris, &c. Qua facultates ad Theriaca constitucionem non minus necessarie sunt, quam reliqua in substantia minus volatili residentes. Idecireò, cum volatiles illi spiritus a fixioribus in inspissatione separetur, operationem Theriaca integrum in extracto hoc quis sibi spödebit? Adde quod hac ratione nonnullorum ingredientium ferocia, quæ alias fermentando in Theriaca cicuratur, indomita maneat, imò vires suas exercere aptior euadat. Praefat itaque Theriacam in sua propria substantia adhibere, quā laboriosa hac extractione operam perdere. Id quod de aliis quoque, exempli gratia, pilularum quarundam extractis censendum.

Verum enī vero, non simpliciter Theriaca extracta improbata velim, præcipue si spirituosores seu oleosoiores partes interveniente precipitatione sint reservatae. Qua in re non possum, quin industriam commendem Chymici solertissimi Friderici Greiffen Pharmacopæi apud Tubingenenses celeberrimi, Amici mei honorandi, qui imperfectionem preparationum barundem perpendens, perfectiorem,

non

non ita pridem in decade sua nobilissimo-
rum medicamentorum, iuris publici fe-
cit, unde
 1. Theriaca Benedicta Querceta-
ni austra & correpta.
 2. Solvenda.
 3. Troch. scillit. Quercetan. 3j.
 de Viper. Venetian.
 Eff. (extr.) opij cum ~~X~~ fact. 3ij.
 Succ. Glycyrrh. in V still. sol. &
 inspiss. 3i*β*.
 Eff. croci (cum V.) 3j.
 Myrrh. in ~~X~~ sol. & inspiss.
 Oliban. in gran. an. 3vj.
 Gran. styrac. cal. in V sol. & ex-
 pres.
 Gum. Arab. albiss.
 Sandarac. in gran.
 Sagapen. in gran.
 Succ. Acac. in ~~X~~ sol. & insp.
 Hypocist. in ~~X~~ f. & insp.
 ana 3i*β*.
 Asphalt. cl.
 Galban.
 Mastich.
 Opopanax. (singul. in gran.) an. 3.iij.
 Essent. Castor. 3. i.

2. Extrahenda aromata.

Piper. long. 3ij.
 Cinam. ac. 3i*β*.
 Acori, f. calam.
 Cas. lign. Verze,
 Cost. Ver.
 Pip. albi,
 nigri,
 Schoenanth.
 Spic. Indic.

Stoechad. Arab.
 Zedoar.
 Zingib. alb. an. 3vj.
 Cardam. min.
 Carbobalsam. veri,
 Cubebar.
 Folij,
 Galang.
 Garyophyllor.
 Macer.
 Spic. Celtic. an. 3i*β*.
 Lign. Aloës 3. ij.

Extrahenda reliqua.

Mirobalan. Chebul. 3vj.
 Baccar. iuniper. 3j.
 Laur. 3ij.
 Fl. Rosar. rub. 3i*β*.
 Hyperic. 3i*β*.
 Centaur. min. 3ij.
 Herb. card. bened.
 Scord. Cret. an. 3i*β*.
 Calamenth. mont.
 Dictamn. Cret.
 Marrub. an. 3. vj.
 Abrotani,
 Chamædr.
 Chamæpit.
 Orig. Cret.
 Polij Cret.
 Rorismar.
 Salv. min.
 Scabios. an. 3i*β*.
 Majoran.
 Mari,
 Lign. Aspalat.
 Santal. citr. an. 3ij.
 Agatic.

192 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Rad. Irid. Flor. an. ʒiſſ.

Angelic.

Pentaphyll.

Rhabarb. el.

Tormentill. an. ʒvj.

Aristoloch. rot.

Aſar.

Cyper. rotund.

Diptamn. alb.

Enula camp.

Gentian.

Imperator.

Meu,

Pimpinell.

Phu Pontic.

Serpentar.

Succif.

Valerian.

Vincetoxic.

Aristoloch. long.

Cruciat. an. ʒij.

Sem. Buniad. seu Napi agrest. ʒiſſ.
Petroſel. Macedon. 3. vj.

Ammeos,

Amomi racemos.

Anis. torrefact.

Citri,

Foenic. Cret.

Hyperic.

Sefel. seu Siler. mont.

Thlaspi seu Nasturt. alb. an. ʒiſſ.

Dauci Cretic. ʒij.

3. Pulverifanda.

Confect. serpentū juniperinæ Quercet. ʒiij.

Terr. sigillat. 3. vj.

Lemn.

C.C.vſti.an. ʒiſſ.

4. Liquida.

Balsam. Indici,

Ol. Nucis moschat. expr. an. ʒiſſ.

Garyophyllor.

Succin. camphorat. ʒiſſ.

Spir. Ⓛ-i, ʒiſſ.

1. F. Extractio ſeorsim medietatis aromatum & reliquorum extrahendorum, ſingulorum ſc. 1. cum V rectific. 2. cum V pluviali, Eſſentiam cum V extractam præcipita cum Extractione in V. Hinc abſtrahē in M. ac collige ſeorsim ſpiritum theriacalem primò egredientem, ſeorsim etiam V theriacalem subsequentem ad conſistent. mellis. Residua in medietatem in pulverem redige.

2. Ex remainentia incinerata elixivia Ⓛ cum V pluviali.

3. In spir. theriacali ſolve fandrac. Olib. Maſtich. storac. omnēſque Eſſentias non ſatis liquidas eo dilue.

4. Cum V theriac. in pultem redige Trochisc. de ſcillis & Vip. ſolve in eodem ſuccum Glycyrrhizæ, G. Arabic. & Ⓛ proprium.

5. In spir. Terebinth. ʒvj. ſolve Asphalturn.

6. Reliqua omnia, vt Eſs. Opij, & Hypocift. Acac. Myrrh. ſagapen. Galban. & Opopanac. ſolve in X.

7. Omnes extractiones, ſolutions, pulveres, Balsama, olea expr. deſtill. ſpiritus & Ⓛia ſ. a. commiſſe quām

quām optimē & redige in massam
pilularem. Hinc

6. Theriaca Calestis.

*¶. Theriac. benedict. prior. lib. 8.
Extrahe cum sp. Theriacali, effunde & abstrahē ad consistent. mellis. Abstractum spir. (essentiā seorsim aſſervatā) reaffunde remanentiaē priori, extrahe denuō & decanta. Remanentiaē affunde **V** rectific. ac extrahe residuam essentiām eius, decanta iterum, & confunde cum priori. Residuam remanentiam in **V** theriacali, & tandem in **X** spiritu Salis balsamicī (**1**) fortificato extrahe. Et his vltimis Extractiōnibus priores præcipita & ad confit. mellis coagula, tandem permisce.*

Magist. corallor.

Perlart. an. **3ij.**

Hyacinthi,

Rubin.

Smaragd. an. **3. vij.**

Bezoard. Animal.

Mineral.

Sal. corallos.

Perlart. an. **3b.**

Bezoard. Oriental.

Terr. sigillat.

Vnicorn. veri.

Oſ. de C. C. an. **3iij.**

Ambr. grif. **3ij.**

Inſpissa in vase dupli ci ad formam Extract. vel massæ pilularis.

Vires. *Vires Quercetanus huic atribus admirabiles in Venenis & contagiosis*

arcendis; in exagitatione spirituum humorumque ſedanda, in catarrhis, dolob. & vigiliis mitigandis. In Balsamo nativo corroborando, purgatione praeservanda, &c.

N. Rationem utrinque huic compositionis vide ſis decade ſuperius allegatā.

EXTRACTA PVRGANTIA.

Extracta purgantia simplicia, vt & qua sub nomine alicuius simplicis veniunt, vide lib. 4.

Purgantia Compoſta.

Extractum

Benedictum, *vide infrā. N. 1.*

Diacarthatum, f. Cnicopharmacum *August.*

Catholicum, *Aug.*

F. F. *vide infrā. 2.*

Sennerti, **3.**

Arnoldi VVeickhardi, **4.**

Cholagogum Querc. *Aug.*

Holagogum Andernaci, *Aug.*

Melampodij, f. Ellebori nigri

Mindereri, *Aug.*

Melanagogum Querc. *Aug.*

Panchymagogum Crollij, l. 2. *vid. infrā. 56.*

Hartmanni, **7.**

Augustanorum.

Phlegmagogum Querc. *Aug.*

Pilarum Aggregatiu. *Aug.*

Aurear. *Aug.*

Cochiar. *A.*

Lucis maior. *A.*

1. Extractum benedictum.

¶. Fol. Sen. el.

Rhabatb. an. **3ij.**

B b. 2.

194 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

- | | |
|--|---|
| Agaric. 3j. | F. Extractum cum V seorsim.
Itidem f. Extractum. |
| Vires. Purgat biliosos ac mucilaginosos humores. | 2. g. Turbith. el.
Rad. Elleb. nigr. an. 3 <i>fl.</i>
Rhabarb. 3j.
Spec. Diarthod. abb. 3 <i>fl.</i> |
| Dosis à 3 <i>fl.</i> ad 3 <i>j.</i> | Aromat. rosat. 3 <i>j.</i> |
| 2. Extractum Catholicum Franco-furtense. | Vtrunque Extractum conjungatur ad massam pilularem. |
| 3. Aloës succotrin. 3 <i>j.</i> | Dosis à 3 <i>j.</i> ad 3 <i>fl.</i> |
| Turpeth. el. 3 <i>fl.</i> | N. Felicius forsitan pro ederetur
Resina Diagrydij, Magister. Gummi de
Peru, Extract. Aloës, per se si fuerint, ut
lib. 4. docebimus, atque Trovisci Al-
bandal cum reliquis infunderentur. |
| Colocynth. 3 <i>v.</i> | 4. Extractum Catholicum, Clariſſ. |
| Agaric. albis. | D. D. Arnoldi VVicker-
hardi. |
| Diagryd. | 5. Aloës succot. fl <i>ss.</i> |
| Rad. Ellebor. an. 3 <i>fl.</i> | Rhabarb. opt. 3 <i>v.</i> |
| Spec. Diarthod. abbat. 3 <i>j.</i> | Fol. Senn. f. fl. 3 <i>viiiij.</i> |
| Macis, | Rad. Mechoac. 3 <i>j.</i> |
| Stœchad. Arab. | Colocynth. 3 <i>j.</i> |
| Galang. | Turpethi. el. 3 <i>viiiij.</i> |
| Cardamom. | Eſul. præparat. 3 <i>fl.</i> |
| Zedoar. | Gener. s. mirobalan. an. 3 <i>j.</i> |
| Caryophyll. | Cinamom. |
| Cinamom. | Zingib. |
| Fl. Anth. | Macis, |
| Lign. Aloës, | Galang. |
| Vilc. querc. an. 3 <i>fl.</i> | Zedoar. |
| Ambr. grif. 3 <i>j.</i> | Garyophyllus. |
| Infunde omnia in V & (8) ex-
ceptis speciebus Diarthod. & Am-
bra, siatque extractum, cui adde Ex-
tractum specierum Diarth. itidem
per V factum, ac Ambram. | Cardamom. |
| Vires. Omnes humores blandè purgat. | Cort. citr. |
| Dosis à 3 <i>j.</i> ad 3 <i>fl.</i> | Scheenanth. an. 3 <i>j.</i> |
| 3. Extr. Catholicum Sennerti. | Spec. Diambr. 3 <i>j.</i> |
| 4. 3 <i>v.</i> Diagryd. | Diarth. abb. 3 <i>viiiij.</i> |
| Trochisc. Alh. | F. Extra |
| Gumm. de Peru, an. 3 <i>fl.</i> | |
| Aloës 3 <i>j.</i> | |

F. Extractio l. a. cum V. & V
fœnic. exprimatur & inspissetur.

Dosis ad 3*fl.* vel 3*vij.*

5. Extractum Panchymagogum
Crollij. 1.

6. Spec. Diarrhod. Abbat.
Diambr. ana 3*j.*

Extrahatur Tinctura cum V. l. a.
vitrum crebro movendo.

Deinde

7. Pulp. colocynth. 3*vij.*
Turpeth. gummos. 3*v.*

Agaric. opt. 3*j.*

Rad. Ellebor. nigr. veri 3*j.*

Scammon. elect. 3*vij.*

Fol. Sen. 3*iiij.*

Rhabarb. cl. 3*iiij.*

Elater. 3*j.*

Sem. Ebol. trit. 3*iiij.*

Hermodact. 3*iiij.*

Incidenda incidentur, terenda
terantur; affunde tincturam illam
specierum, extrahatürque Tinctura
l. a. decantatas extractiones inspissa
leni calore M. ad consistentiam
mellis, postmodum adde

Ol. Cinam.

Caryophyllor.

Nucif. ana gutt. x.

Sal. perlar.

corall. ana 3*j.*

Salem è fecibus superioribus cal-
cinatis extractum.

Rasur. cranij human. [vel oss. cal-
cinat.] 3*fl.*

F. Massa.

Vires. Non datur melius catharti-

cum, quod minori molestia omnes humo-
res noxios expurget.

Dosis à 3*j.* ad 3*vij.* ex vino malva-
tico, vel alio generoso, è iuscule, vel aliis
carapotis aggregati vis admixtis. Datur
& in forma pilulari.

6. Extractum Panchymagogum
Crollij. 1.

7. Pulpæ colocynth. 3*vij.*

Agarici,

Scammon. cl. an. 3*fl.*

Hellebore nigri,

Spec. Diarrhod. Abbat.

Aloës succotrin. ana 3*j.*

Extrahe l. a. cum V, eumque
iterum abstrahere. Et quia in extra-
ctione sæpè virtus purgatrix solet
debilitari, ideo quidam solent ad
vnam partem extractorum addere
crudorum purgantium pacem alte-
ram: adde ergo superioribus, ante-
quam extractum in fundo remanens
planè inspissetur:

Trochisc. Alhand. 3*vij.*

Diagryd. præparat.

Agaric. troch. an. 3*fl.*

Aloës Epatic 3*j.*

Pulverisata redigantur in ma-
sam iusta consistentia.

Dosis à gran. 20. ad 25. & 30.
& vtrā.

N. Aliud vide in Pharmacep.
Augustana.

7. Extractum Panchymagogum
Hartmanni.

8. Fol. sen. f. fl. 3*j.*

Rhabarb. cl. 3*iiij.*

Bb 3

196 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Rad. Hellebor. nigr. 3j.
Turpeth. alb. gumamol.
Polypod. quern.
Trochisc. Alhand.
Agaric. Trochisc. ana 3*fl.*
Medull. sem. cartham.
Myrrh. rubr. el. ana 3*ij.*
Spec. aromat. Garyoph.
Diambr. ana 3*j.*
Cortic. citr. 3*j.*
Concisa & contusa extrahan-
tur simul omnia cum ∇ & ∇ ci-

nam. ana ibi*s.* F. Expressio. Feces
denuō extrahantur cum sola ∇ ci-
nam. tenuiori, percoletur postea.
Extracto adde extracti Aloës cum
 ∇ Beronic. vel Veronic. facti 3*ij.*
F. mistio, & inspissatio ad iustum
consistentiam, addendo Ol. Garyo-
phyllor. gran. 10.

Dosis à 9*fl.* ad 9*fl.* Hartm. in Croll.
Alias insuper descriptiones videre
poteris dict. lib.

C A P. LVIII.

De Farinis.

Farinorum conficiendarum mo-
dus vulgaris est.
Sunt visitatores in Officinis.
Farina Amyli, s. amydi, Krafft-
meel.
Avenæ,
Fabarum,
Fœni græci,
Glandium,

Hordei,
Lentium,
Lini,
Lupinotum,
Orizæ,
Pisorum,
Siliginis,
Triticæ,
Volatilis, Staubmeel.

C A P. LIX.

De Feculis.

Feculæ ex radicibus nonnullis, iſſ-
que viridibus eliciuntur, rarissi-
mè ex foliis.

Modus fieri.

g. Rad. (v. gr. ari) q. v. lotam vel
rasam, conquaſſa optimè in morta-
rio, affundendo aquam subinde, vt
fiat pulpa liquidiuscula, hanc forti-
ter exprime, expressionem liquidam
repone, ut subsideat fecula. Feculam

subsidentem exicca. Sic fiunt.
Fecula Ari,
Bryonia,
Iridis nostræ,
Liliorum albor.
Pœonia,
Serpentariæ,
Scyllæ. N. Hac operationem
habet peculiarem, vide
lib. 4.

N. Ono.

Ononis radix colta in s. q. aqua prius & aliquantulum inspissatum reposatur. (hor. 3.4.) si decoctum illud clarificatum natura, itidem ad fundum mititur.

C A P . L X .

De Floribus.

Flores in Chymia sunt subtiliores corporis partes, per sublimationem, à crassioribus particulis, sub forma sicca separatae.

Modus, ut singulis ferè diuersus est; ita & in singulis describi postulat.

Visitationes sunt.

Flores Antimonij.
Cinnabaris Antimonij,
Flores Arsenici. &c sublimatum.
Benzoin.
Mercurij varij, huc & dulcis.
Salis *.
Sulphuris varij.

C A P . L X I .

De Gargarismis, Diaclysmatis & Dentifriciis liquidis.

Diaclysmata, (Collutiones oris,) sunt liquores, qui in ore detinentur, iterumque expuntur. Hi si gargarisando adhibentur, dicuntur Gargarismi seu Gargarismata, quod tamen vocabulum etiam generaliter pro diaclymate non raro usurpatur. Eadem si phlegmati è cerebro elicendo destinantur, apophlegmatismi nomen assumunt.

Liquores hi in Officinis pro visu nulli extant, sed extempore, ad præscriptiones datas, dispensantur. Fiunt ut plurimum ex aquis, (simplici vel destillata,) succis, decoctis & convenientibus, in quibus pro libitu diluuntur syrapi, mella, sapæ (2ij, 3ij, 4ij, ad lib. 1. vñ) tantillum aceti. O vsti, (Di crudis, præparati, spiritus 10i, 10i, & simil. In summa, omnis generis

liquores, & quicquid in his dissolubile est, diaclysmata ingredi non nequeunt.

Exempta sunt:

1. *Diaclysmata Odontalgicum*
& apophlegmatizans.
2. Piper, alb.
long.
- Cubeb.
- Staphisagr.
- Cort. mori,
mandrag. an. 3j.
- Rad. pyrethr. 3ij.
- Contundantur, & ex vino albo f. decoctum, ad lib. 1. In colatura dissolvatur tantillum aceti.
- F. Diaclysmata.
2. *Diaclysmata refrigerans.*
3. Cancros viv. N. v. vij. vel viij.
Sedi maior. M. iij. vel iiiij.

Con

198 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Contunde & exprime succum.

Vires. Maxime prodest in inflammatione.

3. Diaclysmo ad gingivas.

¶. Aqu. Chelidon. min. bis destillat. 3ij.

O vsti 3j.

M. &c si libet f. filtratura.

Vires. Insgnium virium est in gingivarum putredine.

4. D. Ad fauicum inflammationem.

¶. Aqu. Plantag. 3ij.

Rofar.

Acetoſ. an. 3j.

Prunell. 3ij.

Rob. Diamor. 3ß.

⊕ præparat. 3ß.

M. F. Gargarismus.

5. Diact. apophlegmatizans.

¶. Cort. rad. sambuc. 3j.

Rad. Galang. 3ß.

Pyrethri. 3ij.

Fol. Betonic.

Origan.

Majoran.

Meliſs. an. M. j.

Cubebar. 3iſ.

Sem. Sinap. 3j.

Vvar. paſſar. M. i.

Coquantur in vino vel aqua.

¶. Colatur. ib. 6. præter propter.

Oxymel. scyllit. 3ij.

M. F. Gargarismus.

Vires. Phlegma è cerebro elicit.

6. Huc referendi ſunt LIQVORES, fricandis dentibus, gingivisque destinati.

¶. Aqu. Prunell.

Plantag. ana 3ij.

Rob. Diamor.

Syr. roſar. ſic. ana 3ß. vel 3j.

Spir. ⊕ i 3ß. M.

Inſervit ad dentes dealbandos, extergendos, ſtabiliendos.

N. Spiritus acidi proſunt maximè ad dentes dealbandos, ſed & ſtuporem eorum inducunt.

C A P. L X I I .

De Gelatinis.

Elatina est ſuccus inſpissatus, prior, clariusculus, cum ſaccharo in ſcatulas effusus & congelatus. Et hinc Gelatina dicitur.

Parantur e fructibus nonnullis ſucculentis, tum e cornibus ac offi- bus tenerioribus.

E Fructibus.

¶. Fructus, coque in V, decoctionem citra expreſſionem decanta, vel filtra, ſaccharumque addendo inſpissa.

bumine ovi,) hinc addito ſaccharo inſpissa ſenſim, & effunde in ſcatulas.

Aliter.

¶. Fructus, coque in V, decoctionem citra expreſſionem decanta, vel filtra, ſaccharumque addendo inſpissa.

E Cornibus & Offibus tenerioribus fit fine ſaccharo.

¶. Rafur. cornuum offiūmve (vel eadem

eādem in fragmenta minutiora redacta,) coque, vel digere aliquandiu in ∇ (commun. stillatitiae appropriata,) hinc coque & filtra calidē coagulāque.

N. Quod si ossa & cornua nimis durra sunt, acutari ∇ a poterit liquore aliquo acido, verbi gratia, spiritu \oplus i, X , & simil.

Sic sunt

Gelatina Cytoniorum.

Pomorum.

Pytorum.

Ribium.

Cornu cerui.

Cranij humani.

N. 1. His immiscetur nonnunquam pulveres, vel extracta, & simil. unde Gelatina composita, tum alterantes, tum purgantes, v. gr. Gelatina Cytoniorum purgans, vide lib. 4.

N. 2. Sunt qui Gelatinas Cytoniorum Marmeladas vocant, easque tum simplices, tum aromatisatas pro usu domestico parant, varijs coloris.

C A P . LXIII.

De Infusionibus.

INfusionis (infusi) nomen potio-
Inibus potissimum imponi, iisque
purgantibus, lib. 1. diximus, harum
rationem hic loci exhibemus.

Liquorem exhibit aquae stillatiæ, (tum & fontana) serum, mulsum, hydromel, vinosum, vinum, & simil.

Materia infusioni apta, eti & ex
mineralibus & animalibus sumi que-
at, tamen huius loci in primis sunt
vegetabilia, & maxime purgantia
cum corridentibus.

Modus parandi.

Recipiuntur res medicamenta-
les, preparatae ad infusionem, inci-
dendo, contundendo, limando, &c.
prout in decoctorum doctrina tra-
ditum; immerguntur liquori, quan-
titate & qualitate intentioni medi-
ce respondenti, reponunturque, si

extraactio maturanda, loco calido,
(in cineribus, vel iuxta fornacem.)
Hinc decantetur liquor, exprima-
turve pro usu.

Proprio liquoris præscribitur
ferè q. s. id est, vt materia coope-
tiatur, liquorque superemineat di-
gitos transversos 1. 2. 3. &c.

Exemplo sint

1. *Infuso Cholephlegmagoga.*

Agaric. elect. 3i*b*.

Rhabarb. opt. 3*j*.

Zinzib. 3*b*.

Spic. Nard. gran. v.

Sal. gemm. gran. iii.

Pulverilentur grossè & infun-
dantur per noctem in

Aqu. Eupator.

Cichor. an. 3*b*.

Hinc calefiant & colentur cum
expressione. F. Potus

Cc.

200 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Vires. Purgat bilem & phlegma.

N. Sal gemme additur ad faciliterandam extractionem: cuius rei gratia & sal \ddag addi poterit.

Huius generis sunt *Vina medicata.* (ut & *Cerevisia medicata,*) tum alterantia, tum purgantia. v. g.

2. *Vinum Arthriticum.*

¶. Fol. chamaedr.

Chamæpit.

Sum. Salv. ana fibis.

Flor. Primul. ver.

Anth.

Lil. conuall. ana fibis.

Raf. Lign. Guiac. 3vij.

Viñci quern. fibis.

Rad. Chin. 3ij.

Garyophyllat. 3iiij.

Vini mustim, ensur. LXXX.

Ponantur ad fervescientiam vt deferveant.

3. *Vinum Medicatum Cephalico-Spleneticum.*

¶. Rad. Garyophyllat. 3iiib.

Cichor. 3ib.

Enul. 3j.

Herb. Ceterach.

Veronic. c. fl.

Card. bened. c. florib.

Epatic. stellat. c. flor.

Summit. Centaur. min. ana Mis.

Cort. Arantior. sicc. 3b. 3ij.

Incidantur herbae, contundanturque grossè radices & cortices, infundanturque in vini mensur. viij.

Vires. Catarrhis insigniter opitulatur: caput, epas & lienem corroborat.

4. *Vinum Matricale.*

¶. Herb. Melis.

Puleg.

Capill. ♀.

Salv.

Calamenth.

Artemis. ana M. 3.

Fl. Squinanthe. 3b.

Calendul.

Cheir. ana p. ij.

Nucif.

Macer.

Cubebar.

Cardamom.

Granor. Paradis.

Zedoar. ana 3j.

Vini generosi mensur. iiiij. addendo saccharum pro libitu.

5. *Vinum purgans.*

¶. Fol. Sen. Al. f. st. (sine stipitib.) 3x.

Follicul. sen. 3ib.

Epithym. 3vj.

Sem. cartham. conquaſt. 3b.

Chialapp. 3ij.

Cort. Helleb. nigr. 3b.

Cinamom. 3j.

Galang 3b.

Zingib. 3b.

Cort. citr. 3ij.

Vini mensur. i.

Vires. Purgat humorem Melancholicum & serofum. Dosis 3ij. iiiij.

N. Plura Exempla alium petere licet, vel ex decoctis, vel ∇ is destillatis compositis huc arcessere. Nimurum species dictorum Medicamentorum non minus & hic adhiberi poterunt.

Huc

Huc pertinent *Vina Hippocratica,*
sive *Clareta.*

v. g.

6. *Claretum laxativum.*

8z. *Cinamom.*

Galang.

Garyophyllor.

Macis

Zinzib. an. 3j.

Turbith. alb. 3vj.

Fol. sene. el. 3j.

Mechoacann. 3ijj.

Sacchar. 3ijj.

Vini generosi 3xij.

Aqu. fontan. 3vijj.

Cremor. 3ij.

Stent in infusione per noctem,
dein colentur per Manicam Hippo-

craticam.

Vires. *Purgat humores melancholi-*
cos & pituitos.

Dosis 3ijj.

7. *Claretum purgatorium.* s. *Vinum*
Hippocraticum 3j. iale.

8z. *Vitri* 3 subtiliss. pulveris. 3j. 3ij.

Vini alb. opt. 3vijj.

Digerantur vase vitro benè
clauso, in MB. & P (6.) dein colla,
colaturaque adde

Sacchar. albiss. pulveris. 3ijj.
vel 3j.

Aromatisetur cum opt. v ci-
nam. & servetur. Dosis 3ij.

Vires. *Satis leniter suavitèrque ope-*

rationem suam infrà & supra exercet.
Sala.

C A P . L X I V .

De Iulebis & Moretis.

Iblebi (Iulepi) in Praxi visitatissi-
mum potionis genus constituant,
quod ob saporem gratum, pro potu
ordinario ægris praescribi utpluri-
mum solet.

Parati autem in Officina nulli
extant, sed extempore parantur.

N. *Iulepi violaceus & rosaceus Offi-*
cinarum, Syrupi consistentiam obtinent.

Parantur ex liquore potulento, in
quo Syrupi, saccharumve dissolvun-
tur; additis, prout visum fuerit, &
aliis in liquore illo dissolvi aptis, qua-
lia succi, spiritus, & simil.

N. *Syrupi vices & conservas supple-*

re potest, accidente colatura.

Liquor ille potulentus adhibetur
varius: Aqua stillatia, fontana,
(correcta pane tosto) decoctum, ver-
bi gratia, C.C. Glycyrrizæ, Hordei,
& simil.

Proportio Liquoris, lib. 1.

Syrupi 3j. 3ij. vel pro-
ut palato placuerit.

Acidiusculi adeoque gratiiores
non raro reddi solent, spiritu O-i
ad saporem gratum usque instil-
lato.

Exempl. sint.

202 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

1. g. Decoct. C. C. vsti, id est, in quo
c. c. (v. gr. ʒj. vel. ij.) sit
coctum, ib. i.
- Syrup. papav. err. ʒj.
corallor.
- Succ. Berberor. ana ʒg.
- M. F. Iuleb.
- Confert in febribus aliisque san-
guinis ebullitionibus, quas vigiliae,
alique fluxus comitantur.
2. g. Aqu. fontan. pane cor-
rect. ʒx.
- Iulep. Rosat. ʒiβ.
- Syr. cinam. ʒg.
- Aqu. Rosat. ʒiiij.
- Spir. Ⓣi q. s. ad gratum sa-
porem, videlicet ʒj. vel ʒg.
- F. Iuleb.
- Vires, Refrigerat, roborat, potiusque
gratus est egrotis.
3. g. Aqu. hordei, id est, decoct.
fibis.
- Conserv. rosar. ʒiij.
- Conquassetur conserva, tantillum
subinde decocti affundendo, hinc co-
letur, & si placuerit, filtretur.
- N. 1. Acida si decocto C. C. (in-
primis è crudo C. C.) instillaris, turbi-
dum id redditur.
- N. 2. Poterit itidem Santalo rubro
aromatizari, santali scil. ʒg. simul con-
quaſſando.
- Huius quoque loci est Moretus,
nostratis dicitur, potionis genus,
ex aromaticis, aliisve confortantibus
commixtum, addito ad gratum sa-
porem saccharo, vel syrupo.
- N. Moretus dicitur à moris seu dia-
moro ingrediente. Estque mulierculis,
nostratis potionis genus usitissimum,
quo veram imprægnationem, confortari,
falsam exturbari, persuasum sibi habent.
1. Moretus usuelts pro ditior-
ibus.
2. Diamor. c. sacchar. ʒij.
- Iuleb. rosat.
- Aqu. cinamom. an. ʒj.
- Spec. Diambr. ʒg.
- Trag Stomach. ʒiβ.
- Vini optimi, fib. i. M.
- Bibatur manè bonus haustus,
idque diebus continuis 3.
2. Moretus pro pauperibus.
3. Diamor. c. sacchar. ʒij.
- Iuleb. rosat. ʒj.
- Trag. commun. ʒiβ.
- Vini, fib. i. M.
3. Moretus absque speciebus
4. Diamor. c. sacchar. ʒij.
- Iuleb. rosat. ʒiβ.
- Aqu. cinamom. ʒj.
- Vini generosi, fib. i. M.
- N. Species que adduntur, post infu-
sionem colando iterum separantur.

C A P. LXV.

De Lapidibus.

Lapidis nomen hic sume non pro
lapidibus nativis, sed pro medi-
camentis præparatis, quæ veniant
nomine lapidis, ut sunt, 1. Lapis
vege

vegetabilis dictus. 2. Medicamenta
in duritatem terream, ac lapideam ex-
cocta.

Lapis vegetabilis nihil aliud est
quam essentiales vegetabilis alicuius
partes coniunctae, ac in lapidem q.
coagulatae. Ficque.

¶. Plantam siccām, digere cum
menstruo proprio, (v. propria stil-
latit.) destilla, ut habeas phlegma,
spiritum ac oleum. Ex remanente
ac superstite materiā incineratā ex-
trahe sal beneficio phlegmatis. Ex
cādem (seu eiusdem speciei planta)
extrahe tincturam cum spiritu illo.
Hinc imprægna ⊖ tincturā suā f. a.
ad sufficientiam. Postea adde olei
quantum imprægnatum illud sal im-
bibere potest, & in lapidem quasi co-
agulantur.

N. Huiuscē medicamenti genus et si
in Officinis paratum non extat, opere
pretium tamen esset, introducere, in quo
tamen notandum, quod lentissimo igne
in lapidem paulatim convertere id ope-
rat.

Alias lapidis nomine veniunt.
Lapis septicus, f. cauterium poten-
tiale, tum quoque lapis philopho-
rum, (de quibus Augustani,) & præ-
ter hos.

1. Lapis corrosivus.

¶. Lixivium, è quo sapo niger
coquitur. Id sartagine exceptum co-
quatur in lapidem, qui tessellarum in
formam scinditur, cūm testixerit, ac
vitro rectè obrurato servatur.

Vires. Cauterium insigne est, dimi-

dia hora spatio fonticulum inducere suf-
ficiens. Heurn. in Meth. pract.

2. Lapis, f. magnes arsenicalis.

¶ crudi

⊕ r. flavi,

⊖ albi,

Pulv. subtilissimè, lentōque igne
liquefac. Vase refrigerato eximitur
materia, qua frigore indurescit.

Vires. Vsus eius est in peste, ubi in
forma periapti de collo suspenditur: in-
greditur insuper Emplastrum magneti-
cum. Hartm.

3. Lapis medicamentosus Crollij.

f. Lapis salutis.

¶ i virid. ib. 1.

alb. ib. 8.

Alumin. ibi 8.

Anatron. id est, fel vitri,

Sal. commun. ana 3 iij.

⊕ i,

Asynth.

Arthemis.

Cichor.

Persicar.

Plantag. an. 3 8.

Ponantur in olla vitreatā, affun-
de patum acetū rosacei; ac coque i-
gne l. saepius agitando: ubi incipit
spissescere, adde

Certul. vener. ib. 8.

Boli atmen. 3 iij.

Diligentor misceantur omnia,
donec vi ignis mediocris in lapidis.
duritatem malla concreuerit, quæ
postea fracta ollā eximenda, & ad
vsus reservanda.

204 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

N. Si gummata, myrrham videlicet & thus, addere volet, instituantur coctio lenta, ne comburantur, nec vis illorum in igne evanescat.

Vites. Virtutes eius varie sunt. Tollit vlera & defluxiones; desiccatur vulnera in veterata; curat erysipelas, scabiem, tineam, serpiginem.

Modus utendi.

Liquefcat eius 3j. in V pluvial. mensura 1. filtretur, filtraturà hac vire, tum lavando, tum limeolum imbuen-do ac imponendo.

4. Alia descriptio, Iohannis Greiff.

℞. Alumin. 3ij.

℞. ali vngar. vit. 3ij.

alb.

Tartari,

Borrac.

Mastich.

Thur.

Sal * an. 3j.

Ceruf. 3vj.

Boli armen. 3ij.

Crasso modo contusa, coquuntur in olla vitreata capaci, cum H fortissimo, vt suprà. Hartm. in præt.

5. Alia.

℞. ℥. 1.

℞. ℥.

Ceruf.

Alumin.

Bol. armen. an. 3iv.

Sal. ammoniac. 3ij.

Omnia bene trita coquel. Δ cum H ad eminentiam digit. 2. affuso in olla satis capaci, donec o-

mnia redigantur in lapidem durum.

6. Alius Lapis salutis.

℞. Alumin.

Myrrh. an. 3ij.

℞. i alb.

Anatron.

Ceruf. an. 3ij.

Thur. 3j.

Bol. armen.

Ærugin. an. 3iv.

Tere simul & cum H q. s. coque, ac coagula in lapidem.

7. Lapis mirabilis.

℞. ℥. i alb.

vitrid.

Sacchar. fin.

℞. i, ana ℥. 1. β .

Sal. * 3is.

Alumin. crud. 3iv.

Camphor 3j.

Minutissimè pulverisata, miscantur cum muria sive brodio olivarum conditarum, vt fiat instar mellis. Coque dein lentè, & coagula in lapidem.

Vires. Easdem vires obtinet cum prioribus lapidibus salutis.

8. Alter : Lapis rubens dilut.

℞. Vitriol. Roman.

alb. ana ℥ 1. β .

Alumin.

Lithargyr.

Lap. calamin. ana 3iv.

H . albi puri.

Sal. ammoniac.

commun. ana 3 β .

Affuso aceto coque l. Δ semper agitan

agitando , & cum incipit spissescere
adde
Ceruf. venet. lib.

Boli arm. 3 iv.
M. diligenter , & coque in duri-
tem lapidis.

C A P . L X V I .

De Liquoribus.

Liquores hic voco humores per de-
Lliquum, aut similiter paratos.

N. In his excellunt salia resoluta, que
Balzani , vel interdum olei nomen, licet
minus accurate, sibi vendicarunt.

Resolvuntur salia per deliquum,
si aëri umido exponantur, vel etiam
humore aqueo imbibantur : reliqua
quia peculiarem modum obtinent,
quo in liquorē redigantur, specia-
liter in singulis quilibet innotescet.

Liquores v̄stiratores sunt.

Liquor. Salis ammoniaci,
Arsenici.
Corallorum.
Crystallorum.
Salis gemmæ.
Lapidis Iudaici.
Ludi, s. calculi humani.
Oculorum cancri.
Perlarum.
Saturni.
Talci.
Tartari, i. e. oleum  i.
Huc Liquor. Lumbricorum.
Myrræ.
Commendatur itidem maximopere
Liquor Lithomropicus
compositus.

 Ocul. cancer.

Lapid. Iudaic.
Lyncur.

Spongit.

Aëtit. ana q.v.

Pulveratis affunde Spiritum Sa-
lis ad digit. 3. stent in solutione ♂
aliquot , hinc depleatur solutio, re-
stitansque materia , nouo spiritu sa-
lis affuso denud solutioni submitta-
tur , donec tota ferè soluta sit. Solu-
tiones confusas coagula euaporando
vel abstrahendo. Coagulatum tritum
solue per deliquum, liquorē hunc
coagula iterum , ac solve , idque re-
pete donec coagulationem v̄terio-
rem admittere nolit.

Vires. Maximarum v̄enescetur vi-
rium in calculo resolvendo.

Dosis gutta. 1. ac altera indies propi-
nata. Vide Medull. deft. part. 1. tr. 10.

Liquor ad ulcerā.

 Calc. viv.

Sal. ammoniac. ana.

Læviga simul ; & funde ad follem
fusione maturatā , & confluit ut ∇
quam effunde. Massæ huic tritæ adde
sal  tantundem ac fuit alterutrius,
reponéque in cellam ad liquefēdum.

Vires. Savat impetigines, ulcerā fi-
stulosa , aliaque maligna & inzeterata
mundificat , & ad sanationem disponit,
proin confort in cancro, serpigne, lue ve-
nereā , & simil.

CAP. LXVII.

De Magisteriis.

MAgisterij nomen et si æquivocū sit, vti lib. 1. dictum: attamen communiter usurpatur pro pulvere, vt plurimum candido, per præcipitationem ex certis quibusdam rebus præparato. Res illæ tum è mineralibus sunt, vt terræ & lapides, tum è vegetabilibus, vt Herbae, &c. tum ex animalibus, vt ossa, cornua, crustacea.

Modus fieri.

¶. Materiam ex qua Magisterium parare constitutum est, tere aut comminue grossè, hinc affunde liquorem convenientem (acidum vel similem) vt solvatur, vel extrahatur; solutio præcipitatur (affuso liquore, vel materiâ, cuius vi solventis vis obtundatur,) præcipitatus pulvis abluitur, si opus sit ∇ communi, hinc exiccatum lentè.

Sic fiunt.

Magisteria.

1. E Mineralibus.

Tritis affunditur solvens, solviturque s. a. solutio præcipitatur, eluitur & siccatur.

N. 1. Liquor solvens vulgariter adhibetur \mathbb{X} , tum per se, tum acuatum per Sp. \textcircled{O} vel similes spiritus minerales, sc. $\textcircled{O}i$, \textcircled{O} , &c. vel peculiaris destillatur solutioni aptus liquor, de quo suis locis.

N. 2. Præcipitatio fit communiter oleo \textcircled{H} i. p. d. nonnunquam spiritu $\textcircled{O}i$.

N. 3. Quæ consistentia sunt duric-

ris, vt lapides, antea calcinari volunt. Vide specialius libr. 3.

2. E Vegetabilibus.

1. Tritis grossè, vel incisis affunde lixivium forte ex \textcircled{O} $\textcircled{H}i$, & ∇ pluviali paratum, extrahatur, decantetur ac præcipitetur affundendo aquam aluminis (in qua O solutum) exiccatum lentè.

N. 1. Præstat adhibere herbas medicriter siccas.

N. 2. Sic nobis in usu sunt tam ex alterantibus, quam purgantibus, v. g. Magisterium Rhabarbari, cuius dosis 3*lb.*

2. E Sulphureis, i. e. quæ oleosa parte scatent, extrahitur Tincturabeneficio \textcircled{V} . rectificatis. præcipitatūque affusā aq. com. vel ∇ aluminis.

N. 1. Sic fit Magist. Resinarum, Succini, Corticum resinosarum, e. g. cynam. Turpetb. Chalapp. &c.

N. 2. Extrælis Cat. non imuerit annumerari poterunt.

3. Ex Animalibus.

Ossa, Cornua, Crustacea seu Testacea exhibit sua magisteria, modo, qui de lapidibus traditur: vide licet beneficio \textcircled{X} vel spiritus aliquius mineralis acidi & acris.

Vstitutiona sunt.

Magister.

Concharum.

Corallorum rub.

alb.

C. Cerv.

Cranij.

Cranij humani.	Rubinor.
Crystallorum.	Saphiror.
Granatorum.	Smaragdorum.
Hyacinthor.	Terræ sigillatæ.
Lap. Iudaici.	Tutiaæ.
Magnetis.	Vitri Venetiani.
Mandibularum lucij.	Vngulæ alcis.
Matris perlarum.	Sic & Mag. Ialappæ.
Oculorum cancri.	Scammonij.
Ovorum struthij.	Succini.
Percarum lapillorum.	Turpethi.
Perlarum.	

C A P . L X V I I I .

De Masticatoriis.

Masticatoria, Διαμαστίκα sunt apophlegmatizantia ita dispensata, ut dentibus masticentur.

Fiunt modis tribus :

1. Simplicia, vel integra, vel in pulveres redacta, concisave mastificantur; ut Mastiche, vuæ passæ, pyrethrūm, cubebæ, folia salviæ, agericus, & simil.
 2. Eadem contusa nodulo includentur, qui ori inditus dentibus subinde comprimitur.
 3. Eadem cum cera, mastiche, carne passularum ficuūmve, tete-
- binthiñā, melle, & similib. in massam subiguntur, dentibus submittendā. v. g.
- ꝝ. Rad. pyrethr. ʒj. Nucif. Zinzib. ana Ʒij. Mastich. Ʒj. Dissolvatur Mastiche in pilâ calidâ cum pastillo; hinc cætera admisceantur subigendo in massam, vel pastillos masticabiles, pondere Ʒß.
- Item.
- ꝝ. Rad. Pyrethr. Mastich. ana Ʒß. subigantur cum cera in morsulos magnitudine avellanæ.

C A P . L X I X .

De Morsellis & Rotulis:

Morselli, (morsuli) ex omnibus Medicamentorum generibus fieri possunt, quæ non respuunt cum saccharo soluto commisceri, inque placentas indurati. Talia sunt pul-

ueres, Semina, (minutiora) condita, conservæ, olea, Extracta: Inprimis tamen ad morsellorum compositionem cooptantur pulveres, de quibus tamen notandum, quod non

D d

208 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

opus sit æquè subtile eos recipi, ac
in rotulis.

Modus fieri.

g. Sacchari q. s. solue in liquore
debito super ignem: hinc coque ad
consistentiam ut frigefactum indu-
retur, (probare id poteris tantillo in
orbiculum stanneum vel lapidem
effuso:) Hinc immisce sensim pul-
veres, optimè agita, effundéque dum
adhuc calore liquidum est, supra ta-
bulam cupream lapideam, ut re-
frigescat & induretur, demum scin-
de in tabulas.

N. 1. In purgantibus loco sacchari
recipi potest Manna, cuius proportio v*t*
& sacchari pro Medici voluntate adbi-
betur: ut plurimum recipitur sacchari
sextuplum, octuplum. &c. prout res im-
miscenda fortiores vel ingratiores fue-
rint, e. gr. ad extracta & olea destillata
maior saccharianitas expetitur.

N. 2. Nuclei ac semina emulsioni
apta, si ad morsellorum constitutionem
concurrent, pro libitu in emulsionem re-
digi poterunt, quā facebarum dissolvatur.

N. 3. Condita dupli modo mor-
sellos subeunt. 1. Conquassata. 2. In
frustula incisa.

N. 4. Olea destillata si occurrerint
in fine ea instillare oportet, vel paratis
morsellis illinere. Idem Iudicium sit de
Moscho ac Ambra, qua in aquarofar.
dissolvuntur, atque paratis tabulis il-
linuntur.

Vſitatores sunt alterantes.

Morsuli, sén tabula:

Bezoardici, è pulv. bezoardic.

Cephalici, è speciebus cephal.
è succo & corticibus citri, s. de
citro, vide infra. N. 1.

Imperatoris, è spec. Imper.

Pectorales, 2.

Post pastum, Aug.

Saccharum roſarum tabulatum.

Saponea, Aug.

ad Vermes, A.

Zingiberis cocti, A.

Purgantes vſitatores.

Morsuli

Diacarthami, A.

Diaphaen. A.

Diatrion. laxativa.

Diaturbit. cum rhabarb. è spe-
ciebus.

de Diagrydio, s. laxativi, vide inf. 3.

de Manna ☐ at. vide lib. 4.

de Mechoaca, 4.

è succo roſarum, A.

1. *Morselli de Citro.*

2. Carn. citr.

Cort. citr. condit. concis. an. 3*j.*

Ol. citr. gran. xij.

Succ. citri puriss. q. s.

Sacchar. in V citri fol. 3*xvi.*

F. l. a. Morsuli.

Sunt Cordiales vti citrum.

N. Fiant & simplices è succo, corri-
cibus, & saccharo.

2. *Morsuli pectorales, F. F.*

3. Pinear. rec. in V roſar. parat. 3*b.*

Amygd. d. exort. 3*v.*

Sem. Melon. rec.

Cucum.

Cucurb. an. 3*j.*

Spec. Diarrhod. abb. 3*iv.*

Mag.

Mag. perlar. 3j.

Sacchar. alb. in ∇ rofar. & sca-
bios. sol. 3xvi.

F. l. a. Morsuli.

Sunt nutritiui, refrigerantes, acri-
moniam mitigantes, adeoque con-
veniunt in hec*ticā*.

3. *Morsuli de Diagryd. f. laxat.*

g. Crem. 3ij.

Resin. scammon. 3*lb.*

Sacchar. in ∇ rofar. sol. 1*lb.* 1.

F. Morselli.

Purgant bilem.

Dosis adulto 3*lb.*

4. *Morsuli de Mechoaca, F. F.*

g. Conserv. violar. 3*lb.*

Spec. Diatragac. fr. 3*lb.*

Turbith gum.

Mechoac. alb. ana 3*lb.*

Diagryd. præpar. 3ij.

Ol. cinam. still. gran. vi.

anis. gran. iv.

Sacchar. in ∇ scenic. sol. 3xv.

F. l. a. confectio in morsul.

Purgat bilem ac phlegma.

Dosis à 3*lb.* ad 3j.

Vide part. 1. l. 4. observat. Cl.

Gregor. Horsty.

De Rotulis.

Rotularum parandarum modus
idem est, qui morsellorum, nisi quod
Rotulae, quia formulas illis mino-

res expetunt, medicamenta requi-
rant, quæ rotularum formationem
non impedian. Pulveres itaque sub-
tiles esse oportet, dosique minori.

Proportion sacchari vulgatissima
est octupla, ($\frac{1}{8}$) plus minus. In
purgantibus vero quadrupla, ($\frac{1}{4}$)
facch. } In oleis, stillatitiis major,
pulver. } scil. sacchar. 3j. ol. gran. iv. &c.

N. Finnt & rotule è succo & saccha-
ro, si scil. hoc in illo solutum ad consisten-
tiam iustam coquatur & rotuletur. Ve-
rumentem notatu hinc dignum, Rorulas,
quæ ex succis acidulis fiant, v. gr. è succo
citrini non admittere coctionem, sed sola
parari mixtione. Videlicet, g. Sacchari
pulveris. 1*lb.* 1. calcscat ad ignem len-
tum, hinc affunde succi, v. gr. Berber.
3ij. misce, & effunde in rotulas,

Rotulae visitatores sunt.

Rotulae de Berber.

Manus Christi simpl.

perlat.

Diatragacanth,

Aris, viae l. 3. &c.

Quinimò ex singulis pulveri-
bus & speciebus, tam alterantibus,
quam purgantibus, addito saccharo
in conveniente ∇ soluto Rotulae
pro rei exigentia fieri possunt.

C A P . L X X I .

De Oleis Stillatitiis.

Olea propriè sic dicta, triplicis
generis in Officinas veniunt. 1. Destillata. 2. Expressa. 3. Infusa
ac cocta.

Olea destillata.

Olea stillatitia ex singulis simpli-
cium familiis parati possunt, mine-
ralium, vegetabilium, ac anima-
lium.

MINERALIA, quæ Oleum fun-
dunt, maximè sunt ex genere sul-
phureorum; vt succinum, carbo
Petræ, & simil.

Destillatio illorum eadem est,
quæ resinatum, vel gummatum.

VEGETABILIA primaria, ex qui-
bus olea destillantur, sunt herbae,
flores, fructus, semina, radices, ligna, cor-
tices, aromata.

Secundaria sunt olea, resinae, gummi.

Modus destillandi olea ex pri-
mariis, eadem operâ perficitur, quâ
vñs ac spiritus destillati diximus, &
vt plurimum per vesicam.

N. 1. Felicius oleum ascendit. 1.
Si nonnihil \ominus is, vel 匱 i immiscetur.

2. Si digestio fermentatiove primit-
titur, cuius promovenda gratia nonnihil
fecum cerevisia, vel etiam \ominus is com.
 匱 iue addi poterit.

3. Si Oleum præcipue expeditur, sta-
tim auctiore igne destillatio incipi potest.

I. Ex herbis. 1. Herbas virides,
vel siccas, q. v. contunde ac affunde
vñm, (additòque \ominus is manipul. uno
ac altero, colloca ad putrescendum)
hinc destilla per vesicam.

N. Herba siccata plus olei suppeditant
quam virides.

II. Ex floribus (siccis præcipue)
olea ad eundem modum destillan-

præcipue si contusi dies aliquot
(14.) adjectâ parte \ominus is $\frac{1}{2}$ (vel hu-
ius loco sacchari,) cum vñ fuerint
macerati. Sic fiunt oleum chamo-
millæ, lavendulae, rosarum, &c.

III. Ex seminibus. 1. Semen, e.
gr. fœniculi grossè contusi, ib. 1. af-
funde vñ font. ferventem, q. s. ad-
dendo \ominus is M. 1. (vel insuper, si lib-
er, 匱 i $\frac{1}{2}$ i. aut ij.) digere dies (8. 9.
10.) hinc destilla Δ mediocri per
vesic.

IV. Ex fructibus. e. gr. baccis iuni-
peri, lauri, & similibus, simili ra-
tione, vti dictum, oleum educitur.

N. Fermentatio promoveri potest ad-
ditio tantillo fecum cerevis.

V. Ex radicibus. 1. Radices, con-
quassa, ac digere cum vñ aliquandiu,
hinc destilla per vesicam.

N. 1. Prastant siccæ, vti 匱 q. col-
lectæ fuerunt, antequam instolones abi-
erint.

2. Maiorem olei copiam si expetis, de-
stillationis residuum cum vñ illa destilla-
ta, macera ac destilla iterum.

VI. Ex corticibus non lignosis ole-
um ad eundem cum radicibus para-
tur modum, v. grat. ex cort. aranti-
or. citri. & c.

N. Prastant cortices nondum exic-
cati.

VII. Ex lignis & viscidis. 1. Seg-
menta lignorum arida, q. v. imple
retortam terream, (lutatam,) ac
destilla in excipulum sat amplum, i-
gne nudo gradatim adhibito, sic ex-
tillat primum liquor clarus, conti-
nuato

nuato hoc igne post horas (4. 5.) sequentur spiritus nebulosi : tandem auge ignem , vt fundus retortæ candelat , sic ascendit oleum nigricans & foetidum , quod à liquore separa , ac rectifica. Sic fiunt olea è ligno guajaci , agallochi , buxi , coryli , ebeni , juniperi , santali , serpentarij , sic & visorum coryli , querni , & simil.

N. 1. Fieri quoque possunt per de-
scensum , sed nostratisibus inustitum est ,
oleumque crassius exhibet.

2. Cautè procedas , nec nimium pro-
peres , spiritus enim impetuosi receptacu-
lum disjicere proclives sunt.

3. Elici quoque possunt oleakuius for-
cis ex resinosis lignorum extractis , ad
modum resinarum aliarum destillatis.
Kest. 1. cent. 86.

4. Sunt & ligna , sed pauca , qua oleum
sum , (quod subtilius ac volatilius est ,)
per vesicam cum V fontana destillata
tardè licet , profundunt , vt sassafras , li-
gnum rhodinum , cypresinum. Videlicet
ignum serratum vel minutum incisum ,
maceretur in V aliquandiu , dein de-
stilletur per vesicam ; destillatione dies a-
liquot continuata , prodit tandem oleum.

Rectificantur olea , tūm ex eucur-
bita , tūm ex vesica , cum V & copio-
sā quantitate ea destillando. Non
nunquam tamen , si ponderosiora
sint , arenæ immixta & per retortam
rectificari opus habent.

VIII. Ex aromatibus. 2. | Aroma-
ta grossè contusa , (pulveres minus
olei fundunt ,) maceretur cum men-
struo idoneo , per aliquot dies ,
(4. 5. 6.) hinc destilla per vesicam ,

sic prodit oleum & V.

N. 1. Poterit iidem & aliquid ⊖ ,
vel ⊖ , vel ⊖ i admisceri.

N. 2. Alij in eiusmodi oleis elicien-
dis amygdalas rebus addunt , vt maiorem
copiam nanciscantur , sed fraudulenter ;
etenim partem majorem ejusce olei
amygdala sibi merito vendicant.

N. 3. Alij digerunt primò aromata in
spiritu Terebinthina cokobato aliquot vi-
cibus supra ⊖ calcinato. Verum nec
hi purum oleum aromaticum nanciscun-
tur.

N. 4. Separatio olei ab V fieri po-
test. 1. Subsidendo. Nimirum si ali-
quandiu (14.) destillatum immotum
in cella steterit , subsidet oleum. 2. Fil-
trando per chartam.

I X. Ex resinis. 2. Resinarum
fb. 2. vel 3. affundatur V & quan-
titas copiosa , destilleturque per ve-
sicam.

Sic prodibit Oleum , quod
primò clatissimum stillat V & su-
pernatans (dicitur vulgo Spiritus .)

Hinc incipit paulatim flavesce-
re , muta itaque receptaculum , &
suscipte flavum hoc Oleum , (si pla-
ceret seorsim ,) continuando destilla-
tionem , donec nihil olei amplius
extillet , (dicitur Oleum .)

Tandem exime materiam in ves-
icā restitantem , (quæ colophonia
dicitur ,) cāmque destilla ex reto-
ra in arena , & extillabit oleum
crassum rubrum , (Balsamus vul-
go .)

N. Possunt quidem Olea hac & Balsamus una eademque destillatione per retortam elici, igne scilicet gradatim adhibito, verum enim verò præstat per vescicam priora illa elicere, tunc ut præcaveatur exsiccatura, tunc quoque ne eorum astu labor irritus reddatur quod aliis facilè accidit. Si nihilominus volupe sit per retortam easimul destillare, exstiratio præcaveri potest, si arenam resinam liquefacta immisceris.

Sunt autem resinæ visitatae Lentisci, (Terebinthina cypria,) Laricis, (id est, Terebinthina vulgaris,) pini.

X. Ex gummi-resinis. &c. Gummi-resin. lib. 1. inde retortæ vitreæ, (ventre capaci ut saltem tercia pars impletatur, destilla per arenam in receptaculum, aliquofā parte vasa adimpletur, primò lento, & probabit oleum, dein auctiori, & extilabit Balsamus.

N. 1. Ut fervescientiam præcaveas, arena aliquid admiscere poteris: Alylaco arena addunt tripism silicum grossè contusorum, vel salis aliquid, quo ascensionem olei promoteant.

N. 2. Reftificari potest hoc oleum per cineres cum vasa destillando; vel etiam laterum fragmenta ignita eo imbibendo, atque ita destillationem peragendo, non secus, ac destillatur oleum de lateribus.

Sic fit Oleum è Guimm. Anime, Eleni, Tacamahaca.

IX. Ex gummatis, (præcipue feruleis) Olea elici possunt ad eundem modum quo ex resinis. Nimi-

rum oleum subtilius per vescicam vasa destillando elicetur; crassius ac ponderosius per retortam. Vel si manus destillatione una eademque vtrumque per retortam elicere, destilla initio calore leniori, ac suscipe oleum subtilius seorsim; dein collige crassius igne auctiori. Præstat ramen per vescicam, ut de resinis dicatum.

N. Felicius eliciuntur hæc olea ex Extractis resinoſis, ad modum quem in resinis dedi.

Reliquorum oleorum præparations, si qua ab hisce discrepant, specialius in singulis edocebimus.

Ex ANIMALIVM familiâ exhibent Oleum, cornua, medulla cerebri, ossa, vngulae, pinguedines, sanguis, stercore, (vide de vasis.)

Cornua, ossa, vngulae, igne nudo per retortam (terrâ lutatam) peluntur, funduntque uno ac eodem labore liquorem seu spiritum acidum, (phlegmate commixtum,) oleum ac sal volatilē. Oleum id rectifica.

Medulla, cerebri ac spina fundit oleum, si admisto Æde per retortam vitream ex arena destillatur.

Pinguedines, (axungia, sevum, burzum, cera,) destillantur aliis rebus commixtae, ex cucurbita vel retorta vitrea, idque per cinerem aut arenam; commiscerent autem, vel cum lateribus pulverisatis, vel cum silicibus calcinatis, vel cum cinere arenáue, ut ead facilius oleum ascendat.

N. Quan-

N. Quantitatem rei adicienda edocbit pinguedinis destillanda consistentia, qua in aliis mollior, in aliis durior, plurunque autem sumitur pars terria vel quarta, interdum pondus aquale.

Sanguis destillatur igne nudo ex eucurbita figurina alta ac spaciofa, ad remanentiam terrae nigrae, levis ac spongiosa. Destillatum liquorum filtra per chartam, & transfibit liquor, remanente in charta oleo foetente, (in parua quantitate,) Liquor hic exhibet spiritum, Salse volatile hinc inde vasis destillatoriis adhaerescit.

N. Prestat sanguinem calentem recipere, (metretas scil. 2. vel 3.) cumque in NB, clauso vitro digerere (§ 9. vel plures) hinc per gradus destillare.

Olea destillata visitatoria.

Oleum Absynthij.

- Anethj.
- Angelicæ.
- Anisi.
- Aurantiorum.
- Butyrj maialis.
- Benzoin.
- Calami aromaticj.
- Camphoræ.
- Cardamomi.
- Carvi.
- Caryophyllorum.
- Ceræ rectificat.
- Chamæmeli.
- Chærefolij.
- Cianamomi.

Oleum Citri cort.

- Cymini.
- Cubebatum.
- Euphorbij.
- Fœniculi.
- Galbani.
- Guajaci.
- Hyslopi.
- Iuniperi è baccis.
— ex ligno, August.
- Laterinum Philosophorum.
- Macis.
- Maioranæ.
- Masticis.
- Melissæ.
- Menthæ.
- Myrræ rectific.
- Nucis moschatæ.
- Origani.
- Piperis.
- Pulegij.
- Rorismarini.
- Rofatum.
- Saluiæ.
- Saponis.
- Sauinæ.
- Serpilli.
- Smegmatis.
- Spicæ.
- Succini albi,
— flavi
- Tartari.
- Terebinthinæ.
- Zedoariæ.
- Zopissæ.

C A P. LXXI.

De Oleis expressis.

Exprimuntur Olea ex seminibus
ac nucleis nonnullis oleosis.

Modus.

32. Nucleos sicclos (ex. gr. amygdal.) non rancidos, excortica ac contunde in mortario lapideo minutissime, hinc inde sacculo, ac exprime fortiter sub praelo.

N. 1. Praefat vi plurimum massam illam tritam in fartagine torrere, vel vapore. ∇ calida tepescere. Exemplo sit vulgaris ille modus exprimendi olea ex semine Lini, papaveris, & simil.

N. 2. Eliciuntur quoque Olea sed pauca per decoctionem rei in ∇ . quâ decoctione pars oleosa supernata: sic fit Balsamus Peruvianus, oleum lauri, & similia.

Visitatoria sunt.

Oleum Amygdalarum amar.

— dulc.

Avellanarum, Aug.

Balaninum, à balano myropicā.

Cannabis.

Oleum Carthami, Aug.

Cerasorum ex nucl. Aug.

Citri è granis, Aug.

Erucæ sem.

Hyoscyami, ex semen.

Iuglandium, ex nucleis.

Lauri Aug.

Lini sem. Aug.

Macis.

Nigellæ, ex sem.

Nucis moschata, Aug.

Olivarum ex olivis maturis.

N. Hoc Oleum intelligitur, quories

Olei simpliciter mentio fit.

Omphacinum ex olivis immaturis.

Ovorum, ex vitellis.

de Palma, f. de palla.

Papaveris.

Pericorū nucleor.

Pinearum.

Pistaciorum, Aug.

Raporum sem.

Ricinīnum, f. de Chervā.

Sesaminum, Aug.

C A P. LXXII.

De Oleis per infusionem & coctionem, &c.

Olea hæc tum simplicia, tum cōposita, Officinis visitatissima sūt.

Modus parandi.

1. *Simplicia recentia incisa coquuntur in oleo mixto aquæ, vino aliivè liquori convenienti, idque*

tantisper, donec humiditas aquæ exhalat̄.

2. *Sicca simplicia in oleo mero macerantur.*

Commodior modus hicce est, Herbis exiccatis ac pulverisatis affundē

funde oleum, digeréque in MB. horas (12.) dein exprime fortiter, expressionem expone calorí leni, ut fæces subsideant, quas separa.

N. Oleum communiter adhibetur olivarum, interdum omphacinum, vel aliud, de quo peculiaris semper occurrit admonitio.

*Visitatoria Olea insolata
simplicia.*

Oleum Absynthij, cum Oleo Omphacino.

Abrotani.

Anethi.

Chamælinum.

Cheyrinum.

Cydoniorum, c. Omphac.

Enulae; c. Ol. Sesamin.

Euphorbij;c. Ol. Cheyrino.

Formicarum.

Hederae terrestris.

Iasminum.

Irinum.

Liguistrinum, Cyprinum, de Alcanna.

Lilinum.

Liliorum convall.

Lumbricorum, c. Ol. Omph.

Mastichinum, c. Ol. Omph.

Menthæ, cum Omph.

Melilot. ex fl.

Momordicæ, ex fruct.

Myrtillorum, c. Ol. Omph.

Myrtinum, c. Ol. Omph.

Nardinum simpl.

Nicotianæ.

Nymphaeæ alb. c. Ol. Omph.

Populeum,

Ranatum,

Rosatum vulgare.

— — Omphacinum.

Rutæ.

Sambucinum.

Scorpionum simp.

è Styrace.

Verbasci.

Vernisum, Vernix, c. Ol. Lini.

vide lib. 4. Juniper.

Violarum ex fl.

N. Huc pertinet & Balsamus .
Lithargyrj, & simil. que nibil aliud sunt quam oleum s. spiritus Terebinthina mineralibus illis impregnatus.

Olea cocta composta.

Oleum de Capparibus.

Castorei.

Costinum.

Croci.

Hyperici.

Liliorum.

Majoranæ, f. Sampsuchinum.

Mandragoræ.

Moschellinum.

Nardinum comp.

Papaverinum.

de piperibus.

Resolutivum.

Rosarum Mefuræ.

Scorpionum compositum:

— — magnum.

Stomachale Cratonis.

Vulpinum

Zanetinum Melichij. Cord.

in append.

E e.

216 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

1. Oleum febrifugum Strobelbergeri.

2. Ol. Nymphææ unius saltem anni.
Lumbricor.
Rosar.
Hyperic.
Amygdal. am. an. 3j.

Mixtis impone scorpiones vivos
No. ix. Exponantur Soli (paretur si
possibile in ingressu ☽ in signum mo-
vel ☽) donec moriantur scorpio-
nes, tunc etiam adde,

Theriac. Andr. opt. 3ß.

Relinquantur insolari per 14.

Vires. Eadem vires cum aliis scor-
pionum oleis lib. 5. descriptis obtinet.
In primis tamen inservit Emplastrum fe-
brifugo conficiendo.

2. Oleum Hyperici compositum, s. Bal-
samus Hyperici. Nobiliss. Georg.
Goleri à Rabenstein.

3. Olei Hyperic. opt. lib. Vini generos. sextar. tres.

Ol. Terebinth.

Laterin.

Lumbricor. an. 3jj.

Cera 3j.

Pinguedin. human. destillat.

Ol. de medulla (hum. vel cerv.)

destill. an. 3jj.

Theriac. Andr.

Mithridat. an. 3j.

Visc. querc.

Tiliae,

Coryl. an. Mj.

Fol. Persicar.

Rut. murar.

Pyrol. an. M. iij.

Flor. Antirrhin. M. viiiij.

Hyperic. M. vj.

Verbasc. M. ij.

Betonica.

Centaur. min.

Prunell.

Conf. lid. aureæ,

Ptarmic. Austriacæ,

Chelidon. an. M. j.

Sem. Antirrhin. 3ß.

Hyperic. 3ß.

Rad. Dracuncul. maculat.

Aristoloch. rot.

Symphyt. an. 3ij.

Scrophular.

Fabariae, Crassul. maj. an. Mj.

Bulliant sive coq. in diplomate, va-
se optimè clauso ad consumptionem
Vini. Exprimantur fortiter ; postea
imponantur.

Croc. 3j.

Mumiæ,

Mastich.

Thur.

Myrrh. an. 3jj.

Denuò coq. leviter, dein pro cir-
culatione ponantur ad Solem, hyc-
me ad fornacem.

N. Non opus est predictum oleum
vel Balsamum de novo sapientis confi-
vere, siquidem Balsamus iste ad so-
lem collocatus facile ex novo floribus,
superius annotatis, & foliis Per-
sicaria & Pyrola, necnon & semi-
ne Hyperici augeri potest, & de novo
restaurari, hec tantum injicendo &
ad tempus aliquod in sole digerendo,

post-

postmodum hyeme colando, & ad formam collocando. Quòd enim vetustius hoc oleum fuerit, èo efficacius & nobilior evadet.

Nus & Applicatio: 1. Hoc oleum sive Balsamum excellentissimum existit contra hausta venena, introsumptus: Hac ratione conditione, ut prius conciteretur Vomitus per lixivium, vel oleum olivarium calide bibitum, vel quod melius, per △ Nicotiana, s. Tabaci.

2. Calculum & iænas pellit, sepius in ovo coelto assumptum.

3. In magna quantitate exhibit vermes ventris necat & expellit, praesertim si in △ Persicaria exhibetur.

4. Prædicto modo usque patrum, corpus ab omni corruptione & maledictis ulceribus præservat, ut planè nulla in corpore humano sive interius sive exterius nasci queant.

5. 6. Auriginem quoque & Hydropsin discutit.

7. Interna iudicem vulnera & que contusa sunt mirabili effectu curat.

8. Vomitum sanguinis & Dysenteriam vi compescit atque constringit.

9. Vulnera omnia externa, qualia cuncte sunt, etiam ea que Venenatis armis inflicta fuerint, mira celeritate Balsamica vi contrahit atque conglutinat, omnia alia vulnerum symptomata prohibens ac tollens. Si linteola rasa in eo madefiant & vulneribus imponantur illa sepius lavando & extergendo. Possunt insuper hoc oleo omnia Emplastrum Sticticum, quemadmodum & reliqua in sua virtute & efficacia sola malaxatione confortari,

ut maioris inde virtutis & energia sint.

10. In capitis & vulneribus ubi cranium quoque ad duram vel piæ matrem lesionum fuerit, optimè & studiose cævandum, ne prædicta linteola nimis humida vulneribus supponantur, sed antea per quam bene expressa sint: Si vel una gutta sola super duas illas membranas caderet, jam de vulnerato aedium esset, & insaniam incurceret.

11. Præterea omnes impressiones magicas, ab imaginatione, iaculatione, imprecationibus, & laniarum præstigiis inflictas, stupendo planè modo irritas facit, & personat, tam introsum sumptum, quam exterius illatum, applicatiove.

12. Quod si aliqui culiri, ligna, vitræ, setæ, panni lacerati, filii, canis, crines, testa & quacunque alia intra corpus & stomachum, vel etiâ gula, unde suffocationis periculum incurrit, per incantamenta & præstigia impacula fuerint, si que nullis aliis medicamentis cedere velint: Hoc oleo invigantur, ac ipsi quoque ad bibendum exhibentur, quantitate trium cochlearium. Admirabilem vim experieris: Vel enim prædicta omnia, per aliquod magnum ulcus excitatum tanquam aliquod emulctorium protrudet, vel per vomitum rejiciet, aut tandem per inferiora cogit, ac tandem eger penitus incoluntis citra omnem perditionem evadet. Balsamum hunc mecum communicavit Clariss. Dn. D. Ioh. Christophorus Eisenmenger, Physicus Imperialis Reip. Heilbronensis, Amicus ac Frater mens honoratissimus.

218 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

3. Oleum Hyperici compositum D.
D. Erhardi Ellenbergij.

Scord. rec. an. M. i.
Centaur. min.
Diptamn. Cret.
Rorismarin. an. M. β .
Coq. in oleo, prius herbis contu-
sis per ♂ 3. in M. F. colatura. De-
inde. ♀. Rad. Zedoar.

8. Fol. Hyperic. recent. M. iii.
Contunde modicè, deinde su-
perfunde,

Diptamn. alb.
Angelic. gummos.
Aristoloch. utriusque
Carlin.
Valerian.
Gentian.
Tormentill.
Vincetoxic.

Ol. de scorpion. simp. lb. iii.
Ponantur in ♂. per ♂ 4. Postea
in M. per horas 24. coque & fortiter
exprime. Cola oleum per Colato-
rium vino albo lotum. Deinde Ad-
de,

Cort. Citt. ana 3i.

Flor. Hyperic. recent. con-
tus. M. iii.
Relinquito denuò ad Solem horis
♂ 4. & mox coquito in M. cola ut
antè. Idem repetendum cum floribus
semper recent. bis tèrve, donec oleum
sanguineum acquisiverit colorem.
Hinc

Contusa infundantur, & coq. per
♂ 4. in M. & extim. fortiter, ac in-
terim injiciantur:

♀. Cymat. semin. Hyperic. imma-
turatum, modico vino albo genero-
so madefactatum lb. iii.
Coque in M. per ♂ 3. postea
exprime ut antè, & hoc reiterandum
quater semper cum cymis recentibus.
Post hæc.

Garyophyllor.
Macis,
Scheenanth. an. 3i.

♀. Card. sancti, (benedict.)
Melis.
Verben.
Scabios.
Betonic.
Chamaedr. an. M. β .
Contunde modicè, & coq. in M.
per triduum: deinde colla. Colatu-
re injiciantur
Sum. Galeg.

Santal. rubr. 3i.
Bacc. iunip.
Laur. an. 3ij.
Cinam. ac. 3j.
Benzoin.

Storac. cal. an. 3vj.
Contusa & hæc ponantur in M.
per ♂ 3. dein colentur. Postea
♀. Bufon. No. ij.
Natricum No. 1. { Serpentem no-
bis neck dictam
seu Boam.
Aranear. viv. No. C C.

Injiciantur in oleum prædictum,
& coque per ♂ 2. Postea abjiciantur,
& imponantur

Rha-

Rhabarb. el.
Myrrh. fin.
Aloës Epat. an. 3ij.
Croc. 3j.
Spic. nard. 3iſ.
Thetiac. Andr.
Mithridat. ana 3vj.

Coq. in diplomate per ♂ 4. nec
amplius coletur, sed conservetur pro
usu.

Vſus. Valet præcipue contra omnia
Venena. Illinitur arteris manuum, pe-
dum, & cordi; repetitur illitio tribus al-

ternis horis. Pestem tam curat, quam
præservat. Dolores colicos demulcet.
Vrinam provocat. Vermes per secessum
expellit. (illitum umbilico :) Valet ad
vulnera venenata, que vel ab animali
venenato, vel ferro infecto sunt inflitt a.
In paronychia nibil præstantius, si statim
ab initio antequam inflammatio veneno-
sa supervenerit, facta fuerit inunctio.

Hoc oleo fruere ex communicatione
Iacobi Holtzapffel Pharmacopæi no-
stratis diligentissimi, Affinis mibi dile-
ctissimi.

C A P . L X X I I I .

De Potionibus.

Potulentorum genera in Praxi uisi-
tatoria diximus esse apozemata
seu decocta, Aquas, Emulsiones,
Infusiones, Potionesque alias. De
prioribus alias dictum, de posteriori
hic loci agendum.

Est Potio, de quâ huc agimus, li-
quor, in quo alia Medicamenta cra-
fiora diluta sunt, & præcipue pur-
gantia: Quin & solæ infusiones non
nunquam sufficiunt.

Modus ergo parandi sola ferè mix-
tio est, quam, si res diluenda seu dis-
solvenda, viscosa & tenax fuerit, in
mortario absolvere convenit.

Liquor adhiberi potest varius, usita-
tius tamē recipiuntur decoctiones, in-
fusiones, & maximè aqua destillata.

Res dissolvendæ sunt Syrupi, Ele-
ctuaria, Extracta, Manna, pulveres,
& Similia.

Exemplo sint.

1. *Potio purgans.*
¶. Extr. Fol. sen. 3iſ.
Rhabarb. 3iſ.
Cnicopharm. 3iſ.
Syr. Dialer. 3iſ.
Rosat. solut. 3v.
Aq. Cichor. Betonic. an. 3iſ.
Cinam. 3j. (ad saporem, &c.)
Fl. Acac. 3j.
M. F. Potio pro vñâ vice.
Vires. Educit humores biliosos & pi-
tuitosos.

2. *Alia.*
¶. Fol. sen. 3ijſ.
Epithym. 3ij.
Rhabarb. el. 3iſ.
Spic. celt. 3j.
Infundantur in decoctione pe-
ctorali, q. f. per noctem.
In colatura dissolve.
Syrup. rosat. sol. 3iſ.
Confect. Hamech, 3iſ.

E e 3

220 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

F. Potio.

Purgat humorem melancholicum.

3. *Porio sudorifera.*

4. *Diascord. Fracastor. 3ij.*

Aqu. 1*ij.* 3ij.

Meil. Gran. Juniper. 3j.

Extr. card. benedict. 3*ij.*

Aqu. card. bened. 3ij.

M. F. Potus.

Vires. Sudorem mouet, viriumque repetatur.
insignium est in febribus malignis.

4. *Alia sudorifera.*

5. *Liquor. Lumbric. 3ij.*

Theriac. Andromach. 3j.

Spir. 1*ij.* 3j.

Aq. cinam. 3j.

Mixur. simpl. 3j.

Aq. Veronic. 3*ij.* M.F.P.

Vires. Admirandarum virium est
in arthritide vagâ, si semel ac iterum

C A P. LXXIV.

De Pilulis.

Pilulae fieri possunt 1. ex rebus qui-
busunque siccis, beneficio visci-
di ac glutinosi alicujus liquoris (sy-
rupi, mucilaginis, succi aliquantu-
lum inspissati, extracti, & simil.) in-
corporatis.

2. Ex solis succis extractisve in-
spissatis.

N. 1. *Salia liquationi fermentatio-*
nique apta sunt; idcirco siqua admiscen-
da, in minima dosi admisceri volunt.

N. 2. *Extracta vel succi inspissati re-*
diguntur commodius in pilulas, si adda-
tur nonnihil pulveris appropriati, quam
si sola inspissatione incrassentur.

N. 3. *Possunt & olei guttula una ac*
altera instillari.

Modus fiendi.

6. Medicamenta convenientia
(pulveres,) atque cum liquore vi-
scido conveniente, contunde quam
optimè in mortario, ut exacte cun-
cta misceantur ac cohærent.

N. Pilula, et si ex omni generis me-
dicamentis parari possint, rariores tamen
sunt alterantes, crebriores purgantes.

Sunt

Pilulae alterantes usitatores.

Pilulae de Bdellio, Augst.

Bechicæ, Cord.

Pilulae Bechicæ albæ } convenientia
nigræ } cum Tro-
chis, à quibus sola
formæ differunt.

de Castoreo, A.

de Cynoglossa, A. C.

Kenod.

Febriles, vide infra. N. 1.

Narcoticæ Plateri, 2.

contra Tussim, 3.

Pilulae purgantes.

Pilulae de Agarico Meluæ, A. C. R.

Aggregativæ majores Meluæ,

l. Polychrestæ, A. C. R.

Aggregativæ minores Meluæ,

A.

Ale-

- Alephanginæ, f. aromaticæ,
Pilulæ Solis Mes. A. C.
R.
Alephanginæ *Valerij Cordi.*
de Aloë Iota, A. & C.
rosata, A.
& Mastiche, A. C.
de Ammoniaco *Querc. inf. 1.*
Arabicæ Nicolai, A. C.
Arthriticæ, f. arthreticæ, A. C.
Affaieret Avicennæ, A. C. R.
Aureæ Nicolai, A. C. R.
N. Alias Pilulas huius nominis con-
scriptis Marsilius Ficius, quas & Ma-
gicas vocat. vide VV ecker.
Pilulæ Benedictæ, A. C. 2.
Cholagogæ, *Querc. v. 3.*
Ante cibum.
N. Pilularum, quas ante cibum ap-
pellant, varie occurunt descriptiones.
Sunt enim qui omnibus pilulis stomachi-
cis id nominis imponunt. Renodæ sto-
machicas Galeni ita communiter appellari ait. VV eckerus diversas exhibet
descriptiones pilularum ante cibum, tum
& pilularum ante & post cibum, dista-
rum.
Pilulæ de Colocynthide Dama-
sceni, A. C.
Dicuntur & hoc nomine Pilula de
Nitro Tralliani.
de Esula, *Fernelijs v. 4.*
de Eupatorio maiores, Mesuæ A.
C. R.
N. Potius Pilula de Rhabarbaro di-
cenda sunt.
de Euphorbio Mesuæ, A. C. Quer-
cetani, 5.
Febriles, 6. 7.
- Fœtidæ Mesuæ, A. C. R.
de Fumaria Avicennæ, A. C.
R.
de Hermodactylis, A. C. R.
de Hiera picra, A. C.
Hiera simpl. A. C.
de Hiera cum Agarico, A. C.
composita, A. C.
Hydroticæ, A.
Hydropicæ, *Bontij. 8.*
Iliaca Rhafis, 9.
Imperiales, A. C.
N. Renodæ alias exhibet, quæ
& Catholicae indigitat.
Indæ Haly, A. C.
de Lapide armeno, C.
Lazuli, Mesuæ, A.
C. R.
de Ladano, 10.
Lucis majores optimæ Mes. A. C.
minores, *Cord.*
Marocostinæ, *Mindereri, 11.*
Masticinæ, *Conciliatoriis, A.*
C. R.
de Mechoacanna, *Renod.*
de Mezereo Damasceni, A. C.
de quinque generibus Myroba-
lanorum, Tralliani, A.
C.
de Nitro, f. Diacolocynthidos
A. R.
Octomeræ, f. de octo rebus, Ni-
colsii, A. C.
de Opopanace, Mesuæ, A. C.
Panchymagogæ, *Quercet. 12.*
Pestilentiales Avicennæ, f. com-
munes, A. R.
N. Corda dicuntur pestilentiales,
Ruffi, seu de tribus.
- Pestilen-

222 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Pestilentiales Florentinorūs. A.

Ruffi, A. C.

de Rhabarbaro Mesuæ, A. C.

de Sagapeno, s. Serapino, Mesuæ

A. C.

Quercetani 13.

de Sarcocolla Mesuæ, A. C.

Sine quibus esse nolo Nicolai.

C. R.

Stomachicæ Alkindi, A. C. Me-
suæ C.

de Succino, 14.

Tartareæ melanagogæ, Querc. 15.

Tartareæ Bonij, 16.

Tartareæ meæ descriptionis, 17.

ALTERANTES.

1. Pilula febriles.

2. Extr. card. bened. 3*β*.

centaur. min. 3*j*.

C. C. ust. præparat.

sal. absynth. an. 3*β*.

Cum Syrupo de card. benedict.

F. num. xx.

Vfus. Exhibeantur ante paroxysmū,
expecteturque sudor.

2. Pilula N arctica Plateri.

3. Opij puriss. 3*l*.

Infunde V vitæ 3*β*.

Dissolv. lento calore, eodemque
exsicca.

Deinde alia affusa V vitæ molle-
scat, additis ol. cinam. gran. 2.

Postea.

4. Cinam. 3*ij*.

Sacchar. cand. 3*l*.

Piper. 3*l*.

Sem. coriandr. 3*ij*.

Croci 3*β*.

Subtilissimè pulverisatis adde
opium dissolutum, sensim opio pul-
veres miscendo.

Postea cum syr. de papaver. redi-
gantur in massam pilularem, adden-
do moschi 3*β*.

Massa hæc diu in mortario agite-
tur, & ne exsicetur, Ol. de Been pa-
rum subigatur. Servetur in loco hu-
mido.

Vires. Dolores sopiunt, somnum con-
ciliant.

Dosis gran. ij. Sennert. in Institut.

3. Pilula ad Tuſſim.

4. Succ. Glycyrrhiz.

Thur. ana 3*l*.

Myrrh.

Croc.

Opij, ana 3*j*.

Cum Syr. pap. errat. q. f.

F. Massa.

Vires. Casarrhos subtile & falsos à
capite ad pectus incrassant, ebullitiones
humorum fistulæ, tuſſimque sedant.

Dosis à gran. viij. ad 3*l*.

Purgantes :

1. Pilula de Ammoniaco Querce-
tani.

2. Aloës cum V Endiviæ soluta &
purificata, 3*lv*.

Gumm. ammoniac. in  scyllit.
soluti & colati.

Myrrha in Vino, igne M dissolu-
ta, & dum calet adhuc,
transcolata, an. 3*β*.

Masticis,

Spec.

Spec. Diatr. Santal. an. 3ij.

Croc. 9ij.

Sal. Fraxini, vel Absynth. 9iv.

Cum Syrupo de stechade, vel
de succ. rosarum.

F. Massa Pilularum.

Vires. Purgant insigne tartarum,
omnemque faculentam corporis mate-
riam, magnopere conferunt adversus om-
nes defluxiones, cackexias, oppillationes lit-
nis, eiusdemque duritiem & scirrum,
febres quartanas inveteratas: prestant-
issima sunt ad homines corpulentos eva-
cuandos.

Dosis à 3ß. ad 9j. ad laxationem al-
vi, alias ascendit poterit ulterius.

2. Pilula benedictæ, F. F.

Aloës rosat. 1bß.

Gum. Ammoniac. in guttis, s. pu-
rissimi, 3ij.

Succ. card. benedict. inspissat. 3j.

M. cum vino albo, vel V card.
bened. rectificatâ.

F. Massa.

N. Aloë succorina purissima subti-
lissimè teritur, succus rosarum incarna-
tarum ad pulvis consistentiam permisce-
tur, siccatur, teritur.

Vsus ante & post pastrum, imo eius
initio ac fine.

Dosis gran. xv. 9j. &c.

3. Pilula Cholagogue de Centaurio
Quercetani.

Succor. optimè depuratorum
Centaurij minor.
Rosar. pallidar.

Eupator. Mesua,

Rad. oxylapathi, an. 3iv.

Quibus adde aloës præparat. (ad
modum Quercet. vide lib. 4.) 3vi.

Digerantur MB hor. duodecim,
ut fiat perfecta dissolutio & mixtio,
dein omnia coagulentur ad mellis
consistentiam.

Cui adde.

Pulv. Rhabarb. 3i.

Xyloaloës,

Myrrhæ, an. 3ij.

Croci,

Cinamomi, an. 3b.

Spec. Diatr. santal.

Trochisc. Diarrhod. an. 3i.

M. F. Massa.

Vires. Profundit in omnibus febribus
biliosis, arquato morbo, & cachexia. Ie-
coris itidem, caterarumque partium nu-
tritioni dicatarum, obstructionibus miri-
ficè auxiliantur.

Dosis à 3ß. ad 3j.

4. Pilula de Efsula Fernelij.

2. Cortic. rad. Efsulæ minor, mace-
ratae hor. 24. in & succo
portulacæ 3ij.

Grana Ricini expurgata & torre-
facta, numero xl.

Mirobalanor. citrinor. 3iβ.

Chamædryos,

Chamæphytos,

Spicæ nardi,

Cinnamomi, ana 9ij.

Omnia tenuissimè trita, exci-
piantur Tragacanth. V. rosar. so-
lut. 3i.

F. Massa.

Ff.

224 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

N. Esula non sit recens, sed saltē ante menses octo collecta.

Vires. Valde turbant, sed sunt efficaces in corporibus robustis.

N. Minus exiccabuntur, sed & minus efficaces erunt, si excipiantur syrups ororum solutivo, non mucagine Tragacanthi.

Dosis à 3j. ad 3ii. &c.

5. Pilula de Euphorbio. Quercet.

℞. Euphorb. præparat. (ad modum

Quercet. vide lib. 4.) 3i.

Spic. nardi,

Masticas, an. 3vi.

Opopanac.

Sagapeni præparat.

Bdell. ana 3b.

Agaric. troch.

Troch. Alhandal, an. 3ij.

Syrupi violati acidulis q. l.

F. Massa.

Vires. Mirabiles sunt contra omnis generis febres chronicas, intermitterentes atque quartanas, necnon contra omnes cachexias, hydropsin & colicos dolores.

Dosis à 3j. ad 3ii.

N. Habet Quercetanus & pilulas pestilentiales de Euphorbio.

6. Pilula Febriles s. Tiales ad febres Hartmanni.

℞. Vitri 3ij (iusto tempore si fieri potest, & diligentissimè) præparati, prætereaque cum spiritu ℥ i albitificati & tenuissimè pulverisat. 3b.

Sacchar. candi 3ij.

Farin. tritic. 3iv.

Croc. elect. 3j.

Coque cum V. commun. L. Δ, ad consistentiam pultis, cavendum tamen studiosè, ne in fine massa aduratur, sed ferè panis formam habeat. Asservantur in integritate sua quadriennium: Postea tandem scabritiem contrahunt, minus deinde utiles.

Vires. Mirificè febiles minerat, aliisque symptomata exhaustiunt. Exhibentur ante paroxysmi insultum, cum vestigia horroris gliscunt.

Dosis à 3b. in pueris; ad 3j. in adultis fortioribus.

7. Pilula febiles ad quartaniam, Sennerti.

℞. Ol. 3ij saccharati, 3L.

Aloës succotr. 3b.

Ambr. gryl. 3ij.

Croc. 3ii. (vel essent. croc. 3i.)

F. Massa pilularum.

Vires. Purgat per inferiora nonnunquam per sudorem.

Dosis 3b. ante paroxysmum, cum conserva u. g. roforum, &c.

N. Dicitur Laudanum mercuriale.

8. Pilula Hydropea Bony, Medic apud Hollandos quondam celeberrimi.

℞. Aloës opt. 3ii.

Gumm. gutt. gamb. subtiliter pulver. & cum malvatico dissoluti & lavigati, 3ii.

Diagryd. eodem modo parat. 3i.

Gumm. ammoniac. 3ii.

℞ Plat. 3b.

Cum syrup. ros. sol. F. Massa.

N. He

N. Hæ sunt illæ pilulae, ex quibus una cum P reis, infra descriptis, Bonius Principis Auriaci Medicus, maximam sibi famam acquisivit.

Vires. Edunt aquas potenter.
Dosis à $\text{D}\beta.$ ad $\text{Dj}.$

9. Pilula Iliaca Rhasis.

¶. Colocynthid.

Sagapen. ana $\text{Zvi}.$ Diagryd. $\text{Zij}.$

Cum succo porri.
F. Massa.

N. Alij omisso succo porri, solvunt sagapenum in vino, eoque reliqua suscipiunt.

Vires. Solvunt passionem illiacam ac colicam, cephalalgias, hemiuranicas salubres sunt. Verum cum iudicio usurpanda. Dantur à $\text{Dy}.$ ad $\text{Zj}.$

10. Pilula de Ladan.

¶. Ladan. $\text{ZB}.$ Mastich. $\text{Zj}.$

Calfiant in mortario & dissolutis adde,

Troch. Alhand. $\text{Zij}.$
El. de succ. rosar. $\text{ZB}.$

Cum Syr. ros. sol. q. f. F. Massa.

Vires : Subducunt alvum, mucilaginemque P ream emollient & expurgat, usque sunt insignis in dolore colico.

Dosis à $\text{Dj}.$ ad $\text{Zj}.$

Greg. Horst. obs. part. 1. l. 4. obs. 11.

11. Pilula Mæcostina. Mindereri.

¶. Mari veri,

Croc. Orient. ana $\text{Zi}.$

Agar. trochisc.

Cost. veri Indici,

Myrrh. elect. an. $\text{ZiB}.$ Ammoniac. thymiam. $\text{Zij}.$ Rhabarb. cl. $\text{Zvi}.$ Lign. Aloës $\text{ZB}.$

Aloës succotrin. &c.

1. Solvatur ammoniac. in P scyllit.

2. Diluatur myrrha lavigata in P rotac.

3. Diluatur aloë lavigata in mucharo rosat. $\text{Zvi}.$ defecetur, collecturque.

Hinc mixtis his tribus, affunde succ. limon. aut citri, $\text{Ziv}.$ addéque agaricum cum succis apij, fœnic. & absynth. in puliculam subactum, accidente modicâ irroratione ∇ cinamomi, vt & Rhabarbarum simili modo cum succis cichor. pimpinellæ ac fumariae subactum.

His ita mixtis, terantur crocus, costus, & lignum aloës, diluanturque cum aqua. rosat. fragar. & succ. citri, ana.

Tandem confunde utrumque, & affunde.

Aqu. Lupul.

Borrág.

Betonic. an. $\text{Ziv}.$

Card. bened.

Agrimon.

Ivæ arthritic.

Centaur. min.

Rorismarin.

Ceras. nigr. an. $\text{Ziv}.$

Digerantur in MB , $\text{O} \rho$ $\text{Z}.$ dein decantetur, filtretur & abstrahatur.

F. f. 2.

226 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

in M^b, postmodum inspissetur ad (erit Massa lib. ij.) adde
consistentiam pilularum,

Ex fæcibus residuis fiat de novo
Extractio, cum extillata illa & abstra-
cta v s. a. extimatur leviter, cole-
tur & inspissetur pro pilulis.

Vires. *Mucilaginem tartaream in*
ventri uolo mesenterio, liene, epate col-
lectam incident, paulatim educum; vi-
scera eadem, ut & caput simul roborant,
ad eoque morbis quamplurimis inde or-
tum trahentibus succurrunt. Vide &
pilulas Tartareas Querc.

Dosis à 3*lb.* ad 3*ij.* extracti prioris,
posteriorius enim dosi exhiberi potest ma-
jori.

12. *Pilula Panchymagogæ Quer-*
cetani.

ix. Aloës optimè præparat. (mo-
do Quercetan. vide lib. 4.) lib. af-
fundere succum violatum optimè per
digestione n depuratum, atque ad
mellis consistentiam inspissatum, ex-
pone calori Solis, vel simili, singulis
diebus rudiculâ ligneâ agitando, sic
exactè paucis diebus, commiscebun-
tur. Mixtione suo tempore (prout
habere recenter poteris.) adde

Succorum, (optimè per dig-
stionem depuratorum, & ad mellis con-
sistentiam inspissatorum,) sc.

Florum primulæ veris,
Persicæ arboris,
Rosæ, pallidar.
Cichorij,
Bugloss.
Hyperic. ana 3*iv.*
His cum Aloë perfectè mixtis,

Extract. Sennæ,
Agaric.
Rhabarb. an. 3*ij.*

Cinnamomi,
Pulv. fœnic.
Anis. ana 3*ii.*
Spec. Diatrias antali, 3*iv.*
F. Massa.

13. *Pilula de Sagapeno Querc.*
ix. Sagapen. gummosi, depurat. 3*vii.*
Ammoniac. depurat. 3*ij.*
Extract. t. ochre. Alhand. 3*i.*
Diagrid. 3*ii.*
Salis gemm. 3*ii.*

Cum syrupo violato acidulo &
tincto, f. Massa, ex qua conficiantur
pilulæ in pisli vel ciceris formam.

Vires. Admirandi sunt effectus in
febribus quartanis, dissolvunt nimirum
fæces gummosas, & tenaciter corpori no-
stro adhaerentes.

Dosis, unica pilula initio paroxysmi,
continuando aliquot dies. Sed usum e-
arum præcedat præparatio, v. gr. cum
decotis præparantibus melanaggis, &
similib.

14. *Pilula de Succino Cratoni.*

ix. Pulv. Succin.
Mastich. an. 3*ii.*
Aloës 3*x.*
Agaric. 3*ij.*
Aristoloch. rot. vera, 3*ii.*
Cum Syrup. de Betonic. q. f.
F. Ma. a.

Vires. *Alvum leniter solvant, caput*
roborant.

robort. adeoque à catarrbis præservant.
Præscribit auctor bis in mense, sumere
que iubet post primum somnum.

Dosis 3j. Crato.

15. Pilula Tarareæ seu Melanagogue,
Quercetani.

16. Crystall. vel tremor. $\frac{1}{2}$ i, 3ij.

Polypod. quern. 3ij.

Pallul. Corinthiac. 3iB.

Myrobalan. omnium, ana 3B.

Flor. Buglos.

Borragin.

Nymph. ana p. 1.

Coquantur in f. q. aquarum fu-
maria & scolopendria ad medietati-
tis consumpcionem. Hinc

17. Decocti huius depurati ac cla-
rificati, ib. ij

Succi pomorum redolentium de-
purat. ib. 1.

Adde

Follicolorum senæ mundat. 3ij.

Turbith.

Rad hellebor. nigr. veri, an. 3iB.

Macis.

Myrrh. el 3j.

Caryophyll.

Cinamom.

Epithym. an. 3B.

Macerentur & digerantur ad
ignem MB, (§ 4) vnde viireo clauso;
dein dum materia adhuc ferver, fiat
expressio, vel per setaceum traje-
ctio, cui adde aloës depurat. 3ij O-
mnia sufficienter coagulentur ad
ignem lentum: addendo sub finem
dum ferè refrigerata erit materia,

Spec. Diarthrod. abb.

Lætic. Gal.

Troch. Dialac. an. 3i.

Sal. Ablynth.

Fraxin. an. 3ij.

Essent. (tintetur.) croci, Dij.

Ol. anis. aliquot. guttul.

Reducantur in bonam pilula-
rum consistentiam.

N. His pilulis adjicit interdum Ef-
fentias Aloës & Scammon. Essent. (ex-
tract.) Rhabarb. an. 3iB. Essent. (extr.)
Sen. 3j & Essent. (extract.) Trochisc.
Alhand 3B. vel amplius, vocataque poly-
chrestas.

Vites. Admiranda illarum virtus
nunquam satis laudari potest. purgant
utramque bilem, omnes humores cras-
fos, tartareos, falsos & mucilaginosos
radicibus elicunt. vel è partibus etiam
profundissimis; succurrunt dñe for ma-
niacis & melancholicis affectibus, febri-
bus quartanis opitulantur, & conduceunt
adversus psoram, cancrum, lepram, &
luem veneram. eo quod purificant totam
massam sanguinis à variis corruptioni-
bus, diversorum affectionum effectrisibus
causis. Sumi possunt mane ac vesperi
post cœnam parciores, & ante son-
num.

Dosis 3j. vel 3iB. ad summum.

16. Pilula $\frac{1}{2}$ ea Boni.

17. Aloës succotz el 3ij

Gum. ammoniac. (cum $\frac{1}{2}$ squill.)
depur. 3iB.

$\frac{1}{2}$ G. lat. 3iB.

F. l. a. Mast.

Vites. Prioribus subtiliti ipso sunt.

228 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

maximi enim sunt levaminis in morbis
reis, quales sunt affectus hypochondriacus, obstrutio sienus, mesenterij, &c.
Incidunt enim tartaream mucilaginem,
in primis que in prima ventris regione
collecta est, eamque per dectionem ex-
purgant.

Dosis à 3j ad 3i. mane; vel ante ca-
nam, 3i.

N. 1. Tanta sunt apud Hollando-
es estimationes, ut piaculum habent, com-
unes eas reddere.

Duplicis autem circumferuntur ibi-
dem sortis.

1. Parantur viiam dedimus.

2. Recipiunt Extractum Rhabarbari,
paratum ex Rhabarbari cl. 3i. &
corrigentibus spec. diamargarit. frig. &
diarrhoeod. Abbat. an. 3j. in succo citri
per nolem maceratis, in quorum colar-
tura dissolvuntur species superiores, fit-
que l. a. Massa. Et sic respicuum magis
Epar, regionemque secundam bile le-
vant.

N. 2. Eadem illa priores pilulae, ad-
dito syracis 3j. nostratibus in usu sunt,
ex ordinatione D. D. Petri de Spina,
Medici ut celeberrimi, ita dexterri-
mi.

17. Pilule $\frac{1}{2}$ rea mea descriptionis.

32. Aloës lucid. fragat. id est, cum
succo fragorum insucca-
tæ, 3i.

Resin. ammoniac. 3iiii.
Sal. & subdulc.

Essent croci Orient. an. 3i.

Magister. $\frac{1}{2}$ i purgant. in V bu-
glossæ aliquoties soluti &
coagulati, 3ij.

Extr. Gentian. 3iib.

Cum tintura $\frac{1}{2}$ i.

F. Massa.

Vires. Saburram tartaream & mu-
cilaginosam ex infimo ventre inprimis
educit; Lienem, Vterum & Epar infar-
ctu liberat, morbosque inde prognatos fe-
licissime curat.

Dosis 3i. vespere ante cœnam assump-
ta. Quippe die subsequenti leniter deje-
ctiones aliquot causatur.

N. 1. Constitueram pilulas has, nuptie
quarum operationes optatas, multoties
expertus sum, mibi soli reservare, at vi-
cit candor & amor in proximum,
cuius saluti non prodesse, vetat conscientia.

N. 2. Desideras forsan, amice Leitor,
in numero Pilularum, Angelicas vulgo-
dictas, quas Clariss. D. D. Hartmanno
Beyero, p. m. Officina nostra acceptas
referunt. Has libentissime inscruisse, nisi
cautum esset illas propalare. Ea-
propter excusatum me habeas, certoque
tibi persuadeas, descriptiones multorum
ingredientium, quas pro Angelicis ven-
ditari videris, non esse genuinas, ipsa
enim duobus solis nituntur vegetabilis-
bus. Suntque Extractum propriè di-
lum, Extracto impropriè dicto com-
mixtum, &c.

C.A.P.

C A P . L X X V .

De Pomis Ambrae.

Poma ambrae sunt ex odoratis cidentalibus admixtum sit,) atque in corpora.
pulveribus, (addi & olea possunt,) quæ cerâ, styrace liquidâ, balsamo Indico, mucilagine Tragacanthi, cum tantillo Terebinthinae ad tenacitatem si opus sit, suscepit, additâ que ∇ rosarum, vel simili optimè incorporati, in globulos prout vi sum fuerit, rediguntur.

N. Nomen mutuantur ab Ambra, non quod ea necessariò & semper ingrediatur, sed quia odorem suavem spirant, adeoque ambram emulantur.

Exemplo sint.

1. Odoriferum Crollianum.

2. Macis,

Caryophyll.

Cinamom. vel cass. lign. odorat.

ana 3ij.

Moschi 3*b.*

Zibett. 3ij.

Gumm. Arab. 3*t.*

Tragacanthi, prius supra fornacem siccata. 3ij.

Hæc duo gummata cum mof scho terantur.

Omnibus diligenter tritis, misce Zibettam, & affunde aquam Naphe, (id est, ex floribus aurantium,) seu Damascenæ odoriferae, pro libitu, (ex odoratis specificis, & ∇ rosarum preparatae, in qua prius per 8. dies in digestione modicum de Paracelsi carbon. vel Zibetta Oc-

N. 1. Carbon seu Zibetta Occidentalis, quantum ex Paracelsi Archidox. conjecturari potest, nihil est aliud quam sterlus seu $\frac{1}{2}$ r humanan, in digestione aliquandiu positum, & ex foetidissimo illo odore, sponte sua, longa digestione summam suaveolentiam natum. Vide Hartman. in Croll. ut & lib. 5. class. 1.

N. 2. Poterit etiam parari, si pulverisata mucilagine Tragacanthi (in ∇ a odorifera soluti) suscipiantur.

Vires ac Usus. Adhibitum naribus odore suo sanguinem movet, & cor supra modum refocillat, in Apoplexia, Epilepsia, Colica, suffocatione matricis, pestilentiali aura.

N. Misceri potest tantillum cum oleo nucifæ expresso, ut fiat q. linimentum, & insupra dictis morbis debito modo adhiberi. Croll.

2. Aliud Pomum ambre.

2. Storac. calamit. 3*b.*

Benzoin.

Ladan. ana 3*b.*

Caryophyllor. 3ij.

Nucif.

Macis, ana 3*t.*

Rad. iureos Fl.

Cyper. rot. an. 3*b.*

Fl. Rofat. 3*t.*

Lavendul.

Majoran. ana 3*b.*

Storac.

230 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Storac. liquid. 3*fl.*
 Zibett. 3*fl.*
 Mosch. 3*j.*
 Cum Balsamo Indico, & V ro-
 sat. ana q. f.
 F. Massa.
 3. Alind.
 3*fl.* Ladani pur. 3*fl.*
 Styrac. calam. 3*ij.*
 Benzoin. 3*fl.*
 Nucis moschar.
 Cinamom.
 Macis, ana 3*fl.*
 Coriandr.
 Garyophyllor. ana 3*j.*
 Mastich.
 Oliban. ana 3*fl.*

Lign. Aloës. 3*fl.*
 Ambr. gran. v.
 Mosch. gran. x.
 F. Massa.
 4. Alind.
 2*fl.* Styrac. cal. 3*ij.*
 Mastich.
 Thut. mafc.
 Sandarach. an. 3*fl.*
 Costi, spic. an. 3*fl.*
 Lign. aloës ping. 3*ij.*
 Mosch. ambr. an. gran. aliquot.
 Terebinth. parum.
 F. Pomum.
 Fluxus inhibet.
 N. Vide sis & apud August. Pom.
 Ambra, t. 2.

C A P. LXXVI.

De Præparatis.

Præparata Officinarum communia-
 ter & in specie sic dicta, nihil a-
 liud sunt, quam simplicia nonnulla
 duriuscula in tenuissimum pulve-
 rem accedente aquâ aliquâ cordiali
 tedacta.

Taliâ sunt : Terræ, Lapidæ, Perlæ,
 Corallia, Vngulæ, Crustacea, (te-
 stacea.)

Modus.

&c. Rem præparandam, lœviga su-
 per porphyrite, lapide versatili quam
 minutissime, inter lœvigandum asper-
 ge aquam aliquam cordiale, (ut plu-
 rimū V rofarum adhibetur,) ut fiat
 instar pultis, hanc expone loco repi-
 do, vel aëri, ut in umbra exicetur.

N. Quæ solidiora & duriora, adeoque
 minus levigabilia sunt, ustione antegref-
 sâ calcinari, friabiliaque reddi solent, ut
 cornua, ossa, crustacea, & simil.
 V sitatoria sunt.

Præparat. Cinnabaris.
 Conchæ marinae.
 Corallic alba.
 rubra.
 Cornu cervi: ustum.
 Cranium humanum.
 Crystallii.
 Granati.
 Hæmatites.
 Hyacinthus.
 Lapis Armenus.
 Iudaicus.
 Lazuli.

C A P V T L X X V I I .

231

Lazuli.
Magnes.
Mandibula Lucij pisces.
Margaritæ.
Mater perlatum.
Ocul. ♂.
Ova Struthij.

Percarum lapides.
Rubinus.
Sapphirus.
Smaragdus,
Succinum.
Tutia.
Vngula alcis.

C A P . L X X V I I .

De Pulueribus & Speciebus.

Pulueres ac species fiunt triturâ
laevigatione, quarum apparatus
nonnunquam, exiccatio, calcinatio-
que antegressæ.

N. 1. *Res si subtilioris volatilioris-*
que fuerint substantia, trituram minus
fortem expescunt.

N. 2. *Res pulverisanda, etiam si com-*
misceri debeant, si sint diuersæ duritie,
seorsim terantur.

N. 3. *Quia virtutes pulverum faci-*
lè evanescunt, præstat, quorum pulveri-
satio sine mora perfici potest, nisi crebri-
oris sint usus, integra affiruare.

Pulueres sunt tum simplices,
tum compositi.

Simplices magis usuales sunt.
Pulvis Agarici.

Afari.
Aurantiorum cort.
Caryophyllorum.
Cinnamomi.
Croci.
Cubebarum.
Concharum febrilis, v. lib. 5.
Glycyrrhizæ.
Hellebori albi.

Ialappa.
Lumbricorum.
Mechoacannæ.
Rhabarbari.
Santalorum cunctorum.
Senæ.
Pulvis Serpentum, vide lib. 4.
Tormentillæ.
Ventriculi gallinarum.
Zingiberis.
Pulueres composti prostant sub titulo
puluerum vel specierum.
Sunt usuales pulueres alterantes.
Pulvis contra Abortum, August.
Adstringens Galen. A.
Anonymi contra Phthisin, A.
Bezoardicus Nicol. A.
N.B. Alium habet Renodess
sine pretiosis, infrâ 1.
cum pretiosis, 2.
Electuarij de bolo, A.
Cachecticus Quercetani, 3.
Cæfaris gryseus, A.
rubeus, A.
contra calculum, A.
ad casum, A.
de cineribus Auicen. A.

Gg

232 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

decypro, 4.
 Cypheos, A.
 ad dentifricia, A.
 Dentifricius, 5.
 contra defluxiones, 6.
 Dysentericus, 7.
 Epilepticus Marchionis cum
 & f. Vnicornu, A.
 Antepilepticus de secūdina, 8.
 Antepilepticus diaphoretici-
 cus, 9.
 pro Epithemate cordis, A.
 epatis, A.
 Febrilis, 10.
 Fortis. Tragea fortis, 11.
 Grossus. Tragea grossa, f. spe-
 cies incisæ, 12.
 Haly, A.
 Hepaticus. Tragea hepatica
 Quercet, 13.
 Hystericus. Tragea hysterica
 Quercet, 14.
 Hysteric. A.
 Antinephriticus. Tragea An-
 tineph. Quercet, 15.
 Partum provocans, A.
 Helidei de Padua-
 nis, A.
 Rubeus Pannonicus, A.
 Saxonicus, A.
 Sperniolæ compos. 16.
 Stomachicus, Quercet, 17.
 ad strumam, A.
 Trithemij, 18.
 Violarum odoratus, A. C.
 Pro ulceribus gutturis A.
 Species Diamb. cum ambra & mo-
 scho, A.

Diamb. fine ambra & mo-
 scho, A.
 Dianisu, A.
 Dianthon, A.
 contra Apoplexiā, A.
 Aromaticæ caryophyllatæ,
 cum & fine ambra &
 moscho, A.
 Aromaticæ rosat. cum & fine
 ambra & mo-
 scho, A.
 Diacalamenthes, A.
 Cephalicæ, 19.
 Diacinnamomi, A.
 Diacorallij, A.
 Confectionis cordialis, A.
 Cordiales cum & fine ambra
 & moscho, A.
 Diacubebatum, 20.
 Diacurcuma, f. Diacrocū, A.
 Diagalanga, A.
 de Gemmis calidæ, cum &
 fine ambra & mo-
 scho, A.
 de Gemmis frigidæ, A.
 Ducis, f. Electuarij ducis, A.
 de Hyacintho, A.
 Diahylopū, A.
 Imperatoris. A.
 Diaireos Salom. A.
 simplex, A.
 visitatae, Ibid.
 Iustini, f. Electuarij Iustini, A.
 Dialacca, A.
 Lætificantes Galen. cum &
 fine ambra & moscho, A.
 Lætificantes Rhafis, A.
 Liberantes, confectionis libe-
 rant. A.
 Lithon

LXXVII. 233

Species Lithontribon, A.
 Diamargariton calidæ Aui-
 cen, A.
 Diamargariton frigidæ Ni-
 colai, A.
 Diamoschu amare, A.
 dulcis, cum & sine
 ambra & m. A.
 Diapenidion, A.
 contra pestem, Ferdinandi
 Imper. A.
 Diattrion pipereon, 1. & 2. A.
 Diapleres archonticon, cum
 & sine moscho, A.
 Diapætonias, cum & sine am-
 bra & moscho, Cerd.
 Diaprassiu Nicolai, A.
 Electuarij resumptivi, A.
 Diarrhodon abbatis, cum &
 fine moscho, A.
 Rosata nouellæ, A.
 Diaspoliticon, A.
 Diattrion Santalon, A.
 Diathamaron, cum & fine
 moscho, A.
 Diatragacanthi calidæ, A.
 frigidæ, A.
 ad Vermes, confectio ad ver-
 mes, A.
 Dia-Xyloaloës, cum & sine
 ambra & moscho, A.
 DiaZingiberis, A.
 Huc Sal Philosophorum. 21.
 Sacerdotale. 22.

Purgantes Phlueres.

Pulvis Arheticus Paracelsi. v. infr. 1.
 Cholagogus Quercetani, 2.

Puluis Cornacchini, 3.
 Laxatiuus, Tragea laxatiua,
 Cord.
 Melanagogus Quercetani, 4.
 Nasalis, ad nasalia, A.
 Panchymagogus Quercet. 5.
 Passavanticus, 6.
 Phlegmagogus Querc. 7.
 Salæ, 8.
 Senæ præparat. Montagn. A.
 Solutiuus de tribus, A.
 Magistralis Stoc-
 italdi, A.
 Sternutatorius, A.
 Sternut. Rulandi, 9.
 Baumannii, 10.
 ad suppositoria communia, A.
 acutiora, A.
 sicca,
 Tartari præparat. A.
 ad vermes, A.
 Species benedictæ laxatiuæ, id est,
 Electuarij benedict. la-
 xativ.
 Diacarthamu, id est, Electua-
 rij Diacarth. A.
 Caryocostini, i. e. Electuar. A.
 Episcopi, f. Elescoph. A.
 de succo rosarum, id est, ele-
 ctuarij.
 Diaturbith cum Rhabarbaro.

PVLVERES ALTERANTES.
 1. Pulvis Bezoardicus sine pretiosis,
 F. F.

Bol. armen. ver. cum aqu. sca-
 bios. præparat.
 Terr. sigillat. Silesiac.

G g 2

234 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Rad. diptamn. alb.	Succin. præparat.
Tormentill. an. 3 <i>vii.</i>	Cinamom. ana 3 <i>iv.</i>
Angelic.	Sacchari, q. s. vt fiat pulvis gustui
Gentian.	gratus.
Rad. Petasit.	Vires. <i>Est summum Remedium qd</i>
Zedoar.	<i>cachexias, tam virginum, & mulierum,</i>
C. C. ust. præparat.	<i>quam virorum, iuvenum ac senum.</i>
Succin. alb. præparat.	<i>Dosis cochlear. s. manè continuando</i>
Ols. de C. C.	<i>ad dies aliquot.</i>
Rasur. Ebor.	4. <i>Pulvis de Cypro, odoriferus.</i>
Cort. citr.	¶. Rad. Ireos Flor. 3 <i>iiij.</i>
Corall. rubr. præparat.	Cyperi rot.
an. 3 <i>iiij.</i>	Acot. an. 3 <i>vij.</i>
M. F. Pulvis subtilissimus.	Lign. Santal. citr. 3 <i>iiij.</i>
<i>Dosis ad 3<i>j.</i></i>	Rhodij. 3 <i>j. viij.</i>
2. <i>Pulvis Bezoardicus cum pretiosis.</i>	Spec. Diambr. 3 <i>vij.</i>
¶. Pulv. modò præscripti, 3 <i>i.</i>	Troch. Gall. moschat. 3 <i>j.</i>
Margar. præparat. gran. xvi.	Mosch. 3 <i>iiij.</i>
Hyacinth. præparat.	Ambri. gran. x <i>ii.</i>
Rubin. præparat.	F. Pulvis.
Granat. præparat.	Vires. <i>Pulvis est odoriferus, confor-</i>
Bezoard. Orient. ana gran. viii.	<i>tans spiritus vitales & animalis.</i>
Fol. argent.	5. <i>Pulvis Dentifricius.</i>
Aur. ana num. i.	¶. Silic. fluviatil. calcin. 3 <i>vij.</i>
F. Pulvis subtilissimus.	Lap. pumic. præparat. 3 <i>iiij.</i>
Vires. <i>Cordialis ac diaphoreticus in-</i>	Rad. Ireos Fl. 3 <i>vij.</i>
<i>signis, usque precipui in morbis ma-</i>	Ol. stillat. rofar. 3 <i>iiij.</i>
<i>lignis.</i>	F. Pulvis subtilissimus.
<i>Dosis à 3<i>j.</i> ad 3<i>y.</i></i>	Vires. <i>Exterget dentes, factorem oris</i>
3. <i>Pulvis Cacheeticus Quercetani.</i>	<i>emendat.</i>
¶. Limatur. chalyb. in tenuissi-	N. 1. <i>Alium vide apud August.</i>
mum alcohol. per V simplicem re-	N. 2. <i>Dentifricij pulveres sunt po-</i>
dactæ, vel cum ½ re calcinata. 3 <i>i.</i>	<i>tissimum ex pulverisatis corallis, calci-</i>
Fec. rad. Ari, 3 <i>iiij.</i>	<i>natis ossibus, cornibus, lapidibus, cru-</i>
Ambt. grif. 3 <i>iiij.</i>	<i>staceis, radicibus ireos, crusta panis to-</i>
Essent. corall. (Magist.)	<i>fta, salibus vestis, cineribus, & simil.</i>
Margarit.	

6. Pul

6. *Pulvis contra defluxiones*, Germ.

Flusspulver, Rotblaußpulver,

F. F.

℞. Mastich. alb.

Succin. in fragm.

Summ. Sabin.

Rut.

Oliban.

Sem. cannab. ana ȝ iij.

Stoechad. citr. M. ij.

M. F. *Pulvis grossus.*

7. *Pulvis Dysentericus Crollij.*

℞. Succin.

Sang. dracon.

Lap. Hæmatit.

Corall. rubr.

Sem. Portulac.

Plantag.

Anthor.

Rad. Tormentill.

Terr. sigillat. an. ȝ iij.

Balaustior. ȝ i.

Nucif. num. iv.

Cinamom. ȝ b.

Croc. ♂ adstring.

Talc. calcinat.

Matr. perlar. calc.

Ols. microcosm. calc. an. ȝ i.

Lapides lævigentur, reliquias que minutissimè tritis addantur.

Vires. Vale. in omnibus profluviis ali- vi, menstruorum, narium, &c.

Dosis ȝ j. ad ȝ iib. vel ȝ ij.

8. *Pulvis antepilepticus de secundina.*

℞. Secundin. puelli primogeniti ex- iccat. ȝ b.

Cranij maris calcinat. ȝ i.

Pulv. pullorum corvi, ȝ ij.

Coagul. lepor. ȝ i.

Rasur. C. C. ȝ ij.

Castor. ȝ b.

Succin. albifs. ȝ ij.

Visc. quern. C. decresc. colle- ðti, ȝ b.

Granor. & rad. Pœon. ante no- vilunium collect. an. ȝ b.

Ambr. gris.

Moschi, ana ȝ b.

Spec. Dianth.

Diapliris archont.

Lætific. Galen.

Corall. præparat.

Margarit. præparat. an. ȝ j.

F. *Pulvis subtilissimus.*

9. *Alius Antepilepticus Diapho- reticus.*

℞. Cinnabar. ȝ ij purificat.

Magist. corallor.

perlar.

cran. humana. ana.

F. *Pulvis subtilissimus.*

Dosis à gran. 10. ad 16. bis in septi- mana exhiberi potest. Hartm. in Pract.

Sennert. Instit.

10. *Pulvis febrilis.*

℞. Rad. Diptamn.

Petasit.

Zedoar.

Fol. scord. ana ȝ ij.

Sem. card. bened.

C. C. ust. præparat. an. ȝ i.

♂ diaphoret. ȝ iij.

F. *Pulvis subtilissimus.*

10
236 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Vires. *Est contra omnis generis febres, quas per diaphoresin expellit.*

Dosis 3j. Grunlingius.

11. *Tragea fortis. Species fortes.*

¶. *Piper. nigr. 3ij.*

Zingib. 3r.

Croc. Or. 3i.

Caryophyll.

Galang. an. 3ij.

F. Puluis.

Vires. *Vsus esse potest in aromatis sandis cibis.*

12. *Tragea grossa. Species grossa.*

¶. *Glycyrrhiz. 3β.*

Cinamom. ac. 3v.

Zingib. alb.

Calam. arom. an. 3ij.

Galang.

Zedoar. an. 3ij.

Nucif.

Garyophyll.

Macis,

Cubebar. an. 3j.

Confect. anis.

fenic.

carv.

coriandr. an. 3vi.

Aromata incidentur grossio modo, confectionibusque admisceantur.

Vires. *Confortat ventriculum, adeo que digestionem iuuat.*

13. *Tragea Hepatica Quercetani.*

¶. *Corall. rubr. præparat.*

Spod.

Spec. Diatragac. an. 3ij.

Fl. Hepatic.

Sem. acetos.

Portulac. an. 3i.

Croc. ♂ optimè præparati, 3iiß.

(cum ∇ simpl. vel cum ♀.)

Croc. ♂ ex Ol. ♀ parat. 3ij. (vi-

de lib. 3.)

Sacchar. rosat. pro libitu.

F. Puluis.

Vires. *Puluis est admirabilis, contra omnes obstrunctiones, imbecillitates, ac intemperie hepatis, cui pristimum robur reparat: singularis porro adversus omnes fluxus hepaticos, cachexias, hydroperies, ieterum, &c.*

14. *Tragea Hysterica Quercet.*

¶. *Cass. ligneæ,*

Calam. aromat.

Sem. agni casti,

Pastinac.

Rutæ,

Pœon.

Anis.

Fœnic.

Cardamom.

Macis,

Cinnamom.

Caryophyllor. an. 3i.

Fec. Bryon. 3iß.

Sacchari anthosati, ad pondus omnium.

M. F. Puluis.

Vires. *Prodest albo mulierum fluori,*

& vteri suffocationi.

Dosis 3iß.

15. *Tragea Antinephritica Quer-*

cetani.

¶. *Tunicæ interior. ventriculi Gal-*

linæ.

Sterco

Stercoris albi Gallin. an. 3*β.*
Pulueris pelliculae interioris, quæ
in putaminibus ovorum
reperitur, 3*iiij.*

Herniariae,
Cinnamomi, an. 3*iv.*
Nucleor. mespilor. 3*ij.*
Sem. Foenicul.
Anis. an. 3*j.*

F. Puluis subtilissimus.

Vires. Effectus pulueris knius efficacissimi sunt in alterando, & expellendo calculo. Valet itidem ad colicam passionem.
Dosis 3*β.* ad 3*j.*

16. Puluis Sperniola compositus
Crollij.

17. Myrrh. el.
Thur. masc. an. 3*ij.*
Croci trit. 3*β.*
Camphor. 3*ij.*

Tere omnia, & misce.

Puluerem hunc imbibe & stillat.
Sperniola, id est, spermatis tanarum,
vigesies vel trigesies, ita tamen, ut
semper prius sponte exicetur.

Hinc serua ad usus.

N. Sperniola colligenda est mensē Martio, iriduum circiter ante nouilium, (sic non faret) destillandaque MB.

Vires. Summum est remedium in Hemorrhagiā è naribus, gutture, vtero, quia frigiditate suā coagulat sanguinem. Confert quoque si solvatur cum aceto & Erysipeli dolorib[us]ue podagrīcis calidis applicetur. Hemorrhagiam quoque vulnerum impositione fistit, Paronychiam necat, &c.

Dosis gran. 4, 5, 6, 7, 8.

N. Si hemorrhagia è sanguinis corruptione originem traxerit, non malum sanè remedium, quippe puredinem arceret. In uterinis vero affectibus, ob myrrham ac crocum, aliud adhibere mallem.

17. Pulvis Stomachicus Quercetani, s. Birckmanni.

18. Rad. Ari præparat. 3*ij.*

Acori vulg.

Pimpinell. an. 3*i.*

Ocul. cancr. 3*β.*

Cinamom. 3*ij.*

Sal. Absynth.

Juniper. an. 3*j.*

Sacchari rotati, q. l.

F. Puluis.

Vires. Exhibetur non tantum ad ventriculum corroborandum, cui propriè convenit, sed etiam ad capitis affectus, hemicraniam, vertiginem, melancholiā hypochondriacā, cachexiam: ad calculum ac febrem quartanam: habet enim facultatem deoppilandi, tartarum resolvendi, &c.

Dosis 3*β.* ad 3*j.*

Præparatio radicis Atōnis fit macerando, cum vino albo, horis 12. hinc decantatur vinum novumque affunditur, denuōque ut antea maceratur, quā maceratione acrimonia extrahitur. Hinc radix lente siccanda.

18. Pulvis Trithemij.

19. Calam. arom.

Gentian.

Cymis.

238 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

- | | |
|---|--|
| Cymin. | 9viii. |
| Siler. montan. | diamosch. dulc. |
| Anisi. | Spec. diambr. ana 3ij. gran. vi. |
| Carvi. | Nucif. num. iij. |
| Levist. | F. Puluis. |
| Petrofelin. | Vires. Calfacit caput, exiccat carrrhos, spiritus animales & virales purificat, corroborat, adeoque balsamona-tiuo insigniter confert. |
| Spic. nard. ana 3ij. | Dosis à 3ij. ad 3ij. vel 3j. |
| Zingib. albi. | 20. Species Diacubebarum. |
| Chamæpit. | 21. Santalor. trium, ana 3ij. |
| Fol. fen. el. | Spod. præparat. |
| Crystall. 3ij, ana 3vj. | Raf. Ebor. ana 3ij. |
| Macis, | Sem. amomi. |
| Cubebar. ana 3ij. | Cubebar. ana 3i. |
| Garyophyllor. 3vii. | F. Puluis. |
| M. F. Pulvis subtilissimus. | Vires. Aperit & confortat Epar. |
| Vires. Suni qui huius laudes summe commendant, ad memoriam confortandam. Videlicet, post purgationem convenientem. 22. Huius pulueris 3j. V magnanimitatis gutt. xij. & vini nonnihil, sumuntque manè & vesperi per totum mensē; altero mensē, manè solum; tertio bis vel ter, singulis septimanis, idque manè; quarto mensē bis qualibet sept. & poscea ad dies vita singulis mensibus semel, crescente Lunā. Sed crapulam vitare monent, ebrietatemque. | 21. Sal. Philosophorum. |
| 19. Species Cephalice, F. F. | 23. ⊖ fusi. |
| 23. Cinamom. 3ij. | Sal. gemm. an. 3i. |
| Rad. pecon. | Galang. |
| Sem. pecon. exc. | Macis, |
| citr. exc. ana 3x. 3ij. | Cubebar. ana 3j. |
| Zingib. | F. Puluis. |
| Cubebar. | Vires. Iuvat concoctionem ventriculi, cruditatēsque consumit. |
| Caryophyllor. | Dosis gran. 4. manè, iejuno stomacho. |
| Macis, ana 3v. 3j. | 22. Sal Sacerdotale. |
| Spec. cordial. | 24. Sal. commun. torref. 3ij. |
| aromatic. garyophyll. ana | Piper. 3i. |
| | Cinamom. 3β. |
| | Zedoar. |
| | Zingib. ana 3β. |
| | Sem. cumin. |
| | carv. ana 3i. |
| | F. Puly. subtilis. |

Vires.

Vires. Dolori capitis medetur, ventriculum calfacit, cruditasque & flatus consumit, concoctionem invat, colicum dolorem profigat.

Dosis gran. v. ad viij.

Idem aliter.

℞. Sal. commun. ȝij.

Cinamom.

Cumin. ana ȝiij.

Zingib.

Amom.

Siler. mont.

Piper.

Satureia,

Hyslop.

Origan.

Puleg. ana ȝi.

F. Pulv. subtilis.

Vires Easdem cum priori obtinet.

N. Dicitur Sal Sacerdotale, quia Sacerdotibus olim (tempore Eliae) ad dolorem capitis & oculorum caliginem in usu fuisse statuitur.

Pulveres purgantes.

1. Pulvis Aritheticus Paracelsi.

℞. Hermodactyl.

Turbith. opt.

Diagrid.

Fol. Senn. el.

Rasfur. cran. vel ossium human.

Sacchari, ana.

Vires. Purgat securè & blande omnes defluxiones podagricas.

Dosis ȝi. ȝij. ex aqua Iva arithetica, fragaria, &c.

2. Pulvis Cholagogus Querc.

℞. Rhabarb. elect. ȝiij.

Fl. Violar. ȝij.

Rosar. pallid.

Hyperic. an. ȝi.

Spec. Diatrionsantal.

Mastiche,

Cinamomi. an. ȝi.

Diagrid. ȝi.

Sacchar. violat. ȝi.

M. F. Pulvis.

Dosis ȝi.

3. Pulvis Cornacchini.

Fit ex mixtione diagridij $\frac{1}{2}$ ati, & $\frac{1}{2}$ diaphoretici, cum cremore $\frac{1}{2}$ i commistorum, proportione invicem pro re natâ variante, verbi gratiâ, Diagrid. $\frac{1}{2}$ t. gran. vii. viii. vel ȝi. $\frac{1}{2}$ diaph. gran. v. vi. vii. &c. Crem. $\frac{1}{2}$ i. ȝi.

Vires. Tantum pulveri huic attribuit Author, ut peculiarem de eo conscripsit librum, commendatique ad omnes ferè morbos, in quibus purgatione opus est.

4. Pulvis Melanagogus Querc.

℞. Fol. Sen. ȝi.

Sem. anis.

Fenic. an. ȝi.

Cinamom. ȝij.

Crystall. $\frac{1}{2}$ i, ȝvi.

Sacchari, ȝi. M.

Dosis à ȝi. ad ȝij.

5. Pulvis Panclymagogus Querc.

℞. Crystall. $\frac{1}{2}$ i, ȝi.

Senæ el. ȝx.

Hermodactyl.

Turbith. an. ȝi.

Rhabarbari,

Hh

240 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Agaric. troch. ana 3ij.
Scammon. præparat. 3ij.
Macis,
Cinnamomi,
Galang. an. 3ff.
Sacchari violati, ad pondus
omnium.
Dosis 3j.
6. *Pulvis Paffuanicus.*
¶. Flor. Borrag.
Violar. ana 3ij.
Zingiber.
Spic. nard. ana 3i.
Glycyrrhiz.
Sem. anis. an. 3ij.
Diagryd. 3ij.
Rhabarb. el. 3vi.
Turbith. gumm. 3i.
Sena 3ij.
M. F. Puluis.
Vires. *Purgat omnes humores noxi-*
os, maximè bilem.

7. *Pulvis Phlegmagogus Quer-*
cetani.

¶. Spec. Diacartham. 3ij.
Agaric. Trochisc. 3ff.
Turbith.
Hermodactyl. ana 3j. M.
Dosis 3j.

8. *Pulvis Phlegmagogus, Sala-*

¶. Cryst. 3i.
Hermodactyl. mund. an. 3i.
Turbith. albi. 3vi.
Resin. Scammon. 3ij.
¶. Caryophyll. cum saccharo,
mift. 3ff. M.
Vires. *Purgat serofos ac phlegmati-*

cos humores, sine molestia.
Dosis 3ff. ad 3j.
9. *Pulvis Sternutatorius,*
Martini Rulandi.

¶. Sem. Nigell.
Hellebor. alb. ana 3j.
Majoran.
Rorismar.
Salviae, ana 3ff.
Mosch. gran. ij. M.
Caput roborat, piritans elicit.
10. *Alius.*

¶. Fl. Anthos,
Lavendul.
Salv.
Betonic.
Majoran. ana 3j.
Macis,
Cinamom.
Glycyrrhiz.
Ellebor. alb præparat. ana 3i.
Tabac. opt. 3i.

Omnibus pulverisatis, & probè mix-
tis: adde

¶. Still. anis.
Caryophyll.
Macis,
Majoran. ana g. iv. M.
11. *Alius, Iohann. Nicolai Bau-*
manni M. D.

¶. Fol. Tabac. Indic. 3i. 3j.
Rad. Ircos Flor. 3ff.
Lap. pumic. 3ij.
Moschi gran. ij.
F. Puluis.
N. *Moschus omittendus erit, si mu-*
'ieri adhiberi debeat.

CAP.

C A P . LXXVIII.

De Sacculis.

SAcculus fomentatorius fieri potest ex vegetabilibus quibuscunque, incisis sc. crassiusculaque contusis, sacculique insutis.

Applicatur tepidè, siue siccum saccum velis, siue humidum, id est, in liquore aliquo coctum & expressum.

Exemplo sint.

1. *Sacculus stomachalis.*

2. *Herb. Menth. crisp.*

Calament.

Origan.

Betonic.

Absynth. ana M. 1.

Majoran.

Fl. Rosar. rubr. an. M. 3.

Camomill. odorat. p. 1.

Rad. calam. arom. 3ij.

Nucis moschat. num. 1.

Baccar. Laur. 3iB.

Sem. anis.

carv.

cymin. an. 3i.

Ex conquassatis & incisis F. Sacculus stomachalis cancellatum intersutus.

Vires. *Confortat Ventriculum, Crato.*

2. *Sacculus cordialis.*

3. *Fol. Melis. M. 1. M.*

Basilic.

Card. bened. an. M. 8.

Sal. citrin. 3ij.

Cort. citri.

arantior. an. 3iB.

Fol. Laur. 3i.

Cinamom.

Galang.

Nucis condit. [Nucif.]

Macis, ana 3j.

Lign. Aloës, 3iB.

Sem. citri,

Melis. an. 3iB.

Fl. Borrag.

Bugloss.

Anthos

Melis. an. p. 1.

Rosar. p. 8.

Ex his crassiusculè contusis, F.

Sacc. interceptus serico.

Vires, *Confert in palpitatione, Crato.*

3. *Sacculus Nephriticus, seu Paragoricus.*

4. *Herb. Malv.*

Heder. ter.

Bisnaly.

Cerefol.

Parietar.

Rad. Alth.

Lil. alb. an. 3i.

Sem. Foenugr. 3vi.

Fl. Camomil.

Melilot.

Saxifrag. an. p. 1.

Contulsi & incisis, F. Sacc.

Incoctus pluviæ lactiue applicetur renibus in dolore nephritico.

Huc pertinent & Cucupha, cuius Exemplum sint.

4. *Specus pro Cucupha, F. F.*

Hh 2

242 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

℞. Rad. Ireos Fl. ℥ii.	Sem. Nigel.
Cyper. rot. ʒiij.	Coriandr. præp.
Fl. Lavendul.	Samm. Thymi,
Anthos, ana ʒiij.	Stæeb. Ar. ana 3i.
Fol. Menth.	Mosch. gran. iij.
Majoran.	Ambr. grys. gran. ij.
Ocym. ana ʒij.	F. Pulvis grossus qui gossypio susceptus insuatur pileolo serico, in- terpalsando.
Storac. cál.	
Benzoin. ana ʒiis.	

C A P. LXXXIX.

De Salibus præparatiis.

SAlia tum nativa in Officinis exstant, tum artificialia: de nativis alibi, de artificialibus h̄ic loci ageret.

re remanente aptum redditur, in vliquescere, muriāmque constituere; maximè si maceratio, transcolatio que repetita intervenerint.

E. gr.

℞. Cinerem (absynthij à carbonibus purificatum,) coque cum v in lixivium, vel transcola v'm fervidam aliquoties; sic imprægnabitur. Æ, noménque sortietur lixivij. Hoc purifica filtrando, inspissaque lētā evaporatione, aut crystallisatione.

N. 1. *Salia*, bac ratione calcinata, quia lixivium sapium, nec satis albiant, calcinantur, id est, comburuntur, funduntur communiter ad ignem, ut albedinem acquirant. Verum potior visatur ratio albificandi per iteratas solutiones, filtrationes ac inspissationes, bac tamen admonitione, in majori dosi hec salia esse exhibenda. Saporem lixiviosum quod attinet, optimè is aboletur, si cineres cum Ālis, ana circiter mixti, accenso Ā calcinantur, atque hinc elixivationi submittantur.

N. 2.

Artificialia salia, vel sunt simplicia, vel composita seu mixta.

Simplicia, (propriè sic dicta) totuplicia sunt, quotuplices res naturales, quippe res nulla est, quæ salis proorsus expers sit, imò constitutio rerum naturalium primitus ex sale dependet.

Medium quo salia elicuntur liquor quilibet aqueus est, in quo salia vt solvuntur, ita & eidem se se immiscant. Quia tamen res naturales pleræque validè compactæ sunt, præmissumque requirunt apparatum, quo compedes, quibus sal impeditum est, aperiantur, pro diversitate compactionis, diversi quoque apparatus inventi sunt.

Creberima tamen præ reliquis est incineratio, quâ partes mixtae disgregantur, salque fixum in cine-

N. 2. *Salia* hac fundunt spiritum penetrantissimum, si ad modum, quo *Salia* commune, destillentur.

Salia volatilia, (essentialia non nullis dicta,) nihil aliud esse videntur, quam portio salis aliquantulum elaborata humoris nutritivo immixta, nequid substantiae crassae insinuata.

Modus fieri ex plantis.

¶. Plantam convenientem, coque cum magna quantitate aquæ, hinc exprime succum, cumque optimè purificatum inspissa aliquantulum, reponéque ad crystallandum, s. a.

N. Si succum purificatum recenti herbe affuderis, interveniente digestione, coctione ac expressione, ut prius, maiorem salis copiam nancisceris.

Exhibeni itidem, ligna, ossa, cornua, sanguis, &c. *Salia* volatilia, sed non nisi interveniente destillatione, quâ parietibus vasorum destillatoriorum ea adhescent. Vide in oleis destillariis.

Salia impropiè sic dicta, paramunt ex lapidibus, metallis, cornibus, ossibus, crustaceis, quæ beneficio acidii cuiusdam spiritus solvuntur (communiter recipitur ~~X~~, vide magisterium,) filtrantur, & evaporatione in pulverem rediguntur, quem sal vocant.

Hunc salem abluunt aliquoties, ne acidum sapiat, & servant pro v̄su, vel edulcoratum in liquorem per deliquium in cella resolvunt. Vide Liquor.

Salia simplicia usitatoria.

Sal Absynthij fixum.

Essentiale.

Acetosellæ.

Sal Aluminis, Saccharum, O.

Angelicae.

Artemisiæ.

Borruginis.

Cancrorum.

Cardui benedicti fix.

Essentiale.

Centaurij minoris.

Cere-folij.

Chamælii.

Cichorei.

Cinamomi.

C. C. volatile.

Cranij volatile.

Euphragiæ.

Fabarum, è stramine & corticibus.

Fœniculi.

Fragariæ.

Fraxini, è ligno.

Fumariæ.

Genistæ.

Guajaci volatile.

Hederæ terrestris.

Hyperici.

Hyssopi.

Iuaipeti, è baccis.

ex ligno.

Lavendulæ.

Majoranæ.

Matricariæ.

Melissæ.

Menthæ.

H h 3

244 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Nitri crystallini.
fixi. Lapis prunellæ.
Ononis.
Persicariae.
Pimpinellæ.
Plantaginis.
Rutæ.

Salviae.
Sanguinis humani.
Scordij.
Succini volatile.
Tamarisci.
Tartari.
Vitrioli vomitium.
Vrinæ.
Vriticæ.
Zedoariae.

Salia impropriæ sic dicta, (re-
tius calces diceret,) visitatoria
sunt.

Sal Louis.
Saturni.
Corallorum,
Perlarum, &c.

Salia compostaæ.

1. Sal Alcali.

¶ **Ψ** lb. 1.
Ciner. Isatidis, lb. 5.

¶ i. **Ω**i. ana 3i.

Coque in V, vt fiat lixiuum,
filtra ac inspissa ad siccitatem.

N. 1. Theophrastus. **¶**, Cinerum
glaucl. **Ψ**, & cinerum fabarum, extra-
bit lixiuum, coagulatque.

N. 2. Venetiani. **¶**. **Ψ**. lb. 1. ci-
neris fagi, vel quercus, lbij. Fellis vitri,
⊕ calcinatis, **¶** i. an. 3ij. Fac lixiuum,

atque exinde Sal.

N. 3. Alkali equivocationem vide l. 1.
Vsus hujus Salis solus Chymicus est,
inseruitque separationi Ois à Qe, si in
fluxu injicietur. 2. Facit ad fluxionem
& facilitandam.

2. Sal Alembrot.

¶. **⊖**. præparat. **⊗**. Salis alcali,
an. 3i. F. lixiuum cum succi menthae
ac caryophyllat. an. 3ij. aquæ fontan.
lb. ij. Filtra & coagula.

N. 1. Dicitur & Sal Ellebret. Sal
Taberi. Sal Alkjtran.
N. 2. Est & Sal Alembrot. nativum,
quod in Cypro, ex certa terra, in
monte Olympo extrahitur; formamque
& colorem sanguinis concreti habet, sed
nostratibus incognitum.

3. Sal Anatron.

¶. Calcis viu. lb. iv.
Alumin. lb. ij.
Vitrioli lb. ij.
Salis commun. lb. iii.
F. Lixiuum cum vino albo, di-
gere per dies aliquot (9.)

Postea

¶. Stiriæ. salis petræ, lb. x. af-
fundere lixiuij tantum, vt operiatur
sal in aheno. Misce benè ac solue,
coque ad medias, cola ac reponere ad
concreendum.

Vites. Metallici hoc sale vruntur ad
purgationem fusionemque Metallorum.

Sumitur & Anatron, 1. pro felle
vitri. 2. pro terra Sarracenica, cuius-
sunt

sunt species, nigra, rubra, & carulea. 3.
pro excrementia alba ac lapidea, que in petris crescit, in modum usnea alba, à quibusdam Sal nitrum vocata. Vide Vnzer. de Sale.

4. *Borrax.*

℞. *Sal. ammoniac.*

Nitri

Tartari calcinat. an. ʒi.

G. arabic.

Sal. commun. an. ʒi.

Mastich.

Alumin. roch. ana ʒβ.

Pulverisatis, affunde Vrinam, filtra ac coque, donec materia in saltem concrescat.

N. Alij conficiunt ex ① & urina puerorum inuicem commixtis & coagulatis. Alij Borracem nostratem ex peculiari lapide (Borracis nomine) eoque calcinato extrahibent, monente Tholdio in Halographia.

Vires. In medico r̄su facit ad menstrua, ac partum prouocandum, venērēisque stimulandam.

C A P . L X X X .

De Sapone Odorato.

Sapo odoratus, Smeigma odoratū, odoramenti formula est, constatque ex sapone, (potissimum Veneto, cui res evādēt) subtilissimè puluerisatae immisceruntur, adhibitā v. fragrante, v. gr. rosatum.

Formula sīnt, ex D. D. VVeickhardo.

1. *Sapo Moschatus.*

℞. *Sapon. Venet. ʒij.*

Styrac. calam. ʒij.

Rad. Ireos Fl. ʒj.

Nuc. moschat.

Cinamom. ana ʒβ.

Santal. alb. ʒi.

Af. dulc. ʒij.

Garyophyll. ʒj.

Mosch. gran. iv.

Incorporetur in mortario cum v. rosatum.

Vires. Habet vim abstergendi & conciliandi gratum odorem, similiisque confortandi nervos.

N. Loco cinamomi nucis & que, licet olea stillat. adhibere.

2. *Alius.*

℞. *Caryophyll.*

Macis, ana ʒi.

Benz.

Rad. Ireos Fl. ana ʒβ.

Mosch. gran. x.

Ambr.

Zibett. ana gran. v.

Sapon. Vener. lb. ij.

*Distemperentur cum v. rosa-
rum, adjiciendo Ol. stillat. cinam.*

C A P. LXXXI.

De Spiritibus.

Spiritus ut diuersi sunt volatilitate
ac fixitate, ita & diverso caloris
gradu, diversisque destillatoriis de-
stillantur. Fixiores scilicet retorta,
igneque fortiori, arenæ scilicet, vel
nudo. Volatiliotes **M** atque igne-
blandiori, scil. **NB**. vel cinerum.

Fieri possunt spiritus ex minerali-
bus, vegetabilibus ac animalibus.

Spiritus MINERALES singuli fe-
rè peculiares sibi vendicant modos,
quos vide suis locis.

N. Quà ratione sine vasis destillato-
riis spiritus minerales destillari queant,
lib. i. c. 20. delineavimus.

Spiritus VEGETABILES eliciun-
tur naturæ volatiliori; è foliis, flo-
ribus, fructibus, seminibus, aromati-
bus: fixiori; è lignis, corticibus, vi-
scis.

Modus eliciendi spiritus volatilio-
res non discrepat à destillatione
vrum stillatiarum, quippe inter
has & spiritus hoc solum discrimi-
nis intercedit, quod aquæ dictæ maxi-
mam partem phlegmatis contine-
ant, spiritus minorem; vnde & re-
ctificando spiritus ex aquis seque-
strantur.

N. 1. Res fermentata squidem
promptius ac copiosius spiritum balant, si
res destillanda fermentari apta fuerit;
fermentationem premitere suadeo, quip-
pe quâ præter dictam faciliorem exhala-

tionem, spiritus in quintam Essentiam
exaltantur; persuasum autem tibi ha-
beto, fermentationem felicius in vasis
lignis, v. gr. quernis, procedere, quam
in vasis aliis.

N. 2. Fiant quoque spiritus quoran-
dam vegetabilium cum vino, ut spiritus
liliorum convallium, &c. Verum cum
pars maxima **V** debetur, prestat hu-
iuse generis cognominare, **V** cum ad-
iunctione dati vegetabilis, e. gr. **V** m lili-
atum, vel **V** m vita liliatum.

1. Sic fiant ex herbis & floribus.

2. Herbas aut flores recenter (tem-
pore siccо) collectos, contunde, at-
que in vas terrenum vitreatum, vel
dolium quernum (præstant enim ad
fermentationem vasa lignea,) inter-
mixto sale comprise, clausoque vase
in cellam repone (per mensem vnum
vel plures) donec fermentando ac-
diufulcum ac vinorum acquirant o-
dorem. Hinc destilla per vesicam,
(aut **NB**,) usque ad siccitatem, de-
stillatum affunde, si libet, parti de-
stillandæ residuæ, ac destilla denuò.
Tandem rectifica.

Aliter.

Exprime succum, eumque cum
contusis herbis recentibus mixtum
ad fermentandum colloca.

N. 1. Si minus succulentes fuer-
int, aquâ fervente irrorari ac perfundi-
volunt.

2. Fer-

2. Fermentatio promovetur adiectâ aliquâ portione \ominus is, (qua & putrefactio nem praeceperit) \oplus i, secum cerevisia, vi ni, fermenti dissoluti (in ∇) vel saccha ri.

3. Poterit & ex fermentatis succus exprimi, atque cum novis herbis denou fermentari; sic copiosior exillat spiritus.

II. Ex fructibus & baccais succulentis.

β . Succum expressum, eumque clauso vase debite defervere sine, ac destilla: sic sunt spiritus pomorum, pyrorum, mespitorum, cito nitorum, &c.

III. Ex fructibus & baccais minus succulentis.

β . Fructus vel bacca, conquaissa ac affunde ∇ m ferventem, vel ebullire parum permitte, hinc colloca, vase clauso in fermentationem, addendo si placet nonnihil secum vini vel cerevisiae, & simil. sic sunt spiritus baccar. iuniperi.

IV. Ex fructibus carnosis, (i. e. qui pulpam exprimendo præbent.)

β . Expressam carnosam substanciam, v. gr. cerasorum nigrorum, (exemptis nucleis,) ropone σ (14) ad fermentandum cum \ominus . &c. destilla, sic sunt spiritus, seu quintæ Essentiae, baccarum sambuci, fragorum.

N. Licet initio, si ita visum fuerit, aliquid ∇ ferventis addere.

V. Ex seminibus calidioribus ∇ cum oleo ascendit, quæ rectificando ex-

hibet spiritum, præcipue si fermentatio fuerit præmissa, vide supra de Oleis.

N. 1. Spiritus hi aquarum nomine ut plurimum venient.

N. 2. Si loco ∇ et vinum in maceratione adhibueris, spiritum itidem nancisceris sed compositum ex ∇ i seminisque dati spiritu; præstat itaque hunc ad differentiam spiritus simplicis sc. cum ∇ a destillati, appellare spiritum compositum, seu ∇ i, cum adjectione dati seminiss (e. gr. anisatum, vel ∇ m vita anisatum; vide supra).

V. E frumentis parati possunt Quintæ Essentiae, si in Cerevisiam reducta ea fuerint; quâ ratione magnam spirituum copiam exhibent.

VII. Ex aromatibus spiritus quomodo elicantur, vide cap. 38.

VIII. E lignis prodit vna cum oleo per destillationem liquor acidulus, vide supra c. 70. qui rectificatus, spiritum refert.

N. Rectificatio fieri potest super col chotare aut sale marino, vel cineribus propriis; sic exit primò phlegma insipidum; hinc spiritus acidus scorsim colligendus.

Ex ANIMALIVM familiâ exhibent spiritus; cornua, ossa, sanguis, urina.

Cornua, ossa, vngula, fundunt spiritum acidulum mediante destillatione, (vide de oleis) hunc rectifica in MB.

Sanguinis itidem spiritus beneficio destillationis elicetur, (vide in oleis)

I i.

248 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

& vīs,) estque liquor ab oleo separatus, & denuō rectificatus.

N. Coronidis loco addo : si oleum aliquod stillatitium cum Vi rectificatisimo digeratur, oleum illud a spiritu absorberi, ut sub forma spiritus deliteat.

Spiritus minerales usitatores.

Spiritus Aluminis.

Coralliotum.

Mercurij.

Salis ammoniaci.

— communis.

— gemmæ.

— nitri.

Saturni.

Succini.

Sulphuris.

Tartari.

Vitrioli.

Huc vī spirituose composite:

V.R. ① rea. Vid l. 3.

Spiritus vegetabiles.

Spiritus Absynthij.

Aceti vini.

Angelicæ.

Anisi, id est, vī cum vino destillati.

Spiritus Cardui benedicti.

Centaurij minoris.

Cerasorum nigrorum.

Cochleariæ.

Cydoniorum.

Ebuli ex granis.

Fœniculi.

Fragorum.

Guaiaci.

Iuniperi.

Liliotum convallium.

Melissæ.

Rosmarini.

Rosarum.

Salviæ.

Sambuci.

Thymi.

Tilie flor.

Veronicae.

Vini.

N. Compositi spiritus ferme sub itenlo aquarum recensentur, ut spiritus theriacalis. id est, vī theriacali, &c.

N. 2. Spiritus oleaceos quare sub Oleis, ut spiritum Terebinthæ, & similia.

C A P. LXXXII.

De Succis.

Succi ex vegetabilibus potissimum
Sdepromuntur, raro ex animalibus.
Ex vegetabilibus, putâ non omnibus.

Inidonea enim sunt, 1. nuclei, se-
mina, & reliqua oleosa, qualia sunt
amygdalæ, pistacia, semina lini, (de
quibus egimus in oleis expressis.)

2. Minus apta sunt atidiora, ut
fruges; nisi decocta harum, succos
appellare libuerit.

Modus fieri.

3. Vegetabilia succulenta, (mi-
nus succulenta, macerati, insolari,
elixative antea volunt vī) conqua-
fa &

sa & exp̄ime, hinc clarifica, (cum
albumine ovi, filtrationēque, vel di-
gestione quod melius,) si opus est
Δ l. inspissa, atque ne empyreuma
contrahat, continuo agita; sic fiunt
succii.

I. Ex floribus. ¶ Flores virides,
imple XX, premendo, collocentur
que ad digerendum, s. putrescen-
dum in MB satis profundē, donec
in mucilaginem abiisse videantur:
Hinc exp̄ime succum, clarifica c.
alb. ovi, & inspissa lente ad consi-
stentiam mellis; si fiunt succi, (Es-
tentia dictæ,) borag. bugloss. peon.
verbasc. violat. & simil.

N. 1. Si flores minus succulentii fue-
rint, affundatur parum Væ: sic fit ex-
tractum, s. succus inspissar. flor. tunica,
calendula, Keyri, Cyani, rorismar. rhoæ-
ad. salv. & simil.

N. 2. Praestant flori primū erum-
pentes.

N. 3. Expressum succum si recenti-
bus floribus affuderis, majorem succi co-
piam colliges.

II. Ex fructibus. ¶ Succulentos
exp̄ime, vel coque antea; hinc ex-
prime trajicēque per setaceum, li-
quidoreisque ad mellis consisten-
tiam inspissa.

N. Succi è fructibus alio ferè nomine
gaudent, mellis scil. si dulce sapiant, vt
mel iuniperinum, passulatum, & simil.
alias Roob, Sapæ; vt rob de berberis,
deribit.

III. Ex radicibus & lignis, interve-
niente coctione, (in V,) & expres-
sione succi eliciuntur, adsciscunt-

que nomen Extractorum, vide su-
præ c. 17.

Succi officinales, tum liquidi pro-
stant, tum inspissati.

Liquidi qui per se conserventur
pauci sunt, quippe præter succos aci-
dulos & fermentatos illos potulen-
tos, (qualis vinum, vinum pomo-
rum, pyrorum, & simil.) nulli ad
tempus durabiles sunt: hinc fit vt
addito saccharo, melleve, in syru-
pum coquantur, vide de Syrupis, c.
84.

Quinimodo vel ipsis succis acidulis
nonnihil facchari ferè additur, cu-
ius vi tum parum fermentantur,
tum ab injuriâ corruptionis conser-
vantur.

N. Dantur & succi è vegetabilibus,
tum per se ruptis, tum incisis sponte fili-
lantes, (lacrymas vocare expedit.) Ve-
rūm hi partim nativis accensentur, par-
tim non-usuales sunt.

Talis est succus betule, qui in Suecia
& Finlandia, mensibus Martio &
Aprilis collectus & fermentatus, mu-
lierculis nobilibus petri suspetit; suc-
cus inglandis arboris, liquor scil. qui
in queruum stipitibus coacervatur;
lacryma vitis amputate. Huc opium &
simil.

Succi Officinales Liquidi, qui & Vina
dicuntur, sunt

Succus Berberum.

Citri.

Cytoniorum.

Granatorum acidorum.

250 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Limonum.

N. Succi recentes tot ex tempore parari queant, quot vegetabilia viridia succulenta exhibentur, verum quia gramineum sapient saporem, minus in usum veniunt, licet sapor ille saccharo corrigit queat.

Succi insipissati.

Succus Absynthij communis.

Acaciae nostratis.

N. Vera Officinis habetur inter nativa.

Agrimoniæ.

Aloës.

Cardui benedicti.

Chermes granorum.

Centaurij minoris.

Cydoniorum.

Enulæ.

Fumariae.

Glycyrrhizæ.

Gratiolæ.

Hyperici.

Hyoscyami.

Ireos nostratis catuleæ.

Liquiritiae.

Mercurialis.

Myrtillorum Germanicum.

Heidelbeer saft.

Nicotianæ.

Papaveris domestici,

erratici.

Plantaginis.

Rosatum incarnatarum.

— rubratum.

Scrophulariae.

Solatti.

Huc pertinemt

Rob de Berberis simplex.

de Ribib.

Mel Ebolinum } consistentiam

Sambucinum }

Iuniperinum } Electuarij ferè

obtinent.

Passiflatum.

C A P. LXXXIII.

De Suppositoriis & Pessis.

Vppositoriorum formandorum
Ratio in hoc sita est, vt fiant ex ma-
teriâ duriusculâ, glabrâ, adeoque in
anum intrudi aptâ, sive illa aptitu-
do per se rebus insit, sive mixtione,
coctione concilietur.

Prout igitur indicatio fuerit, ita
suppositoriis materia eligenda, ano-
dyna scil. detergens, consolidans,
exiccans, alvum irritans, &c.

Vstatissima tamen sunt suppo-

sitoria deiectoria, eaque pro ratione
operationis triplicia.

1. Lenia, qua solo ferè tactu ma-
teriali movent. Talia fiunt ex lardo,
fico inversâ, sevo hircino, bubulo,
(candelâ sevinâ,) cerâ, farinâ aquæ
incocata, (ex qua fiunt suppositoria
in sole exiccanda,) caulinibus, &
radicibus, v. gr. betæ, brassicæ, bliti
mercurialis, petroselini, & simil.

2. Mediocria, quæ aliquali acri-
moniâ

moniā stimulant. Talia parantur ex melle ad crassitēm coctō, sapone, terebinthinā coctā. Quibus adduntur interdum & alia, v. gr. muscera, sal, saccharum.

3. Fortiora, quæ vi purgante lacessunt. Talia fiunt ex purgantibus, lenioribus, ac fortioribus, agario, aloë, hierà pictâ, pulvere ad suppositoria, elleboto, scammonio, & simil.

Modus parandi.

Mel coquitur lente ad spissitudinem, vt digitis tractari possit, sine inquinatione, (experiri id licet guttulâ in laminam frigidam, vel stan- neam effusâ,) hinc effunditur in di- etam laminam, oleo illitam, dûmque frigescit, formantur suppositoria, oleoque illinuntur.

Siqua addenda fuerint, ante ef- fusionem ea pulverisata admiscere oportet, vel etiam formatos cylindros iisdem involvere, ut obducantur.

Proportio mellis 3*l*. Pulver, ad purgantia mitiora est 3*l*. præter pro- pter, ad fortiora 9*fl*. ad 3*fl*. vel 3*l*.

Vt 3*l*. Mellis, q. f.(3*l*) salis gemm. 9*fl*. aut 3*fl*. muscerd. 9*fl*. F. sup- positiorum.

3*l*. Agaric. 9*fl*. sal. gemm. 9*fl*. mél- lis, q. f. F. suppositorium.

g. Pulv. ad suppositor. commun. 3*l*. mellis, q. f. F. suppositorium.

De Pessaria.

Pessaria, pessi, nascalia, ad digitī formam ferē formari consueverunt, siūntque ex rebus medicamentali- bus vterinis, quæ vel suscipiuntur, sacculo lineo oblongo, lanâ concer- ptâ, gossypiōe, vel incorporantur cum melle, ladano, galbano, cerâ, succo, similiū te, formanturque ad dictam formam digitī.

N. Figurā suppositoriis similia sunt, nisi quod longiora & crassiora.

Exemplo fint.

g. Myrrhæ 3*fl*.

Spec. hier. pic. compol.

benedict. laxat. ana 3*l*.

Cum melle cocto F. pessarium, quod panno raro obductum, immit- tatur utero ad menses ciendos.

Veickhard.

g. Stercoris asini. q. f. desicca & pulverisata, involvatürque pulvis panno de serico, pro pessario hæmor- thagiam vteri sistente.

g. Barf. pastor. M. fl. contunde & inde panno pro suppositorio menses sistente, &c.

N. Possunt itidem radices certe, v. gr. rubie tintoriorum, cyperi, Iridis, & simil. loco pessarij adhiberi.

Syruporum materia principalis est decoctum, infusum, succus, aqua liquor quidam medicamentosus; stillatitia, acetumve. Servilis, est

152 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

faccharum clarificatum, mélve depuratum, cum quibus liquor ad consistentiam mellis coquitur.

N. Saccharum & mel adduntur precipue, ut liquorum corruptibilitatem arceant, tum quoque vi qualitatem integratam mitigent, saporemque medicamento gratiorem concilient. Hinc non abs re foret, loco sacchari aut mellis aliquando gratiores alias addibere melligenes, cum liquore syrupsando tamen qualitatibus conspirantes; quales sunt, verbi gratia, mel passulatum, rob pomorum redolentium, succus glycirrhiza depuratus, &c.

Syrupi sunt simplices, vel compositi.

Simplices, qui ex simplici unaque re medicamentali cum saccharo aut melle parantur.

Compositi, qui ex pluribus.

Modus fiendi.

¶. Liquorem clarificatum, (decoctum, infusum, succum expersum, acetum,) adde saccharum, vel mel, & simil. coque, clarifica, (si opus,) inspissa, ad mellis consistentiam, ac repone pro usu.

N. Guttula in tabulam frigidam effusâ consistentiam experiri licet.

Proportio liquoris ad saccharum aut mel, est ferè dupla vel tripla.

Verbi gratia.

¶. Decocti, lib. iij. sacchari, lib. iiij. vel 1. prout crassior, vel dilutior syrupus expeditur, vel prout durationi longiori, breviori destinatur.

Virium ratione sunt syrupi alterantes & purgantes.

Syrupi alterantes visitatores,

Syrupi de absynthio maior, A. C.

Acetositas citri, s. è succo

citri, A. C.

de succo acetosæ.

acetosellæ.

Acetosus simplex, id est, ex

¶ & ∇. A.

Acetosus compositus, (è radicibus, ¶ & ∇. A.)

Acetosus Diarrhodon, A.

Adiantinus Fernelij, A.

de Agresta, A. C.

de Althæa Fernelij, A.

Renod.

Anisi simplex Querc. inf. 2.

Antepilepticus Querc. 2.

Aquilegia flor.

Arantiorum è succo.

è corticibus.

è floribus.

de Artemisia Fernelij, comp. 3.

è succo Betonicae.

de Betonica compositus.

de succ. Berberum.

Bizantinus simplex, s. Dy-

nari, è succ. Endiv.

Ap. Lupul. Bugloss.

Bizantinus compositus, A. C.

de Boragine, s. Infusionis.

de Buglossa, è floribus.

de Calamentha Mefœ, A. C.

Calendulae Quercetani, fit è

succ. vel infus. flor.

è succ. Chamæmeli.

Capit.

Syrup⁹ Capillorum Veneris simplex, ex decoctione.
 Capillorum Veneris comp.
 Cardiacus, 4.
 de succo Cardui benedicti.
 Cerasorum acidorum, è succo.
 Cichorij simplex, è succo.
 de Cinamomo, A.
 N. Quercetanus parat cum Vino malvarico. Augustanum V. cinamomi.
 de Cortice citri.
 N. è succo citri dicitur Syrupus acetositas citri.
 Coralliorum. v. l. 3. c. 6.
 Cytoniorum è succo.
 Cytoniorum Vinosus simplex, f. Miva cytoniorum, quæ simplex & aromatica.
 de Endivia simplex.
 compositus.
 de Erysimo Lobelij, 5.
 de Eupatoria Mesuæ, A. C.
 de Farfara, è succo.
 N. Renodatus compositum exhibet.
 de fragis è succo.
 de Fumaria simplex, è succo.
 de Glycyrrhiza Mesuæ, A. C.
 Granatorum dulcium, è succo.
 Granat. acidorum, è succo.
 cum acero.
 Oxsaccharum composit.
 de succo Hederae terrestris.
 de succ. Hyperici.
 de Hyssopo Mesuæ, A. C.
 de Iuiubis Mesuæ, A. C.

Syrup⁹ de Limonibus, è succo.
 de Lupulo, è succo.
 de succ. Melissophyli.
 de Mentha minor, è succo.
 Menth. granat. dulc.
 vel acid.
 de Mentha maior, Mesuæ,
 A. C.
 de succ. Mercurialis.
 Myrtinus compositus Me-
 suæ.
 Nephrocatharticus Louber-
 ti, A.
 Nicotianæ, seu de Peto sim-
 plex, Quercet. 6.
 Nicot. compositus. 7.
 de Nymphaea, è florum in-
 fusione, A.
 de Nymphaea compositus.
 Pedemontani, A.
 de Papavere albo simplex, A.
 de Papav. alb. compositus, A.
 de Papav. erratico, è florum
 infus. A.
 de Floribus Paralysis.
 de Pede cati, f. Hispidula:
 sive de Æluropo simplex: fit ex
 infusione summa-
 tum.
 de Æluropo compositus, 8.
 Flor. Pœoniae.
 de Pilosella : ex infusione
 summitatum florida-
 rum.
 de succo Plantaginis.
 de Pomis: è succo.
 de Portulaca Mesuæ.
 de Prassio Mesuæ.

Syrupus de duabus radicibus.	inspissatum.
de quinque rad.	Mel Menthæ, è succo & mell.
Refectivus Cord.	ana.
Ribium è succo.	Mercuriale è succo &
Rosatus regius, seu Iule-	mell. $\frac{1}{2}$.
pus rosatus.	- Rosatum simplex, ex in-
de Rosis siccis.	fusione triplici &
de Rubo Ideo.	mell. $\frac{4}{5}$.
de Scabiosa.	Vide Disp.
de Scordio, è succo.	Rosatum citratum.
compositus.	Mesuaæ, è gem-
Mercurialis,	mis & mell.
A.	Violatum simplex ex in-
de Scolopendrio Fernelij,	fusione triplici &
A.C.	mell. $\frac{4}{5}$.
de Sempervivo, è succo,	Sic Oxymel simplex.
compositus.	compositum.
Siliquarum.	diureticum.
de Stoechade simplex, A.	scylliticū simpl.
compositus.	compos.
A.	Huc pertinent & Rob. composita,
Fernelij, A.	Rob de Agresta,
de Symphyto, Fernelij, A.	de Berberis ex succ. & fac.
de Testudinibus, g.	de Cornis char. $\frac{1}{2}$.
Flor. Tunicae.	de Ribib.
de succo veronicae.	Diamoron simplex, ex succ. $\frac{1}{2}$
Violatus simplex.	& mell.
compositus Mesue.	compositum.
regius, f. Iulepus	ufitatum Gal.
violatus.	Nucum ex succo cort. virid.
ex succo.	jugl. & mell. $\frac{1}{2}$
Huius loci sunt & Syrupi melliti,	Syrupi purgantes usitatiores.
mella vulgo dicti.	Syrupus Flor. Acaciae Aug.
VI.	de Carthamo, A.
Mel Anthosatum	de Cichoreo cum Rhabar-
Embllicorum, id est, mel-	baro, A. C.
in quo Embllici my-	Diasereos, Andern. A.
rob. conditi, vel de-	de Epi
cqctum Embllicorum	

Syrup⁹ de Epithymo.
de Fumaria compositus , f.
major.
Helleborat. minor Querc. i.
Helleborat. major.
Holagogus 2.
Flor. persicorum.
de polypodio, A. C.
de pomis regis Sabor, A.
cum sena Querc.
de Rhabarbaro solutivus ,
August.
Rosatus solutivus simplex,
f. Mucharum , è Da-
mascenarum 3. infus.
Rosatus laxativus compo-
tus , f. Helleboratus.
Rosatus compositus , sine
Helleboro.
de Senna.
Violatus solutivus , f. infusio-
nis.
Vomitivus . 3.
Mel Rosatum laxativum, } ex infus.
Violatum laxati- { & mell.
vum, } 2.
Oxymel Helleboratum Gesner. A.C.
Oxysaccharum vomitivum, 4.
1. Syrupus Anisi, cum Vino : Quer-
cetani.
¶. Anisi conquassati, 3 iij. mace-
retur in vini generosi , tb. ij. per tres
dies, coletur : Colaturæ adde Sac-
chari, tb. ij. & coque in syrum.
N. Eodem modo concinnari possunt
Syrupi , & ex aliis seminibus, veluti ex
semin. fæniculi, pœonia, ex baccis lauri,
iuniperi, & simil.

2. Syrupus antepilepticus, Quercet.
¶. Rad. pœoniae,
Visci querni, ana 3*ss.*
Cinamomi opt. 3*ij.*
Flor. calendulae,
Lilij convall.
Tiliae,
Lavendul. an. p. 1.
Rosat. rubr. p. ij.
F. Extractio cum spiritu Iuni-
peri, vel Vi, ad eminentiam digit. 4.
Decantetur.
¶. Tinctoræ 3*x.*
Sacchari candi pulverisat. 3*iiij.*
aut 4.
M. & accendantur, flagrantque
continuè agitando , donec syrus
satis coctus, aut plus minùsve fortis
videatur. Tum enim extingendum
erit incendium.
Vires. Præstantissimus est Syrupus,
tam precautionis, quam curationis indi-
cationi satisfaciens.
Dosis cochlearis.

3. Syrupus de Artemisia Fernelij.

¶. Summit. Artemis. M. ij.
Rad. Iridis,
Helenij,
Rubiæ,
Pœoniae,
Levisticæ.
Fæniculi , an. 3*ss.*
Herb. Pulegij,
Origani,
Calaminth.
Nepet.
Melissophylli,

256 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Herb.	Sabina, Sampsuchi, Hyslopi, Prassii, Chamaedryos, Chamæpityos, Parthenij, Betonicæ, an. M. j.	5. Syrupus de Erysimo Lobely. ¶. Erysim. totius recent. M. vi. Rad. Enul. Tussilag. succo adhuc prægnantium. Glycyrrhiz. ana 3ij.
Sem.	Anis. Petrosel. Fœnicul. Ocymi, Dauci, Rutæ. Nigellæ, ana 3ij.	Herb. Borrag. Cichor. Capill. ♀, ana Miß. Flor. Cordial. Anthos, Stœchad. vel Betonic. ana M. 6. Sem. Anis. 3vi. Passular. mundatar. 3ij.
	Contusa macerentur horis 24. in hydromelit. lb. viij. Coquantur ad lb. v. & cum sacchari lb. v. F. Syrup. qui condiatur Cinam. 3i. Spic. 3ij.	Incisis & contufis, f. omnium decoctio f. a. in f. q. aquæ hordei, hydromelitis & 3vi. succi Erysimi, ad lb. ij. vel iiiij. expime, inque Cola- tura dissolve sacchar. q. f. f. syrups.
	Vires. Insignium est virium in uteri affectionibus, à viscida mucilagine subortis, promovet menstrua, uterumque repurgat.	Vires. Efficacissimus est ad mucilagi- nem pulmonum incidentam. & educen- dam, adeò ut beneficio ejus juvencales de- cennio raucedine laborantes, se percura- visse, testetur Author lib. observat.
	4. Syrupus Cardiacus, F. F.	6. Syrupus Nicotiana, f. de Peto simplex Quercet.
¶.	Vini albi generof. lb. ij. Aqu. Rosar. 3iiß. Cinamom. 3ß. Zingiber. Caryophyll. ana 3ij.	¶. Succ. Peti, lb. iv. Hydromelit. simpl. lb. i. Oxymelit. simpl. 3iv.
	Ligentur omnia in petia, ad- danturque Sacchar. 3ivß. Coque ad consentiam syrapi: postea adde,	Omnibus simul mixtis, fiat di- gestio in Mb. & 2. vel 3., vt defec- tur; hinc decanta, ac digere iterum ut suprà, donec materia ab omni fœculentiâ depurata fuerit: adde postea facchari lb. ij. & coque in sy- rupum.
	Ambr. gryl. gran. iij. Mosch. g. 1. in syndone.	N. Sac
	Vires. Convenit in lipothymia, aliis- que cordis affectionibus.	
	N. Prestat sola infusione, vel in MB. parare.	

N. Succus Peti opus habet perexquisitam & ingeniorum digestione, quā vix vomitiva, ac dejectiva corrigiunt, atque in syrum abit præstantissimum, aduersus omnes affectus asthmaticos, in quibus pulmonum bronchia pituita crassata ac viscosa adeo infarcuntur, ut intercepient respirationis suffocationis periculum imminet; in quo casu syrum hic ritè preparatus & administratus mira præstat. Cerebrum insuper curarris, sive fluxionibus serosis & frigidis liberat, simulque per inferiora eductus.

Dosis coqulear. s. vbitamen à principio summā opus est circumspēctione, postea verò dosis augenda erit.

7. Syrupus de Nicotiana compositus Quercetani.

¶. Succi Peti (Nicotianæ) depurati, (ut suprà) fibiis.

Hydromelitis simpl. ib. 1.

In quibus macera per 2. vel 3. M. Fol. Hyssop.

Polytrich.

Adiant.

Flor. Tussilagin.

Stoechad.

Violar.

Bugloss. ana p. ij.

Sem. Bombac.

Vrtic.

Card. bened. an. 3i.

Follicul. sena 3ij.

Agantic. rec. trochisc. 3i.

Cinamom.

Macis,

Caryophyllor. an. 3i.

Dein fortiter exprimantur, digerantur denud ad perfectam fecum depurationem. Colaturae fibiis. adde tantundem sacchari, coquantur in syrum.

Vires. Ad asthemos & asthmaticos aliósque affectus omnes pulmonum à frigidis & crassis humoribus subortos, qui pulmonum bronchias invadentes, vel tufsim antiquam, vel ipsam dyspnœam parvunt, excellētissimum est remedium.

Dosis 3ib. vel 3ij. ad summum.

8. Syrupus de pede cati compositus.

¶. Dactylor. mundat.

Iujubar.

Sebesten.

Ficuum recent.

Passul. maior. enucl. an. 3iv.

Vngul. caballin. c. toto.

Pulmonar. maculos. c. flor. an. Mij.

Pedis cati,

Ceterach. ana M. 1.

Glycyrrhiz. raf. 3i.

F. Decoction, & exinde cum sacchari ib. ij. syrupus perfecte coctus.

Vires. Pectoralis est ac renutritivus, unde his qui plurimi laborant, solanini magno esse poterit.

9. Syrupus de Testudinibus, Σταχελονῶν, Resumptivus Renodai.

¶. Carnis testudinum, 3i.v. (abieclis caudâ, collo & pedibus.)

Hordei mundat. 3ij.

Carnis dactylorum, 3i.

Passularum damascenarum,

Glycyrrhiz. rafæ, 3vj.

Sebesten,

258 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Iuiub. ana num. XII.

Sem. Bombac.

Melonum,

Cucum.

Citrull. ana 3*β*.

Sem. Lactuc.

Papav. alb. ana 3*ij*.

Herb. Vngul. caballin.

Pulmonariæ, ana M. I.

Flor. Violat.

Nenuphar. an. 3*β*.

F. Decoctio. In colatura clati-

fie. ad tb. IV. adde Sacchar. alb. tb.
ij. sacchar. rosati, & diatragacanth.
frig. ana 3*v*. F. syrpus.

Vires. Confert his qui à morbo chro-
nico resurgent, macie confectis, tabidis,
phthisicis, & simil.

Syrupi purgantes.

1. Syrupus Helleboratus mi-
nor Quercetani.

2. Fibratum hellebori nigri, 3*ij*.

Agaric. rec. trochisc. 3*ij*.

Fol. sen. mundat. 3*ij*.

Turbith,

Hermodactylor. ana 3*l*.

Sem. Anisi,

Fœnicul.

Cort. Citri, an. 3*β*.

Caryophyll.

Macis.

Cinamom. an. 3*ij*.

Macerentur in Oxymelitis sim-
plicis, Vini malvatici, & aquarum
Meliſſæ ac Fumariæ, ana q. f. vase vi-
treo clauso, hinc leviter bulliant ac
exprimantur. Depuratae per digestio-
nem colaturæ addantur:

Syrupi de pomis redolentibus
solutivi,

de succis rosatum pal-
lidatum,

Sacchari rosati, & violati, ana
3*iv*. F. Syrupus.

Vires. Omnibus morbis à materia
tartarea, crassa ac tenace, à plegmate
adusto, bile aut melancholia dependen-
tibus, in capite, thorace, ventriculo, he-
pate, vtero, ipsesque articulis mirum in
modum confert.

N. Habet & idem Quercetanus Sy-
rupum helleboratum maiorem, sed suffi-
cit hunc in Officinis paratum asservare.

2. Syrupus Holagogus, F. E.

3. Rad. Polypod. querc. rec.

Cappar. ana 3*l*.

Fol. Scolopendr.

Ceterach,

Melisſ.

Betonic.

Rutæ murat. an. M. I.

Flor. Trium cordial.

Cuscut. ana M. β.

Sem. Limon.

Fœnic.

Anisi. an. 3*ij*.

Carthami contus. 3*l*.

F. Decoctio in l. q. aquæ, ad re-
manentiam quantitatis, cui species
infræ scriptæ infundi queant. Deco-
ctio hæc ita ster. horis 24. tum fiat
colatura, & in hac infundantur:

Fol. Senn. mundat. 3*iv*.

Agaric. albiſſ. 3*ij*.

Hermodactyl. alb. 3*vi*.

Rad.

C A P V T L X X X I V .

259

Rad. Hellebor. nigr. in aceto præparat. $\frac{3}{2}$ iij.
 Epithymi, Zingib. alb. ana $\frac{3}{2}$ iij.
 Caryophyllor. $\frac{3}{2}$ iij.
 Macis $\frac{3}{2}$ j.
 Bulliant parum, & stent in infusione horis 24. hinc exprimantur.
 &. Expressionem integrām (ad lib. ij. & $\frac{3}{2}$ iij.)
 Succi rosat. incarnatar. $\frac{3}{2}$ ix.
 Sacchari albiſ. lib. iij.
 Coque ad lib. iv. circiter.

Vires. Conuenit omnibus humoribus expurgandis, principiū atra bili, ac exinde morbis oriundis.

3. Syrupus Vomitorius.

¶. Aqu. Vomitoriae f. benedictæ, (sive illa ex croco sit, sive ex vitro $\frac{3}{2}$ iij.) $\frac{3}{2}$ vi.
 Aqu. Rosar. fragrant. $\frac{3}{2}$ iij.
 Pulv. cinamom. $\frac{3}{2}$ iij.

Digerantur vase clauso horis 24. postea cola : In colatora dissolve Sacchari $\frac{3}{2}$ viij. coque ad consistētiām syrapi.

Dosis a $\frac{3}{2}$ j. ad 3 iij.
 4. Oxyaccharum vomitorium.

¶. Vitr. $\frac{3}{2}$ iij. pulver. $\frac{3}{2}$ iiij.

Acet. vini albiſ. $\frac{3}{2}$ viij.

Infundantur in MB. l. Δ. per horas xv. colatura adde sacchari albiſ. $\frac{3}{2}$ iv. reduc in patina vitrea ad consistētiām.

Vites. Vt eo possumus pro vomitorio adversus febres continuas, pestilentes & intermitentes, paulò ante paroxysmum. Item, contra venena, Exanthemata, antequam scil. prodierint.

Dosis a $\frac{3}{2}$ iij. ad vi. Sala.

N. Loco Vitrī $\frac{3}{2}$ in his compositionibus sumere quoque licet crocum metalorum, vel etiam flores $\frac{3}{2}$ iij.

C A P . L X X X V .

De Tinctoriis.

Tinctoriae, tūm liquidiōris, tūm solidioris consistētiāe in vſu sunt. Liquidioris consistētiāe Tinctoriae nihil aliud sunt, quām extractiones sine abstracto menstruo.

Solidioris consistētiāe Tinctoriae sunt, pulveres sine combustione, ex liquidioribus tinctoriis abstracto menstruo residui. Et hoc juris sola mineralia sibi vendicare videntur.

Modus fieri fit ad modum, quem de Extractis dedimus. Conuenient ni-

mirum Tinctoriae cum Extractis in plurimis, adeoque non raro confunduntur; quam confusionem vti in aliis, ita & hocce in loco removere, non absque commodo foret. Hinc hūnt Tinctoriae,

1. Ex fructibus.

¶. Rob. affunde $\frac{1}{2}$ l. ac extrahe.

Vel ¶. Baccas seu fructus exiccatos, affunde $\frac{1}{2}$ l. conuenientem stillatiām, ac extrahe, &c.

N. Si Tinctoria lente insipietur, extractum dicitur Quercet. D. R. cap. 26.

K K 3

260 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Sic fiunt Tinctura cerasorum, baccarum
sambuci, ebuli, & simil.

I I. Ex floribus.

¶ Flores siccos, infunde in V ap-
propriata, (propria,) vel fontana
tepida, additis guttulis aliquot spi-
rit. P*i*, vel $\frac{1}{2}$ is.

Famosiores Tinctura sunt:

Ex Mineralibus,

Tincturae ♂
♀ vide libro
♂ tertio.
h
†
⊕ i
♀ is

Smaragdi.

Ex vegetabilibus, & maximè ex
floribus.

Tinctura Alkekengi è baccis.

Effentia croci, 4.

Cerasorum nigrorum.

Fragorum,

Hypericonis, vide c. 57.

Flor. Peoniae.

Rhœados.

Rofatum.

Violarum.

Granorum Sambuci.

Ebuli.

Ex animalibus.

Tinctura fellis tauri. vide lib. 5.

C A P. LXXXVI.

De Trochisci.

Materia Trochiscorum sunt omnis
generis Medicamenta, quæ pul-
verisata, liquore conveniente, (vi-
scoso,) suscipi, compilari ac impa-
stari queunt.

Parantur autem in Officinis
Trochisci, partim ut pulvetes visco-
so aliquo liquore compacti ab inju-
riâ aëris eo melius asserventur, exi-
gentisque necessitate denud palve-
risata in usum accessantur, & aliorum
Medicamentorum compositionem
ingrediantur; partim quoque, ut
per se applicentur, e. gr. Trochisci
bechici, sublinguales, prophylactici,
trochisci pro fumo, & simil.

Modus fiendi.

¶ Medicamenta subtiliter pulve-
risata, redige in massam cum liquo-
re conveniente mucilaginoso, e. g.
cum mucilagine aliquâ (Tragac.)
cum succo, syrupo, & simil.

Ex massa impastata formantur
trochisci, seu parvi pastilli, (quibus
character pro libitu imprimitur,)
vel fiunt inde bacilli oblongi.

Trochisci usitatores alterantes.

Trochisci.

de Absynthio Meluæ, Augst.

de Agno casto Rhasis, Ang.

Alexiterij, s. contra pestem, 1.

Aliptæ moschatae, cum ambra ac
moscho, A.

Aliptæ

Trochisci

Aliptæ moschatæ, sine ambra &
moscho.
de Alkekengi, cum opio, A. sine
opio.
de Aniso Mesuæ, A.
Bechici albi, cum moscho, A.
sine moscho.
nigri.
rubri, sive èbolo.
de Benzoin.
de Berberis.
de Camphora, Mesuæ.
N. Renodens alios è Myrra
substituit.
de Capparibus, Mesuæ.
de Charabe, f. succino, Mesuæ.
de Corallio, Nicol.
Diacoralliu, Gal.
Cypheos Damocritis.
de Eupatoria, Mesuæ.
pro fumo vulgares, 2.
optimi, f. cum mos-
cho, 3.
de Gallia moschata.
Gordonij.
Hedychroi.
de Violis Nicol.
de Lacca Mesuæ.
Moschardini, 4.
de Myrrha Rhaf.
Pectorales. Baculi pectorales, 5.
Prophylactici cum mithridatio, 6.
Ramich Mesuæ.
Diarrhodon Nicol.
de Santalis Mesuæ.
Diaspermator Gal.
de Spedio.

Trochisci

de Terra sigillata Mel.
de Vipera, Gal.
de Xyloaloë, Mesuæ.

Huc referendi sunt. 1. Tro-
chisci ophthalmici, quibus imponi-
tur nomen Sief. 2. Candæ pro fu-
mo. 3. Sapo odoratus, ac 4. Poma
Ambræ, de quibus partim suis locis,
partim hoc loco.

Collyria sunt usitatoria,

Sief album cum & sine Opio
album Galeni.
citrinum Mesuæ.
de plumbo Mesuæ.
de thure Rhafis.

Vide
Di-
spen-
sator.

Trochisci purgantes.

Trochisci de Agarico, Mesuæ.
Agaricus Trochiscatus.
Alhandal, f. de Colocyn-
thide.
de Rhabarbaro.
de Violis solutivi.
1. *Trochisci Alexiteriy, Renodei.*
2. Rad. Zedoatæ,
Gentianæ,
Tormentillæ,
Rad. Ireos Fl. an. 3j.
Angelica 3. ii.
Cinnamomi,
Caryophyllor.
Macis, ana 3ß.
Zingiber. 3t.
Coriandri præparat.
Rosar. ana 3t.
Cort. citri sicc. 3ii.

F. Pul.

262 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

F. Pulvis subtilissimus, & cum succi Glycyrrhizæ ʒvi. f. pasta molllis, de qua fermentur trochisci, vel potius bacilli oblongi.

Vires. Pestii precavenda multum conferunt, si in ore detineantur, vel etiam in ventriculum demittantur.

2. *Trochisci profumo vulgares.*

F. F.

℞. Santal. citrin.

Rosar. rubr.

Caryophyll.

Cinnamom. an. ʒvi.

Benzoin. ʒiij.

Styrac. calamit. ʒi.

Sacchar. pulv. ʒxiij.

Cum mucilag. Tragac. in Vtos. fact. f. trochisci.

3. *Trochisci profumo cum moscho.*

F. F.

℞. Benzoin. ℥. i.

Styrac. calamit. ʒvij.

Rosar. rubr. ʒi.

Ligni aloës. ʒiij.

Caryophyll.

Santal. citr. an. ʒij.

Sacchar. alb. ʒvij.

Mosch.

Zibett. ana ʒiij.

M. & cum infusione tragancanth. in V rosar. fermentur trochisci.

4. *Trochisci moschardini, alias confelio moschardina: corpus sine anima.*

℞. Moschi ex V rosar. dissolut. ʒij. Sacchari albiss. ʒvi.

Amyli ʒv.

Atterantur pistillo, & cum mucilagine tragacanth. (ex ʒi.) in Vrosar. facta, f. grana instar hordeaceorum, quæ exiccentur in umbra, pro usu.

N. Sunt quis sanguinis Draconis ʒij addunt.

Vires. Graveolentiam oris emendant, si pastillus unus ac alter in ore detineatur.

5. *Baculi peitorales, F. F.*

℞. Spec. Diatragac. frigid.

Diaiteos simpl. ana ʒi.

Rad. Liquirit. ʒiij.

Sacchar. albiss. ʒvi.

Cum mucilag. tragacanth. F. Bacul.

Vires. Tussim leniunt, aperitatem demulcent.

6. *Trochisci Prophylactici cum Mitridatio, F. F.*

℞. Boli armen. in succo citri infusi & exiccati, ʒi.

Corall. rubr. præpar. ʒij.

Rasur. C. C. ʒi.

Succin.alb. ʒij.

Rad. Tormentill.

Pimpinell.

Imperator.

Angelic.

Zedoar. an. ʒij.

Cinnamom. ʒij.

Croc. ʒij.

F. Pulvis subtilissim9.

℞. Huius pulveris ʒij.

Mithridati opt. ʒi.

80 Cina-

○ Cinamom.	Oliban.
Angelic. ana gutt. 1.	Mastich.
Sacchar. albiss. 3ij.	Garyophyll. an. 3ij.
Cum infusione G. Tragac. in V	Sacchar. alb. tb. ij.
angelicæ facta, F. Trochisci.	Carbon. tiliæ, tb. 1v.ß.
Vires. Frequenti hinc in usus sunt ad pitem præcavendam.	F. Omnium pulvis subtilissimus; & cum mucilagine tragacant. in V roscar. majoran. & cort. citri facta, formentur candelæ addendo parum styracis liquid. & terebinth.
Hujus quoque loci sunt, cande-	8. Massa seu baculi pro fornace.
la & baculi fumales, quæ sunt ex	¶ Benzoin
pulveribus odoriferis, impastatis	Storac. cal. an. 3i.
mucilagine Tragacanth. Styrac. &	Ladan. opt. 3vi.
simil. uti trochisci pro fumo, à quo	Balsam. Indic. 3ij.
non differunt, quoad modum fiendi.	Lign aloës 3ij. (præstat extract.)
Sic sunt	Mosch. Alexandr.
7. Candela fumales, F. F.	Zibet. ana 3j. M. f. a. f. Massa.
¶ Benzoin. 3xvi.	Formentürque instar ceræ His-
Lign. aloës,	panicæ bacilli fornaci affricandi.
Rhod.	
Santal. citrin.	
Ladan. ana 3iv.	

De Balsamis Inunctoriis, Linimentis, Vnguentis.

Balsami Inunctoriij, Linimenta & triis, vel sub forma pulverum immisceri, vel in iisdem colliquari, &c.

N. 1. } 3ij. vel ij. in linimentis.
Sumitur ad } 3j. vel ii. in balsamis.
Olei 3j. pin- } 3ij. & vel 3. in unguen-
quedini sere } additâ insuper pulveris,
 } 3j. &c.

N. 2. Balsami ob mollesculam con-

sistemant Ceræ carent. Linimenta vel

nihil, vel parum admittunt, (scil. ad

Olei 3j. Ceræ 3j.) Vnguenta vero uti

consistemant requirunt crassorem, ita &

materiâ volunt duriorem, adeoque Ceram

copiosorem, & nonnunquam gunnata.

Modus parandi.

Recipiuntur Olea, hinc adduntur quæ crassiores inducunt consistentiam, idque vel solâ misturâ, vel si opus sit liquefactione interveniente.

N. 1. Fieri potest quoque linimentum unguentum ex pulveribus melle, oxymelite, syrupo & similis suscepitis, informâ scilicet Electuarij.

N. 2. Succi aquei si addendi sunt coquendi illi sunt cum oleis ad humiditatis illius aquæ consumptionem, cuius indicium est, si infiletur guttula super prunas, sine strepitu.

Balsami usitatores sunt.

Balsamus Hispanæ, 1.

Vulnerarius, 2. 3.

Vterinus, 4.

Linimenta usitatoria sunt.

Linimentum Hæni, id est, Balsamus Hæni, dictus, 5.

Linimentum de Amianto, 6.

dentifricium, 7.

Erthrinum, 8.

*Vnguentia usitatoria.**Vnguentum*

Agrippæ Mesuæ, Aug.

Ægyptiacum, A.

Alabastrinum, A.

Album, Avicenn.

Album Camphoratum, A.

Altheæ simplex, Dialthæa, 1.

— compositum A.

Anodynum Cord.

— Podagricum, Crollij 9.

Apostolicum Avicenn.

Aregon.

Vnguentum.

Arthanitæ majus.

— minus.

Aureum, Mesuæ.

Basilicum.

de Bdellio.

de Calce.

ad Carunculas penis.

de Cerussa Avicen.

Citrinum.

Clysinaticum.

Comitissæ.

Cardiacum, 10.

Cordiale.

de Cyclamine.

de Cynoglossa.

Fuscum.

de Glycyrrhiza.

ad Hæmorrhoides.

— Noribergencie.

Infrigidans Galeni.

Iovis, f. de Verbena.

de Lithargyrio.

Mariatum magnum.

— parvum.

Mercuriale.

de Minio camphoratum.

Nervinum.

de Nicotiana.

Nihili ad Oculos.

Cordiale, 12.

Ophthalmicum, 13.

Pectorale.

Pediculorum.

Pomatum.

Diapompholygos, f. Nihili,

Nicolai, Aug.

Popule-

Vnguentum.

Populeum.

potabile.

Resumptivum.

Rosatum.

Rubeum camphoratum.

ad Scabiem.

Spleneticum, 14.

de Succ. Arantij.

Sympatheticum, 15.

Terebinthinæ, 16.

ad Tineam.

de Tutia.

ad Vermes.

Violatum.

Viride Reginæ.

Viride potabile. Burytum Viride, 17.

1. *Balsamus Hispanie.*

¶. Olei veruſtiſs. 3 iij.

Hyperic. 3 ij.

Terebinth. putre, 3 viij.

Frumenti integr. 3 iiß.

Rad. card. bened.

Valerian. an. 3 i.

Thur. pulverisat. 3 ij.

Radices & Herbe crasso modo contusæ, ponantur in olla, infundanturque in Vini albi generosi, q. s. ut omnia in Vino mergant, per (z.) hinc adjiciantur oleum & frumentum coquunturque omnia ad Vini consumptionem. Mox facta forti expressione, addatur Terebinth. & Thus, & iterum parum ebulliant, serventurque in vase vitro.

Vires. Sanat vulnera partium etiam

nervosarum, ſpatio, ut aiunt, viginti quatuor horarum.

Modus ueniendi talis eſt.

Abluto prius vulnere Vino albo frigido, statim inungitur totum vulnus oleo prædicto calente: quod si hoc commodè fieri nequeat, per ſyphonem intra vulnus, tanquam per clysterem immittitur, & conſertim labra vulneris ad mutuum contatum adducuntur deligaturā, aut futurā, aut glutine, deinde partes circumſtantes prædicto oleo ſimiliter inunguntur. Supra vēd vulnēris labia iam reducta, linteum imponitur, prædicto oleo madens, & ſupra hoc aliud Vino nigro exprefſum, mox alia linta ſicca: deinde fascia ſuperligatur. *Vide Hieronymum Fabricium ab Aquapend. ſecundo Opere Chirurg. part. 2. cap. 7.*

2. *Balsamum vulnerarium, Crollij.*

¶. Flor. Hyperic. ib. 1.

N. Colligantur cum Solis ortu, balsamico tēpore, in exaltatione, videlicet circa Festum Iohannis ante novilunium.

Flor. Cheiri,

Centaur. min.

Chelidoniæ,

Prunell.

Chamomill.

Rad. Aristoloch.

Consolidæ mediae vel majoris,

an. 3 iiß.

Rosar. rubr. 3 iiß.

Mumiæ tranſimant.

Myrrh.

Thuris, an. 3ij.

Mastich. 3*t.*Storac. liquid. 3*j.*

Incisif incidentis & tritis terendis, F. infusio in V boni, lb. viij. & aliquot, hinc decantetur cum fortissimae extremitate. Spiritui huic tincto, (nisi velis majoris efficacie ergo reiterata infusionem florum,) addatur olei olivarum recentis, quod supra ramenta pinguia abietina per octo dies, in digestione stetit, lb. v. Terebinth. claræ commun. & resinæ laticeæ lotæ in V hyperic. lib. 3.

Iterum per & 14 omnia digesta: ultimè abstrahatur V in M. tunc balsamum manebit in fundo rubeum, instar sanguinis.

Vires. Balsamum est ad vulnera & punctiones sanandas efficacissimum. Confert & in omnibus tumoribus, inflammationibus, contractis & contusis membris, rupturis ossium.

Vsus idem qui precedentis esse potest.

3. Balsamus vulnerarium.

2. Galbani,

Ammoniac.

Bdell. an. 3*fl.*

Macerentur in $\frac{1}{2}$ per & 3. hinc colentur & inspissentur ad consistentiam mellis.

Postea.

2. Myrrh. rubr.

Mastich. el. an. 3*fl.*Oliban. 3*t.*

Pulverisata solve, coquendo

igne lento in Ol. Olivari. lib. . . . oleum scil. per vices affundendo, semper agitando, donec posteriora haec bene fuerint eliquata.

Tandem gummata illa priora inspissata (vti dictum,) admisce, simili modo agitando, & dein recens oleum olivatum per vices affundendo, donec & altera quoque lib. olei adjecta fuerit, & Balsamus aliquid flavedinis contraxerit.

Vulnera recens punctum & cæsim facta, citissime curat.

Vsus idem est qui precedentium.

N. Fortior erit in mundificatione vulneris, si eruginis 3*fl.* addideris, & per mensem insolaveris, quâ ratione feces subfidentes rejici queant. Hart. in praxi.

4. Balsamus Vterinus.

2. Galban. puriss.

Serapin. elect. ana 3*vii.*As foetid. 3*fl.*Ammoniac. 3*t.*

Dissolve in oleo destillato Juniper. & Terebinth. addendo olei lauri stillat. 3*fl.* succin. 3*fl.* M.

Vires. Vteri suffocationes insigniter fistit, menstrua ciet, si umbilico inungatur, vel abdomen deorsum eo constrictur.

5. Linimentum de N. Balsamus h.

Solve Sal. h. in X, ut optimè imprægnetur, hinc abstrahere aliquantulum X, miscéque hujus 3*viiij.* cum olei rosat. 3*fl.* v. vi. &c. agitare ut f. Linimentum.

Vires.

Vires. Confert inflammationibus, &
ambustis illitum.

6. Linimentum *Hij compositum*, seu
Linimentum de amianto.

¶. Amiant. $\frac{3}{4}$ v.

Plumb. ust. $\frac{3}{4}$ xij.

Tut. præparat. $\frac{3}{4}$ ij.

Calcinentur, deinde pulverisata
macerentur cum ~~X~~, ac quotidie per
mensem materia agitetur semel: post
mensem ebullienda est vnius horæ
quadrante, ac quiescere sinitur, do-
nec clarescat.

Deinde

¶. Aceti hujus clari,

Ol. Rosac. ana.

Misc. optimè, donec F. Lini-
mentum.

Vires. Miraculosum est, ad tineam
puerorum, & ad ulcera tibiarum sanan-
da. Inungitur scil. pueri caput totum
ad scabiem. Ulcera vesperi inunguntur.
Boettius de Boodt.

7. Linimentum dentifricium.

¶. Rad. Ireos. $\frac{3}{4}$.

Pumic. $\frac{3}{4}$ ii.

Alum. ust. $\frac{3}{4}$ b.

Oc. ~~o~~.

Corallor. rubr. ana $\frac{3}{4}$.

Pulverisata excipiantur melle
rosato. F. Linimentum.

8. Linimentum Errhinum.

¶. Succ. Ireos,

Cyclamin.

Majoran.

Betæ, ana $\frac{3}{4}$.

Ol. Irin. $\frac{3}{4}$ i.

Elaterij, gran. vij. cum Cera
F. Linimentum. Crato.

9. Vnguentum Anodynū in
Podagra.

¶. Flor. Rosar. sylvestr. M. x.

Herb. & Cortic. exterior. hyo-
seyam. recent. M. vi.

Concisa coquantur in Vini men-
sur. b. hinc exprimantur & colentur.
Colatura l. Δ ad mellis consisten-
tiā inspissata, adde pingued. suill.
castrat. fb. ij. misce optimè ad Δ ,
tandem ubi parum refrigerata fue-
rint: adnasce

Opij in vino solut. $\frac{3}{4}$.

Croci pulv. ad magnitudinem
avellanar. duatum.

Extract flor. verbasci, $\frac{3}{4}$ b.

F. Vnguentum.

Vires. Singulare est in sistendo dolore
Podagrico & Nephritico, si calidè affe-
ctus illo inungatur.

N. Vbi dolori nephritico velis ap-
plicare, opere pretium feceris, si manu-
pul. duas vel tres baccharum Iuniperi ab
initio compositionis cum hyosyamo teras
& exprimas. Croll.

10. Vnguentum Cardiacum, Germ.

HertzgespanSalb, FF.

¶. Herb. Cardiac.

Chamædr.

Malv.

Senecijs,

Iaceæ,

Amar. dulc.

Scabios.

Sempervir.

268 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

Morsus gallin. ana M. ij.
Incidantur & coquantur in fb.
viiij. butyri recentis, ad consump-
tionem aquositatis, dein exprimantur,
& F. Vnguentum.

Vires. Frequentis usus est in affectu in-
fantum quem Cardiacam appellant. Fri-
cant eo hypochondria & locum cardie,
C. e.

11. Vnguentum Cordiale, D. D. Ar-
nold. V Veickhardi pro Offi-
cina F. F.

¶. Vng. rosat. Mes. 3ij.
Ol. Scorpion. simpl. 3i*ß*.
Nucif. expres.
Stillat. cort. citri.
camphor. ana 3*l*.

Antidot. Matthiol.
Theriac. Andr. ana 3i*ß*.
Aloës rosat. 3ij.
M. F. Linimentum.

Vires. Corroboraat Balsamum vite,
languidisque viribus subvenit, Cordi in-
vitium.

12. Vnguentum Cordiale Ch.
Ludov. ab Hornig.

¶. Vng. ros. opt. loti 3ij.

Balsam. Apoplect. 3j.

Ol. Nucif. expres. 3j.

Stillat. cort. citri. 3*ß*.

Cinam. 3*g*. v.

Rosar. 3*g*. vi.

M. optimè.

Vsus idem qui prioris.

13. Vnguentum Ophthalmicum, F. F.
D. D. de Spina.

¶. Tut. præparat. 3*ß*.

Camphor. 3j.

Aqu. rosat. alb. 3*l*.

Butyr. tec. 3*l*.

Virid. æris parum.

M. F. Vnguent.

Vsus. Applicatur ciliis, in inflam-
matione ac rubidine oculorum.

Vnguentum somniferum, F. F.

¶. Opij Thebaic. 3ij.

Crœc. 3*ß*.

Vng. rosat.

alabastr. ana 3ij.

Ol. nucif. 3v. 3j.

Acet. sambuc. parum.

F. l. a. Vnguent.

Vires. Inungitur temporibus, fronte
& cervici pone aures, ad conciliandum
somnum.

14. Vnguentum spleneticum.

¶. Ol. Amygdal. amar. 3*l*.

Cappar. 3ij.

Nucl. perfic. express. 3*ß*.

Succ. Rad. Bryon.

Cyclamin.

Cicut. ana 3ij.

Gumm. Ammoniac. in  dissolut.

Bdell. ana 3i*ß*.

Pulv. Cort. cappar.

Tamarisc. an. 3*ß*.

Fraxin. 3*v*.

Ceterach.

Summ. centaur. min. an. 3*ß*.

Sem. Cymin. aceto macerati, &
iterum exiccati, 3ij.

Cerae novæ, q. f. F. Vnguent.

Vires. Vim habet calfacentem, e-
mollientem, resolventem, aperientem,
raborantem.

N. Pana-

N. Penetrandi gratia potest addi
3j. vel ij. Ol. spic. vel Ol. stillatit. ab
synth. ðiB.

15. *Vnguentum Sympatheticum,*
Crollij.

¶. Adip. Verris aprugn.
Vrsin. ana 3^{iv}.

Bulliant per horam dienidiam, in
Vino rubro, fundanturque super a-
quam frigidam, colliganturque pin-
guedo supernatans.

Dein:

¶. Lumbricorum lotorum pulveris.
Cerebri aptugni,

Santal. tubr.

Mumiæ,

Hæmatit. ana 3ⁱ.

Vñcaæ è cranio hominis intec-
empti, 3ⁱ.

F. 1. a. *Vnguentum cum pin-*
guedinibus illis.

N. 1. *Animalia illa quò seniora,*
è adeps melior.

N. 2. *Vñca colligenda & crescente,*
et in bona domo existente, ♀ scil. si fieri
possit, non ♂, aut ♂. Parandumque
Vnguentum ⊖ in libra existente.

N. 3. Sunt qui omittunt *Vñcam* &
Mumiam.

Uſus.

Hoc *Vnguento* sanantur omnia
Vulnera, (modò nervi, arteriæ, &c.
non sint lœſæ.) *Vngatur telum*, quo
vulnus infictum, quotidie semel si
necessitas urgeat, & vulnus sit in-
gens, alioquin secundo vel tertio
die inunxiſſe sufficit.

N. 1. Telum servetur in linteolo
mundo, ⊖ loco non nimis calido, ne dam-
num inferatur Patienti. Cavendum
etiam ne pulvis super telum cadat, nec
ventus afflet in loco frigido, alioquin Pa-
tiens mirè affligeretur.

N. 2. Si *Vulnus* punctum infictum,
ungatur telum versus mucronem de-
scendendo.

N. 3. Si telum defit, sanguis ex
vulnere lignello suscipiendus, quod dein
ut de telo dictum, tractandum. Hac
ratione dolor dentium mitigari quoque
potest, si niturum lignellum sanguine
Gingivarum imbutum, eodem unguento
imungatur.

Operatio huius *Vnguenti* perfici-
tur identitate Balsami, sive spiritū
Balsamici, qui in homine & cruore
illius; inter quos spiritus non alia est
differentia, quam quod in homine
vitali actu adhuc spiritus ille vigeat,
in cruore autem coagulatus sit. Quare
cùm experiamur, affinitatem san-
guinis tantum posse, ut uno fra-
tre, vel consanguineo proximo, pe-
ste correpto, etiam alter etsi longo
viæ intervallo absit eadēm afficiatur;
quid non fieri posse autemabimus,
sanguinis identitate?

16. *Vnguentum Terebinthine, vulgo*
Exterſelbichen.

¶. Terebinth. fb. ij.
Vitell. ovor. num. vi.
Mastich.
Myrrh.
Oliban. ana 3ⁱ.

F. Vn

270 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. II.

F. Vnguent.
Vites. In vulneribus generationem
puris promovet.
17. Vnguentum Viride potabile, Bu-
tyrum viride,
F. F.

v, Herb. Salv.
Hyssop.
Prassij,
Menth.
Betonic.
Scolopendr.
Scabiol.
Cichor.
Fornicul.
Melis.
Veronic.
Mattisylv.
Aquileg.
Rut.

Petrosel,
Millefol.
Centaur. min.
Agrimon.
Aristoloch.rot.
Plantag.c. toto, ana M. ij.
Butyri Majalis. lb. viiiij.

Infunde herbas omnes recentes
suo quamlibet collectionis tempore
in butyro, stentque donec omnes
collegeris & infuderis, postea extri-
me; expressum coquatur ad consum-
ptionem aquositatis, F. l. a. Vnguen-
tum.

Vires. Expetitur à vulgo, assumitur
que ad sanguinem coagulatum resolven-
dum, dolores leniendos, pulmonum mu-
cilaginem demulcendam & expellen-
dam. Quin & extrinsecus ad dictos
affectiones adhibetur.



PHAR.