

T A B E L I.

Opgave van de middelen, bij plotselinge vergiftiging, voorloopig door den Apotheker aan te wenden, indien geen Geneesheer aanwezig is.

Bij vergiftiging met alcohol, wekke men mechanisch braking op door huig en keel met eene beöliede penneveer te kittelen, of bij gebrek daarvan, bezige men den vinger. De lijder wordt met eenigszins opgeheven hoofd, in eene voor braking gemakkelijke houding geplaatst, knellende kleedingstukken verwijderd en van vijf tot tien droppels ammonia liquida in 120 grammen suikerwater toegediend. Ook worde een lavement gezet van lauw water, waarin 30 gram keukenzout is opgelost.

Bij vergiftiging met bijtende en koolzure alcaliën, geve men suikerwater met azijn, citroensap of wijnsteenzuur. Laat olieachtige dranken gebruiken en vermijde men het gebruik van braakmiddelen.

Bij vergiftiging met blauwzuur, wekke men mechanisch braking op (bij vergiftiging met bittere amandelen door een sterk braakmiddel). Men geve verdund chloorwater (30 gram op 400 gram water) door mond en aars. Voor den mond en de neus van den lijder worde een spons met verdunde ammonia liquida gehouden. De ademhaling moet kunstmatig (door herhaald beurtelings optrekken der armen en nederdrukken van borstkas en buik) opgewekt worden. Het hoofd en den rug begiete men krachtig met zeer koud water, terwijl op de borst en hartstreek mosterdpappen worden aangelegd of deze deelen met mosterdolie worden gewreven.

Bij vergiftiging met braakwijnsteen, diene men acidum tannicum in water (4 gram op 400 gram) toe, of ook een sterk afkooksel van kina, galnoten of thee. Tevens worde bruispoeder, ijspillen en verzachtende dranken toegediend.

Bij vergiftiging met chloroform, brenge men den bedwelmden in de vrije lucht. De tong worde naar voren getrokken, de ademhaling kunstmatig opgewekt (zie bij blauwzuur).

De huid worde krachtig geprikkeld door zeer koude begietingen en door inwrijving met mosterdolie en dergelijken.

Bij vergiftiging met verstikkende gassen, (lichtgas, rioolgas of dergelijken) brenge men den bedwelmden in de vrije lucht, zette, in geval van blijkbaar bloedophooping in het hoofd, een groot aantal bloedzuigers aan de slapen, achter de oorlellen en op den nek. De ademhaling worde kunstmatig opgewekt (zie bij blauwzuur). De huid worde krachtig begoten met zeer koud water en tevens gewreven met mosterdolie of andere prikkelende middelen. (Wanneer riool- of secreteerwater mocht zijn ingeslikt wekke men op mechanische wijze braking op).

Bij vergiftiging met koperbereidingen, diene men suiker of honig in water met melk of eiwit vermengd toe. Men vermijde de aanwending van olieachtige vloeistoffen of zuren, maar diene gebrande magnesia toe. Zoo noodig wekke men braking mechanisch op of wel door toediening van een slap aftreksel van Ipecacuanha.

Bij vergiftiging met kreosoot, geve men veel eiwit met water gemengd te drinken, en late tevens melk of andere verzachtende dranken gebruiken.

Bij vergiftiging met kwikbereidingen, diene men eieren, in ruime hoeveelheid met suiker gemengd, toe. Men geve tevens ijzervijzel of houtskool, wekke, zoo noodig braking mechanisch op of wel door toediening van 1300 milligrammen Ipecacuanha.

Bij vergiftiging met loodbereidingen, wekke men, zoo noodig, braking op, door 1300 milligrammen Ipecacuanha toe te dienen. Men geve daarna zwavelzure magnesia in veel water opgelost, en late suikerwater met verdund zwavelzuur gemengd, gebruiken.

Bij vergiftiging met oesters, garnalen, mosselen, visschen, diene men 1300 milligrammen Ipecacuanha, of zelfs zwavelzuur zinkoxyde, 130—325 milligrammen, om de 10 minuten, toe, indien er geene overvloedige braking gevolgd is. Bij hevige benauwdheid geve men aether met spiritus, tot 2 gram pro dosi met water. Ook zette men een prikkelend lavement.

Bij vergiftiging met phosphorus, geve men, zoo dit noodig is, tot opwekking van braking 65 tot 130 milligrammen zwavelzuur koperoxyde, alle tien minuten. Men onderhoude de braking door herhaald en zeer rijkelijk toedienen van dik decoctum hordei of van stijfsel of arrowroot met water gemengd. Ook diene men magnesia toe.

Bij vergiftiging met irriteerende plantendeelen en hare alcaloïden (Nicotiana, Digitalis, Colchicum, Sabina, enz.), bevordere men, zoo noodig, de verwijdering van het vergif door mechanische opwekking van braking, of door toediening van 1300 milligrammen Ipecacuanha, alsmede door olieachtige purgeermiddelen enz.

Men geve looizuur (1300 milligrammen pro dosi) met slijmige of olieachtige dranken vermengd, of ook iodium in den vorm van ioodwater.

R̄ Iodii. Mgm. 200

Iodeti kalici Grm. 2

Aquae destill. Grm. 400

Solve

S. alle 2 tot 5 minuten 2 eetlepels.

Bij vergiftiging met zuiver narcotische plantendeelen en hare alcaloïden (Slaapbollen, Opium, Morphine, Codeïne enz.) wekke men braking bij herhaling op, door toediening van 300—600 milligrammen zwavelzuur zinkoxyde, om de 5 tot 10 minuten, onder gelijktijdige mechanische prikkeling van de keel met eene penneveder of met den vinger. Men diene looizuur of iood, als boven, toe.

In den aanvang vermijde men de toediening van plantenzuren, wende prikkelende lavementen en huidprikkelers aan. Men legge compressen met koud water op het hoofd, houde voortdurend den lijder uit den slaap, door schudden of andere krachtige lichaamsbewegingen, door hem, zoo mogelijk tusschen twee personen te doen loopen, door toespraak enz. enz.

Bij vergiftiging met stijfkrimp- (tetanus) en kaak- klem- (trismus) verwekkende plantendeelen en hare alcaloïden (Nux Vomica, Strychnine, Brucine enz.) wekke men krachtige en herhaalde braking op; in zeer dreigende gevallen, door 130 tot 200 milligrammen zwavelzuur koperoxyde om de 10 minuten. Men diene looizuur en iood toe, als boven. Tevens houde men, onder krampaanvallen, eenige droppels chloroform voor mond en neus.

Bij vergiftiging met rattekruid, geve men het antidotum arsenici der Pharm. Neerl. Ed. II, of versch bereid ijzeroxydehydraat, 30 grammen in eens, en daarna van 60 grammen op 400 grammen water, alle 5 minuten twee eetlepels; of men geve gebrande magnesia op overeenkomstige wijze. Men late veel melk drinken, en kittete de keel bij onvoldoende braking.

Bij vergiftiging met Spaansche vliegen, wekke men zoo noodig braking mechanisch op, late melk en slijmige dranken, doch niet in te ruime hoeveelheid nemen, en vermijde het gebruik van olieachtige vochten.

Bij vergiftiging met salpeterzuur zilver, wekke men, zoo noodig, braking mechanisch op of door toediening van Ipecacuanha. Men wende keukenzout in water opgelost aan en late water met eiwit vermengd drinken.

Bij vergiftiging met zinkbereidingen, geve men magnesia. Men doe een sterk afkooksel van thee, met melk en eieren vermengd, drinken.

Bij vergiftiging met sterke zuren, late men magnesia of gebrande magnesia in veel water en melk verdeeld drinken, of bij gebrek van dit middel geve men poeder van krijt, kalkwater of eene oplossing van zeep. Men doe olieachtige, slijmige dranken in ruime hoeveelheid, of melk of water met eiwit vermengd, gebruiken. Men vermijde het gebruik van braakmiddelen.

Bij vergiftiging met zuringzout en zuringzuur, onderhoude men het braken door toediening van koude slijm- en olieachtige dranken, doch niet in te ruime hoeveelheid. Tevens geve men kalkwater, of bij gebrek daaraan, krijtwater.