

CODICIS MEDICAMENTARII FORMULÆ.

SECTIO PRIMA.

*Præparationes Medicamentorum simplicium,
et cautelæ pharmaceuticæ.*

DELECTUS, EXSICCATIO, ASSERVATIO ET RENOVATIO, PURGATIO ET
MUNDATIO, DISPOSITIO ET APTATIO, IN PULVEREM RESOLUTIO.

Ut medicamenta simplicia ad usum medicum apta sint, sincera, integra, et optimæ notæ ea sibi comparare debet Pharmacopœus, ita ut characteri quæque suo plenè respondeant.

Quorum quidem, in vulgò venalibus, delectus fiet certior propriis notis, quas in Materiâ medicâ, quantum licuit, indicavimus, et quæ præsertim usu et rerum peritiâ unicuique melius innotescunt.

Quod autem ea spectat quorum virtus pendet ex colligendi opportunitate, exsicandi ratione, modo asservandi, aliisque cautelis, quæ curâ istud Pharmacopœi munus adimpleri debeat, sequentibus exponere summatim volumus.

DELECTUS ET COLLECTIO.

Tempus colligendis opportunum plantis, aut plantarum partibus, undē medicamina parari solent, pro singulis non mediocriter differt.

Quænam generalius admittendæ sint cautelæ, hic asserre sufficiat; si quæ verò singulariter observandæ sunt, eas Pharmacopœorum doctrinæ et sedulitati permittimus; quarum notitia ex scriptis pharmacologicis haberi potest.

1°. *Radices* vulgò vere et autumno colligi solent. Quædam tamen exceptione aliquâ indigent, pro vegetationis vario progressu et periodis. Sic quarum vitæ periodus est anni unius aut alterius, generatim autumno leguntur; quarum vita diuturnior, vere. At quæcumque fuerit temporum opportunitas, omnium istud ferè commune est ut integræ, flexiles, plenæ et succidæ elegantur; nec intùs ligneâ rigiditate solidescant, quod plerumquè accidit aut annosis aut provectionibus.

Sunt quædam tamen quæ tunc tantum effodiri debent, cùm lignea pars solidior evasit, quales illæ sunt quarum tantummodo cortex in usu medico est. Hujus censūs sunt *Potentillæ*, vulgò *Quinquefolii*, *Cynoglossi* et *Arctii Lappæ* seu *Bardanæ* radices, etc. Istæ scilicet tunc tantum accipiendæ sunt, cùm ea corticis soliditas et crassities est, ut facile à ligneâ parte separari valeat.

2°. *Caules et folia*, in omnibus propemodùm, tantum non explicatis floribus, foliis autem plenè expansis, siccâ tempestate, non diù post ortum solis, rore exhausto, decerpuntur; *turiones* et *gemmae* primo vere, ante folia explicata.

3°. *Cortices* quo tempore detrahere præstet , non adeò facile definiri potest. Id tamē pro constanti haberi debet , nec ab annosioribus petendos esse , aut arboribus , aut arborum ramis ; neque eos justo crassiores , neque quorum extima superficies à vegetantis vitâ nimium aliena sit ; neque morbo exesos legi debere. Autumno autem è fruticibus , adultâ verò hyeme aut instante vere , ex arboribus deglubendi sunt.

4°. *Ligna* , antequām explicentur gemmæ , aut etiam post deciduam frondem , excidenda. Sana et integra , nec à vetustioribus petenda sunt arboribus , demptisque cortice , libro et alburno , asservanda.

5°. *Flores* ut plurimum leguntur nondūm plenè evoluti ; quidam adhucdūm clausi , calyce vix dehiscente ; sic *Rosa illa* , quam *Provinensem* dicunt , ruberrima. Comæ autem florum , dūm explicari flos incipit , decerpndæ. Quarundam tamen alia admodūm virtus est prout ante explicatum florem , aut eo jam ferè emarcescente colliguntur. Sic *Erythræa centaurium* , ubi emarcuère flores , potentiori amaritie pollet , et vi febrifugâ , ut credunt , certiori.

6°. *Fructus* , si recentibus utendum sit , maturi , pleni , succidi , excipiendi sunt ; si exsiccandi , maturescentes , nec plenè maturi , et siccâ tempestate detrahendi.

Eximuntur quoque de quibusdam fructibus extimi cortices , ut de *Citreis* , *Aurantiis dulcibus* aut *amaris* , *limonibus* , etc. Verūm , ut eorum summa tantū cuticula , quam *flavedinem* dicunt , usu requiritur , ista ope cultelli eximi debet curiosius , intactâ , quæ subjacet , albâ corticis parte.

7°. *Semina omnia* , ea præcipue quæ dicuntur *emulsiva* ,

fructu pleno, perfecto, integro, absolutâ maturitate, de-
sumi debent.

8°. *Fungi, Boleti igniarii*, qui venales asportantur, eli-
gantur flexiles, qui compressi cedant molliter, lentè resi-
liant, nec facilè distracti lacerentur.

EXSICCATIO.

Quidquid *exoticorum* est et inter exterias merces aspor-
tatur, mundari primùm, deindè in ritè clausis debet re-
condi vasis, et in sicciissimo reponi.

Indigena verò ut conserventur, si quæ exsiccanda sunt,
non uno modo, pro singulorum naturâ, ad siccitatem
perducenda.

1°. *Herbæ maximè succidæ* siccæ fiunt hâcce industriâ:
scilicet, excisâ omnino exemptâque radice, suprà cancel-
los telâ cannabinâ instructos reponuntur, in aprico, sole
sub ardente, vel in calidario, calore ad gr. primò 20 (25)
temperato, dein ad 36 (45), sensim incremente; atque
sæpius invertuntur et convertuntur, ut nova subindè su-
perficies in ambitum vaporet.

2°. *Minùs succidæ* minori caloris gradu indigent ut siccæ
habeantur.

3°. *Caules, summitates floridæ*, in quibus parca admo-
dum est humiditas, quales sunt *Hyssopi, Galii, Erythrææ*
centaurii, etc., in umbrâ siccantur, in fasciculos minores
divisa; sicca deindè, chartis involuta servantur.

4°. *Flores, caulisbus exemptis*, æquè sub umbrâ, lentiùs

quidem, si magis exsuccci, celerius semper, si proprio hu-
more turgidiores sint, desiccantur.

Rosarum, Dianthique petala, abscisis unguiculis sic-
canda; *Violarum* autem arte peculiari à quibusdam pa-
runtur; scilicet, demptis calycibus staminibusque, suprà
telas sparsa suspenduntur. Affunditur imbris in modum
fervens aqua, quæ primò colore viridi infecta diffuit.
Quod iterum si fiat, virescit adhuc aqua, sed pallidius.
Si demùm tertium affusa tantillum cærulescat, cessandum;
atque illico ut cæteri flores *Viola* desiccanda est. Sic ser-
vatur intemeratus floris color, cum minimâ ipsius odoris
jacturâ.

Hac methodo parati, præ cæteris, isti flores probandæ
liquorum aut acidæ aut alkalinae naturæ inservire possunt.
At multis ad usus medicos satis esse videtur, si eosdem in
calidario, calycibus, ut dictum est, staminibusque demp-
tis, dupli chartæ insertos, sub calore 30° R. (37,5°)
exsiccaverint, pyxidibus deinde recondendos, ut color
maneat integer.

5°. *Semina* quæ emulsionibus parandis apta sunt, et
quæ farinâ abundant, et alia quæcumque, cancellis telâ
cannabinâ instructis imposita, in horreis, aere liberiūs
interfluente, vel in calidariis mediocriter tepentibus ex-
ponuntur; et subinde sedulò invertenda sunt, ut super-
ficies aëri nova sæpius objiciatur.

6°. *Fructus pulposi, Ficus, v. g., et Pruna*, et qui *Cy-
norrhodon* vocantur *Rosæ caninæ fructus*, nunquam ita
exsicandi sunt, ut penitus arescant. Scilicet eximendus
tantum superfluus humor; quod sit dum calore prius mo-
derato tepescunt, dein, crescente paulatim, incalescunt;

idque non unâ vice, sed pluries, donec in eam molliuem devenerint quam ipsis conservandis aptam cognoscimus.

7°. *Radices*, et quæ fibrosæ sunt, et quæ lignæ, facile exsiccantur, si fasciculatim in calidario funicularum ope suspendantur.

Tuberæ, quæ molliores sunt, quales aut *Solani tuberosi*, aut *Bryoniae*, etc., in taleolas tenuiores dissectæ, trajectæ filo, monilis in modum, in calidario suspensæ exarescant.

Si quas servare præstet humore naturali turgidiores, quales sunt quibus siccatis exigua, recentibus multa virtus inest, ut *Armoraciæ*, *Iridis*, *Ari*, *Bryoniae*, *Scillæque ipsius*, etc., opportunâ tempestate collectæ, sabulo sicco reconditæ serventur.

8°. Quod *Bulborum* est, et eorum omnium quæ *squamis coagmentantur*, ut sunt *Scillæ bulbi*, etc., cuncta curari debent hocce modo: nimirūm separatis et excussis tunicis quibus vesiuntur exteriora bulbi, excusso quoque scapo medio, squamæ, neglectis iis quæ meditullio propiores, molliores et albidiiores sunt, cæteræ separatim exi- muntur, et quatenus earum fibrillæ producuntur in longitudinem, in minutissimas dividuntur lacinias, sicque filo trajectæ appenduntur in calidario, donec penitus aride fiant.

9°. *Ramusculi*, *cauliculi*, *cortices*, *ligna* æquè in calidario siccantur, itâ divisa, ut parva cum sit eorum moles, superficies tamen quam maxima aëri exhibeat.

10°. Quæcumque ex *animalibus* desumuntur eâdem exsiccati debent curâ, quæ plantæ et radices, habitâ tamen ratione indolis singulorum diversæ.

Cantharides sparsim, non acervatim, supra telas cancellosque dispositae, in horreis aere perflatis siccandæ sunt. *Viperæ*, detractâ cute, capite intestinisque exemptis, suspensæ sigillatim, leni tempore sensim exsiccati debent.

ASSERVATIO ET RENOVATIO.

Exsiccata, quæcumque sint, includenda sunt in capsis, aut vasis, in quæ lumini non detur accessus, et sicciissimo in loco reponenda, atque ita recondenda, ut nec ad ipsa pulvisculi advolent, nec insecta permeare possint. Quibus inest aliquid fragrans aut volatile, et ea præsertim quæ humorem in se ex atmosphærâ contrahere solent, in vasis servari debent diligenter obturatis. Inspicere quoque saepius ipsa conyenit, ut si quid temporis injuriâ vitiis suscepérint, id possit aut præcayeri, aut excludi celerius. Quorum virtus tractu temporis infirmatur, diu servari non debent; quæ verò indigena sunt, quotannis colligi et siccari, rejectis omnibus quæ præter annum inveteraverunt.

PURGATIO ET MUNDATIO.

Medicamenta simplicia non pauca à variis sordibus aut heterogeneis admixtis purgari et mundari indigent. Talia sunt imprimis *adipes*, *gummi-resinæ*, *opium*, *mel*, *sulfur sublimatum* quod acido nunquam non remixtum est, nisi eluatatur.

1°. *Adipes*. Adeps colore, odore, densitate diversus est; et variè consistit pro animalis è quo desumitur generè aut specie et pro naturâ partis de quâ detractus est. Melior est, si ex fôrribus, vividis et sanis animalibus habeatur; suillus, seu porcinus, quem vulgò gallico idiomate *sain-doux*, latino *arvinam*, et vulgari, sed minùs convenienti nomine, *axungiam* vocamus, imprimis apud nos in usu est. Asservari debet in saventinis clausis, et in frigidiori loco repositis. Id præcipue curandum est, ut omni, quantum fieri potest, humore careat; quod efficitur, si balnei maris calore fusus expurgetur.

Ubi vel minimum rancescere percipitur, tunc ipsum à pharmacopoliis omnino facessere convenit.

R. Adipes cuiusvis recentis..... quantum opus est.

Crassioribus fibris et venulis exemptis, concitus minutim, sub aquâ purissimâ et frigidâ manibus pressus subactusque mollescat adeps.

Coque dein cum sufficienti quantitate aquæ, donec totus liquecat; quo facto, aquam simul et liquefactum adipem colla per linteum densem; frigesactum, densatum, et supernatantem adipem separa.

Liquetur denuò balneo maris, et ubi expurgatus fuerit, concretusque evaserit, ipsum exime, et serva ad usum.

Eodem modo parantur,

Sevum ovillum;

Medulla bovina;

Et aliæ Medullæ.

2°. *Gummi-Resinæ*, sepositis majoribus purioribusque

lacrymis si quæ siccissimæ sint , totæ si moliores fuerint impurioresque , pari quantitate alcoolis dilutioris (seu 12^d, aut 22^d B) emolliuntur , per linteum exprimendo percolantur , et vaporando in pristinam siccitatem reducuntur. *Gummi ammoniacum* , hoc paratum modo , adhibetur facilis ad unguenta conficienda ; quod si in pulverem , ut vulgo præscribitur , tritum conjiceretur , facilè in grumos concreceret , nec æqualiter satis toti massæ commisceretur.

3°. *Opium* , duplā aquæ quantitate emollitum et eâdem methodo percolatum , denique vaporando inspissatum , et pro variis usibus , modò molle , modò ad duritiem usque addensatum , servatur purum et vocatur *Laudanum* seu *Opium expurgatum*.

4°. *Mel* quoque , si impurius videatur , igne supposito calefactum , ubi primū calore intumuerit , aquâ frigidâ pauxillâ injectâ detumescet ; spumâ deindè abjectâ , colatum , frigefactum , addito aquæ calentis quantum sufficit ut ad debitam spissitudinem redeat (quod quartam scilicet Mellis ipsius partem non excedet) , servabitur purum , et ad usus pharmaceuticos aptius ; et dicitur *Mel despumatum*.

5°. *Sulphur sublimatum* , quod *flores sulphuris* dicere solent , semper aliquâ acidi sulphurici portiunculâ inficitur . Aquâ ergo bulliente ipsum diluere , percolare , atque affusâ insuper tandiù eluere convenit , donec in aquâ difflente cartha cærulea , tincta præcipue ope Crotonis tinctorii (*Tournesol*) , nullum acidi vestigium superesse indicaverit.

6°. *Terebinthina* etiam magnâ parte olei volatilis quo

feta est, ignis ope, aquâ mediante, spoliari solet sequentî modo, et tunc dicitur *Terebinthina cocta*:

R. Terebinthinae quantum volueris.

Conjiciatur in aquâ bullientis sufficienti quantitate, triplâ circiter: protrahatur ebullitio donec terebinthina in aquam frigidorem projecta, in mollitiem plasticam solidescat; ex quâ tunc globuli formantur pondere decigrammatum trium, seu granorum sex, sub aquâ frigidâ servandi.

Simili arte Resinæ omnes liquidiores, fragrantiores et aceriores dulcescere et solidescere possunt.

DISPOSITIO ET APTATIO AD USUS MEDICOS.

CORTICIS DAPHNES GNIDII AUT MEZERÆI PRÆPARATIO.

R. Ramorum Daphnes Gnidi. . . . quantum opus est.

Macerentur in aquâ vel aceto donec facile cortex à ligno separari possit. Dividatur deinde cortex in segmenta variæ magnitudinis ritè exsiccanda, dein asservanda in usum.

SPONGIÆ PRÆPARATÆ.

(*Spongia usitatissima*.)

Sæpè ad *dilatanda ulcera* spongiis utuntur Chirurgi. Verum ut effectum præstent requisitum, convenienter antè præparandæ sunt, maximèque omnis humor ab iis excludendus. Duplici modo hæcce conditio vulgo obtineri solet; is verò præstare videtur modus quo in præparandâ spongia cera non adhibetur.

SPONGIA PRÆPARATA CUM CERA.

R• Spongias contextū tenuis (*éponges fines*), exsiccatas, perfecte elotas et alienis omnibus repurgatas.

In ceram flavam igne liquatam immerge, et interpositas stanneis duobus laminis, in aquā bulliente calefacitis, ut cera facilius à spongiis excludatur, prælo subjice; fortiter exprime; frigefactas exime.

SPONGIARUM ABSQUE CERA PRÆPARATIO.

R• Spongias contextū tenuis puras et lotas :

Humidas adhuc funiculis circumductis constringe fortiter, gyris funiculi ita contiguis, ut nullus intersit spongiæ exitus, omnisque ipsa contegatur eodem ferè modo quo Tabaci foliorum cylindri solent; nodoque utrimquè funiculus teneatur facilè solubili.

His ita dispositis exsiccanda est probè spongia, et in loco sicciissimo asservanda.

Spongia sic præparata, soluto ubi requiritur funiculo, forcipe aut cultello acutiori exsecari valet, et in omnes duci acuique formas.

IN PULVEREM RESOLUTIO.

Pulveres ex quibuslibet materiis desumantur non eodem modo parandi sunt. Materiæ aliæ terendæ, aliæ contundendæ sunt; multæ suprà porphyriten levigandæ: quædam etiam præcipitatione chymicâ parandæ, de quibus suo habebitur loco.

2*

Quo quævis materia paranda sit modo, ipsa cujusque et natura et status indigitant.

Sæpius ut in pulverem corpora ritè resolvantur, prævià aliquà operatione disponenda sunt; sic radices et ligna, modò in taleolas exilissimas resecanda sunt; modò limà, radulâ aut scobinâ sunt abradenda. At quocumque hunc ad finem aptentur modo, nullus benè parabitur pulvis, si ex iis cautelis quas vel materiae natura requirit, vel artis præcepta legitimè indicant, aliquid aut oscitanter admittatur, aut omittatur negligenter.

A quibusdam autem medicamentis, dùm teruntur, cavidum est ne, aut quod in iis tenuissimum et efficacius est disperdatur, aut acriores pulvisculi, oculis, gutturi, faciei, manibus varia minitentur incommoda. Quod ex *Ipecacuanhâ*, *Euphorbio*, *Cantharidibus*, *mineralibusque quibusdam materiis* maximè metuendum est. Eas idcirò, dùm in mortariis teruntur, cohibere necesse est alutâ laxiori, cuius summa pars ad pistillum adnectitur, ima circâ mortarii oras vinculo aptanda est strictiori. Incernicula quoque ipsa similiter contegi debent, dùm manibus hinc indè versantur, ut iidem pulveres per textus sericeos setaceosve subtiliores exigantur.

Cæterùm id præcipuè notandum est, numquàm magnâ copiâ parandos esse pulveres, etiam ex iis medicaminibus quæ hâc formâ frequentiùs usurpantur. Omnia medicamina quæcumque sint, paucis inter mineralia præser-tim exceptis, integra multò tutiùs asservantur. Neque ea certè quæ volatilia sunt et fragrantia, aut subtilioris effica-ciæ, aut quæ faciliùs humescunt, magnâ copiâ sub pul-veris formâ paranda sunt. Sic neque Ipecacuanhæ, neque

Rhei , neque Kinæ diù pulveres benè asservantur , etiamsi vasa rite occlusa sint ; istis scilicet frequentius adapertis magnum virtutis suæ patiuntur detrimentum. Eamdem ob causam rite parati pulveres in vasis perfectè clausis asservandi sunt.

Colorem etiam , non prætereundum intemerati pulveris indicium , cum præsertim ex herbis paratur , purum servabunt , si pulveres in vasis contineantur luci imperviis ; quæ si vitrea sint , extus glutinatà chartà undique obtegenda sunt.

Quod autem incernicula attinet quibus , pro textū densitate variâ , plūs minusve subtile斯 pulveres secerni solent , alia quidem setaceo textu crassioribus , alia sericeo subtilioribus aptiora conficiuntur. Verū tamen ad quædam certè melius , nisi pretium obstaret , telæ ex filis argenteis contextæ adhiberentur. Mortaria quoque ipsa , pro naturâ aut duritie materiei terendæ , varia esse debent ; ferrea , marmorea , vitrea , etc. Pistillis etiam aut ligneis aut ferreis , aut vitreis , etc.

Tritus ubi primâ vice per incerniculum tenuior secretus est pulvis ; atque ubi deindè crassior qui restitit denuò tritus , novam subtilioris pulveris suppedavit copiam ; omnes sic ex eodem medicamine singulis vicibus parati pulveres commiscendi sunt , ut totius substantiæ virtus omnis , per totam parati pulveris massam æqualiter disperbiatur.

1. PULVIS DE RADICE ALTHEÆ.

(*Althea officinalis.*)

R. Radicis altheæ electæ , cuticulâ excussâ siccatae , et in taleolas tenues sectæ quantum opus est.

Contunde in mortario ferreo, et fiat, secundum artem,
pulvis tenuissimus, à parte fibrosâ per incerniculum ritè
separandus.

Simili modo parantur pulveres :

de radice Glycyrrhizæ,
et aliis radicibus.

2. PULVIS DE RADICE JALAPÆ.

(*Convolvulus Jalapa.*)

R. Radicis Jalapæ electæ in frustula divisæ et exsiccate.

..... *quantum opus est.*

Contundatur in mortario ferreo, ut fiat, secundum artem,
pulvis tenuissimus, nullâ ferè parte residuâ.

Simili modo parari possunt pulveres de radicibus :

Rhei (*Rheum palmatum*);
Gentianæ (*Gentiana lutea*);
Helenii (*Inula Helenium*);
et aliis.

3. PULVIS DE RADICE IPECACUANHÆ.

(*Cephælis emetica.*)

R. Radicis Ipecacuanhæ electæ et mundatae.

..... *quantum opus est.*

Tere primum leviter in mortario ferreo usque dum pars
exterior et resinosa radicis à parte ligneâ intimâ, seu medi-
tullio separetur; hanc partem ligneam rejice, dein pars ex-
terior resinosa denuò teratur et fiat, secundum artem, pulvis
tenuissimus.

4. PULVIS DE CORTICE KINÆ KINÆ.

(Cinchona condaminea.)

R. Corticis Kinæ Kinæ cinereæ electi. *quantum opus est.*
Contunde initio leviter in mortario ferreo, pulvisque primum sic acceptus rejiciatur ut inutilis : quo facto contundendo pergas donec cortex probè contritus in subtilissimum pollen ferè omnis sit resolutus.

Simili arte parantur pulveres :

de aliis corticibus Kinæ officinalibus,
de cortice Cascarillæ (*Croton Cascarilla*), etc.

5. PULVIS DE CORTICE CINNAMOMI.

(Laurus Cinnamomum.)

R. Corticis Cinnamomi electi. . . . *quantum opus est.*
Contunde in mortario ferreo, et fiat, secundum artem,
pulvis tenuissimus.

Similiter parantur pulveres ē corticibus :

Cassiæ ligneæ (*Laurus cassia*);
Winteræ aromaticæ.

6. PULVIS DE LIGNO GUAYACI.

(Guayacum officinale.)

R. Ligni Guayaci electi et in scobem redacti. . . .
. *quantum opus est.*
Contunde in mortario ferreo et fiat, secundum artem,
pulvis tenuissimus.

Simili modo parantur pulveres de lignis :

Aloës (*Aloëxylum verum*);
 Santali citrini (*Santalum album*);
 Santali rubri (*Pterocarpus Santalinus*);
 Sassafras (*Laurus sassafras*).

7. PULVIS E PLANTARUM FOLIIS.

R. Foliorum siccatorum cuiuslibet herbæ, caulibus abjectis *quantum opus est.*

Contunde in mortario ferreo ut fiat, secundum artem, pulvis tenuissimus, à parte fibrosâ accuratè separandus.

8. PULVIS E RADICIBUS ORCHIDIS SALEP DICTUS.

R. Bulborum Orchidis orientalium, quales venales vulgo prostant *quantum opus est.*

Aquâ tepidâ ipsos ablue, citoque exsicca.

Contunde in mortario ferreo, pulveremque, qui primus abscedit, ope incerniculi abjice; perge deinde usque contundendo et pulverem per sericeum incerniculum trajice, qui erit pulvis salep.

Simili modo parabilis est :

Farina ex Orizâ, quæ tamen, antequam teri possit, modicè humescere debet; alioquin elasticè dissipans, ictibus pistilli sese usquè subduceret.

9. PULVIS DE VANILLÆ FRUCTIBUS.

(*Vanilla.*)**R**

Fructuum Vanillæ electorum. . . quantum opus est.
 Sacchari purissimi et siccissimi. duplum.
 Fructus forcibus in minutissimas concide particulas, sac-
 charoque commixtos tere in mortario ferreo, donec in tenuis-
 sum pulvrem sint redacti; per sericeum incerniculum
 traiice; crassiorem qui restitit pulvis tere denuò, donec ita
 subtilis evaserit, ut omnis omnino per sericeum transeat.
 Serva in vase accuratè clauso.

10. PULVIS DE CANTHARIDIBUS.

(*Litta vesicatoria.*)**R**

Cantharidum electarum et siccatarum.
 quantum opus est.
 Contunde in mortario ferreo, alutâ cautè obiecto, et fiat,
 secundùm artem, pulvis per setaceum incerniculum aut per
 sericeum, pro requisitâ pulveris tenuitate trajiciendum.

11. GUMMI TRAGACANTHÆ IN PULVEREM RESOLUTIO.

R

Gummi tragacanthæ quam siccissimi.
 quantum opus est.
 Teratur primò leviter in mortario ferreo calefacto; pul-
 veremque qui primus abscedit rejice. Dein usque terendo
 perge et per incerniculum sericeum traiice.

12. PULVERES MEDIANTE GUMMI TRAGACANTHÆ
FACILIUS CONTERENDI.

PULVIS È COLOCYNTHIDE.

(*Cucumis Colocynthis.*)

Colocynthis aliquando, ut facile conteratur, gummi

tragacanthæ ità consocianda est, ut, iis siccatis simul, siccus, tenax, et membranaceus **Colocynthidis** textus, pistillo ægrè admodùm dividendus, fragilitatis gummi particeps tritu demùm facilis evadat, dum ipsius simul hac ipsa methodo acrimonia retunditur; quod fiet facillimè sequenti modo.

R. Parenchymatis sicci **Colocynthidis** albae. *partes* 8.

Gummi tragacanthæ. 1.

Sufficienti aquæ quantitate intumescens gummi in mucaginem solvatur spissiorem, et cum parenchymate **Colocynthidis** in mortario pistilli ope misceatur, ut fiat massa in tabellas seu pastillos facile dividenda, probè exsiccanda, et postmodùm pro necessitate terenda in pulverem tenuissimum, per sericeum incerniculum trajiciendum.

Non aliis erat usus trochiscorum quos vocabant *Allandal*, qui operiosori, sed non utiliori methodo parabantur.

Simili arte in pulverum teri possunt:

Agaricus albus, (Boletus Laricis);

Viperarum caro, (Coluber viperæ);

Et alia quorum textus pistillo difficilius dividi potest.

15. RESINARUM IN PULVEREM RESOLUTIO.

Resinas in pulverem resolvunt terendo in mortario ferreo, vitro, marmoreove. Quidam imum pistillum, fundumque mortarii aliquantulùm oleo innungunt, ne resina ipsis adhæreat tenaciùs; verùm hâc in re periculum est ne oleum ipsum in resinam cedens, huic cohæreat ac brevi rances-

cat. Expedit igitur ut detergatur cautē quod nimium est ; aut potius ab hāc methodo abstinendum. Cæterū , ut hāc præcaveantur incommoda , præstat hanc præparationem fieri tempore frigido.

*Simili arte , sed oleo nequaquam adhibito ,
parari possunt :*

Pulveres de Gummi-Resinis ferè omnibus ,
saltēm siccioribus.

14. CAMPHORÆ IN PULVEREM RESOLUTIO.

R. Camphoræ puræ..... *quantum volueris.*
Conjice in mortarium marmorēum aut vitreum ; instilla aliquantulūm alcoolis purissimi , et tere leviter admodūm.

15. PULVIS E CONCREMENTIS , VULGO LAPIDIBUS
CANCORUM.

(*Astacus fluviatilis.*)

R. Lapidum Cancrorum..... *quantum volueris.*
Aquā fluviatili calente , pluriē de die renovatā , ablue , donec ferè nullus odor saporve deprehendatur.
Exsiccatos deindē tere in mortario ferreo , posteā suprā porphyriten leviga , instillando aquam communem , usquè dum subacti sint in pultem levissimam de quā effingendi sunt trochisci in umbrā siccandi.

Simili modo parari possunt :

Ovorum putamina ;
Testae Ostreorum ;
Coralla ;
Cornu Cervi ad albedinem exustum.

16. PULVERES DE ARGILLACEIS , SCILICET BOLIS ET
ALIIS SIMILIBUS.

R• Terræ sigillatæ optimæ..... *partem 1.*

Humescat penitus et pressa manibus divi-
saque diluatur in aquæ communis..... *partibus 3.*

Residat per duo aut tria horæ minuta ut arenulæ præci-
pites fundum petant; tunc aqua crassioribus arenis libera et
adhuc turbida effundatur in setaceum incerniculum , quo
trajecto , reponatur in loco tranquillo. Sensim sine sensu
subsidet terra subtilior in fundo vasis , à liquore superfluo
separanda. Dein ex ipsâ effinguntur trochisci in umbrâ sic-
candi.

17. PULVIS DE SULFURETO ANTIMONII.

R• Sulfureti Antimonii puri et in mortario ferreo jam
in pulverem redacti..... *quantum opus est.*

Suprà porphyriten leviga : dein cum aquâ multâ per-
misce et agita ; aquam , cùm turbida evaserit , transfunde ut
residat. Superstigi materiæ , quam levigabis usque , aquam
rursus affunde ; idque totiès iteretur , donec materiam te-
nuatam exhauseris totam. Tunc aquam totiès sepositam ,
in quâ resedit pulvis , omnem effunde. Sulfuretum in fundo
vasis residuum exsicca , et serva.

Simili modo præparatur

Sulfuretum Hydrargyri , etc.

**18. PULVIS DE OXIDO PLUMBI QUOD VULGÒ DICUNT
LITHARGYRUM.**

Lithargyrum purum et in pulverem jam redactum cum aquâ plurimâ tere in mortario ferreo , atque indè pulvis subtilior eluatur , ut præscriptum fuit in præparatione sulfureti antimonii.

19. PULVIS DE SUBCARBONATE PLUMBI SEU CERUSSA.

R. Cerussæ albæ et electæ..... *quantum opus est.*

Affricetur suspensâ manu ad setaceum cibrum densius contextum , pulvisque trajectus chartâ excipiatur purâ.

Simili modo parabatur vulgò :

Pulvis de Agarico albo (*Boletus Laricis*).

Verùm melius parabitur ut dictum est suprà de Colocynthide.

20. FERRI IN PULVEREM RESOLUTIO.

R. Scobis Ferri splendentis , nitidæ et à sordibus perfectè mundatae..... *quantum opus est.*

Tempestate siccâ , sicco in loco suprà porphyriten (sine aquâ) levigetur , donec redacta sit in pulverem tenuissimum , nigerrimum , nullatenus splendentem , vase perfectè obturato asservandum , à quo humidum omne summâ curâ arcendum est.

21. STANNI IN PULVEREM RESOLUTIO.

R. Stanni purissimi..... *quantum opus est.*

Igne fusum Stannum conjiciatur in pyxidem ferream ,

modicè calentem , asperis intus parietibus , cretā undiquè dealbatis ; et sic junctis hæmisphæriis , metallum liquidum exagitetur assiduè , atque ita continuato motu , dum frigescit , in tenuissimum pulverem dividetur , per incerniculum densioris textūs trajiciendum . Idem quoque ope pyxidis lignearē sat facile obtineri potest .

Simili arte parari possunt :

Pulveres de metallis mōdico calore
fusilibus ; Plumbō , etc .

22. SALIUM IN PULVEREM RESOLUTIO.

Sales quorum elementa dissociare non valet marmor , in marmoreis terendi mortariis ; cæteri in vitreis vel in porcellaneis teri debent .

Sales qui tritu difficiliores sunt , suprà porphyriten sine aquâ levigandi , v. g. Murias Mercurii dulcis , Tartras Potassæ stibiatus , Sulfas Potassæ , etc .

23. CARBONUM IN PULVEREM RESOLUTIO.

R. Carbonis Tiliacei aut Salicini aut Populei , aut de alio quovis leviori ligno , penitus exusti , levissimi , sonantis et puri quantum opus est .

Aquaē tantum affunde quantum sufficiet , ut tantummodo humescat carbo . Contunde dein in mortario ferreo , aut molis subige , fiatque massa lentè diffluens , quam sic intactam post aliquot dies Ielis impones , ut ab ipsâ sensim stillando exhauriatur humor ; indè effingantur orbiculares placentes , quas solaribus radiis expositas penitus sines exsiccere .

Simili modo parabitur:

Carbo ex ossibus ustis.

N.B. Insolatione Carboni singularis additur efficacia,
quam eidem in umbrâ siccato non æquè conciliaveris;
sic scilicet et color alienus et odor omnis facile et ple-
nius absumuntur.

24. PULVIS DE SPONGIIS USTIS.

RUstarum in crucibulo cooperto spongiarum.
. quantum opus est.
Terantur in mortario marmoreo, absque aquâ, et per
setaceum trajiciantur.

SECTIO SECUNDA.

*Materiae è Simplicibus integris, elementis
parùm immutatis, depromptæ.*

SUCCI EXPRESSI, FÆCULÆ, OLEA EXPRESSA, PULPÆ, SERUM
LACTIS,

SUCCI EXPRESSI.

Cum quidquid vegetantium est, non æquè succo turgeat, cujusque herbæ status et natura primò consideranda sunt, ut indè succus ritè exprimi possit.

Herbæ nonnullæ, multo humore turgidæ, non indigent nisi ut mundatæ sedulò tundantur pistillo et prælo submittantur.

Hujus censùs sunt *Nasturtium* (*Sisymbrium Nasturtium*); *Cochlearia* (*Cochlearia officinalis*); *Acetosa* (*Rumex acetosa*); *Lactuca* (*Lactuca sativa*), etc.

Aliæ parùm succidæ, vel viscidiores aliquantulum aquæ requirunt; sed quæ admisceatur eâ tantùm quantitate quæ sufficiat ad succum faciliùs eliciendum; quo facto, contusæ prælo subjiciuntur.

Sic tractanda sunt *Borago* (*Borago officinalis*) ; *Bugglossum* (*Anchusa officinalis*) ; *Urtica* (*Urtica dioica*), etc.

Alia vegetabilia , qualia sunt quædam radices et fructus , in pultem priùs sunt redigenda scobinæ ope , videlicet *Dauci radix* (*Daucus carota*) ; *Fructus Cydoniæ* (*Cydonia vulgaris*) ; *Mali* (*Pyrus malus*) ; *Pyri* (*Pyrus communis*), etc.

Denique nonnulla contusa , et in pultem redacta , quodam fermentationis motu priùs subigenda sunt , antequām sub prælum veniant. Quo tractantur modo *Baccæ Rhamni* (*Rhamnus Catharticus*) ; *Sambuci*, etc., *Fructus Citri* (*Citrus medica*) ; *Aurantii amari* (*Citrus Aurantium amarum*) ; *Aurantii dulcis* , (*Citrus Aurantium*), etc.

Quod attinet ad defæcandos expressos plantarum succos , præstat , quantum fieri potest , frigidos percolari , præcipue si aromate polleant ; eos tantum balnei calore eliquari convenit , qui aut viscidiores aut spissiores sunt quam ut cola facilè permeare possint.

Succorum alii *magistrales* seu à Medicis præscribendi ; alii *officinales* seu à Pharmacopœis asservandi sunt.

Priores eâ parantur horâ quam præscribuntur.

Posteriores excipiuntur lagenis vitreis , angusti oris et colli ; superficiei supernatet olei pauxillum , sive amygdalini , sive alius cuiusvis quod non facilè concrescat. Lagenæ deinde tali munitæ operculo , quo sordibus non pateant , sic in frigidario collocentur. Oleum identidem , exempto veteri , novum instilletur.

HERBARUM SUCCI.

SUCCI EXPRESSI DE SIMPLICIBUS SINGULATIM.

1. SUCCUS BORRAGINIS.

(*Borago officinalis.*)

R. Foliorum Borruginis mundatorum 16

Contunde in mortario marmoreo paulatim addendo
aquæ communis. 1

Succum exprime , quem frigidum si spissior non fuerit ,
balneo calefactum si viscosiorem habueris , posito scilicet
albumine , per chartam emporeticam percolando defæcabis .

Simili modo parantur succi :

Foliorum Buglossi (*Anchusa officinalis*);

Graminis herbæ (*Cynodon dactylon*);

Pulmonariæ (*P. officinalis*);

Urticæ (*Urtica dioica*);

Cichorii (*Cichorium intybus*);

Cicutæ (*Cicuta officinalis*).

2. SUCCUS DAUCI RADICIS.

(*Daucus Carota.*)

R. Radicum Dauci , abrasâ cuticulâ mundatorum . . 16

Ad scobinam affracentur et redigantur in pultem ,
quam modicè dilues cum aquæ communis. 2

Indè succus exprimatur et coletur .

5. SUCCUS BACCARUM RHAMNI.

(*Rhamnus catharticus.*)

R. Rhamni Cathartici baccarum. . . *quantum opus est.*

Compressæ manibus elidantur baccæ , ne obterantur simul semina. Dein massa per tres quatuorve dies fermentescat; tunc demùm exprimatur succus et coletur. Succus iste , vel illicò impendi potest , vel ad usum servari. Tunc autem lagenis excipiatur , et superficie instilletur amygdalinum oleum , ut jam dictum est.

Simili modo paratur :

Succus de baccis Sambuci

(*Sambucus nigra* ,
Sambucus ebulus).

4. SUCCUS DE FRUCTIBUS CITRI MEDICÆ.

R. Citreorum electorum et maximè succidorum. *quantum opus est.*

Summus qui flavus est cortex sedulò , et quod albi subest , seminaque simul omnino eximantur ; accuratè sic mundata citrea , manibus compressa elidantur , et intermixtis straminibus secalinis eoncisis tepidâque lotis , prælo committantur , ut expressus defluat succus , tunc tantum percolandus , cum fæce sponte suâ subsidente fuerit liberatus.

Succus iste per plures menses facile incorruptus servatur , si lagenis exceptus , oleo amygdalino instillato asservetur.

Simili modo præparantur succi de fructibus :

Punicæ Granati ;
 Citri Aurantii , dulcibus ,
 amaris.

5. SUCCUS DE FRUCTIBUS CYDONIÆ.

R. Fructuum Cydoniæ submaturorum. quantum opus est.

Radulæ in pultem redigantur quæ statim, exclusis seminibus, intermixtis secalinis straminibus aquâ tepidâ lotis concisisque, prælo submittatur; succus expressus et in vase faventino vel vitro exceptus, postquam sponte defecatus erit, coletur. Hie quoque lagenis exceptus, oleo amygdalino instillato, facile asservatur. Notandum etiam optimè hunc succum asservari, si lagenæ quibus excipitur vapore ex Sulphure combusto prius inficiantur, ut mos est in doliolis pro conservando musto; aut si Sulfites Calcis ad grana aliquot (quindicim pro bilibri mensurâ) lagenæ injiciatur et cum succo misceatur.

Simili modo parantur succi:

de Pyris (*Pyrus communis*);
de Malis, (*Pyrus malus*); etc.

6. SUCCUS DE FRUCTIBUS RIBIS RUBRI.

R. Acinorum Ribis, sen Grossulariæ rubræ, non penitus maturorum, rhachidibus devulsis. . . quantum opus est.

Compressi manibus eliduntur, et seponantur in frigidario, donec liquor supernè illimis appareat, quem tunc, unâ cum spissiore, prælo subjicies. Expressum deinde percolabis, et sic succus habebitur pulchrè ruber et pellucidissimus.

N. B. Succusidem, admixta ribibus sextâ parte Cerasorum rubrorum expeditius paratur et facilius eliquatur.

Parantur eodem modo succi de fructibus :

Mori (*Morus nigra*);
Fragariae (*Fragaria vesca*);
Berberidis (*Berberis vulgaris*).
Omphacium seu *succus de uvis austera*ris.

7. SUCCUS DE PETALIS ROSARUM PALLIDARUM.

R. Petalorum de Rosis pallidis recentium quantum opus est.

Contunde in mortario marmoreo vel ligneo; exprime fortiter. Succus expressus, per chartam bibulam percolatus, subruber habebitur, egregie odor, minimè viscosus, non nihil acidulus, oleo instillato asservandus.

N. B. Ex petalorum 64
 Succi percolati quantitas erit circiter 24,5

SUCCI DE PLURIBUS COMMIXTIS.

i. SUCCI DICTI ANTISCORBUTICI.

R. Foliorum Sisymbrii Nasturtii
Cochleariae officinalis,
Menyanthis trifoliatae. *āa partes æquales.*

Hæc mundata sedulo contunde in mortario marmoreo vel ligneo et exprime fortiter. Expressum succum per eartham bibulam infundibulo vitro insertam trajice.

2. SUCCI DICTI TEMPERANTES ET DIURETICI.

R. Foliorum Lactucae sativæ,
Rumicis Acetosæ;
Chærophylli sativi,
Sempervivi tectorum. *āā partes æquales.*
Eodem modo quo prædicti parari debent.

FÆCULÆ.

PRÆPARATIO FÆCULARUM.

Fæcularum nomine olim significabantur fæces quædam in succis expressis subsidentes, eæque naturæ non unius, imò diversæ admodum. Hodiè solum sic vocantur aut amylos, aut eæ fæculæ quæ ipsi naturâ sunt omnino affines.

Pura et sincera *alibilis fæcula* eadem semper et constans sibi materies est, ex quibuscumque vegetantium partibus deprompta sit. At dūm elicetur, saepius alia ex iisdem vegetabilibus adjuncta secum trahit elementa, undē et ipsi proprietates accedunt non suæ, nisi peculiari artificio, repetitis scilicet lotionibus, ab alienis repurgetur.

Tales se præbent quæ ex Bryoniæ, Ari, Iridis radicibus, ex Hippocastani semine; etc., medicinales parantur fæculæ; istæ scilicet illotæ, nec amylo simplici, nec fæculæ è tuberibus Solani tuberosi, aut è cerealibus seminibus elicite similes existimandæ sunt.

1. FÆCULA MEDICINALIS BRYONIÆ.

(*Bryonia alba.*)

R. Radicis Bryoniæ recentis et accuratè lotæ.
quantum opus est.

Scobinâ ferreâ radicem derade ; scobem excipe sacco cannabino et prælo subjectam exprime. Succus sufficienti aquæ quantitate dilutus, ut facilius diffluat, effusus in incerniculum rarioris textùs excipiatur vase faventino vel vitro, et seponatur : subsidet paulatim fæcula, non jam eluenda, quæ, liquore superfluo effuso, in frustula dissecta, suprà chartam bibulam, in umbrâ, leni calore siccanda est; ac demum, siccata penitus, in pulverem redigenda erit, atque in vase clauso asservanda.

Simili arte parari possunt fæculæ medicinales :

Radicum Ari (*Arum vulgare*) ;
Iridis (*Iris germanica*) ;
Seminum Hippocastani (*Aesculus Hippocastanum*).

2. FÆCULA ALIBILIS SOLANI TUBEROSI.

R. Tuberum radicis Solani tuberosi, pelliculâ exteriore sedulò mundatorum. quantum opus est.

Redige in pultem ope scobinæ ferreae. Hanc sufficienti aquæ quantitate dilutam trajice per setaceum incerniculum, atque itâ liquor turbidus excipiatur in vase vitro vel faventino; inde citò subsidet fæcula, quæ repetitis lotionibus repurgata, in umbrâ, leni sub calore exsiccati debet.

OLEA EXPRESSA.

Olea aut Unguedines, quibus scatent vegetantia quædam multùm inter se partium cohærentiâ differunt. Quædam ità facilè diffluunt, ut succorum more aquosorum, pressione commodè extrahi possint.

Alia, quantumvis naturâ fluida, ità mucosis substantiis cohærentibus irretiuntur, ut ægrè admodùm expressioni cedant, neque sic elici sat facilè queant.

Quædam demùm, Sebi instar, ità concreta inveniuntur ut nullâ arte valeant extrahi, nisi antè, justo calore liquata, fiant ad diffluendum aptiora.

Ex tali singulorum naturæ discrepantiâ facilè intelligitur, pro cujusque vario statu et conditione, varias extrahendi rationes esse adhibendas.

In universum Unguedines et olea expressa, facillimè cùm rancescere soleant, renovari sæpiùs indigent et in frigidariis asservari.

1. OLEUM AMYGDALARUM DULCIUM.

(*Amygdalus communis.*)

R• Amygdalarum dulcium selectarum. quantum opus est.

Amygdalas siccas et sacco conclusas concute ut pulvisculus cuticulæ adherens excutiatur cribroque secerni possit. Sic mundatas tunde in mortario marmoreo, pistillo ligneo; vel inclius redige in farinam molâ trusatili. Dein sacco canna-

bino inclusas torculari submitte : exprime fortiter, ut defluat oleum usui asservandum. Hoc etiam, si percoletur Oleum per chartam bibulam, limpidius habebitur, et diutius intemeratum asservabitur.

Siculi modo parantur Olea :

Amygdalarum amararum (Amygdalus communis);
Nucum (Juglans regia);
Pistaciarum (Pistacia trifolia);
Quatuor seminum quae vulgo frigida dicuntur.

Olea Seminum Moringae Ben dictorum (Moringa Zeylanica);

Papaveris albi (Papaver somniferum); etc.

2. OLEUM SEMINUM LINI.

(*Linum usitatissimum.*)

R. Seminum Lini mundatorum et contusorum. quantum opus est.

Supra cibrum inversum et coopertum, vapor i aquae ferventis per horae semiquadrantem expone, ut penitus humescant; tunc tela densioris textus includantur et exprimantur illico et celeriter.

Eodem modo parantur Olea

Seminum Anisi (Pimpinella Anisum);
Carvi (Carum carvi);
Anethi (Anethum graveolens), etc.

5. OLEUM EXPRESSUM VOLATILE DE AURANTIORUM
CORTICIBUS.

R. Fructum Citri Aurantii. . . . quantum opus erit.

Radulâ extimum corticem seu *flavedinem* abrade, intactâ, quantum fieri potest, albida que ipsi subjacet ejusdem corticis parte. Hanc scobem, ubi collecta erit eâ copiâ quæ sufficere videbitur, sacculo inclusam prælo subjice; defluet intense coloratus liquor, qui vase exceptus cylindrico bifariam dividetur, oleo supernatante; istud fistulâ aut siphunculo eximes, abjecto qui subest aquoso liquore. Oleum hoc lagunculis rite obturatis exceptum, temporis tractu, positâ fæce, fiet limpidissimum, et multò suavius, quantumvis intensius coloratum, quam quod ope ignis destillando paratum est.

Eadem arte Olea parari possunt è corticibus fructuum *Citri medicæ* et aliorum id genus, quorum varietates nominibus *Cedra*, *Bergamotte*, *Bigarade* insignitæ multi estimantur.

4. OLEUM EXPRESSUM SEMINUM RICINI VEL PALMÆ
CHRISTI.

(*Ricinus communis.*)

R. Seminum Ricini communis maturorum, et exteriori seminis tegumine, necnon embryone, quantum fieri potest, mundatorum. quantum opus est.

Contunde in mortario marmoreo, pistillo ligneo, donec trita coeant in pultem mollissimam. Hanc involutam telâ textûs densioris gradatim, ne tela rumpatur, exprime, quod non nisi longo satis tempore convenienter perfici potest. Verum, omnibus ritè peractis, oleum pulchrè exstilabit, sapore subdilei, quale apprimè ad usum medicum requiri.

ritur; quod ubi aliquantum resederit perfecte limpidum habbitur. Hoc oleum Olivo lentiū difflit, lentescītque magis ac magis; at ubi demūm acrius est factum, omnino ab officiis réjiciendū est.

N. B. Genuinum Ricini oleum hōc ab aliis discrepat expressione paratis, quod totum alcoole dissolvatur. Ubi prae dicto modo elicitum fuit colore caret: at aliā etiam methodo parabile est, scilicet;

Semina Ricini mundata in sartagine ferreā leviter torrentur; ubi refriguere, molis conteruntur, aut contunduntur in mortario marmoreo, buxeo pistillo. His peractis, massa sic parata, aquæ sufficienti quantitate diluta, igni imponatur, et dūm incandescit indesinenter agitetur donec bulliat; tunc spumosa materies, oleo turgens, superficie innatans, excipietur omnis, minorique in vase collecta, denuo igne incandescat, ut in vapores abeat aquosus humor, oleumque secedat. Tunc per pannum illud trajicitur, refrigerescit, fæcēm ponit, purumque, quamvis priore coloratius, servatur medicos ad usus.

5. OLEUM CONCRETUM E SEMINIBUS CACAO.

(*Theobroma Cacao.*)

R. Seminum Cacao mundatorum... *quantum opus est.* Torrefacta modicè in sartagine ferreā munda cōrtice, tere deindè in mortario leviter, ac demūm leviga super lapidem, igne supposito, ut mos est in conficiendā *Chocolatā.*

Dein predicta massa bulliat in aquæ communis sufficienti quantitate, donec oleum supernatet, quod concretum colliges ex aquā refrigeratā.

Vel melius: levigata massa, aquæ bullientis sufficienti quantitate madescat; tunc sacco densioris textū inclusa, stanneis duobus laminis, in aquā bullienti ut incalescant

ad immersis, interponatur, et sic submittatur praeo illico et exprimatur.

Denique oleum istud, quocumque modo elicatum, concretum ut esse solet, liquefiat balnei maris calore, et dum liquescet, hoc ipso sub calore, per chartam emporeticam percoletur; sic purum, cum denuo concreverit, asservabitur.

Similiter, sed non torrefactis fructibus, elicitur oleum:

de Baccis Lauri (*Laurus nobilis*);

de Nuce myristicā (*Myristica aromaticā*).

6. OLEUM DE VITELLIS OVORUM.

R. Vitellorum ovorum recentium. 1000
(circiter 60 vitellos).

Immittantur in pelvem argenteam et vaporent balnei maris ad dimidias, scilicet, donec ex ipsis inter digitos pressis facile oleum exsudet: tunc involutos telā textū tenacioris, aut è setis equinis contextā, subjice praeo, sūsideque interpositis laminis ferreis, aquæ ferventi prius, ut justè incalent, immersis, et festinanter exprime.

Oleum istud, chartā emporeticā, sub ipso balnei maris calore percoletur, et habebuntur ex prædictā vitellorum quantitate olei dulcissimi circiter. 125

N. B. Etheri sulfurico facile oleum hoc, quæcumque sit unius ad alterum ratio commiscetur. Diù vero asservari nequit; novumque in veteris locum saepius suffici debet; aut do apotius, ut magistralia solent, ex tempore ubi præscribitur parari præstat.

PULPÆ.

DE PULPIS.

Vegetantia, aut eorum partes, quæcumque mollia et sticciada sunt, in pulpas redigi possunt, eā tantum adhibitā curā, ut terantur primum in mortario marmoreo, et trita dein per incerniculum setaceum densius exigantur.

At radices et fructus quorū parenchyma minus est succidum, non terenda in mortario, sed radulā dividenda sunt, et sic abrasa per setaceum exigi possunt.

Quod attinet plantas, earumque partes sicciores nec molles satis, mollescant primum aquā vinove madefactæ, aut decoctæ in aquæ sufficienti copia, ut deinde facilius, soluto partium nexu, trajiciantur, et sic in pulpamen mollius lentescant.

Pulpamina autem addensari debent in cohærentiam spissioris magmatis, quod etiam levī evaporatione, si ita libuerit, compactum magis evadet. Sed ea utendit tempore tantum paranda sunt, quippe quæ facilimè et cito nimis asservata corrumpuntur.

I. PULPÆ DE PLANTIS EMOLlientIBUS.

R. Specierum emollientium recentium (V. SPECIES). quantum opus est.
Bulliant in aquæ communis sufficienti quantitate, atque ubi penitus excoctæ sunt, per incerniculum trudantur ope spatulæ. Pulpæ sic paratae vaporet ut spissescat in massam molliorem.

2. PULPA DE LILIORUM BULBIS.

(*Lilium candidum.*)

R. Bulborum Liliorum mundatorum. *quantum opus est.*

Chartà involuti bulbi sub cineribus calidis usquè deco-
quantur, dum facilimè intrà digitos pressi elidantur; tunc,
excussis quæ nimium ambusta sunt, terantur in mortario
marmoreo, et in pulpam trudantur, ut artis est.

3. PULPA DE SCILLÆ BULBIS.

(*Scilla maritima.*)

Simili modo paratur Pulpa Scillæ, ablatis Scillarum
recentium corticulis exterioribus et radicibus. Potest etiam
obduci Scillæ bulbus farinâ in massam plasticam aquâ
mediante subactâ; et sic, aut prædicto modo, aut furno
commissus, facile decoqui valet.

4. PULPA CASSIÆ.

(*Cassia fistula.*)

R. Leguminum seu fistularum Cassiæ. *quantum opus est.*

Pulpa è leguminibus diffractis exempta, et à seminibus et
dissepimentis quantum fieri potest purgata, per setaceum
trajiciatur, et sic in pullem redigatur leni calore inspi-
sandam.

Simili modo parari potest:

Pulpa Tamarindorum, admixto tamen, si
modo ea nimium exsucca è leguminibus
educta sit, aquæ calentis quantum sufficit
ut mollescat.

5. PULPA DE PRUNIS.

(Prunus domestica.)

Ruinae Pruni domestice fructuum siccatorum
quantum opus est.

Coque in aquæ communis sufficienti quantitate ad molitatem; dein, exemptis nucleis, per setaceum trajice, ut fiat Pulpa, quæ, cum aquâ decocti mixta, vaporet leni calore ad requisitam spissitudinem.

Eodem modo parari possunt Pulpæ

de Ficubus (*Ficus Carica*);

Dactylis (*Phænix Dactylifera*);

Passulis (*Vitis vinifera*

apyræna);

Jujubis (*Zizyphus Lotus*), etc.

6. PULPA DE ROSÆ CANINÆ FRUCTIBUS CYNORRHODON
DICTIS.

Ruinae Fructuum Cynorrhodi jam rubentium, necdum plenè maturorum 16

Excisis in summo fructu quod calyci, in imo quod asperum pedunculo respondet, exemptis deinde seminibus et pilis interioribus, excipientur vase laventino, et super affunde.

Vini albi generosi. 2

Misce accuratè ope spatulæ ligneæ aut eburneæ et macera per duos vel tres dies ut penitus mollescant.

Tunc tere leviter in mortario marmoreo, pistillo ligneo, et trajice per setaceum densum; et habebitur Pulpa.

SERUM LACTIS.

R. Lactis vaccini, vel alius, si placeat, animalis. 2000 ,00

Excipiatur vase figulino vel argenteo et ad-
misceantur coaguli vitulini aqua tantillam diluti. 2 ,50

Cineribus calidis imponatur vas, et ubi lac concrescere
inceperit, calor sensim augeatur, ut tantum non bulliat li-
quor, et caseosa pars magis ac magis addensetur. Tunc
quod serosum est transfundatur; coagulum autem imponatur
craticulae vimineae, ut serum extillans penitus exhauriatur,
priorique commisceatur.

Serum sic collectum, turbidum adhuc et albicans sequenti
modo eliquandum est.

R. Pro seri libris quatuor, aut grammatis. 2000,00

Albumina ovorum recentium. n° 3.

Tartratis aciduli potassae grana viginti quin-
que, seu. 1,25

Albumina primò cum aliquantula seri parte mixta exagi-
tentur; additoque deinde quod seri superest, bulliat liquor;
dumque ebullire incipit, sensim inspergatur, simulque agi-
tando misceatur Tartras; atque ubi purum, limpidumque
evaserit, coletur Serum, per linteum primò, ac deinde per
chartam bibulam.

SECTIO TERTIA.

Materiae in Simplicibus fermentando evolutæ.

INTER liquores qui fermentando parantur, numerantur præcipue Vina, Cerevisiæ, Aceta. Omnia hæc venalia vulgo prostant, et apud nos facilius minorique sumptu emuntur quam parantur. Hic, tamen, exempli gratiâ, attulimus Vinum ex Hydromelite.

Vina autem et cerevisiæ aut aceta, quæ admixtis variis, etiam inter fermentandum, medicantur (ut est liquor vulgo notus sub nomine *Laudanum, abb. Rousseau*), alio loco, scilicet inter vina et aceta medicata locum obtinebunt.

HYDROMEL VINOsum SEU VINUM EX HYDROMELITE.

R • Mellis albi exquisiti.	2,500
Aquaæ communis tepidæ.	12,500
Fermenti ex cerevisâ mollieris.	64
Solutis in aquâ, fermento et melle, liquor doliolo exceptus ad fermentandum reponatur sub aëris tempore circiter 15 ad 20 s. (19-25 ^{eg.}), usque dum odorem vinosum acquisierit. Tunc liquorem decapula et serva.	

SECTIO QUARTA.

Materiæ ex Simplicibus destillando elicite.

AQUÆ STILLATITIÆ, OLEA VOLATILIA ODORATA, ALCOOL ET ALCOOLATA,
OLEA ET SALIA VOLATILIA PYROGENÆA.

**DE DESTILLATIONIBUS ET IIS PRÆCIPUÈ
QUE PER RETORTAM FIUNT.**

NEMO nescit quibus artificiis, vasorumque apparatu. igne supposito, distillent varia corpora, eaque ipsa quorum maxima in medicis rebus efficacia est.

Cucurbitæ metallicæ, quarum usus est frequentior in aquis, oleis volatilibus, aut alcoole destillandis, sæpè in aliis distillationibus adhiberi nequeunt, sive quod difficiliùs ferant nimiam ignis vim, ad elicienda corporum elementa nonnunquam necessariam, sive ob metum ne ipsa haec elementa ab hoc vasorum genere adulterentur aut inficiantur heterogeneis; sive demùm quia non sat facile ipsis astrui possunt quidam apparatus excipiendis et secernendis materiebus apti. In earum igitur locum ampullas *retortas* dictas adhíbuerunt Chymici, iisdem operibus absolvendis aptiores. Iis autem utuntur aut vitreis, aut fictilibus sive porcellaneis, sive argillaceis siliceisque, aut etiam aliquando ferreis. Nonnumquam luto arte facto trullissatae loricantur retortæ,

quā parte præcipuè major ignis ferenda est violentia. Vasa, quæ ipsorum rostro coaptantur, pro variâ excipiendorum naturâ, in varios apparatus ordinantur; inter quæ præcipuum locum obtinet ille quem autor instituit *Woulf*, cuius ope et amplioribus vasis carere possumus, et quidquid aëreâ elasticitate expanditur facilè coerceri valet, et omnino arcetur imminens quod olim sæpè adeò reformidabatur fracturæ periculum.

Præterea destillationis eliciendæ varius modus, varios effectus prodit; diversèque elementa consociat, undè variæ producuntur rerum et naturæ et facies; ideòque non una in opere ipso adhibenda est cautela; de quā re fusiùs in scriptis chymicis pharmaceuticisque traduntur præcepta diligentius observanda, ut sincera et legitima habeantur ea præsertim omnia quæ in medicum usum verti debent.

I. AQUÆ STILLATITIÆ.

1º. AQUÆ STILLATITIÆ SIMPLICES.

Aquarum simplicium destillatio fieri non debet sine cautelis, quibus omissis, earum virtus et utilitas omnis evanescit.

Nulla herba caret odore proprio, qui sub ipsâ destillatione cum aquâ sublimis exhalat, et quo prægnans humor stillat in excipula.

Ubi parcè admodum olent plantæ, recentes habeantur, iteratisque vicibus in novas quæ jam nunc stillavit aqua refundatur herbas; et sic cumulato odore feta demùm fragabit pleniùs.

Contra, si odoratissimæ habeantur, semel tantum destillasse sufficiet, modo ea sit herbæ copia quæ eliciendæ aquæ quantitate respondeat.

Herbæ quædam fragrantiores, quamvis siccæ, si accuratè exsiccatæ fuerint, non magnum inde patiuntur odoris detrimentum; ex his, scilicet, quantumvis siccis, stillant aquæ odoratissimæ; nihilominus istis etiam præstat uti recentioribus.

Diversas plantarum partes, cum sèpè seorsim ex iis aquæ stillare debeant, eligere quoque diversis temporibus convenit; cum, scilicet, pleniori fragrant aromate.

Hac de re sat dictum fut̄ cum de *colligendis, siccan-*

disque herbis actum est.

Facile, temporis lapsu, corrumpuntur aquæ stillatitiae;

sæpius adeò renovandæ sunt.

Meliùs in vitreis, faventinis, aut siliceis fictilibus istæ asservant aquæ. Reponi debent temperato in aëre, in loco lucis radiis parùm pervio; neque vasa perfectius, nisi plena sint, obturasse curaveris.

1. AQUA COMMUNIS STILLATITIA.

R. Aquæ fontanæ..... 10,000

Destillent, ut artis est, eo calore quo modicè bulliat liquor. Partem quæ priùs destillavit, decimam totius, ut minus puram abjice. Quod succedit excipe et serva, donec dodrantem totius aquæ æquaverit.

Simili modo destillabunt:

Aqua Pluvialis,

Fluviatilis.

AQUÆ STILLATITIÆ DE PLANTIS PARUM

ODORIS : exemplo sit,

2. LACTUCA.

(*Lactuca sativa.*)

R • Lactucæ capitatae recentis.....	5,000
Aquæ communis.....	12,500
Modico igne destillent donec exasperis circiter stillatitii liquoris.....	10,000
Hic refundatur in novam Lactucæ quantitatem priori æqualem , admixtis insuper novie aquæ.....	10,000
Destillentque iterum ; hæc quoque vice excipies stillatitium liquorē ad.....	10,000
Quem solum servabis , nisi odor debilior fuerit : quod si contigerit ; idenr , tertia vice , proderit iterasse.	

Eadem arte obtineri possunt :

- Aquæ de folijs et caulis Borraginis (*Borago officinalis*);
 Buglossi (*Anchusa Buglossum*);
 Plantaginis (*Plantago major*);
 Portulacæ (*Portulaca oleracea*);
 Potentillæ (*Potentilla reptans*);
 Parietariæ (*Parietaria officinalis*)

Aquæ de foliis et caulibus Cardui Benedicti (*Centaurea Benedicta*);
 Solani (*Solanum nigrum*);
 Euphrasiæ (*Euphrasia officinalis*);
 Cyani (*Centaurea Cyanus*).

AQUÆ STILLATITIÆ ODORATORES.

5. AQUA STILLATITIA DE RAPHANO RUSTICANO.
 (*Cochlearia armoracia*.)

R. Radicis Cochleariae armoraciae recentis.....	2,000
Aquæ communis.....	10,000
Destillent, ut artis est, donec exceperis.....	4,000

Simili modo obtinetur :

Aqua stillatitia de radice Inulæ companæ (*Inula Helenium*);
 Valerianæ sylvestris (*Valeriana officinalis*).

4. AQUA STILLATITIA DE FOLIIS PRUNI LAUROCERASI.

R. Foliorum Pruni Laurocerasi recentium.....	1,000
Aquæ communis.....	2,000
Destillent donec habeantur liquoris stillatitii.....	500
<i>N. B.</i> Magnum ex usu liquoris hujus imprudenti cùm immineat periculum, seponenda sunt et diligentius notanda vasa in quibus asservatur, ut nullus detur errori locus; et	

nulli tradatur emptori, nisi ex legitimâ præscriptione, jus-
toque chirographo.

Simili modo destillabit:

Aqua de Amygdalis amaris contusis.

*AQUÆ STILLATITIÆ DE FLORIBUS ODORA-
TISSIMIS.*

5. AQUA DE FLORIBUS CITRI AURANTII, AQUA NAPHE
DICTA.

R <small>egula</small>	Florum Citri Aurantii recenter decerptorum.	5,000
	Aqua communis.....	20,000
	Destillent, ut artis est, donec in excipula stilla- verint liquoris.....	10,000

Nota. Præstat floribus in cucurbitâ repositis aquam affu-
disse bullientem; citoque dehinc, nec intermissa, debet
peragi destillatio.

*Simili modo destillabunt alii flores aromatici, vide-
licet:*

Lilii (*Lilium candidum*);
Sambuci (*Sambucus nigra*);
Tiliæ (*Tilia Europæa*);
Convallariæ (*Convallaria majalis*);
Rosarum (*Rosa centifolia*).

Rosarum autem duplum requiritur
ut eadem aquæ aromaticæ obtineatur
copia.

Pari etiam modo ex minus odoris floribus habebuntur aquæ :

Papaveris Rhœados (*Papaver Rhœas*);
Nymphææ (*Nymphaea alba*);
Pæoniæ (*Paeonia officinalis*);
Centaurii minoris (*Erythræa Centaurium*), etc.

6. AQUA DE HYSSOPO STILLATITIA.

(*Hyssopus officinalis*.)

R.	Summitatum floridarum Hyssopi recentium	5,000
	Aquæ communis.....	20,000
	Destillent, ut artis est, donec habeantur stillatitiae aquæ.....	10,000
		000.0

Simili arte destillabunt aquæ summitatum floridarum :

Melissæ (*Melissa officinalis*);
Lavandulæ (*Lavandula Spica*);
Salviæ (*Salvia officinalis*);
Thymi (*Thymus vulgaris*);
Menthæ (*Mentha sativa*);
Menthæ piperitæ (*Mentha piperita*);
Feniculi (*Anethum Feniculum*);
Tanaceti (*Tanacetum vulgare*);
Matricariæ (*Matricaria Parthenium*), etc.

Atque inter minus odoras :

Scordii (*Teucrium Scordium*);
Veronicæ (*Veronica officinalis*), etc.

7. AQUA STILLATITIA DE ANISO.

(*Pimpinella anisum.*)

R. Seminum Anisi.....	2,000
Aquæ communis.....	15,000
Destillent ut artis est, donec habeantur aquæ stillatitiae.....	4,000

Simili arte destillabunt aquæ

- De Seminibus Carvi (*Carum carvi*);
Petroselini (*Apium Petroselinum*);
Angelicæ (*Angelica Archangelica*);
Feniculi (*Anethum Feniculum*);
Coriandri (*Coriandrum sativum*);
 De baccis Juniperi (*Juniperus communis*).

8. AQUA STILLATITIA DE CINNAMOMO.

(*Laurus Cinnamomum.*)

R. Cinnamomi Ceylanensis.....	2,000
Aquæ communis.....	16,000
Macerationi permittantur per duodecim horas; deinceps destillent, ut artis est, bulliendo leviter, donec habeantur aquæ stillatitiae.....	8,000

Destillent eodem modo :

- Cortex Cascarillæ* (*Croton Casca-
rilla*);
Cortex et lignum Sassafras (*Laurus
Sassafras*);

Lignum Rhodium (*Convolvulus Scoparius*);
Caryophylli aromatici (*Caryophylus aromaticus*), etc.

**29. AQUÆ STILLATITIÆ EX PLURIBUS SIMUL
UNITIS.**

AQUA STILLATITIA DE HERBIS QUAS DIXERE
VULNERARIAS.

R. Specierum Vulneriarum (V. SPECIES)	2,000
Aqua communis.....	20,000
Destillent, ut artis est, donec habeantur aquæ stillatitiae.....	8,000

II. OLEORUM VOLATILIUM DESTILLATIO.

Quo tempore aquæ odoratae destillant, eodem et *Olea volatilia*, neque aliâ plerumque arte excipiuntur.

Ea inter quædam sunt aliis et volatilia magis et leviora, quædam ponderosiora: leviora olea vulgo ab indigenis, ponderosiora ab exoticis vegetabilibus destillant.

Pro diversâ oleorum naturâ diversus distillationi astruitur apparatus; quæ differentia ex sequentibus sigillatim pleniùs intelligetur.

Ex herbis recentibus, ut plurimum, tenuiora et fragrantiora quam ex siccioribus olea eliciuntur.

Ea omnia, obscuro in loco, et in vasis servari debent

diligentius obturatis. Temporis lapsu et lentiora fiunt et coloratiora, debilius quoque fragrant.

1º. OLEA VOLATILIA LEVIORA.

OLEUM DE FLORIBUS CITRI AURANTII *NEROLI* DICTUM.

R.	Florum Citri Aurantii recentium.....	5,000
	Aquæ communis.....	7,500

Destillent eo modo quo utuntur ad aquam eliciendam, sed in locum excipuli ampullati et longicollis (*matratum dicti*), capitelli rostro aptetur excipulum conicum, *florentinum* dictum, cuius ope, Oleum, aquæ innatans simul stillanti, angustum in spatium colligitur, facilèque, si liquidum sit tubo ampullato vitro, si concretum vitreâ spatulâ totum eximitur.

Aqua, quæ oleo comitante extillavit ipsoque feta est, in novos refundi flores, et sic pluriæ, ut oleum eliciatur abundantius, aliis destillationibus inservire potest.

Eadem arte destillabunt olea:

- Rosarum (*Rosa centifolia*);
- Menthæ piperitæ;
- Thymi (*Thymus vulgaris*);
- Lavandulæ (*Lavandula Spica*);
- Salviæ (*Salvia officinalis*);
- Tanaçeti (*Tanacetum vulgare*);
- Absynthii (*Artemisa Absynthium*);
- Rosmarini (*Rosmarinus officinalis*);
- Corticibus Aurantiorum (*Citrus Aurantium*);
- Ocymi (*Ocimum Basilicum*);

Rutæ (*Ruta graveolens*) ;
 Chamæmeli (*Anthemis nobilis*) ;
 Sabinæ (*Juniperus Sabina*) ;
 Anisi (*Pimpinella Anisum*) ;
 Feniculi (*Anethum Fenicum*) ;
 de Baccis Juniperinis (*Juniperus communis*), etc.

**2º. OLEA VOLATILIA QUÆ PONDEROSIORA
SUNT.**

OLEUM DE CINNAMOMO.

(*Laurus Cinnamomum.*)

R. Cinnamomi selectioris contusi.....	5,000
Muriatis sodæ.....	500
Aqua communis.....	10,000
Macerentur per horas duodecim ; ac deinde igne supposito , aqua citissimè bulliat; et aptato ad capitelli rostrum vase ampullato et colli longioris , destillet liquor , donec in excipulum limpidus decidere incipiatur.	

His ita dispositis et peractis , liquor lactescens habebitur , ejus imma petens oleum in fundo vasis subsidet. Istud ab aquâ supernatante separabis. Aquam verò refundes in cucurbitam iterum , terque , atque etiam quater ; et sic omne quod ex Cinnamomo potest elici oleum obtinebitur.

Similiter parari possunt olea :

Cinnamomi Sinensis ;
 Caryophyllorum aromaticorum ;
 Sassafras (*Laurus Sassafras*) ;
 Rhodii ligni (*Convolvulus scoparius*), etc.

III. ALCOOL ET ALCOOLATA.

DESTILLATIO ALCOOLIS.

R. Vini de uvis optimæ notæ.... *quantum opus est.*

Destillet, ut artis est, ex eucurbitâ stillatoriâ, cuius capitulo aptabitur tubus in spiram convolutus (gallieè *Serpentin*); et stillare pergit, modico ignis calore, donec nullam liquor stillans præ se ferat alcoolis notam.

ALCOOLIS PURGATIO.

Qui destillavit methodo suprà dictâ Alcool, balneo maris et eodem apparatu destillet iterum, donec liquoris totius dodrans in excipula transierit.

Pro destillationis tempore et progressu, varia obtinetur Alcoolis et tenuitas et vis. Cujusquidem gradus ex *Aræometris* (seu potius *Hydrometris*, ut Batavis placuit), innotescit. Tenuissimum autem illud est quod destillavit prius. Cujus etiam vis acuitur magis, si, mediante Muriate Calcis aut Potassæ Acetate, aquâ omnino liber destillando evaserit.

Purissimus Alcool in aræometri columnâ, si scalam à *Baumé* divisam, cuius initium est 10, consulas, gradu notabitur 40°. Si verò scalæ numeri à 0 initium ducant, ut apud pharmacopeos in Bataviâ usitatum est, notabitur idem 30° gradu.

Densitas autem pro gradu varia est, scilicet,				
in alcoole 12 6.	—	22 Baumé.	923	densit.
16	—	26	900	
22	—	32	868	
26	—	36	847	
30	—	40	828	

Atque adeò aquæ stillatitiæ mensura kilogramma capiens
Alcoolis pondera tenebit dictis densitatibus æqualia; scilicet
grammata 923, etc.

Si autem ad antiqua pondera referas, et habeas aquæ
stillatitiæ mensuram quæ libras 2 capere valeat, eadem
tenebit Alcoolis.

12 — 22	1 lib.	15 unc.	4 drach.	15 gran.
16 — 26	1	12	6	29
22 — 32	1	12	0	71
26 — 36	1	11	0	60
30 — 40	1	10	5	70

Hæc autem pondera atque hæ mensuræ habebuntur,
barometri columnâ notante 28 poll. aut ferè 76 centimetra.

Liquores omnes, quotquot sunt, qui fermentatione vinum
æmulantur, destillare possunt eodem modo; ex singulis
enim hæc arte elicetur Alcool, qui sæpius suffici yalet in
locum Alcoolis qui ex vino ipso destillavit.

ALCOOLATA SEU LIQUORES EX ALCOOLE CUM
AROMATICIS DESTILLATI OLM SPIRITUS
DICTI.

ALCOOLATA SIMPLICIA.

1. ALCOOLATUM DE AURANTIORUM CORTICE.

(*Citrus Aurantium.*)

R .	Corticis de fructibus Aurantiorum recentis....	240
	Alcoholis purissimi (22—52 B ⁴).....	960
	Aquæ stillatitiae.....	480
	Macerentur per biduum; destillent balneo maris, donec in excipulum transierint Alcoholis aromatici...	960

Eodem modo destillabit Alcoolatum de Citreis.

2. ALCOOLATUM DE COCHLEARIA.

(*Cochlearia officinalis.*)

R .	Foliorum Cochleariae officinalis recentium....	720
	Alcoholis purissimi (22—52 B ⁴).....	480
	Destillent balneo maris donec in excipulum tran- sierint.....	400

5. ALCOOLATUM DE ROSMARINO.

R .	Summitatum floridarum Rosmarini recentium.	120
	Alcoholis (22—52 B ⁴).....	360
	Aquæ de Rosmarino stillatitiae.....	120
	Macerentur per quatriduum; destillent balneo maris donec habeantur Alcoholis aromatici (12—22)....	500

Simili modo destillabunt Alcoolata de

Menthis crispâ, piperitâ, etc.;

Melissâ (Melissa officinalis);

Lavandulâ (Lavandula spica), etc.

ALCOOLATA COMPOSITA.

Hic quædam composita servavimus, uti usu invaluere et qualia vulgò requiruntur, etiamsi superfluâ aromaticorum varietate pleraque turgeant, exclusis iis quæ sunt dubiæ nimium virtutis. Verùmtamen ut simplicitati justè faveremus, in singulis annotavimus et summam medicamentorum ex quibus vis medicamenti præcipuè pendet, et hujus summæ rationem ad Alcoolis elicti copiam; necnon et ea simplicia, quæ compositi veluti capita haberi possunt, obliquis litteris indicavimus. Ea igitur, aut alia ex eodem numero, si elegantur, itâ ipsorum pondera augeri debent, ut omnium summæ et numeris et virtute satis respondant.

1. ALCOOLATUM VULGÒ DICTUM VULNERARIUM.

(*Eau Vulnéraire spiritueuse.*)

R. Foliorum et summittatum siccatorum.

<i>Salvia officinalis</i>	128
<i>Angelicæ Archangelicæ</i>	128
<i>Tanaceti vulgaris</i>	128
<i>Artemisiæ Absynthii</i>	128
<i>Anethi Feniculi</i>	128
<i>Menthæ vulgaris</i>	128
<i>Hyssopi officinalis</i>	128
<i>Thymi vulgaris</i>	128

Anthemidis nobilis.....	7	128
Origani vulgaris.....	128	128
Origani Majoranae.....	128	128
Melissæ Calaminthæ.....	128	128
<i>Lavandulae Spicae</i>	128	128
Alcoolis (12 — 22 B ⁴).....	24,000	
Destillent, ut artis est, balneo maris donec exceperis liquoris.....	20,000	
<i>Nota.</i> Summa aromaticorum.....	1,664	
Cujus ratio ad Alcoolem destillatione elicuum erit circiter.....		12

2. ALCOOLATUM QUOD VULGÒ DICUNT *CARMINATIVUM*
SYLVII.

R . Radicum <i>Angelicæ Archangelicæ</i>	4
Imperatoriae Ostruthii	6
Marantæ Galangæ	6
Foliorum Rosmarini.....	48
Origani Majoranae.....	48
<i>Rutæ graveolentis</i>	48
Ocymi Basilici.....	48
Baccarum Lauri nobilis.....	12
Seminum Angelicæ Archangelicæ.....	16
Ligustici Levistici.....	16
<i>Pimpinellæ Anisi</i>	16
Zingiberis (<i>Zingiber officinale</i>).....	6
Nucis Moschatae (<i>Myristica aromaticæ</i>).....	6
<i>Cinnamomi</i> (<i>Laurus Cinnamomum</i>).....	12
Caryophyllorum aromaticorum.....	4
<i>Corticis Citrei</i> (<i>Citrus medica</i>).....	4
Contusis omnibus affunde Alcoolis (22—32 B ⁴). 1,500	
Macerentur per biduum. Dein balneo maris des- tillent donec habeantur liquoris Alcoolici.....	1,000

<i>Nota.</i> Summa aromaticorum.....	506
Ratio summæ ad Alcoolem elicitem superat..	$\frac{1}{3}$

5. ALCOOLATUM DE COCHLEARIIS seu ALCOOLATUM
ANTISCORBUTICUM.

R. Foliorum Cochleariæ officinalis recentium...	2,500
Radicum Cochleariæ armoraciæ recentium, minuti-	
tissimè concisarum.....	320
Alcoolis (22 — 52).....	5,000
Destillent balneo maris, donec habeantur liquoris	
alcoolici.....	2,500
Summa utriusque Cochleariæ.....	2,820
Summæ autem ratio ad Alcoolem elicitem erit	
ferè ut 9 ad 8.	

4. ALCOOLATUM DE TEREBINTHINA COMPOSITUM
DICTUM VULGÒ BALSAMUM FIORAVANTI.

R. Terebinthinæ puræ.....	516
Resinæ Elemi.....	96
Tacamahacæ.....	96
Succini.....	96
Balsami Styracis liquidi.....	64
Gummi resine Galbani.....	96
Myrræ.....	96
Aloës.....	52
Baccarum Lauri (<i>Laurus nobilis</i>) recentium.....	128
Radicum Galangæ (<i>Maranta Galanga</i>).....	48
Zedoariæ (<i>Kämpferia rotunda</i>).....	48
Zingiberis (<i>Zingiber officinale</i>).....	48
Cinnamomi (<i>Laurus Cinnamomum</i>)	48
Caryophyllorum aromaticorum.....	48
Nucis Moschatae (<i>Myristica aromatica</i>)	48

Foliorum Origani Dictamni.....	52
Contusis contundendis affunde.	
Alcoolis (22 — 52 B ¹).....	5,000
Macerentur per sex dies , ac demùm destillent balneo maris , donec habeantur liquoris stillatitii... 2,500	
Ratio Terebinthinae et sueorum aromaticorum ad caetera aromata erit circiter ut..... 2 ad 1	
Ratio omnium ad Alcoolem elicitem paulò ultra 5 ad 5	

5. ALCOOLATUM DE CROCO COMPOSITUM EX QUO
PARATUR ELIXIRIUM DICTUM DE GARUS.

R ² Aloës Soccotrinæ.....	320
Myrrhæ.....	64
Croci (Crocus sativus).....	52
Cinnamomi (Laurus Cinnamomum).....	16
Caryophyllorum aromaticorum.....	16
Nucis Moschatæ (Myristica aromaticæ).....	16
Alcoolis (12 — 22 B ²).....	8,000
Aqua Naphe.....	500
Digerantur per biduum ; destillent deinde balneo maris donec in excipula transierint	
Liquoris stillatitii.....	4,000
In quo liquore si ratio habeatur Aloës et Myrrhæ, aromaticorum summa ad Alcoolem elicitem erit ferè 1/4. Cæteroquin esset circiter 1/7.	
Cui liquori si adjiciantur et commisceantur	
Syrupi de Adianto.....	5,000
Habebitur quod vocant Elixirium Garus ; cui color aureus conciliabitur , vel admiscendo saccharum , ita percoctum ut rufescat ; solutum in aqua Naphe... 250	
Sunt qui Crocum ipsum destillationi non committunt , sed in destillato ipso liquore macerari curant eā quantitate	

quæ destillationi priùs addita fuerat. Verùm indè, præter odorem croci, sapor quoque liquori additur, unde vis ipsi quidem accedit intensior, sedà multis certè molestè ferenda.

6. ALCOOLATUM AROMATICUM AMMONIACALE VULGÒ
DICTUM SPIRITUS VOLATILIS AROMATICO-OLEOSUS

R. Segminum summi corticis recentis	
Aurantiorum	24
Citreorum.....	24
Vanillæ.....	8
Caryophyllorum aromaticorum.....	2
Cinnamomi.....	4
Muriatis ammoniacalis.....	128
Contusis omnibus et in retortam vitream inditis af-	
funde	
Aqua de Cinnamomo stillatitiae simplicis.....	128
Alcoolis (22 — 52 B').....	128
Digerantur per triduum ac deindè addantur Carbo-	
natis Potassæ.....	128
Destillent calore modico donec habeantur liquoris	
Alcoolici Ammoniacalis aromatici	128
Liquor ille, ubi stillavit, limpidus est et colore caret, sed	
luce accidente flavescit rufescitque. Quod si vitare, purum-	
que liquorem diutiùs ferè ut stillavit servare volueris, exci-	
piendus est lagunculis vitreis, extùs glutinatâ chartâ nigri-	
cante ità obductis, ut luci prorsùs sint imperviæ.	
Ratio Summæ aromaticorum ad liquorem elicitem	
erit ut.....	1 ad 1,85
Ratio autem Carbonatis Ammoniae è muriate expe-	
diti invenietur circiter.....	1/2

**7. ALCOOLATUM LAVANDULÆ AMMONIACALE DICTUM
GUTTÆ ANGLICÆ CEPHALICÆ.**

R. Subcarbonatis Ammoniæ oleosi animalis li-	
quidi, (seu spiritus volatilis ex bombycino filo eliciti)	128
Olei volatilis de Lavandulâ Spicâ.....	4
Alcoolis (22—32).....	16
Omnia in retortam vitream immittantur; destillent	

leni calore;

Atque ubi primum sphærulæ oleosæ innatabunt liquori
elicito, casset destillatio. Liquor ipse in lagunculis vitreis
rite obturatis asservandus est.

ALCOOLES AROMATICI VULGÒ USATISSIMI.

**8. ALCOOLATUM DE MELISSA COMPOSITUM QUOD
VULGÒ DIXERÙ *CARMELITARUM AQUAM.***

Hanc compositionis plurimū celebratæ genuinam for-
mulam nobis notam fortuitò, publici juris faciendam cen-
suimus, non ob ipsius famam tantùm, verùm etiam ob me-
thodum quā parari solet non despiciendam, nec inutilem
forsan ad servandam aromatum subtilitatem et gratiam.

R. Cinnamomum in pulverem crassius tritum;	
Caryophyllos aromaticos integros;	
Nuces moschatas contusas;	
Semina Anisi contusa;	
Semina Coriandri contusa;	
Cortices Citreorum siccatos et in frustula concisos;	
Singula <i>seorsim</i> macerentur per biduum triduumve, pro temperie aëris,	
In Alcoolis (12° — 22 B°)	1,000

Pro singulorum 96

Destillent deinde balneo maris , et liquor stillatius cuiusque *singulatim* excipiatur et servetur in lagunculis perfectè obturatis. Hæc autem sit in omnibus destillandi norma, ut à destillatione tunc omnino cessandum sit , cum guttatum , nec jam continuo rivulo defluit in excipula liqior.

Aliundè , simili modo et lege , et pari Alcoolis ratione per biduum infundantur , destillentque singula seorsim ,

Angelicæ herba tota , caule jam elato , foliis evolutis , nec ipsa exclusa radice si libuerit ,

Folia floresque , caulibus exclusis { Rosmarini ,
Organī Majoranæ ,
Hyssopi officinalis ,
Thymi vulgaris ,
Salviae officinalis .

Omnia autem proprio tempore , quo scilicet maximè fragrant , colligenda sunt et destillationi committenda.

Nec non iisdem et modo et ponderum ratione mace- rentur et destillent . Folia mundata è medio caule ad sum- mum usque decerpta , MELISSÆ , collectæ mense Maio præ- sertim et nondum floridæ , aut etiam repullulantis mense Septembri .

Omnium singulatim lagunculæ propriis notis distinctæ asserventur in usum mox exponendum.

His ita confectis , tribus in amphoris aut doliolis misceantur ;

In primâ , Alcoolata de Aromatibus siccis ;

De Cinnamomo partes 3 ,5

Caryophyllis 3 ,0

Nuce Moschatæ 3 ,0

Seminibus Anisi 2 ,0

Coriandri 3 ,5

Corticibus Citrei 0 ,25

In secundâ, Alcoolata de herbis odoratis,

De Angelicâ partes.....	10 ,0
Rosmarino.....	6 ,0
Majoranâ.....	7 ,0
Hyssopo.....	8 ,0
Thymo.....	7 ,0
Salviâ.....	15 ,5

In tertiat, Alcoolatum de Melissâ solum continetur.

Quibus itâ dispositis, desumantur,	
Ex amphorâ p̄iori, aromatum scilicet, partes.	5 ,0
Ex amphorâ herbarum.....	5 ,0
Ex amphorâ aut doliolo Melissæ.....	5 ,5

Commisceantur omnia, et in cœnubita destillatoriâ, additis aquæ fontanæ decimâ totius parte, et sacchari octogesimâ in pulverem redacti (quod dubiæ admodum utilitatis est), balneo maris destillent, donec quinta pars tantum superpetit; quod autem stillaverit in excipula erit *Aqua Melissæ* perfectior.

Nota. Notandum autem itâ quidem hâc in formulâ insti-
tutam esse permiscendorum rationem ut nulla præmineant;
at si quorundam odor in amphorâ mixturi, videlicet
Cinnamomi, aut Caryophyllorum, ut fit aliquoties, sese efferat
nimis, aliis additis, gustu indice, temperandum esse; et si-
milter si Melissa, ob aliquam in colligendâ incuriam, nimium
effeta videatur, addito guttatim alcoolato Citrei, Alcoolat-
um Melissæ in debitâ fragrantiam esse reducendum.

Parantur quoque Alcoolata, solutis in Alcoole oleis;
exemplo sit :

9. ALCOOLATUM DE CITREIS COMPOSITUM, DICTUM :
AQUA COLONIENSIS.

R • Oleorum volatilium	
De Corticibus varietatum	{
Citrei quas dixere.....	Bergamotte..... 100 Citron..... 100 Cedra..... 100

De Rosmarino	50
Floribus Aurantii...	50
Lavandulæ..	50
Cinnamomo	25
Summa Oleorum...	475

Solvantur in

Aleoolis (26—56 B ⁴).....	12,000
Alcoolati de Melissâ compositi.....	1,500
Alcoolati de Rosmarino.....	1,000
Summa Alcoolis.....	14,500

Misceantur intimè; digerantur per dies decem; destillent
balneo maris, ut quinta pars supersit; quod stillaverit in
excipula erit *Aqua Coloniensis*.

Cui, si libuerit, addes, suavitatis causâ, Alcoolati apud
aromatarios dicti *Eau de Bouquet*. (V. *El. de Pharm.* de
Baumé, p. 379)..... 500

IV. OLEA ET SALIA VOLATILIA PYROGENÆA.

DESTILLATIO SUCCINI, DESTILLATIO CORNU CERVI.

DESTILLATIO SUCCINI.

ACIDUM SUCCINI ET OLEUM SUCCINI STILLATITIUM.

R. Succini flavi contusi..... quantum opus est.
Excipiatur retortâ fictili siliceâ loricatâ, cuius rostrum,
vase intermedio (*allonge*) productum, desinat in excipulum
amplissimum tubulo instructum.

Destilla igne primū leni, deinde sensim aucto, donec nihil amplius destillet.

Interea refrigerescat identidem excipulum impositis linteis frigidā madentibus. Absolutā distillatione, Oleum ope infundibuli seernatur; acidusque liquor sponte vaporet sub aere frigido. Acidi succinici pars in crystallos cōnerescet; pars alia, quae parietibus vasis intermedii adhaesit ab ipsis detrahitur, et vulgo, ut purior, seponitur et seorsim asservatur; liquor superstes acido-oleosus idem est quem olim Pharmacopei *spritum Succini* vocitabant.

Oleum primā distillatione profundē fuseum, retortā vitreā exceptum, modico igne distillabit purum primō et albicans; deinde colore magis magisque fusco; quod dum stillat, pro coloris differentiā et olei sinceritate, divide in partes seorsim asservandas.

DESTILLATIO CORNU CERVI.

R• Cornu Cervini in frustula dissecti. *quantū opus est.*

Conjice in retortam cuius quarta pars tantum vacua manebit. Sit autem retorta fictilis silicea, luto loricata, quam fornice tectam in foco suprā craticulam collocabis. Rostrum addito vase intermedio (Gallicè *allonge*) producatur, et desinat in sphæricum excipulum.

Destillet ignis ē vi quae aquae bullientis gradum paulò superet; prodibit primō liquor nonnihil odorus, colore ferè carens, quem, ubi cessaverit, sepones rejiciendum. Tunc restituto excipulo adjungatur apparatus qui *Woulfii* dicitur, tubo intermedio ad securitatem operis inserto, atque ita, juncturis probè consertis, increscat sensim ignis, donec rubescere incipiatur retortae pars infima. Tunc, distillatione perfecta, frigefactis vasis, solutis juncturis, quidquid in lagunulas transierit, pro variā naturā, seorsim distinguens.

Quod sic destillavit triplicis est generis.

1^o. Liquor habebitur flavescentes, odore gravis et ingratius. Hic est Subcarbonas Ammoniae oleosus liquidus, vulgo dictus: *Spiritus cornu Cervi volatilis.*

2^o. Liquori dicto supernatet Oleum pyrogenaeum quod dictum est vulgari nomine: *Oleum volatile cornu Cervi.*

3^o. Vasis, tum intermedio, tum sphærico quoque excipulo intus adhaeret sal concretum ex albo flavescentes, quod est Subcarbonas Ammoniae oleosus concretus, et vulgo dictum fuit: *Sal volatile cornu Cervi.*

In retortâ autem supersunt ipsius cornu Cervi frusta, formâ integrâ, colore carbonis nigerrimo.

Triplex quae in excipula transiit materies, pro singulorum naturâ, variâ methodo purgari indiget, et purior evadet artificio mox explanando.

PURGATIO SPIRITUS VOLATILIS CORNU CERVI.

(*Subcarbonas Ammoniae liquidus oleosus.*)

R. Spiritus volatilis cornu Cervi... *quantum opus est.*

Destillet balneo arenæ in retortâ vitreâ, aptato excipulo sphærico, ore dupli, altero tubulato, juncturis probè consertis; igne modico destillabit liquoris totius dodrans: tunc solutis juncturis, quod destillavit excipietur lagunculâ vitreâ in loco reponenda luci parum pervio.

Iste liquor, primis diebus, colore caret, verum citreo deinde colore inficitur in dies saturationi; et tunc novâ distillatione purior habebitur.

PURGATIO OLEI VOLATILIS CORNU CERVI AD PARANDUM OLEUM ANIMALE DIPPELII.

(*Oleum Cornu cervi pyrogenaeum.*)

R. Olei volatilis cornu Cervi..... *quantum opus est.*

Tubo mediante injiciatur in retortam vitream, ita cautè, ut præpediatur Olei ad retortæ collum allapsus, ne quidquam intùs huic adhæreat; retorta deindè arenæ imponatur; ipsiusque rostro aptetur sphæricum excipulum. Tunc, consertis probè juncturis, destillet Oleum eo calore qui gradum aquæ bullientis non superet.

Prodibit Oleum tenuissimum coloris expers ferè, quartam partem æquans hujus quod exceptit retorta.

Si quādam incuriā Oleum destillasset coloratius, novā retortā exceptum idem iteratā destillatione obtineretur purius.

Sic paratum Oleum, minimas in lagunculas divisum, quām citissimè in obscuro loco seponi et asservari debet.

Non aliud erat quod olim arte operosiori parabatur Oleum dictum *Dippelii* animale. Quod scilicet cum pulvere ossium ad albedinem exustorū in globos esformabatur; et sic destillatum, aquæ dein commixtum, iterūm iterūmque destillabat, donec limpidissimum evaderet.

Quālibet cum curā servetur, et quocumque modo paratum fuerit hoc Oleum, nunquam non temporis lapsu colore inficitur flavo primū, dein fusco, demūmque nigro. Quod cītrei tantum coloris est bona adhucdūm note haberi potest; saturius et nigrum si fuerit, indiget iterūm destillando fieri purius, ut in medicos usus recipi queat.

Nota. Si Oleum hoc aquæ destillatæ commixtum concutiatu aliquandiū, ac deindè aqua ab Oleo supernatante limpida separetur, ea tenebit solutum intimè Olei aliquantulum, quod Ammoniā mediante ipsi inhærebit: ratioque hujus saponuli ammoniacalis ad aquam talis erit, ut guttae duodecim (scilicet *grana sex* aut *decigrammata tria*) in 32 grammatibus, sive unciā unā aquæ solutæ habeantur.

PURGATIO SALIS VOLATILIS CONCRETI.

(Subcarbonas Ammoniae oleosus concretus.)

R. Salis volatilis concreti de cornu Cervi.....
..... quantum opus est.

Sublimetur ope cucurbitæ vitreæ humilioris, cui capitulum aptetur capacius; aut si malueris, retorta ad hoc opus habetur latioris colli, quæ in vas adjectum longius (*allonge*) pateat, desinatque in aliud quodcumque excipulum.

Suprà arenæ balneum opus perfici debet, ignis admodum modicâ vi.

Quo peracto, citissimè sal detrahendum est à parietibus quibus adhæsit, et lagunculis illicò includendus probè obtutatis in obscurō loco reponendis.

Hoc sal scilicet temporis lapsu flavescit; at ubi saturior color evaserit, novatâ sublimatione, purius habendum est.

Omnes ferè ex animalibus desumptæ materiæ, eodem artificio quo Cervinum cornu destillatae, similiter in volatilem spiritum, Oleum et Sal solvuntur; quæ singulatim, iteratis destillatione et sublimatione, æquè purganda sunt, antequam ea in medicos usus vocare liceat.

OS DICTUM CERVI CORNU, PRÆPARATUM.

R. Cornu Cervi in frusta divisi..... quantum opus est.

Disponatur suprà cratem ferream furni foco impositam, suppositoque igne comburantur frusta donec et facilè friabilia sint, et penitus albescant; frigefacta conterantur in mortario ferreo, pulvisque per densius incerniculum transmittatur; idemque, suprà porphyritem cum aquæ quantum sufficit levigatus, in trochiscos informetur.

Ossa ex animalibus qualibet similiter præparari possunt. Potest etiam eadem arte et exuri, et levigari, et informari

quod in retortâ superest post destillationes tūm ipsius cornū Cervi, tūm quorumvis ossium.

In crucibulo quoque exuri possunt hæc ossa tūm Cervi, tūm aliorum. Sic et albicant melius et sunt friabilia magis, et nullas prorsus (quod, ubi intrà carbones uruntur, contingit aliquotiæ) particulas vitræ duritie mixtas confinebunt.

SECTIO QUINTA.

*Solutiones Medicamentorum variis liquidis
paratæ.*

AQUA, VINO, CEREVISIA, ACETO, OLEIS, ALCOOLE, ÆTHERE, VARIIS
LIQUIDIS CUM SACCHARO AUT MELLE.

I°. SOLUTIONES AQUA PARATÆ: *POTUS, MIXTURÆ, JURA.*

CUM solutiones omnes, quæ parantur aquâ mediante, ex tempore fieri debeant, et variè præscribi atque concinnari, pro medici judicio et rerum necessitate; quedam hic tantum in medium attulimus exempla ex maximè vulgaribus desumpta, non quæ medicis proponeremus, sed ex quibus notæ fierent præcipua à Pharmacopeis in confiendo hoc medicamentorum genere observandæ cautelæ. Prætereà, in his omnibus, ne quis, præcipuè in purgantium usu, subiret error, utile censuimus mensuras in venalibus usitatas numeris generalibus apponere; quod in officinalibus plerisque, quæ, prout raro frequenter singula requiruntur, variâ quantitate parantur et asservantur, supervacaneum omnino fore duximus.

L POTUS , seu SOLUTIONES MACERANDO , INFUNDENDO AUT DECOQUENDO PARANDÆ;

PTISANÆ, APOZEMATA, HAUSTUS.

PTISANÆ SEU POTUS MEDICATI LEVIORES ET SIMPLICIORES PRO POTU COMMUNI.

Ptisanarum nomine insigniuntur potus, qui parcâ admodum medicamentorum solutorum quantitate valent; et sic fortiori medicinæ, aut præpoti expeditiorem viam facere apti sunt, aut intermixti, solvendi vi quâ pollut, fiunt actionis adjumentum. Leves illi et quâm minimum injucundi parari debent, ut cùm sæpius uti debeant ægri, ab iis minus abhorreant; saccharo etiam aut melle aut syrupis, prout vel requirit res, vel expetit æger, gratiores effici solent. Fiunt autem plerumque aut infundendo, aut decoquendo *Ptisanæ*. Sæpè ad excipienda valentiora medicamenta inserviunt. Puriores ut fiant, percolari possunt; quæ cura non inutilis quidem, at certè minimè ut plurimùm necessaria habenda est.

Exemplo sint sequentia:

1. PTISANA DE RÁDICE GRAMINIS.

(*Cynodon Dactylon.*)

R adicis Graminis electæ et mundatæ, unciām unam, seu.....	52
Bulliat primū paulisper in aqua quâm sufficienți, quæ abjiciatur ut inutilis et acrior; quo facto, contusa radix denuò bulliat in aqua communis libris duabus et unciis octo, seu.....	1,250

Ut supersint circiter libræ duæ, seu.....	1,000
Sub finem adde Glycyrrhizæ rasæ et contusæ drachmas duas, seu.....	8
Quo facto, vas ab igne remove, decoctum refrigeratum cola, et erit Ptisana.	

2. DECOCTUM HORDEI.

(Hordeum distichum.)

R. Hordei cortice mundati, leviter linteo aspe- riore conficti et aquâ primùm eloti unciam semis, seu.....	16
Coque in aquâ communis libris duabus et unciis octo, seu	1,250
Donec hordeum intumescat penitusque molles- cat, ut supersint circiter, libræ duæ seu.....	1,000
Dein cola et adde syrapi Althææ vel Adianti un- ciam unam, seu.....	52
Et erit Ptisana.	

N. B. Hordeum sèpè ad gargarismata decoquitur inte-
grum, non abjecto cortice, et tunc sapore subacri et ali-
quantulum astringenti pollet, quo carere debet Ptisana.

Simili modo paratur :

Ptisana de Orizâ.

5. PTISANA DE FLORIBUS BECHICIS.

R. Specierum ex floribus Bechicis (V. Species) dracmas duas, seu.....	8
Super affunde aquâ communis bullientis libras duas, seu.....	1,000
Infundantur per quadrantem horæ; dein cola, et colaturaæ adde	
Syripi de Althæâ aut Adianto unciam unam, seu	52
Et erit Ptisana.	

Simili modo parantur Ptisanæ de floribus :

Sambuci (*Sambucus nigra*);
 Tiliae (*Tilia Europaea*);
 Chamæmeli (*Anthemis nobilis*),
 etc.

4. PTISANA DE FRUCTIBUS.

R• Fructum dictorum vulgò *Pectoralium* (V. Species) uncias duas, seu 64
 Coque per quadrantem horæ in aquæ communis sufficienti quantitate ut supersint libræ duæ, seu ... 1,000
 Dein cola et adde, si lubet, syrapi de Althæa unciam semis, seu 16
 Et erit Ptisana.

5. PTISANA DE FOLIIS CICHORII.

(*Cichorium intybus*.)

R• Foliorum mundatorum Cichorii virentis unciam unam, seu 52
 Infundantur in aquæ bullientis libris duabus, seu 1,000
 Dein cola et adde, si lubet, syrapi de Adianto aut Mellis purissimi unciam unam, seu 52
 Et erit Ptisana.

Simili modo parantur Ptisanæ cum foliis

Borraginis (*Borago officinalis*);
 Buglossi (*Anchusa officinalis*);
 Chamædryos (*Teucrium Chamædrys*);
 Radicibus Inulæ (*Inula Helenium*), etc.

6. DECOCTUM TAMARINDORUM.

(*Tamarindus indica.*)

R. Tamarindorum in particulas concisorum	
unciam unam aut duas , seu.....	52—64
Bulliant per semiquadrantem horæ in vase fici tili vel argenteo in aquæ libris duabus , seu....	1,000
Dein cola sine expressione ;	
Adde syrapi de Adianto unciam unam , seu... M	52

7. DECOCTUM CASSIÆ.

(*Cassia fistula.*)

R. Pulpæ interioris de leguminibus Cassiæ uncias	
duas , seu.....	64
Bulliant per aliquot horæ minuta in aquæ libris	
duabus , seu.....	1,000
Cola sine expressione et adde	
Syrupi violarum unciam unam , seu	52
Vel, si præstare videbitur,	
Mannæ purissimæ uncias duas , seu	64

8. HYDROMEL SIMPLEX.

R. Mellis albi purissimi uncias duas , seu.....	64
Solve in aquæ communis tepidæ libris duabus , seu	1,000
Et erit Hydromel.	

*APOZEMATA SEU POTUS MEDICATI SATURATIORES
AUT MAGIS COMPOSITI, HORIS MEDICIS PROPI-
NANDI.*

In hoc *Apozemata à Ptisanis* discrepant quod et pro majori medicamentorum quantitate saturationiora evadant , et ægris nunquam pro potu communi exhiberi debeant.

Quantà copià ehibenda sint et quibus horis , accuratè à Medico præscribi convenit , neque minùs sollicitè , pro re natà , singulorum ex quibus confici debent mensura et modus determinanda sunt.

* Exemplo tantùm sint sequentia;

1. DECOCTUM DE PĀNIS MEDULLA SEU DECOCTUM ALBUM (a).

R • Cornu Cervi ad albedinem usti et maximè friabilis , suprà porphyritem levigati drachmas duas , seu	8
Medullæ panis triticei drachmas tres , seu.....	24
Sacchari albi purissimi unciam unam , seu.....	52
Misce simul diù contundendo in mortario marmoreo , dein coque per semiquadrantem horæ in aquæ communis libris duabus , seu.	1,000
Cola decoctum adhuc servidum per cilicinum rarius (<i>étamine peu serrée</i>), cum levi expressione et adde aquæ Naphe unciam semis , seu.....	16
Vel si lubet aquæ Cinnamomi , drachmas duas , seu	8
Potus iste ità sæpè propinandus est , ut inter potandum turbidiùs albescat.	

2. DECOCTUM AMARUM.

R • Radicis Gentianæ (<i>Gentiana lutea</i>) in taleolas sectæ drachmam unam , seu.....	4
--	---

(a) Ponderibus tantùm aliquatenus mutatis , hoc decoctum quale à *Sydenham* præscribi solebat , codicibus vulgo inseritur. At pars interior , molliorque panis , seu medulla , quam *Micam* dicere solent , quantum varia sit , pro variâ ratione et curâ quâ panis ipse conficitur , nemo nescit. Undè apud multos usitatum est ut *Gummi Arabicum* in ipsius locum sufficiatur.

Aqua communis libras duas et semis , seu.....	1,250
Bulliant simul per semiquadrantem horæ ; tūm adde	
Specierum amararum drachmas duas , seu.....	8
Infundantur per duas horas , dein cola sine expressione.	

5. APOZEMA DICTUM DE QUINQUE RADICIBUS.

R . Radicum recentium et minutum incisarum	
Rusci (<i>Ruscus aculeatus</i>) semi unciam , seu....	16
Asparagi (<i>Asparagus officinalis</i>) semi unciam , seu	16
Eryngii (<i>Eryngium campestre</i>) semi unciam , seu	16
Bulliant per quadrantem horæ in aquæ communis libris duabus , seu	1,000
Sub finem adde	
Radicis Petroselini (<i>Apium Petroselinum</i>) drach- mas duas , seu	8
Radicis Feniculi (<i>Anethum Feniculum</i>) drachmas duas , seu	8
Removeantur ab igne et infundantur per aliquot horæ minuta.	
Tunc cola et adde	
Syrupi de quinque Radicibus unciam unam , seu	52
Nitratis Potassæ grana viginti , vel.....	1

4. APOZEMA DE COCHLEARIA ARMORACIA COMPOSITUM.

R . Radicum Bardanæ (<i>Arctium lappa</i>) unciam unam , seu	52
Lapathi seu Patientiae (<i>Rumex Patientia</i>) unciam unam , seu	52
In vase faventino bulliant per quadrantem horæ in aquæ communis libris quatuor , seu	2,000
Decocto ab igne remoto adde	

Radicis Cochleariae armoraciæ minutum concisæ unciam unam , seu.....	52
Foliorum Cochleariae rotundifoliæ unciam unam , seu	52
Sisymbrii Nasturtii unciam unam , seu.....	52
Menyanthis trifoliatæ unciam unam , seu.....	52
Vas accuratè obturetur et seponatur , donec liquor prorsùs refrigeruerit.	
Tunc cola.	

5. DECOCTUM KINÆ KINÆ SIMPLEX.

(*Cinchona Condaminea.*)

R . Corticis Kinæ Kinæ officinalis electi et contusi unciam unam , seu	52
Bulliant per aliquot horæ minuta , vase cooperto , in aquæ communis libris duabus , seu.....	1,000
Sub finem adde	
Muriatis Ammoniæ grana viginti , seu.....	1
Vel Carbonatis Potassæ drachmam semis , seu...	2
Dein cola cum expressione.	
Adde , si libuerit ,	
Syrupi de Kinâ Kinâ unciam semis , seu.....	16
<i>N. B.</i> Addito Carbonate Potassæ decoctum limpidius efficitur : scilicet hujus ope penitus solvitur resina Kinæ Kinæ , quâ tantummodo suspensâ decoctum turbidum maneret.	

6. DECOCTUM KINÆ KINÆ COMPOSITUM ET LAXANS.

R . Corticis Kinæ Kinæ electi et contusi unciam unam , seu	52
Bulliant per quadrantem horæ in aquæ communis libris duabus , seu	1,000

Remotis ab igne infundantur per semihoram Leguminum seu follicolorum Sennæ drachmæ duæ, seu.....	8
Sulfatis Sodaë drachmæ duæ, seu.....	8
Muriatis Ammoniæ grana viginti, seu.....	1
Cola cum expressione et colaturæ adde Syrupi de Sennâ, vulgò <i>de Pomis</i> compositi, unciam unam, seu.....	52

7. DECOCTUM DE GUAYACO COMPOSITUM.

R. Ligni Guayaci in scobem redacti (<i>Guaiacum officinale</i>) unciam unam et semis, seu.....	48
Radicis Sarsæparillæ (<i>Smilax Sarsaparilla</i>) minutum sectæ unciam unam et semis, seu	48
Infundantur in vase clauso per duodecim horas in aque communis tepidæ libris quatuor, seu.....	2,000
Dein bulliant donec supersint libræ tres, seu... 1,500	
Sub finem adde	
Rasuræ ligni Sassafras (<i>Laurus Sassafras</i>) drachmas duas, seu	8
Glycyrrhizæ rasæ (<i>Liquiritia officinalis</i>) unciam semis, seu.....	16
Infunde per semihoram et cola.	

8. DECOCTUM DE GUAYACO COMPOSITUM ET PURGANS.

R. Rasuræ ligni Guayaci (<i>Guaiacum officin.</i>) unciam unam, seu.....	52
Radicis Sarsæparillæ (<i>Smilax Sarsaparilla</i>) unciam unam, seu.....	52
Carbonatis Potassæ, grana viginti quinque, vel	1 ,25
Macerentur per duodecim horas identiden agitando in aquæ communis libris quatuor, seu 2,000	

Dein bulliant omnia donec supersint libræ tres , seu.....	1,500
Sub finem infunde per semiboram	
Foliorum Sennæ mundatorum (<i>Cassia senna</i>)	
drachmas duas , seu.....	8
Rhei contusi (<i>Rheum palmatum</i>) drachmam	
unam , seu.....	4
Rasuræ ligni Sassafras (<i>Laurus Sassafras</i>)	
drachmas duas , seu.....	8
Glycyrrhizæ rasæ (<i>Liquiritia officinalis</i>)	
drachmas duas , seu.....	8
Seminum Coriandri (<i>Coriandrum sativum</i>)	
drachmam unam , seu.....	4
Cola cum levi expressione et colaturæ refrigeratâ , face depositâ , decapuletur liquor.	

9. APOZEMA LAXANS.

R . Foliorum virentium	
Borraginis (<i>Borrage officinalis</i>) unciam	
unam , seu.....	52
Buglossi (<i>Anchusa officinalis</i>) unciam unam ,	
seu.....	52
Chicorii (<i>Chicorium intybus</i>) unciam unam ,	
seu.....	52
Infunde per quadrantem horæ in aquæ bul- lientis libris duabus , seu.....	1,000
Dein cola , et colaturæ adde	
Sulfatis Sodaë drachmas duas , seu.....	8
Syrupi Violarum unciam unam , seu.....	52
Et erit Apozema laxans.	

10. APOZEMA PURGANS.

R . Foliorum virentium	
Borraginis (<i>Borrage officinalis</i>) unciam	

unam, seu.....	52
Buglossi (<i>Anchusa officinalis</i>) unciam unam, seu.....	52
Chicorii (<i>Cichorium intybus</i>) unciam unam, seu.....	52
Foliorum Sennæ mundatorum (<i>Cassia Senna</i>) drachmas duas, seu.....	8
Sulfatis Sodaæ unciam semis, seu.....	16
Infundantur per semihoram in aquæ bul- lientis libris duabus, seu.....	1,000
Cola et adde	
Syrupi de Sennâ, vulgò de Pomis compositi, unciam unam, seu.....	52
Et erit Apozema purgans.	

11. POTUS PURGANS VULGÒ TISANE ROYALE.

R . Foliorum Sennæ mundatorum (<i>Cassia Senna</i>) unciam semis, seu.....	16
Sulfatis Sodaæ unciam semis, seu.....	16
Semimum Anisi (<i>Pimpinella Anisum</i>) drach- mam unam, seu	4
Semimum Coriandri (<i>Coriandrum sativum</i>) drachmam unam, seu.....	4
Foliorum concisorum Cærefolii (<i>Chærophyl- lum sativum</i>) unciam semis, seu.....	16
Poterii sanguisorbe unciam semis, seu....	16
Aquæ communis frigidæ libras duas, seu..	1,000
Citreum taleolatum sectum.....	nº 1
Macera per viginti horas identidem agitando, dein colo- cum levi expressione et per chartam bibulam trajice.	

*HAUSTUS, seu POTIONES, UNO HAUSTU UT
PLURIMUM SORBENDI.*

HAUSTUS PURGANTES.

Potus isti, pro ætate, sexu, temperamentis aut ægrotantium statu, variè præscribuntur.

Sæpiùs poculum implent unicum; aliquoties in duo triave dividuntur.

Cavendum ne spissior fiat epotandus liquor.

Parantur hi potus præcipue decoquendo, infundendo, macerando.

Quas hic proponimus formulas medicaminibus constant, quorum pondera augeri aut minuī queunt pro re natâ, officinales quippe non sunt.

1. *HAUSTUS PURGANS COMMUNIS DECOCTIONE
PARANDUS.*

R. Foliorum Sennæ mundatorum (<i>Cassia Senna</i>) drachmas duas, vel.....	8
Sulfatis Sodaë drachmas duas, vel.....	8
Rhei electi (<i>Rheum palmatum</i>) drachimam semis, vel.....	2
Mannæ unciam unam et semis, vel.....	48
Bulliant per aliquot horæ minuta et Senna et Rheum iraquaë sufficienti quantitate, ut subsistent unciae quinque, vel.....	160

Tunc ab igne remotis addantur Sulfas et Manna.

Solutis iisdem coletur liquor cum levî expressione.

Addi subinde potest aqua stillatitia de florib. Citri Aurantii, vel de Menthâ piperitâ, vel de Cinnamomo.

2. HAUSTUS PURGANS INFUNDENDO PARANDUS.

R. Eadem quæ suprà ;
 Affunde bullientis aquæ uncias quinque , vel... 160
 Infundantur per horas octo identidem agitando.
 Coletur liquor.

3. HAUSTUS PURGANS MACERATIONE PARANDUS.

R. Eadem quæ suprà ;
 Affunde frigidam in quā macerentur per duodecim ho-
 ras motando sæpius.
 Deinde coletur liquor.

4. HAUSTUS PURGANS ELIQUANDUS.

Cùm eliuatione vis purgans medicamentorum plero-
 rumque non mediocriter infringatur, pondus singulorum
 pro ratione augendum est.

Sit exemplo formula sequens :

R. Foliorum Sennæ (<i>Cassia Senna</i>), aut leguminum quæ dicuntur folliculi , drachmas tres , vel.....	12
Sulfatis Sodaë drachmas tres , vel.....	12
Rhabarbari (<i>Rheum palmatum</i>) drachmam unam , vel.....	4
Mannaë uncias duas et semis , vel.....	80
Omnia fiant ut dietum superius est, in potu decoctione parando; ità tamen ut major paulò aquæ quantitas adhibeatur , ebulliendo et eli- quando absumenda.	

Colato liquori admisceatur albumen ovi unius,
in aquæ quantitate sufficienti agitando su-
bactum ; bulliant simul commixta per horæ mi-
nutum unum et alterum : bullire incipientibus
adde

Succi Citrei drachmas duas , vel..... 8

Tum vas ab igne remove ; et per cilicinum densius (*éta-
mine serrée*) aut chartam bibulam trajice.

Addi etiamnùm possunt, ut præcedentibus, condiendi
gratiâ , aquæ stillatitiae odoratæ variae.

5. POTIO EMETICA ANTIMONIATA.

R Tartratis Potassæ Stibiat grana tria , vel. 0 ,15
Aquaæ stillatitiae simplicis uncias novem , vel. 288 ,00
Misce ut tripartitò sumatur, interposito circiter horæ
quadrante.

6. POTIO EMETICA CUM IPECACUANHA.

R Ipecacuanha (*Cephælis Emetica*) in pul-
verem tritæ grana viginti quatuor, vel..... 1 ,2
Syrupi de Adianto unciam unam , vel..... 52 ,0
Aquaæ communis uncias novem , vel..... 288 ,0
Solutio in aquâ syrupo , hæc potio tripartitò sumatur, horæ
quadrante circiter interposito , et singulâ vice Ipecacuanhæ
pars teria poculo admisceatur.

II. MIXTURÆ, SEU SOLUTIONES PARATÆ EX PLURIBUS MEDICAMENTIS DILUENDO AUT MISCENDO, NON ADHIBITIS MACERATIONE, INFUSIONE AUT DECOCTIONE.

*EMULSIONES, POTIONES, ET ECLEG-
MATÆ.*

*ELMULSIONES, SEU LIQUORES UT PLURIMUM E
CONTUSIS SEMINIBUS OLEO FETIS AQUA ME-
DIANTE EXPRESSI.*

Emulsionum vulgari nomine designantur qui ex contritis quibusdam seminibus, aquâ mediante, eliciuntur liquidi potus, lacti ut plurimùm concolores, mucosis et oleosis partibus commixtis atque unâ solutis suspensisque constantes; isti, utpotè facile, partibus dissociatis et muco acescente, corrumpuntur, ex tempore et ut præscribuntur parandi sunt.

Unico exemplo parandi modus innotescat.

1. EMULSIO SIVE LAC DICTUM AMYGDALINUM.

R. Amygdalas dulces decorticatas, n° 24, æquantes unciam unam, vel..... 52
Sacchari albi unciam unam, vel..... 52
Contunde diu in mortario marmoreo, identidem instilando pauxillum aquæ, ut partibus subtilissime attritis fiat massa mollier, quæ dein diluetur in

Aquaæ communis ad grādum 40 Reaumur tepentis librâ unâ , vel.....	500
Cola cum expressione et adde	
Aquaæ Naphe semunciam , vel.....	16

Simili modo parantur Emulsiones

De seminibus dictis *Frigidis* ;
 Nucleis Pini (*Pinus pinea*) ;
 Pistaciæ (*Pistacia trifolia*).

Observandum tamen est, in plerisque, in quibus mucus
 facilius aquâ solvitur, frigidam melius ut plurimum adhi-
 beri.

Ipsis quoque emulsionibus varia medicamina admisceri
 possunt, ut indè fiant potus variè medicati.

2. EMULSIO PURGANS CUM JALAPPÆ RESINA.

R. Jalappæ Resinæ grana duodecim, vel.....	0 ,6
Sacchari albi drachmas duas, vel.....	8 ,0
Tere diù in mortario marmoreo, pistillo ligneo;	
dein adde sensim ovi semi-vitellum.	
Terendo perge diù , intereaque paulatim addan- tur emulsionis simplicis uncia quinque, vel.....	160 ,0
Tandem admisce	
Aquaæ Naphe drachmas duas, vel.....	8 ,0
Purgantium pondera pro ægri ætate augenda aut mi- nuenda sunt.	

3. EMULSIO PURGANS CUM SCAMMONIO.

Fiat ut suprà, sufficiendo resinam Scammonii in resinæ
 Jalappæ locum.

N. B. Proderit sœpè has resinas in alcoole cum duplo sa-

pone amygdalino solutas, dein vaporando in extracti densitatem inspissatas, triplicato pondere, adhibuisse.

4. EMULSIO PURGANS CUM OLEO RICINI.

R. Olei de seminibus Ricini recentibus unciam unam, vel.....	32
Ovi Vitellum.....	semis.
Aquæ communis uncias duas, vel.....	64
Aquæ Naphe unciam semis, vel.....	16
Syrupi simplicis unciam semis, vel.....	16
Terantur simul vitellum et oleum; interea Syrupus admisceatur, demumque omnia diluantur intimè mixta, ut fiat potio.	

N. B. Potest in locum Syrupi simplicis suffici vel Syrupus de Althæa, vel Syrupus de Adianto, aut de floribus Aurantiorum: potest etiam, pro ægri variâ ætate, olei quantitas major aut minor admitti; aut potius, si libuerit, augeri vis purgans, admixto aliquo de Syrupis purgantibus.

POTIONES

PLERUMQUE COCHLEATIM SUMENDÆ, NON PURGANTES.

Potiones maximè, ut *Magistralia* omnia, pro ægrorum et morborum conditione variâ, variè præscribuntur: sunt tamen quæ frequenter apud Medicos usurpantur, quas hic adducimus, ut Pharmacopœis ad concinnandas similes exemplo esse possint.

Nihilominus hoc monendum præsertim censuimus, nec numerosiora in potionibus admittenda esse medicamenta,

et multum interesse in iis præparandis quænam sit natura miscendorum et quibus ratione atque ordine inter se misceantur.

1. POTIO EX AROMATICIS, *CARDIACA DICTA*, SEU AD
VIRES EXCITANDAS.

R .	Syrupi de floribus Dianthi Caryophylli	
	unciam unam, vel.....	52
	Alcoolati de Cinnamomo unciam semis, vel.	16
	Confectionis Croci drachmas duas, vel....	8
	Misceantur accuratè in mortario.	
	Dein adde	
	Aquæ Menthae piperitæ uncias tres, vel....	96
	Aquæ Naphe uncias tres, vel.....	96
	Misce.	

2. POTIO EFFERVESCENS, *ANTI-EMETICA DICTA
RIVERII.*

R .	Syrupi de Limonibus unciam unam, vel.	52
	Succi Citrei recentis unciam semis, vel....	16
	Aquæ communis uncias tres, vel.....	96
	Carbonatis Potassæ drachmam semis, vel...	2
	Misce in phialâ probè illicò obturandâ.	

N. B. Profuit sœpè tantummodò Carbonatē aut Potassæ aut Soda potionī primū adjecisse; hâc dein epotâ, subindè ingeritur illicò Citrei succus; quo facto, in ipso ventriculo effervescit Carbonas;

Tunc Potio hocce modo præscribi potest.

R	Aquæ communis uncias duas, vel.....	64
	Aquæ Menthae piperitæ unciam unam, vel.	52

Crystallorum Carbonatis Sodaæ drachmam
semis, vel.....²

Syrupi de cortice Citrei unciam semis, vel.¹⁶

Misce.

Quæ potio dimidiatim sorbetur, et singulà viē
superingeruntur

Succi Citrei drachmæ duæ, vel Cochleare
minus, aut.....⁸

N. B. Potest etiam, eodem cum successu, in quibusdam
casibus, Magnesiae Carbonas utiliter suffici in Carbonatis
Sodaæ aut Potassæ locum.

5. POTIO ÆTHEREA, *ANTISPASMODICA* DICTA.

R. Syrupi de floribus Nymphaeæ unciam
unam, vel.....⁵²

Aquæ stillatitiae de floribus Tiliae uncias
duas, vel.....⁶⁴

Aquæ Naphe uncias duas, vel.....⁶⁴

Ætheris Sulfurici drachmam unam, vel.⁴

Misce in phialâ probè obturandâ.

4. POTIO EX FETIDIS, *ANTI-HYSTERICA* DICTA.

R. Syrupi de Artemisiâ compositi unciam
unam, vel.....^{52 ,o}

Tincturæ vel Castorei vel Asæ-Fetidæ grana
viginti quatuor, vel.....^{1 ,2}

Pistillo agitantur diù ut probè commisceantur;

Dein admisce

Aquæ de Valerianâ stillatitiae uncias duas, vel.^{64 ,o}

Aquæ Naphe uncias duas, vel.....^{64 ,o}

Ætheris Sulfurici drachmam semis , vel.... 2 ,0
Misce in phialâ probè obturandâ.

5. POTIO CAMPHORATA , DICTA ANTI-SEPTICA.

R. Serpentariae Virginianæ (*Aristolochia Serpentaria*) drachmas duas, vel..... 8 ,0
Per quadrantem horæ infundantur in
Aquaæ bullientis unciis quatuor , vel..... 128 ,0
Tum seorsim misceantur sequentia ;
Syrupi de Kinâkinâ uncia una , vel..... 52 ,0
Tincturæ Kinækinæ Alcoolicæ drachmæ duæ,
vel 8 ,0
Camphoræ grana duodecim , vel..... 0 ,6
Subigantur diù in mortario vitro ;
Dein adde
Acetatis Ammoniæ liquidi unciam unam , vel. 52 ,0
Ac demùm cum infuso Serpentariae refrigerato commis-
eeantur.

6. POTIO SCILLITICA ACIDULA , DICTA DIURETICA.

R. Oxymellis Scillitici unciam semis , vel.. 16
Aquaæ stillatitiæ de Parietariâ officinali uncias
quatuor , vel..... 128
Aquaæ stillatitiæ de Mentha piperitâ unciam
unam , vel..... 52
Acidi Nitrici alcoolisati destillando parati
drachmam semis , vel..... 2
Misce in phialâ probè obturandâ.

7. POTIO EX GUMMI AMMONIACO ET SCILLA, DICTA
INCISIVA, SEU *AD MUCUM PULMONALEM LIBERIUS CIENDUM.*

R. Foliorum Hyssopi officinalis drachmam	
unam, vel.....	4 ,0
Infundantur in aquæ bullientis uncii quatuor, vel.....	128 ,0
Interea dum refrigerescet infusum, seorsim recipiantur	
Oxymellis Scillitiei uncia una, vel.....	52 ,0
Gummi Ammoniaci in pulverem redacti grana duodecim, vel.....	0 , 6
Haec misceantur diù in mortario vitro, ac deinde usquè terendo solvantur in infuso refrigerato.	

9. POTIO EX IPECACUANHA COMPOSITA, DICTA *AD PERTUSSIM.*

R. Ipecacuanhae (<i>Cephaelis emetica</i>) leviter	
contritæ drachmam unam, vel.....	4
Leguminum Sennæ (<i>Cassia Senna</i>) drachmas duas, vel.....	8
Infunde per duodecim horas in	
Aquæ bullientis uncii sex, vel.....	192
Cola et colato liquori adde	
Oxymellis Scillitici unciam unam, vel....	52
Syrupi de Hyssopo unciam unam, vel....	52
Et erit potio cochleatum sumenda.	

10. POTIO ANODYNA DICTA JULEP.

R • Syrupi de Papaverē seu Diaeodiōn drachmas duas , vel.....	8
Aquaē Naphe unciam semis , vel.....	16
Aquaē de Lactucā stillatitiæ uncias tres , vel.	96
Misce.	

ECLEGMATA

LOOK DICTA.

Eclegmata medicamenta dicuntur liquida , sed syrups ipsis paulò lentiūs diffluentia.

Cùm præcipua pars Eclegmatum constet ex mucaginibus quæ parantur ex gummi solutis , ipsorum lensor his auctis augeri , pro re natâ , aut detractis iisdem imminui potest.

Sæpè Eclegmatibus utuntur Medici ad excipienda alia medicamina , seu liquida ea sint , sive in pulverem attenuata , ut Kermes , Ipecacuanha , etc.

Sæpius eadem apud ægros renovanda sunt , quippe quæ facilè admodum aescere solent ; ideoque in frigidiori repone nda sunt loco. In ipsis nunquam , né syrupo rum quidem formâ , acidi liquores admittendi sunt.

1. LOOK AMYGDALINUM , vulgo LOOK ALBUM.

R • Amygdalas dulces decorticatas duodecim ,	
æquantes unciam semis , vel.....	16 ,0
Amygdalas amaras.....	nº 2
Sacchari albi drachmas quatuor , vel.....	16 ,0

Contundantur in marmoreo mortario, pis-	
tillo ligneo, sensim affundendo aquæ communis	
uncias quatuor, vel.....	128 ,0
Fiat ex arte emulsio;	
Tum	
R. Gummi Tragacanthæ in pulverem triti	
grana sexdecim, vel.....	0 ,8
Olei recentis Amygdalarum dulcium unciam	
semis, vel.....	16 ,0
Sacchari albi drachmas duas, vel.....	8 ,0
Misceantur in mortario marmoreo, sensim sine	
sensu affundendo lac amygdalinum suprà dic-	
tum; sub finem adde	
Aquæ Naphe drachmas duas, vel.....	8 ,0
Et erit Look album.	

2. LOOK CUM CROCO ET PISTACIIS, DICTUM *LOOK
VIRIDE.*

R. Syrupi Violarum unciam unam, vel...	32 ,0
Tincturae Croci grana viginti vel.....	1 ,0
Aquæ communis uncias quatror, vel.....	128 ,0
Misce et ex seminum Pistaciæ exsiccatorum	
drachmis sex, vel.....	24 ,0
Fiat emulsio.	
Tum seorsim	
R. Gummi Tragacanthæ in pulverem tenuissi-	
mum triti grana sexdecim, vel.....	0 ,8
Olei Amygdalarum dulcium unciam semis,	
vel.....	16
Quibus mixtis, diuque unà contritis, sensim	
affunde emulsionem suprà dictam, simul usque	

terendo in mortario marmoreo, donec muca-
ginis spissitudinem consequantur.

Sub finem adde

Aqua Naphe drachmas duas, vel..... 8 ,o
Et erit Look viridescens.

3. LOOK EX OVO.

R Vitellum ex ovo recenti unum, aequantem circiter unciam semis, vel.....	16
Olei Amygdalarum dulcium unciam unam et semis, vel.....	48
Syrupi de Althæa unciam unam, vel.....	52
Misce diù in mortario marmoreo pistillo li- gneo, deìn adde paulatim et per vices Aquarum stillatiarum	
Naphe unciam unam, vel.....	52
Papaveris Rhœados uncias duas, vel.	64

4. LOOK ABSQUE EMULSIONE PARATUM.

R Gummi Tragacanthæ in pulverem subtilis- simum redacti grana sexdecim, vel.....	0 ,8
Aut usquè ad triginta duo, vel.....	1 ,6
Olei Amygdalarum dulcium unciam semis, vel	16 ,0
Sacchari purissimi unciam unam, vel.....	52 ,0
Aqua communis uncias tres, vel.....	96 ,0
Aqua Naphe drachmas duas, vel.....	8 ,0
Misce terendo in mortario marmoreo ut fiat Eclegma.	

III. JUSCULA

DECOCTIONE EX ANIMALIUM CARNIBUS
PARATA.

1. JUSCULUM VIPERINUM.

R. Viperam vivam , capite et caudā resectis , pelle nudatam et exenteratam , sanguine , corde et hepate servatis , quæ simul pendent circiter uncias quatuor , vel.... 128 ,o

Seca in partes , coque in vase clauso , balneo
maris , per duas horas in

Aqua communis uneiis duodecim , vel.... 384 ,o
Dein cola.

Eodem modo parantur Juscula

Cum Cancris fluviatilibus ;
Pullo Gallinaceo ;
Carne Testudinum ;
Carne et pulmone Vitulinis ;
Lacertis , Ranis , etc.

His Jusculis , pro rei necessitate , variæ herbæ et radices
adduntur .

De Limacibus autem sic parantur Juscula :

2. JUSCULUM DE LIMACIBUS.

R. Limacum per vineta collectorum , testā
nudatorum , n° 20 , circiter uncias quatuor , vel. 128 ,o

Quibus adduntur , ut plurimum , Cancri fluvia-
tiles n° 2 , æquantes circiter unciam unam , vel.. 52 ,o

Aqua libras duas , vel..... 1000 ,o

Probè eluantur Canceris Limacesque; contundantur simul in mortario marmoreo, pistillo ligneo, et balnei maris calore per trihorium decoquantur in stanneâ cucurbitâ clausâ: decoctum, ubi refrigeruerit, cola.

Si quas addere libuerit herbas, eas simul cum Limacibus in cucurbitam immisisse conveniet.

OBSERVATIO DE SOLUTIONIBUS QUIBUSDAM AQUOSIS NON OBSCURÆ VIRTUTIS.

Solutionibus aquâ parandis hic annumerandæ quoque nobis videntur quædam materiæ, quibus adeò parcè aqua inficitur, ut insolubiles vulgo habeantur; ei scilicet, quantulacumque ipsarum portione saturata fuerit, innatant intactæ, si leviores fuerint; si graviores, fundum petunt, nec ullo modo superfluo liquori commisceri queunt. Iis tamen, quantumvis parvâ quantitate solutis, itâ medicatur aqua, ut indè non mediocriter in rebus medicis quandoque valeat.

Talia sunt *Æther sulfuricus*, *Oleum animale Dippelii*, *Oleum pyrogenæum de Pice navalí*, ac demum *Camphora* solâ aquâ omnium minimè solubilis, si excipias *Olea volatilia odorata*.

Quæ autem singulorum quantitas saturandæ aquæ debetur, sicut experimentum docuit, exponere sequentibus non inutile visum est.

Aqua Ætherea *Ætheris* tenet decimam sui partem, scilicet, vel pro..... 32 ,0 3 ,200

Aqua oleo animali Dippelii mediata, observante D. CHAUSSIER, olei

tenet pro unciâ unâ guttas duodecim, scilicet grana sex, seu pro... 32 ,o o ,300

Aqua Camphorata Camphoræ tenet pro unciâ unâ granum unum, seu pro..... 32 ,o o ,0500

Aqua Picea, seu Pice navalí medicata (*Eau de Goudron*), tenet materiæ solubilis quartam partem grani unius pro unciâ unâ, seu pro..... 32 ,o o ,0125

Eadem propemodùm quantitas ex oleis volatilibus odoratis in aquam cedit, scilicet in aquæ unciâ vix grani unius pars quarta solvi valet. Facilius autem aliis solvitur oleum volatile *Valerianæ officinalis*, deinde *Cinnamomi*, post hæc *Caryophyllorum*, *Citreorum*, *Aurantiorum*, etc.

Solutiones istæ modo sequenti parari possunt in usus medicos.

AQUA CAMPHORATA.

R. Camphore ab alcoole camphorato, aquâ mediante, separatæ, grana viginti quatuor vel... 1 ,2

Lagenâ excipiantur vitreâ unciarum viginti quatuor, seu 750 gram. capaci, cui affundatur

Aquæ communis stillatitiae libra una et semis, vel..... 750 ,o

Exagitentur simul, donec omnino soluta sit *Camphora*; soluta coletur et servetur in lagunculâ ritè obturandâ.

Simili modo et *Æther* et *Olea volatilita odorata*, et *Oleum animale Dippelii* cum aquæ sufficienti quantitate exagitari possunt per aliquot dies, ac deinde, ope siphunculi, aqua hæc methodo medicata à supernatantibus æthere vel oleis

separari potest, per chartam percolari, et in lagunculis probè obturatis asservari.

Quod autem Camphoram spectat, notandum est, si Gummi, vel Saccharum, vel Acetum aut acidum quodlibet, vel demum Ovi vitellum simul cum ipsâ conterantur, tunc eam facile, his mediantibus, aquæ commisceri, et in ipsâ solutam aut saltem diffusam ac suspensam posse permanere et sic potionibus admisceri, quamvis nullas in iis partes habeat Alcool.

AQUA PICEA.

(Eau de Goudron.)

R • Picis navalis.....	500
Aquæ pluvialis.....	16,000

Reponantur in vase fietili siliceo, et macerentur per dies octo, identidem exagitando spatulâ ligneâ; aquam superfluentemcola per chartam bibulam et serva in lagenis obturatis.

Aqua Picea odorata est, et non nihil acidula. Materiæ solutæ ratio ad aquam non superat grani unius quartam partem pro unciâ unâ. Aromatis ipsius pondus aestimari nequit. Acidi autem tantula est ratio in aquæ unciâ unâ, ut Subcarbonatis Potassæ granum semis, Magnesiæ autem granum unum ipsi saturando sufficiat. Tunc autem notandum est, si Subcarbonate Potassæ utamur, aquam flavescere medio-riter, si Magnesiâ, intensius eamdem rufescere. Sæpè novâ aquæ quantitate remiscenda est aqua hæc Picea, ut ægris propinari possit.

2^o. SOLUTIONES VINO ET CEREVISIA
PARANDÆ.

VINA MEDICATA SIMPLICIA; VINA MEDICATA
COMPOSITA; CEREVISIÆ MEDICATÆ.

Vina medicata ea sunt in quibus aut unum, aut plura soluta sunt medicamenta, ex quorum naturâ et proprietatibus efficacia ipsis additur à communibus Vini virtutibus multùm discrepans.

Genuina tantùm et sincera Vina, eaque generosiora ut plurimùm adhiberi solent, ut medicata fiant. Parcâ quantitate singulis vicibus paranda sunt; quia scilicet in corruptionem pleraque prona sunt. Lagenæ quibus asservantur perfectè obturatæ in frigidariis reponendæ sunt.

VINA MEDICATA SIMPLICIA

1. VINUM ABSINTHITES.

R. Foliorum siccatorum utriusque Absinthii (*Artemisia Absinthium, Artemisia Pontica*),
aā drachmas sex, vel..... 24
Affunde vini albi generosi libras quatuor, vel. 2,000
Macerentur in *matratio* per viginti - quatuor horas.
Cola cum expressione et per chartam trajice.

2. VINUM SCHILLITICUM.

R. Squamarum Scillæ siccatarum (*Scilla maritima*) unciam unam, vel..... 32

Contundantur pistillo ligneo, et macerentur
identidem agitando in vase vitreo clauso cum
vini Malacensis librâ unâ, vel 500

Post duodecim dies liquorem cola et per chartam trajice.

Simili modo paratur Vinum

de Bulbis Colchici.

5. VINUM CHALIBEATUM.

R• Limatura Ferri puræ unciam unam, vel .. 52
Vini albi generosi libras duas, vel..... 1,000
Macerentur simul in *matratio* per sex dies identidem
agitando; dein cola et per chartam trajice.

4. VINUM EMETICUM.

R• Vini albi generosi libras duas, vel.... 1,000
Tartratis Potassæ Stibiati drachmam semis,
vel 2
Misce.

N. B. Dosis Tartratis Potassæ Stibiati augetur vel minui-
tur pro Medici arbitrio.

Idem, si videtur, parari potest ex Vino Hispano Mala-
censi.

5. VINUM DE KINAKINA.

(*Cinchona Condaminea.*)

R• Corticis Kinækinae cineritii in pulverem
redacti libram semis, vel..... 250
Conjice in *matratum* et superaffunde
Alcoolis (12=22 B°) libram unam, vel... 500
Macerentur in Alcoole identidem agitando
per viginti quatuor horas.

Addantur deinde

Vini rubri generosi libræ sex , vel..... 5,000

Macerentur simul per quatuor dies, agitando
sæpius de die : ac demum percoletur et per
chartam trajiciatur liquor, qui lagenis probè ob-
tutatis exceptus, in cellâ vinariâ asservandus est.

Ratio Corticis ad liquida in quibus maceratur
erit 1 ad 14.

VINA MEDICATA COMPOSITA.

1. VINUM DE KINAKINA COMPOSITUM.

R. Corticis Kinækinæ cineritii in pulverem redacti libram semis, vel.....	250
Ligni Quassiae amaræ unciam semis , vel....	16
Corticis Winterani (<i>Wintera aromaticæ</i>) un- ciam semis , vel.....	16
Corticis de Aurantiis amaris siccatorum un- ciam semis , vel.....	16
Omnia conjiciantur in <i>matratum</i> in quod af- fundatur,	
Alcoolis (12==22 B ⁴) libra una , vel.....	500
Macerentur identidem agitando per viginti quatuor horas, ac deinde addantur	
Vini generosi libræ sex , vel.....	3,000
Cætera , ut superiùs dictum est de Vino sim- plici , habeantur.	
Ratio corticis Kinæ erit eadem quæ in præce- denti ; ratio autem omnium simul sumptorum ad liquida in quibus macerantur erit paulò minor quam. 1 ad 11.	

2. VINUM DE OPIO COMPOSITUM, seu *LAUDANUM LIQUIDUM SYDENHAM.*

R. Opii selecti et in taleolas secti uncias duas,	
vel.....	64
Croci sativi unciam unam, vel.....	52
Cinnamomi (<i>Laurus Cinnamomum</i>) drachmam unam, vel.....	4
Pulveris Caryophyllorum aromaticorum drach- mam unam, vel.....	4
Conjice in <i>matratum</i> et super affunde Vini Hispani Malacensis optimi libram unam, vel... 500	
Macerentur leni calore per quindecim dies, identidem agi- tando.	
Cola cum forti expressione et per chartam trajice.	

Ratio Opii integrum ad Vinum in quo maceratur est ut 1 ad 8.
 Ratio partis in Opio solubilis ad predictam Vini quantita-
 tem erit circiter ut 1 ad 16... Ratio aromatum ad par-
 tem Opii solutam ut 5 ad 4. Guttæ verò viginti hujus Lau-
 dani cùm æquent pondus granorum quindecim (0 gram., 75)
 tenebunt Opii soluti tantummodò granum unum (0 ,05).

5. VINUM OPIATUM FERMENTATIONE PARATUM, DICTUM
GUTTÆ seu *LAUDANUM ABBATIS ROUSSEAU.*

R. Mellis albi uncias duodecim, vel.....	375
Aquaæ calentis libras tres, vel.....	1,500
Solutum aquâ Mel in <i>matratum</i> conjiciatur et reponatur in loco calido : ubi autem fermentes- cere incipiet, addantur	
Opii selecti unciae quatuor, vel.....	128

Soluti prius in aquæ uncis duodecim, vel...	384
Sinito hæc simul fermentescere pergant per mensem, in loco qui ad gradum 24 R ^r . (30 centig.) tepescat. Liquorem percolatum trajice per char- tam; deinde vaporet donec supersint unciae decem, vel	520
Cola iterum et adde Alcoolis (22=52 B ^s) un- cias quatuor, et semis, vel.....	144
Serva in vase accuratè clauso.	

N. B. Si Laudanum hoc citius fermentescere cupias, id
fiet, si liquori pro fermento addideris spumæ Cerevisiæ
drachmam unam, vel..... 4

In confecto autem liquore, si, non Opii integri, sed extracti
tantum rationem habueris, hujuscem habebitur extracti ad to-
tum Laudanum ratio ut 1 ad 7 ,25.

Cùm autem hujus liquoris, Laudano Sydenham longè
viscidioris, guttae viginti pendeant grana 22 (1 gram. ,1), idem
guttarum numerus tenebit opii soluti grana tria (0 ,15),
adeoque granum unum respondebit guttis circiter septem.

4 VINUM SOLUTIS EXTRACTIS MEDICATUM, VULGO
ELIXIRIUM VISCIERALE HOFFMANNI. (Ph. AMST.)

R. Corticum Aurantiorum recentium unciam semis, vel.....	16
Extracti Cardui benedicti (<i>Centaurea bene- dicta</i>) drachmas duas, vel.....	8
Cascarillæ (<i>Croton Cascarilla</i>) drach- mas duas, vel.....	8
Gentianæ Centaurii (<i>Erythraea Cen- taurium</i>) drachmas duas, vel....	8
Gentianæ Luteæ drachmas duas, vel.	8

Extracti Myrræ aquosi drachmas duas, vel... 8
 Vini Hispani libras duas, vel..... 1,000
 Macerentur in Vino cortices per biduum et exprimantur:
 Dein diluantur Extracta, quibus plenè solutis coletur
 liquor.

Extractorum ad Vinum ratio erit ut 1 ad 25.

N. B. Vina similia, solutis aliis extractis, pro re natâ
 variis, eodem modo parari possunt.

5. VINUM AMARUM SCILLITICUM COMPOSITUM IN CHARITATIS NOSOCOMIO USURPATUM, VULGO DICTUM *VINUM DIURETICUM AMARUM.*

R.	Corticis Kinækinæ Cineritii (<i>Cinchona Condaminea</i>) uncias duas, vel....	64
	Winterani (<i>Wintera aromatica</i>) uncias duas, vel.....	64
	Citreorum (<i>Citrus medica</i>) uncias duas, vel.....	64
	Radicum Asclepiadis (<i>Asclepias vincetoxicum</i>) unciam semis, vel.....	16
	Squamaram Scillæ (<i>Scilla maritima</i>) unciam semis, vel.....	16
	Stipitum Angelicæ Bohemicæ (<i>Angelica Archangelica</i>) unciam semis, vel.....	16
	Foliorum Absinthii (<i>Artemisia Absinthium</i>) unciam unam, vel.....	52
	Melissæ (<i>Melissa officinalis</i>) unciam unam, vel.....	52
	Baccarum Juniperi (<i>Juniperus communis</i>) unciam semis, vel.....	16
	Macis (<i>Myristica aromatica</i>) unciam semis, vel.	16
	Vini albi generosi libras octo, vel.....	4,000

Contundantur Cortices, Radices, Folia atque Macis; succer-
natur pulvis per incerniculum setaceum laxius; teranturque
iterum quae supererunt crassiora, donec omnia transierint. Pul-
vis suceretus totus cum baccis Juniperinis integris conjiciatur
in *matratum*. Tunc assundatur Vinum, omniaque macerentur
per quatriduum sub modico aeris calore (*grad. 10, R. 12,5*
centig.). Deinde per telam trajiciatur liquor, leviter expri-
mendo, ac demum per chartam bibulam percoletur: maceran-
dorum autem ratio ad vinum erit paulo supra 1 ad 12

6. VINUM AROMATICUM.

R. Specierum aromaticarum (<i>V. Species</i>) un-	
cias quatuor, vel.....	128
Vini rubri libras duas, vel.....	1,000
Macerentur per sex dies, vase clauso, dein cola cum ex-	
pressione et per chartam trajice.	

7. VINUM ANTI-SCORBUTICUM.

R. Radicum recentium et minutum concisa-	
rum Cochleariae Armoraciæ unciam unam, vel..	52
Foliorum recentium Cochleariae officinalis un-	
ciam semis, vel.....	16
Nasturtii aquatici unciam	
semis, vel.....	16
Menyanthis trifoliatae un-	
ciam semis, vel.....	16
Seminum Sinapi non contusorum unciam se-	
mis, vel.....	16
Muriatis Ammoniae drachmas duas, vel.....	8
Vini albi generosi libras duas, vel.....	1,000
Macerentur omnia vase clauso, identidem agi-	
tando, per triginta sex horas: dein cola cum levi	
expressione et per chartam trajice.	

Adde Alcoolati de Cochleariā unciam semis,
vel

16

Ratio radicum, foliorum et seminum ad Vinum
erit circiter, ut 1 ad 10 ,4.

CEREVISIÆ MEDICATÆ.

Methodo dupli medicatæ fiunt Cerevisiæ, vel enim me-
dicamenta ipsis adduntur post fermentationem absolutam,
vel sub ipsâ fermentatione admiscentur.

Prior methodus et facilior et utilior habetur, neque
differt à vinis medicatis, nisi naturâ liquidi medicamentis
excipiendis aptati.

Altera apud nos ideò rariùs admittitur, quod non fa-
cilè possit definiri quæ supersit post fermentationem pe-
ractam et natura et vis solutorum. Exceptis enim quibus-
dam exoticis aromatibus, quæ sub hoc ipso motu aliquan-
tenus evolvuntur atqne videntur quodammodo increscere,
quod asserunt cum *nuce Moschatâ* contingere, cæterorum
vis adulteratur penitus atque evanescit.

Igitur prioris methodi duo tantummodo exempla affe-
remus; cætera facilè intelligi queunt.

CEREV рІА DE KINAKINA SIMPLEX.

R. Corticis Kinakinæ Cineritii contusi (*Cin-*
chona Condaminea) unciam unam, vel..... 52

Cerevisiæ optimæ libras duas, vel..... 1,000

Maceretur cortex per biduum, identidem agitando; co-
latus deinde liquor vasis excipiatur probè obturandis.

..... 14

CEREVISIA ANTI-SCORBUTICA, ALITER ABIETINA COMPOSITA, DICTA SAPINETTE.

R. Foliorum recentium Cochleariae unciam unam, vel.....	52
Radicis Cochleariae Armoraciae minutum concisa uncias duas, vel.....	64
Gemmarum Pini Abietis siccatarum unciam unam, vel.....	52
Cerevisiae recenter paratae libras quatuor, vel. 2,000	
Conjificantur herba, gemmae et radix in matratum, superaffusâ Cerevisiâ; macerentur per biduum.	
Decapuletur liquor; per chartam trajiciatur.	
Sæpius hæc Cerevisiae compositio renovanda est, utpotè temporis sat brevi lapsu fiet deterior.	

III. SOLUTIONES ACETO PARATÆ.

ACETA MEDICATA.

Acetorum medicatorum compositio eâdem methodo perficitur ac Vinorum, maceratione scilicet: et aceta hâc arte parata adhibitis similibus cautelis asservari debent.

ACETA MEDICATA SIMPLICIA.

1. ACETUM ROSATUM.

R. Rosarum rubrarum exungulatarum et exsiccatarum libram semis, vel.....	250
Aceti optimi rubri libras octo, vel.....	4,000

Macerentur per quindecim dies vase clauso, identidem agitando. Dein acetum cola et per chartam trajice.

Simili modo parantur :

Aceta Florum Sambuci nigræ,
Rosmarini officinalis,
Salviæ officinalis,
Dianthi Caryophylli (*Tunica dicti*),
Lavandulæ Spicæ, etc.

2. ACETUM SCILLITICUM.

R. Squamarum Scillæ rubræ siccatarum libram semis, vel 250
 Concidantur et ingerantur in lagenam, superaffusis.
 Optimi Aceti rubri libris sex, vel 3,000
 Alcoolis (12 = 22 B[‡]) uncia unâ, vel 52
 Macerentur in vase vitro clauso, per quindecim dies, identidem agitando; dein cola et per chartam trajice.

3. ACETUM DE FRAMBÆSIIS.

R. Fructuum Rubi-Idæi recentium calice mundatorum libras sex, vel 3,000
 Aceti rubri optimi libras quatuor, vel 2,000
 Macerentur per quatuor dies; dein cola sine expressione, et per chartam trajice.

Simili modo parantur :

Aceta de aliis fructibus.

ACETA MEDICATA COMPOSITA.

ACETUM AROMATICUM ALLIATUM SEU ANTI-SEPTICUM,
VULGÒ DES QUATRE VOLEURS.

R. Summitatum siccatorum Absinthii majoris (<i>Artemisia Absinthium</i>) uncias duas, vel.....	64
<i>Minoris (Artemisia Pontica)</i> uncias duas, vel.....	64
<i>Rosmarini officinalis</i> uncias duas, vel.....	64
<i>Salviæ officinalis</i> uncias duas, vel.....	64
<i>Menthæ aquatice</i> uncias duas, vel.....	64
<i>Rutæ hortensis (Ruta graveolens)</i> uncias duas, vel	64
<i>Florum Layandulæ Spicæ siccatorum</i> uncias duas , vel.....	64
<i>Allii (Allium sativum)</i> drachmas duas, vel...	8
<i>Radicis Acori Calami</i> drachmas duas, vel....	8
<i>Corticis Cinnamomi (Laurus cinnamomum)</i> drachmas duas, vel.....	8
<i>Caryophyllorum (Caryophyllus aromaticus)</i> drachmas duas, vel.....	8
<i>Nucis moschatae (Myristica aromatica)</i> drachmas duas, vel.....	8
<i>Aceti rubri optimi libras octo</i> , vel.....	4,000
Macerentur in <i>matratæ</i> probè obturato per quindecim dies; <i>cola</i> , exprime fortiter, trajice per chartam et adde :	
<i>Camphoræ in Alcoolis sufficienti quantitate solutæ</i> unciam semis, vel	16
<i>Aeidi acetici gradus 10°</i> in areometro notantis unciam semis, vel.....	16
<i>Serva in vase ritè obturato.</i>	
Ratio macerandorum ad acetum erit paulò infrà 1/8.	

IV. SOLUTIONES OLEO PARATÆ.

OLEA MACERANDO, INFUNDENDO, DECOCUENDO MEDICATA.

Olea quæ dicuntur *fixa*, ea scilicet quæ expressione eliciuntur, præ cæteris autem Olivum, sola adhibentur ad Olea medicata confienda.

Oleis fixis facilè solvuntur odores, colores quidam vegetantium et animalium, virosa vis narcoticorum, *Cantharidum* acritudo epispastica, quæ plerumquæ oleis tenuibus aut succis resinosis primitùs inhærent; at mucosis quoque solvendis non inepta sunt olea fixa, si bullierint cum materiis muco plenis; ex iis enim lentescunt magis, atque inunctam cutem penitiùs imbuunt. Cujus solutionis duplex quoque exemplum hic servare utile duximus; unum inter Composita, *oleum dictum de mucaginibus*, quod admittitur in emplastro de gummiresinis vulgò dicto *de mucaginibus*, ducto ab ipso oleo nomine; alterum simplex, *de lumbricis dictum*, quod mediante quoque vino præparatum est, indèque aliquâ discutiendi vi fortè non carens, apud ipsam plebem maximè usitatum in articulorum doloribus tumoribusque (jure an injuria?), sat sœpè à Pharmacopœis requiritur.

Cæterū, ut olea hæc omnia temporis lapsu in corruptionem facilè sunt prona, quotannis aut etiam sœpiùs innovari debent, et asservari in vitreis vasis, aut siliceis fictilibus, et in frigidariis collocari. Ubi autem vel minimum rancescere incipiunt, illicò rejicienda sunt, et ipsis omininò interdicendum.

OLEA MEDICATA SIMPLICIA.

1. OLEUM ROSATUM.

(*Rosa Gallica vel Damascena.*)

R. Rosarum pallidarum recentium et contu-	
sarum libram unam, vel.....	500
Olei Olivarum libras quatuor, vel.....	2,000
Insolentur per tres dies; quibus elapsis Rosas exprimito:	
novae similiter in eodem oleo insolentur, idque ter repetatur	
relictis per mensem in Oleo Rosis ultimæ infusionis; dein	
exprime, defæca et serva ad usum.	

N. B. Summa florum omnis erit 1500 : Olei autem quantitas 2,000.

Simili modo parari possunt :

Olea cum floribus,
 Rosarum rubrarum recentium aut sic-
 catarum,
 Lili candidi recentibus,
 Meliloti (*Melilotus officinalis*) siccatis,
 Anthemidis nobilis siccatis.

2. OLEUM HYPERICI.

(*Hypericum perforatum.*)

R. Foliorum Hyperici recentium contusorum	
libram unam, vel.....	500
Conjificantur in Olei Olivarum libras quatuor,	
vel	2,000

Per septem dies insolentur, deinde coquantur leviter. Cola, et idem secundò fiat in eodem oleo cum novis floribus. Tertiò tandem flores alios pari quantitate, sed exsiccatos, in idem oleum conjice, et sine resideant, vase cooptero, per mensem; deinde colla, exprime et defeca.

N. B. Florum summa omnis erit 1,500 pro Olei 2,000.

3. OLEUM HYOSCYAMI.

(*Hyoscyamus niger.*)

R. Foliorum Hyoscyami contusorum libram unam	500
Olei olivarum libras duas, vel.....	1,000

Digere suprà cineres calidos per viginti quatuor horas, colla et exprime: expresso in Oleo par foliorum contusorum quantitas iterum eodem modo maceretur, dein coquantur leviter; colatum, expressum depuratunque oleum usui servetur.

N. B. Summa foliorum erit 1,000 pro Olei pari quantitate.

Simili modo parantur:

- Olea cicutæ (*Cicuta officinalis*);
- Stramonii (*Datura Stramonium*);
- Nicotianæ (*Nicotiana Tabacum*);
- Solani (*Solanum nigrum*);
- Rutæ (*Ruta graveolens*).

4. OLEUM DE CANTHARIDIBUS.

(*Litta vesicatoria.*)

R. Cantharidum in crassiorem pulverem tri-

tarum uncias quatuor, vel.....	125
Olei Olivarum purissimi libras duas, vel....	1,000

Digerantur per sex horas, balneo maris, in vase vitro,
vel faventino; per linteum trajificantur, exprimantur; Oleum
per chartam bibulam percoletur.

5. OLEUM DE LUMBRICIS MEDIANTE VINO PARATUM.

R. Lumbricorum terrestrium viventium libras quatuor, vel.....	2,000
Olei de Olivis recentis libras quatuor, vel... .	2,000
Vini albi optimæ notæ libras quatuor, vel.. .	2,000

Lumbrici penitus eluantur, in plevem cum vino et oleo
conjificantur, et leni igne decoquantur, donec aquosus humor
ferè omnis absusptus fuerit; cola cum expressione; colatum
que oleum, positâ fœce, decapuletur et asservetur.

Vini quantitatem præter solitum auximus, ut ab extracto
vinoso in oleum cederet, si qua esse potest, vis tonica et
discutiens paulò major.

OLEA MEDICATA COMPOSITA.

1. OLEUM DE MUCAGINIBUS.

R. Seminum contusorum Feni græci (<i>Trigo-</i> <i>nella Fenum græcum</i>) libra una, vel.	500
Seminum Lini (<i>Linum usitatissimum</i>) libra una, vel.	500
Radicum Althææ (<i>Althæa officinalis</i>) libra una, vel.	500
Aquæ calentis libras decem, vel.	5,000
Digerantur per viginti quatuor horas iden-	

tidem agitando; deinde viscidus liquor coletur
et fortiter exprimatur; expresso adde.

Olei Olivarum libras duas, vel. 1,000

Coquantur ad humoris ferè consumptionem. Tunc cola
sine expressione. Oleum colatum servetur ad usum.

2. OLEUM DE NARCOTICIS, DICTUM VULGÒ *BALSAMUM*
TRANQUILLANS.

R. Foliorum Stramonii vulgaris recentium	
(<i>Datura Stramonium</i>) uncias quatuor, vel.	125
Solani nigri uncias quatuor, vel.	125
Atropæ Belladonæ uneias quatuor, vel.	125
Nicotianæ (<i>Nicotiana Tabacum</i>) uncias qua-	
tuor, vel.	125
Hyoscyami nigri uncias quatuor, vel.	125
Papaveris albi uncias quatuor, vel.	125
Minutim concisa conjificantur	
In Olei olivarum libras sex, vel.	5,000
Coquantur ad humoris ferè consumptionem;	
dein cola, et in colatum oleum injificantur florum	
vel summitatum siccatarum	
Rosmarini (<i>Rosmarinus officinalis</i>) uncia una	
vel.	52
Salviæ (<i>Salvia officinalis</i>) uncia una, vel. . .	52
Rute (<i>Ruta graveolens</i>) uncia una, vel. . . .	52
Absinthii utriusque (<i>Artemisia Absinthium</i> ,	
<i>Artemisia Pontica</i>) uncia una, vel.	52
Hyssopi (<i>Hyssopus officinalis</i>) uncia una, vel.	52
Lavandulæ (<i>Lavandula Spica</i>) uncia una,	
vel.	52
Thymi (<i>Thymus vulgaris</i>) uncia una, vel. . .	52

Majoranæ (<i>Origanum Majorana</i>) uncia una,	
vel	52
Tanaceti Balsamitæ uncia una, vel	52
Menthæ aquatice uncia una, vel	52
Sambuci (<i>Sambucus nigra</i>) uncia una, vel . .	52
Hyperici (<i>Hypericum perforatum</i>) uncia una,	
vel	52

Macerentur sub sole per menses aliquot, vase clauso;
tunc oleum defæcatum et colatum servetur ad usum.

N. B. Narcoticorum summa erit 750, Aromaticorum
verò 384 pro Olei 5,000.

Adeoque priorum ad oleum ratio erit 1/4, posteriorum
circiter 1/8.

V. SOLUTIONES ALCOOLE PARATÆ

ET TINCTURÆ ALCOOLICÆ.

Tincturas plerumquæ vocavére liquores illos quos Pharamacopœi parare norunt Alcoole, in quo, plus minusve protractâ digestione, leni calore, solvuntur variæ è vegetabilibus animalibusque materiæ.

Ut Tincturis conficiendis aptentur medicamenta, sicca sint et in pulverem, particulas, aut minora fragmenta dividantur oportet, et eà copiâ admittantur ex quâ, quantum fieri potest, satur evadat Alcool.

Tincturæ sunt simplices aut compositæ.

Priores ex unico medicamine, posteriores ex pluribus commixtis conficiuntur. Ubi verò ex pluribus medicamentis

paranda est quælibet Tinctura, eâ arte perfici debet, ut duriora, solutuque difficilia primùm, ac deindè ea quæ possunt solvi facilius in Alcoolem per vices immergantur.

Accuratè obturatis in vasis asservandæ sunt.

Notum est, pro variâ materierum solvendarum naturâ, Alcoolem non unius notæ adhibendum esse. Si quodcumque est è singulis solubile extrahere esset animus, forsan sua cuncta materiei Alcoolis nota deberetur. Verùm indè multiplex formularum varietas numerusque cresceret ultrà modum.

Igitur tres tantum præscribendas in parandis ad usus medicos Tincturis censuimus Alcoolis notas; scilicet graduum 12, seu 22 *Baumé* primam, alteram 22 = 32 *B*; 26 = 36 *B* tertiam; neque enim medicis in rebus utile credimus Alcoolem adhibere qui gradus 30 = 40 *B* attingeret. Inter medicamina ad quorum Tincturas unaquæque Alcoolis nota aptior nobis visa est, quædam selegimus, quæ cæteris præparandis exemplo esse possent.

Caloris gradum autem adhibuimus eum qui inter 28^{um} et 30^{um} *Réaumur* (scilicet 35 — 37,5 *Centig.*) subsistit.

Prætereà id curare debent Pharmacopœi in parandis Tincturis, ut habeant primò Alcoolem quam purissimum; deindè, admissâ aquæ stillatæ simplicis sufficienti quantitate, ipsum ad eam notam facile deducant, quæ ad singula aptior videbitur.

Quidam crediderunt Tincturas saturatiōres haberi posse, si Alcoolis vis, vel Ammoniā, vel Potassā, ut arbitrabantur, incresceret. Verūm, experimento facto, comper-

tum habuimus, Ammoniā quidem ad dimidias Alcooli 26=36 Bé remixtā, ex Guaiaci resinā solutā materiæ quantitatē, pro Alcoolis ratione, nullatenū majorem fuisse, quām si Alcoole puro resina eadem solveretur; imo rationem solutionis simplicis ad priorem fuisse ut 8 ad 6,7; aequalē autem, si Valerianæ radix in utroque Alcoole digereretur. Multò minus increvit vis solvens ex Potassā vulgari seu Subcarbonate Potassæ. Ipsius enim Subcarbonatis Potassæ in Alcoole soluti perparva ratio ad Alcoolem inventa est, nec superavit $\frac{1}{54}$; et in hoc Alcoole solutio Succini multò parcior fuit quam in Alcoole puro. In puro scilicet Ratio Succini soluti fuit $\frac{1}{52,5}$, in altero $\frac{1}{76,5}$. Quod autem Potassam puram spectat, quae in Alcoole solvitur longè facilius, ita ut ipsius ultrà quintam sui partem recipere possit Alcool, nulla adhuc ex hæc solutione Tinctura parata est: indè autem enasci debere videtur quoddam saponis genus, in Alcoole necessariò soluble.

Cùm omnis Tincturarum vis ex materiæ solubilis ratione ad Alcoolem omnino pendeat, in simplicibus formulis *numeros generales* tantummodò ascripsimus, quibus superpositis, ipsa hæc ratio melius et facillimè uno intuitu patet. In compositis verò, ne plurium medicamentorum ratio mutua locum ullum errori faceret, *venalium quoque mensuras vulgares* ipsis apposuimus.

*I. TINCTURÆ ALCOOLICÆ SIMPLICES.**TINCTURÆ PARANDÆ OPE ALCOOLIS CUJUS
NOTA ERIT GRADUUM 26 SEU 36 BAUMÉ.**1. TINCTURA SUCCINI.*

R •	Succini flavi in tenuissimum pulverem	
triti.....	50
Alcoolis (26 = 56 B ⁴)	800

Per sex dies in vase cooperto digerantur, et identidem exagitetur liquor, resideatque præterea per totidem dies. Coletur et servetur in vase vitro probè obturato. Tinctura habebitur in quâ Succini soluti ratio, experimento facta, fuit ad Alcoolem ut 1 ad 52 ,53.

2. TINCTURÆ DE RESINIS ET BALSAMIS.

Quamquam Balsamorum in Alcoole solutio multò plenior, et ipsorum ad Alcoolem facilè ratio esse possit ut 1 ad 2, præstare tamen censuimus, si haberetur ut 1 ad 4; sic enim facilius potionibus admisceri poterunt istæ Tincturæ, nullamque solutæ materiæ jacturam patientur; quod si benè admodum succedere velis, id præcipuè observandum est ut syrupo (si quem, ut solent, admittunt potiones medicatæ) priùs intimè commisceatur terendo quælibet Tinctura; sic enim integra certius sub ipsâ mistione permanebit.

Harum autem Tincturarum pondus ita exigi potest, ut viginti guttæ haberi possint pro granis decem, seu 0 ,5.

TINCTURA DE BENZOE ALCOOLICA.

R.	Benzoës in pulverem tritæ.....	200
	Alcoolis (26 = 56 B ⁴).....	800

Digerantur per sex dies identidem agitando; resideant aliquantiū et coletur Tinctura.

Eodem modo parabuntur:

Tincturæ de Balsamo Tolutano ;
de Succis resinosis ;
de Resinis liquidis; Terebinthinà,
Copaivà ,
Meccanà , etc. ;
de Resinis Solidis; Resinà Jalapæ,
Guaiaci ;
Et aliis tūm Resinis ,
Tūm Balsamis.

N. B. Experimento facto, ratio solutæ materiæ fuit
ad Alcoolem ,

Ex Benzoë ut.....	1 ad 5 ,14
Balsamo Tolutano ut.....	1 ad 4 ,88
Resinà Guaiaci ut.....	1 ad 6 ,70

TINCTURÆ PARANDÆ OPE ALCOOLIS CUJUS
NOTA ERIT 22 SEU 32 BAUMÉ.1. TINCTURÆ EX SUCCIS GUMMO AUT EXTRACTO-
RESINOSIS.

TINCTURA DE ALOE.

R.	Aloës dictæ Socotrinæ crassius tritæ..	200
	Alcoolis (22=52 B ⁴).....	800

Digerantur per triduum; coletur Tinctura et servetur ad usum.

Eodem modo parantur:

Tincturæ Scammonii,
Gummi Ammoniaci,
Asæ fetidæ,
Euphorbii,
Myrrhæ.

Nota. Melius et pleniùs solvuntur in Alcoole 22=32 B⁴ quam in Alcoole 12=22 B⁴; compertum enim est solutæ materiæ quantitatem in priore esse majorem.

Experimento facto, Tincturâ juxta præscriptum modum paratâ, ratio solutæ materiæ ad Alcoolem fuit:

Ex Aloë Socotrinâ ut.....	1 ad	4 ,88
Scammonio ut.....	1 ad	7
Myrrhæ ut.....	1 ad	17
Asà fetidâ ut.....	1 ad	8 ,28

2. TINCTURÆ DE MEDICAMENTIS INTEGRIS.

TINCTURA DE CINNAMOMO ALCOOLICA.

(*Laurus Cinnamomum.*)

R. Cinnamomi in pulverem triti.....	200
Alcoolis (22=32 B ⁴).....	800

Digerantur per sex dies, coletur Tinctura et servetur ad usum.

Eodem modo parabuntur Tincturæ

de cortice Cascarillæ (*Croton Cascarilla*);
de radicibus Ellebori nigri;

de racidibus Dorsteniae Contrayervæ ;
 de foliis Asari (*Asarum Europæum*) ;
 Digitalis purpureæ ;
 de Caryophyllis aromaticis ;
 Stigmatibus Croci ;
 Castoreo ;
 Moscho ;
 Ambrâ.

Nota. Quamvis residua materies omni parte solubili nondum ita exhausta videatur, quin novi Alcoolis ope possit aliquid ipsi detrahi; nihilominus prior Alcool non ideo omnino saturatus habebitur; scilicet ex novâ ejusdem medicamenti quantitate novam idem poterit solutæ materiæ vim recipere et ad majorem efficaciam evehî. Infundendorum tamen rationem ad Alcoolem instituendam esse censuimus ut 1 ad 4. Ea videlicet nobis visa est præstantior, et ex quâ, pro corporum, quamvis ejusdem generis atque etiam nominis, variâ admodum constitutione, constantior Tincturæ vis haberetur.

Atque ideo Alcoolis ope cujus nota fuit 22=32 Bt, experimento facto, ratio solutæ materiæ ad Alcoolem inventa fuit

Ex Cinnamomo ut.....	1 ad	26	,55
Stigmatibus Croci ut.....	1 ad	8	,74
Digitali purpureâ ut.....	1 ad	15	,50
Castoreo autem ut.....	1 ad	4	,90

Id autem speciatim hic annotandum est, quod et Tincturæ Croci in Alcoole hujusce gradûs (22=32 Bt) parate color constantior sit, et ex ipsâ rubra quædam materies non æquè sponte subsidat, ac si ex Alcoole debiliori pararetur.

TINCTURÆ PARANDÆ OPE ALCOOLIS DEBLIORIS CUJUS NOTA ERIT 12 SEU 22 BAUMÉ.

1. TINCTURA DE KINAKINA.

(*Cinchona Condaminea.*)

R. Corticis Kinækinæ cineritii in pulverem triti 100
Alcoolis (12=22 B⁴)..... 400
Digerantur per sex dies, eoletur tinctura, et servetur ad
usum.

Pari modo parabuntur Tincturæ

De Cortice Kinækinæ rubro (*Cinchona oblongi
folia*);

Ligno Guaiaci (*Guaiacum officinale*)
dicta *Aqua vitæ de Guaiaco*;

Radicibus Jalapæ (*Convolvulus Jalapa*);

Ipecacuanhæ (*Cephælis emetica*);

Valerianæ sylvestris;

Inulæ Helenii;

Gentianæ luteæ;

Bulbis Scillæ (*Scilla maritima*);

Colchici autumnalis;

Foliis Absinthii (*Artemisia Absinthium*);

Fructu Nucis vomicæ (*Strychnos nux vomica*); quæ sedulò et summâ cùm curâ
prædicto modo præcipuè præparanda
est.

Materiæ solutæ ad Aleoolem ratio inventa fuit

Ex foliis Absynthii ut..... 1 ad 20 ,4

Cortice Kinækinæ cineritio ut... 1 ad 25 ,47

16

Ligno Guaiaci ut.....	1 ad 22 ,50
Radicibus Jalapæ ut.....	1 ad 45 ,40
Ipecacuanhæ ut.....	1 ad 50 ,00
Valerianæ ut.....	1 ad 28 ,54
Gentianæ ut.....	1 ad 16 ,75
Bulbis Scillæ ut.....	1 ad 6 ,65
Fructu Nucis vomicæ ut.....	1 ad 56 ,90

Ex his autem omnibus tinctura longè saturatior habetur
cum Alcoole debiliori, quam si cum fortiori pararetur.

2. TINCTURA DE CANTHARIDIBUS.

R. Cantharidum in crassiorem pulverem contusarum 100
Alcoolis (12=22 B°)..... 800
Digerantur per dies quatuor;cola deinde et serva ad
usum.

Experimento facto, materiæ solutæ ad Alcoolem ratio in-
venta fuit ut..... 1 ad 55 ,86

Præstat autem multūm, in hâcce Tincturâ parandâ, de-
bilior alcool fortiori : scilicet in illo plenius longè solvitur
Cantharidum acris matieres.

3. TINCTURA DE EXTRACTO OPII.

R. Extracti Opii aquosi dicti..... 50
Alcoolis (12=22 B°)..... 560

Reponantur in vase vitro probè obturato, donec solutum
sit extractum. Absolutâ solutione coletur Tinctura et ser-
vetur ad usum.

Hâc in Tincturâ ratio Extracti soluti ad Alcoolem erit $\frac{1}{12}$.
Ut autem hujus medicamenti in minima quæque facilis fiat
divisio, hoc præcipue notandum est; Guttas viginti quatuor

æquare grana 12 (0,6), adeoque tenere Extracti granum unum (0,05).

4. TINCTURA DE CATECHU.

R.	Extracti de Catechu.....	30
	Alcoolis (12=22 B ⁴).....	120
Digerantur per dies quatuor; coletur Tinctura et servetur ad usum.		
	Ratio Extracti soluti ad Alcoolem erit $\frac{1}{4}$.	

5. ALCOOL CAMPHORATUS.

R.	Alcoolis (12=22 B ⁴).....	500
	Camphoræ.....	10

Misce, solutâque Camphorâ, liquorem cola et serva in vase probè obturato.

Ratio Camphoræ ad Alcoolem erit $\frac{1}{50}$. Poterit autem Camphoræ ratio tantum augeri quantum opus esse videbitur.

II. TINCTURÆ ALCOOLICÆ COMPOSITÆ.

1. TINCTURA ABSINTHII COMPOSITA.

R.	Foliorum siccatorum	
	Absinthii majoris (<i>Artemisia Absinthium</i>) unciam	
	semis, vel.....	16
	minoris (<i>Artemisia Pontica</i>) unciam	
	semis, vel.....	16
	Caryophyllorum aromaticorum unciam semis,	
	vel.....	16

Sacchari albissimi drachmas duas, vel.....	8
Alcoolis (22=52 B ¹) libram semis, vel.....	250
Digerantur per quindecim dies leni calore; colentur.	
N. B. Ratio medicamentorum ad Alcoolem erit 1 ad 5 ,2	

2. TINCTURA BALSAMICA VULGÒ DICTA BAUME DU
COMMANDEUR DE PERMES.

R. Radicis Angelicæ Bohemicæ (<i>Angelica Archangelica</i>) siccæ, minutum concisæ, unciam semis, vel.....	16
Florum Hyperici (<i>Hypericum perforatum</i>) siccatorum unciam unam, vel.....	32
Alcoolis (22=52 B ¹) libram unam et uncias quatuor, vel.....	1,125
Digerantur simul leni calore, vase clauso, identidem agitando per quindecim dies.	
Colato et expresso liquori adde	
Myrræ unciam semis, vel.....	16
Olibani unciam semis, vel.....	16
Digerantur ut supra; tūm	
R. Styracis calamitæ vel Balsami Peruviani uncias tres, vel.....	96
Benzoës electæ uncias tres, vel.....	96
Aloës Soccotrinæ unciam semis, vel.....	16
Ambræ cineritiæ grana sex, vel.....	0 ,3
Contrita conjiciantur in Tincturam suprà paratam. Insolentur per quadraginta dies, coletur liquor, servetur in vase accuratè clauso.	
Medicamentorum ratio ad Alcoolem erit circiter ..	2

3. TINCTURA AROMATICA, VULGO DICTA EAU DE BON-FERME.

R • Nucum Moschatarum (<i>Myristica aromatic</i> a)	
uncias duas, vel.....	6 <i>4</i>
Caryophyllorum aromaticorum uncias duas, vel.	6 <i>4</i>
Cinnamomi (<i>Laurus Cinnamomum</i>) uncias duas, vel.....	6 <i>4</i>
Florum mali Granati (<i>Punica Granatum</i>) uncias duas et semis, vel.....	8 <i>0</i>
Alcoolis (22=52 B ⁴) libras duas, vel.....	1,000
Macerentur per quindecim dies;	
Cola, exprime, residuæque materiæ affunde	
Alcoolis (12=22 B ⁴) libras duas, vel.....	1,000
Macerentur iterum per quindecim dies;	
Cola et exprime.	
Commisceatur uterque liquor. Coletur per chartam empo- reticam, et erit Tinctura, in quâ medicamentorum ratio ad	
Alcoolem erit ut 1 ad 7 ,3.	

4. TINCTURA AROMATICA COMPOSITA USITATISSIMA,
VULGO DICTA AQUA VULNERARIA SPIRITUOSA.

(EAU ROUGE.)

R • Foliorum recentium	
Salviæ (<i>Salvia officinalis</i>) unciam unam, vel.....	5 <i>2</i>
Rosmarini (<i>Rosmarinus officinalis</i>) unciam unam, vel.....	5 <i>2</i>
Satureiæ (<i>Satureia hortensis</i>) un- ciam unam, vel.....	5 <i>2</i>
Origani vulgaris unciam unam, vel.....	5 <i>2</i>

Foliorum Origani-Majoranae unciam unam ,	
vel.....	52
Thymi vulgaris unciam unam , vel.	52
Thymi Serpilli unciam unam , vel.	52
Hyssopi (<i>Hyssopus officinalis</i>) unciam unam , vel.....	52
Melissæ officinalis unciam unam ,	
vel.....	52
Melissæ Calamenthae unciam unam ,	
vel.....	52
Ocymi Basilici unciam unam , vel.	52
Menthæ aquaticæ unciam unam ,	
vel.....	52
Feniculi (<i>Anethum Feniculum</i>) unciam unam , vel.....	52
Angelicæ (<i>Angelica Archangelica</i>) unciam unam , vel.....	52
Absinthii (<i>Artemisia Absinthium</i>) unciam unam vel.....	52
Rutæ (<i>Ruta graveolens</i>) unciam unam , vel.....	52
Summitatum floridarum	
Lavandulæ (<i>Lavandula Spica</i>) unciam unam , vel.....	52
Hyperici (<i>Hypericum perforatum</i>) unciam unam , vel.....	52
Alcoolis purissimi (12 = 22 B ^e) libras duas , vel.	1,000

Macerentur per octo dies ; per linteum trajificantur et exprimantur ; colentur per chartam emporeticam.

N. B. Ratio Aromaticorum ad Alcoolem non erit multum infra 3 ad 5.

Liquoris autem color ab Hyperico pendet.

5. TINCTURA AROMATICA CUM ACIDO SULFURICO, DICTA
VULGO ELIXIRIUM VITRIOLICUM MYNSICHTI.

R adicum Calami aromatici (<i>Acorus Calamus</i>) unciam unam, vel...	52
Galangæ (<i>Marantha Galanga</i>) unciam unam, vel.....	52
Florum Chamæmeli (<i>Anthemis nobilis</i>) unciam semis, vel.....	16
Foliorum Salviae (<i>Salvia officinalis</i>) unciam semis, vel.....	16
Absinthii (<i>Artemisia Absinthium</i>) unciam semis, vel.....	16
Menthæ crispæ unciam semis, vel...	16
Caryophyllorum aromaticorum drachmas tres, vel.....	12
Cinnamomi (<i>Laurus Cinnamomum</i>) drachmas tres, vel.....	12
Cubebarum (<i>Piper Cubeba</i>) drachmas tres, vel.....	12
Nucis Moschatæ (<i>Myristica aromatica</i>) drachmas tres, vel.....	12
Zingiberis (<i>Amomum Zingiber</i>) drachmas tres, vel.....	12
Ligni Aloës (<i>Aloëxylum verum</i>) drachmam unam, vel.....	4
Corticum Citri (<i>Citrus medica</i>) drachmam unam, vel.....	4
Sacchari uncias tres, vel.....	96
Omnia in pulverem crassiorem confusa inge-	
rantur in matratium, superadditâ.	
Alcoolis (12=22 B ^c) librâ semis, vel.....	250

Post horas sex addantur	
Acidi Sulfurici unciae quattuor, vel.....	125
Iterumque post viginti quatuor horas addatur	
Alcoolis (12 = 22 B ⁴) libra una et semis, vel..	750
Digerantur omnia per quatuor dies; coletur li-	
quor cum expressione; per chartam bibulam tra-	
jiciatur ; servetur ad usum.	
Ratio aromaticorum erit ad Alcoolem paulò	
infrà.....	1 ad 5
Ratio acidi sulfurici.....	1 ad 8
Ratio sacchari ad totum liquorem paulò suprà	1 ad 12

6. TINCTURA FEBRIFUGA DOCTORIS HUXHAM.

R. Corticis Kinækinæ rubri (<i>Cinchona oblongi-</i>	
<i>folia</i>) uncias duas, vel.....	64
Aurantiorum amarorum (<i>Citrus</i>	
<i>Aurantium</i>) unciam unam et	
semis, vel.....	48
Radicis Serpentariae Virginianæ (<i>Aristolochia</i>	
<i>Serpentaria</i>) drachmas tres, vel..	12
Stigmatum Croci (<i>Crocus sativus</i>) drachmam	
unam, vel.....	4
Cocci Cacti tinctorii grana quinquaginta, vel.	2 ,5
Alcoolis (22 = 52 B ⁴) libras duas, vel.....	1,000
Digerantur per dies quindecim, colentur, traji-	
ciantur per chartam emporeticam.	
Ratio medicamentorum ad Alcoolem erit circiter ut 1	
ad 7 ,6.	

7. TINCTURA GENTIANÆ CUM AMMONIA, DICTA IN
NOSOCOMIIS *ELIXIRIUM AD SCROFULAS.*

R adicis Gentianæ (<i>Gentiana lutea</i>) contusæ	
unciam unam, vel.....	52
Carbonatis Ammoniæ drachmas duas, vel....	8
Digerantur simul per dies quatuor in Alcoolis	
(12 = 22 B ¹) libris duabus, vel.....	1,000

Coletur liquor et exprimatur; deinde per chartam trahatur. Ratio radicis ad Alcoolem aequabit circiter $\frac{1}{3}$; ratio Carbonatis Ammoniæ $\frac{1}{25}$; elixirii autem uncia qualibet tenebit grana circiter quatuor et semis Carbonatis Ammoniæ.

N. B. Si in locum Carbonatis Ammoniæ sufficientantur Carbonatis Sodaæ drachmæ tres, vel..... 12 habebitur *ELIXIRIUM D¹ PEYRILHE* cuius uncia una tenebit carbonatis Sodaæ tantummodo grana septem.

8. TINCTURA KINÆKINÆ ÆTHEREA COMPOSITA, SEU
ELIXIRIUM ANTISEPTICUM D. CHAUSSIER,

R orticis Kinækinae cineritii (<i>Cinchona Con-</i>	
<i>daminea</i>) uncias duas, vel...	64
Cascarillæ (<i>Croton Cascarilla</i>)	
unciam semis, vel.....	16
Cinnamomi (<i>Laurus Cinnamo-</i>	
<i>mum</i>) drachmas tres, vel....	12
Stigmatum Croci (<i>Crocus sativus</i>) drachmam	
semis, vel.....	2
Sacchari albissimi uncias quatuor et drach-	
mas sex, vel.....	150
Kinā, Cascarillā, Cinnamomo in crassiorem	
pulverem tritis, concisis Croci stigmatibus, Sac-	

charo in frustula comminuto, omnia in vas sphæricum immittantur, additis	
Vini Hispani albi, aut Gallici moschati librâ unâ, vel.....	500
Alcoolis (16=26 B ⁴) librâ unâ, vel.....	500
Macerentur per biduum identidem agitando; elutrietur liquor, eique lagenâ excepto addantur	
Ætheris Sulfurici purissimi drachma una et semis, vel.....	6
Lagena obturetur illicè accuratè, et per aliquot horæ minuta exagitetur. Liquor sic paratus servetur ad usum.	
Medicamentorum ratio ad Vinum et Alcoolem erit circiter.....	1 ad 10 ,6
Sacchari circiter.....	1 ad 7
Ætheris autem.....	1 ad 166

9. TINCTURA PURGANS, VULGO DICTA *AQUA VITÆ*
(AUT *VITIS*) *GERMANICA*.

R . Radicis Jalapæ electæ (<i>Convolvulus Japa</i>) libram semis, vel.....	250
Turpethi (<i>Convolvulus Turpe-thum</i>) unciam unam, vel.....	32
Scammoniæ Alepensis uncias duas, vel.....	64
Contusa omnia macerentur in <i>matratio</i> cum Alcoolis (12=52 B ⁴) libris sex, vel.....	3,000
Post octo dies transfundatur et coletur Tinctura. Ratio medicamentorum purgantium ad Alcoolem erit circiter.....	1 ad 8 ,5

10. TINCTURA AMARA, DICTA VULGÒ *ELIXIRIUM DOCTORIS STOUGHTON.*

R. Summitatum siccatarum	
Absinthii majoris (<i>Artemisia Absinthium</i>)	
drachmas sex, vel.....	24
Chamaedryos (<i>Teucrium Chamædrys</i>) drach-	
mas sex, vel.....	24
Radicis Gentianæ siccæ (<i>Gentiana lutea</i>)	
drachmas sex, vel.....	24
Corticis Aurantiorum amarorum (<i>Citrus Au-</i>	
<i>rantium</i> drachmas sex, vel.....	24
Cascarillæ (<i>Croton Cascarilla</i>) drach-	
mam unam, vel.....	4
Rhei electi (<i>Rheum palmatum</i>) unciam	
semis, vel.....	16
Aloës Socotrinæ drachmam unam, vel....	4
Alcoolis (12=22 B ⁶) libras duas, vel.....	1,000
Digérantur módico calore per dies quindecim, colentur,	
et per chartam trajiciantur.	
Medicamentorum ratio ad Alcoolem erit.. 1 ad 8 ,53	
Ratio autem Aloës ad cætera..... 1 ad 30	
Ad Alcoolem verò circiter..... 1 ad 240 ,2	

11. TINCTURA DE ALOE COMPOSITA, DICTA VULGÒ *ELIXIR DE LONGUE VIE.*

R. Aloës Socotrinæ drachmas novem, vel.	36
Radicis Gentianæ (<i>Gentiana lutea</i>) drach-	
mam unam, vel.....	4
Stigmatum Croci (<i>Crocus sativus</i>) drachmam	
unam, vel.....	4

Rhabarbari (<i>Rheum palmatum</i>) drachmam unam, vel.....	4
Agarici albi (<i>Boletus Laricinus</i>) drachmam unam, vel.....	4
Theriacæ drachmas duas, vel.....	8
Aloë, Radices, Agaricus et Stigmata trita digerantur per quindecim dies in Alcoolis (12=22 B°) libris duabus, vel....	1,000
Cola et residuae materiae affunde iterum Alcoolis (12=22 B°) libras duas, vel.....	1,000
Addē Sacchari crystallorum unciam unam, vel.....	52
Cinnamomi drachmam unam, vel.....	4
Digerantur adhuc per dies quindecim; liquor prior et alter commisceantur, colentur; serva ad usum.	
Ratio medicamentorum ad Alcoolem erit ut 1 ad 52	
Purgantium tantum.....	1 ad 45 ,5
Aloës solius.....	1 ad 55 ,5

VI. SOLUTIONES ÆTHERE PARATÆ SEU
TINCTURÆ ÆTHEREÆ. Exemplo
sit:

1. TINCTURA ÆTHEREA DE DIGITALI PURPUREA.

R. Foliorum Digitalis purpureæ siccatorum et in pulverem contritorum drachmas duas, vel.	8
Ætheris sulfurici (46°=56°) unciam unam, vel.....	52

Macerentur per biduum in lagunculâ rite obturatâ ; transfundatur liquor et servetur ad usum.

Eodem modo parantur

*Tincturæ Æthereæ de Arnicâ (Arnica montana),
Cicutâ (Cicuta officinalis),
de Balsamo Tolutano et aliis
Balsamis,
de Asâ fetidâ,
Castoreo,
Moscho,
Ambrâ ; etc.*

Ratio materiæ solubilis ad Ætherem, experimento facto,
ex Digitali purpureâ, fuit tantum ut 1 ad 68.

**2. TINCTURA ÆTHEREA ALCOOLICA DE MURIATE FERRI,
DICTA TINCTURA BESTUCHEF, SIVE DOCTORIS
KLAPROTH.**

R • Muriatis Ferri sublimati.....	1
Aetheris Sulfurici Alcoolisati.....	9

Per octo dies in lagunculâ vitrâ reponantur probè obturandâ; identidem exagitentur. Deinde transfundatur liquor et servetur ad usum.

Experimento facto, nullâ aliâ methodo quam prædictâ, scilicet, adhibito ad hoc opus Muriate Ferri sublimato, major quantitas Muriatis Ferri Æthere dissolvi potest. (*Vide Bulletin de Pharmacie*, 1810, tom. II, pag. 282.)

Verum id præsertim curandum est ut tinctura hæc in minimas lagunculas dividatur, probè obturandas, et in frigido loco reponendas; præterea lagunculæ itâ impleantur,

ut in ipsis parcè admodum detur aëri locus; alioquin facile
protoxydum ferri in peroxydum sive deutoxydum vertitur,
et præceps fundum petit, aut adhæret parietibus, et liquor
ipse fit acidissimus.

5. ÆTHER PHOSPHORATUS.

R. Ætheris Sulfurici libram unam, vel.... 500 ,o
Phosphori in frustula concisi drachmas duas
et semis, vel..... 10 ,o

Excipiatur primùm Æther lagunculâ vitreâ crystallino ob-
turaculo munitâ, atque extus glutinatâ chartâ nigricante
obtectâ, deinde iniciatur Phosphorus, jām in Æthere quoque
lotus. Agitentur identidem serventurque simul per mensem.
Tunc transfundatur Æther, ipsoque impleantur ore tenūs
minimæ lagunculae probè obturatæ et chartâ nigrâ obtectæ.
Phosphori autem in Æthere soluti ratio erit $\frac{1}{15}$, superabit sci-
licet grana tria pro uncia unâ.

VII. SOLUTIONES AQUA, AUT VINO, AUT
ACETO CUM SACCHARO AUT MELLE
PARATÆ.

SYRUPI, MELLITA, ELÆO-SACCHARA.

1. SYRUPI.

SYRUPI vocantur medicamenta liquida, saccharo in ipsis
soluto in eam densitatem deducta, quâ lentè admodum dif-
fluant; constant autem vel aquâ, vel solutis, infusis, decoctis

variis medicaminibus, vel succis expressis, aut etiam stillatuis liquoribus.

In Syrupis simplicioribus justae densitatis argumentum est Areometri (Hydrometrum dixerunt Batavi) emersus, in bulliente syrupo ad gradum 30, in refrigerato ad gradum 35. Aliâ quoque methodo ratio densitatis Syrupi inveniri potest; scilicet, si vas quod aquæ 32 ^{gram.} capit, capiat syrupi 42. Unde quoque eruitur specifica syrupi gravitas æquans 1321. Neque minus certum indicium est quod ex thermometri observatione eruitur, scilicet bullientis syrupi fervor 84 gr. in Reaumur divisione, 105 in centuplici, 221 in Fahrenheit numeratione obtinet.

Syrupos plerique huc usque Codices distinxere in *purgantes*, seu vacuandæ alvo destinatos; et non *purgantes*, quos alio nomine dixerent *alterantes*, seu aptos immutandis actionibus; rursusque utriusque seriei syrupos diviserunt in *simplices* et *compositos*, scilicet ex uno medicamine aut pluribus unitis constantes.

I^o. SYRUPI SIMPLICES NON PURGANTES,

ALTERANTES DICTI.

1. SYRUPUS SIMPLICISSIMUS, SIVE AQUA ET SACCHARO CONSTANS.

R • Sacchari libras duodecim, vel.....	6,000
Aquæ libras quatuor, vel.....	2,000
Conjice in caldarium igni impositum, ut solvatur sensim Saccharum identidem agitando; sumatur si-	

mul albumen unius ovi quod subigatur diluaturque
in aquæ libris quatuor , vel..... 2,000

Ubi concitato igne intumescet liquor , ipsum compesce
desuper affundendo aliquantum aquæ albumini mixtæ ; mox
detumescens spumam exime , et sic deinceps , repetitis yici-
bus , omnis affundatur aqua , donec penitus albicantes spumæ
omnes exemptæ sint . Tunc liquori ferventi injiciatur aquæ
simplicis Cochlear unum , nullisque superstitibus spumis ,
percoctus Syrupus , per pannum , dum servet adhuc , trajec-
tus , pellucidus purusque habebitur et servabitur in usus .

N. B. Fiet extemporalis idem Syrupus , si Sacchari pu-
rissimi et albissimi partes duæ , aquæ parte unâ sub ipso
tepidarii calore dissolvantur .

SYRUPI DE SOLUTIS GUMMI, EXTRACTIS, etc.

2. SYRUPUS DE GUMMI ARABICO.

R. Gummi Arabici albi mundati et contusi libram
unam , vel..... 500
Aquæ communis libram unam , vel..... 500
Syrupi simplicissimi , libras quatuor , vel..... 2,000
Gummi ope caloris aqua solvatur ; solutioni addatur Sy-
rupus : bulliant per duo aut tria horæ minuta ; despument ,
et frigidus demùm per pannum trajiciatur Syrupus .

3. SYRUPUS DE OPIO.

R. Extracti Opii aquâ frigidâ parati drachmas
tres et grana sexaginta , vel..... 15
Aquæ uncias duas , vel..... 64
Syrupi de Saccharo simplicis libras novem cum
uncius novem et semis , vel..... 4,800

Solvatur in aquâ Extractum, addito deinde Syrupo accuratè misceatur; bulliant aliquantisper, fervensque Syrupus per pannum trajiciatur.

Serva.

N. B. Syrupus iste, pro singulis uncisiis, seu pro Extracti tenet grana duo, seu..... 52 ,0 0 ,1

SYRUPI DE AQUIS STILLATITIIS.

4. SYRUPUS DE MENTHA PIPERITA.

R• Summitatum Menthae piperitae exsiccatarum et mundatarum unciam unam, vel..... 52

Aqua ejusdem Menthae stillatitiae libras duas, vel.. 1,000

Digere balneo maris per horam unam et alteram in vase clauso.

Dein colo et per chartam trahice.

Tunc liquori adde Sacchari albi duplum et solvatur balneo maris, vase clauso.

Refrigeratus Syrupus per pannum coletur.

Simili modo parabuntur in propriis aquis:

Syrupi de Hyssopo officinali,

Myrto communî,

Marrubio (*Marrubium vulgare*),

Scordio (*Teucrium Scordium*),

Stæchade (*Lavandula Stæchas*),

Apio (*Apium graveolens*),

Menthis (*Mentha gentilis et aliæ*),

Dictamno (*Origanum Dictamnus*),

5. SYRUPUS DE CINNAMOMO.

R. Aquæ Cinnamomi stillatitiae libras duas, vel.. 1,000
 Sacchari albi libras quatuor, vel..... 2,000
 Misce et fiat balneo maris in vase clauso Syrupus.

Eodem modo parantur

Syrupus de floribus Aurantiorum cum aquâ
 eorumdem stillatitiâ seu aquâ Naphe.

SYRUPI DE INFUSIS AQUOSIS.

6. SYRUPUS DE VIOLIS.

(*Viola odorata.*)

R. Petalorum Violarum recentium libras quatuor,
 vel..... 2,000
 Congerantur in vas stanneum capax et profun-
 dum; affunde
 Aquæ ferventis libras octo, vel..... 4,000
 Infundantur in vase cooperto per duodecim horas.
 Cola cum levi expressione, et colatus liquor, post aliquot
 horas, positis fæcibus decapuletur.
 Huic in vase stanneo adde Sacchari albi optimi duplum.
 Fiat Syrupus sub balnei maris calore perficiendus.

Simili modo parantur Syrupi

De floribus Caprifolii (*Lonicera*
Peryclymenum).
 Papaveris Rheados,
 Dianthi Caryophylli,

De floribus Nymphææ albæ,
Tussilaginis Farfaræ,
Rosarum rubrarum,
etc.

7. SYRUPUS DE ADIANTO.

(Adiantum Pedatum.)

R • Foliorum Adianti Cadanensis, stipitibus ex-	
clusis, uncias quatuor, vel.....	128
Infundantur per duas horas in aquæ bullientis li-	
bris sex, vel.....	5,000
Coletur liquor et in eo solvantur Sacchari albi	
librae quatuor, vel.....	2,000
Eliqua et coque in densitatem Syrupi, quem inji-	
cies adhuc calentem suprà foliorum Adianti mun-	
datorum uncias duas, vel.....	64
Infundantur per duas horas in vase clauso; dein colla,	
et erit Syrupus, quem, si lubet, jucundiorem facies aquâ	
Naphe admixtâ.	

*Simili modo parari potest idem Syrupus*De A. Monspeliaco (*Adiantum Capillus Veneris*).

8. SYRUPUS DE HEDERA TERRESTRIS.

(Glecoma hederacea.)

R • Foliorum Hederae terrestris recentium mundato-	
rum libram semis, vel.....	250
Aquæ bullientis libras tres, vel.....	1,500

Infunde per duodecim horas; dein cola per chartam, et
adde liquori Sacchari albi duplum.
Fiat in vase clauso Syrupus.

Simili modo parabuntur Syrupi

De Erysimo (*Erysimum officinale*);
Millesolio (*Achillaea Millefolium*), etc.

9. SYRUPUS DE ABSINTHIIS.

(*Artemisia Absinthium.*)

(*Artemisia Pontica.*)

R. Summitatum utriusque Absinthii siccata- rum, aā uncias tres, vel.....	96
Infundantur per sex horas in aquæ ferventis libris tribus, vel.....	2,000
Cola, et adde liquori Sacchari albi duplum.	
Fiat Syrupus in vase clauso.	

Simili modo paratur Syrupus

De Artemisiâ (*Artemisia vulgaris*).

10. SYRUPUS DE CORTICE CITREI.

(*Citrus Medica*, *Citrus Aurantium.*)

R. Flavedinum Citrei recentium uncias quinque, vel.....	160
Aquæ ferventis libras duas, vel.....	1,000

Infundantur in vase clauso per duodecim horas; dein cola
absque expressione; colatum liquorem per chartam trajice,
et addito Sacchari duplo, fiat balneo maris Syrupus, quem
refrigeratum inodorabis Elæo-Saccharo Citrei.

Eodem modo paratur Syrupus

De cortice Aurantiorum.

11. SYRUPUS BALSAMICUS DE TOLU.

R. Balsami Tolutani electi et triti libram semis,
vel..... 250
Aquæ communis libras duas, vel..... 1,000
Digerantur balneo maris per duodecim horas in vase
clauso, identidem agitando.
Liquori elutriato et per chartam trajecto adde Sacchari
albissimi duplum.
Et fiat Syrupus, vase clauso.

Simili modo paratur Syrupus

De Benzoe.

SYRUPI EX DECOCTIS.

12. SYRUPUS DE BRASSICA RUBRA.

(*Brassica oleracea.*)

R. Brassicæ rubræ minutim concisæ libras duas,
vel..... 1,000
Aquæ communis libram unam, vel..... 500
Coquantur simul igne moderato in vase clauso ad Brassicæ
mollitiem; cola, et colato liquori adde Sacchari duplum.
Despumet, inspissetur et sic fiat Syrupus.

13. SYRUPUS DE ALTHÆA SIMPLEX.

(Althæa officinalis.)

R. Radicum Althææ recentium, mundatarum, minutim sectorum uncias sex, vel.....	192
Coque leviter in aquæ communis libris quatuor, vel.....	2,000
Cola.	
Adde Sacchari libras sex, vel.....	5,000
Eliqua et coque in Syrupum.	

*Simili modo parari potest Syrupus**de Symphyto (Symphytum
officinale).*

14. SYRUPUS DE PAPAVERE ALBO SEU DIACODIÒN.

(Papaver somniferum.)

R. Capsularum Papaveris albi maturarum et sic- catarum, abjectis seminibus, libram unam, vel....	500
Aquâ frigidâ primùm abluantur et scindantur mi- nutum et contundantur.	
Affunde	
Aquæ communis ad grad. 60 Reaumur (75 cen- tig.) calentis libras octo, vel.....	4,000
Digerantur per duodecim horas, dein vaporent balneo maris ad dimidias; sine fæces subsidant;	
Tunc defecato liquori adde	
Sacchari albissimi libras quatuor, vel.....	2,000
Coque in Syrupum.	

15. SYRUPUS DE KINAKINA.

(Cinchona Condaminea.)

R. Corticis Kinækinæ cineritii contriti uncias	
quatuor, vel.....	128
Aque puræ libras duas et semis, vel.....	1,250
Bulliant simul, vase cooperto, per horæ quadrantem. Colatura turbida vaporet leni igne circiter ad	
dimidias.	
Tunc cum Sacchari albi.....	500
Coque in Syrupum.	

SYRUPI DE INFUSIS VINOSIS ET AQUOSO-VINOSIS.

16. SYRUPUS DE KINAKINA CUM VINO.

R. Corticis Kinekinæ cineritii contriti uncias	
duas, vel.....	64
Extracti de Kinakinæ drachmas sex, vel.....	24
Vini albi Lunatensis (de Lunel), aut alijs ejusdem	
naturæ libram unam, vel.....	500
Alcoolis (12 = 22 B ⁴) unciam unam, vel.....	32
Sacchari albissimi libram unam et semis, vel..	750
Kinakina teratur in mortario, addendo paulatim Al-	
coolem, ut fiat massa mollior partium tenuissimarum, quæ	
ingeratur in lagenam superaddito vino; maceretur per bi-	
duum, identidem agitando. Coletur; colato liquore, diluatur	
extractum, ac deinde sub balnei maris calore Saccharum	
solvatur, ut fiat Syrupus.	

17. SYRUPUS DE CROCO. (PHARM. LOND.)

(Crocus Sativus.)

R. Croci electi unciam unam , vel.....	52
Vini Malacensis libram unam , vel.....	500
Crocus vino maceretur per biduum , coletur modice exprimendo , resideat paulisper , elutrietur et colato liquori addantur	
Sacchari albissimi libra una et unciæ decem , vel..	820
Fiat Syrupus.	

SYRUPI DE SUCCIS HERBARUM EXPRESSIS.

18. SYRUPUS DE COCHLEARIA OFFICINALI.

R. Succi Cochleariae percolati libram unam ,	
vel.....	500
Sacchari albi libras duas , vel.....	1,000
Fiat Syrupus, balneo maris, vase clauso ; et frigidus per pannum trajiciatur.	

*Simili modo paratur Syrupus*de Nasturtio (*Sisymbrium*
Nasturtium).

19. SYRUPUS DE FUMARIA.

(Fumaria officinalis.)

R. Succi Fumariae per ebullitionem defæcati et percolati libras tres , vel.....	1,500
--	-------

Sacchari albi libras tres, vel.....	1,500
Coque in Syrupum leni calore.	

Simili modo conficiuntur Syrupi

de Menyanthe trifoliata
 Urticâ (*Urtica dioica*),
 et de Succis omnibus herba-
 rum expressis parùm
 odoris.

N. B. Extemporalis idem Syrupus parabitur si in succo
 percolato, sub ipso tepidarii calore, dissolvatur Sacchari
 duplum.

*SYRUPI DE ACIDIS VEGETABILIBUS ET SUCCIS
 FRUCTUUM ACIDULIS.*

20. *SYRUPUS DE CITREORUM SUCCO.*

(*Citrus Medica*.)

R • Succi Citreorum recentis defæcati et per char-	
tam trajecti libras duas, vel.....	1,000
Sacchari albissimi libras tres et semis, vel.....	1,750
Solvatur Saccharum, sub ipso tepidi aëris calore, in vase vitro aut faventino, et fiat Syrupus, qui jucundior erit ad- dito Elæo-Saccharo Citrei.	

Simili modo parantur Syrupi

de Succo Limonum,
 Aceto Vini,
 Aceto Vini cum Fram-
 bæsiis,

de Aurantiis dulcibus et amara-
ris (*Citrus Aurant.*),
Granatis (*Punica Gra-*
natum),
Omphacio,
Ribesiis (*Ribes rubrum*),
Berberide (*Berberis vul-*
garis),
Cydoniis (*Pyrus Cydonia*).

21. SYRUPUS DE ACIDO TARTARI.

R. Syrupi simplicis libras duas, vel.....	1,000
Crystallorum acidi Tartarici drachmas quinque,	
vel.....	20
Aquæ stillatitiae uncias duas, vel.....	64
Acidum aquâ solvatur in vase vitro; solutio accuratè cum Syrupo misceatur, bulliant leviter per aliquot horæ minuta, et Syrupus per pannum trahatur; qui jucundior fiet addito Elæo-Saccharo Citrei.	

22. SYRUPUS DE MORIS.

(Morus nigra.)

R. Mororum nigrorum nondum plenè maturorum
Sacchari purissimi..... *ā a partes æquales.*
Conjificantur in pelvem argenteam, misceantur agitando le-
viter, modicoque igni imponantur. Succus, ruptis paulatim
Moris, defluit Saccharoque miscebitur; qui, postquam bul-
lierit paulisper, in setaceum incerniculum densius conjicia-
tur, unde Syrupus stillet sensim in vas subjectum.

Simili modo paratur Syrupus

de Frambæsiis (*Rubus Idæus*).

SYRUPI DE EMULSIS LIQUORIBUS.

24. SYRUPUS DE AMYGDALIS, vulgo SYROP D'ORGEAT.

(*Amygdalus communis.*)

R . Amygdalarum dulcium decorticatarum, libram unam, vel.....	500
Amararum libram semis, vel.	250
Sacchari albissimi libram unam et uncias duodecim, vel.....	875
Contunde diù in mortario marmoreo, pistillo ligneo, sensim addendo aquæ communis uncias quatuor, vel.....	125
Ut fiat massa mollis et tenuissimarum partium; hanc massam dilue in aquæ libris tribus et uncias duodecim, vel.....	1,875
Ut fiat emulsio; cola cum expressione, et colato liquori adde Sacchari albissimi libras quinque, vel.	2,500
Bulliant leviter in vase argenteo vel faventino, per decem horæ minuta, semper agitando, donec Saccharum sit solutum. Tum vas ab igne remove et erit Syrupus; cui colato et penè refrigerato adde	
Aqua Naphe uncias tres, vel.....	96
Vel Alcoolati de cortice Citrei unciam semis, vel.	16
Serva.	

24. SYRUPUS CUM ÆTHERE SULFURICO PARATUS.

R. Sacchari albi purissimi libras duas, vel... 1,000

Aquæ stillatitiae simplicis libram unam, vel..... 500
 Solvantur absque ignis ope et colentur; excipientur lagunculæ vitreæ in quam pateat os tubulatum duplex; superiorum unum, alterum lateri lagunculæ inferius adnatum; illud obturaculo, hoc epistomio instructum.

Addantur Syrupo:

Ætheris Sulfurici..... 48

Quæ per quinque sexve dies sæpius simul agitantur; quiescant deinde; tunc, spumâ summum vas petente, Syrupus pelucebit purus, et aperto inferius epistomio, defluet elutriatus liquor, qui Syrupus erit Æthere satur.

• 25. SYRUPUS DE MERCURIO MEDIANTE GUMMI, DICTUS
MERCURIUS GUMMOSUS PLENCKII.

R. Mercurii puri drachmam unam, vel..... 4
 Gummi Arabici in pulverem redacti drachmas tres, vel..... 12
 Syrupi Diacodion unciam semis, vel..... 16
 Conterantur paulatim simul in mortario marmoreo, donec mercurius totus subactus in mucum cesserit. Syrupus iste ex tempore tantum, et prout requiretur, parandus est.

26. SYRUPUS DE SULFURETO POTASSÆ, JUXTA METHODUM A. D. CHAUSSIER PROPOSITAM.

R. Sulfureti Potassæ unciam semis, seu..... 16
 Aquæ de Hyssopo aut Feniculo stillatitiae semilibram, seu..... 250
 Sacchari purissimi uncias quindecim, seu..... 480
 Solyatur Sulfuretum in aquâ aut Hyssopi aut Feniculi tri-

gidā; coletur; addatur Saccharum in pulverem crassiorem tritum, solvaturque sub balnei maris calore.

Hic Syrupus pro uncia unā, seu pro..... 52 ,o
Tenebit Sulfureti ultrà grana 12 , circiter.... o ,7

Servandus est in lagunculis parùm capacibus, ipso plenis, chartâ nigrante involutis, ut luci sint imperviae.

2°. SYRUPI SIMPLICES PURGANTES.

1. SYRUPUS DE IPECACUANHA.

(*Cephaelis emetica.*)

R. Radicis Ipecacuanhæ cineritiae contusæ libram semis,
vel 250
Aquæ libras septem, vel..... 5,500
Coque in vase cooperto ut supersint liquoris libræ
sex, vel..... 5,000

Subsidat fæx, elutrietur liquor, coletur per chartam.
Tum adde
Sacchari albissimi libras duodecim, vel..... 6,000
Coque in Syrupum.
Ratio Ipecacuanhæ adhibitæ ad totum Syrupum
erit ut 1 ad 56 : adeoque pro uncia unā, seu pro... 52 ,o
Decoquuntur Ipecacuanhæ plus quam grana sex-
decim, circiter..... o ,85

Emetina autem cum in totâ Ipecacuanhâ aequet circiter
o ,16; uncia una Syropi hujus tenebit *Emetinae* solute
grana plus quam duo et semis; scilicet ultrà o ,125 Eme-
tinæ pro Syropi 52 .

2. SYRUPUS DE ROSIS PALLIDIS.

R. Succi defæcati Rosarum pallidarum libras octo,
vel 4,000

Sacchari albi libras octo , vel.....	4,000
Coque in Syrupum leni igne.	

5. SYRUPUS DE AMYGDALI PERSICÆ FLORIBUS.

R. Florum Amygdali Persicæ recentium libras quatuor ,	
vel.....	2,000
Aquaæ bullientis libras duodecim , vel.....	6,000
Infundantur super cineres calidos , per duodecim	
horas , vase clauso : cola et leviter exprime . Cola-	
tum liquorem subsidendo defæcatum misce cum	
Sacchari albi libris septemdecim , vel.....	8,500
Coque in Syrupum.	

4. SYRUPUS DE RHAMNO CATHARTICO.

R. Succi de Baccis Rhamni , methodo jam expositâ	
(pag. 27) elicit et defæcati , libras tres , vel....	1,500
Sacchari albi libras tres , vel.....	1,500
Coque in Syrupum leni igne.	

5. SYRUPUS DE JALAPA.

(*Convolvulus Jalapa*).

R. Jalapæ in pulverem tenuissimum tritæ drachmas de-	
cem , vel.....	40
Seminum Coriandri (<i>Coriandrum sativum</i>) drach-	
mam semis , vel.....	2
Feniculi (<i>Anethum Feniculum</i>) drach-	
mam semis , vel.....	2
Aquaæ uncias duodecim et semis , vel.....	400
Sacchari uncias viginti quinque , vel..	800

Jalapa et semina congerantur in lagenam cum aquâ, itâ ut eâ impleatur collo tenûs. Lagenâ immergatur in balneum maris ejus aqua bulliat per viginti horæ minuta. Quo facto, subducto igne, frigescat sensim balneum. Tunc exemptâ lagenâ, elapsis quatuor et viginti horis, elutrietur liquor, coletur, addatur Saccharum, quo, sub ipso balnei maris calore soluto, fiet Syrupus.

Ratio Jalapæ adhibitæ ad Syrum totum erit ut 1 ad 50, seu granorum viginti circiter pro uncia unâ.

Simili modo parari possunt Syrupi:

de Rhabarbaro et aliis.

6. SYRUPUS DE SCAMMONIO.

R. Scammonii in pulverem triti unciam semis,	
vel.....	16
Sacchari albissimi uncias quatuor, vel.....	128
Alcoolis (12 = 22 B ⁴) uncias octo, vel.....	256
Omnia congerantur in pultarium argenteum, igne supposito; atque ubi modicè incaluerint, superficie admoveatur cerei flamma; incendetur illico liquor, spatulâ tunc assiduè movendus, igne subducto, donec flamma omnis evanuerit: Syrupus sic paratus, ubi refriguerit, per pannum trajiciatur, ipsique admisceantur Syrupi de Violis unciae quatuor, vel.....	128
Syrupi hujus libra una, vel.....	500
Tenebit extractum de Scammonii uncia semis, vel..	16

Adeòque ratio Scammonii adhibiti ad Syrum totum erit circiter ut 1 ad 52, seu granorum octodecim pro uncia unâ

3°. SYRUPI COMPOSITI NON PURGANTES, VULGÒ
ALTERANTES.

1. SYRUPUS DE STÆCHADE COMPOSITUS.

R.	Spicarum siccatarum Stæchados (<i>Lavandula Stæchas</i>) uncias tres , vel.....	96
	Summitatum floridarum et siccatarum Thymi (<i>Thymus vulgaris</i>) uncias quatuor et semis , vel,...	144
	Salviae (<i>Salvia officinalis</i>) drachmas sex , vel....	24
	Rosmarini (<i>Rosmarinus officinalis</i>) drachmas sex , vel	24
	Seminum Rutaë (<i>Ruta graveolens</i>) drachmas quatuor et semis , vel.....	18
	Feniculi (<i>Anethum Feniculum</i>) drachmas quatuor et semis , vel.....	18
	Cinnamomi (<i>Laurus Cinnamomum</i>) drachmas duas , vel.....	8
	Zingiberis (<i>Amomum Zingiber</i>) drachmas duas , vel.....	8
	Calami aromatici (<i>Acorus Calamus</i>) drachmas duas , vel.....	8
	Contusa omnia aut concisa macerentur in vase cooperto per biduum cum aquæ libris octo , vel... ,	4,000
	Tum balneo maris per distillationem excipiatur liquoris fragrantis libra semis , vel.....	250
	Ex quibus fiat Syrupus, vase clauso , eodem calore balnei maris , cum Sacchari albi duplā quantitate , scilicet librā unā , vel.....	500
	Quod residuum est, colatum et leviter expressum , eliqua et adde	
	Sacchari albi libras quatuor , vel.....	2,000

Coque in Syrupum, cui semi-refrigerato adde prior
rem.

<i>N. B.</i> Summa fragrantium erit.....	348
Ex quibus Syrupi fragrantis solius quantitas erit..	750
Syrupi vero totius erit circiter.....	5,750
Primas hoc in Syrupo partes sustinent Stæchas et Thymus.	

2. SYRUPUS AROMATICUS, VULGÒ DICTUS *DE ARTEMISIA*,
COMPOSITUS.

R . Summitatum floridarum Artemisiae vulgaris uncias sex, vel.....	192
Radicum Helenii (<i>Inula Helenium</i>) unciam se- mis, vel.....	16
Levistici (<i>Ligusticum Levisticum</i>) unciam semis, vel.....	16
Feniculi (<i>Anethum Feniculum</i>) unciam semis, vel.....	16
Herbarum Pulegii (<i>Mentha Pulegium</i>) uncias sex, vel	192
Nepetæ (<i>Nepeta Cataria</i>) uncias sex , vel	192
Foliorum Sabinæ (<i>Juniperus Sabina</i>) uncias sex , vel	192
Majoranæ (<i>Origanum Majorana</i>) un- cias tres et semis, vel.....	112
Hyssopi (<i>Hyssopus officinalis</i>) uncias tres et semis, vel.....	112
Matricariæ (<i>Matricaria Parthenium</i>) uncias tres et semis, vel.....	112
Ruteæ (<i>Ruta graveolens</i>) uncias tres et semis, vel.....	112
Ocymi (<i>Ocimum Basilicum</i>) uncias tres et semis, vel.....	112

Seminum Anisi (<i>Pimpinella Anisum</i>) drachmas novem, vel.....	56
Cinnamomi (<i>Laurus Cinnamomum</i>) drachmas novem, vel.....	56
Contusa omnia macerentur per triduum in Hydromelitis libris octodecim, vel.....	9,000
Tum ex balneo maris destillent, ut habeatur liquoris fragrantis libra semis, vel.....	250
Ex quibus	
Et Sacchari albi librâ unâ, vel.....	500
Fiat Syrupus vase clauso.	
Interea liquorem in cucurbitâ superstitem, cum levi expressione colatum,	
Cum Sacchari libris quatuor, vel.....	2,000
Coque in Syrupum, cui semi refrigerato adde priorum.	
N. B. Summa fragrantium in hoc Syrupo erit..	1,448
Ex quibus Syrupi fragrantis quantitas erit.....	750
Syrupi verò totius circiter.....	5,750
Primas hoc in Syrupo partes tenent Artemisia, Sabina et Ruta.	

5. SYRUPUS DE ERYSIMO COMPOSITUS.

R Hordei mundati (<i>Hordeum Distichon</i>) uncias duas, vel.....	64
Passularum mundatarum (<i>Vitis vinifera</i>) uncias duas, vel.....	64
Glycyrrhisæ rasæ et contusæ (<i>Glycyrrhiza glabra</i>) uncias duas, vel.....	64
Herbarum Borraginis (<i>Borago officinalis</i>) uncias tres, vel.....	96
Cichorii (<i>Cichorium Intybus</i>) uncias tres, vel.....	96

Bulliant in aquæ communis libris duodecim, vel..	6,000
Ad quartæ partis consumptionem.	
Cola cum levi expressione; tūm	
R. Erysimi recentis totius (<i>Erysimum officinale</i>)	
libras tres, vel.....	1,500
Radicis Enulæ Campanæ (<i>Inula Helenium</i>) uncias	
quatuor, vel.....	128
Adianti (<i>Adiantum Pedatum</i>) unciam unam, vel.	52
Summitatum siccatarum	
Rosmarini (<i>Rosmarinus officinalis</i>)	
unciam semis, vel.....	16
Stæchados (<i>Lavandula Stæchas</i>) un-	
ciam semis, vel.....	16
Seminum Anisi (<i>Pimpinella Anisum</i>) drachmas	
sex, vel.....	24
Concisis concidendis, contundendis contusis affunde de-	
coctum prius pàratum fervens: macerentur per quatuor et	
viginti horas, vase clauso: tunc per destillationem balneo	
maris excipiatur	
Liquoris fragrantis libra semis, vel.....	250
Ex quibus cum Sacchari duplo, scilicet librâ unâ,	
vel.....	500
Fiat Syrupus sub ipso ejusdem balnei maris calore.	
Quod autem in cucurbitis residuum est cola, leviter	
exprime, aliqua, adde	
Sacchari albi libras tres, vel.....	1,500
Mellis optimi libram unam, vel.....	500
Coque in Syrupum quem tepidum miscebis cum	
priore.	
N. B. Summa dulcium erit.....	192
Summa herbarum.....	192
Summa fragrantium.....	1,716
Summa omnium.....	2,100

Syrupi fragrantis quantitas erit.....	750
Syrupi totius circiter.....	5,750

4. SYRUPUS DE ARMORACIA COMPOSITUS, DICTUS
ANTISCORBUTICUS.

R. Foliorum virentium	
Cochleariae (<i>Cochlearia officinalis</i>) libram unam, vel.....	500
Menyanthis trifoliatae libram unam, vel.....	500
Nasturtii aquatichi libram unam, vel.....	500
Radicis Armoraciae (<i>Cochlearia Armoracia</i>) libram unam, vel.....	500
Aurantiorum amarorum (<i>Citrus Aurantium</i>) libram unam, vel.....	500
Cinnamomi (<i>Laurus Cinnamomum</i>) unciam unam et semis, vel.....	48
Herbas concisas, Aurantia, Cinnamomum frustulatim secta conjice in cucurbitam stanneam, et statim affunde Vini generosi albi libras quatuor, vel.....	2,000
Capitello protinus aptato et probè conserto, macerentur omnia per biduum; tūm balneo maris desillent, donec liquoris alcoholici et aromatici habeatur libra una, vel.....	500
Ex quo cum Sacchari albi duplo, scilicet libris duabus, vel.....	1,000
Fiat Syrupus balneo maris et vase clauso.	
Liquorem in cucurbitā superstitem sine expressione cola; sinito residere, et elutriatum cum Sacchari albi libris duabus, vel.....	1,000
Coque in Syrupum albumine eliquidum et priori admisendum, cum tepidus evaserit: servetur in lagenis probè obturatis.	

<i>N. B.</i> Summa medicaminum erit hocce in Syrupo.	2,550
Syrupi fragrantis et aliquantum alcoolici quantitas erit.....	1,500
Syrupi totius circiter.....	5,000

5. SYRUPUS E QUINQUE RADICIBUS.

R . Radicum Apii graveolentis uncias quinque , vel.....	160
Feniculi (<i>Anethum Feniculum</i>) un- cias quinque , vel.....	160
Apii Petroselini uncias quinque , vel..	160
Mundatas et in frusta concisas infunde , vase clauso , per quatuor et viginti horas in aquæ bullientis libris duabus et semis , vel.....	1,250
Dein cola sine expressione :	
Aliundè et seorsim	
R . Radicum Asparagi (<i>Asparagus officinalis</i>) un- cias quinque , vel.....	160
Rusci (<i>Ruscus aculeatus</i>) uncias quin- que , vel.....	160
Mundatis et concisis affundantur aquæ communis libræ septem , vel.....	5,500
Bulliant ad dimidias , addendo sub finem quod residuum est infusi præcedentis.	
Bulliant etiamnū per aliquot horæ minuta.	
Tunc cola ; utrumque liquorem misce et adde	
Sacchari albissimi libras sex , vel.....	5,000
Eliqua et coque in Syrupum.	
Radicum summa erit.....	800
Pro Syrupi totius.....	4,500

6. SYRUPUS E PULMONIBUS VITULINIS.

R. Pulmonis Vitulini recentis libras duas, vel..	1,000
Dactylorum (<i>Phœnix Dactylifera</i>) uncias quinque, vel.....	160
Fructuum Zizyphi (<i>Zizyphus Sativus</i>) uncias quinque et semis vel.....	176
Passularum (<i>Vitis vinifera aut apyræna</i>) uncias quinque et semis, vel.....	176
Radicis Glycyrrhizæ (<i>Glycyrrhiza glabra</i>) unciam unam, vel.....	52
Sympyti officinalis unciam unam, vel..	52
Foliorum Pulmonariae (<i>Pulmonaria officinalis</i>) uncias quinque et semis, vel.....	176
Sacchari crystallorum libras quatuor, vel.....	2,000
Aquæ fluviatilis libras duas et semis, vel.....	1,250
Pulmones minutissimè concisi, aquâ frigidâ probè eluan- tur, ut muco et sanguine prorsùs careant; mox cum aquæ præscriptâ quantitate conjiciantur in vas stanneum, balneo maris immersum et cooperiendum; balneum bulliat per ho- ram; calidus liquor resideat, decapuletur, coletur; tūm in pelvem puram cum Saccharo conjiciatur, et coquatur in Sy- rupum albuminibus aliquot eliquandum.	
<i>N. B.</i> Dulcium et mucosorum incoctorum summa in hoc Syrupo erit.....	1,752
Syrupi autem totius quantitas circiter.....	5,200

4°. SYRUPI COMPOSITI PURGANTES.

1. SYRUPUS DE RHEO, VULGO *DE CICHORIO,*
COMPOSITUS.

R. Radicum Cichorii sylvestris (<i>Cichorium Intybus</i>) uncias sex, vel	192
---	-----

CODEX MEDICAMENTARIUS.

159

Foliorum Cichorii sylvestris (<i>id.</i>) uncias novem, vel.	288
Fumariae (<i>Fumaria officinalis</i>) uncias tres, vel.....	96
Scolopendrii (<i>Scolopendrum offici- nale</i>) uncias tres, vel.....	96
Baccarum Halicacabi (<i>Physalis Alkekengi</i>) uncias duas, vel.....	64
Coque in aquæ communis libris quatuordecim, vel.....	7,000
Donec supersint libræ duodecim, vel.....	6,000
Colato liquore, solvantur	
Sacchari albi libræ quinque, vel.....	2,500
Eliqua et coque leni igne in densitatem Syrupi lentioris.	
Aliundè	
R. Aquæ communis libras octo, vel.....	4,000
Rhei electi et contusi (<i>Rheum Palmatum</i>) uncias sex, vel.....	192
Santali Citrini (<i>Santalum album</i>) unciam semis, vel.....	16
Cinnamomi (<i>Laurus Cinnamomum</i>) unciam semis, vel.....	16
Infundantur per viginti quatuor horas, vase clauso.	
Colatus liquor, leviter expressus, addatur prædicto Sy- rupo, eique accuratè misceatur, et percoquantur in Syru- pum, quem injicies calidum super	
Cinnamomi et Santali citrini contusorum et in nodulo inclusorum, à unciam semis, vel.....	16
Infundantur per sex horas. Syrupi quantitas erit. 3,750	
Ratio Rhei ad Syrupi summam erit circiter. 1 ad 19,5	

2. SYRUPUS DE SENNA, vulgò *DE POMIS, COMPOSITUS.*

R. Foliorum Sennæ mundatorum (*Cassia Senna*)
libram semis, vel..... 250

Seminum Feniculi (<i>Anethum Feniculum</i>) unciam unam, vel.....	52
Caryophyllorum (<i>Caryophyllus aromaticus</i>) drachmam unam, vel.....	4
Infunde per quatuor et viginti horas in Succi depurati Pomorum redolentium (<i>Pyrus malus</i>) libris quatuor, vel....	2,000
Borraginis (<i>Borago officinalis</i>) libris tribus, vel.....	1,500
Buglossi (<i>Anchusa officinalis</i>) li- bris tribus, vel.....	1,500
Postquam leviter bullierint, cola et exprime; quod residuum est bulliat iterum in aquae communis libris quatuor, vel.....	2,000
Et vaporet ad dimidias : cola cum expressione; uterque colatus liquor una misceantur, mixtisque sol- vantur Sacchari optimi librae quatuor, vel.....	2,000
Eliquentur et coquantur in Syrupum, quem injicies adhuc calidum super,	
Seminum Feniculi (<i>Anethum Feniculum</i>) drach- mam unam et semis, vel.....	6
Caryophyllorum (<i>Caryophyllus aromaticus</i>) drach- mam unam et semis, vel.....	6
In nodulo inclusorum ; sic infundantur per sex horas. <i>N. B.</i> Syrupi totius quantitas erit circiter.	3,500
Sennæ autem ad ipsum ratio ut 1 ad 14.	

3. SYRUPUS DE SALSAPARILLA ET SENNA COMPOSITUS,
VULGÒ DICTUS *SIROP DE CUISINIER.*

R . Radicum Salsaparillæ (<i>Smilax Salsaparilla</i>) minutum concisarum libras duas, vel.....	1,000
Infunde per quatuor et viginti horas in aquæ te- pidæ libris duodecim, vel.....	6,000

Dein bulliant per quadrantem horæ. Cola cum expressione, et quod residuum est denuò bulliat cum aquæ communis libris decem, vel..... 5,000

Vaporent ad libras sex, vel..... 5,000

Idque fiat rursus bis, terque.

Tum liquores omnes mixti simul bulliant leviter cum

Florum Borraginis (*Borago officinalis*) unciis duabus, vel..... 64

Roseæ albæ unciis duabus, vel..... 64

Foliorum Sennæ mundatorum (*Cassia Senna*) unciis duabus, vel..... 64

Seminum Anisi (*Pimpinella Anisum*) unciis duabus, vel..... 64

Vaporentque ad dimidias.

Tum cola et adde

Mellis albi libras duas, vel..... 1,000

Sacchari albi libras duas, vel..... 1,000

Coque in Syrupum densiorem.

N. B. Syropi hujus quantitas erit ferè..... 5,000

Pro Salsæparillæ..... 1,000

Et cæterorum parcâ admodum quantitate; Sennæ enim ipsius ratio, pro unciis sex Syropi, vix superat drachmam unam, aut $\frac{1}{48}$.

Parùm admodum initio, aut nihil prorsùs, sive medicamentorum naturâ et mutuâ ratione, sive methodo parandi, ab hoc discrepabat adeò decantatum *Rob* dictum *Anti-Syphiliticum*; cuius, ut omnium arcanorum, commune hoc vitium est, ut facile ab ipsis inventoribus deinde immutari possint, Medicis, quorum id præcipue interest, insciis; atque itâ uni eidemque demùm proposito nullatenus respondeant.

II. MELLITA.

Syrupi Melle parati *Mellita* dicuntur. Densitate et lenore Syrupsos æquare debent. Eodem ferè parantur modo: Aqua simplex, infusa varia et decocta, aut plantarum succi, Acetumque Melle admixto, variis apta sunt compositionibus ex quibus mellita constant.

Annumerari quoque potest Mellitis quod vulgo dicitur *Unguentum Ægyptiacum*, sic ideo dictum huc usque, quod ad exteriora tantum unguentorum more applicari solet.

1. MELLITUM SIMPLEX, seu SYRUPUS DE MELLE.

R.	Mellis albissimi libras sex , vel.....	5,000
	Aquæ communis libram unam et semis , vel.....	750
	Carbonatis Calcis loti et in pulverem redacti uncias tres , vel.....	96
	Mel et Carbonas unâ conjiciantur in pelvem argenteam, mixtaque simul bulliant per duo aut tria horæ minuta.	
	Tum adde Carbonis, præcipue ex animalibus præparati , scilicet in pulverem redacti, loti , et aperto celo siccati uncias sex , vel	192
	Ovorum albumina duo subacta aquæ librâ unâ , vel.....	500
	Quæ penitus commixta præcedentibus, simul bulliant ad Syrupi densitatem : pelvem ab igne remove ; per quadrantem horæ liquor residat et per pannum trahiatur.	
	N. B. Ea Syrupi pars quæ prior desfluxit, utpotè parti-	

culis carbonis inquinatior, rursus in pannum refundenda est, ut purus omnino habeatur Syrupus. Cujus quantitas aequabit circiter 4,000

2. OXYMEL SIMPLEX.

Rv. Mellis albissimi et optimi libras quatuor, vel.. 2,000
 Aceti vini albi optimi libras duas, vel..... 1,000
 Coque leni igne in vase argenteo vel farentino, donec liquor Syrupi lentorem adeptus fuerit.
 Cola.

3. MELLITUM DE ROSIS, SEU MEL ROSATUM.

Rv. Petalorum Rosæ rubræ exsiccatorum (*Rosa Gallica*) libram unam, vel..... 500
 Infunde per horas duodecim in decocti calycum à petalis ejusdem Rosæ sejunctorum libris quatuor vel..... 2,000
 Cola sine expressione.
 Colato liquori adde
 Mellis optimi libras sex, vel..... 5,000
 Eliqua ex ovi albumine et coque in Syrupum.

4. MELLITUM DE MERCURIALI SEU MEL MERCURIALE SIMPLEX.

(*Mercurialis annua.*)

Rv. Succi Mercurialis libras quatuor, vel..... 2,000
 Mellis optimi libras quatuor, vel..... 2,000
 Misce, coque in Syrupum, cola, et serva ad usum.

5. MEL SCILLITICUM.

(Scilla maritima.)

R. Squamarum Scillæ exsiccatarum uncias duas,
vel.....

Contundantur in mortario marmoreo, pistillo
ligneo, et misceantur cum aquæ communis limpi-
dissimæ libris tribus, vel.....

64

1,500

Bulliant leviter per aliquot horæ minuta, deinde
digerantur per biduum. Coletur liquor et exprima-
tur; cui adde

Mellis optimi libram unam et semis, vel.....

750

Eliqua et coque in Syrupum in vase argenteo vel
faventino. Syrupi quantitas habebitur circiter....
in quo Scillæ ratio erit ut 1 ad 16.

1,000

Simili modo paratur

Mel de bulbis Colchici (*Colchicum*
autumnale.)

6. OXYMEL SCILLITICUM.

R. Mellis purissimi libras quatuor, vel..... 2,000

Aceti Scillitici, chartâ emporeticâ percolati libras
duas, vel..... 1,000

Coque in Syrupum in vase argenteo vel faventino.

Simili paratur modo

Oxymel de Aceto Colchici.

7. MELLITUM DE MERCURIALI COMPOSITUM, VULGÒ
SYROP DE LONGUE VIE.

R • Succorum defæcatorum Mercurialis (<i>Mercurialis annua</i>) libras duas, vel...	1,000
Borraginis (<i>Borago officinalis</i>) libram semis, vel.....	250
Buglossi (<i>Anchusa officinalis</i>) libram semis, vel.....	250
Radicum Ireos Pseudo-Acori recentium uncias duas, vel.....	64
Gentianæ siccæ (<i>Gentiana lutea</i>) unciam unam, vel.....	52
Mellis albi optimi libras tres, vel.....	1,500
Vini albi uncias duodecim, vel.....	375

Radices contusæ macerentur in vino per viginti quatuor horas.

Cola.

Mel succis mixtum solvatur levi ebullitione, et coletur per pannum *manica* dictum: ambo liquores simul permixti coquantur in Syrupum.

Nota. Huic Syrupo addi potest infusum de foliorum Sennæ mundatae (*Cassia Senna*) uncia unâ et semis, vel... 48

Quorum ratio ad Syrupum erit circiter 1 ad 56.

8. MELLITUM DE ACETATE CUPRI, VULGÒ UNGUENTUM
ÆGYPTIACUM.

R • Mellis optimi uncias quatuordecim, vel....	448
Aceti optimæ notæ uncias septem, vel.....	224
Acetatis Cupri crudi (<i>Vert-de-Gris</i>) uncias quinque, vel.....	160

Coquantur simul donec solutus sit Acetas, et Melli color
purpureus unguentique spissitas accesserint.

III. ELÆO-SACCHARA.

1. ELÆO-SACCHARA parantur hoc modo:

R. Olei cujuscumque volatilis, pro guttis duabus,
Sacchari albissimi drachmas duas, vel grammata.. S
Terantur diu simul in mortario marmoreo vel vitro,
et intimè misceantur.

Sic parantur Elæo-Sacchara.

Anisi,
Feniculi,
Cinnamomi,
Caryophyllorum aromati-
corum.

2. At Elæo-Sacchara de corticibus Citreorum et Aurantiorum melius et expeditius fiunt, si Sacchari frusta ipsi cortici affracentur, atque ubi satis oleo imbuta fuerint, terantur usque, donec in omnem massam aequaliter olei fragantia divisæ sit.

SECTIO SEXTA.

Materiae è Solutionibus inspissatis extractæ.

MUCAGINES, GELATINÆ, EXTRACTA, RESINÆ.

MUCI SEU MUCAGINES.

MUCAGINES vocantur liquida lentè admodum fluentia, quæ lentorem suum à gummi aut similibus aquâ solutis aut suspensis mutuantur.

Mucaginum, pro usu in quem aptantur, diversus debet esse spissitudinis gradus. Hic scilicet aut minuitur aut augetur, dum ad eas conficiendas aquæ copia plenior aut parcior adhibetur.

1. MUCAGO DE SEMINIBUS PSYLLII.

(*Plantago Psyllium.*)

R. Seminum Psyllii drachmas duas, vel..... 8

Aquaे tepentis unciam unam et semis, vel..... 48

Digerantur per viginti quatuor horas, suprà cineres calidos, identidem agitando spatulâ ligneâ, donec humor albumine ovi paulò lentior evadat.

Tunc trajiciatur per linteum et exprimatur.

Simili modo conficiuntur Mucagini

de Seminibus Lini (*Linum usitatum*);

Cydoniorum (Pyrus Cydonia);

de Radice Althæe (*Althaea officinalis*);

et aliis Muco prægnantibus.

Nec absimili modo fit præparatio Mucaginis :

de Gummi Arabico ;

Tragacanthæ, etc.

Verūm in conficiendā Mucagine de Gummi Arabico notandum est satis esse si æqualem ferè aquæ calentis adhibueris quantitatē; ad Mucaginem autem Gummi Tragacanthæ, pro Gummi unā parte, aquæ calentis partes requiri circiter quatuordecim, isto scilicet, dūm aquā humescit, mirè intumescente.

GELATINÆ.

Gelatinæ à Mucaginibus in eo differunt, quod, à vegetantium animaliumve varijs partibus aquâ decoctis extractæ inspissatæque, dūm refrigerescunt, sponte coactâ substantiâ, in massam consistunt tremulam.

Pelluciditate et saporis gratiâ itâ placere debent ut iis aegri non injucundè uti possint.

Commodum istud est non mediocre Gelatinarum, quod

materiam alibilem et medicaminum elementa contineant
itâ coacta, ut minimâ mole, majorem vim exercere va-
leant.

Cùm autem facilè admodum eas corrumpi periculum
sit, prout requiruntur præparandæ sunt, et paratæ frigi-
diori loco asservandæ.

1. GELATINA DE CORNU CERVI.

R. Rasuræ Cornu Cervi aquâ tepidâ prius ablutæ
libram semis, vel..... 250

Aquaæ communis libras duas, vel..... 1,000

Coque secundùm artem in vase cooperio; colla
cum forti expressione;

Tunc quod residuum est denuò coquatur

Cum Aquaæ communis libris duabus, vel..... 1,000

Commixtis utroque liquore, solvantur

Sacchari albissimi unciae quatuor, vel..... 125

Eliqua cum ovi unius albumine;

Ac demùm igne lento vaporet liquor donec spissi-
tudinem debitam acquisierit, quod facilè dignosces,
si hujus aliquot guttae refrigeratae in Gelatinam citò
concreverint.

Tunc, condiendi causâ, infunde aliquot frustula
summi Corticis Citrei recentis, aut corticis Cin-
namomi.

Repone demùm in loco frigido ut in Gelatinam citius
coeat liquor.

*Simili modo parari potest Gelatina de animalis cuius-
cumque partibus Gelatinâ scatentibus.*

2. GELATINA DE CYDONIIS.

(Pyrus Cydonia.)

R. Cydoniorum maturescentium, sepimentis et seminibus exclusis, libras sex, vel.....	3,000
In frusta concide cultello argenteo aut eburneo :	
Bulliant in aquæ communis libris decem, vel.....	5,000
Ad dimidiæ partis consumptionem.	
Colatum liquorem aliqua ex ovi albumine cum	
Sacchari albi libris quatuor, vel.....	2,000
Citissimè tunc coquatur ac demùm reponatur in loco frido ut in Gelatinam concrescat.	

Simili modo paratur Gelatina de Malis et aliis Pomis
Gelatinâ valentibus.

3. GELATINA DE FUO HELMINTHO-CHORTO.

R. Fuci Helmintho-Chorti uncias quatuor, vel...	128
Decoquatur	
In Aquæ libris quatuor, vel.....	2,000
Adde	
Vini generosi albi libram unam, vel.....	500
Sacchari albi libram unam et semis, vel.....	750
Ichtyocollæ prius in aquâ solutæ drachmas duas,	
vel.....	8
Liquorem aliqua, cola; deinde vaporet donec in Gelatinam concrescat.	

4. GELATINA DE LICHENE ISLANDICO.

R. Lichenis Islandici uncias duas, vel.....	64
--	----

Sacchari albi uncias quatuor , vel.....	125
Ichtyocollæ drachmam unam , vel.....	4
Aquæ.....	<i>quod sufficit.</i>
Bulliat primò remissius Lichen in vase figulino ,	
et hujus prioris decocti aqua excludatur ut inutilis.	
Quo facto, decoquatur denuò purus Lichen semel ,	
iterumque ; mixtisque decoctis Ichtyocolla, seorsim	
soluta , et Saccharum admisceantur ; deinde vaporet	
et eliquet liquor; vaporetque denuò donec supersit	
libra semis , vel.....	250
Huic , si libuerit, aromatis alicujus gratia poterit conciliari ex Cortice Citrei aut aliis. Postea in frigidario repone ,	
ut in gelatinam concrescat,	

5. GELATINA DE LICHENE CUM KINAKINA.

R. Lichenis Islandici uncias duas , vel.....	64
Ichtyocollæ drachmam unam , vel.....	4
Aquæ.....	<i>quod sufficit.</i>
Bulliat primò Lichen leviter ut suprà dictum est;	
cujus prioris decocti rejiciatur inutilis aqua.	
Deinde puri Lichenis uni et alteri decocto, paratis	
ut dictum est superius , admisceantur	
Ichtyocolla seorsim soluta	
Et Syrupi de Kinakinâ cum vino parati unciæ sex,	
vel	192
Post levem ebullitionem coletur liquor et vaporet,	
ut concrescat in Gelatinam cujus quantitas erit cir-	
citer libra semis , seu.....	250

EXTRACTA E SUCCIS EXPRESSIS , EX
INFUSIS ET DECOCTIS , È SUCCIS
CONCRETIS.

Extractum dicimus , si aquâ aut aliis liquidis , vino scilicet , Alcoole , etc., macerata , infusa aut decocta fuerit animalis , vegetabilis materia , et liquor eosquè vaporet , donec superstet materies densa , mollis ut plurimùm et tenax . Idem quoque obtinetur si succus expressus plan- tarum , proprio humore liquidus , vaporando similiter concrescat .

Sæpè ex siccis herbis , cùm recentes desunt , paratur extractum , postquam ex iis infusa aut decocta præparata sunt .

Nonnunquam Extracta eò vaporant usquè , dum sicca eva- dant omnino ; tunc , malè admodum aptato nomine , *sales essentiales* dicta sunt , juxta methodum D. *La Garaye* .

Cæterùm in quamcumque densitatem aut formam Extracta vaporando deducantur , expedit ut primò leniter bulliat infusum succusve , donec quarta pars tantum super sit , quæ deinde sub balnei maris calore in debitam spissitudinem densabitur .

Quicumque liquores in Extractum densari debent , antequam vaporent , aut chartâ percolenda sunt emporeticâ , aut eliquanda , vel positis per quietem fæcibus , vel etiam quandoquè ovi albumine .

Ex his patet Extractum , quale apud Pharmacopœos

usurpatur, multum differre ab eo quod Chimici huc usque annumeravere elementis, quibus corpora animalia ac vegetantia, dum integra sunt, constare creduntur, et cuius natura nondum penitus perspecta est.

Extractum autem, quale à Pharmacopœis obtinetur, minimè simplex est, et variis commixtis constat, nec iisdem semper proprietatibus valet.

Pharmacopœorum Extractum solum huc usquè inter medicamina numeratur. Nominibus non paucis fuit insignitum, et, pro variâ ipsius origine, modo *Rob*, modo *Sapa*, modo *Defrutum* dictum est.

Rob nomine intelligebatur fructus cuiuscumque succus, qui fermentando non efferbuit, et qui melli spissitudine æqualis vaporando factus est.

Sapam dixerunt tantummodo Uvarum succum ad eamdem, ad quam *rob* solet, densitatem deductum.

Defrutum succus erat Uvae, æquè ac *sapa*, at pauciori detractâ humiditate, scilicet liquidus adhuc et ad tertias tantummodo vaporando deductus. Cæteris omnibus solum *Extracti* nomen concessum est.

Extracta, cùm sponte et facilè admodum pleraque vitiari soleant, vigilantiū inspicienda sunt, asservanda quoque in vasis faventinis porcellaneisve, et in siccissimo loco reponenda.

I. EXTRACTA EX SUCCIS INSPISSATIS.

1. EXTRACTUM, SEU ROB, DE BACCIS SAMBUCI.

Rob. Succi expressi ex Baccis maturis Sambuci (*Sambucus nigra*)..... quantum opus est.

Cola et coque igne moderato ut in Mellis spissitudinem
consistat.

Simili modo parantur :

Rob seu Sapa ex Uvis, Ribesiis, etc.

2. EXTRACTUM, SEU ROB, DE RHAMNO CATHARTICO.

R. Baccarum Rhamni maturarum... *quantum opus est.*
Ità obterantur ut semina maneant integra, sicque per
triduum in pelle quiescant, ut fermentescere incipient;
subjiciantur deinde prælo, succeusque per pannum trajicia-
tur. Liquor colatus post tres aut quatuor horas decapu-
letur, deinde sub calore modico vaporet, donec succus
in Extractum constiterit.

5. EXTRACTUM FUMARÆ.

(*Fumaria officinalis.*)

R. Succi recentis et aliquati Fumariæ,
..... *quantum opus est.*
Vaporet balneo maris donec in Extractum consistat.

Simili modo fiant Extracta

Menyanthis trifoliatae ;
Scandicis Cærefolii ;
Borraginis officinalis ;
De Fructibus Elaterii (*Ecba-*
lium Elaterium), etc.

4. EXTRACTUM CICUTÆ ABSQUE FECULA.

(*Cicuta officinalis* sive *Conium maculatum.*)

R. Herbæ recentis, tantum non floridæ, et sedulò mun-
datae Cicutæ officinalis..... *quantum opus est.*

Contunde in mortario marmoreo, aspergendo pauxillūm aquæ, et exprimatur succus. Hic succus vel balneo maris, vel bulliendo leviter repurgatus, et deinde colatus, vaporet leni igne, donec in Extractum consistat.

5. EXTRACTUM CICUTÆ CUM FECULA.

R. Herbæ recentis et mundatae Cicutæ officinalis..... *quantum opus est.*

Contunde in mortario marmoreo, sensim addendo pauxillum aquæ, et succum exprime. Succus per incerniculum coletur; bulliat leniter: inter bullendum, ubi aliquantulum coierit, trajice per manicam; deinde vaporet leni igne, donec in Mellis spissitudinem devenerit. Quo facto, et vase ab igne remoto, adde feculam in manicā superstitem. Dein misce et inspissa balneo maris, identidem agitando, ferè ad massæ pilularum densitatem.

Simili modo parantur Extracta

Aconiti (*Aconitum Cammarum*);

Hyoscyami nigri, albi;

Atropæ Belladonæ.

6. EXTRACTUM RHOIS TOXICODENDRI.

R. Foliorum recentium Rhois Toxicodendri..... *quantum opus est.*

Vultu personato, manibus manicis prius ab acerrimo succi vaporisque contactu præmunitis, folia hæc contunde in mortario marmoreo, pistillo ligneo, inspergendo pauxillūm aquæ; exime fortiter succum; dein cola. Liquor colatus

leni calore vel balneo maris vaporet, donec in Extracti spissitudinem constiterit.

Serva ad usum.

N. B. Extractum idem parari potest ex foliis siccatis eodem modo quo Extractum Absinthii et alia. (*V. n^o 8.*)

II. EXTRACTA EX MACERATIS, INFUSIS, DECOCTIS.

7. EXTRACTUM JUNIPERI.

(*Juniperus communis.*)

R. Baccarum Juniperi maturarum et integrarum libras duas, vel..... 1,000

Affunde

Aqua tepidae libras octo, vel..... 4,000

Infundantur per octo et quadraginta horas, identidem agitando; dein colla, et liquor eliquatus vaporet leni igne, donec in Extractum consistat.

8. EXTRACTUM ABSINTHII.

(*Artemisia Absinthium.*)

R. Summitatum Absinthii majoris siccatarum..... quantum opus est.

Infunde per quatuor et viginti horas in aqua bullientis..... quod sufficit.

Dein colla. Colatus liquor vaporet leni igne, ut in Extractum consistat.

Eodem modo fiant Extracta:

Cardui benedicti (*Centaurea benedicta*);

Centaurii minoris (*Erythræa Centaurium*);
 Chamædryos (*Teucrium Chamædrys*);
 Et aliarum herbarum siccatarum.

N. B. Potest etiam eodem modo, sed cum cautelis predictis (nº 6), parari Extractum *Rhois Toxicodendri* ex foliis siccatis.

9. EXTRACTUM RHEI.

(*Rheum palmatum*.)

Rhei electi in frustula concisi libram unam,
 vel 500

Affunde aquæ limpidæ frigidæ libras quatuor,
 vel 2,000

Macerentur vase clauso, per viginti quatuor horas circiter, identidem agitando : dein cola et materiæ superstitti affunde novam quantitatem aquæ. Macerentur ut suprà, et colentur cum levi expressione.

Ambos liquores mixtos per manicam trajice, et vaporent balneo maris, ut in Extractum consistant.

Simili modo parantur Extracta Radicum :

Helenii (*Inula Helenium*);
 Liquiritiæ (*Glycyrrhiza glabra*);
 Lapathi (*Rumex acutus*);
 Gentianæ (*Gentiana lutea*);
 Valerianæ (*Val. hortensis*);

Florum Narcissi (*Narcissus Pseudo-Narcissus*);

Fructuum Colocynthidis (*Cucumis Colocynthis*);

Leguminum, vulgo Follicolorum, et Foliorum Sennæ (*Cassia Senna*), etc.

Agarici albi (*Boletus Laricinus*).

10. EXTRACTUM KINÆKINÆ MOLLE E DECOCTO
CORTICE PARATUM.

(*Cinchona Condaminea*.)

R. Corticis Kinækinæ crassius contriti libras duas,	
vel	1,000
Aquaæ communis libras duodecim, vel	6,000
Bulliant leniter per quadrantem horæ; dein cola.	
Decocti quod residuum est bulliat per quadrantem	
horæ	
In aquaæ communis libris octo, vel	4,000
Liquor colatus et priori mixtus trajiciatur per pannum,	
et sic repurgatus indesinenter agitando vaporet, leni igne,	
donec in Extractum consistat.	

11. EXTRACTUM KINÆKINÆ SICCUM E MACERATO
CORTICE PARATUM, DICTUM VULGO SEL ESSENTIEL
DE LAGARAYE.

R. Corticis Kinækinæ crassius triti libras duas,	
vel	1,000
Aquaæ frigidæ libras duodecim, vel	6,000
Macerentur, identidem agitando, per viginti qua-	
tuor horas, quibus elapsis, liquorem trajice per	
pannum et serva.	

De maceratione quod residuum est maceretur de-
nuò in aquæ frigidæ libris octo, vel..... 4,000
sæpè sæpius agitando :

Deindè cola.

Tum ambo liquores commixti vaporent balneo maris ad
syrupi densitatem.

Hunc liquorem sic addensatum divide, ut diffundas super
orbes planos fæventinos, ità ut non supereret in singulis alti-
tudinem duarum linearum, et sic balneo maris, aut in cli-
bano, vaporēt ad siecitatem.

Extractum orbibus hærens cultello obtuso abrade; quod
sic secedet in lamellas tenues, nitidas, pellucidas, hyacin-
thino colore; servandum in vase accuratè clauso.

Eodem modo parari possunt Extracta sicca:

Sennæ (*Cassia Senna*);

Rhei (*Rheum palmatum*);

Opii;

Et multarum herbarum et radicum,

12. EXTRACTUM IPECACUANHÆ, *EMETINA* DICTUM, JUXTA
METHODUM D. PELLETIER, PHARMACOPOEI PARISIENSIS.

(*Cephaelis emetica.*)

Radicis Ipecacuanhæ in pulverem tritæ, excluso li-
gneo meditullio, unciam unam, vel..... 52

Ætheris sulfurici (50=60 B⁴) uncias duas, vel... 64

Pulvis simul cum Æthere excipiatur clauso vase,
et, ne dispereat Æther, destillationi apto; deinde
maceretur sub modico calore, per aliquot horas.

Quod supererit iterum teratur, et in

Alcoolis (50=40 B⁴) unciis quatuor, vel..... 128
maceretur primò, ac deindè bulliat.

Coletur liquor, residuaque materies iterum, tertiumque etiam, novo Alcoole maceretur bulliatque, donec nihil prorsus ex radice in Alcoolem cedat.

Tunc mixti liquores Alcoolici vaporent ad siccitatem. Extractum hoc Alcoholicum maceretur in Aquæ stillatæ frigidæ..... sufficienti quantitate, ut quidquid in aquâ solubile est extrahatur.

Solutio aquâ sic parata coletur per chartam, et vaporet ad siccitatem.

Extractum hoc aquâ solubile *Emetina* dictum est, et aequaliter radicis ipsius aut 0,16, aut 0,14, scilicet, circiter 1/6 vel 1/7.

N. B. *Emetina* hæc, quantumvis ad usus medicos pura haberi possit, etiamnū creditur tenere Acidi Gallici circa 0,005; quod, ad severiorem analysisim, posset facile ab ipsâ separari artificio viris chymicis non ignoto; quod tamen hic omittendum censuimus, ut supervacaneum.

III. EXTRACTA È SUCCIS CONCRETIS, MEDIAN- TIBUS AQUA AUT VINO.

15. EXTRACTUM OPII VINO PARATUM SEU *LAUDANUM* *OPIATUM*.

R. Opii electi et mundati, frustulatum
secti *quod volueris.*

Vini albi quantum sufficit ad solvendum Opium. Fiat solutio sub balnei maris calore.

Solutionem fortiter expime per linteum densum; dein liquor, positis fecibus, sedulò decapulatus, vaporet balneo maris, ut in Extractum consistat.

14. EXTRACTUM OPII AQUA FRIGIDA SOLUTI, JUXTA
METHODUM CEL. CARTHEUSER A D. CROHARÉ EMEN-
DATAM.

R. Opii electi et in taleolas secti libram unam,
vel..... 500
Aqua communis libras quatuor, vel..... 2,000

Simul mixta reponantur in tepidario, identidem agitando per biduum. Liquor percolatus per biduum alterum quiescat; cui tum innatabit pellicula odoris virosi. Liquor ope chartae emporetice percolatus vaporet leni igne ad dimidiis; qui, adhucdūm modicē turbidus, rursūs quiescat in tepidario per biduum, et supernatabit pellicula virosa nova. Denuò percolatus liquor vaporet demūm, donec in Extractum consistat; quod tunc fiet, ipso ad finem usquè puro et minimē turbido permanente, et sic habebitur Extractum omni odore viroso carens.

15. EXTRACTUM OPII FERMENTATIONE PARATUM,
JUXTA METHODUM D. DEYEUX.

R. Opii selecti in taleolas dissecti... *quantum opus est.*

Maceretur in aquā cum fermenti de Cerevisiā quantitate sufficienti, sub eo caloris gradu (scilicet 20—25 centig.) qui fermentationi siveat.

Liquor ubi limpidus evaserit, aquā additā diluendus est, et colandus per chartam emporeticam. Bulliat deinde, donec odor virosus omnis evanuerit; denique vaporet, et in Extractum solidius addensetur; quod sic carebit omni virosā parte.

16. EXTRACTUM OPII PER LONGAM DIGESTIONEM
PARATUM, JUXTA FORMULAM DOCTORIS DE DIEST.

R. Opii electi et in taleolas secti libram unam, vel. 500
Aqua communis libras quatuor, vel..... 2,000
Bulliant leviter per semihoram : dein cola et colatum
liquorem serva.

Quod residuum est eodem modo decoquatur, et pari
aqua quantitate, bis terve. Quo facto, decocta colata exci-
piantur cucurbita stannea quae imponatur balneo arenæ, ita
ut liquor, supposita lampade calefactus, bulliat indesinenter,
leniterque per sex menses.

Curandum est ut cucurbita semper ferè plena sit;
quod fit, si liquori per ebullitionem in vapores disperso
identidem æqua sufficiatur quantitas aquæ communis stil-
latæ.

Notandum est etiam liquorem interdum transfundendum
esse, ut à limo qui in fundo cucurbitæ secessit separetur.
Post sex menses liquor refrigeratus coletur accuratè per
pannum aut chartam bibulam, et vaporet balneo maris, ut
consistat in massam pilulis informandis aptam.

Servetur ad usum in vase probè clauso.

N. B. Hanc formulam servavimus, ut diù celebrem, et cui
viri in arte non mediocris auctoritatis peculiarem tribueret
amant etiamnū efficaciam, innocentiaque pretium.

17. EXTRACTUM MYRRHÆ.

R. Myrrhae electæ..... *quod opus est.*
Solvatur in aquæ bullientis sufficienti quantitate ; friges.

cat; coletur liquor cum expressione et vaporet donec in Extractum consistat.

18. EXTRACTUM ALOES AQUA PARATUM.

R. Aloes Soccotrinæ contusæ..... quantum opus est.
Affunde aquæ ferventis..... quod sufficit.

Fiat solutio balneo maris, identidem agitando; liquoremcola; positâque tenuiori fæce, decapula; dein vaporet balneo maris, eodem modo, et in iisdem vasis ad siccitatem.

N. B. Potest etiâ aquâ frigidissimâ eadem solutio parari, ut Extractum resinâ omnino careat.

19. EXTRACTUM SEU PRÆPARATIO CATHECU.

R. Cathecu selecti et in pulverem contriti libram unam, vel..... 500
Aquaæ calentis libras quatuor, vel..... 2,000
Infunde per aliquot horas ad perfectam solutionem; cola per setaceum. Liquor residendo desecatus vaporet ad siccitatem balneo maris.

20. EXTRACTUM CASSIÆ.

R. Pulpæ è Cassiæ leguminibus exemptæ, et à seminibus et dissepimentis separatæ, libram unam, vel 500
Solve agitando in aquæ communis frigidæ libris quatuor, vel..... 2,000
Dein liquorem per pannum trajice, et vaporet leni calore, donec in Extractum consistat.

21. EXTRACTUM FELLIS BOVINI.

R. Fellis Bovini recentis..... quantum opus est.

Diluatur in pari quantitate aquæ, bulliat, despumet, coletur per linteum; dein vaporet balneo maris, donec in Extractum consistat.

Eodem modo paratur Extractum

Fellis Vitulini.

IV. EXTRACTA MEDANTIBUS VINO ET
ALCOOLE, ADJUVANTE SUBCARBONATE
POTASSÆ.

22. EXTRACTUM HELLEBORI NIGRI, JUXTA METHODUM
DOCTORIS BACKER.

R. Radicis siccatae Hellebori nigri mundatae et	
contusæ libras duas, vel.....	1,000
Carbonatis Potassæ libram semis, vel.....	250
Alcoolis (12=22 B ⁴) libras octo, vel.....	4,000

Omnia excipiantur *matratio*; suprà arenam mediocriter calentem imponantur; digeranturque per duodecim horas, identidem agitando: cola et exprime.

Residue materiei affunde Vini albi veteris et generosi libras octo, vel..... 4,000

Et in *matratio* arenæ balneo imposito digerantur per viginti quatuor horas; cola et exprime: quiescat liquor per quatuor horas, positâque fæce, cùm limpidus evaserit, ipsum transfundere; cum priori misce, simulque vaporent leni calore, donec in Extractum consistant.

V. EXTRACTA EX INFUSIS ALCOOLICIS.

23. EXTRACTUM KINÆKINÆ ALCOOLE PARATUM.

(Cinchona Condaminea.)

R. Tincturæ de Kinakinâ plenè saturatæ ope Alcoolis gradus (12=22 B⁶)..... quantum opus est.

Destillet balneo maris ut quarta pars supersit, quæ leni calore deinde vaporet, donec in Extracti sicci soliditatem consistat; quod Extractum servandum est in vasis accurate clausis.

Pari ratione possunt Extracta parari Alcoolica de aliis Cinchonæ corticibus, scilicet *oblongifoliae* aut rubro, *lanceolatae* aut aurantiaco, etc.

Simili modo parari potest Extractum

Ratanhiæ (*Krameria Ixina*);

24. EXTRACTUM DE NUCE VOMICA ALCOOLE PARATUM.

(Strychnos Nux vomica.)

R. Nucis vomicæ radulâ in scobem redactæ.... 50
Alcoolis (12=22 B⁶)..... 200

Excipientur cucurbitâ operculo tectâ; incalescant per viginti quatuor horas; per telam trajice; quod residuum est prælo exprime; expressa massa, affusis iterum Alcoolis 150
codem modo digeratur; trajiciatur liquor, exprimatur, collectur, priori misceatur;

Tum simul destillent balneo maris, donec pars totius quarta supersit. Quod superest vaporet balneo eodem, donec in Extractum consistat.

N. B. Alcool destillatione elicitus notâ inscriptâ servabitur,
ut simili Tincturæ unicè inserviat.

25. EXTRACTUM DE CANTHARIDIBUS ALCOOLE
PARATUM.

R. Tincturæ Cantharidum modo superius proposito pa-
ratæ..... *quantum opus est.*

Destillet priùs balneo maris, donec quarta pars supersit.
Quod residuum est vaporet balneo eodem, donec in Ex-
tractum constiterit.

N. B. Alcool sic destillando elicitus, notâ inscriptâ ser-
vetur, ut Cantharidum tincturæ parandæ unicè inserviat.

EXTRACTIO RESINARUM.

Præter Resinas spontè ex vegetantibus vel illæsis, vel
incisis stillantes, sunt aliæ, quæ, ipsorum textui inter-
mixtæ, variis eliciuntur artificiis, nec puræ aliter obtineri
queunt.

Quædam venales vulgò prostant apud pharmacopolas;
verùm, ut plerūmque impuriores sic habentur, ità nullis
uti debet Pharmacopœus, nisi propriâ illas ipse manu pa-
raverit, aut admixtis saltem purgaverit heterogeneis.

Sit in exemplum JALAPÆ RESINA.

R. Tincturæ Jalapæ, modo superius præscripto (*v. pag.*
121) paratæ..... *quantum opus est.*

Destillet balneo maris, donec liquoris dodrans in excipula
transierit. Quod residuum est æquali aquæ stillatæ quan-

titate remisceatur; fiet turbidus liquor. Praecepis ad ima se-
retur materies copiosa, quam percolando separabis omnem.
Eluatur eadem aquâ stillatâ repetitis vicibus; et humore
penitus exhausto, cautè exprimatur: habebitur materia
ferè sicca, friabilis, quæ, denuò modico calore Alcoole
soluta, vaporabit ad siccitatem, et erit pura admodum Jalapæ
Resina.

Simili modo parabuntur:

Resina Scammonii,
Corticis Peruviani,
Et aliorum Corticum et Radicum.

SECTIO SEPTIMA.

*Medicamenta per analysim Chymicam è
corporibus elicita.*

ACIDA, ALKALIA ET SUBCARBONATES ALKALINI, METALLA,
SULFUR, PHOSPHORUS, CARBONES.

I. ACIDA.

ACIDA in usus medicos non mineralia tantum aptantur, sed et ea plurima quae è vegetantibus, animalibusque eruuntur.

Quà arte pura et sincera parari possint, suo loco patet, ubi de singulis agetur.

Mineralia tamen, cum in multiplices artium usus majoribus in officinis magnâ copiâ parentur, à Pharmacopœo confici non expedit; sed ipsi ea certè incumbit cura, ut quae coempta suscepit, ea sibi purgando summè pura comparet, ut nullum ex ipsis medicamentum nisi sincerum, et ab omnibus alienis perfectè liberum habeatur.

Præterea necessarium est ut, antequam in compositiones chymicas adhibeantur acida quaelibet, eorum densitas areometro omnino probata et perspecta sit, quandoquidem

natura componendorum varia emergit, prout diversimodè addensata acida in varias syntheses admittuntur.

1. ACIDUM SULFURICUM.

Acidum hoc vulgò venale coëmitur; tamen ut purum habeatur, sequenti artificio purgari debet.

PURGATIO ACIDI SULFURICI.

R• Acidi sulfurici vulgò venalis (66 $\frac{2}{3}$)..... 1,000

Infundatur in retortam vitream loricatam et longioris colli, ità ut pars quarta capacitatis vacua supersit.

Balneo arenæ imponatur, balnei trullâ craticulâ furni suffultâ; aptetur retortæ collo excipulum vitreum sphæricum, juncturis luto liberis. Collum autem retortæ in excipuli ca- vum ad ipsius medietatem usquè protendatur. Ac demùm, fornice suprà retortam furno aptatâ, ignis submittatur. Mo- dicè primùm incalescat apparatus, crescenteque igne, acidi primùm debilioris exstilla bit circiter pars quindecima, quam seponi curabis. Aptato iterum excipulo, cireumpositis pannis calentibus, vis ignis ità increscat, ut leniter in retortâ bulliat acidum, destilletque totum, ferè ad siccitatem.

Purum sic habebitur acidum sulfuricum, quod asservabitur in lagunculis probè obturatis. Notabit gradus in areome- tro 66, ipsiusque densitas erit, 1,847.

2. ACIDUM SULFUROSUM.

R• Mercurii purissimi..... 300

Acidi Sulfurici puri (66 $\frac{2}{3}$)..... 750

Destillent simul in retortâ vitrâ loricatâ, cui aptabitur vasorum apparatus dictus *de Wouf*; quatuor constans la- gunculis, tubis ad apparatus securitatem, ut artis est, inter-

sertis. Laguncula prior parcam admodum aquæ stillatæ quantitatem teneat; tres autem subsequentes singulæ capiant aquæ circiter 250; ità verò disponatur apparatus, ut incurvorum tuborum pars longior, cuique lagunculæ inserta, fundo tenus aquæ immergatur.

His ità dispositis, vasorumque juncturis luto obseratis, igne submisso, tamdiu incalescat retorta, donec nulla pars vaporis acidi laguncularum aquâ jam solvi queat, integræque per eam ad ultimam usque lagunculam transeant bullæ; quod fiet, sub temperie 10 ad 15°, ubi aquæ mensura una receperit tres et triginta mensuras gaz acidi sulfurosi, pondere æquantes aquæ ipsius $\frac{91}{1000}$.

Absoluto opere, vasa luto liberentur, sepositâque prioris lagunculæ aquâ, cui Acidi Sulfurici non nihil solutum inhæredit, quidquid in reliquis habebitur, Acidum erit Sulfurum liquidum. Hujus in areometro nota erit 7, densitas autem invenietur 1,053.

Qui verò in retortâ superest *Sulfas Mercurii Acidus*, servari potest alios in usus.

Nota. Aquæ puræ in locum si lagunculis immissa fuerit solutio, seu Potassæ, seu Sodaæ, seu Ammoniæ, habebuntur, pro solutionum naturâ, *Sulfites Potassæ*, *Sulfites Sodaæ*, *Sulfites Ammoniæ*, qui vaporando ita addensari poterunt, ut in crystallos concrescant.

3. ACIDUM NITRICUM.

R.	Nitratis Potasse purissimi.....	5,000
	Acidi sulfurici (66°).....	2,000

Congerantur in retortam fictilem capacissimam, furnoque, fornice impositâ, committantur; aptato ad retortæ collum tubo intermedio in ventrem ampliato (*allonge*), et sphærio excipulo tubulato. Hujus ostio inseratur tubus incurvus in

sphærulam dilatatus, cuius crus alterum descendat in lagunculam, et in eā aquae immergatur. Eidem lagunculae tubus alius insertus, rectus, longior, in auras supernè ita pateat, ut vapores indē altius erumpentes, quibus inest aliquid sæpè gaz nitrosi, os oculosque opificis afficere nequeant. His omnibus sic dispositis juncturæ obturentur luto; modico igne ita incalescat retorta, ut Acidum expeditum guttatum stillet tantum; subque finem operis gradatim ignis increscat, donec nihil amplius in excipulum transeat. Absoluto opere, frigescente demùm apparatu, Acidum Nitricum in excipulo collectum invenies et servabis in usum.

N. B. Quod si, ex Nitrate minus puro, minus quoque sincerum Acidum obtinuisse contigerit, scilicet Acidis Sulfurico, Nitroso, Muriatico, aut Muriatico oxygenato (*Acido hydrochlorico, aut Chlоро*) adulteratum; ipsum tunc in retortam vitream indito cum

Nitratis Potassæ..... 60

Tubumque collo retortæ intermedium et sphæricum excipulum aptato, juncturis luto liberis; tunc destillet supra arenam ad siccitatem. Hac arte Acidum Sulfurico Nitricum liberabitur.

Deinde ipsum indito in *matratium* colli longioris, ibique, partitis vicibus, æquali aquæ quantitate agitando remisceatur. Deinde suprâ arenam incalescat et vaporet, donec gradum 42 in areometro notaverit, densitatemque obtinerit 1,412 æqualem. Tunc demùm dissipatis Gaz Nitroso et Muriatico Oxygenato (*Chlоро*), purissimum evadet Nitricum Acidum; quod servabis in laguncula crystallo obturatâ, loco reponendâ obscuro.

4. ACIDUM NITROSUM LIQUIDUM.

R. Cupreæ scobis..... 600

Acidi Nitrici (18°) (1)	2,000
Acidi Nitrici purioris (42°)	500

Cuprum in lagunculam ostio duplice tubulato patentem indito. Uni ostio inseratur tubus, bis sùs-deque in ∞ figuram reflexus et inflexus, superius in infundibuli formam dilatatus. Ex altero ostio, tubo mediante incurvo, siphunculi formâ, via pateat in secundam lagunculam, quâ contineantur aquæ circiter 200

Huic extremum longiusque tubi crus immergetur. Ex hâc lagunculâ simili tubo via similiter pateat in tertiam, tenentem Acidum Nitricum purum, quantum præscripsimus, in quod extremus profundè descendet tubus: ac demùm tubus alias ex tertia lagunculâ extus in aquam ultimò immergatur. Tunc intersertis, ad apparatus securitatem, rectis in secundam et tertiam lagunculam tubis, juncturæ omnes luto obturentur.

His itâ dispositis, Acidum Nitricum debilis paulatim, partitisque vicibus, intrâ spatum duorum, triumve dierum, totum per infundibulum tubi prioris infundatur in lagunculam Cuprum tenentem. Effervescat Acidum Cupro mixtum. Gaz indè expeditum Nitrosum, per aquam transmissum, in Acidum Nitricum deseretur, quod, eo soluto, fiet Acidum Nitrosum. Opere plenè absoluto, Nitrosum acidum lagunculâ excipies crystallo obturatâ, et loco reponendâ obscuro. Hoc acidum gradus notabit 38, densitate æquabit 1,559.

5. ACIDUM MURIATICUM LIQUIDUM, RECENTIORIBUS DICTUM ACIDUM HYDROCHLORICUM.

R. Salis marini, post quam igne sat concereput, ut ipsius quantitas apprimè constet..... 5,000

(1) N. B. Acidum Nitricum habebis notans decem et octo gradus, si Acidum Nitricum vulgò venale, scilicet 54 graduum, pari aquæ stillatae quantitate remiscueris.

Aquæ communis.....	70
Congere in <i>matratium</i> longioris colli capacissimum, et misce intimè. Imponatur arenæ <i>matratium</i> , ipsius- que collo tubi duo inserantur; unus bis, sùs deque, in ∞ figuram erit incurvus, et superius dilatatus in infundibuli formam; alterius tubi, siphunculi for- mâ, crus extremum excipietur lagunculâ sub aquæ circiter.....	200
Indè quoque per tubum alium via pateat in aliam lagunculam quæ contineat aquæ.....	2,000

Tubusque sub ipsam aquam non ità profundè des-
cendat. Ex secundâ demùn hâc lagunculâ tubus
ultimus aquæ quoque exterius immergatur.

His ità dispositis, tubisque ad apparatus securitatem
intersertis, juncturas obtura. Tunc, partitis vicibus, in
matratium per infundibulum prioris tubi injice, ubi
post misturam refrigeruerint,

Acidi sulfurici (66%).....	5,000
Remixti Aquæ stillatae.....	750
Modicè admodùm arena tamdiù incalescat, dum gaz erumpens vividiùs aestuabit; sub finem autem, ubi pau- lulùm deserbuerit liquor, vis ignis augeatur sensim, pers- tetque donec nullum prorsùs Gaz emanet.	

Haec dum peraguntur, aqua prioris lagunculae vapore sa-
tura flavescit primò, deindè reliquum Gaz purius per ipsam
transmittitur in ultimam lagunculam, cujus aqua demùm
ipsa quoque saturata vertetur in Acidum Muriaticum pu-
rissimum et colore carens. Gradus notat 24, densitate æquat
1,200.

N. B. Laguncularum capacitas aquæ contentæ copiam
tertiâ totius parte superare debet, ut ipsi capienda par sit,
cùm liquoris quantitas, post absumptum gaz, non parùm
increverit.

6. ACIDUM MURIATICUM OXYGENATUM LIQUIDUM, QUOD
CHLORUM AQUA SOLUTUM RECENTIORES NUNCUPAVERUNT.

R. Salis marini, postquam igne sat concrepuit. 1,000

Oxidi Manganesii..... 250

Aquaæ stillatae..... 500

Sal et Oxidum misceantur, congeranturque in retortam vitream, ostio tubulato superius instructam.

Aquam tune super affunde, et omnia agitando probè misceantur.

Imponatur arenae retorta, colloque tubus aptetur, quem ex alterâ parte excipiēt lagena triplici ostio tubulato patens, et aquâ stillatâ ad summum ferè plena.

Huic duo vel tres aliae lagunculæ, aquâ itâ plenæ, ut quarta pars vacua supersit, tubis mutuò perviae, adjungantur; tubique alii recti ad securitatem interserantur; juncturæ luto obturentur.

His itâ dispositis, Acidi Sulfurici (66^g)..... 1,000

Remixti Aquæ stillatae..... 500

postquam mistura refrigeruerit, in retortam unâ vice injiciantur.

Ostium retortæ tubulatum obturetur illico; continuò Gaz sese expediet, et perget per duos tresve dies, etiam calore non adjuvante. Tunc, subductis, si satura fuerit aqua, prioribus lagunculis subjiciantur aliae, ac demum igne modico retortâ incalescente, nova bullarum copia itâ erumpet, ut aqua laguncularum iterum ipsis saturetur.

Hanc aquam Acidu Muriatico Oxygenato, seu Chloro saturam servabis in lagenis perfectè obturatis, chartâ nigrâ extus glutinatâ obductis, et in loco reponendis prorsus luci impervio.

N.B. Ea quam præscripsimus materiarum copia sufficiet ut indè facilè saturari possint aquæ..... 40,000, adeòque commode admodum adhiberi poterunt lagunculæ, è quibus, peculiari ostio, propè fundum pro lubitu aperiendo, in alia vasa, non soluto apparatu, defluere possit saturatus liquor; vacuatæque lagunculæ aquâ, iterum saturandâ, impleri poterunt, per tubos ipsos securitatis causâ interertos. Aquæ mensura una sesquialteram Chlori absumere valet, adeòque ponderis sui $\frac{1}{194}$.

7. ACIDUM PHOSPHOROSUM.

R. Phosphori bacilli tubis inserantur vitreis sesquideci-metrum longis, centimetalri diametro, alterâ extrémitate in capillarem ferè tenuitatem ductâ. Tubi isti æquo ordine dispositi immittantur in infundibulum, cuius emissarium inse-ratur collo lagunculæ. Omnibus tunc superinducatur cam-pana vitrea, ad fastigium et ad latus tubulata, vase excipien-da, cui tantùm aquæ infundatur quantum sufficiet, ut ora in-ferior campanæ ipsi immergatur. Phosphorus diffluet, in aci-dum liquorem versus, guttatumque, et ex tubis, et ex in-fundibulo destillans, in lagunculam confluet.

Hâc operâ, non equidem brevi absolvendâ, habebitur Aci-dum Phosphorosum liquidum, sed lentescens et coloris ex-pers. Nullius hûc usquæ rebus in medicis usûs est.

8. ACIDUM PHOSPHORICUM.

R. Phosphori..... 500
Acidi Nitrici (32g)..... 4,000

Arenæ balneo imponatur retorta vitrea tubulata, inter-poitoque tubo, ipsi aptetur excipulum sphæricum, et la-gunculæ dueæ *Woulfianæ*, tubis ad apparatûs securitatem in-

tersertis, aquam tenentes. Juncturis luto obseratis, retortæ infunditur Acidum, quod deinde igne incalescat donec bulliat; tunc demùm immittatur frustatim Phosphorus.

Tandiù verò operi instandum est, quandiu introrsus exhalabit nitrosus vapor; abstinentem autem ubi, hoc cessante, Acidum Phosphoricum quod in retortâ perstitit omni colore carebit.

Acidi Phosphorici frigidi plerūmque nota 70 est graduum, densitas 1,946; ipsum verò in usus medicos aquâ stillatâ itâ diluunt, ut ad gradum 45 deducatur, et ad densitatem 1,454.

Notandum autem, dum opus peragitur, Acidum fieri densius, itâ ut sub finem Phosphorus non jam fundum petat, sed innatet; aëris igitur contactu tunc tantum combustus, in excipulum transiret. Hæc ne contingant, tunc temporis cessandum est, et apparatu frigesfacto, refuso in retortam quod in excipulum cesserat Acido, iterum incalescat retorta, additoque quod Phosphorisuperest, fieri pergit, donec absoluta sit, operatio.

g. ACIDUM ACETICUM. ACIDI ACETICI DESTILLATIO DEBILIORIS, VULGO ACETUM STILLATITIUM.

R. Aceti de vino optimi..... *quantum opus est.*

Destillet balneo arenæ ex retortâ vel cucurbitâ vitrâ, ferè ad dodrantem, divisis in duo aut tria excipula, pro destillationis tempore, partibus.

Tunc, distillatione interruptâ, quidquid in excipula transiit in lagunculis totidem servetur.

Qui primus destillavit liquor Acidum Aceticum est debilius, sed suavius olens.

Ultima pars densior est meraciorque, sed ob odorem empumaticum deterior.

10. ACIDUM ACETICUM PURUM, VULGO *ACETUM RADICALE.*

R. Acetatis Cupri in pulverem redacti et exsiccati.....
..... *quantum opus est.*

Ex retortâ fictili in excipula destillet, igne sensim aucto,
donec exhaustus sit Acetas.

Liquorem sœpè tantillūm viridem arenæ balneo, ut artis
est, destillando puriorem habebis.

Sic prodibit Acidum Aceticum, coloris expers et fragran-
tissimum, quod in areometro notabit 10 gradus, et cuius
densitas æquabit 1,075.

11. ACIDUM TARTARICUM.

R. Tartratis aciduli Potassæ..... 1,000
Dilue in aquæ bullientis sufficienti quantitate.

Dein partite et paulatim injice Carbonatis Calcis
in pulverem redacti 400

Vel quantum sufficit ad perfectam Acidi saturatio-
nem. Liquor turbidus quiescat. Transfundatur qui
limpidus evaserit; qui verò subsedit Tartras Calcis,
eluatur affusâ identidem, donec insipida exstillet,
aquâ. Tunc Tartrate Calcis in vase fictili recepto et
aquâ calidâ diluto affunde,

Acidi Sulfurici (66g)..... 400

Liquor acidus quiescat, limpidus decapuletur, vaporet
balneo maris ad dimidias et ultrà.

Iterùm, igne remoto, quiescat, factusque illimis trans-
fundatur liquor, ac demùm vaporet ad eam densitatem ex
quâ concrescant crystalli, quas, repetitis solutionibus, puras,
nec non pellucidas obtinebis. Iis Acidum Tartaricum constat.

N. B. Liquor primus, in quo Tartras Calcis subsedit,
Tartratem Potassæ nullatenus acidulum continet, qui in crys-
tallos concretus servari potest ad medicos usus.

12. ACIDUM OXALICUM.

R. Sacchari in pulverem triti..... 500
Acidi Nitrici (52⁸)..... 5,000
Intromittatur Saccharum in retortam multi liquidi
capacem, tubulatam, arenæ balneo imponendam.
Huic aptetur sphæricum excipulum ex quo per tu-
bum incurvum pateat exitus in lagunculam aquâ
plenam.

Per retortæ tubulum primò injiciantur Acidi.... 1,500
Seu dimidia pars totius; modicè incalescat arena; effe-
vescet liquor; ubi cessaverit, vaporet; formabuntur crystalli,
quas, ubi secesserint, eximes; tunc superstiti liquori affundes
quod Acidi superest; qui, ubi deserbuerit iterum, vaporabit,
crystallosque ponet. Has quoque exemptas, prioribus ad-
mixtas aquâ bulliente solves, purioresque demùm Acidi
Oxalici crystallos, ubi sufficienter liquor vaporaverit, ob-
tinebis.

13. ACIDUM CITRICUM.

R. Succi de Citreis expressi..... *quantum opus est.*
In vas faventinum indito; incalescat balneo maris; adda-
tur deinde partitum.
Carbonatis Calcis..... *quantum sufficit*,
ut saturetur Acidum. Ubi subsederit Citras Calcis, effuso
liquore, eluatur aquâ calidâ pluries, donec ea exsiliet co-
lore ferè expers. Quo facto, sicetur.
Deinde
R. Citratis Calcis dictâ methodo parati..... 5,000

Vase fietili, siliceo, vel saventino excipientur, additis Aquæ.....	6,000
Diluto penitus Citrate, adde	
Acidi Sulfurici (66 ⁵).....	2,000

Moveatur massa, quiescat; diluatur etiamnum in
aque..... 12,000

Incalescat lentè, et demùm bulliat liquor in vase argen-
teo vel plumbeo; et, ubi subsederit Sulfas Calcis, trans-
fundatur et percoletur.

Sulfas qui subsidit eluatur, donec aqua nihil prorsus indè
sapiat; aquæ omnes, liquori commixtæ priori, vaporent bal-
neo maris, donec superficie pellicula innatet; tunc in calida-
rio reponatur liquor; subsidet in crystallos Acidum Citricum.

Quæ, ut puræ evadant, aquâ stillatâ solvendæ sunt, for-
mataeque iterum, iterumque solutæ, demùm purissimæ
obtinebuntur et servabuntur ad usum.

14. ACIDUM BENZOICUM JUXTA METHODUM SCHEELIA- NAM.

R. Calcem aquâ solutam dilutamque, quam di- cunt lac Calcis, scilicet Calcis.....	1
Dilute in Aquæ.....	52
Benzoës in pulverem tritæ.....	4

Misceatur primùm Benzoës pulvis cum solutæ Calcis quintâ
circiter parte, ac deindè paulatim addatur tota solutio. Bulliat
sic mixtus liquor per horæ quadrantem, simulque agitetur in-
desinenter; mox ab igne remotus quiescat, et qui limpidus
evaserit transfundatur. Quod subsidet sedimentum novâ ejus-
dem aquæ calcis quantitate eluatur iterum atque iterum. Li-
quores singulis vicibus elutriati, et qui priùs sepositus est, simul
misceantur. Vaporent donec pars liquidi 16^a tantum supersit.

Sic parato liquori guttatim admiscebitur Acidum Muria-
ticum, donec nihil prorsus subsidat, et liquor ipse gustu
sentiatur non obscurè acidus.

Quæ subsederit materies chartâ bibulâ percolata , frigidâque lota non semel aquâ , Acidum est Benzoicum, quod duplixi interpositum chartæ exsiccabitur.

Hoc si , igne supposito , sublimare velis , habebis crystallos , acicularum formâ , levissimas et lætissimè splendentes.

Vasis vitreis perfectè obturatis , et obscurò in loco repositis , asservandum est *Acidum Benzoicum*.

15. ACIDUM BENZOICUM PER SUBLIMATIONEM , OLIM
FLORES BENZOINI.

R. Benzoës optimæ , in pulverem tritæ non tenuissimum quantum opus erit.

Habeantur cymbia duo fictilia , quorum unum inversum alteri imponatur. Benzoë impleatur inferius , superiusque ipsi aptetur , junctis invicem oris , circumductâ chartaceâ fasciâ conglutinatis. In superius autem cymbium aëri , cum lubebit , identidem pateat exitus per angustum foramen chartulâ obturandum.

His itâ coaptatis , igne supposito , modico calore in superioris cymbium Acidum Benzoicum concrescit in flores albissimos , singulis horis colligendos. Ubi autem flavescent cessandum est.

Servabuntur in vase accuratè clauso.

16. ACIDUM BORACICUM AUT IN CRYSTALLOS CONCRETUM,
AUT SUBLIMATUM.

R.	Sub-Boratis Sodaे purissimi	320
	Solvatur in Aquâ stillatæ bullientis	1,600
	Cola et partitum adde	
	Acidi Sulfurici (66 ²)	100
	Resideat liquor , quo frigescente subsident crystalli , quas frigidâ lotas , iterum aquâ bulliente dilues ; undè iterum	

subsident crystalli puriores, quibus constat Acidum Boracicum.

Quod Acidum si sublimatum habere volueris, concretumque nivis instar, florum nomine, vaporet liquor donee pellicula supernatet; tunc, aptato cucurbitae capitello et receptaculo, destillet super arenam ad siccitatem. Aqua, quæ prior des. tillavit, abjiciatur; quæ posterior, servetur. Cum nihil stillat humoris amplius, sal volatile sublimatur nivem aliquatenus referens: hoc exempto, vasis refrigeratis, materiæ superstitione servatam liquoris stillatitii postremam partem affunde; destillet, liquorem serva; sublimati flores prioribus habebuntur copiosiores; servatusque liquor, superstitione materiæ affusus, novos aget flores; quod iterari potest, donec nihil amplius sublimando concrescat.

17. ACIDUM SUCCINICUM.

V. SECT. IV, art. IV, pag. 64.

18. GAZ ACIDUM CARBONICUM.

R. Carbonatem Calcis marmoreum, electo Marmore candidissimo.

Eum in frustula comminutum, in apparatu vasorum convenienti, Acido affuso muriatico (seu *Hydro-Chlorico*) ita dissolve, ut Gaz Acidum Carbonicum ex effervescente carbonate emanans, per aquam, ut purius habeatur, trajectum, excipiatur vasis notæ capacitatis, quibus ad usum asservabitur.

Si, ad idem Gaz parandum, Cretam in Marmoris locum suffeceris; ea prius igne modico incandescat, ut odore prorsus careat. Tunc tritam et aquâ dilutam solve, admixto Acido Sulfurico; et eodem vasorum apparatu Gaz excipiatur.

N. B. Acido Muriatico præstat uti, cùm è Marmore Gaz elicitur; quia ex Acido Sulfurico concretus ad frustulorum superficiem sulfas calcis, brevi efficeret ne penitus Acido solveretur marmor; atque adeò, opere infecto, Acidi Carbonici effluvium subsisteret.

II. ALKALIA ET SUBCARBONATES ALKALINI.

ALKALIA LIXIVA; CARBONATES ET SUBCARBONATES ALKALINI; ALKALIA.

*ALKALIA LIXIVA, ALKALIA È CINERIBUS LIXIVIS
VAPORANDO CONCRETA, SALIA LIXIVA DICTA.*

Alkalia ista generatim constant mixtis Carbonate Potassæ aut Soda et neutrī aliis salibus, qualia sunt Sulfas Potassæ, Sodaque, Murias Soda aut Potassæ, etc., quibus abundant cineres ex combustis variis plantarum speciebus.

Indè conjectandum est, è tali variorum incertâque missione, varios edi debere effectus; neque certè constare quid ab hoc medicamentorum genere expectandum sit. Nihilominus, cùm ea sæpius à medicis usurpentur, quo modo parari debeant à Pharmacopœis hic exponere utile visum est.

Hoc salium genus semper fusco colore infectum est, et vasis asservandum perfectè clausis; pleraque enim humorem aéreum in se contrahere amant.

1. SAL PLANTARUM TACHENII METHODO PARATUM.

R Plantæ cujuslibet siccatae, Absinthii (verbi gratiâ) *quantum opus est.*

Injice in cacabum ferreum operculo munitum ; ignem admove itâ temperatum , ut lentè comburatur planta et in carbonem vertatur , sumos quidem emitendo quâm plurimos , sed nullâ erumpente flammâ. Dein auferatur operculum , et igne continuato ustuletur carbo prædicto modo paratus , cavendo imprimis ne scintillando flammâ emittat , massamque indesinenter agitando virgâ ferreâ , quamdiu aliquid remanserit carbonis in cineres nondum conversi. Cinis ille posteâ cum aquâ purissimâ , quæ ipsius pondus superet sexies , fortissimè bulliat. Lixivia hæc fervens coleatur per linteum : colata vaporet in vase ferreo ad siccitatem , summâ curâ sub finem movendo , ne ad fundum vasis adhæreat materies residua ; quæ sapore acris , colore subfusca , in aëre humido deliquescens , servetur in vase subere perfectè obturato.

Simili modo parari possunt Salia Lixiva

De Erythræâ Centaurio ,
Genistâ (*Spartium Scoparium*), etc.

SUBCARBONATES ALKALINI.

Quantumvis in sectione VIII et inter Sales melius certè Carbonates Alkalini et Subcarbonates ipsi locum tenuissent suum ; nihilominus huc loci utilius referendos censuimus , propter præparandi modum , proprietatum quarundam analogias , et primum adeò facilemque ipsorum ex ipsis Alkalibus ortum sub aëris contactu , parùmque vul-

garem medicis in rebus usum Alkalium omni Acidi Carbonici connubio carentium.

**2. SUBCARBONAS POTASSÆ EX TARTARO COMBUSTO,
VULGÒ DICTUS *SAL TARTARI.***

(Juxta Nomenclaturam Recentioram *Sub-Deuto-Carbonas Potassii.*)

R. Tartratis aciduli Potassæ communis.....
..... *quantum volueris.*

Congestus in caldarium ferreum igne incandescat , moveaturque , donec nullus è materiâ exustâ fumus emanet . Tunc aquâ stillatâ solvatur; vaporet ad siccitatem ; exsiccata materies servetur in vase subere perfectè obturato .

**3. SUBCARBONAS POTASSÆ EX DEFLAGRANTIBUS SIMUL
TARTRATE ACIDULO POTASSÆ ET NITRATE POTASSÆ
PARATUS , VULGÒ *NITRUM EX TARTARO FIXUM,***

((1) N. R. *Sub-Deuto-Carbonas Potassii.*)

R. Nitratis Potassæ puri , et
Tartratis aciduli Potassæ exsiccatorum et in pulverem tritorum..... *æa partes æquales.*

Misce in mortario ferreo ; materiam incende admoto Carbone candente ; factâ deflagratione , massam solve in Aquâ stillatæ..... *quantitate sufficienti.*

Cola , vaporet ad siccitatem , etc.

(1) Hæ litteræ N. R. indicabunt Nomenclaturam Recentioram.

4. SUBCARBONAS POTASSÆ EX DEFLAGRANTE CUM
CARBONIBUS NITRATE POTASSÆ PARATUS , VULGÒ
NITRUM FIXUM.

(N. R. *Sub-Deuto-Carbonas Potassii.*)

R • Nitratis Potassæ puri.....	16
Igne liquecat in caldario ferreo, et suprà fusam ma-	
teriam projiciantur partitis vicibus	
Carbonis in crassiorem pulverem triti.....	2
Donec nullum appareat deflagrationis indicium.	
Materiam adhuc calentem, è crucibulo exemptam, aquâ	
stillatâ solve, cola, vaporet ad siccitatem.	

5. CARBONAS POTASSÆ.

(N. R. *Deuto-Carbonas Potassii.*)

R • Carbonatis Calcis in minuta frustula divisi.....	quantum opus est.
Conjiciatur vel in doliolum, vel in lagenam fictilem, duo-	
bus aperturis perviam. Aptetur uni tubus bis superius infe-	
riusque in 50 figuram incurvus, cuius pars superior pateat	
infundibili formâ. Alteri tubus aliis inseratur, cuius curva-	
turâ crus alterum descendat in lagunculam aquâ plenam,	
collo et ore triplici ; huie aptetur prætereâ tubus ad securita-	
tem rectus unus, aliasque incurvus aliâ lagunculâ excipien-	
dus, ibique mergendus in aquam Subcarbonate Potassæ	
ità saturam, ut notet gradus 28 — 30.	

Omnibus itâ dispositis, per infundibulum prioris tubi affun-

datur Acidum Muriaticum, aut Sulfuricum quod notet 20⁴.

Atquæ ubi ex primo Acidi contactu Gaz Acidum Carbonicum

efferbuerit, sedato motu, perge Acidum novum affundendo,

interruptis pro effervescentiâ vicibus, donec, ex potassæ

Subcarbonate in Carbonatē verso, sedimentum in floccos siliceum seponatur. Quo ope chartæ emporeticæ separato, et ulterius ad Calcis usquè saturationem Acidō affuso, ab opere cessandum erit. Tunc in ultimā lagunculā sponte per quietem Carbonas Potassæ secedet in crystallos, quas aquā stillatā elues et servabis ad usum.

- *N. B.* Si Sulfurico uteris, præstabit, non Cretam, sed Acidum in lagenam prius injecisse et huic deindè Cretam seu Calcis Carbonatē aquā dilutam affudisse; sic enim pleniū, placidiū et æqualiū Acidum Carbonicum expedites, ut solutum Subcarbonati faciliū uniatur.

6. SUBCARBONAS SODÆ.

(*N. R. Sub-Deuto-Carbonas Sodii.*)

R. Sodæ Alicantinæ,
Aut aliūs cujuscumque vulgò venalis.. *quantum opus est.*
Contundatur in pulverem crassiorem, aëri exponendum et identidem commovendum; qui, ubi albescet, aquā pluviali solvendus erit. Lixivia vaporabit donec ad densitatem ducatur graduum 28 ad 30. Tunc quiescat, ut secedant crystalli, iterū aquā solvendæ, iterūque vaporando reformatæ, ut puriores habeantur.

7. SUBCARBONAS AMMONIÆ.

R. Muriatis Ammoniæ in pulverem triti et exsiccati.....	6
Carbonatis Calcis in pulverem triti et exsiccati...	5

Misceantur intimè, simulque injiciantur in retortam silicēam, optimè luto loricatam, cuius collo aptabis aut lagenam fictilem silicēam, aut vas plumbeum excipuli formā. Tunc igne supposito, impositā fornice, calor increscat sen-

sim, donec nihil amplius in excipulum transeat; quod facile cognoscet, ubi omnem in eo caloris sese expedientis fervorem cessasse senties. Hæc scilicet dum fiunt, aquâ frigidâ aut glacie temperandus erit increscens excipuli calor, simulque expanso vapore, qui densari nequit, exitus aliquis inter junc- turas concedendus est.

Idem excipulum pluribus destillationibus aptari valet; atque ubi requisita collecta est salis concreti copia, aut frangi si fictile, aut discindi si plumbeum sit, potest; quo facto, sal eximitur, et illico vasis perfectè obturandis committitur, et sic asservandus est.

Potest etiam idem Subcarbonas obtineri, adhibito Carbonate Potassæ, in Carbonatis Calcis locum; et sic etiam aliquatenus purior habebitur; quidam, scilicet, ex Carbonate Calcis credunt nonnihil Calcis ipsius cum Ammoniæ Subcarbonate in sublime evehi.

Vid. et Subcarbonatam Ammoniæ destillatione paratum.

Sect. IV, art. IV, pag. 66 et 68.

9. SUBCARBONAS MAGNESIÆ.

(N. R. *Sub-Carbonas Magnesii.*)

R. Sulfatis Magnesiæ.....	10
Solve in Aquæ purissimæ.....	50

Cola, affunde Subcarbonatis Potassæ liquidi sufficientem quantitatem, quâ Magnesiæ disjunctio ab Acido sulfatis absolvit possit.

Quod secesserit sedimentum suprà telas repone, ut exstillet totus humor. Aquâ deinde purâ ablue, donec ex loturâ, solutio Muriatis Barytici instillata, nihil prorsus subsidat.

Quo facto, ut Magnesiæ probè siccatur, reponenda est suprà tabulas è materiâ maximè bibulâ confectas, scilicet cretaceas,

gypseas, ligneas è ligno albo leviori, loco sicco, modice calenti reponendas.

ALKALIA.

9. POTASSA OPE CALCIS PARATA ET IGNE FUSA, OLIM
LAPIS CAUSTICUS.

(N. R. *Deutoxidum Potassii.*)

R.	Subcarbonatis Potassæ.....	200
	Calcis in minima frustula contritæ.....	100
	Fiat Lixivia cum aquæ communis.....	1,200
	Cola per linteum. Liquor colatus, vase æneo exceptus, vaporet igne aperto ad siccitatem. Sicca materies in crucibulo fusa, lentèque diffluens, in patinam aut calidum marmor effundatur, et ubi friguerit durueritque, in frustula divisa, diligenter in vase sicco, magnâ cum curâ obturando, reponatur.	

POTASSA LIQUIDA.

Si eadem Lixivia fiat majori quantitate Aquæ, scilicet..... 3,000,
similiter percoletur, et eò vaporando usque addensetur,
donec, immerso areometro, gradum 56 non superet;
eàdem post subsidentiam elutriatâ, habebitur *Potassa liquida*, cuius densitas aequabit 1,554; adeòque phiala trium
Aquæ unciarum capax, capiet hujus liquoris uncias quatuor. Èa præterim utuntur in conficiendo Sapone, ex quo
paratur Balsamum dictum *Opodeldoch.* V. infrâ sect. VIII,
art. *Sapones*, n° 6.

N. B. Si Potassam omnino puram, scilicet et alienis salibus, et omni carbonate admixtis liberam, tibi comparare volueris, chymicos præsertim in usus, Potassam li-

quidam, vaporando exsiccatam, solvas Alcoole purissimo (50—40 B⁴); deinde pars Alcoolis destillando exhauriatur. Quod in retortā superest vaporet in pelve argenteā. Superficie obducetur pellicula nigricans, cochleari eximenda. Liquorem residuum diffunde super orbes planos argenteos. Concreset Potassa purissima, lagunculis illico concludenda perfectè obturatis. Hæc est quam vocant *Potassam ex Alcoole*, ipso Lapide Caustico, si igne fusa fuerit, multò majorem vim exerens, ad cauteria certè nimiam, imò nocivam.

Si Alcool (26—56 B⁴) sit hac Potassā satur, ipsius quartam sui partem solutam tenebit, et tincturam constituet colore intense flavo aut rubicundo notandam, similem prorsū illi tam celebratae olim *Metallorum Tincturae*, quam alio nomine *Lilium Paracelsi chymici veteres nuncupavere.*

10. SODA CAUSTICA LIQUIDA, VULGÒ *LIXIVIA SAPONARIORUM.*

R. Calcis in minima frustula contritæ.....	500
Carbonatis Sodaे.....	1,000
Bulliant cum aquæ..... sufficienti quantitate.	

Coletur lixivia; vaporet, donec vas aquæ communis drachmarum octo capax teneat lixivie densatæ drachmas undecim, eadem verò frigida, notet gradus in areometro 56.

Tunc repone, ut post subsidentiam elutrietur liquor, excipiendus vase vitro clauso.

11. AMMONIA, VULGÒ *SPIRITUS SALIS AMMONIACI OPE CALCIS PARATUS.*

R. Muriatis Ammoniæ.....	400
Calcis novissimè extinctæ.....	400

Utraque materies, seorsim in pulverem tritæ, mixtæ celeriter, conjitantur in retortam capacem loricatam. Re-

tortæ aptetur excipulum sphæricum, cui addatur aliud intermedium longius, quo mediante series omnis desinat in apparatum *Woulfianum*,

Statim affunde in secundam tertiamque lagenam

Aquaæ Stillatæ..... 400

In primam autem multò pauciore aquam, Gaz eluendo

tantum destinatam, et quæ, opere confecto, rejicienda est.

Ammoniam enim prior hæc aqua tenebit minus puram et alieno colore inquinatam.

His ità dispositis, et commissuris probè obturatis destillent, ignem gradatim augendo, donec nihil amplius prodeat, illi refrigeratis omnibus, aquam Ammoniâ saturam celeriter exime, et serva in vase perfectè obturato.

Ammonia liquida hoc modo parata notat gradus 12—
22 B°, et densitate aequat 0,925.

12. MAGNESIÆ PURÆ PRÆPARATIO.

(N. R. *Oxidum Magnesii.*)

R. Carbonatis Magnesiæ..... quantum opus est.

Hic exceptus crucibulo fictili, ignis experiatur vim non mediocrem, donec ita sit exustus, ut Acidi Muriatici contactu nullatenus effervescat. Tunc frigescat, servetur in vase perfectè obturato.

His ità peractis, exclusis dissipatisque acido et aquâ, Magnesia superstes aequabit partem tertiam carbonatis adhuc.

III. METALLA ET OXIDA METALLICA.

Metallis Pharmacopœi utuntur quibusdam integris et nitore metallico splendentibus, aliis in Oxidorum formam versis.

Oxida ut *Oxidationis* gradu varia sunt, atque adeò variam medicamentis impertiunt efficaciam, maximâ curâ talia eligi debent, qualia convenient ad propositum finem.

Metalla integra, purissima aut eligi, aut effici debent; adeòque propriis indiciis exploranda sunt ea quæ ex officinis majoribus in varios usus efferuntur. Iis enim sæpius adulteratis vis medicamentis accedit à requisitâ efficaciâ prorsùs aliena.

Neque minus vulgo venalibus Oxidis attendere debet Pharmacopœus; sæpius enim, præsertim quæ ex Plumbo, Antimonio, Zinco, Bismutho parata sunt, impura periuntur, et arte indigent sollicitâ, ut in sinceritatem debitam referantur.

1º. METALLA.

1. STIBIUM, OLIM REGULUS ANTIMONII.

R • Sulfureti Stibii.....	16
Tartratis aciduli Potassæ.....	12
Nitratis Potassæ.....	6

Seorsim et tenuissimè trita, ac deinde commixta, in crucibulum eumdem ope cochlearis ferrei per partes injice; singulis vicibus deflagrent, cooperto crucibulo; omni deflagratione peractâ, augeatur ignis donec fluida fiat materia; hanc fluentem in conum ferreum calefactum, illitumque sebo effunde; ictibus identidem modicis concute conum. Solidescit materia. Stibium ipsum, quod fundum occupat, excipe, exemptis scoriis.

2. HYDRARGYRUM EX SULFURETO RUBRO PURUM.

R. Hydrargyri in Sulfuretum rubrum conversi.. 1,000
 Terendo misce cum Scobis Ferri, vel cum Calcis. 500
 Ingerantur in retortam fictilem siliceam, loricatam, cuius
 dimidia vel tertia pars vacua remaneat. Excipulum aptetur
 vitreum, amplum, aquam frigidam tenens. Collum autem re-
 tortæ sit solito longius, et aquæ superficiem contingat. Hujus
 ori circumducatur ope vinculi linteum, jacturæ evitandæ
 causâ, ut globuli Hydrargyri ex collo delabentes, per lin-
 teum madidum collecti trajectique, aquæ fundum petant.

His ita dispositis, igne sensim aucto, donec incandescat
 retorta, fiat destillatio. Hydrargyrum autem quod stillavit
 aquâ inherente liberabitur, si aut linteo densiori, aut pelle
 Rupicapræ exceptum, noduloque conclusum expresseris.

2°. OXIDA METALLICA.

Huc referenda censuimus, non Oxida tantum pura, sed
 quædam quibus Acidorum quantitas adhucdum inhæret
 adeo parva, ut ea diù Oxidis annumerare soliti fuerint
 Pharmacopœi; quorum cæteroquin differentiam à veris
 Oxidis singulatim indicavimus.

1. OXIDUM AUT POTIUS SUBNITRAS BISMUTHI, DICTUM VULGO
MAGISTERIUM BISMUTHI.

(N. R. *Sub-Nitras Bismuthi.*)

R. Bismuthi.....	60
Acidi Nitrici (525).....	180
Bismuthum in frustula contusum dissolve Acido Nitrico : solutum misce cum Aquæ stillatæ.....	240

Liquor fiet turbidus, quem colatum effundes in vas vitreum, amplum, quod teneat aquæ stillatæ copiam vicies circiter majorem. Pulverem subsidentem album, perfectissimè elutum, loco calido, radiis solaribus impervio, sicca et usui serva.

2. OXIDUM FERRI NIGRUM AQUA PARATUM, VULGÒ
ÆTHIOPS MARTIALIS.

(N. R. *Protoxidum Ferri.*)

R. Scobis seu *Limaturæ Ferri* præparatæ.....
..... quantum opus est.

Repone in vas latè patens, vitreum aut testaceum; af-funde aquam communem optimè repurgatam, quæ limatum ferrum superemineat ad sex digitorum altitudinem. Singulis diebus, vas sæpius exagites, servesque continuò tectum, ne Aëri ad Ferrum detur accessus, et, si fuerit opus, novam aquam adjice, ut nullo non tempore ferrum ad eamdem altitudinem superemineat. Quod ni feceris diligenter, ferrum in grumos concrescat non facilè terendos, et operam perdes. His per plures hebdomas repetitis, pulvis nigerrimus et subtilissimus turbabit aquam supernantem, quam sic turbidam in colum chartaceum conjicies, undè sedulò colliges sedimentum, probè ac celeriter exsiccandum in cucurbitâ destillatoriâ capitello tectâ.

Nota. Brevis adhuc et facilius parari potest Oxidum Ferri nigrum, ope machinæ ita dispositæ, ut scobs Ferri aquæ immersa continuo motu indesinenter exagitetur.

3. OXIDUM FERRI NIGRUM, VULGÒ ÆTHIOPS MARTIALIS,
ACIDI ACETICI OPE PARATUM.

R. Sulfatis Ferri purissimi.....

500

Aquæ stillatæ simplicis.....	4,000
Aquâ solvatur Sulfas, coletur, et ipsi per vices addantur.....	500
Subcarbonatis Soda.....	4,000
Soluti in Aquæ stillatæ.....	

Materies quæ subsidet, effuso liquore, eluatur perfectè, lentè exsiccanda; cui deinde affundatur Acidum Aceticum debilius, cujus ad materiam sit ratio ut 5 ad 8; hæc intimè mixta ingerantur in retortam fictilem siliceam loricatam; destillent, ut artis est, sub fornice; frigescant, Oxidum è retorta residuum eximatur et servetur medicos in usus.

4. OXIDUM FERRI FUSCUM, DICTUS VULGÒ *CROCUS MARTIS APERIENS.*

(N. R. *Sub-Deuto-Carbonas Ferri.*)

R. Sulfatis Ferri.....	500
Soluti in Aquæ stillatæ.....	4,000
Subcarbonatis Potassæ vel Soda liquidi... <i>quod sufficit,</i>	
ut omne Oxidum præceps subsidat; præcipitatum aquâ calidâ ablue, sicca, in pulverem tere, et vase clauso serva.	

Idem quoque Rori expositum paratur sequenti modo.

R. Scobis Ferri purissimæ..... *quantum opus est.*

Rori exponatur, vel aquâ pluviali identidem irroretur, donec in rubiginem vertatur, supra porphyriten absque aquâ levigandam. Serva ad usum.

5. OXIDUM FERRI RUBRUM, DICTUM VULGÒ *COLCOTHAR.*

R. Sulfatis Ferri..... *quantum opus est.*

Exceptum cruciulo igne forti exure, donec in massam obscurè rubram vertatur; serva ad usum.

Quam si materiam aquâ bullienti probè eluas, habebitur Oxidum Ferri rubrum, seu *Deutoxidum* purissimum.

6. OXIDUM ZINCI, FLORES ZINCI DICTUM.

(N. R. *Oxidum Zinci.*)

R. Zinci..... *quantum opus est.*

Excipe crucibulo amplo et alto, medias inter prunas reponendo. Eousquè ignis intendatur, donec fluat Metal-
lum, ac tandem erumpat in flammam ex cæruleo viridem.
Tum crucibulum conge, vel Cochleari Ferreo, vel alio
crucibulo inverso, ut colligantur flocci seu *Flores* (sic dicti
vulgato nomine) albi et levissimi, floccorum nivis instar.
Nisi scilicet retineantur, totum sic dissipabitur et avolabit
Zincum, et officinæ spatum omne lanugine quādam per aëra
volitante obnubilabitur; undē Oxidum illud non inepto no-
mine vocabatur à veteribus *Nihil album*, atque etiam *Lana*
philosophica. Istos tamen floceos identidem Cochlearis ope
eximes, ut metalli superficies nudetur et liberè deflagrare
pergat.

7. OXIDUM ZINCI PRÆCIPITATIONE PARANDUM,

AUT POTIUS SUBCARBONAS ZINCI.

(N. R. *Sub-Carbonas Zinci.*)

R. Sulfatis Zinci purissimi..... *quantum opus est.*

Aqua sufficienti quantitate solvatur. Soluto adjiciatur
paulatim Subcarbonas Potassæ, tandiù dūm nihil subsidat.
Præcipitatam materiem seu Subcarbonatæ Zinci, probè
elues, et habebitur Oxidum Zinci præcipitatione paratum.

Exsicca et serva ad usum.

8. OXIDUM STIBII ALBUM, MEDIANTE NITRO CONFECTUM,
VULGÒ *ANTIMONIUM DIAPHORETICUM.*

R. Stibii purissimi (olim *Reguli Antimonii*).
Nitratis Potassæ purissimi aā..... 250

In pulverem redacta misce. Mixta cochlearis ope conjice in crucibulum candens; singulis vicibus deflagrabit materies; peractâ omni deflagratione , augeatur ignis per horam circiter dimidiam, quâ quidem elapsâ, materies semifluens projiciatur in aquam. Qui subsidet pulvis lotionibus pluriē repetitis eluatur , donec aqua nullo sapore imbuatur.

Ea materies constat unitis Oxido Antimonii et parte cir- citer quintâ Potassæ : si verò aquæ , quâ materies eluta est, admisceatur Acidum Aceticum , ea lactescit, præcepseque subsidit materies albissima , quæ chartâ emporeticâ collecta , lota plures et exsiccata, constituet peroxidum Stibii. Eam vulgò nuncuparunt *materiam Kerkringii perlata*.

9. OXIDUM, SEU SUBMURIAS STIBII, PRÆCIPITANDO
PARATUM ; DICTUM OLIM *PULVIS ALGAROTH*, VEL
MERCURIUS VITÆ.

(N. R. *Sub-Murias Stibii.*)

R. Muriatis Stibii liquidi, vulgò *Butyrum Antimonii* vocatum..... quantum opus est.

Aqua stillate..... quod sufficit.

Agitando misce , subsidet illicò pulvis.

Hunc repetitis vicibus aquâ purâ frigidâque elue, sicca et serva ad usum.

**10. OXIDUM HYDRARGYRI NIGRUM PRÆCIPITANDO
PARATUM.**

(N. R. *Protoxidum Hydrargyri.*)

R. Proto-Nitratis, seu Nitratis Hydrargyri parum
Oxidati..... 100
Soluti in Aquæ stillatae..... 1,600
Instilla paulatim.
Potassæ liquidæ puræ..... *quod sufficit;*
scilicet, donec nihil amplius subsidat: pulverem nigrum
aquâ stillata probè ablutum sicca, et in vase vitro clauso,
loco obscuro, usui serva.

**11. OXIDUM HYDRARGYRI NIGRUM, MEDIANTE AMMONIA
EX PROTO-NITRATE HYDRARGYRI PRÆCIPITATUM,
VULGÒ DICTUM *MERCURIUS HAHNEMANNI SOLU-*
*BILIS.***

(N. R. *Sub-Proto-Nitras Hydrargyri et Ammoniae.*)

R. Hydrargyri liquidi purissimi..... 6
Acidi Nitrici puri (55g)..... 4
Excipiantur phialâ vitreâ, et igne supposito incalescant,
ut solvi incipiatur Hydrargyrum. Liquor bullire pergit, donec
in ipso manifesta fiat massa flava crystallina; continuatoque
etiamnum aliquantis per calorem, subducatur tandem ignis,
exagiteturque liquor, ut coeat in crystallos confusè inter-
mixtas, flavescentes.

Tunc quidquid in phialâ est effundatur in mortarium
vitreum; et quod Hydrargyri intactum superest terendo sali
commisceatur. Affundatur interim aqua stillata cum Acidi
Nitrici pauxillo, teranturque diu; resideant paululum; de-

capuletur liquor. Residuae materie affundantur iterum et aqua et Acidi Nitrici pauxillum, teranturque; et sic perge, donec quidquid salis est solutum sit, et solum supersit quod intactum remansit Hydrargyrum.

His peractis, liquores omnes in vas vitreum collige, et, ope bacilli vitrei assidue commovendo, ipsis guttatum instilla Ammoniam, ita cautè, ut non excedat quod sufficit ut præceps subsidat Oxidum Hydrargyri nigrum, Acido liberum. Resideat paulisper liquor, positoque pulvere decapuletur. Tunc qui subsidit pulvis eluat pluriès, extendatur supra chartam emporeticam, ut exstillet humor, pressusque etiam intrâ chartam duplicem bibulam penitus siccatur, ac demum in tepidario, aversâ luce, omnino exarescat.

Servetur hic pulvis in lagunculâ, chartâ nigrâ extus obductâ.

Nonnulli inter chymicos viros hunc Oxidum putant insignendum nomine *Sub-Proto-Nitratis Hydrargyri et Ammoniae*.

12. OXIDUM HYDRARGYRI RUBRUM SEU PEROXIDUM HYDRARGYRI, OLIM MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER.

(N. R. *Deutoxidum Hydrargyri.*)

R. Hydrargyri è Sulfureto redivivi.....	160
Acidi Nitrici (32 g).....	180
Scilicet quantitatem sufficientem ut eâ Mercurius plenè solvi queat.	

Mercurius ingeratur in *matratum*, ejus ima pars plana sit, arenaque tepide insidat. Acidum affunde, modicoque adjuvante calore, fiat solutio. Quâ peractâ, aucto calore, vaporet liquor ad siccitatem usquè; ac demum hæcce materies incandescat igne crescente, donec nullus amplius emanet

nitrosus vapor. Lentè deinde frigescat Oxidum residuum,
quod exime et serva.

Si Oxidum omni Acido carens, adeòque nullà prorsùs vi
causticā metuendum habere necesse sit, parabitur sequenti
modo.

**13. OXIDUM SEU PEROXIDUM HYDRARGYRI RUBRUM,
ABSQUE ACIDO, PROTRACTA CALORIS VI CUM AERIS
CONTACTU PARATUM, DICTUM OLIM MERCURIUS PRE-
CIPITATUS PER SE.**

(N. R. *Deutoxidum Hydrargyri.*)

R. Hydrargyri puri..... *quantum opus est.*

Excipiatur pluribus ampullis fundo planis, collo in ca-
pillarem tenuitatem ducto, eâ quantitate quâ uniuscujusque
ampullæ fundus tantummodò obtegatur. Imponatur suprà
arenam, igne sensim aucto, ferè ut bulliat; ut sic perget
non intermissum opus per aliquot menses; intreà pulve-
rem obtinebis subrubrum; quo seposito, digeretur usquè
eodem modo Hydrargyrum superstes, donec in pulverem
rubicundum ferè totum abierit.

SULFUR.

**SULFUR PRÆCIPITATUM, DICTUM OLIM MAGIS-
TERIUM SULFURIS.**

R. Sulfureti Potassæ, vel Sodaæ, vel Calcis.....

quantum opus est.

Solve in Aquæ bullientis,..... *quantum sufficit.*

Cola et instilla

Acidi Acetici..... *quod sufficiet*

ut Sulfur omne subsidat; dein colla, et præcipitatum probè
elutum et siccatum usui serva.

N. B. Quantumvis purum videatur, etiamsi benè lotum, Sulfur hoc modo paratum quibusdam notis differt à sublimato; subtiliorem multò pulverem constituit; ubi recens est, odore proprio adhucdūm distinguitur; igne fusum, mollius est ac tractabilius, nec adeò fragile est ut Sulfur aliā methodo præparatum.

SULFUR SUBLIMATUM, seu *Flores Sulfuris*, inter venalia recensendum est. Sed, ob inhærentem Acidi semper aliquam partem, semper est sollicitè eluendum; de quā locatione, *vide* pag. 9, art. *Purgatio et Mundatio*, n° 5.

PHOSPHORUS.

R. Ossium Boum aut Ovium, ad albedinem exustorum et in tenuissimum pulverem redactorum. 12,000

Cupā lignea aut plumbea exceptum pulverem aquā dilue, quantum sufficit ut coeat in pultem lentē diffluentem, cui paulatim adde

Acidi Sulfurici (66%) 10,000

Bacillo simul exagita; effervescat et incalescat multum liquor, et in magma spississimum densabitur; quod, affusā novā aquae copiā diluetur rursus, ut diffluat in pultem sat liquidam; quam residere sines per viginti quatuor horas, ut acidi Sulfurici vis in Phosphatem calcis sese exerat penitus.

Hanc pultem tunc aquā bullienti clue; per telam textūs densioris cola; tamdiūque eluendo perge, donec nulla in aquis lixivis aciditatis nota deprehendatur. Aqua autem ē colo diffluens excipietur vasis aut fictilibus siliceis, aut ligneis, videlicet nullatenus acido erodendis.

Hæc aqua, soluto Phosphate calcis acido feta, tenet insuper non nihil sulfatis calcis acido mediante soluti, quo sequenti modo liberabitur.

Vaporet, scilicet, in cupreo aut plumbeo caldario et in Syrupi spissitudinem addensetur. Sulfas calcis ad fundum præceps feretur, qui etiamnū eluetur, et indè defluentes aquæ priori commiscebuntur. Tunc omnes solo jām ferè Phosphate calcis acido fetæ, vaporabunt iterum ad Syrupi densitatem.

Quo facto, sic addensata materies, remixta ipsi quartâ parte carbonis in pulverem triti, in pelle ferreâ, ad rubedinem usque exuretur, et penitus exsiccabitur.

Eam tunc excipiet retorta fictilis silicea, ipsaque impletatur ad capacitatis dodrantem usquè. Furno retorta committatur fornice tecto. Ipsius collo aptetur vas cupreum, in tubum productum, quod, trajecto subereo obturaculo, excipietur lagenâ vitrâ, aquâ ad medietatem usquè plenâ. Luto contegantur cuprei vasis oræ retortæ collo coaptatæ. Tubus quoque rectus vitreus, Suberi insertus, intrâ lagenam pateat, centimetrali diametro, octo aut novem decimetra altus.

His itâ dispositis, furni, quotquot sunt, juncturis luto perfectè obseratis, lutoque ad perfectam siccitatem perducto, submittatur retortæ ignis, calorque itâ paulatim increscat, ut non antè alteram horam fundus retortæ rubescat. Tunc impleatur itâ carbone furnus ut nunquam nisi ardentibus prunis ipsa contingatur retorta. Sæpiùs interea, virgâ ferreâ, furni craticula cineribus, quibus erit impedita, liberetur.

Post expeditum primis horis gaz, carbonis oxido et hydrogenio carbonato constans, elapsis tandem quatuor ut plurimum horis, prodit Phosphorus, oxido carbonis et hydrogenio Phosphorato simul comitantibus formâ elasticâ, per tubi ostium superius facile observandâ; si aliquando remittant, indicium est ignis incitandi, donec tale nihil amplius

prodeat; quod fiet post elapsas viginti quatuor aut triginta horas. Tunc, opere confecto, ab igne cessandum est.

Phosphori quæ prodiit pars prior pura est, pellucida et serè incolor, posterior admixto carbone aliquo opacior et ex flavo rubens. Hanc inclusam nodulo, ex pelle Rupicaræ confecto, sub aquâ ad gradum 45 incalescente exprimes, et transadiges fusam aquæ calore et puram. Phosphorum puriorem etiam obtinebis, si retortâ vitreâ, sed pareâ simul quantitate, scilicet aliquot grammatum, destillare curaveris.

Phosphorum facilè asservabis, si fusum sub aquâ, ad gradum 45 incalescente, in tubos vitroes, ore ad ostium superius aptato, cautè attrahas: plenos deinde tubos in aquam frigidam immerges: sic informabitur Phosphorus in cylindros seu bacilos, facilè, vel in ipsis tubis, vel etiam nudos sub aquâ conservandos, donec ad usus medicos requirantur.

CARBONES.

*Vide Sect. I., Præparationes, Art. in Pulverem Resolutio, n° 23,
pag. 22.*

Vide Sect. IV, Art. IV, Destillatio Cornu Cervi, pag. 65, 66.

CARBO DE SPONGIIS.

Præter Muriates Sodæ, Magnesiæ et Calcis, quibus inficiuntur Spongiæ illotæ, quales habemus vulgo venales, multis quoque ipsarum areolæ implentur passim conchyliis, sat firmiter adhærentibus.

Hæc omnia accuratiùs elui debent, antequam exurantur et vertantur Spongiæ in Carbonem usui interno destinatum.

Non æquè illas expurgare convenit, quarum Carbo usui
externo aptandus est, illotasque sic præparare satiùs est.

Ad quemlibet usum apparandæ sint, idem esse debet exurendi modus; scilicet :

R. Spongiarum siccum lotarum aut illo tarum.

quantum opus est.

Crucibulum fictile ipsis impletatur modicè compressis, cooperiaturque operculo filis ferreis revincto, dupli foramine pertuso; prunisque imponatur ardentibus. Tunc ignis folle incitetur, donec nullus per foramina fumus exhalet; quo facto, frigefacto crucibulo, remoto operculo, Carbo reperitur in pulverem terendus, et asservandus in lagunculâ perfectè obturatâ.

SECTIO OCTAVA.

*Medicamenta per Synthesim, seu ex unitis arte
Chymicâ elementis composita.*

ÆTHERES ET LIQUORES ÆTHEREI ALCOOLISATI, ACIDA ALCOOLISATA,
SALES, SULFURETA, SAPONES, AQUÆ MINERALES ARTE FACTÆ.

I. ÆTHERES ET LIQUORES ÆTHEREI ALCOOLISATI.

Si misceantur simul Acidum et Alcool, debitâ remixtum utrumque quantitate, cautelisque justis adhibitis, ac deinde apto vasorum apparatu stillent, habebuntur aut Ætherei dicti liquores, aut Ætheres ipsi.

Acida, Sulfuricum, Nitricum, Muriaticum, Aceticumque, rarò Phosphoricum, huc usquè sola ad conficiendos Ætheres liquoresque Æthereos adhibita sunt, nec aliis uti solent Medici, nondùm autem Phosphorico.

Quod Acido cuilibet nomen, idem quoque Ætheribus ex ipso confectis additum est.

Neque unâ omnes methodo perfici æquè possunt, varijs utimur ad singulos artificiis,

Omnibus id commune est, ut sint summè volatiles et rapidissimè conflagrent; undè, lumine averso, transfundere prudentium est. Proprio singuli odore, proprioque sapore discernuntur.

Ab alienis admixtis puros omnino adhibere convenit. Probè obturatis in vasis asservandi sunt, et in frigidissimo loco reponendi.

1. ÆTHER SULFURICUS.

R Alcoolis (26—56 B⁶).....} Acidi Sulfurici (66%).....} àa 5,000 (1)

Excipiatur primùm Alcool retortā vitreā, in quam superius pateat os tubulatum; per hoc infundatur acidum, et agitando permisceatur Alcooli. Tum retorta arenæ imponatur calenti; rostrumque ipsius producatur addito tubo vitreo, longo, cui aptetur, juncturis probè consertis, vas sphæricum, ampulum, cuius ima pars aquæ immergatur perpetuò frigidæ; ex hoc autem, per ostium tubulatum, infrà liquori stillanti

(1) Notandum, quantumvis generalibus numeris hic solam utrorumque rationem indicare fuerit animus, singulorum quantitate, pro lubitu, unicuique augendâ aut minuendâ, operam tamen male admodum, si parcâ nimis copiâ coēant Alcool et Acidum, meliusque omnino successuram, si mensuræ, quæ quatuor impleant aut quinque bilibres lagenas, aut æquent totidem kilogrammata, ad opus conficiendum adhibeantur.

Si verò minori copiâ Ætherem Sulfuricum parare volueris, habeas retortam, excipulum sphæricum retortæ collo aptatum, lagunculas tres, quarum pars dimidia tantum aquâ impletatur; tuboque ad securitatem apparatus inserto, et viâ ab excipulo in lagunculam priorem, ac vicissim ex priore in alteram, indèque in tertiam, per tubos incurvos sub aquam patente, juxta methodum *Woulfianam*, fiat destillatio ut artis est,

pateat exitus in excipula, aut lagunculas, progrediente destillatione commutanda. Ori autem retortæ tubulato inserendum est infundibulum dupli instructum epistomio, infundibulique os inferius non procul absit à retortæ fundo.

His ita dispositis, ignem arenæ submittito, quo citius in retortâ bulliant mixti liquores. Liquor in excipula stillabit, cujus ubi quantitas 1,000 æquaverit, pari ratione sufficiatur novus Alcool in illius locum qui prius Ætheris formâ stilando decesserit; idque repetitis siat vicibus, donec æqua priori Alcoolis quantitas, scilicet 5,000 adjecta sit. Quod ubi absolutum erit; destillare perget liquor æthereus donec in excipula 7,500 transierint.

Hac arte confectus Æther purior evadet si aliquantulum Potassæ liquidæ ipsi agitando commiscueris, et deinde balnei maris calore destillare curaveris. Quæ primò prodibit tertia totius pars, scilicet 2,500, Æther erit purissimus, cuius erit nota $46 = 56 B^{\circ}$, densitas autem æquabit 758. Talis Æther ad usus medicos habetur purissimus; potest tamen etiam in densitatem usque 715 tenuari, scilicet, ad gradum usque $56 = 66 B^{\circ}$ evehi. Pari quantitate sequetur Æther dictus *Alcoolisatus*, $55 = 45 B^{\circ}$, cuius densitas erit 805, et quem olim liquorum Hoffmanni anodynum nuncupabant.

NOTA. Si Ætherem Sulfuricum Alcoolisatum, seu *Liquorem Hoffmanni* tantummodo obtinere sit animus, misceantur Alcoolis et Acidi pondera, quorum ratio sit 2 Alcoolis et 1 Acidi, et sic destillent. Excipiaturque non interruptè dimidia pars totius, scilicet, ex commixtis Alcoolis 10,000 et Acidi 5,000, habebuntur liquoris Ætherei Alcoolisati 7,500.

2. ÆTHER NITRICUS.

Si, ut fit aliquoties, speciatim à medico prescribatur
Æther Nitricus, Pharmacopeos ex tempore ipsum methodo
sequenti præparare convenit.

R. Acidi Nitrici (34°).....
Alcoolis (26—36 B°).....} aa 500

Per os tubulatum infundantur in retortam tripodi ferreo
impositam, cui furnus ita supponatur, ut amoveri facile
possit. Ante tamen quam ignis admoveatur, rostro retortæ
addatur tubus in ventrem ampliatus, tuboque globus vitreus
amplissimus, globoque apparatus quem dixerunt *de Woulf*,
constans scilicet quinque vel sex vasis, quorum duos trientes
implebit Aqua Soda Muriate satra, ipsorumque vasorum
fundus frigidissime excipietur cymbiis, mixtis una glacie et
Soda Muriate plenis.

Tunc modicè incalescat igne supposito retorta, et ad primas
liquoris subservidi bullas, subducto igne, sponte et proprio
motu totum opus perficietur. Quo peracto, quod liquidi in
retorta superest siphunculo eximetur; novaque Acidi et Al-
coolis pondera sufficientur, donec habeatur omnis qui requi-
ritur Æther. Interea Æthereus vapor tuborum ductu aquam
sale fetam permeat supernatantque, et ab ea facile secerni
potest; idemque purior deinde leni calore destillabit in ex-
cipula glacie circumsepta.

Ut asservetur Nitricus Æther, misceatur primum cum
aqua seu lacte calcis, et saepius unam per diem exagitetur;
deinde transfundatur aquam supernatans, serveturque loco
obscuro, frigido, lagunculis plenis; nec magna quantitate
parandus est, facile enim, aut sponte, aut modice sub ca-
lore Acidum ab Alcoole dissociatur.

Potionibus aqueis additus hic *Æther* in Acidum facile vertitur.

Æther Alcoolisatus Nitricus parari potest in vasis Woulfiani apparatus, si in locum Aquæ salitæ Alcoole suffecto, huic *Æther* sese destillando admisceat, donec pondus Alcoolis duplò increverit. Idem æquè paratur, si Alcoolis pars pondere duplex cum simplici Acidi Nitrici simul destillent, neque cura habeatur *Ætheris* prius conficiendi.

Ætheris Nitrici gradus in areometro erit $16 = 26 B^{\circ}$; densitas autem 900,6.

Ætheris autem Alcoolisati gradus $22 = 52 B^{\circ}$, densitas 868,5.

5. ÆTHER MURIATICUS.

(N. R. *Æther Hydrochloricus.*)

R. Acidi Muriatici (25°)
Alcoolis ($50 = 40 B^{\circ}$) $\ddot{a}a \dots \dots \dots$ pondus æquale.

Conjice in retortam vitream arenæ impositam, cui aptetur apparatus destillatorius dictus *de Woulf*.

In primum hujus apparatus excipulum affunde sufficientem quantitatem aquæ ad duodecim aut quindecim usquè gradus calentis, altero et sequentibus excipulis, si plura addidisse libuerit, vacuis, altioris multò quam latioris formæ, glacie circumdati. Sic destillent mixti liquores leni igne. Gaz *Æthereum* in prius excipulum transiens, ibi sese Acido et Alcoole liberabit, in posterioribus refrigerescet; liquidi formam induet, et erit *Æther Muriaticus*, in vase accuratè clauso et loco frigido reponendus.

Si in secundum excipulum Alcoolem immiseris, huic Gaz *Æthereum* admiscebitur, atque ubi pondus Alcoolis duplò increverit, *Æther Alcoolisatus Muriaticus* habebitur.

\mathcal{E} ther autem purus ad areometrum gradus notabit 16=26 B⁶. Densitas erit 900,6.

\mathcal{E} ther Alcoolisatus notabit 22=52 B⁶; ejus densitas erit 868 ,5.

4. \mathcal{E} ETHER ACETICUS.

R .	Alcoolis (50=40 B ⁶)	5,000
	Acidi Acetici (10 ⁶)	2,000
	Acidi Sulfurici (66 ⁶)	625

Immittantur primò in retortam vitream Alcool unàque Acidum Aceticum.

Addatur postremò Acidum Sulfuricum, motaque retortā, omnia intimè commisceantur: excipulum deinde aptetur retortae, interposito tubo in ventrem ampliato. Tum, igne sensim aucto, destillent donec transierint in excipulum liquoris stillatii 4,000

Huic liquori modica quantitas Subcarbonatis Potassae agitando commisceatur, quiescat, ut subsidat subcarbonas, transfundatur liquor, destilletque de nuò ut purioris \mathcal{E} theris excipiatur quantitas æquans. 5,000

Hujus nota erit 15=25 B⁶, densitas 917.

Alio quoque modo parari potest \mathcal{E} ther idem, non adhibito Acidu Sulfurico.

Sumantur scilicet Acidi Acetici (10⁶) et Alcoolis (50=40 B⁶) pondera æqualia; misceantur intimè; destillent ad dodrantem totius: liquor qui destillavit in retortam refundatur, destilletque iterum; tertia similiter vice et refundatur et destilllet, ac demum quartæ vice. Tunc, ut supra diximus, post admixtum Potassae subcarbonatem destilllet, et habebitur purissimus \mathcal{E} ther Aceticus.

ACIDA ALCOOLISATA , VULGÒ DULCIFICATA DICTA.

1 ACIDUM NITRICUM ALCOOLISATUM.

R.	Alcoolis (26—56 B°).....	560
	Acidi Nitrici (34%).....	120

Misce in *matratio*, et exceptum liquorem lagunculis probè obturatis serva ad usum. Odor hujus Acidi Alcoolisati facile fit *Æthereus*, et affinis odori malorum redolentium.

2. ACIDUM MURIATICUM ALCOOLISATUM.

R.	Acidi Muriatici (22%).....	120
	Alcoolis (26—56 B°).....	360
	Misce et serventur ut supra.	

3. ACIDUM SULFURICUM ALCOOLISATUM , VULGÒ EAU DE RABEL.

R.	Acidi Sulfurici puri (66%).....	120
	Alcoolis purissimi (26—56 B°).....	360
	Misce in <i>matratio</i> et serva ad usum. Temporis lapsu odor hujus misturæ vertitur in <i>Æthereum</i> .	

II. SALES.

**NORMÆ GENERALES AD QUAS EXIGI DEBET PRÆPARATIO
SALIUM.**

Normæ istæ ad sequentes referri possunt:

1º. Acidorum sinceritas et eorum corporum quibuscum

inire connubium debent Acida, omnibus modis probanda est.

2°. Cum siccitas corporum huic officiat connubio, una saltem ex uniendis materiis liquida sit necesse est.

3°. Si neutra salium confiendorum pars excedere debet, scilicet sal si neutrum perfectè habendum est, ipsius perfectio probanda est Tincturis aquosis florum cæruleorum, ut Violarum, Crotonis tinctorii, quem vulgò dicunt *Heliotropium* (Gallicè *Tournesol*), Malvæ, etc., aut Chartis cya-neo dictarum plantarum colore infectis.

4°. Connubio hoc ritè peracto, solutio salis percolanda est. Vaporabit eadem in vase argenteo, vitro, aut fictili siliceo, faventino, vel porcellaneo, donec crystallis depo-nendis aptus videatur liquor. Si tamen sali constituendo, aut cuprum, aut ferrum, aut plumbum inservierint, cu-preis cupreum, ferreis ferreum, plumbeis denique plum-beum committi poterunt vasis.

5°. Ubi crystalli mox formandæ sunt, solutio salina re-ponenda est in loco tranquillo, subfrigido, nisi salis ea sit natura, ut aëris in se humorem contrahat; quæ conditio si adfuerit, ut crystalli bene informentur, requiritur vapo-ratio ad extremam densitatem, aërisque ambientis intensior calor, qui lentè ad frigidorem deducendus est.

Similiter et ii sales qui crystallos non ponunt, nisi ad extremam densitatem adducta sit solutio, ut fit in *Tar-trate Potassæ*, etiamsi humorem aëris non contrahant, in aëre calido reponi debent, tectisque in vasis, ut servetur ea fluiditas in quâ liquidi lensor ponendis crystallis impe-

dimento non sit. Simili cautelâ habentur quoque in officinis sacchari crystalli perfectiores.

6°. Ubi cessant crystalli, liquor superfluuus transfundendus est, vaporabitque denuò, ut crystallorum nova copia subsidat; quod siet tamdiù, dum aptus ponendis novis crystallis liquor videbitur.

7°. Ubi crystalli secesserint omnes, superest ut puriores et sinceriores habeantur. Hoc ut fiat, solutis in aquâ purissimâ salibus, et percolatâ solutione, nova instauretur vaporatio, et cætera, ut dictum est, conficiantur.

8°. Inter crystallos eæ tantum seponendæ sunt, quarum sinceritas omnibus notis comprobata et absoluta videbitur.

9°. Sales, qui ægrè admodum, quia facile deliquescent, in crystallos formari valent, aquâ soluti, ad siccitatem usquè vaporent necesse est, et inter vaporandum continuò agitari debent.

Tali industriâ indiget præsertim Acetas Potassæ et alia similia.

10°. Sales quorum crystalli aëris humorem facilius in se trahunt, aquâ solutionis totâ extillando penitus exhaustâ, vasis excipiendi sunt purissimis, perfectè clausis. Eadem cura adhibenda est ad servandas crystallos quorum in aëre superficies, ut aiunt, efflorescendo deteritur.

11°. Qui sublimes feruntur in altum sales, quales sunt Murias uterque Mercurii, Murias Ammoniæ, etc., indigent ut sublimatio semel facta iteretur, ut sublimatus sal omni prorsùs vitio careat.

12°. Omnes quicumque venales vulgo prostant, purgandi sunt sedulo sales, ut apti fiant ad usum pharmaceuticum.

1°. MURIATES, NUPERRIMÈ *CHLORURETA* AUT
HYDROCHLORATES.

1. MURIATIS SODÆ PURGATIO.

(N. R. *Chloruretum Sodii.*)

R• Muriatis Sodaæ venalis..... *quantum opus est.*

Solvatur in quantitate aquæ sufficiente. Liquor coletur, vaporetque leni calore, ut crystalli inter vaporandum coalescant, exemptaque, simul ac concrescunt, aquâ frigidâ eluantur, et sic purissimæ evadant.

2. MURIAS POTASSÆ.

(N. R. *Chloruretum Potassii.*)

R• Subcarbonatis Potassæ..... *quantum opus est.*

Solvatur in aquæ sufficiente quantitate : cola, affunde Acidi Muriatici purissimi quantum est satis, ut saturetur Potassa: cola iterum; vaporet liquor donec gradum notet 30. Reponatur demum ut crystalli concrescant.

Æquè sal idem obtinebitur, si, vel Sulfas Potassæ, vel Tartras, admixto Muriate Calcis, sua cum ipso elementa permutaverint; idem quoque erit exitus, si Muriati Ammoniæ admixtus Potassæ Carbonas Potassam Acido Muriatico suam suppeditaverit.

5. MURIAS POTASSÆ HYPEROXGENATUS.

(N. R. *Chloras Potassii.*)

Si Gaz Acidum Muriaticum Oxygenatum , quod *Chlorum* dicunt , eā methodo et formā expediās quā descripta est , pag. 194 , et Gaz sic expeditum , mediante eodem apparatu , excipiatur Potassā aquā solutā (V. *Potassa liquida* , pag. 208) ; tunc ad fundum subsidet Murias Potassæ Hyper - oxygenatus , in formā lamellarum nitentium ; quem si solvas de nuō , in crystallos puriores concrescat , lagunculis includen- das probè obturandis .

4. MURIAS AMMONIÆ PURUS.

(N. R. *Hydrochloras Ammoniæ.*)

R. Muriatis Ammoniæ venalis..... quantum opus est .
Solvatur in aquæ sufficienti quantitate ; solutio colata va-
poret , leni igne , donec ipsi pellicula innatet , et seponatur
ut in crystallos concrescat .

5. MURIAS CALCIS.

(N. R. *Chloruretum Calcii.*)

R. Carbonatis Calcis..... quantum opus est .
Ipsi Acidum Muriaticum affunde , donec in bullas cesset
effervescere . Murias sic paratus aquā solvatur , coletur , va-
poret ad siccitatem usquè ; aut si in crystallos solidescere
malueris , vaporet ad densitatem 40 graduum , et seponatur .
Concretas sic crystallos , aquā quam celerrimè extillando
prorsū exhaustā , in vase perfectè obturato servabis .

Simili arte parari potest ex Magnesiæ Carbonate Murias Magnesiæ. (N. R. *Chloruretum Magnesii.*)

Potest etiam ex Ammonie Muriate, dum, ope Calcis aut Carbonatis Calcis, vel Ammonia liquida, vel Ammoniæ Carbomas destillando extrahuntur, Murias Calcis obtineri, ubi Acidum cessit in Calcem. *V.* pag. 209, n° 11.

6. MURIAS BARYTICUS.

(N. R. *Chloruretum Barii.*)

R. Sulfatis Barytici.....	240
Carbonis è ligno parati.....	60

In pulverem trita conjificantur in crucibulum, igne vehementi exurantur per duas horas, materiam (quæ tunc Sulfuretum est Barytae) è crucibulo extractam aquâ stilatâ calenti solve, cola, et cautè admodum super affunde Acidi Muriatici..... *quantum satis.*

Scilicet donec amplius non effervescat liquor, et ad plenam Sulfuris præcipitationem: liquorem iterum cola, vaporet ad pelliculam et seponatur, ut in crystallos concrescat.

Æquè, et forsan melius, sal idem obtineri valet, si conjificantur in crucibulum 4 partes Sulfatis Barytici, Muriatis Calcis 4, et una tantum Carbonis; simulque igne forti incandescent; solvatur deinde materies, et cætera, ut suprà dictum est, perficiantur.

Hæc autem convenit ut fiant cælo aperto et aëre liberius circumfluente.

SOLUTIO MURIATIS BARYTICI.

Ut omne vitetur periculum in usu medico Muriatis Barytici, expedit ut, non nisi aquâ solutus, exhibeatur, ne ex balance minus accuratâ facilis irrepatus error; adeoque solutio habebitur Muriatis Barytici sic parata:

R. Muriatis Barytici.....	10
Aquæ stillatæ.....	50
Soluto Muriate liquor percoletur et servetur ad usum.	

N. B. Nulli requirenti concedendus est iste liquor, nisi ex legitimâ præscriptione, justoque chirographo.

7. MURIAS FERRI.

(N. R. *Proto-Chloruretum Ferri.*)

R. Scobis Ferri.....	<i>quantum opus est.</i>
Exceptam ampullâ vitrâ, Acido Muriatico gradus 22 notante quantum sufficit affuso, dissolve penitus.	
Solutionemcola: vaporet ad siccitatem; serva in vase perfectè clauso.	

Si *MURIATEM FERRI SUBLIMATUM* res agenda requirat, ut sit in conficiendâ *Tincturâ de Muriate Ferri Æthereâ alcoolisatâ* (V. pag. 153), Muriatem Ferri, ut modò dictum est, exsiccatum in crucibulum conjicies, inverso alio crucibulo contectum, juncturis luto obseratis; quæ, cùm igne ardenti per horas duas satis incaluerint, frigefacto apparatu, invenies salis partem sublimem superiori crucibulo inhærentem.

Quam detractam servabis in lagunculâ probè obturandâ.

8. MURIAS AMMONIÆ ET FERRI.

R. Muriatis Ammoniæ.....	360
Muriatis Ferri	120
Solvantur simul in aquæ sufficienti quantitate.	
Mediante modico calore vaporent ad siccitatem.	

Materies exsiccata excipiatur fictili cymbio, cui aliud in-

versum imponatur angusto foramine pervium , oris luto junctis; imponatur arenæ balneo , sensimque incalescat apparatus , ut Murias sublimis ad superiora feratur; quo facto , decutiatur sal à superiori cymbio , et servetur in vasis perfectè clausis. Salem hunc sublimatum vocabant olim *Flores salis Ammomaci Martiales*.

Nota. Non æquè semper , pro variâ ignis vi , unum et alterum sal , servatâ utriusque proportione simul sublimantur ; adeòque certior erit et justa magis utriusque mistio , si tantummodò soluta materies vaporando siccetur.

9. MURIAS HYDRARGYRI DULCIS , SUBLIMATUS , OLIM
MERCURIUS SUBLIMATUS DULCIS.

(N. R. Proto-Chloruretum *Hydrargyri*.)

Rū Muriatis Hydrargyri Oxygenati (N. R. Deuto-Chloruretum *Hydrargyri*)..... 480
Hydrargyri purissimi..... 500

Murias teratur in mortario marmoreo , pistillo ligneo vel vitreo , cum sufficienti* quantitate aquæ stillatae , ut fiat massa , eui addatur Hydrargyrum , teranturque simul , donec Hydrargyri nihil supersit quod visu possit percipi ; massa lenissimo calore exsiccata , excepta ampullis vitreis , arenæ collo tenus immersis , sublimetur. Quo peracto fractisque ampullis , ut plerumqùe aliqua Mercurii pars adhuc libera materiæ sublimatae inhæret , teratur sublimeturque iterum atque iterum ; ac demum toto in Muriatem verso Mercurio , suprà porphyriten in pulverem subtilissimum redigetur massa , aquâ stillatâ calente abluetur , siccabitur , servabitur ad usum.

Non alia est præparatio ejusdem Muriatis quam celebra- runt veteres variis nominibus , *Calomelas* , *Panacea Mercu- rialis* , *Aquila alba* , etc.

10. MURIAS MERCURII DULCIS MEDIANTE AQUA
SUBTILISSIME DIVISUS.

JUXTA METHODUM JOSLÆ JEWEL.

(N. R. *Proto-Chloruretum Hydrargyri.*)

R. Muriatis Hydrargyri dulcis. *quantum opus est.*

Ingeratur in retortam fictilem siliceam, collo latiori, brevi, luto undique loricatam; collum autem vase fictili, crustâ obtecto vitreâ, vel porcellaneo aquâ plenis excipiatur. Utrumquè, hinc indè, igne supposito, incandescent, et retorta ut sublimetur sal, et vas fictile ut bulliat aqua; tum, intermixtis hinc et indè Muriatis et aquæ vaporibus, Hydrargyri Murias, aquâ exceptus, in pulverem albissimum et mirè subtilem divisus subsidet, quem in umbrâ siccatum ad usum servabis.

11. MURIAS HYDRARGYRI SUBOXYGENATUS PRÆCIPITATIONE PARATUS, VULGÒ PRÆCIPITATUM ALBUM.

(N. R. *Proto-Chloruretum Hydrargyri.*)

R. Hydrargyri. *quantum opus erit.*

Solvatur lenissimo calore in Acidi Nitrici 20 gradus notantis. *sufficienti quantitate.*

Solutione peractâ, affunde Muriatem Soda solutum purissimum, donec nihil amplius subsidat.

Liquorem cola et præcipitatum pulverem elue, donec aqua nullum contraxerit saporem. Residuus pulvis in trochiscos informetur, quos in umbrâ siccabis.

12. MURIAS HYDRARGYRI OXYGENATUS, VULGO *SUBLIMATUS CORROSIVUS*, ET IPSIUS SOLUTIO DICTA *AQUA SWIETENII*.

(N. R. *Deuto-Chloruretum Hydrargyri.*)

R.	Sulfatis Acidi Hydrargyri non loti.....	480
	Muriatis Sodæ	480
	Oxidi Manganesii nigri.....	450

Misce intimè, conjice in *matratum* imâ parte planum, cuius dimidia pars tantum impleatur, et quod arenæ immerges collo tenùs; incalescat sensim, donec sublimatum sal totum superiora petierit.

SOLUTIO MURIATIS HYDRARGYRI OXYGENATI, DICTA
VULGO *AQUA SWIETENII*.

R.	Muriatis Hydrargyri Oxygenati.....	0 ,5
	Aquæ stillatæ.....	450 ,0
	Alcoolis (26—56B).....	50 ,0
	Solvatur in Alcoole Murias, et aquæ commisceatur. Li-	
	quidi totius Murias erit pars millesima.	

Potest etiam, si vulgaribus mensuris placeat uti, sic ratio solutionis ejusdem institui, ut solvendis. Muriatis prædicti granis octo, adhibeantur Aquæ stillatae unciae quatuordecim et semis, et Alcoolis uncia una et semis.

Uncia tunc liquidi singula tenebit Muriatis Hydrargyri granum semis.

Notandum autem nec *Muriatem Hydrargyri Oxygenatum ipsum*, nec etiam *solutum*, cuiquam requirenti esse concedenda, nisi ex legitimâ præscriptione justoque chirographo.

13. MURIAS MERCURII OXYGENATUS ET AMMONIAE.

(N. R. *Deuto-Chloruretum Hydrargyri, et Hydrochloras Ammoniae.*)

Si Muriati Mercurii, ut modò dictum est parato (p. 259), admisceatur æqua Muriatis Ammoniae quantitas, his vel solutis simul, vel sublimatis, fiet sal triplex, facilius in aquâ solvendum, quod dicere licebit, *Muriatem Ammoniaco-Mercurialem*, olim *sal Allembroth*.

14. DEUTO-MURIAS STIBII SUBLIMATUS, VULGÒ BUTYRUM ANTIMONII.

(N. R. *Chloruretum Stibii.*)

R.	Stibii purissimi.....	180
	Muriatis Hydrargyri Oxygenati, seu Sublimati corrosivi.....	480

Seorsim utrumque terantur in pulverem tenuissimum in mortario vitro; misceantur eelerrimè: destillent ex retortâ vitreâ brevioris et latioris colli, supra arenam, calore gradatim increscente. Deuto-Murias Antimonii destillans glaciei in modum solidescet; liquandus admoto carbone ardente, si forte in collo retortæ concreverit. Sic exceptus Murias in vase perfectè obturato servetur.

15. MURIAS AURI.

(N. R. *Chloruretum Auri.*)

R. Auri purissimi in laminas exiles complanati et in frustula dissecti.....	100
Conjiciantur in phialam aut <i>matratum</i> minimæ amplitudinis. Affundantur deinde	
Acidi Nitro-Muriatici, constantis ex Acidi-Nitrici (32 ^o) parte unâ, et Acidi Muriatici (22 ^o) partibus duabus.....	500

Phiala imponatur arenæ modice calenti, ibique perstet,
donec dissolutum omnino sit Aurum. Tum liquor excipiatur
patellâ vitreâ, aut porcellaneâ, vaporetque ad siccitatem, sed
lenissimo calore, ne Aurum liberetur Acido, et in metallum
vertatur.

Sic paratus Auri Murias servetur in vase vitro, crystal-
lino obturaculo, loco luci impervio. Potest etiam idem as-
servari aquâ itâ solutus, ut, ratione salis ad aquam apprimè
perpensâ, justa ipsius dosis pro lubitu ministrari possit. Huic
liquori addetur non nihil Muriatis Sodæ. Nulli autem conce-
dendus est, nisi ex præscriptione justo notatâ chirographo.

2º. SULFATES.

1. SULFAS POTASSÆ.

(N. R. *Deuto-Sulfas Potassii.*)

R. Carbonatis Potassæ.....	<i>quantum opus erit.</i>
Solvatur in aquæ quantitate duodecies majori. Liquor percolatus excipiatur vase fictili siliceo, ipsique affunda- tur Acidi Sulfurici, notantis 20 gradus, tantum quantum sufficiet ut saturetur Potassa. Cola iterum, vaporetque in ar-	

genteo caldario, donec pellicula tenuis innatet. Lentè tūm frigescat, ut concrescere possit in crystallos albicantes et justæ figuræ.

N. B. Minoribus impensis idem sal haberi potest, si aut Potassæ Carbonate, aut etiam Calce ipsā saturetur Sulfas Potassæ Acidus, quem residuum tenet retorta, post Acidum Nitricum ē Nitro, mediante Acido Sulfurico, extractum.

Quo facto, soluta materies aquā bulliente coletur, vaporet, et ad crystallos lentē formandas, ut dictum est, reposatur.

2. SULFAS SODÆ.

(*N. R. Deuto-Sulfas Sodii.*)

R. Crystallorum Carbonatis Sodæ.. quantum opus est.

Solvantur in aquæ sufficienti quantitate. Solutis affunde Acidum Sulfuricum notans 20°, donec ipso satura sit Soda.

Liquor colatus vaporet, donec idem bulliens notet in areometro gradus 25.

Transfundatur in vasa parùm alta, atque ita patentia, ut magna liquoris superficies aëri subjiciatur. Sic enim formæ perfectioris crystalli concrescent.

Si crystallos autem voles et tenuiores et nivearum instar implicatas, excipietur altioribus vasis liquor, atque idem spatulâ ligneâ dum frigescet exagitabitur.

Sal idem obtineri quoque valet, si Carbonate Sodæ, aut ipsā Calce, saturetur sal acidulum residuum ex Muriate Sodæ, undē, mediante Acido Sulfurico, Acidum Muriaticum elicitum fuit. Sal, hāc methodo paratum, aquæ bullientis quantitate sufficienti solutum, colato liquore, in crystallos concrescat solito artificio.

Sal idem venale prostat ex fontibus salinis Lotharingiae, post Muriatis Sodae præparationem residuum, et notum est nomine *Salis Epsamensis Lotharingici*; sed istud, minimè sincerum, indiget ut solvatur denuò, et in crystallos coalescat hâc arte puriores.

Servari debet *Sulfas Sode* in vasis perfecte obturatis.

5. SULFAS MAGNESIÆ PURUS.

R. Carbonatis Magnesiae..... quantum opus est.

Redigatur in pulverem, excipiatur vase vitro aut porcellaneo, ipsique affundatur Acidi Sulfurici notantis gradus 15, quod saturando sufficiat. Tunc bulliat leniter liquor, coletur, vaporet, atque ubi gradus in areometro 25 attigerit, reponatur in loco frigido, placidoque: sic habebuntur crystalli majores, justæque figuræ; si autem malis tenuiores et confusè implicatas, ut vulgo venalibus similes appareant, exagitandus identidem erit liquor, donec sal concreverit.

Ex eodem autem sale, vulgo venali, quod *Epsamense* aut *Sedlitzense* vocant, sed minimè sincero, si purum habere volueris verum *Magnesiae Sulfatem*, solvatur illud in aquæ quantitate sufficienti, vaporetque, donec bulliens liquor notet gradus 50; coletur et reponatur ut crystalli concrescant. Eas autem tantum excipies quæ primæ concreverunt. Sequentes eādem iterum methodo purgari indigent, ac demùm ubi eò ventum est, ut liquor residuus nullâ arte in crystallos possit coalescere, dimittendus est, nihil enim ipsi inest nisi Murias Magnesiae, qui concrescere nequit.

4. SULFAS ACIDUS ALUMINIS ET POTASSÆ PURUS.

(N. R. *Super-Sulfas Aluminii et Potassii aliquoties insuper et Ammoniae.*)

R. Aluminis vulgò venalis quantum licet purissimi....
..... *quantum opus est.*

Solvatur in aquæ bullientis dupli, triplici quantitate.
Cola, sepone, ut crystalli concrescant; eas, ut potè adhuc-
dùm impuras, solve denuò ut puriores habeantur.

5. SULFAS FERRI VIRIDIS.

(N. R. *Proto-Sulfas Ferri.*)

R. Scobis Ferri purissimæ.... *quantum opus erit.*

Conjice in vas fictile latè patens; affunde sensim Acidi Sul-
furici duplum, notantis gradus 20; ubi materies effervescere
cessaverit, plenè solutam effunde in Ferreum caldarium,
in quo vaporet, donec notet in areometro gradus inter 50
et 52. Post aliquam quietem elutriatum liquorem sepone, ut
in crystallos solidescat, quas, solutas iterum et percolatas,
iterum quoque sepones, ut indè habeantur crystalli puriores.

Sulfas Ferri vulgò venalis, Sulfate Aluminis et Sulfate Cu-
pri inquinatus, purgari potest, si solutus bulliat cum Ferri
Scobe purissimâ, ac deindè colatus vaporet et ad crystallos
seponatur, ut artis est.

Crystalli, ubi extillaverit aqua, siccæ in vasis perfectè ob-
turatis servandæ sunt.

6. SULFAS CUPRI CÆRULEUS.

(N. R. *Deuto - Sulfas Cupri.*)

- R.** Scobis Cupri..... *partem unam.*
 Acidi Sulfurici (66^g)..... *partes duas.*

Utraque materies, ne acidi sulfurosi vapor pulmoni infestus sit, ingeratur in retortam vitream, arenæ imponendam; colloque aptetur *matratium*, ore tubulato patens, cui tubus ad securitatem unus inseratur, et alter inflexus ejus crus alterum in lagunculam aquâ ad dimidias plenam immagatur; incalescat retorta ad Cupri solutionem. Acidum Sulfurosum emanabit, lagunculâ excipiendum. In retorta autem supererit fusca materies salina, aquæ quantitate sufficienti solvenda. Liquor colatus vaporet, donec notet gradus 30; atque ubi refrigeruerit, in crystallos cœruleas egregiè figuratas concrescat.

Sic vulgo non paratur Sulfas Cupri, sed frequenter ex Sulfate venali, purgato ut artis est.

7. SULFAS CUPRI ET AMMONIÆ.

(N. R. *Deuto - Sulfas Cupri et Ammoniæ.*)

- R.** Sulfatis Cupri in pulverem redacti.....
 *quantum opus erit.*
 Huic in vase vitro sensim addatur
 Subcarbonatis Ammoniæ liquidi.... *quantum sufficit.*
 Donec materies viridis, quæ præceps fundum petit, omnino soluta sit.
 Liquori cyaneo adde parem et ultra Alcoolis quantitatem; quo facto, crystallos è liquore excussas, valde cœru-

leas , nullo admoto calore exsicca , et serva in vase vitro
accuratè clauso.

8. SULFAS ZINCI.

R. Acidì Sulfurici (20^e)..... *quantum opus erit.*

Acidum excipiatur patellā vitreā aut porcellanē arenæ
imponendā.

Incalescat modicè , et addatur per vices Zincus in micas
divisus purissimas.

Liquorem saturum , adhuc calentem , postquam additā
aquā ipsum aliquantulum dilueris , cola , vaporet deindè et
ad crystallos seponatur.

N. B. Sulfas Zinci vulgò venalis plerumquè admixto Sul-
fate Ferri aliquantulum inquinatur ; quem purum habebis
exurendo , solvendoque pluries , pluriesque ad crystallos
deducendo.

9. SUBSULFAS HYDRARGYRI PEROXYDATI , *seu TUR-*
BITH MINERALE.

(N. R. *Sub-Deuto-Sulfas Hydrargyri.*)

R. Hydrargyri purissimi..... 2,000
Acidi Sulfurici (66^e)..... 2,500

Ingeratur Mercurius in retortam fictilem siliceam lori-
catam ; super ingeratur Acidum : retorta furno imponatur
fornice tecto , aptetur collo tubus inflexus , cuius alterum
crus aquæ immergatur. Ignis ardeat, donec Acidum Sulfu-
ricum nullum ferè emanet.

Frigescat retorta , è quā eximatur massa salina albicans ,
quam in mortario vitro teres , pluriesque elues aquā stillatā

calente, et pulverem flavescentem subsidente siccabis leni calore, servandum in usus.

3°. NITRATES.

1. NITRATIS POTASSÆ PURGATIO.

(N. R. *Deuto-Nitras Potassii.*)

R • Nitratis Potassæ post cocturam tertiam vulgò venalis	2,000
Aquæ ballientis.....	1,000
Soluto sale, coletur liquor et seponatur, ut crystalli con-		
crescant.		

2. NITRAS POTASSÆ FUSUS SULFATIS PAUXILLO
MIXTUS, *SAL PRUNELLÆ*, VEL *CRYSTALLUS MINE-*
RALIS VULGÒ DICTUS.

R • Nitratis Potassæ repurgati.....	128
Conjice in crucibulum igni impositum; Nitrate li-	
quesfacto, injice per vices Sulfuris sublimati.....	2
Deflagratione peractâ, crucibulo parumper refrigerato,	
Nitratem in patinam effunde, itâ hinc inde versandam, ut	
sal fusum et defluens in tabellam refrigeratum concrescat.	
Exemptum et frustulatim diffractum serva.	

3. NITRAS HYDRARGYRI IN CRYSTALLOS CONCRETUS.

(N. R. *Proto-Nitras Hydrargyri.*)

R • Hydrargyri puri.....	120
Acidi Nitrici (28°).....	240

Mediante modico calore dissolvetur Acidò major pars Hydrargyri, liquor exceptus vaporet, et seponatur ut in crystallos albicantes concrescat.

Ex hoc Nitrate parari quoque potest, ut jam dictum est, Mercurius præcipitatus niger, vulgò *Mercurius Hahnemanni solubilis*, cuius præparandi modum, sub n° 11, inter Oxyda, pag. 217, descripsimus.

4. NITRAS HYDRARGYRI LIQUIDUS, VULGÒ *AQUA MERCURIALIS.*

(N. R. *Deuto-Nitras Hydrargyri aquā solutus.*)

R. Hydrargyri, ut artis est, purificati.....	120
Dissolve in <i>matratio</i> , mediante leni calore, in Acidi Nitrici (55 ^e)	150
Solutione peractā affunde aquae stillatæ.....	900
Post aliquot dies, cola et serva ad usum.	

5. NITRAS ARGENTI IN CRYSTALLOS CONCRETUS.

R. Argentī purissimi.....	120
Exceptum vase vitreo, vel porcellaneo dissolve in Acidi Nitrici purissimi (55 ^e).....	240
Vaporet liquor igne leni ad quartæ partis consumptionem.	
Sepone ut Crystalli concrescant.	
Quod superest liquidum vaporet iterūm et seponatur; et sic pergas, donec quidquid Crystallorum haberi potest concreverit.	

6. NITRAS ARGENTI FUSUS, VULGÒ *LAPIS INFERNALIS.*

R. Nitritis Argenti exsiccati..... *quod volueris.*

Conjice in crucibulum argenteum aut porcellaneum amplus; leni igne tumet primum materia, posteà detumescit; demùm, aucto igne, instar olei liquecit.

Effunde illico in modiolum fusorium (Gallicè *lingotière*), prius calefactum, seboque litum.

Concreta massa eximatur, servetur in vase probè obturato, et in loco sicco reponatur.

4°. ACETATES.

1. ACETAS POTASSÆ, DICTUS TERRA FOLIATA TARTARI.

(N. R. *Acetas Potassii.*)

R Sub-Carbonatis Potassæ..... quantum opus erit.

Injiciatur per vices in Aceti stillatii, vel Acidì Acetici, quantum sufficit ad plenam sub-carbonatis saturationem; cola.

Vaporet liquor in Argenteo caldario; et ubi dodrans pars circiter vaporaverit, frigescat quod superest, positoque sedimento inutili, transfusus latex denuò incalescat, et addito etiamnùm Acido Acetico aliquantulo, vaporet demùm ad siccitatem, assiduè agitando.

Sal sic paratum in lagunculam ritè obturata congreratur, et servetur ad usum.

N. B. Quidam, ut Acetatem hunc obtineant albissimum, liquorem, postquam ad dimidiás vaporavit, calidum in carbones è lignis paratos, suprà idoneum colum dispositos, conjicere amant, et sic percolare, alieno colore prorsùs liberum.

2. ACETAS SODÆ, DICTUS TERRA FOLIATA MINERA-

LIS. (N. R. *Acetas Sodii.*)

R Sub-Carbonatis Sodaë Crystallorum, quantum opus erit.

Affunde per vices Aceti stillatitii, quod satis est ut Carbonas sit plenè satur.

Liquor colatus vaporet in vase argenteo, donec areometri gradum 32 attigerit, aut ipsi pellieula obducatur; tunc quiescat, ut, dum frigescet, Crystalli concrescant; quas, plures solutas pluriesque concrescentes, habebis tandem purissimas.

5. ACETAS AMMONIÆ LIQUIDUS.

R. Acidi Acetici purissimi gradus 3 notantis....	480
Sub-Carbonatis Ammoniæ concreti circiter.....	50

Scilicet quantum sufficit ut Acidum plenè saturum evadat.

Incalescat leviter Acidum in pelve argenteâ, aut in curbitâ balneo maris impositâ: tunc, addito per vices, ad saturationem usque, Sub-Carbonate Ammoniæ, liquorem cola et serva in lagunculis perfectè obturatis.

Liquor autem sic paratus colore expers esse, nullatenus Acidus, et in areometro gradum 5 attingere debet, densitatem nempe 1,036 æqualem.

DE SPIRITU IPSO, SIC DICTO, MENDERERI.

Notandum tamen, si salem velis ipsum quem nuncupare *Spiritum Mendereri*, tunc non Sub-Carbonatem Ammoniæ purum, sed *Subcarbonatum Ammoniae Oleosum Pyrogenæum*, qualem suppeditat destillatio Cornu Cervi, esse sumendum, eumque vel liquidum, vel potius concretum, èà quantitate quæ sufficiat saturando Acido. Acidum autem speciatim præscribebant, quod *Spiritum Aceti* vocitabant, illud scilicet quod prodit in Aceti destillatione, postquam

liquidi tertia pars prior, aquosa nimis debiliorque, excepta est, et antequam pyrogenæum odorem spiraverit Acidum factum densius, destillatione ad finem vergente.

Hac methodo, ut optimè annotavit D. CHAUSSIER, *Spiritus Mendereri* tenet quoddam saponuli ammoniacalis genus, Oleo Pyrogenæo et Ammoniæ Subcarbonate cons-tans, cui et tonica et diaphoretica vis non immerito forsan tribuitur, quâ non æquè pollet Acetas Ammoniæ cum Car-bonate Ammoniæ puro confectus.

Ad præscriptam Acetatis Ammoniæ densitatem, gradum-que areometri quintum, facilè sub leni calore vaporando adduci potest *Spiritus ipse Mendereri*, etiamsi adhibito Sub-carbonate Ammoniæ oleoso liquido confectus fuerit. Ve-rum, cùm calore facilis sit Ammoniæ dissipatio, ipsum quoque Acetatem Ammoniæ in Pharmacopoliis sèpiùs Acidum inveniri contingit; atque adeò, utendi tempore, ipsum probare convenit cæruleo aquosarum Crotonis, Violarum, aut Malvæ tincturarum colore, et, si Acidior fuerit, Am-moniâ ex tempore saturare.

In Acetate autem Ammoniæ utrovis, quales hic consti-tuendos indicavimus, ut constat experimentis à D. VAU-QUELIN institutis, continetur circiter decima pars tantum Acetatis Ammoniæ aquâ omni quantum fieri licet liberi; et hoc ipso in Acetate ratio Acidi Acetici puri ad Ammo-niam erit circiter ut 6 ,9 ad 2 ,5, sive ut 7 ,3 ad 2 ,7.

Quam analysim hic loci expônere utile duximus in me-dicamento usitatissimo, et quod parcè nimiùm Medici ple-rique in formulis præscribere solent

extremo in r. 2. tempore effusio excepit r. 2. r. 2. r. 2. r. 2.

4. ACETAS HYDRARGYRI.

(N. R. *Proto-Acetas Hydrargyri.*)

R. Proto-Nitratis Hydrargyri.....	60
Aquæ stillatæ.....	560

Nitratem aquā solve, soluto sali affunde Acetatis Potassæ liquidi quantum satis, ut nihil amplius subsidat; effundatur liquor, præcipitatus Acetas eluatur pluries, et sicetur celeriter.

5. ACETAS PLUMBI IN CRYSTALLOS CONCRETUS, DICTUS
SACCHARUM SATURNI.

R. Oxidi Plumbi semivitrei <i>Lithargyrum</i> dicti...	1,000
Acidi Acetici stillatitii quantum ad saturationem requiritur.	

Vaporet liquor donec pellicula supernatet, et loco frigido reponatur, ut Crystalli concrescant; residuus liquor vaporet denuò similiter, reponaturque; idque tandiù iteretur, donec Crystalli nullæ possint concrescere.

6. SUB-ACETAS PLUMBI LIQUIDUS.

(N. R. *Sub-Acetas Plumbi.*)

R. Acetatis Plumbi in crystallos concreti partes..	5
Aquæ stillatæ circiter partes.....	9
Excipientur pelve Cupreâ, et leni calore crystalli solvantur; adde	
Oxidi Plumbi semivitrei fusi.....	1
Bulliant, spatulâque interea exagitentur, donec oxidum sit solutum, et liquoris densitas æquet 50 in areometro	

gradus; frigescat liquor, coletur, et vasis excipiatur accuratè clausis.

Ad hunc densitatis gradum ubi devenit hic Sub-Acetas, vulgari nomine *Extractum Saturni* audit.

Cujus si uncia semis, vel..... 16

Solvatur in Aquæ stillatae libris duabus, vel..... 1,000

Additis Alcoolis (12=22 B¹) unciis duabus, vel.. 6*4*

Habebitur solutio dicta vulgo *Aqua Vegeto-Mineralis*.

Si aquâ vulgari eadem pararetur, lactesceret plerumque, verso partim aut in Carbonatem, aut in Sulfatem Plumbi, Plumbi Acetate, et parte aliquantulâ Acetatis Calcis in ipsius locum aquâ solutâ.

5°. TARTRATES.

1. TARTRAS ACIDULUS POTASSÆ PURUS.

(N. R. *Super-Tartras Potassii.*)

R Tartratis aciduli Potassæ venalis... *quantum opus erit.*
Solvatur in aquæ bullientis sufficienti quantitate; liquor coletur, ut aliena admixta quibus inquinatur excludi queant; tunc albuminis ope liquetur, despumet, per pannum trajiciatur, ut Crystalli concrescant.

2. TARTRAS ACIDULUS POTASSÆ SOLUBILIS, ADMIXTO ACIDO BORACICO.

R Tartratis aciduli Potassæ puri in pulverem triti..... 210
Acidi Boracici..... 50
Aquæ stillatae..... 20
Acidum Boraeicum et aquam simul misce in argenteo

caldario. Galescant , simulque exagitentur spatulâ. Ubi satis incaluerint, partitè et per vices addatur Tartras acidulus, semper agitando ; omnia sic commixta mirè liquecent, et eodem calore ad siccitatem deducta pulverulenta evadent ; tunc hypocausti calore ad perfectam siccitatem perducantur, et terantur in pulverem tenuissimum , in vase perfectè obtutato asservandum.

5. TARTRAS POTASSÆ, OLIM *SAL VEGETABILE*.

(N. R. *Deuto-Tartras Potassii.*)

R. Tartratis aciduli Potassæ. *quod volueris.*
Bulliat cum Aquæ pluvialis..... *quantum sufficit.*
Tum adde Sub-Carbonatis Potassæ quod requiritur ad plenam saturationem.
Bulliant leviter ; liquor coletur , vaporet , donec notet in areometro gradus 45. Tunc sub aëre modicè calido quiescat , ut sensim Crystalli concrescant.

4. TARTRAS POTASSÆ ET SODÆ OLIM *SAL POLYCHRESTUM SOLUBLE*, VULGÒ SEL DE SEIGNETTE.

(N. R. *Deuto-Tartras Potassii et Sodii.*)

R.	Tartratis aciduli Potassæ.....	200
	Solve in Aquæ pluvialis.....	640
	Tum adde	
	Sub-Carbonatis Soda circiter.	160
	Vel quantum sufficit ad plenam saturationem.	
	Solutio coletur , vaporet ad 55 gradus , ut sensim refri- gescendo concrescant crystalli ; quas , si res postulabit , ite- ratâ solutione puriores obtinebis.	

5. TARTRAS POTASSÆ STIBIATUS, VULGÒ TARTARUS
EMETICUS.

(N. R. *Deuto-Tartras Potassii et Stibii.*)

R. Oxidi Stibii Sulfurati vitrei supra porphyriten laevigati.....	160
Tartratis aciduli Potassæ.....	240
Fiat pulvis excipiens vase fietili aut potius ar- genteo cum aquæ purissimæ.....	<i>quod sufficit.</i>
Bulliant per semi-horam, addendo identidem aquam fer- ventem. Liquor tepidus coletur; vaporet in cymbio por- cellaneo ad siccitatem usque; residua post vaporationem materies aquâ bulliente solvatur, vaporetque denuò, donec notet 20 gradus; seponatur ut concrescant crystalli, quas hac methodo omnino puras obtinebis.	

6. TARTRAS HYDRARGYRI.

(N. R. *Proto-Tartras Hydrargyri.*)

R. Proto-Nitratis Hydrargyri.....	20
Solvatur in Aquæ stillatæ.....	160
Liquori colato adde sensim Tartratem Potassæ aquâ so- lutum, addendoque pergas, donec nil amplius subsidat. Pre- cipitatus pulvis, Hydrargyri Tartras, effuso liquore, frigidâ affatim eluat, siccat et servetur ad usum.	

7. TARTRAS POTASSÆ ET FERRI LIQUIDUS, OLIM TINC-
TURA MARTIS TARTARISATA.

(N. R. *Tartras Potassii et Ferri.*)

R. Scobis Ferri puræ et nitidæ.....	64
Tartratis aciduli Potassæ.....	160

Conjice in ollam ferream, amplam; adde tantum aquae pluvialis purissimae, quantum sufficiet ut fiat massa mollis, per viginti horas seponenda.

Tum affunde

Aquæ pluvialis.....

200

Bulliant per duas horas, identidem agitando et aquam ferventem addendo; postquam ebullire cessaverit, paululum quiescat liquor, et qui purior supernabit transfundatur; coletur vaporetque, donec gradus 52 attigerit; tum adde Alcoolis (26=56 B⁴). .

10

Serva ad usum.

Ex hoc liquore paratur *Extractum dictum Martis*, si vaporat in Extracti densitatem.

8. TARTRAS POTASSÆ ET FERRI, OLIM TARTARUS CHALIBEATUS SOLUBILIS.

(N. R. *Tartras Potassii et Ferri.*)

R. Tartratis Potassæ in pulverem triti..... 40
Tartratis Potassæ et Ferri liquidi (*Vide supra*,
nº 7)

160

Misceantur et vaporent simul igne leni in vase ferreo ad siccitatem; residuum sal in vase probè obturato serva.

N. B. Non erit multum absimile sal, quod parari potest, si Tartratem Potassæ et Ferri liquidum, servatâ eâdem ratione, miscueris cum Tartrate Potassæ et Sodæ. Verum hoc non æquè liquecit (*N. R. Tartrates Potassii, Sodi et Ferri*).

9. TARTRAS POTASSÆ ET FERRI SOLIDUS, VULGO GLOBULI MARTIALES, DICTI NANCEIANI.

R. Scobis Ferri supra porphyriten levigatæ.... 500

Tartari de Vino rubri in pulverem tenuissimum triti.....	1,000
Alcoolis (8=18° B ⁴).....	<i>quantum satis.</i>

Coeant omnia in pultem lente diffuentem, syrapi instar spissioris, excipiendam vase laventino aut fictili crustâ vitreâ obducto, deinde per quinque sexve dies seponendam sub aëris modico tepore, et de die plures exagitandam.

His ita peractis, igne supposito, incalescat circiter ad gradum 60 aut 64 Reaumur, moveaturque saepius spatulâ materies; atque ubi mellis instar densioris vaporando erit inspissata, novâ Alcoolis ejusdem notæ copiâ diluatur, iterumque et inspissetur et diluatur, et tandiù idem repetatur, donec massa, amissò omni metallico splendore, nigrescat penitus. Tunc temporis, non jam addito Alcoole, vaporare perget, donec, in massam redacta plasticam manibusque tractabilem, informari possit in globos, quorum singuli æquabunt grammata circiter aut duo et triginta, aut sexaginta quatuor, sive unciam unam duasve; in tepidario lente exsiccandi. Sic parati isti globi non jam fissuris, ut saepius fit, deturpabuntur.

6°. PHOSPHATES, CARBONATES, MALATES, ARSENITES.

1. SUB-PHOPHAS SODÆ.

(N. R. *Sub-Phophas Sodii.*)

R. Ossium donec albescant exustorum, et in pul-	
verem contritorum.....	1,500
Acidi Sulfurici (66°).....	900
Ossium pulvis diluatur in Aquæ communis.....	5,000
Tunc super affunde Acidum, omniaque moveantur spatulâ	

ligneā, ut misceantur intimè. Reponantur deinde per aliquot dies, additā præterea aquā, quantum sufficere videbitur.

Liquorem deinde cola, et qui pulvis supererit insuper eluat; liquor prior, et is qui de loto pulvere secessit, unā misceantur, vaporent ad syrupi densitatem, aquā deinde diluantur, colentur, ut auferatur qui præceps secessit Sulfas calcis. Tunc liquori, cui solutus inest Phosphas Calcis acidus, addatur Sub-Carbonas Soda, eoque saturetur plenè superque. Atque ubi Phosphas Calcis Soda exclusus omnis subderit, elutriatus liquor calescat, coletur, vaporet donec gradus 25 attigerit, et seponatur ut crystalli concrescant, quas solutas iterum habebis deinde purores.

Si, post depositas primò Crystallos, acidum adhuc sapiat, Sub-Carbonate Soda saturetur liquor; si verò alkalinus deprehendator, addito Phosphate Calcis Acido, mitescat.

2. CARBONAS ZINCI.

R. Sulfatis Zincii purissimi..... 100
 Solve in Aquā stillatæ servidæ..... 1,000
 Cola et instilla paulatim Carbonatis Soda in Aquā
 soluti..... quantum sufficiet,
 ut Carbonas Zincii præceps subsidat; pulverem album præ-
 cipitatum, probè elutum et siecatum, serva ad usum.

3. MALAS FERRI.

(N. R. *Proto-Malas Ferri.*)

R. Scobis Ferri suprà porphyriten levigatæ.... 500
 Succi de Malis acidulis (*Malus communis*)..... 2,000
 Misceantur intimè, et per triduum digerantur in vase vitro-
 clauso, sub calore 50° (57,5 centig.); sensim deinde incales-

cant et modico calore vaporent ad dimidias. Coletur liquor,
et balneo maris, clauso vase, vaporet in extracti spissitatem.
Quem sic addensatum serva ad usum vitreis in vasis accuratè
clausis.

4. ARSENITES POTASSÆ.

ET LIQUOR ARSENICALIS dictus FOWLERI.

(Ph. Lond., pag. 46, Ed. 1809 in-18.)

(N. R. *Arsenias Potassii.*)

R oxidi Arsenici albi, seu Acidi Arseniosi (N. R. <i>Protoxidum Arsenici</i>) in pulverem redacti.	5
Sub-Carbonatis Potassæ.....	5
Aquæ stillatæ purissimæ.....	500
Misceantur accuratè, bulliantque simul in cymbio vitreo, donec Acidi Arseniosi nihil non solutum su- persit. Liquori frigefacto adde	
Alcoolati de Melissâ compositi.....	16
Tunc super addatur Aquæ tantum quantum suffi- ciet, ut liquoris totius pondus æquet.....	500
Ratio Arsenitis Potassæ ad totum liquorem erit $\frac{1}{50}$. Guttæ adeo 72, quarum pondus æquat grana 50, tenebunt Arsenitis Potassæ granum unum.	

N. B. Nulli requirenti hic liquor concedendus est, nisi ex
legitimâ præscriptione justoque chirographo.

IV. SULFURETA.

DE SULFURETIS.

Sulfureta vocantur composita quædam ex Sulfure, quod

Metallis, Terris, aut Alcalibus chymicâ affinitate consociatur.

Multa ex his, Metallica præsertim, ex ipsis Terræ visceribus aliquando effodiuntur adeò sincera, ut eā præparatione tantum indigeant, quâ materie, cui inhærent, excussâ liberentur. Verūm, ut plurimūm, solertissimam requirunt analysis, operationumque seriem multiplicem ut pura et usui aptiora evadant.

Præterea Metallica Sulfureta arte quoque chymicâ confici queunt. Ipsorum consecratio magnis in officinis, magno apparatu perficitur imprimis; atque indè venalia prostare solent.

Verūm Sulfureta Alcalina et Terrea à Pharmacopœis ipsis eā industriā parari debent, quæ mox præscribetur.

Metallica quidem Sulfureta plerumquè paucis admodum cautelis indigent ut intemerata asserventur, utpotè parūm in aëre mutabilia; alkalina verò et terrea, quæ facile ad aëris contactum immutantur, vasis includenda sunt perfectè obturatis.

Inter Metallica, quatuor tantum hodie dūm aut inter medicamenta recensenda sunt, aut quibusdam compositis admiscentur.

Talia habentur,

Sulfureta Arsenici flavum rubrumque, vulgò venalia.

Sulfureta Hydrargyri rubrum nigrumque. Rubrum inter vulgò venalia haberri potest, sed præstat arte factum à Pharmacopœo. Nigrum semper arte factum habendum est.

Sulfuretum Stibii, vulgò venale.

Ferri Sulfuretum arte factum habetur, aut fusis simul Sulfure et Ferro, aut quod residuum est post præparatum Hydrargyrum ex Sulfureto rubro purum (*V.* pag. 212).

1. SULFURETUM HYDRARGYRI NIGRUM, VULGÒ ETHIOPS MINERALIS.

R. Hydrargyri puri.....	80
Sulfuris sublimati,.....	160

Terantur simul in mortario marmoreo, pistillo vitreo; et sic perge, donec nullatenus splendeat Hydrargyrum, mixta que nigrum præferant colorem.

N. B. Temporis lapsu pulvis iste nigrior fiet; quæ nota est intimioris Hydrargyrum inter Sulfuris connubii. Indè quoque sequitur vetustiorem hunc pulverem virtutibus frui non omnino iisdem quibus recentior.

Sulfuretum idem alio quoque modo parari valet. Nempe fuso in trullâ ferreâ sulfure, si Hydrargyrum quam tenuissimè divisum inspergas, cum videlicet pelle præparata Rupi-ca-præ (*peau de chamois*) inclusus, per poros trajicitur pluitque Hydrargyrum; tunc Sulfuris fusi contactu cum ipso coalescit, præsertim urgente pistillo assidue adactus, aut ferreâ spatulâ, donec matières omnis, igne amoë, friguerit.

Verum hâc methodo paratum Sulfuretum in usus internos non adhibetur: vulgò anteponitur illud quod terendo tantum, nec mediante igne, confectum est.

2. SULFURETUM HYDRARGYRI RUBRUM, VULGÒ CINNABARIS.

Vulgò venale prostat hoc Sulfuretum; at enim, si Pharmacopœus illud ipse sibi parare prætulerit, sequenti me-

thodo uti conveniet; quam, ut fama est, adhibere solent
Batavi.

R.	Sulfuris sublimati et loti.....	150
	Hydrargyri puri.....	1,080

Incalescent simul in vase ferreo mediocriter alto, fundo complanato, intus expolito, calorque sufficiat ut Sulfur liquatum fluat. Interēa moveantur continuò Hydrargyrum et Sulfur, ne recusent consociari, prae ponderis differentia. Elapo horae quadrante, subducto igne, frigescat matieres, coloris tunc nigri; quae in pulverem trita projiciatur illico in crucibula igni imposita; quibus sensim incalescentibus demum erumpet flammā obscurè violacea; quae ubi cessaverit, tegentur crucibula tegminibus ferreis. Sic continuato igne Cinnabaris sublimabitur totus.

3. HYDROSULFURETUM RUBRUM STIBII SULFURATI,
VULGÒ KERMÈS MINERALE.

R.	Aquæ pluvialis.....	1,280
	Bulliat ad expellendum aërem ipsi naturâ immixtum, quo discusso, solve	
	Carbonatis Soda.....	128
	Liquor bulliat per horam dimidiā, spatulâque lignea agitetur, admiscendo	

Sulfureti Stibii in tenuissimum pulverem triti.... 6

Liquor coletur fervens; colo vas supponatur tenens aquam tepidam, ex qua prius bulliendo aër exclusus fuerit; in eam deciduus ubi excipietur liquor, subsidet pulvis obscurè ruber; aqua ipsa, ubi refrignit, transfundatur seponaturque; pulvis autem, suprà telam densioris textū expansus, eluatur affusâ identidem aquâ purâ, frigidâ primū, deindè

calente, et cuius aër bulliendo priùs exclusus erit; idque tandem iteretur, donec aqua insipida exstillet. Praelo subjiciatur pulvis, ad aquam exprimendam; qui demùm, penitus celeriterque in umbrâ exsiccatus, servabitur in vase luci impervio.

Nota. Kermès eodem modo parari quoque potest mediante Sub-Carbonate Potassæ; verùm multi illum anteponunt qui mediante Soda Sub-Carbonate preparatus est; hunc scilicet magis sibi constare arbitrantur.

4. HYDROSULFURETUM LUTEUM OXIDI STIBII SULFURATI, VULGÒ *SULFUR ANTIMONII AURATUM.*

R. Liquoris, ex præcedenti operatione, posito Kermete residui..... *quantum opus est.*
Cui sensim instillando adde:

Acidi Acetici (5g)..... *quantum sufficiet.*

Pergasque donec cessest subsidere pulvis luteus, qui, aquâ stillata perfectè elutus et exsiccatus, in vase vitro servandus est.

5. SULFURETUM POTASSÆ.

R. Sulfuris sublimati..... 100
Sub-Carbonatis Potassæ exsiccati 200
Misce simul, et, igne sensim aucto, liquefiant in *matratio.*
Materies fusa, cùm refriguerit, rupto *matratio*, diligenter in vase perfectè obturato asservabitur.

Arte simili obtinentur

Sulfuretum Soda.

Sulfuretum Calcis.

6. SULFURETUM AMMONIÆ HYDROGENATUM, AUT HYDROSULFURETUM AMMONIÆ, VULGÒ LIQUOR FUMANS BOYLII.

(N. R. *Hydrosulfas Ammoniae Sulfuratus.*)

R.	Calcis in pulvere in tritæ.....	160
	Muriatis Ammoniæ.....	160
	Sulfuris sublimati.....	80

Misceantur intimè et ingerantur in retortam fictilem sileam loricatam. Aptato huic excipulo, additoque vase intermedio, atque inserto tubo incurvo, cuius crus inferius aquæ immergatur, destillent leni igne. Transibit liquor, olei instar fluens, colore ex rubro luteo, aut qualis est intensus Aurantiorum color, vapores emittens fetidos, quem scrubabis in vase perfectè obturato.

7. SULFITES SODÆ SULFURATUS.

(N. R. *Deuto-Sulfites Sulfuratus Sodii.*)

R.	Vas habeatur in quo solvantur	
	Sub-Carbonatis Sodæ.....	520
	In Aquæ purissimæ.....	640
	Admisceanturque	
	Sulfuris sublimati.....	40

Huic liquori immergatur crus unum tubi inflexi, cuius altera pars aptabitur collo retortæ fletilis sileæ tubulatæ.

In retortam ingerantur	
Hydrargyri	640
Acidi Sulfurici (66%).	800

Igne retortae supposito, impositaque fornice, dum solvitur
Acido Mercurius, sese expediet Gaz Acidum Sulfurosum, et
Carbonati Soda aqua soluto Sulfureo miscebitur; quod,
continuato igne, tandi fiet, dum, peracta solutione, nullum
amplius gaz emanabit. His peractis, Aqua tenebit solutum
Sulfitem Soda Sulfuratum. Postquam aliquantis per bullierit,
coletur liquor, vaporet modico calore, lentèque frigescat,
ut sal in justæ formæ crystallos possit concrescere.

Qui superest in retortâ Hydrargyri Sulfas inservire valet
ad parandum Sulfatrem Hydrargyri Oxygenatum, vulgo
Turbith minerale, ut suo singula loco exposita sunt.

Potest tamen in Hydragyri locum suffici Carbo, cuius satis
erant partes 200, eadem cæterorum ratione servata.

V. SAPONES.

1. SAPO EX SODA AMYGDALINUS, VULGO SAPO MEDICALIS AMYGDALINUS.

R • Sodæ liquidæ (quam causticam dicunt, seu Saponiorum Lixiviam) notantis 36 g.....	100
Olei Amygdalini recentis.....	210
Oleum excipiatur vase saventino aut figulino, et ipsi per partes admisceatur Soda, quæ simul spatulâ ex ligno albo confectâ agitetur, donec oleo ita coeat, ut simul concres- cant, modicâ partium cohærentiâ; quod intrâ paucos dies contingere solet.	

Tunc in formas aut Chartaceas, aut è ligno albicante
confectas, chartâ intus obductâ, Sapo adhucdum mollior

dividitur; in quibus demum solidescit. Tunc exemptum
serva ad usum.

N. B. Hic Sapo non aptus est ad usus medicos nisi bi-
mestris.

Simili modo parari potest

Sapo ex Olivo.

2. SAPO EX OLEO TEREBINTHINÆ VOLATILI ET PO-
TASSA, seu STARKEYANUS.

Cum ægrè admodum oleis volatilibus quibuscumque
Potassa societur, atque, ubi demum operose coaluit, facile
hic Sapo, resoluto partium nexu, prorsus immutetur,
sequentि modo præstat ipsum parari:

R. Sub-Carbonatis Potassæ penitus exsiccati,
Olei volatilis de Terebinthinâ stillatitii,
Terebinthinæ Venetæ..... a' a partes æquales.
Teratur Sub-Carbonas in mortario marmoreo, pistillo
vitreo, ipsique admiceatur oleum volatile, ac deinde Te-
rebinthina. Quæ, ubi in debitam spissitudinem coaluere,
suprà porphyriten levigentur, saepe sic paratus in vase
faventino asservetur.

Hoc modo confectus Sapo iste, in extracti densitatem
consistit, homogeneus perstat, nec temporis lapsu immuta-
tur, caretque vitiis quæ sat citò contrahit sapo vulgari me-
thodo confectus Starkeyanus.

Cætera olea volatilia, si saponis formâ ipsis placeret uti,
Saponi amygdalino determinata dosi possunt admisceri.

3. SAPO CALCAREUS, VULGÒ LINIMENTUM OLEOSO-CALCAREUM.

R. Aquæ Calcis recenter parate.....	800
Olei Amygdalarum dulcium.....	100
Misce accuratè simul agitando.	

N. B. Oleum Calci mixtum aquæ innatabit, atque inde eximi potest in usus medicos. Sapo iste ex tempore tantum parandus est, pro rei necessitate. Extùs præcipue, et ad ambusta usurpatur.

4. SAPO AMMONIACALIS, VULGÒ LINIMENTUM VOLATILE, SEU AMMONIACALE.

R. Ammoniæ liquidæ gradum 22 notantis.....	16
Olei Amygdalarum dulcium.....	128

Misce, agitando in phialâ probè obturatâ, et fiet Linimentum in quo Ammoniæ ratio erit ad Oleum ut 1 ad 8. Iste Sapo temporis tractu lentescere, atque etiam potest demum in massam mollem, nec jam disfluentem, addensari.

5. LIQUOR EX AMMONIA OLEO SUCCINI VOLATILI
COMMIXTA VULGÒ AQUA LUCIÆ DICTUS.

R. Olei succini destillando depurgati (<i>rectificati</i>).	12
Balsami seu resinæ Meccanæ.....	8
Alcoolis (26 = 56 B°).....	500
Digerantur per quatriodium et sic fiat tinctura.	

Tum

R. Tincturæ prædictæ.....	1
Ammoniæ liquidæ (20 g).....	16

Tincturam Ammoniæ instilla. Admissâ tincturâ liquor lactescet, agitandus ut commisceantur, oleo in Saponulum verso, et non tam

soluto quam diluto, quibus constat aqua dicta *Luciae*, quam servabis adusum.

Quidam tincturæ aliquantulum saponis addunt Amygdalini, ut olej solutio in Ammoniâ pleniùs absolvatur.

6. SAPO EX MEDULLA BOVINA, AMMONIACALIS, CAMPHORATUS, VULGO *BALS. OPODELDOCH.*

Paratur primò Sapo animalis de Medullâ Bovinâ sequenti modo.

R. Medullæ Bovinæ, ut jam dictum est (pag. 8),	
præparatæ	500
Potassæ liquidæ (v. pag. 208).....	250
Misceantur et simul liquecant igne leni, spatulâque moveantur, donec intimè mixta coalescant in Saponem aquâ omnino solubilem.	
Quo facto, solvatur Sapo iste	
In Aquæ bullientis	2,000
Addaturque soluto	
Muriatis Soda.....	180
Soluti in Aquæ stillatae.....	1,000
Sapo brevi præceps agetur; idem frigefactus, abjectâ aquâ, per linteum exprimendo transadigatur et siccatur, dividaturque ut erit opus.	
Hic est <i>Sapo ex Medullâ Bovinâ</i> .	
Tum ex ipso hoc Sapone parabitur Sapo Ammoniacalis Camphoratus sequenti modo.	
R. Saponis de Medullâ Bovinâ.....	64
Alcoolis purissimi (26=56 B°).....	576
Aquæ de Thymo stillatitæ.....	64
Camphoræ purissimæ.....	24
Sapo in frustula concisus ingeratur in vas ampullatum	

longioris colli (*matratum*), cæteris admixtis. Vasis ostium vesicâ obductâ innexâque contegatur. Vesica autem acu pertundatur, ut aëri pateat exitus. Haec mistura deinde liquefiat balneo maris, calidaque percoletur, et ubi paulisper refri-
guerit, ipsi admisceantur

Oleorum volatilium

Rosmarini.....	6
Thymi.....	2
Ammoniaæ liquidæ.....	8

Sic paratum Saponem *Opodeldoch* affundere solent in lagunculas cylindricas, ore latiori patentibus.

Potest etiam idem Sapo parari ex *adipe porcino* sive *ar-
vinâ*, paratâ ut dictum est de *Medullâ Bovinâ*.

N. B. Causticus idem et vesicans fit vulgo apud Germanos, auctâ tantum ratione Ammoniaæ. Hanc autem præcipue sibi comparant ex Muriate Ammoniaæ, ope Subcarbonatis Potassæ, admixto ad destillationem Alcoole purissimo; et Ammoniam sic paratam vocant *Liquorem Ammoniaæ vinosum*.

7. SAPONES RESINIS MEDICATI.

R.

Resinæ Jalapæ,

Aut Scammonii,

Aut alijs cuiusvis.....

8

Saponis Amygdalini.....

16

Solvantur in Alcoolis (22=52 B°) sufficienti quantitate.

Vaporet deinde Alcool; residuaque materies inspissetur in extracti densitatem.

Hujus Saponis grana tria tenebunt Resinæ granum unum.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

VI. AQUÆ MINERALES ARTE FACTÆ.

Cum, teste medicorum multorum experientiâ, manifestum sit multis in casibus Aquas, seu solutiones aquosas mineralium arte factas, non carere virtutibus, quibus ipsi nobilitantur fontes Aquarum Mineralium, quas passim diversis in locis scaturientes objicit Natura, non inutile visum est hic quædam subjicere de methodo, quâ non absimiles omnino naturalibus aquas ars chymica parare consuevit.

Paucas hic in exemplum attulisse sufficiat ex præcipuis et frequentiùs usitatis : ex his nempe facile et alias plures conficiendi methodus innotescet, pro singularum naturâ analyseos ope perspectâ.

Cæterum hic non tam Naturam æmulari, quam ad eam, quantum fieri potest, propriùs accessisse animus est, et non omnes, sed præcipuas, quibus indiget Medicina, attingere naturalium aquarum virtutes.

Aquas arte factas hic dividimus
in Aquas acidulas ;
Aquas acidulas salinas ;
Aquas acidulas martiales, seu Ferrum tenentes
solutum ;
Aquas hydro-sulfuratas.

1. AQUA ACIDULA SIMPLICIOR.

R. Primùm Gaz Acidi Carbonici, arte jàm descriptâ parati (*vide p. 201*), tantum quantum pro opere conficiendo requiritur : Tunc, ope antliæ comprimentis, ad dolio-
lum Aquâ stillatâ ferè plenum aptatae, gaz in dolium adiga-

tur eà copiâ, que in aëre libero quinquies Aquæ mensuram æquare valeat; post viginti quatuor horas, quâm celerrimè in lagenas urgeatur aqua sic parata, illicò diligentissimè obturandas, obturaculo citò resinâ liquatâ obducendo. Lagenæ autem singula sit circiter 650 grammatum, aut unciarum plus quâm viginti capax. Supinæ in cellis subterraneis reponantur ad usum.

AQUÆ ACIDULÆ SALINÆ.

2. AQUA VICIENSIS (DE VICHY).

R. Aquam acidulam, receptâ Gaz Acidi Carbonici duplâ mensurâ prægnantem..... quantum opus erit.

Solve

Pro Aquæ istius unciiis viginti et semis, vel.	650 <small>gram.</small>
Sub-Carbonatis Soda grana tringinta duo, vel.	1 ,6
Sulfatis Soda grana sexdecim, vel.....	0 ,8
Muriatis Soda grana quatuor, vel.....	0 ,2
Sub-Carbonatis Magnesiæ granum semis, vel	0 ,025
Muriatis Ferri grani unius quartam partem, vel.....	0 ,0125

Sales primùm in lagenam justæ capacitatis ingerantur; in ipsam deindè urgeatur Aqua acidula; obturetur illicò et diligenter lagenæ servetur in frigidario.

Simili artificio parandæ sunt

Aquæ sequentes, variâ pro variis admissâ salium quantitate, scilicet.

3. AQUA SELTERANA.

(DE SELTZ OU SELTER.)

R. Pro Aquæ acidulæ, quintuplâ Gaz Acidi Carbonici

mensurā medicatæ, uncii viginti et semis,	
vel.....	650 gram.
Sub-Carbonatis Soda grana quatuor, vel.	0 ,2
Sub-Carbonatis Magnesiæ grana duo, vel.	0 ,1
Muriatis Soda grana viginti duo, vel....	1 ,1
Cætera ut suprà peragantur.	

4. AQUA SEDLITZENSIS.

(DE SEDLITZ.)

1°. Debilior.

R. Aquæ acidulæ, Gaz Acidi Carbonici triplici mensurā prægnantis, uncias viginti et semis, vel.... 650 gram.

Sulfatis Magnesiæ circiter drachmas duas,
vel..... 8 ,0

Muriatis Magnesiæ grana octodécim, vel.. 0 ,9

2°. Saturatior.

Si Saturatiorem, naturalique propriorem
velis, augenda est ratio sulfatis Magnesiæ et
pro Aquæ acidulæ uncii viginti et semis, vel.. 650

Solvantur Sulfatis Magnesiæ drachmæ qua-
tuor, vel..... 16

Muriatis Magnesiæ grana triginta sex, vel. 1 ,8

N. B. Aqua Sedlitzensis naturalis Acido Carbonico aut
nullo feta est, aut paucissimo; et talis facilè parari potest,
solutis in Aquâ simplici Sulfate Magnesiæ et Muriate. Verum
usus apud nos invaluit Aquam acidulam ad solvendum Sul-
fatem adhibendi, undè et ingrata minus hæc Aqua, et ven-
triculo videtur esse amicior. Idem fieri etiam solet in aliis
omnibus salinis Aquis conficiendis.

5. AQUA BELLILUCANA.

(DE BALARUC.)

R Pro Aquæ acidulæ, Gaz Acidi Carbonici duplā men-	
surā prægnantis, unciis viginti et semis, vel...	650 gram.
Muriatis Sodaæ drachmam unam et semis,	
vel.	6
Muriatis Calcis grana octodécim, vel....	0 ,9
Muriatis Magnesiæ grana sex et quinqua-	
ginta, vel.	2 ,8
Carbonatis Magnesiæ granum unum, vel..	0 ,05

6. AQUA BORVONENSIS.

(DE BOURBONNE - LES - BAINS.)

R Pro Aquæ acidulæ, duplā Gaz Acidi Carbonici men-	
surā prægnantis, unciis circiter viginti et se-	
mis, vel.....	650 gram.
Muriatis Sodaæ circiter drachmam unam,	
vel.....	4 ,0
Muriatis Calcis grana decem, vel.....	0 ,5

AQUÆ ACIDULÆ MARTIALES.

7. AQUA SPADANA.

(DE SPA.)

R Pro Aquæ acidulæ, quintuplici Gaz Acidi Carbonici	
mensurā medicate, unciis circiter viginti et	
semis, vel.....	650 gram.
Sub-Carbonatis Sodaæ, grana duo, vel...	0 ,1
Muriatis Sodaæ, granum unum, vel.....	0 ,05
Sub-Carbonatis Magnesiæ grana quatuor, vel	0 ,2
Sub-Carbonatis Ferri granum unum, vel.	0 ,05

8. AQUA PYRMONTANA.

(DE PYRMONT.)

R. Pro Aquæ acidulæ , quintuplici Gaz Acidì Carbonicî mensurâ prægnantis, unciis circiter viginti et semis , vel.....	650 ^{gram.}
Muriatis Soda grana duo , vel.....	o ,1
Sulfatis Magnesiae grana octo , vel.....	o ,4
Carbonatis Magnesiae grana duodecim , vel..	o ,6
Carbonatis Ferri granum unum , vel.....	o ,05

AQUÆ HYDROSULFURATÆ.

9. AQUA HYDROSULFURATA SIMPLEX , SEU AQUA
HEPATICA.

R. Sulfureti Ferri.....	1,000
Acidi Sulfurici (66 gr).....	2,000
Diluatur acidum in aquæ stillatae.....	4,000

Sulfuretum autem in pulverem tritum ingeratur in phialam vitream.

Cui aptetur apparatus vasorum Woulfianus quinque aut sex lagenis constans aqua plenis sat capacibus , quarum ultima teneat duo et triginta circiter Potassæ puræ grammata in Aquæ kilogrammate uno soluta , sive unciam unam pro libris duabus. Acidum per vices Sulfureto affunde , ut gaz prodeat Hydrosulfuratum , quod sic , post saturatam priorum laguncularum Aquam , Potassâ mediante , in ultimâ lagunculâ detinebitur , nec tetro odore Officinam inficiet. Aqua autem hujus ultimæ lagenæ abjicitur , ut inutilis.

N. B. Aqua , barometro intrâ centimetra 76 stante , Gaz Hydrosulfurato maximè satura , istud non ultrâ mensuram sibi ipsi æqualem absorbere valet. Notandum autem est hanc

Aquam longè esse saturatiorem quam ut inserviat ad usus medicos, immo et dici posse venenatam, adeoque Aquam puram ratione esse, pro re natam, diluendam. Sæpius vero, ut patebit in sequentibus, aquæ hujus mensura una mensuram quadruplici aquæ stillatae erit remiscenda.

10. AQUA BAREGINENSIS.

(DE BARÈGES.)

R. Aquæ Hydrosulfuratæ saturæ circiter uncias quatuor, vel.....	130
Aquæ puræ circiter libram unam et unciam semis, vel.....	520
Carbonatis Soda grana sexdecim, vel....	0 ,8
Muriatis Soda granum semis, vel.....	0 ,025

Sales ingerantur in lagenam justæ capacitatis, deinde affundantur Aqua et Aqua Hydrosulfurata; obturentur lagenæ diligenter et serventur ad usum.

In hac misturâ Aqua tota tenebit gaz Hydrogenii Sulfurati quintam partem sue ipsius mensuræ.

Eadem methodo sequentes Aquæ confici debent, scilicet:

11. AQUA BONNENSIS.

(DE BONNES.)

R. Aquæ puræ circiter libram unam et unciam semis, vel.....	520
Aquæ Hydrosulfuratæ circiter uncias quatuor, vel.....	130
Muriatis Soda grana triginta, vel.....	0 ,15
Sulfatis Magnesiæ granum unum, vel....	0 ,05

12. AQUA AQUISGRANENSIS.

(D'AIX-LA-CHAPELLE.)

R. Aquæ puræ circiter libram unam et unciam semis , vel	520
Aquæ Hydrosulfuratae circiter uncias qua- tuor , vel	150
Carbonatis Soda grana viginti , vel.....	1 ,0
Muriatis Soda grana novem , vel.....	0 ,45

13. AQUA ACIDULÀ HYDROSULFURATA , QUAM DICUNT
VULGÒ NEAPOLITANAM.

(DE NAPLES.)

Juxta methodum DD. TRIAYRE et JURINE.

R. Aquæ Acidulæ , quadruplici Gaz acidi Car- bonici mensurâ medicatæ , circiter uncias quindecim et drachmas tres , vel.....	49 ² ,0
Aquæ Hydrosulfuratae uncias quinque et drach- mam unam , vel.....	164 ,0
Carbonatis Soda grana circiter octodecim , vel.	0 ,9
Carbonatis Magnesiae grana circiter decem ,	0 ,5
Ingestis priùs salibus , urgeantur in eamdem lagenam Aqua Hydrosulfurata , ac deinde Acidula ; et habebitur Aqua triplici Gaz acidi Carbonici mensurâ , et insuper Gaz Hy- drogenii Sulfurati mensuræ unius quartâ parte prægnans ; quæ , iisdem , quibus cæteræ , cautelis adhibitis , servabitur ad usum.	

14. AQUA AD BALNEUM HYDROSULFURATA.

Pro Balneo 6*40* librarum aut kilogrammatum 520.

- R.** Hydrosulfureti Soda liquidi, gradus in
Areometro 25 notantis, uncias decem, vel..... 520
 Solutionis salino-gelatinosæ, mox describendæ,
 uncias quatuor, vel..... 128
 Misceantur simul, et deinde in balnei Aquæ. paulò ante
 ingressum, agitando et penitus commovendo, dissolvantur.
 Ipsa autem solutio salino-gelatinosa sequenti modo parari
 debet.

15. SOLUTIO SALINO-GELATINOSA.

- R.** Aquæ stillatae libram unam, vel..... 500
 Carbonatis Soda unciam unam, vel..... 32
 Gelatinæ animalis unciam unam, vel..... 32
 Sulfatis Soda unciam semis, vel..... 16
 Muriatis Soda unciam semis, vel..... 16
 Naphthæ ex Petroleo parate grana viginti,
 vel..... 1,0
 Misceantur simul.

N. B. Ratio Hydrosulfureti et liquoris Salino-Gelatinosi
ad aquam Balnei, non eadem semper esse debet; et, pro
variis casibus, variè à Medico definienda est. Neque in me-
tallicis Balnei hujus aqua apparanda est, sed in ligneis tan-
tummodo labris.

SECTIO NONA.

*Medicamenta ex mixtis tantum Simplicibus
conflata.*

SPECIES, PULVERES COMPOSITI, MASSÆ MOLLIORES, CONSERVÆ,
TABELLÆ, ELECTUARIA ET OPIATÆ, PILULÆ ET BOLI.

Q^{UANTUMVIS} medicamenta, in hâc Codicis sectione proposita, veluti mixta tantum considerari soleant, non omnia tamen suam ex solâ variorum cumulatione virtutem itâ mutuari intelliguntur, ut nullis chymicarum affinitatum credantur subjacere legibus. Neque certè dubitandum est quin, verbi gratiâ, in Electuariis, saventibus Melle, Saccharo, Syrupis, Aquâ aut Vino, quædam elementorum consociatio et commutatio intercedat, undè totum medicamentum, à simplici singulorum, quibus conflatur, additione magnopère differat. Cujus rei exemplum, ut infrâ videbitur, conati sumus proferre in ipsâ Theriacâ. Verumtamen in miscendis multis Pharmacopœæ Galenicæ compositis, non alia sœpè cura magis invaluit, quàm cumulandarum virtutum cœca satis sollicitudo. Quorum medicaminum utilitas et vis, duce potius experientiâ quàm ratione innotuit, itâ

tamen ut iis jam nunc Års ipsa carere nequeat. Ex iis igitur,
quæ usitatoria sunt, neque spernenda, neque negligenda
arbitrati, hic loci collegimus.

I. SPECIES.

Specierum nomine apud Pharmacopœos designantur
commixtae aut Herbæ aut partes Herbarum plures, siccæ,
minutim concisæ, ex quibus parabilia fiunt, aut infusa,
aut decocta, aut alia ejusdem generis.

Si quas Medicus præceperit Species, in medicamentorum
Magistralium compositione admittendas, semper deter-
minatâ dosi eas ipsum præscribere convenit.

1. SPECIES DICTÆ EMOLLIENTES.

R. Foliorum siccatorum

Malvæ rotundifoliae,
Althææ officinalis,
Verbasci Thapsi,
Senecionis vulgaris,
Parietariae vulgaris... àa partes pondere
æquales.

Misce et serva ad usum.

2. SPECIES EX FLORIBUS, BECHICÆ DICTÆ, SIVE AD TUSSIM.

R. Florum siccatorum

Malvæ rotundifoliae, vel Althææ officinalis,

Florum Gnaphalii Dioīei (*Pes Cati*),
Tussilaginis Farfaræ,
Petalarum Papaveris Rhæados..... àa partes pondere
æquales.

Misce et serva ad usum.

5. SPECIES EX FRUCTIBUS, DICTÆ BECHICÆ.

R. Dactylorum (*Phœnix Dactylifera*), nucleis exelusis,
Zizyphorum (*Zizyphus sativa*),
Ficuum Caricarum,
Passularum (*Vitis vinifera* aut *Apyrena*)... àa par-
tes pondere æquales.

Misce et serva in usum.

4. SPECIES AMARÆ.

R. Foliorum siccatorum
Teucrī Chamædryos,
Summitatum Erythrææ Centaurii,
Artemisiæ Absinthii. àa partes pondere
æquales.

Misce et serva in usum.

5. SPECIES AROMATICÆ, DICTÆ VULNERARIÆ⁽¹⁾.

R. Foliorum Siccatorum
Salviæ officinalis,

(1) Hoc sub nomine enumerantur vulgo herbæ, quarum natura insinitur ali-
quæ in quibusdam amaritie, cui semper junctum est nonnihil quod astringere
percipitur. His plus minusve adjungitur aroma, in quibusdam debile admodum,
in aliis sat potens, sed quod organa tantum suscitare, caput autem nullatenus

Foliorum Thymi vulgaris,
 Thymi Serpylli,
 Hyssopi officinalis,
 Menthe aquaticæ,
 Artemisiae Absinthii,
 Origani vulgaris... *āā partes pondere æquales.*
 Misce et serya in usum.

6. SPECIES AROMATICÆ, PECTORALES DICTÆ.

R. Foliorum siccatorum

Adianti pedati,
 Veronicae officinalis,
 Hyssopi officinalis,
 Glecomæ hederaceæ. *āā partes pondere
æquales.*

Misce et serva in usum.

7. SEMINA EX OMBELLIFERIS, VULGÒ DICTA CARMINATIVA, SEU FLATIBUS DISCUTIENDIS APTA.

R. Seminum Pimpinellæ Anisi,
 Anethi Feniculi,

tentare valet. Pleraque desumuntur inter Rosaceas, Labiatas, et Compositas, has verò præcipue flosculosas, herbas. *Vulneriarum* autem ideo ipsis additum nomen videtur fuisse, quod non inutiliter, sive infuse, sive decoctæ, extus intusve adhiberentur in vulneribus ægrè coalescentibus, ob inertiam mollietatemque solidorum, superfluam quâ turgent seri colluviem, adeoque difficilem in iis puris legitimi generationem. Hic autem herbas tantum inscripsimus que non debili pollent aromate.

Coriandri sativi,
Cari Carvi... $\ddot{a}a$ partes pondere α equales.

Misce et serva in usum.

8. SPECIES ANTHELMINTHICÆ.

R. Foliorum et florum siccatorum
Tanaceti vulgaris,
Artemisiae Absinthii,
Anthemidis nobilis.... $\ddot{a}a$ partes
 α pondere α equales.

Misce et serva in usum.

9. SPECIES DIURETICÆ.

R. Radicum siccatarum et minutum consisarum
Anethi Feniculi,
Rusci aculeati,
Ononidis spinosæ,
Asparagi sativi,
Apii Petroselini $\ddot{a}a$ partes pondere α equales.

Misce et serva in usum.

10. SPECIES SUDORIFICÆ, AD PARANDA INFUSA.

R. Ligni Sassafras scobe abrasi (*Laurus Sassafras*),
Florum Sambuci (*Sambucus nigra*),
Foliorum Borraginis (*Borago officinalis*),
Petalorum Papaveris Rhaeos $\ddot{a}a$ partes pondere α equales.
Misce et serva in usum.

11. SPECIES SUDORIFICÆ, AD DECOCTA PARANDA.

R. Ligni Guaïaci officinalis, scobe abrasi,
 Radicum Smilacis Salsaparillæ consisarum,
 Radicum Smilacis Chinæ in taleolas dissectarum.....
 *āa partes pondere æquales.*
 Misce et serva in usum.

12. SPECIES ASTRINGENTES.

R. Radicum siccatarum et minutim concisarum
 Polygoni Bistortæ,
 Tormentillæ erectæ,
 Corticis Punicæ granati, seu Malicorii minutim con-
 cisi..... *āa partes pondere æquales.*
 Misce et serva in usum.

13. SEMINA, DICTA VULGÒ FRIGIDA.

R. Seminum
 Cucurbitæ Lagenariæ,
 Cucurbitæ Citrulli,
 Cucumeris Melonis,
 Cucumeris Sativi..... *āa partes pondere
 æquales.*
 Misce et serva in usum.

14. FARINÆ EMOLLIENTES DICTÆ.

R. Farinarum Lini usitatissimi,
 Secalis Cerealis,
 Hordei distichi *āa partes pondere æqual.*
 Misce et serva in usum.

15. FARINÆ RESOLVENTES (1) DICTÆ.

R. Farinarum

Trigonellæ Feni-græci,
Fabæ majoris,
Orobi sylvatici,
Lupini albi, . . . *āa partes pondere æquales.*

Misce et serva in usum.

II. PULVERES COMPOSITI.

Parvâ quantitate semper parandi sunt compositi Pulveres, sæpiusque renovandi. Nonnullos etiam præstat commisceri ubi præscribuntur, eos præcipue quos aëris contactus, aut loci tepor humorisve facilis allapsus immutare valent: numeros igitur hic tantum formulæ generales apposuimus, et mutuam miscendarum rationem summasque omnium subscriptissimus. Numeros enim in drachmas vertere aut grammata, pro lubitu, servatâ omnium ratione, cuique licebit.

Inter Pulveres, quidam hic quoque (ut Pulvis *James*, et Pulvis *Dover*) numerantur, qui consociatis ignis vi partibus valent, adeoque inter chymica præparata melius forsitan conscriberentur; sed cum incertâ satis chymicarum operationum lege sint conflati, demumque commixtis, quan-

(1) Inter medicamenta externa, resolventium nomine vulgo insigniuntur ea, in quibus emolliendi facultas toniceæ cvidam et astringenti consociatur, et discutientia rectius forsitan vocarentur.

tumvis immutatis, sed non unitis partibus constant, in aliis Sectionibus locum nullibi proprium nancisci potuerunt.

1. PULVIS DE SULFATE POTASSÆ COMPOSITUS, DICTUS
VULGÒ *TEMPERANS STAHLII.*

R. Sulfatis Potassæ.....	9
Nitratis Potassæ purissimi.....	9
Sulfureti Hydrargyri rubri præparati.....	2
Summa omnium.....	20

Misceantur et suprà porphyriten levigentur, donec habeatur Pulvis tenuissimus.

2. PULVIS DE MAGNESIA COMPOSITUS, DICTUS *ANTI-*
ACIDUS, VEL ABSORBENS.

R. Magnesiæ puræ, seu igne exustæ,
Sacchari albi..... *āā partes pondere æquales.*
Misce diù in mortario vitro, et fiat Pulvis.
Servetur in vase accuratè clauso.

N. B. Parcā tantū quantitate parandus et asservandus est iste Pulvis; imò præstat componi, ubi præscriptus requiritur.

3. PULVIS DE ARO COMPOSITUS.

R. Radicum Ari.....	48
Acori Veri.....	48
Pimpinellæ Saxifragæ.....	48
Concrementorum de Canceris præparatorum.....	12
Cinnamomi.....	9

Sulfatis Potassæ.....	6
Muriatis Ammoniae.....	2
Summa omnium.....	175

Misce accuratè et fiat secundum artem Pulvis tenuissimus,
in vase vitro probè obturato servandus.

4. PULVIS DE SULFURE ET SCILLA, VULGÒ DICTUS *ANTI-ASTHMATICUS*, VEL *INCISIVUS*, SEU *AD MUCUM PULMONALEM LIBERIUS CIENDUM*.

R. Sacchari albi.....	3
Sulfuris sublimati loti.....	2
Scillæ (<i>Scilla maritima</i>) exsiccatæ et in pulverem tritæ.....	1
Summa omnium.....	6

Misce diu et fiat Pulvis.

5. PULVIS DE AMARIS COMPOSITUS, VULGÒ DICTUS *ANTI-ARTHRITICUS AMARUS*.

R. Radicum Gentianæ (<i>Gentiana Lutea</i>).....	2
Aristolochiæ rotundæ.....	2
Florum Erythraeæ Centaurii.....	4
Foliorum Chamaedryos (<i>Teucrium Chamædrys</i>)..	2
Chamaepithyos (<i>Teucrium Chamæpithys</i>)	2
Summa omnium.....	12

Misce et fiat Pulvis.

6. PULVIS DE SENNA, SCAMMONIO ET LIGNIS COMPOSITUS, DICTUS *ANTI-ARTHRITICUS PURGANS*.

R. Gummi Arabici.....	4
Tartratis aciduli Potassæ.....	4

Foliorum Sennæ mundatorum (<i>Cassia Senna</i>)....	4
Corticis Cinnamomi (<i>Laurus Cinnamomum</i>)....	4
Scammonii (<i>Convolvulus Scammonium</i>).....	2
Radicum Salsaparillæ (<i>Smilax Salsaparilla</i>)....	2
Chinæ (<i>Smilax China</i>).....	2
Ligni Guaïaci (<i>Guaïacum officinale</i>).....	2
Summa omnium.....	24

Fiat ex omnibus Pulvis tenuissimus.

Sennæ et Scammonii ratio ad Summam erit ut 1 ad 4.

7. PULVIS DE JALAPA ET SCAMMONIO COMPOSITUS,
DICTUS *CATHARTICUS*.

R. Pulverum Jalapæ (<i>Convolvulus Jalapa</i>)....	1
Tartritis aciduli Potassæ.....	2
Scammonii Alepensis.....	1
Summa omnium.....	4

Misce diù in mortario vitro, et erit Pulvis in vase clauso servandus.

8. PULVIS DICTUS *CORNACHINI*, SIVE *DE TRIBUS*.

R. Scammonii Alepensis ,	
Tartratis Aciduli Potassæ,	
Oxidi Stibii albi (vulgò <i>Antimonium diaphoreticum</i>)	
loti..... aā partes pondere æquales.	

N. B. Parva tantum hujus Pulveris copia singulâ vice preparari debet; ne vis ipsius purgans temporis lapsu immutetur, et vertatur in emeticam. Melius etiā parabitur ex tempore, et ubi præscribitur,

9. PULVIS E GUMMI GUTTA SEU CAMBOGIA COMPOSITUS,
DICTUS *HYDRAGOGUS*.

R. Radicum Jalapæ (<i>Convolvulus Jalapa</i>).....	24
Mechoacannæ (<i>Convolvulus Mechoacanna</i>).....	12
Cinnamomi (<i>Laurus Cinnamomum</i>).	8
Rhei electi (<i>Rheum Palmatum</i>)....	8
Gummi Guttæ.....	5
Foliorum Convolvuli Soldanellæ siccatorum	6
Seminum Anisi.....	12
Summa omnium.....	75

Teratur seorsim, summâ cum curâ, Gummi gutta in pulverem tenuissimum; deinde cum cæteris pulveribus accurate misceatur; et fiat ex omnibus Pulvis. In quo aromatiorum ad purgantia ratio erit 1 ad 2 ,65.

10. PULVIS E SULFURETO HYDRARGYRI NIGRO ET
SCAMMONIO PICTUS *VERMIFUGUS MERCURIALIS.*

R. Pulveris è Scammonio compositi dicti de tribus (*vide*
nº 8),
Sulfureti Hydrargyri nigri recenter terendo præparati.
āa partes pondere aequales.
Mixta conterantur in mortario vitreo et fiat Pulvis.

11. PULVIS EX HELMINTHOCHORTO COMPOSITUS, DICTUS
VERMIFUGUS ABSQUE MERCURIO.

R. Fuci Helminthochorū,
Seminis-contrà (*Artemisia contrà*, vel *Artemisia Judaica*),

Summitatum Absinthii (*Artemisia Absinthium*),
 Tanaceti (*Tanacetum vulgare*),
 Foliorum Scordii (*Teucrium Scordium*),
 Sennae (*Cassia Senna*),
 Rhei electi (*Rheum Palmatum*)... $\ddot{\text{a}}$ partes pondere
 α equales.
 Misce et fiat Pulvis secundum artem.

**12. PULVIS GUMMOSUS ALKALINUS, VULGO DICTUS SAPO
VEGETABILIS.**

R. Gummi Arabici in pulverem redacti tenuissi-
 mum..... 32
 Carbonatis Potassae crystallorum..... 4
 Tere simul diuque, ut intimè misceantur, et fiat pulvis
 extempore et ubi præscribitur parandus.

**13. PULVIS DE PHOSPHATE CALCIS ET STIBIO COMPO-
SITUS, DICTUS ANTIMONIALIS DOCTORIS JAMES.**

(JAMES'S POWDER.)

R. Sulfureti Antimonii crassiusculè triti,
 Cornu Cervini scobinâ abrasi. $\ddot{\text{a}}$ partes pondere α equales.
 Mixta conjiciantur in sartaginem ferream, igne sic arden-
 tem ut rubeat, et continuò agitantur, donec colorem cine-
 reum induerint. Massam refrigeratam et in pulverem tritam
 indito in crucibulum loricatum, tectum alio crucibulo in-
 verso, ex quo parvum pateat foramen. Aduratur materies
 in hoc apparatu per duas horas, ignem sensim augendo,
 donec candescat; deindè refrigerata teratur in Pulverem
 tenuissimum.

14. PULVIS EX IPECACUANHA ET OPIO COMPOSITUS,
DICTUS DOVERI.

(DOVER'S POWDER.)

R.	Sulfatis Potassæ.....	4
	Nitratis Potassæ.....	4
	Simul trita conjiciantur in crucibulum ut igne li-	
	quentur. Massæ dein in mortarium ferreum effusæ	
	et penè refrigeratæ adjice	
	Extracti Opii siccissimi in Pulverem redacti.....	1
	Hisque simul tritis adde demum	
	Radicis Ipecacuanhae (<i>Cephaelis emetica</i>).....	1
	Glycyrrhizæ (<i>Glycyrrhiza glabra</i>).....	1
	Terantur omnia in Pulverem tenuissimum.	

(Swediaur Pharmacopœa.)

15. PULVIS DE ASARO COMPOSITUS DICTUS STERNUTATORIUS.

R.	Foliorum siccatorum	
	Majoranæ (<i>Origanum Majorana</i>)..	2
	Betonicæ (<i>Betonica officinalis</i>)..	2
	Asari (<i>Asarum Europæum</i>).....	2
	Florum siccatorum	
	Lilii convallium (<i>Convallaria Majalis</i>)..	2
	Summa omnium.....	8
	Misce et fiat Pulvis secundum artem.	

16. PULVIS DENTIFRICIUM.

R.	Boli Armenii præparati.....	24
	Coralli rubri præparati.....	24
	Ossis Sepiæ supra Porphyriten levigati.....	24

Resinæ Sanguis-Draconis dictæ.....	12
Coccinellæ (<i>Coccus Cacti</i>) in Pulverem redactæ.	3
Tartratis aciduli Potassæ.....	56
Cinnamomi (<i>Laurus Cinnamomum</i>).....	6
Caryophyllorum (<i>Caryophyllum aromaticus</i>) ...	1
Summa omnium.....	150
Misce accuratè et fiat Pulvis subtilissimus, in quo Tartratis aciduli ad summam ratio erit circiter 1 ad 3 ,6	

III. MASSÆ MOLLIORES, DICTÆ VULGO
PASTÆ.

Massæ, ex medicaminibus unà subactis constantes, molitie pistoriâ, plasticæ, partibus itâ inter se cohærentibus, ut digitis pressæ non adhærescant, dicuntur à recentioribus *Pastæ* (Græcæ vox originis, quasi farinæ, quæ mollescit aquâ conspersa, πατη). Gummi Saccharumque, aquâ aut infuso quolibet decocto soluta, vaporando sensim addensata, in *Pastis* omnibus vinculum fiunt subactarum partium, mollitemque ipsis propriam conciliant.

1. MASSA DE GUMMI ARABICO, VULGÒ *PASTA DE ALTHÆA.*

R . Radicis Althææ recentis et mundatae uncias quatuor, vel.....	125
Infunde per duodecim horas in Aquæ communis libris quinque, vel.....	2,500

Cola; hoc deinde infuso, moderato calore et identidem agitando, solvantur

Gummi Arabici albissimi electi et contusi libræ duæ, vel..... 1,000

Sacchari albissimi libræ duæ, vel..... 1,000

Colentur per linteam densum, exprimantur, et superfluus humor exhalet, igne aperto, ad spissitudinem extracti mollis, continuò movendo spatulâ ligneâ. Tum fortiter et assiduè conteratur et subigatur Massa, identidem aspergendo,

Pro Massæ libris quinque,

Spumam albuminis ovorum recentium duodecim,

Subactam in

Aquæ de floribus Aurantiorum stillatitiæ unciis

quatuor, vel..... 128
donec albescat. Ea tunc Massa, nivei coloris, indesinenter agitata, inspissetur calore leni, usque dum spatulæ imposita et manui admota ipsis non adhæreat. Tunc extendatur suprà tabulam marmoream pulvrey amylaceo conspersam.

Nota. Sæpius Aqua communis in locum infusi radicis Althææ sufficitur.

Eodem modo parari potest Massa Liquiritiæ, radicem Glycyrrhizæ sufficiendo in locum radicis Althææ.

2. MASSA seu PASTA DE DACTYLIS.

(*Phœnix Dactylifera.*)

R. Dactylorum electorum et nucleis mundatorum libram unam et semis, vel..... 750

Sacchari purissimi libras quinque, vel..... 2,500

Gummi Senegalensis seu Arabici electi et albissimi libras sex, vel..... 3,000

Aquæ purissimæ libras triginta , vel.....	15,000
Aquæ Naphe uncias novem , vel.....	288
Ex quibus ritè , ut mox dicendum est , præparatis , habebitur Massa , pondo circiter libras novem , vel.....	4,500

Preparandi modus.

Dactyli in minutissima frustula concisi in Aquæ libris decem , vel..... 5,000

Bulliant per horam circiter ; scilicet , donec moliores facti , facilè inter digitos eliduntur ; decoctum deinde percoletur.

Seorsim contundatur Gummi et solvatur in Aquæ libris viginti , vel..... 10,000

Solutum deinde per linteum densius trajiciatur. Liquores commixti in caldario igni imponantur , addito saccharo ; quo soluto , albumina ovorum recentium quinque , cum aquæ pauxillo agitando subacta , adjiciantur , bulliantque ; subinde ut supernatabit , eximatur spuma , bullientique undatim liquori tenuis identidem frigidæ vena affundatur.

Liquor ubi pellucidissimus evaserit , quod siet tunc demum cum ad tertias vaporaverit , per pannum trajiciatur , atque iterum vaporet , nudo igne , donec in syrapi densioris lentorem inspissatus fuerit.

Admixtâ tunc Aquâ Naphe , balneo maris vaporare pergit , nec amplius agitetur liquor , eâ tantum adhibitâ curâ , ut quæ , cuticulæ in modum , ad superficiem concreverit materies , ad latera vasis detrahatur.

Ubi liquor in densitatem extracti mollioris et lentè fluentis , quale Juniperinum esse solet , devenerit , in formas laminis ferreis stanno obductis confectas (*moules de fer-blanc*) , oleo primùm pleniùs obductas , dein leviter detersas dividatur , atque ita vaporario demum committatur , ut calore

moderato (50g) et, quantum fieri potest, constanti perficiatur Massæ exsiccatio, cuius quadrulae non antè inverti debent, quām Massa in soliditatem sufficientem constiterit.

Id autem sedulò observandum est ut vaporarium nec abruptè, nec nimium incalescat; ne Massa, ignis vi violentiæ quasi correpta, nimium contrahatur, et amissâ pelluciditate, rigida, tenaxque in corneam soliditatem indurescat.

5. MASSA DE ZIZYPHORUM FRUCTU, VULGÒ PASTA DE JUJUBIS.

R.	Jujubarum (<i>Zizyphus Sativa</i>) lectissimarum et mundatarum libram unam, vel.....	500
	Gummi Senegalensis electi et albissimi libras sex, vel.....	3,000
	Sacchari purissimi libras quinque, vel.....	2,500
	Aquaæ percolatæ libras triginta, vel.....	15,000
	Tincturæ Alcoolicæ de cortice Citrei, Aquâ stillatâ dilute, unciam unam, vel.....	52
	His omnibus comparatis, non aliâ methodo Massa conficiatur ac de Dactylis præscriptum est.	
	Indè habebuntur Massæ præparatæ seu <i>Pastæ</i> circiter librae novem, vel.....	4,500

4. MASSA DE EXTRACTO GLYCYRRHIZÆ, SEU PASTA GLYCYRRHIZÆ GUMMATA ET ANISATA.

R.	Extracti Glycyrrhizæ purissimi libram unam, vel	500
	Gummi Senegalensis libras duas, vel.....	1,000
	Sacchari albi libram unam, vel.....	500
	Radicis Iridis Florentinæ in pulverem redactæ drachniam unam, vel.....	4

Olei volatilis seminum Anisi grana circiter vi-
ginti quatuor, vel..... 1 , 2

Diluatur Gummi Aquæ sufficienti quantitate.

Dilutum cola, sinito residere, élutriato liquori adde ex-
tractum Glycyrrhizæ, vaporet leni igne, donec in mellis
densitatem lentescat; tunc adde pulverem Iridis; et, cùm,
protactâ, vaporatione, in extracti spissitudinem constiterit,
adde demùm oleum Anisi Saccharo commixtum.

Cæterum eodem hæc exsiccanda est modo quo Massa
seu *Pasta de Jujubis*.

IV. CONSERVÆ.

Conservarum nomine designantur Pulpæ omnes sive ex
fructibus, sive ex recentibus herbis floribusve, sive ex
herbarum pulveribus aquâ sufficienti subactis paratae, qui-
bus, condiendi gratiâ, aliqua sacchari quantitas admiscetur.
Vulgò Conservæ habentur molles et densitate Melli smii-
les, quædam verò itâ siccæ, ut Sacchari instar frangi pos-
sint. Facilè ut plurimùm vitiantur, atque adeò non nisi
mediocri copiâ singulis vicibus erunt parandæ.

1. CONSERVA ROSARUM RUBRARUM RECENTIUM.

R. Rosæ rubræ petalorum recentium, ungue absciso
mundatorum 150
Sacchari albi in pulverem redacti 300
Contunde simul in mortario marmoreo, pistillo ligneo,
ut fiat pulpa tenuissimarum partium, quam trajice, me-
diante spatulâ pulmentariâ, per incerniculum setaceum den-
sioris textûs.

Pulpæ hoc modo elicitæ adde
 Sacchari albi ità decocti, ut in electuarii densitatem consistat, postquam paululum refrigeruerit... 1,200
 Misce accuratè, et erit Conserva,
 Petalorum Rosæ ratio ad Massam erit 1 ad 11.

Simili modo conficiuntur

Conservæ Herbarum et Florum recentium.

3. CONSERVA ROSARUM OMNI TEMPORE PARANDA.

R. Petalorum Rosæ rubræ, ungue abscisso, siccatorum et in pulverem redactorum..... 90
 Admisceatur Aquæ Rosarum fragrantis quantum sufficit, ut coéant in pulpam : macerentur in vase faventino per sex horas, sœpius agitando spatulâ eburneâ : dein adde sacchari aquâ Rosarum soluti et ità cocti ut cogi possit in tabellas..... 1,000
 Misce accuratè in mortario marmoreo, pistillo ligneo, et erit Conserva.
 Petalorum autem ratio ad Massam erit..... 1 ad 12

5. CONSERVA CYNORRHODI.

R. Pulpæ fructuum Rosæ caninæ seu Cynorrhodi, at suprà dictum est paratae..... 500
 Sacchari albi ad electuarii densitatem usque cocti..... 750
 Misce accuratè ; fiat Conserva secundùm artem.
 Ratio Pulpæ ad Massam erit..... 2 ad 5

4. CONSERVA CASSIÆ, SEU *CASSIA COCTA*.

R. Extracti Cassiæ..... 160

Syrupi Violarum	120
Sacchari in pulverem redacti	50
Vaporent balneo maris, identidem agitando, ad extracti mollis densitatem, cui refrigerato	
Adde Olei volatilis florum Aurantiorum	0,1
Serva ad usum.	

5. CONSERVA DE RADICE HELENII.

(*Inula Helenum.*)

R. Pulpæ radicis Helenii coquendo parate, ut præscriptum est ad conficiendam Pulpam ex herbis emollientibus, et per setaceum incerniculum trajectæ	250
Sacchari albi in decocto radicis Helenii ad electuarii solidi densitatem cocti	1,000
Misce; fiat Conserva secundum artem.	
Ratio Pulpæ radicis ad Massam erit 1 ad 5.	

*Simili modo parantur Conservæ*de Angelicâ (*Angelica Archangelica*);
Apio (*Apium graveolens*).

6. CAULES ANGELICÆ SACCHARO CONDITI.

Cum saepius, condiendi causâ, Angelicæ et Apii Caules, Citreorum aut Aurantiorum cortices Saccharo conditi, medicamentis aut admisceantur, aut infundantur, etiamsi inter Bellaria frequenter ista recenseantur, utile credimus ea in Pharmacopœorum officinis ad usum medicum apparari.

Elige caules Angelicæ tenerimos; detractâ cuticulâ conditantur in frusta tres quatuorvè digitos longa.

Bulliant, quod dealbare (*blanchir*) vulgo dicitur, in Aquæ sufficienti quantitate, quæ saporis vim aliquatenus refringat.

Eximantur deinde, et suprà incerniculum disponantur ut

superfluus exstillet humor. Haec dum peraguntur, fiat Syrupus de Saccharo purissimo ad gradum 36 densitatem usque decoquendus, in quem caules immergantur buliantque, donec ab iis omnis humor abscesserit; quod tunc demum factum esse intelliges, cum caulinuli saccharo satis incotti solidescant; quo facto, cochleari foraminulis pertuso exempti, supra crateres ferreas ligneas reponentur, ut humor exstillet in supposita fietilia; ac demum exsudabunt in calidario, donec fragiles evaserint.

Caules Apii graveolentis, ipsique flores Aurantiorum et Citreorum cortices sive integri, sive summi, quos dicunt flavedines, eodem modo conservari queunt; sed integri quidem sic parabuntur Apii caules; Angelice vero frustatum, ut et Citreorum cortices, condire praestat.

7. CHOCOLATA SIMPLICIOR, QUAM VULGO DICUNT *CHOCOLAT DE SANTÉ.*

Cum saepissime Chocolata, lucri causa, nimium adulteretur, vel admixtis heterogenaeis, unde Massae moles increbat, vel adhibitis malae admodum notae seminibus; indeque in dietam a medicis prescriptam non mediocre vitium sapientius inferatur; utile futurum hic loci credimus, si methodum conficiendae Chocolatae inter formulas pharmacopeis proponendas exscriberemus. Cui quidem si, ex medici judicio, aliquid addere placuerit quod aut ad dietae utilitatem, aut ad morborum curam conferat, id ex peculiari prescriptione, non clam, ut solent, nec promiscue, neque indefinite fieri conveniet.

R. Seminum Caracensium Theobromae Cacao tosicrum, teguminibus et radiculis mundatorum. 1,750

Seminum Theobromæ, insularum dietæ, simili-	
liter tostorum et mundatorum.....	3,000
Sacchari albissimi.....	5,000
Cinnamomi corticis in pulverem redacti.....	40

Semina utriusque Cacao ferreo mortario, prius calefacto, contunde cum quartâ parte Sacchari; quæ ubi in Massam contrita coaluerint, partitum axe ferreo conterentur suprà lapidem lævissimum huic operi aptum, et itâ calefactum ut Massa, facta calore mollior, facilius penitusque attenuetur; cui, ubi ad subtilitatem debitam pervenisse visa fuerit, Cinnamomum et Sacchari quod reliquum est addetur, pergeturque conterendo per hora semiquadrantem: Massa demum, sic parata, in formas confessas ex laminis ferreis stanno obductis purissimas dividetur; in quibus frigefacta in soliditatem requisitam concrescat.

N. B. Prout vel magis, quod apud Italos, vel minus, quod apud Hispanos solitum est, torrentur semina, amarietum quoque majorem minorem contrahunt, et minorem aut majorem unguedinis proprie suppeditant in Chocolatâ copiam. Torrendo enim Chocolatæ color ex obscurè rubro in fuscum et sèpè fere nigricantem vertitur; eademque simul amaritiem, non sine aromate, gustui non ingratam objicit. Ex alterutra igitur methodo, Italâ aut Hispanâ, modo tonicâ magis, modò demulcente et analepticâ virtute pollet Chocolata. Itaque hæc omnia à Medico, pro re natâ, definienda et requirenda sunt.

8. CHOCOLATA VANILLÆ ODORE.

R. Massæ, modo suprà præscriptio parate, quantitatem suprà dictam.

Cui adde, cùm ad debitam subtilitatem pervenerit,
Vanillæ in pulverem tritæ..... 40

Misce accuratè conterendo; deinde in formas divide, ut dictum est superius.

V. TABULÆ SEU QUADRÆ ET PASTILLI.

Tabulæ seu Quadræ et Quadrulæ, aut, si minores sint multò, Pastilli dicuntur medicamentorum genus siccum, fragile, variis Pulveribus et Saccharo constans, quibus additur mucaginis cuiuslibet ea quantitas, cuius ope devinctæ mollescunt in Massam tractabilem, quæ, in planum ducta et in quadrulas divisa æqualiter, in vaporario exsiccati debet.

Quandoquæ in mucaginis locum sufficitur saccharum ipsum aquâ solutum, ad plumulas usquæ percoctum, quo devinciuntur pulveres.

Hoc genus medicamentorum in clausis asservandum est vasis, et reponendum in locis in quibus nequeant humescere.

Pastillos quoque specialiter vocant cùm Saccharum ipsum ad plumulas decoctum, admixtis variis odoribus oleisve fragrans, guttatim in sphærulas aut semisphærulas dividitur.

1°. TABELLÆ OPE MUCAGINIS PARATÆ.

2. TABELLÆ DE ALTHÆA.

R. Radicis Althææ (*Althæa officinalis*) in subtilissimum pulverem redactæ unciam unam et semis, vel... 48

Sacchari albissimi in pulverem redacti uncias quatuor et semis, vel..... 144

Accuratè misce; fiat Massa cum mucagine Gummi Tragacanthæ, unde informentur posteà Tabellæ secundum artem.

2. TABELLÆ DE SULFURE SIMPLICES.

R. Sulfuris sublimati et loti unciam semis, vel... 16

Sacchari albissimi uncias quatuor, vel..... 128

Gummi Tragacanthæ in mucaginis lentorem

Aquâ Rosarum soluti..... *quod sufficiet.*

Ut fiant, secundum artem, Tabellæ in cibano exsiccande.

5. TABELLÆ DE SULFURE COMPOSITÆ.

R. Sulfuris sublimati et loti drachmas duas, vel..... 8 ,0

Acidi Benzoici sublimati grana duodecim, vel.. 0 ,6

Radicis Ireos Florentinæ in pulverem redactæ drachmam semis, vel..... 2 ,0

Olei de Aniso stillatitii grana octo aut guttas duodecim, vel..... 0 ,4

Sacchari albi uncias quinque et semis, vel... 176 ,0

Cum sufficienti quantitate mucaginis Gummi Tragacanthæ fiant Tabellæ secundum artem.

4. TABELLÆ DE MAGNESIA, DICTÆ ABSORBENTES.

R. Magnesiae puræ unciam unam, vel..... 52

Sacchari albissimi uncias quatuor, vel..... 128

Cum sufficienti Gummi Tragacanthæ quantitate, Aquâ Naphe in mucaginem soluti, fiant Tabellæ.

Simili modo parari possunt

Tabellæ

De Concrementis, vulgo lapidibus
Cancrorum.

5. TABELLÆ DE ACIDO OXALICO, DICTÆ AD SITIM.

R. Acidi Oxalici puri et suprà porphyriten levigati drachmam unam, vel.....	4
Sacchari albissimi libram semis, vel.....	250
Olei volatilis Citrei grana duodecim aut guttas octodecim, vel.....	o ,6
Misce diù in mortario marmoreo, et, cum sufficieni quantitate mucaginis Gummi Tragacanthæ, fiant Tabellæ seu Pastilli, pondo circiter grana decem, vel.....	o ,5

Simili modo parantur:

Tabellæ de Acidis Tartari,
Et Citrei.

6. TABELLÆ DE KINAKINA.

(*Cinchona Condaminea.*)

R. Extracti de Kinakinâ siccâ unciam semis, vel.....	16
Sacchari albi puri uncias quatuor, vel.....	128
Cinnamomi (<i>Laurus Cinnamomum</i>) drachmam semis, vel.....	2
Misceantur accuratè, et, cum sufficienti quantitate mucaginis Gummi Tragacanthæ, fiant ex arte Tabellæ, pondo circiter grana octo, vel....	o ,4

Saccharo involvendæ ; quarum singulæ continebunt extracti granum semis.

Serventur in vase clauso.

TABELLÆ SEU PASTILLI DE CATHECU SIMPLICES.

R. Extracti Cathecu purissimi in subtilissimum pulverem redacti.....	100
Sacchari albi purissimi.....	400
Mucaginis Gummi Tragacanthæ.....	<i>quod sufficit.</i>
Ut fiant Pastilli pondo circiter grana duodecim, vel.....	0 ,6
Quibus grana duo Cathecu continebuntur.	

8. TABELLÆ DE CATHECU ET MAGNESIA.

R. Pulveris Cathecu drachmas sex , vel.....	24
Magnesiae pure et in pulverem redactæ uncias quatuor , vel.....	128
Pulveris Cinnamomi drachmas tres , vel.....	12
Sacchari albi libram semis , vel.....	250
Gummi Tragacanthæ grana duodecim , vel...	0 ,6
Aquaæ Cinnamomi.....	<i>quod sufficit.</i>
Diù commisceantur , et fiat Massa dividenda in Tabellas pondo circiter grana duodecim , vel... 0 ,6	
Singulis autem inerunt Cathecu grani unius $\frac{2}{3}$ et Ma- gnesiae grana quatuor.	

9. TABELLÆ SEU PASTILLI DE CATHECU ODORATI.

R. Massæ Pastillorum Cathecu suprà confectæ libram semis , vel.....	250
---	-----

Adde Tincturæ Ambræ, aut alijs cujusvis, guttas sexdecim aut grana octo, vel..... o ,4
Misce accurate et fiant Pastilli.

Eodem modo parari possunt:

Pastilli de Cathecu ferè omnes, quos inodorare licet variis additis oleis volatilibus.

10. TABELLÆ SEU PASTILLI DE IPECACUANHA.

(*Cephælis emetica.*)

R. Radicis Ipecacuanhae in subtilissimum pulverem redactæ unciam semis, vel..... 16

Sacchari albi uncias viginti, vel..... 640

Mucaginis Gummi Tragacanthæ Aquâ Naphe confectæ..... quantum satis.

Fiat Massa è quâ forméntur Tabellæ pondo circiter grana duodecim, vel..... o ,6

Ita ut singula Ipecacuanhae teneant quartam partem grani cinnamoni.....

11. TABELLÆ DE RHEO.

(*Rheum Palmatum.*)

R. Rhei electi et in pulverem redacti unciam semis, vel..... 16

Sacchari in pulverem triti uncias quinque, vel..... 160

Mucaginis Gummi Tragacanthæ Aquâ Cinnamomi paratae..... quantum satis.

Ut fiant Tabellæ secundum artem, pondo circiter grana duodecim, vel..... o ,6

Ita ut singulae granum unum Rhei contineant.

12. TABELLÆ DE SCAMMONIO ET SENNA COMPOSITE.

Has Tabellas, Tabellis vulgò dictis *de Citro et Diacarthami* sufficere non dubitavimus, arbitratī nullam in purgantibus, apud vulgum et rusticos præserūm usitatissimis, medicamentum admittendum esse, cujus virtus non satis apud nos tristis usu perspecta sit, aut quod temporis lapsu, si diù asservetur, facilè vitiari queat. Tales sunt in prædictis formalis *Hermodactyli*, qui raro admodum hodiè usurpantur; talia etiam, in Tabellis iisdem, quæcumque oleoso-mucosis partibus abundant, ut *Medulla seminum Carthami*, et ipse *Pulvis dictus Diatragacanthi frigidi*, quem ideo inter hujus Codicis formulas non judicavimus admittendum.

R	Scammonii drachmas tres, vel.....	12
Foliorum Sennae (<i>Cassia Senna</i>) drachmas quatuor et semis, vel.....	18	
Rhei (<i>Rheum Palmatum</i>) drachmam unam et semis, vel.....	6	
Caryophyllorum (<i>Caryophyllus aromaticus</i>) drachmam unam, vel.....	4	
Corticis Citrei conditi unciam unam, vel.....	32	
Sacchari optimi uncias sex et drachmas sex, vel.....	216	
Summa omnium.....	288	

Omnia in pulverem tenuissimum trita, accuratè mixta, humescant sufficienti quantitate mucaginis Gummi Tragacanthæ Aquæ Cinnamomi paratae, et in tabellas sic-

centur, quarum pondus æquabit circiter drachmas sex,	
vel grammata viginti quatuor, in quibus	
Purgantium ratio erit ut 1 ad 8, vel.....	5 gram.
Aromaticorum ut 1 ad 8, vel.....	5
Gummi simul et Sacchari ut 5 ad 4, vel.....	18
Summa, seu Tabellæ cujusque pondus.....	24 gram.

15. TABELLÆ DE FERRO.

R. Scobis Ferri supra Porphyriten levigatae un-	
ciam semis, vel.....	16
Pulveris Cinnamomi drachmam unam, vel.....	4
Sacchari in pulverem triti uncias quinque, vel..	160
Misceantur cum Gummi Tragacanthæ, Aquâ Cin-	
namomi in mucagine soluto.....	quantum satis.
Fiant Tabellæ secundum artem, pondo circiter	
grana duodecim, vel.....	0,6
Ita ut singulæ circiter granum unum Ferri contineant.	

14. TABELLÆ DE STIBII SULFURETO, DICTÆ ANTIMO-

NIALES KUNKELII.

R. Amygdalarum dulcium decorticatarum un-	
ciam unam, vel.....	32
Sacchari in pulverem triti libram semis, vel....	250
Contundantur simul in mortario marmoreo, et	
fiat Massa tenuissimarum partium.	
Dein adde seminum Cardamomi minoris (<i>Amo-</i>	
<i>mum Cardamomum</i>) mundatorum, et in pulverem	
cum tantillo Sacchari redactorum, unciam semis,	
vel.....	16

Cinnamomi in Pulverem triti drachmas duas , vel.....	8
Sulfureti Stibii præparati unciam semis , vel...	16
Misce accuratè cum sufficienti quantitate muca- ginis Gummi Tragacanthæ , et fiant Tabellæ pondo circiter grana duodecim , vel.....	0,6
Singula tenebit circiter Sulfureti Stibii granum semis ; undè facile intelligitur quām innocuē possit in his Tabellis adeo celebratis augeri multūm ratio Sulfureti Stibii.	

2º. TABELLÆ ABSQUE MUCAGINIBUS PARATÆ.

15. PASTILLI DE MENTHA PIPERITA.

R. Sacchari albissimi uncias duas , vel.....	64
Aquaæ Menthae fragrantissimæ uncias duas , vel.....	64
Coque , secundūm artem , ad Electuarii mollieris densi- tatem , in pultario manubriato et in acumen rostrato.	
Interea ,	
R. Sacchari albissimi in pulverem crassiorem contriti , excluso per cibrum pollinarium quod in pulvere subtilius est , uncias quatuor , vel.....	128
Olei volatilis de Mentha Piperita drachmam se- mis , vel.....	2

Ex quibus accuratissimè mixtis fiat Elæo-Saccharum , quod
saccharo priùs decocto , adhuc calenti , spatulâ argenteâ
diligenter admisceatur ; illicò tunc et expeditè per acumen
pultarii , veruculo juvante , liquida adhucdūm materies su-
prā nitidum marmor , vel in chartam suprà marmor ex-
tensam , guttatum effundetur . Refrigeratæ et concretæ gut-
tulæ , super incerniculum disponantur , et sub remisso caloris
gradu , per aliquot horas siccari pergant .

Sic habebuntur Pastilli de Menthâ Piperitâ loco sicco ser-vandi.

ELECTUARIA , CONFECTIONES , OPIATA SEU OPIATÆ.

Promiscuè hodiè , nullaque ferè habitâ curâ vocum dis-criminis , *Electuaria* , *Confectiones* , *Opiatæ* , vocantur me-dicamenta mellia , pulveribus constantia subactis Syrupo vel simplici , vel composito , sive saccharo paratus sit sive melle.

Ad hæc accedunt quoque in pluriinis Extracta , Pulpæ , Sales , etc.

Omnia ea , quæcumque sint , quæ coeunt in Electuaria , itâ accuratè commiscenda sunt , ut eorum nulla pars in grumos coalescat.

Sæpius et frequenter subigendæ sunt , commovendæque penitus Electuariorum Massæ , in faventiniis porcellaneisque vasis asservandæ , et in locis neque humidis , neque inten-sius calidis reponendæ.

Quod nomen attinet , hanc vocem *Electuarium* ubique servavimus ; *Opiatum* , ut adjективum *Electuarii* nomen , ut est *Opiata Confectionis* , iis tantum adjecimus , in quibus Opium admittitur.

Divisimus porrò Electuaria in non Purgantia , vulgo dicta *Alterantia* , Purgantia , et Opiata . Pauca admodum ex antiquo Codice admisisimus , eaque imprimis ut aliis , pro re natâ , conficiendis exemplo essent . Delegimus autem ea ,

quæ frequenter in usu sunt, quorum nomina in ore omnium versantur, quasi inter simplicia numerarentur, et quorum virtus, etiam rudibus, maximè nota et perspecta creditur. Purgantia plura admisimus, quorum varietas præcipue medicorum interest, propter variam hominum aegritudinumque conditionem, ab hoc medicamentorum genere præ ceteris facile lèdendam. Cæterùm talia concinnare ferè omnia, pro necessitate, medentium potius est quam pharmacopœi munus; neque enim indiscriminatim omnibus pleraque, quantacumque singulorum fama venditetur, convenit præscribi; multa præterea in officinis, temporis lapsu, facillimè vitiantur.

ELECTUARIA NON PURGANTIA.

1. ELECTUARIUM seu CONFECTIO DE CROCO EMENDATA,
OLIM DICTA DE HYACINTHIS.

R. Terræ sigillatæ præparatæ uncias quatuor,	
vel	128
Concrementorum Cancerorum præparatorum un-	
cias quatuor, vel	128
Cinnamomi electi (<i>Laurus Cinnamomum</i>) un-	
ciam unam et drachmas tres, vel	44
Foliorum Dictanini Cretici (<i>Origanum Dictam-</i>	
<i>nus</i>) drachmam unam et semis, vel	6
Santalii Citrini (<i>Santalum album</i>) drachmam	
unam et semis, vel	6
Myrræ electæ drachmas duas, vel	8
Fiat secundum artem pulvis tenuissimus.	
Aliundè	
R. Mellis Narbonensis libram semis, vel	250

Syrupi de Adianto libram semis , vel.....	250
Sacchari albi libram semis , vel.....	250
Additā Aquā quantitate sufficienti ut liquefiant, decoquantur ad ebullitionem usquē , et fiat Syrupus.	
Hunc Syrupum semirefrigeratum misce paulatim et diū terendo	
Cum Croci Orientalis (<i>Crocus sativus</i>) in Pulve- rem tenuissimum redacti drachmis tribus , vel...	12
Santali rubri (<i>Pterocarpus Santalinus</i>) drachmis tribus , vel.....	12
Quo facto , adde etiam paulatim alios pulveres , demūnque guttas sex Olei volatilis de Cortice Citrei , quod , in Elæo- Saccharum versum , Electuario penitus commiscebitur.	
Summa Aromaticorum erit.....	88
Absorbentium seu antiacidorum.....	128
Terræ inertis Massæ partibus tantum interpo- site.....	128
Excipientum , Mellis , Syrupi , Sacchari.....	750
Summa totius.....	1,094

Primas in hoc Electuario tenent Crocus , Cinnamomum ,
Myrrha.

N. B. In Electuarīus notandum est veteres sēpē Terras
inertes admiscuisse non adeō inutiliter , ac vulgō arbitrantur.
Sic scilicet partes in mutuam cohærentiam pronæ disjunctæ
manent , et æqualiū sparsæ per Massam , que sic dividitur
faciliū , per minima quaque similior sibi.

Santalum rubrum adjecere causā coloris , nimiū , ex
Croco solo , temporis lapsu mutabilis.

In locum autem Syrupi de Limonibus vulgō præscripti ,
suffecimus Syrupum de Adianto , ut integra maneret anti-
acidā vis Carbonatis Calcis , quo , magnā ex parte , constant
Cancrorum concrementa.

2. ELECTUARIUM DE KINAKINA, VULGÒ *OPIATA*
FEBRIFUGA.

R • Kinakinæ (<i>Cinchona Condaminea</i>) in pulverem re- daetæ uncias duas et drachmas duas, vel.....	72
Muriatis Ammoniæ drachmam unam, vel.....	4
Mellis optimi uncias duas, vel.....	64
Syrupi de Absinthiis uncias duas, vel.....	64
Summa.....	204

Fiat Electuarium in quo Cinchonæ cortex paulò ultrà ter-
tiam obtinebit totius partem.

ELECTUARIA PURGANTIA.

3. ELECTUARIUM DE RHEO COMPOSITUM, VULGÒ DICTUM
 VETERIBUS *CATHOLICUM DUPLICATUM RHEO.*

R • Radicum Polypodii (<i>Polypodium vulgare</i>) contusarum libram semis, vel.	250
Cichorii (<i>Cichorium Intybus</i>) un- cias duas, vel.....	64
Glycyrrhizæ (<i>Glycyrrhiza gla- bra</i>) unciam unam, vel....	52
Foliorum Agrimonie (<i>Agrimonia Eupato- rium</i>) uncias tres, vel.....	96
Scolopendrii (<i>Scolopendrium vul- gare</i>) uncias tres, vel.....	96
Coquantur igne moderato in Aquæ communis libris sex, vel.....	3,000
Ad tertiae partis consumptionem, sub finem addendo	

Seminum Feniculi (<i>Anethum Feniculum</i>) drachmas sex, vel.....	24
Cola et exprime.	
Colatus liquor cum Sacchari optimi libris quatuor, vel.....	2,000
Coquatur paulo supra Syrupi communis spissitudinem.	
Cui ab igne remoto admisce	
Extractum Cassiae (<i>Cassia fistula</i>) uncias quatuor, vel	128
Pulpae Tamarindorum (<i>Tamarindus Indica</i>) uncias quatuor, vel.....	128
Dein paulatim et partito adjice pulverem param ex commixtis	
Rhei electi (<i>Rheum Palmatum</i>) uncii quatuor, vel.....	128
Foliorum Sennae (<i>Cassia Senna</i>) mundatorum uncii quatuor, vel.....	128
Glycyrrhizae rasae (<i>Glycyrrhiza glabra</i>) unciam unam, vel.....	52
Seminum Violarum (<i>Viola odorata</i>) uncii duabus, vel.....	64
Seminum quatuor frigidorum unciam unam, vel..	52
Seminum Feniculi (<i>Anethum Feniculum</i>) unciam semis, vel.....	16
Misce accurate, fiat Electuarium, in quo Pulverum summa erit.....	400
Pulparum	256
Decociti in Syropum densiorem inspissati circiter	2,840
Totius summa circiter.....	5,496

Primas autem in eo tenebunt partes Rheum et Senna; quorum ratio ad summam Electuarii erit circiter ut 1 ad 1/4.

4. ELECTUARIUM DE ALOE COMPOSITUM, DICTUM VETERIBUS HIERA PICRA.

R. Cinnamomi (<i>Laurus Cinnamomum</i>) drachmas sex, vel.....	24
Macis (<i>Myristica aromatica</i>) drachmas sex, vel.....	24
Radicis Asari (<i>Asarum Europaeum</i>) drachmas sex, vel.....	24
Croci (<i>Crocus Sativus</i>) drachmas sex, vel.....	24
Mastiche drachmas sex, vel.....	24
Aloës soccotrinæ uncias duodecim, vel.....	584
Mellis optimi libras tres, vel.....	1,500
Summa totius.....	2,004
Fiat Electuarium, in quo Aloës ratio ad Massam erit circiter.....	1 ad 5

5. ELECTUARIUM DE ALOE, MURIATE HYDRARGYRI, ET FERRO, DICTUM VULGÒ OPIATA MESENTERICA.

R. Gummi-resinæ Ammoniaci in pulverem redacti unciam semis, vel.....	16
Sennæ (<i>Cassia Senna</i>) drachmas sex, vel.....	24
Muriatis Hydrargyri dulcis drachmas duas, vel.....	8
Radicis Ari (<i>Arum maculatum</i>) drachmas duas, vel.....	8
Aloës Soccotrinæ drachmas duas, vel.....	8
Pulveris de Scammonio compositi, dicti de Tribus, drachmas tres, vel.....	12
Rhei electi (<i>Rheum palmatum</i>) drachmas tres, vel.....	12
Scobis Ferri purissimæ suprà porphyriten levigatae unciam semis, vel.....	16
Summa omnium.....	104
Contritis iis quæ conterenda sunt, omnia excipiantur sul-	
	40

cienti quantitate Syrupi de Sennâ, vulgò *de Pomis*, compesi, quæ erit circiter omnium duplex.

Fiat secundum artem Electuarium.

Varia hujus Electuarii medicamina sub formâ pulveris commixta asservari possunt, et tunc tantum syrpus iis admisceri cum præscribitur; alioquin, quantumvis molle fuerit recens, progressu temporis, ob ferrum quod ipsi inest, mirè indurescit.

Summa Electuarii tunc erit	312
Ratio autem ad summam habebitur Ferri ut..	1 ad 19 ,5
Aloës et Muriatis Hydrargyri, uniuscujusque	
singulatim ut.....,	1 ad 59 ,0
Purgantium omnium simul sumptorum cir-	
citer ut.....	1 ad 5 ,0

6. ELECTUARIUM DE SENNA ET FRUCTUM PULPIS
COMPOSITUM DICTUM VULGO *EL. LENITIVUM.*

R. Hordei integri (<i>Hordeum distichum</i>) uncias duas, vel.....	64
Radicum Polypodii querni (<i>Polypodium vulgare</i>) uncias duas, vel.....	64
Glycyrrhizæ rasæ et contusæ (<i>Glycyrrhiza glabra</i>) unciam unam, vel..	52
Foliorum Šcolopendrii officinalis recentium unciam unam et semis, vel.....	48
Mercurialis (<i>Mercurialis annua</i>) recentium uncias quatuor, vel.....	128
Acinorum de Passulis (<i>Vitis vinifera aut apyrena</i>) uncias duas, vel.....	64
Prunorum Damascenorum (<i>Prunus domestica</i>) unciam unam et semis , vel.....	48
Jujubarum (<i>Zizyphus sativus</i>) unciam unam et semis , vel.....	48

Tamarindorum (<i>Tamarindus Indica</i>) uncias duas, vel.....	64
Bulliant primò Hordeum donec rumpatur, deinde Polypodium in frustula confractum, ac demùm cætera, in aquæ sufficienti quantitate.	
Seorsim verò decoquuntur	
Foliorum Sennæ (<i>Cassia senna</i>) unciæ duæ, vel.....	64
Decoctum unum et alterum misceantur, et bulliant, donec supersint ex utroque libræ quinque, vel.....	2,500
Quibus addantur	
Sacchari libræ duæ et semis, vel.....	1,250
Decoquantur in syrupum solito densiore.	
Syrupo demùm sic parato diluantur	
Extracti Cassiae unciæ novem, vel.....	288
Pulpæ Tamarindorum unciæ novem, vel.....	288
Ac demùm, omnibus commixtis, admisceantur	
Foliorum Sennæ, tritorum in pulverem tenuissimum, unciæ quinque, vel.....	160
Seminum Feniculi (<i>Anethum Feniculum</i>) tritorum drachmæ duæ, vel.....	8
Anisi (<i>Pimpinella Anisum</i>) tritorum drachmæ duæ, vel.....	8
Omnia simul exagitentur spatulâ ligneâ, ut penitus commisceantur et coëant in Electuarium, cuius Massa aequabit libras circiter quatuor, cum unciis quatuor et drachmis quatuor, vel.....	2,144
Sennæ autem tum decoctæ, tum in pulverem tritæ ratio ad summam Electuarii erit circiter ut 1 ad 9 ,6	
Cætera ex dulcibus et Saccharo et Pulpis ferè constant, In enematibus præcipue adhibetur hoc Electuarium.	

7. ELECTUARIUM DE SCAMONIO ET TURPETHO COMPO-
SITUM, DICTUM VULGÒ *DIAPHOENIX*.

R.	Pulpæ Dactylorum (<i>Phœnix Dactylifera</i>)	
	semilibram , vel.....	250
	Amygdalarum dulcium decorticatarum (<i>Amyg- dalus communis</i>) uncias tres et semis , vel.....	112
	Sacchari in pulverem triti semilibram , vel...	250
	Terantur Amygdalæ , ipsisque paulatim admis- ceantur Dactylorum Pulpa et Saccharum , ac de- mum	
	Mellis despumati libræ duæ , vel.....	1,000
	Tunc addantur pulveres sequentes parati ex singulis seorsim tritis	
	Zinziberis (<i>Amomum Zingiber</i>) drachmis dua- bus vel	8
	Piperis (<i>Piper nigrum</i>) drachmis duabus , vel	8
	Macis (<i>Myristica aromaticâ</i>) drachmis duabus, vel.....	8
	Cinnamomi (<i>Laurus Cinnamomum</i>) drachmis duabus , vel.....	8
	Foliorum Rutæ (<i>Ruta graveolens</i>) drachmis duabus , vel.....	8
	Stygamatum Croci (<i>Crocus sativus</i>) granissex, vel	0 ,5
	Seminum Dauci Cretici (<i>Athamanta Cretensis</i>)	
	drachmis duabus , vel.....	8
	Feniculi (<i>Anethum Fentulum</i>)	
	drachmis duabus , vel.....	8
	Radicis Turpethi tenuissimè triti (<i>Convolvulus Turpethum</i>) unciis quatuor , vel.....	128
	Scammonii Alepensis (<i>Convolvulus Scammo- nium</i>) unciâ unâ et semis , vel.....	48
	Summa omnium.....	1,844 ,5

Misceantur intimè ut fiat Electuarium.
 Ratio purgantium drasticorum ad Massam erit
 ut..... 1 ad 10 ,5

Aromaticorum autem ad purgantia ratio circiter
 ut..... 1 ad 3

Cætera constant ex dulcibus, Melle et Saccharo; quorum
 summa novies circiter æquat pondus purgantium.

Hoc Electuarium in nosocomio Caritatis frequenter in
 enematibus usurpatur ad eolicum Pictorum dolorem.

ELECTUARIA OPIATA.

8. ELECTUARIUM OPIATUM POLYPHARMACUM, *THERIACA DICTUM.*

Theriacam hic inscripsimus , qualem exposuit Codex
 Parisiensis nuperimus (ed. quinta 1758). Trochiscos ta-
 men Hedychroôn, Viperinos, et Scillæ in elementa itâ di-
 visimus , ut medicamentorum Trochiscis illis et Theriacæ
 ipsi communium pondera addendo auxerimus , ea verò
 quæ in solis Trochiscis continentur , Theriacæ totius cata-
 logo proprio quæque loco annumerarentur ; undè nulla
 materies in hâc Theriacæ editione , nullum pondus adest ,
 quod à Codicis præcedentis Theriacâ discrepet

Præterea in ordinandis medicaminibus , non , ut olim ,
 æqualitatem ponderum secuti sumus , sed naturæ et qualiti-
 tum , quantum licuit , consociavimus analogias , et in sin-
 gulîs plerumquè priora inscripsimus quæ valentiora ; ex
 hoc scilicet ordine per celebris hujus compositionis na-
 tura melius intelligetur ; et , si cui forsitan æqualia sed sim-
 pliciora componere fuerit animus , facile ad eamdem vim
 utilitatemque poterit accedere.

Ordinem igitur medicamentorum sic instituimus, ut locum quæque suum tenerent 1° inter *Acria*, seu ea quæ mucosas secretiones præcipue sollicitare valent, inter quæ retulimus semina quæ ex cruciferis desumuntur. 2° *Amara*, quorum in numero inscripsimus et ea, quæ herbaceo extractu ferè tantum sapore distinguntur, ut *Hypericum*; 3° *Styptica* seu astringentia; 4° *Aromatica exotica*; 5° *Aromatica ex indigenis*, inter quæ *Crocum* quoque numeravimus, qui facile etiam Virosis seu Narcoticis ascriberetur; 6° *Aromatica ex Umbelliferis*, quæ sedem merentur sibi propriam; 7° *Resinas* et *Balsama*; 8° *Graveolentia*, in quibus et *Gummi-resinæ*, et ex animalibus fetida consociantur; 9° *Virosa*, quam sedem occupat Opium; 10° *Gummosa*, *Amylacea*, *Gelatinosa*; 11° *Terram inertem*; 12° *Dulcia* demum, Mel præcipue; 13° et ultimò *Vinum*; ita ut ista Theriacæ compositio videatur antiquæ Materiæ medicæ ferè totius quasi exemplar, ostendatque quibus mente atque consilio, multò ante Galeni tempora, talia à veteribus conficerentur.

R. 1°. *Acria*.

Pulpæ ex Scillâ (<i>Scilla maritima</i>) paratæ uncias tres, drachmas quatror, grana sexaginta, vel.	115 ,0
Radicis Asari (<i>Asarum Europæum</i>) grana quadrageinta octo, vel.....	2 ,4
Agarici albi (<i>Boletus Laricinus</i>) unciam unam et semis, vel.....	48 ,0
Seminum Buniadis (<i>Brassica Napus sylvestris</i>) unciam unam et semis, vel.....	48 ,0
Thlaspeos (<i>Thlaspi arvense</i>) unciam semis, vel.....	16 ,0
Summa Acrium.....	229 ,4

2^o. *Amara.*

Myrrhae Troglodyticæ unciam unam ,vel....	52 ,0
Comarum Centaurii minoris (<i>Erythrea Centaurium</i>) drachmas duas , vel.....	8 ,0
Radicum Gentianæ (<i>Gentiana Lutea</i>) unciam semis , vel.....	16 ,0
Rhapontici (<i>Rhei Rhapontici</i>) drachmas sex , vel.....	24 ,0
Herbarum Scordii (<i>Teucrium Scordium</i>) unciam unam et semis , vel.....	48 ,0
Chamædryos (<i>Teucrium Chamædrys</i>) unciam semis , vel.....	16 ,0
Chamæpithyos (<i>Teucrium Chamæpithys</i>) unciam semis , vel.....	16 ,0
Summitatum Hyperici (<i>Hypericum perforatum</i>) unciam semis , vel.....	16 ,0
Summa Amarorum.....	<hr/> 176 ,0

5^o. *Saporis Styptici , vulgo Astringentia.*

Petalorum Rosarum rubrarum (<i>Rosa Gallica</i>) unciam unam et semis , vel.....	48 ,0
Radicis Pentaphylli (<i>Potentilla reptans</i>) drachmas sex , vel.....	24 ,0
Succi Hypocistidis (<i>Cytinus Hypocistis</i>) drachmas quatuor , vel.....	16 ,0
Succi Acaciae (<i>Mimosa Nilotica</i> , aut <i>Acacia vera</i>) drachmas quatuor , vel.....	16 ,0
Chalcitidis ustæ , aut melius Colcothar (<i>Oxidum Ferri rubrum</i>) drachmas quatuor , vel....	16 ,0
Summa Stypticorum.....	<hr/> 120 ,0

4°. Aromatica exotica.

Corticum Cinnamomi Zeylanensis (<i>Laurus Cinnamomum</i>) uncias duas et semis, vel	80 ,o
Cassiae Ligneæ (<i>Laurus Cassia</i>) unciam unam, vel.....	52 ,o
Radicum Zinziberis (<i>Amomum Zingiber</i>) drachmas sex, vel.....	24 ,o
Fructuum Piperis longi uncias tres, vel.....	96 ,o
Piperis nigri drachmas sex, vel....	24 ,o
Amomi racemosi unciam unam, vel.	52 ,o
Cardamomi minoris (<i>Amomum Cardamomum</i>) unciam semis, vel...	16 ,o
Foliorum Malabathri (<i>Laurus Cassia</i>) drachmas sex, vel.....	24 ,o
Herbæ Schœnanthi (<i>Andropogon Schœnanthus</i>) unciam unam et drachmas sex, vel.....	56 ,o
Radicis et caulis Nardi Indicæ (<i>Andropogon Nardus</i>) unciam unam, vel.....	32 ,o
Radicum Nardi Celticæ (<i>Valeriana Celtica</i>) unciam semis, vel.....	16 ,o
Costi Arabici drachmas septem, vel.	28 ,o
Acori veri (<i>Acorus Calamus</i>) drachmas quinque, vel.....	20 ,o
Ligni Aloës (<i>Aloëxylum verum</i>) grana quadraginta octo, vel.....	2 ,4
Aromatum exoticorum summa.....	482 ,4

5°. Aromatica indigena.

Stigmatum Croci (<i>Crocus sativus</i>) unciam unam, vel.....	52 ,o
Corticum Citrei (<i>Citrus medica</i>) siccatorum drachmas sex, vel.....	24 ,o

CODEX MEDICAMENTARIUS.

321

Herbarum Calaminthæ montanæ (<i>Melissa Ca-</i>	
<i>lamintha</i>) drachmas sex, vel...	24 ,0
Dictamni Creticæ (<i>Origanum Dic-</i>	
<i>tamus</i>) drachmas sex, vel....	24 ,0
Florum Stoechados Arabicæ (<i>Lavandula Sta-</i>	
<i>chas</i>) drachmas sex, vel.....	24 ,0
Verticillorum Prassii (<i>Marrubium vulgare</i>)	
drachmas sex, vel.....	24 ,0
Summitatum Polii montani (<i>Teucrium Polium</i>)	
unciam semis, vel.....	16 ,0
Mari (<i>Teucrium Marum</i>) grana	
quadraginta octo, vel.....	2 ,4
Amaraci (<i>Origanum Majorana</i>)	
grana quadraginta octo, vel..	2 ,4
Radicum Iridis Florentinæ unciam unam et se-	
mis, vel.....	48 ,0
Summa Aromatum ex indigenis.....	220 ,8
6º. Aromaticæ ex Umbelliferis.	
Seminum Petroselini Macedonici (<i>Bubon Ma-</i>	
<i>cedonicum</i>) drachmas sex, vel...	24 ,0
Ammeos (<i>Sison Ammi</i>) unciam se-	
mis, vel.....	16 ,0
Feniculi (<i>Anethum Feniculum</i>) un-	
ciam semis, vel.....	16 ,0
Anisi (<i>Pimpinella Anisum</i>) unciam	
semis, vel.....	16 ,0
Seseleos Massiliensis (<i>Seseli tortuo-</i>	
<i>sum</i>) unciam semis, vel.....	16 ,0
Dauci Cretici (<i>Athamanta Creten-</i>	
<i>sis</i>) drachmas duas, vel.....,	8 ,0
Radicum Mei Athamantici (<i>Aethusa Meum</i>)	
unciam semis, vel.....	16 ,0
Summa Aromatum ex Umbelliferis,.....	112 ,0

41

7^o. Resinosa et Balsama.

Ligni dicti Xylobalsamum (<i>Amyris Opopobalsamum</i>) drachmam unam , vel.....	4 ,0
Fructuum quo ^s dicunt Carlobalsamum (<i>Amyris Opopobalsamum</i>) unciam semis , vel.....	16 ,0
Resinæ dictæ Opopobalsamum (<i>Amyris Opopobalsamum</i>) unciam unam et drachmas septem , vel.....	60 ,0
Resinarum Thuri Masculi , aut Olibani (<i>Juniperus Lycia</i>) drachmas sex , vel.	24 ,0
Terebinthinæ Chiæ (<i>Pistacia Terebinthus</i>) drachmas sex , vel....	24 ,0
Masticæ (<i>Pistacia Lentiscus</i>) grana viginti quatuor , vel.....	1 ,2
Bituminis Judaici sive Asphalti drachmas duas, vel	8 ,0
Balsami Storacis Calamitæ (<i>Styrax officinalis</i>) unciam semis , vel.....	16 ,0
Aromatum summa ex Resinis et Balsamis...	153 ,2

8^o. Grave-olentia.

Radicum Valerianæ majoris (<i>Valeriana officinalis</i>) drachmas quinque , vel...	20 ,0
Aristolochiæ tenuis (<i>Aristolochia Pistolochia</i>) drachmas duas, vel..	8 ,0
Gummi Resinarum Galbani (<i>Bubon Galbanum</i>) drachmas duas, vel....	8 ,0
Opopanaxis (<i>Pastinaca Opopanax</i>) drachmas duas , vel.....	8 ,0
Sagapeni unciam semis , vel.....	16 ,0

Castorei (<i>Castor Fiber</i>) drachmas duas,	
vel.....	8 ,0
Summa Grave-olentinum.....	68 ,0
<i>9°. Virosa</i> , seu quæ Narcosim inducunt.	
Opii Thebaici (<i>Papaver somniferum</i>) uncias tres, vel.....	96 ,0
<i>10°. Terrea insipida et inertia.</i>	
Terræ Lemniæ, drachmas quatuor, vel.....	16 ,0
<i>11°. Gummosa, Amylacea, etc.</i>	
Gummi Senegalensis (<i>Acacia</i> , aut <i>Mimosa Se-</i> <i>negalensis</i>) drachmas quatuor, vel.....	16 ,0
Medullæ Panis triticei drachmas quinque et grana quinquaginta, vel.....	22 ,5
Farinæ Orobii (<i>Orobus Sylvaticus</i>) uncias duas, drachmas tres, et grana quindecim, vel.....	76 ,75
Carnis Viperinæ (<i>Coluber Vipera</i>) uncias duas, drachmas duas et grana viginti, vel.....	75 ,0
Summa Gummosorum.....	187 ,80
<i>12°. Dulcia.</i>	
Succi Glycyrrhizæ (<i>Glycyrrhiza glabra</i>) un-	
ciam unam et semis, vel.....	48 ,0
Mellis Narbonensis libras decem et semis, vel..	5,250 ,0
Summa Dulcium.....	5,298 ,0
<i>13°. Vinum.</i>	
Vini Hispanici circiter libras duas et semis, vel.	1,250 ,0
Summa omnium.....	8,409 ,6
Pars Vini solvendo Melli, pars Opio diluendo, pars alia Gummi succorumque solutioni inserviat; singula seorsim	

percolentur; soluta misceantur Opio Mel et succus Glycyrrhizæ Gummique, deinde Colcothar, tandemque Balsama et Resinæ; ac dénum pulvères non assatū, sed paulatim adjiciantur.

Massa omnis probè mixta subactaque, per annum, vase clauso, ut lentè fermentescat, reponatur.

Opii integri ratio ad summam erit circiter ut 1 ad 88 paulò minor quam grani unius pro drachmā unā. Extratum autem, quod longè sine dubio præstaret, si prætuleris, ratio ipsius dimidiata habenda est scilicet 1 ad 176(1).

(1) Ex hâc multiplici adeò, et, ut vulgò creditur, inconditâ materierum miscellâ, quodnam enascatur medicamenti genus, chymicâ analysi, nobis instantibus, elucidare conatus est D. *Guilbert*, Pharmacopœus Parisiensis soler-tissimus, cuius laboris summam breviter hic proponere liceat.

Ex Theriacæ unciiis duabus, vel ex amussim..... 61 ,188200 gram.

Variâ adhibitâ operationum serie, eliciuntur sequentia.

(1) *Solo Alcoole solubilia*

Alcoolem destillando sequuntur olei volatilis non obscura indi-cia, nullâ arte satis aestimanda.

Aquâ autem admixtâ, turbato et colato Alcoole, colo excipiuntur, facilè dignoscenda

Resina.....	} un. dr. gr. Balsamum..... Terebinthina..... Oleum viride.....	4 ,461640
.....		unā. " 1 12... 45 ,022959
.....	
.....	

(2) *Ex Alcoole autem in Aquam ce-dentia*

Mel.....	} unā. 1 3 18... 45 ,022959
Croci odor et color.....	
Gentianæ propria amarities....	

(3) *Quæ Alcoole non solvuntur et Aquâ frigidâ solvi queunt*

Extractum, quod, protractio aëris contactu, præcepis dénum agi-

	unc.	dr.	gr.	gram.
tur, et Aquā tunc ipsā fit insolu-				
bile.....	" "	6...		0 ,518690
Extractum, quod Aquā solutum				
permanet.....	"	1 22...		4 ,092790
(4) Aquā bulliente tantummodo solubilia				
Extractum insipidum lamellis				
splendentibus constans.....	" "	16...		0 ,849840
Flocci leves suspensi, non soluti.	" "	4...		0 ,212460
(5) Aquā et Alcoole nullo modo solubilia				
Quae igne adusta dissipantur, quae				
debentur ligneis vegetabilium				
partibus, et fibrae Viperinæ car-				
nis.....	"	1 48...		6 ,575780
Quae solubilia sunt Acido Mu-				
riatico et cum ipso efferves-				
cunt.....	" "	7...		0 ,571800
Ex cineribus demum habetur si-				
licea materies, cuius pars cras-				
sior, dimidia totius, ab alienis				
certè accessit; pars autem sub-				
tilior Theriacæ ipsi tribui de-				
bet.....	" "	3...		0 ,159540
(6) Deperdita quedam, aut quæ expendi-				
nequeunt.....	" "	8...		0 ,424910
	2 "	"..."		61 ,188200

N. B. (1) Alcoolatum quod ex Theriacâ stillavit Theriacam odore refert; quod ex Alcoole ipso, seu Tincturâ Theriacoli, Aquâ mediante præcepit agitur Extractum Alcoholicum, Theriacam et Bitumen redolet, colore ex viridi fuscō, sapore acri piperato. Oleum autem viride non totum, nisi bulliente Alcoole solvitur. (2) Quod ex Alcoole in Aquam cessit, indicia quoque prætulit salis calcarei, et alienjs tñm Sulfatis, tñm Muriatis, nullatenus verò Acetatis. (3) Extractum quod Aquâ frigidâ, post Alcoolem, solutum est, fuscō colore, aëris contactu nigrescit, teneisque aliquod et Gummi, et quod vocant Tanin; at nullum partem Sulfatis Ferri; quæ tamen manifesta admodum fit in Theriacâ D. BACNÉ, in quâ in Colcothar locum sufficiunt Sulfas Ferri ad albedinem exustus; non spernendâ sancte inter utramque Theriacam differentiâ. (4) In Extracto Aquâ tantum bulliente solibili dignoscitur Amylus; floccorum autem exastorum fumi materiam produnt vegeto-animaliem. (5) Quod est residuum, dum exoritur, odorem vegeto-animalis substantie emitit. Quid autem è cineribus in Acidem cessit Sales dedit Aquâ stillatâ solubiles, quibus cyanei colores non immutantur, separe

metallico notabiles, et, ubi notis probantur artificiis, Calcem, Alumineam terram, et
Oxidum Ferri, prodentes.

Notandum autem hic speciatim est nullam omnino differentiam intercessisse inter analysim Theriacæ recentissimæ, de industria ad hocce opus preparatæ, Theriacæ vetustioris per quatuor annos in officina repositæ, et antiquioris et penè exsiccatæ, quæ post annos quadraginta asservabatur apud D. BOURET Pharmacopœum Parisiensem, et olim confecta fuerat solemniter, juxta eamdem formulam, in Pharmacopeorum publico consessu. Huic scilicet eadem Mellis inerat quantitas, quæ in recentioribus. Hoc tantum differebat, quod residue post solutionem Alcoolicam materiei inerat quoddam, micis albicantibus constans, quod videbatur melli deberi, et ejus esse partem illam à D. PROUST optimè notatam, quæ sola ex melle in crystallos glomeratas valet concrecere. Cætera iisdem et naturâ et ratione in omnibus dictis Theriacis inveniebantur. Unde patet quid sentendum sit de illâ adeò celebratâ fermentatione, pro perficiendâ in ampos Theriacâ.

Verumtamen fatendum est, quantumcumque solertia peragatur medicamentorum analysis, fogacem nimis volatilium partium vim nullâ esse lance trahinandam; et eam hucusquæ omni se subripuisse Chynicorum industria. Multa tamen in hâ ipsâ odorum subtilitate, adeò mutabili, inest medica vis et actio in æquè subtilem nervorum influxum, quo mirum varia in modum viventium organorum incitatur efficacia. Igitur dici non potest quid decedat aut accedit temporis lapsu Theriacæ hujus virtuti; neque certè vetustissimam recentiori, ut multi contendunt, longè præstare negantur.

9. ELECTUARIUM OPIATUM ASTRINGENS, VULGÒ
DIASCORDIUM.

R foliorum Scordii (<i>Teucrium Scordium</i>) siccatorum unciam unam et semis, vel	48
Rosarum rubrarum (<i>Rosa Gallica</i>) unciam semis, vel	16
Radicum Bistortæ (<i>Polygonum Bistorta</i>) unciam semis, vel.....	16
Gentianæ (<i>Gentiana lutea</i>) unciam se- mis, vel.....	16
Tormentillæ (<i>Tormentilla erecta</i>) un- ciam semis, vel.....	16
Seminum Berberidis (<i>Berberis vulgaris</i>) unciam semis, vel.....	16
Zinziberis (<i>Amomum Zingiber</i>) drachmas duas, vel	8
Piperis Longi (<i>Piper Longum</i>) drachmas duas, vel	8
Cassiæ lignææ (<i>Laurus Cassia</i>) unciam semis, vel.	16
Cinnamomi (<i>Laurus Cinnamomum</i>) unciam se- mis , vel.....	16
Dictamni Creticæ (<i>Origanum Dictamnus</i>) unciam semis , vel.....	16
Styracis Calamitæ (<i>Styrax officinalis</i>) unciam semis , vel.....	16
Galbani (<i>Bubon Galbanum</i>) unciam semis , vel.	16
Gummi Arabici uneiam semis , vel.....	16
Boli Orientalis præparati uncias duas, vel.....	64
Extracti Opii Vino parati drachmas duas, vel..	8
Mellis rosati percolati, et ad lentorem usque Mel- lis excoeti, libras duas, vel.....	1,000

Vini Hispani generosi, quod satis est, aut circiter libram semis, vel..... 250

Solutis inde Galbano in aliquantulo Vino, inde Melle, iisdem deinde commixtis, admixtisque paulatim pulveribus, fiat ex arte Electuarium, quod saepius agitur, donec in debitam densitatem devenerit.

In locum Styracis Calamitae suffici potest aut Balsamum Tolutanum (*Toluifera Balsamum*), aut Benzoïnum (*Styrax Benzoin*).

Summa totius Electuarii erit circiter..... 1,472

Ratio Extracti Opii ad summam Electuarii erit ut 1 ad 184; neque multum aberit ab ipsius in Theriacâ ratione, si in Theriacâ non Opii integri, sed solius Extracti rationem habueris.

11. ELECTUARIUM DENTRIFICIUM.

R. Corallii rubri (*Isis Nobilis*) præparati uncias quatuor, vel..... 128

Ossis Sepiae (*Sepia officinalis*) in tenuissimum pulverem triti unciam unam, vel..... 32

Cinnamomi (*Laurus Cinnamomum*) in pulvrem triti unciam unam, vel..... 32

Coccinellæ (*Coccus Cacti*) in tenuissimum pulvrem tritæ unciam semis, vel..... 16

Mellis Narbonensis uncias decem, vel..... 520

Aluminis in pulvrem triti drachmam semis, vel. 2

Tere diu in mortario marmoreo Coccinellam et Alumen, cum parvâ quantitate Aquæ communis, usque dum eliciatur color purpureus.

Tum adde paulatim Mel et alios pulveres, et erit Electuarium, Oleis volatilibus inodorandum variis. Drachma una Electuarii satis inodorabitur olei guttâ unâ.

VII. PILULÆ ET BOLI.

Pilulæ vocantur medicamenta mixtis accurate Pulveribus, ope Syrupi, Mucaginis, Mellis, Extracti vel Conservæ cujuslibet intimè unitis constantia, undè Massa conficitur sat solida, ut facile tractari digitis ducique, et in partes molis parvæ æqualiter dividi, atque in sphærulas effingi possit.

Ne solidentur nimium Pilulæ cavendum est: ideòque diù conterendæ sunt in mortario Massæ Pilularum, antequam dividantur. In officinis autem ipsæ Massæ indivisæ inter membranas Oleo purissimo mollitas asservandæ sunt; quas, pro necessitate, ne rancescant, novis commutare convenit. Si Massa ipsa nimium induruerit, Syrupo convenienti ad mixto, conterenda et mollienda est.

Massas tantum, non Pilulas, in officinis asservare præstat; et tunc tantum in Pilulas effingi debent, cùm à Medico præscribuntur.

1. PILULÆ DE SAPONE.

R .	Saponis Amygdalini libram semis, vel....	250
	Pulverum Radicis Althææ (<i>Althaea officinalis</i>) un-	
	ciam unam, vel.....	52
	Nitratis Potassæ drachmas duas, vel..	8

Contunde Saponem cum sufficienti quantitate olei Amygdalarum dulcium in mortario marmoreo. Dein adde Pulveres, et fiat Massa, ex quâ Pilulæ informari poterunt.

2. PILULÆ DE ALOE ET KINAKINA, DICTÆ STOMACHICÆ,
VEL ANTE CIBUM.

R. Aloës Socotrinæ in pulverem tritæ drachmas sex, vel..... 24
 Extracti de Kinakinâ drachmas tres, vel..... 12
 Cinnamomi (*Laurus Cinnamomum*) drachmam unam, vel..... 4

Misce cum Syrupi de Absinthiis quod satis est, ut fiat Massa, cuius Aloës æquabit circiter quartam partem; dividenda in pilulas, quarum singula æquabit grana quatuor.

5. PILULÆ DE ALOE ET MYRRHA, DICTÆ RUFI.

R. Aloës Socotrinæ in pulverem tritæ uncias duas, vel..... 64
 Myrræ in pulverem tritæ unciam unam, vel.. 52
 Croci stigmatum (*Crocus Sativus*) unciam semis, vel 16
 Misce, et cum Syrupo de Absinthiis fiat Massa, cuius Aloës æquabit circiter $\frac{4}{10}$, Dividenda in pilulas, quarum sit singula granorum quatuor.

4. PILULÆ DE ALOE ET CAMBOGIA, DICTÆ HYDRAGOGÆ
BONTII.

R. Aloës Socotrinæ, Sueci dicti Gummi Guttæ, *de Guttiferá verá*,
 Gummi-Resinæ Ammoniaci,
 In pulverem redactorum..... *āā partes æquales.*

Aceto Vini acerrimo dissolvantur ; colentur , et quod residuum erit, fortiter exprimatur. Dein liquor vaporet balneo maris ad Extracti penè solidi spissitudinem , ut fiat Massa apta Pilulis informandis , quarum singula pendat grana quatuor.

5. PILULÆ DE ALOE ET FETIDIS, DICTÆ BENEDICTÆ FULLERI.

R • Aloës Soccotrinæ unciam unam , vel.....	52
Sennæ (<i>Cassia Senna</i>) unciam semis , vel.....	16
Asæ fetidæ drachmas duas , vel.....	8
Galbani drachmas duas , vel.....	8
Myrrhæ drachmas quatuor , vel.....	16
Croci (<i>Crocus sativus</i>) drachmam unam , vel..	4
Macis (<i>Myristica aromaticæ</i>) drachmam unam , vel.....	4
Sulfatis Ferri unciam unam et semis , vel.....	48
Singula seorsim in pulverem trita misceantur , addanturque	
Olei succini gttæ octo circiter grana sex , vel..	0,5
Et Syrupi de Artemisiâ quantum satis , scilicet circiter unciae sex , vel.....	192
Misce intimè ut fiat Massa apta Pilulis , supe- rans uncias decem , vel.....	528
In qua ratio purgantium ad summam erit circi- ter ut 1 ad 7.	

6. PILULÆ EX ALOE ET SAPONE.

R • Aloës purissimæ in pulverem tritæ unciam se- mis , vel.....	16
---	----

Saponis Amygdalini drachmas sex , vel.....	24
Olei volatilis de Aniso guttas octo , circiter grana sex , vel	0,5
Misce accuratè et cum sufficienti quantitate Syrupi de Rhamno , fiat Massa , ad formandas Pilulas. In quibus Aloës ratio erit circiter $\frac{1}{4}$.	

7. PILULÆ DE HYDRARGYRO , SCAMMONIO ET ALOE,
VULGÒ MERCURIALES.

R. Hydrargyri purissimi unciam unam , vel...	52
Teratur assiduè , donec splendor metallicus omnis sit extinctus , cum	
Mellis optimi uncii duodecim , vel.....	584
Terendoque demum admisce	
Aloës Socotrinæ uncias duas , vel	64
Scammonii Alepensis uncias duas , vel.....	64
Macis (<i>Myristica aromatica</i>) drachmas duas , vel	8
Cinnamomi (<i>Laurus Cinnamomum</i>) drachmas duas , vel.....	8
Summa omnium.....	560
Fiat Massa dividenda in Pilulas in pulvere Glycyrrhizæ volutandas , quarum singula grana æquabit quatuor ; quatuor autem pilulæ tenebunt Hydrargyri paulò infrà gra- num unum , purgantium paulò ultra grana quatuor , aro- matum granum semis.	

8. PILULÆ EX OXIDO STIBII ET HYDRARGYRI SULFURETO
NIGRO COMPOSITÆ , DICTÆ ADVERSUS SCROPHULAS.

R. Scammonii in pulverem triti uncias duas , vel	64
--	----

Sulfureti Hydrargyri nigri (vulgò <i>Aethiops mineralis</i>) uncias duas, vel.....	64
Oxidi Stibii albi (vulgò <i>Antimonium diaphoreticum</i>) drachmas tres, vel.....	12
Oniscorum seu Millepedum (<i>Oniscus Asellus</i>) præparatorum drachmas tres, vel.....	12
Saponis Amygdalini drachmas tres, vel.....	12
Extracti Glycyrrhizæ, vel Syrupi è quinque Radicibus quantum satis, aut circiter uncias quinque, vel.....	160
Summa omnium.....	524

Fiat Massa ad formandas Pilulas, quarum singula æquabit grana quatuor; decem verò tenebunt Sulfureti Hydrargyri grana circiter octo, Oxidi Stibii granum unum et semis, Scammonii grana octo.

9. PILULÆ EX HELLEBORO ET MYRRHA, DICTÆ TONICÆ
GEORGII FREDERICI BACKER.

Extracti Hellebori nigri juxta methodum Backer parati (v. pag. 184) unciam unam, vel..	52
Extracti Myrræ, ut dictum est superius (pag. 182) parati, unciam unam, vel.....	52
Foliorum Cardui Benedicti (<i>Centaurea Benedicta</i>) in pulverem tritorum drachmas tres, vel...	12
Summa omnium.....	76

Misce intimè, ut fiat Massa, quæ in siccissimo loco repona est, donec in densitatem Pilulis formandis aptam devenerit; tunc demùm dividenda est in Pilulas grani unius.

10. PILULÆ SCILLITICÆ.

R .	Pulveris Scillæ (<i>Scilla maritima</i>) unciam unam et semis, vel.....	48
	Gummi-Resinæ Ammoniaci unciam semis, vel..	16
	Misce accuratè, et cum sufficienti quantitate Oxiellis Scil- litici fiat Massa ad formandas Pilulas.	

11. PILULÆ DE TEREBINTINA.

V. Præparationem Terebinthinæ, page 10.

12. PILULÆ BALSAMICÆ DICTÆ D. MORTON.

R .	Pulveris Millepedum (<i>Oniscus Asellus</i>) un- cias duas et drachmas duas, vel.....	72
	Gummi - Resinæ Ammoniaci unciam unam et drachmam unam, vel.....	56
	Acidi Benzoïci sublimati drachmas sex, vel....	24
	Pulverum Croci (<i>Crocus sativus</i>) drachmam unam, vel.. ..	4
	Balsami Peruviani sicci drachmam unam, vel.....	4
	Balsami Sulfuris Anisati quantum satis aut circiter drachmas sex, vel.....	24
	Summa totius.....	164
	Misce : fiat Massa diù contundenda et ad usum servanda. Hæc in summâ Millepedes erunt ut 1 ad 2 ,28; Ammo- niacum ut 1 ad 4 ,5; Acidum Benzoicum et Balsamum Sul- furis singulatim ut 1 ad 7; Crocus et Balsamum Peruvia- num, singulatim ut 1 ad 41.	

N. B. Inter Olea medicata Solutiones Sulfuris Oleo paratas, *Balsama Sulfuris* dicta, non consultò omisimus, non spernendum tamen medicamenti genus; adeòque hic loci eas indicare necesse duximus.

**OLEUM ANISI SULFURATUM, VULGÒ BALSAMUM
SULFURIS ANISATUM.**

R. Sulfuris sublimati et loti partem unam..... 10
Olei volatilis de Aniso stillatiti partes quatuor.. 4
Digerantur suprà arenam ad Sulfuris dissolutionem; oleum rubescet, atque ubi refriguerit lagunculis excipiatur probè obturandis.

Simili modo cum Oleis volatilibus Terebinthinae, Sucini, etc., aut ipsis expressis ex Olivis Nucibusve, parari possunt Olea Sulfurata.

**15. PILULÆ DE EXTRACTO OPII, DICTÆ VULGÒ DE
CYNOGLOSSO.**

R. Pulverum

de cortice radicum Cynoglossi (<i>Cynoglossum officinale</i>) drachmas qua-	
tuor, vel.....	16
de Seminibus Hyoscyami albi drach-	
mas quatuor, vel.....	16
Extracti Opii Vino parati, seu Laudani Opiati	
drachmas quatuor, vel.....	16
Pulverum Myrræ drachmas sex, vel.....	24
Olibani drachmas quinque, vel.....	20
Croci (<i>Crocus Sativus</i>) drachmam	
unam et semis, vel.....	6
Castorei drachmam unam et semis, vel.	6
Syrupi de Opio.....	<i>quod satis.</i>

Fiat secundum artem Massa diu contundenda et in usum servanda, cuius Summa erit circiter 144; et Extracti Opii ad summam ratio erit ut 1 ad 9.

TROCHISCI.

Trochiscos, quos olim in usum internum parabant, hic omittendos duximus. Alii enim ad id ferè tantum conficiebantur, ut quædam medicamenta in pulverem facilius redigerentur; Sic parabantur Colocynthis in Trochiscis Alandal, Caro Viperina in Viperinis, Scilla in Scilliticis, et Boletus Laricinus in Trochiscis de Agarico; quorum ope hæc medicamenta intemerata servabantur, donec essent terenda. Sed de istis satis dictum est, ubi de parandis illis pulveribus egimus (*V.* page 17); Cæteri Trochisci, quos à Tabellis et ipsis Pilulis, nisi formâ aut siccitate, differre vix invenies, in usu jam non sunt, nec ipsi quos vocant *Hedycroón*, de quibus in Theriacâ actum satis.

SECTIO DECIMA.

*Medicamenta mistione aut formâ ad usum
externum præcipue destinata.*

CATAPLASMATA, FOMENTA, COLLYRIA, LYNTIMENTA, CERATA, ADIPES
MEDICATI ET UNGUENTA OLEOSO RESINOSA, UNGUENTA SOLIDA SEU
EMPLASTRA, TELÆ MEDICATÆ, ESCHAROTICA, SUFFUMIGATIONES.

MULTA hoc in genere Medicamentorum inter simpliciter
mixta numerari possunt. Contrà in quibusdam vera ob-
tinet dissolutio Chymica. In nonnullis elementorum com-
mutatio et consociatio itâ perficitur, ut nova indè enascan-
tur corpora; quod certè fit propè in omnibus medicatis
Adipibus, et Emplastris. Verum tamen hujus sectionis or-
dinem non ex operationum Chymicarum naturâ, ut in
præcedentibus, sed ex singulorum usu medico sumendum
duximus. Scilicet, in externis actionibus, cùm nihil ferè
observantibus incertum objiciatur aut dubium, nihil non
percipiatur ipsissimis oculis, facilè ex ipsis medicamentorum
titulis et nominibus utendi modus et agendi intelligitur; indè
igitur ordinis ratio certior ab omnibus sponte deducitur et
maximè naturalis.

I. CATAPLASMATA.

Cataplasmata, inter externa medicamenta, ea dicuntur quæ ex pulpis, pulveribus, farinisve commixtis constant, quæ diluta aquâ simplici, decoctisve Plantarum, aut lacte, liquidisve variis coquuntur, et sic in pultem spissiorem addensantur.

Iis sic ritè comparatis admisceri quoque possunt Olea, Unguenta, Pulveres varii et alia id genus, ex quibus Cataplasmatum vis augeri aut immutari pro necessitate valet.

Rarò frigidis convenit uti, sèpiùs tepidis, aut calidis, aliquoties calidissimis. Multis, præcipue si emollire debeant et calida diù permanere, utile est sub finem adjecisse non nihil aut olei, aut adipis ejus vis recentis, quod ipsis intimè permisceatur. Indè scilicet et lentiùs frigescunt imposita, et, cùm detrahantur, nuda cutis non æquè, sub aëris contactu et aquosi vaporis in auras dissipatione, nocivum contrahit frigus.

1. CATAPLÀSMA È PANIS MEDULLA.

R. Medullæ Panis triticei exsiccati et eras-	
sius triti uncias quatuor, vel.....	128
Lactis Vaccini recentis, vel decocti radicis Al-	
thææ libram unam et semis, vel.....	750
Coque, indesinenter movendo spatulâ ligneâ,	
ad debitam spissitudinem, et erit cataplasma, cui	
ipsâ quâ apponetur horâ adde, si lubet,	
Croci Sativi in pulverem redacti drachmam se-	
mis, vel.....	

2. CATALPLASMA E FARINIS ET PULPIS DICTUM EMOLLIENS.

R. Farinarum emollientium uncias quatuor,
vel 128

Diluantur in sufficienti quantitate decoctionis
plantarum emollientium; deinde coquantur in
pultem; quo facto, vas ab igne remove et ad-
misceantur

Pulpæ specierum emollientium recenter præ-
paratae unciae quatuor, vel 128

Vel ejus loco, pulveris specierum emollientium
uncia una, vel 52

Coque denuò ad debitam spissitudinem.

N. B. Cum Cataplasmata emollientibus parata excipien-
dis sèpè aptentur medicamentis valentioribus, ut penitiùs
horum vis per emollitam cutem absorbeatur; multa, ipsis
non incoqui, sed paulò antequam appónantur admisceri
præstat. Talia sunt, verbi gratiâ, *Cicutæ pulvis*, aut *Croci*,
aut aliorum, præsertim quæ partibus valent, quarum virtus
decoctione aut perit omnis, aut multùm infringitur.

3. CATALPLASMA E PULPIS ET UNGUENTO, DICTUM AD
SUPPURATIONEM PROMOVENDAM.

R. Farinarum resolventium uncias quatuor,
vel 128

Coque cum sufficienti quantitate decocti Plan-
tarum emollientium, ad debitam spissitudinem.

Tum adde,

Pulpæ bulborum Lilii albi recenter præparatæ uncias duas, vel.....	64
Pulpæ è decoctis foliis Rumicis Acetosæ uncias duas, vel.....	64
Unguenti, vel Basilici vel Fusci unciam unam, vel.....	52
Misce accurate.	
<i>N. B.</i> Unguentum aliquantulo oleo diluere prodest, ne, pulpis aliis non sat benè immixtum, concrescat frigescendo, et in ipso Cataplasmate ab ipsis dissocietur.	

4. CATAPLASMA CUM KINA ET CAMPHORA, DICTUM
ANTISEPTICUM.

R. Farinæ hordæ uncias sex, vel.....	192
Aquaæ communis libram unam, vel.....	500
Corticis Peruviani in pulverem triti unciam unam, vel.....	52
Bulliant simul per quadrantem horæ, inde- sinenter movendo spatulâ ligneâ, ad debitam Cata- plasmatis spissitudinem, cui semirefrigerato adde Camphoræ in pulverem redactæ drachmam unam, vel.....	4

5. CATAPLASMA E PAPAVERE COMPOSITUM ET HYOS-
CYAMO, DICTUM *ANODYNUM.*

R. Capsularum Papaveris albi minutim concisarum un- ciam unam, vel.....	52
Foliorum Hyosciami nigri recentium uncias duas, vel.....	64
Ità Bulliant cum sufficienti quantitate Aquaæ	

communis, ut, coctione peractâ, supersit liquoris circiter libra una et semis, vel.....	750
Cola, et colato decocto dilue farinarum emol- lientium uncias quatuor, vel.....	128
Dein coque, indesinenter movendo, ad spissi- tudinem Cataplasmati.	

6. CATAPLASMATA È PIPERE ET ACETO, DICTUM ANTI-
PLEURITICUM, VEL RUBEFACIENS.

R. Hordei leviter torrefacti et in pulverem redacti uncias quatuor, vel.....	128
Aceti acerrimi unciam unam, vel.....	52
Albumina ovorum n° 5.	
Misce in mortario marmoreo et cum sufficienti quantitate aquæ communis fiat massa extendenda suprà stupas linteо impositas; dein superficie hu- jus Cataplasmati superinsperge mixtos pulveres paratos ex	
Piperis nigri uncia semis, vel.....	16
Et seminum Feniculi uncia semis, vel.....	16

7. CATAPLASMA EX SINAPI seu SINAPISMUS.

R. Pulveris semen Sinapi recentium quantum erit opus.	
Aceti Acerrimi.....	quod sufficit.
Misce in mortario marmoreo ad debitam Cataplasmati spissitudinem, quod aut purum, aut, pro rei necessitate, variè compositum à medico præscribetur; modò scilicet fa- rinæ Hordei aut Lini quantitate variâ remiscebitur, ut fiat mitius; modò contrà, additis Cochleariæ Armoracae radice	

radulà communità, Allii bulbis contusis , aut aliis id genus , ut efficacius evadat.

Eo tantum tempore quo in usum requiritur , præparandum est.

II. FOTUS SEU FOMENTA , LOTIONES.

Fotus seu Fomenta Lotionesque dicuntur à Medicis , non actus tantum sovendi lavandi que, sed et medicamenta liquida quibus soventur , humescunt lavanturve partes externæ mōrbo affectæ , aut quibus aliquis subjacet morbus.

Plantarum infusa decoctave , lac , Vinum sive simplex , sive aromaticum sit , pro Fotu et Lotione esse possunt , prout singula à naturā morbi requiruntur.

Tepidi saepius adhibentur Fotus , ope pannorum aut linteorum quæ ipsis immaduère. At etiam , pro liquidorum quibus constant naturā et morbi necessitate , quandoquè frigidi apponuntur , quandoquè calore suprà temporem intensiori. Pleraque à medicis ex tempore , pro re natâ , præscribuntur. Sequentia tantummodò in exemplum sint.

1. FOTUS E MUCAGINIBUS , DICTUS EMOLLIENS.

R. Decoctorum ex Radicibus Althææ officinalis foliisque Malvæ paratorum..... *quod sufficit.*

Semina Lini in radicis Althææ locum suffici , et folia Herbarum emollientium quarumlibet Malvæ vices implere facile possunt.

2. FOTUS EX SUB-ACETATE PLUMBI SIMPLEX, VULGÒ
AQUA VEGETO-MINERALIS.

V. pag. 253, inter Acetes, n° 6, Sub-Acetas Plumbi
 LIQUIDUS.

3. FOTUS EX VINO AROMATICUS ET CAMPHORATUS.

R. Vini aromatici libras duas, vel..... 1,000
 Alcoolis Camphorati uncias duas, vel..... 64
 Misce.

Hoc in Fotu ratio Alcoolis Camphorati ad Vinum aromaticum erit circiter ut 1 ad 16. Varia tamen, pro lubitu, esse potest.

4. FOTUS EX HERBIS ET SUB-ACETATE PLUMBI, DICTUS
EMOLLIENS ET RESOLVENS.

R. Decocti Herbarum emollientium libras duas,
 vel..... 1,000
 Sub-Acetatis Plumbi liquidi (vulgò *Extracti Saturi*) drachmas duas, vel..... 8
 Misce.

5. LOTIO HYDRO-SULFURATA, AD SCABIEM, A. D. DU-
PUYTREN PROPOSITA.

R. Aquæ communis..... 1,000
 Sulfureti Potassæ..... 96
 Acidi Sulfurici (66%)...... 4
 Solvatur aquâ Sulfuretum; solutoque admisceatur aei-

dum; misceantur autem omnia tantum utendi tempore.
Potest in Acidi Sulfurici locum suffici Acidum Aceticum,
auctâ tamen hujus ad alia ratione.

N. B. Expeditius hoc utuntur linimento Milites, peregrinantes, inopes et alii, quibus uti commodè non licet balneis aut vaporibus hydrosulfuratis, aut etiam unguentis ad Scabiem vulgaribus.

III. COLLYRIA:

In oculorum morbis ea medicamina quæ oculis palpbrisve aptantur medicandis, eluendis, abstergendis, Collyria dicuntur. Sicca ea sunt, aut Mollia, aut Liquida.

Sicca pulveribus constant quos semper subtilissimos esse convenient.

Sacchari crystalli puriores, in pulverem subtilissimum redacti, sales quidam tenuissimè triti, quales sunt Ammoniæ Murias, Sulfas Zinci parcâ quantitate Saccharo commixti, etc., siccorum Collyriorum materiam suppeditant.

Ea vulgò ope calami scriptorii, ex quo ipsis per foraminulum patet exitus, flatu in oculum excludi solent. At enim talia non nisi magnâ cum cautelâ adhibenda sunt.

Mollia. Unguentorum formam quadamtenus referunt et vulgaribus unguentis firmius paulò consistunt. Hujus censûs præcipue sunt quæ inter Unguenta aut Pomata describenda sunt: *Unguentum de Oido Zinci*, vulgò de *Tuthiad* dictum, et *Unguentum de Oido Hydrargyri rubro*, vulgò

dictum *Ophthalmicum*, quæ inter Adipes medicatos referuntur.

Liquida ex Aquis stillatitiis, infusis Plantarum et decoctis variè conficiuntur, admixtis etiam diversis quandoquè, pro indicationum naturâ, materiis.

Collyriorum formulæ *magistrales* ut plurimùm esse solent. Sunt tamen ex his medicamentis usitatoria quædam, inter liquida præsertim, quæ hoc in Codice locum obtinere debent.

1. COLLYRIUM OPIATUM SEU ANODYNUM.

R • Aquæ Rosarum stillatitiæ uncias duas, vel.	64 ,00
Gummi Arabici drachmam semis, vel.....	2 ,00
Vini opati fermentatione parati guttas sex, cir-	
citer grana septem, vel.....	0 ,35
Quæ tenebunt extracti Opii ferè granum unum.	
Misce.	

2. COLLYRIUM DE SULFATE ZINCI.

R • Sulfatis Zinci drachmam unam, vel....	4
Aquæ stillatitiæ de Rosis, libram unam, vel..	1,000
Alcoolis (12=22° B°) unciam unam, vel...	32
Misce.	
Quidam huic Collyrio addunt Sacchari crystal-	
lorum unciam unam, vel.....	52

5. COLLYRIUM DE SALIBUS IGNE FUSIS, OLIM VOCATIS LAPIS DIVINUS.

R • Sulfatis Cupri puri uncias tres, vel....	96
Nitratis Potassæ puri uncias tres, vel.....	96
	48

Sulfatis Aluminæ puri uncias tres , vel.....	96
In pulverem accuratè redacti et mixti igne liqueuntur in cymbio fictili aut in crucibulo.	
Liquatis adde	
Camphoræ in pulverem tritæ drachmam unam ,	
vel	4
Massa refrigerata , effracto vase , seponatur et servetur.	
R. Materiæ sic paratæ drachmam unam , vel..	4
Aquæ communis libras duas , vel.....	1,000
Solve , et erit Collyrium servandum in usus.	

IV. LINIMENTA.

Linimenta medicamenta ea sunt , quæ cutis superficie illinuntur , sive ipsi aut sub ipsâ morbus inhæreat , sive insideat partibus inunctæ regioni subjectis ; quorumdam ad interna quoque , sorbente cute , videtur actio transmitti.

Plerumque inter Oleorum fluiditatem et mollitiem adipis suilli medius consistit Linimentorum lensor.

Multæ ipsis admisceri possunt materiae , quarum virtutes morborum naturæ accommodantur ; verum omnes ferè semper , ut illinantur , vel Oleo , vel Adipe solvendæ sunt ; sœpè Sapone admixto , si difficilius Oleo commisceri queant.

Pleraque Linimenta ex tempore præscribuntur à Medicis , et sic , pro re natâ parantur . Nihilominus quasdam in exemplum afferre non inutile visum est Linimentorum formulas frequentius usitatas.

1. LINIMENTUM AMMONIACALE.

(*V. SUPRA INTER SAPONES*, n° 5, p. 266.)

2. LINIMENTUM OLEOSO-CALCARIUM, AD AMBUSTA.

(*V. SUPRA INTER SAPONES*, n° 5, p. 267.)

Opiatum etiam fit idem Linimentum sequenti modo.

R	Aquaæ Calcis libram semis, vel.....	250
	Olei Amygdalarum dulcium libram semis, vel.	250
	Laudani liquidi Sydenhami drachmas duas,	
vel.....		8
	Misceantur omnia et turbido sic liquore lintea madescant, ut ipsis ambustæ partes involvantur.	

3. LINIMENTUM SAPONACEUM OPIATUM.

R	Tincturæ Opii Alcoolicæ unciam unam,	
vel.....		52
	Saponis Amygdalini, unciam semis, vel...	16
	Olei Amygdalarum dulcium aut Olivarum un-	
cias duas, vel.....		64
	aut quantum libuerit.	

Soluto ope Tincturæ Sapone, terendo commisceatur
accuratè Oleum, ut fiat Linimentum, in quo, pro re natâ,
varia esse potest Olei ad Tincturam ratio.

4. LINIMENTUM CAMPHORATUM.

R	Olei Olivarum.....	64
	Camphoræ.....	ad 8
	Misce accuratè.	
	Possunt Olivo suffici Olea medicata simplicia vel compo-	
	sita, ut Chamæmeli, aut Hyoscyami, aut aliorum.	

5. LINIMENTUM E CANTHARIDIBUS CAMPHORATUM.

R. Tincturæ Cantharidum semi-unciam , vel..	16
Olei Amygdalarum dulcium uncias quatuor,	
vel.....	128
Saponis Amygdalini unciam unam , vel.....	52
Camphoræ drachmam semis.....	2
Solvatur in Oleo Camphora; ac deinde Tinctura, soluto	
Sapone, terendo admisceatur.	
Similia parantur ex Tincturis Scillæ , Digitalis purpureæ	
et aliis.	

6. LINIMENTUM HYDRO-SULFURATUM SAPONACEUM, AD SCABIEM. D. JADELOT.

R. Saponis communis	500
Liquescat balneo maris in vase fictili, et addan-	
tur	
Olei de seminibus Papaveris albi.....	250
Terendo misceantur intimè, et addantur	
Sulfureti Potassæ siccii et in pulverem triti...	100
Terantur iterum, ut mistura fiat perfectior, ad-	
danturque inter terendum	
Olei de seminibus Papaveris	750
Fiat massa lentè diffluens cuius summa erit... .	1600
Et ratio Sulfureti ad summam Linimenti erit	
ut.....	ad 16

V. OLEO CERATA, ADIPES MEDICATI,
UNGUENTA OLEOSO-RESINOSA.

His nominibus significantur medicamina , quæ admixtis
hinc Adipibus , Oleis , Cerâ , indè Extractis , Pulveribus ,

Oxidis, aut Salibus Metallicis, Resinisque aut Balsamis conficiuntur.

Hæc inter quædam simpliciora mixtis constant admodum paucis, quædam multipliciter composita ex numerosis coalescent.

Varia quoque in iis est densitatis soliditatisque vis, pro materiarum quibus constant natura. Mollitie tamen plerique melli proxima sunt, ut partes ipsis obduci et inungi facile queant.

Pro materiis ex quibus conficiuntur, variis inscribi sub titulis, et diversis sectionibus annumerari possunt.

Primum genus eorum est quæ, ex Oleo et Cerâ unitis, *Cerata* vulgo, aut, adæquato magis nomine, *Oleo-Cerata* dici solent.

Alterum genus præcipuè constat *Adipibus medicatis*, quos Pomata plerumquæ dixerunt; pars adipes habet aromaticis tantum inodoratos; pars alia conficitur Sulfure, atque etiam nuperrimè Phosphoro, aut Oxidis variis, Mercurii præsertim, adipe exceptis ipsove solutis; alia constant epispaticis aut infusis adipi, aut permixtis; quædam tandem parantur succis narcoticis adipi incoctis.

Tertium genus et cæteris solidius est, quod fit ex Resinis Oleo aut Adipi consociatis, ad quod pertinent ea præsertim quæ *Balsama* aut *Unguenta* nuncupantur.

Ut autem facile admodum corrumpuntur præcipuè Pomata et Cerata, frequentius innovanda sunt; et asservandi modus idem esse debet, qnem Adipum Oleorumque esse diximus.

I. OLEO-CERATA SEU CERATA.

1. OLEO-CERATUM SIVE CERATUM SIMPLEX.

- R.** Olei Amygdalarum dulcium..... 12
 Ceræ albæ purissimæ..... 4
 Leni calore, balneo maris, liquecat in oleo Cera, donec omnino soluta sit et totus pelluceat liquor. Frigescat, et, cum duruerit, deradatur et teratur in mortario marmoreo, pistillo vitreo, ut grumi, si qui supersint, omnino evanescant.
N. B. Auctâ Ceræ ratione, ut sit ad Oleum ut 9 ad 16, et additâ ad colorem Anchusâ, habebitur Ceratum paulò solidius, dictum *Pomatum ad Labia demulcenda*; cui liquato et percolato, ad odoris gratiam, Olei volatilis eujusvis aliquantulum admiscebitur; tunc infundetur in Pyxides ad hunc usum aptas, in quibus frigesactum solidescet.

2. CERATUM KINAKINA MEDICATUM.

- R.** Cerati simplicis..... 16
 Extracti de Kinakinâ Alcoolici, parcâ Alcoolis
 quantitate diluti..... 2
 Terantur miscenturque intimè; frigescat Ceratum et ser-
 vetur ad usum.

5. OLEO-CERATUM AQUA SUBACTUM SEU CERATUM
ALBUM, VULGÒ CERATUM GALENI.

- R.** Ceræ albæ et puræ..... 4
 Olei Amygdalarum dulcium..... 16
 Liquefiant simul leni calore in vase faventino
 et moveantur continuò, donec refrixerint. Dein

adde sensim sine sensu, et indesinenter agitando
in mortario marmoreo, pistillo ligneo,

Aquæ purissimæ, vel, si lubeat,

Aquæ Rosarum stillatitiae 12

Et erit Ceratum asservandum in vase faventino.

Simili modo paratur Ceratum cum Cerâ flavâ.

4. CERATUM SUB-ACETATE PLUMBI MEDICATUM, VULGÒ
DICTUM *CERAT DE GOULARD.*

R .	Cerati Albi ut dictum est parati.....	500
	Sub-Acetatis plumbi liquidi (<i>Extr. Saturni</i>)..	4
	Misce accuratè in mortario marmoreo.	
	Sub-Acetatis ratio erit ad totum Ceratum ut 1 ad 125, seu granorum viginti circiter pro unciiis quatuor.	

II. ADIPES MEDICATI VULGÒ *POMATA*
DICTI.

1º. ADIPES ODORATI.

1. ADEPS ROSIS MEDICATUS VULGÒ *UNGUENTUM*
ROSATUM.

R .	Adipis Porceini recenter præparati et multo-	
	ties Aquâ Rosarum loti.....	1,000
	Rosarum pallidarum cum calycibus recentium et contusarum.....	1,000

Mixtae adipi Rose maneant per biduum; quo elapso, in eodem
adipe leni calore fuso par quantitas Rosarum iterum maceretur per
alterum biduum, ac denuo fusus adeps exprimatur; tum demum
balnei maris calore liqueficiatur, positâ fæce, purum evadet Pomatum.

Color huic adipi vel Pomato ruber conciliari potest, ope radicis
Anchusæ tinctoriæ.

2. ADEPS LAURO MEDICATUS VULGÒ OLEUM AUT UNGUENTUM LAURINUM.

R. Foliorum Lauri (<i>Laurus nobilis</i>).....	500
Conterantur in mortario marmoreo, pistillo	
ligneo, cum adipis porcini.....	1,000
Coquantur igne leni, donec omnis humor	
evanuerit.	
Sub finem adde	
Baccarum Lauri contusarum.....	500
Digerantur balneo maris vase clauso per decem horas.	
Dein cola per linteum densum cum expressione; quo	
facto, positâ fæce, frigescat. Tunc liquetur denuò ut purum	
habeatur.	

2°. ADIPES OXIDIS, SULFURE, etc.,
MEDICATI.

3. ADEPS SUB-CARBONATE PLUMBI MEDICATUS, VULGÒ
DICTUM UNGUENTUM ALBUM RHAZIS.

R. Oxidi albi seu Sub-carbonatis Plumbi suprà	
porphyriten levigati.....	500
Adipis porcini leni calore molliti et modice	
disfluentis.....	2,500
Misce ope spatulae ligneari.	
Et erit Pomatum in quo ratio Oxidi erit $\frac{1}{6}$; quod nunquam	
magnâ copiâ simul parandum est; facile enim rancescit.	

4. ADEPS OXIDO ZINCI MEDICATUS DICTUM UNGUEN-

TUM DE TUTHIA.

R. Oxidi Zincii (vulgò <i>Tuthia</i>) sublimati et suprà por-	
phyriten levigati.....	8

Butyri Aquâ Rosarum loti.....	16
Unguenti Rosati.....	16
Misce accuratè in mortario marmoreo et erit Pomatum in quo ratio Oxidi erit ut 1 ad 5.	

5. ADEPS OXIDO HYDRARGYRI RUBRO ET PLUMBI
ACETATE MEDICATUS.

R. Butyri recentis Aquâ Rosarum frigidâ loti.....	4 ,5
Camphoræ	0 ,25
Oxidi Hydrargyri rubri.....	0 ,25
Super-Aacetatis Plumbi.....	0 ,25
Accuratè misceantur terendo diù et fiat Po- matum , in quo ratio tûm Oxidi, tûm Acetatis ad Butyrum quo excipiuntur erit singulatim ut... 1 ad 18	
Adeòque utriusque grana quatuor tenebit hujus Pomati drachma una.	

N. B. Hunc Adipem , *Pomato* , dicto *Ophthalmico*
D. Regent, similem , probante ut credunt analysi, propo-
suere, *Baup, Duret (Bulletin de Pharmacie, 1814, p. 590)*.

6. ADEPS TARTRATE STIBII MEDICATUS.

R. Tartratis Stibii et Potassæ.....	5
Adipis Suilli præparati.....	16
Teratur primò seorsim tartras , ac deindè intimè Adipi misceatur , terendo in mortario vitro.	

7. ADEPS MURIATE HYDRARGYRI OXYGENATO MEDICA-
TUS, VULGÒ POMATUM D. CYRILLO.

R. Deuto-Muriatis Hydrargyri (<i>Sublimati corrosivi</i>),	4
Adipis Suilli præparati.....	52
	45

Teratur primò Deuto-Murias seorsim; deinde intimè Adipi
misceatur terendo in mortario vitro; quæ demùm mixta
suprà porphyriten accuratè levigentur.

8. ADEPS HYDRARGYRO MEDICATUS *VULGÒ UNGUENTUM NEAPOLITANUM.*

R. Adipis Suilli loti et præparati.....	500
Hydrargyri purissimi.....	500
Misce accuratè in mortario marmoreo vel ferreo, indesinenter terendo Hydrargyrum cum tertia parte Adipis, donec fiat inconspicuus; dein adde paulatim et per vices reliquum adipem, et erit Unguentum, in quo Hydrargyri ratio erit Adipi æqualis, seu massæ dimidium.	

N. B. Si Adipi et Hydrargyro commiscendis terendo addideris quartam partem Unguenti jam anteà præparati, consociabuntur multò facilius, et brevi tempore opus omne absolvetur.

9. ADEPS *SEU UNGUENTUM EX HYDRARGYRO MITIUS, DICTUM CINERITIUM.*

R. Unguenti Neapolitani.....	250
Adipis Suilli.....	750
Misce accuratè in mortario ferreo et erit Unguentum in quo Mercurii ad massam ratio erit ut .1 ad .8	

10. ADEPS NITRATE HYDRARGYRI MEDICATUS, *VULGÒ UNGUENTUM CITRINUM AD SCABIEM.*

R. Hydrargyri purissimi.....	64
Acidi Nitrici puri (52 g).....	96
Peractâ Mercurii dissolutione et refrigerato liquore,	
R. Adipis Suilli repurgati et liquefacti.....	1,000

Tere in vase figulino paulatim assundendo liquorem nitratis Hydrargyri supra dictum. Simul ac erunt omnia commixta, materiam adhucdum liquidam divide in formas chartaceas, in quibus paulò post indurescat in tabellas, et erit Unguentum in quo Nitratis Mercurii ratio ad summam erit ut 1 ad 7, 25.

10. ADEPS SULFURE ET AMMONIÆ MURIATE MEDICATUS
SEU UNGUENTUM SULFURATUM AD SCABIEM.

R. Adipis Porcini præparati.....	120
Sulfuris sublimati et loti.....	60
Muriatis Ammoniæ in pulverem redacti.....	4
Sulfatis Aluminæ et Potassæ in pulverem triti.	4
Misce accuratè in mortario marmoreo.	

12. ADEPS SULFURE ET CARBONATE POTASSÆ MEDICATUS, seu UNGUENTUM SULFURATUM ALCALI-
NUM AD SCABIEM D. HELMERICH.

R. Adipis Suilli præparati.....	800
Sulfuris Sublimati et loti.....	200
Carbonatis Potasse purissimi.....	100
Misce accuratè in mortario marmoreo pistillo ligneo.	
Serva ad usum.	

13. ADEPS OPÆ PHOSPHORI MEDICATUS.

R. Phosphori purissimi.....	1
Adipis Suilli recentis.....	1,000
Aquæ.....	100
Bulliant in vase faventino aut fictili crusta vitreâ obducto, donec et resolutus sit omnino Phosphorus, et aqua in vapores soluta sit tota. Liquidum Adipem aut Phosphoro, aut Hydrogenio Phosphorato fetum cola per chartam bibulam.	

Et, si libuerit, adde
Olei de Layandulâ volatilis.....¹
Sic fiet Unguentum seu Pomatum Phosphoratum, quod
in tenebris aliquantulum lucere deprehenditur.

14. POMATUM VEL UNGUENTUM NITRICUM, SEU OXYGE-
NATUM.

R. Adipis Suilli purissimi..... 500
Leni igne liquecat; adde
Acidi Nitrici (52%)..... 64
Supposito igne, massa assiduè moveatur bacillo vitro,
donec ebullire cœperit; quod ubi fiet, statim ab igne re-
motam movere perge, donec cessaverint bullæ. Tunc de-
mum in modulos chartaceos effunde ut concrescat.

3°. ADIPES EPIPASTICIS MEDICATI.

15. ADEPS CORTICE DAPHNES GNIDII MEDICATUS SEU
UNGUENTUM EPISPASTICUM DE DAPHNE GNIDIO, VULGÒ POMADE DE GAROU.

R. Adipis Porcini præparati..... 520
Ceræ..... 52
Corticis Daphnes Gnidi præparati..... 128
Liquentur Adeps Ceraque simul; addatur cortex aquâ
aliquantulum humescens; bulliant donec humor omnis ab-
sumptus fuerit, colentur, resideant, et cum refrixerint,
Pomatum abradatur sensim à summo ad imum, ac deinde
teratur, ut grumis omnino careat.

16. ADEPS CANTHARIDIBUS MEDICATUS VULGO *POMATUM*, SEU *UNGUENTUM EPISPASTICUM VIRIDE STIMULANS ACRIUS.*

R • Pulveris Cantharidum subtilissimi.....	64
Adipis Papavere medicati (vulgò <i>Unguentum populeum</i>).....	1,680
Ceræ albæ.....	256
Oxidi Cupri (vulgò <i>Viride æris</i> , Vert de gris).	24
Extracti Opii.....	24
Liquescant simul Unguentum Populeum et Cera, quibus, antequam refrixerint, adjungenda sunt Oxidum Cupri, Cantharides et Opium, quæ suprà Porphyriten, addito simul Olei pauxillo, simul usquè leviganda sunt, dum intimius permisceantur; fiet Pomatum cujus summa erit..	2,048
Et in quo Cantharidum ratio erit ut.....	1 ad 52
Ratio autem tūm Oxidi Cupri, tūm Opii citer ut.....	1 ad 85

17. ADEPS CANTHARIDIBUS MEDICATUS ALIUS, VULGO *POMATUM EPISPASTICUM FLAVUM ET MHTIUS.*

R • Pulveris Cantharidum crassius triti.....	120
Adipis Suilli.....	1,680
Aquæ.....	250
Liquato Adipe, diluantur Cantharides, aquâ simul admixta; omnia leni igne liquida permaneant et continuò spatulâ moveantur per duas horas, identidemque sufficiatur aquæ pauxillum in locum prioris in vapores solutæ. Trajicantur deinde per linteum et exprimantur; liquecere	

pergant calore balnei maris, additis, coloris causâ,	
Radicis Curcumæ in pulverem tritœ.....	8
Et sub hoc ipso balnei calore colentur per char- tam emporeticam: Colata lentè frigescant, ut sensim secedat humor superfluous, posteà, liquatis iterum admisceantur,	
Ceræ flavae.....	250
Tum verò gratum odorem conciliare licebit additis	
Olei Citrei volatilis.....	8
In hoc unguento habebitur extractum Oleosum grani unius Cantharidum circiter pro uncia semis unguenti.	

4°. ADIPES NARCOTICIS MEDICATI.

18. ADEPS PAPAVERE, HYOSCYAMO ET BELLADONA
MEDICATUS VULGO UNGUENTUM POPULEUM.

R • Gemmarum Populi nigrae recentium....	500
Macerentur per quatuor et viginti horas in Adipis Porcini præparati et liquefacti.....	1,500
Serva, donec adoleverint herbæ sequentes;	
Tum recipe foliorum recentium,	
Papaveris nigri.....	128
Belladonæ (<i>Atropa Belladona</i>).....	128
Hyoscyami (<i>Hyoscyamus niger</i>).....	128
Solani (<i>Solanum nigrum</i>).....	128
Contusa omnia misceantur cum adipe et gemmis Populi. Coquantur igne moderato, identidem agitando, ad humo- ris consumptionem; tum cola, toreulari expime, et Un- guentum defæcatum serva,	

III. UNGUENTA MOLLIA , OLEOSO-RESINOSA ,
BALSAMA VULGÒ DICTA.

Unguenta hic speciatim diximus ea quæ sat mollia sunt ut inungi queant. Quædam Linimentorum more partibus integris illinuntur, et verè priscum Unguentorum nomen et naturā et usu merentur; alia partibus aut rumpendis, aut ruptis, ulceribusque sœpè apponuntur, et ab Unguentis solidis seu Emplastris eo tantum differunt, quod molliora sunt et facile extenduntur, et non obtegunt tantum partes, sed in eas vi medicatā pollent evidentiori.

1. UNGUENTUM EX OLEIS VOLATILIBUS , BALSAMO PERUVIANO ET CAMP�ORA COMPOSITUM, DICTUM
BALSAMUM NERVINUM.

R .	Medullæ Bovinæ præparatæ uncias quatuor,	
vel		128
Olei de Nuce Moschatæ concreti uncias qua-		
tuor , vel		128
Oleorum volatilium		
Rosmarini drachmas duas vel		8
De Caryophyllis aromaticis drachman unam,		
vel		4
Camphoræ drachmam unam , vel		4
Balsami Peruviani siccii drachmas duas , vel . . .		8
Alcoolis (26 = 36 B ³) unciam semis , vel		16
Liquentur simul Medulla et Oleum concretum , et in lage-		
nam ostio latiore patentem infundantur ; addantur deinde		
Olea volatilia et Camphora in pulverem trita , atque Balsa-		
mum Alcoole solutum. Omnia simul liquentur balneo maris		

misceanturque intimè, et serventur in vasis vitreis perfectè obturatis.

2. UNGUENTUM DE TEREBINTHINA ET OVORUM VITELLIS,
QUOD VOCANT *DIGESTIVUM SIMPLEX.*

R. Terebinthinae puræ	64
Vitellos ovorum n° 2 circiter	52
Misce diu in mortario vitro sensim addendo	
Olei Hyperici coquendo parati <i>quantum satis.</i>	
Ut ex toto fiat Unguentum lente diffluens.	
<i>N. B.</i> Vis ipsi detergendi efficacior, pro rei necessitate, addetur, admixtā Melliti de Acetate Cupri (<i>Ung. Ægyptia-</i> <i>cum</i>) variâ quantitate.	

3. UNGUENTUM DE TEREBINTHINA ET CERA, DICTUM
VULGÒ *DE ALTHÆA.*

R. Olei de Mucaginibus	1,000
Ceræ flavæ	250
Resinæ puræ	125
Terebinthinae	125
Liquefiant omnia, colentur per linteum; spatulæ ligneæ exagitentur, donec refixerint, et fiat Unguentum.	

4. UNGUENTUM DE TEREBINTHINA CAMPHORATUM, VULGÒ
BAUME DE GENEVIÈVE.

R. Olei Olivarum	384
Ceræ flavæ	64
Santali rubri in pulverem redacti	16
Terebinthinae	128
Camphoræ	2
Digerantur leni calore; Camphora verò paulò antè addatur misceaturque quām refixerit Unguentum.	

5. UNGUENTUM DE TEREBINTHINA ET ADIPIBUS, VULGO
BALSAMUM ARCAEI.

R • Sebi Ovilli.....	1,000
Terebinthinae puræ.....	750
Resine Elemi puræ.....	750
Adipis Porcini	500
Liquentur simul, colentur, ut fiat Unguentum.	

6. UNGUENTUM DE STYRACE COMPOSITUM.

R • Olei de Nucibus expressi.....	350
Styracis liquidæ et puræ.....	225
Liquefiant simul leni calore identidem agitando;	
Sinito residere, Cola ;	
Adde Colophoniæ puræ.....	480
Resinæ Elemi pure.....	192
Ceræ flavæ.....	192
Igne modico liquatis omnibus, cola per linteum, ut fiat Unguentum.	

7. UNGUENTUM DE PICE ET CERA DICTUM BASILICUM.

R • Picis nigræ.....	32
Colophoniæ.....	32
Ceræ flavæ.....	32
Olei Olivaram.....	128

Liquescant simul Pix nigra et Colophonia, quibus fusis, addantur Cera et Oleum, et tamdiu super ignem agitantur, donec permixta atque omnino soluta sint omnia; tum per

linteum colentur et Pistillo ligneo usquè moveantur, dum tantummodo tepescat Unguentum. Tum demum effundatur in vasa in quibus asservandum est.

N. B. Ideò præstat Resinæ Pineæ Colophoniam, quod, admissa, ut solitum erat prius, Resinam, ex hujus humore innato, dum deeoquitur, intumesceret Unguentum, mixtorumque fieret solutio difficultis; omnia verò et solvuntur plenius, et facilius absolvuntur, adhibitâ in Resinæ locum Colophoniam.

N. B. Hoc Unguentum ut stimulet acrius, addi potest pro singulis Unguenti unciis, vel pro..... 52
Oxidi Mercurii rubri drachma semis, vel.... 2

VI. EMPLASTRA.

Iisdem ferè materiis Emplastra constant, quibus et Unguenta: ita tamen perficiuntur ut non æquè incalescendo diffuant, soliditatemque obtineant quæ varias induere et servare formas, partibusque aptata ad ipsas componi, atque ipsis inhærere valeant aliquando pertinaciùs.

Duplum distingui debet Emplastrorum genus.

Aliud nempè conficitur ex variis medicaminibus Adipi, Oleis, Ceræ, Resinisve commixtis; neque talia ab Unguentis modo descriptis nisi soliditate discrepant.

Alterum genus ex solutis Plumbi Oxidis præcipuam mutuantur soliditatis vim; inter quæ alia, aquâ intermixta, alia absque eâ decoquuntur. Hæc ultima ignis vi nigrescunt, atque ideo, non satis apto nomine, *usta* dici solent.

Multæ Emplastris admisceri possunt materiæ, ex quibus

variæ ipsis conciliantur proprietates. Cavendum ne in du-

riorem Massam ita solidescant, ut tractari facilè et suprà

alutas aut lintea extendi nequeant.

Emplastra incorrupta diù asservari valent; temporis ta-

men lapsu ita exsiccantur, ut digitis tractata frangantur,

et tunc ut obsoleta rejici debent.

I. EMPLASTRA OXIDIS CARENTIA SEU UNGUENTA SOLIDA.

1. EMPLASTRUM DE CERA.

R esinæ Citrinæ.....	50
Sebi Ovilli præparati.....	50
Picis albæ.....	10
Liquentur simul et misceantur.	

2. UNGUENTUM SOLIDUM DE CICUTA SEU EMPLASTRUM DE CICUTA.

R esinæ Pini.....	960
Ceræ Citrinæ.....	640
Picis albæ.....	448
Olei de Cicutæ coquendo parati.....	128
Foliorum Cicutæ (<i>Cicuta officinalis</i>) recentium contusorum.....	2,000

Liquentur leni igne Resinæ et Cera Oleo mixta,
additisque Cicutæ foliis, simul coquantur in Em-
plastrum. Huic per pannum fortiter expresso, per
misceantur Aceto Scillitico et Succo Cicutæ soluta
et inspissata

Gummi resinæ Ammoniaci..... 500

Misceantur omnia accuratè indesinenter movendo , et
habebitur Emplastrum cujus Massa erit circiter 4,676, et
quam mos est effingere in cylindros , dictos vulgò *Magda-*
lia , *Magdalides* , *Magdaleones*.

3. UNGUENTUM SOLIDUM DE RESINIS ET GUMMI-RESINIS,
VULGÒ *EMPLASTRUM DE MUCAGINIBUS.*

R. Olei Mucaginum.....	240
Resinæ Pini.....	96
Terebinthinæ.....	52
Resina et Terebinthina igne liquefiant Oleo mixta , et colentur. Colatis admisce	
Ceræ Citrinæ.....	1,000
Semi refrigeratis adde , postquam Alcoole (10=20 B ⁴) erunt soluta , et in mellis spissitudinem vaporando adden- sata ,	
Gummi Resinæ Ammoniaci.....	52
Opopanacis.....	52
Tum admisce	
Croci in pulverem triti.....	10
Misce accuratè , ut fiat Emplastrum in cylindros effin- gendum cujus Massa erit 1,442.	

4. EMPLASTRUM DE PICE ET RESINIS GLUTINANS,
DICTUM *ANDREÆ A CRUCE.*

R. Picis albæ.....	128
Resinæ Elemi.....	52
Terebinthinæ puræ.....	16
Olei Laurini.....	16
Liquefiant moderato igne , cola per linteum , et erit Emplastrum cujus summa erit 192.	

5. EMPLASTRUM E CANTHARIDIBUS EPISPASTICUM SOLIDIUS ET TENACIUS HÆRENS, VULGÒ *EMPLASTRUM VESICANS*.

R.	Picis albæ.....	240
	Therebinthinæ puræ.....	80
	Ceræ flavae.....	180

Liquefiant simul : trajiciantur per linteum dēnioris textū , moyeantur aliquandiū , et ab igne remotis adde

Cantharidum in 'pulverem subtilissimum contritum..... 125

Misce accuratissimè ut fiat Emplastrum in cylindros effingendum cuius Massa æquabit..... 625

Ratio autem Cantharidum ad Massam erit ut... 1 ad 5

N. B. Antequām cuti apponatur aluta hoc emplastro obducta , ipsi prætereà , pro Medici arbitrio , vulgò inspergitur pulvis Cantharidum non ita subtilis , cui sèpè etiam Camphora admiscetur.

6. EMPLASTRUM E CANTHARIDIBUS EPISPASTICUM MOLLIUS, VULGÒ *VESICANS ANGLICUM* DICTUM.

R. Emplasti de Cerâ (V. n° 1),
Adipis Suilli,
Cantharidum in subtilissimum pulverem tritarum , àa
partes æquales.

Liquatis emplastro et adipe , liquatâ Cerâ Oleoque solutâ , remotisque ab igne , adjiciatur , antequām concrescant , Cantharidum pulvis , et accurate commisceatur.

Huic emplastro plerumque non inspergitur pulvis Cantharidum.

II. EMPLASTRA CUM OXIDIS.

1. EMPLASTRA CUM OXIDIS PLUMBEIS AQUA
MEDIANTE COCTA.1. EMPLASTRUM EX OXIDO-PLUMBI SEMI-VITREO,
SEU EMPLASTRUM SIMPLEX.

R. Oxidi Plumbi semi-vitrei (*Lithargyri*) in
tenuissimum pulverem triti..... 1,500
 Adipis Porcini 1,500
 Olei Olivarum..... 1,500
 Aquæ communis..... quantum satis.
 Vasi primū immittantur Adeps Oleumque, ac deinde
 Oxidum; incalescant sensim, spatulâque misceantur; tūm
 superaffusâ aquâ, bulliant, assidue movendo ope spatulæ
 lignæ; aquæ in vapores solutæ nova identidem sufficiatur,
 donec solutum oxidum omnino fiat inconspicuum: tūm
 vase ab igne remoto, citò concrescat Emplastrum ab aquâ
 separandum, cuius Massa erit 4,500.
 Oxidi autem ratio erit ad Massam ut 7..... 1 ad 3.

2. EMPLASTRUM SIMPLEX GLUTINANS.

R. Emplastri simplicis..... 6
 Picis albæ..... 1
 Liquetur Emplastrum leni calore; liquato addatur Pix et
 intimè misceatur.

5. EMPLASTRUM EX OXIDO PLUMBI RUBRO CAMPHORATUM, VULGÒ DICTUM NORIMBERGENSE.

R. Oxidi Plumbi rubri (vulgò <i>Minii</i>).....	500
Olei Olivarum.....	600
Aquæ communis.....	<i>quantum satis.</i>
Coque ad perfectam Oxidi dissolutionem et humoris ferè consumptionem. Tùm vas ab igne remove et adde	
Ceræ flavæ.....	500
Et remoto sub finem igne, antequām concrecant, addantur	
Camphoræ.....	24
Quibus optimè permixtis perficiatur Emplastrum.	
Color Emplastro conciliabitur ruber, si propè jam cocto addantur Oxidi Plumbi rubri.....	60
Tunc erit Oxidi ratio ad Massam circiter ut...	1 ad 4

4. EMPLASTRUM CUM GUMMI-RESINIS, DICTUM DIACHY-LUM GUMMATUM.

R. Emplasti simplicis.....	1,600
Ceræ Citrinæ.....	96
Picis albæ.....	96
Terebinthinæ.....	96
Liquefiant haec primū modico igne, tūm	
R. Gummi-Resinarum Ammoniaci.....	52
Bdellii.....	52
Galbani.....	52
Sagapeni.....	52

Solvantur in

Alcoolis (10=20 B⁴)..... sufficienti quantitate.

Et vaporent in mellis spissitudinem, ac deinde liquato
Emplastro accuratè admisceantur : Gummi-Resinarum ratio
erit ad Massam Emplastri ferè ut..... 1 ad 19

5. EMPLASTRUM SAPONACEUM.

R. Oxidi Plumbi rubri (vulgò <i>Minii</i>) in pul-	
verem probè triti.....	500
Oxidi albi seu Sub-Carbonatis Plumbi (vulgò	
<i>Cerussæ</i>).....	250
Emplastri simplicis.....	2,000
Ceræ albæ.....	96
Aquaë communis.....	quod satis.
Coque assiduè movendo ad perfectam Oxidorum	
solutionem. Tùm vas ab igne remove et, aquà ab-	
jeetâ, admisce	
Saponis albissimi siccî et derasi.....	125
Coque denuò leni igne, et erit Emplastrum, cui, ex tem-	
pose, si libuerit, Camphora addi potest.	
Saponis autem ratio erit ad Massam Emplastri circiter ut	
1 ad 24.	

6. EMPLASTRUM DE HYDRARGYRO COMPOSITUM, VULGÒ DE VIGO CUM MERCURIO EMENDATUM.

R. Emplastri simplicis.....	1,250
Ceræ flavæ.....	64
Resinæ Pini.....	64
Quibus liquatis, plenè solutis et semi-frigidis,	
nondūm verò concretis, addantur pulveres	

Gummi-Resinarum Ammoniaci.....	20
Bdellii.....	20
Olibani.....	20
Myrrhæ.....	20
Croci (<i>Crocus Sativus</i>).....	12
Misce accuratè. Intereā	
R. Hydrargyri.....	380
Terebinthinae puræ.....	64
Styracis liquidæ et puræ.....	192
Terantur diù in mortario ferreo donec, Mercurius fiat incompisciuis. Quo facto, adde Emplastrum suprà paratum, liquefactum, modicè calens, et misce intimè, ac demùm, antequam concrescat, adde	
Olei Lavandulæ volatilis.....	8
Misce ut fiat Emplastrum, in quo Hydrargyri ratio ad Massam erit circiter ut 1 ad 8.	
No'tandum est ad conficiendum hoc Emplastrum non utendum esse cupreis, sed ferreis tantummodo vasis.	

3°. EMPLASTRUM CUM OXIDIS AQUA NON
MEDIANTE.

7. EMPLASTRUM FUSCUM, VULGÒ UNGUENTUM MA-
TRIS THECLÆ.

(Onguent de la Mère.)

R. Olei Olivarum.....	500
Adipis Porcini.....	250
Butyri recentis.....	250
Sebi Arictini.....	250

Quibus simul fusis, fumo jām exhalante, partitis vicibus adjiciantur	
Oxidi Plumbi semivitrei (vulgò <i>Lithargyri</i>) in pulverem triti.....	250
Quibus usquè coctis, donec Massa ex fusco ni- grescat, adde	
Ceræ flavæ.....	180
Picis nigræ.....	80
Sie fiet Emplastrum.	
<i>N. B.</i> Nisi huic Emplastro Pix nigra sub finem adderetur, ipsius superficies sensim fuscum colorem cum flavo albi- cante, temporis lapsu, commutaret.	

S. EMPLASTRUM EX MIXTIS QUATUOR, QUÆ DICUNTUR
VULGÒ *RESOLVENTIA*.

R. Emplastrorum Saponacei,
De Cicutâ,
De Gummi - Resinis, seu
Diachyri gummati,
De Hydrargyro compositi. *ā parte
aqua*les.

Liquentur simul in cymbio fictili vitro encausto ob-
ducto, Balnei maris calore; liquata deinde in ollâ ferreâ
intimè misceantur.

VI. TELÆ MEDICATÆ, etc.

TELÆ DICTÆ *SPARADRAP*, *CEREOLI*,
GLANDES SUPPOSITORIÆ.

Hoc nomine *Sparadrap* significantur Telæ Cannabinæ,
Lineæ, aut textus Sericei, aut etiam Chartæ papyraceæ

quorum aut una , aut utraque facies Emplastro aliquo li-
quato penicillo obducta est ; vel quæ ipso mersa utrimquè
immaduere.

Ut sit benè commodèque confectum *Spadarap*, id præ-
cipuè requiritur ut, quocumque modo ipsi inducta sit
materies, tenuem, æqualem lævemque per omnem super-
ficiem sese præbeat, textusque ipse latus tractabilisque
maneat, sitque ita glutinosus, ut et cuti adhærescat facilè,
et ab eâ sic detrahi possit, ut ablatum materia obducta
sequatur tota, et nullis cutem deturpet vestigii.

Quædam instrumenta præparandis hisce Telis apta in-
venta sunt, quæ describere hujus loci non est; omnia au-
tem quæcumque sint, peritis assuefactisque æquè succe-
dunt.

Emplastra, *Diachylum gummatum*, *Norimbergense*,
Simplex, etc., Cerata ipsa plerumque in hoc Tela-
rum genere confiendo usurpantur; sunt tamen quædam
composita quæ in hunc usum, in simpliciorum vulnerum
curâ, vulgò et commodè satis adhibentur, quorum for-
mulas hic exarare non extrâ rem nostram visum est.

1. TELA SEU SPADARAP VULGARE.

R.	Ceræ albæ minutim concisæ.....	64
	Olei Amygdalarum dulcium.....	52
	Terebinthinæ.....	8
Liquefiant simul balneo maris. Pro tempestate aut Me- dici judicio, ratio Ceræ et Olei major vel minor esse potest : indè parentur Sparadrap secundum artem.		

2. SPARADRAP EX EMPLASTRIS.

R. Emplastrorum Simplicis.....	15
De Gummi - Resinis , seu	
Drachyli Gummati.....	15
Ceræ Flavæ.....	5
Terebinthinæ.....	5

Liquentur simul Balneo maris, et suprà Telas extendantur.

3. CHARTA CERATA.

R. Ceræ puræ et albæ.....	48
Terebinthinæ pure.....	48
Olei Ceti concreti (vulgò <i>Spermaceti</i>).....	52
Liquefiant simul balneo maris, et spatulâ vel alio instrumento ad id aptiori extendantur super chartulas.	

4. SERICUM , DICTUM ANGLICUM.

R. Ichthyocollæ Selectæ.....	64
Aqua communis.....	250
Alcoolis (12 = 22 B°).....	500
Ichthyocolla in frustula concidatur ; digeratur aquâ , in vase fictili faventino, suprà arenam ; soluta per linteum coletur ; admisceatur demum Alcool , vaporentque omnia leni igne ad dimidias ; iterum cola.	

Tunc Serico in fascias secto proboque extenso , penicilli ope , liquor tepidus leviter inducatur . Quo siccato , iterum atque tertio , imò si præstet , quater et quinques illinden-
dus est .

Odoris gratia conciliabitur adhibitâ Peruviani balsami tincturâ , quam eodem modo licebit inducere , eâ tamen cautelâ , ut , cum sicca fuerit , ultimò Iththyocollâ obductâ contegatur . Quibus plenè peractis sericum sic præparatum

siccescere opportet per viginti quatuor horas, ac deinde dividì in quadrulas.

5. SERICUM EPISPASTICUM D. GUILBERT PHARMACO-
POEI PARISIENSIS.

R. Corticis Daphnes Gnidi.	24
Bulliant in Aquæ.	1,500
Trajice per incerniculum, adde	
Cantharidum in pulverem tenuissimum redac-	
tarum.	24
Myrrhæ in pulverem tritæ.	24
Euphorbii in pulverem triti.	24

Incalescant donec bulliant; tunc cola per linteum dupli-
catum nondum usu attritum; eò demùm usquè decoctum
vaporando addensetur, ut ipso facilè Sericum cerà jam
illitum penicillo possit obduci.

Mensuram dedimus hâc in formulâ talem quæ sufficiat
obducendo serico quadrato tria decimeta lato.

N. B. Curandum est sericum istum, ubi sat siccum vi-
debitur ut tractari facilè possit, aëri expositum ne rema-
neat diutiùs, sed illicò convolutum chartis includatur, et
sic servetur. Hâc scilicet arte, lentore proprio revolubile
et usque tractabile, nunquam siccitate nimiâ aut fissuris
dividetur, aut in squamas dissiliet.

CEREOLI.

Hæc Medicamina præcipuè apta sunt curandis urethræ
morbis; formantur in cylindros unâ parte crassiores pau-
lulùm, alterâ tenuiores, crassitie cæterùm variâ, sed ea
tamen quæ nunquam ferè scriptorii calami tenuioris me-
diocritatem excedat. Longitudo non est suprà centimetra
septem et viginti.

Conficiuntur Cereoli ex Telis in fasciolas dissectis, tenuioris textūs, obducto Emplastro aliquo leviter utrimquè illitis. Fasciolæ istæ convolutæ eodem instrumento levigantur, quo cerarii solent nitorem candelis inducere cereis.

Quidquid Emplastrorum est aut Unguentorum quæ solidæ sunt, modò nimis non induruerint, Cereolis informandis coaptari valet; perfectiores habentur qui lenti, flexiles, nitentes, et, æqualiter obducta materie, enodes obtinentur.

Quandòque, priusquam in usum adhibeantur, Cereoli liquidis immerguntur, quæ, pro morbi naturā, diversimodè præparata præstò esse debent.

GLANDES SUPPOSITORIÆ.

Id Medicamentorum genus in anum immitti solet. Sebum arietinum soliditate emulantur. Crassities earum varia est; in conum scilicet ductæ, modò calamum scriptorium æquant, modò ad auricularis digitii crassitiem accedunt.

Sapo, Sebum Verveticum, Oleum concretum de seminibus Cacao, Mel in soliditatem huic usui aptam coctione addensatum, vulgo ad has Glandes efformandas adhibentur.

Sæpiùs, antequam in anum immittantur, liquoribus medicatis inficiuntur, que requisito effectui respondeant.

Sapo cultello exsecari debet in convenientem formam.

Oleum concretum de seminibus Cacao, Sebumque Arietinum liquefieri debent calore sufficienti, et sic in conos infundi chartaceos aut papyraceos.

Glandes demum suppositoriæ, quæ ex Melle decocto

constant, inter digitos volutari et sic in debitam formam effingi possunt.

VII. ESCHAROTICA.

DE CATHÆRETICIS ET ESCHAROTICIS.

Escharotica medicamenta, quæ, si remissius agant, *Cathæretica* dicuntur, ea sunt quæ vel inurendæ cuti apta sunt, vel carnes ulcerum luxuriantes, flaccidas, in fungos excrescentes exedunt, aut in Escharas vertunt mox deciduas, ubi ipsas ferro exsecare non licet.

Sales alkalini, Acida, Oxida metallica quæ adurendi vi pollent, plerisque Escharoticis conficiendis materiem præbent præcipuam. Mollia alia sunt, solida alia, liquida per multa. Formam quoque diversam induere debent, pro variis corporis partibus et locis, et pro requisitis tūm efficaciā, tūm agendi modo.

1. TROCHISCI ESCHAROTICI.

R. Muriatis Hydrargyri corrosivi.....	8
Amyli.....	16
Mucaginis Gummi Tragacanthæ.....	quod satis.
Fiant Trochisci quibus addi poterunt, si lubet, guttæ aliquot Laudani liquidi.	
Ratio Muriatis ad Massam major paulò est quam 1 ad 5.	

2. TROCHISCI ESCHAROTICI DE MINIO.

R. Oxi Plumbi rubri (<i>Minium dictum</i>)....	16
Muriatis Hydrargyri corrosivi.....	52

- Medullæ panis exsiccatæ et in pulverem tritæ.. 128
 Aquæ Rosarum..... quod satis.
 Fiant secundum artem Trochisci oblongi, in seminis av-
 nacei formam effici.

Muriatis ratio in ipsis est ad Oxidum duplex, ad Mas-
 sam autem ut 2 ad 11.

5. MASSA CAUSTICA D. ROUSSELOT, QUAM VULGO AD-
 SCRIBUNT *F. COSME, A. D. DUBOIS* EMENDATA.

R.	Oxidi Arsenici albi.....	2
	Sulfureti Hydrargyri rubri in subtilissimum pul- verem aquâ mediante triti.....	32
	Resigæ Sanguis-Draconis dictæ.....	16

Omnia seorsim trita asserventur, et eo tantum quo
 requiruntur tempore misceantur intimè in mortario vitro;
 atque, ubi ulceribus mox imponenda sunt, Pulveris hu-
 jus ea copia, quæ sufficere videbitur, suprà discum faven-
 tinum aut porcellaneum, admixtâ, ut solent, salivâ, vel,
 si præstare videbitur, gummi ita soluto ut aqua inde ali-
 quam visciditatem contrahat, ope spatulæ ita subigatur
 et coëat, ut accedat ad mollitiem massæ triticeæ in panificiis
 præparatæ. Sic demùm Massa hæc apta est curandis ulceribus
 cancerosis.

N. B. Sulfureti polvis aquâ mediante itâ teri debet, ut pars
 ejus subtilior, aquâ ob tenuitatem suspensa et ipsi innatans,
 tantummodò excipiatur, ut præscriptum est de parandis
 pulveribus, n° 17, pag. 20. Eâ enim tenuitate tantum
 aptus fiet ad parandam hanc Massam. Talis ex Bataviâ Cin-
 nabarinus pulvis ad nos advehitur, machinis paratus ad id
 opus aptissimis (vide eâ de re optimè scriptum libellum
 à D. PATRICK. *Didot atné*, 1816).

Nulli autem concedatur hæc Massa nisi ex legitimâ prescripcione notoque assertâ chirographo.

Ratio Oxidi Arsenici ad totum pulvrem erit ut 1 ad 25.

4. ALUMEN IGNE EXSICCATUM, DICTUM VULGO *ALUMEN USTUM.*

R. Sulfatis Aluminæ et Potassæ crystallorum.. quantum opus est.

Excipiantur patellæ fictili nullo encausto obductâ, et igne admoto, sensimque aucto, intumescat Alumen, donec siccum peritus evaserit.

5. POTASSA IGNE FUSA, DICTA *LAPIS CAUSTICUS.*

V. Sect. VII. ALKALIA, pag. 268, n° 9.

6. NITRAS ARGENTI FUSUS, DICTUS *LAPIS INFERNALIS.*

V. Sect. VIII. SALES, NITRATES, pag. 248, n° 6.

7. OXIDUM HYDRARGYRI RUBRUM, DICTUM *MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER.*

V. Sect. VII. OXIDA METALLICA, pag. 218, n° 12.

8. DEUTO-MURIAS STIBII SUBLIMATUS, OLIM *BUTYRUM ANTIMONII* DICTUM.

V. Sect. VIII. SALES, MURIATES, pag. 240, n° 14.

9. MIXTURA, seu SOLUTIO CATHÆRETICA, DICTA COLLYRIUM LANFRANCI.

R.	Vini albi generosi	500
	Aquarum Plantaginis	96
	Rosarum	96
	Sulfureti Arsenici flavi (vulgò <i>Auripigmentum</i>)	8
	Oxidi Cupri viridis, gallice <i>Verd de gris</i>	4
	Myrræ	2,6
	Aloës	2,6
	Tere diu in mortario vitro et serva ad usum.	
	Mixturæ totius summa erit	709,2
	Ratio Sulfureti Arsenici ad mixturam totam erit ut 1 ad 88,65; Ratio Oxidi Cupri ut 1 ad 177,30.	

10. MELLITUM DE CUPRO ACETATUM, VULGÒ UNGUENTUM ÆGYPTIACUM.

V. Sect. V. MELLITA, pag. 165, n° 8.

11. ACIDUM SULFURICUM ALCOOLISATUM, VULGÒ EAU DE RABEL.

V. Sect. VIII. ACIDA ALCOOLISATA, pag. 250, n° 3.

12. AQUA MERCURIALIS.

V. Sect. VIII. NITRATES, pag. 248, n° 4.

VIII. SUFFUMIGATIONES.

Quæcumque determinato caloris gradu in vapores solvuntur, ad Suffumigationes parandas apta sunt:

Aqua simplex,
Aqua aromatibus odorata,
Acida quædam,
Alcoolata de vegetantibus et animalibus odoratis,
Tincturæ Æthereæ,
Combustorum sumi, ut Chartæ papyraceæ, Sacchari,
Linteorum, etc.

Sulfur, Cinnabaris, aliæque ex mineralibus desumptæ materiæ, igne volatiles, ad suffumigandum adhiberi possunt.

Verùm ut variæ in singulis deprehenduntur vires, nec idem ex omnibus fumus exhalat, Medici officium est ea indicare ex quibus Suffumigatio aptior haberi possit, sive in atmosphæram latè spargenda sit, sive illa toti corporis superficie, vel alicui tantùm parti sit aptanda.

Aliæ autem medicatæ verè dici possunt et magistralibus medicamentis annumerari debent; aliæ ad fetidos odores vincendos tantùm valent; aliæ demùm adhibentur ad corrigenda, aut absumenda vitia quibus aër inficitur, unde restituatur purus et salubris.

1º. SUFFUMIGATIONES MEDICATÆ inter Magistralia tantum recenseri debent, atque adeò sive materiem spectes, sive artificium vaporí regendo destinatum hoc in Codice locum obtinere nequeunt.

2°. SUFFUMIGATIONES AD FETOREM VIN-
CENDUM.

1. FUMI EXCITANTES ET TONICI.

R. Sacchari, Coffæ, Benzoïni, vel Sucini, Cascarillæ,
vel Santali Citrini, aut baccarum Juniperi, aut Pastillo-
rum odoratorum..... *quod volueris.*

Injice suprà batillum, patellam, aut sartaginem ferè in-
candescentem. Citò exhalabunt vapores fuliginosi et aro-
matici, qui, per aërem sparsi, miasmata fetida extemporali
efficaciâ vincere quenunt et vires aliquatenus excitare, at
neque contagii adversari, neque aëri sinceritatem per-
mansuram conciliare possunt, imò ipsum necessariò hete-
rogeneis vaporibus inficiunt, non semper, si copiosiores fue-
rint, innocuis.

2. PASTILLI ODORATI.

R. Balsamorum aquâ priùs decoctorum, ut acido
volatili, careant

Benzoïni.....	16
Peruviani siccii.....	16
Santalini Citrini (<i>Santalus albus</i>).....	4
Labdani.....	1
Carbonis Tiliacei.....	96
Nitratis Potassæ.....	2

Omnia in pulverem subtilissimum trita, intimè mixta,
ope mucaginis Gummi Tragacanthæ, coéant in Massam
plasticam, informandam in conos, basi in tripodem dilatait,
in cibano leni calore exsiccandos.

3°. SUFFUMIGATIONES ANTISEPTICÆ AD
AERIS VITIA CORRIGENDA.

5. SUFFUMIGATIO GUYTONIANA.

R.	Muriatis Soda in pulverem triti.....	56
	Oxidi Manganesii (gallicè <i>Manganèse</i>).....	8
	Aqua communis.....	52
	Misceantur in patellâ vitrâ, vel in vase faventino, et suprà affundantur	
	Acidi Sulfurici (66%).....	52
	Mox exhalabunt vapores albi, qui copiosius erumpent, si materies moveatur bacillo vitro, vel porcellaneo.	

Nota. Cubiculum in quo suffimentum exhalat istud, nemine ibi stante, perfectè claudendum est; neque portæ senes træve aperiendæ sunt antè semi-horam.

Mensura materiarum suprà præscripta apta est cubiculo octodecim pedes lato longoque, et decem circiter alto, vel, mensurâ in cubum ductâ, $3\frac{1}{2}/4$ pedum cubicorum capaci, seu metrorum 111,058; adeoque, pro locorum amplitudine augenda vel minuenda est suffimenti materies.

5. SUFFUMIGATIO SMITHIANA.

R.	Acidi Sulfurici (66%).....	64
	Aqua purissimæ.....	52
	Nitratis Potassæ purissimi in pulverem triti....	64

Acidum aquâ remixtum, fervore post mixturam cessante, excipiatur patellâ vitrâ aut fictili, suprà cineres calidos, aut arenam, modico igne supposito. Sic leniter incalescat

acidum, cui tunc Nitratas Potassæ injiciatur partitim, ut, postquam Gaz singulis vicibus emanare cessaverit, nova iteretur Nitratis injectio, et sic nulla Gaz Nitrosi pars Nitricum vaporem inficiat.

APPENDIX.

*Omissa quædam, aut quæ potiori methodo
possunt confici.*

1. EXTRACTUM CICUTÆ CUM FÆCULA. (*Vid. p. 175,
nº 5.*)

R. Cicutæ officinalis..... *q. lubet.*
Contunde et succum expime. Cola per telam textū den-
sioris. Divide effundendo in orbes planos faventinos, in va-
porario reponendos sub calore 55 ad 40 (43, 75 ad 50 centig.).
Ubi succus eò vaporaverit usque dūm siccus evaserit, aut
saltēm in mollitiem constiterit pilulis aptam, eximatur et
servetur ad usum, vase clauso.

Eodem modo parantur:

Extracta

Aconiti (*Aconitum Na-
pellus*),
Belladonæ (*Atropa Bella-
dona*),
Fumariæ, etc. (*Fumaria of-
ficialis*).

2. EXTRACTUM ALCOOLICUM DE NUCE VOMICA. (*Vid.
p. 185, nº 24.*)

(*Strychnos Nux Vomica.*)

Cùm multò major vis hujus extracti resinosi observetur
cùm alcoole paratur puriori; in locum illius quod indica-

vimus alcoole parandum 12=22 B^c, hic subjungendum duximus extractum paratum alcoole 22=32 B^c, quale in Caritatis nosocomio ad curandas paralyses a D. Fouquier usurpatur.

R. Nucis Vomicæ (*Strychnos Nux Vomica*)... 12

Alcoolis (22=32 B^c)..... quantum satis.

Digeratur nux in Alcoole, tamdiu renovando, dum novus Alcool nullo demum colore nulloque sapore inficiatur; tunc mixtae tinteturæ omnes per chartam bibulam trajiciantur. Destillent deinde donec quinta pars tantum supersit, quam tandem, sub balnei maris calore, in densitatem pilulis aptam vaporare curabis.

Habebitur sic extractum Alcoholicum æquans totius nucis partem duodecimam.

N. B. Nulli committatur hoc extractum nisi ex prescriptione legitimâ justoque obsignatâ chirographo.

5. DE EMETINA AD EMESIM TOTI IPECACUANHÆ SUBSTITUENDA. (Vid. p. 178, n° 12.)

Ex quo Emetina per Ipecacuanhæ analysis eruta est, ea ipsa in locum Ipecacuanhæ ipsius suffici potuit eà ratione, quæ totius Ipecacuanhæ emeticam vim optimè repræsenteret. Ita scilicet ut, si *Cephaelidem* velis, Emetina totius sit radicis circiter $\frac{1}{6}$ aut 0 ,16 ; si *Psychotriam* habeas, eadem sit totius $\frac{1}{7}$ aut 0 ,14.

Igitur in Ipecacuanhæ ipsius locum solutam aquâ Emetinam, multò minori ægrorum cum nauseâ, usurpare licet, ad totius Ipecacuanhæ partem circiter sextam aut septimam.

Sic in formulâ nostrâ potionis emeticæ , pag 83 , n° 6 , aquâ solvi possunt.

Emetinæ grana quatuor, aut..... 0 ,2

Pro Ipecacuanhæ cinericiae granis viginti quatuor, aut..... 1 , 2
 In Syrupi autem ex Ipecacuanhâ parati formulâ, p. 149,
 n° 1, solvi potest

Emetina ad drachmas decem, seu..... 40
 Pro Ipecacuanhæ cinericiae librâ semis, seu... 250

Atquè eadem servari poterit ratio in quibuscumque Ipecacuanha admittitur formulis, ut potionē ad pertussim p. 90, n° 8, et in pastillis p. 304, n° 10, etc. si videbitur.

4. EXTRACTA EX OPIO MATERIES MORPHINA DICTA,
 AUTORE D. ROBIQUET. (Ad p. 186, cum n° 26.)

R. Opii purissimi minutissimè dissecti..... 300

Macerentur per dies quinque

In Aquæ communis..... 1,000

Cola. Colato liquori adde

Magnesiæ puræ, omni acidō liberæ..... 15

Bulliant per horæ minuta decem. Inter bulliendum secedet sedimentum granosum, cinereum, copiosum. Totus liquor cum sedimento in chartaceum colan conjiciatur, ut quidquid erit sedimenti omnino secernatur. Istud deinde frigidâ eluat tamdiù, dum effluat aqua colore ferè expers. Sicetur sic lotum sedimentum.

Siccum idem leni calore digeratur in

Alcoolis (12=22 B^t)..... quantum sufficit.

Alcool, ubi colorem sedimenti, quantum licet, absumpsit, coletur; et quod sedimenti Alcoole calido digesti residuum est, Alcoole ejusdem notæ frigido eluat, donec Alcool vix coloratus effluat.

Tum demùm residuum hoc sedimentum teneatur per aliquot horæ minuta in Alcoole (22=52 B^t) purissimo et buliente.

Liquor colatus, dum frigescet, ponet crystallos Morphinæ leviter coloratas. Novus et ejusdem semper notæ Alcool ter quaterque cum residuo sedimento bulliat, colatusque idem frigescendo ponet similes crystallos, singulis vicibus pauciores.

Ut candidissimam Morphinam demum obtineas, sufficiet ut omnem purissimo Alcoole (26—56 B⁴) bulliente solvas; tunc eo frigescente subsidet in crystallos colore ferè expertes; colore ipso cum aliquantulâ Morphinâ in Alcoole superfluo permanente.

PRÆPARATIO MORPHINÆ JUXTA METHODUM D. SER-TUERNER.

(*Ann. de Chim. et de Phys. Juillet 1817, p. 275.*)

R • Extracti Opii.....	500
Dissolvatur Aquæ.....	suff: quantitate,
Ut frigifactum notet in areometro 8 ^d .	
Cui tunc affunde	
Ammoniæ Liquidæ (22 ^d).....	160

Scilicet ut tantillū superet Ammonia. Illicò subsidet materia gelatinæ similis citò auferenda; totusque liquor particulis implebitur crystallinis, subcinereis, floccorum specie fundum potentibus. Liquore colato, crystalli chartâ emporeticâ excepti eluantur, siccescant. Ipsi deindè solvantur Acido Sulfurico (66%), calenti, quod antè dilues Aquæ Stillatitiae quantitate octiès majori. Tantum autem Acidi adhibeatur, quantum sufficit ut habeatur Sulfas Morphinae. Ex hoc Sulfate, Ammoniâ iterum affusa, præceps agetur Morphina pulverulenta, candidissima, Alcoole (22%) eluenda. Mox ea solvatur bulliente Alcoole (56%). Solutam percolabis, ad crystallos deduces, ut dictum est, et servabis ad usum.

Ex parata alterutra methodo Morphinâ conficiuntur Sulfas et Acetas Morphinæ sequenti modo :

SULFAS MORPHINÆ. (*Ad Sulfates, p. 247, sub n° 11.*)

R. Morphinæ.....	6
Aquæ stillatæ.....	12

Diluatur aquâ Morphina, ipsique affundatur paulatim Acidum Sulfuricum duplici aquæ quantitate remixtum, donec indè charta colorata neutram in partem immutetur:

Vaporet liquor, ponatque crystallos, quas servabis ad usum.

Morphinæ Sulfas in ramulosas crystallos concrescit.

ACETAS MORPHINÆ. (*Ad Acetates, p. 253, sub n° 7.*)

R. Morphinæ.....	4
Aquæ stillatæ.....	8

Diluatur sedulò in cymbio porcellaneo Morphina, addaturque

Acidi Acetici (10g)..... quantum sufficit, donec aliquantulum ruborem induat immersa charta ex Crotone cœrulea. Vaporet liquor ad syrapi densitatem, et hypocraterio exceptus lente vaporare pergit, aut ad solem, aut in calidario. Salem in pulverem tritum serva. Acetas Morphinæ nullo crystallorum ordine concrescit.

5. ACIDUM HYDROCYANICUM. (*Ad Acida, p. 202, sub n° 19.*)

JUXTA METHODUM SCHEELIANAM.

Acidum Hydrocyanicum seu Prussicum, Scheelianâ methodo paratum, cùn: nuperrimè in usus medicos adducere, suadente D. Magendie, quidam non dubitaverint medici, hanc methodum hic proferre necesse visum est.

R. Cyanureti Ferri (<i>Bleu de Prusse</i>).....	128
Deutoxidi Hydrargyri (<i>Précipité rouge</i>).....	64
Aquæ stillatæ.....	500

Bulliant in cymbio porcellaneo, per horæ quadrantem, perpetuòque moveantur. Colentur, per chartam trajiciantur, et quod residuum superest eluatur in

128

Aquæ stillatæ bullientis	96
Liquores misceantur hydrargyri Cyanureto seti ;	24
lagunculæque exceptis adjiciantur	
Scobis ferreae in tenuissimum pulverem lœvi-	
gatæ.....	
Acidi Sulfurici (66%).	24
Soluti in Aquæ stillatæ.....	24

Mixta commoveantur, et per horam integrum, lagunculâ ipsâ aquæ frigidæ immersâ, subsidat sedimentum Hydrargyrum tenens.

Tunc liquor, constans Sulfate ferri et Acido Hydrocyanico solutis, ingeratur in retortam superius tubulatam, arenæ impositam; cujus collo aptetur vas intermedium (*allonge*), et huic excipulum sphæricum tubulatum, ac demum tubus cujus crux extremum excipiatur lagunculâ aquâ plenâ. Juncturæ luto conserantur, excipulumque linatis aquâ madidis continuò frigescat.

His itâ dispositis, incalescat liquor donec bulliat, excipienturque liquoris stillatitii..... 192

Ut autem liquor colore aliquo sæpiùs non caret, ipsi adjiciantur

Carbonatis Calcis	8
Iterùm destillet et habeantur tunc solummodo	
Liquoris stillatitii acidi.....	128
Hoc acidum asservandum est in lagunculis chartâ nigra extus glutinatâ obductis.	

N. B. Nulli detur hoc Acidum nisi ex prescriptione legitima, justoque obsignatâ chirographo.

RATIO CERTIOR AD IDEM ACIDUM FARANDUM A
D. ROBIQUET PROPOSITA.

(*V. Journal de Pharmacie, Mars 1818, pag. 107.*)

Verumtamen, cùm multis de causis sàpè incerta evadat et constitutio et vis hujus Acidi Scheeliani, imprimis quòd Cyanuretum Ferri non semper sincerum sit, nec sibi perpetuò constet; certiori et tuctiori modo idem parare docuit D. Robiquet; scilicet ex Acido Hydrocyanico puro, juxta methodum D. Gay-Lussac præparato, aquæ pari quantitate remixto. Hanc methodum, etsi notam satis, ne quis subrepat error, hic exponendam duximus.

Habeatur retorta tubulata, cujus rostro aptetur tubus vitreus latior, marmore contuso et Muriate Calcis igne fuso plenus, ex quo tubus alius angustior in campanulam exeat mixturâ frigerante circumdatam.

Tunc in retortam injiciatur Cyanuretum Hydrargyri, tantumque Acidi Hydrochlorici superaddatur, quantum sufficit ut superemineat ad digitii altitudinem unius. Tum modicè sensimque incalescat retorta, ut Acidum Hydrocyanicum lètè admodum expediatur, atque ita, Muriatis et Carbonatis Calcis ope, aquâ omni et acido Hydrochlorico transeundo spoliatur. Quod tune purum in campanulâ, sub ambiente frigore, facilè colligitur, densitate 0,700 aequante; ac deinde pari aquæ stillatæ quantitate remixtum certius ad requisitam Scheeliani Acidi densitatem, scilicet ad 0,900, adducetur, tutiusque ad medicos usus, guttatum instillatum potionibus, certâ ponderis ratione admiscetur.

RATIO ALIA EXPEDITIOR SIMPLICIORQUE AD PARANDUM ACIDUM IDEM HYDROCYANICUM A D. VAUQUELIN PROPOSITA.

R.	Cyanureti Hydrargyri.....	100
	Aquaे stillatæ.....	800

Solvatur leni calore Cyanuretum, et per liquorem ita transmittatur Acidum Hydrosulfuricum, ut tantillum superet quod saturando sufficit. Coletur liquor, ut liberetur Sulfureto Mercurii quod præceps actum est. Liquori colato inest Acidum Hydrocyanicum, cui admixta est non nihil Acidi Hydrosulfurici. Hoc autem ipsum facilè auferetur admixto Plumbi Subcarbonate, ita ut hujus pulveris quantitas superet quod sufficit ad sorbendum Acidum Hydrosulfuricum. Liquor et pulvis una identidem exagitentur, ac demum percolentur. Habebitur tune Acidum Hydrocyanicum aquâ solutum et alienis omnino liberum, eaque densitate quâ Scheelianum ipsum.

Quibusdam medicis cùm placuerit syrupum Hydrocyanicum præscribere, non descriptâ formulâ, sequenti modo paratur idem in majori nosocomiorum officinâ

R.	Syripi simplicis.....	9
	Acidi Hydrocyanici prædicto modo parati.	1

Misceantur intimè et excipientur lagunculâ probè obtundâ.

6. OXIDUM FERRI NIGRUM. (P. 215, sub n° 2 bis.)

JUSTA METHODUM D. GUIBOURT IN MAGNA NOSOCOMIORUM PHARMACOPOEA USITATAM.

R.	Scobis Ferri.....	4,000
	Aut.....	quantum libuerit.

Teratur in mortario; excipiatur vase latè patente testaceo, ipsique aqua affundatur tamdiù, donec elutà penitus scobe effluat limpidissima. Tunc scobe compressâ, inclinato vase, exstillet aqua per aliquot horæ minuta; ac demum, vase reposito, spatulâ ferreâ scobe moveatur saepius, ipsique addatur identidem tantum aquæ quantum opus erit ut humescat. Elapsis diebus quatuor aut quinque, ferrum eluetur, ut Oxidum Ferri nigrum aquâ dilutum effleratur, secedat, aquâ percolatâ secernatur, exprimatur, et in cibano ad siccitatem perducatur.

N. B. Id præsertim curandum est ut ea aquæ copia ferro semper inhæreat, quâ nec superficies unquam desinat humescere, nec inclinato vase aqua ferrum deserere possit atque effluere. Hæc si cura habeatur, brevi se expediet gas hydrogenium, odore proprio dignoscendum; eaque ipsâ die massa incalescit ad gradum 50 centigr. (24 Ream.^m), alterâ ad 56 centigr. (28 $\frac{4}{5}$ Ream.^m), tertiat ferè ad 50 centig. (40 Ream.^m): nempe oxygenio ex aquâ in Ferrum cedente; neque ultrâ dabitur calorem progredi. Quiquidem gradus ut perset, massa sèpè movenda est, nec superare humorem nec deficere sines, alioqui non æquâ perficietur opus. Quinque diebus elapsis, pars ferri magna in oxidum conversa est, calorisque decrescit gradus. Tunc eluenda est massa, oxidique aquam sequente, quod Ferri superest, iterum et in oxidum verti et incalescere eâdem ratione valet, et iterum post totidem dies elui. Hâc methodo facile intrâ paucos dies magna Ovidi Ferri nigri quantitas parari poterit, eoque præstantior, quod mediantibus tantum aquâ et ferro conficitur.

METHODUS NOVA AD PARANDUM TARTRATEM POTASSÆ STIBIATUM.

(*Juxta Pharm. Edinensem ad annum 1815*).

Parandus est primò Sub-Sulfas Stibii sequenti modo :

7. SUB-SULFAS STIBII. (*Ad Sulfates, p. 247, sub n° 10.*)

R.	Stibii.....	500
	Acidi Sulfurici (66 g).....	750

Incalescant in vase figulinò identidem agitando, cavendo
ne vaporibus Acidi Sulfurosi os naresque invadantur, tam-
diuque pergatur, donec mixta colorem ex albo cinereum in-
duerint ; eluatur accuratè materies ut acido omni careat
superfluo. Servetur quod superest ; et erit Sub-Sulfas Stibii.

8. TARTRAS STIBII ET POTASSÆ. (*Ad p. 255, sub
n° 8 bis.*)

R.	Sub-Sulfatis Stibii loti.....	1,000
	Super-Tartratis Potassæ in pulverem triti....	1,000
	Aquæ stillatæ communis.....	quod sufficit.

Aquâ solvatur Super-Tartras Potassæ in olla ferreâ vel
pelvè argenteâ; tunc partite injicias Sub-Sulfatatem Stibii.
Bulliant simul donec liquor gradum in areometro 20 attinge-
rit, densitatem scilicet 1161. Coletur et lentè friges-
cat liquor. Subsident crystalli Tartratis Stibii et Potassæ
purissimæ, albissimæ, nullis admixtis heterogeneis. Quibus
positis, residuus etiamnùm si vaporet liquor, novæ crystalli
minùs albæ subsident, quas iterùm solvendo purissimæ
obtinebis.

9. CYANURETUM HYDRARGYRI. (*Ad p. 259, sub n^o 5.*)

(Antehac Prussias Hydrargyri.)

Cum Cyanuretum Hydrargyri utiliter usurpatum sit in quibusdam morbis, autore D. Chaussier, nec non ad parandum quoque acidum Hydrocyanicum inservire possit, ejus parandi modum hic afferre non inutile visum est. Cyanuretum hoc nulli concedendum est, nisi ex præscriptione legitimâ justoque Chirographo.

R. Cyanureti Ferri (*Bleu de Prusse*)..... 500

Oxidi Hydrargyri rubri (*Précipité rouge*).... 250

Trita in pulverem excipientur vase fictili. Quibus adde

Aqua stillatæ..... 3,000

Bulliant sœpius agitando spatulâ ferreâ, trahianturque per chartam emporeticam.

Residua materies eluatur in Aquæ bullientis.... 500

Mixti liquores vaporent, donec pellicula innatet. Tum secedent crystalli Prussiatis, seu Cyanureti Hydrargyri; quas sœpius solvendo, vaporandoque, puras obtinebis.

10. TELA DICTA MALA (*Toile de Mai*). (*Ad p. 379, sub n^o 1 bis.*)

R. Ceræ albæ..... 750

Olei Amygdalini..... 250

Alcoolis debilioris. (12=22 B⁶)..... 125

Butyri recentis..... 250

Cerâ Alcoole solutâ, Butyro ac deindè Oleo commixtâ, liqueuntur leni calore omnia intimèque misceantur; liquatis calentibusque immergantur Telæ, intrâ duplîcē cylindrū, ut expimantur, transmittendæ.