

	Pagin.		Pagin.
Zedoarieæ Summitates	50	Zincum hydrocyanicum	433
Zincum	89, 296	muriaticum	147
aceticum	97	oxydatum	208
borussicum	433	sulphuricum	254
chloratum	447	valerianicum	284
cyanatum	135	Zingiberis Radix	90

ADDENDA.

MATERIA MEDICA.

APIUM, Radix.

Apium graveolens L. (Pentandria Digynia L.; fam. Umbelliferæ).
Planta biennis in locis paludosis frequens.

Radix fusiformis pollicem fere crassa, extus grisea, intus alba, sapor primum aromatico et amaro, dein acri. Siccatione dulcescit.

CITRUS LIMETTA, Oleum.

Citrus Limetta Riso (Polyadelphia Icosandria L.; fam. Aurantiaceæ).
Arbor in Europa australi culta.

Oleum venale e cortice fructuum expressum. Sit sublimpidum, flaves-
cens, odoris gratissime aromatici, saporis cum aliqua acredine amaro-
aromatici.

CYNORRHODON s. CYNOSBASTOS, Fructus.

Rosa Canina L. (Icosandria Polygynia L.; fam. Rosaceæ). Frutex in
Belgio frequens.

Fructus matus bacciformis, coloris coccinei, saporis acidi, cui insunt
nuculi (achænia) pilosi.

FOENICULUM VULGARE, Radix.

Foeniculum vulgare Dec. (Pentandria Digynia L.; fam. Umbelliferæ).
Herba biennis vel perennis apud nos culta.

Radix fusiformis, digitum crassa, annulata, fibrosa, in centro lignosa;
qua nota a radice Petroselini distinguitur.

GENISTA, Semen.

Spartium scoparium L. (Diadelphia Decandria L.; fam. Leguminosæ).

Planta perennis Europæ.

Semina parva, subcylindrica, splendentia, flava, saporis dulcis.

PETROSELINUM, Radix recens.

Radix fusiformis, simplex vel subramosa, digitum circiter crassa, extus albida, intus alba, succulento-carnosa, odoris proprii subaromatici, saporis dulciusculo-aromatici subpungentis.

RUSCUS, Radix.

Ruscus aculeatus L. (Diœcia Monadelphia L.; fam. Asparagineæ). Frutex in Belgio haud rarus.

Radix (rhizoma) cylindrica, flexuosa, nodosa, calami crassitudine, extus coloris e cinereo flavescentis, intus albida, odoris nullius, saporis dulcis ac amari.

SOLANUM NIGRUM, Folia.

Solanum nigrum L. (Pentandria Monogynia L.; fam. Solaneæ). Herba annua in ruderatis frequens.

Folia petiolata, ovata, dentato-sinuata, obscure viridia, saporis fere nullius, odoris virosi.

TURPETHUM, Radicis Cortex.

Convolvulus Turpethum L. (Pentandria Monogynia L.; fam. Convolvulaceæ). Planta Indiæ orientalis, Zeyloniæ, Malabariæ, etc.

Radix fibrosa digitum crassa, extus cinerea, intus alba, inodora, sapore nauseoso.

PRÆPARATA.

SUCCUS BELLADONNÆ INSPISSATUS.

Extractum Belladonnae defæcatum.

R. Succi recentis Belladonnæ clarificati. . . . Q. V.

Succus balneo marie sub perpetua agitatione inspissetur ad mellis consistentiam. Servetur in vase tecto, loco frigido et secco.