

TABLE
MÉTHODIQUE
DES CLASSES, DES GENRES;
ET DES ESPÈCES DE MALADIES.

Table des Maladies. A

TABLE
MÉTAMORPHOSES
DES CLASSES DES GENRES
ET DES TYPES DES MÉTIERS

A. —



T A B L E
MÉTHODIQUE
DES CLASSES, DES GENRES,
ET DES ESPECES DE MALADIES.

PREMIERE CLASSE.
FIEVRES.

FIEVRE. (*Febris. — Febris, Boërh. van-Swiet. de cognoscend. morb. Aphor. 558. — Febres, Glaff, de Febribus. — Fievre, Quesnay, essai sur les Fievres. — Febres, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 257.*)

ORDRE PREMIER.

FIEVRES continues simples. — Fievers sans accès sensibles & réguliers, pendant tout leur cours. (*Febres continuæ simplices.*)

GENRE I. *Fievre éphémere.* — Fievre continue, d'un, de deux, ou de trois jours. (*Febris ephemera. — Febris ephemera, Sennert. opera med. tom. VI. pag. 326. — Febris diaria, Lomm. Observ. med. pag. 2.*)

ESPECE I. *Fievre éphémere par indigestion.* (*Ephemera à veniticult cruditate, Senn. tom. VI. pag. 327.*)

I. CLASSE, ORDRE I.

ESPECE II. Fievre éphémère par l'impression d'un corps froid. (*Febris ex angustia cutis*, *Senn. tom. VI. pag. 327.* — Fievre par l'impression de l'air trop froid, ou trop humide, *Huxham, Essai sur les Fievres*, pag. 2.)

ESPECE III. Fievre éphémère par un exercice trop violent. (*Huxham*, pag. 2.)

ESPECE IV. Fievre éphémère pléthorique. (*Ephemera plethorica*, *Sauvag. Nos. method. tom. I. pag. 290.*)

ESPECE V. Fievre éphémère laitiée. (*Ephemera lactea*. — *Febris lactis*, *Senn. tom. IV. pag. 745.* — Fievre de lait, *Levet, art des accouchemens*, pag. 146.)

ESPECE VI. Fievre éphémère avec sueur. (*Ephemera sudatoria*. — *Sudor Anglicus*, *Senn. tom. VI. pag. 494.*)

GENRE II. *Fievre synoqua.* — Fievre continue, de sept, onze, quatorze, dix-sept, ou vingt jours, sans signes évidents que les humeurs des premières voies tendent à une prompte putridité. (*Febris synoqua*. — *Ephemera continens non putrida*, *Lomm. observ. med. pag. 3.* — *Ephemera plurium dierum, & synoqua sine putridine*, *Senn. tom. VI. pag. 327.*)

ESPECE I. Fievre inflammatoire. (*Febris inflammatoria*. — *Febris acuta sanguinea*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 105.*)

ESPECE II. Fievre synoqua bilieuse. (*Synoqua biliosa*, *Senn. tom. VI. pag. 365.*)

ESPECE III. Fievre ardente. (*Febris ardens*. — *Febris ardens*, *Lomm. obs. med. pag. 7.* — *Febris ardens*, *Senn. tom. VI. pag. 332.* — *Febris ardens*, *Boerh. van-Sw. de cognosc. morb. Aph. 738.* — *Febris ardens nec non cholistica*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 111.*)

ESPECE IV. Fievre continue varioleuse. (*Febris continua variolosa*. — *Febris continua variolosa*, *Sydenham opera med. tom. I. pag. 98.*)

ESPECE V. Fievre continue pleuretique. (*Febris continua pleuretica*. — *Febris continua pleuretica*, *Sydenh. tom. I. pag. 136.*)

ESPECE VI. Fievre continue sanguine. (*Synoqua sanguinea*. — *Febris continua annorum 1661, 62, 63, 64*, *Sydenh. tom. I. pag. 29.*)

ESPECE VII. Fievre continue, avec sueur.

ESPECE VIII. Fievre qui survient après les blessures. (*Febris vulneribus superveniens*, *Senn. tom. V. pag. 133.* — *Febris vulneri superveniens*, *Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 81.*)

GENRE III. *Fievre synoqua putride.* — Fievre de trois, & rarement de quatre semaines, avec signes évidents que les humeurs des premières voies tendent à une prompte putridité. (*Febris synoqua putrida*. — *Febris putrida in genere*, *Senn. tom. VI. pag. 366.*)

ESPECE I. Fievre continue putride. (*Febris continua putrida*. — *Febris continens putrida*, *Lomm. obs. med. pag. 4.* — *Febris continua putrida*, *Boerh. van-Sw. de cognosc. morb. Aphor. 730.*)

ESPECE II. Fievre continue dysenterique. (*Febris continua dysenterica*. — *Febris continua dysenterica*, *Sydenh. tom. I. pag. 116.*)

ESPECE III. Fievre des couches. (*White, Avis aux femmes en couches*, pag. 184.)

I. CLASSE, ORDRE II.

5

ESPECE IV. Fievre putride, survenant aux petites vèroles confluentes. (*Febris putrida variolis confluentibus superveniens*, Sydenh. tom. I. pag. 374.)

ESPECE V. Fievre mésentérique. (*Febris mesenterica*, Baglivi oper. med. pag. 52.)

GENRE IV. *Fievre continue maligne.* — Fievre continue, de deux ou trois semaines, avec abattement extrême des forces musculaires, relativement à celles du cœur. (*Febris continua maligna*. — *Febris maligna*, Senn. tom. VI. pag. 344. — *Febris putrida maligna*, Fred. Hoffm. suppl. pars. 1. pag. 374. — *Febris maligna*, Baglivi, pag. 51. — *Febris malignæ*, de Haen rat. med. tom. I. pag. 241. & tom. II. pag. 5.)

ESPECE I. Fievre des prispons. (*Febris carcerum*. — *Fievre d'hôpital*, Pringle, malad. des armées, tom. II. pag. 83. — *Fievre maligne*, Monro, malad. des armes tom. II. p. 1.)

ESPECE II. Fievre de quatorze ou vingt jours, avec accroissement du pouls, lafiude universelle, assoupissement, douleur & pesanteur de tête. (*Fievre lente urticante*, Huxham, *Essai sur les fievres*, pag. 88. — *Fievre nerveuse*, obs. de ned. à Edimbourg, tom. VI. pag. 45.)

ESPECE III. Fievre maligne avec catarrhe & toux. (*Febris maligna cum catarrho & tussi*, Senn. oper. med. tom. VI. pag. 349.)

ORDRE SECOND.

FIEVRES exacerbantes. — Fievres continues avec redoublement. (*Febres exacerbantes*. — *Febres continuaæ periodicæ*, Sennert. oper. med. tom. VI. pag. 332.)

GENRE I. *Fievre amphimétrine.* — Fievre continue quotidiane. (*Amphimerina*. — *Febris quotidiana continua*, Senn. tom. VI. pag. 333.)

ESPECE I. *Fievre épiale.* — Fievre continue quotidienne maligne. (*Febris epiala*. — *Febris epiala*, Senn. tom. VI. pag. 333.)

ESPECE II. *Fievre hemitriée.* — Fievre demi-tierce. (*Hemitritus*. — *Febris semi-tertiana*, Senn. tom. VI. pag. 340. — *Febris semi-tertiana*, Baglivi, op. med. pag. 49.)

ESPECE III. *Fievre continue quotidienne des camps.* (*Fievre remisante d'automne dans les camps*, Pringle, malad. des armées, tom. I. pag. 311.)

ESPECE IV. *Fievre continue quotidienne froide.* (*Amphimerina algida*. — *Hemitritus malignus*, Rivetii cent. 4. observ. 56.)

ESPECE V. *Fievre syncopale.* (*Febris syncopalis*, Senn. tom. VI. pag. 333. — *Fievre syncopale*, Meyssery, med. d'arm. tom. II. pag. 92.)

ESPECE VI. *Fievre maligne avec assoupissement.* — Fievre continue dont les accès arrivent tous les jours, ou de deux jours l'un, avec assoupissement précédé d'un violent mal de tête. (*Parapoplexia*, sive *febris tritæophya comata*, Carol. Pison. de mort. à colluv. serof. pag. 88.)

ESPECE VII. *Fievre catarrale exacerbante.* (*Febris catarrhalis continua*, Car. Pison. de mort. à colluv. serof. pag. 489.)

ESPECE VIII. Fievre quotidienne continue, avec toux & difficulté d'avaler. (*Fever catarihale epidemique*, Meyseley, med. d'arm. tom. II. pag. 266.)

ESPECE IX. Fievre continue quotidienne humorale. (*Amphimerina humorosa*. — *Febris semi-tertiana*, Paul. Aegin. oper. lib. 2. cap. 33.)

GENRE II. Fievre tierce continue. (*Tritæophya*. — *Febris tertiana continua*, Senn. tom. VI. pag. 332. — *Tritæophya*, Baglivi, oper. med. pag. 54.)

ESPECE I. Fievre tierce continue épidémique. (*Febris continua tertiana epidemica*, Lancisi oper. tom. III. pag. 244.)

ESPECE II. Fievre tierce continue, avec froid des extrémités & chaleur interne. (*Febris lypiria*, Senn. tom. VI. pag. 406. — *Febris lypiria*, Baglivi, pag. 56.)

ESPECE III. Fievre tierce continue bilieuse. (*Febris tertiana continua biliosa*. — *Causus, seu febris ardens*, River. prax. med. pag. 376.)

ESPECE IV. Fievre tierce continue, avec sueur. (*Suette des Picards*, Boyer, Méthode de traiter les malad. épidem.)

GENRE III. Fievre quarte continue. (*Febris quartana continua*, Sennert. tom. VI. pag. 405.)

ESPECE I. Fievre quarte continue soporeuse. (*Febris quartana continua soporosa*, Car. Pif. de morb à colluv. fer. pag. 491.)

ESPECE II. Fievre quarte continue maligne, avec spasme. (*Febris maligna cum spastico*, Senn. tom. VI. pag. 349.)

ORDRE TROISIEME.

FIEVRES exanthématiques. — Fievres avec éruption sur la peau, de tumeurs plus ou moins grandes. (*Febres exanthematicæ*. — *Febres cum exanthematibus*, de Haën. rat. med. tom. II. pag. 209. tom. IV. pars 2. pag. 15.)

GENRE I. Rougeole. — Fievre avec éruption de tumeurs inflammatoires semblables à de larges piquures de puces, se terminant le 8^e ou neuvième jour par écailles, & précédée de douleur de tête, de toux, de larmoiement & éternuement. (*Rubeola*. — *Morbilli Rhazes*. — *Febris morbillosa*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 62. — *Febris morbillosa*, De Haën. rat. med. tom. IV. pars 2. pag. 84.)

ESPECE I. Rougeole irrégulière. (*Rubeola non regularis*, Sydenh. tom. I. pag. 135.)

ESPECE II. Rougeole régulière. (*Rubeola vulgaris*, Sydenh. tom. I. pag. 130.)

GENRE II. Petite vérole. — Fievre avec éruption de petites tumeurs inflammatoires, les 2, 3 & 4^e jours, qui blanchissent le 7 & le 8, & se changent

I. CLASSE, ORDRE III.

en croûtes les 11, 12, 13 & 14^{me} jours. (*Variola*. — *Variola*, Rh. 25,
de variolis. — *Febris variolosa*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 49.)

ESPECE I. Petite vérole discrète. (*Variola discreta*, Sydenh. tom. I. pag. 79.)

ESPECE II. Petite vérole conflue. (*Variola confluenta*, Sydenh. tom. I. pag. 81.)

GENRE III. *Petite vérole volante*. — Fievre légère & de courte durée, avec éruption, principalement sur le visage, de petites rumeurs remplies de matière blanchâtre ou transparente, & qui se desséchent le 4^{me} jour. (*Variola lymphatica*, Sauvag. Nof. meth. tom. I. pag. 422.)

GENRE IV. Fievre éphémère, avec éruption sur le ventre & sur les extrémités, de phlyctènes de la grandeur d'une amande, suivie de danger éminent. (*Morta*, Linn. gen. morb. gen. 1.)

GENRE V. *Peste*. — Fievre contagieuse & très-dangereuse, avec bubon, ou charbon, ou chancre. (*Pestis*. — *Pestis*, Senn. tom. VI. pag. 443. — *Febris pestilentialis*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 93. — *Pestis*, Mead, tom. I. pag. 179.)

ESPECE I. Peste du Levant. (*Pestis vulgaris* — *Febris pestilentialis Landinenfis*, annorum 1665 & 66, Sydenh. tom. I. pag. 63.)

GENRE VI. *Fievre miliaire*. — Fievre continue, avec éruption sur les réguments, de tumeurs inflammatoires de la grandeur d'un grain de millet, promptement changées en tumeurs remplies de fluide limpide, & se terminant par écailles. (*Febris miliaris*. — *Febris purpurata miliaris*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 68. — *Febris miliaris*, de Haen. rat. med. tom. IV. pars 2. p. 32.)

ESPECE I. Fievre miliaire des femmes en couche. (*Febris miliaris puerperarum*. — *Eruption laiteuse à la peau*, Patis. traité des accouch. pag. 377 — *Fievre miliaire des femmes en couches*, White, pag. 252. — *Eruption miliaire blanche*, Levr. art des acc. p. 163.)

ESPECE II. Fievre inflammatoire, avec éruption miliaire. (*Nova febris*, Sydenh. tom. I. pag. 354.)

ESPECE III. Eruption miliaire laiteuse, avec boutons approchant de ceux de la petite vérole. (Levr. art des accouch. pag. 164.)

GENRE VII. Fievre aiguë, avec éruption de grandes vésicules remplies d'huileur limpide. (*Febris vesicularis*. — *Febris cum exanthematibus serosis*, Carol. Pif. de morb. à colluv. ser. pag. 440.)

GENRE VIII. *Fievre scarlatine*. — Fievre avec éruption sur la peau, de taches rouges plus ou moins larges, de figures irrégulières, quelquefois se terminant par écailles fatineuses. (*Febris scarlatina*. — *Febris scarlatina*, Sydenh. tom. I. p. 162. — *Febris scarlatina*, de Haen. rat. med. tom. IV. pars. 2. pag. 18.)

ESPECE I. Fievre scarlatine bénigne. (*Febris scarlatina benigna*, de Haen. rat. med. tom. IV. pars. 2. pag. 19.)

ESPECE II. Fievre scarlatine maligne. (*Febris scarlatina maligna*, de Haen. rat. med. tom. IV. pars. 2. pag. 21.)

ESPECE III. Fievre scarlatine des femmes en couches. (*Eruption laiteuse à plaques enflammées, Levret, art des accouch. pag. 164.*)

GENRE IX. *Fievre pétéchiale.* — Fievre avec abattement extrême des forces musculaires, & éruption de petites taches sur la peau, d'un rouge plus ou moins vif, quelquefois d'un rouge jaunâtre livide. (*Febris pétéchialis, Febris pétéchiales vera, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 84. — Febris pétéchialis, de Haen. rat. med. tom. IV. pars. 1. pag. 22.*)

GENRE X. *Fievre ortiee.* — Fievre avec éruption de petites tumeurs rouges, semblables à des piqûres d'ortie, accompagnées de démangeaison. (*Febris uricata. — Febris cum pundiuris urticarum, Sydenh. tom. I. pag. 175.*)

ESPECE I. *Fievre ortiee aiguë.* (*Fievre ortiee, Meyssery, med. d'arm. tom. II. pag. 253.*)

ESPECE II. *Fievre ortiee bénigne.*

GENRE XI. *Fievre érysipélateuse.* (*Febris erysipelatosu, Sydenham tom. I. pag. 174. — Febris erysipelacta, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 98. — Febris erysipelatosu, de Haen. rat. med. tom. IV. pars. 2. pag. 16.*)

ESPECE I. *Fievre érysipélateuse, avec constriction de la région épigastrique, abattement extrême des forces; éruption de tumeurs superficielles inflammatoires, qui se changent bientôt en larges véhicules, & attaquent plutôt les parties inférieures, que les supérieures. Febris erysipelatosu maligna. — Zona, Fred. Hoffm. tom. II. p. 99.*)

ESPECE II. *Fievre continue synoqe, avec tumeur inflammatoire d'une partie du corps, particulièrement du visage & des jambes. (Erysipelas seu rofa, Senn. tom. VI. pag. 407.)*

ORDRE QUATRIEME.

FIEVRES Intermittentes. (*Febres intermittentes. — Febres intermit- tentes, Senn. tom. VI. pag. 409. — Febres intermittentes, Werlhof, de febribus intermitt.*)

GENRE I. *Fievre quotidienne.* — Fievre dont les accès reviennent tous les jours, avec intermission plus ou moins longue entre chaque accès. (*Febris quotidiana. — Febris quotidiana, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 34.*)

ESPECE I. *Fievre quotidienne légitime.* (*Febris quotidiana legitima. — Febris quotidiana legitima, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 33.*)

ESPECE II. *Fievre quotidienne épidémique.* (*Febris quotidiana epidemica. — Febris quotidiana epidemica, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 33.*)

ESPECE III. *Fievre quotidienne épileptique.* (*Febris quotidiana epileptica. — Febris quotidienne epileptique, Effais de med. d'Edimbourg, tom. VI. pag. 138.*)

ESPECE IV. *Fievre quotidienne sciatique.* (*Febris quotidiana ischiatica. — Febris quotidienne sciatique, Effais de med. d'Edimbourg, tom. VI. pag. 143.*)

GENRE II.

I. CLASSE, ORDRE IV. 9

GENRE II. Fievre tierce.—Fievre avec retour d'accès semblables, de deux jours l'un. (*Febris tertiana*. —*Febris tertiana*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 11.)

ESPECE I. Fievre tierce légitime. (*Febris tertiana legitima*. —*Febris tertiana exquisita*, Senn. tom. VI. pag. 419.)

ESPECE II. Fievre tierce pernicieuse, avec vomissement bilieux & déjection bilieuse, particulièrement pendant l'accès. (*Febris intermittens cholérica, vel dysenterica, Torti, de febr. period. pernic.* pag. 135.)

ESPECE III. Fievre tierce pernicieuse, avec flux de ventre semblable à la laveur de chair, principalement pendant l'accès. (*Febris intermittens, cum fluxu subcuento*. —*Febris intermittens subcuenta, vel atrabilaris, Torti, de febr. period. pernic.* p. 136.)

ESPECE IV. Fievre tierce, avec cardialgie pendant l'accès. (*Febris tertiana cardiaca, Torti, de febr. period. pernic.* pag. 137.)

ESPECE V. Fievre tierce, avec sueur aussi-tôt après le froid, sans calme sensible pendant l'accès. (*Febris intermittens diaphoretica, Torti de febr. period. pernic.* pag. 137.)

ESPECE VI. Fievre tierce, avec syncope pendant l'accès. (*Febris tertiana syncopalis, Torti, de febr. period. pernic.* pag. 138.)

ESPECE VII. Fievre tierce, avec sentiment de froid presque continual pendant l'accès, soif, & chaleur douce au tact. (*Febris tertiana algida, Torti, de febr. period. pernic.* pag. 138.)

ESPECE VIII. Fievre tierce, avec léthargie pendant l'accès. (*Febris tertiana intermittens lethargica, Torti, de febr. period. pernic.* pag. 138.)

ESPECE IX. Fievre tierce épidémique. (*Febris tertiana epidemica*. —*Febris tertiana epidemica*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 20.)

ESPECE X. Fievre tierce triple. (*Febris tertiana triplex*, Senn. tom. VI. pag. 437.)

ESPECE XI. Fievre tierce incomplète. (*Febris tertiana spuria*. —*Febris tertiana noctis*, Senn. tom. VI. pag. 419.)

ESPECE XII. Fievre double tierce. — Fievre, avec retour des accès de deux jours l'un, de manière que le premier accès répond au troisième, & le second au quatrième. (*Febris tertiana duplex*. —*Febris tertiana duplex*, Senn. tom. VI. pag. 437.)

GENRE III. Fievre quarte. — Fievre avec retour d'accès semblables tous les quatre jours. (*Febris quartana*. —*Febris quartana*, Senn. tom. VI. pag. 426. —*Febris quartana*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 23.)

ESPECE I. Fievre quarte avec dépravation des humeurs contenues dans les premières voies. (*Febris quartana ab humore in primis viis orto*. —*Febris putrida intermittens, quarto quoque die recurrens*, Senn. tom. VI. pag. 427.)

ESPECE II. Fievre quarte par répercussion de la galle. (*Febris quartana ex scabie introcurrente*, Senn. tom. VI. pag. 433.)

ESPECE III. Fievre quarte automnale. (*Febris quartana autumnalis*, Sydenh. tom. I. pag. 51.)

ESPECE IV. Fievre quarte avec folie. (*Febris quartana cum amentia*. —*Mania intermittentes diuturniores præcipue quartanas nonnumquam excipiens*, Sydenh. t. I. p. 60.)

ESPECE V. Fievre quarte double. — Fievre dont le premier accès répond au quatrième, & le second au cinquième ; le troisième jour sans accès. (*Febris quartana duplex*. — *Febris quartana duplex*, Senn. tom. VI. pag. 437.)

ESPECE VI. Fievre quarte triple. (*Febris quartana triplex*, Senn. tom. VI. pag. 437.)

GENRE IV. Fievre erratique. — Fievre avec retour de semblables accès tous les 5 jours, ou les 6, ou les 7, ou les 8, ou les 9, ou les 10 jours. (*Febris erratica*, Sauvag. Nosol. Méthod. tom. I. pag. 359.)

ORDRE CINQUIEME.

FIEVRES lentes. (*Febres lenta*.)

GENRE I. Fievre hétérique. — Fievre continue de la durée de 4, 5, 6 semaines, & même plusieurs mois. (*Febris hética*. — *Febris lenta*, Lomm. obf. med. pag. 16. — *Febris hética*, Senn. tom. VI. pag. 437. — *Febris lenta & hética*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 175.)

ESPECE I. Fievre hétérique des enfants. (*Febris hética infantum*. — *Febris lenta ex lacte corruptio*, Senn. tom. VI. pag. 334. — *Febris hética infantum*, Sydenh. tom. I. pag. 367, 521. — *Febris lenta infantum*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 177.)

ESPECE II. Fievre lente des vieillards. (*Febris lenta senum*. — *Marasmus senum*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 177.)

ESPECE III. Fievre lente vénérienne. (*Febris lenta venerea*. — *Febris lenta venerea*, Afruc. de morb. vener. tom. I. pag. 427.)

ESPECE IV. Fievre lente vermineuse. (*Febris lenta verminosa*. — *Febris verminosa lenta*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 187.)

ESPECE V. Fievre lente bénigne, avec taches inégales, très-rouges, volages, accompagnées de démangeaison, tombant en écailles. (*Uredo*, Linn. gen. morb. gen. 8.)



SECONDE CLASSE. MALADIES INFLAMMATOIRES. IMFLAMMATIONS.

ORDRE PREMIER.

INFLAMMATION des téguments, & des glandes situées sous la peau. (*Inflammatio, Boërh. Swieten, de cogn. morb. aph. 370.*)

GENRE I. Inflammation plus ou moins étendue, de peu de durée, sans danger, n'attaquant que la surface de la peau.

ESPECE I. Inflammation superficielle des aines & des cuisses des petits enfants. (*Levret, Art. des accouch. pag. 250.*)

ESPECE II. *Feu volage des enfants.* — Taches rouges rarement fixes, attaquant indistinctement les diverses parties de la peau des enfants. (*Maculae volatiles infantium, Senn. tom. V. pag. 78.*)

ESPECE III. Éruption de petites taches rouges chez les nouveaux nés, lorsqu'ils ne se vident pas. (*Smellie, tom. I. pag. 464. tom. III. pag. 567.*)

GENRE II. Rougeur de tout le corps par la distension des vaisseaux, avec difficulté de respirer. (*Plethora, Linn. gener. morb. gen. 225.*)

GENRE III. *Érysipèle.* — Tumeur rouge, douloureuse, non circonscrite, d'une chaleur acré, se terminant plus souvent par des veillies remplies de sérosité, que par abcès. (*Erysipelas. — Erysipelas, Heiß. Inst. Chir. tom. I. p. 285.*)

ESPECE I. Érysipèle essentielle. (*Erysipelas essentiale.*)

ESPECE II. Érysipèle par compression. (*Meyseray, Med. d'arm. tom. II. pag. 242.*)

ESPECE III. *Brûlure.* — Érysipèle par le feu. (*Combustio, Heiß. Inst. Chir. t. I. p. 322.*)

ESPECE IV. Érysipèle par suppression de transpiration, ou de sueur. (*Meyseray, Med. d'arm. tom. II. pag. 241.*)

ESPECE V. Érysipèle par poison. (*Erysipelas à veneno, Sauvag. Nosol. meth. tom. I. pag. 451.*)

ESPECE VI. Érysipèle par le soleil. (*Erysipelas à sole, Plater. Prax. Med. t. III. p. 71.*)

ESPECE VII. *Feu sacré.* — Érysipèle avec abattement extrême des forces, & prompt passage à la gangrene. (*Ignis facer. — Febris erysipelacea cum pestle, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 99.*)

12 *II. CLASSE, ORDRE I.*

GENRE IV. Tumeurs par piqûre d'insectes, rouges, douloureuses, plus ou moins superficielles & étendues. (*Ictus virulentii insectorum nostrorum*, *Plater. Prax. med. tom. II. pag. 682.*)

ESPECE I. Tumeur inflammatoire, par la piqûre d'une abeille. *Erysipelas à vespis*, *Sauvag. Nof. method. tom. I. pag. 452.*)

ESPECE II. Douleur aiguë avec inflammation, par un insecte vénimeux introduit dans une partie des téguments. (*Cocytia*, *Linn. gener. morb. gen. 257.*)

ESPECE III. Inflammation par la morsure d'une vipère. (*Inflammatio à viperā*, *Mead de viperā. tom. I. pag. 1.*)

ESPECE IV. Sirons. (*Sirones*, *Senn. tom. V. pag. 33.*)

GENRE V. Inflammation par des instruments tranchants, piquants, ou contondants.

ESPECE I. Inflammation par instrument tranchant, ou piquant. (*Inflammatio vulnerum*, *Heijster. inf. chirurg. tom. I. pag. 80.* — *Inflammatio vulneribus supervenienti*, *Senn. tom. V. pag. 134.*)

ESPECE II. Inflammation par une plâtre d'arme à feu. (*Inflammatio vulnerum à sclopétis*, *Heijster. inf. chirurg. tom. I. pag. 85.*)

ESPECE III. Inflammation érythémateuse par une fracture. (*du Verney, maladies des os*, *tom. I. pag. 112.*)

ESPECE IV. Inflammation des téguments, ou des muscles par une fracture. (*du Verney, malad. des os*, *tom. I. pag. 118.*)

GENRE VI. Engelure. — Tumeur caufée par le froid, avec rougeur, chaleur, démangeaison, affectant particulièrement les pieds, les mains, & quelquefois le bout du nez, se terminant souvent par la suppuration. (*Pernio*. — *Pernio*, *Senn. tom. V. pag. 24* — *Pernio*, *Heijster. inf. chirurg. tom. I. p. 308.*)

GENRE VII. Écrouelles. — Tumeurs circonscrites, peu douloureuses, lentes à venir à suppuration, situées au col, ou aux aisselles, ou aux aines, ou au mésentère, avec pâleur du visage, bouffissure des lèvres, souvent tuméfaction des os & cartilagineux, attaquant pour l'ordinaire les enfants, jusqu'à l'âge de virilité. (*Scrophula*. — *Ecrouelles*, *Brouzet, educ. med. des enfants*, *tom. II. pag. 184.*)

GENRE VIII. Dragonneau. — Tumeur inflammatoire promptement terminée en une vésicule, qui s'ouvre & se montre comme une des extrémités d'un ver. (*Dracunculus*. — *Inflammation & ulcere par des dragonneaux*, *Essais de méd. d'Edim. tom. VI. pag. 414.* — *Dragonneau*, *Astruc. traité des tumeurs*, *tom. I. pag. 116.*)

GENRE IX. Framboise, Pian. — Taches sur la peau, contagieuses, se changeant en petits boutons qui s'ulcèrent, & se convertirent en petits champignons rouges, avec blanchissement des poils environnans.

II. CLASSE, ORDRE I.

13

(*Framboësia. — Yaw, observ. de méd. d'Edimbourg, tom. VI. pag. 419.*)

GENRE X. Vérole. — Tumeurs inflammatoires des parties génitales, ou des parties environnantes, par le contact immédiat des parties génitales d'une personne saine avec celles d'une personne infectée de cette maladie. (*Syphilitis. — Morbus venereus, sive lues venerea confirmata, Astruc, de morb. venereis. t. I. pag. 399. — Lues venerea, Morgagni, de sedibus. morb. tom. II. pag. 365.*)

ESPECE I. Tumeurs légèrement inflammatoires, petites, circonscrites, dures, semées sur la peau, suppurrant quelquefois à leur centre, ne cédant qu'aux préparations mercurielles. (*Gale verolique des enfants, Puys, traité des accouchem. p. 314.*)

GENRE XI. Gale. — Petites tumeurs inflammatoires ordinairement situées sur les téguments aux articulations des extrémités, entre les doigts des mains & des pieds, avec chaleur, vive démangeaison, évacuation presqu'insensible d'humeurs plus ou moins fluides. (*Scabies. — Scabies, Senn. tom. V. pag. 34. — Scabies, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 426.*)

GENRE XII. Phlegmon. — Tumeur circonscrite avec douleur, chaleur, tension, rougeur, & penchant vers la suppuration. (*Phlegmone. — Phlegmone, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 265. — Phlegmone, Platner. inst. chirurg. pag. 40.*)

GENRE XIII. Furoncle. — Tumeur circonscrite avec chaleur, rougeur, douleur, dureté, se terminant par suppuration & par une espece de bourillon. (*Furunculus. — Furunculus, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 289.*)

GENRE XIV. Bubon. — Tumeur dure, circonscrite, située aux aines, ou aux aisselles, au commencement sans rougeur & chaleur sensibles, se terminant lentement vers la résolution, ou vers la suppuration. (*Bubo. — Bubo, Senn. tom. V. pag. 18. — Bubo, Platner, inst. chirurg. pag. 66.*)

ESPECE I. Bubon pestilential. (*Bubo pestilentialis, Heist. inst. chir. tom. I. pag. 293.*)

ESPECE II. Bubon vénérien. (*Bubo venereus. — Bubo venereus, Astruc, de morbis venereis. tom. I. pag. 323.*)

ESPECE III. Bubon bénin. (*Bubo benignus. — Bubo benignus, Heist. inst. chir. tom. I. pag. 291.*)

ESPECE IV. Bubon scrophuleux. (*Bubo scrophulosus.*)

ESPECE V. Bubon inguinal des enfants. — Tuméfaction des glandes inguinales des enfants, avec douleur, renitence & maigreuté de tout le corps. (*Bubo inguinalis puerorum. — Bubo puerorum, Platner, inst. chirurg. pag. 69.*)

GENRE XV. Charbon. — Tumeur dure, d'un rouge noirâtre & livide, peu élevée, accompagnée d'une douleur aiguë, très-souvent pourvue à son extrémité d'une véhicule grifâtre, se terminant en très-peu de temps par la gangrene. (*Carbunculus. Anthrax. — Carbunculus, Senn. tom. V. pag. 22. — Carbunculus, Platner, inst. chirurg. pag. 58.*)

14 *II. CLASSE, ORDRE I.*
ESPECE I. Charbon non pestilentiel. (*Carbunculus non pestilentialis*, *Senn. t. V. p. 21.*)
ESPECE II. Charbon pestilentiel. (*Carbunculus pestilentialis*, *Senn. tom. V. pag. 21.*
— *Carbunculus sive anthrax*, *Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 293.*)

GENRE XVI. Inflammation des mammelles. (*Inflammatio mammarum*,
Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 279.)

ESPECE I. Inflammation des mammelles par la rétention & la dépravation du lait,
(*Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 279.*)

ESPECE II. Inflammation des mammelles par une cause mécanique.

ESPECE III. Inflammation essentielle des mammelles.

GENRE XVII. Inflammation de l'ombilic. (*Inflammatio umbilici*, *Senn.*
tom. III. pag. 618.)

GENRE XVIII. Inflammation du scrotum. (*Inflammatio scroti*, *Senn. tom. III.*
pag. 601.)

GENRE XIX. *Inflammation des testicules.* — Gonflement des testicules avec chaleur, dureté & douleur. (*Inflammatio testicularum*, *Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 283.* — *Testiculorum inflammatio*, *Platner, inst. chirurg. pag. 70.*)

ESPECE I. *Inflammation essentielle des testicules.* — Inflammation des testicules par abondance du sang. (*Inflammatio testicularum à sanguine*, *Heistler, inst. chirurg. tom. I. pag. 284.*)

ESPECE II. Inflammation des testicules par abondance de fémence.

ESPECE III. Inflammation des testicules par un coup. (*Inflammatio testicularum ab externa violencia*, *Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 284.*)

ESPECE IV. Inflammation des testicules par virus vénérien. (*Phlegmo testium venereus*,
Astruc, de morb. vener. tom. I. pag. 296. — *Inflammatio testicularum à venere*,
Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 284.)

GENRE XX. Inflammation du gland. (*Inflammatio glandis.*)

ESPECE I. Inflammation du gland par un coït trop violent, ou trop répété, ou par déchirement du frein.

ESPECE II. Inflammation du gland par constriction de sa base.

ESPECE III. Inflammation du gland par virus vénérien.

ESPECE IV. Inflammation du gland par les mauvaises qualités de l'humeur sébacée.

GENRE XXI. *Phimosis.* — Inflammation du prépuce, avec difficulté & souvent impossibilité de découvrir le gland, qui est souvent enflammé. (*Phimosis*,
Senn. tom. III. pag. 606. *Phimosis*, *Heist. inst. chirurg. tom. II. p. 311.*)

ESPECE I. Phimosis par l'acréte de l'humeur sébacée. (*Phimosis ab acritate humoris subpinguis absque viru venereo*, *Platner, inst. chirurg. pag. 559.*)

II. CLASSE, ORDRE I. 15

ESPECE II. Phimosis vénérien. (*Phimosis venerum, Astruc, de morb. vener. tom. I.*, pag. 360.)

ESPECE III. Phimosis par un coït trop violent. (*Phimosis à coitu vehementiori, Heist. infl. chirurg. tom. II.*, pag. 811.)

GENRE XXII. Inflammation du prépuce, avec empêchement de recouvrir le gland ordinairement enflammé. (*Paraphimosis, Senn. tom. III.*, pag. 606. — *Paraphimosis, Heist. infl. chirurg. tom. II.*, pag. 813.)

GENRE XXIII. Inflammation des parties naturelles de la femme.

ESPECE I. Inflammation des parties naturelles par la dépravation des pertes blanches;

ESPECE II. Inflammation essentielle des parties naturelles de la femme. (*Inflammatio effensualis genitalium sexus feminini.*)

ESPECE III. Inflammation des parties naturelles de la femme par virus vénérien. (*Inflammatio genitalium sexus feminini à víro venereo.*)

ESPECE IV. Inflammation gangreneuse des parties génitales par l'enclavement de la tête de l'enfant. (*Levret, art. des accouch.*, pag. 104.)

ESPECE V. Inflammation des grandes levres des femmes grosses, précédée de fièvre. (*Levret, art. des accouch.*, pag. 218.)

ESPECE VI. Inflammation de l'une ou l'autre levre des femmes grosses, rarement de deux, suivie de fièvre. (*Levret, art. des accouch.*, pag. 219.)

ESPECE VII. Inflammation légère des parties naturelles par un accouchement difficile.

GENRE XXIV. Inflammation de l'extrémité du doigt par le froid, avec chute de l'ongle. (*Pressura, Linn. gen. morb. gen.* 260.)

GENRE XXV. *Panaris.* — Tuméfaction de l'extrémité du doigt, avec chaleur, douleur lancinante, & tension considérable. (*Paronychia. — Paronychia, Senn. tom. V.*, pag. 23.)

ESPECE I. Panaris cutané. (*Paronychia cutanea, Heist. infl. chirurg. tom. II.* 1077.)

ESPECE II. Panaris avec lésion du tendon. (*Paronychia cum tendinis lazione, Heist. infl. chirurg. tom. II.* pag. 1078.)

ESPECE III. Panaris avec lésion du périoste (*Paronychia cum lazione periostii, Heist. infl. chirurg. tom. II.* pag. 1078.)

ESPECE IV. Onglade. — Panaris par le virus vénérien. (*Paronychia venerea, Astruc. de morb. ven. tom. I.*, pag. 401.)

GENRE XXVI. *Papule.* — Petite tumeur enflammée, & ne suppurant qu'avec peine. (*Papula. — Papula, Linn. gener. morb. gen.* 275.)

GENRE XXVII. *Échauboulure.* — *Ébullition de sang.* — Tumeurs superficielles, petites, rouges, semblables à des grains de millet, attaquant la poitrine, les bras & les cuisses, particulièrement des enfants. (*Ebullitio sanguinis. — Sudamina, Senn. tom. V.*, pag. 33.)

16 *II. CLASSE, ORDRE I.*

GENRE XXVIII. Bourgeons. — Tumeurs dures, petites, plus ou moins rouges & élevées, circonscrites, indolentes, de longue durée, laissant quelquefois transfuser une espèce d'humeur fluide, & affectant le visage. (*Vari.* — *Vari*, *Plater*, *prax. med. tom. III.* pag. 212. — *Vari*, *Senn. tom. V.* pag. 33.)

GENRE XXIX. Couperose. — Tumeurs superficielles, rouges, petites, inégales, de longue durée, plus ou moins rasssemblées, affectant le visage. (*Gutta rosea*. — *Gutta roseacea*, *Plater. prax. med. tom. III.* pag. 72.)

ESPECE I. Couperose par le vin. (*Gutta roseacea à vino*, *Senn. tom. V.* pag. 40.)

ESPECE II. Couperose dartreuse. (*Gutta rosea herpetica*. — *Gutta rosea pustulosa*, & *quasi exulcerata*, *Senn. tom. V.* pag. 40.)

ESPECE III. Couperose vénérienne. (*Gutta rosea syphilitica*. — *Tubercula venerea*, *Afric, de morb. ven. tom. I.* pag. 400.)

GENRE XXX. Épinydide. — Phlyctènes d'un rouge noirâtre, agrégées, de trois ou quatre lignes de diamètre, affectant particulièrement les jambes, avec douleur pungitive beaucoup plus vive la nuit que le jour. (*Epinydis*, *Senn. tom. V.* pag. 33.)

GENRE XXXI. Porcelaine. — Tumeurs superficielles, petites, semblables à des piqûres d'orties, se changeant promptement en vésicules remplies de sérosité, se desséchant sans altérer la couleur de la peau. (*Sora*. — *Effere*, *Senn. tom. V.* pag. 34.)

GENRE XXXII. Orgeolet. — Tumeur inflammatoire sur le bord des paupières, petite, & plus ou moins douloureuse. (*Orgeolet*, *S. Yves*, *malad. des yeux*, pag. 63.)

GENRE XXXIII. Cancer. — Tumeur dure, plus ou moins enflammée, très-douloureuse, & dégénérant avec plus ou moins de rapidité en ulcère rongeant. (*Cancer*. — *Cancer*, *Boëhr. Swiet. de cognosc. morb. afor. 492.*)

ESPECE I. Cancer par la suppression, ou la diminution du flux menstruel.

ESPECE II. Cancer sans principe évident.

ESPECE III. Cancer par une blessure, ou autre cause mécanique.

ESPECE IV. Cancer scrophuleux.

ESPECE V. Cancer vérolique. (*Cancer syphiliticus*, *Sauv. nōf. meth. tom. I.* pag. 149.)

ESPECE VI. Cancer des mammelles. (*Cancer mammarum*, *Heister, inst. chirurg. t. II.* pag. 688.)

ESPECE VII. Cancer de l'œil. (*Carcinoma oculi*, *Heilt. inst. chir. tom. I.* pag. 593.)

ESPECE VIII. Cancer des paupières. (*Malite-Jan*, *malad. de l'œil*, pag. 510. — *S. Yves*, *malad. des yeux*, pag. 68.)

ESPECE IX.

II. CLASSE, ORDRE. II. 17

ESPECE IX. Cancer des lèvres. (*Carcinoma labrorum aut oris*, Heijl. *inst. chir. tom. II.* pag. 635.)

ESPECE X. Cancer de la langue. (*Cancer linguae*, Heijl. *inst. chir. tom. II.* pag. 655.)

ESPECE XI. Cancer des parotides.

ESPECE XII. Cancer de la verge. (*Cancer colis*, Heijl. *inst. chir. tom. II.* pag. 816.)

ESPECE XIII. Cancer de la matrice. (*Cancer uteri*, Senn. *tom. IV.* pag. 631.)

ORDRE SECOND.

INFLAMMATIONS de la tête. (*Inflammationes capititis.*)

GENRE I. Phrénésie. — Maladie inflammatoire de la tête, avec fièvre aiguë & délire continuels. (*Phrenitis.* — *Febris phrenetica sive phrenitis*, Fred. Hoffm. *tom. II.* pag. 131. — *Phrenitis*, Boërh. van-Swieten, de cogn. morb. aph. 771. — *Phrenitis*, Bagliv. prax. med. pag. 102. — *Phrenitis*, Morgagni, de sedib. morb. *tom. I.* pag. 49.)

ESPECE I. Phrénésie essentielle. (*Phrenitis essentialis.* — *Phrenitis vera*, Boërh. van-Swiet, de cogn. morb. aph. 772.)

ESPECE II. Phrénésie symptomatique. (*Phrenitis symptomatica*, Boërh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 772.)

ESPECE III. Phrénésie par le soleil. (*Phrenitis à sole.* — *Inflammation du cerveau*, Pringle, mal. des armées, *tom. I.* pag. 245.)

ESPECE IV. Phrénésie par une longue diète, ou par des évacuations considérables. (*Meyserry*, Med. d'arm. *tom. II.* pag. 168.)

ESPECE V. Inflammation du cerveau avec fièvre synoïque, tremblement des tendons & délire. (*Sphacelismus*, Linn. gen. morb. gen. 32.)

ESPECE VI. Chaleur sur le sommet de la tête des enfants, avec les yeux retirés, face rouge, fièvre aiguë, insomnie, sécheresse du corps, manque d'appétit, souvent délire continuels, & quelquefois cavité plus ou moins sensible sur la fontanelle. (*Siriasis infantum*, Senn. *tom. IV.* pag. 771.)

GENRE II. Inflammation des parotides (*Inflammatio parotidum.* — *Parotidum inflammatio*, Platner, *inst. chir.* pag. 63.)

ESPECE I. Inflammation des parotides par une crise. (*Parotis critica*, Senn. *tom. V.* pag. 20.)

ESPECE II. Oreillon. — Inflammation bénigne des parotides. (*Parotis benigna*, Senn. *tom. V.* pag. 20.)

ESPECE III. Inflammation des parotides par le mercure. (*Inflammatio parotidum ab argento vivo*, Platner, *inst. chirurg.* pag. 64.)

ESPECE IV. Inflammation des parotides par une humeur catarrhal. (*Inflammatio parotidum in catarrho*, Platner, *inst. chir.* pag. 65.)

Table des Maladies. C

GENRE III. *Ophthalmie.* — Rougeur de la conjonctive avec douleur, & souvent avec chaleur. (*Ophthalmia*. — *Ophthalmia*, Senn. tom. III. pag. 201. — *Inflammation de l'œil*, Maitre-Jan, mal. de l'œil, pag. 345.)

ESPECE I. *Ophthalmie humide.* (*Ophthalmia humida*. — *Ophthalmie humide*, S. Yves, mal. des yeux, pag. 139.)

ESPECE II. *Ophthalmie seche.* (*Ophthalmia secca*, Senn. tom. III. pag. 206. — *Ophthalmie seche*, S. Yves, malad. des yeux, pag. 139.)

ESPECE III. *Ophthalmie par la chaleur du soleil, ou du feu.* (*Ophthalmia à calore solis vel igne*, Senn. tom. III. pag. 202.)

ESPECE IV. *Ophthalmie par des coups.* (*Ophthalmia ab ictu*, Senn. tom. III. p. 203. — *Ophthalmie par des coups*, S. Yves, mal. des yeux, pag. 146.)

ESPECE V. *Ophthalmie vénérienne.* (*Ophthalmia venerea*, Afr. de morb. ven. tom. I. pag. 289 & 421. — *Ophthalmie vénérienne*, S. Yves, mal. des yeux, pag. 145.)

ESPECE VI. *Ophthalmie*, avec bourgeons sur le globe de l'œil. (*S. Yves*, malad. des yeux, pag. 141.)

ESPECE VII. *Ophthalmie violente.* (*Chemosis*, S. Yves, mal. des yeux, pag. 143.)

ESPECE VIII. *Ophthalmie catarrhale.* (*S. Yves*, mal. des yeux, pag. 140.)

ESPECE IX. *Ophthalmie érythopélateuse.* (*S. Yves*, mal. des yeux, pag. 142.)

ESPECE X. *Ophthalmie par la rupture des vaisseaux de la conjonctive.* (*S. Yves*, mal. des yeux, pag. 147.)

ESPECE XI. *Ophthalmie*, avec des petits abcès sur la cornée & la conjonctive. (*S. Yves*, malad. des yeux, pag. 142.)

ESPECE XII. *Ophthalmie scrophuleuse.* (*Ophthalmia scrophulosa*.)

ESPECE XIII. *Ophthalmie par la rache.* (*Ophthalmia à rinea*.)

ESPECE XIV. *Ophthalmie par la fumée, & autres corps étrangers.* (*Ophthalmia à fumo*, Senn. tom. III. pag. 202. — *Ophthalmie par des ordures dans l'œil*, S. Yves, malad. des yeux, pag. 146.)

ESPECE XV. *Ophthalmie de la choroïde.* (*S. Yves*, mal. des yeux, pag. 145.)

GENRE IV. *Inflammation de l'oreille.* — Douleur aiguë de l'oreille, avec battement & chaleur. (*Aurium inflammatio*, Senn. tom. III. pag. 233. tom. IV. pag. 774.)

GENRE V. *Inflammation de la langue.* (*Inflammatio linguæ*, Senn. tom. III. pag. 251.)

GENRE VI. *Inflammation de la luette.* (*Inflammatio uvulæ*. — *Gurgulionis inflammatio*, Senn. tom. III. pag. 274.)

GENRE VII. *Inflammation des amygdales.* (*Inflammatio tonsillarum*, Senn. tom. III. pag. 276.)

GENRE VIII. *Angine.* — Difficulté d'avaler, avec inflammation du goſier.

II. CLASSE, ORDRE III. 19

chaleur, douleur, fièvre, plus ou moins vive, & respiration plus ou moins gênée. (*Angina.* — *Angina*, *Senn. tom. III. pag. 278.*)

ESPECE I. Esquinacie. (*Angina inflammatoria*. — *Synanche*, *Senn. tom. III. p. 280.*
— *Angina*, *Sydenham. tom. I. pag. 176.* — *Angina*, *Frederic. Hoffm. tom. II.*
pag. 125. — *Angina inflammatoria*, *Boëth. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 798.*)

ESPECE II. Difficulté très-grande d'avaler & de respirer, avec inflammation aiguë de la trachée-artère, sans rougeur sensible des amygdales & du voile du palais. (*Synanche*, *Senn. tom. III. pag. 280.* — *Angina inflammatoria fistula pulmonalis*, *Boëth. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 801.*)

ESPECE III. Difficulté d'avaler & de respirer, avec rougeur sensible du goſier, & des parties environnantes du col. (*Parafynanche*, *Senn. tom. III. pag. 280.*)

ESPECE IV. Angine qui se termine par la gangrene. (*Angina gangrenoſa*, *Boëth. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 816.*)

ESPECE V. Angine pituiteuse. (*Angina pituitosa*, *Senn. tom. III. pag. 280.*)

GENRE IX. Inflammation des gencives.

ESPECE I. Inflammation des gencives des enfants, par la pouſſe des dents. (*Brouzet, éduc. med. des enfants*, *tom. I. pag. 228.*)

ESPECE II. Inflammation essentielle des gencives.

ESPECE III. Inflammation des gencives par le ſcorbut.

ESPECE IV. Inflammation des gencives par le mercure.

ORDRE TROISIÈME.

INFLAMMATIONS de la poitrine (*Inflammationes pectoris.*)

GENRE I. *Inflammation des poumons.* — Douleur de poitrine plus ou moins vive, avec fièvre aiguë, difficulté de respirer, toux & expectoration ordinairement fanguinolente. (*Peripneumonia*, *Lomm. obſerv. med. pag. 133.* — *Peripneumonia*, *Morgagni*, *de ſed. morb. tom. I. pag. 204.*)

ESPECE I. Péripneumonie essentielle. (*Peripneumonia vera*. — *Febris pneumonica ſive peripneumonia*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 136.* — *Peripneumonia vera*, *Boëth. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 820.*)

ESPECE II. Péripneumonie pituiteuse. (*Peripneumonia pituitosa*. — *Peripneumonia notha*, *Sydenh. tom. I. pag. 167.* — *Peripneumonia notha*, *Boëth. van-Swiet. de cogn. morb. aphor. 867.*)

ESPECE III. Inflammation de poitrine des nouvelles accouchées. (*Inflammation de poitrine des femmes en couches*, *Leyret, art. des accouch. pag. 161.*)

GENRE II. *Pleuréſie.* — Inflammation de la pleure, ou des muscles intercostaux, ou du tissu cellulaire qui unit la pleure & les muscles, avec fièvre aiguë, douleur lancinante, respiration difficile, toux douloureuse. (*Pleuritis*. — *Febris pleuritica*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 136.* — *Pleuritis*, *Boëth. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 875.* — *Pleuritis*, *Triller, de Pleuride.*)

ESPECE I. Pleurésie essentielle. (*Pleuritis vera*, Boérh. van-Swiet. de cognosc. morb. aph. 878. — *Pleuritis*, Lomm. obf. med. pag. 121.)

ESPECE II. Pleurésie avec expectoration. (*Pleuritis humida*, Boérh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 879.)

ESPECE III. Pleurésie aiguë. (*Pleuritis acuta*. — *Pleuritis sicca*, Boérh. van-Swiet. de cogn. morb. aphor. 879. — *Pleuritis sicca sive erysipelatodes acutissima*, Baglivi, prax. med. pag. 37.)

ESPECE IV. Pleurésie pituiteuse. (*Pleuritis pituitosa*. — *Pleurésie pituiteuse, ou par cause froide*, Meyjerey, Med. d'armée, tom. II. pag. 308.)

ESPECE V. Pleurésie laiteuse. (*Pleuritis lactea*. — *Dépôt laiteux sur une partie de la poitrine, avec fièvre aiguë, douleur fixe & vive*, Puçot, traité des accouchem. pag. 373.)

ESPECE VI. Pleurésie putride. (*Pleuritis putrida*. — *Pleurésie avec des signes de matières indigestes ou putrides dans les premières voies*, Meyjerey, malad. des armées, tom. II. pag. 314.)

ESPECE VII. Pleurésie féreuse. (*Pleuritis ferosa*. — *Pleuritis à colluvie ferosa*, Carol. Pif. de morb. à coll. feros. pag. 249.)

GENRE III. Pleuropéripneumonie. — Inflammation de la pleure & des poumons, avec douleur lancinante, fièvre aiguë, toux vive, crachat sanguinolent, respiration difficile & fréquente. (*Pleuropéripneumonia*.)

ESPECE I. Pleuropéripneumonie essentielle. (*Pleuropéripneumonia essentialis*.)

ESPECE II. Pleuropéripneumonie bilieuse. (*Pleuropéripneumonia biliosa*. — *Dolor pleumaticus à bile*, Tulpi, obf. med. pag. 102.)

GENRE IV. Inflammation du muscle sternocostal, avec respiration difficile, & douleur aiguë de toute la région épigastrique, particulièrement vers le cartilage xiphoïde. Symptômes essentiels incertains. (*Inflammatio sternocostalis*, Sauv. nosol. meth. tom. I. pag. 478.)

GENRE V. Inflammation du cœur. — Douleur profonde & pénétrante sous le sternum, avec palpitation, défaillance, pouls inégal & fréquent. Symptômes essentiels incertains. (*Inflammatio cordis*. — *Inflammation du cœur*, Senac. tom. II. pag. 380.)

ORDRE QUATRIEME.

INFLAMMATIONS du ventre. (*Inflammationes abdominis*.)

GENRE I. Inflammation des muscles du bas-ventre. — Muscles du bas-ventre tendus, extrêmement douloureux, avec chaleur & quelquefois rougeur des téguments. (*Inflammatio muscularum abdominis*, Senn. tom. IV. p. 619.)

II. CLASSE, ORDRE. IV. 21

GENRE II. Paraphrénésie. — Constriction violente & très-douloureuse dans la région épigastrique, avec fièvre aiguë, délire, ris sardonique, respiration petite, fréquente & douloureuse; inflammation du diaphragme, ou des membranes qui le recouvrent. (*Paraphrenesis*, Boërh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 907. — *Paraphrenitis*, Morgagni, de sedib. morb. tom. I. pag. 52.)

GENRE III. Inflammation du foie. — Tension douloureuse de l'hypocondre droit, avec tumeur, chaleur, douleur gravative, fièvre aiguë, difficulté de respirer, toux seche, couleur jaune du visage, soif, très-souvent hoquet & vomissement. (*Hepatitis. Jecinoris inflammatio. — Hepatitis, Fernelii, oper. medic. tom. II. pag. 228. — Lomm. obs. med. pag. 215.*)

ESPECE I. Inflammation essentielle du foie. (*Hepatis inflammatio*, Senn. tom. IV. pag. 540. — *Febris hepatica sive hepatitis*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 143. — *Hepatitis*, Boërh. van-Swiet. de cogn. morb. pag. 914.)

ESPECE II. Inflammation du foie des nouvelles accouchées. (*Inflammatio hepatis in pueris*, Senn. tom. IV. pag. 747.)

ESPECE III. Inflammation superficielle du foie. (*Inflammatio superficialis quasi erysipelacea & spuria hepatis*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 143.)

GENRE IV. Inflammation de la rate. — Tension & gonflement de l'hypocondre gauche, avec douleur, chaleur, soif, fièvre aiguë & difficulté de respirer. (*Inflammatio splenis. — Lienis inflammatio*, Lomm. obs. med. pag. 223.)

ESPECE I. Inflammation de la rate par abondance du sang. (*Lienis inflammatio à sanguine*, Senn. tom. III. pag. 488.)

GENRE V. Inflammation du méscénètre. — Douleur profonde & gravative, tantôt au dessus, tantôt au dessous de la région ombilicale, avec tumeur, fièvre plus ou moins aiguë, rétention des matières fécales, quelquefois excrétion de matières rougeâtres par l'anus. (*Inflammatio mesenterii*. Lomm. obs. med. pag. 207. — *Inflammatio mesenterii*, Senn. tom. III. pag. 479.)

GENRE VI. Inflammation de l'épipoon. — Tension & tuméfaction de la partie supérieure & moyenne de l'abdomen, avec douleur vive, lancinante & profonde, fièvre aiguë. Symptômes essentiels incertains. (*Inflammatio omenti. — Inflammatio omenti*, Boërh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 958. — *Epipliotis*, Sauvag. nosol. meth. tom. I. pag. 480.)

GENRE VII. Inflammation de l'estomac. — Tuméfaction de la région épigastrique, avec fièvre aiguë, douleur vive, fixe & profonde, tension, ardeur, soif, nausées & vomissement. (*Inflammatio ventriculi*, Lomm. observ. med. pag. 172.)

ESPECE I. Inflammation essentielle de l'estomac. (*Gastritis. — Febris stomachica inflam-*

matoria, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 120. — *Inflammatio ventriculi*, Boérh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 951.)

ESPECE II. Inflammation de l'estomac par un coup. *Meyssery*, Méd. d'arm. t. II. p. 363.)

ESPECE III. Inflammation de l'estomac par des substances vénéneuses. (*Inflammatio ventriculi à venenis*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 123.)

GENRE VIII. *Inflammation des intestins*. — Douleur aiguë & profonde de l'abdomen, avec gonflement & tension douloureuse des muscles abdominaux, fièvre aiguë, soif, ordinairement vomissement & rétention de matières fécales. (*Inflammatio intestinorum*, Senn. tom. III. pag. 414. — *Intestinorum inflammatio*, Boérh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 959. — *Febris intestinorum inflammatoria*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 170.)

ESPECE I. Inflammation essentielle des intestins. (*Inflammatio effentialis intestinorum*, Boérh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 959.)

ESPECE II. Inflammation des intestins par des substances vénéneuses. (*Inflammatio intestinorum à materia acri*, Boérh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 959.)

ESPECE III. Inflammation par l'âcreté des humeurs contenues dans les intestins. (*Inflammatio ventriculi ab acrimonia humorum*, Boérh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 959.)

ESPECE IV. Inflammation des intestins par une violente convulsion. (*Inflammatio ab ingente convulsione*, Boérh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 959.)

ESPECE V. Inflammation des intestins par étranglement. (*Inflammation des intestins par des hernies*, Meyssery, Méd. d'arm. tom. II. pag. 366.)

ESPECE VI. Inflammation essentielle de l'intestin ileum. (*Inflammatio iliaca*. — *Volvulus*, Lomm. obs. med. p. 188. — *Febris iliaca inflammatoria*, Fred. Hoffm. t. II. p. 174.)

ESPECE VII. Inflammation essentielle du colon. (*Inflammatio coli*, Lomm. obs. med. pag. 195.)

ESPECE VIII. Inflammation des intestins par le froid de tout le corps, ou des pieds, (Meyssery, tom. II. pag. 366.)

GENRE IX. *Inflammation des reins*. — Douleur excessive entre les fausses côtes & les os des îles, jusqu'à la partie inférieure de la région hypogastrique, avec fièvre aiguë, vomissement, stupeur de la cuisse du côté affecté, & quelquefois rétraction du testicule, excrétion d'urine souvent interrompue, & en très-petite quantité. (*Inflammatio renum*. *Nephritis*. — *Inflammatio renum*, Lomm. obs. med. pag. 237. — *Renum inflammatio*, Senn. tom. III. pag. 578. — *Nephritis*, Boérh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 993.)

ESPECE I. Inflammation essentielle des reins. (*Febris nephretica*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 147. — *Nephritis à plethora*, Boérh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 994.)

ESPECE II. Inflammation par un calcul, ou des graviers. (*Inflammatio renum à calculo*. — *Febris nephretica calculosa*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 148.)

ESPECE III. Inflammation des reins par une cause mécanique externe. (*Nephritis à vulnere aut contusione*, Boérh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 994.)

ESPECE IV. Inflammation de reins par spasme. (*Inflammatio renum à spasmodia contraktione*, Boérh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 994.)

II. CLASSE, ORDRE IV. 23

GENRE X. *Inflammation de la vessie.* — Gonflement, tension de la région hypogastrique, avec fièvre aiguë, vive douleur, strangurie, ou ischurie. (*Inflammatio vesicæ*, Lomm. obf. med. pag. 254. — *Vesicae inflammatio*, Senn. tom. III. pag. 587.)

ESPECE I. Inflammation essentielle de la vessie. (*Inflammatio vesicæ*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 152.)

ESPECE II. Inflammation de la vessie par l'action d'un corps étranger. (*Inflammatio vesicæ à causis externis*, Senn. tom. III. pag. 587.)

ESPECE III. Inflammation de la vessie par les cantharides. (*Inflammatio vesicæ à cantharidibus*, Sauvag. nosol. meth. tom. I. pag. 483.)

ESPECE IV. Inflammation de la vessie par la gonorrhée. (*Inflammatio vesicæ à gonorrhœa*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 153.)

ESPECE V. Inflammation de la vessie par suppression d'évacuations sanguines. (*Inflammatio vesicæ à suppressis sanguinis evacuationibus*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 153.)

GENRE XI. *Inflammation de matrice.* — Tuméfaction & tension de la région hypogastrique, avec fièvre aiguë, 2^o. douleur vive & profonde, s'étendant sur les lombes, le coccyx, le pubis & les parties voisines, 3^o. douleur de tête & des yeux, 4^o. souvent difficulté d'uriner & de rendre les matières fécales, 5^o. chaleur, clôture & dureté du col de la matrice. (*Uteri inflammatio*, Lomm. obf. med. pag. 271. — *Inflammatio uterina*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 156.)

ESPECE I. Inflammation essentielle de la matrice. (*Inflammatio uteri à plethora*, Senn. tom. IV. pag. 643.)

ESPECE II. Inflammation de la matrice par rétention du flux menstruel, ou des loches, ou des fleurs blanches. (*Inflammatio à retenitis lochiis aut fluxu menstruali*, Senn. tom. IV. pag. 643.)

ESPECE III. Inflammation de la matrice par un accouchement laborieux, ou par violente extraction du placenta. (*Inflammation de la matrice*, Levret, art. des accouch. pag. 157.)

ESPECE IV. Inflammation de l'orifice de la matrice par l'extirpation de l'enfant, trop prompte & trop précipitée.

ESPECE V. Inflammation des ovaires & des ligaments de la matrice chez les accouchées. Symptômes essentiels incertains. (*Smellie*, Tr. des accouch. t. III. p. 471.)

ORDRE CINQUIEME.

INFLAMMATIONS du périoste. — Douleur plus ou moins aiguë, répondant à une portion de l'os, souvent avec fièvre, chaleur, ordinairement sans inflammation sensible des téguments qui recouvrent la partie affectée.

GENRE I. *Inflammation du périoste externe.* — Tumeur plus ou moins sensible du périoste, avec chaleur, douleur lancinante, profonde, plus vive quand on touche la partie affectée; quelquefois avec rougeur des téguments, lorsqu'ils recouvrent immédiatement le périoste.

ESPECE I. Inflammation bénigne du périoste externe. (*Inflammatio ossis benignior à périoste externo inflammato*, Boérh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 534.)

ESPECE II. Inflammation du périoste externe, par virus vénérien.

ESPECE III. Inflammation du périoste externe, par cause mécanique.

GENRE II. *Inflammation du périoste interne.* — Douleur profonde, vive, continue dans une portion de l'os, augmentant particulièrement après la marche & pendant la nuit, ne prenant point d'accroissement sensible, lorsque l'os est comprimé. (*Inflammatio periostei interni*, Boérh. van Swiet. de cogn. morb. aph. 543.)

ESPECE I. Inflammation du périoste interne par virus vénérien.

ESPECE II. Inflammation du périoste interne par scorbut.

ESPECE III. Inflammation essentielle du périoste interne.

ESPECE IV. Inflammation du périoste interne par cause mécanique.



TROISIEME CLASSE. MALADIES DOULOUREUSES. DOULEURS.

ORDRE PREMIER.

DOULEURS des téguments. (*Dolores tegumentorum.*)

GENRE I. *Froid.* — Sensation désagréable qu'éprouvent les téguments, avec désir de chaleur. (*Frigus.*)

ESPECE I. Douleur des téguments par le froid excessif de l'air, ou des corps environnans. (*Froid excessif,* Meyssery, *Med. d'arm.* tom. I. pag. 53 & 61.)

ESPECE II. Froid fébrile. (*Frigus febrile,* Boërh. van-Sviet. de cogn. morb. aph. 621.)

GENRE II. *Chaleur.* — Sensation désagréable qu'éprouvent les téguments, avec désir de la fraîcheur. (*Calor.*)

ESPECE I. Chaleur excessive par de violents exercices.

ESPECE II. Chaleur excessive par le soleil, ou le feu.

ESPECE III. Chaleur excessive par des aliments, ou des remèdes échauffants.

ESPECE IV. Chaleur excessive par la fièvre. (*Calor febrilis,* Boërh. van-Sviet. de cogn. morb. aph. 673.)

GENRE III. *Démangeaison.* — Douleur qui excite continuellement à gratter la partie affectée des téguments. (*Pruritus,* Senn. tom. V. pag. 79.)

ESPECE I. Démangeaison essentielle des téguments. (*Pruritus ab humorum acrimonia,* Senn. tom. V. pag. 79.)

ESPECE II. Démangeaison des parties génitales par virus vénérien. (*Pruritus venereus,* Plater. prax. med. tom. I. pag. 567.)

ESPECE III. Démangeaison des parties naturelles sans virus. (*Pruritus scroti & prepucii,* Senn. tom. IV. pag. 616.)

ESPECE IV. Démangeaison des parties fracturées ou luxées. (*Pruritus luxationibus supervenientis,* Senn. tom. V. pag. 153.)

ESPECE V. *Vermine.* — Démangeaison par des poux. (*Morbus pédicularis.* — *Phthiriásis,* Plater. prax. med. tom. III. pag. 874.)

ESPECE VI. Démangeaison des parties naturelles par des morpions. (*Pediculi ingui-*
Table des Maladies D

nales impasti in pilosâ cute, circa pudenda, Plat. prax. med. t. III. p. 874. — Démangeaison des parties naturelles de la femme par des insectes, Levret, art. des acc. p. 220.)

ESPECE VII. Démangeaison du conduit auditif de l'oreille. (*Pruritus auris interna, Plat. prax. med. tom. II. pag. 285.*)

GENRE IV. Fourmillement. — Sensation douloureuse, approchant de celle que les fourmis font éprouver lorsqu'elles marchent sur les téguments. (*Formicatio, Plat. prax. Med. tom. I. pag. 155.*)

GENRE V. Douleur le long du dos, des bras & des jambes des enfants, avec petites tumeurs, plus ou moins éloignées les unes des autres, ressemblant à des extrémités de petits crins noirâtres, formées par des vers, accompagnées de démangeaison, de faim & de maigreur. (*Vermes dorfi, Senn. tom. III. pag. 331. — Petits vers cutanés, Brouzet, malad. des enfants, tom. II. pag. 224.*)

GENRE VI. Douleur par des petits poils rudes & piquants, principalement le long du dos des enfants, avec agitation, pleurs continues & marasme. (*Poils qui naissent entre chair & cuir, Brouzet, malad. des enfants t. II. p. 229.*)

GENRE VII. Stupeur. — Douleur légère, profonde & gravative, avec engourdissement, & diminution de la sensibilité du toucher. (*Stupor.*)

ESPECE I. Stupeur par compression.

ESPECE II. Stupeur par le froid. (*Stupor à refrigeratis, Plat. prax. med. tom. I. pag. 156.*)

ORDRE SECOND.

DOULEURS de la tête. (*Dolores capititis.*)

GENRE I. Douleur de tête. — Sensation fâcheuse éprouvée dans les enveloppes du crâne, dans les parties qui y sont contenues, ou dans une portion de ces organes. (*Dolor capititis. — Dolor capititis, Lomm. obs. med. pag. 74. — Dolor capititis, Senn. tom. III. pag. 192. — Dolor cephalicus, Fred. Hoffm. t. II. pag. 247. — Dolor capititis, Morgagni, de sedibus morb. tom. I. pag. 5.*)

ESPECE I. Douleur aiguë & de longue durée de toute la tête. (*Cephalaea, Alexand. Trallian, de art. med. tom. I. pag. 25. — Cephalaea, Fred. Hoffm. tom. II. p. 247.*)

ESPECE II. Douleur de tête par pléthore. (*Dolor capititis à plethora, Senn. tom. III. pag. 192. — Dolor capititis à sanguinis nimia copia, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 248.*)

ESPECE III. Douleur de tête par des humeurs féreuses. (*Dolor capititis à mucido sero, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 248.*)

ESPECE IV. Douleur de tête par ivresse. (*Dolor capititis ab ebrietate, Senn. tom. III. pag. 192.*)

III. CLASSE, ORDRE II.

27

ESPECE V. Douleur de tête par sympathie, ou par lésion des viscères de la poitrine, particulièrement du ventre. *Dolor capitis per consensum*, *Senn. tom. III. p. 192.*
— *Dolor capitis vitio stomachi*, *Alexand. Trall. de art. med. tom. I. pag. 20.*)

ESPECE VI. Douleur de tête par des vers. (*Dolor capitis à vermis*, *Senn. tom. III. pag. 192.*)

ESPECE VII. Douleur de la tête par un coup. (*Dolor capitis ieiuni*, *Alexand. Trall. de art. med. tom. I. pag. 23.*)

ESPECE VIII. Douleur modérée d'une partie de la tête. (*Cephalalgia*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 247.*)

ESPECE IX. *Migraine*. — Douleur d'un seul côté de la tête, ordinairement périodique. (*Hemicrania*, *Alexand. Trall. pag. 32.* — *Hemicrania*, *Fred. Hoffm. t. II. p. 247.*)

ESPECE X. Migraine par des humeurs séreuses. (*Hemicrania à colluvie serosa*, *Carol. Pilon. de morb. à coll. ser. pag. 68.*)

ESPECE XI. *Clou*. — Douleur dans un seul point de la tête. (*Clavus*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 247.*)

ESPECE XII. Douleur dans une portion de la tête par virus vénérien. (*Cephalæa ex gonorrhœa virulenta*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 256.* — *Capitis gravitas, clavus, hemigranaria cephalæa à víra venereo*, *Afric. de morb. vener. tom. I. pag. 424.*)

ESPECE XIII. *Clou hysterique*. — Douleur dans un seul point de la tête par passion hysterique. (*Clavus hystericus*, *Sydenh. tom. I. pag. 257 & 263.*)

ESPECE XIV. Douleur de tête par le soleil. (*Dolor capitis insolatu*, *Alexand. Trall. de art. med. tom. I. pag. 15.*)

GENRE II. Douleur des yeux. (*Dolor oculorum*, *Senn. tom. III. pag. 213.*)

ESPECE I. Douleur des yeux par cause interne. (*Dolor oculorum ab acrimonia humorum*, *Senn. tom. III. pag. 213.*)

ESPECE II. Douleur des yeux par l'action des corps extérieurs. (*Dolor oculorum à causa externa*, *Senn. tom. III. pag. 213.*)

GENRE III. Douleur d'oreille. (*Otalgia*. — *Aurium dolor*, *Senn. tom. III. pag. 240.* — *Dolor & spasmodus otalgicus*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 336.*)

ESPECE I. Douleur aiguë des oreilles. (*Dolor & spasmodus otalgicus*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 336.*)

ESPECE II. Douleur médiocre des oreilles, sans ardeur, tension, ni tintouin. (*Intemperies aurium frigida*, *Senn. tom. III. pag. 232.*)

ESPECE III. Douleur violente des oreilles, sans tintouin. (*Intemperies calida aurium*, *Senn. tom. III. pag. 232.*)

ESPECE IV. Douleur aiguë des oreilles par des vers. (*Dolor acutus aurium à vermis*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 336.*)

ESPECE V. Douleur des oreilles par introduction de corps étrangers dans le conduit de l'oreille. (*Dolor à corporibus præter naturam in auribus*, *Senn. tom. III. p. 235.*
— *Dolor aurium à causa externa in aurem illata*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 337.*)

ESPECE VI. Douleur des oreilles par une humeur catarrhale, ou par une transpiration suspendue. (*Dolor aurium à defluxione catarrhalis vel à suppressione sudoris*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 336.*)

28 III. CLASSE, ORDRE III.

GENRE IV. *Tintouin*. — Sensation douloureuse dans l'une & l'autre oreille, par une espèce de bruit qui se fait dans l'oreille même. (*Tinnitus aurium*, *Senn. tom. III. pag. 236.*)

ESPECE I. Tintouin par pléthora. (*Tinnitus aurium*. — *Tinnitus aurium à congestion sanguinis*, *Fred. Hoffm. tom. III. pag. 241.*)

ESPECE II. Tintouin par mauvaise digestion. (*Tinnitus à nimia cibi repletione*, *Senn. tom. III. pag. 236.* — *Tinnitus ex vito ventriculi*, *Fred. Hoffm. tom. III. pag. 241.*)

ESPECE III. Tintouin par des humeurs visqueuses. (*Tinnitus ab humoribus viscosis*, *Senn. tom. III. pag. 236.*)

ESPECE IV. Tintouin des femmes grosses.

ESPECE V. Tintouin par des insectes.

GENRE V. Douleur de dent. (*Dolor dentium. Odontalgia*. — *Dentium dolor*, *Senn. tom. III. pag. 264.*)

ESPECE I. Douleur de dent par des humeurs séreuses. (*Odontalgia à colluvie serosa*, *Carol. Pif. de morb. à coll. seros. pag. 47.*)

ESPECE II. Douleur aiguë des dents sans carie, par une humeur rhumatismale. (*Rhumatismus odontalgicus*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 330.*)

ESPECE III. Douleur de dents par carie pourrissante. (*Courtois Dent. obs. pag. 65.*)

ESPECE IV. Douleur de dents des femmes grosses. (*Dolor dentium gravidarum*, *Senn. tom. IV. pag. 717.*)

ESPECE V. Agacement des dents. (*Stupor dentium*, *Senn. tom. III. pag. 265.*)

GENRE VI. *Insomnie*. — Veille extraordinaire par des douleurs plus ou moins vives. (*Pervigilium*. — *Vigiliae nimia*, *Senn. tom. III. pag. 61.*)

ESPECE I. Insomnie par défaut d'aliments. (*Vigiliae nimia ab vaporum spiritus sopientium defectum*, *Senn. tom. III. pag. 66.*)

ESPECE II. Insomnie par trop d'aliments.

ESPECE III. Insomnie par des boissons spiritueuses, ou par des aliments trop chauds. (*Vigilia à potu vel medicamentis calidis*, *Senn. tom. III. pag. 66.*)

ESPECE IV. Insomnie par la fièvre. (*Pervigilium febrile*, *Boëth. van-Sviet. de cogn. morb. aph. 708.*)

ESPECE IV. Insomnie par les affections de l'ame. (*Vigilia ab animi affectibus*, *Senn. tom. III. pag. 67.*)

ESPECE VII. Insomnie des Vieillards. (*Vigilia a frigida & sicca intemperie*. — *Vigilia senum*, *Senn. tom. III. pag. 67.*)

ORDRE TROISIEME.

DOULEURS du col, de la poitrine. (*Dolores colli & pectoris.*)

GENRE I. Difficulté d'avaler avec douleur. (*Deglutitio difficultis & dolorosa.*)

ESPECE I. Difficulté d'avaler & avec douleur, par des tumeurs de l'œsophage. (*Dolor in deglutiendo à tumoribus œsophagi*, *Senn. tom. IV. pag. 365.*)

III. CLASSE, ORDRE III. 29

ESPECE II. Difficulté d'avaler & avec douleur, par des corps étrangers arrêtés dans l'œsophage. (*Corps étrangers arrêtés dans l'œsophage*, Mémoire de l'Acad. de chir. in-4. tom. I. pag. 444.)

ESPECE III. Difficulté d'avaler & avec douleur, par des vers dans l'œsophage. (*Anguilla asophagi à vermis*, Senn. tom. IV. pag. 365.)

ESPECE IV. Difficulté d'avaler & avec douleur, par l'action des boîfons adstringentes. (*Œsophagi anguilla à constringentibus*, Senn. tom. IV. pag. 365.)

ESPECE V. Difficulté d'avaler & avec douleur, par affection hystérique ou hypocondriaque. (*Difficultas deglutiendi ab affectione hypocondriaca*, Senn. tom. IV. pag. 365.)

GENRE II. Difficulté d'avaler & de respirer, avec douleur.

ESPECE I. *Angine aqueuse*. — Difficulté d'avaler & de respirer, avec douleur & tuméfaction œdémateuse ou aqueuse, proche du larynx & du pharynx. (*Angina aquosa*, Boëth. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 791.)

ESPECE II. *Angine squameuse*. — Difficulté d'avaler & de respirer, avec douleur, par le volume & la dureté des glandes de l'arrière-bouche. (*Angina scirrhosa*, Boëth. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 797.)

GENRE III. Catarrhe. — Douleur d'une partie de la tête, du nez & du col, ordinairement avec rougeur des yeux, enflammement, souvent avec toux, quelquefois avec fièvre. (*Catarrhus*, Senn. tom. III. pag. 181.)

ESPECE I. Catarrhe froid. (*Catarrhus frigidus*, Senn. tom. III. pag. 184.)

ESPECE II. Catarrhe chaud. (*Catarrhus calidus*, Senn. tom. III. pag. 184.)

ESPECE III. Catarrhe bénin. (*Catarrhus benignus*, Sauvag. nosol. meth. tom. II. p. 35.)

ESPECE IV. Catarrhe suffocant. (*Catarrhus suffocatus*, Morgagni, de sed. morb. tom. I. pag. 96.)

ESPECE V. Catarrhe épidémique. (*Catarrhus contagiosus*, Senn. tom. III. pag. 184.)

GENRE IV. Douleur des parties extérieures de la poitrine, plus ou moins vive, ordinairement sans fièvre & sans toux. (*Pleuritis notha*, Lomm. obs. med. pag. 132. — *Pleuritis spuria*, Boëth. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 878.)

ESPECE I. Douleur de poitrine par humeur rhumatismale. (*Pleuritis spuria, rhumatismi species*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 137.)

ESPECE II. Douleur de poitrine épidémique. (*Dolor lateris pleuritis mendax*, Ballonii, oper. med. tom. I. pag. 59.)

ESPECE III. Douleur de poitrine par une humeur de goutte, ou de vérole, ou de scorbut. (*Dolor pectoris ab humoribus vitiatis ad pectoris transflatis*, Senn. tom. III. pag. 349.)

ESPECE IV. Douleur de poitrine par une humeur catarrcale. (*Dolor pectoris à catarrho*, Senn. tom. III. pag. 349.)

30 III. CLASSE, ORDRE IV.

GENRE V. Anxiété. — Sensation douloureuse dans la poitrine & la région épigastrique, avec agitation plus ou moins forte des extrémités & du corps. (*Anxetas*. — *Inquietudo*, Senn. tom. III. pag. 127.)

ESPECE I. Anxiété fébrile. (*Anxetas febrilis*, Boëth. *Sviet. de cogn. morb. aph.* 631.)

ESPECE II. Anxiété spasmodique. (*Anxetas spasmodica*, Boëth. *van-Sviet de cogn. morb. aph.* 633.)

GENRE VI. Douleur des mamelles.

ESPECE I. Douleur des mamelles des femmes grosses. (*Mauriceau, obf. sur les accouch.* tom. I. pag. 137.)

ESPECE II. Douleur des mamelles par la rétention du flux menstruel, ou des pertes blanches.

ORDRE QUATRIEME.

DOULEURS du ventre. (Dolores abdominis.)

GENRE I. Soif excessive. — Desir immoderé de la boisson. (*Sitis nimia*, Senn. tom. IV. pag. 394.)

ESPECE I. Soif par une humeur bilieuse. (*Sitis ab humore bilioso*, Senn. t. IV. p. 395.)

ESPECE II. Soif par une chaleur excessive de la poitrine. (*Sitis à pulmonis calore*, Senn. tom. IV. pag. 395.)

ESPECE III. Soif par une chaleur excessive du corps. (*Sitis à calore & fuscitate*, Senn. tom. IV. pag. 395.)

ESPECE IV. Soif par des aliments acres, ou spiritueux.

ESPECE V. Soif fébrile. (*Sitis febrilis*, Boëth. *van-Sviet. de cogn. morb. aph.* 636.)

GENRE II. Faim canine. — Appétit excessif d'aliments, souvent avec nausées & vomissement après avoir mangé. (*Canina appetentia*, Lomm. *obf. med.* pag. 168. — *Nimia ciborum appetentia*, Senn. tom. IV. pag. 390. — *Famis prater naturam*, Morgagni, *de sedib. morb. tom. II.* pag. 7.)

ESPECE I. Appétit excessif des aliments par les mauvaises qualités des humeurs de l'estomac. (*Bulimus ab humore acido*, Senn. tom. IV. pag. 390.)

ESPECE II. Faim canine par une longue abstinence. (*Bulimus ex defectu alimentorum*, tom. IV. pag. 391.)

ESPECE III. Appétit excessif par les vers. (*Bulimus à veribus*, Senn. tom. IV. p. 390.)

ESPECE IV. Faim canine par un froid excessif. (*Bulimus à frigore vehementi*, Senn. tom. IV. pag. 391.)

ESPECE V. Faim canine épidémique. (*Famis epidemica*, Senn. tom. IV. pag. 390.)

ESPECE VI. Appétit excessif périodique, avec nausées, & abattement des forces.

III. CLASSE, ORDRE IV. 31

(*Bulimus*, Lomius, obf. med. pag. 169. — *Bulimus*, Senn. tom. IV. p. 390.)

ESPECE VII. *Appétit canin*. — Appétit excessif, sans vomissement, ni diarrhée, ni diminution des forces. (*Appetitus caninus*, Senn. tom. IV. pag. 390.)

GENRE III. Appétit immoderé de substances insipides ou désagréables, avec douleur mordante dans la région épigastrique, anxiété, crachement, & souvent vomissement. (*Pica seu appetitus vitiosus*, Senn. tom. IV. p. 392.)

GENRE IV. Sentiment de constriction dans la région épigastrique, pendant la digestion des aliments. (*Stomachi adstringio*, Aëtii, oper. med. pag. 546.)

GENRE V. *Cremafon*. — Sentiment d'ardeur dans la région épigastrique sans fièvre. (*Ardens ventriculi dolor*, Plater. prax. med. tom. II. pag. 397. — *Dolor ventriculi*, Lomm. obf. med. pag. 166.)

GENRE VI. Douleur corrosive & de longue durée dans la région épigastrique. (*Cardiogmos*, Plater. prax. med. tom. II. pag. 396. — *Erosio stomachi*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 120. — *Erosio ventriculi*, Lomm. obf. med. pag. 167.)

ESPECE I. Douleur corrosive de l'estomac, par la présence d'une bile très-acre.

ESPECE II. Douleur corrosive de l'estomac, par un poison.

ESPECE III. Douleur corrosive de l'estomac, sans principe évident.

GENRE VII. *Colique d'estomac*. — Douleur plus ou moins vive, ordinairement de peu de durée dans la région épigastrique sans fièvre. (*Gastrodinia*. — *Cardilæa*, Plater. prax. med. tom. II. pag. 398.)

ESPECE I. Colique d'estomac par indigestion. (*Colique d'estomac par des mauvais aliments*, Meyseray, Med. d'arm. tom. III. pag. 20.)

ESPECE II. Colique d'estomac par le froid de tout le corps, ou des pieds. (*Meyseray*, Med. d'arm. tom. III. pag. 20.)

ESPECE III. Colique d'estomac par le poison. (*Meyseray*, Med. d'arm. tom. III. pag. 24.)

ESPECE IV. Colique d'estomac par des calculs & autres corps durs. (*Meyseray*, Med. d'armée, tom. III. pag. 25.)

ESPECE V. Colique d'estomac par la bile. (*Meyseray*, Med. d'arm. tom. III. p. 24.)

ESPECE VI. Colique d'estomac par la répercussion d'une humeur. (*Meyseray*, Med. d'armée, tom. III. pag. 25.)

ESPECE VII. Colique d'estomac hystérique. (*Dolor hystericus in regione cordis scrofulo circumposita*. Sydenh. tom. I. pag. 262.)

GENRE VIII. *Cardialgie*. — Douleur plus ou moins aiguë vers le creux de l'estomac, avec anxiété, difficulté de respirer, abattement des forces. (*Cardialgia*, Plater. prax. med. tom. II. pag. 395. — *Cardialgia*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 257.)

III. CLASSE, ORDRE IV.

ESPECE I. Cardialgie par des vers. (*Cardialgia à veribus*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 259.)

ESPECE II. Cardialgie chez les enfants par des acides. (*Cardialgia ab acido apud infantes laclantes*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 258.)

ESPECE III. Cardialgie par le poison, ou les émétiques. (*Cardialgia à venenis*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 259.)

ESPECE IV. Cardialgie par la suppression du flux menstruel, ou du flux hémorroïdal, (*Cardialgia à mensibus vel hemorrhoidibus suppressis*, Fred. Hoffm. tom. II. p. 258.)

ESPECE V. Cardialgie par les affections de l'ame. (*Cardialgia ab animi affectibus*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 259.)

ESPECE VI. Cardialgie flatueuse. (*Cardialgia flatulentia*, Fred. Hoffm. t. II. p. 257.)

ESPECE VII. Cardialgie spasmodique. (*Cardialgia spasmodica*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 257.)

ESPECE VIII. Cardialgie des enfants par les mauvaises qualités des humeurs contenues dans les premières voies. (*Cardialgia infant.* Fred. Hoffm. tom. III. p. 494.)

GENRE IX. *Douleur du foie.* — Douleur profonde dans l'hypocondre droit. (*Dolor hepatis. Hepatalgia.*)

ESPECE I. *Obstruction du foie.* — Douleur gravative dans l'hypocondre droit, principalement après avoir mangé, sans tumeur sensible & sans fièvre. (*Obstrucțio hepatis. — Jecinoris obstrucțio*, Lomm. obf. med. pag. 212.)

ESPECE II. Douleur dans l'hypocondre droit par un calcul. (*Dolor & spasmus praecordiorum à calculo felles*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 268.)

ESPECE III. Intempérie chaude du foie. (*Intemperies calida jecinoris*, Lomm. obf. med. pag. 207. — *Intemperies calida hepatis*, Senn. tom. IV. pag. 536.)

ESPECE IV. Intempérie froide du foie. (*Intemperies frigida jecinoris*, Lomm. obf. med. pag. 208. — *Intemperies frigida hepatis*, Senn. tom. IV. pag. 536.)

GENRE X. *Douleur de la rate.* — Douleur profonde & gravative dans l'hypocondre gauche. (*Dolor lienis.*)

ESPECE I. Sentiment de douleur & de chaleur dans l'hypocondre gauche, avec soif & langue sèche sans fièvre. (*Intemperies calida lienis*, Senn. tom. IV. pag. 485.)

ESPECE II. *Obstruction de la rate.* — Douleur gravative dans l'hypocondre gauche, plus vive après des exercices violents, avec couleur livide de la peau, difficulté de respirer, quelquefois accompagnée de toux sèche. (*Obstrucțio lienis*, Senn. t. IV. p. 487.)

ESPECE III. Douleur obscure dans l'hypocondre gauche, avec borborigmes, rapports & vomissement acide sans fièvre. (*Intemperies lienis frigida*, Senn. t. IV. p. 485.)

GENRE XI. *Colique du Poitou.* — *Colique des peintres.* — Douleur très-aiguë du bas ventre, particulièrement proche du nombril, au commencement avec diarrhée, ensuite constipation, pâleur du visage, froid des extrémités, abattement des forces, anxiété, insomnie, nausées, vomissement bilieux. (*Colica pietonum*, Tronchin, *de colic. pieton.*)

ESPECE I.

III. CLASSE, ORDRE IV. 33

ESPECE I. Colique du Poitou. (*Colica saturnina*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 286.
— *Colica pictonum à venenis*, Tronchin, de colic. piét. pag. 25.)

ESPECE II. Colique du Poitou par l'excès du vin, & des fruits éloignés de leur maturité. (*Colica pictonum à nimio usu vini potuſque acido-aufteri, acidorumque im- maturorum*, Tronchin de colic. piét. pag. 32.)

ESPECE III. Colique du Poitou par humeur rhumatismale. (*Colica pictonum à rheu- matismo*, Tronchin, de col. piét. pag. 39.)

ESPECE IV. Colique du Poitou par la crise imparfaite d'une fièvre. (*Colica pictonum à reliquis fibrum imperfecta crisi solitarum vel non bene curatarum*, Tronchin de col. piét. pag. 20.)

ESPECE V. Colique du Poitou par les passions de l'âme. (*Colica pictonum ab animi paſhematibus*, Tronch. de colic. piét. pag. 48.)

ESPECE VI. Colique du Poitou par la goutte. (*Colica pictonum ab arthritide*, Tronch. de colic. piét. pag. 38.)

ESPECE VII. Colique du Poitou par le scorbut. (*Colica pictonum à scorbuto*, Tronch. de colic. piét. pag. 44.)

ESPECE VIII. Colique du Poitou par la transpiration suspendue. (*Colica pictonum ab impedita perspiratione*, Tronch. de colic. piét. pag. 41.)

GENRE XII. *Colique*. — Douleur des intestins. (*Colica*. — *Dolor intestino- rum*, Senn. tom. IV. pag. 430. — *Dolor intestinorum*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 284 — *Colica*, Baglivi, pag. 99. — *Dolor intestinorum*, Morgagni, de sedib. morb. tom. II. pag. 44. 57.)

ESPECE I. Colique bilieuse. (*Colica biliosa*. — *Colica ab humore bilioſo & calido*, Senn. tom. IV. pag. 435. — *Colica biliosa*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 286. — *Co- lica biliosa*, Sydenh. tom. I. pag. 127.)

ESPECE II. Colique spasmodique. (*Colica spasmatica*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 285.)

ESPECE III. Colique par la suppression du flux menstruel. (*Colica à menſum fluxu ſuppreſſo*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 286.)

ESPECE IV. *Colique hémorroidale*. — Colique par la suppression du flux hémorroïdal. (*Colica ab hemorroidum fluxu ſuppreſſo*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 286.)

ESPECE V. Colique par la suppression des lochies. (*Colica à lochiorum fluxu retento*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 286.)

ESPECE VI. Colique par le froid des pieds. (*Dolor ventris à deambulatione nudis pe- dibus ſuper frigidum pavimentum*, Baglivi, pag. 100.)

ESPECE VII. Colique par des humeurs pituitées. (*Colica ab humoribus crassis & viſ- cidis*, Senn. tom. IV. pag. 434.)

ESPECE VIII. Colique venteuse. (*Colica à flatibus*, Senn. tom. IV. pag. 432. — *Colica flatulenta*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 285.)

ESPECE IX. Colique par des substances véneneuses, ou médicamenteuses.

ESPECE X. Colique de l'intestin cœcum. (*Morbus intestini plenioris*, Cels. oper. med. pag. 223.)

ESPECE XI. Colique hysterique. (*Colica hysterica*, Sydenh. tom. I. pag. 131.)

Table des Maladies E

III. CLASSE, ORDRE IV.

ESPECE XII. Colique bilieuse des accouchées, avec engorgement des glandes thyroïdes depuis le premier accouchement. (*Levret, art. des accouch.* pag. 190.)

ESPECE XIII. Colique chez les enfants par les mauvaises qualités du lait. (*Dolor intestinorum in lactantibus à latte depravato*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 286. — *Colique des enfans à la mammelle*, Pujos, trait. des accouch. pag. 288.)

ESPECE XIV. Colique des nouveaux nés. (*Colica meconialis*. — *Tranchée des nouveaux nés*, Pujos, trait. des accouch. pag. 281.)

ESPECE XV. Colique par les vers lombricaux. (*Colica à vermicibus rotundis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 490. — *Lumbrixi puerorum*, Baglivi, pag. 59. — *Vers, Brouzet, educ. med. des enf.* tom. II. pag. 33.)

ESPECE XVI. Colique par des vers ascarides, ordinairement avec démangeaison à l'anus, & fréquentes envies d'aller à la selle. (*Tensio ab ascaridibus*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 490.)

ESPECE XVII. *Colique par le ver solitaire.* — Douleur gravative & profonde dans le ventre par le vers solitaire, avec appétit dépravé, anxiété, syncope, maigreur, & sortie par l'anus d'une portion du ver plus ou moins grande. (*Van-Doeven, obs. de taria*.)

ESPECE XVIII. Colique par le pincement de l'intestin. (*Mémoire de l'Acad. de chir.* in-4. tom. III. pag. 147.)

GENRE XIII. *Douleur de matrice.* — Douleur plus ou moins vive & profonde dans la région hypogastrique des femmes, sans fièvre.

ESPECE I. Colique des femmes grosses. (*Colique des femmes enceintes*, Pujos, traité des accouch. pag. 79.)

ESPECE II. *Fauilles douleures.* — Douleurs des femmes enceintes, approchant de celles qu'elles éprouvent lorsqu'elles accoucheent. (*Faux travail*, Levret, art. des accouch. pag. 94. — *Dolor spurius gravidarum*, Roëderer elem. art. obſt. pag. 216. ſect. 438.)

ESPECE III. Douleurs qui précédent l'accouchement. (*Dolores praefagientes*, Roëd. elem. art. obſt. pag. 73. ſect. 159.)

ESPECE IV. Douleurs de l'enfantement. (*Douleurs qui accompagnent l'accouchement*, (Levret, art. des accouch. pag. 84. — *Dolores veri sine labore ad partum*, Roëd. elem. art. obſt. pag. 78. ſect. 169.)

ESPECE V. Tranchées qui suivent l'accouchement. (*Levret, art. des accouch.* pag. 145. — *Tranchées qui accompagnent l'accouchement*, Pujos, trait. des accouch. pag. 158.)

GENRE XIV. *Colique néphritique.* (Douleur aiguë & fixe, depuis la région rénale jusqu'à la vessie, avec nausées, & souvent avec vomissement, & rétraction des testicules. (*Dolor nephriticus*, Senn. tom. IV. pag. 584.)

ESPECE I. Colique néphritique par calcul. (*Dolor nephriticus à calculo renum*, Lomm. obſt. med. pag. 241. — *Dolor nephriticus à calculo*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 298.)

ESPECE II. Colique néphritique par passion hystérique. (*Dolor nephriticus ex affectione hysterica*, Sydenh. tom. I. pag. 258. & 278.)

ESPECE III. Colique néphritique par la goutte. (*Dolor nephriticus à podagra*, Sydenh. tom. I. pag. 328.)

GENRE XV. Douleur spasmodique de la vessie, & des parties environnantes,

III. CLASSE, ORDRE V. 35

(*Spasmodus & dolor vesicæ & adjacentium partium*, Fred. Hoffm. tom. II.
pag. 307.)

GENRE XVI. *Ardeur d'urine.* — Sentiment d'ardeur dans le canal de l'uretre, au passage de l'urine. (*Ardor urinæ*.)

ESPECE I. Ardeur d'urine par l'acréte des urines. (*Ardor urinæ ab acrimonia urinarum*, Senn. tom. IV. pag. 595.)

ESPECE II. Ardeur d'urine par la présence d'un calcul dans la vessie. (*Ardor urinæ à calculo*, Senn. tom. IV. pag. 595.)

GENRE XVII. *Menstruation douloureuse.* — Douleur avant & pendant l'écoulement du flux menstruel. (*Menses cum molestia & gravibus symptomatibus fluentibus*, Senn. tom. IV. pag. 670.)

ORDRE CINQUIEME.

DOULEURS de l'épine du dos, du bassin & des extrémités.

GENRE I. *Rhumatisme.* — Douleur des muscles plus ou moins vive, de longue durée, ordinairement sans rougeur, ni tumeur. (*Rheumatismus. — Dolor rheumaticus*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 317. — *Rheumatismus*, Boëth. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 1490.)

ESPECE I. Rhumatisme inflammatoire. (*Rheumatismus cum febre*, Sydenh. t. I. p. 170.)

ESPECE II. Rhumatisme par des humeurs séreuses. (*Dolor externus artuum & totius corporis à diluvie serosa*, Carol. Pif. de morb. à coll. ser. pag. 432.)

ESPECE III. Rhumatisme scorbutique. (*Rheumatismus scorbuticus*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 320. — Sydenh. tom. I. pag. 172.)

ESPECE IV. Rhumatisme vénérien. (*Rheumatismus venereus*, Fred. Hoffm. t. II p. 320.)

GENRE II. *Mal de reins.* — Douleur qui occupe la région lombaire, avec difficulté de redresser le tronc. (*Lumbago*, Senn. tom. III. pag. 330. t. IV. pag. 518. — *Dolor circa regionem lumbarem*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 297. — *Lumborum affeditio*, Baglivi, pag. 93.)

ESPECE I. Douleur rhumatismale dans la région lombaire. (*Lumbago rheumatica*, Sydenh. tom. I. pag. 170.)

ESPECE II. Douleur des lombes par catharre. (*Dolor lumborum à catarrho*, Senn. tom. IV. pag. 518.)

GENRE III. *Sciaticque.* — Douleur fixe & continue à l'articulation du fémur avec l'os des îles, ou proche du coccyx, ou dans les muscles qui recouvrent l'os des îles, sans tumeur ni rougeur. (*Dolor ischiadicus*, Senn. tom. V. pag. 173. — *Sciaticque*, Meyserey, Méd. d'arm. tom. III. pag. 14.)

36 III. CLASSE, ORDRE V.

ESPECE I. Douleur sciatique rhumatismale. (*Dolor in ipsis musculis inter genua & coxadicem ab humore feroſo*, *Senn. tom. V. pag. 173.*)

ESPECE II. Douleur sciatique par la goutte. (*Dolor ifchiadicus ab arthrite*, *Senn. tom. V. pag. 173.*)

ESPECE III. Douleur sciatique intermittente. (*Dolor ifchiadicus intermittens*. — *Douleur intermittente vers l'os ifchium*. *Obs. de med. d'Edim. tom. VI. p. 143.*)

GENRE IV. Douleur à l'articulation du fémur avec la cavité cotyloïde, souvent accompagnée de tumeur, sans luxation, ni fracture, ni ankylose sensible. (*Morbus coxarius*, *de Haen, rat. med. tom. II. pag. 105.*)

GENRE V. Goutte. — Douleur des articulations, périodique, vague, avec tumeur dure & plus ou moins élevée. (*Podagra*, *Sydenh. tom. I. pag. 302.* — *Podagra*, *Boërh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 1254.* — *Dolor podagratus & arthriticus verus & inveteratus*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 339.* — *Arthritis*, *Morgagni, de sedib. morb. tom. II. pag. 358.*)

ESPECE I. Goutte régulière. (*Podagra regularis*, *Sydenh. tom. I. pag. 303.* Variété.)

ESPECE II. Goutte non régulière. (*Podagra non regularis*, *Sydenh. tom. I. pag. 304 ad 307.* Variété.)

GENRE VI. Douleur des os. (*Dolor ossium. Dolor osteoporus.*)

ESPECE I. Douleur des os par virus vénérien. (*Dolor osteoporus à viru venereo, Afruc. de morb. vener. tom. I. pag. 516.*)

ESPECE II. Douleur scorbutique des os. (*Lind. traité du scorbut*, *tom. I. pag. 207.*)

ESPECE III. Douleur des os par virus écrouelleux.

ESPECE IV. Douleur des os par virus rachitique.

ESPECE V. Épine venteuse. — Douleur extrêmement vive, rapportée dans l'intérieur de l'os, souvent avec tumeur des parties qui recouvrent l'os. (*Spina ventosa*, *du Verney, malad. des os, préface, pag. 158.*)

GENRE VII. Entorse. — Douleur plus ou moins vive, dans une articulation par un déplacement passager des os, avec difficulté de mouvoir les parties articulées. (*Entorse, du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 65.*)

QUATRIEME CLASSE. MALADIES CONVULSIVES. CONVULSIONS.

ORDRE PREMIER.

CONVULSIONS GÉNÉRALES. — Mouvements involontaires, plus ou moins rapides, de plusieurs parties du corps. (*Convulsiones.*)

GENRE I. *Convulsion.* — Mouvement involontaire & plus ou moins rapide, d'une extrémité du corps, ou de plusieurs. (*Convulso.* — *Motus convulsivi.* Fred. Hoffm. tom. III. pag. 24. — *Convulso.*, Boërh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 230. — *Convulso.*, Morgagni, de sed. morb. tom. I. pag. 76.)

ESPECE I. Convulsion par de vives affections de l'ame. (*Convulso ab animi affectibus.* Fred. Hoffm. tom. III. pag. 25.)

ESPECE II. Convulsion par des vers. (*Convulso à vermis.*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 26.)

ESPECE III. Convulsion par la morsure d'un animal. (*Convulso ab ichu & morstu animalium.*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 26.)

ESPECE IV. Convulsion par inanition. (*Convulso à vacuatione.*, Hippocratis, aph. 39. sect. 6.)

ESPECE V. Convulsion par le raphanus. (*Raphanistrum.* — *Raphania*, Linn. amanit. acad. tom. VI. pag. 430.)

ESPECE VI. Convulsion febrile. (*Convulso febrilis.*, Boërh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 710.)

ESPECE VII. Convulsion par un coït prématuré ou trop répété, ou par la masturbation reitérée avec excès. (*Convulso à nimia venere.*, Fred. Hoffm. tom. III. p. 25.)

ESPECE VIII. Convulsion des femmes enceintes. (*Levret*, art. des accouch. pag. 222.)

ESPECE IX. Convulsion par la dentition. (*Levret*, art. des accouch. pag. 255.)

ESPECE X. Convulsion par les mauvaises qualités du lait de la nourrice. (*Levret*, art. des accouch. pag. 255.)

ESPECE XI. Convulsion par des humeurs dépravées, contenues dans les premières voies des enfants. (*Convulsion des enfants.*, Brouzet, ed. med. des enf. t. II. p. 4.)

ESPECE XII. Convulsion intermittente. (*Convulso intermittens.*, Sauvag. nos. meth. tom. I. pag. 556.)

ESPECE XIII. Convulsion qui survient après une blessure. (*Convulsio vulnorum*, Heijer, *inf. chir. tom. I.* pag. 81.)

ESPECE XIV. Convulsion par répletion. (*Convulsio à repletione*, Hippocratis, Aph. 39. *fecit. 6.*)

GENRE II. *Épilepsie*. — Convulsions d'une ou de plusieurs parties du corps, chronique, intermittente, avec subite & entière abolition des sens, & oubli de tout ce qui s'est passé pendant l'accès. (*Epilepsia*. — *Epilepsia*, Caelius Aurelianus, *tom. II.* pag. 31. — *Morbus comitialis*, Lomm. obf. med. pag. 88. — *Epilepsia*, Morgagni, *de sed. morb. t. I.* p. 68. — *Epilepsia*, Senn. *t. III.* pag. 154. — *Epilepsia*, Boëhr. van-Swiet. *de cogn. morb. aph.* 1071.)

ESPECE I. Épilepsie essentielle. (*Epilepsia per primarium cerebri affectionem*, Senn. *t. III.* pag. 162. — *Epilepsia*, Fred. Hoffm. *tom. III.* pag. 9.)

ESPECE II. Épilepsie par les vives affections de l'âme. (*Epilepsia ab animi affectionibus*, Fred. Hoffm. *tom. III.* pag. 12.)

ESPECE III. Épilepsie par les matières contenues dans les premières voies. (*Epilepsia per consensum ventriculi*, Senn. *tom. III.* pag. 163.)

ESPECE IV. Épilepsie sympathique. (*Epilepsia per consensum*, Senn. *tom. III.* p. 162. — *Epilepsia sympathica*, Fred. Hoffm. *tom. III.* pag. 12.)

ESPECE V. Épilepsie féreuse. (*Epilepsia à colluvie serosa*, Carol. Pison, *de morb. à coll. fer.* pag. 115. — *Epilepsia cachectica*, Fred. Hoffm. *tom. III.* pag. 12.)

ESPECE VI. Épilepsie par les vers. (*Epilepsia à vermis*, Senn. *tom. III.* pag. 163.)

ESPECE VII. Épilepsie par affection de la matrice. (*Epilepsia ab utero*, Senn. *t. III.* p. 163.)

ESPECE VIII. Épilepsie par des blessures. (*Epilepsia à partibus externis*, Senn. *t. III.* p. 164. — *Epilepsia idiopathica à causa violenta externa*, Fred. Hoffm. *t. III.* pag. 11.)

ESPECE IX. Épilepsie hystérique. (*Epilepsia hysterica*, Fred. Hoffm. *tom. III.* pag. 12.)

GENRE III. *Danse de S. Guy*. — Mouvements irréguliers & involontaires des bras & des jambes, lorsque le malade veut laisser un corps ou marcher. (*Chorea sancti Viti*, Sydenham, *tom. I.* pag. 360.)

GENRE IV. *Mouvements spasmodiques vagus*. — Mouvements irréguliers & involontaires, passant avec plus ou moins de rapidité d'une partie du corps à l'autre, avec lésion sensible des fonctions de la partie affectée. (*Motus spasmodici vagi*, Fred. Hoffm. *tom. III.* pag. 34.)

ESPECE I. Mouvement spasmodique, vague, heréditaire. (*Motus spasmodicus vagus hereditarius*, Fred. Hoffm. *tom. III.* pag. 35.)

ESPECE II. Mouvement spasmodique vague épidémique. (*Motus spasmodicus vagus epidemicus*, Fred. Hoffm. *tom. III.* pag. 36.)

ESPECE III. Mouvement spasmodique vague par les matières impures contenues dans les premières voies. (*Affectus spasmodicus vagus ex fodiis primarum viarum*, Fred. Hoffm. *tom. III.* pag. 36.)

ESPECE IV. Affection spasmodique vague par des vers dans les premières voies. (*Affectus spasmodicus vagus à verminosa colluvia*, Fred. Hoffm. *tom. III.* pag. 36.)

IV. CLASSE, ORDRE I. 39

ESPECE V. Affection spasmodique vague, par la répercussion des maladies cutanées.
(*Affectus spasmodicus vagus à retroupluis morbis cutaneis*, Fred. Heffm. t. III. p. 37.)

GENRE V. *Frisson*.—Mouvement rapide & involontaire des téguments & des muscles situés sous la peau, avec sentiment de froid. (*Rigor*, Senn. tom. III. pag. 127.)

ESPECE I. Frisson par le froid. (*Rigor à frigore*, Sauvag. nosl. meth. tom. I. pag. 568.)

ESPECE II. Frisson par les passions. (*Rigor ab animi pathematisbus*.)

ESPECE III. Frisson fébrile. (*Frigus febrile*, Boëth. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 621.)

GENRE VI. *Tremblement*.—Mouvement rapide & involontaire de la tête, d'une ou de plusieurs extrémités. (*Tremor*, Senn. tom. III. pag. 129.)

ESPECE I. Tremblement par cause froide. (*Tremor à causa frigida*, Senn. tom. III. pag. 130.)

ESPECE II. Tremblement par une évacuation supprimée, ou par plethora. (*Tremor ab evacuatione suppressâ vel plethorâ*, Senn. tom. III. pag. 130.)

ESPECE III. Tremblement des metallurgistes. (*Tremor metallurgorum*. — *Tremor à venenis*, Plater. prax. med. tom. I. pag. 350. — *Tremor à malignâ & narcoticâ cauſâ*, Senn. tom. III. pag. 130.)

ESPECE IV. Tremblement par le vin. (*Tremor à vino*, Plater. prax. med. tom. I. pag. 350. — *Tremor ex abusu aquæ vitæ*, Baglivi, pag. 96.)

ESPECE V. Tremblement par la trop abondante boisson du café. (*Tremor ex nimio caffè abusu*, Baglivi, pag. 76.)

ESPECE VI. Tremblement irrégulier survenu après la guérison d'une fièvre intermitte. (*Obser. de med. d'Edim. tom. IV.* pag. 517.)

ESPECE VII. Tremblement des vieillards. (*Tremor senilis*, Senn. tom. III. pag. 130.)

ESPECE VIII. Tremblement fébrile. (*Tremor febrilis*, Boëth. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 627.)

ESPECE IX. Tremblement par une longue maladie, ou par un coït immoderé, ou autre évacuation trop abondante. (*Tremor à spirituum absumptione & dissolutione*, Senn. tom. III. pag. 130.)

ESPECE X. Tremblement par des matières impures dans les premières voies. (*Tremor à faburrâ*, Sauvag. nosl. meth. tom. I. pag. 559.)

ESPECE XI. Tremblement par l'usage du mercure. (*Tremor capitis ex hydrargiro*, Ballonii, oper. med. tom. I. pag. 191.)

GENRE VII. *Soubresaut des tendons*.—Élévation subite & involontaire des tendons des pieds & des mains. (*Tendinum subfultoria elevatio*. — *Subfultus*, Linn. gen. morb. gen. 134.)

GENRE VIII. Mouvement rapide, répété & involontaire des tendons qui font mouvoir la main & les doigts. (*Digitorum tremula contratio inficia*. — *Carpologia*, Linn. gen. morb. gen. 135.)

40 *IV. CLASSE, ORDRE I.*

GENRE IX. *Pandiculation.* — Inspiration profonde, involontaire, avec une espèce de constrictiō de la poitrine, & extension du corps & des extrémités. (*Pandiculatio*, Senn. tom. III. pag. 126.)

GENRE X. *Bâillement.* — Inspiration lente, involontaire, avec ouverture considérable de la bouche, & ordinairement suivie d'une expiration sonore. (*Oscitatio*, Senn. tom. III. pag. 258.)

GENRE XI. *Suffocation.* — Respiration très-difficile, avec un sentiment de constrictiō dans la trachée - artère. (*Suffocatio seu strangulatio*, Senn. tom. III. pag. 341. — *Suffocatio*, Morgagni, de sedibus morbor. tom. I. pag. 175.)

GENRE XII. Difficulté de respirer par des corps étrangers, passés dans la trachée-artère. (*Mémoires de l'Acad. de chir. in-4.* tom. I. pag. 447.)

GENRE XIII. *Orthopnée.* — Difficulté de respirer, subite, aiguë, avec expiration plus ou moins sonore. (*Orthopnea*.)

ESPECE I. Orthopnée par des anévrismes. (*Respiratio lassa à cordis aut magnar arteriarum intra thoracem anevrismatibus*, Morgagni, de sedib. morb. tom. I. pag. 152.)

ESPECE II. Orthopnée par des vapeurs. (*Orthopnea à vaporibus suffocantibus*. — *Suffocatio à vaporibus*, Senn. tom. IV. pag. 342.)

ESPECE III. Orthopnée par une course violente, ou pour avoir monté trop rapidement.

GENRE XIV. *Oppression.* — Respiration difficile très-précipitée & de peu de durée. (*Anhelatio*, Linn. gen. morb. gen. 157.)

GENRE XV. *Cochemar.* — Difficulté de respirer & de parler, lorsqu'on est sur le point de dormir, avec le sentiment d'un poids sur la poitrine. (*Incubus*, Senn. tom. III. pag. 150.)

ESPECE I. Cochemar pléthorique. (*Incubus à plethora*, Senn. tom. III. pag. 151.)

ESPECE II. Cochemar par une trop grande quantité d'aliments dans l'estomac. (*Incubus à crapula*, Senn. tom. III. pag. 152.)

ESPECE III. Cochemar par le froid. (*Incubus à causa externa refrigerante*, Senn. tom. III. pag. 152.)

GENRE XVI. *Asthme.* — Difficulté de respirer, chronique, périodique, & plus ou moins sonore. (*Asthma*, Senn. tom. III. pag. 335. — *Asthma*, Baglivi, pag. 103. — *Asthme*, Floyer, traité de l'asthme.)

ESPECE I. Asthme convulsif. (*Asthma convulsivum*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 94. — *Baglivi*, pag. 103. & 107.)

ESPECE II.

IV. CLASSE, ORDRE. I.

41

ESPECE II. Asthme convulsif par des vapeurs métalliques. (*Asthma convulsivum à fumis metallicis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 96.)

ESPECE III. Asthme spasmodique, avec des vents qui se dégagent en grande abondance, des aliments contenus dans les premières voies. (*Asthma spasmodico-flatum*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 96.)

ESPECE IV. Asthme hystérique. (*Asthma hystericum*, Baglivi, pag. 202. — *Asthme hysterique*, Floyer, traité de l'asthme, pag. 22.)

ESPECE V. Asthme pituitex. (*Asthma pituitosum*. — *Asthma intermittens*, Carol. Pif. de morb. à coll. serof. pag. 212. — *Asthma pituitosum*, Fred. Hoffm. tom. III. p. 94. — *Asthma humoralis*, Baglivi, pag. 104. — *Asthme flatueux*, Floyer, traité de l'asthme.)

ESPECE VI. Asthme sanguin. (*Asthma sanguineum*. — *Asthma spasmodico-sanguineum*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 95.)

GENRE XVII. Dyspnée. — Difficulté de respirer, de longue durée, sans soudainement de constriction vers la trachée-artère, sans intermittence, ni signes d'empyème ou d'hydropisie. (*Dyspnæa*, Plater. prax. med. tom. I. pag. 338.)

ESPECE I. Dyspnée catarrhale avec redoublement. (*Dyspnæa gravissima ab illuvie serofâ*, Carol. Pif. de morb. à coll. serof. pag. 244.)

ESPECE II. Dyspnée catarrhale sans redoublement. (*Dyspnæa catarrhalis*. — *Asthma continuum*, Carol. Pif. de morb. à coll. serof. pag. 226.)

ESPECE III. Dyspnée par l'affection des viscères de l'abdomen. (*Dyspnæa à visceribus vitiatis motum sepius liberum impeditibus*, Plater. prax. med. tom. I. pag. 366.)

ESPECE IV. Dyspnée par des matières fluides en trop grande quantité dans l'abdomen. (*Dyspnæa ab humore aquoso abdomen distendente*, Plater. prax. med. tom. I. pag. 365.)

ESPECE V. Dyspnée par l'air contenu en trop grande quantité dans l'estomac & les intestins. (*Dyspnæa à flatibus abdomen impletibus*, Plater. prax. med. tom. I. pag. 365.)

ESPECE VI. Difficulté de respirer des femmes grosses. (*Burton*, syst. des accouchem. tom. I. pag. 247.)

GENRE XVIII. Rhume. — Difficulté de respirer plus ou moins considérable, avec toux, & pour l'ordinaire avec enrouement & enchirrément. (*Rheuma*, Sauvag. nosol. meth. tom. I. pag. 686.)

ESPECE I. Rhume par l'impression d'un air trop froid. (*Rheuma catarikale*, Sauvag. nosol. meth. tom. I. pag. 687.)

ESPECE II. Grippe. — Rhume épidémique. (*Rheuma epidemicum*, Sauvag. nosol. meth. tom. I. pag. 688.)

GENRE XIX. Toux. — Expiration sonore, prompte, avec mouvement violent & involontaire de la poitrine. (*Tussis*, Lomm. observ. med. pag. 157. — *Tussis*, Senn. tom. III. pag. 344. — *Tussis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 109. — *Tussis*, Baglivi pag. 114. — *Tussis*, Morgagni, de sed. morb. tom. I. pag. 190.)

42 *IV. CLASSE, ORDRE I.*

ESPECE I. Toux catarrhale. (*Tussis catarrhalis*. — *Tussis ab aere frigido*, *Senn.* tom. III. pag. 345. — *Tussis catarrhalis levior*, *Fred. Hoffm.* tom. III. pag. 110. 111.)

ESPECE II. Toux rhumatismale. (*Tussis rheumatica ex causa interna*, *Fred. Hoffm.* tom. III. pag. 111.)

ESPECE III. Toux rhumatismale de-cause externe. (*Tussis ab illuvie serosa*, *Carol. Pif.* de *morb. à coll. serosa*, pag. 199. — *Tussis rheumatica*, *Fred. Hoffm.* tom. III. pag. 111.)

ESPECE IV. Coqueluche. — Toux vive, fréquente, ordinairement suivie de vomissement, revenant comme par accès, attaquant particulièrement les enfants, & souvent épidémique. (*Tussis convulsiva seu ferina*, *Fred. Hoffm.* tom. III. pag. 111.)

ESPECE V. Toux flomachale. (*Tussis flomachalis*, *Fred. Hoffm.* tom. III. pag. 112.)

ESPECE VI. Toux hypocondriaque. (*Tussis hypocondriaca*, *Fred. Hoffm.* tom. III. pag. 112.)

ESPECE VII. Toux épidémique. (*Tussis epidemica*, *Sydenh.* tom. I. pag. 150.)

ESPECE VIII. Toux habituelle. (*Tussis habitualis*, *Fred. Hoffm.* tom. III. pag. 112.)

ESPECE IX. Toux par un corps étranger dans la trachée-artère. (*Tussis à peregrinis in asperam arteriam illabentibus*, *Fred. Hoffm.* tom. III. pag. 110.)

ESPECE X. Toux des fondeurs. (*Tussis metallicolatum*, *Fred. Hoffm.* tom. III. p. 110.)

ESPECE XI. Toux des enfants. — Toux seche des enfants, avec difficulté de respirer, & crainte de suffocation, quelquefois épidémique, souvent produite par la dentition trop difficile. (*Tussis aut asthma infantum*, *Fred. Hoffm.* tom. III. pag. 495.)

GENRE XX. *Gémissement*. — Expiration sonore, lente & involontaire, produite par la douleur. (*Gemitus*.)

GENRE XXI. Expiration involontaire d'un son très-fort, produite par la douleur. (*Vociferatio*, *Linn. gen. morb. gen.* 147.)

GENRE XXII. *Hoquet*. — Inspiration sonore, prompte & pour l'ordinaire répétée. (*Singultus*, *Senn.* tom. IV. pag. 399. — *Singultus*, *Morgagni*, de *sed. morb.* tom. II. pag. 12.)

ESPECE I. Hoquet par la trop grande quantité d'aliments. (*Singultus à nimia ali-*
mentorum quantitate, *Fred. Hoffm.* tom. III. pag. 124.)

ESPECE II. Hoquet par le dérangement des os de la poitrine. (*Singultus ab ossarum partiū mala conformatio*nē, *Fred. Hoffm.* tom. III. pag. 125.)

ESPECE III. Hoquet par inanition. (*Singultus ab inanitione*, *Fred. Hoffm.* tom. III. pag. 125.)

ESPECE IV. Hoquet par l'impression de l'air froid. (*Singultus ab aere frigido*, *Fred. Hoffm.* tom. III. pag. 124.)

ESPECE V. Hoquet chronique. (*Singultus chronicus*, *Fred. Hoffm.* tom. III. pag. 125.)

ESPECE VI. Hoquet depuis la naissance.

ESPECE VII. Hoquet par la répercussion d'une matière acré cutanée. (*Singultus à materiā acri cutanea repercutā*, *Frederic. Hoffm.* tom. III. pag. 124.)

ESPECE VIII. Hoquet par la mauvaise qualité des humeurs contenues dans l'estomac.

GENRE XXIII. Éternuement. — Expiration par les narines, vive, subite & sonore, avec mouvement violent & involontaire de la tête & du tronc. (*Sternutatio.*)

ESPECE I. Éternuement par l'irritation de l'humeur qui revêt la membrane pituitaire. (*Sternutatio à caufis internis*, Senn. tom. III. pag. 250.)

ESPECE II. Eternuement par l'action des corps extérieurs. (*Sternutatio à caufis externis*, Senn. tom. III. pag. 250.)

GENRE XXIV. Ronflement. — Respiration sonore, grande, forte, avec mouvement plus ou moins sensible des ailes du nez. (*Stertor*, Plater. prax. med. tom. III. pag. 581.)

GENRE XXV. Ris. — Mouvements rapides & involontaires des muscles du visage, avec expiration sonore plus ou moins forte, accompagnée d'un sentiment de joie. (*Rifus.*)

ORDRE SECOND.

Convulsions particulières. — Mouvements involontaires, & plus ou moins rapides d'une partie du corps.

GENRE I. Palpitation du cœur. — Pulsion du cœur, plus grande & plus précipitée que dans l'état naturel, plus forte à proportion, que la pulsation de l'artère, & très-souvent intermittente. (*Palpitatio cordis*. — *Palpitation du cœur*, Senac trait. du cœur, tom. II. pag. 481. — *Palpitatio cordis*, Morgagni, de sed. morb. tom. I. pag. 235.)

ESPECE I. Palpitation par défaut de sang. (*Palpitatio ex defectu sanguinis*, Fred. Hoff. tom. III. pag. 87.)

ESPECE II. Palpitation du cœur par les passions de l'âme. (*Palpitatio ab animi affectibus*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 87. — *Palpitation produite par les passions*, Senac trait. du cœur, tom. II. pag. 486.)

ESPECE III. Palpitation par maladie des poumons. (*Senac trait. du cœur*, tom. II. pag. 488.)

ESPECE IV. Palpitation par l'estomac affecté. (*Senac trait. du cœur*, tom. II. p. 492.)

ESPECE V. Palpitation par les différentes parties de l'abdomen affectées. (*Senac trait. du cœur*, tom. II. pag. 494.)

ESPECE VI. Palpitation par l'abondance des humeurs. (*Palpitatio humorum abundans*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 86.)

44 ***IV. CLASSE, ORDRE II.***

ESPECE VII. Palpitation par les vices du cœur. (*Palpitatio à polypo cordis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 85. — *Palpitation par les vices de la substance du cœur*, Senac, trait. du cœur, tom. II. pag. 483.)

ESPECE VIII. Palpitation du cœur par les vices des artères.

GENRE II. Souris. — Contraction involontaire & irrégulière, soit des paupières, soit du globe de l'œil, soit de l'uvée. (*Nystagmus*.)

ESPECE I. Mouvement rapide des paupières, par la convulsion essentielle des muscles des paupières. (*Palpitatio palpebrarum*, Senn. tom. III. pag. 201.)

ESPECE II. Mouvement rapide des paupières par un corps étranger dans l'œil. (*Palpebrarum nictitatio frequentissima*. — *Hippos*, Linn. gen. morb. gen. 137.)

ESPECE III. Mouvement rapide & involontaire du globe de l'œil, par convulsion essentielle des muscles du globe de l'œil.

ESPECE IV. Mouvement rapide & involontaire du globe de l'œil, par l'irritation d'un corps étranger sur le globe de l'œil.

GENRE III. Grincement de dents. — Mouvement rapide & involontaire des mâchoires, avec choc des dents. (*Stridor dentium*, Senn. tom. III. pag. 267.)

ESPECE I. Grincement de dents par un coup violent sur la tête.

ESPECE II. Grincement de dents par le froid. (*Stridor dentium à frigore*, Senn. tom. III. pag. 267.)

ESPECE III. Grincement de dents par les vers. (*Stridor dentium à vermis*, Senn. tom. III. pag. 267.)

GENRE IV. Bégaiement. — Difficulté de prononcer distinctément certaines syllabes & certains mots. (*Balbuties*. — *Balbuties*, Morgagni, de *fedibus morb.* tom. I. pag. 121. — *Bégaiement*, Brouzet, *educ. med. des enf.*, tom. II. pag. 253.)

ESPECE I. Bégaiement par une trop grande précipitation à parler. (*Brouzet, educ. med. des enf.*, tom. II. pag. 253.)

ESPECE II. Bégaiement par une abondance de séroïtés, dans les organes de la parole. (*Brouzet, educ. med. des enf.*, tom. II. pag. 253.)

ESPECE III. Bégaiement par des tumeurs qui viennent à côté, ou sous la langue. (*Brouzet, educ. med. des enf.*, tom. II. pag. 254.)

ESPECE IV. Bégaiement par le filer de la langue trop court ou trop grand. (*Brouzet, educ. med. des enf.*, tom. II. pag. 253.)

GENRE V. Bredouillement. — Réunion rapide de plusieurs syllabes, en parlant, sans les ranger chacune à leur place. (*Bredouillement*, Brouzet, *educ. med. des enf.*, tom. II. pag. 257.)

GENRE VI. Difficulté de parler, & d'élever la voix, avec sons pénibles & désagréables à l'oreille. (*Paraphonia*, Sauv. nos. meth. tom. I. pag. 783.)

ORDRE TROISIEME.

SPASME. — Contraction constante & involontaire dans plusieurs parties du corps, avec immobilité, ou peu de mouvement.
(*Spasmus.*)

GENRE I. *Catalepsie.* — Abolition de tous les sens, pouls & respiration peu sensibles, disposition des membres à prendre & à conserver la situation donnée. (*Catalepsis, Cael. Aurelian. de morb. tom. I.* pag. 108. — *Catalepsis, Lomm. obf. med. pag. 87.* — *Catalepsis, Senn. tom. III.* pag. 153. — *Catalepsis, Fred. Hoffm. tom. III.* pag. 44. — *Catalepsis, Boëth. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 1036.*)

ESPECE I. Catalepsie par les passions de l'âme. (*Catalepsis ab animi pathematisbus, Fred. Hoffm. tom. III.* pag. 47.)

ESPECE II. Catalepsie par les vers. (*Catalepsis à vermis, Fred. Hoffm. tom. III.* pag. 47.)

ESPECE III. Catalepsie hysterique. (*Catalepsis hysterica, Sauvag. nosol. meth. tom. I.* pag. 825.)

GENRE II. Rigidité de tout le corps de longue durée, avec respiration peu sensible, pouls petit & faible, & impossibilité au corps de changer de figure, aussi-tôt qu'il a été affecté de spasme. (*Catochus, Paul. Aegin. de remed. lib. III. cap. 10.*)

GENRE III. *Tetanos.* — Rigidité de tout le corps avec respiration difficile & intégrité des sens. (*Tetanus. — Tetanus seu rigor, Aretaus, de morb. pag. 5.*)

ESPECE I. Tetanos par le froid. (*Tetanus à frigore, Aretaus, de morb. pag. 5.*)

ESPECE II. Tetanos par une blessure. (*Tetanus à vulnera, Aretaus, de morb. pag. 5.*)

ESPECE III. Tetanos par avortement. (*Tetanus ex abortu, Aretaus, de morb. pag. 5.*)

ORDRE QUATRIEME.

SPASMES particuliers. — Contraction constante & involontaire d'une partie du corps.

GENRE I. Immobilité du globe de l'œil, par la contraction involontaire & constante des muscles de l'œil. (*Impotentia oculos voluntandi, Plater. prax. med. tom. I.* pag. 289.)

46 *IV. CLASSE, ORDRE IV.*

GENRE II. Immobilité des paupières par la contraction involontaire & constante des muscles des paupières. (*Palpebrarum instabilitas*, *Senn. tom. III.* pag. 201.)

GENRE III. *Strabisme.* — Contraction constante & involontaire des muscles de l'un & de l'autre œil, telle qu'elle ne leur permet pas d'avoir pour le même objet, le même axe optique. (*Strabismus*, *Senn. tom. III.* pag. 224. — *Strabisme*, *Levret*, art. des acc. pag. 272.)

ESPECE I. Strabisme par une grande faiblesse de vue, dans l'un ou l'autre œil, ou dans tous les deux. (*Obf. de méd. d'Edim. tom. III.* pag. 298.)

ESPECE II. Strabisme par habitude. (*Obf. de méd. d'Edim. tom. III.* pag. 289.)

ESPECE III. Strabisme par la situation oblique du crystallin. (*Obf. de méd. d'Edim. tom. III.* pag. 292.)

GENRE IV. Impossibilité d'éloigner la mâchoire inférieure de la supérieure, avec contraction constante & involontaire, salivation plus ou moins abondante, & insomnie. (*Trismos*, *Plater. prax. med. tom. I.* pag. 288.)

ESPECE I. Immobilité catarrhale de la mâchoire inférieure. (*Trismus catarrhalis*, *Sauvag. nos. meth. tom. I.* pag. 534.)

ESPECE II. Immobilité de la mâchoire inférieure par blessure, ou ulcère de la bouche.

ESPECE III. Immobilité de la mâchoire inférieure par virus scorbutique. (*Immobilis maxillæ inferioris scorbutica*, *Senn. tom. III.* pag. 270.)

ESPECE IV. Immobilité de la mâchoire inférieure par des tumeurs proche de l'articulation. (*Immobilis maxillæ inferioris à tumoribus circa articulum*, *Senn. tom. III.* pag. 270.)

ESPECE V. Immobilité ou mouvement peu sensible de la mâchoire des nouveaux nés. (*Spasmus maxillæ in infantibus*, *Heijl. compend. med. pag. 337.*)

GENRE V. *Rigidité de la langue.* — Immobilité de la langue, de manière que ni le malade, ni les assistants ne peuvent facilement la flétrir. (*Convulsio linguae*, *Senn. tom. III.* pag. 253.)

GENRE VI. *Crampe.* — Contraction violente, prompte, douloureuse & de peu de durée, d'un, ou de plusieurs muscles des extrémités. (*Campus*. — *Spasmus flatulentus*, *Senn. tom. III.* pag. 146.)

ESPECE I. Crampe essentielle. (*Spasmus flatulentus*, *Plater. prax. med. tom. I.* pag. 286.)

ESPECE II. Crampe des femmes grosses.

ESPECE III. Crampe sympathique. (*Crampus sympatheticus*, *Sauvag. nos. meth. tom. I.* pag. 540.)

IV. CLASSE, ORDRE IV. 47

GENRE VII. Renversement involontaire & constant de la langue dans le gosier. (*Petit, Mémoire de l'Acad. des Sciences, année 1742.*)

GENRE VIII. *Angine convulsive.* — Impossibilité ou difficulté considérable d'avaler, avec difficulté de respirer, fièvre & sentiment de constriction violente au gosier, sans apparence d'inflammation dans l'arrière-bouche. (*Angina convulsiva, Boërh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 818.*)

GENRE IX. *Maladie spasmotique de l'œsophage & du pharynx.* — Déglutition difficile & souvent impossible des aliments, particulièrement des boissons froides, avec douleur dans le pharynx, ou le long de l'œsophage. (*Morbus œsophagi & pharyngis spasmoticus, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 130.*)

ESPECE I. Affection spasmotique du pharynx & de l'œsophage par dégoût. (*Affectus spasmoticus pharyngis & œsophagi à fastidio, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 132.*)

ESPECE II. Affection spasmotique du pharynx & de l'œsophage par des aliments acres. (*Spasmus œsophagi & pharyngis ab assumptis acribus, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 135.*)

ESPECE III. Affection spasmotique de l'œsophage par l'impureté des matières contenues dans les premières voies. (*Spasmus œsophagi ex vito primarum viarum, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 133.*)

ESPECE IV. Affection spasmotique du pharynx & de l'œsophage par les passions de l'âme. (*Spasmus œsophagi ab animi affectibus, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 132.*)

GENRE X. *Torticulis.* — Immobilité du col, ou difficulté très-grande de le mouvoir. (*Obstipitas.*)

ESPECE I. Immobilité du col par rhumatisme. (*Immobilitas colli ab humore rheumatico.*)

ESPECE II. Immobilité catarrhale du col. (*Obstipitas catarrhalis, Sauvag. nosf. meth. tom. I. pag. 536.*)

GENRE XI. Contraction constante & involontaire des muscles abdominaux. (*Spasmus abdominis, Senn. tom. IV. pag. 620.*)

GENRE XII. *Priapisme.* — Gonflement & tension de la verge, constante, involontaire, de plus ou moins longue durée, sans désir du coït. (*Priapismus, Senn. tom. IV. pag. 612.*)

ESPECE I. Priapisme par la présence d'un calcul dans la vessie. (*Priapismus dysuricus, Sauvag. nosf. meth. tom. I. pag. 540*)

ESPECE II. Priapisme par la gonorrhée virulente. (*Priapismus à virofâ gonorrhæa, Plater. prax. med. tom. I. pag. 567.*)

ESPECE III. Priapisme par un coït trop répété, ou par un excès de masturbation.

ESPECE IV. Priapisme par les mouches cantharides. (*Priapismus à cantharidibus, Sauvag. nosf. meth. tom. I. pag. 541.*)

ESPECE V. *Satyriasis.* — Priapisme avec inflammation des parties génitales, & convulsion des cuisses. (*Satyriasis, Aetæus, de morb. pag. 46. & 212.*)

GENRE XIII. Gonflement & tension du clitoris, involontaires, de plus ou moins longue durée, & sans désir pour l'acte vénérien.

ESPECE I. Gonflement & tension du clitoris par gonorrhée.

ESPECE II. Gonflement & tension du clitoris par un frottement trop réitéré, ou un coït trop répété.

ESPECE III. Gonflement & tension du clitoris par les mouches cantharides.

GENRE XIV. *Suffocation de la matrice.* — Constriction spasmodique du col de l'utérus, avec gonflement de la matrice, prompt, circonscrit, ordinairement sans fièvre. (*Suffocation de la matrice, Levret, art. des accouchements, pag. 157.*)

ESPECE I. Suffocation hysterique de la matrice.

ESPECE II. Suffocation de la matrice après l'accouchement, avec suppression des lochies. (*Levret, art. des accouch. pag. 157.*)



CINQUIEME CLASSE. MALADIES DE L'ESPRIT. *MORBI MENTALES.*

ORDRE PREMIER.

VICES de l'Imagination. (*Imaginationis vitia.*)

GENRE I. *Délire.* — Succession d'idées qui ne répondent point aux impressions que les objets extérieurs doivent produire sur des sens bien organisés. (*Delirium.* — *Delirium*, Senn. tom. III. pag. 83. — *Delirium*, Morgagni de sedib. morb. tom. I. pag. 53.)

ESPECE I. *Délire essentiel.* (*Delirium simplex*, Senn. tom. III. pag. 84.)

ESPECE II. *Délire symptomatique.* (*Delirium febrile*, Boérh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 700.)

GENRE II. *Tristesse.* — Etat douloureux de l'imagination, par la privation d'un objet cher, avec indifférence pour tout ce qui lui est étranger, langueur, œil abattu, teint plus ou moins pâle, & diminution des forces musculaires. (*Tristitia.*)

ESPECE I. *Chagrin.* — Etat douloureux de l'imagination, produit par des obstacles multiples, avec mauvaise humeur.

ESPECE II. *Affliction.* — Etat très-douloureux de l'imagination fortement émué par la perte d'un objet cher, avec abattement des forces & souvent avec pleurs.

ESPECE III. *Désolation.* — Agitation très-douloureuse de l'imagination vivement frappée par la perte imprévue d'un objet cher, avec sanglots & cris inarticulés.

ESPECE IV. *Accablement.* — Abattement douloureux de l'imagination par des grands malheurs réels ou imaginaires, avec diminution considérable des forces vitales & musculaires.

GENRE III. *Mélancolie.* — Attachement constant & opiniâtre de l'imagination à un seul objet, avec tristesse, sans fièvre, & sans dépravation du jugement ni de l'imagination sur les autres objets. (*Melancholia.* — *Melancholia*, Senn. tom. III. pag. 90. — *Melancholia*, Fred. Hoffm. tom. III. p. 251. — *Melancholia*, Boérh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 1089. — *Melancholia*, Morgagni de sedib. morb. tom. I. pag. 56.)

ESPECE I. *Mélancolie par les passions de l'ame.* (*Melancholia à cerebro affecto*, Senn. tom. III. pag. 93. — *Melancholia ab animi pathematus*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 253.)

V. CLASSES, ORDRE I.

50. ESPECIE II. Melancolie par un écoulement trop abondant de semence. (*Melancholia à nimis feminis profusione*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 254.)

ESPECIE III. Melancolie hypocondriaque, ou hystrérique. (*Melancholia hypocondriaca*, Sena. tom. III. pag. 101. — *Melancholia à malo hypocondriaco*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 255.)

ESPECIE IV. Melancolie par dépravation du flux ménstruel. (*Melancholia ex utero*, Sena. tom. III. pag. 106.)

ESPECIE V. Melancolie dans laquelle le malade court sans cause, & sans savoir où il veut aller, particulièrement dans le mois de Février. (*Melancholia errabunda*, Sena. tom. III. pag. 107.)

ESPECIE VI. Melancolie dans laquelle le malade est comme stupide & ne veut point changer de place. (*Melancholia attonata*, Sena. tom. III. pag. 107.)

ESPECIE VII. Désouït de soi-même & des choses, qui tend la vie insupportable. (*Tedium vitae*. — *Sidnei*, Gresser.)

ESPECIE VIII. *Misanthropie*. — Disposition habituelle de l'imagination, qui porte à hâter les hommes, à s'irriter de leurs moindres imperfections & à les tuer. (*Le Misanthrope*, Molière.)

ESPECIE IX. *Le Plaintif*. — Caractère toujours porté à être mécontent des événements, & à gémir sans cause sur les moindres circonstances.

GENRE IV. *Passion hystrérique*. — Crainte continue de la mort chez les femmes, avec sensibilité extrême, mouvements convulsifs passagers, & pour l'ordinaire avec abondance d'urine limpide, après ou avant l'accès. (*Affection hysterica*, Sydenh. tom. I. pag. 256. — *Affection spasmodico-convulsiva ex uteri vitio*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 50.)

ESPECIE I. Passion hystrérique par oïstivité.

ESPECIE II. Passion hystrérique par dérangement du flux ménstruel. (*Malum hystericum à vitio flubris menstruali*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 54.)

ESPECIE III. Passion hystrérique par suppression des fleurs blanches. (*Passio hysterica ex suppresse fluore albo*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 63.)

ESPECIE IV. Passion hystrérique par suppression des loches. (*Passio hysterica ex lochis suppressis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 61.)

ESPECIE V. Passion hystrérique des femmes enceintes, & des femmes nouvellement accouchées. (*Passio hysterica gravidarum ac puerorum*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 54.)

ESPECIE VI. Passion hystrérique par amour, ou par des violents désirs. (*Malum hystericum à stimulis venereis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 53.)

ESPECIE VII. Passion hystrérique par le chagrin.

GENRE V. *Affection hypocondriaque*. — Crainte continue de la mort chez les hommes, avec palpitation de cœur, borborygmes & autres symptômes qui reviennent ordinairement par accès plus ou moins violents. (*Passio hypochondriaca*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 64.)

ESPECIE I. Affection hypocondriaque par oïstivité.

ESPECE II. Affection hypocondriaque par amour, ou par des violents deuirs,
(*Patio hypocondriaca à stimulis venereis*)

ESPECE III. Affection hypocondriaque par le chagrin.

GENRE VI. *Folie*. — Erreur de l'imagination sur un ou sur plusieurs objets, sans fureur, ni fièvre, ni dépravation apparente des sens. (*Stultitia*)

GENRE VII. *Manie*. — Erreur de l'imagination sur un ou sur plusieurs objets, avec fureur ou hardiesse, sans fièvre. (*Mania*, *Senn. tom. III. pag. 108.* — *Mania*, *Fred. Hoffm. tom. III. pag. 252.* — *Mania*, *Boëth. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 1118.* — *Mania*, *Morgagni, de sed. morb. tom. I. pag. 54. tom. II. pag. 405.*)

ESPECE I. Manie par amour. (*Mania ab amore*, *Senn. tom. III. pag. 109.*)

ESPECE II. Manie chronique & furieuse, avec la crainte des démons. (*Daemonia*, *Linn. gener. morb. gen. 69.*)

ESPECE III. Manie par suppression d'une évacuation sanguine. (*Mania à sanguinis suppressione*, *Fred. Hoffm. tom. III. pag. 255.*)

ESPECE IV. Manie par disposition héréditaire. (*Mania à disposition hereditaria*, *Fred. Hoffm. tom. III. pag. 254.*)

ESPECE V. Manie par un dépôt de lait sur le cerveau. (*Puer*, *Traité des Accouch. pag. 387.*)

ESPECE VI. Manie par des substances narcotiques. (*Mania à narcoticis*, *Fred. Hoffm. tom. III. pag. 254.*)

ESPECE VII. Manie par des fièvres intermittentes. (*Mania à febribus intermissionibus diuturnioribus*, *Sydenham, tom. I. pag. 61.*)

GENRE VIII. *Lubricité*. — Désir excessif de l'homme pour l'acte vénérien. (*Salacitas*, *Senn. tom. IV. pag. 611.*)

ESPECE I. Penchant continual à l'acte vénérien, avec érection. (*Satyrus*, *Carlus Aurelianus, tom. I. pag. 286.* — *Satyrus*, *Senn. tom. IV. pag. 612.*)

ESPECE II. Penchant continual à l'acte vénérien, sans érection.

GENRE IX. Désir immoderé de la femme pour le coït. (*Appetitus Veneris in feminis*, *Senn. tom. IV. pag. 655.*)

ESPECE I. Appétit pour l'acte vénérien, avec démangeaison des parties naturelles. (*Pruritus uteri*, *Senn. tom. IV. pag. 653.*)

ESPECE II. Intempérie chaude de l'utérus. (*Intempuries uteri calida*, *Senn. tom. IV. pag. 633.*)

ESPECE III. Fureur utérine. — Désir furieux du coït chez les femmes. (*Furor uterinus*, *Senn. tom. III. pag. 111.*)

GENRE X. *Le Voluptueux*. — Caractère continuellement porté à la recherche & à la jouissance des plaisirs réels ou imaginaires.

ESPECE I. *Molleffe*. — Disposition habituelle à favoriser tranquillement les plaisirs des sens, avec répugnance à faire le moindre effort pour se les procurer.

52 V. CLASSE, ORDRE I.

ESPECE II. *Effeminé*. — Caractère toujours enclin à vivre à la manière des femmes, & dans leur société, avec faiblesse invincible de l'esprit & des sens.

GENRE XI. *Sensualité*. — Disposition invincible & habituelle des sens & de l'imagination pour les objets qui leur causent des impressions agréables, avec désir continual de la jouissance.

ESPECE I. *Gourmandise*. — Penchant invincible & habituel à rechercher les mets les plus exquis, avec désir avide & excessif de manger, sans éprouver le sentiment du besoin.

ESPECE II. *Ivrognerie*. — Penchant invincible & habituel à boire des liqueurs spiritueuses, ordinairement accompagné d'abrutissement, d'une soif continue, & de dégoût pour les aliments solides. (*Ebriositas*.)

GENRE XII. *Somnambulisme*. — Disposition habituelle à faire en dormant, des actes qui ne sont propres qu'à l'homme éveillé. (*Somnambulismus*. — *Somnambuli*, *Senn. tom. III. pag. 120.*)

GENRE XIII. Vue d'un objet qui n'existe pas. (*Visus depravatio quæ res non existentes oculis observari videntur*, *Senn. tom. III. pag. 228.* — *Imaginations perpétuelles de l'œil*, *Maitre-Jan*, *Mal. de l'œil*, *pag. 256.* — *Repræsentatio objectorum quæ non sunt*, *Boërh. de morb. ocul. pag. 66*)

ESPECE I. *Vue double*. — Affection des yeux, qui fait voir double tous les objets. (*Viso geminata*, *Senn. tom. III. pag. 228.*)

GENRE XIV. *Ivreſſe*. — Erreur passagere de l'imagination sur plusieurs objets, avec intrépidité, souvent sans fièvre & quelquefois avec fureur, suivie d'une privation plus ou moins grande des sens.

ESPECE I. Ivreſſe par les boissons spiritueuses. (*Ebrietas*. — *Temulentia*, *Senn. tom. III. pag. 86.*)

ESPECE II. Ivreſſe par les substances vénéneuses. (*Temulentia à venenis vel medicamentis narcoticis*, *Senn. tom. III. pag. 86.*)

ESPECE III. Ivreſſe par les substances odorantes.

GENRE XV. *Abattement d'esprit*. — Inaction de l'imagination, avec diminution de force & de courage.

ESPECE I. Privation d'imagination. (*Morosis*, *Linn. gener. Morb. gen. 106.*)

ESPECE II. *Apathie*. — Faiblesse d'imagination avec cessation de toutes passions.

GENRE XVI. *Inquiétude*. — Agitation douloureuse de l'imagination, par mécontentement de l'état présent, ou par incertitude de l'état à venir, accompagnée de mouvements du corps involontaires & plus ou moins violents, souvent avec insomnie. (*Inquietudo*, *Senn. tom. III. pag. 127.*)

ESPECE I. *Souci*. — Agitation douloureuse de l'imagination par incertitude des événements à venir, avec vive crainte qu'ils ne soient pas tels qu'on les desire.

GENRE XVII. *Crainte.* — Secousse plus ou moins vive de l'imagination, avec inquiétude & trouble, à la vue d'un danger, ou d'un objet qu'on redoute. (*Timor.*)

ESPECE I. *Terror.* — Secousse très-violente de l'imagination & des sens, à la vue d'un péril éminent, ou par la vive impression d'un objet dangereux & extraordinaire. (*Terror.*)

ESPECE II. *Effroi.* — Saisissement subit & violent, à la vue d'un objet affreux, ou d'un péril inattendu, avec frisson & immobilité passagère des sens.

ESPECE III. *Alarme.* — Agitation violente de l'imagination, à l'approche imprévue d'un péril éminent qu'on croyoit éloigné, accompagnée de cris & de mouvements du corps incertains & précipités.

ESPECE IV. *Épouvanter.* — Mouvement inquiet & rapide de l'imagination, à l'approche subite d'un objet dangereux ou effrayant, avec empressement de fuir. (*Pavor.*)

ESPECE V. *Frayeur.* — Secousse vive & passagère de l'imagination & des sens, à l'aspect d'un danger inattendu, ou par l'impression subite d'un objet sur les sens.

ESPECE VI. *Le Peureux.* — Caractère toujours disposé à s'effrayer, sans cause évidente, principalement pendant la nuit & dans l'obscurité; fréquent chez les femmes & chez les enfants. (*Pavor in somno. Sennert. Tom. IV. pag. 772.*)

ESPECE VII. *Lâcheté.* — Mouvement inquiet de l'imagination, habituel ou passager, qui porte à fuir à l'approche du danger qu'il faudroit vaincre.

ESPECE VIII. *Poltronerie.* — Mouvement inquiet de l'imagination, habituel ou passager, qui empêche d'aller au devant du péril qu'il faut surmonter.

ESPECE IX. *Appréhension.* — Disposition habituelle à prévoir des événements nuisibles, ou contraires au but qu'on se propose.

ESPECE X. *Puillanimité.* — Disposition habituelle de l'imagination, qui porte à manquer de courage & de fermeté, même dans les circonstances les moins difficiles.

ESPECE XI. *Timidité.* — Etat habituel de l'imagination qui fait crainte de paraître & de parler devant les autres hommes; souvent avec contenance contrainte & embarrassée, voix faible & confusion dans les idées. (*Le Legs, Marivaux.*)

ESPECE XII. *Le Craintif.* — Caractère inquiet, toujours disposé à hésiter à l'approche des plus légers obstacles, avec défaillance de les forcés pour les surmonter.

GENRE XVIII. *Ennui.* — Etat d'une imagination active, qui n'est plus attachée à aucun objet & ne fait à quoi se fixer, avec dégoût invincible pour tout ce qui est à sa portée, désir continual de sortir de cet état, langueur & bâillements réitérés. (*Tedium.*)

GENRE XIX. *Maladie du pays.* — Désir continual & excessif de revoir sa patrie, avec mélancolie. (*Meyseray, Med. d'arm. tom. I. pag. 105.*)

GENRE XX. *Désespoir.* — Agitation violente & très-douloureuse de l'imagination, par la perte imprévue d'un objet cher, ou par la forte persuasion de ne pouvoir obtenir un bien vivement désiré, ou par

54
l'attente de grands malheurs prochains ; souvent avec ardent sur soi-même, ou avec dessein de le donner la mort.

GENRE XXI. Espérance. — Mouvement agréable & habituel d'une imagination qui se persuade sur les plus légères apparences, qu'elle parviendra à la possession de l'objet de ses désirs, & qui s'occupe sans cesse du plaisir qu'elle aura d'en jouir. (*Spes.*)

GENRE XXII. Ambition. — Desir habituel & sans cesse actif, de toujours s'élever à un état supérieur, avec inquiétude, air pensif, pouls accéléré, fréquemment avec insomnie. (*Ambitio.* — *L'Ambitieux, Deslouches.*)

GENRE XXIII. Le Chimérique. — Caractere sans cesse porté à ensanter des idées ou des projets éloignés de la vraisemblance, avec le plaisir de s'en repaître & d'en imaginer la réalité.

ESPECE I. L'Etravagant — Caractere dont les idées rapides s'écartent toujours de la réalité des objets.

ESPECE II. Le Malade imaginaire. — Caractere toujours disposé à se supposer des maladies, & à goûter le plaisir de s'en plaindre & d'en persuader les autres. (*Le Malade imaginaire, Molière.*)

GENRE XXIV. Envie. — Disposition habituelle à voir avec peine les autres jouir des biens & des avantages qu'on ne possède pas soi-même, avec haine & désir continual de les en voir privés & d'en jouir, souvent avec mélancolie, maigreur & diminution des forces vitales.

GENRE XXV. Jalouſie. — Disposition habituelle à vouloir posséder seul, accompagnée d'inquiétudes, & d'aversion plus ou moins violente contre ceux qu'on soupçonne de prétendre aux mêmes possessions : avec efforts continuels pour les empêcher d'y parvenir, souvent avec agitation, fureur, pâleur & insomnie.

ESPECE I. Jalouſie par amour. (*L'Ecole des Maris, Molière.*)

ESPECE II. Jalouſie par vanité.

ESPECE III. Jalouſie par intérêt.

GENRE XXVI. Amour. — Etat de l'imagination vivement & agréablement préoccupée en faveur d'un objet, avec préférence entière & exclusive. (*Amor.*)

ESPECE I. Amour entre personnes de différentes sexes. — Mouvement ardent & continu de l'imagination, pour la possession entière de l'objet aimé, avec inquiétude, agitation & souvent insomnie.

ESPECE II. Amour intense. (*Amor insanus, Senn. tom. III. pag. 94. — Amor nimius, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 252.*)

ESPECE III. Amour-propre. — Mouvement agréable d'une imagination toujours occupée du contentement qu'on a de soi-même.

GENRE XXVII. *Orgueil.* — Etat de l'imagination fortement préoccupée du grand mérite qu'on s'attribue à soi-même, avec persuasion féconde de la supériorité qu'on prétend sur les autres.

ESPECE I. *Hauteur.* — Sentiment avantageux qu'en a de soi-même, de son rang ou de ses qualités, avec dédain sensible envers les autres.

ESPECE II. *Fierté.* — Disposition habituelle à faire sentir vivement à ceux qui voudraient nous rabaisser ou s'égaler à nous, la bonne opinion que nous avons de nous-mêmes.

ESPECE III. *Arrogance.* — Disposition habituelle à faire sentir aux autres par des paroles dures & des manières hautaines, la supériorité qu'on croit avoir sur eux.

ESPECE IV. *Le Dédaigneux.* — Caractère habituellement disposé à mépriser d'une manière sensible les qualités & les talents des autres, avec éloignement pour eux.

GENRE XXVIII. *Vanité.* — Mouvement constant & agréable d'une imagination sans cesse portée à étaler des avantages réels ou imaginaires, avec efforts continuels pour les faire admirer.

ESPECE I. *Prétention.* — Désir habituel d'occuper les autres de soi-même, & des qualités dont on veut se glorifier, avec efforts continuels pour prévaloir sur eux.

ESPECE II. *Affection.* — Etat de l'imagination continuellement occupée à plaire ou à attirer l'attention, par un étalage de sentiments, de pensées, & de manières élancées.

ESPECE III. *Coquetterie.* — Désir continué d'inspirer de l'amour à plusieurs par les grâces du corps & de l'esprit, en tâchant de persuader à tous en particulier des sentiments qu'on n'a pour aucun.

ESPECE IV. *Le Petit-Maitre.* — Caractère sans cesse occupé du désir & des moyens d'inspirer l'attention & l'admiration, par un ton avantageux, par un air libre, vif & léger, par une parure & des manières recherchées.

ESPECE V. *L'Amateur.* — Caractère sans cesse porté à rassembler & à accumuler les objets relatifs à une partie quelconque des Sciences ou des Arts, pour obtenir la réputation d'avoir ce qu'il y a de plus rare, & d'en connaître parfaitement le mérite & la valeur.

GENRE XXIX. *Vaine gloire.* — Etat habituel de l'imagination agréablement occupée à développer la marque de la supériorité qu'on prétend sur les autres, & à se repaire de la considération qu'on croit mériter. (*Le Glogueur, Desfouches!*)

ESPECE I. *Le Magnifique.* — Caractère sans cesse occupé à étaler la grandeur & la somptuosité pour captiver l'admiration. (*Le Magnifique, La Motte.*)

ESPECE II. *L'Imparante.* — Caractère sans cesse occupé à faire parade de la science, de la bonté, ou de la fortune.

ESPECE III. Caractère sans cesse occupé à affecter, ou à imiter le ton & les manières des personnes d'un rang plus élevé, & à se persuader d'en avoir le mérite. (*Le Bourgeois Gentilhomme, Molière.*)

ESPECE IV. *L'Avantageux.* — Caractère fortement prévenu d'une grande idée de soi-même, & toujours porté à en faire parade par les manières & par les discours.

ESPECE V. *Le Fanfaron.* — Caractère toujours disposé à faire parade de bravoure, ou à vanter ses succès réels ou supposés.

GENRE XXX. *Présumption.* — Disposition constante de l'imagination à se croire des vertus, ou des talents qu'on n'a pas.

ESPECE I. *Pédanterie.* — Présumption babillard qui porte à vouloir sans celle instruire ou reprendre les autres, en étalant la science ou l'érudition qu'on croit avoir. (*Les Femmes Savantes, Molière.*)

ESPECE II. *Suffisance.* — Disposition habituelle de l'imagination à s'admirer soi-même, & à le témoigner par des discours vains & emphatiques.

GENRE XXXI. *Métromanie.* — Disposition constante de l'imagination qui excite sans celle à créer de nouveaux ouvrages, à les admirer soi-même & à vouloir les faire admirer aux autres. (*La Métromanie, Piron.*)

GENRE XXXII. *Joie.* — Mouvement vif & agréable de l'imagination, par la jouissance d'un objet désiré, ou par la représentation d'un bien qu'on se flatte d'obtenir, souvent avec faisanement, transports & ris immorés. (*Lætitia.*)

GENRE XXXIII. *Vivacité.* — Mouvement rapide & habituel de l'imagination, avec prompte action, ou désir d'agir promptement.

ESPECE I. *L'Homme bouillant.* — Caractère toujours porté à suivre avec rapidité les mouvements ardents de son imagination, & à faire, sans aucune considération, les efforts les plus violents pour surmonter les obstacles; avec fremitement, rougeur du visage, & contraction des muscles, lorsqu'il ne peut les vaincre.

ESPECE II. *Brutalité.* — Disposition habituelle à manifester vivement son opposition par des paroles rudes & des actions violentes, sans considération des personnes.

ESPECE III. *Brusquerie.* — Disposition habituelle à s'exprimer promptement & lacinalement, avec un ton dur & incivil, sans égard aux personnes.

ESPECE IV. *Pétulance.* — Mouvement impétueux & presque continual de l'imagination & du corps, ordinairement habituel & sans cause évidente.

ESPECE V. *Etourderie.* — Disposition habituelle à agir vivement, sans réflexion, & ordinairement d'une manière contraire au but qu'on se propose. (*L'Etourdi, Molière.*)

ESPECE VI. *Le Téméraire.* — Caractère toujours porté à affronter les dangers les plus évidents, sans réflexion, ou sans motifs suffisants.

GENRE XXXIV. *Le Colérique.* — Caractère toujours disposé à s'émuvoir avec impétuosité & violence, à la moindre opposition, souvent avec paroles vives & sans ordre, avec regards fixes & menaçants, pâleur du visage & forte contraction des muscles.

ESPECE I. *Le Violent.* Caractère toujours disposé à s'émuvoir & à s'abandonner impétueusement à des paroles menaçantes, & à des actions vives contre ceux qui lui opposent le moindre obstacle, avec œil étincelant & rougeur du visage.

ESPECE II.

V. CLASSE, ORDRE I. 57

ESPECE II. *L'Emporié.* Caractere toujours disposé à s'irriter au moindre obstacle, & à s'abandonner par accès & sans réflexion à des paroles vives & véhémentes, avec éclats de voix & mouvements très-prompts du corps.

ESPECE III. *L'Impatient.* — Caractere inquiet & toujours disposé à avoir de l'humeur, au plus léger obstacle, avec paroles vives & coupées, trépignement & contraction des différentes parties du visage.

ESPECE IV. *Le Vindicatif.* — Caractere toujours fortement irrité contre ceux dont il croit avoir éprouvé quelque préjudice, & sans cesse occupé des moyens de leur nuire ; avec air sombre & sourcilleux, souvent avec teint livide & maigre de tout le corps.

ESPECE V. *L'Implacable.* — Caractere que la fierté ou l'entêtement porte à ne jamais pardonner le mal qu'on lui a fait, ou qu'il croit avoir reçu : souvent sans aucun désir de vengeance.

GENRE XXXV. *Enthousiasme.* — Mouvement plus ou moins violent d'une imagination exaltée & fortement préoccupée en faveur d'un objet, avec admiration absolue, & discours véhéments pour faire passer le même sentiment dans l'esprit des autres, souvent avec œil ardent, rougeur du visage & agitation continue du corps.

ESPECE I. *Extase.* — Etat de l'imagination si fortement préoccupée d'un objet que l'action des sens paraît comme suspendue.

ESPECE II. *L'Emphatique.* — Caractere disposé à se représenter les objets au dessus de ce qu'ils sont, & à le témoigner par des discours exagérés.

GENRE XXXVI. *Fanatisme.* — Mouvement violent & constant de l'imagination en faveur d'un objet, avec ardeur aveugle pour le défendre, & disposition à s'abandonner sans crainte & sans remords à toutes sortes d'actions, même les plus atroces, contre ceux qui y sont opposés. (*Mahomet, ou le Fanatisme, Voltaire.*)

GENRE XXXVII. *Caprice.* — Mouvement inconstant & subit de l'imagination qui porte à agir tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, & sans motifs.

ESPECE I. *Bizarrie.* — Mouvement subit de l'imagination qui porte à penser & à agir sans réflexion & avec humeur, d'une manière contraire aux usages & aux sentiments reçus.

ESPECE II. *Le Fantasque.* — Caractere habituellement disposé à changer sans cesse de goûts & de désirs.

GENRE XXXVIII. *Singularité.* — Mouvement de l'imagination qui porte à penser & à agir d'une manière contraire aux usages & aux sentiments admis dans la société.

ESPECE I. *L'Original.* — Caractere toujours porté à penser & à agir d'une façon nouvelle & particulière.

GENRE XXXIX. *Sensibilité.* Disposition habituelle de l'imagination à être vivement affectée de la moindre impression sur les sens.

- *Table des Maladies.* H

ESPECE I. *Tendresse.* — Disposition habituelle de l'imagination à s'émuvoir avec trop de facilité en faveur d'un ou de plusieurs objets, souvent avec larmes & léger faillissement.

GENRE XL. *Distraction.* — Etat d'une imagination toujours éloignée des objets présents, & de l'action dont elle devroit être occupée, avec mouvements & attitudes qui y sont étrangers ou contradictoires. (*Le Distrait, Regnard.*)

GENRE XLI. *Le Dissipé.* — Caractère dont l'imagination est continuellement entraînée par les objets les plus frivoles, avec difficulté invincible de fixer son action.

ESPECE I. *Le Volage.* — Caractère dont l'imagination ne se plaît qu'un instant au même objet, & passe sans cesse de l'un à l'autre, avec difficulté invincible de fixer son attachement.

ESPECE II. *L'Évaporé.* — Caractère dont l'imagination est toujours entraînée à de nouvelles idées par la plus légère impression des objets, avec difficulté invincible de fixer son attention, discours légers & variés, œil vif & inconscient, mouvements incertains & presque continuels du corps.

ORDRE SECOND.

VICES du jugement. (*Vitia judicii.*)

GENRE I. *Vertige.* — Affection des yeux qui fait juger que les objets en repos tournent ou se meuvent. (*Vertigo*, Sennert. tom. III. pag. 71. — *Vertigo*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 219.)

ESPECE I. Vertige par pléthora. (*Vertigo flatulenta*, Senn. tom. III. pag. 73. — *Vertigo à sanguinis flagratione*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 220.)

ESPECE II. Vertige par abondance de férofites. (*Vertigo à colluvie sanguinis ferofis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 220.)

ESPECE III. Vertige passager. (*Vertigo fugax*. — *Vertigo à spirituum ex caufis evidenter agitatione*, Senn. tom. III. pag. 77.)

ESPECE IV. Vertige hystrérique ou hypocondriaque. (*Vertigo hypochondriaca*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 221.)

ESPECE V. Vertige par les narcotiques, ou par les spiritueux. (*Vertigo à narcoticis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 220.)

ESPECE VI. Vertige par lésion du foie, de la rate, de l'utérus, ou de tout le corps. (*Vertigo per consensum ab hepate, liene, utero, vel toto corpore*, Senn. tom. III. pag. 76.)

ESPECE VII. Vertige par des blessures. (*Vertigo à violentiis extrinsecus capiti illatis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 220.)

ESPECE VIII. Vertige par dérangement des fonctions de l'estomac. (*Vertigo per*

GENRE II. *Antipathie*. — Sentiment habituel, désagréable & confus, à la vue de certains objets, avec mouvement subit & involontaire pour s'en éloigner.

ESPECE I. *Aversion*. — Sentiment très-désagréable, constant & involontaire pour certains objets, causé par leurs défauts réels ou imaginaires, avec agitation intérieure lorsqu'ils sont présents, & désir de s'en éloigner. (*Odium*.)

ESPECE II. *Haine*. — Sentiment violent & réfléchi contre certaines personnes, avec penchant à leur nuire & à les éviter, produit par quelque ressentiment, ou par les mauvaises qualités qu'on leur attribue. (*Malevolentia*.)

ESPECE III. Antipathie pour les aliments solides. (*Cacofilia*, Linn. gen. morb. gen. 87.)

ESPECE IV. *Rage*. — Antipathie pour la boisson, avec plus ou moins de furur & de désir de mordre. (*Hydrophobia rabies canina*, Boëth. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 1128. — *Rage*, Sauvag. dissert. sur la rage. — *Hydrophobia*, Morgagni, de sedib. morb. tom. I. pag. 60.)

GENRE III. *Méfiance*. — Disposition habituelle & constante à craindre d'être trompé, & à se tenir sur ses gardes.

ESPECE I. *Défiance*. — Disposition habituelle à douter des promesses, des vertus ou des talents des autres, & à ne point compter sur eux.

GENRE IV. *Crédulité*. — Disposition habituelle à adopter sans examen toutes les idées qu'on nous suggère, & à croire les choses les moins vraisemblables. (*Credulitas*.)

GENRE V. *Paresse*. — Disposition habituelle à rester dans le repos, & à s'abandonner au plaisir de l'inaction. (*Pigritia*. — *Pigritia*, Plater. prax. med. tom. I. pag. 277.)

ESPECE I. *Fainéantise*. — Eloignement invincible pour le travail du corps & de l'esprit.

ESPECE II. *Nonchalance*. — Disposition constante & involontaire à n'agir qu'avec lenteur & mollesse.

ESPECE III. *Indolence*. — Disposition constante & involontaire à n'agir qu'avec lenteur & indifférence.

GENRE VI. *Foiblesse d'esprit*. — Disposition à laisser prendre empire aux autres sur soi-même, & à leur accorder tout ce qu'ils exigent.

ESPECE I. Foiblesse d'esprit par crainte.

ESPECE II. Foiblesse d'esprit par amour.

ESPECE III. Foiblesse d'esprit par indolence.

GENRE VII. *Stupidité*. — Difficulté & souvent impossibilité de juger & d'imaginer, avec taciturnité & lenteur d'action.

ESPECE I. *Niaiserie*. — Dépravation du jugement qui par incapacité d'apprécier les objets, semble applaudir à tout par une expression sensible de joie, & par une contenance naïve & ridicule.

ESPECE II. *Bêtise*. — Dépravation du jugement qui par défaut d'idées distinctes sur les objets & sur leurs rapports, fait agir & parler sans goût & sans justesse, pour l'ordinaire avec entêtement.

GENRE VIII. *Esprit embrouillé*. — Dépravation du jugement qui rassemble avec rapidité une multitude d'idées obscures sur le même objet, & ne peut discerner les choses avec précision.

GENRE IX. *Irrésolution*. — Disposition habituelle du jugement à suspendre son action, par défaut d'idées distinctes, ou par la crainte d'inconvénients réels ou supposés. (*L'Irréolu*, *Deslouches*.)

GENRE X. *Le Minutieux*. — Caractère qui ne discernant point ce qu'il y a d'essentiel dans les objets, s'attache aux plus perites circonstances.

GENRE XI. *Radoterie*. — Foiblesse de jugement qui porte à s'appesantir sans cesse sur les mêmes objets, & à en rappeler par ses discours les circonstances les plus minutieuses.

GENRE XII. *Le Babillard*. — Caractère invinciblement entraîné à parler sans cesse d'une manière rapide & diffuse, sur les objets même les plus frivoles, sans écouter les autres, ni leur laisser le temps de répondre. Maladie commune chez les personnes du sexe. (*Le Babillard*, *Boissy*.)

GENRE XIII. *Frivolité*. — Penchant continual & involontaire à traiter légèrement les objets importants, pour ne s'occuper que de choses superficielles, avec empressement pour les nouveautés.

GENRE XIV. *Inconséquence*. — Dépravation du jugement qui fait parler & agir d'une manière contraire aux principes mêmes qu'on a adoptés, & au but qu'on se propose.

GENRE XV. *Curiosité*. — Disposition habituelle à désirer avec impatience de pénétrer dans les secrets & les affaires d'autrui.

GENRE XVI. *Prévention*. — Dépravation du jugement qui ayant adopté une opinion quelconque, est incapable d'apprécier les sentiments qui y sont contraires.

ESPECE I. *Entêtement*. — Jugement déterminé sur un objet, avec refus de l'examiner.

ESPECE II. *Opiniâtreté*. — Attachement à un sentiment reconnu pour déraisonnable, avec refus de réclamer ses idées.

ESPECE III. *Obligation*. — Attachement à sa volonté particulière, quelque déraisonnable qu'elle soit, avec refus de réclamer son action.

GENRE XVII. *Imprudence.* — Disposition habituelle à agir inconsidérément sans égard à l'importance des objets.

GENRE XVIII. *Le Menteur.* — Caractère toujours porté à donner hardiment des choses fausses pour véritables, avec satisfaction d'avoir réussi à persuader ; souvent sans intérêt, ni but particulier. (*Le Menteur, Corneille.*)

GENRE XIX. *Hypocrite.* — Disposition invincible & habituelle à affecter des vertus & des sentiments qu'on n'a pas, pour tromper, & pour parvenir au but qu'on se propose. (*Le Tartuffe, Molière.*)

ESPECE I. *Le Fourbe.* — Caractère toujours porté à mentir avec assurance, & à se servir de fautes combinées pour parvenir à un but qui est nuisible aux autres.

ESPECE II. *Le Charlatan.* — Caractère toujours porté à en imposer avec effronterie, par les paroles & par les actions, pour parvenir à un but, en abusant les autres, sans deffein de leur nuire.

ESPECE III. *L'Artificieux.* — Caractère toujours porté à déguiser avec art les routes cachées qu'il veut suivre, ou à séduire les autres par des discours adroits & des manières insinuantes, pour parvenir à un but avec sûreté & sans obstacle.

ESPECE IV. *Le Rusé.* — Caractère toujours porté à donner ingénieusement le change aux autres, & à les tromper par des feintes adroites, afin de parvenir sans obstacles au but qu'il se propose.

ESPECE V. *Le Diffimulé.* — Caractère toujours porté à couvrir par des fausses apparences, ses deffeins & sa vraie manière de penser.

ESPECE VI. *Le Souple.* — Caractère prompt à changer, en apparence, & souvent avec bassesse, de manière de penser, de parler & d'agir, suivant les circonstances & son intérêt.

ESPECE VII. *Le Flateur.* — Caractère toujours porté à louer avec excès les personnes dont il a besoin, & à leur complaire avec bassesse, en approuvant en eux ce qu'intérieurement il condamne.

ESPECE VIII. *Perfidie.* — Disposition habituelle à employer les fausses promesses, les serments ou les apparences de l'amitié, pour nuire plus sûrement à ceux qu'on a trompés.

ESPECE IX. *Le Traître.* — Caractère toujours porté à affecter pour le plus vil intérêt, les apparences de la bienveillance & de l'amitié, afin de surprendre la confiance, & servir plus facilement les ennemis de ceux qu'il a trompés.

GENRE XX. *Impudence.* — Hardiesse à commettre sans honte pour soi, ni respect pour les autres, des actions qu'on fait être blâmables.

GENRE XXI. *Effronterie.* — Disposition habituelle à ne rougir de rien, & à braver l'infamie.

GENRE XXII. *Basseſſe.* — Disposition habituelle à faire pour le plus vil intérêt, des actions humiliantes & contraires à l'honneur, sans éprouver aucune répugnance.

GENRE XXIII. Insolence. — Disposition habituelle à faire sentir aux autres d'une maniere outrageante, leurs défauts réels ou prétendus.

ESPECE I. Le Railleur. — Caractere qui se livre sans cesse au plaisir de tourner en ridicule les paroles & les actions des autres.

GENRE XXIV. Esprit d'indépendance. — Disposition habituelle à ne souffrir aucune loi & à ne suivre que ses propres idées.

ESPECE I. Indocilité. — Disposition habituelle à résister à tout ce que la supériorité légitime exige.

GENRE XXV. Le Mécontent. — Caractere toujours disposé à désapprouver les paroles & les actions des autres.

ESPECE I. Le Bourru. — Caractere toujours disposé à témoigner de la mauvaise humeur, même dans les circonstances qui doivent lui être agréables.

ESPECE II. Le Grondeur. — Caractere toujours disposé à reprimander les autres par des paroles dures & brusques, sans examen des actions. (*Le Grondeur, Palaprat.*)

ESPECE III. Le Baudeur. — Caractere toujours disposé à témoigner du mécontentement par un silence obstiné, & un air sombre & fâché.

GENRE XXVI. Contradiction. — Disposition habituelle à être contraire aux sentiments, aux désirs ou aux actions des autres.

ESPECE I. Le Chicaneur. — Caractere toujours porté à disputer avec acharnement sur des prétentions réelles ou imaginaires, & à chercher dans les paroles, les actions, ou les propriétés des autres, des moyens pour leur élever des difficultés, (*Les Plaideurs, Racine.*)

GENRE XXVII. L'Intriguant. — Caractere porté sans cesse par son activité à s'insinuer dans toutes les affaires, & à les mettre en mouvement par une multitude de moyens adroits ou cachés, afin de les conduire au but qu'il se propose.

ESPECE I. Le Brouillon. — Caractere porté sans cesse à s'insinuer dans les affaires des autres, pour y faire naître des obstacles, en empêcher le succès & produire des inimitiés ou la discorde.

GENRE XXVIII. Insensibilité. — Disposition habituelle à n'être point affecté du mal d'autrui.

ESPECE I. Dureté. — Disposition habituelle à témoigner son insensibilité par des paroles ou par des actions.

ESPECE II. Cruauté. — Penchant habituel à commettre de sang-froid & sans émotion, les actions les plus inhumaines, & à goûter du plaisir à faire souffrir ou à être témoin des souffrances des autres.

GENRE XXIX. Le Méchant. — Caractere sans cesse occupé du plaisir de nuire volontairement aux autres, par ses discours, par ses actions, ou par ses intrigues. (*Le Méchant, Greffet.*)

ESPECE I. Le Calomniateur. — Caractere sans cesse porté à imputer aux autres

des mauvaises actions, ou à interpréter en mal ce qu'ils ont fait de bien, souvent avec désir de leur nuire.

ESPECE II. *Le Médisant.* — Caractère sans cesse occupé à s'informer des fautes ou des mauvaises actions des autres, pour s'empêtrer de les publier, souvent avec désir de leur nuire.

ESPECE III. *Le Satyrique.* — Caractère toujours empressé à tourner en ridicule les paroles & les actions des autres, par des discours ou des écrits mordants, avec désir de les irriter & souvent de leur nuire.

GENRE XXX. *Austérité.* — Disposition habituelle à se priver avec opiniâtréte des choses les plus essentielles à la vie, accompagnée de maigreur & de mélancolie.

ESPECE I. *Abstinence.* — Sentiment habituel qui porte à se priver avec opiniâtréte des aliments nécessaires, accompagné de maigreur, de douleur dans la région épigastrique, & de diminution plus ou moins considérable des forces vitales & musculaires. (*Longa abstinentia, Senn. tom. IV. pag. 383.*)

GENRE XXXI. *Appétit dépravé.* — Desir involontaire & excessif de manger certaines substances non alimentaires, avec dégoût des aliments. (*Pica, Certorum ciborum saftidium, Senn. tom. IV. pag. 389.*)

GENRE XXXII. *Avarice.* — Satisfaction habituelle dans la possession des richesses, avec désir immoderé de les accumuler, même au dépens de ses propres besoins, accompagnée d'une crainte vive & continue de se les voir enlever, de soupçons, de défiance, de maigreur, de pâleur, d'insomnie. (*L'Avare, Molière.*)

GENRE XXXIII. *Le Dissipateur.* — Caractère toujours porté à prodiguer les richesses pour se faire plaisir, sans égard à la véritable valeur des objets, souvent avec vanité & ostentation. (*Le Dissipateur, Deslouches.*)

ORDRE TROISIEME.

VICES de la mémoire. (*Vitia memoriae.*)

GENRE I. Perte de mémoire. (*Oblivio. — Oblivio, Plater. prax. med. tom. I pag. 1. — Memoria laesa, Senn. tom. III. pag. 78.*)

ESPECE I. Perte de mémoire par suspension des loches.

ESPECE II. Perte de mémoire par un coup sur la tête.

ESPECE III. Perte de mémoire par un dépôt critique.

ESPECE IV. Perte de mémoire par affections soporifiques.

GENRE II. *Regret.* — Sentiment douloureux par le ressouvenir d'une action qu'on se reproche, ou d'une jouissance qu'on a perdue.

64 V. CLASSE, ORDRE IV.

GENRE III. Remords. — Sentiment douloureux par le ressouvenir des crimes réels ou imaginaires qu'on croit avoir à se reprocher, avec vive inquiétude, air sombre & taciturne.

ESPECE I. Repentir. — Sentiment douloureux par le ressouvenir des fautes réelles ou imaginaires qu'on croit avoir à se reprocher, avec air triste, souvent accompagné de larmes.

ESPECE II. Honte. — Sentiment inquiet que le ressouvenir d'une action qu'on a faite & qu'on croit répréhensible, fait éprouver à l'approche de ceux qu'on en suppose intrusifs, avec rougeur du visage, attitude contrainte & désir de fuir leur présence. (*Le Philosophe marié, Deslouches.*)

GENRE IV. Reffentiment. — Souvenir vif & pénible du chagrin qu'on a éprouvé par une offense réelle ou imaginaire, avec frémissement contre ceux de qui on l'a reçue, souvent avec haine & désir de se venger.

GENRE V. Ingratitude. — Insensibilité constante pour les bienfaits reçus, souvent avec aversion pour les bienfaiteurs, désir d'éviter leur présence & disposition à leur nuire. (*L'Ingrat, Deslouches.*)

ORDRE QUATRIÈME.

VICES du jugement & de la mémoire. (*Vitia judicii & memoriae.*)

GENRE I. Manque de jugement & de mémoire. (*Hebetudo mentis, Plater, tom. I. pag. 1.*)

GENRE II. Imbécillité, démence. — Défaut d'aptitude à juger, à se ressouvenir & à imaginer. (*Dementia. — Mentis imbecillitas, Plater. prax. med. tom. I. pag. 1.*)

ESPECE I. Imbécillité de naissance. (*Imbecillitas à parentibus, Plater. prax. med. tom. I. pag. 2.*)

ESPECE II. Imbécillité par une évacuation trop abondante de sang ou d'autre fluide. (*Imbecillitas menis à nimia sanguinis profusione, Plater. prax. med. tom. I. pag. 2.*)

ESPECE III. Imbécillité par vieillesse. (*Imbecillitas mentis à senectute, Plater. prax. med. tom. I. pag. 2.*)

ESPECE IV. Imbécillité par un coup sur la tête. (*Imbecillitas ab ictu capitis, Plater. prax. med. tom. I. pag. 2.*)

ESPECE V. Imbécillité par la fièvre quarte. (*Amentia à febribus intermittentibus diutioribus, pricipuè quartanis, Sydenh. tom. I. pag. 61.*)

ESPECE VI. Imbécillité par l'excès du coït ou de la masturbation.

ESPECE VII. Démence par un dépôt de lait sur le cerveau. (*Pueros, traité des acc. pag. 387.*)

ESPECE VIII. Démence par les affections soporifères.

SIXIÈME

SIXIÈME CLASSE.

MALADIES DE FOIBLESSE.

DEBILITATES.

ORDRE PREMIER.

DIMINUTIONS des forces musculaires.

GENRE I. *Lassitude.* — Foiblesse du mouvement musculaire des extrémités & du tronc. (*Lassitudo*. — *Motus debilitas*, *Plater. prax. med. tom. I.* pag. 277. — *Lassitudo*, *Senn. tom. III. pag. 125.*)

ESPECE I. Lassitude après des travaux excessifs. (*Lassitudo post labores seu defatigatio*, *Plater. prax. med. tom. I. pag. 277.* — *Lassitudo à labore*, *Sennert. tom. III. pag. 125.*)

ESPECE II. Lassitude spontanée. (*Lassitudo spontanea*, *Plater. prax. med. tom. I. pag. 278.*)

ESPECE III. Lassitude par pléthore. (*Lassitudo spontanea phlegmonodes*, *Senn. tom. III. pag. 125.*)

ESPECE IV. Lassitude spontanée, avec sentiment de tension dans tous les muscles. (*Lassitudo spontanea tensiva*, *Senn. tom. III. pag. 125.*)

ESPECE V. Lassitude spontanée, avec douleurs pectoritives par tout le corps. (*Lassitudo spontanea ulcerosa*, *Senn. tom. III. pag. 125.*)

GENRE II. Mouvements inégaux des jambes en marchant, par la faiblesse des muscles d'une des deux jambes. (*Claudicatio à debilitate*, *Sauvag. Nof. meth. tom. I. pag. 566.*)

GENRE III. *Langueur.* — Abattement des forces musculaires ; avec diminution des forces vitales, pouls petit, penchant au sommeil, défaut d'appétit & inquiétudes. (*Langor.*)

ESPECE I. Langueur par des longues abstinences, avec abattement des forces musculaires, pouls très-petit, teint pâle, quelquefois livide & jaunâtre, fréquentes défaillances, enflure œdématoise des jambes.

ESPECE II. Langueur par des grandes pertes de sang.

66 VI. CLASSE, ORDRE I.

GENRE IV. Grandeur plus considérable de la luttet par le relâchement de ses muscles. (*Gurgitionis laxatio*, Senn. tom. III. pag. 273. — *Uva sive uvula nimium produda*, Heister. *instit. chirurg.* tom. II. pag. 659.)

GENRE V. Foibleffe de l'estomac. — Digestion difficile par la foibleffe de l'estomac. (*Imbecillitas ventriculi dicta cordis motus*, Plater. *prax. med.* tom. II. pag. 398.)

ESPECE I. Foibleffe d'estomac par chaleur. (*Imbecillitas ventriculi ex calore*, Lomm. *observ. med.* pag. 166.)

ESPECE II. Foibleffe d'estomac par humidité. (*Imbecillitas ventriculi ab humiditate*, Lomm. *observ. med.* pag. 166.)

GENRE VI. Courte haleine (*Parole entrecoupée des enfants*, Brouzet, *educ. med. des enfants*, tom. II. pag. 236.)

GENRE VII. Foibleffe du membre viril pour le coït. (*Languiditas in masculis*, Plater. *prax. med.* tom. I. pag. 553.)

ESPECE I. Foibleffe du membre viril par masturbation, ou par excès du coït.

ESPECE II. Foibleffe du membre viril par les passions de l'âme.

ESPECE III. Foibleffe du membre viril par l'action du mercure.

GENRE VIII. Beriberii. — Difficulté de mouvoir les jambes & les bras, avec foibleffe & fourmillement dans les parties affectées, & espece de stupeur. (*Beriberii Indorum*, Tulp. *observ. med.* pag. 286.)

ESPECE I. Foibleffe des muscles de la main, avec difficulté de saisir & de retenir les corps, souvent accompagnée de fourmillement à l'extremité des doigts, & de crampe.

GENRE IX. Cachexie. — Affaiblissement des forces musculaires, avec pâleur de tout le corps, légère bouffissure & pâleur considérable du visage, diminution de chaleur, défaut d'appétit, respiration un peu gênée, pouls faible & tardif, abattement de l'esprit. (*Cachexia*. — *Cachexia sive malus corporis habitus*, Aretæus, pag. 89. — *Cachexia*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 311.)

ESPECE I. Pâles couleurs. (*Chlorosis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 312.)

ESPECE II. Diminution des forces musculaires, avec froid & pâleur de tout le corps, pouls petit & tardif; excréments pituitieux & souvent liquides; urines blanches, ou ténues, ou épaisses. (*Insemperies hepatis frigida*, Senn. tom. IV. pag. 536.)

GENRE X. Rhachitis. — Diminution considérable des forces musculaires des enfants, avec gonflement des articulations des extrémités, distorsion des os longs, bouffissure & grandeur excessive de la tête, maigreur des extrémités, tuméfaction du bas ventre, & esprit prématuré. (*Rhachitis*. — *Rhachitis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 488. — *Rhachitis*, Boëth. *vatt-*

Swiet. de cogn. morb. aph. 1480. — Rhachitis, du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 284.)

GENRE XI. Scorbute. — Lassitude, avec tuméfaction des gencives, évacuation de sang à la plus légère compression des gencives, haleine fétide, pâleur jaunâtre du visage, difficulté de respirer au moindre mouvement; taches sur la poitrine, sur les bras & sur les jambes, d'un jaune rougeâtre, souvent bleuâtre, livide ou noirâtre. (*Scorbutus*, — *Scorbutus*, Senn. tom. IV. pag. 504. — *Scorbutus*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 369. — *Scorbutus*, Boérh. van-Swiet de cogn. morb. aph. 1148.)

ESPECE I. Scorbute essentiel. — Scorbute de mer. (*Scorbutus*, Lind, *Traité du Scorbute*.)

ESPECE II. Scorbute des enfants. — Foiblesse des extrémités inférieures chez les enfants, avec douleur dans les muscles, petites duretés dans les téguments, inflammation & ulcération des gencives, ensuite affection & carie dans les os. (*Puzos, traité des accouchem.* pag. 300.)

ORDRE SECOND.

ABOLITIONS du mouvement. (*Abolitiones motūs*.)

GENRE I. Atonie. — Défaut de contraction des fibres musculaires. (*Atonia*, — *Atonia*, Linn. gen. morb. gen. 120.)

ESPECE I. Paralysie musculaire des extrémités. — Précipitation de mouvement d'une des extrémités du corps, ou de plusieurs, sans perte de sentiment.

ESPECE II. Paralysie du membre viril. (*Paralysis membra virilis*, Plater. prax. med. tom. I. pag. 555. — *Aeternia*, Linn. gen. Morb. gen. 119.)

ESPECE III. Paralysie de l'œsophage, avec impossibilité d'avaler les solides, & difficulté d'avaler les fluides; sans éprouver aucune douleur. (*Difficultas deglutiendi à resolutione œsophagi*, Senn. tom. IV. pag. 367.)

GENRE II. Extinction de voix. (*Vox abolita*, Senn. tom. III. pag. 344.)

ESPECE I. Extinction de voix, pour avoir trop crié. (*Vox abolita à clamore nimio*, Senn. tom. III. pag. 344.)

ESPECE II. Extinction de voix par une toux violente & de longue durée.

ESPECE III. Extinction de voix par une humeur visqueuse. (*Brouzet*, Educ. med. des enfants. tom. II. pag. 233.)

GENRE III. Mutisme. — Impuissance de parler. (*Mutus aphonias*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 247. — *Mutisme*, Brouzet, Educ. med. des enfants. tom. II. pag. 246.)

ESPECE I. Mutisme de naissance, sans surdité. (*Brouzet*, Educ. med. des enfants. tom. II. pag. 247.)

ESPECE II. Mutisme par surdité de naissance. (*Institution des sourds & muets*.)

ESPECE III. Mutisme par abondance de sang. (*Aphonia ex sanguinis congectione ad fauces & linguam*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 248.)

ESPECE IV. Mutisme par des vers contenus dans les premières voies. (*Aphonia ex vermis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 248.)

ESPECE V. Mutisme par des humeurs séreuses. (*Aphonia ex serof. humorum stagnatione*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 248.)

ESPECE VI. Mutisme par paralysie de la langue. (*Aphonia ex paralyse linguae*, Fred. Hoffmann. tom. III. pag. 248. — *Brouzet, Educ. med. des enfants*, pag. 250.)

ESPECE VII. Mutisme par mauvaise conformation de la langue.

ESPECE VIII. Mutisme par privation de la langue.

ORDRE TROISIEME.

DIMINUTIONS du sentiment. (*Diminutiones sensus.*)

GENRE I. Diminution du goût. (*Læsus gustatus*, Senn. tom. III. pag. 252.)

GENRE II. *Anorexie*. — Diminution sensible d'appétit. (*Anorexia*. — *Anorexia seu appetentia dejecta*, Plater. prax. med. tom. I. pag. 495. — *Anorexia*, Senn. tom. IV. pag. 381.)

ESPECE I. Défaut d'appétit par abus immoderé de l'acte vénérien. (*Refrigeratio stomachi a nimio coitu*, Sanctor. med. stat. fact. VI. aph. 42.)

ESPECE II. Défaut d'appétit par l'excès des boissons spiritueuses, ou par les substances narcotiques. (*Appetitus defectus à stupore ventriculi*, Plater. tom. I. pag. 500.)

ESPECE III. Défaut d'appétit par les passions de l'âme. (*Inappetentia ab animi patetate*, Baglivi, pag. 149.)

ESPECE IV. Défaut d'appétit par des matières visqueuses contenues dans l'estomac. (*Inappetentia ab humoribus crassis & lentis in ventriculo*, Senn. tom. IV. pag. 381.)

ESPECE V. Défaut d'appétit par foiblesse d'estomac. (*Appetitus defectus imbecillitate ventriculi*, Plater. prax. med. tom. I. pag. 500.)

ESPECE VI. Défaut d'appétit par mauvaises digestions. (*Anorexia à faburra — Anorexia ob alimenti abundantiam*, Senn. tom. IV. pag. 382.)

ESPECE VII. Défaut d'appétit par abondance de bile dans l'estomac. (*Inappetentia à bile*, River. prax. med. pag. 128.)

GENRE III. Défaut d'appétit pour l'acte vénérien.

ESPECE I. Défaut d'appétit chez l'homme pour l'acte vénérien. (*Intemperies testium frigida*, Sennert. tome III. pag. 598.)

ESPECE II. Défaut d'appétit chez la femme pour l'acte vénérien.

ESPECE III. Défaut d'appétit pour l'acte vénérien, par diminution de sensibilité des parties naturelles.

GENRE IV. Diminution de l'odorat. (*Olfac̄tus depravatio.*)

ESPECE I. Diminution de l'odorat par abondance d'humeurs séreuses ou piquantes.

ESPECE II. Diminution de l'odorat par défaut de mucosités.

ESPECE III. Diminution de l'odorat par l'excès du tabac ou des odeurs fortes.

GENRE V. Diminution de l'ouie. (*Auditus depravatio.*)

ESPECE I. Difficulté de l'ouie par des humeurs séreuses. (*Difficultas auditus ex debitu serorum humorum ad aures*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 240.)

ESPECE II. Difficulté de l'ouie par mauvaise constitution des parties de l'oreille. (*Difficultas auditus à mala constitutione partium*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 240.)

ESPECE III. Difficulté de l'ouie par l'abondance & la grande viscosité de la matière cérumineuse.

ESPECE IV. Difficulté de l'ouie par abondance du sang, avec tintement.

ESPECE V. Difficulté de l'ouie par vieillesse.

ESPECE VI. Diminution de l'ouie par l'effet des sons trop violents.

GENRE VI. Foibleffe de la vue. — Vue confuse sans opacité sensible de la cornée, ou à la pupille. (*Visus debilitas*, Senn. tom. III. pag. 225.)

ESPECE I. Foibleffe de la vue par excès de l'acte vénérien. (*Laz̄o oculorum à coitu immoderato*, Sandor. med. Stat. Sect. VI. aph. 19.)

ESPECE II. Foibleffe de la vue par lésion des nerfs optiques. (*Visus affecta à spirituum opticorum viiiis*, Senn. tom. III. pag. 222.)

ESPECE III. *Vue nocturne, Nyctalopie.* — Vue distincte pendant la nuit & foible pendant le jour. (*Nyctalopia*, Boérh. de morb. oculi.)

ESPECE IV. *Vue obtuse.* — Vue foible à quelque distance que soit l'objet. (*Visus obtusus*, Boérh. de morb. oculi.)

ESPECE V. *Vue courte, Myopie.* — Vue distincte lorsque l'objet est très-proche, & confuse lorsqu'il est un peu éloigné. (*Myopia*, Boérh. de morb. oculi.)

ESPECE VI. *Presbytie.* — Vue distincte lorsque l'objet est éloigné & confuse lorsqu'il est proche. (*Presbyopia*, Boérh. de morb. oculi.)

ESPECE VII. Vue foible pendant le jour, & entièrement abolie à l'aproche de la nuit. (*Visus diurnus, seu hemeralopia*, Boérh. de morb. oculi.)

ESPECE VIII. Foibleffe de la vue par défaut, ou par diminution de l'humeur aqueuse. (*Visus imminutio ob defectum humoris aquaei*, Senn. tom. III. pag. 221.)

ESPECE IX. Foibleffe de la vue par une trop longue & trop conilante application des yeux.

ESPECE X. Foibleffe de la vue par une lumière trop vive.

ESPECE XI. Foibleffe de la vue par vieillesse.

ORDRE QUATRIEME.

ABOLITIONS du sentiment. (*Abolitiones sensus.*)

GENRE I. Privation absolue d'appétit.

ESPECE I. Privation absolue d'appétit pour les aliments solides, souvent avec répugnance.

ESPECE II. Privation absolue d'appétit pour la boisson, souvent avec répugnance. (*Aposia*, *Plater. prax. med. tom. I.* pag. 496. — *Situs deficiens*, *Senn. tom. III.* pag. 394.)GENRE II. Privation entière du goût. (*Abolito gustus*, *Senn. tom. III.* pag. 252.)GENRE III. *Impuissance*. — Impossibilité d'engendrer par privation de sensibilité dans les parties de la génération. (*Impotencia*. — *Veneri actus defectus*, *Plater. prax. med. tom. I.* pag. 553.)

ESPECE I. Insensibilité des parties de la génération de l'homme, par foibleté.

ESPECE II. Insensibilité des parties de la génération de l'homme, par défaut de semence.

ESPECE III. Insensibilité des parties de la génération de l'homme, par mauvaise qualité de la semence.

ESPECE IV. Insensibilité de l'homme pour la génération, par une vitieuse évacuation de semence, provenant d'une mauvaise conformation du canal de l'urethre, ou des autres parties de la génération.

ESPECE V. Insensibilité des parties naturelles de la femme. (*Venus extincta in mulieribus*, *Plater. prax. med. tom. I.* pag. 554.)

ESPECE VI. Insensibilité des parties naturelles de la femme, par une structure vitieuse.

GENRE IV. *Surdité*. — Privation de l'impression des sons. (*Surditas*. — *Surditas*, *Senn. tom. III.* pag. 238. — *Surditas in acutis*, *Bagliyi, prax. med. p. 69*)ESPECE I. Surdité de naissance. (*Surditas nativa ex mala organi auditorii conformatio-*ne, *Fred. Hoffm. tom. III.* pag. 240.)ESPECE II. Surdité catarrhal. (*Surditas catarrhalis*, *Fred. Hoffm. tom. III.* pag. 241. 243.)ESPECE III. Surdité par des excroissances dans le conduit de l'oreille. (*Surditas à tuberculis in meatus auditorio.*)ESPECE IV. Surdité par l'introduction des corps étrangers dans le conduit de l'oreille. (*Surditas obstrunctione à rebus externis*, *Senn. tom. III.* pag. 239.)ESPECE V. Surdité par l'obstruction du conduit d'Eustache. (*Surditas ab obstrunctione ductus Eustachiani*, *Tulpi*, *obser. med. pag. 67.* — *Fred. Hoffm. tom. III.* pag. 240.)ESPECE VI. Surdité par l'action violente des corps extérieurs. (*Surditas percussione corporum exteriorum*, *Fred. Hoffm. tom. III.* pag. 240.)

VI. CLASSE, ORDRE VI.

71

ESPECE VII. Surdité par l'action de l'air trop froid, pendant l'usage des frictions mercurielles. (*Auditus abolitus à cera mercuriali male tractatus*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 246.)

GENRE V. *Goutte sereine*. — Privation entière de la vue sans opacité sensible dans la pupille, & avec immobilité des bords internes de l'iris. (*Gutta serena*. — *Amaurosis*, Boërh. de morb. oculi. — *Gutta serena*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 228. — *Goutte sereine parfaite*, S. Yves, malad. des yeux, pag. 262.)

ESPECE I. *Goutte sereine par pléthore*. (*Gutta serena à sanguinis stagnatione*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 230.)

ESPECE II. *Goutte sereine à la suite d'un coup*. (*Amaurosis traumatica*, Boërh. de morb. oculi.)

ESPECE III. *Goutte sereine à la suite des maladies aigues*. (S. Yves, malad. des yeux, pag. 264.)

ESPECE IV. *Goutte sereine vénérienne*. (*Amaurosis venerea*, Boërh. de morb. oculi.)

ESPECE V. *Goutte sereine par suppression du pourpre*. (*Gutta serena ex suppressa purpura*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 232.)

ORDRE CINQUIEME.

DIMINUTIONS du sentiment & du mouvement.

GENRE I. *Syncope*. — Subite diminution des forces vitales, sans existence sensible du pouls, & de la faculté de connoître. (*Syncope*. — *Syncope*, Plater. prax. med. tom. I. pag. 470.)

ESPECE I. *Syncope violente & de longue durée par le froid*. (*Asphyxia congelatorum*, Sauvag. Nof. math. tom. I. pag. 817.)

ESPECE II. *Syncope violente des noyés*. (*Asphyxia submersorum*.)

ESPECE III. *Syncope violente par la vapeur du charbon*. (*Observ. de med. d'Edim.* tom. VI. pag. 177.)

ESPECE IV. *Syncope violente par la passion hystérique*. (*Asphyxia hysterica*. — *Suffocatio uteri*, Senn. tom. IV. pag. 686.)

ESPECE V. *Syncope violente par des vapeurs souterraines*. (*Asphyxia à vaporibus terra*.)

ESPECE VI. Mort apparente de l'enfant nouveau né. (*Foibleffe de l'enfant qui vient de naître*. Levret, art. des acc. pag. 227.)

ESPECE VII. *Syncope violente par les vapeurs qui s'élèvent pendant la fermentation vineuse*.

ESPECE VIII. *Syncope par les vapeurs qui s'élèvent des fosses d'aïance*.

ESPECE IX. *Syncope par les passions de l'âme*. (*Syncope ab animi affectibus*, Plater. prax. med. tom. I. pag. 474. — *Syncope ab animi affectibus*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 270.)

ESPECE X. *Syncope par des évacuations trop abondantes*. (*Syncope à nimis evacuationibus*, Plater. prax. med. tom. I. pag. 473. — *Syncope ab hemorrhagis & alii nimis excretionibus*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 271.)

72 VI. CLASSE, ORDRE V.

ESPECE XI. Syncope des femmes grosses. (*Burton, Syst. des Accouch. tom. I. p. 245.*)

ESPECE XII. Syncope par des obstacles dans le cœur. (*Senac, Traité du cœur, tom. II. pag. 533.*)

ESPECE XIII. Syncope par l'abondance du sang. (*Syncope plethorica. — Syncope par la plénitude, Senac, traité du cœur, tom. II. pag. 540.*)

ESPECE XIV. Syncope par émétiques, purgatifs, ou poisons. (*Syncope à venenis, purgantibus, & emeticis, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 271.*)

ESPECE XV. Syncopé par la gangrene. (*Syncope à sphacelosa in partibus vel externis, vel internis corruptione, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 271.*)

GENRE II. *Défaillance.* — Diminution subite & de peu de durée, des forces vitales & musculaires, avec respiration & pulsation du cœur peu sensibles : sans perdre la faculté de connoître. (*Vitalis motus defectus, Plater. prax. med. tom. I. pag. 467. — Virium lapsus, & animi deliquum, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 267.*)

GENRE III. *Lipothymie.* — Diminution subite & de courte durée, des forces vitales, avec pulsation peu sensible, & perte de la faculté de connoître. (*Lipothymia, Animi deliquum. — Lipothymia, Plater. prax. med. tom. I. pag. 470. — Lipothymia, Morgagni, de sedib. morb. tom. I. pag. 266.*)

GENRE IV. Sommeil apparent, avec insomnie & délire. (*Coma vigil. — Coma vigil, Senn. tom. III. pag. 119. — Coma vigil, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 209.*)

GENRE V. *Affouissement comateux.* — Etat approchant du sommeil, de longue durée, sans fièvre, sans délire, qui laisse la faculté de répondre aux questions, d'ouvrir les yeux & de changer de place à chaque irritation faite au malade. (*Coma somnolentum. — Coma somnolentum, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 210.*)

GENRE VI. *Somnolente.* — Sommeil de plus longue durée que la veille. (*Somnolentia. — Sopor vigiliis protractior, Linn. gen. morb. gen. 96.*)

GENRE VII. *Affouissement carotique.* — Sommeil profond avec perte presque entière du sentiment & du mouvement, & respiration tranquille. (*Carus. — Carus, Senn. tom. III. pag. 170. — Carus, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 210. — Carus, Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aph. 1045.*)

ESPECE I. Affouissement carotique par pléthora. (*Carus à plethora.*)

ESPECE II. Affouissement carotique, avec fièvre aiguë. (*Carus acutis febribus socius, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 210.*)

ESPECE III. *Coup de soleil.* — Affouissement carotique par le soleil. (*Carus ab insolatione, Sauvag. Nofol. meth. tom. I. pag. 842.*)

ESPECE IV. Affouissement carotique par des substances vénéneuses. (*Carus à veneno, Senn. tom. III. pag. 170.*)

ESPECE V.

VI. CLASSE, ORDRE V. 73

ESPECE V. Assoupissement catotique par les vers. (*Carus à vermis*, Senn. tom. III. pag. 170.)

ESPECE VI. Assoupissement catotique par des humeurs pituitées, ou séreuses. (*Carus à serosa colluvie*, Carol. Pif. de morb. à colluv. serof. pag. 81.)

GENRE VIII. *Extase vaporeuse*. — Suspension de l'action des sens; pouls & respiration peu sensibles; flexibilité plus ou moins grande des membres, sans prendre ni retenir la situation qu'on veut leur donner. (*Extasis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 46.)

GENRE IX. *Apoplexie*. — Subite abolition des sens, avec apparence d'un sommeil très profond, respiration flétrissante, & relâchement des muscles des extrémités. (*Apoplexia*. — *Apoplexia*, Senn. tom. III. pag. 171. — *Apoplexia*, Boërh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 1007. — *Apoplexia*, Baglivi, pag. 111. — *Apoplexia in universum*, Morgagni, de sedib. morb. tom. I. pag. 10. — *Apoplexia*, Morgagni, de sedib. morb. tom. II. pag. 401. — *Apoplexia*, Wepfer.)

ESPECE I. Apoplexie pituiteuse. (*Apoplexia pituitosa*, Senn. tom. III. pag. 172. — *Apoplexia glutinosa*, Morgagni, de sedib. morb. tom. I. pag. 37.)

ESPECE II. Apoplexie séreuse. (*Apoplexia serosa*, Carol. Pif. de morb. à colluv. serosa, pag. 103. — *Apoplexia serosa*, Morgagni, de sedib. morb. tom. I. pag. 26.)

ESPECE III. Apoplexie laiteuse. (*Laiteret*, art des accouchem. pag. 159.)

ESPECE IV. Apoplexie sanguine. (*Apoplexia sanguinea*. — *Apoplexia à phlegmone diatheria cum sanguinis copia*, Senn. tom. III. pag. 172. — *Apoplexia à sanguine*, Morgagni, de sedib. morb. tom. I. pag. 11 & 12.)

ESPECE V. Apoplexie légère & sanguine. (*Apoplexia levis à pleniora*.)

ESPECE VI. Apoplexie légère & séreuse. (*Apoplexia levis à serosa colluvie*, Carol. Pif. de morb. à coll. serof. pag. 99.)

GENRE X. *Léthargie*. — Assoupissement profond & considérable; avec ouverture subite & passagère des yeux, à la suite de quelqu'irritation faite au malade; faculté de répondre aux vives interrogations, délire, & ensuite oubli de tout ce qui s'est passé. (*Lethargus*. — *Lethargus*, Senn. tom. III. pag. 121. — *Lethargus*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 210.)

ESPECE I. Léthargie pituiteuse. (*Lethargus à pituita*, Carol. Pif. de morb. à coll. serof. pag. 109.)

ESPECE II. Léthargie goutteuse & périodique. (*Lethargus periodice repetens*, Carol. Pif. de morb. à colluv. serosa, pag. 105.)

ESPECE III. Léthargie des gens de lettres. (*Lethargus litteratorum*, van Swiet. comment. in Boërh. aph. 1010. pag. 263.)

GENRE XI. *Commotion de l'épine*. — Diminution du sentiment & du mouvement par commotion, à la suite d'un coup, ou d'une chute. (*Du Verney*, malad. des os, tom. II. pag. 113.)

ORDRE SIXIÈME.

ABOLITIONS du sentiment, ou du mouvement des muscles extérieurs, ou à la fois du sentiment & du mouvement.

GENRE I. *Gangrene.* — Abolition du sentiment, de la chaleur, & souvent du mouvement d'une partie du corps, avec lividité ou noirceur de cette partie. (*Gangrana*. — *Gangræna*, Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aph. 419. & 457. — *Gangrene*, Quesnay, trait. de la gangrene.)

ESPECE I. Gangrene humide par inflammation. (Quesnay, trait. de la gangrene, p. 216.)

ESPECE II. Gangrene humide par pourriture (Quesnay, trait. de la gangrene, p. 308.)

ESPECE III. Gangrene humide par froid excessif. (Quesnay, trait. de la gangr. p. 291.)

ESPECE IV. Gangrene humide par brûlure. (Quesnay, trait. de la gangr. pag. 278.)

ESPECE V. Gangrene humide par morsure de bêtes vénimeuses. Quesnay, trait. de la gangr. pag. 184.)

ESPECE VI. Gangrene humide par étranglement. (Quesnay, trait. de la gangr. p. 86.)

ESPECE VII. Gangrene humide par contusion. (Quesnay, trait. de la gangr. p. 15.)

ESPECE VIII. Gangrene humide par infiltration. (Quesnay, trait. de la gangr. p. 68.)

ESPECE IX. *Gangrene de la matrice.* — Abolition subite d'une douleur & d'une chaleur excessives de la matrice, avec abattement des forces vitales & anxiété. (*Gangræna uteri*, Senn. tom. IV. pag. 632.)

ESPECE X. Gangrene des parties de l'arrière-bouche. (*Angina gangrenosa*, Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 816.)

GENRE II. *Gangrene seche.* — Abolition du sentiment, du mouvement & de la chaleur d'une partie du corps, avec noirceur & secheresse de cette partie. (*Gangrana secca*. — *Gangrene seche*, Quesnay, traité de la gangr. pag. 319. — *Gangræna secca*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 342.)

ESPECE I. Gangrene seche par le seigle ergoté. (Quesnay, trait. de la gangr. pag. 355.)

ESPECE II. *Escharre.* — Gangrene seche par l'action du cautère potentiel. (*Eschara crux à medicamentis adseribus*, Platner, infl. chir. pag. 602. fecl. 928.)

ESPECE III. Gangrene seche par la goutte. (Quesnay, trait. de la gangr. pag. 366.)

ESPECE IV. Gangrene seche par dépôt critique à la suite des maladies aiguës. (Quesnay, trait. de la gangr. pag. 368.)

GENRE III. *Paralyse.* — Abolition du mouvement, ou du sentiment, ou à la fois du mouvement & du sentiment. (*Paralysis*. — *Paralysie*, Senn.

VI. CLASSE, ORDRE VI. 75

tom. III. pag. 135. — Paralyse, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 195. — Paralyse, Boëth. van Swiet. de cogn. morb. aph. 1057. — Paralyse, Morgagni, de sed. morb. tom. I. pag. 82.)

ESPECE I. Paralysie pituitéuse. (*Paralyse à pituita, Plater. prax. med. pag. 293.*
— *Paralyse pituitosa, Senn. tom. III. pag. 136.*)

ESPECE II. Paralysie à la suite de l'apoplexie. (*Paralyse ab apoplexia levī à ferosa colluvie, Carol. Pif. de morb. à colluv. ferosa, pag. 102.*)

ESPECE III. Paralysie par virus vénérien. (*Paralyse à viru venereo. — Paralyse vénérienne, Mém. de l'Acad. de chir. tom. IV. in-4⁸. pag. 141.*)

ESPECE IV. Paralysie par l'action du plomb, ou de ses préparations. (*Paralyse à plumbo vel ejus preparationibus, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 203.*)

ESPECE V. Paralysie par le scorbut. (*Paralyse scorbutica, Senn. tom. III. pag. 136.*)

ESPECE VI. Paralysie par l'action du froid. (*Paralyse ob contactus diuturnum rei frigidæ, Senn. tom. III. pag. 136.*)

ESPECE VII. Paralysie par suppression d'une évacuation devenue nécessaire. (*Paralyse ab imminentio hemorrhoidum fluxu, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 205.*)

ESPECE VIII. Paralysie par l'action du mercure. (*Paralyse à mercurio.*)

ESPECE IX. Paralysie par solution d'un nerf. (*Paralyse à soluta nervi unitate, Senn. tom. III. pag. 136.*)

ESPECE X. Paralysie par compression sensible d'un nerf. (*Paralyse à nervorum compressione, Plater. prax. med. tom. I. pag. 296.*)

ESPECE XI. Paralysie par une chute, ou par un coup violent, sans aucune solution de continuité apparente. (*Paralyse à commotione.*)

GENRE IV. Privation momentanée du sentiment & du mouvement de l'œil.
(*Scotomia, Linn. gen. morb. gen. III.*)

GENRE V. *Hemiplegie.* — Abolition, ou du mouvement, ou du sentiment de la moitié du corps, ou à la fois du sentiment & du mouvement.
(*Hemiplegia. — Hemiplegia, Plater. prax. med. tom. I. pag. 284.*)

GENRE VI. Impuissance de mouvoir le globe de l'œil, & d'appercevoit la lumiere. (*Paralyse oculorum, Alexand. Trall. de arte med. tom. I. pag. 80.*)



SEPTIEME CLASSE.
MALADIES ÉVACUATOIRES.
EVACUATIONS.

ORDRE PREMIER.

DIMINUTIONS des parties charnues & graisseuses du corps, ou d'une partie du corps, par évacuation insensible.

GENRE I. *Atrophie.* — Amaigrissement de tout le corps, avec affaiblissement des forces musculaires, sans fièvre & sans expectoration. (*Atrophia*. — *Atrophia*, Morton, tom. I. pag. 1. — *Atrophia*, Benet. *Theatrum tabidor.*)

ESPECE I. *Atrophie nerveuse.* — Maigreur de tout le corps, avec défaut d'appétit, mauvaise digestion, sans fièvre, sans toux & sans expectoration. (*Atrophia seu phthisis nervosa*, Morton, tom. I. pag. 2.)

ESPECE II. Maigreur par des tumeurs scrophuleuses dans le mésentere, sans fièvre. (*Tabes à tumoribus scrophulosis in mesenterio*, Morton, tom. I. pag. 24.)

ESPECE III. Atrophie des Enfants par des médicaments mal indiqués. (*Atrophia infantum à pervertis medicamentis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 486.)

ESPECE IV. Atrophie scorbutique. (*Atrophia scorbutica*, Senn, tom. IV. pag. 524.)

ESPECE V. Atrophie des Enfants par la mauvaise qualité des humeurs des Parents ou des Nourrices. (*Atrophia ab impura humorum parentum aut nutritiæ dyscrasia*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 486.)

ESPECE VI. Atrophie des Enfants par malpropreté. (*Atrophia infantum à foeciditate*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 486.)

ESPECE VII. Atrophie des Enfants par les vers. (*Atrophia à vermis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 486.)

ESPECE VIII. Atrophie des Enfants, après qu'ils ont cessé de téter, avec continual appetit. (*Atrophia infantum post ablactationem*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 487.)

ESPECE IX. Atrophie des Enfants par le froid. (*Atrophia infantum, à refrigerationibus*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 486.)

ESPECE X. Atrophie des Enfants, par des aliments de mauvaise qualité. (*Atrophia infantum ab incongruis cibis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 486.)

GENRE II. Amaigrissement de tout le corps, sans fièvre, sans douleur, sans expectoration & sans affaiblissement considérable des forces musculaires. (*Macilenta*, seu *Macror*, Plater. *Prax. Med.* tom. III. pag. 472.)

VII. CLASSE, ORDRE II. 77

ESPECE I. Maigreur des Enfants par jalouzie. (*Brouzet, malad. des enfants, tom. II.*
pag. 311.)

ESPECE II. Amaigrissement des Vieillards. (*Macror Senium, Plater. Prax. medie.*
tom. III. pag. 474.)

ESPECE III. Amaigrissement de tout le corps par virus vénérien. (*Atrophia à virus*
veneroso, Ajruc. de morb. vener. tom. I. pag. 427.)

GENRE III. Aridure. — Partie du corps plus maigre & moins sensible que
les autres. (*Aridura, Linn. gen. morb. gen. 226.*)

ESPECE I. Atrophie d'un membre à la suite d'une fracture. (*Tabes membra à frac-*
tura, Heist. Inst. chirurg. tom. I. pag. 187.)

GENRE IV. Étise. — Maigreur de tout le corps, avec fièvre lente, sans
toux, ni crachement de pus. (*Tabes. — Tabes, Plater. Prax. med. tom. III.*
pag. 473.)

ESPECE I. Étise par inanition. — Maigreur de tout le corps par inanition. (*Tabes*
a depauperatione sanguinis per succi nutritii præternaturalem subtractionem orta, Morton,
tom. I. pag. 5.)

ESPECE II. Étise par hydropisie. — Amaigrissement de tout le corps par hydropisie.
(*Tabes ab hydrope, Morton, tom. I. pag. 19.*)

GENRE V. Déséchement ou maigreur extrême d'un doigt, avec douleur
périodique très-vive. (*Digitum, Linn. gen. morb. gen. 227.*)

ORDRE SECOND.

ÉVACUATIONS d'air plus ou moins chargé de parties hétérogènes.

GENRE I. Rapports. — Évacuation par la bouche, de l'air contenu dans
l'estomac. (*Ructatio. — Ructatio, Senn. tom. IV. pag. 402.*)

ESPECE I. Rapports n'ayant ni odeur ni saveur. (*Ructatio insignem nullam qualitiatem præferens, Senn. tom. IV. pag. 402.*)

ESPECE II. Rapports approchant de l'odeur & de la saveur des aliments qu'on vient
de manger. (*Ructatio cibi assumpit qualitatem præferens, Senn. tom. IV.*
pag. 402.)

ESPECE III. Rapports acides. (*Ructatio acida, Senn. tom. IV. pag. 402.*)

ESPECE IV. Rapports niodoreux. (*Ructatio nidorosa, Senn. tom. IV. pag. 402.*)

GENRE II. Rot. — Expulsion sonore par la bouche, de l'air contenu dans
l'estomach. (*Rotus. — Rotus, Plater. Prax. med. tom. I. pag. 397.*)

ESPECE I. Rot par un excès d'aliments.

78 VII. CLASSE, ORDRE III.

ESPECE II. Rot par des aliments de mauvaise qualité.

ESPECE III. Rot par affection hypocondriaque ou hystérique.

GENRE III. Nausées. — Efforts inutiles pour vomir, accompagnés de mouvements spasmodiques de l'estomac & de l'œsophage, avec expulsion d'air contenu dans l'estomac, & quelquefois évacuation de matières muqueuses. (*Nausea*. — *Nausea*, Senn. tom. IV. pag. 402. — *Nausea*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 133.)

ESPECE I. Nausées sans autre évacuation sensible que celle de l'air.

ESPECE II. Nausées avec évacuation d'une petite quantité de matières muqueuses & insipides.

ESPECE III. Nausées bilieuses.

ESPECE IV. Nausées avec évacuation d'une petite quantité de matières visqueuses & acides.

ESPECE V. Nausées des Femmes grosses. (*Levret, art des acc.* pag. 207.)

ESPECE VI. Nausées par le mouvement d'un navire.

GENRE IV. Expulsion d'un air fétide par les narines, sans ulcere. (*Fetor narium*, Plater. prax. med. tom. III. pag. 583.)

GENRE V. Haleine fétide. — Expulsion d'un air fétide par la bouche. (*Fetor oris, seu anhelitus fetidus*, Plater. prax. med. tom. III. pag. 583.)

ESPECE I. Haleine fétide de naissance.

ESPECE II. Haleine fétide, par malpropreté des dents & des gencives.

GENRE VI. Pet. — Expulsion d'un air fétide par l'anus, avec bruit ou sans bruit. (*Peditum. — Crepitus ventris*. Plater. prax. med. tom. III. pag. 583.)

GENRE VII. Expulsion d'air par le vagin, avec bruit.

GENRE VIII. Exhalaisons fétides de la surface du corps.

ESPECE I. Exhalaisons fétides des pieds & des aisselles.

ESPECE II. Exhalaisons fétides des téguments des rousseaux.

ORDRE TROISIÈME.

ÉVACUATIONS de substances solides.

GENRE I. Expulsion de substances solides par le canal de l'urethre, avec plus ou moins d'urine.

VII. CLASSE, ORDRE. III. 79

ESPECE I. Expulsion de petits calculs par le canal de l'urethre, avec plus ou moins de douleur.

ESPECE II. Expulsion par le canal de l'urethre, d'une matière sablonneuse mêlée avec l'urine.

GENRE II. Expulsion par l'anus, de substances d'une consistance semblable à celle de la pierre, avec les matières fécales, ou sans les matières fécales.

ESPECE I. Expulsion de calculs hépatiques. (*Calculi bilioſi, Morgagni, de ſed. morb. tom. II. pag. 73.*)

ESPECE II. Expulsion de calculs intestinaux. (*Intefinorum calculi, Morgagni, de ſed. morb. tom. II. pag. 88 & 90.*)

GENRE III. Expectoration de substances d'une consistance semblable à celle de la pierre, ordinairement accompagnée de pus. (*Expeſoratio calculatorum, Morgagni, de ſedibus morb. tom. I. pag. 134.*)

GENRE IV. Vomissement de calculs. (*Vomitus calculatorum, Morgagni, de ſedibus morb. tom. II. pag. 88.*)

GENRE V. Evacuation de calculs contenus dans l'ombilic. (*Lapides in umbilico, Senn. tom. IV. pag. 619.*)

GENRE VI. Carie. — Altération de l'os, avec changement de couleur, inégalités à sa surface, exfoliation, mollesse & fragilité. (*Caries. — Caries, Heijster. Inſlit. Chirurg. tom. I. pag. 369. — Carie, Du Verney, Malad. des os, tom. II. pag. 401.*)

ESPECE I. Carie scorbutique. (*Lind. Traité du scorbut. tom. I. pag. 220. — Carie scorbutique, Du Verney, Malad. des os, tom. II. pag. 406.*)

ESPECE II. Carie des dents. (*Dentium caries, Senn. tom. III. pag. 261.*)

ESPECE III. Carie scrophuleuse. (*Du Verney, Malad. des os, tom. II. pag. 407.*)

ESPECE IV. Carie des os par virus vénérien. (*Caries effum venerea, Afruc de morb. venereis. tom. I. pag. 507.*)

ESPECE V. Carie par inflammation du périoste interne. (*Du Verney, Malad. des os, tom. I. pag. 96.*)

ESPECE VI. Carie par inflammation du périoste externe. (*Du Verney, Malad. des os, tom. I. pag. 97.*)

GENRE VII. Ramollissement des os.

ESPECE I. Ramollissement des os par virus vénérien. (*Oſteofarcifis, Afruc de morb. venereis, tom. I. pag. 418.*)

GENRE VIII. Chute des dents. (*Dentium casus, Senn. tom. III. pag. 263.*)

GENRE IX. Diminution des dents par le frottement. (*Dentium imminutio, Senn. tom. III. pag. 262.*)

80 VII. CLASSE, ORDRE IV.

GENRE X. *Carte du cartilage*. — Altération des cartilages, avec exfoliation & suintement d'une humeur ichoreuse.

GENRE XI. Expulsion du Crystallin hors du globe de l'œil, par une ouverture au globe de l'œil.

ESPECE I. Expulsion du crystallin par plaie pénétrante dans le globe de l'œil.

ESPECE II. Expulsion du crystallin par ulcere pénétrant dans le globe de l'œil.

GENRE XII. Poussière écaillueuse sur les téguments de la partie chevelue de la tête, avec démangeaison. (*Furfuratio capitis*. *Senn. tom. V.* pag. 186.)

ORDRE QUATRIEME.

ÉVACUATIONS de corps organisés.

GENRE I. Accouchement. — Évacuation d'un, ou de plusieurs fœtus, au bout de neuf mois. (*Partus*. — *Accouchement*, *Smellie*, traité des accouch. tom. I. pag. 180. — *Levret. art des accouch.* pag. 80.)

ESPECE I. Accouchement naturel. — Évacuation d'un fœtus sans le secours de l'Art, au bout de neuf mois. (*Levret, art des accouch.* pag. 80.)

ESPECE II. Accouchement précipité. (*Levret, art des accouch.* pag. 100.)

ESPECE III. Passage du fœtus dans le bas ventre, par la rupture de la matrice dans les douleurs de l'accouchement. (*Crantz*, pag. 395. *de Part des accouch. de Puys*. — *Évacuation du fœtus par des voies extraordinaires*, *Smellie*, tom. II. pag. 191.)

ESPECE IV. Accouchement naturel de deux ou trois fœtus. (*Partus gemellorum*, *Roeder. elem. art. obſt.* pag. 320. — *Accouchemens des jumeaux*, *Smellie*, trait. des accouch. tom. I. pag. 390.)

GENRE II. Evacuation de l'arrière-faix. (*Solutio placenta*, *Roeder. Elem. art. obſt.* pag. 178. — *Maniere de délivrer le placenta*, *Smellie*, traité des accouch. tom. I. pag. 242.)

ESPECE I. Évacuation naturelle de l'arrière-faix. (*Expulſio placenta sine manus immiſſione*, *Roeder. elem. art. obſt.* pag. 180.)

ESPECE II. Évacuation du placenta, avant la sortie du fœtus.

GENRE III. Avortement. — Sortie du fœtus avant le terme de neuf mois. (*Abortus*. — *Abortus*, *Roeder. elem. art. obſt.* pag. 326. — *Avortement*, *Smellie*, trait. des accouch. tome I. pag. 124.)

ESPECE I. Avortement par convulsions. (*Convulſio uteri, sive abortus*, *Fred. Hoffm. tom. III.* pag. 176.)

ESPECE II.

VII. CLASSE, ORDRE IV. 81

ESPECE II. Avortement par efforts, chutes, coups violents, ou trop grands exercices. (*Abortus ab externis violentiis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 179.)

ESPECE III. Avortement par violentes passions de l'ame. (*Abortus ab animi passionibus*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 179.)

ESPECE IV. Avortement par trop de sang. (*Abortus à nimia sanguinis abundantia*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 179.)

ESPECE V. Avortement par défaut de sang. (*Abortus à defectu sanguinis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 179.)

ESPECE VI. Avortement par violents remedes. (*Abortus à fortioribus emmenagogis, purgantibus, emeticis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 179.)

ESPECE VII. Avortement par une toux violente, ou par des mouvements convulsifs. (*Abortus a tussi ferina ac convulsiva, necnon ab omnibus convulsivis morbis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 179.)

ESPECE VIII. Avortement par une perte blanche. (*Abortus à fluore albo*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 179.)

ESPECE IX. Avortement par une abondante boisson de vin ou de liqueurs. (*Abortus à vino*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 179.)

GENRE IV. Évacuation d'une mole. (*Exclusio molæ*, Roeder. elem. art. obstet. pag. 337. — *Faux germe, ou mole*, Smelie, trait. des accouch. pag. 126.)

GENRE V. Chute des ongles. (*Unguium casus*. Senn. tom. V. pag. 93.)

ESPECE I. Chute des ongles par blessure, ou par contusion.

ESPECE II. Chute des ongles par virus vénérien.

ESPECE III. Chute des ongles par un abcès.

GENRE VI. Alopécie. — Chute des poils. (*Alopecia*. — *Alopecia*, Alexander Trallianus, de art. med. pag. 1 & 4. — *Pilorum defluvium*. Senn. tom. V. pag. 83.)

ESPECE I. Chute des poils, avec entortillement, & avec excoriation de la peau vers leur racine. (*Ophiasis*, Senn. tom. V. pag. 83.)

ESPECE II. Alopécie naturelle. — Chute des poils sans cause évidente.

ESPECE III. Chute des poils par des maladies longues ou aiguës. (*Pilorum defluvium à morbis*, Senn. tom. V. pag. 83.)

ESPECE IV. Chute des poils par virus vénérien. (*Pilorum defluvium a lue venerea*. Senn. tom. V. pag. 83.)

ESPECE V. Chute des cheveux par des especes de poux. (*Tinea capillorum*. Senn. tom. V. pag. 84.)

ESPECE VI. Chute des cheveux depuis le front jusqu'au sommet de la tête par vieillisse. (*Calvities à senectute*, Plat. prax. med. tom. III. pag. 9.)

ORDRE CINQUIEME.

ÉVACUATIONS de matières plus ou moins fluides, blanchâtres, souvent jaunâtres ou noirâtres, ou d'un jaune verdâtre.

GENRE I. *Ulcere*. — Solution de continuité, avec évacuation de matières plus ou moins fluides & blanchâtres. (*Ulcus*. — *Ulcus*, *Heister*. *Inst. chir.* tom. I. pag. 347. — *Ulcus*, *Platner*. *inst. chir.* pag. 369. — *Ulcera*, *Morgagni* de *sed. morb.* tom. II. pag. 333.)

ESPECE I. *Ulcere benin.* (*Ulcus simplex*, *Senn*, tom. V. pag. 56. — *Ulcus benignum*, *Heijer*. *Inst. chir.* tom. I. pag. 348.)

ESPECE II. *Ulcere vénérien.* (*Ulcus venereum*. — *Ulcera venerea*, *Astruc de morbe vener.* tom. I. pag. 409 & 412. — *Ulcera venerea*, *Heij. inst. chirurg.* tom. I. pag. 361.)

ESPECE III. *Ulcere dartreux.*

ESPECE IV. *Ulcere serophuleux.*

ESPECE V. *Ulcere scorbutique.* (*Lind*, *Traité du scorbut*, tom. I. pag. 204.)

ESPECE VI. *Ulcere vermineux.* (*Ulcus verminosum*, *Senn*, tom. V. pag. 64.)

ESPECE VII. *Ulcere galeux.*

ESPECE VIII. *Ulcere putride.* (*Ulcus sordidum putridum & corroditum*, *Senn*, tom. V. pag. 60. — *Ulcus putridum*, *Heijer*. *inst. chir.* tom. I. pag. 360.)

ESPECE IX. *Ulcere phagédénique.* (*Phagedana*, *Senn*, tom. V. pag. 66. — *Ulcus malignum*, *Heij. inst. chir.* tom. I. pag. 356.)

ESPECE X. *Ulcere Calleux.* (*Ulcus callosum*, *Heijer*. *inst. chirurg.* tom. I. pag. 363.)

ESPECE XI. *Ulcere ancien des jambes.* (*Ulcus chironium*, *Celsus*, pag. 322. — *Ulcera tibiarum*, *Senn*, tom. V. pag. 67. — *Ulcera antiqua præseritum in cruribus*, *Heij. inst. chir.* tom. I. pag. 366.)

ESPECE XII. *Ulceres aux pieds ou aux mains, par le froid.* (*Ulcera ex frigore in pedibus & manibus*, *Celsus*, pag. 323.)

GENRE II. *Ulcere cancéreux.* — *Ulcere très-dououreux, avec bords renversés, vaisseaux variqueux, évacuation d'une humeur fânieuse.* (*Cancer ulceratus*, *Boërh. van-Swiet. de cogn. morb. aph.* 498.)

ESPECE I. *Cancer des paupières.* (*S. Yves*, *malad. des yeux.*)

ESPECE II. *Ulcere cancéreux par virus vénérien.*

ESPECE III. *Cancer à la peau.* — *Ulcere cancéreux des teguments.* (*Mémoires de l'Acad. de Chirurg.* tom. III. in-4 pag. 3.)

GENRE III. *Ulcere du tendon.*

GENRE IV. Ulcere de la matrice.

ESPECE I. Ulcere simple de la matrice, ou du col de la matrice. (*Ulcus simplex cervicis uteri*, Senn. tom. IV. pag. 629. — *Ulcere simple de la matrice*, Pujos, trait. des accouch. pag. 258.)

ESPECE II. Ulcere fongeux de l'utérus, ou du col de l'utérus. (*Ulcus malignum cervicis uteri*, Senn. tom. IV. pag. 629. — *Ulcere fongueux de la matrice*, Pujos, trait. des accouch. pag. 262.)

ESPECE III. Ulcere vénérien de la matrice, ou du col de la matrice. (*Ulcus uteri à lue vénerea*, Senn. tom. IV. pag. 629. — *Ulcere vénérique de la matrice*, Pujos, trait. des accouch. pag. 272.)

ESPECE IV. Ulcere cancéreux de la matrice. (*Cancer uteri exulceratus*, Senn. tom. IV. pag. 631. — *Ulcere carcinomateux de la matrice*, Pujos, trait. des accouch. pag. 274.)

ESPECE V. Suppuration de la matrice par le vagin, venant d'un dépôt laiteux. (*Lavret art des accouch.* pag. 180.)

GENRE V. Ulcere du périoste externe ou interne.

ESPECE I. Ulcere du périoste à la suite d'une blessure.

ESPECE II. Ulcere du périoste par virus vénérien.

ESPECE III. Ulcere du périoste, à la suite d'une inflammation.

GENRE VI. Ulcere du cerveau. (Mém. de l'Ac. de Chir. tom. I. in-4. p. 312.)

GENRE VII. Ulcere sinueux. — Ulcere avec ouverture plus étroite que son fond. (*Ulcus sinuosum*, Senn. tom. V. pag. 62.)

GENRE VIII. Fistule. — Ulcere avec callosité des bords, &c avec ouverture plus étroite que le fond. (*Fistula*. — *Fistula*, Senn. tom. V. pag. 62. — *Fistula*, Heißl. inst. chir. tom. I. pag. 364.)

ESPECE I. Fistule à l'anus. (*Ani fistula*, Heißl. inst. chirurg. tom. II. pag. 1054. — *Sinus & fistule à l'anus*, Bertrandii, oper. de chir. pag. 210.)

ESPECE II. Fistule du périné. (*Fistula perinai*, Heißl. inst. chir. tom. II. pag. 947.)

GENRE IX. Rhagades. — Solutions de continuité dans le fond & le long des rides de l'anus, par virus vénérien, avec évacuation d'une matière purulente. (*Rhagades*. — *Rhagades sive rhagadia*, Astruc de morb. veneris. tom. I. pag. 392.)

GENRE X. Ulcere du globe de l'œil. (*Ulcere de la conjonctive & de la cornée*, Maître-Jan, malad. de l'œil, pag. 379.)

ESPECE I. Ulcere de la cornée, à la suite d'une tumeur inflammatoire. (S. Yves, malad. des yeux, pag. 175.)

ESPECE II. Ulcere de la cornée par des substances corrosives.

ESPECE III. Ulcere de tout le globe de l'œil, à la suite d'une blessure.

ESPECE IV. Ulcere cancéreux du globe de l'œil. (*Ulcus oculi cancrorum*, Heister. *inf. chirurg. tom. I.* pag. 593.)

GENRE XI. *Fistule lacrymale*. — Ulcere des conduits lacrymaux, ou du lacrymal. (*Fistula lacrymalis*, Heist. *inf. chir. tom. I.* pag. 534. — *Fistula lacrymale*, Bertrand. *oper. de chir.* pag. 297.)

GENRE XII. Ulcere du palais. (*Ulcus palati*, Heister. *inf. chir. tom. II.* pag. 657.)

ESPECE I. Ulcere simple du palais.

ESPECE II. Ulcere vénérique du palais.

ESPECE III. Ulcere scorbutique du palais.

GENRE XIII. *Aphthe*. — Ulcere de la bouche, de peu d'étendue, douloureux, approchant d'une figure plus ou moins ronde. (*Aphtha*. — *Aphtha*, Senn. *tom. III.* pag. 271. — *Aphtha*, Boëth. van Swieten, *de cogn. morb. aphor.* 978.)

ESPECE I. Aphthe simple des enfants nouveaux-nés, sans fièvre. (*Brouzet, educ. med. des enf.* som. II. pag. 105.)

ESPECE II. *Muguet*. — Aphthe contagieux, avec fièvre. (*Aphtha epidemica*, van Swiet. *Comment. in aph. Boëth. aphor. 978*, tom. III. pag. 197.)

ESPECE III. Aphthe sans maladie précédente. (*Aphtha absque morbo prægresso*, van Swiet. *comment. in aph. Boëth. aphor. 983*, tom. III. pag. 201.)

ESPECE IV. Aphthes critiques. (*Aphtha quæ febres sequuntur*, Boëth. van Swiet. *de cogn. morb. aph.* pag. 983.)

ESPECE V. Aphthes vénériens des Enfants nouveaux-nés. (*Levret, art des acc.* pag. 256.)

ESPECE VI. Aphthes scorbutiques des Enfants nouveaux-nés. (*Levret, art des accouch.* pag. 256.)

GENRE XIV. Ulcere de la langue.

ESPECE I. Ulcere cancéreux de la langue. (*Cancer linguae exulceratus*, Heist. *inf. chirurg. tom. II.* pag. 655.)

ESPECE II. Ulcere simple de la langue.

ESPECE III. Ulcere vénérien de la langue.

ESPECE IV. Ulcere de la langue par l'action du mercure.

ESPECE V. Ulcere de la langue par une dent gâtée ou mal conformée.

GENRE XV. Ulcere des mamelles.

ESPECE I. Ulcere des mamelles, par une tumeur inflammatoire sans cause évidente.

ESPECE II. Ulcere des mamelles par un dépôt de lait.

VII. CLASSE, ORDRE V. 85

ESPECE III. Ulcere cancéreux des mamelles. (*Cancer mammarum operus*, Heister. *Inst. chir.* tom. II. pag. 690. — *Cancer aux mamelles*, *Mém. de l'Acad. de Chirurg.* tom. III. in-4. pag. 18 & 37.)

ESPECE IV. Ulcere cancéreux des mamelles par virus vénérien. (*Cancer mammarum exulceratum à viru venereo*, *Astruc de morb. ven.* tom. I. pag. 427.)

ESPECE V. Ulcere du mamelon. (*Mamelon excorié ou ulcétré*, *Mauriceau*, *traité des malad. des femmes grasses*, tom. I. pag. 443.)

GENRE XVI. Ulcere de l'œsophage, avec évacuation de pus par la bouche, accompagnée de simples nausées, sans vomissement, & sans douleur dans la région épigastrique.

GENRE XVII. Ozéne. — Évacuation de pus par le nez, avec plus ou moins d'odeur. (*Ozéna*. — *Ozéna*, Heister. *Inst. chir.* tom. II. pag. 619.)

ESPECE I. Ozéne avec carie des os. (*Ozéna cum carie*, Heister. *Inst. chir.* tom. II. pag. 620.)

ESPECE II. Ozéne par virus vénérien, avec carie ou sans carie. (*Ozéna venerea*, *Astruc de morb. ven.* tom. I. pag. 412.)

ESPECE III. Ozéne simple de la membrane pituitaire, sans carie & sans virus. (*Ozéna simplex*, Heist. *Inst. chir.* tom. II. pag. 619.)

GENRE XVIII. Ulcere des oreilles. (*Ulcus aurium*, Senn. tom. III. pag. 234.)

ESPECE I. Ulcere des parties externes de l'oreille. (*Ulcus auris externæ*, Senn. tom. V. pag. 234.)

ESPECE II. Ulcere de l'oreille interne. (*Ulcus auris internæ*, Senn. tom. III. pag. 234.)

ESPECE III. Evacuation de pus par l'oreille, venant d'un ulcere du cerveau. (*Aures purulentes ab abscessu cerebri*, *Morgagni de sedib. morb.* tom. I. pag. 108.)

GENRE XIX. Ulcere de l'ombilic. (*Ulcus umbilici*, Senn. tom. III. pag. 618.)

GENRE XX. Maladie de Lazare. — Ulcères contagieux, froidides, sanieux, attaquant les téguments, les muscles des bras, des lombes, des cuisses & des jambes. (*Morbus Lazari*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 427.)

GENRE XXI. Solution de continuité au doigt, par la courbure latérale de l'ongle, avec inflammation, suppuration, & douleur plus ou moins vive. (*Curvatura unguium*, Senn. tom. V. pag. 93.)

GENRE XXII. Ulcere par les cauteress actuels ou potentiels, ou par l'instrument tranchant. (*Ulcus arte factum*, Platner. *Inst. chir.* pag. 601.)

GENRE XXIII. Gonorrhée. — Écoulement par les parties naturelles, de matière liquide d'un blanc plus ou moins jaunâtre, quelquefois verdâtre,

souvent très-fluide, quelquefois visqueuse, rarement sans ardeur d'urine.

ESPECE I. *Gonorrhœa benigne*. — Évacuation par les parties naturelles, d'une matière jaunâtre, ordinairement sans ardeur d'urine, ne provenant d'aucun virus, & se terminant sans le secours d'aucune préparation mercurielle.

ESPECE II. *Gonorrhœa virulente*. — Écoulement de matière purulente, par les parties naturelles, ordinairement avec douleur, chaleur & ardeur d'urine, provenant de caute vénérienne. (*Gonorrhœa virulenta*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 357. — *Gonorrhœa virulenta*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 194. — *Gonorrhœa virulenta in virus*, Afrac, de morb. vener. tom. I. pag. 245. & 246.)

GENRE XXIV. *Chancre*. — Ulcere ordinairement d'une figure circulaire, plus ou moins profond, douloureux, & rongeant avec plus ou moins de promptitude les parties circonvoisines. (*Ulcusculum cancrosum*.)

ESPECE I. *Chancre benin*. (*Ulcusculum cancrosum benignum*.)

ESPECE II. *Chancre malin*, avec fièvre & prompte destruction des parties qui l'environnent.

ESPECE III. *Chancre vénérien*. (*Ulcusculum cancrosum venerium*, Afrac de morb. vener. tom. I. pag. 348.)

GENRE XXV. Écoulement involontaire de semence. (*Gonorrhœa benigna*, Senn. tom. IV. pag. 612. — *Gonorrhœa*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 357. — *Gonorrhœa habitualis*, Afrac de morb. veneris tom. I. pag. 305.)

ESPECE I. Écoulement de semence par relâchement. (*Gonorrhœa benigna à partibus nimis relaxatis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 357.)

ESPECE II. Écoulement de semence par surabondance. (*Gonorrhœa ab abundantia feminis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 357.)

ESPECE III. Pollution nocturne. (*Pollutio nocturna*, Senn. tom. IV. pag. 614. — *Somnus venerius*, Caius Aurelian. tom. II. pag. 391. — *Pollutio nocturna*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 357.)

ESPECE IV. Éjaculation de la semence, trop prompte pour la fécondation.

GENRE XXVI. *Consumption dorsale*. — Consomption par une évacuation trop abondante de semence, à la suite de l'excès du coit ou de la masturbation. (*Tabes dorfallis*, Lomm. Observ. med. pag. 250.)

GENRE XXVII. *Fleurs blanches*. — Évacuation par le vagin, d'une humeur blanchâtre quelquefois aunâtre. (*Leucorrhœa*. — *Fluor albus muliebris*, Senn. tom. IV. pag. 673. — *Cachexia uterina sive fluor albus*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 348. — *Fluor muliebris*, Morgagni, de sedibus morborum, tom. II. pag. 220.)

ESPECE I. Fleurs blanches à la suite des pâles couleurs.

ESPECE II. Fleurs blanches, après une grande perte de sang par le vagin.

ESPECE III. Fleurs blanches par diminution ou suppression accidentelle du flux menstruel.

ESPECE IV. Fleurs blanches à la suite d'une gonorrhée virulente.

ESPECE V. Fleurs blanches après la cessation naturelle du flux menstruel.

ESPECE VI. Fleurs blanches après les couches.

GENRE XXVIII. Atrophie par des pertes blanches. (*Tabes à fluore albo*, Morton, tom. I. pag. 8.)

GENRE XXIX. Évacuation d'urine trouble, blanchâtre, donnant par le repos une grande quantité de sédiment blanchâtre, avec ardeur sur la fin de l'évacuation. (*Mictio lattea*, Plater. *Prax. med.* tom. III. p. 746.)

GENRE XXX. *Ulcere de la Vesicæ*. — Évacuation de pus & d'urine par le canal de l'urethre, avec douleur gravative au périen & au pubis, ordinairement aiguë vers le sphincter de la vessie pendant le temps de l'excrétion de l'urine. (*Ulcus vesicæ*, Senn. tom. IV. pag. 588.)

ESPECE I. Ulcere de la vessie par un calcul. (*Ulcus vesicæ à calculo*, Senn. tom. IV. pag. 588.)

ESPECE II. Ulcere de la vessie par une gonorrhée virulente. (*Ulcus vesicæ à gonorrhœa virulentæ*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 309.)

ESPECE III. Ulcere fistuleux de la vessie. (*Fistula vesicæ*, Senn. tom. IV. pag. 589.)

GENRE XXXI. *Phthisie*. — Maigreur de tout le corps, avec fièvre lente, difficulté de respirer, crachement de pus. (*Phthisis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 284. — *Phthiseos*, Bennet. *Theatrum tabidorum*. — *Phthisis pulmonalis*, Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aph. 1196. — *Phthisis*, Morgagni, de sed. morb. tom. I. pag. 232.)

ESPECE I. Phthisie pulmonaire essentielle. (*Phthisis pulmonaris originalis*, Morton, tom. I. pag. 25.)

ESPECE II. Phthisie par hemoptysie. (*Phthisis ab haemoptoe*, Morton, tom. I. pag. 95.)

ESPECE III. Phthisie par peripneumonie, ou par pleurésie. (*Phthisis à peripneumonia, & pleuritide*, Morton, tom. I. pag. 112.)

ESPECE IV. Phthisie pulmonaire par des fièvres. (*Phthisis pulmonaris à febribus*, Morton, tom. I. pag. 125.)

ESPECE V. Phthisie par des calculs dans les poumons. (*Phthisis à calculis in pulmonibus*, Morton, tom. I. pag. 101.)

ESPECE VI. Phthisie par suppression du flux menstruel. (*Phthisis à chlora & suppressione menstruarum purgationum*, Morton, tom. I. pag. 110.)

ESPECE VII. Phthisie par suppression d'une gonorrhée virulente, ou des fleurs blanches, ou d'un ulcere ancien, ou d'un ulcere scrophuleux. (*Phthisis à suppressione gonorrhœa virulentæ, ulcerum veterum, ulcerum scrophulatum, & floris albis*, Morton, tom. I. pag. 109.)

ESPECE VIII. Phthisie asthmatische. (*Phthisis asthmatica*, Morton, tom. I. pag. 89.)

VII. CLASSE, ORDRE VI.

ESPECE IX. Phthisie par virus vénérien. (*Phthisis à lue venerea*, *Morton*, tom. I. pag. 107.)

ESPECE X. Phthisie scorbutique. (*Phthisis scorbutica*, *Morton*, tom. I. pag. 85.)

ESPECE XI. Phthisie scrophuleuse. (*Phthisis scrophulosa*, *Morton*, tom. I. pag. 81.)

ESPECE XII. Phthisie par la goutte & le rhumatisme. (*Phthisis ab arthritide & rheumatismo*, *Morton*, tom. I. pag. 118.)

ESPECE XIII. Phthisie par passion hysterique ou hypochondriaque. (*Phthisis ab hysterica, aux hypochondriaca affectione*, *Morton*, tom. I. pag. 92.)

ESPECE XIV. Phthisie par affection du foie. (*Phthisis icteritia seu hepatica*, *Morton*, tom. I. pag. 131.)

ESPECE XV. Phthisie par les ulcères internes de l'abdomen. (*Phthisis pulmonaris ab internis ulceribus viscerum & partium membranofarum*, *Morton*, tom. I. pag. 146.)

GENRE XXXII. Amaigrissement de tout le corps, par des ulcères considérables, avec fièvre. (*Tabes ab apostematibus ulceribus largis orta*, *Morton*, tom. I. pag. 9.)

GENRE XXXIII. Vomissement de pus, avec douleur fixe, aiguë & brûlante dans la région épigastrique, principalement à jeun, suivi d'assoublissement des forces, de soif & souvent de colique. (*Vomitus purulentus*, *Fabric. Hildan. observ. med. tom. I. pag. 13.* — *Vomitus purulentus*, *Morgagni, de sedib. morb. tom. II. pag. 19.*)

GENRE XXXIV. Amaigrissement des Nourrices, par une succion excessive de lait, avec fièvre. (*Tabes nutricum à lactatione nimia*, *Morton*, tom. I. pag. 13.)

GENRE XXXV. Écoulement spontané du lait, par surabondance dans les mamelles. (*Lactis redundantia*, *Senn. tom. IV. pag. 758.*)

GENRE XXXVI. Lochies. — Évacuation par le vagin, deux ou trois jours après l'accouchement, d'une humeur plus ou moins blanche. (*Lochia. — Lochies*, *Levret, art des accouch. pag. 153.*)

ESPECE I. Lochies naturelles. (*Levret, art des accouch. pag. 153.*)

ESPECE II. Lochies fétides. (*Levret, art. des accouch. pag. 153.*)

ESPECE III. Lochies de confiance glaireuse, sans couleur, sans odeur, en petite quantité. (*Levret, art des acc. pag. 154.*)

ESPECE IV. Lochies ressemblant à la lavure de chair. (*Levret, art des acc. p. 154.*)

ESPECE V. Lochies de couleur de café & d'une odeur cadavéreuse. (*Levret, art des acc. pag. 154.*)

ESPECE VI. Lochies de couleur de café, & d'une odeur fétide & ammoniacale. (*Levret, art des acc. pag. 154.*)

ORDRE VI.

ORDRE SIXIEME.

ÉVACUATION de matières plus ou moins fluides, transparentes, quelquefois avec des matières solides.

GENRE I. Vomissement. — Évacuation par la bouche, de matières contenues dans l'estomac. (*Vomitus*. — *Vomitus*, Senn. tom. IV. pag. 402. — *Motus convulsivus ventriculi*, sive *vomitus*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 139. — *Vomitus*, Morgagni, de *sedib. morb.* tom. II. pag. 19.)

ESPECE I. Vomissement par des substances vénéneuses ou nuisibles à l'estomac. (*Vomitus ab assumptis qualitate inimicis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 142.)

ESPECE II. Vomissement de matières bilieuses. (*Vomitus biliosus*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 142.)

ESPECE III. Vomissement par trop d'aliments dans l'estomac. (*Vomitus à nimia assumptorum quantitate*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 142.)

ESPECE IV. Vomissement fébrile. (*Vomitus febrilis*, Boerk. van Swiet. de cogn. morb. aphae. 652.)

ESPECE V. Vomissement de matières pituitées, par dépravation des humeurs contenues dans l'estomac. (*Vomitus à faburrâ ventriculi*, Fred. Hoffm. tom. III. p. 142.)

ESPECE VI. Vomissement par lésion du cardiac. (*Vomitus à visio orificii cardiaci*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 143.)

ESPECE VII. Vomissement par lésion du pilore. (*Vomitus à visio pilori*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 143.)

ESPECE VIII. Vomissement par un calcul dans les reins, ou dans l'urethre. (*Vomitus à calculo*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 143.)

ESPECE IX. Vomissement par les vers. (*Vomitus à vermis*, Fred. Hoffm. t. III. p. 143.)

ESPECE X. Vomissement par lésion des intestins. (*Vomitus ab intestinorum vitio*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 143.)

ESPECE XI. *Mal de mer.* — Vomissement par le mouvement d'un navire. (*Vomitus à motu corporis in navi à non effectis instituto*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 144.)

ESPECE XII. Vomissement des hypochondriques ou des hystériques. (*Vomitus hypochondriacorum*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 142.)

ESPECE XIII. Vomissement par transport d'une matière acré sur l'estomac. (*Vomitus à materia acre per metastatism ad ventriculum delata*, Fred. Hoffm. tom. III. p. 142.)

ESPECE XIV. Vomissement par un coup sur l'estomac. (*Vomitus à causâ externâ*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 144.)

ESPECE XV. Vomissement des femmes grosses. (*Levet, art des acc.* pag. 207.)

ESPECE XVI. Vomissement des enfants à la mamelle, pour avoir pris une trop grande quantité de lait. (*Brouzet, Éducat. medio. des enfants*, tome II. pag. 28. — *Vomissement de l'enfant à la mamelle*, Levet, art des acc. pag. 264.)

90 **VII. CLASSE, ORDRE VI.**

ESPECE XVII. Vomissement de chyle, des enfants à la mamelle. (*Levret, art des accouch. pag. 265.*)

GENRE II. *Passion iliaque*. — Douleur aiguë du ventre, avec borborygmes, constipation, & vomissement de matières fluides, d'une odeur souvent semblable à celle de la matière fécale. (*Passio iliaca. — Ileus, Senn. tom. IV. pag. 427.*)

ESPECE I. Passion iliaque par abcès, ou par ulcération. (*Ileus ab abcessu aut exulceratione, Senn. tom. IV. pag. 429.*)

ESPECE II. Passion iliaque par substances vénéneuses. (*Ileus à veneno, Senn. opera, tom. IV. pag. 429.*)

ESPECE III. Passion iliaque par matières fécales endurcies. (*Ileus à facibus induratis, Senn. tom. IV. pag. 429.*)

ESPECE IV. Passion iliaque par skirrhe. (*Ileus à scirrho, Senn. tom. IV. p. 429.*)

ESPECE V. Passion iliaque par ulcère cancéreux des intestins. (*Ileus à cancro intestinalis, Senn. tom. IV. pag. 429.*)

GENRE III. *Expectoration*. — Évacuation par la bouche, de matières plus ou moins fluides venant des bronches pulmonaires, avec bruit, ou avec toux. (*Expectoratio. — Expectoratio, Linn. gen. morb. gen. 178.*)

GENRE IV. *Crachement*. — Évacuation par la bouche, de matières fluides ou visqueuses, contenues dans la bouche & l'arrière bouche, chassées avec plus ou moins de bruit. (*Excreatio. — Expuitio, Plater. prax. med. tom. I. pag. 397.*)

ESPECE I. Crachotement. — Crachement habituel. (*Screatus continuus. — Expuitio ex consuetudine usitata, Plater. prax. med. tom. I. pag. 397.*)

ESPECE II. Crachement pituitex. (*Expuitio pituitosa, Plater. prax. med. tom. III. pag. 697.*)

GENRE V. *Salivation*. — Évacuation abondante de salive par la bouche. (*Salivatio. — Ptyalismus seu crebra sputatio, Senn. tom. III. pag. 260.*)

ESPECE I. Salivation par des aliments mal digérés. (*Salivatio à cibo corrupto, Senn. tom. III. pag. 261.*)

ESPECE II. Salivation par des remèdes qui provoquent la salive. (*Expuitio à remediis salivam provocantibus, Plater. prax. med. tom. III. pag. 697.*)

ESPECE III. Salivation par des préparations mercurielles. (*Salivatio mercurialis, Astruc de morbis vener. tom. I. pag. 494.*)

ESPECE IV. Salivation scorbutique. (*Continua salivæ & sputi rejetio, à scorduto, Senn. tom. IV. pag. 520.*)

ESPECE V. Salivation des hysteriques & des hypocondriaques. (*Ptyalismus ab affectione hysterica, Sydenham, tom. I pag. 264.*)

ESPECE VI. Salivation dans les petites véroles confluentes. (*Salivatio in variolis confluentibus, Sydenh. tom. I. pag. 83, 84, 93, 94, 96, 99, 103, 125, 503.*)

VII. CLASSE, ORDRE VI. 91

ESPECE VII. Salivation par inflammation ou ulcération de la bouche. (*Salivatio inflammatione & ulceribus oris*, Senn. tom. III. pag. 261.)

ESPECE VIII. Salivation excessive, avec amaigrissement de tout le corps. (*Tabes à salivation*, Morton, tom. I. pag. 18.)

GENRE VI. Ouverture du conduit de Sténon. — Solution de continuité du conduit salivaire des glandes parotides, avec écoulement continu de salive hors de la bouche. (*Mémoire de l'Acad. de Chir. in-4°. tom. III. pag. 431.*)

GENRE VII. Enchiffrément. — Évacuation par le nez, d'une humeur limpide, avec douleur gravative des parties qui répondent aux sinus du nez, particulièrement du sinus frontal. (*Coryza*, Senn. tom. III. pag. 250.)

ESPECE I. Enchiffrément par impression du froid.

ESPECE II. Enchiffrément habituel.

GENRE VIII. Évacuation des humeurs contenues dans le globe de l'œil.

ESPECE I. Évacuation de l'humeur aqueuse par cause mécanique.

ESPECE II. Évacuation de l'humeur aqueuse & quelquefois du crystallin & de l'humeur vitrée, par ulcère.

ESPECE III. Évacuation de toutes les humeurs de l'œil, par cause mécanique.

ESPECE IV. Évacuation des humeurs de l'œil, par des substances corrosives.

GENRE IX. Larmoyement. — Écoulement des larmes sur les joues. (*Epiphora*, Senn. tom. III. pag. 231.)

ESPECE I. Larmoyement par obstruction du conduit lacrymal nasal. (*Epiphora ab obstrukione ductus nasalis lacrymalis*, Heißl. inst. chirurg. tom. I. pag. 532.)

ESPECE II. Larmoyement, par tuméfaction au grand angle de l'œil affectant les points lacrymaux. (*Epiphora à tumore aliquo puncta lacrymalia infestante*, Heißl. inst. chirurg. tom. I. pag. 532.)

ESPECE III. Larmoyement, par lésion des paupières affectant les points lacrymaux. (*Epiphora à palpebrarum nosa puncta lacrymalia præcludente*, Heißl. inst. chirurg. tom. I. pag. 532.)

ESPECE IV. Larmoyement, par blessure ou par obturation des conduits lacrymaux. (*Epiphora à ductuum lacrymalium vulneratione vel obturazione*, Heißl. inst. chirurg. tom. I. pag. 532.)

ESPECE V. Larmoyement, par une excroissance de chair bouchant ou comprimant l'orifice inférieur du conduit lacrymal. (*Epiphora à polypo ductum lacrymalem occludente vel comprimente*, Heißl. inst. chirurg. tom. I. pag. 532.)

ESPECE VI. Larmoyement, par fistule lacrymale. (*Epiphora à fistula lacrymali*, Heißl. inst. chirurg. tom. I. pag. 532.)

ESPECE VII. Larmoyement, par renversement des paupières. (*Epiphora à palpebrarum inversione*, Heißl. inst. chirurg. tom. I. pag. 532.)

ESPECE VIII. Larmoyement, par érosion ou par défaut de la caroncule lacrymale. (*Epiphora à lacrymalis caruncula erosione aut defectu*, Heißl. inst. chir. tom. I. p. 532.)

92 VII. CLASSE, ORDRE VI.

ESPECE IX. Larmoyement par humeur pituiteuse. (*Epiphora ab humoris pituitosis*, *Plater. prax. medic. tom. III. pag. 672.*)

ESPECE X. Larmoyement par humeur acre. (*Epiphora à seroso humor, acris & calido*, *Plater. prax. medic. tom. III. pag. 674.*)

ESPECE XI. Larmoyement par les passions de l'ame. (*Erupio lacrymarum ab animis magnis commotionibus*, *Plater. prax. medic. tom. III. pag. 668.*)

ESPECE XII. Larmoyement par des corps étrangers dans l'œil.

ESPECE XIII. Larmoyement par l'action des corps volatils.

ESPECE XIV. Larmoyement par inflammation de l'œil.

GENRE X. Écoulement d'humeurs par les oreilles.

ESPECE I. Écoulement abondant par les oreilles, d'une matière cérumineuse & inodore.

ESPECE II. Écoulement abondant par les oreilles, d'une matière fluide, presque transparente & fétide; produit par la teigne, ordinairement sans douleur.

ESPECE III. Écoulement par les oreilles, d'une humeur séreuse, fétide & plus ou moins jaune, sans ulcere. (*Sanies ex auribus absque ulcere*, *Senn. tom. III. p. 234.*)

ESPECE IV. Écoulement d'une humeur aqueuse par les oreilles. (*Aurum aquosus effluxus*, *Plater. tom. III. pag. 669.* — *Suintement des oreilles des enfants*, *Brouzet, educ. med. des enfants*, *tom. II. pag. 294.*)

GENRE XI. Sueur trop abondante. (*Sudor præternaturalis*, *Plater. tom. III. pag. 670 & 861.*)

ESPECE I. Sueur fébrile. (*Sudor febrilis*, *Boëth. van Swiet. de cognosc. morb. aph. 715.*)

ESPECE II. Sueur excessive, avec maigreur & fièvre. (*Tabes à sudoribus immensis*, *Morton, tom. I. pag. 21.*)

ESPECE III. Sueur par violents exercices.

ESPECE IV. Sueur par la trop grande chaleur.

GENRE XII. Diabète. — Évacuation trop abondante d'urine. (*Diabetes*, — *Diabetes*, *Senn. tom. IV. pag. 582.*)

ESPECE I. Évacuation trop abondante d'urine, avec maigreur de tout le corps. (*Diabetes cum colligatione*, *Aretæus de morb. acut. & diuturn. pag. 99. & 244.* — *Tabes à diabetes*, *Morton, tom. I. pag. 16.*)

ESPECE II. Diabète par un coït immodéré. (*Diabetes à nimio venere usu*, *Senn. tom. IV. pag. 582.*)

ESPECE III. Diabète par un violent exercice. (*Diabetes ab immodico labore*, *Senn. tom. IV. pag. 582.*)

ESPECE IV. Diabète par la fièvre, particulièrement par la fièvre intermittente. (*Diabetes à febre intermitte*, *Sydenh. tom. I. pag. 192 & 520.*)

GENRE XIII. Pissement de matières muqueuses. (*Midio mucofa*, *Plater. prax. med. tom. III. pag. 746.*)

VII. CLASSE, ORDRE VI.

93

ESPECE I. Pissement de matières muqueuses, par calculs dans la vessie.

ESPECE II. Pissement de matières muqueuses, par vieillesse.

ESPECE III. Pissement de matières muqueuses, par acréte de l'urine.

GENRE XIV. Écoulement d'urine par des voies extraordinaires. (*Urina effluens per viam præternaturalem*, *Plater. tom. III. pag. 748.* — *Urina per aliena loca excretio*, *Senn. tom. IV. pag. 558.*)

GENRE XV. D'artre de la vessie. — Écoulement d'urine par le canal de l'urethre, avec des matières filamentueuses & des petits corps sous forme de pellicules, accompagné de douleur. (*Scabies vesicæ*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 310.*)

GENRE XVI. Incontinence d'urine. — Écoulement involontaire d'urine. (*Urinæ incontinentia*, *Senn. tom. IV. pag. 595.*)

ESPECE I. Incontinence d'urine pendant le sommeil. (*Incontinentia urinæ per somnum*, *Senn. tom. IV. pag. 595.*)

ESPECE II. Incontinence d'urine, par paralysie ou foiblesse du sphincter de la vessie. (*Incontinentia urinæ ab imbecillitate, aut resolutione sphincteris*, *Senn. tom. IV. pag. 595.*)

ESPECE III. Incontinence d'urine pendant le travail de l'accouchement. (*Involuntarius urinæ effluxus tempore partus contingens*, *Röder. elem. art. obſtr. pag. 83.*)

ESPECE IV. Incontinence d'urine pendant la grossesse.

ESPECE V. Incontinence d'urine par l'effet du virus vénérien.

ESPECE VI. Incontinence d'urine par la peur.

ESPECE VII. Incontinence d'urine chez les femmes, par un rire excessif.

GENRE XVII. Évacuation par le vagin, des eaux renfermées dans la matrice des femmes grosses.

ESPECE I. Évacuation des eaux contenues hors de l'amnios. (*Aqua spuria*, *Röder. elem. art. obſtr. pag. 85.*)

ESPECE II. Évacuation naturelle des eaux de l'amnios. (*Évacuation des eaux*, *Levret. art. des acc. pag. 96.*)

ESPECE III. Évacuation des eaux de l'amnios long-temps avant l'accouchement. (*Écoulement prématûr des eaux*, *Pujos, traité des accouchements, pag. 122.*)

GENRE XVIII. Ténèfme. — Desir continual d'aller du ventre, avec douleur, & souvent avec déjection par l'anus, d'une petite quantité de matières muqueuses. (*Tenesmus*, *Senn. tom. IV. pag. 472.*)

ESPECE I. Ténèfme bilioux. (*Tenesmus biliofus*, *Senn. tom. IV. pag. 472.*)

ESPECE II. Ténèfme par purgatifs violents, ou par substances vénéneuses.

ESPECE III. Ténèfme par matières fécales trop endurcies. (*Tenesmus à calculo, vel à facibus induratis*, *Senn. tom. IV. pag. 472.*)

94 VII. CLASSE, ORDRE VI.

ESPECE IV. Ténesme par le froid. (*Tenesmus à refrigeratione nimis*, Senn. tom. IV. pag. 472.)

ESPECE V. Ténesme par affection des parties circonvoisines de l'intestin rectum. (*Tenesmus à partium vicinarum affectibus*, Senn. tom. IV. pag. 472.)

ESPECE VI. Ténesme pas affection hysterique ou hypocondriaque.

GENRE XIX. Érosion de la surface des téguments, avec humidité & douleur. (*Intertrigo*, Linn. gener. morb. gen. 247.)

GENRE XX. Fissures des mains, des pieds & des lèvres par le froid, avec faiblement plus ou moins sensible.

GENRE XXI. *Croûtes de lait*. — Ulcération de la peau, affectant le visage des enfants qui tetent, avec faiblement d'une matière séreuse plus ou moins abondante & avec croûtes. (*Crustæ laitæ*, Heister. inst. chirurg. tom. I. pag. 385. — *Croûtes de lait*, Brouzet, educ. med. des enf. tom. II. pag. 91.)

GENRE XXII. *Teigne*. — Ulcération des téguments plus ou moins couverts de croûtes, avec faiblement d'une matière séreuse, attaquant ordinairement la tête des enfants, souvent avec vive démangeaison. (*Tinea*. — *Tinea*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 495. — *Tinea capitis*, Heister. inst. chirurg. tom. I. pag. 385. — *Gâle des enfants*, Puzos, traité des acc. pag. 313.)

GENRE XXIII. *Teigne par virus vénérien*. — Tumeurs croûteuses, avec démangeaison plus ou moins vive & faiblement ; attaquant le front, & le plus souvent la partie chevelue de la tête. (*Tinea adulorum venerea*, Heist. inst. chir. tom. I. pag. 386.)

GENRE XXIV. *Lepre des Grecs*. — Tumeurs plus ou moins grandes, dures, sèches, représentant des écailles de poisson, avec vive démangeaison & sueur fétide, affectant les téguments, surtout ceux des jambes, des bras & de la poitrine. (*Lepra græcorum*, Senn. tom. V. pag. 37.)

GENRE XXV. *Lepre des Juifs*. — Tumeurs dures, épaisses, entrecoupées de gessures, continues sur la plus grande partie des téguments, contagieuses, accompagnées de démangeaison, avec face horrible, front fillonné, corps dénué de poils, pouls petit, haleine fétide, respiration difficile, abattement des forces musculaires. (*Elephantiasis*, Aretaeus, pag. 130, — *Elephantia*, Lomm. observ. med. pag. 67.)

GENRE XXVI. *Dartre*. — Petit ulcères rassemblés, de longue durée, avec démangeaison, faiblement d'une humeur plus ou moins fluide & transparente, & pour l'ordinaire avec petites croûtes plus ou moins épaisses. (*Herpes*. — *Herpes*, Senn. tom. V. pag. 26. — *Herpes*, Platner. inst. chir. pag. 593.)

ESPECE I. Dartre seche. (*Herpes simplex*, Senn. tom. V. pag. 26.)

ESPECE II. Dartre humide.

ESPECE III. Dartre rongeante. (*Herpes exedens*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 426.)

ESPECE IV. Dartre sur la poitrine & sur la région épigastrique, avec cardialgie, chaleur & démangeaison. (*Zona ignea*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 426.)

ESPECE V. Dartre miliaire. (*Herpes miliaris*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 426.)

ESPECE VI. Dartre vénérienne. (*Herpes venereus*, *Astruc de morb. venereis*, t. I. p. 410.)

ORDRE SEPTIEME.

ÉVACUATION par l'anus, de matières fécales plus ou moins fluides.

GENRE I. Diarrhée. — Évacuation par l'anus, de matières fécales sous forme liquide. (*Diarrhæa*. — *Diarrhæa*, Senn. tom. IV. pag. 443. — *Diarrhæa*, Baglivi, pag. 107. — *Alvi profluvium incurruentum*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 15.)

ESPECE I. Diarrhée, avec évacuation des humeurs vitiées. (*Diarrhæa à toto corpore fine febre*, Senn. tom. IV. pag. 445.)

ESPECE II. Diarrhée par la qualité des aliments. (*Diarrhæa à ciborum qualitate*, Senn. tom. IV. pag. 446.)

ESPECE III. Diarrhée par foibleesse de l'estomac. (*Diarrhæa à ventriculi debilitate*, Senn. tom. IV. pag. 446.)

ESPECE IV. Diarrhée bilieuse. (*Diarrhæa à bilioso humore*, Senn. tom. IV. p. 446. — *Diarrhæa biliofa*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 165.)

ESPECE V. Diarrhée fécale. (*Diarrhæa fæosa*, Carol. Piso, de morb. à coll. fæos. pag. 260. — *Diarrhæa caecorrhialis*, Senn. tom. IV. pag. 447.)

ESPECE VI. Diarrhée par la quantité des aliments. (*Diarrhæa à ciborum copiâ*, Senn. tom. IV. pag. 446.)

ESPECE VII. Diarrhée par les vers. (*Diarrhæa à vermibus*, Senn. tom. IV. p. 446.)

ESPECE VIII. Diarrhée par l'éruption des dents chez les enfants. (*Diarrhæa à dentibus pueris erumpentibus*, Senn. tom. IV. pag. 448.)

ESPECE IX. Diarrhée par la suspension du flux menstrual. (*Diarrhæa à mensibus retentis*, Sennert. tom. IV. pag. 447.)

ESPECE X. Diarrhée par des substances vénéneuses ou purgatives. (*Diarrhæa à purgantibus vel à veneno*, Senn. tom. IV. pag. 448.)

ESPECE XI. Diarrhée fébrile. (*Diarrhæa cum febre*, Senn. tom. IV. pag. 443. — *Diarrhæa febrilis*, Boérh. van Swiet. de cognosc. morb. aphor. 719.)

ESPECE XII. Diarrhée des femmes nouvellement accouchées. (*Levrer, art. des acc.* pag. 166.)

ESPECE XIII. Diarrhée par le froid, ou par humidité des extrémités inférieures.

96 VII. CLASSE, ORDRE VII.

GENRE II. *Flux colliquatif*. — Évacuation par l'anus, de matières fécales, liquides, de diverses couleurs, odeur & consistance, avec fièvre & confusion de tout le corps. (*Fluxus colliquatus*, Senn. tom. IV. p. 444.)

GENRE III. *Passion cœliaque*. — Évacuation par l'anus, de matières liquides, de couleur ordinairement blanchâtre & quelquefois rousse, avec peu d'odeur, accompagnée de maigreur, sans fièvre, ni affoiblissement des forces. (*Fluxus chylosus*, Senn. tom. IV. pag. 443.)

ESPECE I. Flux par l'anus de matières fécales, liquides & blanchâtres, avec atrophie, tumeurs au bas ventre, & tension des muscles de cette partie. (*Mesenteritis vaorum angustia*, Senn. tom. IV. pag. 478.)

ESPECE II. Passion cœliaque des enfants.

ESPECE III. Passion cœliaque, par substances vénéneuses.

GENRE IV. *Liénterie*. — Évacuation par l'anus, d'aliments à peine décomposés, environnés de matières fluides, avec borborygmes, tuméfaction de l'abdomen, maigreur & dépérissement des forces. (*Liénteria*, Senn. tom. IV. pag. 439. — *Atrophia liénteria*, Morton, tom. I. pag. 23.)

GENRE V. *Flux hépatique*. — Évacuation par l'anus, de matières fécales sous forme fluide, semblables à la lavure de chair, avec pâleur de tout le corps, soif, dégoût, tuméfaction des paupières & des pieds. (*Fluxus hepaticus*, Senn. tom. IV. pag. 469.)

GENRE VI. *Misérère*. — Déjection abondante de matières fécales, avec vomissement de matières plus ou moins bilieuses, colique, ténesme & abattement des forces. (*Cholera*. — *Cholera humida*, Senn. tom. IV. pag. 405. — *Cholera*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 165.)

ESPECE I. Misérère par des aliments susceptibles d'une prompte fermentation, ou en fermentation. (*Cholera à cibis nimirum fermentescibilis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 167.)

ESPECE II. Misérère par substances vénéneuses. (*Cholera à venenis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 167.)

ESPECE III. Misérère par purgatifs ou émétiques trop violents. (*Cholera à purgantibus & emeticis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 167.)

ESPECE IV. Misérère épidémique principalement en Août & Septembre. (*Cholera moibus epidemicus*, Sydenh. tom. I. pag. 184 & 511.)

ESPECE V. Misérère par une violente colère. (*Cholera eb iracundia*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 167.)

ORDRE VIII.

ORDRE HUITIEME.

ÉVACUATIONS de matières sanguinolentes.

GENRE I. Hémorrhagie. — Évacuation excessive de sang. (*Hæmorrhagia*, — *Hæmorrhagia*, Fred. Hoffm. tom II. pag. 194. — *Hamorrhagia*, Boëth. van Swict. de cognosc. morb. aphor. 218.)

ESPECE I. Hémorrhagie artérielle par une blessure. (*Hæmorrhagia à vulnere arteria*, Senn. tom. V. pag. 120.)

ESPECE II. Hémorrhagie artérielle interne, sans principe évident.

ESPECE III. Hémorrhagie veineuse par une blessure. (*Hamorrhagia à vulnere venæ*, Senn. tom. V. pag. 120.)

ESPECE IV. Hémorrhagie interne veineuse, sans principe évident.

ESPECE V. Hémorrhagie souvent renouvelée, avec maigreur de tout le corps, sans fièvre sensible. (*Tabes ab hæmorrhagia*, Morton, tom. I. pag. 6.)

ESPECE VI. Hémorrhagie critique.

ESPECE VII. Hémorrhagie périodique.

GENRE II. Évacuation de sang par le nez. (*Sanguinis à naribus fusio*, Lomm. observ. med. pag. 112.)

ESPECE I. Hémorrhagie du nez par disposition de cet organe à l'éruption du sang. (*Hæmorrhagia à naribus ad sanguinis eruptionem pronis*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 196.)

ESPECE II. Hémorrhagie du nez par difficulté de la circulation du sang dans les vaisseaux du nez. (*Hamorrhagia narium à congectione sanguinis*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 196.)

ESPECE III. Hémorrhagie du nez par suppression d'une évacuation sanguine. (*Hæmorrhagia narium à sanguinis evacuationis suppressione*, Fred. Hoffm. tom. II. p. 197.)

ESPECE IV. Hémorrhagie du nez par l'embarras du cours des humeurs dans les viscères du bas ventre. (*Hamorrhagia à visceribus sanguineis obstrudis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 197.)

ESPECE V. Hémorrhagie du nez chez les femmes grosses.

GENRE III. Crachement de sang venant de la bouche, sans toux & sans vomissement.

ESPECE I. Crachement de sang ichoreux, par le scorbut. (*Expulatio sanguinis ex ore à scorbuto*, Senn. tom. IV. pag. 516.)

ESPECE II. Crachement de sang, par la blessure d'une ou de plusieurs parties de la Table des Maladies. N

bouche. (*Expulso sanguinis à lassione mechanica gingivarum linguae, aut faucom palati, Plater. prax. medic. tom. III. pag. 702.*)

ESPECE III. Crachement de sang venant des gencives molles, sans scorbut. (*Expulso sanguinis ex laxâ & molli carne gingivarum, Plater. prax. med. t. III. p. 702.*)

GENRE IV. Hémoptysie. — Évacuation de sang par la bouche, d'un rouge vif, ordinairement écumeux, avec toux plus ou moins vive, rarement avec effort pour vomir. (*Hæmoptysis. — Sputum sanguinis, Lommii observ. med. pag. 141. — Sputum sanguinis, Senn. tom. III. pag. 350. — Sanguinis fluxus ex pulmonibus, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 202. — Sputum sanguinis, Morgagni, de sedib. morb. tom. I. pag. 225.*)

ESPECE I. Hémoptysie par disposition naturelle des vaisseaux pulmonaires à la rupture: (*Hæmoptysis ab habitu pulmonis ad sanguinis eruptionem proni, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 203.*)

ESPECE II. Hémoptysie par de violentes inspirations & expirations. (*Disruptio vasorum in pulmonibus, violentâ nimirum & nimia dilatatione vel contractione, Plater. prax. med. tom. III. pag. 703.*)

ESPECE III. Hémoptysie par diminution ou suppression des menstrues. (*Hæmoptysis à fluxu menstruali suppresso, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 207.*)

ESPECE IV. Hémoptysie par un coup. (*Paffo hæmoptoica ab ictu, Plater. prax. med. tom. III. pag. 704.*)

ESPECE V. Hémoptysie périodique. (*Paffo hæmoptoica certis temporibus, Plater. prax. med. tom. III. pag. 699.*)

ESPECE VI. Hémoptysie par ulcere des poumons. (*Paffo hæmoptoica ab ulcere, Plater. prax. med. tom. III. pag. 704. — Hæmoptysis phthisica, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 203 & 211.*)

ESPECE VII. Hémoptysie par engorgement de la rate, avec tension douloureuse de l'hypochondre gauche. (*Hæmoptysis ab obstructione, vel infarctu lienis, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 203.*)

ESPECE VIII. Hémoptysie par des accès violents de passion hystérique ou hypochondriaque, ou par des mouvements spasmodiques. (*Hæmoptysis à spasmis atrocibus vel hystericis vel hypochondriacis, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 203.*)

ESPECE IX. Hémoptysie par pléthore. (*Hæmoptysis ab abundantia sanguinis, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 203.*)

ESPECE X. Hémoptysie des femmes grosses.

ESPECE XI. Hémoptysie pendant le cours de la petite vérole. (*Sanguinis sputum in variolis, Sydenham, tom. I. pag. 378.*)

ESPECE XII. Hémoptysie par fluxion catarrhale. (*Hæmoptysis fluxione catarrhalis, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 204.*)

ESPECE XIII. Hémoptysie par blessure. (*Paffo hæmoptoica à vulnere, Plater. prax. med. tom. III. pag. 705. — Vulnus pulmonis, Heiß. chir. tom. I. pag. 121.*)

ESPECE XIV. Hémoptysie par effort violent.

GENRE V. Vomissement de sang. — Vomissement de sang ordinairement noirâtre, souvent mêlé avec des matières contenues dans l'estomac, & pré-

VII. CLASSE, ORDRE VIII. 99

cédé de plus ou moins d'anxiété, & de douleur dans la région épigastrique. (*Vomitus cruentus*, *Lommii*, *obs. med. pag. 171.* — *Vomitus cruentus*, *Fred. Hoffm. tome II. pag. 212.* — *Vomitus cruentus*, *Stahl. Theoria medica vera*, *pag. 775.*)

ESPECE I. Vomissement de sang par suppression des hémorroïdes. (*Vomitus cruentus à fluxu hemorrhoidalimminuto vel cessante*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 213.*)

ESPECE II. Vomissement de sang par retard, diminution, ou suppression du flux menstruel. (*Vomitus cruentus à fluxus menstrualis suppressione vel diminutione vel intermissione*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 213.*)

ESPECE III. Vomissement de sang par substances véneneuses.

ESPECE IV. Vomissement de sang par violents emménagogues. (*Vomitus cruentus à validis emmenagogis*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 213.*)

ESPECE V. Vomissement de sang par mauvaises qualités de l'air. (*Vomitus cruentus ab aeris vito*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 213.*)

ESPECE VI. Vomissement de sang noirâtre, avec déjection d'une semblable matière, souvent d'une odeur forte; ordinairement avec tumeur du foie, ou de la rate. (*Seccus niger, sive morbus niger Hypocriti*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 214, 216 & 218.*)

GENRE VI. Sueur sanguinolente. (*Sudor cruentus*, *Ballon. opera*, *tom. I. pag. 195.*)

GENRE VII. Pisslement de sang. — Évacuation de sang par les voies urinaires. (*Mictus sanguinis — Hæmorrhagia ex urinariis viis*, *Fred. Hoffm. tome II. pag. 231.*)

ESPECE I. Pisslement de sang par un calcul dans les reins. (*Mictus sanguineus à calculo renibus impasto*, *Sydenh. tom. I. pag. 442.* — *Mictus cruentus à calculo in rene delitescente*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 233.*)

ESPECE II. Pisslement de sang par corrosion ou ulcère de la vessie. (*Mictus cruentus à vesicæ erosione & ulceræ*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 233.*)

ESPECE III. Pisslement de sang par purgatifs ou urinaires violents. (*Mictus cruentus ab aceroribus puigantibus aut diureticis*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 234.*)

ESPECE IV. Pisslement de sang par des espèces d'hémorroïdes sur la face interne de la vessie, ou proche du sphincter. (*Mictus cruentus à vasis vesical ejusque sphincteris dilatatis atque rupiis*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 232.*)

ESPECE V. Pisslement de sang dans les maladies aiguës, particulièrement dans les maladies exanthématiques. (*Mictus sanguineus in petechiis*, *Sydenham, tom. I. pag. 252 & 253.* — *in morbillis*, *pag. 237, 238 & 241.* — *in variolis confluentibus & discretis*, *pag. 85.*)

ESPECE VI. Pisslement de sang par un coup, ou par une chute. (*Mictus cruentus à causa extera*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 233.*)

ESPECE VII. Évacuation d'urine sanguinolente, par un ver contenu dans la vessie. (*Effus. de med. d'Edimbourg, tom. VI. pag. 381.*)

ESPECE VIII. Pisslement de sang par suppression des hémorroïdes. (*Mictus cruentus à suppressis hemorrhoidibus*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 232.*)

ESPECE IX. Pissement de sang par de violentes courses à pied ou à cheval. (*Mictus sanguinis à motu corporis fortiori, maximè equitatione*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 233.)

GENRE VIII. *Flux hémorroïdal.* — Évacuation sanguine par des tumeurs variqueuses situées autour de l'anus, & nommées hémorroïdes. (*Fluxus hemorrhoidalis*, Senn. tom. IV. pag. 473. — *Hemorrhoidal fluxus nimius*, Fred. Hoffm. tome II. pag. 219.)

ESPECE I. Flux hémorroïdal périodique.

ESPECE II. Flux hémorroïdal par des excréments trop durs.

ESPECE III. Flux hémorroïdal par violente équitation.

GENRE IX. *Perte de sang.* — Évacuation abondante de sang par l'utérus, hors le temps de la menstruation. (*Uteri haemorrhagia immoderata*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 224.)

ESPECE I. Évacuation abondante de sang par l'utérus, produite par asphyxie spasmodique. (*Uteri haemorrhagia à spasmis*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 225.)

ESPECE II. Évacuation abondante de sang par l'utérus, à l'âge où le flux menstruel doit cesser. (*Haemorrhagia uteri circa annum quinquagesimum sanguinis menstrualis excretionem cessante*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 225.)

ESPECE III. Hémorragie de l'utérus pendant l'accouchement, ou par la rupture du cordon ombilical, ou par l'ouverture d'un vaisseau de la matrice, ou par le décollement d'une partie du placenta. (*Sanguinis fluxus tempore partus, ruptura funis umbilicalis aut vasis uteri, aut solutione partis placentae ab utero*, Roeder. elem. art. obst. pag. 311.)

ESPECE IV. Hémorragie de l'utérus par la présence d'un corps étranger dans la matrice après l'accouchement. (*Haemorrhagia uteri à relictis post partum*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 225.)

ESPECE V. Perte de sang dans les derniers temps de la grossesse. (*Levret, art des accouchements*, pag. 342.)

ESPECE VI. Perte de sang immoderée après l'accouchement. (*Accouchement accompagné de perte de sang immoderée*, Puços, traité des accouch. pag. 167. — *Pertes de sang*, Levret, art des accouch. pag. 155.)

ESPECE VII. Hémorragie utérine pendant la grossesse, (*Levret, art des acc. p. 49.*)

ESPECE VIII. Hémorragie de l'utérus par plethora. (*Haemorrhagia uteri à plethora*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 225.)

GENRE X. *Flux menstrual trop abondant.* (*Nimius mensium fluxus*, Sennert. tom. IV. pag. 666. — *Fluxus mensium immodicus*, Freind opera medic. pag. 127.)

ESPECE I. Flux menstrual continuant au delà de son terme. (*Fluxus menstrualis ultra confuetum tempus subsistens*, Senn. tom. IV. pag. 672.)

ESPECE II. Flux menstrual trop abondant par plethora. (*Nimius mensium fluxus à plethorâ*, Senn. tom. IV. pag. 666.)

ESPECE III. Flux menstrual reparoissant plusieurs fois dans le mois. (*Menses inordinari*, Senn. tom. IV. pag. 671.)

VII. CLASSE, ORDRE VIII. 101

ESPECE IV. Flux menstruel continu & en très-petite quantité. (*Mensum silicium, Senn. tom. IV. pag. 665.*)

GENRE XI. Flux menstruel péchant par la couleur & la consistance. (*Menses vitiati quoad colorem & consistentiam, Senn. tom. IV. pag. 670.*)

GENRE XII. Évacuation abondante de sang par l'anus, sans hémorroiades, sans ténèse, & avec peu de coliques.

ESPECE I. Hémorragie par l'anus provenant de la suppression du flux menstruel.

ESPECE II. Hémorragie par l'anus à la suite d'une diarrhée, ou d'une dysenterie.

ESPECE III. Hémorragie par l'anus à la suite de violents exercices.

ESPECE IV. Hémorragie périodique par l'anus.

GENRE XIII. Dysenterie. — Évacuation par l'anus, de matières muqueuses, ordinairement sanguinolentes, avec ténèse & tranchées. (*Dysenteria. — Dysenteria, Senn. tome IV. pag. 448. — Dysenteria, Fred. Hoffm. tome III. pag. 151. — Dysenteria, Baglivi, pag. 107. — Dysenteria, Morgagni, de sedib. morb. tom. I. pag. 29.*)

ESPECE I. Dysenterie bénigne. (*Dysenteria benigna, Fred. Hoffm. tom. III. p. 152.*)

ESPECE II. Dysenterie maligne de 17 ou 20 jours.

ESPECE III. Dysenterie épidémique. (*Dysenteria epidemica partis anni 1669, atque integrorum 1670, 71 & 72, Sydenh. tom. I. pag. 108. — Dysenteria bilio-constipatio, Degner, historia medica de dysenteria. — Dysenteria epidemica, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 162, 163 & 164.*)

ESPECE IV. Dysenterie des camps. (*Dysenterie des camps, Monroe, med. d'Armées, tom. II. pag. 89 & 125.*)

GENRE XIV. Amaigrissement de tout le corps, par dysenterie, ou par diarrhée, avec fièvre. (*Tabes à dysenteria vel diarrhaea, Morton, tom. I. pag. 15.*)

GENRE XV. Déchirement de la fourchette pendant l'accouchement. (*Puzos, traité des accouch. pag. 125.*)

GENRE XVI. Déchirement total de l'espace qui sépare la vulve d'avec l'anus, par le passage difficile de l'enfant. (*Puzos, traité des accouch. pag. 128.*)

GENRE XVII. Hémorragie par la chute prématurée du cordon ombilical, (*Levret, art des acc. pag. 244.*)

GENRE XVIII. Plaie. — Solution de continuité, par un instrument tranchant ou aigu, avec épanchement plus ou moins considérable de sang. (*Vulnus. — Vulnus, Boërh. van Swieten, de cognosc. morb. aphor. 145. — Vulnus, Heister, inst. chirurg. tom. I. pag. 41. — Plaies d'armes blanches, Ravatot, chirurg. d'armée, pag. 417. — Vulnera, Magatti, de vulneribus, libri duo.*)

102 *VII. CLASSE, ORDRE VIII.*

ESPECE I. Plaies de la tête. (*Vulnera capitis*, Boërh. van Swier. de cogn. morb. aphor. 239. — *Capitis vulnera*, Heist. inst. chir. tom. I. pag. 129. — *Vulnera & ictus capitis*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 285 & 297.)

ESPECE II. Plaies de la poitrine. (*Vulnera thoracis*, Boërh. van Swier. de cogn. morb. aphor. 297. — *Pectoris vulnera*, Heist. inst. chir. tom. I. pag. 117. — *Vulnera & ictus colli*, pectoris & dorfi, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 312.)

ESPECE III. Plaies du ventre. (*Vulnera abdominis*, Boërh. van Swier. de cogn. morb. aphor. 306. — *Vulnera & ictus ventris & lumborum*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 321.)

ESPECE IV. Plaies des extrémités supérieures & inférieures. (*Ravaton*, chirurg. d'armée, pag. 503, 518 & 608. — *Vulnera & ictus artuum*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 331.)

GENRE XIX. *Plaies d'armes à feu.* — Solution de continuité par des armes à feu, avec évacuation de sang plus ou moins grande. (*Vulnera à machinis ignivomis & sclopetis*, Heist. inst. chir. tome I. pag. 82. — *Plaies d'armes à feu*, Ravaton, chirurg. d'armée pag. 83.)

ESPECE I. Plaies de la tête, par des armes à feu. (Ravaton, chir. d'armée, pag. 144.)

ESPECE II. Plaies du col & de la poitrine, par des armes à feu. (Ravaton, chir. d'armée, pag. 190 & 200.)

ESPECE III. Plaies du bas ventre, par des armes à feu. (Ravaton, chir. d'armée pag. 227.)

ESPECE IV. Plaies des extrémités supérieures & inférieures, par des armes à feu. (Ravaton, chir. d'armée, pag. 246 & 321.)

GENRE XX. Solution de continuité, par un instrument empoisonné. (*Vulnera veneno vexata*, Heist. inst. chir. tome I. pag. 161.)



HUITIEME CLASSE. MALADIES PAR DÉPLACEMENT DES PARTIES ORGANIQUES.

ORDRE PREMIER.

DÉPLACEMENTS des parties organiques molles.

GENRE I. Sortie involontaire d'une partie de la langue hors de la bouche.
(*Linguae procidentia*, *Plater, prax. med. tom. III. pag. 530.*)

ESPECE I. Déplacement involontaire de la langue, avec grandeur excessive produite par une matière véneneuse. (*Magnitudo linguae nimia à veneno*, *Senn. tom. III. pag. 251.*)

ESPECE II. Déplacement involontaire de la langue par paralysie.

ESPECE III. Déplacement involontaire de la langue, avec grandeur excessive produite par des matières pituitueuses. (*Magnitudo linguae nimia à materia pituitosa*, *Senn. tom. III. pag. 251.*)

ESPECE IV. Déplacement involontaire de la langue, avec grandeur excessive produite par l'action du mercure. (*Nimia linguae magnitudo à mercurio*, *Astruc de morb. veneris*, *tom. I. pag. 476.*)

ESPECE V. Déplacement involontaire de la langue, avec grandeur excessive produite par abondance de sang. (*Magnitudo linguae nimia, à sanguine*, *Senn. tom. III. pag. 251.*)

GENRE II. Sortie d'une partie du globe de l'œil hors de l'orbite. (*Oculi procidentia*, *Senn. tom. III. pag. 224.*)

ESPECE I. Déplacement d'une partie du globe de l'œil par un coup. (*Sortie de l'œil hors de l'orbite par un coup*, *Maitre-Jan, malad. de l'œil*, *pag. 307.*)

ESPECE II. Déplacement d'une partie du globe de l'œil, par paralysie des muscles de l'œil. (*Procidentia oculi à resolutione muscularum*, *Senn. tom. III. pag. 224.*)

ESPECE III. Déplacement d'une partie du globe de l'œil, par inflammation de ses parties environnantes. (*S. Yves, malad. des yeux*, *pag. 106.*)

ESPECE IV. Déplacement d'une partie du globe de l'œil, par des tumeurs dans la cavité orbitaire, dures, peu douloureuses, & d'un accroissement insensible. (*Déplacement du globe de l'œil, par l'accroissement des corps qui contiennent ou soutiennent le globe de l'œil*, *S. Yves malad. des yeux*, *pag. 109.*)

104 VIII. CLASSE, ORDRE I.

GENRE III. Chute des paupières. — Déplacement involontaire des paupières.
(*Prostis*, *Heister. inst. chir. tom. I. pag. 510.*)

ESPECE I. Chute de la paupière supérieure par relâchement de la peau. (*Præsidentia palpebrarum à nimia cutis laxitate*, *Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 511.*)

ESPECE II. Chute de la paupière supérieure par paralysie des muscles de la paupière supérieure. (*S. Yves, malad. des yeux*, pag. 80.)

GENRE IV. Déplacement involontaire de la paupière supérieure, par son union au globe de l'œil. (*Prosphysis*, *Mauchart, in Haller. Disputation. chirurg.*)

GENRE V. Déplacement des paupières par leur union entre elles. (*Palpebræ concreta sive ancyloblepharum*, *Heister. inst. chirurg. tom. I. pag. 514.* — *Union des paupières contre nature*, *S. Yves, malad. des yeux*, pag. 98.)

GENRE VI. Renversement des paupières, avec impossibilité de recouvrir entièrement le globe de l'œil.

ESPECE I. Renversement des paupières, avec les cils tournés vers le globe de l'œil. (*Trichiasis*, *Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 512.* — *Trichiaise*, *S. Yves, malad. des yeux*, pag. 76.)

ESPECE II. Renversement des paupières en dehors. (*Ectropium*, *Heist. inst. chir. tom. I. pag. 517.*)

GENRE VII. Solution de continuité à la paupière supérieure, ou à la paupière inférieure. (*Éraillement des paupières*, *S. Yves, malad. des yeux*, pag. 85.)

GENRE VIII. Obturation de la pupille. — Déplacement des bords de l'uvée par leur union entr'eux. (*Pupilla nimis conficta vel clausa*, *Heist. inst. chir. tom. I. pag. 578.*)

GENRE IX. Plique. — Embrouillement chronique & contagieux des cheveux & de la barbe, avec douleur & faiblesse des articulations (*Plica polonica*, *Senn. tom. V. pag. 86.*)

GENRE X. Hernie du cerveau. — Tumeur sur la tête des nouveaux-nés, formée par les parties contenues dans le cerveau. (*Tumeur à la tête d'un enfant nouveau-né*, *Le Dran, observ. de chir. tom. I. pag. 1.*)

GENRE XI. Bec-de-lièvre. — Solution de continuité de la levre supérieure, ou de la levre inférieure. (*Labra leporina*, *Heist. inst. chir. tom. II. p. 626.* — *Bec-de-lièvre*, *Mémoires de l'Acad. de chir. in-4°, tom. IV. pag. 385.*)

GENRE XII. Hernie de l'estomac. — Déplacement de l'estomac, formant une tumeur plus ou moins sensible sur le ventre. (*Mémoires de l'Acad. de chir. in-4°*)

GENRE XIII. Hernie intestinale. — Déplacement de l'intestin formant une tumeur, plus ou moins sensible sur le ventre, ou sur les parties externes du bassin. (Entérocele. — Enterocèle, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 180. — Hernies, le Blanc, maniere d'opérer les hernies, pag. 1.)

ESPECE I. Hernie inguinale sans accident fâcheux.

ESPECE II. Hernie inguinale dans le scrotum. (*Hernia scrota*, Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 772.)

ESPECE III. Hernie inguinale dans la vulve. (*Hernia vulvæ*, Plasner. inst. chirurg. pag. 502.)

ESPECE IV. Bubonocele. — Hernie inguinale, avec étranglement & inflammation. (Bubonocele, Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 750.)

ESPECE V. Hernie intestinale de l'ombilic. (*Omphalocoèle*, Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 735.)

ESPECE VI. Hernie intestinale par l'échancrure sciatique.

ESPECE VII. Hernie intestinale par le vagin. (*Hernie entérvaginale*, Levret, observ. sur les polypes de matrice, pag. 157. — Entérocele vaginale, Hoin, *essai sur les hernies*, pag. 250.)

ESPECE VIII. Hernie intestinale au périné. (*Entérocele périndale*, Hoin, *essai sur les hernies*, pag. 243.)

ESPECE IX. Hernie intestinale par les trous ovalaires du bassin. (*Mémoires de l'Acad. de chirurg.* in-4. tom. I. pag. 709.)

ESPECE X. Hernie crurale. (*Hernia cruralis, fove femoralis*, Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 769.)

ESPECE XI. Hernie ventrale. (*Ventriss hernia fove hernia ventralis*, Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 747.)

ESPECE XII. Hernie avec étranglement par accumulation des matières contenues dans l'intestin, avec caractère d'inflammation lente. (*Hernie avec étranglement par engouement de matières*, Mém. de l'Acad. de chir. in-4. tom. IV. pag. 247.)

ESPECE XIII. Hernie avec étranglement par inflammation. (Mém. de l'Acad. de chirurg. in-4. tom. IV. pag. 244.)

ESPECE XIV. Hernie intestinale avec gangrene. (Mém. de l'Acad. de chir. in-4. tom. I. pag. 337. tom. III. pag. 145. tom. IV. pag. 164.)

GENRE XIV. Déplacement peu sensible de l'intestin dans les parties où les hernies peuvent se former, avec pincement, douleur aiguë, vomissement & inflammation plus ou moins vive.

GENRE XV. Epiplocele. — Déplacement de l'épiploon dans les parties où les hernies intestinales peuvent se former. (Epiplocele, Heister. inst. chir. tom. II. pag. 786.)

ESPECE I. Epiplocele périnéale. (*Hoin, essai sur les hernies*, pag. 353.)

ESPECE II. Epiplocele vaginale. (*Hoin, essai sur les hernies*, pag. 365.)

GENRE XVI. *Epiplo-entérocele*. — Déplacement de l'intestin & de l'épipoloon dans les divers endroits où la hernie intestinale peut avoir lieu.

ESPECE I. Epiplo-intéromphale. — Hernie epiplo-intestinale du nombril. (*Hernia umbilicalis omenti & intestinorum*, *Heist, inst. chirurg. tom II*, p. 736.)

ESPECE II. Oschéocele. — Déplacement de l'intestin & de l'épipoloon dans le scrotum. (*Oschéocele*, *Platner, inst. chirurg.* pag. 533.)

ESPECE III. Hernie de l'intestin & de l'épipoloon par le vagin. (*Hernie entéro-epiplo-vaginale*, *Levret, observ. sur les polypes*, pag. 165. *Hernie entéro-epiplo-vaginale*, *Hoin, essai sur les hernies*, pag. 321.)

GENRE XVII. Déplacement de la matrice.

ESPECE I. Situation oblique de la matrice. (*Inclinaison de la matrice*, *Deventer, observ. sur les accouchem.* pag. 315. — *Situs uteri obliquus*, *Roeder, elem. art. obstétricar.* pag. 213. — *Obliquité de la matrice*, *Mém. de l'Acad. de chirurg. in-4. tom. III.* pag. 386.)

ESPECE II. Déplacement de la matrice par les anneaux des muscles du bas ventre. (*Mémoires de l'Acad. de chirurg. in-4. tom. III.* pag. 387.)

ESPECE III. Descente complète de la matrice, avec renversement total de son fond & de son corps, même de son col par son orifice propre, (*Levret, observ. sur les polypes*, pag. 138. — *Renversement de la matrice*, *Mémoires de l'Acad. de chirurg. in-4. tom. III.* pag. 362.)

ESPECE IV. Descente complète de la matrice sans renversement (*Levret, observ. sur les polypes*, pag. 117.)

ESPECE V. Descente incomplète de la matrice sans renversement. (*Levret, observ. sur les polypes*, pag. 113.)

ESPECE VI. Descente de la matrice, avec renversement incomplet de son fond par son orifice, (*Levret, observ. sur les polypes*, pag. 129. — *Mém. de l'Acad. de chir. in-4. tom. III.* pag. 375.)

ESPECE VII. Descente de la matrice, contenant un fœtus. (*Mém. de l'Acad. de chir. in-4. tom. III.* pag. 369.)

GENRE XVIII. Déplacement du vagin. (*Vagina procidentia*, *Heister, inst. chirurg. tom. II.* pag. 1030. — *Renversement du vagin*, *Levret, observ. sur les polypes*, pag. 168. — *Déplacement du vagin*, *Mémoires de l'Acad. de chirurg. in-4. tom. III.* pag. 390.)

GENRE XIX. *Cistocele*. — Déplacement de la vessie. (*Hernie de la vessie*, *Mémoires de l'Acad. de chirurg. in-4. tom. II.* pag. 1.)

ESPECE I. Hernie crurale de la vessie. (*Mém. de l'Acad. de chir. in-4. tom. II.* p. 23.)

ESPECE II. Hernie de la vessie par un des anneaux des muscles du bas ventre. (*Mém. de l'Acad. de chirurg. in-4. tom. II* pag. 41.)

ESPECE III. Hernie de la vessie, au périné. (*Mém. de l'Acad. de chirurg. in-4. tom. IV.* pag. 182. — *Cistocele périnéale*, *Hoin, essai sur les hernies*, pag. 344.)

VIII. CLASSE, ORDRE I. 107

ESPECE IV. Hernie de la vessie par le vagin. (*Levret, observ. sur les polypes, pag. 150. — Cistocele vaginale, Hoin, essai sur les hernies, pag. 366.*)

ESPECE V. Hernie de la vessie & de l'intestin par le vagin. (*Entero-cistocele vaginale, Hoin, essai sur les hernies, pag. 365.*)

ESPECE VI. Hernie de la vessie, avec l'épipoon, ou avec l'intestin, ou avec l'un & l'autre, par les anneaux des muscles du bas-ventre. (*Mém. de l'Acad. de chirurg. in-4. tom. II. pag. 10.*)

GENRE XX. Chute du fondement. — Déplacement de l'anus, ou de l'extrémité inférieure de l'intestin rectum. (*Ani procidentia sive intestini recti prolapsus, Heister. inst. chirurg. tom. II. pag. 1044. — Descension du rectum, Hoin, essai sur les hernies, pag. 348. — Intestini recti prolapsus, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 40.*)

ESPECE I. Chute de l'anus par le relâchement, ou par la paralysie des muscles de l'anus. (*Podicis muscularum resolutio, Plater. prax. med. tom. III. pag. 538.*)

ESPECE II. Chute du fondement des enfants. (*Brouet, educ. med. des enfants, tom. II. pag. 115.*)

ESPECE III. Chute de l'anus & du rectum par de violents efforts. (*Prolapsus podicus & recti intestini a conatus maximis, Plater. prax. med. tom. III. pag. 537.*)

GENRE XXI. Déplacement des testicules. (*Situs testium mutatus, Senn. tom. IV. pag. 600.*)

ESPECE I. Déplacement naturel des testicules. (*Senn. tom. IV. pag. 600.*)

ESPECE II. Déplacement des testicules par l'inflammation du cordon, ou par la forte contraction du muscle cremaster. (*Situs testium mutatus ab inflammatione ligamentorum, Senn. tom. IV. pag. 600.*)

GENRE XXII. Distorsion du membre viril. (*Distorsio penis, Senn. tom. IV. pag. 604.*)

GENRE XXIII. Phimosis de naissance. — Prépuce trop long (*Phimosis à nativitate, Senn. tom. IV. pag. 606.*)

GENRE XXIV. Paraphimosis de naissance. — Prépuce trop court. (*Preputium cursum, Senn. tom. IV. pag. 607.*)

GENRE XXV. Solution de continuité d'un tendon.

ESPECE I. Solution de continuité des tendons par un instrument tranchant. (*Tendines disseciti, Heister. inst. chirurg. tom. II. pag. 1095.*)

ESPECE II. Solution de continuité d'un tendon par une violente contraction. (*Rupture du tendon, Petit, malad. des os, tom. II. pag. 289.*)

GENRE XXVI. Doigts courbés, ou adhérant les uns aux autres par une cicatrice défectueuse. (*Digitii cohærentes & curvati a vitiosa cicatrice, Celsi opera omnia, pag. 497.*)

ORDRE SECOND.

DÉPLACEMENT des Parties Organiques dures.

GENRE I. *Luxation.* — Déplacement des extrémités osseuses articulées & mobiles, avec difficulté & souvent impossibilité de mouvoir la partie affectée. (*Luxatio*, Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 358. — *Luxatio*, Heister. inst. chirurg. tom. I. pag. 221. — *Luxation*, du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 1.)

ESPECE I. Luxation par l'action violente d'un corps. (*Luxation par des efforts violents*, du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 13. — *Luxatio à vi externa extendente, intorquente, expellente*, Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 361.)

ESPECE II. Luxation par la grandeur excessive de la tête articulée. (du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 14.)

ESPECE III. Luxation par le gonflement de la cavité articulaire. (du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 14.)

ESPECE IV. Luxation par abondance & mauvaise qualité de la synovie. (*Luxation par le gonflement des ligaments, ou la coagulation des humeurs synoviales*, du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 21.)

ESPECE V. Luxation par la faiblesse des ligaments. (du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 14.)

ESPECE VI. Luxation par la violente contraction des muscles.

ESPECE VII. Luxation de la mâchoire inférieure. (*Inferior maxilla luxata*, Heister. inst. chirurg. tom. I. pag. 233. — *Luxation de la mâchoire inférieure*, du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 78.)

ESPECE VIII. Luxation de la tête, ou de la première vertébre, ou de la seconde vertébre avec la première. (*Caput luxatum*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 235. — *Luxatio nucha*, Morgagni, de fed. morb. tom. II. pag. 354.)

ESPECE IX. Luxation des vertébres de l'épine. (*Luxatio vertebrarum spina*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 237. — *Luxatio vertebrarum spina cum fractura*, Morgagni, de fed. morb. tom. II. pag. 356.)

ESPECE X. Luxation du coccyx. (*Os cocygis luxatum*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 240.)

ESPECE XI. Luxation de l'humérus. (*Humerus luxatus*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 243. — *Luxation du bras*, du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 133.)

ESPECE XII. Luxation du cubitus. (*Cubitus luxatus*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 248. — *Luxation du coude*, du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 166.)

ESPECE XIII. Luxation du rayon. (du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 175.)

ESPECE XIV. Luxation des os du carpe. (*Officula carpi luxata*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 251.)

VIII. CLASSE, ORDRE II. 109

ESPECE XV. Luxation du métacarpe. (*Metacarpus luxatus*, Heiß. inf. chirurg. tom. I. pag. 251.)

ESPECE XVI. Luxation de la main. (*Manus luxata*, Heiß. inf. chirurg. tom. I. pag. 250.)

ESPECE XVII. Luxation des doigts. (*Digitii luxati*, Heiß. inf. chirurg. tom. I. pag. 251. — *Luxation des doigts*, du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 207.)

ESPECE XVIII. Luxation du fémur. (*Femur luxatum*, Heiß. inf. chirurg. tom. I. pag. 252. — *Luxation de la cuisse*, du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 221.)

ESPECE XIX. Luxation du tibia sur le fémur. (*Genu luxatum*, Heiß. inf. chirurg. tom. I. pag. 258. — *Luxation du genou*, du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 258.)

ESPECE XX. Luxation de la rotule. (*Patella luxata*, Heiß. inf. chirurg. tom. I. pag. 258.)

ESPECE XXI. Luxation du péroné. (*Fibula luxata*, Heiß. inf. chirurg. tom. I. pag. 259.)

ESPECE XXII. Luxation du pied. (*Tali five pedis luxatio*, Heiß. inf. chirurg. tom. I. pag. 260. — *Luxation du pied*, du Verney, malad. des os, tom. II. p. 267.)

ESPECE XXIII. Luxation de la clavicule. (*Clavicula luxata*, Heiß. inf. chirurg. tom. I. pag. 241.)

ESPECE XXIV. Luxation des côtes. (*Luxatae costae*, Heiß. inf. chirurg. tom. I. pag. 240. — *Luxation des côtes*, Mém. de l'Acad. de chirurg. in-4. tom. IV. pag. 573.)

ESPECE XXV. Déplacement du cartilage xiphoïde chez les enfants. (*Brouzet, educ. med. des enfants*, tom. II. pag. 151.)

GENRE II. *Entorse*. — Déplacement momentané des articulations, avec distraction violente des ligaments articulaires. (*Entorse*, du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 65.)

ESPECE I. Déplacement momentané des articulations très-mobiles. (du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 65.)

ESPECE II. Déplacement momentané des articulations peu mobiles. (*Diastase ou écartement des os*, du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 72.)

GENRE III. *Écartement des épiphyses*. — Écartement des os, unis par des cartilages. (*Écartement des pièces offuses unies par synchondrose*, du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 9.)

ESPECE I. Écartement des os du bassin pendant l'accouchement. (*Levyt, art des accouchemens*, pag. 5.)

GENRE IV. *Écartement des os*, unis par suture. (du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 2.)

GENRE V. Dents mal placées pour la mastication & pour le mouvement de la langue. (*Situs vitiatus dentium*, Senn. tom. III. pag. 265.)

110 VIII. CLASSE, ORDRE II.

GENRE VI. Solution de continuité entre les lames osseuses, par un instrument tranchant ou aigu, sans division entière de l'os. (*Ossium laetio per tela acuta*, Heist. inst. chir. tom. I. pag. 216.)

GENRE VII. Fracture. — Solution de continuité d'un os. (*Fractura — Ossa fracta*, Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 339. — *Ossium fractura universæ spectatæ*, Heist. inst. chir. tom. I. pag. 164. — *Fracture en général*, du Verney, malad. des os, tom. I. pag. 9. — *Ossium fracturæ*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 345.)

ESPECE I. Fracture simple. (*Fractura simplex*, Boërh. van Swiet, de cogn. morb. aphor. 340. — *Fracture simple*, du Verney, malad. des os, tom. I. pag. 55.)

ESPECE II. Fracture compliquée. (*Fractura complicata*, Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 340. — *Fracture compliquée*, du Verney, malad. des os, tom. I. p. 91.)

ESPECE III. Fracture oblique des os longs. (*Fractura obliqua*, Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 341. — *Fracture oblique*, du Verney, malad. des os, tom. I. p. 11.)

ESPECE IV. Fissure de l'os. — Fracture en long des grands os. (*Fissura*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 171. — *Fracture en long des grands os*, du Verney, malad. des os, tom. I. pag. 156.)

ESPECE V. Fracture transversale. (*Fractura transversa*, Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 341. — *Fracture transversale*, du Verney, tom. I. pag. 10.)

ESPECE VI. Fracture avec esquilles. (*Fractura cum fragmentis ossis*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 172. — *Fractura cum fragmientis*, Boërh. van Swiet. aphor. 341.)

ESPECE VII. Fracture des os du crâne, avec enfoncement. (*Calvaria impressio*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 145.)

ESPECE VIII. Fissure des os du crâne. (*Fissura calvaria*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 141. — *Fractures du crâne*, Mém. de l'Acad. de chirurg. in-4. tom. I. p. 188.)

ESPECE IX. Fracture des os du crâne par contre-coup. (*Mém. de l'Acad. de chirurg. in-4. tom. I. pag. 212.*)

ESPECE X. Fracture des os du nez. (*Nasus fractus*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 189. — *Fracture des os du nez*, du Verney, malad. des os, tom. I. pag. 172.)

ESPECE XI. Fracture de l'apophyse zygomatique. (du Verney, malad. des os, tom. I. pag. 182.)

ESPECE XII. Fracture de la mâchoire supérieure. (*Fractura maxillæ superioris*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 190.)

ESPECE XIII. Fracture de la mâchoire inférieure. (*Maxilla inferior fracta*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 191. — *Fracture de la mâchoire inférieure*, du Verney, malad. des os, tom. I. pag. 187.)

ESPECE XIV. Fracture de l'omoplate. (*Scapula fracta*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 194. — *Fracture de l'omoplate*, du Verney, malad. des os, tom. I. pag. 223.)

ESPECE XV. Fracture de la clavicule. (*Fractura clavicularis*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 193. — *Fracture de la clavicule*, du Verney, malad. des os, tom. I. pag. 199.)

ESPECE XVI. Fracture du sternum. (*Sternum fractum*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 195. — *Fracture du sternum*, du Verney, malad. des os, tom. I. pag. 232.)

VIII. CLASSE, ORDRE II. 111

ESPECE XVII. Fracture de l'appendice xiphoïde. (*du Verney, malad. des os, tom. I.*
pag. 233.)

ESPECE XVIII. Fracture des vertébres. (*Vertebrae fractæ, Heist. inst. chirurg.*
tom. I. pag. 199. — Fracture des vertébres, du Verney, malad. des os, tom. I.
pag. 239.)

ESPECE XIX. Fracture de l'os sacrum. (*Os sacrum fractum, Heist. inst. chirurg.*
tom. I. pag. 200. — Fracture de l'os sacrum, du Verney, malad. des os, tom. I.
pag. 241.)

ESPECE XX. Fracture du coccyx. (*du Verney, malad. des os, tom. I. pag. 241.*)

ESPECE XXI. Fracture des côtes. (*Costæ fractæ, Heist. inst. chirurg. tom. I.*
pag. 196. — *Fracture des côtes, du Verney; malad. des os, tom. I. pag. 250.*)

ESPECE XXII. Fracture des os qui composent le bassin. (*du Verney, malad. des os,*
tom. I. pag. 279.)

ESPECE XXIII. Fracture de l'humérus. (*Humerus fractus, Heist. inst. chirurg. tom. I.*
pag. 201. — *Fracture du bras, du Verney, malad. des os, tom. I. pag. 290.*)

ESPECE XXIV. Fracture du col de l'humérus. (*Mém. de l'Acad. de chirurg. in-4.*
tom. IV. pag. 614.)

ESPECE XXV. Fracture du cubitus, ou du radius. (*du Verney, malad. des os,*
tom. I. pag. 311.)

ESPECE XXVI. Fracture du cubitus & du radius. (*Brachium inferius fractum, Heist.*
inst. chirurg. tom. I. pag. 202. — Fracture de l'avant-bras, du Verney, malad. des
os, tom. I. pag. 308.)

ESPECE XXVII. Fracture du carpe. (*Ossa carpi fracta, Heist. inst. chirurg. tom. I.*
pag. 203.)

ESPECE XXVIII. Fracture du métacarpe. (*Fractura metacarpi, Heist. inst. chirurg.*
tom. I. pag. 204.)

ESPECE XXIX. Fracture des doigts. (*Digitæ fractæ, Heist. inst. chirurg. tom. I.*
pag. 204 — *Fracture des doigts, du Verney, malad. des os, tom. I. pag. 329.*)

ESPECE XXX. Fracture du fémur. (*Femur fractum, Heist. inst. chirurg. tom. I.*
pag. 204. — *Fracture simple de la cuisse, du Verney, malad. des os, tom. I.*
pag. 335.)

ESPECE XXXI. Fracture du col du fémur. (*du Verney, malad. des os, tom. I.*
pag. 354. — *Fracture du col du fémur, Mém. de l'Acad. de chirurg. in-4. tom. IV.*
pag. 630.)

ESPECE XXXII. Fracture de la rotule. (*Patella sine rotula fracta, Heist. inst. chirurg.*
tom. I. pag. 211. — Fracture de la rotule, du Verney, malad. des os, tom. I.
pag. 375.)

ESPECE XXXIII. Fracture de la jambe. (*Fractura cruris sine tibial & fibular, Heist.*
inst. chirurg. tom. I. pag. 213.)

ESPECE XXXIV. Fracture du péroné. (*du Verney, malad. des os, tom. I.*
pag. 60.)

ESPECE XXXV. Fracture des os du pied. (*Fracta pedis ossa, Heist. inst. chirurg.*
tom. I. pag. 215.)

ESPECE XXXVI. Fracture d'une ou de plusieurs dents.

112 VIII. CLASSE, ORDRE II.
GENRE VIII. Fente des ongles. (*Fissura unguium*, Senn. tom. V. p. 93.)

GENRE IX. Conformation vitieuse des jambes relativement à leur direction. (*Lordosis*. — *Perversio situ membrorum*, Plater. prax. med. tom. III. pag. 17.)

ESPECE I. Distorsion des jambes, de maniere que les genoux & les pieds s'éloignent, & que les jambes se rapprochent. (*Lordosis varorum*. — *Contorsio pedum intro*, Plater. prax. med. tom. III. pag. 17. — *Vari*, Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 1106.)

ESPECE II. Courbure des jambes en dehors, de maniere que les pieds & les genoux se rapprochent. (*Lordosis valgorum*. — *Valgi*, Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 1106.)

ESPECE III. Caigneux. — Direction vicieuse des jambes, de maniere que les genoux tendent à se toucher, tandis que les pieds s'éloignent l'un de l'autre. (*Lordosis compernium*. — *Contorsio pedum foras*, Plater. prax. med. tom. III. pag. 17.)

GENRE X. Bosse. — Distorsion de l'épine du dos, ou des os de la poitrine, de maniere à produire une éminence plus ou moins considérable. (*Gibbositas*. — *Gibbus*, Plater. prax. med. tom. III. pag. 18. — *Gibbositas*, Senn. tom. III. pag. 328.)

ESPECE I. Bosse par courbure de l'épine. (*Dorsum incurvatum*, Heist. inst. chir. tom. II. pag. 700. — *Courbure de l'épine*, Mem. de l'Acad. de chirurg. in-4. tom. IV. pag. 596. — *Gibbositas pravo situ vertebrarum dorfi*, Morgagni, de sed. morb. tom. I. pag. 297.)

ESPECE II. Bosse par la mauvaise conformation du sternum. (du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 126.)

GENRE XI. Diffémité du bassin relativement à l'accouchement. (Levret, art des accouch. pag. 10.)

ESPECE I. Détrict supérieur du Bassin, rétréci par la trop grande saillie du bord supérieur de l'os sacrum, ou par l'aplatissement du corps des os pubis.

ESPECE II. Capacité du petit bassin, rétrécie par la mauvaise conformation de l'os sacrum, ou par les épines des os iléochiens trop portés en dedans.

ESPECE III. Arcade des os pubis trop rétrécie.

ESPECE IV. Détrict inférieur trop petit par le grand rapprochement des tubérosités des os iléochiens.

ESPECE V. Détrict inférieur gêné par la grandeur du coccyx, ou par sa courbure excessive.



CLASSE IX.

NEUVIEME CLASSE.

MALADIES PAR RÉTENTION DE MATIERES FLUIDES, OU SOLIDES.

ORDRE PREMIER.

RÉTENTIONS de matières plus ou moins fluides dans une cavité.

GENRE I. *Hydrocéphale*. — Collection d'eau dans le crâne, avec accroissement du volume de la tête, & pour l'ordinaire avec écartement des sutures. (*Hydrocephalus internus*, Senn. tom. III. pag. 59. — *Hydrocephalus*, Carol. Pifon. de morb. à colluv. ferosa pag. 41. — *Hydrocephalus internus*, Heift. infl. chirurg. tom. I. pag. 495. — *Hydrocephalus*, Morgagni, de sed. morb. tom. I. pag. 87.)

ESPECE I. Hydrocéphale entre le crâne & les membranes du cerveau. (*Hydrocephalus inter cranium & cerebri membranas*, Senn. tom. III. pag. 59. — *Hydrocephalus inter cranium & cerebri membranas*, Boëth. van Swiet. de cognosc. morb. aphor. 1217.)

ESPECE II. Hydrocéphale entre les membranes du cerveau, ou dans les ventricules du cerveau. (*Hydrocephalus inter membranas & cerebrum*, Senn. tom. III. pag. 59. — *Hydrocephalus inter membranas ipsas cerebri, harumque duplicaturas, inter has & cerebrum, inter cerebri plicas, in cavaitudibus ipsis*, Boëth. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 1217.)

GENRE II. *Exophthalmie*. — Grandeur excessive du globe de l'œil, par collection d'une humeur. (*Exophthalmia*. — *Groffeur & éminence contre nature du globe de l'œil*, Maître-Jan, malad. de l'œil, pag. 289.)

ESPECE I. Grandeur excessive du globe de l'œil par abondance de l'humeur vitrée. (*Groffeur contre nature du globe de l'œil, par l'augmentation du corps vitré*, Maître-Jan, malad. des yeux, pag. 290.)

ESPECE II. *Hydropisie de l'œil*. — Grosseur démesurée du globe de l'œil par abondance de l'humeur aqueuse. (S. Yves, malad. des yeux, pag. 129.)

GENRE III. *Hydropisie de poitrine*. — Collection d'eau dans la capacité de la poitrine, avec difficulté de respirer, impossibilité de se tenir couché à la renversé, toux sèche, pâleur du visage, enflure œdémateuse des pieds & particulièrement des mains, oppression subite pendant le sommeil,

Table des Maladies. P

114 IX. CLASSE, ORDRE I.

râlement, &c quelquefois fluctuation plus ou moins sensible au tact. (*Hydrothorax*. — *Hydrops Thoracis*, Car. Pison. de morb. à colluy. ser. pag. 237. — *Hydrops pectoris*, Senn. tom. III. pag. 327. — *Thoracis hydrops*, Morgagni, de sed. morb. tom. I. pag. 136. — *Hydrops thoracis*, Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 1219.)

ESPECE I. Hydropisie d'une seule cavité de la poitrine ; avec son moins grave du côté affecté que du côté sain, en frappant l'un & l'autre côté de la poitrine en même temps : avec difficulté & souvent impossibilité de se coucher sur le côté sain, de crainte de suffocation. (*Hydrops in una parte pectoris*, Senn. tom. III. pag. 328.)

ESPECE II. Hydropisie de poitrine dans les deux cavités. (*Aqua in toto thorace*, Senn. tom. III. pag. 328.)

ESPECE III. Collection d'eau dans un sac formé par la plevre. (*Hydrops pectoris fuscatus*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 337.)

ESPECE IV. Hydropisie du péricarde. (Senac, traité du cœur, tom. II. pag. 349. — *Hydrops pericardii*, Morgagni, de sed. morb. tom. I. pag. 140.)

GENRE IV. Ascite. — Collection d'eau dans le ventre, avec abattement des forces, tuméfaction, fluctuation, difficulté de respirer, pesanteur dans les hypocondres, urine ordinairement briquetée & en petite quantité. (*Ascites*. — *Hydrops ascites*, Carol. Pison. de morb. à coll. serosâ, pag. 329. — *Ascites*, Senn. tom. IV. pag. 550. — *Ascites*, Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 1226. — *Ascites*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 94.)

ESPECE I. Ascite par affection du foie. (*Ascites ab hepate*, Carol. Pif. de morb. à coll. ser. pag. 334. — *Ascites ab affectione hepatis*, Fred. Hoffm. tom. III. p. 325.)

ESPECE II. Ascite par affection de la rate. (*Ascites à lienis & reliquorum abdominalis viscerum labo*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 326.)

ESPECE III. Ascite par une trop grande boisson d'eau. (*Ascites à nimio aquæ potu*, Car. Pifon. de morb. à coll. seros. pag. 333.)

ESPECE IV. Ascite par l'usage immoderé des spiritueux. (*Ascites ab abusu aquæ vitæ*, Car. Pifon. de morb. à coll. seros. pag. 337.)

ESPECE V. Ascite par la suppression du flux menstrual, ou du flux hémorroïdal. (*Ascites à suppressione fluxus menstrualis & haemorrhoidalis*, Car. Pifon. de morb. à coll. seros. pag. 336.)

GENRE V. Hydromphale. — Tumeur indolente de l'ombilic, formée par collection d'eau ; pour l'ordinaire un peu transparente, & avec fluctuation sensible au tact. (*Hydromphalus*. — *Hydromphalon*, Plater. prax. med. tom. III. pag. 201. — *Hernia umbilici aquosa aut hydromphalus*, Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 737. — *Hydromphale*, Dionis, traité des oper. de chirurg. commenté par la Faye, pag. 108.)

GENRE VI. Hydropisie de la matrice. — Rétention d'eau dans la cavité de la marrice, avec tuméfaction circonscrite dans la région hypogastrique, douleur & maigreur de tout le corps, changement dans la situation & dans la grandeur naturelle du col de la matrice. (*Hydrops uteri*, Senn.

IX. CLASSE, ORDRE I. 115

tom. IV. pag. 640. — *Hydrops uteri*, Carol. Pison. de morb. à coll. serosa. pag. 369. — *Hydrops uteri*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 326. — *Hydrops uteri*, Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 1224.)

ESPECE I. Hydropisie de matrice, avec foetus. (*Hydrops uteri cum fetus*, Senn. tom. IV. pag. 644. — *Hydrops uteri cum graviditate*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 326.)

ESPECE II. Collection & rétention d'eau, entre les parois de la matrice & celles des membranes du placenta. (*Pulos*, traité des accouch. pag. 86.)

ESPECE III. Collection d'eau, entre une portion des membranes de l'arriere-saix.

ESPECE IV. Hydropisie de matrice, par des hydatides. (*Hydrops uteri à vesiculis*, Carol. Pif. de morb. à coll. serosa. pag. 369.)

GENRE VII. Hydropisie des ovaires. — Tumeur dure & fixe dans la région hypogastrique; ordinairement sur une des parties de l'hypogastre; avec distension considérable du bas ventre; sans changement sensible de situation & de grandeur du col de la matrice. (*Hydrops ovariorum*, Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 1223. — *Hydropisie de l'ovaire*, Smellie, obs. sur les accouch. tom. II. pag. 179.)

GENRE VIII. Hydropisie de l'articulation. — Tumeur de l'articulation peu douloureuse, formée par l'amas d'une humeur plus ou moins fluide dans la capsule articulaire, gênant le mouvement articulaire, avec fluctuation plus ou moins sensible, sans changement de couleur des téguments (*Hydrops articulorum*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 343.)

ESPECE I. Hydropisie de l'articulation, par un coup, avec vive douleur, ramollissement & carie légère des cartilages & des os. (*Tumeur blanche*, Effais & obs. de med. d'Edimbourg, tom. IV. pag. 367 & 373.)

ESPECE II. Hydropisie simple de l'articulation, par un coup. (*Hydrops articuli post lapsum*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 343.)

ESPECE III. Hydropisie de l'articulation chez les femmes en couche. (*Tumeur blanche chez les femmes en couche par la fièvre de lait*, Effais & obs. de med. d'Edimbourg, tom. IV. pag. 380.)

ESPECE IV. Hydropisie de l'articulation par virus scrophuleux.

ESPECE V. Hydropisie de l'articulation sans cause évidente.

GENRE IX. Anévrisme. — Tumeur, avec pulsation plus ou moins sensible; cédant en partie sous le doigt, plus ou moins douloureuse, formée par la dilatation d'une portion des parois d'une artère, & communiquant immédiatement avec la cavité de l'artère. (*Anevrysma*. — *Anevrysma*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 414.)

ESPECE I. Anevrisme vrai. (*Anevrysma verum*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 414.)

ESPECE II. Anevrisme faux. (*Anevrysma spurium*, Heist. inst. chirurg. tom. I. p. 414.)

GENRE X. Varice. — Tumeur peu douloureuse, sans pulsation, cédant en

116 IX. CLASSE, ORDRE I.

partie sous le doigt, formée par la dilatation d'une portion des parois d'une veine, & communiquant immédiatement avec la cavité de la veine. (*Varix. — Varix, Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 1101.*)

ESPECE I. Varices par des courses forcées, ou par d'autres mouvements violents & rapides des jambes.

ESPECE II. Varices pour avoir resté trop longtemps debout ou assis.

ESPECE III. Varices des femmes grosses. (*Levret, art des accouch. pag. 217.*)

ESPECE IV. Varices aux jambes & aux cuisses par l'action du feu.

GENRE XI. *Hémorroides*. — Tumeurs rouges, plus ou moins molles & dououreuses, situées au bord de l'anus, donnant quelquefois du sang. (*Hæmorrhoides. — Hæmorrhoides, Senn. tom. IV. pag. 472. — Hæmorrhoides, Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 1047. — Hæmorrhoides, Morgagni, de sed. morb. tom. II. p. 38.*)

ESPECE I. Hémorroides externes. (*Hæmorrhoides externæ, Senn. tom. IV. pag. 473.*)

ESPECE II. Hémorroides internes. (*Hæmorrhoides cæcæ, Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 1050.*)

ESPECE III. Hémorroides des femmes enceintes. (*Levret, art des accouch. pag. 214.*)

ESPECE IV. Hémorroides des femmes accouchées. (*Levret, art des accouch. p. 187.*)

GENRE XII. *Tumeur de la vésicule du fiel, par abondance de la bile*. — Tumeur plus ou moins éminente, dans l'endroit qui répond à la vésicule du fiel, avec anxiété, constriction douloureuse dans les hypochondres, particulièrement dans l'hypochondre droit ; quelquefois avec couleur jaunâtre de la peau & de l'albuginée. (*Mém. de l'Acad. de chirurg. tom. I. in-4. pag. 155.*)

GENRE XIII. *Hydatide*. — Tumeur capsuleuse, transparente, remplie d'une humeur limpide, quelquefois située dans le tissu cellulaire, rarement seule ; plus souvent en grand nombre, réunies par des pédicules & par un tissu cellulaire. (*Hydatis. — Hydatides, Morgagni, de sedibus & caus. morb. tom. II. pag. 104 & 110. — Hydatides, Carol. Pison. de morb. à colluv. seros. pag. 439.*)

ESPECE I. Hydatides dans la matrice. (*Smellie, obs. sur les accouch. tom. II. pag. 119.*)

GENRE XIV. *Phlyctènes*. — Vésicules remplies d'une humeur transparente, scellées sur les téguments. (*Phlyctæna, Plater. prax. med. tom. III. p. 202.*)

ESPECE I. Phlyctènes par le feu. (*Phlyctæna ab igne, Senn. tom. V. pag. 32.*)

ESPECE II. Phlyctènes par la mauvaise qualité des humeurs. (*Phlyctæna ab humore acri, Senn. tom. V. pag. 32.*)

ESPECE III. Phlyctènes par le frottement réitéré d'un corps dur.

ESPECE IV. Phlyctènes des paupières & de la conjonctive. (*S. Yves, maled. des yeux, pag. 193.*)

GENRE XV. *Abcès.* — Tumeur, avec fluctuation plus ou moins sensible au tact, & douleur plus ou moins forte ; presque toujours précédée d'inflammation, formée par une matière opaque, plus ou moins liquide, ordinairement blanchâtre, quelquefois ichoreuse. (*Abscessus*. — *Abcesso*. *Senn. tom. V. pag. 7.* — *Abscessus*, *Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 402.*)

ESPECE I. *Abcès par une tumeur inflammatoire.* (*Abscessus*, *Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 402.* — *Abscessus*, *Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 273.*)

ESPECE II. *Dépot.* — *Abcès*, sans être précédé d'inflammation sensible. (*Abscessus per decubitum*, *Sever. de abcess. rec. natura*, *pag. 19, 20, 21 & 26.*)

ESPECE III. *Abcès par métastase.* (*Abscessus vi metastasis*, *Sever. de abcess. recondit. natura*, *pag. 511.*)

ESPECE IV. *Abcès à la suite d'une contusion.*

ESPECE V. *Abcès scrophuleux.*

ESPECE VI. *Abcès laiteux.* (*Apostomes laiteux des mamelles*, *Levret, art des accouch. pag. 174.* — *Abcès par des dépôts laiteux confécouïs*, *Levret, art des acc. pag. 178.*)

ESPECE VII. *Pustule.* — Tumeur superficielle, petite, circonscrite, blanchâtre, remplie d'une humeur blanchâtre ou purulente. (*Pustula*. — *Pustula*, *Linn. gen. morb. gen. 274.*)

GENRE XVI. *Abcès de l'œil.* — Globe de l'œil plus ou moins tuméfié par la présence du pus. (*Abcès de l'œil*, *S. Yves, malad. des yeux, pag. 171.*)

ESPECE I. *Hypopion.* — *Abcès de l'œil dans la cornée transparente.* (*Hypopion*, *S. Yves, malad. des yeux, pag. 172.* — *Hypopyon*, *Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 589.*)

ESPECE II. *Abcès à l'uvée.* (*S. Yves, malad. des yeux, pag. 171.*)

ESPECE III. *Abcès entre la cornée opaque & la conjonctive.* (*S. Yves, malad. des yeux, pag. 171.*)

GENRE XVII. *Empyème.* — Collection de pus dans une des cavités de la poitrine, avec difficulté de respirer, de se tenir couché à la renverse, ou sur le côté sain ; avec fièvre lente, douleur gravative sur le diaphragme, & gonflement œdémateux des mains. (*Empyema*. — *Empyema*, *Senn. tom. III. pag. 325.* — *Empyema*, *Plater. inst. chirurg. pag. 415.*)

ESPECE I. *Empyème par inflammation des poumons.* (*Empyema à peripneumonid*, *Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 833.*)

ESPECE II. *Empyème par inflammation de la plèvre.* (*Empyema à pleuritide*, *Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 892.*)

ESPECE III. *Empyème par métastase.*

GENRE XVIII. *Abcès du foie.* — Tumeur du ventre, particulièrement de l'hypocondré droit, avec douleur au dessous des fausses côtes, ou au dessus de l'ombilic du côté droit ; avec difficulté de respirer, toux, soif, défaillance

plus ou moins fréquente, & fièvre. (*Abscessus hepatis*, Morgagni, de sed. morb. tom. II, pag. 63.)

E S P E C E I. Abcès du foie par inflammation du foie. (*Abscessus hepatis*, Senn. tom. IV, pag. 547. — *Abcès au foie*, Mém. de l'Acad. de chirurg. tom. II, in-4, pag. 59.)

E S P E C E II. Abcès du foie, à l'occasion des plaies de la tête. (Mém. de l'Acad. de chirurg. tom. III, in-4, pag. 484.)

G E N R E X I X. *Abcès des intestins.* — Douleur fixe du ventre, avec tumeur, fièvre, frisson irrégulier, évacuation de pus par l'anus. (*Abscessus intestini paris*, Ballon. oper. med. tom. I, pag. 198.)

G E N R E X X. *Ischurie.* — Distension douloureuse de la vessie, par suppression d'évacuation de l'urine ; sensible au tact dans l'intestin rectum, & sur la région hypogastrique immédiatement au dessus des os pubis ; avec efforts presque continuels pour uriner. (*Ischuria*. — *Urina suppressio seu ischuria*, Senn. tom. IV, pag. 591. — *Urina suppressa*, Heist. inst. chirurg. tom. II, pag. 940.)

E S P E C E I. Ischurie par obstruction du canal de l'urethre. (*Ischuria ab obstrukione meatus urinarii*, Senn. tom. IV, pag. 591. — *Ischuria à cicatrice, aut rugis, aut urethra tuberculo, aut prostatis justo grandioribus vel scirrhosis*, Heist. inst. chirurg. tom. II, pag. 941. — *Urina suppressio*, Morgagni, de sed. morb. tom. II, pag. 149.)

E S P E C E II. Ischurie par des matières pituitées. (*Ischuria à pituita in vesica*, Senn. tom. IV, pag. 591.)

E S P E C E III. Ischurie aux approches de l'accouchement, ou pendant le travail de l'accouchement. (*Urina suppressio*, Roederer, element. artis obstet. pag. 77. — *Retention d'urine à la fin de la grossesse & pendant l'accouchement*, Smellie, pratique des accouche. tom. I, pag. 161.)

E S P E C E IV. Retention d'urine, dans les premiers mois de la grossesse, par descente incomplete de matrice. (Levret, art des accouche. pag. 221.)

E S P E C E V. Ischurie par la diminution ou la perte, soit du sentiment, soit du mouvement musculaire de la vessie. (*Ischuria à vesico sensu deficiente*, Senn. tom. IV, pag. 592.)

E S P E C E VI. Ischurie par spasme de la vessie. (*Suppressio urinæ à spasmo*, Fred. Hoffm. tom. II, pag. 313. — *Urina retentio à spasmo*, Fred. Hoffm. tom. IV, pag. 279.)

E S P E C E VII. Ischurie chez les enfants, par la mauvaise qualité du lait. (*Urina suppressio apud pueros*, Fred. Hoffm. tom. III, pag. 494.)

E S P E C E VIII. Ischurie par une trop longue & volontaire rétention d'urine. (*Ischuria ab urinâ nimis diu retentâ*, Senn. tom. IV, pag. 592.)

E S P E C E IX. Suppression d'urine par gonorrhée virulente. (*Suppressio urinæ ex gonorrhœa*, Fred. Hoffm. tom. II, pag. 315.)

E S P E C E X. Suppression d'urine par inflammation du sphincter, ou du col de la vessie. (*Ischuria ab inflammatione vesica*, Senn. tom. IV, pag. 591. — *Urina suppressio propter graviorem aliquam sphincteris aut cervicis vesica inflammationem*, Heist. inst. chirurg. tom. II, pag. 941.)

IX. CLASSE, ORDRE I. 119

ESPECE XI. Ischurie par la goutte. (*Ischuria à materia podagrissâ retrogressa*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 341.*)

ESPECE XII. Ischurie par un calcul dans la vessie, ou dans le canal de l'urethre. (*Ischuria à calculo*, *Senn. tom. IV. pag. 591.* — *Ischuria à calculo cervici vesicæ impacto*, *Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 941.*)

ESPECE XIII. Ischurie par défaut d'ouverture du gland, ou du canal de l'urethre. (*Ischuria ab apertura urethrae sive glandis defecta*, *Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 818.* — *Ischuria par l'extrémité du canal de l'urethre close*, ou par manque d'une portion du canal, *Levret, art des accouch. pag. 236.*)

GENRE XXI. (*Obstruction des uretères*. — Rétention d'urine dans les reins, ou dans les uretères, avec douleur aiguë depuis la région lombaire jusques dans le fond de la région hypogastrique; vomissement & ischurie; sans tuméfaction de la vessie. (*Obstratio ureterum*, *Senn. tom. IV. pag. 581.*)

ESPECE I. Obstruction des uretères par un calcul. (*Angustia renum à calculo*, *Senn. tom. IV. pag. 572.* — *Obstratio ureterum à calculo*, *Senn. tom. IV. pag. 581.*)

ESPECE II. Obstruction des uretères par des matières visqueuses. (*Obstratio renum à crassis & viscidis humoribus*, *Senn. tom. IV. pag. 572.* — *Obstratio ureterum à pituita*, *Senn. tom. IV. pag. 581.*)

ESPECE III. Obstruction des uretères par compression des parties voisines: (*Obstratio renum à compressione*, *Senn. tom. IV. pag. 573.* — *Obstratio ureterum à compressione vicinorum*, *Senn. tom. IV. pag. 581.*)

ESPECE IV. Obstruction des uretères par du pus, précédée d'un pissement de matière purulente. (*Obstratio renum à pure*, *Senn. tom. IV. pag. 572.* — *Obstratio ureterum à pure*, *Senn. tom. IV. pag. 581.*)

ESPECE V. Obstruction des uretères par un caillot de sang, précédée d'un pissement de sang. (*Obstratio renum à sanguinis grumo*, *Senn. tom. IV. pag. 572.* — *Obstratio ureterum à sanguinis grumo*, *Senn. tom. IV. pag. 581.*)

GENRE XXII. *Dysuria*. — Évacuation d'urine, lente, difficile & douloureuse. (*Dysuria*. — *Dysuria*, *Senn. tom. IV. pag. 594.* — *Urinæ difficultas*, *Morgagni*, *de sed. morb. tom. II. pag. 156.*)

ESPECE I. Difficulté d'uriner par des cicatrices dans le canal de l'urethre. (*Difficultas urinæ reddenda à caruncula in urethra*, *Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 834.*)

ESPECE II. Gonorrhée seche. — Difficulté d'uriner, avec tumeur & rougeur au periné, par virus vénérien. (*Dysuria venerea siccæ*, *Astruc de morb. vener. tom. I. pag. 282.*)

ESPECE III. Difficulté d'uriner par virus vénérien, sans tumeur ni rougeur au periné. (*Gonorrhœa siccæ absque tumore aut rubore nec in pene nec in perinæo*, *Astruc de morb. vener. tom. I. pag. 283.*)

ESPECE IV. Difficulté d'uriner par des substances vénéneuses. (*Ardor urinæ à venenis*, *sic à cantharidibus*, *Senn. tom. IV. pag. 594.*)

ESPECE V. Difficulté d'uriner, par l'abondance ou la mauvaise qualité de la semence. (*Ardor urinæ à semine in masculis*, *Senn. tom. IV. pag. 595.*)

ESPECE VI. Difficulté d'uriner par des vers. (*Difficultas mingendi à vermis*, *Senn. tom. IV. pag. 587.*)

ESPECE VII. Difficulté d'uriner, à la suite d'une gonorrhée vénérienne. (*Stranguria gonorrhœa pedis equa*, Astruc, de morb. vener. tom. I. pag. 309.)

ESPECE VIII. Difficulté d'uriner par l'inflammation du col de la vessie, ou du canal de l'urethre. (*Ardor urinæ à partum vesicæ inflammatione*, Senn. tom. IV. pag. 595.)

GENRE XXIII. Rétention du cérumen dans le conduit auditif, avec plus ou moins de fécidité. (*Sordities aurium cum fetore*, Senn. tom. III. p. 235.)

ORDRE SECOND.

RÉTENTIONS de matières plus ou moins fluides dans plusieurs cavités.

GENRE I. *Suppression des règles*. — Rétention du flux menstruel. (*Mensum defectus & suppressio*, Senn. tom. IV. pag. 659. — *Menses suppressi*, Freind. oper. med. pag. 97.)

ESPECE I. Suppression des règles par l'impression trop vive des corps froids. (*Suppressio mensum à frigida aqua potu, vel lotione in aqua frigida, vel frigido aere*, Senn. tom. IV. pag. 660. — *Menses suppressi lotione in aqua frigidâ*, Freind. oper. med. pag. 121.)

ESPECE II. Suppression du flux menstruel par faiblesse. (*Suppressi menses cum pulsū debili & tardo*, Freind., Oper. med. pag. 118.)

ESPECE III. Suppression du flux menstruel, par les vives passions de l'âme. (*Mensum defectus à terrore*, Senn. tom. IV. pag. 659.)

ESPECE IV. Suppression du flux menstruel par affection spasmodique.

ESPECE V. Suppression des règles par de violents exercices. (*Suppressio mensum ab exercitiis atque laboribus nimis*, Senn. tom. IV. pag. 659.)

ESPECE VI. Suppression des règles par des évacuations trop abondantes, ou par de longues maladies. (*Suppressio mensum ab evacuationibus nimis per quamcumque partem facilis*, Senn. tom. IV. pag. 660.)

ESPECE VII. Suppression du flux menstruel par excès de graisse. (*Suppressio mensum ob sanguinis conseruentem in pinguedinem*, Senn. tom. IV. pag. 660.)

ESPECE VIII. Rétention du flux menstruel par la mauvaise conformation de l'utérus, ou du vagin. (*Suppressio mensum ob carnem vel membranam in utero aut vagina, effluxum prohibentem*, Senn. tom. IV. pag. 660.)

GENRE II. Rétention de matières fluides plus ou moins blanchâtres, qui doivent s'écouler par le vagin après l'accouchement. (*Retentio lochiorum*, Senn. tom. IV. pag. 741.)

ESPECE I. Suppression des loches par le froid. (*Suppressio lochiorum à frigore*, Senn. tom. IV. pag. 741.)

ESPECE II.

IX. CLASSE, ORDRE II. 121

ESPECE II. Suppression des lochies par les vives passions de l'ame. (*Suppreffio lochiorum à perturbationibus animi*, Sean. tom. IV. pag. 741.)

ESPECE III. Suppression des lochies par le cours trop accelleré du sang ou des humeurs, vers les mamelles, ou vers la tête. (*Suppreffio lochiorum à sanguine cum impetu ad mammae ruente*, Senn. tom. IV. pag. 741.)

GENRE III. Suppression subite des pertes blanches.

ESPECE I. Suppression des pertes blanches, par l'abus immodéré des forts astringents.

ESPECE II. Suppression des pertes blanches par l'impression trop vive des corps froids

ESPECE III. Suppression des pertes blanches par les vives passions de l'ame.

GENRE IV. Hydropisie. — Rétention de sérosités dans le tissu cellulaire. (*Hydrops*, — *Hydrops*, Sydenham, tom. I. pag. 333. — *Hydrops*, Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 1215. — *Hydrops*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 322. — *Aqua inter cutem*, Aretæus, de morb. acut. & diutur. pag. 93. — *Œdema*, Senn. tom. V. pag. 27.)

ESPECE I. *Leucophlegmatie.* — Tuméfaction des téguments; molle; cédant à la pression du doigt, en conservant peu de temps l'empreinte; avec pâleur du visage. (*Leucophlegmatia*. — *Phlegmatias*, Aretæus, de morb. acut. & diut. pag. 94. — *Leucophlegmatia*, Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 1225. — *Leucophlegmatia*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 323.)

ESPECE II. *Anasarque.* — Tuméfaction des téguments, moins molle, plus élevée & conservant plus longtemps l'empreinte du doigt, que dans la leucophlegmatie; commençant par les pieds, pour dela s'étendre à tous les téguments. (*Anasarca*. — *Anasarca*, Aretæus, de morb. acut. & diut. pag. 94. — *Anasarca*, Senn. tom. IV. pag. 567. — *Anasarca*, Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 1225.)

ESPECE III. *Hydrocéphale cutanée.* — Collection d'eau dans le tissu cellulaire des téguments de la tête. (*Hydrocephalus colluvie facta inter integumenta ipsa*, Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 1217. — *Hydrocephalon externum*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 496.)

ESPECE IV. *Hydropisie des paupières.* (*Tumor œdematosus in palpebris*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 510. — *Hydropisie des paupières*, S. Yves, malad. des yeux, pag. 91.)

ESPECE V. *Œdeme des mamelles.* (*Œdema mamarum*, Senn. tom. IV. pag. 751.)

ESPECE VI. Gonflement œdématueux des grandes lèvres, chez les femmes enceintes. (*Levret, art des accouch.* pag. 217.)

ESPECE VII. Enflure œdématueuse des extrémités inférieures, chez les femmes enceintes. (*Puqos, traité des accouch.* pag. 85.)

ESPECE VIII. *Œdématie.* — Enflure œdématueuse des jambes. (*Œdematia*. — *Tumor œdematosus pedum*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 323 & 333.)

GENRE V. Hydatides du poumon. — Hydropisie du poumon par des hydatides, avec difficulté de respirer, oppression, & expectoration plus ou moins fréquente d'hydatides. (*Hydatides pulmonis*, Carol. Pison. de morb. a colluv. serof. pag. 242.)

122 IX. CLASSE, ORDRE II.

GENRE VI. *Hydrocele*. — Tumeur du scrotum, avec fluctuation plus ou moins sensible, & douleur plus ou moins vive. (*Hydrocele*. — *Hydrocele*, Heist, inst. chirurg. tom. II. pag. 793. — *Hydrocele*, Mém. de l'Acad. de chirurg. tom. III. in-4. pag. 85. — *Hydrocele*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 186.)

ESPECE I. Rétention de fluide dans le tissu cellulaire du scrotum. (*Hydrops scroti*, Boeth. van Swiet. de cogn. morb. apher. 1227. — *Hydrocele des nouveaux-nés*, Levret, art des accouch. pag. 249.)

ESPECE II. Rétention de fluide entre la tunique vaginale & la tunique albuginée des testicules. (*Hydrops involuci vaginalis testis*, Boeth. van Swiet. de cogn. morb. apher. 1227. — *Hydrops inter vaginalem & albugineam testiculi*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 187.)

ESPECE III. Rétention de fluide dans la tunique vaginale du cordon spermatique. (*Hydrocele in tunica vaginali*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 187, 188 & 189. — *Hydrocele par la tunique vaginale du cordon spermatique*, Bertrand, traité des oper. de chirurg. pag. 191.)

ESPECE IV. Hydrocele par collection d'une humeur sanguinolente. (*Hamatocele*, Heist, inst. chirurg. tom. II. pag. 803.)

GENRE VII. *Cirfocele*. — Tumeur le long du cordon spermatique, noueuse, sans fluctuation, s'étendant quelquefois jusques sur le testicule, formée par des varices. (*Cirfocele*. — *Cirfocele*, Heister. inst. chirurg. tom. II. pag. 808. — *Cirfocele*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 191.)

GENRE VIII. Difficulté d'éjaculer la semence. (*Seminis ejaculatio lata*, Senn. tom. IV. pag. 610.)

GENRE IX. *Dépôts laiteux*. — Rétention du lait en différentes parties du corps, avant ou après l'accouchement. (*Puzos*, traité des accouchements, pag. 341.)

ESPECE I. Dépôt laiteux avant l'accouchement, avec fièvre aiguë. (*Puzos*, traité des accouch. pag. 371. — *Dépôts laiteux pendant la greffe*, ordinairement dans l'hypogastre, ou sur les extrémités inférieures, *Puzos*, traité des accouch. pag. 381. — *Levret*, art des accouch. pag. 192. — *Dépôts laiteux*, avant l'accouchement.)

ESPECE II. Dépôts laiteux dans les premiers jours de l'accouchement, avec fièvre aiguë, douleur fixe & vive sur une partie du corps (*Puzos*, traité des accouch. pag. 367. & 373.)

ESPECE III. Dépôts laiteux après les couches. (*Dépôts laiteux consécutifs*, ou *après les couches*, *Levret*, art des accouch. pag. 178.)

ESPECE IV. Dépôts laiteux sur les mamelles. (*Puzos*, traité des accouch. pag. 348.)

ESPECE V. Engorgement laiteux des mamelles chez les femmes nouvellement accouchées. (*Levret*, art des accouch. pag. 174.)

ESPECE VI. Engorgement laiteux dans le bassin, après l'accouchement. (*Levret*, art des accouch. pag. 168. — *Dépôts laiteux dans l'hypogastre*, *Puzos*, traité des acc. pag. 356.)

IX. CLASSE, ORDRE II. 123

ESPECE VII. Engorgement laiteux des extrémités inférieures, après l'accouchement.
(*Levret, art des accouch.* pag. 170 & 338.)

ESPECE VIII. Dépôts de lait sur la matrice, quelques jours après l'accouchement.
(*Levret, art des accouch.* pag. 181.)

ESPECE IX. Dépôts de lait sur la matrice, dans le temps où la fièvre de lait devroit arriver. (*Levret, art des accouch.* pag. 180.)

GENRE X. Distension des mamelles pendant la grossesse. (*Gonflement des mamelles pendant la grossesse, Puzos traité des accouch.* pag. 52.)

GENRE XI. Distension douloureuse des mamelles, par la rétention du lait chez les nourrices, & chez les femmes qui cessent de nourrir; souvent avec tumeurs inégales. (*Retentio lactis in mammis à coagulatione vel alius viuis, Senn. tom. IV. pag. 759.*)

GENRE XII. Gonflement de la matrice ou de son museau, plus ou moins sensible au tact, avec douleur des ligaments ronds, difficulté de marcher & de se tenir sur les jambes. (*Engorgement de la matrice ou de son museau, Levret, art des accouch.* pag. 365.)

GENRE XIII. Douleur aiguë dans l'hypochondre droit, périodique, de peu de durée, avec tuméfaction, sans dureté, ni sentiment de pesanteur. (*Inflatio hepatis, Senn. tom. IV. pag. 540.*)

GENRE XIV. Douleur plus ou moins vive de l'hypochondre gauche, avec tumeur, pour ainsi dire, flatueuse. (*Inflatio lienis, Senn. tom. IV. pag. 488.*)

GENRE XV. Contusion. — Pression plus ou moins violente sur une partie du corps, par une cause mécanique, sans être suivie d'une évacuation sensible de sang. (*Contusio, Heft. inst. chirurg. tom. I. pag. 153.*)

ESPECE I. Contusion par un coup, ou par une chute. (*Contusio ieiu, impulsu atque iactu, Heft. inst. chirurg. tom. I. pag. 154.*)

ESPECE II. Contusion par les armes à feu. (*Contusion par des balles, des éclats de bombes, &c. Ravaton, chirurg. d'armée, pag. 3.*)

ESPECE III. Contusion par l'air vivement comprimé. (*Contusion par la pression & l'agitation de l'air, Ravaton, chirurg. d'armée, pag. 6.*)

ESPECE IV. Contusions des os du crâne. (*Ravaton, chirurg. d'armée, pag. 10.*)

ESPECE V. Contusions de la poitrine. (*Ravaton, chirurg. d'armée, pag. 27.*)

ESPECE VI. Contusions de l'abdomen. (*Ravaton, chirurg. d'armée, pag. 36.*)

ESPECE VII. Contusions des extrémités. (*Ravaton, chirurg. d'armée, pag. 49.*)

ESPECE VIII. Contusions des articulations. (*Ravaton, chirurg. d'armée, pag. 62.*)

ESPECE IX. Contusions attaquant le corps des os des extrémités. (*Ravaton, chirurg. d'arm. pag. 71.*)

124 IX. CLASSE, ORDRE III.
ESPECE X. Contusions des yeux. — (*Maladies qui suivent les coups reçus à l'œil.*
S. Yves, malad. des yeux, pag. 133.)

GENRE XVI. Épanchement de sang dans le tissu cellulaire, par de fortes contusions. (*Ravatou, chirurg. d'armée, pag. 80.*)

GENRE XVII. Rétention des fluides qui arrosent la langue, avec aspérité & sécheresse de cet organe. (*Linguae asperitas & scabritas, Senn. tom. III,*
pag. 250.)

ORDRE TROISIÈME.

RÉTENTIONS de matières d'une consistance plus ou moins épaisse, dans une ou plusieurs cavités.

GENRE I. *Corpulence.* — Rétention d'une trop grande quantité d'humeur adipeuse dans le tissu cellulaire du corps. (*Corpulentia. — Corpulentia nimia, Senn. tom. V. pag. 8.*)

GENRE II. *Tumeur adipeuse.* — Tumeur adhérente à la peau, d'une dureté & d'une sensibilité approchant de celle des téguments, plus ou moins étendue, formée par l'extension du tissu cellulaire & par l'accumulation de la graisse. (*Tumores adiposi. — Tumores adiposi, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 272.*)

GENRE III. *Squirrhe.* — Tumeur dure, insensible, souvent de longue durée, difficile à résoudre, & facile à dégénérer en cancer. (*Scirrus. — Scirrus, Senn. tom. V. pag. 28. — Scirrus, Boërh. van Swi. de cogn. morb. aphor. 484.*)

ESPECE I. Squirrhe de glandes salivaires. (*Glandulae salivales nimis tumidae ac induratae, Heist. inst. chirurg. tom. II. pag 665.*)

ESPECE II. Dureté des amygdales. (*Tonsillae induratae, Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 663.*)

ESPECE III. Squirrhe de la langue. (*Scirrus linguae, Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 655.*)

ESPECE IV. Squirrhe des mamelles, par la compression d'un corps étranger.

ESPECE V. Squirrhe des mamelles, par suppression des règles.

ESPECE VI. Squirrhe des mamelles, par virus écrouelleux. (*Glandulae mammarum scrophulis tumentes, Senn. tom. IV. pag 752.*)

ESPECE VII. Squirrhe des mamelles, par virus vénéréen.

ESPECE VIII. Squirrhe des mamelles, sans aucun principe évident.

ESPECE IX. Squirrhe des glandes axillaires ou inguinales, par virus écrouelleux

IX. CLASSE, ORDRE III. 125

ESPECE X. Squirre des glandes axillaires, ou inguinales par virus vénérien.

ESPECE XI. Squirre des glandes axillaires par communication du squirre des mamelles.

ESPECE XII. Squirre du testicule. (*Scirrus testiculi*, Senn. tom. IV. pag. 600.)

ESPECE XIII. Squirre du corps de la matrice, sans virus vénérien. (*Uteri Scirrus*, Senn. tom. IV. pag. 644. — *Squircle de la matrice*, Pujos, traité des acc. pag. 255.)

ESPECE XIV. Squirre du corps de la matrice par virus vénérien. (*Scirrus uteri venereus*, Aßtruc, de morb. venereis, pag. 428.)

ESPECE XV. Squirre du col de la matrice sans principe vénérien. (*Scirrus in cervice uteri*, Senn. tom. IV. pag. 644.)

ESPECE XVI. Squirre du col de la matrice par virus vénérien.

ESPECE XVII. Squirre du gland. (*Scirrus glandis*, Heißt. inst. chirurg. tom. II. pag. 816.)

GENRE IV. Tumeurs lymphatiques, avoisinant le vagin, ou prennant naissance dans la circonference de la matrice; plus ou moins sensibles au tact; pour l'ordinaire indolentes & médiocrement dures. (*Levret, art des accouch.* pag. 374.)

ESPECE I. Tumeurs lymphatiques dans les environs de la matrice & du vagin, sans virus vénérien. (*Levret, art des accouch.* pag. 175.)

ESPECE II. Tumeurs lymphatiques dans les environs de la matrice & du vagin par virus vénérien. (*Levret, art des accouch.* pag. 375.)

GENRE V. Grosseur considérable du testicule, sans inflammation, ni vive douleur.

ESPECE I. Grosseur du testicule, par accumulation de semence.

ESPECE II. Grosseur du testicule, par virus vénérien.

ESPECE III. Grosseur du testicule, à la suite d'un coup ou d'une inflammation.

GENRE VI. *Squircle de l'estomac.* — Douleur gravative, fixe, & de longue durée, dans la région épigastrique; très-légère dans son commencement, & avec digestion difficile; ensuite devenant plus forte & accompagnée de renvois, de vomissement, de gonflement & de dureté dans l'épigastre. (*Scirrus ventriculi*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 14.)

GENRE VII. Tuméfaction du ventre des enfants, de longue durée, souvent avec inégalités dans l'abdomen, douleur & difficulté de respirer. (*Bouffissure du ventre*, Brouzet, educ. med. des enfants, tom. II. pag. 64.)

GENRE VIII. *Obstruction du mésentère.* — Tumeur dure dans la capacité de l'abdomen, plus ou moins étendue vers la région ombilicale, avec borbottements, rapports, colique, constipation, maigreur extrême & abattement des forces. (*Obstratio mésenterii*, Senn. tom. IV. pag. 478.)

GENRE IX. *Tumeur de l'épipoon.* — Tumeur considérable du ventre, indépendante des réguments & des muscles du ventre auxquels elle adhère, plus ou moins douloureuse, ordinairement plus saillante au dessus du nombril, avec anxiété, & difficile digestion. (*Omenti intumescensia*, Senn. tom. IV. pag. 483.)

GENRE X. *Obstruction du foie.* — Tumeur dure du foie, plus ou moins étendue dans l'hypochondre droit, avec douleur gravative & sourde, affaiblissement des forces vitales, couleur jaunâtre des téguments & particulièrement de l'albuginée. (*Obstrucio hepatis*. — *Scirrus hepatis*, Senn. tom. IV. pag. 543. — *Obstrucio hepatis*, Senn. tom. IV. pag. 538.)

GENRE XI. *Obstruction de la rate.* — Tumeur dure de la rate, plus ou moins étendue dans l'hypochondre gauche, avec douleur gravative, abattement des forces vitales & musculaires, digestion lente & souvent très-laborieuse, couleur du visage livide & comme plombée. (*Obstrucio lienis*. — *Scirrus lienis*, Senn. tom. IV. pag. 489. — *Obstrucio lienis*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 66.)

GENRE XII. *Obstruction du pancréas.* — Douleur profonde & plus ou moins aiguë dans l'épigastre & vers le milieu des vertèbres dorsales, avec battement violent de l'artère coeliaque, affaiblissement des forces vitales, maigreur & constipation. (*Obstrucio pancreatis*. — *Obstrucio pancreatis*, Senn. tom. IV. pag. 483. — *Pancreas scirrhosum*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 72.)

GENRE XIII. *Ganglion.* — Tumeur dure, insensible, mobile, ordinairement située sur les tendons, ou sur les ligaments de la main, & rarement sur ceux du pied. (*Ganglion*, Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 1085.)

GENRE XIV. *Loupe.* — Tumeur indolente, ne changeant point la couleur de la peau, plus ou moins mobile & molle, remplie d'une humeur approchant de la consistance & de la couleur de la graisse. (*Lupia*. — *Meliceris*, *atheroma & steatoma*, Senn. tom. V. pag. 43. — *Tumor tunicā comprehensus*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 457.)

ESPECE I. *Taupe.* — Tumeur molle, grande, indolente, située dans le tissu cellulaire des téguments qui recouvrent le crâne; quelquefois avec carie de la table externe du crâne, sur laquelle elle est située. (*Talpa*, Senn. tom. V. p. 44.)

ESPECE II. Tumeur enkystée des paupières. (*Aihérome des paupières*, S. Yves, malad. des yeux, pag. 92.)

ESPECE III. Tumeur folliculeuse vers le petit angle de l'œil, venant de la face interne de la paupière supérieure. (*Tumeur adipeuse*, S. Yves, malad. des yeux, pag. 94.)

ESPECE IV. *Grille.* — Petite tumeur dure & blanche, située sur le bord des paupières. (*Gravelle*, S. Yves, malad. des yeux, pag. 65 & 66.)

IX. CLASSE, ORDRE IV.

127

ESPECE V. Tumeur folliculeuse, grande, molle, indolente, ordinairement située sur le dos. (Natta, Senn. tom. V. pag. 44.)

GENRE XV. *Goître*. — Tuméfaction plus ou moins étendue, de la glande thyroïde, ou des autres glandes extérieures du larynx, indolente, plus ou moins dure, située sur la partie antérieure ou sur les parties latérales du col. (Bronchocele. — Bronchocele, Plater. prax. med. tom. III. pag. 201. — Bronchocele, Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 678. — Goître, Brouzet, educ. med. des enf. tom. II. pag. 272. — Tumores glandula thyroidæ, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 275.)

GENRE XVI. *Tumeur lombaire*. — Tumeur sur les vertèbres lombaires des nouveaux-nés, médiocrement dure, quelquefois avec fluctuation; accompagnée de foiblesse de la vessie & des parties inférieures, souvent avec paralysie de ces parties (Spina bifida, Bidloo, oper. anat. chirurg. pag. 187. — Spina bifida, Levret, art des accouch. pag. 237. — Tumor ad lumbares vertebrae, Morgagni, de sed. morb. tom. I. pag. 95.)

ORDRE QUATRIEME.

RÉTENTIONS des matières qui servent au développement & à l'accroissement de diverses parties molles du corps.

GENRE I. Accroissement considérable du globe de l'œil, par la trop grande épaisseur des membranes du globe de l'œil. (Grosseur démesurée du globe de l'œil, par l'épaisseur extraordinaire de ses membranes, S. Yves, malad. des yeux, pag. 128.)

GENRE II. *Mûre*. — Excroissance de chair entre les paupières & le globe de l'œil, venant de la caroncule lacrymale, ou proche de la caroncule lacrymale. (Encanthis, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 519.)

GENRE III. *Staphylome*. — Tumeur presque indolente, petite, située sur la cornée transparente, rarement sur la cornée opaque. (Staphyloma. — Staphylome, S. Yves, malad. des yeux, pag. 178. — Staphyloma, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 581.)

GENRE IV. Excroissances de chair sur le bord des paupières, avec diminution de la vue, & difficulté de mouvoir le globe de l'œil. (Caligo à variis palpebrarum tuberculis & excrescentiis, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 508.)

GENRE V. *Onglet*. — Excroissance membraneuse, venant pour l'ordinaire du grand angle de l'œil, sur laquelle rampent une multitude de vaisseaux

128 IX. CLASSE, ORDRE IV.
sanguins. (*Pterygion*. — *Pterygion*, *S. Yves*, *mélad des yeux*, pag. 118.
— *Pannus*, *sive pterygium oculorum* *Heist. inst. chirurg.* tom. I. pag. 581.)

GENRE VI. *Filet*. — Frein de la langue, d'une conformation à gêner le mouvement de cet organe. (*Frenulum linguæ vitiosum*, *Heist. inst. chirurg.* tom. II. pag. 652. — *Filet*, *Levret*, *art des accouch.* pag. 240.)

GENRE VII. Brides ligamenteuses sur les deux côtés de la langue des enfants, avec difficulté & quelquefois impossibilité de tenter. (*Levret art des accouch.* pag. 241.)

GENRE VIII. *Polype*. — Excroissance charnue, molle, peu douloureuse dans les commencements, ordinairement située dans les cavités qui s'ouvrent immédiatement à l'extérieur. (*Polypus*. — *Polype*, *Levret*, *observat. sur la Cure des polypes*. — *Polype*, *Bertrand*, *oper. de chirurg.* pag. 358.)

ESPECE I. Polype benin du nez. (*Levret*, *observ. sur la cure des polypes*, pag. 215.)

ESPECE II. Polype muqueux du nez. (*Levret*, *observ. sur la cure des polypes*, pag. 314.)

ESPECE III. Polype du nez par virus vénérien.

ESPECE IV. Polype cancéreux du nez. (*Polypus nasalis cancerosus*, *Heist. inst. chir.* tom. II. pag. 619. — *Polype cancéreux du nez*, *Levret*, *observ. sur la cure des polypes*, pag. 216.)

ESPECE V. Polype du vagin. (*Levret*, *observ. sur la cure des polypes*, pag. 145.)

ESPECE VI. *Polype utérin*. — Augmentation du volume de la matrice par un polype, avec dilatation & ramollissement du col de la matrice, tiraillement des ligaments larges & des ligaments ronds, & douleur approchant de celle qui accompagne le travail de l'accouchement. (*Augmentation du volume de la matrice, par un polype utérin*, *Levret*, *art des accouch.* pag. 372. — *Levret*, *observ. sur la cure des Polypes*, pag. 15.)

GENRE IX. Excroissances de chair dans le conduit auditif. (*Tubercula*, *sive carnes excrescentes in ipso aurium meatu*, *Heist. inst. chirurg.* tom. II. pag. 605.)

GENRE X. Excroissance de chair, par l'ouverture de la carie des dents. (*Epulis*, *Plater. prax. med.* tom. III. pag. 198.)

GENRE XI. Excroissance de chair, venant des gencives, & surpassant la hauteur des dents. (*Gingivarum caro luxurians dentium superincarnatio*, *Plater. prax. med.* tom. III. pag. 198.)

GENRE XII. Excroissances charnues venant du palais, ou de l'arrière bouche. (*Excrecentia juxta fauces, vel tonsillas, vel palatum provenientes*, *Heist. inst. chirurg.* tom. II. pag. 664.)

GENRE XIII. Excroissances de chair dans les ulcères. (*Caro in ulceribus excrescens & luxurians*, *Senn. tom. V.* pag. 61.)

GENRE XIV.

IX. CLASSE, ORDRE IV.

119

GENRE XIV. Excroissances fongueuses des membranes du cerveau. (*Fungi cerebri*, Senn. tom. III. pag. 55.)

GENRE XV. *Sarcocèle*. — Tumeur du testicule, médiocrement dure, sans fluctuation, ni douleur, pour l'ordinaire se formant avec lenteur. (*Sarcocèle*. — *Sarcocèle*, Heist. inst. chirurg. tom. III. pag. 789.)

GENRE XVI. *Fraises*. — Excroissances presque sphériques, plus ou moins dures; approchant de la couleur de la peau, souvent d'une couleur rougeâtre, inégales, & adhérant aux teguments par un petit pédicule. (*Fraga*.)

ESPECE I. *Fraise*, ou cic bénin.

ESPECE II. *Fraise*, ou cic vénérique. (*Ficus à morbo venereo*, Astruc de morb. vener. tom. I. pag. 391.)

GENRE XVII. *Verrue*. — Excroissance sur la peau, approchant de la couleur des teguments, plus ou moins sensible, inégale, d'une dureté médiocre, & affectant différentes formes. (*Verruca*, Plater. prax. med. tom. III. pag. 211.)

ESPECE I. *Verrue* bénigne. (*Verruca*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 454.)

ESPECE II. *Verrue* vénérique. (*Verruca venerea*, Astruc, de morb. vener. tom. I. pag. 386.)

ESPECE III. *Verrue* avec disposition au cancer. (*Verruca cancrosa*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 456.)

GENRE XVIII. *Condylome*. — Excroissance au bord de l'anus, indolente, médiocrement dure, approchant pour l'ordinaire de la grandeur & de la couleur des hémorroïdes. (*Condyloma*.)

ESPECE I. *Condylome* bénin.

ESPECE II. *Condylome* vénérien. (*Condyloma venereum*, Astruc, de morb. vener. tom. I. pag. 386.)

GENRE XIX. *Criée*. — Excroissance molle, quelquefois dure, d'une couleur rougeâtre, inégale ou dentelée à son extrémité, plus ou moins dure, située autour de l'anus, & sur les parties génitales de l'un & de l'autre sexe; produite par virus vénérien. (*Crista*, Astruc, de morb. vener. tom. I. pag. 386.)

GENRE XX. *Porreau*. — Excroissance charnue, oblongue, petite, déliée, peu sensible, située sur la face intérieure du prépuce, proche de la base du gland, sur le frein; sur les levres de la vulve; & rarement au bord de l'anus. (*Porrus*.)

ESPECE I. *Porreau* bénin.)

ESPECE II. *Porreau* vénérien. (*Porrus venereus*, Astruc, de morb. vener. tom. I. pag. 386.)

Table des Maladies. R

130 IX. CLASSE, ORDRE V.

GENRE XXI. Callosité.—Epaississement de l'épiderme par frôtement, avec dureté & insensibilité. (*Callus cutaneus*, *Plater. prax. med. tom. III. pag. 210.*)

ESPECE I. Callosité des mains ou des pieds.

ESPECE II. Cor au pied. (*Clavus*, *Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 1104.*)

GENRE XXII. Allongement des grandes lèvres, ou des nymphes. (*Levret, art des accouch. pag. 19 & 22.*)

GENRE XXIII. Parties superflues de l'enfant nouveau-né. (*Levret, art des accouch. pag. 239.*)

GENRE XXIV. Union des parties molles qui doivent être défunies.

ESPECE I. Union des paupières entr'elles, ou du globe de l'œil avec les paupières. (*Ancylloblepharum*, *Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 514.*)

ESPECE II. Narines closes. (*Foramina narium præter naturam concreta*, *Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 623.*)

ESPECE III. Union des lèvres entr'elles.

ESPECE IV. Imperforation du conduit de l'oreille.

ESPECE V. Urethre entièrement close, ou en partie. (*Penis urethra non perforata*, *Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 818.*—*Vices de conformatio[n] de l'urethre*, *Levret, art des accouch. pag. 236.*)

ESPECE VI. Imperforation de l'anus. (*Levret, art des accouch. pag. 234.*)

ESPECE VII. Vagin entièrement clos, ou en partie. (*Vagina, vel ex parte, vel integre oclusa*, *Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 955.*—*Vulva imperforée*, *Levret, art des accouch. pag. 23.*)

ESPECE VIII. Cohérence des doigts, par naissance. (*Cohæsio digitorum in utero*, *Celsi, Oper. med. pag. 497.*)

ESPECE IX. Cohérence des doigts, à la suite des ulcères. (*Digitæ inter se invicem cohærentes*, *Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 465.*)

ORDRE CINQUIEME.

RÉTENTIONS d'un ou de plusieurs corps organisés dans une cavité.

GENRE I. Rétention du fœtus dans le bas-ventre, hors de la matrice. (*Anatomie chirurgicale de Palatin*, par *Petit*, *tom. II. pag. 239.*)

ESPECE I. Rétention du fœtus dans le bas ventre, par son développement hors de la matrice. (*Levret, art des accouch. pag. 52.*)

ESPECE II. Rétention du fœtus dans le ventre, par le déchirement de la matrice. (*Levret, art des accouch. pag. 105.*)

GENRE II. *Fœtus mort, & retenu dans la région hypogastrique.* — Grosseur du ventre, avec cessation entière du mouvement du fœtus, diminution des forces vitales de la mère, orifice externe du col de la matrice plus dilaté ; douleur gravative dans l'hypogastre ; mouvement rapide de la grosseur du ventre, vers le côté où la malade se tourne, étant couchée.

ESPECE I. Enfant mort & retenu dans la matrice. (*Smellie, observ. sur les accouch. tom. II, pag. 187.*)

ESPECE II. Enfant mort & retenu dans la capacité du bas-ventre. (*Smellie, observ. sur les accouch. tom. II, pag. 74.*)

ESPECE III. Enfant mort & retenu dans la matrice, longtemps après le terme de neuf mois.

GENRE III. Accouchement laborieux, à cause de la mauvaise situation ou conformatio[n] du fœtus, du placenta, du cordon ombilical & des membranes du fœtus.

ESPECE I. Accouchement laborieux, où le front du fœtus est tourné vers l'os pubis. (*Accouchement laborieux, où le front du fœtus se trouve contre l'os pubis, Smellie, prat. des accouch. tom. I, pag. 287, tom. II, pag. 316 & 545.*)

ESPECE II. Accouchement laborieux, où la face du fœtus se présente la première. (*Smellie, pratique des accouch. tom. I, pag. 292, tom. II, pag. 324.*)

ESPECE III. Accouchement laborieux, où la tête du fœtus est arrêtée par le bord supérieur de l'os sacrum.

ESPECE IV. Accouchement laborieux, où la fontanelle antérieure se présente la première. (*Smellie, observ. sur les accouch. tom. II, pag. 318.*)

ESPECE V. Accouchement laborieux, où la tête du fœtus est arrêtée sur l'os pubis.

ESPECE VI. Accouchement laborieux, où l'enfant présente le front. (*Smellie, observ. sur les accouch. tom. II, pag. 320.*)

ESPECE VII. Accouchement laborieux, où une des oreilles se présente. (*Smellie, observ. sur les accouch. tom. II, pag. 323.*)

ESPECE VIII. Accouchement laborieux, par hydrocéphale. (*Smellie, observ. sur les accouch. tom. II, pag. 417, tom. III, pag. 1.*)

ESPECE IX. Accouchement laborieux, par la grosseur de la tête du fœtus (*Smellie, observ. sur les accouch. tom. II, pag. 403-513.*)

ESPECE X. *Enclavement.* — Accouchement laborieux, où la tête du fœtus est engagée & retenue dans le détroit inférieur. (*Enclavement de la tête de l'enfant, Levret, art des accouch. pag. 108. — Levret, Accouchemens laborieux, pag. 126.*)

ESPECE XI. Accouchement laborieux, par le passage des mains de l'enfant dans le vagin (*Levret, art des accouch. pag. 135.*)

ESPECE XII. Accouchement laborieux, où le fœtus présente l'épaule. (*Smellie, prat. des accouch. tom. I, pag. 364, 369, 372, tom. II, pag. 331.*)

ESPECE XIII. Accouchement laborieux, où le fœtus présente les hanches. (*Smellie, prat. des Accouchemens. tome I, pag. 340.*)

ESPECE XIV. Accouchement laborieux, dans lequel le fœtus replié sur lui-même

IX. CLASSE, ORDRE V.

en forme de peloton, ou étendu dans toute sa longueur, présente la partie antérieure ou postérieure de son corps. (Smellie, prat. des accouch. tom. I. pag. 352.)

ESPECE XV. Accouchement laborieux, où le fœtus présente les fesses à l'orifice de la matrice. (Smellie, prat. des accouch. tom. I. pag. 334. 377.)

ESPECE XVI. Accouchement laborieux, où le fœtus se présente par les genoux.

ESPECE XVII. Accouchement souvent de longue durée, où le fœtus se présente par les pieds. (Levret, art. des accouch. pag. 122. — Accouchement où l'enfant se présente par les pieds, Smellie, prat. des accouch. tom. I. pag. 325.)

ESPECE XVIII. Accouchement laborieux, où le placenta est attaché sur l'orifice de la matrice. (Levret, accouch. labor. part. 2. pag. 448. — Accouchement difficile par le placenta, adhévant aux bords de l'orifice interne de la matrice, Smellie, observ. sur les accouch. tom. III. pag. 146.)

ESPECE XIX. Accouchement laborieux, où le placenta est attaché sur les parties latérales de la matrice. (Levret, accouch. labor. part. 2. pag. 92.)

ESPECE XX. Accouchement laborieux, par la sortie du cordon ombilical, avant le fœtus. (Levret, art. des accouch. pag. 135. — Smellie, prat. des accouch. tom. I. pag. 371.)

ESPECE XXI. Accouchement laborieux, où le cordon ombilical est trop court, (Levret, art. des accouch. pag. 102.)

ESPECE XXII. Accouchement laborieux, où le cordon ombilical entoure le col de l'enfant. (Levret, art. des accouch. pag. 102. — Rétention du corps du fœtus, par le cordon autour du col, Smellie, prat. des accouch. tom. II. pag. 438. 504.)

ESPECE XXIII. Accouchement laborieux, par la rupture difficile des membranes. (Puys, traité des accouch. pag. 123. — Accouchement long, à cause de la dureté des membranes, Smellie, observ. sur les accouch. tom. II. pag. 288. 295.)

ESPECE XXIV. Accouchement de longue durée, par la rupture prématurée des membranes. (Smellie, observ. sur les accouch. tom. II. pag. 299.)

ESPECE XXV. Accouchement laborieux, par vice de conformatio[n] dans les différentes parties du corps de l'enfant. (Monstres, Smellie, tom. I. pag. 395.)

ESPECE XXVI. Accouchement laborieux, par hydropisie du ventre de l'enfant. (Levret, art. des accouch. pag. 449.)

GENRE IV. Accouchement laborieux, par la conformatio[n] déséquuse, ou par les mauvaises dispositions de la mère.

ESPECE I. Accouchement laborieux, par excès d'embonpoint de la mère. (Levret, art. des accouch. pag. 102.)

ESPECE II. Accouchement laborieux, par convulsions de la mère. (Smellie, observ. sur les accouch. tom. II. pag. 377.)

ESPECE III. Accouchement laborieux, par la grande inclinaison de la matrice. (Devantier, observ. sur les accouch. pag. 276, 295 & 315.)

ESPECE IV. Accouchement laborieux, par la descente du col de la matrice, ou par celle du vagin. (Accouchement laborieux, par l'allongement & la descente du col de la matrice, Levret, art. des accouch. pag. 115.)

ESPECE V. Accouchement laborieux, par la rigidité des parties. (Smellie, observ. sur les accouch. tom. II. pag. 336 & 499.)

IX. CLASSE, ORDRE V.

133

ESPECE VI. Accouchement laborieux, par le resserrement de la partie inférieure de la matrice, ou de son col, au devant des épaules de l'enfant. (Smellie, observ. sur les accouch. tom. II. pag. 395.)

ESPECE VII. Accouchement laborieux, par la mauvaise conformation du bassin. (Smellie, observ. sur les accouch. tom. II. pag. 419.)

ESPECE VIII. Accouchement laborieux, où la tête du fœtus est engagée & retenue dans le bassin mal conformé. (Smellie, observ. sur les accouch. tom. II. pag. 527.)

ESPECE IX. Accouchement laborieux, par la chute du rectum de la mère.

ESPECE X. Accouchement retardé par une perte de sang. (Smellie, observ. sur les accouch. tom. II. pag. 355.)

ESPECE XI. Accouchement laborieux, par une hernie crurale, ou inguinale, ou exomphale de la mère. (Smellie, observ. sur les accouch. tom. II. pag. 169.)

ESPECE XII. Accouchement retardé par des peines d'esprit. (Smellie, observ. sur les accouch. tom. II. pag. 488.)

ESPECE XIII. Accouchement laborieux, par une pierre dans la vessie de la mère. (Smellie, observ. sur les accouch. tom. II. pag. 165.)

ESPECE XIV. Accouchement laborieux, par le gonflement inflammatoire des parties naturelles. (Smellie, observ. sur les accouch. pag. 433.)

ESPECE XV. Accouchement laborieux, par une excroissance polypeuse à l'orifice de la matrice. (Smellie, observ. sur les accouch. tom. II. pag. 435.)

ESPECE XVI. Accouchement laborieux, par des callosités au vagin. (Smellie, observ. sur les accouch. tom. II. pag. 437. tom. III. pag. 387.)

ESPECE XVII. Accouchement laborieux, par foiblesse de la matrice, ou par foiblesse de la mère. (Smellie, observ. sur les accouch. tom. II. pag. 473.)

GENRE V. Rétention d'une partie du fœtus dans la matrice.

ESPECE I. Rétention de la tête du fœtus dans la matrice. (Tête d'enfant restée seule dans la matrice, Levret, accouch. labor. partie I. pag. 1. — Smellie, pratiqu. des accouch. tom. I. pag. 383.)

ESPECE II. Rétention du tronc du fœtus dans la matrice. (Extraction du corps du fœtus, dont on n'a pu éviter l'arrachement de la tête, Levret, accouch. labor. part. II. pag. 1.)

GENRE VI. Rétention du placenta. (Smellie obs. sur les acc. tom. II. pag. 453.)

ESPECE I. Rétention du placenta, qui se trouve dur & squirtheux. (Smellie, obs. sur les accouch. tom. II. pag. 453 & 454.)

ESPECE II. Rétention du placenta, adhérant au fond de la matrice, & dont le cordon est cassé. (Smellie, observ. sur les accouch. tom. II. pag. 454.)

ESPECE III. Rétention du placenta, par la contraction d'une portion de la matrice. (Smellie, observ. sur les accouch. tom. II. pag. 456.)

ESPECE IV. Placenta enkysté. (Levret, accouch. labor. part. II. pag. 119. — Smellie, observ. sur les accouch. tom. II. pag. 459.)

GENRE VII. Faux-germe. — Rétention dans la matrice, d'un corps solide

134. IX. CLASSE, ORDRE VI.
organisé. — Faux-germe ou mole, Levret, art des accouch. pag. 194. — Faux-
germe, Smellie, observ. sur les accouch. tom. II. pag. 111 & 115.)

GENRE VIII. Réention d'un insecte, ou de plusieurs, dans une partie quelconque du corps.

ESPECE I. Insectes retenus dans les sinus du nez. (*Vermes in capite*, Senn. tom. III. pag. 37.)

ESPECE II. Insectes retenus dans le conduit auditif. (*Vermes aurium*, Cels. oper. med. pag. 378. — *Vermes in auribus*, Senn. tom. III. pag. 235.)

ESPECE III. Insectes retenus dans les bronches pulmonaires, avec expectoration plus ou moins fréquente de ces insectes. (*Vermes in pulmone geniti*, Senn. tom. III. pag. 302.)

ESPECE IV. Insectes dans les reins ou dans la vessie. (*Vermes in vesica*, Senn. tom. IV. pag. 587. — *Vermes in renibus*, Morgagni de sed. morb. tom. II. pag. 139.)

ESPECE V. Insectes retenus dans le péricarde, ou dans le cœur. (*Vermes in pericar-
dio*, Senn. tom. III. pag. 352.)

ESPECE VI. Insectes dans le foie. (*Vermes in hepate*, Senn. tom. IV. pag. 545.)

ESPECE VII. Insectes dans l'ombilic. (*Vermes in umbilico geniti*, Senn. tom. IV. pag. 619. — *Vers omphiliaux*, Brouzet, educ. med. des enf. tom. II. pag. 218.)

ESPECE VIII. Insectes dans l'œsophage, dans l'estomac, ou dans les intestins. (*Lumbrici puerorum*, Baglivi, pag. 59. — *Vers des intestins*, Andry, Gener. des vers, tom. I. pag. 188.)

ORDRE SIXIEME.

RÉTENTIONS des matières fécales.

GENRE I. *Constipation*. — Rétention des matières fécales. (*Alvi retentio*, Senn. tom. IV. pag. 437. — *Alvi adstringatio*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 35.)

ESPECE I. Rétention des matières fécales, de plus ou moins longue durée, sans maladie, ni cause évidentes. (*Alvis segnis absque morbo notabili*, Senn. tom. IV. p. 437.)

ESPECE II. Rétention des matières fécales par leur extrême durété. (*Alvi reten-
tio fecum duritate*, Senn. tom. IV. pag. 438.)

ESPECE III. Rétention des matières fécales par l'abus des astringents. (*Alvi reten-
tio ab adstringentibus*, Senn. tom. IV. pag. 438.)

ESPECE IV. Rétention des matières fécales par l'irritation de l'intestin rectum, ou à la suite des violents purgatifs.

ESPECE V. Rétention des matières fécales par affection spasmodique.

ESPECE VI. Rétention des matières fécales par hémorroïdes internes.

ESPECE VII. Rétention des matières fécales par la stupore ou par la paralysie de l'intestin rectum & de l'anus. (*Alvi retentio, ani stupore aut paralyse*, Senn. tom. IV. pag. 438 & 471.)

ORDRE SEPTIEME.

RÉTENTIONS de matières dures & solides, dans une ou plusieurs cavités.

GENRE I. *Exostose.* — Tuméfaction d'une partie de l'os, ou de l'os entier.
(*Exostosis.* — *Exostose, Petit, malad. des os, tom. II. pag. 353.*)

ESPECE I. Exostose bénigne. (*Exostosis benigna. — Exostose bénigne, Petit, malad. des os, tom. II. pag. 430.*)

ESPECE II. *Cal.* — Accroissement de l'os dans l'endroit fracturé & réuni. (*Callus. — Callus, Heist, inst. chirurg. tom. I. pag. 185.*)

ESPECE III. Exostose rhachitique. (*Petit, malad. des os, tom. II. pag. 440.*)

ESPECE IV. Exostose vénérienne. (*Petit, malad. des os, tom. II. pag. 453. — Exostosis venerea, Astrar. de morb. vener. tom. I. pag. 414.*)

ESPECE V. Exostose scorbutique. (*Petit, malad. des os, tom. II. pag. 443.*)

ESPECE VI. Exostose chancreuse. (*Petit, malad. des os, tom. II. pag. 478.*)

ESPECE VII. Exostose scrophuleuse. (*Petit, malad. des os, tom. II. pag. 480.*)

GENRE II. *Ankylose.* — Immobilité des articulations mobiles. (*Ankylosis, Platner. inst. chirurg. pag. 823. — Ankylose, du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 350.*)

ESPECE I. Ankylose glaireuse. (*du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 366.*)

ESPECE II. Ankylose sècheuse. (*du Verney, mal. des os, tom. II. pag. 370.*)

ESPECE III. Ankylose exostosée. (*du Verney, mal. des os, tom. II. pag. 378.*)

ESPECE IV. Ankylose par fracture d'un article. (*du Verney, mal. des os, tom. II. pag. 376.*)

ESPECE V. Ankylose purulente. (*Du Verney, mal. des os, tom. II. pag. 375.*)

ESPECE VI. Ankylose vénérienne. (*Ankylosis venerea, Astrar. de morb. vener. tom. I. pag. 402.*)

ESPECE VII. Ankylose par inaction. (*Du Verney, mal. des os, tom. II. pag. 365.*)

ESPECE VIII. Ankylose par la goutte. (*Du Verney, mal. des os, tom. II. pag. 375.*)

ESPECE IX. Ankylose scrophuleuse. (*Du Verney, mal. des os, tom. II. pag. 375.*)

GENRE III. Corps étrangers arrêtés dans l'œsophage. (*Mém. de l'Acad. de chirurg. tom. I. in-4. pag. 445. — Res præternaturales in œsophago vel fauci- bus hærentes, Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 670.*)

GENRE IV. Tumeur dure, quelquefois indolente, située proche du frein de la langue, contenant un calcul., & empêchant de parler, (*Calculus in lin-*

136 IX. CLASSE, ORDRE VII.
guia, Senn. tom. III. pag. 251. — Calculus sub lingua, Heft. inst. chirurg. tom. II. pag. 653.)

GENRE V. Rétention de corps étrangers dans l'estomac, ou dans les intestins.

GENRE VI. Rétention de calculs dans l'estomac, avec douleur aiguë & souvent intermittente, répondant à la région épigastrique, quelquefois avec vomissement de ces calculs. (*Calculi ventriculi*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 83.)

GENRE VII. *Calculs du foie.* — Rétention de calculs dans le foie, avec douleur aiguë, de longue durée, intermittente, pongitive du côté droit sous les fausses côtes, s'étendant jusqu'à la région ombilicale. (*Calculi biliofi*. — *Calculi hepatis*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 84 & 94.)

GENRE VIII. Rétention de calculs dans les intestins, avec douleur plus ou moins aiguë, quelquefois avec déjection de calculs. (*Intestinorum calculi*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 35, 88 & 90.)

GENRE IX. Rétention de calculs dans l'ombilic. (*Lapides umbilici*, Senn. tom. IV. pag. 619.)

GENRE X. *Calculs des reins.* — Douleur gravative dans la région rénale droite, ou dans la région rénale gauche, ou dans l'une & l'autre, très-aiguë, venant par accès, avec vomissement, accompagnée de douleur & de stupeur dans le cordon spermatique & dans le testicule du côté affecté, & souvent dans la cuisse ; avec évacuation de petits calculs par les conduits urinaires. (*Calculi renum*, Senn. tom. IV. pag. 573.)

GENRE XI. *Calcul de la vessie.* — Calcul retenu dans la vessie ; plus ou moins sensible à la sonde ; avec difficulté d'uriner, souvent avec suppression passagère d'urine, accompagné d'une douleur plus ou moins aiguë dans la région hypogastrique, laquelle s'étend le long du canal de l'urethre, & se fait sentir plus vivement à son orifice externe. (*Calculus vesicæ*, Senn. tom. IV. pag. 584. — *Pierre de la vessie*, Bertrandi, Oper. de chirurg. p. 106.)

GENRE XII. *Calcul dans la tunique vaginale.* — Tumeur dans la tunique vaginale, très-dure, peu sensible, causée par des calculs. (*Calculi in tunica vaginali*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 422.)

GENRE XIII. *Calculs des prostates.* — Calculs formés dans les prostates, avec difficulté plus ou moins grande d'uriner ; & accompagnés d'une douleur plus ou moins vive, rapportée au siège des prostates. (*Calculi in prostatis*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 174.)

GENRE XIV. Substance pierreuse dans les ventricules du cerveau, ou dans la substance du cerveau.

GENRE XV.

IX. CLASSE, ORDRE VIII. 137

GENRE XV. *Cornes.* — Excroissances dures, seches, indolentes, plus ou moins élevées, situées sur les articulations des extrémités, particulièrement des mains & des pieds, souvent avec pâleur du visage, abattement des forces musculaires, & appetit excessif. (*Cornua*, *Senn. tom. V.* pag. 45.)

GENRE XVI. Inégalités de l'ongle.

ESPECE I. Inégalités de l'ongle, sans cause évidente. (*Scabrities simplex unguium*, *Senn. tom. V.* pag. 93.)

ESPECE II. Inégalités de l'ongle par la plique polonoise. (*Scabrities unguium à plica polonica*, *tom. V.* pag. 93.)

ESPECE III. Inégalités de l'ongle par virus vénérien. (*Scabrities unguium*, *Astrac de morb. vener.* *tom. II.* pag. 411.)

ORDRE HUITIÈME.

RÉTENTIONS à la surface du corps, de matières colorantes, ou de matières étrangères & opaques.

GENRE I. *Rouffeur.* — Tache de la peau, peu étendue, de couleur jaunâtre, affectant particulièrement le visage, les bras, & les mains. (*Ephelis*, — *Lentigo*, *Senn. tom. V.* pag. 76.)

ESPECE I. Rouffeur de naissance. (*Lentigo in rufis*, *Senn. tom. V.* pag. 76.)

ESPECE II. Rouffeur chez les femmes enceintes. (*Ephelis in gravidis*, *Senn. tom. V.* pag. 76.)

ESPECE III. Rouffeur par le soleil. (*Lentigo à sole*, *Senn. tom. V.* pag. 76.)

ESPECE IV. Rouffeur par le virus vénérien. (*Maculae venereæ ephelidum inflatae*, *Astrac de morb. vener.* *tom. I.* pag. 400.)

GENRE II. Changement de la couleur des cheveux. (*Canities*, *Senn. tom. V.* pag. 85.)

GENRE III. Dents jaunâtres, avec odeur plus ou moins fétide. (*Dentes initiai colore & folidite*, *Senn. tom. III.* pag. 267.)

GENRE IV. Changement de la couleur des ongles. (*Unguium color mutatus*, *Senn. tom. V.* pag. 93.)

GENRE V. *Alphos.* — Tache superficielle de la peau, blanche, jaune ou brune ; formée d'un assemblage de petites taches ; sans douleur, sans ulcère, avec léger enfoncement, n'affectant qu'une partie des teguments. (*Alphus*. — *Vitiligo*, *Plater. prax. med. tom. III.* pag. 72.)

ESPECE I. *Alphos blanc.* — Tache blanchâtre, formée d'un assemblage de petites

Table des Maladies. S

138 IX. CLASSE, ORDRE VIII.
taches discrètes, donnant du sang lorsqu'on les pique. (*Alphus albus*. — *Alphus albus*, Senn. tom. V. pag. 38.)

ESPECE II. *Alphos très-blanc*. — Tache plus blanche & plus enfoncée que l'alphos blanc, fournissant, lorsqu'on la pique, beaucoup plus de sérosité que de sang; avec les poils de la partie affectée, blancs & semblables à de la laine. (*Leuca*. — *Leuca*, Senn. tom. V. pag. 38.)

ESPECE III. *Alphos noir*. — Tache brune de la pesu, légèrement inégale & comme écaillée, formée d'un assemblage de petites taches continues. (*Melas*. — *Alphus niger*, Senn. tom. V. pag. 38.)

GENRE VI. Tache de naissance. (*Nævus maternus*, Senn. tom. V. pag. 78.)

GENRE VII. *Ecchymose*. — Tache superficielle, d'un rouge noirâtre ou livide, produite par le sang extravasé. (*Ecchymosis*, Senn. tom. V. pag. 24.)

ESPECE I. Ecchymose des téguments par un coup, ou par une blessure. (*Ecchymosis*, Platter. inst. chirurg. pag. 452 & 457.)

ESPECE II. Ecchymose du globe de l'œil. (*Sugillation*. — *Cruor in oculum effusus*, Heist inst. chirurg. tom. I. pag. 592.)

GENRE VIII. *Taches hépatiques*. — Taches de la peau, affectant tantôt une partie & tantôt l'autre, principalement le dos, la poitrine & les jambes; ordinairement de la grandeur de la paume de la main, brunes, ou d'un jaune noirâtre, écaillées, avec légère aspérité. (*Maculae hepaticæ*, Senn. tom. V. pag. 78.)

GENRE IX. *Intempérie du foie*. — Couleur jaune du visage, avec sécheresse de la langue, dégoût, chaleur des pieds & des mains, déjection bilieuse, vomissement bilieux. (*Intemperies calida hepatis*, Senn. tom. IV. pag. 536.)

GENRE X. *Ictere noir*. — Couleur des téguments, d'un brun noirâtre. (*Icterus niger*, Senn. tom. IV. pag. 493.)

ESPECE I. Ictere noir, par poison. (*Icterus niger à veneno*, Senn. tom. IV. pag. 493.)

ESPECE II. Ictere noir, avec douleur gravative & tumeur dans l'hypocondre gauche. (*Icterus niger à liene*, Lomm. observ. med. pag. 225. — *Icterus niger à liene*, Senn. tom. IV. pag. 493.)

ESPECE III. Ictere noir précédé de l'ictere jaune, avec douleur dans l'hypocondre droit. (*Icterus niger ab hepate*, Senn. tom. IV. pag. 493. — *Icterus flavus in nigrum*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 310.)

GENRE XI. *Jaunisse*. — Couleur jaune des téguments & de l'albuginée, avec lassitude, urine jaune, constriction spasmodique dans la région épigastrique, & difficulté de respirer. (*Icterus*. — *Morbus regius*, Aretai, oper. med. pag. 84. — *Aurigo*, Lomm. observ. med. pag. 224. — *Icterus*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 301. — *Icterus*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. p. 78.)

ESPECE I. Jaunisse par des boissons, ou par des aliments de mauvaise qualité. (*Icterus à perverfa diatâ*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 303.)

ESPECE II. Ictere par l'impression des corps froids, soit intérieurement, soit extérieurement.

IX. CLASSE, ORDRE VIII. 139

ESPECE III. Ictere par des poisons, ou par la morsure des insectes vénimeux. (*Icterus à morfu venenato, & venenatis*, Senn. tom. IV. pag. 570.)

ESPECE IV. Ictere par pléthore. (*Icterus à plethora*, Fred. Hoffm. tom. III. p. 303.)

ESPECE V. Ictere par la fièvre. (*Icterus in febribus symptomaticis*, Senn. tom. IV. pag. 570. — *Icterus febri biliosæ jundus*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 311.)

ESPECE VI. Ictere par la crise d'une fièvre au foie, sans dureté. (*Icterus à crisi febris*, Senn. tom. IV. pag. 570.)

ESPECE VII. Ictere par inflammation du foie. (*Icterus inflammatione hepatis*, Boëth. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 918.)

ESPECE VIII. Ictere des nouveaux-nés. (*Levret, art des accouch.* pag. 251.)

ESPECE IX. Ictere par spasme. (*Icterus à spasmis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 302.)

ESPECE X. Ictere par des calculs. (*Icterus à calculis*, Fred. Hoffm. tom. III. p. 303.)

ESPECE XI. Ictere par obstruction des vaisseaux biliaires. (*Icterus ab obstruktione ductuum bilem fecernentium*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 303.)

GENRE XII. Obscurcissement de la vue. — Diminution ou suppression entière de la vue, par un corps opaque adhérant au globe de l'œil, & situé devant la pupille. (*Caligo*, Senn. tom. III. pag. 225. — *Obscuritas cornæ*, Boëth. de morb. ocul.)

ESPECE I. Leucoma. — Tache blanchâtre de la cornée. (*Albugo, Maître-Jan*, malad. de l'œil, pag. 417. — *Albugo*, S. Yves, malad. des yeux, pag. 182.)

ESPECE II. Nuage de la cornée. (*Nebula & nubecula*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 584.)

GENRE XIII. Cataracte. — Abolition de la vue, par opacité dans la pru-nelle. (*Cataracta*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 557. — *Suffusio*, Platner. inst. chirurg. pag. 877.)

ESPECE I. Cataracte vraie. (*Maître-Jan*, malad. de l'œil, pag. 111. — *Vraie cata-racte*, S. Yves, pag. 187. — *Vraie cataracte*, Mém. de l'Acad. de chirurg. in-4. tom. II. pag. 337 & 578.)

ESPECE II. Cataracte membraneuse. (S. Yves, malad. des yeux, pag. 196.)

ESPECE III. Cataracte par l'altération de la membrane du chaton. (S. Yves, malad. des yeux, pag. 204.)

ESPECE IV. Cataracte secondaire. (Hoin, Mémoires de l'Acad. de chirurg. in-4. tom. II. pag. 425.)

ESPECE V. Cataracte branlante. (S. Yves, malad. des yeux, pag. 210.)

ESPECE VI. Cataracte, avec immobilité de l'uvée.

ESPECE VII. Cataracte avec protubérance du crystallin. (*Protubérance du crystallin*, Maître-Jan, mal. de l'œil, pag. 209.)

ESPECE VIII. Cataracte, par la vapeur qui s'élève des latrines fermées depuis long-temps. (*Cucitas foricariorum*, Ramallini, oper. med. pag. 515.)

ESPECE IX. Cataracte par des coups. (S. Yves, mal. des yeux, pag. 102.)

ESPECE X. Cataracte par la trop vive réflexion de la lumière ou du feu.

ESPECE XI. Cataracte par vieillisse.

ESPECE XII. Cataracte par l'application d'une substance qui détruit la transparence des humeurs de l'œil, ou du cryallin.

ESPECE XIII. Cataracte par la répercussion d'une humeur.

ESPECE XIV. *Glaucome* — Cataracte compliquée avec la goutte sereine. (*Glaucoma*. — *Glaucome*, *Méth. Jan*, pag. 204. — *Glaucome*, *S. Yves*, pag. 205.)

ORDRE NEUVIÈME.

RÉTENTIONS d'air, dans une ou plusieurs cavités.

GENRE I. *Emphyseme*. — Gonflement élastique des téguments, par l'introduction de l'air dans le tissu cellulaire. (*Emphysema*.)

ESPECE I. Emphyseme par l'air introduit à l'aide d'un soufflet, dans une blessure aux téguments.

ESPECE II. Emphyseme par une blessure pénétrant dans la cavité de la poitrine. (*Sarcites flatuofus*, *Senn. tom. IV*. pag. 565.)

ESPECE III. Emphyseme par la fracture des côtes. (*Emphysema fracturæ costarum*, *Heßl. inst. chirurg. tom. I*. pag. 197 & 199.)

ESPECE IV. Emphyseme par une gale répercutee. (*Emphysema levis à scabie fecit*, *Morgagni*, *de sed. morb. tom. II*. pag. 98.)

GENRE II. *Borborygmes*. — Murmures dans le ventre, plus ou moins forts & réitérés, ordinairement sans douleur, ni tension de l'abdomen. (*Borborygmus*. — *Rugitus ventris*, *Plater. prax. med. tom. III*. pag. 582.)

GENRE III. *Météorisme*. — Gonflement élastique du ventre ; douloureux ; de plus ou moins longue durée ; sans fluctuation, & sans rendre aucun son lorsqu'on frappe sur le ventre. (*Meteorismus*. — *Flatulentia*, *Fred. Hoffm. tom. III*. pag. 339.)

ESPECE I. *Météorisme de l'estomac*. — Gonflement élastique de la région épigastrique, avec difficulté de respirer, anxiété & abattement des forces. (*Flatulentia ventriculi*, *Fred. Hoffm. tom. III*. pag. 339.)

ESPECE II. *Météorisme des intestins*. — Gonflement élastique du ventre, avec douleur plus ou moins aiguë autour du nombril, anxiété, abattement des forces & constipation. (*Flatulentia intestinorum*, *Fred. Hoffm. tom. III*. pag. 340.)

ESPECE III. Météorisme d'une portion des intestins. *Flatulentia pars intestini*, *Fred. Hoffm. tom. III*. pag. 341.)

ESPECE IV. Météorisme par l'action du froid. (*Flatulentia à transpiration impedita*, *Fred. Hoffm. tom. III*. pag. 340.)

ESPECE V. Météorisme symptomatique. (*Meteorismus à morbis progressis*, *Fred. Hoffm. tom. III*. pag. 340.)

ESPECE VI. Météorisme spasmodique. (*Flatulentia apud hystericos, vel hypochondriacos*, *Fred. Hoffm. tom. III*. pag. 341.)

GENRE IV. *Tympanite*. — Gonflement élastique du ventre, de très-longue durée, ordinairement peu douloureux, rendant, lorsqu'on le frappe, un

IX. CLASSE, ORDRE IX. 141

son presque semblable à celui du tambour. (*Tympanites*. — *Tympanites*, *Lomm. observ. med. pag. 231.* — *Tympanites*, *Fred. Hoffm. tom. III. pag. 341.*)

— *Tympanites*, *Combalusier*, *Pneumato-patholog.* — *Tympanites*, *Forstii opera med. tom. II. pag. 396.*)

ESPECE I. Tympanite par rétention d'air dans l'estomac & dans les intestins. (*Tympanites ab aere in ventriculo & intestinis*, *Senn. tom. IV. pag. 565.* — *Tympanites ab aere in ventriculo aut intestinis*, *Morgagni*, *de sed. morb. tom. II. pag. 98.*)

ESPECE II. Tympanite par rétention d'air dans l'abdomen, hors des intestins, entre le péritoine & les intestins. (*Tympanites in ipsa abdominis cavitate*, *Senn. tom. IV. pag. 565.* — *Tympanites ab aere extra ventriculum & intestina*, *Morgagni*, *de sed. morb. tom. II. pag. 99.*)

ESPECE III. Tympanite avec ascite. (*Tympanites cum ascite*, *Morgagni*, *de sed. morb. tom. II. pag. 100.*)

ESPECE IV. Tympanite par la dilatation extrême d'une portion des intestins. (*Tympanites à dilatation flupendâ coli*, *De Haen*, *rat. med. tom. II. pag. 54.*)

ESPECE V. Tympanite enkystée, avec plus ou moins d'eau. (*Tympanites & hydrops cyclicus*, *De Haen*, *rat. med. tom. II. pag. 57.*)

ESPECE VI. *Hydropisie seche.* — Gonflement flattueux du ventre, avec fièvre, colique & évacuation de matières fécales semblables à celle des chevies. (*Hydrops fucus*. — *Hydrops fucus*, *Baglivi*, *oper. med. pag. 81.*)

GENRE V. *Tympanite de la Matrice.* — Gonflement presque sphérique & uniforme dans la région hypogastrique, peu douloureux, élastique ; produit rapidement par l'air contenu dans la matrice, lequel s'échappe de temps en temps par le vagin & avec bruit : donnant à la matrice la forme d'un balon qu'on reconnoit par l'introduction du doigt dans le vagin ; avec élévation du col de l'utérus, affaissement des mamelles, nombril arroudi & plus enfoncé que dans la vraie grossesse. (*Inflatio uteri*, *Senn. tom. IV. pag. 638.* — *Fausse grossesse par l'air*, *Leyret*, *art des accouch. pag. 199.*)

GENRE VI. *Hernie venteuse.* — Tumeur élastique sur la surface du ventre ou du bassin, plus ou moins douloureuse, produite par l'air renfermé dans une portion d'intestin déplacée.

ESPECE I. Hernie venteuse de l'ombilic. (*Pneumatophale*, *Dionis*, *oper. de chir. p. 108.*)

ESPECE II. Tumeur élastique sur le scrotum, formée par l'air renfermé dans une portion d'intestin reçue dans le scrotum. (*Pneumatocele ab aere intra intussum in scroto inclusum*, *Morgagni*, *de sed. morb. tom. II. pag. 191.*)

GENRE VII. Gonflement élastique du scrotum, souvent douloureux, transparent, produit par l'air retenu dans le tissu cellulaire du scrotum. (*Pneumatocele*, *Plater. prax. med. tom. III. pag. 201.* — *Pneumatocele*, *Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 806.* — *Emphysema Scroti*, *Morgagni*, *de sed. morb. tom. II. pag. 191.*)

Fin de la Table des Maladies.