



T A B L E
MÉTHODIQUE
DES CLASSES, DES GENRES,
ET DES ESPECES DE MALADIES.

PREMIERE CLASSE.
FIEVRES.

FIEVRE. (*Febris. — Febris, Boërh. van-Swiet. de cognoscend. morb. Aphor. 558. — Febres, Glaff, de Febribus. — Fievre, Quesnay, essai sur les Fievres. — Febres, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 257.*)

ORDRE PREMIER.

FIEVRES continues simples. — Fievers sans accès sensibles & réguliers, pendant tout leur cours. (*Febres continuæ simplices.*)

GENRE I. *Fievre éphémere.* — Fievre continue, d'un, de deux, ou de trois jours. (*Febris ephemera. — Febris ephemera, Sennert. opera med. tom. VI. pag. 326. — Febris diaria, Lomm. Observ. med. pag. 2.*)

ESPECE I. *Fievre éphémere par indigestion.* (*Ephemera à veniticult cruditate, Senn. tom. VI. pag. 327.*)

I. CLASSE, ORDRE I.

ESPECE II. Fievre éphémère par l'impression d'un corps froid. (*Febris ex angustia cutis*, *Senn. tom. VI. pag. 327.* — *Fievre par l'impression de l'air trop froid, ou trop humide*, *Huxham, Essai sur les Fievres*, pag. 2.)

ESPECE III. Fievre éphémère par un exercice trop violent. (*Huxham*, pag. 2.)

ESPECE IV. Fievre éphémère pléthorique. (*Ephemera plethorica*, *Sauvag. Nos. method. tom. I. pag. 290.*)

ESPECE V. Fievre éphémère laitiée. (*Ephemera lactea*. — *Febris lactis*, *Senn. tom. IV. pag. 745.* — *Fievre de lait, Levret, art des accouchements*, pag. 146.)

ESPECE VI. Fievre éphémère avec sueur. (*Ephemera sudatoria*. — *Sudor Anglicus*, *Senn. tom. VI. pag. 494.*)

GENRE II. *Fievre synoqua.* — Fievre continue, de sept, onze, quatorze, dix-sept, ou vingt jours, sans signes évidents que les humeurs des premières voies tendent à une prompte putridité. (*Febris synoqua*. — *Ephemera continens non putrida*, *Lomm. observ. med. pag. 3.* — *Ephemera plurium dierum, & synoqua sine putridine*, *Senn. tom. VI. pag. 327.*)

ESPECE I. Fievre inflammatoire. (*Febris inflammatoria*. — *Febris acuta sanguinea*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 105.*)

ESPECE II. Fievre synoqua bilieuse. (*Synoqua biliosa*, *Senn. tom. VI. pag. 365.*)

ESPECE III. Fievre ardente. (*Febris ardens*. — *Febris ardens*, *Lomm. obs. med. pag. 7.* — *Febris ardens*, *Senn. tom. VI. pag. 332.* — *Febris ardens*, *Boerh. van-Sw. de cognosc. morb. Aph. 738.* — *Febris ardens nec non cholistica*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 111.*)

ESPECE IV. Fievre continue varioleuse. (*Febris continua variolosa*. — *Febris continua variolosa*, *Sydenham opera med. tom. I. pag. 98.*)

ESPECE V. Fievre continue pleuretique. (*Febris continua pleuretica*. — *Febris continua pleuretica*, *Sydenh. tom. I. pag. 136.*)

ESPECE VI. Fievre continue sanguine. (*Synoqua sanguinea*. — *Febris continua annorum 1661, 62, 63, 64*, *Sydenh. tom. I. pag. 29.*)

ESPECE VII. Fievre continue, avec sueur.

ESPECE VIII. Fievre qui survient après les blessures. (*Febris vulneribus superveniens*, *Senn. tom. V. pag. 133.* — *Febris vulneri superveniens*, *Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 81.*)

GENRE III. *Fievre synoqua putride.* — Fievre de trois, & rarement de quatre semaines, avec signes évidents que les humeurs des premières voies tendent à une prompte putridité. (*Febris synoqua putrida*. — *Febris putrida in genere*, *Senn. tom. VI. pag. 366.*)

ESPECE I. Fievre continue putride. (*Febris continua putrida*. — *Febris continent putrida*, *Lomm. obs. med. pag. 4.* — *Febris continua putrida*, *Boerh. van-Sw. de cognosc. morb. Aphor. 730.*)

ESPECE II. Fievre continue dysenterique. (*Febris continua dysenterica*. — *Febris continua dysenterica*, *Sydenh. tom. I. pag. 116.*)

ESPECE III. Fievre des couches. (*White, Avis aux femmes en couches*, pag. 184.)

I. CLASSE, ORDRE II.

5

ESPECE IV. Fievre putride, survenant aux petites vèroles confluentes. (*Febris putrida variolis confluentibus superveniens*, Sydenh. tom. I. pag. 374.)

ESPECE V. Fievre mésentérique. (*Febris mesenterica*, Baglivi oper. med. pag. 52.)

GENRE IV. *Fievre continue maligne.* — Fievre continue, de deux ou trois semaines, avec abattement extrême des forces musculaires, relativement à celles du cœur. (*Febris continua maligna*. — *Febris maligna*, Senn. tom. VI. pag. 344. — *Febris putrida maligna*, Fred. Hoffm. suppl. pars. 1. pag. 374. — *Febris maligna*, Baglivi, pag. 51. — *Febris malignæ*, de Haen rat. med. tom. I. pag. 241. & tom. II. pag. 5.)

ESPECE I. Fievre des prispons. (*Febris carcerum*. — *Fievre d'hôpital*, Pringle, malad. des armées, tom. II. pag. 83. — *Fievre maligne*, Monro, malad. des armes tom. II. p. 1.)

ESPECE II. Fievre de quatorze ou vingt jours, avec accroissement du pouls, lafiude universelle, assoupissement, douleur & pesanteur de tête. (*Fievre lente urticante*, Huxham, *Essai sur les fievres*, pag. 88. — *Fievre nerveuse*, obs. de ned. à Edimbourg, tom. VI. pag. 45.)

ESPECE III. Fievre maligne avec catarrhe & toux. (*Febris maligna cum catarrho & tussi*, Senn. oper. med. tom. VI. pag. 349.)

ORDRE SECOND.

FIEVRES exacerbantes. — Fievres continues avec redoublement. (*Febres exacerbantes*. — *Febres continuaæ periodicæ*, Sennert. oper. med. tom. VI. pag. 332.)

GENRE I. *Fievre amphimérienne.* — Fievre continue quotidiane. (*Amphimerina*. — *Febris quotidiana continua*, Senn. tom. VI. pag. 333.)

ESPECE I. *Fievre épiale.* — Fievre continue quotidienne maligne. (*Febris epiala*. — *Febris epiala*, Senn. tom. VI. pag. 333.)

ESPECE II. *Fievre hemitrienne.* — Fievre demi-tierce. (*Hemitritus*. — *Febris semi-tertiana*, Senn. tom. VI. pag. 340. — *Febris semi-tertiana*, Baglivi, op. med. pag. 49.)

ESPECE III. *Fievre continue quotidienne des camps.* (*Fievre remisante d'automne dans les camps*, Pringle, malad. des armées, tom. I. pag. 311.)

ESPECE IV. *Fievre continue quotidienne froide.* (*Amphimerina algida*. — *Hemitritus malignus*, Rivetii cent. 4. observ. 56.)

ESPECE V. *Fievre syncopale.* (*Febris syncopalis*, Senn. tom. VI. pag. 333. — *Fievre syncopale*, Meyssery, med. d'arm. tom. II. pag. 92.)

ESPECE VI. *Fievre maligne avec assoupissement.* — Fievre continue dont les accès arrivent tous les jours, ou de deux jours l'un, avec assoupissement précédé d'un violent mal de tête. (*Parapoplexia*, sive *febris tritæophya comata*, Carol. Pison. de mort. à colluv. serof. pag. 88.)

ESPECE VII. *Fievre catarrale exacerbante.* (*Febris catarrhalis continua*, Car. Pison. de mort. à colluv. serof. pag. 489.)

ESPECE VIII. Fievre quotidienne continue, avec toux & difficulté d'avaler. (*Fever catarihale epidemique*, Meyseley, med. d'arm. tom. II. pag. 266.)

ESPECE IX. Fievre continue quotidienne humorale. (*Amphimerina humorosa*. — *Febris semi-tertiana*, Paul. Aegin. oper. lib. 2. cap. 33.)

GENRE II. Fievre tierce continue. (*Tritæophya*. — *Febris tertiana continua*, Senn. tom. VI. pag. 332. — *Tritæophya*, Baglivi, oper. med. pag. 54.)

ESPECE I. Fievre tierce continue épidémique. (*Febris continua tertiana epidemica*, Lancisi oper. tom. III. pag. 244.)

ESPECE II. Fievre tierce continue, avec froid des extrémités & chaleur interne. (*Febris lypiria*, Senn. tom. VI. pag. 406. — *Febris lypiria*, Baglivi, pag. 56.)

ESPECE III. Fievre tierce continue bilieuse. (*Febris tertiana continua biliosa*. — *Causus, seu febris ardens*, River. prax. med. pag. 376.)

ESPECE IV. Fievre tierce continue, avec sueur. (*Suette des Picards*, Boyer, Méthode de traiter les malad. épidem.)

GENRE III. Fievre quarte continue. (*Febris quartana continua*, Sennert. tom. VI. pag. 405.)

ESPECE I. Fievre quarte continue soporeuse. (*Febris quartana continua soporosa*, Car. Pif. de morb à colluv. fer. pag. 491.)

ESPECE II. Fievre quarte continue maligne, avec spasme. (*Febris maligna cum spastico*, Senn. tom. VI. pag. 349.)

ORDRE TROISIEME.

FIEVRES exanthématiques. — Fievres avec éruption sur la peau, de tumeurs plus ou moins grandes. (*Febres exanthematicæ*. — *Febres cum exanthematibus*, de Haen. rat. med. tom. II. pag. 209. tom. IV. pars 2. pag. 15.)

GENRE I. Rougeole. — Fievre avec éruption de tumeurs inflammatoires semblables à de larges piquures de puces, se terminant le 8^e ou neuvième jour par écailles, & précédée de douleur de tête, de toux, de larmoiement & éternuement. (*Rubeola*. — *Morbilli Rhazes*. — *Febris morbillosa*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 62. — *Febris morbillosa*, De Haen. rat. med. tom. IV. pars 2. pag. 84.)

ESPECE I. Rougeole irrégulière. (*Rubeola non regularis*, Sydenh. tom. I. pag. 135.)

ESPECE II. Rougeole régulière. (*Rubeola vulgaris*, Sydenh. tom. I. pag. 130.)

GENRE II. Petite vérole. — Fievre avec éruption de petites tumeurs inflammatoires, les 2, 3 & 4^e jours, qui blanchissent le 7 & le 8, & se changent

I. CLASSE, ORDRE III.

en croûtes les 11, 12, 13 & 14^{me} jours. (*Variola*. — *Variola*, Rh. 25,
de variolis. — *Febris variolosa*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 49.)

ESPECE I. Petite vérole discrète. (*Variola discreta*, Sydenh. tom. I. pag. 79.)

ESPECE II. Petite vérole conflue. (*Variola confluenta*, Sydenh. tom. I. pag. 81.)

GENRE III. *Petite vérole volante*. — Fievre légère & de courte durée, avec éruption, principalement sur le visage, de petites rumeurs remplies de matière blanchâtre ou transparente, & qui se desséchent le 4^{me} jour. (*Variola lymphatica*, Sauvag. Nof. meth. tom. I. pag. 422.)

GENRE IV. Fievre éphémère, avec éruption sur le ventre & sur les extrémités, de phlyctènes de la grandeur d'une amande, suivie de danger éminent. (*Morta*, Linn. gen. morb. gen. 1.)

GENRE V. *Peste*. — Fievre contagieuse & très-dangereuse, avec bubon, ou charbon, ou chancre. (*Pestis*. — *Pestis*, Senn. tom. VI. pag. 443. — *Febris pestilentialis*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 93. — *Pestis*, Mead, tom. I. pag. 179.)

ESPECE I. Peste du Levant. (*Pestis vulgaris* — *Febris pestilentialis Landinenfis*, annorum 1665 & 66, Sydenh. tom. I. pag. 63.)

GENRE VI. *Fievre miliaire*. — Fievre continue, avec éruption sur les réguments, de tumeurs inflammatoires de la grandeur d'un grain de millet, promptement changées en tumeurs remplies de fluide limpide, & se terminant par écailles. (*Febris miliaris*. — *Febris purpurata miliaris*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 68. — *Febris miliaris*, de Haen. rat. med. tom. IV. pars 2. p. 32.)

ESPECE I. Fievre miliaire des femmes en couche. (*Febris miliaris puerperarum*. — *Eruption laiteuse à la peau*, Patis. traité des accouch. pag. 377 — *Fievre miliaire des femmes en couches*, White, pag. 252. — *Eruption miliaire blanche*, Levret. art des accouche. p. 163.)

ESPECE II. Fievre inflammatoire, avec éruption miliaire. (*Nova febris*, Sydenh. tom. I. pag. 354.)

ESPECE III. Eruption miliaire laiteuse, avec boutons approchant de ceux de la petite vérole. (Levret, art des accouch. pag. 164.)

GENRE VII. Fievre aiguë, avec éruption de grandes vésicules remplies d'huileur limpide. (*Febris vesicularis*. — *Febris cum exanthematibus serosis*, Carol. Pif. de morb. à colluv. ser. pag. 440.)

GENRE VIII. *Fievre scarlatine*. — Fievre avec éruption sur la peau, de taches rouges plus ou moins larges, de figures irrégulières, quelquefois se terminant par écailles fatineuses. (*Febris scarlatina*. — *Febris scarlatina*, Sydenh. tom. I. p. 162. — *Febris scarlatina*, de Haen. rat. med. tom. IV. pars. 2. pag. 18.)

ESPECE I. Fievre scarlatine bénigne. (*Febris scarlatina benigna*, de Haen. rat. med. tom. IV. pars. 2. pag. 19.)

ESPECE II. Fievre scarlatine maligne. (*Febris scarlatina maligna*, de Haen. rat. med. tom. IV. pars. 2. pag. 21.)

ESPECE III. Fievre scarlatine des femmes en couches. (*Eruption laiteuse à plaques enflammées, Levret, art des accouch. pag. 164.*)

GENRE IX. *Fievre pétéchiale.* — Fievre avec abattement extrême des forces musculaires, & éruption de petites taches sur la peau, d'un rouge plus ou moins vif, quelquefois d'un rouge jaunâtre livide. (*Febris pétéchialis, Febris pétéchiales vera, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 84. — Febris pétéchialis, de Haen. rat. med. tom. IV. pars. 1. pag. 22.*)

GENRE X. *Fievre ortiee.* — Fievre avec éruption de petites tumeurs rouges, semblables à des piqûres d'ortie, accompagnées de démangeaison. (*Febris uricata. — Febris cum pundiuris urticarum, Sydenh. tom. I. pag. 175.*)

ESPECE I. *Fievre ortiee aiguë.* (*Fievre ortiee, Meyssery, med. d'arm. tom. II. pag. 253.*)

ESPECE II. *Fievre ortiee bénigne.*

GENRE XI. *Fievre érysipélateuse.* (*Febris erysipelatosu, Sydenham tom. I. pag. 174. — Febris erysipelacta, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 98. — Febris erysipelatosu, de Haen. rat. med. tom. IV. pars. 2. pag. 16.*)

ESPECE I. *Fievre érysipélateuse, avec constriction de la région épigastrique, abattement extrême des forces; éruption de tumeurs superficielles inflammatoires, qui se changent bientôt en larges véhicules, & attaquent plutôt les parties inférieures, que les supérieures. Febris erysipelatosu maligna. — Zona, Fred. Hoffm. tom. II. p. 99.*)

ESPECE II. *Fievre continue synoqe, avec tumeur inflammatoire d'une partie du corps, particulièrement du visage & des jambes. (Erysipelas seu rofa, Senn. tom. VI. pag. 407.)*

ORDRE QUATRIEME.

FIEVRES Intermittentes. (*Febres intermittentes. — Febres intermit- tentes, Senn. tom. VI. pag. 409. — Febres intermittentes, Werlhof, de febribus intermitt.*)

GENRE I. *Fievre quotidienne.* — Fievre dont les accès reviennent tous les jours, avec intermission plus ou moins longue entre chaque accès. (*Febris quotidiana. — Febris quotidiana, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 34.*)

ESPECE I. *Fievre quotidienne légitime.* (*Febris quotidiana legitima. — Febris quotidiana legitima, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 33.*)

ESPECE II. *Fievre quotidienne épidémique.* (*Febris quotidiana epidemica. — Febris quotidiana epidemica, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 33.*)

ESPECE III. *Fievre quotidienne épileptique.* (*Febris quotidiana epileptica. — Febris quotidienne epileptique, Effais de med. d'Edimbourg, tom. VI. pag. 138.*)

ESPECE IV. *Fievre quotidienne sciatique.* (*Febris quotidiana ischiatica. — Febris quotidienne sciatique, Effais de med. d'Edimbourg, tom. VI. pag. 143.*)

GENRE II.

I. CLASSE, ORDRE IV. 9

GENRE II. Fievre tierce.—Fievre avec retour d'accès semblables, de deux jours l'un. (*Febris tertiana*. —*Febris tertiana*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 11.)

ESPECE I. Fievre tierce légitime. (*Febris tertiana legitima*. —*Febris tertiana exquisita*, Senn. tom. VI. pag. 419.)

ESPECE II. Fievre tierce pernicieuse, avec vomissement bilieux & déjection bilieuse, particulièrement pendant l'accès. (*Febris intermittens cholérica, vel dysenterica, Torti, de febr. period. pernic.* pag. 135.)

ESPECE III. Fievre tierce pernicieuse, avec flux de ventre semblable à la laveur de chair, principalement pendant l'accès. (*Febris intermittens, cum fluxu subcuento*. —*Febris intermittens subcuenta, vel atrabilaris, Torti, de febr. period. pernic.* p. 136.)

ESPECE IV. Fievre tierce, avec cardialgie pendant l'accès. (*Febris tertiana cardiaca, Torti, de febr. period. pernic.* pag. 137.)

ESPECE V. Fievre tierce, avec sueur aussi-tôt après le froid, sans calme sensible pendant l'accès. (*Febris intermittens diaphoretica, Torti de febr. period. pernic.* pag. 137.)

ESPECE VI. Fievre tierce, avec syncope pendant l'accès. (*Febris tertiana syncopalis, Torti, de febr. period. pernic.* pag. 138.)

ESPECE VII. Fievre tierce, avec sentiment de froid presque continual pendant l'accès, soif, & chaleur douce au tact. (*Febris tertiana algida, Torti, de febr. period. pernic.* pag. 138.)

ESPECE VIII. Fievre tierce, avec léthargie pendant l'accès. (*Febris tertiana intermittens lethargica, Torti, de febr. period. pernic.* pag. 138.)

ESPECE IX. Fievre tierce épidémique. (*Febris tertiana epidemica*. —*Febris tertiana epidemica*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 20.)

ESPECE X. Fievre tierce triple. (*Febris tertiana triplex*, Senn. tom. VI. pag. 437.)

ESPECE XI. Fievre tierce incomplète. (*Febris tertiana spuria*. —*Febris tertiana noctis*, Senn. tom. VI. pag. 419.)

ESPECE XII. Fievre double tierce. — Fievre, avec retour des accès de deux jours l'un, de manière que le premier accès répond au troisième, & le second au quatrième. (*Febris tertiana duplex*. —*Febris tertiana duplex*, Senn. tom. VI. pag. 437.)

GENRE III. Fievre quarte. — Fievre avec retour d'accès semblables tous les quatre jours. (*Febris quartana*. —*Febris quartana*, Senn. tom. VI. pag. 426. —*Febris quartana*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 23.)

ESPECE I. Fievre quarte avec dépravation des humeurs contenues dans les premières voies. (*Febris quartana ab humore in primis viis orto*. —*Febris putrida intermittens, quarto quoque die recurrens*, Senn. tom. VI. pag. 427.)

ESPECE II. Fievre quarte par répercussion de la galle. (*Febris quartana ex scabie introcurrente*, Senn. tom. VI. pag. 433.)

ESPECE III. Fievre quarte automnale. (*Febris quartana autumnalis*, Sydenh. tom. I. pag. 51.)

ESPECE IV. Fievre quarte avec folie. (*Febris quartana cum amentia*. —*Mania intermittentes diuturniores præcipue quartanas nonnumquam excipiens*, Sydenh. t. I. p. 60.)

ESPECE V. Fievre quarte double. — Fievre dont le premier accès répond au quatrième, & le second au cinquième ; le troisième jour sans accès. (*Febris quartana duplex*. — *Febris quartana duplex*, Senn. tom. VI. pag. 437.)

ESPECE VI. Fievre quarte triple. (*Febris quartana triplex*, Senn. tom. VI. pag. 437.)

GENRE IV. Fievre erratique. — Fievre avec retour de semblables accès tous les 5 jours, ou les 6, ou les 7, ou les 8, ou les 9, ou les 10 jours. (*Febris erratica*, Sauvag. Nosol. Méthod. tom. I. pag. 359.)

ORDRE CINQUIEME.

FIEVRES lentes. (*Febres lenta*.)

GENRE I. Fievre hétérique. — Fievre continue de la durée de 4, 5, 6 semaines, & même plusieurs mois. (*Febris hética*. — *Febris lenta*, Lomm. obf. med. pag. 16. — *Febris hética*, Senn. tom. VI. pag. 437. — *Febris lenta & hética*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 175.)

ESPECE I. Fievre hétérique des enfants. (*Febris hética infantum*. — *Febris lenta ex lacte corruptio*, Senn. tom. VI. pag. 334. — *Febris hética infantum*, Sydenh. tom. I. pag. 367, 521. — *Febris lenta infantum*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 177.)

ESPECE II. Fievre lente des vieillards. (*Febris lenta senum*. — *Marasmus senum*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 177.)

ESPECE III. Fievre lente vénérienne. (*Febris lenta venerea*. — *Febris lenta venerea*, Afruc. de morb. vener. tom. I. pag. 427.)

ESPECE IV. Fievre lente vermineuse. (*Febris lenta verminosa*. — *Febris verminosa lenta*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 187.)

ESPECE V. Fievre lente bénigne, avec taches inégales, très-rouges, volages, accompagnées de démangeaison, tombant en écailles. (*Uredo*, Linn. gen. morb. gen. 8.)

