

## SECONDE CLASSE. MALADIES INFLAMMATOIRES. *IMFLAMMATIONS.*

### ORDRE PREMIER.

INFLAMMATION des téguments, & des glandes situées sous la peau. (*Inflammatio, Boërh. Swieten, de cogn. morb. aph. 370.*)

GENRE I. Inflammation plus ou moins étendue, de peu de durée, sans danger, n'attaquant que la surface de la peau.

ESPECE I. Inflammation superficielle des aines & des cuisses des petits enfants. (*Levret, Art. des accouch. pag. 250.*)

ESPECE II. *Feu volage des enfants.* — Taches rouges rarement fixes, attaquant indistinctement les diverses parties de la peau des enfants. (*Maculae volatiles infantium, Senn. tom. V. pag. 78.*)

ESPECE III. Éruption de petites taches rouges chez les nouveaux nés, lorsqu'ils ne se vident pas. (*Smellie, tom. I. pag. 464. tom. III. pag. 567.*)

GENRE II. Rougeur de tout le corps par la distension des vaisseaux, avec difficulté de respirer. (*Plethora, Linn. gener. morb. gen. 225.*)

GENRE III. *Érysipèle.* — Tumeur rouge, douloureuse, non circonscrite, d'une chaleur acré, se terminant plus souvent par des veillies remplies de sérosité, que par abcès. (*Erysipelas. — Erysipelas, Heiß. Inst. Chir. tom. I. p. 285.*)

ESPECE I. Érysipèle essentielle. (*Erysipelas essentiale.*)

ESPECE II. Érysipèle par compression. (*Meyseray, Med. d'arm. tom. II. pag. 242.*)

ESPECE III. *Brûlure.* — Érysipèle par le feu. (*Combustio, Heiß. Inst. Chir. t. I. p. 322.*)

ESPECE IV. Érysipèle par suppression de transpiration, ou de sueur. (*Meyseray, Med. d'arm. tom. II. pag. 241.*)

ESPECE V. Érysipèle par poison. (*Erysipelas à veneno, Sauvag. Nosol. meth. tom. I. pag. 451.*)

ESPECE VI. Érysipèle par le soleil. (*Erysipelas à sole, Plater. Prax. Med. t. III. p. 71.*)

ESPECE VII. *Feu sacré.* — Érysipèle avec abattement extrême des forces, & prompt passage à la gangrene. (*Ignis facer. — Febris erysipelacea cum pestle, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 99.*)

12      II. CLASSE, ORDRE I.

GENRE IV. Tumeurs par piqûre d'insectes, rouges, douloureuses, plus ou moins superficielles & étendues. (*Ictus virulentii insectorum nostrorum*, *Plater. Prax. med. tom. II. pag. 682.*)

ESPECE I. Tumeur inflammatoire, par la piqûre d'une abeille. *Erysipelas à vespis*, *Sauvag. Nof. method. tom. I. pag. 452.*)

ESPECE II. Douleur aiguë avec inflammation, par un insecte vénimeux introduit dans une partie des téguments. (*Cocytia*, *Linn. gener. morb. gen. 257.*)

ESPECE III. Inflammation par la morsure d'une vipère. (*Inflammatio à viperæ*, *Mead de viperæ. tom. I. pag. 1.*)

ESPECE IV. Sirons. (*Sirones*, *Senn. tom. V. pag. 33.*)

GENRE V. Inflammation par des instruments tranchants, piquants, ou contondants.

ESPECE I. Inflammation par instrument tranchant, ou piquant. (*Inflammatio vulnerum*, *Heijster. inf. chirurg. tom. I. pag. 80.* — *Inflammatio vulneribus supervenienti*, *Senn. tom. V. pag. 134.*)

ESPECE II. Inflammation par une plâtre d'arme à feu. (*Inflammatio vulnerum à sclopétis*, *Heijster. inf. chirurg. tom. I. pag. 85.*)

ESPECE III. Inflammation érythémateuse par une fracture. (*du Verney, maladies des os*, *tom. I. pag. 112.*)

ESPECE IV. Inflammation des téguments, ou des muscles par une fracture. (*du Verney, malad. des os*, *tom. I. pag. 118.*)

GENRE VI. *Engelure*. — Tumeur caufée par le froid, avec rougeur, chaleur, démangeaison, affectant particulièrement les pieds, les mains, & quelquefois le bout du nez, se terminant souvent par la suppuration. (*Pernio*, *Pernio, Senn. tom. V. pag. 24* — *Pernio, Heijster. inf. chirurg. tom. I. p. 308.*)

GENRE VII. *Écrouelles*. — Tumeurs circonscrites, peu douloureuses, lentes à venir à suppuration, situées au col, ou aux aisselles, ou aux aines, ou au mésentère, avec pâleur du visage, bouffissure des lèvres, souvent tuméfaction des os & carie, attaquant pour l'ordinaire les enfants, jusqu'à l'âge de virilité. (*Scrophula*. — *Ecrouelles, Brouzet, educ. med. des enfants*, *tom. II. pag. 184.*)

GENRE VIII. *Dragonneau*. — Tumeur inflammatoire promptement terminée en une vésicule, qui s'ouvre & se montre comme une des extrémités d'un ver. (*Dracunculus*. — *Inflammation & ulcere par des dragonneaux*, *Essais de méd. d'Edim. tom. VI. pag. 414.* — *Dragonneau, Astruc. traité des tumeurs*, *tom. I. pag. 116.*)

GENRE IX. *Framboise, Pian*. — Taches sur la peau, contagieuses, se changeant en petits boutons qui s'ulcerent, & se convertissent en petits champignons rouges, avec blanchissement des poils environnans.

*II. CLASSE, ORDRE I.*

13

(*Framboësia. — Yaw, observ. de méd. d'Edimbourg, tom. VI. pag. 419.*)

**GENRE X. Vérole.** — Tumeurs inflammatoires des parties génitales, ou des parties environnantes, par le contact immédiat des parties génitales d'une personne saine avec celles d'une personne infectée de cette maladie. (*Syphilitis. — Morbus venereus, sive lues venerea confirmata, Astruc, de morb. venereis. t. I. pag. 399. — Lues venerea, Morgagni, de sedibus. morb. tom. II. pag. 365.*)

**ESPECE I.** Tumeurs légèrement inflammatoires, petites, circonscrites, dures, semées sur la peau, suppurrant quelquefois à leur centre, ne cédant qu'aux préparations mercurielles. (*Gale verolique des enfants, Puys, traité des accouchem. p. 314.*)

**GENRE XI. Gale.** — Petites tumeurs inflammatoires ordinairement situées sur les téguments aux articulations des extrémités, entre les doigts des mains & des pieds, avec chaleur, vive démangeaison, évacuation presqu'insensible d'humeurs plus ou moins fluides. (*Scabies. — Scabies, Senn. tom. V. pag. 34. — Scabies, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 426.*)

**GENRE XII. Phlegmon.** — Tumeur circonscrite avec douleur, chaleur, tension, rougeur, & penchant vers la suppuration. (*Phlegmone. — Phlegmone, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 265. — Phlegmone, Platner. inst. chirurg. pag. 40.*)

**GENRE XIII. Furoncle.** — Tumeur circonscrite avec chaleur, rougeur, douleur, dureté, se terminant par suppuration & par une espece de bourillon. (*Furunculus. — Furunculus, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 289.*)

**GENRE XIV. Bubon.** — Tumeur dure, circonscrite, située aux aines, ou aux aisselles, au commencement sans rougeur & chaleur sensibles, se terminant lentement vers la résolution, ou vers la suppuration. (*Bubo. — Bubo, Senn. tom. V. pag. 18. — Bubo, Platner, inst. chirurg. pag. 66.*)

**ESPECE I. Bubon pestilential.** (*Bubo pestilentialis, Heist. inst. chir. tom. I. pag. 293.*)

**ESPECE II. Bubon vénérien.** (*Bubo venereus. — Bubo venereus, Astruc, de morbis venereis. tom. I. pag. 323.*)

**ESPECE III. Bubon bénin.** (*Bubo benignus. — Bubo benignus, Heist. inst. chir. tom. I. pag. 291.*)

**ESPECE IV. Bubon scrophuleux.** (*Bubo scrophulosus.*)

**ESPECE V. Bubon inguinal des enfants.** — Tuméfaction des glandes inguinales des enfants, avec douleur, renitence & maigreuté de tout le corps. (*Bubo inguinalis puerorum. — Bubo puerorum, Platner, inst. chirurg. pag. 69.*)

**GENRE XV. Charbon.** — Tumeur dure, d'un rouge noirâtre & livide, peu élevée, accompagnée d'une douleur aiguë, très-souvent pourvue à son extrémité d'une véhicule grifâtre, se terminant en très-peu de temps par la gangrene. (*Carbunculus. Anthrax. — Carbunculus, Senn. tom. V. pag. 22. — Carbunculus, Platner, inst. chirurg. pag. 58.*)

14 *II. CLASSE, ORDRE I.*  
ESPECE I. Charbon non pestilentiel. (*Carbunculus non pestilentialis*, *Senn. t. V. p. 21.*)  
ESPECE II. Charbon pestilentiel. (*Carbunculus pestilentialis*, *Senn. tom. V. pag. 21.*  
— *Carbunculus sive anthrax*, *Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 293.*)

GENRE XVI. Inflammation des mamelles. (*Inflammatio mammarum*,  
*Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 279.*)

ESPECE I. Inflammation des mamelles par la rétention & la dépravation du lait,  
(*Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 279.*)

ESPECE II. Inflammation des mamelles par une cause mécanique.

ESPECE III. Inflammation essentielle des mamelles.

GENRE XVII. Inflammation de l'ombilic. (*Inflammatio umbilici*, *Senn.*  
*tom. III. pag. 618.*)

GENRE XVIII. Inflammation du scrotum. (*Inflammatio scroti*, *Senn. tom. III.*  
*pag. 601.*)

GENRE XIX. *Inflammation des testicules.* — Gonflement des testicules avec chaleur, dureté & douleur. (*Inflammatio testicularum*, *Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 283.* — *Testiculorum inflammatio*, *Platner, inst. chirurg. pag. 70.*)

ESPECE I. *Inflammation essentielle des testicules.* — Inflammation des testicules par abondance du sang. (*Inflammatio testicularum à sanguine*, *Heistler, inst. chirurg. tom. I. pag. 284.*)

ESPECE II. Inflammation des testicules par abondance de fémence.

ESPECE III. Inflammation des testicules par un coup. (*Inflammatio testicularum ab externa violencia*, *Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 284.*)

ESPECE IV. Inflammation des testicules par virus vénérien. (*Phlegmo testium venereus*,  
*Astruc, de morb. vener. tom. I. pag. 296.* — *Inflammatio testicularum à venere*,  
*Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 284.*)

GENRE XX. Inflammation du gland. (*Inflammatio glandis.*)

ESPECE I. Inflammation du gland par un coït trop violent, ou trop répété, ou par déchirement du frein.

ESPECE II. Inflammation du gland par constriction de sa base.

ESPECE III. Inflammation du gland par virus vénérien.

ESPECE IV. Inflammation du gland par les mauvaises qualités de l'humeur sébacée.

GENRE XXI. *Phimosis.* — Inflammation du prépuce, avec difficulté & souvent impossibilité de découvrir le gland, qui est souvent enflammé. (*Phimosis*,  
*Senn. tom. III. pag. 606.* *Phimosis*, *Heist. inst. chirurg. tom. II. p. 311.*)

ESPECE I. Phimosis par l'acréte de l'humeur sébacée. (*Phimosis ab acritate humoris subpinguis absque viru venereo*, *Platner, inst. chirurg. pag. 559.*)

*II. CLASSE, ORDRE I.* 15

ESPECE II. Phimosis vénérien. (*Phimosis venerum, Astruc, de morb. vener. tom. I.*, pag. 360.)

ESPECE III. Phimosis par un coït trop violent. (*Phimosis à coitu vehementiori, Heist. infl. chirurg. tom. II.*, pag. 811.)

GENRE XXII. Inflammation du prépuce, avec empêchement de recouvrir le gland ordinairement enflammé. (*Paraphimosis, Senn. tom. III.*, pag. 606. — *Paraphimosis, Heist. infl. chirurg. tom. II.*, pag. 813.)

GENRE XXIII. Inflammation des parties naturelles de la femme.

ESPECE I. Inflammation des parties naturelles par la dépravation des pertes blanches;

ESPECE II. Inflammation essentielle des parties naturelles de la femme. (*Inflammatio effensualis genitalium sexus feminini.*)

ESPECE III. Inflammation des parties naturelles de la femme par virus vénérien. (*Inflammatio genitalium sexus feminini à víro venereo.*)

ESPECE IV. Inflammation gangreneuse des parties génitales par l'enclavement de la tête de l'enfant. (*Levret, art. des accouch.*, pag. 104.)

ESPECE V. Inflammation des grandes levres des femmes grosses, précédée de fièvre. (*Levret, art. des accouch.*, pag. 218.)

ESPECE VI. Inflammation de l'une ou l'autre levre des femmes grosses, rarement de deux, suivie de fièvre. (*Levret, art. des accouch.*, pag. 219.)

ESPECE VII. Inflammation légère des parties naturelles par un accouchement difficile.

GENRE XXIV. Inflammation de l'extrémité du doigt par le froid, avec chute de l'ongle. (*Pressura, Linn. gen. morb. gen.* 260.)

GENRE XXV. *Panaris.* — Tuméfaction de l'extrémité du doigt, avec chaleur, douleur lancinante, & tension considérable. (*Paronychia. — Paronychia, Senn. tom. V.*, pag. 23.)

ESPECE I. Panaris cutané. (*Paronychia cutanea, Heist. infl. chirurg. tom. II.* 1077.)

ESPECE II. Panaris avec lésion du tendon. (*Paronychia cum tendinis lazione, Heist. infl. chirurg. tom. II.* pag. 1078.)

ESPECE III. Panaris avec lésion du périoste (*Paronychia cum lazione periostii, Heist. infl. chirurg. tom. II.* pag. 1078.)

ESPECE IV. Onglade. — Panaris par le virus vénérien. (*Paronychia venerea, Astruc. de morb. ven. tom. I.*, pag. 401.)

GENRE XXVI. *Papule.* — Petite tumeur enflammée, & ne suppurant qu'avec peine. (*Papula. — Papula, Linn. gener. morb. gen.* 275.)

GENRE XXVII. *Échauboulure.* — *Ébullition de sang.* — Tumeurs superficielles, petites, rouges, semblables à des grains de millet, attaquant la poitrine, les bras & les cuisses, particulièrement des enfants. (*Ébullitio sanguinis. — Sudamina, Senn. tom. V.*, pag. 33.)

16 *II. CLASSE, ORDRE I.*

**GENRE XXVIII. Bourgeons.** — Tumeurs dures, petites, plus ou moins rouges & élevées, circonscrites, indolentes, de longue durée, laissant quelquefois transfuser une espèce d'humeur fluide, & affectant le visage. (*Vari.* — *Vari*, *Plater*, *prax. med. tom. III.* pag. 212. — *Vari*, *Senn. tom. V.* pag. 33.)

**GENRE XXIX. Couperose.** — Tumeurs superficielles, rouges, petites, inégales, de longue durée, plus ou moins rasssemblées, affectant le visage. (*Gutta rosea*. — *Gutta roseacea*, *Plater. prax. med. tom. III.* pag. 72.)

**ESPECE I. Couperose par le vin.** (*Gutta roseacea à vino*, *Senn. tom. V.* pag. 40.)

**ESPECE II. Couperose dartreuse.** (*Gutta rosea herpetica*. — *Gutta rosea pustulosa*, & *quasi exulcerata*, *Senn. tom. V.* pag. 40.)

**ESPECE III. Couperose vénérienne.** (*Gutta rosea syphilitica*. — *Tubercula venerea*, *Afric, de morb. ven. tom. I.* pag. 400.)

**GENRE XXX. Épinydide.** — Phlyctènes d'un rouge noirâtre, agrégées, de trois ou quatre lignes de diamètre, affectant particulièrement les jambes, avec douleur pungitive beaucoup plus vive la nuit que le jour. (*Epinydis*, *Senn. tom. V.* pag. 33.)

**GENRE XXXI. Porcelaine.** — Tumeurs superficielles, petites, semblables à des piqûres d'orties, se changeant promptement en vésicules remplies de sérosité, se desséchant sans altérer la couleur de la peau. (*Sora*. — *Effere*, *Senn. tom. V.* pag. 34.)

**GENRE XXXII. Orgeolet.** — Tumeur inflammatoire sur le bord des paupières, petite, & plus ou moins douloureuse. (*Orgeolet*, *S. Yves*, *malad. des yeux*, pag. 63.)

**GENRE XXXIII. Cancer.** — Tumeur dure, plus ou moins enflammée, très-douloureuse, & dégénérant avec plus ou moins de rapidité en ulcère rongeant. (*Cancer*. — *Cancer*, *Boëhr. Swiet. de cognosc. morb. afor. 492.*)

**ESPECE I. Cancer par la suppression, ou la diminution du flux menstruel.**

**ESPECE II. Cancer sans principe évident.**

**ESPECE III. Cancer par une blessure, ou autre cause mécanique.**

**ESPECE IV. Cancer scrophuleux.**

**ESPECE V. Cancer vérolique.** (*Cancer syphiliticus*, *Sauv. nōf. meth. tom. I.* pag. 149.)

**ESPECE VI. Cancer des mammelles.** (*Cancer mammarum*, *Heister, inst. chirurg. t. II.* pag. 688.)

**ESPECE VII. Cancer de l'œil.** (*Carcinoma oculi*, *Heilt. inst. chir. tom. I.* pag. 593.)

**ESPECE VIII. Cancer des paupières.** (*Malite-Jan*, *malad. de l'œil*, pag. 510. — *S. Yves*, *malad. des yeux*, pag. 68.)

**ESPECE IX.**

*II. CLASSE, ORDRE. II.* 17

ESPECE IX. Cancer des lèvres. (*Carcinoma labrorum aut oris*, Heijl. *inst. chir. tom. II.* pag. 635.)

ESPECE X. Cancer de la langue. (*Cancer linguae*, Heijl. *inst. chir. tom. II.* pag. 655.)

ESPECE XI. Cancer des parotides.

ESPECE XII. Cancer de la verge. (*Cancer colis*, Heijl. *inst. chir. tom. II.* pag. 816.)

ESPECE XIII. Cancer de la matrice. (*Cancer uteri*, Senn. *tom. IV.* pag. 631.)

---

ORDRE SECOND.

INFLAMMATIONS de la tête. (*Inflammationes capititis.*)

GENRE I. Phrénésie. — Maladie inflammatoire de la tête, avec fièvre aiguë & délire continuels. (*Phrenitis.* — *Febris phrenetica sive phrenitis*, Fred. Hoffm. *tom. II.* pag. 131. — *Phrenitis*, Boërh. van-Swieten, de cogn. morb. aph. 771. — *Phrenitis*, Bagliv. prax. med. pag. 102. — *Phrenitis*, Morgagni, de sedib. morb. *tom. I.* pag. 49.)

ESPECE I. Phrénésie essentielle. (*Phrenitis essentialis.* — *Phrenitis vera*, Boërh. van-Swiet, de cogn. morb. aph. 772.)

ESPECE II. Phrénésie symptomatique. (*Phrenitis symptomatica*, Boërh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 772.)

ESPECE III. Phrénésie par le soleil. (*Phrenitis à sole.* — *Inflammation du cerveau*, Pringle, mal. des armées, *tom. I.* pag. 245.)

ESPECE IV. Phrénésie par une longue diète, ou par des évacuations considérables. (*Meyserry*, Med. d'arm. *tom. II.* pag. 168.)

ESPECE V. Inflammation du cerveau avec fièvre synoïque, tremblement des tendons & délire. (*Sphacelismus*, Linn. gen. morb. gen. 32.)

ESPECE VI. Chaleur sur le sommet de la tête des enfants, avec les yeux retirés, face rouge, fièvre aiguë, insomnie, sécheresse du corps, manque d'appétit, souvent délire continuels, & quelquefois cavité plus ou moins sensible sur la fontanelle. (*Siriasis infantum*, Senn. *tom. IV.* pag. 771.)

GENRE II. Inflammation des parotides (*Inflammatio parotidum.* — *Parotidum inflammatio*, Platner, *inst. chir.* pag. 63.)

ESPECE I. Inflammation des parotides par une crise. (*Parotis critica*, Senn. *tom. V.* pag. 20.)

ESPECE II. Oreillon. — Inflammation bénigne des parotides. (*Parotis benigna*, Senn. *tom. V.* pag. 20.)

ESPECE III. Inflammation des parotides par le mercure. (*Inflammatio parotidum ab argento vivo*, Platner, *inst. chirurg.* pag. 64.)

ESPECE IV. Inflammation des parotides par une humeur catarrhalie. (*Inflammatio parotidum in catarrho*, Platner, *inst. chir.* pag. 65.)

Table des Maladies. C

**GENRE III.** *Ophthalmie.* — Rougeur de la conjonctive avec douleur, & souvent avec chaleur. (*Ophthalmia*. — *Ophthalmia*, Senn. tom. III. pag. 201. — *Inflammation de l'œil*, Maitre-Jan, mal. de l'œil, pag. 345.)

ESPECE I. *Ophthalmie humide.* (*Ophthalmia humida*. — *Ophthalmie humide*, S. Yves, mal. des yeux, pag. 139.)

ESPECE II. *Ophthalmie seche.* (*Ophthalmia sicca*, Senn. tom. III. pag. 206. — *Ophthalmie seche*, S. Yves, malad. des yeux, pag. 139.)

ESPECE III. *Ophthalmie par la chaleur du soleil, ou du feu.* (*Ophthalmia à calore solis vel igne*, Senn. tom. III. pag. 202.)

ESPECE IV. *Ophthalmie par des coups.* (*Ophthalmia ab ictu*, Senn. tom. III. p. 203. — *Ophthalmie par des coups*, S. Yves, mal. des yeux, pag. 146.)

ESPECE V. *Ophthalmie vénérienne.* (*Ophthalmia venerea*, Afr. de morb. ven. tom. I. pag. 289 & 421. — *Ophthalmie vénérienne*, S. Yves, mal. des yeux, pag. 145.)

ESPECE VI. *Ophthalmie*, avec bourgeons sur le globe de l'œil. (*S. Yves*, malad. des yeux, pag. 141.)

ESPECE VII. *Ophthalmie violente.* (*Chemosis*, S. Yves, mal. des yeux, pag. 143.)

ESPECE VIII. *Ophthalmie catarrhale.* (*S. Yves*, mal. des yeux, pag. 140.)

ESPECE IX. *Ophthalmie érythopélateuse.* (*S. Yves*, mal. des yeux, pag. 142.)

ESPECE X. *Ophthalmie par la rupture des vaisseaux de la conjonctive.* (*S. Yves*, mal. des yeux, pag. 147.)

ESPECE XI. *Ophthalmie*, avec des petits abcès sur la cornée & la conjonctive. (*S. Yves*, malad. des yeux, pag. 142.)

ESPECE XII. *Ophthalmie scrophuleuse.* (*Ophthalmia scrophulosa*.)

ESPECE XIII. *Ophthalmie par la rache.* (*Ophthalmia à rinea*.)

ESPECE XIV. *Ophthalmie par la fumée, & autres corps étrangers.* (*Ophthalmia à fumo*, Senn. tom. III. pag. 202. — *Ophthalmie par des ordures dans l'œil*, S. Yves, malad. des yeux, pag. 146.)

ESPECE XV. *Ophthalmie de la choroïde.* (*S. Yves*, mal. des yeux, pag. 145.)

**GENRE IV.** *Inflammation de l'oreille.* — Douleur aiguë de l'oreille, avec battement & chaleur. (*Aurium inflammatio*, Senn. tom. III. pag. 233. tom. IV. pag. 774.)

**GENRE V.** *Inflammation de la langue.* (*Inflammatio linguæ*, Senn. tom. III. pag. 251.)

**GENRE VI.** *Inflammation de la luette.* (*Inflammatio uyulæ*. — *Gurgulionis inflammatio*, Senn. tom. III. pag. 274.)

**GENRE VII.** *Inflammation des amygdales.* (*Inflammatio tonsillarum*, Senn. tom. III. pag. 276.)

**GENRE VIII.** *Angine.* — Difficulté d'avaler, avec inflammation du goſier.

### II. CLASSE, ORDRE III. 19

chaleur, douleur, fièvre, plus ou moins vive, & respiration plus ou moins gênée. (*Angina.* — *Angina*, Senn. tom. III. pag. 278.)

ESPECE I. Esquinancie. (*Angina inflammatoria*. — *Synanche*, Senn. tom. III. p. 280. — *Angina*, Sydenham, tom. I. pag. 176. — *Angina*, Frederic. Hoffm. tom. II. pag. 125. — *Angina inflammatoria*, Boëth. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 798.)

ESPECE II. Difficulté très-grande d'avaler & de respirer, avec inflammation aiguë de la trachée-artère, sans rougeur sensible des amygdales & du voile du palais. (*Synanche*, Senn. tom. III. pag. 280. — *Angina inflammatoria fistulæ pulmonalis*, Boëth. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 801.)

ESPECE III. Difficulté d'avaler & de respirer, avec rougeur sensible du goſier, & des parties environnantes du col. (*Parafynanche*, Senn. tom. III. pag. 280.)

ESPECE IV. Angine qui se termine par la gangrene. (*Angina gangrenoſa*, Boëth. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 816.)

ESPECE V. Angine pituiteuse. (*Angina pituitosa*, Senn. tom. III. pag. 280.)

### GENRE IX. Inflammation des gencives.

ESPECE I. Inflammation des gencives des enfants, par la pouſſe des dents. (*Brouzet, éduc. med. des enfants*, tom. I. pag. 228.)

ESPECE II. Inflammation essentielle des gencives.

ESPECE III. Inflammation des gencives par le ſcorbut.

ESPECE IV. Inflammation des gencives par le mercure.

---

## ORDRE TROISIÈME.

### INFLAMMATIONS de la poitrine (*Inflammationes pectoris.*)

GENRE I. *Inflammation des poumons.* — Douleur de poitrine plus ou moins vive, avec fièvre aiguë, difficulté de respirer, toux & expectoration ordinairement fanguinolente. (*Peripneumonia*, Lomm. obſerv. med. pag. 133. — *Peripneumonia*, Morgagni, de ſed. morb. tom. I. pag. 204.)

ESPECE I. Péripneumonie essentielle. (*Peripneumonia vera*. — *Febris pneumonica ſive peripneumonia*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 136. — *Peripneumonia vera*, Boëth. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 820.)

ESPECE II. Péripneumonie pituiteuse. (*Peripneumonia pituitosa*. — *Peripneumonia notha*, Sydenh. tom. I. pag. 167. — *Peripneumonia notha*, Boëth. van-Swiet. de cogn. morb. aphor. 867.)

ESPECE III. Inflammation de poitrine des nouvelles accouchées. (*Inflammation de poitrine des femmes en couches*, Leyret, art. des accouch. pag. 161.)

GENRE II. *Pleuréſie.* — Inflammation de la pleure, ou des muscles intercostaux, ou du tissu cellulaire qui unit la pleure & les muscles, avec fièvre aiguë, douleur lancinante, respiration difficile, toux douloureuse. (*Pleuritis*. — *Febris pleuritica*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 136. — *Pleuritis*, Boëth. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 875. — *Pleuritis*, Triller, de *Pleuritide.*)

ESPECE I. Pleurésie essentielle. (*Pleuritis vera*, Boérh. van-Swiet. de cognosc. morb. aph. 878. — *Pleuritis*, Lomm. obf. med. pag. 121.)

ESPECE II. Pleurésie avec expectoration. (*Pleuritis humida*, Boérh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 879.)

ESPECE III. Pleurésie aiguë. (*Pleuritis acuta*. — *Pleuritis sicca*, Boérh. van-Swiet. de cogn. morb. aphor. 879. — *Pleuritis sicca sive erysipelatodes acutissima*, Baglivi, prax. med. pag. 37.)

ESPECE IV. Pleurésie pituiteuse. (*Pleuritis pituitosa*. — *Pleurésie pituiteuse, ou par cause froide*, Meyjerey, Med. d'armée, tom. II. pag. 308.)

ESPECE V. Pleurésie laiteuse. (*Pleuritis lactea*. — *Dépôt laiteux sur une partie de la poitrine, avec fièvre aiguë, douleur fixe & vive*, Puçot, traité des accouchem. pag. 373.)

ESPECE VI. Pleurésie putride. (*Pleuritis putrida*. — *Pleurésie avec des signes de matières indigènes ou putrides dans les premières voies*, Meyjerey, malad. des armées, tom. II. pag. 314.)

ESPECE VII. Pleurésie féreuse. (*Pleuritis ferosa*. — *Pleuritis à colluvie ferosa*, Carol. Pif. de morb. à coll. feros. pag. 249.)

GENRE III. Pleuropéripneumonie. — Inflammation de la pleure & des poumons, avec douleur lancinante, fièvre aiguë, toux vive, crachat sanguinolent, respiration difficile & fréquente. (*Pleuropéripneumonia*.)

ESPECE I. Pleuropéripneumonie essentielle. (*Pleuropéripneumonia essentialis*.)

ESPECE II. Pleuropéripneumonie bilieuse. (*Pleuropéripneumonia biliosa*. — *Dolor pleumaticus à bile*, Tulpi, obf. med. pag. 102.)

GENRE IV. Inflammation du muscle sternocostal, avec respiration difficile, & douleur aiguë de toute la région épigastrique, particulièrement vers le cartilage xiphoïde. Symptômes essentiels incertains. (*Inflammatio sternocostalis*, Sauv. nosol. meth. tom. I. pag. 478.)

GENRE V. Inflammation du cœur. — Douleur profonde & pénétrante sous le sternum, avec palpitation, défaillance, pouls inégal & fréquent. Symptômes essentiels incertains. (*Inflammatio cordis*. — *Inflammation du cœur*, Senac. tom. II. pag. 380.)

### ORDRE QUATRIEME.

INFLAMMATIONS du ventre. (*Inflammationes abdominis*.)

GENRE I. Inflammation des muscles du bas-ventre. — Muscles du bas-ventre tendus, extrêmement douloureux, avec chaleur & quelquefois rougeur des téguments. (*Inflammatio muscularum abdominis*, Senn. tom. IV. p. 619.)

*II. CLASSE, ORDRE. IV.*

21

**GENRE II. Paraphrénésie.** — Constriction violente & très-douloureuse dans la région épigastrique, avec fièvre aiguë, délire, ris sardonique, respiration petite, fréquente & douloureuse; inflammation du diaphragme, ou des membranes qui le recouvrent. (*Paraphrenesis*, Boërh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 907. — *Paraphrenitis*, Morgagni, de sedib. morb. tom. I. pag. 52.)

**GENRE III. Inflammation du foie.** — Tension douloureuse de l'hypocondre droit, avec tumeur, chaleur, douleur gravative, fièvre aiguë, difficulté de respirer, toux seche, couleur jaune du visage, soif, très-souvent hoquet & vomissement. (*Hepatitis. Jecinoris inflammatio. — Hepatitis, Fernelii, oper. medic. tom. II. pag. 228. — Lomm. obs. med. pag. 215.*)

**ESPECE I.** Inflammation essentielle du foie. (*Hepatis inflammatio*, Senn. tom. IV. pag. 540. — *Febris hepatica sive hepatitis*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 143. — *Hepatitis*, Boërh. van-Swiet. de cogn. morb. pag. 914.)

**ESPECE II.** Inflammation du foie des nouvelles accouchées. (*Inflammatio hepatis in pueris*, Senn. tom. IV. pag. 747.)

**ESPECE III.** Inflammation superficielle du foie. (*Inflammatio superficialis quasi erysipelacea & spuria hepatis*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 143.)

**GENRE IV. Inflammation de la rate.** — Tension & gonflement de l'hypocondre gauche, avec douleur, chaleur, soif, fièvre aiguë & difficulté de respirer. (*Inflammatio splenis. — Lienis inflammatio*, Lomm. obs. med. pag. 223.)

**ESPECE I.** Inflammation de la rate par abondance du sang. (*Lienis inflammatio à sanguine*, Senn. tom. III. pag. 488.)

**GENRE V. Inflammation du méscénètre.** — Douleur profonde & gravative, tantôt au dessus, tantôt au dessous de la région ombilicale, avec tumeur, fièvre plus ou moins aiguë, rétention des matières fécales, quelquefois excrétion de matières rougeâtres par l'anus. (*Inflammatio mesenterii*. Lomm. obs. med. pag. 207. — *Inflammatio mesenterii*, Senn. tom. III. pag. 479.)

**GENRE VI. Inflammation de l'épipoon.** — Tension & tuméfaction de la partie supérieure & moyenne de l'abdomen, avec douleur vive, lancinante & profonde, fièvre aiguë. Symptômes essentiels incertains. (*Inflammatio omenti. — Inflammatio omenti*, Boërh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 958. — *Epipliotis*, Sauvag. nosol. meth. tom. I. pag. 480.)

**GENRE VII. Inflammation de l'estomac.** — Tuméfaction de la région épigastrique, avec fièvre aiguë, douleur vive, fixe & profonde, tension, ardeur, soif, nausées & vomissement. (*Inflammatio ventriculi*, Lomm. observ. med. pag. 172.)

**ESPECE I.** Inflammation essentielle de l'estomac. (*Gastritis. — Febris stomachica inflam-*

*matoria*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 120. — *Inflammatio ventriculi*, Boérh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 951.)

ESPECE II. Inflammation de l'estomac par un coup. *Meyssery*, Méd. d'arm. t. II. p. 363.)

ESPECE III. Inflammation de l'estomac par des substances vénéneuses. (*Inflammatio ventriculi à venenis*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 123.)

GENRE VIII. *Inflammation des intestins*. — Douleur aiguë & profonde de l'abdomen, avec gonflement & tension douloureuse des muscles abdominaux, fièvre aiguë, soif, ordinairement vomissement & rétention de matières fécales. (*Inflammatio intestinorum*, Senn. tom. III. pag. 414. — *Intestinorum inflammatio*, Boérh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 959. — *Febris intestinorum inflammatoria*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 170.)

ESPECE I. Inflammation essentielle des intestins. (*Inflammatio effentialis intestinorum*, Boérh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 959.)

ESPECE II. Inflammation des intestins par des substances vénéneuses. (*Inflammatio intestinorum à materia acri*, Boérh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 959.)

ESPECE III. Inflammation par l'âcreté des humeurs contenues dans les intestins. (*Inflammatio ventriculi ab acrimonia humorum*, Boérh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 959.)

ESPECE IV. Inflammation des intestins par une violente convulsion. (*Inflammatio ab ingente convulsione*, Boérh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 959.)

ESPECE V. Inflammation des intestins par étranglement. (*Inflammation des intestins par des hernies*, Meyssery, Méd. d'arm. tom. II. pag. 366.)

ESPECE VI. Inflammation essentielle de l'intestin ileum. (*Inflammatio iliaca*. — *Volvulus*, Lomm. obs. med. p. 188. — *Febris iliaca inflammatoria*, Fred. Hoffm. t. II. p. 174.)

ESPECE VII. Inflammation essentielle du colon. (*Inflammatio coli*, Lomm. obs. med. pag. 195.)

ESPECE VIII. Inflammation des intestins par le froid de tout le corps, ou des pieds, (Meyssery, tom. II. pag. 366.)

GENRE IX. *Inflammation des reins*. — Douleur excessive entre les fausses côtes & les os des îles, jusqu'à la partie inférieure de la région hypogastrique, avec fièvre aiguë, vomissement, stupeur de la cuisse du côté affecté, & quelquefois rétraction du testicule, excrétion d'urine souvent interrompue, & en très-petite quantité. (*Inflammatio renum*. *Nephritis*. — *Inflammatio renum*, Lomm. obs. med. pag. 237. — *Renum inflammatio*, Senn. tom. III. pag. 578. — *Nephritis*, Boérh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 993.)

ESPECE I. Inflammation essentielle des reins. (*Febris nephretica*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 147. — *Nephritis à plethora*, Boérh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 994.)

ESPECE II. Inflammation par un calcul, ou des graviers. (*Inflammatio renum à calculo*. — *Febris nephretica calculosa*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 148.)

ESPECE III. Inflammation des reins par une cause mécanique externe. (*Nephritis à vulnere aut contusione*, Boérh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 994.)

ESPECE IV. Inflammation de reins par spasme. (*Inflammatio renum à spasmodia contraktione*, Boérh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 994.)

*II. CLASSE, ORDRE IV.* 23

GENRE X. *Inflammation de la vessie.* — Gonflement, tension de la région hypogastrique, avec fièvre aiguë, vive douleur, strangurie, ou ischurie. (*Inflammatio vesicæ*, Lomm. obf. med. pag. 254. — *Vesicae inflammatio*, Senn. tom. III. pag. 587.)

ESPECE I. Inflammation essentielle de la vessie. (*Inflammatio vesicæ*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 152.)

ESPECE II. Inflammation de la vessie par l'action d'un corps étranger. (*Inflammatio vesicæ à causis externis*, Senn. tom. III. pag. 587.)

ESPECE III. Inflammation de la vessie par les cantharides. (*Inflammatio vesicæ à cantharidibus*, Sauvag. nosol. meth. tom. I. pag. 483.)

ESPECE IV. Inflammation de la vessie par la gonorrhée. (*Inflammatio vesicæ à gonorrhœa*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 153.)

ESPECE V. Inflammation de la vessie par suppression d'évacuations sanguines. (*Inflammatio vesicæ à suppressis sanguinis evacuationibus*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 153.)

GENRE XI. *Inflammation de matrice.* — Tuméfaction & tension de la région hypogastrique, avec fièvre aiguë, 2<sup>o</sup>. douleur vive & profonde, s'étendant sur les lombes, le coccyx, le pubis & les parties voisines, 3<sup>o</sup>. douleur de tête & des yeux, 4<sup>o</sup>. souvent difficulté d'uriner & de rendre les matières fécales, 5<sup>o</sup>. chaleur, clôture & dureté du col de la matrice. (*Uteri inflammatio*, Lomm. obf. med. pag. 271. — *Inflammatio uterina*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 156.)

ESPECE I. Inflammation essentielle de la matrice. (*Inflammatio uteri à plethora*, Senn. tom. IV. pag. 643.)

ESPECE II. Inflammation de la matrice par rétention du flux menstruel, ou des loches, ou des fleurs blanches. (*Inflammatio à retenitis lochiis aut fluxu menstruali*, Senn. tom. IV. pag. 643.)

ESPECE III. Inflammation de la matrice par un accouchement laborieux, ou par violente extraction du placenta. (*Inflammation de la matrice*, Levret, art. des accouch. pag. 157.)

ESPECE IV. Inflammation de l'orifice de la matrice par l'extirpation de l'enfant, trop prompte & trop précipitée.

ESPECE V. Inflammation des ovaires & des ligaments de la matrice chez les accouchées. Symptômes essentiels incertains. (*Smellie*, Tr. des accouch. t. III. p. 471.)

## ORDRE CINQUIEME.

*INFLAMMATIONS du périoste.* — Douleur plus ou moins aiguë, répondant à une portion de l'os, souvent avec fièvre, chaleur, ordinairement sans inflammation sensible des téguments qui recouvrent la partie affectée.

**GENRE I.** *Inflammation du périoste externe.* — Tumeur plus ou moins sensible du périoste, avec chaleur, douleur lancinante, profonde, plus vive quand on touche la partie affectée; quelquefois avec rougeur des téguments, lorsqu'ils recouvrent immédiatement le périoste.

ESPECE I. Inflammation bénigne du périoste externe. (*Inflammatio ossis benignior à périoste externo inflammato*, Boérh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 534.)

ESPECE II. Inflammation du périoste externe, par virus vénérien.

ESPECE III. Inflammation du périoste externe, par cause mécanique.

**GENRE II.** *Inflammation du périoste interne.* — Douleur profonde, vive, continue dans une portion de l'os, augmentant particulièrement après la marche & pendant la nuit, ne prenant point d'accroissement sensible, lorsque l'os est comprimé. (*Inflammatio periostei interni*, Boérh. van Swiet. de cogn. morb. aph. 543.)

ESPECE I. Inflammation du périoste interne par virus vénérien.

ESPECE II. Inflammation du périoste interne par scorbut.

ESPECE III. Inflammation essentielle du périoste interne.

ESPECE IV. Inflammation du périoste interne par cause mécanique.

