

## SIXIÈME CLASSE.

### MALADIES DE FOIBLESSE.

#### DEBILITATES.

#### ORDRE PREMIER.

DIMINUTIONS des forces musculaires.

**GENRE I.** *Lassitude.* — Foiblesse du mouvement musculaire des extrémités & du tronc. (*Lassitudo*. — *Motus debilitas*, *Plater. prax. med. tom. I.* pag. 277. — *Lassitudo*, *Senn. tom. III. pag. 125.*)

**ESPECE I.** Lassitude après des travaux excessifs. (*Lassitudo post labores seu defatigatio*, *Plater. prax. med. tom. I. pag. 277.* — *Lassitudo à labore*, *Sennert. tom. III. pag. 125.*)

**ESPECE II.** Lassitude spontanée. (*Lassitudo spontanea*, *Plater. prax. med. tom. I. pag. 278.*)

**ESPECE III.** Lassitude par pléthore. (*Lassitudo spontanea phlegmonodes*, *Senn. tom. III. pag. 125.*)

**ESPECE IV.** Lassitude spontanée, avec sentiment de tension dans tous les muscles. (*Lassitudo spontanea tensiva*, *Senn. tom. III. pag. 125.*)

**ESPECE V.** Lassitude spontanée, avec douleurs pectoritives par tout le corps. (*Lassitudo spontanea ulcerosa*, *Senn. tom. III. pag. 125.*)

**GENRE II.** Mouvements inégaux des jambes en marchant, par la foiblesse des muscles d'une des deux jambes. (*Claudicatio à debilitate*, *Sauvag. Nof. meth. tom. I. pag. 566.*)

**GENRE III.** *Langueur.* — Abattement des forces musculaires ; avec diminution des forces vitales, pouls petit, penchant au sommeil, défaut d'appétit & inquiétudes. (*Langor.*)

**ESPECE I.** Langueur par des longues abstinences, avec abattement des forces musculaires, pouls très-petit, teint pâle, quelquefois livide & jaunâtre, fréquentes défaillances, enflure œdématoise des jambes.

**ESPECE II.** Langueur par des grandes pertes de sang.

## 66 VI. CLASSE, ORDRE I.

GENRE IV. Grandeur plus considérable de la luttet par le relâchement de ses muscles. (*Gurgitionis laxatio*, Senn. tom. III. pag. 273. — *Uva sive uvula nimium produda*, Heister. *instit. chirurg.* tom. II. pag. 659.)

GENRE V. Foibleffe de l'estomac. — Digestion difficile par la foibleffe de l'estomac. (*Imbecillitas ventriculi dicta cordis motus*, Plater. *prax. med.* tom. II. pag. 398.)

ESPECE I. Foibleffe d'estomac par chaleur. (*Imbecillitas ventriculi ex calore*, Lomm. *observ. med.* pag. 166.)

ESPECE II. Foibleffe d'estomac par humidité. (*Imbecillitas ventriculi ab humiditate*, Lomm. *observ. med.* pag. 166.)

GENRE VI. Courte haleine (*Parole entrecoupée des enfants*, Brouzet, *educ. med. des enfants*, tom. II. pag. 236.)

GENRE VII. Foibleffe du membre viril pour le coït. (*Languiditas in masculis*, Plater. *prax. med.* tom. I. pag. 553.)

ESPECE I. Foibleffe du membre viril par masturbation, ou par excès du coït.

ESPECE II. Foibleffe du membre viril par les passions de l'âme.

ESPECE III. Foibleffe du membre viril par l'action du mercure.

GENRE VIII. Beriberii. — Difficulté de mouvoir les jambes & les bras, avec foibleffe & fourmillement dans les parties affectées, & espece de stupeur. (*Beriberii Indorum*, Tulp. *observ. med.* pag. 286.)

ESPECE I. Foibleffe des muscles de la main, avec difficulté de saisir & de retenir les corps, souvent accompagnée de fourmillement à l'extremité des doigts, & de crampe.

GENRE IX. Cachexie. — Affaiblissement des forces musculaires, avec pâleur de tout le corps, légère bouffissure & pâleur considérable du visage, diminution de chaleur, défaut d'appétit, respiration un peu gênée, pouls faible & tardif, abattement de l'esprit. (*Cachexia*. — *Cachexia sive malus corporis habitus*, Aretæus, pag. 89. — *Cachexia*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 311.)

ESPECE I. Pâles couleurs. (*Chlorosis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 312.)

ESPECE II. Diminution des forces musculaires, avec froid & pâleur de tout le corps, pouls petit & tardif; excréments pituitieux & souvent liquides; urines blanches, ou ténues, ou épaisses. (*Insemperies hepatis frigida*, Senn. tom. IV. pag. 536.)

GENRE X. Rhachitis. — Diminution considérable des forces musculaires des enfants, avec gonflement des articulations des extrémités, distorsion des os longs, bouffissure & grandeur excessive de la tête, maigreur des extrémités, tuméfaction du bas ventre, & esprit prématuré. (*Rhachitis*. — *Rhachitis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 488. — *Rhachitis*, Boëth. *vatt-*

Swiet. de cogn. morb. aph. 1480. — Rhachitis, du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 284.)

GENRE XI. Scorbute. — Lassitude, avec tuméfaction des gencives, évacuation de sang à la plus légère compression des gencives, haleine fétide, pâleur jaunâtre du visage, difficulté de respirer au moindre mouvement; taches sur la poitrine, sur les bras & sur les jambes, d'un jaune rougeâtre, souvent bleuâtre, livide ou noirâtre. (*Scorbutus*, — *Scorbutus*, Senn. tom. IV. pag. 504. — *Scorbutus*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 369. — *Scorbutus*, Boérh. van-Swiet de cogn. morb. aph. 1148.)

ESPECE I. Scorbute essentiel. — Scorbute de mer. (*Scorbutus*, Lind, *Traité du Scorbute*.)

ESPECE II. Scorbute des enfants. — Foiblesse des extrémités inférieures chez les enfants, avec douleur dans les muscles, petites duretés dans les téguments, inflammation & ulcération des gencives, ensuite affection & carie dans les os. (*Puzos, traité des accouchem.* pag. 300.)

## ORDRE SECOND.

ABOLITIONS du mouvement. (*Abolitiones motūs*.)

GENRE I. Atonie. — Défaut de contraction des fibres musculaires. (*Atonia*, — *Atonia*, Linn. gen. morb. gen. 120.)

ESPECE I. Paralysie musculaire des extrémités. — Précipitation de mouvement d'une des extrémités du corps, ou de plusieurs, sans perte de sentiment.

ESPECE II. Paralysie du membre viril. (*Paralysis membra virilis*, Plater. prax. med. tom. I. pag. 555. — *Aeternia*, Linn. gen. Morb. gen. 119.)

ESPECE III. Paralysie de l'œsophage, avec impossibilité d'avaler les solides, & difficulté d'avaler les fluides; sans éprouver aucune douleur. (*Difficultas deglutiendi à resolutione œsophagi*, Senn. tom. IV. pag. 367.)

GENRE II. Extinction de voix. (*Vox abolita*, Senn. tom. III. pag. 344.)

ESPECE I. Extinction de voix, pour avoir trop crié. (*Vox abolita à clamore nimio*, Senn. tom. III. pag. 344.)

ESPECE II. Extinction de voix par une toux violente & de longue durée.

ESPECE III. Extinction de voix par une humeur visqueuse. (*Brouzet*, Educ. med. des enfants. tom. II. pag. 233.)

GENRE III. Mutisme. — Impuissance de parler. (*Mutus aphonias*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 247. — *Mutisme*, Brouzet, Educ. med. des enfants. tom. II. pag. 246.)

ESPECE I. Mutisme de naissance, sans surdité. (*Brouzet*, Educ. med. des enfants. tom. II. pag. 247.)

ESPECE II. Mutisme par surdité de naissance. (*Institution des sourds & muets*.)

ESPECE III. Mutisme par abondance de sang. (*Aphonia ex sanguinis congectione ad fauces & linguam*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 248.)

ESPECE IV. Mutisme par des vers contenus dans les premières voies. (*Aphonia ex vermis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 248.)

ESPECE V. Mutisme par des humeurs séreuses. (*Aphonia ex serof. humorum stagnatione*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 248.)

ESPECE VI. Mutisme par paralyse de la langue. (*Aphonia ex paralysi linguae*, Fred. Hoffmann. tom. III. pag. 248. — *Brouzet, Educ. med. des enfants*, pag. 250.)

ESPECE VII. Mutisme par mauvaise conformation de la langue.

ESPECE VIII. Mutisme par privation de la langue.

## ORDRE TROISIEME.

### DIMINUTIONS du sentiment. (*Diminutiones sensus.*)

GENRE I. Diminution du goût. (*Læsus gustatus*, Senn. tom. III. pag. 252.)

GENRE II. *Anorexie*. — Diminution sensible d'appétit. (*Anorexia*. — *Anorexia seu appetentia dejecta*, Plater. prax. med. tom. I. pag. 495. — *Anorexia*, Senn. tom. IV. pag. 381.)

ESPECE I. Défaut d'appétit par abus immoderé de l'acte vénérien. (*Refrigeratio stomachi a nimio coitu*, Sanctor. med. stat. fact. VI. aph. 42.)

ESPECE II. Défaut d'appétit par l'excès des boissons spiritueuses, ou par les substances narcotiques. (*Appetitus defectus à stupore ventriculi*, Plater. tom. I. pag. 500.)

ESPECE III. Défaut d'appétit par les passions de l'âme. (*Inappetentia ab animi patetate*, Baglivi, pag. 149.)

ESPECE IV. Défaut d'appétit par des matières visqueuses contenues dans l'estomac. (*Inappetentia ab humoribus crassis & lentis in ventriculo*, Senn. tom. IV. pag. 381.)

ESPECE V. Défaut d'appétit par foiblesse d'estomac. (*Appetitus defectus imbecillitate ventriculi*, Plater. prax. med. tom. I. pag. 500.)

ESPECE VI. Défaut d'appétit par mauvaises digestions. (*Anorexia à faburra — Anorexia ob alimenti abundantiam*, Senn. tom. IV. pag. 382.)

ESPECE VII. Défaut d'appétit par abondance de bile dans l'estomac. (*Inappetentia à bile*, River. prax. med. pag. 128.)

GENRE III. Défaut d'appétit pour l'acte vénérien.

ESPECE I. Défaut d'appétit chez l'homme pour l'acte vénérien. (*Intemperies testium frigida*, Sennert. tome III. pag. 598.)

ESPECE II. Défaut d'appétit chez la femme pour l'acte vénérien.

ESPECE III. Défaut d'appétit pour l'acte vénérien, par diminution de sensibilité des parties naturelles.

GENRE IV. Diminution de l'odorat. (*Olfac̄tus depravatio.*)

ESPECE I. Diminution de l'odorat par abondance d'humeurs séreuses ou piquantes.

ESPECE II. Diminution de l'odorat par défaut de mucosités.

ESPECE III. Diminution de l'odorat par l'excès du tabac ou des odeurs fortes.

GENRE V. Diminution de l'ouie. (*Auditus depravatio.*)

ESPECE I. Difficulté de l'ouie par des humeurs séreuses. (*Difficultas auditus ex debitu serorum humorum ad aures*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 240.)

ESPECE II. Difficulté de l'ouie par mauvaise constitution des parties de l'oreille. (*Difficultas auditus à mala constitutione partium*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 240.)

ESPECE III. Difficulté de l'ouie par l'abondance & la grande viscosité de la matière cérumineuse.

ESPECE IV. Difficulté de l'ouie par abondance du sang, avec tintement.

ESPECE V. Difficulté de l'ouie par vieillesse.

ESPECE VI. Diminution de l'ouie par l'effet des sons trop violents.

GENRE VI. Foibleffe de la vue. — Vue confuse sans opacité sensible de la cornée, ou à la pupille. (*Visus debilitas*, Senn. tom. III. pag. 225.)

ESPECE I. Foibleffe de la vue par excès de l'acte vénérien. (*Laz̄o oculorum à coitu immoderato*, Sandor. med. Stat. Sect. VI. aph. 19.)

ESPECE II. Foibleffe de la vue par lésion des nerfs optiques. (*Visus affecta à spirituum opticorum viiiis*, Senn. tom. III. pag. 222.)

ESPECE III. *Vue nocturne, Nyctalopie.* — Vue distincte pendant la nuit & foible pendant le jour. (*Nyctalopia*, Boérh. de morb. oculi.)

ESPECE IV. *Vue obtuse.* — Vue foible à quelque distance que soit l'objet. (*Visus obtusus*, Boérh. de morb. oculi.)

ESPECE V. *Vue courte, Myopie.* — Vue distincte lorsque l'objet est très-proche, & confuse lorsqu'il est un peu éloigné. (*Myopia*, Boérh. de morb. oculi.)

ESPECE VI. *Presbytie.* — Vue distincte lorsque l'objet est éloigné & confuse lorsqu'il est proche. (*Presbyopia*, Boérh. de morb. oculi.)

ESPECE VII. Vue foible pendant le jour, & entièrement abolie à l'aproche de la nuit. (*Visus diurnus, seu hemeralopia*, Boérh. de morb. oculi.)

ESPECE VIII. Foibleffe de la vue par défaut, ou par diminution de l'humeur aqueuse. (*Visus imminutio ob defectum humoris aquaei*, Senn. tom. III. pag. 221.)

ESPECE IX. Foibleffe de la vue par une trop longue & trop conilante application des yeux.

ESPECE X. Foibleffe de la vue par une lumière trop vive.

ESPECE XI. Foibleffe de la vue par vieillesse.

## ORDRE QUATRIEME.

ABOLITIONS du sentiment. (*Abolitiones sensus.*)

GENRE I. Privation absolue d'appétit.

ESPECE I. Privation absolue d'appétit pour les aliments solides, souvent avec répugnance.

ESPECE II. Privation absolue d'appétit pour la boisson, souvent avec répugnance. (*Aposia*, *Plater. prax. med. tom. I.* pag. 496. — *Situs deficiens*, *Senn. tom. III.* pag. 394.)GENRE II. Privation entière du goût. (*Abolito gustus*, *Senn. tom. III.* pag. 252.)GENRE III. *Impuissance*. — Impossibilité d'engendrer par privation de sensibilité dans les parties de la génération. (*Impotencia*. — *Veneri actus defectus*, *Plater. prax. med. tom. I.* pag. 553.)

ESPECE I. Insensibilité des parties de la génération de l'homme, par foibleté.

ESPECE II. Insensibilité des parties de la génération de l'homme, par défaut de semence.

ESPECE III. Insensibilité des parties de la génération de l'homme, par mauvaise qualité de la semence.

ESPECE IV. Insensibilité de l'homme pour la génération, par une vitieuse évacuation de semence, provenant d'une mauvaise conformation du canal de l'urethre, ou des autres parties de la génération.

ESPECE V. Insensibilité des parties naturelles de la femme. (*Venus extincta in mulieribus*, *Plater. prax. med. tom. I.* pag. 554.)

ESPECE VI. Insensibilité des parties naturelles de la femme, par une structure vitieuse.

GENRE IV. *Surdité*. — Privation de l'impression des sons. (*Surditas*. — *Surditas*, *Senn. tom. III.* pag. 238. — *Surditas in acutis*, *Bagliyi, prax. med. p. 69*)ESPECE I. Surdité de naissance. (*Surditas nativa ex mala organi auditorii conformatio-*ne, *Fred. Hoffm. tom. III.* pag. 240.)ESPECE II. Surdité catarrhal. (*Surditas catarrhalis*, *Fred. Hoffm. tom. III.* pag. 241. 243.)ESPECE III. Surdité par des excroissances dans le conduit de l'oreille. (*Surditas à tuberculis in meatus auditorio.*)ESPECE IV. Surdité par l'introduction des corps étrangers dans le conduit de l'oreille. (*Surditas obstrunctione à rebus externis*, *Senn. tom. III.* pag. 239.)ESPECE V. Surdité par l'obstruction du conduit d'Eustache. (*Surditas ab obstrunctione ductus Eustachiani*, *Tulpi*, *obser. med. pag. 67.* — *Fred. Hoffm. tom. III.* pag. 240.)ESPECE VI. Surdité par l'action violente des corps extérieurs. (*Surditas percussione corporum exteriorum*, *Fred. Hoffm. tom. III.* pag. 240.)

## VI. CLASSE, ORDRE VI.

71

ESPECE VII. Surdité par l'action de l'air trop froid, pendant l'usage des frictions mercurielles. (*Auditus abolitus à cura mercuriali male tractatus*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 246.)

GENRE V. Goutte sereine. — Privation entière de la vue sans opacité sensible dans la pupille, & avec immobilité des bords internes de l'iris. (*Gutta serena*. — *Amaurosis*, Boërh. de morb. oculi. — *Gutta serena*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 228. — *Goutte sereine parfaite*, S. Yves, malad. des yeux, pag. 262.)

ESPECE I. Goutte sereine par pléthore. (*Gutta serena à sanguinis stagnatione*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 230.)

ESPECE II. Goutte sereine à la suite d'un coup. (*Amaurosis traumatica*, Boërh. de morb. oculi.)

ESPECE III. Goutte sereine à la suite des maladies aigues. (S. Yves, malad. des yeux, pag. 264.)

ESPECE IV. Goutte sereine vénérienne. (*Amaurosis venerea*, Boërh. de morb. oculi.)

ESPECE V. Goutte sereine par suppression du pourpre. (*Gutta serena ex suppressa pura*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 232.)

## ORDRE CINQUIEME.

### DIMINUTIONS du sentiment & du mouvement.

GENRE I. Syncope. — Subite diminution des forces vitales, sans existence sensible du pouls, & de la faculté de connoître. (*Syncope*. — *Syncope*, Plater. prax. med. tom. I. pag. 470.)

ESPECE I. Syncope violente & de longue durée par le froid. (*Asphyxia congelatorum*, Sauvag. Nof. math. tom. I. pag. 817.)

ESPECE II. Syncope violente des noyés. (*Asphyxia submersorum*.)

ESPECE III. Syncope violente par la vapeur du charbon. (*Observ. de med. d'Edim.* tom. VI. pag. 177.)

ESPECE IV. Syncope violente par la passion hystérique. (*Asphyxia hysterica*. — *Suffocatio uteri*, Senn. tom. IV. pag. 686.)

ESPECE V. Syncope violente par des vapeurs souterraines. (*Asphyxia à vaporibus terra*.)

ESPECE VI. Mort apparente de l'enfant nouveau né. (*Foibleffe de l'enfant qui vient de naître*, Levret, art. des acc. pag. 227.)

ESPECE VII. Syncope violente par les vapeurs qui s'élèvent pendant la fermentation vineuse.

ESPECE VIII. Syncope par les vapeurs qui s'élèvent des fosses d'aïance.

ESPECE IX. Syncope par les passions de l'âme. (*Syncope ab animi affectibus*, Plater. prax. med. tom. I. pag. 474. — *Syncope ab animi affectibus*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 270.)

ESPECE X. Syncope par des évacuations trop abondantes. (*Syncope à nimis evacuationibus*, Plater. prax. med. tom. I. pag. 473. — *Syncope ab hemorrhagis & alii nimis excretionibus*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 271.)

72 VI. CLASSE, ORDRE V.

ESPECE XI. Syncope des femmes grosses. (*Burton, Syst. des Accouch. tom. I. p. 245.*)

ESPECE XII. Syncope par des obstacles dans le cœur. (*Senac, Traité du cœur, tom. II. pag. 533.*)

ESPECE XIII. Syncope par l'abondance du sang. (*Syncope plethorica. — Syncope par la plénitude, Senac, traité du cœur, tom. II. pag. 540.*)

ESPECE XIV. Syncope par émétiques, purgatifs, ou poisons. (*Syncope à venenis, purgantibus, & emeticis, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 271.*)

ESPECE XV. Syncopé par la gangrene. (*Syncope à sphacelosa in partibus vel externis, vel internis corruptione, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 271.*)

GENRE II. *Défaillance.* — Diminution subite & de peu de durée, des forces vitales & musculaires, avec respiration & pulsation du cœur peu sensibles : sans perdre la faculté de connoître. (*Vitalis motus defectus, Plater. prax. med. tom. I. pag. 467. — Virium lapsus, & animi deliquum, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 267.*)

GENRE III. *Lipothymie.* — Diminution subite & de courte durée, des forces vitales, avec pulsation peu sensible, & perte de la faculté de connoître. (*Lipothymia, Animi deliquum. — Lipothymia, Plater. prax. med. tom. I. pag. 470. — Lipothymia, Morgagni, de sedib. morb. tom. I. pag. 266.*)

GENRE IV. Sommeil apparent, avec insomnie & délire. (*Coma vigil. — Coma vigil, Senn. tom. III. pag. 119. — Coma vigil, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 209.*)

GENRE V. *Affouissement comateux.* — Etat approchant du sommeil, de longue durée, sans fièvre, sans délire, qui laisse la faculté de répondre aux questions, d'ouvrir les yeux & de changer de place à chaque irritation faite au malade. (*Coma somnolentum. — Coma somnolentum, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 210.*)

GENRE VI. *Somnolente.* — Sommeil de plus longue durée que la veille. (*Somnolentia. — Sopor vigiliis protractior, Linn. gen. morb. gen. 96.*)

GENRE VII. *Affouissement carotique.* — Sommeil profond avec perte presque entière du sentiment & du mouvement, & respiration tranquille. (*Carus. — Carus, Senn. tom. III. pag. 170. — Carus, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 210. — Carus, Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aph. 1045.*)

ESPECE I. Affouissement carotique par pléthora. (*Carus à plethora.*)

ESPECE II. Affouissement carotique, avec fièvre aiguë. (*Carus acutis febribus socius, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 210.*)

ESPECE III. *Coup de soleil.* — Affouissement carotique par le soleil. (*Carus ab insolatione, Sauvag. Nofol. meth. tom. I. pag. 842.*)

ESPECE IV. Affouissement carotique par des substances vénéneuses. (*Carus à veneno, Senn. tom. III. pag. 170.*)

ESPECE V.

*VI. CLASSE, ORDRE V.* 73

ESPECE V. Assoupissement catotique par les vers. (*Carus à vermis*, Senn. tom. III. pag. 170.)

ESPECE VI. Assoupissement catotique par des humeurs pituitées, ou séreuses. (*Carus à serosa colluvie*, Carol. Pif. de morb. à colluv. serof. pag. 81.)

GENRE VIII. *Extase vaporeuse*. — Suspension de l'action des sens; pouls & respiration peu sensibles; flexibilité plus ou moins grande des membres, sans prendre ni retenir la situation qu'on veut leur donner. (*Extasis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 46.)

GENRE IX. *Apoplexie*. — Subite abolition des sens, avec apparence d'un sommeil très profond, respiration flétrissante, & relâchement des muscles des extrémités. (*Apoplexia*. — *Apoplexia*, Senn. tom. III. pag. 171. — *Apoplexia*, Boërh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 1007. — *Apoplexia*, Baglivi, pag. 111. — *Apoplexia in universum*, Morgagni, de sedib. morb. tom. I. pag. 10. — *Apoplexia*, Morgagni, de sedib. morb. tom. II. pag. 401. — *Apoplexia*, Wepfer.)

ESPECE I. Apoplexie pituiteuse. (*Apoplexia pituitosa*, Senn. tom. III. pag. 172. — *Apoplexia glutinosa*, Morgagni, de sedib. morb. tom. I. pag. 37.)

ESPECE II. Apoplexie séreuse. (*Apoplexia foris*, Carol. Pif. de morb. à colluvie serosa, pag. 103. — *Apoplexia serosa*, Morgagni, de sedib. morb. tom. I. pag. 26.)

ESPECE III. Apoplexie laiteuse. (*Levret*, art des accouchem. pag. 159.)

ESPECE IV. Apoplexie sanguine. (*Apoplexia sanguinea*. — *Apoplexia à phlegmone diatheri cum sanguinis copia*, Senn. tom. III. pag. 172. — *Apoplexia à sanguine*, Morgagni, de sedib. morb. tom. I. pag. 11 & 12.)

ESPECE V. Apoplexie légère & sanguine. (*Apoplexia levis à pleniora*.)

ESPECE VI. Apoplexie légère & séreuse. (*Apoplexia levis à serosa colluvie*, Carol. Pif. de morb. à coll. serof. pag. 99.)

GENRE X. *Léthargie*. — Assoupissement profond & considérable; avec ouverture subite & passagère des yeux, à la suite de quelqu'irritation faite au malade; faculté de répondre aux vives interrogations, délire, & ensuite oubli de tout ce qui s'est passé. (*Lethargus*. — *Lethargus*, Senn. tom. III. pag. 121. — *Lethargus*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 210.)

ESPECE I. Léthargie pituiteuse. (*Lethargus à pituita*, Carol. Pif. de morb. à coll. serof. pag. 109.)

ESPECE II. Léthargie goutteuse & périodique. (*Lethargus periodice repetens*, Carol. Pif. de morb. à colluv. serosa, pag. 105.)

ESPECE III. Léthargie des gens de lettres. (*Lethargus litteratorum*, van Swiet. comment. in Boërh. aph. 1010. pag. 263.)

GENRE XI. *Commotion de l'épine*. — Diminution du sentiment & du mouvement par commotion, à la suite d'un coup, ou d'une chute. (*Du Verney*, malad. des os, tom. II. pag. 113.)

## ORDRE SIXIÈME.

**ABOLITIONS** du sentiment, ou du mouvement des muscles extérieurs, ou à la fois du sentiment & du mouvement.

**GENRE I.** *Gangrene.* — Abolition du sentiment, de la chaleur, & souvent du mouvement d'une partie du corps, avec lividité ou noirceur de cette partie. (*Gangrana*. — *Gangræna*, Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aph. 419. & 457. — *Gangrene*, Quesnay, trait. de la gangrene.)

ESPECE I. Gangrene humide par inflammation. (Quesnay, trait. de la gangrene, p. 216.)

ESPECE II. Gangrene humide par pourriture (Quesnay, trait. de la gangrene, p. 308.)

ESPECE III. Gangrene humide par froid excessif. (Quesnay, trait. de la gangr. p. 291.)

ESPECE IV. Gangrene humide par brûlure. (Quesnay, trait. de la gangr. pag. 278.)

ESPECE V. Gangrene humide par morsure de bêtes vénimeuses. Quesnay, trait. de la gangr. pag. 184.)

ESPECE VI. Gangrene humide par étranglement. (Quesnay, trait. de la gangr. p. 86.)

ESPECE VII. Gangrene humide par contusion. (Quesnay, trait. de la gangr. p. 15.)

ESPECE VIII. Gangrene humide par infiltration. (Quesnay, trait. de la gangr. p. 68.)

ESPECE IX. *Gangrene de la matrice.* — Abolition subite d'une douleur & d'une chaleur excessives de la matrice, avec abattement des forces vitales & anxiété. (*Gangræna uteri*, Senn. tom. IV. pag. 632.)

ESPECE X. Gangrene des parties de l'arrière-bouche. (*Angina gangrenosa*, Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 816.)

**GENRE II.** *Gangrene seche.* — Abolition du sentiment, du mouvement & de la chaleur d'une partie du corps, avec noirceur & secheresse de cette partie. (*Gangrana secca*. — *Gangrene seche*, Quesnay, traité de la gangr. pag. 319. — *Gangræna secca*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 342.)

ESPECE I. Gangrene seche par le seigle ergoté. (Quesnay, trait. de la gangr. pag. 355.)

ESPECE II. *Escharre.* — Gangrene seche par l'action du cautère potentiel. (*Eschara crux à medicamentis adseribus*, Platner, infl. chir. pag. 602. fecl. 928.)

ESPECE III. Gangrene seche par la goutte. (Quesnay, trait. de la gangr. pag. 366.)

ESPECE IV. Gangrene seche par dépôt critique à la suite des maladies aiguës. (Quesnay, trait. de la gangr. pag. 368.)

**GENRE III.** *Paralyse.* — Abolition du mouvement, ou du sentiment, ou à la fois du mouvement & du sentiment. (*Paralysis*. — *Paralysie*, Senn.

*VI. CLASSE, ORDRE VI.* 75

tom. III. pag. 135. — *Paralyse*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 195. — *Paralyse*, Boëth. van- Swiet. de cogn. morb. aph. 1057. — *Paralyse*, Morgagni, de sed. morb. tom. I. pag. 82.)

ESPECE I. Paralysie pituiteuse. (*Paralyse à pituita*, Plater. prax. med. pag. 293. — *Paralyse pituitosa*, Senn. tom. III. pag. 136.)

ESPECE II. Paralysie à la suite de l'apoplexie. (*Paralyse ab apoplexia levi à ferosa colluvie*, Carol. Pif. de morb. à colluv. ferosa, pag. 102.)

ESPECE III. Paralysie par virus vénérien. (*Paralyse à viru venereo*. — *Paralyse vénérienne*, Mém. de l'Acad. de chir. tom. IV. in-4<sup>o</sup>. pag. 141.)

ESPECE IV. Paralysie par l'action du plomb, ou de ses préparations. (*Paralyse à plumbo vel ejus preparationibus*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 203.)

ESPECE V. Paralysie par le scorbut. (*Paralyse scorbutica*, Senn. tom. III. pag. 136.)

ESPECE VI. Paralysie par l'action du froid. (*Paralyse ob contactus diuturnum rei frigidæ*, Senn. tom. III. pag. 136.)

ESPECE VII. Paralysie par suppression d'une évacuation devenue nécessaire. (*Paralyse ab imminentio hemorrhoidum fluxu*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 205.)

ESPECE VIII. Paralysie par l'action du mercure. (*Paralyse à mercurio*.)

ESPECE IX. Paralysie par solution d'un nerf. (*Paralyse à soluta nervi unitate*, Senn. tom. III. pag. 136.)

ESPECE X. Paralysie par compression sensible d'un nerf. (*Paralyse à nervorum compressione*, Plater. prax. med. tom. I. pag. 296.)

ESPECE XI. Paralysie par une chute, ou par un coup violent, sans aucune solution de continuité apparente. (*Paralyse à commotione*.)

GENRE IV. Privation momentanée du sentiment & du mouvement de l'œil.  
(*Scotomia*, Linn. gen. morb. gen. III.)

GENRE V. *Hemiplegie*. — Abolition, ou du mouvement, ou du sentiment de la moitié du corps, ou à la fois du sentiment & du mouvement.  
(*Hemiplegia*. — *Hemiplegia*, Plater. prax. med. tom. I. pag. 284.)

GENRE VI. Impuissance de mouvoir le globe de l'œil, & d'appercevoit la lumiere. (*Paralyse oculorum*, Alexand. Trall. de arte med. tom. I. pag. 80.)

