

SEPTIEME CLASSE.
MALADIES ÉVACUATOIRES.
EVACUATIONS.

ORDRE PREMIER.

DIMINUTIONS des parties charnues & graisseuses du corps, ou d'une partie du corps, par évacuation insensible.

GENRE I. *Atrophie.* — Amaigrissement de tout le corps, avec affaiblissement des forces musculaires, sans fièvre & sans expectoration. (*Atrophia*. — *Atrophia*, Morton, tom. I. pag. 1. — *Atrophia*, Benet. *Theatrum tabidor.*)

ESPECE I. *Atrophie nerveuse.* — Maigreur de tout le corps, avec défaut d'appétit, mauvaise digestion, sans fièvre, sans toux & sans expectoration. (*Atrophia seu phthisis nervosa*, Morton, tom. I. pag. 2.)

ESPECE II. Maigreur par des tumeurs scrophuleuses dans le mésentere, sans fièvre. (*Tabes à tumoribus scrophulosis in mesenterio*, Morton, tom. I. pag. 24.)

ESPECE III. Atrophie des Enfants par des médicaments mal indiqués. (*Atrophia infantum à pervertis medicamentis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 486.)

ESPECE IV. Atrophie scorbutique. (*Atrophia scorbutica*, Senn, tom. IV. pag. 524.)

ESPECE V. Atrophie des Enfants par la mauvaise qualité des humeurs des Parents ou des Nourrices. (*Atrophia ab impura humorum parentum aut nutritiæ dyscrasia*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 486.)

ESPECE VI. Atrophie des Enfants par malpropreté. (*Atrophia infantum à foeciditate*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 486.)

ESPECE VII. Atrophie des Enfants par les vers. (*Atrophia à vermis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 486.)

ESPECE VIII. Atrophie des Enfants, après qu'ils ont cessé de téter, avec continual appetit. (*Atrophia infantum post ablactationem*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 487.)

ESPECE IX. Atrophie des Enfants par le froid. (*Atrophia infantum, à refrigerationibus*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 486.)

ESPECE X. Atrophie des Enfants, par des aliments de mauvaise qualité. (*Atrophia infantum ab incongruis cibis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 486.)

GENRE II. Amaigrissement de tout le corps, sans fièvre, sans douleur, sans expectoration & sans affaiblissement considérable des forces musculaires. (*Macilenta*, seu *Macror*, Plater. *Prax. Med.* tom. III. pag. 472.)

VII. CLASSE, ORDRE II. 77

ESPECE I. Maigreur des Enfants par jalouzie. (*Brouzet, malad. des enfants, tom. II.*
pag. 311.)

ESPECE II. Amaigrissement des Vieillards. (*Macror Senium, Plater. Prax. medie.*
tom. III. pag. 474.)

ESPECE III. Amaigrissement de tout le corps par virus vénérien. (*Atrophia à virus*
veneroso, Ajruc. de morb. vener. tom. I. pag. 427.)

GENRE III. Aridure. — Partie du corps plus maigre & moins sensible que
les autres. (*Aridura, Linn. gen. morb. gen. 226.*)

ESPECE I. Atrophie d'un membre à la suite d'une fracture. (*Tabes membra à frac-*
tura, Heist. Inst. chirurg. tom. I. pag. 187.)

GENRE IV. Étise. — Maigreur de tout le corps, avec fièvre lente, sans
toux, ni crachement de pus. (*Tabes. — Tabes, Plater. Prax. med. tom. III.*
pag. 473.)

ESPECE I. Étise par inanition. — Maigreur de tout le corps par inanition. (*Tabes*
a depauperatione sanguinis per succi nutritii præternaturalem subtractionem ora, Morton,
tom. I. pag. 5.)

ESPECE II. Étise par hydropisie. — Amaigrissement de tout le corps par hydropisie.
(*Tabes ab hydrope, Morton, tom. I. pag. 19.*)

GENRE V. Déséchement ou maigreur extrême d'un doigt, avec douleur
périodique très-vive. (*Digitum, Linn. gen. morb. gen. 227.*)

ORDRE SECOND.

ÉVACUATIONS d'air plus ou moins chargé de parties hétérogènes.

GENRE I. Rapports. — Évacuation par la bouche, de l'air contenu dans
l'estomac. (*Ructatio. — Ructatio, Senn. tom. IV. pag. 402.*)

ESPECE I. Rapports n'ayant ni odeur ni saveur. (*Ructatio insignem nullam quali-*
tatem præferens, Senn. tom. IV. pag. 402.)

ESPECE II. Rapports approchant de l'odeur & de la saveur des aliments qu'on vient
de manger. (*Ructatio cibi assumpit qualitatem præferens, Senn. tom. IV.*
pag. 402.)

ESPECE III. Rapports acides. (*Ructatio acida, Senn. tom. IV. pag. 402.*)

ESPECE IV. Rapports niodoreux. (*Ructatio nidorosa, Senn. tom. IV. pag. 402.*)

GENRE II. Rot. — Expulsion sonore par la bouche, de l'air contenu dans
l'estomach. (*Rotus. — Rotus, Plater. Prax. med. tom. I. pag. 397.*)

ESPECE I. Rot par un excès d'aliments.

ESPECE II. Rot par des aliments de mauvaise qualité.

ESPECE III. Rot par affection hypocondriaque ou hystérique.

GENRE III. Nausées. — Efforts inutiles pour vomir, accompagnés de mouvements spasmodiques de l'estomac & de l'œsophage, avec expulsion d'air contenu dans l'estomac, & quelquefois évacuation de matières muqueuses. (*Nausea*. — *Nausea*, Senn. tom. IV. pag. 402. — *Nausea*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 133.)

ESPECE I. Nausées sans autre évacuation sensible que celle de l'air.

ESPECE II. Nausées avec évacuation d'une petite quantité de matières muqueuses & insipides.

ESPECE III. Nausées bilieuses.

ESPECE IV. Nausées avec évacuation d'une petite quantité de matières visqueuses & acides.

ESPECE V. Nausées des Femmes grosses. (*Levret, art des acc.* pag. 207.)

ESPECE VI. Nausées par le mouvement d'un navire.

GENRE IV. Expulsion d'un air fétide par les narines, sans ulcere. (*Fetor narium*, Plater. prax. med. tom. III. pag. 583.)

GENRE V. Haleine fétide. — Expulsion d'un air fétide par la bouche. (*Fetor oris, seu anhelitus fetidus*, Plater. prax. med. tom. III. pag. 583.)

ESPECE I. Haleine fétide de naissance.

ESPECE II. Haleine fétide, par malpropreté des dents & des gencives.

GENRE VI. Pet. — Expulsion d'un air fétide par l'anus, avec bruit ou sans bruit. (*Peditum. — Crepitus ventris*. Plater. prax. med. tom. III. pag. 583.)

GENRE VII. Expulsion d'air par le vagin, avec bruit.

GENRE VIII. Exhalaisons fétides de la surface du corps.

ESPECE I. Exhalaisons fétides des pieds & des aisselles.

ESPECE II. Exhalaisons fétides des téguments des rousseaux.

ORDRE TROISIEME.

ÉVACUATIONS de substances solides.

GENRE I. Expulsion de substances solides par le canal de l'urethre, avec plus ou moins d'urine.

VII. CLASSE, ORDRE. III. 79

ESPECE I. Expulsion de petits calculs par le canal de l'urethre, avec plus ou moins de douleur.

ESPECE II. Expulsion par le canal de l'urethre, d'une matière sablonneuse mêlée avec l'urine.

GENRE II. Expulsion par l'anus, de substances d'une consistance semblable à celle de la pierre, avec les matières fécales, ou sans les matières fécales.

ESPECE I. Expulsion de calculs hépatiques. (*Calculi bilioſi, Morgagni, de ſed. morb. tom. II. pag. 73.*)

ESPECE II. Expulsion de calculs intestinaux. (*Intefinorum calculi, Morgagni, de ſed. morb. tom. II. pag. 88 & 90.*)

GENRE III. Expectoration de substances d'une consistance semblable à celle de la pierre, ordinairement accompagnée de pus. (*Expeſoratio calculatorum, Morgagni, de ſedibus morb. tom. I. pag. 134.*)

GENRE IV. Vomissement de calculs. (*Vomitus calculatorum, Morgagni, de ſedibus morb. tom. II. pag. 88.*)

GENRE V. Evacuation de calculs contenus dans l'ombilic. (*Lapides in umbilico, Senn. tom. IV. pag. 619.*)

GENRE VI. Carie. — Altération de l'os, avec changement de couleur, inégalités à sa surface, exfoliation, mollesse & fragilité. (*Caries. — Caries, Heijster. Inſlit. Chirurg. tom. I. pag. 369. — Carie, Du Verney, Malad. des os, tom. II. pag. 401.*)

ESPECE I. Carie scorbutique. (*Lind. Traité du scorbut. tom. I. pag. 220. — Carie scorbutique, Du Verney, Malad. des os, tom. II. pag. 406.*)

ESPECE II. Carie des dents. (*Dentium caries, Senn. tom. III. pag. 261.*)

ESPECE III. Carie scrophuleuse. (*Du Verney, Malad. des os, tom. II. pag. 407.*)

ESPECE IV. Carie des os par virus vénérien. (*Caries effum venerea, Afruc de morb. venereis. tom. I. pag. 507.*)

ESPECE V. Carie par inflammation du périoste interne. (*Du Verney, Malad. des os, tom. I. pag. 96.*)

ESPECE VI. Carie par inflammation du périoste externe. (*Du Verney, Malad. des os, tom. I. pag. 97.*)

GENRE VII. Ramollissement des os.

ESPECE I. Ramollissement des os par virus vénérien. (*Oſteofarcifis, Afruc de morb. venereis, tom. I. pag. 418.*)

GENRE VIII. Chute des dents. (*Dentium casus, Senn. tom. III. pag. 263.*)

GENRE IX. Diminution des dents par le frottement. (*Dentium imminutio, Senn. tom. III. pag. 262.*)

80 VII. CLASSE, ORDRE IV.

GENRE X. *Carte du cartilage*. — Altération des cartilages, avec exfoliation & suintement d'une humeur ichoreuse.

GENRE XI. Expulsion du Crystallin hors du globe de l'œil, par une ouverture au globe de l'œil.

ESPECE I. Expulsion du crystallin par plaie pénétrante dans le globe de l'œil.

ESPECE II. Expulsion du crystallin par ulcere pénétrant dans le globe de l'œil.

GENRE XII. Poussière écailluse sur les téguments de la partie chevelue de la tête, avec démangeaison. (*Furfuratio capitis*. *Senn. tom. V.* pag. 186.)

ORDRE QUATRIEME.

ÉVACUATIONS de corps organisés.

GENRE I. Accouchement. — Évacuation d'un, ou de plusieurs fœtus, au bout de neuf mois. (*Partus*. — *Accouchement*, *Smellie*, traité des accouch. tom. I. pag. 180. — *Levret. art des accouch.* pag. 80.)

ESPECE I. Accouchement naturel. — Évacuation d'un fœtus sans le secours de l'Art, au bout de neuf mois. (*Levret, art des accouch.* pag. 80.)

ESPECE II. Accouchement précipité. (*Levret, art des accouch.* pag. 100.)

ESPECE III. Passage du fœtus dans le bas ventre, par la rupture de la matrice dans les douleurs de l'accouchement. (*Crantz*, pag. 395. *de Part des accouch. de Puys*. — *Évacuation du fœtus par des voies extraordinaires*, *Smellie*, tom. II. pag. 191.)

ESPECE IV. Accouchement naturel de deux ou trois fœtus. (*Partus gemellarum*, *Roeder. elem. art. obſt.* pag. 320. — *Accouchemens des jumeaux*, *Smellie*, trait. des accouch. tom. I. pag. 390.)

GENRE II. Evacuation de l'arrière-faix. (*Solutio placenta*, *Roeder. Elem. art. obſt.* pag. 178. — *Maniere de délivrer le placenta*, *Smellie*, traité des accouch. tom. I. pag. 242.)

ESPECE I. Évacuation naturelle de l'arrière-faix. (*Expulſio placenta sine manus immiſſione*, *Roeder. elem. art. obſt.* pag. 180.)

ESPECE II. Évacuation du placenta, avant la sortie du fœtus.

GENRE III. Avortement. — Sortie du fœtus avant le terme de neuf mois. (*Abortus*. — *Abortus*, *Roeder. elem. art. obſt.* pag. 326. — *Avortement*, *Smellie*, trait. des accouch. tome I. pag. 124.)

ESPECE I. Avortement par convulsions. (*Convulſio uteri, sive abortus*, *Fred. Hoffm. tom. III.* pag. 176.)

ESPECE II.

VII. CLASSE, ORDRE IV. 81

ESPECE II. Avortement par efforts, chutes, coups violents, ou trop grands exercices. (*Abortus ab externis violentiis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 179.)

ESPECE III. Avortement par violentes passions de l'ame. (*Abortus ab animi passionibus*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 179.)

ESPECE IV. Avortement par trop de sang. (*Abortus à nimia sanguinis abundantia*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 179.)

ESPECE V. Avortement par défaut de sang. (*Abortus à defectu sanguinis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 179.)

ESPECE VI. Avortement par violents remedes. (*Abortus à fortioribus emmenagogis, purgantibus, emeticis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 179.)

ESPECE VII. Avortement par une toux violente, ou par des mouvements convulsifs. (*Abortus a tussi ferina ac convulsiva, necnon ab omnibus convulsivis morbis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 179.)

ESPECE VIII. Avortement par une perte blanche. (*Abortus à fluore albo*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 179.)

ESPECE IX. Avortement par une abondante boisson de vin ou de liqueurs. (*Abortus à vino*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 179.)

GENRE IV. Évacuation d'une mole. (*Exclusio molæ*, Roeder. elem. art. obflet. pag. 337. — *Faux germe, ou mole*, Smelie, trait. des accouch. pag. 126.)

GENRE V. Chute des ongles. (*Unguium casus*. Senn. tom. V. pag. 93.)

ESPECE I. Chute des ongles par blessure, ou par contusion.

ESPECE II. Chute des ongles par virus vénérien.

ESPECE III. Chute des ongles par un abcès.

GENRE VI. Alopécie. — Chute des poils. (*Alopecia*. — *Alopecia*, Alexander Trallianus, de art. med. pag. 1 & 4. — *Pilorum defluvium*. Senn. tom. V. pag. 83.)

ESPECE I. Chute des poils, avec entortillement, & avec excoriation de la peau vers leur racine. (*Ophiasis*, Senn. tom. V. pag. 83.)

ESPECE II. Alopécie naturelle. — Chute des poils sans cause évidente.

ESPECE III. Chute des poils par des maladies longues ou aiguës. (*Pilorum defluvium à morbis*, Senn. tom. V. pag. 83.)

ESPECE IV. Chute des poils par virus vénérien. (*Pilorum defluvium a lue venerea*. Senn. tom. V. pag. 83.)

ESPECE V. Chute des cheveux par des especes de poux. (*Tinea capillorum*. Senn. tom. V. pag. 84.)

ESPECE VI. Chute des cheveux depuis le front jusqu'au sommet de la tête par vieillisse. (*Calvities à senectute*, Plat. prax. med. tom. III. pag. 9.)

ORDRE CINQUIEME.

ÉVACUATIONS de matières plus ou moins fluides, blanchâtres, souvent jaunâtres ou noirâtres, ou d'un jaune verdâtre.

GENRE I. *Ulcere*. — Solution de continuité, avec évacuation de matières plus ou moins fluides & blanchâtres. (*Ulcus*. — *Ulcus*, *Heister*. *Inst. chir.* tom. I. pag. 347. — *Ulcus*, *Platner*. *inst. chir.* pag. 369. — *Ulcera*, *Morgagni* de *sed. morb.* tom. II. pag. 333.)

ESPECE I. *Ulcere benin.* (*Ulcus simplex*, *Senn*, tom. V. pag. 56. — *Ulcus benignum*, *Heijer*. *Inst. chir.* tom. I. pag. 348.)

ESPECE II. *Ulcere vénérien.* (*Ulcus venereum*. — *Ulcera venerea*, *Astruc de morbe vener.* tom. I. pag. 409 & 412. — *Ulcera venerea*, *Heij. inst. chirurg.* tom. I. pag. 361.)

ESPECE III. *Ulcere dartreux.*

ESPECE IV. *Ulcere ferophuleux.*

ESPECE V. *Ulcere scorbutique.* (*Lind*, *Traité du scorbut*, tom. I. pag. 204.)

ESPECE VI. *Ulcere vermineux.* (*Ulcus verminosum*, *Senn*, tom. V. pag. 64.)

ESPECE VII. *Ulcere galeux.*

ESPECE VIII. *Ulcere putride.* (*Ulcus sordidum putridum & corroditum*, *Senn*, tom. V. pag. 60. — *Ulcus putridum*, *Heijer*. *inst. chir.* tom. I. pag. 360.)

ESPECE IX. *Ulcere phagédénique.* (*Phagedana*, *Senn*, tom. V. pag. 66. — *Ulcus malignum*, *Heij. inst. chir.* tom. I. pag. 356.)

ESPECE X. *Ulcere Calleux.* (*Ulcus callosum*, *Heijer*. *inst. chirurg.* tom. I. pag. 363.)

ESPECE XI. *Ulcere ancien des jambes.* (*Ulcus chironium*, *Celsus*, pag. 322. — *Ulcera tibiarum*, *Senn*, tom. V. pag. 67. — *Ulcera antiqua præseritum in cruribus*, *Heij. inst. chir.* tom. I. pag. 366.)

ESPECE XII. *Ulceres aux pieds ou aux mains, par le froid.* (*Ulcera ex frigore in pedibus & manibus*, *Celsus*, pag. 323.)

GENRE II. *Ulcere cancéreux.* — *Ulcere très-dououreux, avec bords renversés, vaisseaux variqueux, évacuation d'une humeur fânieuse.* (*Cancer ulceratus*, *Boërh. van-Swiet. de cogn. morb. aph.* 498.)

ESPECE I. *Cancer des paupières.* (*S. Yves*, *malad. des yeux.*)

ESPECE II. *Ulcere cancéreux par virus vénérien.*

ESPECE III. *Cancer à la peau.* — *Ulcere cancéreux des teguments.* (*Mémoires de l'Acad. de Chirurg.* tom. III. in-4 pag. 3.)

GENRE III. *Ulcere du tendon.*

GENRE IV. Ulcere de la matrice.

ESPECE I. Ulcere simple de la matrice, ou du col de la matrice. (*Ulcus simplex cervicis uteri*, Senn. tom. IV. pag. 629. — *Ulcere simple de la matrice*, Pujos, trait. des accouch. pag. 258.)

ESPECE II. Ulcere fongeux de l'utérus, ou du col de l'utérus. (*Ulcus malignum cervicis uteri*, Senn. tom. IV. pag. 629. — *Ulcere fongueux de la matrice*, Pujos, trait. des accouch. pag. 262.)

ESPECE III. Ulcere vénérien de la matrice, ou du col de la matrice. (*Ulcus uteri à lue vénerea*, Senn. tom. IV. pag. 629. — *Ulcere vénérique de la matrice*, Pujos, trait. des accouch. pag. 272.)

ESPECE IV. Ulcere cancéreux de la matrice. (*Cancer uteri exulceratus*, Senn. tom. IV. pag. 631. — *Ulcere carcinomateux de la matrice*, Pujos, trait. des accouch. pag. 274.)

ESPECE V. Suppuration de la matrice par le vagin, venant d'un dépôt laiteux. (*Lavret art des accouch.* pag. 180.)

GENRE V. Ulcere du périoste externe ou interne.

ESPECE I. Ulcere du périoste à la suite d'une blessure.

ESPECE II. Ulcere du périoste par virus vénérien.

ESPECE III. Ulcere du périoste, à la suite d'une inflammation.

GENRE VI. Ulcere du cerveau. (Mém. de l'Ac. de Chir. tom. I. in-4. p. 312.)

GENRE VII. Ulcere sinueux. — Ulcere avec ouverture plus étroite que son fond. (*Ulcus sinuosum*, Senn. tom. V. pag. 62.)

GENRE VIII. Fistule. — Ulcere avec callosité des bords, &c avec ouverture plus étroite que le fond. (*Fistula*. — *Fistula*, Senn. tom. V. pag. 62. — *Fistula*, Heißl. inst. chir. tom. I. pag. 364.)

ESPECE I. Fistule à l'anus. (*Ani fistula*, Heißl. inst. chirurg. tom. II. pag. 1054. — *Sinus & fistule à l'anus*, Bertrandii, oper. de chir. pag. 210.)

ESPECE II. Fistule du périné. (*Fistula perinai*, Heißl. inst. chir. tom. II. pag. 947.)

GENRE IX. Rhagades. — Solutions de continuité dans le fond & le long des rides de l'anus, par virus vénérien, avec évacuation d'une matière purulente. (*Rhagades*. — *Rhagades sive rhagadia*, Astruc de morb. veneris. tom. I. pag. 392.)

GENRE X. Ulcere du globe de l'œil. (*Ulcere de la conjonctive & de la cornée*, Maître-Jan, malad. de l'œil, pag. 379.)

ESPECE I. Ulcere de la cornée, à la suite d'une tumeur inflammatoire. (S. Yves, malad. des yeux, pag. 175.)

ESPECE II. Ulcere de la cornée par des substances corrosives.

ESPECE III. Ulcere de tout le globe de l'œil, à la suite d'une blessure.

ESPECE IV. Ulcere cancéreux du globe de l'œil. (*Ulcus oculi cancrorum*, Heister. *inf. chirurg. tom. I.* pag. 593.)

GENRE XI. *Fistule lacrymale*. — Ulcere des conduits lacrymaux, ou du lacrymal. (*Fistula lacrymalis*, Heist. *inf. chir. tom. I.* pag. 534. — *Fistula lacrymale*, Bertrand. *oper. de chir.* pag. 297.)

GENRE XII. Ulcere du palais. (*Ulcus palati*, Heister. *inf. chir. tom. II.* pag. 657.)

ESPECE I. Ulcere simple du palais.

ESPECE II. Ulcere vénérique du palais.

ESPECE III. Ulcere scorbutique du palais.

GENRE XIII. *Aphthe*. — Ulcere de la bouche, de peu d'étendue, douloureux, approchant d'une figure plus ou moins ronde. (*Aphtha*. — *Aphtha*, Senn. *tom. III.* pag. 271. — *Aphtha*, Boëth. van Swieten, *de cogn. morb. aphor.* 978.)

ESPECE I. Aphthe simple des enfants nouveaux-nés, sans fièvre. (*Brouzet, educ. med. des enf.* som. II. pag. 105.)

ESPECE II. *Muguet*. — Aphthe contagieux, avec fièvre. (*Aphtha epidemica*, van Swiet. *Comment. in aph. Boëth. aphor. 978*, tom. III. pag. 197.)

ESPECE III. Aphthe sans maladie précédente. (*Aphtha absque morbo prægresso*, van Swiet. *comment. in aph. Boëth. aphor. 983*, tom. III. pag. 201.)

ESPECE IV. Aphthes critiques. (*Aphtha quæ febres sequuntur*, Boëth. van Swiet. *de cogn. morb. aph.* pag. 983.)

ESPECE V. Aphthes vénériens des Enfants nouveaux-nés. (*Levret, art des acc.* pag. 256.)

ESPECE VI. Aphthes scorbutiques des Enfants nouveaux-nés. (*Levret, art des accouch.* pag. 256.)

GENRE XIV. Ulcere de la langue.

ESPECE I. Ulcere cancéreux de la langue. (*Cancer linguae exulceratus*, Heist. *inf. chirurg. tom. II.* pag. 655.)

ESPECE II. Ulcere simple de la langue.

ESPECE III. Ulcere vénérien de la langue.

ESPECE IV. Ulcere de la langue par l'action du mercure.

ESPECE V. Ulcere de la langue par une dent gâtée ou mal conformée.

GENRE XV. Ulcere des mamelles.

ESPECE I. Ulcere des mamelles, par une tumeur inflammatoire sans cause évidente.

ESPECE II. Ulcere des mamelles par un dépôt de lait.

VII. CLASSE, ORDRE V. 85

ESPECE III. Ulcere cancéreux des mamelles. (*Cancer mammarum operus*, Heister. *Inst. chir.* tom. II. pag. 690. — *Cancer aux mamelles*, *Mém. de l'Acad. de Chirurg.* tom. III. in-4. pag. 18 & 37.)

ESPECE IV. Ulcere cancéreux des mamelles par virus vénérien. (*Cancer mammarum exulceratum à viru venereo*, *Astruc de morb. ven.* tom. I. pag. 427.)

ESPECE V. Ulcere du mamelon. (*Mamelon excorié ou ulcétré*, *Mauriceau*, *traité des malad. des femmes grasses*, tom. I. pag. 443.)

GENRE XVI. Ulcere de l'œsophage, avec évacuation de pus par la bouche, accompagnée de simples nausées, sans vomissement, & sans douleur dans la région épigastrique.

GENRE XVII. Ozéne. — Évacuation de pus par le nez, avec plus ou moins d'odeur. (*Ozéna*. — *Ozéna*, Heister. *Inst. chir.* tom. II. pag. 619.)

ESPECE I. Ozéne avec carie des os. (*Ozéna cum carie*, Heister. *Inst. chir.* tom. II. pag. 620.)

ESPECE II. Ozéne par virus vénérien, avec carie ou sans carie. (*Ozéna venerea*, *Astruc de morb. ven.* tom. I. pag. 412.)

ESPECE III. Ozéne simple de la membrane pituitaire, sans carie & sans virus. (*Ozéna simplex*, Heist. *Inst. chir.* tom. II. pag. 619.)

GENRE XVIII. Ulcere des oreilles. (*Ulcus aurium*, Senn. tom. III. pag. 234.)

ESPECE I. Ulcere des parties externes de l'oreille. (*Ulcus auris externæ*, Senn. tom. V. pag. 234.)

ESPECE II. Ulcere de l'oreille interne. (*Ulcus auris internæ*, Senn. tom. III. pag. 234.)

ESPECE III. Evacuation de pus par l'oreille, venant d'un ulcere du cerveau. (*Aures purulentes ab abscessu cerebri*, *Morgagni de sedib. morb.* tom. I. pag. 108.)

GENRE XIX. Ulcere de l'ombilic. (*Ulcus umbilici*, Senn. tom. III. pag. 618.)

GENRE XX. Maladie de Lazare. — Ulcères contagieux, froidides, sanieux, attaquant les téguments, les muscles des bras, des lombes, des cuisses & des jambes. (*Morbus Lazari*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 427.)

GENRE XXI. Solution de continuité au doigt, par la courbure latérale de l'ongle, avec inflammation, suppuration, & douleur plus ou moins vive. (*Curvatura unguium*, Senn. tom. V. pag. 93.)

GENRE XXII. Ulcere par les cauteress actuels ou potentiels, ou par l'instrument tranchant. (*Ulcus arte factum*, Platner. *Inst. chir.* pag. 601.)

GENRE XXIII. Gonorrhée. — Écoulement par les parties naturelles, de matière liquide d'un blanc plus ou moins jaunâtre, quelquefois verdâtre,

souvent très-fluide, quelquefois visqueuse, rarement sans ardeur d'urine.

ESPECE I. *Gonorrhœa benigne*. — Évacuation par les parties naturelles, d'une matière jaunâtre, ordinairement sans ardeur d'urine, ne provenant d'aucun virus, & se terminant sans le secours d'aucune préparation mercurielle.

ESPECE II. *Gonorrhœa virulente*. — Écoulement de matière purulente, par les parties naturelles, ordinairement avec douleur, chaleur & ardeur d'urine, provenant de caute vénérienne. (*Gonorrhœa virulenta*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 357. — *Gonorrhœa virulenta*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 194. — *Gonorrhœa virulenta in virus*, Afrac, de morb. vener. tom. I. pag. 245. & 246.)

GENRE XXIV. *Chancre*. — Ulcere ordinairement d'une figure circulaire, plus ou moins profond, douloureux, & rongeant avec plus ou moins de promptitude les parties circonvoisines. (*Ulcusculum cancrosum*.)

ESPECE I. *Chancre benin*. (*Ulcusculum cancrosum benignum*.)

ESPECE II. *Chancre malin*, avec fièvre & prompte destruction des parties qui l'environnent.

ESPECE III. *Chancre vénérien*. (*Ulcusculum cancrosum venerium*, Afrac de morb. vener. tom. I. pag. 348.)

GENRE XXV. Écoulement involontaire de semence. (*Gonorrhœa benigna*, Senn. tom. IV. pag. 612. — *Gonorrhœa*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 357. — *Gonorrhœa habitualis*, Afrac de morb. veneris tom. I. pag. 305.)

ESPECE I. Écoulement de semence par relâchement. (*Gonorrhœa benigna à partibus nimis relaxatis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 357.)

ESPECE II. Écoulement de semence par surabondance. (*Gonorrhœa ab abundantia feminis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 357.)

ESPECE III. Pollution nocturne. (*Pollutio nocturna*, Senn. tom. IV. pag. 614. — *Somnus venerius*, Caius Aurelian. tom. II. pag. 391. — *Pollutio nocturna*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 357.)

ESPECE IV. Éjaculation de la semence, trop prompte pour la fécondation.

GENRE XXVI. *Consumption dorsale*. — Consomption par une évacuation trop abondante de semence, à la suite de l'excès du coit ou de la masturbation. (*Tabes dorfallis*, Lomm. Observ. med. pag. 250.)

GENRE XXVII. *Fleurs blanches*. — Évacuation par le vagin, d'une humeur blanchâtre quelquefois aunâtre. (*Leucorrhœa*. — *Fluor albus muliebris*, Senn. tom. IV. pag. 673. — *Cachexia uterina sive fluor albus*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 348. — *Fluor muliebris*, Morgagni, de sedibus morborum, tom. II. pag. 220.)

ESPECE I. Fleurs blanches à la suite des pâles couleurs.

ESPECE II. Fleurs blanches, après une grande perte de sang par le vagin.

ESPECE III. Fleurs blanches par diminution ou suppression accidentelle du flux menstruel.

ESPECE IV. Fleurs blanches à la suite d'une gonorrhée virulente.

ESPECE V. Fleurs blanches après la cessation naturelle du flux menstruel.

ESPECE VI. Fleurs blanches après les couches.

GENRE XXVIII. Atrophie par des pertes blanches. (*Tabes à fluore albo*, Morton, tom. I. pag. 8.)

GENRE XXIX. Évacuation d'urine trouble, blanchâtre, donnant par le repos une grande quantité de sédiment blanchâtre, avec ardeur sur la fin de l'évacuation. (*Mictio lattea*, Plater. *Prax. med.* tom. III. p. 746.)

GENRE XXX. *Ulcere de la Vesicæ*. — Évacuation de pus & d'urine par le canal de l'urethre, avec douleur gravative au périen & au pubis, ordinairement aiguë vers le sphincter de la vessie pendant le temps de l'excrétion de l'urine. (*Ulcus vesicæ*, Senn. tom. IV. pag. 588.)

ESPECE I. Ulcere de la vessie par un calcul. (*Ulcus vesicæ à calculo*, Senn. tom. IV. pag. 588.)

ESPECE II. Ulcere de la vessie par une gonorrhée virulente. (*Ulcus vesicæ à gonorrhœa virulentæ*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 309.)

ESPECE III. Ulcere fistuleux de la vessie. (*Fistula vesicæ*, Senn. tom. IV. pag. 589.)

GENRE XXXI. *Phthisie*. — Maigreur de tout le corps, avec fièvre lente, difficulté de respirer, crachement de pus. (*Phthisis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 284. — *Phthiseos*, Bennet. *Theatrum tabidorum*. — *Phthisis pulmonalis*, Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aph. 1196. — *Phthisis*, Morgagni, de sed. morb. tom. I. pag. 232.)

ESPECE I. Phthisie pulmonaire essentielle. (*Phthisis pulmonaris originalis*, Morton, tom. I. pag. 25.)

ESPECE II. Phthisie par hemoptysie. (*Phthisis ab haemoptoe*, Morton, tom. I. pag. 95.)

ESPECE III. Phthisie par peripneumonie, ou par pleurésie. (*Phthisis à peripneumonia, & pleuritide*, Morton, tom. I. pag. 112.)

ESPECE IV. Phthisie pulmonaire par des fièvres. (*Phthisis pulmonaris à febribus*, Morton, tom. I. pag. 125.)

ESPECE V. Phthisie par des calculs dans les poumons. (*Phthisis à calculis in pulmonibus*, Morton, tom. I. pag. 101.)

ESPECE VI. Phthisie par suppression du flux menstruel. (*Phthisis à chlora & suppressione menstruarum purgationum*, Morton, tom. I. pag. 110.)

ESPECE VII. Phthisie par suppression d'une gonorrhée virulente, ou des fleurs blanches, ou d'un ulcere ancien, ou d'un ulcere scrophuleux. (*Phthisis à suppressione gonorrhœa virulentæ, ulcerum veterum, ulcerum scrophulatum, & floris albis*, Morton, tom. I. pag. 109.)

ESPECE VIII. Phthisie asthmatische. (*Phthisis asthmatica*, Morton, tom. I. pag. 89.)

VII. CLASSE, ORDRE VI.

ESPECE IX. Phthisie par virus vénérien. (*Phthisis à lue venerea*, *Morton*, tom. I. pag. 107.)

ESPECE X. Phthisie scorbutique. (*Phthisis scorbatica*, *Morton*, tom. I. pag. 85.)

ESPECE XI. Phthisie scrophuleuse. (*Phthisis scrophulosa*, *Morton*, tom. I. pag. 81.)

ESPECE XII. Phthisie par la goutte & le rhumatisme. (*Phthisis ab arthritide & rheumatismo*, *Morton*, tom. I. pag. 118.)

ESPECE XIII. Phthisie par passion hysterique ou hypochondriaque. (*Phthisis ab hysterica, aux hypochondriaca affectione*, *Morton*, tom. I. pag. 92.)

ESPECE XIV. Phthisie par affection du foie. (*Phthisis icteritia seu hepatica*, *Morton*, tom. I. pag. 131.)

ESPECE XV. Phthisie par les ulcères internes de l'abdomen. (*Phthisis pulmonaris ab internis ulceribus viscerum & partium membranofarum*, *Morton*, tom. I. pag. 146.)

GENRE XXXII. Amaigrissement de tout le corps, par des ulcères considérables, avec fièvre. (*Tabes ab apostematibus ulceribus largis orta*, *Morton*, tom. I. pag. 9.)

GENRE XXXIII. Vomissement de pus, avec douleur fixe, aiguë & brûlante dans la région épigastrique, principalement à jeun, suivi d'assoublissement des forces, de soif & souvent de colique. (*Vomitus purulentus*, *Fabric. Hildan. observ. med. tom. I. pag. 13.* — *Vomitus purulentus*, *Morgagni, de sedib. morb. tom. II. pag. 19.*)

GENRE XXXIV. Amaigrissement des Nourrices, par une succion excessive de lait, avec fièvre. (*Tabes nutricum à lactatione nimia*, *Morton*, tom. I. pag. 13.)

GENRE XXXV. Écoulement spontané du lait, par surabondance dans les mamelles. (*Lactis redundantia*, *Senn. tom. IV. pag. 758.*)

GENRE XXXVI. Lochies. — Évacuation par le vagin, deux ou trois jours après l'accouchement, d'une humeur plus ou moins blanche. (*Lochia. — Lochies*, *Levret, art des accouch. pag. 153.*)

ESPECE I. Lochies naturelles. (*Levret, art des accouch. pag. 153.*)

ESPECE II. Lochies fétides. (*Levret, art. des accouch. pag. 153.*)

ESPECE III. Lochies de confiance glaireuse, sans couleur, sans odeur, en petite quantité. (*Levret, art des acc. pag. 154.*)

ESPECE IV. Lochies ressemblant à la lavure de chair. (*Levret, art des acc. p. 154.*)

ESPECE V. Lochies de couleur de café & d'une odeur cadavéreuse. (*Levret, art des acc. pag. 154.*)

ESPECE VI. Lochies de couleur de café, & d'une odeur fétide & ammoniacale. (*Levret, art des acc. pag. 154.*)

ORDRE VI.

ORDRE SIXIEME.

ÉVACUATION de matières plus ou moins fluides, transparentes, quelquefois avec des matières solides.

GENRE I. Vomissement. — Évacuation par la bouche, de matières contenues dans l'estomac. (*Vomitus*. — *Vomitus*, Senn. tom. IV. pag. 402. — *Motus convulsivus ventriculi*, sive *vomitus*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 139. — *Vomitus*, Morgagni, de *sedib. morb.* tom. II. pag. 19.)

ESPECE I. Vomissement par des substances vénéneuses ou nuisibles à l'estomac. (*Vomitus ab assumptis qualitate inimicis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 142.)

ESPECE II. Vomissement de matières bilieuses. (*Vomitus biliosus*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 142.)

ESPECE III. Vomissement par trop d'aliments dans l'estomac. (*Vomitus à nimia assumptorum quantitate*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 142.)

ESPECE IV. Vomissement fébrile. (*Vomitus febrilis*, Boerk. van Swiet. de cogn. morb. aphae. 652.)

ESPECE V. Vomissement de matières pituitées, par dépravation des humeurs contenues dans l'estomac. (*Vomitus à faburrâ ventriculi*, Fred. Hoffm. tom. III. p. 142.)

ESPECE VI. Vomissement par lésion du cardiac. (*Vomitus à visio orificii cardiaci*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 143.)

ESPECE VII. Vomissement par lésion du pilore. (*Vomitus à visio pilori*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 143.)

ESPECE VIII. Vomissement par un calcul dans les reins, ou dans l'urethre. (*Vomitus à calculo*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 143.)

ESPECE IX. Vomissement par les vers. (*Vomitus à vermis*, Fred. Hoffm. t. III. p. 143.)

ESPECE X. Vomissement par lésion des intestins. (*Vomitus ab intestinorum vitio*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 143.)

ESPECE XI. *Mal de mer.* — Vomissement par le mouvement d'un navire. (*Vomitus à motu corporis in navi à non effectis instituto*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 144.)

ESPECE XII. Vomissement des hypochondriques ou des hystériques. (*Vomitus hypochondriacorum*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 142.)

ESPECE XIII. Vomissement par transport d'une matière acré sur l'estomac. (*Vomitus à materia acre per metastatism ad ventriculum delata*, Fred. Hoffm. tom. III. p. 142.)

ESPECE XIV. Vomissement par un coup sur l'estomac. (*Vomitus à causâ externâ*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 144.)

ESPECE XV. Vomissement des femmes grosses. (*Levet, art des acc.* pag. 207.)

ESPECE XVI. Vomissement des enfants à la mamelle, pour avoir pris une trop grande quantité de lait. (*Brouzet, Éducat. medio. des enfants*, tome II. pag. 28. — *Vomissement de l'enfant à la mamelle*, Levet, art des acc. pag. 264.)

90 **VII. CLASSE, ORDRE VI.**

ESPECE XVII. Vomissement de chyle, des enfants à la mamelle. (*Levret, art des accouch. pag. 265.*)

GENRE II. *Passion iliaque*. — Douleur aiguë du ventre, avec borborygmes, constipation, & vomissement de matières fluides, d'une odeur souvent semblable à celle de la matière fécale. (*Passio iliaca. — Ileus, Senn. tom. IV. pag. 427.*)

ESPECE I. Passion iliaque par abcès, ou par ulcération. (*Ileus ab abcessu aut exulceratione, Senn. tom. IV. pag. 429.*)

ESPECE II. Passion iliaque par substances vénéneuses. (*Ileus à veneno, Senn. opera, tom. IV. pag. 429.*)

ESPECE III. Passion iliaque par matières fécales endurcies. (*Ileus à facibus induratis, Senn. tom. IV. pag. 429.*)

ESPECE IV. Passion iliaque par skirrhe. (*Ileus à scirrho, Senn. tom. IV. p. 429.*)

ESPECE V. Passion iliaque par ulcère cancéreux des intestins. (*Ileus à cancro intestinalis, Senn. tom. IV. pag. 429.*)

GENRE III. *Expectoration*. — Évacuation par la bouche, de matières plus ou moins fluides venant des bronches pulmonaires, avec bruit, ou avec toux. (*Expectoratio. — Expectoratio, Linn. gen. morb. gen. 178.*)

GENRE IV. *Crachement*. — Évacuation par la bouche, de matières fluides ou visqueuses, contenues dans la bouche & l'arrière bouche, chassées avec plus ou moins de bruit. (*Excreatio. — Expuitio, Plater. prax. med. tom. I. pag. 397.*)

ESPECE I. Crachotement. — Crachement habituel. (*Screatus continuus. — Expuitio ex consuetudine usitata, Plater. prax. med. tom. I. pag. 397.*)

ESPECE II. Crachement pituitex. (*Expuitio pituitosa, Plater. prax. med. tom. III. pag. 697.*)

GENRE V. *Salivation*. — Évacuation abondante de salive par la bouche. (*Salivatio. — Ptyalismus seu crebra sputatio, Senn. tom. III. pag. 260.*)

ESPECE I. Salivation par des aliments mal digérés. (*Salivatio à cibo corrupto, Senn. tom. III. pag. 261.*)

ESPECE II. Salivation par des remèdes qui provoquent la salive. (*Expuitio à remediis salivam provocantibus, Plater. prax. med. tom. III. pag. 697.*)

ESPECE III. Salivation par des préparations mercurielles. (*Salivatio mercurialis, Astruc de morbis vener. tom. I. pag. 494.*)

ESPECE IV. Salivation scorbutique. (*Continua salivæ & sputi rejetio, à scorduto, Senn. tom. IV. pag. 520.*)

ESPECE V. Salivation des hysteriques & des hypocondriaques. (*Ptyalismus ab affectione hysterica, Sydenham, tom. I pag. 264.*)

ESPECE VI. Salivation dans les petites véroles confluentes. (*Salivatio in variolis confluentibus, Sydenh. tom. I. pag. 83, 84, 93, 94, 96, 99, 103, 125, 503.*)

VII. CLASSE, ORDRE VI. 91

ESPECE VII. Salivation par inflammation ou ulcération de la bouche. (*Salivatio inflammatione & ulceribus oris*, Senn. tom. III. pag. 261.)

ESPECE VIII. Salivation excessive, avec amaigrissement de tout le corps. (*Tabes à salivation*, Morton, tom. I. pag. 18.)

GENRE VI. Ouverture du conduit de Sténon. — Solution de continuité du conduit salivaire des glandes parotides, avec écoulement continu de salive hors de la bouche. (*Mémoire de l'Acad. de Chir. in-4°. tom. III. pag. 431.*)

GENRE VII. Enchiffrément. — Évacuation par le nez, d'une humeur limpide, avec douleur gravative des parties qui répondent aux sinus du nez, particulièrement du sinus frontal. (*Coryza*, Senn. tom. III. pag. 250.)

ESPECE I. Enchiffrément par impression du froid.

ESPECE II. Enchiffrément habituel.

GENRE VIII. Évacuation des humeurs contenues dans le globe de l'œil.

ESPECE I. Évacuation de l'humeur aqueuse par cause mécanique.

ESPECE II. Évacuation de l'humeur aqueuse & quelquefois du crystallin & de l'humeur vitrée, par ulcère.

ESPECE III. Évacuation de toutes les humeurs de l'œil, par cause mécanique.

ESPECE IV. Évacuation des humeurs de l'œil, par des substances corrosives.

GENRE IX. Larmoyement. — Écoulement des larmes sur les joues. (*Epiphora*, Senn. tom. III. pag. 231.)

ESPECE I. Larmoyement par obstruction du conduit lacrymal nasal. (*Epiphora ab obstrukione ductus nasalis lacrymalis*, Heißl. inst. chirurg. tom. I. pag. 532.)

ESPECE II. Larmoyement, par tuméfaction au grand angle de l'œil affectant les pointes lacrymaux. (*Epiphora à tumore aliquo puncta lacrymalia infestante*, Heißl. inst. chirurg. tom. I. pag. 532.)

ESPECE III. Larmoyement, par lésion des paupières affectant les points lacrymaux. (*Epiphora à palpebrarum nosa puncta lacrymalia præcludente*, Heißl. inst. chirurg. tom. I. pag. 532.)

ESPECE IV. Larmoyement, par blessure ou par obturation des conduits lacrymaux. (*Epiphora à ductuum lacrymalium vulneratione vel obturazione*, Heißl. inst. chirurg. tom. I. pag. 532.)

ESPECE V. Larmoyement, par une excroissance de chair bouchant ou comprimant l'orifice inférieur du conduit lacrymal. (*Epiphora à polypo ductum lacrymalem occludente vel comprimente*, Heißl. inst. chirurg. tom. I. pag. 532.)

ESPECE VI. Larmoyement, par fistule lacrymale. (*Epiphora à fistula lacrymali*, Heißl. inst. chirurg. tom. I. pag. 532.)

ESPECE VII. Larmoyement, par renversement des paupières. (*Epiphora à palpebrarum inversione*, Heißl. inst. chirurg. tom. I. pag. 532.)

ESPECE VIII. Larmoyement, par érosion ou par défaut de la caroncule lacrymale. (*Epiphora à lacrymalis caruncula erosione aut defectu*, Heißl. inst. chir. tom. I. p. 532.)

92 VII. CLASSE, ORDRE VI.

ESPECE IX. Larmoyement par humeur pituiteuse. (*Epiphora ab humoris pituitosis*, *Plater. prax. medic. tom. III. pag. 672.*)

ESPECE X. Larmoyement par humeur acre. (*Epiphora à seroso humor, acris & calido*, *Plater. prax. medic. tom. III. pag. 674.*)

ESPECE XI. Larmoyement par les passions de l'ame. (*Erupio lacrymarum ab animi magnis commotionibus*, *Plater. prax. medic. tom. III. pag. 668.*)

ESPECE XII. Larmoyement par des corps étrangers dans l'œil.

ESPECE XIII. Larmoyement par l'action des corps volatils.

ESPECE XIV. Larmoyement par inflammation de l'œil.

GENRE X. Écoulement d'humeurs par les oreilles.

ESPECE I. Écoulement abondant par les oreilles, d'une matière cérumineuse & inodore.

ESPECE II. Écoulement abondant par les oreilles, d'une matière fluide, presque transparente & fétide; produit par la teigne, ordinairement sans douleur.

ESPECE III. Écoulement par les oreilles, d'une humeur séreuse, fétide & plus ou moins jaune, sans ulcere. (*Sanies ex auribus absque ulcere*, *Senn. tom. III. p. 234.*)

ESPECE IV. Écoulement d'une humeur aqueuse par les oreilles. (*Aurium aquosus effluxus*, *Plater. tom. III. pag. 669.* — *Suintement des oreilles des enfants*, *Brouzet, educ. med. des enfants*, *tom. II. pag. 294.*)

GENRE XI. Sueur trop abondante. (*Sudor præternaturalis*, *Plater. tom. III. pag. 670 & 861.*)

ESPECE I. Sueur fébrile. (*Sudor febrilis*, *Boëth. van Swiet. de cognosc. morb. aph. 715.*)

ESPECE II. Sueur excessive, avec maigreur & fièvre. (*Tabes à sudoribus immensis*, *Morton, tom. I. pag. 21.*)

ESPECE III. Sueur par violents exercices.

ESPECE IV. Sueur par la trop grande chaleur.

GENRE XII. Diabète. — Évacuation trop abondante d'urine. (*Diabetes*, — *Diabetes*, *Senn. tom. IV. pag. 582.*)

ESPECE I. Évacuation trop abondante d'urine, avec maigreur de tout le corps. (*Diabetes cum colligatione*, *Arctus de morb. acut. & diuturn. pag. 99. & 244.* — *Tabes à diabète*, *Morton, tom. I. pag. 16.*)

ESPECE II. Diabète par un coû immoderé. (*Diabetes à nimio venoris usu*, *Senn. tom. IV. pag. 582.*)

ESPECE III. Diabète par un violent exercice. (*Diabetes ab immodico labore*, *Senn. tom. IV. pag. 582.*)

ESPECE IV. Diabète par la fièvre, particulièrement par la fièvre intermittente. (*Diabetes à febre intermitte*, *Sydenh. tom. I. pag. 192 & 520.*)

GENRE XIII. Pissement de matières muqueuses. (*Midio mucofa*, *Plater. prax. med. tom. III. pag. 746.*)

VII. CLASSE, ORDRE VI.

93

ESPECE I. Pissement de matières muqueuses, par calculs dans la vessie.

ESPECE II. Pissement de matières muqueuses, par vieillesse.

ESPECE III. Pissement de matières muqueuses, par acréte de l'urine.

GENRE XIV. Écoulement d'urine par des voies extraordinaires. (*Urina effluens per viam præternaturalem*, *Plater. tom. III. pag. 748.* — *Urina per aliena loca excretio*, *Senn. tom. IV. pag. 558.*)

GENRE XV. D'artre de la vessie. — Écoulement d'urine par le canal de l'urethre, avec des matières filamentueuses & des petits corps sous forme de pellicules, accompagné de douleur. (*Scabies vesicæ*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 310.*)

GENRE XVI. Incontinence d'urine. — Écoulement involontaire d'urine. (*Urinæ incontinentia*, *Senn. tom. IV. pag. 595.*)

ESPECE I. Incontinence d'urine pendant le sommeil. (*Incontinentia urinæ per somnum*, *Senn. tom. IV. pag. 595.*)

ESPECE II. Incontinence d'urine, par paralysie ou foiblesse du sphincter de la vessie. (*Incontinentia urinæ ab imbecillitate, aut resolutione sphincteris*, *Senn. tom. IV. pag. 595.*)

ESPECE III. Incontinence d'urine pendant le travail de l'accouchement. (*Involuntarius urinæ effluxus tempore partus contingens*, *Röder. elem. art. obſtr. pag. 83.*)

ESPECE IV. Incontinence d'urine pendant la grossesse.

ESPECE V. Incontinence d'urine par l'effet du virus vénérien.

ESPECE VI. Incontinence d'urine par la peur.

ESPECE VII. Incontinence d'urine chez les femmes, par un rire excessif.

GENRE XVII. Évacuation par le vagin, des eaux renfermées dans la matrice des femmes grosses.

ESPECE I. Évacuation des eaux contenues hors de l'amnios. (*Aqua spuria*, *Röder. elem. art. obſtr. pag. 85.*)

ESPECE II. Évacuation naturelle des eaux de l'amnios. (*Évacuation des eaux*, *Levret. art. des acc. pag. 96.*)

ESPECE III. Évacuation des eaux de l'amnios long-temps avant l'accouchement. (*Écoulement prématûr des eaux*, *Pujos, traité des accouchements, pag. 122.*)

GENRE XVIII. Ténèseme. — Desir continual d'aller du ventre, avec douleur, & souvent avec déjection par l'anus, d'une petite quantité de matières muqueuses. (*Tenesmus*, *Senn. tom. IV. pag. 472.*)

ESPECE I. Ténèseme bilioux. (*Tenesmus biliosus*, *Senn. tom. IV. pag. 472.*)

ESPECE II. Ténèseme par purgatifs violents, ou par substances vénéneuses.

ESPECE III. Ténèseme par matières fécales trop endurcies. (*Tenesmus à calculo, vel à facibus induratis*, *Senn. tom. IV. pag. 472.*)

94 VII. CLASSE, ORDRE VI.

ESPECE IV. Ténesme par le froid. (*Tenesmus à refrigeratione nimis*, Senn. tom. IV. pag. 472.)

ESPECE V. Ténesme par affection des parties circonvoisines de l'intestin rectum. (*Tenesmus à partium vicinarum affectibus*, Senn. tom. IV. pag. 472.)

ESPECE VI. Ténesme pas affection hysterique ou hypocondriaque.

GENRE XIX. Érosion de la surface des téguments, avec humidité & douleur. (*Intertrigo*, Linn. gener. morb. gen. 247.)

GENRE XX. Fissures des mains, des pieds & des lèvres par le froid, avec faiblement plus ou moins sensible.

GENRE XXI. *Croûtes de lait*. — Ulcération de la peau, affectant le visage des enfants qui tetent, avec faiblement d'une matière séreuse plus ou moins abondante & avec croûtes. (*Crustæ laitæ*, Heister. inst. chirurg. tom. I. pag. 385. — *Croûtes de lait*, Brouzet, educ. med. des enf. tom. II. pag. 91.)

GENRE XXII. *Teigne*. — Ulcération des téguments plus ou moins couverts de croûtes, avec faiblement d'une matière séreuse, attaquant ordinairement la tête des enfants, souvent avec vive démangeaison. (*Tinea*. — *Tinea*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 495. — *Tinea capitis*, Heister. inst. chirurg. tom. I. pag. 385. — *Gâle des enfants*, Puzos, traité des acc. pag. 313.)

GENRE XXIII. *Teigne par virus vénérien*. — Tumeurs croûteuses, avec démangeaison plus ou moins vive & faiblement ; attaquant le front, & le plus souvent la partie chevelue de la tête. (*Tinea adulorum venerea*, Heist. inst. chir. tom. I. pag. 386.)

GENRE XXIV. *Lepre des Grecs*. — Tumeurs plus ou moins grandes, dures, sèches, représentant des écailles de poisson, avec vive démangeaison & sueur fétide, affectant les téguments, surtout ceux des jambes, des bras & de la poitrine. (*Lepra græcorum*, Senn. tom. V. pag. 37.)

GENRE XXV. *Lepre des Juifs*. — Tumeurs dures, épaisses, entrecoupées de gessures, continues sur la plus grande partie des téguments, contagieuses, accompagnées de démangeaison, avec face horrible, front fillonné, corps dénué de poils, pouls petit, haleine fétide, respiration difficile, abattement des forces musculaires. (*Elephantiasis*, Aretaeus, pag. 130, — *Elephantia*, Lomm. observ. med. pag. 67.)

GENRE XXVI. *Dartre*. — Petit ulcères rassemblés, de longue durée, avec démangeaison, faiblement d'une humeur plus ou moins fluide & transparente, & pour l'ordinaire avec petites croûtes plus ou moins épaisses. (*Herpes*. — *Herpes*, Senn. tom. V. pag. 26. — *Herpes*, Platner. inst. chir. pag. 593.)

ESPECE I. Dartre seche. (*Herpes simplex*, Senn. tom. V. pag. 26.)

ESPECE II. Dartre humide.

ESPECE III. Dartre rongeante. (*Herpes exedens*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 426.)

ESPECE IV. Dartre sur la poitrine & sur la région épigastrique, avec cardialgie, chaleur & démangeaison. (*Zona ignea*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 426.)

ESPECE V. Dartre miliaire. (*Herpes miliaris*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 426.)

ESPECE VI. Dartre vénérienne. (*Herpes venereus*, *Astruc de morb. venereis*, t. I. p. 410.)

ORDRE SEPTIEME.

ÉVACUATION par l'anus, de matières fécales plus ou moins fluides.

GENRE I. Diarrhée. — Évacuation par l'anus, de matières fécales sous forme liquide. (*Diarrhæa*. — *Diarrhæa*, Senn. tom. IV. pag. 443. — *Diarrhæa*, Baglivi, pag. 107. — *Alvi profluvium incurruentum*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 15.)

ESPECE I. Diarrhée, avec évacuation des humeurs vitiées. (*Diarrhæa à toto corpore fine febre*, Senn. tom. IV. pag. 445.)

ESPECE II. Diarrhée par la qualité des aliments. (*Diarrhæa à ciborum qualitate*, Senn. tom. IV. pag. 446.)

ESPECE III. Diarrhée par foibleesse de l'estomac. (*Diarrhæa à ventriculi debilitate*, Senn. tom. IV. pag. 446.)

ESPECE IV. Diarrhée bilieuse. (*Diarrhæa à bilioso humore*, Senn. tom. IV. p. 446. — *Diarrhæa biliofa*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 165.)

ESPECE V. Diarrhée fécale. (*Diarrhæa fæosa*, Carol. Piso, de morb. à coll. fæos. pag. 260. — *Diarrhæa caecorrhialis*, Senn. tom. IV. pag. 447.)

ESPECE VI. Diarrhée par la quantité des aliments. (*Diarrhæa à ciborum copiâ*, Senn. tom. IV. pag. 446.)

ESPECE VII. Diarrhée par les vers. (*Diarrhæa à vermbus*, Senn. tom. IV. p. 446.)

ESPECE VIII. Diarrhée par l'éruption des dents chez les enfants. (*Diarrhæa à dentibus pueris erumpentibus*, Senn. tom. IV. pag. 448.)

ESPECE IX. Diarrhée par la suspension du flux menstrual. (*Diarrhæa à mensibus retentis*, Sennert. tom. IV. pag. 447.)

ESPECE X. Diarrhée par des substances vénéneuses ou purgatives. (*Diarrhæa à purgantibus vel à veneno*, Senn. tom. IV. pag. 448.)

ESPECE XI. Diarrhée fébrile. (*Diarrhæa cum febre*, Senn. tom. IV. pag. 443. — *Diarrhæa febrilis*, Boérh. van Swiet. de cognosc. morb. aphor. 719.)

ESPECE XII. Diarrhée des femmes nouvellement accouchées. (*Levrer, art. des acc.* pag. 166.)

ESPECE XIII. Diarrhée par le froid, ou par humidité des extrémités inférieures.

96 VII. CLASSE, ORDRE VII.

GENRE II. *Flux colliquatif*. — Évacuation par l'anus, de matières fécales, liquides, de diverses couleurs, odeur & consistance, avec fièvre & confusion de tout le corps. (*Fluxus colliquatus*, Senn. tom. IV. p. 444.)

GENRE III. *Passion cœliaque*. — Évacuation par l'anus, de matières liquides, de couleur ordinairement blanchâtre & quelquefois rousse, avec peu d'odeur, accompagnée de maigreur, sans fièvre, ni affoiblissement des forces. (*Fluxus chylosus*, Senn. tom. IV. pag. 443.)

ESPECE I. Flux par l'anus de matières fécales, liquides & blanchâtres, avec atrophie, tumeurs au bas ventre, & tension des muscles de cette partie. (*Mesenteritis vaorum angustia*, Senn. tom. IV. pag. 478.)

ESPECE II. Passion cœliaque des enfants.

ESPECE III. Passion cœliaque, par substances vénéneuses.

GENRE IV. *Liénterie*. — Évacuation par l'anus, d'aliments à peine décomposés, environnés de matières fluides, avec borborygmes, tuméfaction de l'abdomen, maigreur & dépérissement des forces. (*Liénteria*, Senn. tom. IV. pag. 439. — *Atrophia liénteria*, Morton, tom. I. pag. 23.)

GENRE V. *Flux hépatique*. — Évacuation par l'anus, de matières fécales sous forme fluide, semblables à la lavure de chair, avec pâleur de tout le corps, soif, dégoût, tuméfaction des paupières & des pieds. (*Fluxus hepaticus*, Senn. tom. IV. pag. 469.)

GENRE VI. *Misérère*. — Déjection abondante de matières fécales, avec vomissement de matières plus ou moins bilieuses, colique, ténesme & abattement des forces. (*Cholera*. — *Cholera humida*, Senn. tom. IV. pag. 405. — *Cholera*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 165.)

ESPECE I. Misérère par des aliments susceptibles d'une prompte fermentation, ou en fermentation. (*Cholera à cibis nimirum fermentescibilis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 167.)

ESPECE II. Misérère par substances vénéneuses. (*Cholera à venenis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 167.)

ESPECE III. Misérère par purgatifs ou émétiques trop violents. (*Cholera à purgantibus & emeticis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 167.)

ESPECE IV. Misérère épidémique principalement en Août & Septembre. (*Cholera moibus epidemicus*, Sydenh. tom. I. pag. 184 & 511.)

ESPECE V. Misérère par une violente colère. (*Cholera eb iracundia*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 167.)

ORDRE VIII.

ORDRE HUITIEME.

ÉVACUATIONS de matières sanguinolentes.

GENRE I. Hémorrhagie. — Évacuation excessive de sang. (*Hæmorrhagia*, — *Hæmorrhagia*, Fred. Hoffm. tom II. pag. 194. — *Hamorrhagia*, Boëth. van Swict. de cognosc. morb. aphor. 218.)

ESPECE I. Hémorrhagie artérielle par une blessure. (*Hæmorrhagia à vulnere arteria*, Senn. tom. V. pag. 120.)

ESPECE II. Hémorrhagie artérielle interne, sans principe évident.

ESPECE III. Hémorrhagie veineuse par une blessure. (*Hamorrhagia à vulnere venæ*, Senn. tom. V. pag. 120.)

ESPECE IV. Hémorrhagie interne veineuse, sans principe évident.

ESPECE V. Hémorrhagie souvent renouvelée, avec maigreur de tout le corps, sans fièvre sensible. (*Tabes ab hæmorrhagia*, Morton, tom. I. pag. 6.)

ESPECE VI. Hémorrhagie critique.

ESPECE VII. Hémorrhagie périodique.

GENRE II. Évacuation de sang par le nez. (*Sanguinis à naribus fusio*, Lomm. observ. med. pag. 112.)

ESPECE I. Hémorrhagie du nez par disposition de cet organe à l'éruption du sang. (*Hæmorrhagia à naribus ad sanguinis eruptionem pronis*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 196.)

ESPECE II. Hémorrhagie du nez par difficulté de la circulation du sang dans les vaisseaux du nez. (*Hamorrhagia narium à congectione sanguinis*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 196.)

ESPECE III. Hémorrhagie du nez par suppression d'une évacuation sanguine. (*Hæmorrhagia narium à sanguinis evacuationis suppressione*, Fred. Hoffm. tom. II. p. 197.)

ESPECE IV. Hémorrhagie du nez par l'embarras du cours des humeurs dans les viscères du bas ventre. (*Hamorrhagia à visceribus sanguineis obstrudis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 197.)

ESPECE V. Hémorrhagie du nez chez les femmes grosses.

GENRE III. Crachement de sang venant de la bouche, sans toux & sans vomissement.

ESPECE I. Crachement de sang ichoreux, par le scorbut. (*Expulatio sanguinis ex ore à scorbuto*, Senn. tom. IV. pag. 516.)

ESPECE II. Crachement de sang, par la blessure d'une ou de plusieurs parties de la Table des Maladies. N

bouche. (*Expulso sanguinis à lassione mechanica gingivarum linguae, aut faucom palati, Plater. prax. medic. tom. III. pag. 702.*)

ESPECE III. Crachement de sang venant des gencives molles, sans scorbut. (*Expulso sanguinis ex laxâ & molli carne gingivarum, Plater. prax. med. t. III. p. 702.*)

GENRE IV. Hémoptysie. — Évacuation de sang par la bouche, d'un rouge vif, ordinairement écumeux, avec toux plus ou moins vive, rarement avec effort pour vomir. (*Hæmoptysis. — Sputum sanguinis, Lommii observ. med. pag. 141. — Sputum sanguinis, Senn. tom. III. pag. 350. — Sanguinis fluxus ex pulmonibus, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 202. — Sputum sanguinis, Morgagni, de sedib. morb. tom. I. pag. 225.*)

ESPECE I. Hémoptysie par disposition naturelle des vaisseaux pulmonaires à la rupture: (*Hæmoptysis ab habitu pulmonis ad sanguinis eruptionem proni, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 203.*)

ESPECE II. Hémoptysie par de violentes inspirations & expirations. (*Disruptio vasorum in pulmonibus, violentâ nimirum & nimia dilatatione vel contractione, Plater. prax. med. tom. III. pag. 703.*)

ESPECE III. Hémoptysie par diminution ou suppression des menstrues. (*Hæmoptysis à fluxu menstruali suppresso, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 207.*)

ESPECE IV. Hémoptysie par un coup. (*Paffo hæmoptoica ab ictu, Plater. prax. med. tom. III. pag. 704.*)

ESPECE V. Hémoptysie périodique. (*Paffo hæmoptoica certis temporibus, Plater. prax. med. tom. III. pag. 699.*)

ESPECE VI. Hémoptysie par ulcere des poumons. (*Paffo hæmoptoica ab ulcere, Plater. prax. med. tom. III. pag. 704. — Hæmoptysis phthisica, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 203 & 211.*)

ESPECE VII. Hémoptysie par engorgement de la rate, avec tension douloureuse de l'hypochondre gauche. (*Hæmoptysis ab obstructione, vel infarctu lienis, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 203.*)

ESPECE VIII. Hémoptysie par des accès violents de passion hystérique ou hypochondriaque, ou par des mouvements spasmodiques. (*Hæmoptysis à spasmis atrocibus vel hystericis vel hypochondriacis, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 203.*)

ESPECE IX. Hémoptysie par pléthore. (*Hæmoptysis ab abundantia sanguinis, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 203.*)

ESPECE X. Hémoptysie des femmes grosses.

ESPECE XI. Hémoptysie pendant le cours de la petite vérole. (*Sanguinis sputum in variolis, Sydenham, tom. I. pag. 378.*)

ESPECE XII. Hémoptysie par fluxion catarrhale. (*Hæmoptysis fluxione catarrhalis, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 204.*)

ESPECE XIII. Hémoptysie par blessure. (*Paffo hæmoptoica à vulnere, Plater. prax. med. tom. III. pag. 705. — Vulnus pulmonis, Heiß. chir. tom. I. pag. 121.*)

ESPECE XIV. Hémoptysie par effort violent.

GENRE V. Vomissement de sang. — Vomissement de sang ordinairement noirâtre, souvent mêlé avec des matières contenues dans l'estomac, & pré-

VII. CLASSE, ORDRE VIII. 99

cédé de plus ou moins d'anxiété, & de douleur dans la région épigastrique. (*Vomitus cruentus*, *Lommii*, *obs. med. pag. 171.* — *Vomitus cruentus*, *Fred. Hoffm. tome II. pag. 212.* — *Vomitus cruentus*, *Stahl. Theoria medica vera*, *pag. 775.*)

ESPECE I. Vomissement de sang par suppression des hémorroïdes. (*Vomitus cruentus à fluxu hemorrhoidalimminuto vel cessante*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 213.*)

ESPECE II. Vomissement de sang par retard, diminution, ou suppression du flux menstruel. (*Vomitus cruentus à fluxus menstrualis suppressione vel diminutione vel intermissione*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 213.*)

ESPECE III. Vomissement de sang par substances véneneuses.

ESPECE IV. Vomissement de sang par violents emménagogues. (*Vomitus cruentus à validis emmenagogis*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 213.*)

ESPECE V. Vomissement de sang par mauvaises qualités de l'air. (*Vomitus cruentus ab aeris vito*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 213.*)

ESPECE VI. Vomissement de sang noirâtre, avec déjection d'une semblable matière, souvent d'une odeur forte; ordinairement avec tumeur du foie, ou de la rate. (*Seccus niger, sive morbus niger Hypocriti*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 214, 216 & 218.*)

GENRE VI. Sueur sanguinolente. (*Sudor cruentus*, *Ballon. opera*, *tom. I. pag. 195.*)

GENRE VII. Pisslement de sang. — Évacuation de sang par les voies urinaires. (*Mictus sanguinis — Hæmorrhagia ex urinariis viis*, *Fred. Hoffm. tome II. pag. 231.*)

ESPECE I. Pisslement de sang par un calcul dans les reins. (*Mictus sanguineus à calculo renibus impasto*, *Sydenh. tom. I. pag. 442.* — *Mictus cruentus à calculo in rene delitescente*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 233.*)

ESPECE II. Pisslement de sang par corrosion ou ulcère de la vessie. (*Mictus cruentus à vesicæ erosione & ulceræ*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 233.*)

ESPECE III. Pisslement de sang par purgatifs ou urinaires violents. (*Mictus cruentus ab aceroribus puigantibus aut diureticis*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 234.*)

ESPECE IV. Pisslement de sang par des espèces d'hémorroïdes sur la face interne de la vessie, ou proche du sphincter. (*Mictus cruentus à vasis vesical ejusque sphincteris dilatatis atque rupiis*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 232.*)

ESPECE V. Pisslement de sang dans les maladies aiguës, particulièrement dans les maladies exanthématiques. (*Mictus sanguineus in petechiis*, *Sydenham*, *tom. I. pag. 252 & 253.* — *in morbillis*, *pag. 237, 238 & 241.* — *in variolis confluentibus & discretis*, *pag. 85.*)

ESPECE VI. Pisslement de sang par un coup, ou par une chute. (*Mictus cruentus à causa extera*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 233.*)

ESPECE VII. Évacuation d'urine sanguinolente, par un ver contenu dans la vessie. (*Effus. de med. d'Edimbourg*, *tom. VI. pag. 381.*)

ESPECE VIII. Pisslement de sang par suppression des hémorroïdes. (*Mictus cruentus à suppressis hemorrhoidibus*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 232.*)

ESPECE IX. Pissement de sang par de violentes courses à pied ou à cheval. (*Mictus sanguinis à motu corporis fortiori, maximè equitatione*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 233.)

GENRE VIII. *Flux hémorroïdal.* — Évacuation sanguine par des tumeurs variqueuses situées autour de l'anus, & nommées hémorroïdes. (*Fluxus hemorrhoidalis*, Senn. tom. IV. pag. 473. — *Hemorrhoidal fluxus nimius*, Fred. Hoffm. tome II. pag. 219.)

ESPECE I. Flux hémorroïdal périodique.

ESPECE II. Flux hémorroïdal par des excréments trop durs.

ESPECE III. Flux hémorroïdal par violente équitation.

GENRE IX. *Perte de sang.* — Évacuation abondante de sang par l'utérus, hors le temps de la menstruation. (*Uteri haemorrhagia immoderata*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 224.)

ESPECE I. Évacuation abondante de sang par l'utérus, produite par asphyxie spasmodique. (*Uteri haemorrhagia à spasmis*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 225.)

ESPECE II. Évacuation abondante de sang par l'utérus, à l'âge où le flux menstruel doit cesser. (*Haemorrhagia uteri circa annum quinquagesimum sanguinis menstrualis excretionem cessante*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 225.)

ESPECE III. Hémorragie de l'utérus pendant l'accouchement, ou par la rupture du cordon ombilical, ou par l'ouverture d'un vaisseau de la matrice, ou par le décollement d'une partie du placenta. (*Sanguinis fluxus tempore partus, ruptura funis umbilicalis aut vasis uteri, aut solutione partis placentae ab utero*, Roeder. elem. art. obst. pag. 311.)

ESPECE IV. Hémorragie de l'utérus par la présence d'un corps étranger dans la matrice après l'accouchement. (*Haemorrhagia uteri à relictis post partum*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 225.)

ESPECE V. Perte de sang dans les derniers temps de la grossesse. (*Levret, art des accouchements*, pag. 342.)

ESPECE VI. Perte de sang immoderée après l'accouchement. (*Accouchement accompagné de perte de sang immoderée*, Puços, traité des accouch. pag. 167. — *Pertes de sang*, Levret, art des accouch. pag. 155.)

ESPECE VII. Hémorragie utérine pendant la grossesse, (*Levret, art des acc. p. 49.*)

ESPECE VIII. Hémorragie de l'utérus par plethora. (*Haemorrhagia uteri à plethora*, Fred. Hoffm. tom. II. pag. 225.)

GENRE X. *Flux menstrual trop abondant.* (*Nimius mensium fluxus*, Sennert. tom. IV. pag. 666. — *Fluxus mensium immodicus*, Freind opera medic. pag. 127.)

ESPECE I. Flux menstrual continuant au delà de son terme. (*Fluxus menstrualis ultra confuetum tempus subsistens*, Senn. tom. IV. pag. 672.)

ESPECE II. Flux menstrual trop abondant par plethora. (*Nimius mensium fluxus à plethorâ*, Senn. tom. IV. pag. 666.)

ESPECE III. Flux menstrual reparoissant plusieurs fois dans le mois. (*Menses inordinari*, Senn. tom. IV. pag. 671.)

VII. CLASSE, ORDRE VIII. 101

ESPECE IV. Flux menstruel continu & en très-petite quantité. (*Mensum silicium, Senn. tom. IV. pag. 665.*)

GENRE XI. Flux menstruel péchant par la couleur & la consistance. (*Menses vitiati quoad colorem & consistentiam, Senn. tom. IV. pag. 670.*)

GENRE XII. Évacuation abondante de sang par l'anus, sans hémorroiades, sans ténèse, & avec peu de coliques.

ESPECE I. Hémorragie par l'anus provenant de la suppression du flux menstruel.

ESPECE II. Hémorragie par l'anus à la suite d'une diarrhée, ou d'une dysenterie.

ESPECE III. Hémorragie par l'anus à la suite de violents exercices.

ESPECE IV. Hémorragie périodique par l'anus.

GENRE XIII. Dysenterie. — Évacuation par l'anus, de matières muqueuses, ordinairement sanguinolentes, avec ténèse & tranchées. (*Dysenteria. — Dysenteria, Senn. tome IV. pag. 448. — Dysenteria, Fred. Hoffm. tome III. pag. 151. — Dysenteria, Baglivi, pag. 107. — Dysenteria, Morgagni, de sedib. morb. tom. I. pag. 29.*)

ESPECE I. Dysenterie bénigne. (*Dysenteria benigna, Fred. Hoffm. tom. III. p. 152.*)

ESPECE II. Dysenterie maligne de 17 ou 20 jours.

ESPECE III. Dysenterie épidémique. (*Dysenteria epidemica partis anni 1669, atque integrorum 1670, 71 & 72, Sydenh. tom. I. pag. 108. — Dysenteria bilio-fo-contagiosa, Degner, historia medica de dysenteria. — Dysenteria epidemica, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 162, 163 & 164.*)

ESPECE IV. Dysenterie des camps. (*Dysenterie des camps, Monroe, med. d'Armées, tom. II. pag. 89 & 125.*)

GENRE XIV. Amaigrissement de tout le corps, par dysenterie, ou par diarrhée, avec fièvre. (*Tabes à dysenteria vel diarrhaea, Morton, tom. I. pag. 15.*)

GENRE XV. Déchirement de la fourchette pendant l'accouchement. (*Puzos, traité des accouch. pag. 125.*)

GENRE XVI. Déchirement total de l'espace qui sépare la vulve d'avec l'anus, par le passage difficile de l'enfant. (*Puzos, traité des accouch. pag. 128.*)

GENRE XVII. Hémorragie par la chute prématurée du cordon ombilical, (*Levret, art des acc. pag. 244.*)

GENRE XVIII. Plaie. — Solution de continuité, par un instrument tranchant ou aigu, avec épanchement plus ou moins considérable de sang. (*Vulnus. — Vulnus, Boërh. van Swieten, de cognosc. morb. aphor. 145. — Vulnus, Heister, inst. chirurg. tom. I. pag. 41. — Plaies d'armes blanches, Ravatot, chirurg. d'armée, pag. 417. — Vulnera, Magatti, de vulneribus, libri duo.*)

102 *VII. CLASSE, ORDRE VIII.*

ESPECE I. Plaies de la tête. (*Vulnera capitis*, Boërh. van Swier. de cogn. morb. aphor. 239. — *Capitis vulnera*, Heist. inst. chir. tom. I. pag. 129. — *Vulnera & ictus capitis*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 285 & 297.)

ESPECE II. Plaies de la poitrine. (*Vulnera thoracis*, Boërh. van Swier. de cogn. morb. aphor. 297. — *Pectoris vulnera*, Heist. inst. chir. tom. I. pag. 117. — *Vulnera & ictus colli*, pectoris & dorfi, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 312.)

ESPECE III. Plaies du ventre. (*Vulnera abdominis*, Boërh. van Swier. de cogn. morb. aphor. 306. — *Vulnera & ictus ventris & lumborum*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 321.)

ESPECE IV. Plaies des extrémités supérieures & inférieures. (*Ravaton*, chirurg. d'armée, pag. 503, 518 & 608. — *Vulnera & ictus artuum*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 331.)

GENRE XIX. *Plaies d'armes à feu.* — Solution de continuité par des armes à feu, avec évacuation de sang plus ou moins grande. (*Vulnera à machinis ignivomis & sclopetis*, Heist. inst. chir. tome I. pag. 82. — *Plaies d'armes à feu*, Ravaton, chirurg. d'armée pag. 83.)

ESPECE I. Plaies de la tête, par des armes à feu. (Ravaton, chir. d'armée, pag. 144.)

ESPECE II. Plaies du col & de la poitrine, par des armes à feu. (Ravaton, chir. d'armée, pag. 190 & 200.)

ESPECE III. Plaies du bas ventre, par des armes à feu. (Ravaton, chir. d'armée pag. 227.)

ESPECE IV. Plaies des extrémités supérieures & inférieures, par des armes à feu. (Ravaton, chir. d'armée, pag. 246 & 321.)

GENRE XX. Solution de continuité, par un instrument empoisonné. (*Vulnera veneno vexata*, Heist. inst. chir. tome I. pag. 162.)

