

## HUITIEME CLASSE. MALADIES PAR DÉPLACEMENT DES PARTIES ORGANIQUES.

### ORDRE PREMIER.

#### DÉPLACEMENTS des parties organiques molles.

GENRE I. Sortie involontaire d'une partie de la langue hors de la bouche.  
(*Linguae procidentia*, *Plater, prax. med. tom. III. pag. 530.*)

ESPECE I. Déplacement involontaire de la langue, avec grandeur excessive produite par une matière véneneuse. (*Magnitudo linguae nimia à veneno*, *Senn. tom. III. pag. 251.*)

ESPECE II. Déplacement involontaire de la langue par paralysie.

ESPECE III. Déplacement involontaire de la langue, avec grandeur excessive produite par des matières pituitueuses. (*Magnitudo linguae nimia à materia pituitosa*, *Senn. tom. III. pag. 251.*)

ESPECE IV. Déplacement involontaire de la langue, avec grandeur excessive produite par l'action du mercure. (*Nimia linguae magnitudo à mercurio*, *Astruc de morb. veneris*, *tom. I. pag. 476.*)

ESPECE V. Déplacement involontaire de la langue, avec grandeur excessive produite par abondance de sang. (*Magnitudo linguae nimia, à sanguine*, *Senn. tom. III. pag. 251.*)

GENRE II. Sortie d'une partie du globe de l'œil hors de l'orbite. (*Oculi procidentia*, *Senn. tom. III. pag. 224.*)

ESPECE I. Déplacement d'une partie du globe de l'œil par un coup. (*Sortie de l'œil hors de l'orbite par un coup*, *Maitre-Jan, malad. de l'œil*, *pag. 307.*)

ESPECE II. Déplacement d'une partie du globe de l'œil, par paralysie des muscles de l'œil. (*Procidentia oculi à resolutione muscularum*, *Senn. tom. III. pag. 224.*)

ESPECE III. Déplacement d'une partie du globe de l'œil, par inflammation de ses parties environnantes. (*S. Yves, malad. des yeux*, *pag. 106.*)

ESPECE IV. Déplacement d'une partie du globe de l'œil, par des tumeurs dans la cavité orbitaire, dures, peu douloureuses, & d'un accroissement insensible. (*Déplacement du globe de l'œil, par l'accroissement des corps qui contiennent ou soutiennent le globe de l'œil*, *S. Yves malad. des yeux*, *pag. 109.*)

104 VIII. CLASSE, ORDRE I.

GENRE III. Chute des paupières. — Déplacement involontaire des paupières.  
(*Prostis*, *Heister. inst. chir. tom. I. pag. 510.*)

ESPECE I. Chute de la paupière supérieure par relâchement de la peau. (*Præsidentia palpebrarum à nimia cutis laxitate*, *Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 511.*)

ESPECE II. Chute de la paupière supérieure par paralysie des muscles de la paupière supérieure. (*S. Yves, malad. des yeux*, pag. 80.)

GENRE IV. Déplacement involontaire de la paupière supérieure, par son union au globe de l'œil. (*Prosphysis*, *Mauchart, in Haller. Disputation. chirurg.*)

GENRE V. Déplacement des paupières par leur union entre elles. (*Palpebræ concreta sive ancyloblepharum*, *Heister. inst. chirurg. tom. I. pag. 514.* — *Union des paupières contre nature*, *S. Yves, malad. des yeux*, pag. 98.)

GENRE VI. Renversement des paupières, avec impossibilité de recouvrir entièrement le globe de l'œil.

ESPECE I. Renversement des paupières, avec les cils tournés vers le globe de l'œil. (*Trichiasis*, *Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 512.* — *Trichiaise*, *S. Yves, malad. des yeux*, pag. 76.)

ESPECE II. Renversement des paupières en dehors. (*Ectropium*, *Heist. inst. chir. tom. I. pag. 517.*)

GENRE VII. Solution de continuité à la paupière supérieure, ou à la paupière inférieure. (*Éraillement des paupières*, *S. Yves, malad. des yeux*, pag. 85.)

GENRE VIII. Obturation de la pupille. — Déplacement des bords de l'uvée par leur union entr'eux. (*Pupilla nimis conficta vel clausa*, *Heist. inst. chir. tom. I. pag. 578.*)

GENRE IX. Plique. — Embrouillement chronique & contagieux des cheveux & de la barbe, avec douleur & faiblesse des articulations (*Plica polonica*, *Senn. tom. V. pag. 86.*)

GENRE X. Hernie du cerveau. — Tumeur sur la tête des nouveaux-nés, formée par les parties contenues dans le cerveau. (*Tumeur à la tête d'un enfant nouveau-né*, *Le Dran, observ. de chir. tom. I. pag. 1.*)

GENRE XI. Bec-de-lièvre. — Solution de continuité de la levre supérieure, ou de la levre inférieure. (*Labra leporina*, *Heist. inst. chir. tom. II. p. 626.* — *Bec-de-lièvre*, *Mémoires de l'Acad. de chir. in-4°, tom. IV. pag. 385.*)

GENRE XII. Hernie de l'estomac. — Déplacement de l'estomac, formant une tumeur plus ou moins sensible sur le ventre. (*Mémoires de l'Acad. de chir. in-4°*)

GENRE XIII. Hernie intestinale. — Déplacement de l'intestin formant une tumeur, plus ou moins sensible sur le ventre, ou sur les parties externes du bassin. (Entérocele. — Enterocèle, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 180. — Hernies, le Blanc, maniere d'opérer les hernies, pag. 1.)

ESPECE I. Hernie inguinale sans accident fâcheux.

ESPECE II. Hernie inguinale dans le scrotum. (*Hernia scrota*, Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 772.)

ESPECE III. Hernie inguinale dans la vulve. (*Hernia vulvæ*, Plasner. inst. chirurg. pag. 502.)

ESPECE IV. Bubonocele. — Hernie inguinale, avec étranglement & inflammation. (Bubonocele, Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 750.)

ESPECE V. Hernie intestinale de l'ombilic. (*Omphalocoèle*, Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 735.)

ESPECE VI. Hernie intestinale par l'échancrure sciatique.

ESPECE VII. Hernie intestinale par le vagin. (*Hernie entérvaginale*, Levret, observ. sur les polypes de matrice, pag. 157. — Entérocele vaginale, Hoin, *essai sur les hernies*, pag. 250.)

ESPECE VIII. Hernie intestinale au périné. (*Entérocele périndale*, Hoin, *essai sur les hernies*, pag. 243.)

ESPECE IX. Hernie intestinale par les trous ovalaires du bassin. (*Mémoires de l'Acad. de chirurg.* in-4. tom. I. pag. 709.)

ESPECE X. Hernie crurale. (*Hernia cruralis, fove femoralis*, Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 769.)

ESPECE XI. Hernie ventrale. (*Ventriss hernia fove hernia ventralis*, Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 747.)

ESPECE XII. Hernie avec étranglement par accumulation des matières contenues dans l'intestin, avec caractère d'inflammation lente. (*Hernie avec étranglement par engouement de matières*, Mém. de l'Acad. de chir. in-4. tom. IV. pag. 247.)

ESPECE XIII. Hernie avec étranglement par inflammation. (Mém. de l'Acad. de chirurg. in-4. tom. IV. pag. 244.)

ESPECE XIV. Hernie intestinale avec gangrene. (Mém. de l'Acad. de chir. in-4. tom. I. pag. 337. tom. III. pag. 145. tom. IV. pag. 164.)

GENRE XIV. Déplacement peu sensible de l'intestin dans les parties où les hernies peuvent se former, avec pincement, douleur aiguë, vomissement & inflammation plus ou moins vive.

GENRE XV. Epiplocele. — Déplacement de l'épiploon dans les parties où les hernies intestinales peuvent se former. (Epiplocele, Heister. inst. chir. tom. II. pag. 786.)

ESPECE I. Epiplocele périnéale. (*Hoin, essai sur les hernies*, pag. 353.)

ESPECE II. Epiplocele vaginale. (*Hoin, essai sur les hernies*, pag. 365.)

GENRE XVI. *Epiplo-entérocele*. — Déplacement de l'intestin & de l'épipoloon dans les divers endroits où la hernie intestinale peut avoir lieu.

ESPECE I. Epiplo-intéromphale. — Hernie epiplo-intestinale du nombril. (*Hernia umbilicalis omenti & intestinorum*, *Heist, inst. chirurg. tom II*, p. 736.)

ESPECE II. Oschéocele. — Déplacement de l'intestin & de l'épipoloon dans le scrotum. (*Oschéocele*, *Platner, inst. chirurg.* pag. 533.)

ESPECE III. Hernie de l'intestin & de l'épipoloon par le vagin. (*Hernie entéro-epiplo-vaginale*, *Levret, observ. sur les polypes*, pag. 165. *Hernie entéro-epiplo-vaginale*, *Hoin, essai sur les hernies*, pag. 321.)

GENRE XVII. Déplacement de la matrice.

ESPECE I. Situation oblique de la matrice. (*Inclinaison de la matrice*, *Deventer, observ. sur les accouchem.* pag. 315. — *Situs uteri obliquus*, *Roeder, elem. art. obstétricar.* pag. 213. — *Obliquité de la matrice*, *Mém. de l'Acad. de chirurg. in-4. tom. III.* pag. 386.)

ESPECE II. Déplacement de la matrice par les anneaux des muscles du bas ventre. (*Mémoires de l'Acad. de chirurg. in-4. tom. III.* pag. 387.)

ESPECE III. Descente complète de la matrice, avec renversement total de son fond & de son corps, même de son col par son orifice propre, (*Levret, observ. sur les polypes*, pag. 138. — *Renversement de la matrice*, *Mémoires de l'Acad. de chirurg. in-4. tom. III.* pag. 362.)

ESPECE IV. Descente complète de la matrice sans renversement (*Levret, observ. sur les polypes*, pag. 117.)

ESPECE V. Descente incomplète de la matrice sans renversement. (*Levret, observ. sur les polypes*, pag. 113.)

ESPECE VI. Descente de la matrice, avec renversement incomplet de son fond par son orifice, (*Levret, observ. sur les polypes*, pag. 129. — *Mém. de l'Acad. de chir. in-4. tom. III.* pag. 375.)

ESPECE VII. Descente de la matrice, contenant un fœtus. (*Mém. de l'Acad. de chir. in-4. tom. III.* pag. 369.)

GENRE XVIII. Déplacement du vagin. (*Vagina procidentia*, *Heister, inst. chirurg. tom. II.* pag. 1030. — *Renversement du vagin*, *Levret, observ. sur les polypes*, pag. 168. — *Déplacement du vagin*, *Mémoires de l'Acad. de chirurg. in-4. tom. III.* pag. 390.)

GENRE XIX. *Cistocele*. — Déplacement de la vessie. (*Hernie de la vessie*, *Mémoires de l'Acad. de chirurg. in-4. tom. II.* pag. 1.)

ESPECE I. Hernie crurale de la vessie. (*Mém. de l'Acad. de chir. in-4. tom. II.* p. 23.)

ESPECE II. Hernie de la vessie par un des anneaux des muscles du bas ventre. (*Mém. de l'Acad. de chirurg. in-4. tom. II* pag. 41.)

ESPECE III. Hernie de la vessie, au périné. (*Mém. de l'Acad. de chirurg. in-4. tom. IV.* pag. 182. — *Cistocele périnéale*, *Hoin, essai sur les hernies*, pag. 344.)

VIII. CLASSE, ORDRE I. 107

ESPECE IV. Hernie de la vessie par le vagin. (*Levret, observ. sur les polypes, pag. 150. — Cistocele vaginale, Hoin, essai sur les hernies, pag. 366.*)

ESPECE V. Hernie de la vessie & de l'intestin par le vagin. (*Entero-cistocele vaginale, Hoin, essai sur les hernies, pag. 365.*)

ESPECE VI. Hernie de la vessie, avec l'épipoon, ou avec l'intestin, ou avec l'un & l'autre, par les anneaux des muscles du bas-ventre. (*Mém. de l'Acad. de chirurg. in-4. tom. II. pag. 10.*)

GENRE XX. Chute du fondement. — Déplacement de l'anus, ou de l'extrémité inférieure de l'intestin rectum. (*Ani procidentia sive intestini recti prolapsus, Heister. inst. chirurg. tom. II. pag. 1044. — Descension du rectum, Hoin, essai sur les hernies, pag. 348. — Intestini recti prolapsus, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 40.*)

ESPECE I. Chute de l'anus par le relâchement, ou par la paralysie des muscles de l'anus. (*Podicis muscularum resolutio, Plater. prax. med. tom. III. pag. 538.*)

ESPECE II. Chute du fondement des enfants. (*Brouet, educ. med. des enfants, tom. II. pag. 115.*)

ESPECE III. Chute de l'anus & du rectum par de violents efforts. (*Prolapsus podicus & recti intestini a conatus maximis, Plater. prax. med. tom. III. pag. 537.*)

GENRE XXI. Déplacement des testicules. (*Situs testium mutatus, Senn. tom. IV. pag. 600.*)

ESPECE I. Déplacement naturel des testicules. (*Senn. tom. IV. pag. 600.*)

ESPECE II. Déplacement des testicules par l'inflammation du cordon, ou par la forte contraction du muscle cremaster. (*Situs testium mutatus ab inflammatione ligamentorum, Senn. tom. IV. pag. 600.*)

GENRE XXII. Distorsion du membre viril. (*Distorsio penis, Senn. tom. IV. pag. 604.*)

GENRE XXIII. Phimosis de naissance. — Prépuce trop long (*Phimosis à nativitate, Senn. tom. IV. pag. 606.*)

GENRE XXIV. Paraphimosis de naissance. — Prépuce trop court. (*Preputium cursum, Senn. tom. IV. pag. 607.*)

GENRE XXV. Solution de continuité d'un tendon.

ESPECE I. Solution de continuité des tendons par un instrument tranchant. (*Tendines disseciti, Heister. inst. chirurg. tom. II. pag. 1095.*)

ESPECE II. Solution de continuité d'un tendon par une violente contraction. (*Rupture du tendon, Petit, malad. des os, tom. II. pag. 289.*)

GENRE XXVI. Doigts courbés, ou adhérant les uns aux autres par une cicatrice défectueuse. (*Digitii cohærentes & curvati a vitiosa cicatrice, Celsi opera omnia, pag. 497.*)

## ORDRE SECOND.

DÉPLACEMENT des Parties Organiques dures.

**GENRE I.** *Luxation.* — Déplacement des extrémités osseuses articulées & mobiles, avec difficulté & souvent impossibilité de mouvoir la partie affectée. (*Luxatio*, Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 358. — *Luxatio*, Heister. inst. chirurg. tom. I. pag. 221. — *Luxation*, du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 1.)

**ESPECE I.** Luxation par l'action violente d'un corps. (*Luxation par des efforts violents*, du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 13. — *Luxatio à vi externa extendeante, intorquente, expellente*, Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 361.)

**ESPECE II.** Luxation par la grandeur excessive de la tête articulée. (du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 14.)

**ESPECE III.** Luxation par le gonflement de la cavité articulaire. (du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 14.)

**ESPECE IV.** Luxation par abondance & mauvaise qualité de la synovie. (*Luxation par le gonflement des ligaments, ou la coagulation des humeurs synoviales*, du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 21.)

**ESPECE V.** Luxation par la faiblesse des ligaments. (du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 14.)

**ESPECE VI.** Luxation par la violente contraction des muscles.

**ESPECE VII.** Luxation de la mâchoire inférieure. (*Inferior maxilla luxata*, Heister. inst. chirurg. tom. I. pag. 233. — *Luxation de la mâchoire inférieure*, du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 78.)

**ESPECE VIII.** Luxation de la tête, ou de la première vertébre, ou de la seconde vertébre avec la première. (*Caput luxatum*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 235. — *Luxatio nucha*, Morgagni, de fed. morb. tom. II. pag. 354.)

**ESPECE IX.** Luxation des vertébres de l'épine. (*Luxatio vertebrarum spina*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 237. — *Luxatio vertebrarum spina cum fractura*, Morgagni, de fed. morb. tom. II. pag. 356.)

**ESPECE X.** Luxation du coccyx. (*Os cocygis luxatum*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 240.)

**ESPECE XI.** Luxation de l'humérus. (*Humerus luxatus*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 243. — *Luxation du bras*, du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 133.)

**ESPECE XII.** Luxation du cubitus. (*Cubitus luxatus*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 248. — *Luxation du coude*, du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 166.)

**ESPECE XIII.** Luxation du rayon. (du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 175.)

**ESPECE XIV.** Luxation des os du carpe. (*Officula carpi luxata*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 251.)

VIII. CLASSE, ORDRE II. 109

ESPECE XV. Luxation du métacarpe. (*Metacarpus luxatus*, Heiß. inf. chirurg. tom. I. pag. 251.)

ESPECE XVI. Luxation de la main. (*Manus luxata*, Heiß. inf. chirurg. tom. I. pag. 250.)

ESPECE XVII. Luxation des doigts. (*Digitii luxati*, Heiß. inf. chirurg. tom. I. pag. 251. — *Luxation des doigts*, du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 207.)

ESPECE XVIII. Luxation du fémur. (*Femur luxatum*, Heiß. inf. chirurg. tom. I. pag. 252. — *Luxation de la cuisse*, du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 221.)

ESPECE XIX. Luxation du tibia sur le fémur. (*Genu luxatum*, Heiß. inf. chirurg. tom. I. pag. 258. — *Luxation du genou*, du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 258.)

ESPECE XX. Luxation de la rotule. (*Patella luxata*, Heiß. inf. chirurg. tom. I. pag. 258.)

ESPECE XXI. Luxation du péroné. (*Fibula luxata*, Heiß. inf. chirurg. tom. I. pag. 259.)

ESPECE XXII. Luxation du pied. (*Tali five pedis luxatio*, Heiß. inf. chirurg. tom. I. pag. 260. — *Luxation du pied*, du Verney, malad. des os, tom. II. p. 267.)

ESPECE XXIII. Luxation de la clavicule. (*Clavicula luxata*, Heiß. inf. chirurg. tom. I. pag. 241.)

ESPECE XXIV. Luxation des côtes. (*Luxatae costae*, Heiß. inf. chirurg. tom. I. pag. 240. — *Luxation des côtes*, Mém. de l'Acad. de chirurg. in-4. tom. IV. pag. 573.)

ESPECE XXV. Déplacement du cartilage xiphoïde chez les enfants. (*Brouzet, educ. med. des enfants*, tom. II. pag. 151.)

GENRE II. *Entorse*. — Déplacement momentané des articulations, avec distraction violente des ligaments articulaires. (*Entorse*, du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 65.)

ESPECE I. Déplacement momentané des articulations très-mobiles. (du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 65.)

ESPECE II. Déplacement momentané des articulations peu mobiles. (*Diastase ou écartement des os*, du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 72.)

GENRE III. *Écartement des épiphyses*. — Écartement des os, unis par des cartilages. (*Écartement des pièces offuses unies par synchondrose*, du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 9.)

ESPECE I. Écartement des os du bassin pendant l'accouchement. (*Levyt, art des accouchemens*, pag. 5.)

GENRE IV. *Écartement des os*, unis par suture. (du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 2.)

GENRE V. Dents mal placées pour la mastication & pour le mouvement de la langue. (*Situs vitiatus dentium*, Senn. tom. III. pag. 265.)

110 VIII. CLASSE, ORDRE II.

GENRE VI. Solution de continuité entre les lames osseuses, par un instrument tranchant ou aigu, sans division entière de l'os. (*Ossium laetio per tela acuta*, Heist. inst. chir. tom. I. pag. 216.)

GENRE VII. Fracture. — Solution de continuité d'un os. (*Fractura — Ossa fracta*, Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 339. — *Ossium fractura universæ spectatæ*, Heist. inst. chir. tom. I. pag. 164. — *Fracture en général*, du Verney, malad. des os, tom. I. pag. 9. — *Ossium fracturæ*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 345.)

ESPECE I. Fracture simple. (*Fractura simplex*, Boërh. van Swiet, de cogn. morb. aphor. 340. — *Fracture simple*, du Verney, malad. des os, tom. I. pag. 55.)

ESPECE II. Fracture compliquée. (*Fractura complicata*, Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 340. — *Fracture compliquée*, du Verney, malad. des os, tom. I. p. 91.)

ESPECE III. Fracture oblique des os longs. (*Fractura obliqua*, Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 341. — *Fracture oblique*, du Verney, malad. des os, tom. I. p. 11.)

ESPECE IV. Fissure de l'os. — Fracture en long des grands os. (*Fissura*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 171. — *Fracture en long des grands os*, du Verney, malad. des os, tom. I. pag. 156.)

ESPECE V. Fracture transversale. (*Fractura transversa*, Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 341. — *Fracture transversale*, du Verney, tom. I. pag. 10.)

ESPECE VI. Fracture avec esquilles. (*Fractura cum fragmentis ossis*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 172. — *Fractura cum fragmientis*, Boërh. van Swiet. aphor. 341.)

ESPECE VII. Fracture des os du crâne, avec enfoncement. (*Calvaria impressio*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 145.)

ESPECE VIII. Fissure des os du crâne. (*Fissura calvaria*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 141. — *Fractures du crâne*, Mém. de l'Acad. de chirurg. in-4. tom. I. p. 188.)

ESPECE IX. Fracture des os du crâne par contre-coup. (*Mém. de l'Acad. de chirurg. in-4. tom. I. pag. 212.*)

ESPECE X. Fracture des os du nez. (*Nasus fractus*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 189. — *Fracture des os du nez*, du Verney, malad. des os, tom. I. pag. 172.)

ESPECE XI. Fracture de l'apophyse zygomatique. (du Verney, malad. des os, tom. I. pag. 182.)

ESPECE XII. Fracture de la mâchoire supérieure. (*Fractura maxillæ superioris*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 190.)

ESPECE XIII. Fracture de la mâchoire inférieure. (*Maxilla inferior fracta*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 191. — *Fracture de la mâchoire inférieure*, du Verney, malad. des os, tom. I. pag. 187.)

ESPECE XIV. Fracture de l'omoplate. (*Scapula fracta*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 194. — *Fracture de l'omoplate*, du Verney, malad. des os, tom. I. pag. 223.)

ESPECE XV. Fracture de la clavicule. (*Fractura clavicularis*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 193. — *Fracture de la clavicule*, du Verney, malad. des os, tom. I. pag. 199.)

ESPECE XVI. Fracture du sternum. (*Sternum fractum*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 195. — *Fracture du sternum*, du Verney, malad. des os, tom. I. pag. 232.)

VIII. CLASSE, ORDRE II. 111

ESPECE XVII. Fracture de l'appendice xiphoïde. (*du Verney, malad. des os, tom. I.*  
pag. 233.)

ESPECE XVIII. Fracture des vertébres. (*Vertebrae fractæ, Heist. inst. chirurg.*  
*tom. I. pag. 199. — Fracture des vertébres, du Verney, malad. des os, tom. I.*  
pag. 239.)

ESPECE XIX. Fracture de l'os sacrum. (*Os sacrum fractum, Heist. inst. chirurg.*  
*tom. I. pag. 200. — Fracture de l'os sacrum, du Verney, malad. des os, tom. I.*  
pag. 241.)

ESPECE XX. Fracture du coccyx. (*du Verney, malad. des os, tom. I. pag. 241.*)

ESPECE XXI. Fracture des côtes. (*Costæ fractæ, Heist. inst. chirurg. tom. I.*  
pag. 196. — *Fracture des côtes, du Verney; malad. des os, tom. I. pag. 250.*)

ESPECE XXII. Fracture des os qui composent le bassin. (*du Verney, malad. des os,*  
*tom. I. pag. 279.*)

ESPECE XXIII. Fracture de l'humérus. (*Humerus fractus, Heist. inst. chirurg. tom. I.*  
pag. 201. — *Fracture du bras, du Verney, malad. des os, tom. I. pag. 290.*)

ESPECE XXIV. Fracture du col de l'humérus. (*Mém. de l'Acad. de chirurg. in-4.*  
*tom. IV. pag. 614.*)

ESPECE XXV. Fracture du cubitus, ou du radius. (*du Verney, malad. des os,*  
*tom. I. pag. 311.*)

ESPECE XXVI. Fracture du cubitus & du radius. (*Brachium inferius fractum, Heist.*  
*inst. chirurg. tom. I. pag. 202. — Fracture de l'avant-bras, du Verney, malad. des*  
*os, tom. I. pag. 308.*)

ESPECE XXVII. Fracture du carpe. (*Ossa carpi fracta, Heist. inst. chirurg. tom. I.*  
pag. 203.)

ESPECE XXVIII. Fracture du métacarpe. (*Fractura metacarpi, Heist. inst. chirurg.*  
*tom. I. pag. 204*)

ESPECE XXIX. Fracture des doigts. (*Digitæ fractæ, Heist. inst. chirurg. tom. I.*  
pag. 204 — *Fracture des doigts, du Verney, malad. des os, tom. I. pag. 329.*)

ESPECE XXX. Fracture du fémur. (*Femur fractum, Heist. inst. chirurg. tom. I.*  
pag. 204. — *Fracture simple de la cuisse, du Verney, malad. des os, tom. I.*  
pag. 335.)

ESPECE XXXI. Fracture du col du fémur. (*du Verney, malad. des os, tom. I.*  
pag. 354. — *Fracture du col du fémur, Mém. de l'Acad. de chirurg. in-4. tom. IV.*  
pag. 630.)

ESPECE XXXII. Fracture de la rotule. (*Patella sine rotula fracta, Heist. inst. chirurg.*  
*tom. I. pag. 211. — Fracture de la rotule, du Verney, malad. des os, tom. I.*  
pag. 375.)

ESPECE XXXIII. Fracture de la jambe. (*Fractura cruris sine tibial & fibular, Heist.*  
*inst. chirurg. tom. I. pag. 213.*)

ESPECE XXXIV. Fracture du péroné. (*du Verney, malad. des os, tom. I.*  
pag. 60.)

ESPECE XXXV. Fracture des os du pied. (*Fracta pedis ossa, Heist. inst. chirurg.*  
*tom. I. pag. 215.*)

ESPECE XXXVI. Fracture d'une ou de plusieurs dents.

112 VIII. CLASSE, ORDRE II.  
GENRE VIII. Fente des ongles. (*Fissura unguium*, Senn. tom. V. p. 93.)

GENRE IX. Conformation vitieuse des jambes relativement à leur direction. (*Lordosis*. — *Perversio situ membrorum*, Plater. prax. med. tom. III. pag. 17.)

ESPECE I. Distorsion des jambes, de maniere que les genoux & les pieds s'éloignent, & que les jambes se rapprochent. (*Lordosis varorum*. — *Contorsio pedum intro*, Plater. prax. med. tom. III. pag. 17. — *Vari*, Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 1106.)

ESPECE II. Courbure des jambes en dehors, de maniere que les pieds & les genoux se rapprochent. (*Lordosis valgorum*. — *Valgi*, Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 1106.)

ESPECE III. Caigneux. — Direction vicieuse des jambes, de maniere que les genoux tendent à se toucher, tandis que les pieds s'éloignent l'un de l'autre. (*Lordosis compernium*. — *Contorsio pedum foras*, Plater. prax. med. tom. III. pag. 17.)

GENRE X. Bosse. — Distorsion de l'épine du dos, ou des os de la poitrine, de maniere à produire une éminence plus ou moins considérable. (*Gibbositas*. — *Gibbus*, Plater. prax. med. tom. III. pag. 18. — *Gibbositas*, Senn. tom. III. pag. 328.)

ESPECE I. Bosse par courbure de l'épine. (*Dorsum incurvatum*, Heist. inst. chir. tom. II. pag. 700. — *Courbure de l'épine*, Mem. de l'Acad. de chirurg. in-4. tom. IV. pag. 596. — *Gibbositas pravo situ vertebrarum dorfi*, Morgagni, de sed. morb. tom. I. pag. 297.)

ESPECE II. Bosse par la mauvaise conformation du sternum. (du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 126.)

GENRE XI. Diffémité du bassin relativement à l'accouchement. (Levret, art des accouch. pag. 10.)

ESPECE I. Détrict supérieur du Bassin, rétréci par la trop grande saillie du bord supérieur de l'os sacrum, ou par l'aplatissement du corps des os pubis.

ESPECE II. Capacité du petit bassin, rétrécie par la mauvaise conformation de l'os sacrum, ou par les épines des os iléochiens trop portés en dedans.

ESPECE III. Arcade des os pubis trop rétrécie.

ESPECE IV. Détrict inférieur trop petit par le grand rapprochement des tubérosités des os iléochiens.

ESPECE V. Détrict inférieur gêné par la grandeur du coccyx, ou par sa courbure excessive.



CLASSE IX.