

NEUVIEME CLASSE.

MALADIES PAR RÉTENTION DE MATIERES FLUIDES, OU SOLIDES.

ORDRE PREMIER.

RÉTENTIONS de matières plus ou moins fluides dans une cavité.

GENRE I. *Hydrocéphale*. — Collection d'eau dans le crâne, avec accroissement du volume de la tête, & pour l'ordinaire avec écartement des sutures. (*Hydrocephalus internus*, Senn. tom. III. pag. 59. — *Hydrocephalus*, Carol. Pifon. de morb. à colluv. ferosa pag. 41. — *Hydrocephalus internus*, Heift. infl. chirurg. tom. I. pag. 495. — *Hydrocephalus*, Morgagni, de sed. morb. tom. I. pag. 87.)

ESPECE I. Hydrocéphale entre le crâne & les membranes du cerveau. (*Hydrocephalus inter cranium & cerebri membranas*, Senn. tom. III. pag. 59. — *Hydrocephalus inter cranium & cerebri membranas*, Boëth. van Swiet. de cognosc. morb. aphor. 1217.)

ESPECE II. Hydrocéphale entre les membranes du cerveau, ou dans les ventricules du cerveau. (*Hydrocephalus inter membranas & cerebrum*, Senn. tom. III. pag. 59. — *Hydrocephalus inter membranas ipsas cerebri, harumque duplicatras, inter has & cerebrum, inter cerebri plicas, in cavaibus ipsis*, Boëth. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 1217.)

GENRE II. *Exophthalmie*. — Grandeur excessive du globe de l'œil, par collection d'une humeur. (*Exophthalmia*. — *Groffeur & éminence contre nature du globe de l'œil*, Maître-Jan, malad. de l'œil, pag. 289.)

ESPECE I. Grandeur excessive du globe de l'œil par abondance de l'humeur vitrée. (*Groffeur contre nature du globe de l'œil, par l'augmentation du corps vitré*, Maître-Jan, malad. des yeux, pag. 290.)

ESPECE II. *Hydropisie de l'œil*. — Grosseur démesurée du globe de l'œil par abondance de l'humeur aqueuse. (S. Yves, malad. des yeux, pag. 129.)

GENRE III. *Hydropisie de poitrine*. — Collection d'eau dans la capacité de la poitrine, avec difficulté de respirer, impossibilité de se tenir couché à la renversé, toux sèche, pâleur du visage, enflure œdémateuse des pieds & particulièrement des mains, oppression subite pendant le sommeil,

Table des Maladies. P

114 IX. CLASSE, ORDRE I.

râlement, &c quelquefois fluctuation plus ou moins sensible au tact. (*Hydrothorax*. — *Hydrops Thoracis*, *Car. Pison. de morb. à colluy. ser. pag. 237.* — *Hydrops pectoris*, *Senn. tom. III. pag. 327.* — *Thoracis hydrops*, *Morgagni, de sed. morb. tom. I. pag. 136.* — *Hydrops thoracis*, *Boëth. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 1219.*)

ESPECE I. Hydropisie d'une seule cavité de la poitrine ; avec son moins grave du côté affecté que du côté sain, en frappant l'un & l'autre côté de la poitrine en même temps : avec difficulté & souvent impossibilité de se coucher sur le côté sain, de crainte de suffocation. (*Hydrops in una parte pectoris*, *Senn. tom. III. pag. 328.*)

ESPECE II. Hydropisie de poitrine dans les deux cavités. (*Aqua in toto thorace*, *Senn. tom. III. pag. 328.*)

ESPECE III. Collection d'eau dans un sac formé par la plevre. (*Hydrops pectoris fuscatus*, *Fred. Hoffm. tom. III. pag. 337.*)

ESPECE IV. Hydropisie du péricarde. (*Senac, traité du cœur, tom. II. pag. 349.* — *Hydrops pericardii*, *Morgagni, de sed. morb. tom. I. pag. 140.*)

GENRE IV. *Ascite*. — Collection d'eau dans le ventre, avec abattement des forces, tuméfaction, fluctuation, difficulté de respirer, pesanteur dans les hypocondres, urine ordinairement briquetée & en petite quantité. (*Ascites*. — *Hydrops ascites*, *Carol. Pison. de morb. à coll. serosâ, pag. 329.* — *Ascites*, *Senn. tom. IV. pag. 550.* — *Ascites*, *Boëth. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 1226.* — *Ascites*, *Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 94.*)

ESPECE I. Ascite par affection du foie. (*Ascites ab hepate*, *Carol. Pif. de morb. à coll. ser. pag. 334.* — *Ascites ab affectione hepatis*, *Fred. Hoffm. tom. III. p. 325.*)

ESPECE II. Ascite par affection de la rate. (*Ascites à lienis & reliquorum abdominalis viscerum labo*, *Fred. Hoffm. tom. III. pag. 326.*)

ESPECE III. Ascite par une trop grande boisson d'eau. (*Ascites à nimio aquæ potu*, *Car. Pifon. de morb. à coll. serof. pag. 333.*)

ESPECE IV. Ascite par l'usage immoderé des spiritueux. (*Ascites ab abusu aquæ vitæ*, *Car. Pifon. de morb. à coll. serof. pag. 337.*)

ESPECE V. Ascite par la suppression du flux menstruel, ou du flux hémorroïdal. (*Ascites à suppressione fluxus menstrualis & hemorrhoidalis*, *Car. Pifon. de morb. à coll. serof. pag. 336.*)

GENRE V. *Hydromphale*. — Tumeur indolente de l'ombilic, formée par collection d'eau ; pour l'ordinaire un peu transparente, & avec fluctuation sensible au tact. (*Hydromphalus*. — *Hydromphalon*, *Plater. prax. med. tom. III. pag. 201.* — *Hernia umbilici aquosa aut hydromphalus*, *Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 737.* — *Hydromphale*, *Dionis, traité des oper. de chirurg. commenté par la Faye, pag. 108.*)

GENRE VI. *Hydropisie de la matrice*. — Rétention d'eau dans la cavité de la marrice, avec tuméfaction circonscrite dans la région hypogastrique, douleur & maigreur de tout le corps, changement dans la situation & dans la grandeur naturelle du col de la matrice. (*Hydrops uteri*, *Senn.*

IX. CLASSE, ORDRE I. 115

tom. IV. pag. 640. — *Hydrops uteri*, Carol. Pison. de morb. à coll. serosa. pag. 369. — *Hydrops uteri*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 326. — *Hydrops uteri*, Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 1224.)

ESPECE I. Hydropisie de matrice, avec foetus. (*Hydrops uteri cum fetus*, Senn. tom. IV. pag. 644. — *Hydrops uteri cum graviditate*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 326.)

ESPECE II. Collection & rétention d'eau, entre les parois de la matrice & celles des membranes du placenta. (*Pulos*, traité des accouch. pag. 86.)

ESPECE III. Collection d'eau, entre une portion des membranes de l'arriere-saix.

ESPECE IV. Hydropisie de matrice, par des hydatides. (*Hydrops uteri à vesiculis*, Carol. Pif. de morb. à coll. serosa. pag. 369.)

GENRE VII. Hydropisie des ovaires. — Tumeur dure & fixe dans la région hypogastrique; ordinairement sur une des parties de l'hypogastre; avec distension considérable du bas ventre; sans changement sensible de situation & de grandeur du col de la matrice. (*Hydrops ovariorum*, Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 1223. — *Hydropisie de l'ovaire*, Smellie, obs. sur les accouch. tom. II. pag. 179.)

GENRE VIII. Hydropisie de l'articulation. — Tumeur de l'articulation peu douloureuse, formée par l'amas d'une humeur plus ou moins fluide dans la capsule articulaire, gênant le mouvement articulaire, avec fluctuation plus ou moins sensible, sans changement de couleur des téguments (*Hydrops articulorum*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 343.)

ESPECE I. Hydropisie de l'articulation, par un coup, avec vive douleur, ramollissement & carie légère des cartilages & des os. (*Tumeur blanche*, Effais & obs. de med. d'Edimbourg, tom. IV. pag. 367 & 373.)

ESPECE II. Hydropisie simple de l'articulation, par un coup. (*Hydrops articuli post lapsum*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 343.)

ESPECE III. Hydropisie de l'articulation chez les femmes en couche. (*Tumeur blanche chez les femmes en couche par la fièvre de lait*, Effais & obs. de med. d'Edimbourg, tom. IV. pag. 380.)

ESPECE IV. Hydropisie de l'articulation par virus scrophuleux.

ESPECE V. Hydropisie de l'articulation sans cause évidente.

GENRE IX. Anevrystme. — Tumeur, avec pulsation plus ou moins sensible; cédant en partie sous le doigt, plus ou moins douloureuse, formée par la dilatation d'une portion des parois d'une artère, & communiquant immédiatement avec la cavité de l'artère. (*Anevrystma*. — *Anevrysma*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 414.)

ESPECE I. Anevrystme vrai. (*Anevrystma verum*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 414.)

ESPECE II. Anevrystme faux. (*Anevrystma spurium*, Heist. inst. chirurg. tom. I. p. 414.)

GENRE X. Varice. — Tumeur peu douloureuse, sans pulsation, cédant en

116 IX. CLASSE, ORDRE I.

partie sous le doigt, formée par la dilatation d'une portion des parois d'une veine, & communiquant immédiatement avec la cavité de la veine. (*Varix. — Varix, Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 1101.*)

ESPECE I. Varices par des courses forcées, ou par d'autres mouvements violents & rapides des jambes.

ESPECE II. Varices pour avoir resté trop longtemps debout ou assis.

ESPECE III. Varices des femmes grosses. (*Levret, art des accouch. pag. 217.*)

ESPECE IV. Varices aux jambes & aux cuisses par l'action du feu.

GENRE XI. *Hémorroides*. — Tumeurs rouges, plus ou moins molles & dououreuses, situées au bord de l'anus, donnant quelquefois du sang. (*Hæmorrhoides. — Hæmorrhoides, Senn. tom. IV. pag. 472. — Hæmorrhoides, Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 1047. — Hæmorrhoides, Morgagni, de sed. morb. tom. II. p. 38.*)

ESPECE I. Hémorroides externes. (*Hæmorrhoides externæ, Senn. tom. IV. pag. 473.*)

ESPECE II. Hémorroides internes. (*Hæmorrhoides cæcæ, Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 1050.*)

ESPECE III. Hémorroides des femmes enceintes. (*Levret, art des accouch. pag. 214.*)

ESPECE IV. Hémorroides des femmes accouchées. (*Levret, art des accouch. p. 187.*)

GENRE XII. *Tumeur de la vésicule du fiel, par abondance de la bile*. — Tumeur plus ou moins éminente, dans l'endroit qui répond à la vésicule du fiel, avec anxiété, constriction douloureuse dans les hypochondres, particulièrement dans l'hypochondre droit ; quelquefois avec couleur jaunâtre de la peau & de l'albuginée. (*Mém. de l'Acad. de chirurg. tom. I. in-4. pag. 155.*)

GENRE XIII. *Hydatide*. — Tumeur capsuleuse, transparente, remplie d'une humeur limpide, quelquefois située dans le tissu cellulaire, rarement seule ; plus souvent en grand nombre, réunies par des pédicules & par un tissu cellulaire. (*Hydatis. — Hydatides, Morgagni, de sedibus & caus. morb. tom. II. pag. 104 & 110. — Hydatides, Carol. Pison. de morb. à colluv. seros. pag. 439.*)

ESPECE I. Hydatides dans la matrice. (*Smellie, obs. sur les accouch. tom. II. pag. 119.*)

GENRE XIV. *Phlyctènes*. — Vésicules remplies d'une humeur transparente, scellées sur les téguments. (*Phlyctæna, Plater. prax. med. tom. III. p. 202.*)

ESPECE I. Phlyctènes par le feu. (*Phlyctæna ab igne, Senn. tom. V. pag. 32.*)

ESPECE II. Phlyctènes par la mauvaise qualité des humeurs. (*Phlyctæna ab humore acri, Senn. tom. V. pag. 32.*)

ESPECE III. Phlyctènes par le frottement réitéré d'un corps dur.

ESPECE IV. Phlyctènes des paupières & de la conjonctive. (*S. Yves, maled. des yeux, pag. 193.*)

GENRE XV. *Abcès.* — Tumeur, avec fluctuation plus ou moins sensible au tact, & douleur plus ou moins forte ; presque toujours précédée d'inflammation, formée par une matière opaque, plus ou moins liquide, ordinairement blanchâtre, quelquefois ichoreuse. (*Abscessus*. — *Abcesso*. *Senn. tom. V. pag. 7.* — *Abscessus*, *Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 402.*)

ESPECE I. *Abcès par une tumeur inflammatoire.* (*Abscessus*, *Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 402.* — *Abscessus*, *Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 273.*)

ESPECE II. *Dépot.* — *Abcès*, sans être précédé d'inflammation sensible. (*Abscessus per decubitum*, *Sever. de abcess. rec. natura*, *pag. 19, 20, 21 & 26.*)

ESPECE III. *Abcès par métastase.* (*Abscessus vi metastasis*, *Sever. de abcess. recondit. natura*, *pag. 511.*)

ESPECE IV. *Abcès à la suite d'une contusion.*

ESPECE V. *Abcès scrophuleux.*

ESPECE VI. *Abcès laiteux.* (*Apostomes laiteux des mamelles*, *Levret, art des accouch. pag. 174.* — *Abcès par des dépôts laiteux confécouïs*, *Levret, art des acc. pag. 178.*)

ESPECE VII. *Pustule.* — Tumeur superficielle, petite, circonscrite, blanchâtre, remplie d'une humeur blanchâtre ou purulente. (*Pustula*. — *Pustula*, *Linn. gen. morb. gen. 274.*)

GENRE XVI. *Abcès de l'œil.* — Globe de l'œil plus ou moins tuméfié par la présence du pus. (*Abcès de l'œil*, *S. Yves, malad. des yeux, pag. 171.*)

ESPECE I. *Hypopion.* — *Abcès de l'œil dans la cornée transparente.* (*Hypopion*, *S. Yves, malad. des yeux, pag. 172.* — *Hypopyon*, *Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 589.*)

ESPECE II. *Abcès à l'uvée.* (*S. Yves, malad. des yeux, pag. 171.*)

ESPECE III. *Abcès entre la cornée opaque & la conjonctive.* (*S. Yves, malad. des yeux, pag. 171.*)

GENRE XVII. *Empyème.* — Collection de pus dans une des cavités de la poitrine, avec difficulté de respirer, de se tenir couché à la renverse, ou sur le côté sain ; avec fièvre lente, douleur gravative sur le diaphragme, & gonflement œdémateux des mains. (*Empyema*. — *Empyema*, *Senn. tom. III. pag. 325.* — *Empyema*, *Plater. inst. chirurg. pag. 415.*)

ESPECE I. *Empyème par inflammation des poumons.* (*Empyema à peripneumonid*, *Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 833.*)

ESPECE II. *Empyème par inflammation de la plèvre.* (*Empyema à pleuritide*, *Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 892.*)

ESPECE III. *Empyème par métastase.*

GENRE XVIII. *Abcès du foie.* — Tumeur du ventre, particulièrement de l'hypocondré droit, avec douleur au dessous des fausses côtes, ou au dessus de l'ombilic du côté droit ; avec difficulté de respirer, toux, soif, défaillance

plus ou moins fréquente, & fièvre. (*Abscessus hepatis*, Morgagni, de sed. morb. tom. II, pag. 63.)

ESPECE I. Abcès du foie par inflammation du foie. (*Abscessus hepatis*, Senn. tom. IV, pag. 547. — *Abcès au foie*, Mém. de l'Acad. de chirurg. tom. II, in-4, pag. 59.)

ESPECE II. Abcès du foie, à l'occasion des plaies de la tête. (Mém. de l'Acad. de chirurg. tom. III, in-4, pag. 484.)

GENRE XIX. *Abcès des intestins.* — Douleur fixe du ventre, avec tumeur, fièvre, frisson irrégulier, évacuation de pus par l'anus. (*Abscessus intestini paris*, Ballon. oper. med. tom. I, pag. 198.)

GENRE XX. *Ischurie.* — Distension douloureuse de la vessie, par suppression d'évacuation de l'urine ; sensible au tact dans l'intestin rectum, & sur la région hypogastrique immédiatement au dessus des os pubis ; avec efforts presque continuels pour uriner. (*Ischuria*. — *Urina suppressio seu ischuria*, Senn. tom. IV, pag. 591. — *Urina suppressa*, Heist. inst. chirurg. tom. II, pag. 940.)

ESPECE I. Ischurie par obstruction du canal de l'urethre. (*Ischuria ab obstrukione meatus urinarii*, Senn. tom. IV, pag. 591. — *Ischuria à cicatrice, aut rugis, aut urethra tuberculo, aut prostatis justo grandioribus vel scirrhosis*, Heist. inst. chirurg. tom. II, pag. 941. — *Urina suppressio*, Morgagni, de sed. morb. tom. II, pag. 149.)

ESPECE II. Ischurie par des matières pituitées. (*Ischuria à pituita in vesica*, Senn. tom. IV, pag. 591.)

ESPECE III. Ischurie aux approches de l'accouchement, ou pendant le travail de l'accouchement. (*Urina suppressio*, Roederer, element. artis obstet. pag. 77. — *Retention d'urine à la fin de la grossesse & pendant l'accouchement*, Smellie, pratique des accouchem. tom. I, pag. 161.)

ESPECE IV. Retention d'urine, dans les premiers mois de la grossesse, par descente incomplete de matrice. (Levret, art des accouchem. pag. 221.)

ESPECE V. Ischurie par la diminution ou la perte, soit du sentiment, soit du mouvement musculaire de la vessie. (*Ischuria à vesica sensu deficiente*, Senn. tom. IV, pag. 592.)

ESPECE VI. Ischurie par spasme de la vessie. (*Suppressio urinæ à spasmo*, Fred. Hoffm. tom. II, pag. 313. — *Urina retentio à spasmo*, Fred. Hoffm. tom. IV, pag. 279.)

ESPECE VII. Ischurie chez les enfants, par la mauvaise qualité du lait. (*Urina suppressio apud pueros*, Fred. Hoffm. tom. III, pag. 494.)

ESPECE VIII. Ischurie par une trop longue & volontaire rétention d'urine. (*Ischuria ab urinâ nimis diu retentâ*, Senn. tom. IV, pag. 592.)

ESPECE IX. Suppression d'urine par gonorrhée virulente. (*Suppressio urinæ ex gonorrhœa*, Fred. Hoffm. tom. II, pag. 315.)

ESPECE X. Suppression d'urine par inflammation du sphincter, ou du col de la vessie. (*Ischuria ab inflammatione vesica*, Senn. tom. IV, pag. 591. — *Urina suppressio propter graviorem aliquam sphincteris aut cervicis vesicae inflammationem*, Heist. inst. chirurg. tom. II, pag. 941.)

IX. CLASSE, ORDRE I. 119

ESPECE XI. Ischurie par la goutte. (*Ischuria à materia podagrissâ retrogressa*, *Fred. Hoffm. tom. II. pag. 341.*)

ESPECE XII. Ischurie par un calcul dans la vessie, ou dans le canal de l'urethre. (*Ischuria à calculo*, *Senn. tom. IV. pag. 591.* — *Ischuria à calculo cervici vesicæ impacto*, *Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 941.*)

ESPECE XIII. Ischurie par défaut d'ouverture du gland, ou du canal de l'urethre. (*Ischuria ab apertura urethrae sive glandis defecta*, *Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 818.* — *Ischuria par l'extrémité du canal de l'urethre close*, ou par manque d'une portion du canal, *Levret, art des accouch. pag. 236.*)

GENRE XXI. (*Obstruction des uretères*. — Rétention d'urine dans les reins, ou dans les uretères, avec douleur aiguë depuis la région lombaire jusques dans le fond de la région hypogastrique; vomissement & ischurie; sans tuméfaction de la vessie. (*Obstratio ureterum*, *Senn. tom. IV. pag. 581.*)

ESPECE I. Obstruction des uretères par un calcul. (*Angustia renum à calculo*, *Senn. tom. IV. pag. 572.* — *Obstratio ureterum à calculo*, *Senn. tom. IV. pag. 581.*)

ESPECE II. Obstruction des uretères par des matières visqueuses. (*Obstratio renum à crassis & viscidis humoribus*, *Senn. tom. IV. pag. 572.* — *Obstratio ureterum à pituita*, *Senn. tom. IV. pag. 581.*)

ESPECE III. Obstruction des uretères par compression des parties voisines: (*Obstratio renum à compressione*, *Senn. tom. IV. pag. 573.* — *Obstratio ureterum à compressione vicinorum*, *Senn. tom. IV. pag. 581.*)

ESPECE IV. Obstruction des uretères par du pus, précédée d'un pissement de matière purulente. (*Obstratio renum à pure*, *Senn. tom. IV. pag. 572.* — *Obstratio ureterum à pure*, *Senn. tom. IV. pag. 581.*)

ESPECE V. Obstruction des uretères par un caillot de sang, précédée d'un pissement de sang. (*Obstratio renum à sanguinis grumo*, *Senn. tom. IV. pag. 572.* — *Obstratio ureterum à sanguinis grumo*, *Senn. tom. IV. pag. 581.*)

GENRE XXII. *Dysuria*. — Évacuation d'urine, lente, difficile & douloureuse. (*Dysuria*. — *Dysuria*, *Senn. tom. IV. pag. 594.* — *Urinæ difficultas*, *Morgagni*, *de sed. morb. tom. II. pag. 156.*)

ESPECE I. Difficulté d'uriner par des cicatrices dans le canal de l'urethre. (*Difficultas urinæ reddenda à caruncula in urethra*, *Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 834.*)

ESPECE II. Gonorrhée seche. — Difficulté d'uriner, avec tumeur & rougeur au periné, par virus vénérien. (*Dysuria venerea siccæ*, *Astruc de morb. vener. tom. I. pag. 282.*)

ESPECE III. Difficulté d'uriner par virus vénérien, sans tumeur ni rougeur au periné. (*Gonorrhœa siccæ absque tumore aut rubore nec in pene nec in perinæo*, *Astruc de morb. vener. tom. I. pag. 283.*)

ESPECE IV. Difficulté d'uriner par des substances vénéneuses. (*Ardor urinæ à venenis*, *sic à cantharidibus*, *Senn. tom. IV. pag. 594.*)

ESPECE V. Difficulté d'uriner, par l'abondance ou la mauvaise qualité de la semence. (*Ardor urinæ à semine in masculis*, *Senn. tom. IV. pag. 595.*)

ESPECE VI. Difficulté d'uriner par des vers. (*Difficultas mingendi à vermis*, *Senn. tom. IV. pag. 587.*)

ESPECE VII. Difficulté d'uriner, à la suite d'une gonorrhée vénérienne. (*Stranguria gonorrhœa pedis equa*, Astruc, de morb. vener. tom. I. pag. 309.)

ESPECE VIII. Difficulté d'uriner par l'inflammation du col de la vessie, ou du canal de l'urethre. (*Ardor urinæ à partum vesicæ inflammatione*, Senn. tom. IV. pag. 595.)

GENRE XXIII. Rétention du cérumen dans le conduit auditif, avec plus ou moins de fécidité. (*Sordities aurium cum fetore*, Senn. tom. III. p. 235.)

ORDRE SECOND.

RÉTENTIONS de matières plus ou moins fluides dans plusieurs cavités.

GENRE I. *Suppression des règles*. — Rétention du flux menstruel. (*Mensum defectus & suppressio*, Senn. tom. IV. pag. 659. — *Menses suppressi*, Freind. oper. med. pag. 97.)

ESPECE I. Suppression des règles par l'impression trop vive des corps froids. (*Suppressio mensum à frigida aqua potu, vel lotione in aqua frigida, vel frigido aere*, Senn. tom. IV. pag. 660. — *Menses suppressi lotione in aqua frigidâ*, Freind. oper. med. pag. 121.)

ESPECE II. Suppression du flux menstruel par faiblesse. (*Suppressi menses cum pulsū debili & tardo*, Freind., Oper. med. pag. 118.)

ESPECE III. Suppression du flux menstruel, par les vives passions de l'âme. (*Mensum defectus à terrore*, Senn. tom. IV. pag. 659.)

ESPECE IV. Suppression du flux menstruel par affection spasmodique.

ESPECE V. Suppression des règles par de violents exercices. (*Suppressio mensum ab exercitiis atque laboribus nimis*, Senn. tom. IV. pag. 659.)

ESPECE VI. Suppression des règles par des évacuations trop abondantes, ou par de longues maladies. (*Suppressio mensum ab evacuationibus nimis per quamcumque partem facilis*, Senn. tom. IV. pag. 660.)

ESPECE VII. Suppression du flux menstruel par excès de graisse. (*Suppressio mensum ob sanguinis conseruentem in pinguedinem*, Senn. tom. IV. pag. 660.)

ESPECE VIII. Rétention du flux menstruel par la mauvaise conformation de l'utérus, ou du vagin. (*Suppressio mensum ob carnem vel membranam in utero aut vagina, effluxum prohibentem*, Senn. tom. IV. pag. 660.)

GENRE II. Rétention de matières fluides plus ou moins blanchâtres, qui doivent s'écouler par le vagin après l'accouchement. (*Retentio lochiorum*, Senn. tom. IV. pag. 741.)

ESPECE I. Suppression des loches par le froid. (*Suppressio lochiorum à frigore*, Senn. tom. IV. pag. 741.)

ESPECE II.

IX. CLASSE, ORDRE II. 121

ESPECE II. Suppression des lochies par les vives passions de l'ame. (*Suppreffio lochiorum à perturbationibus animi*, Sean. tom. IV. pag. 741.)

ESPECE III. Suppression des lochies par le cours trop accelleré du sang ou des humeurs, vers les mamelles, ou vers la tête. (*Suppreffio lochiorum à sanguine cum impetu ad mammae ruente*, Senn. tom. IV. pag. 741.)

GENRE III. Suppression subite des pertes blanches.

ESPECE I. Suppression des pertes blanches, par l'abus immodéré des forts astringents.

ESPECE II. Suppression des pertes blanches par l'impression trop vive des corps froids

ESPECE III. Suppression des pertes blanches par les vives passions de l'ame.

GENRE IV. Hydropisie. — Rétention de sérosités dans le tissu cellulaire. (*Hydrops*, — *Hydrops*, Sydenham, tom. I. pag. 333. — *Hydrops*, Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 1215. — *Hydrops*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 322. — *Aqua inter cutem*, Aretæus, de morb. acut. & diutur. pag. 93. — *Œdema*, Senn. tom. V. pag. 27.)

ESPECE I. *Leucophlegmatie.* — Tuméfaction des téguments; molle; cédant à la pression du doigt, en conservant peu de temps l'empreinte; avec pâleur du visage. (*Leucophlegmatia*. — *Phlegmatias*, Aretæus, de morb. acut. & diut. pag. 94. — *Leucophlegmatia*, Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 1225. — *Leucophlegmatia*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 323.)

ESPECE II. *Anasarque.* — Tuméfaction des téguments, moins molle, plus élevée & conservant plus longtemps l'empreinte du doigt, que dans la leucophlegmatie; commençant par les pieds, pour dela s'étendre à tous les téguments. (*Anasarca*. — *Anasarca*, Aretæus, de morb. acut. & diut. pag. 94. — *Anasarca*, Senn. tom. IV. pag. 567. — *Anasarca*, Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 1225.)

ESPECE III. *Hydrocéphale cutanée.* — Collection d'eau dans le tissu cellulaire des téguments de la tête. (*Hydrocephalus colluvie facta inter integumenta ipsa*, Boërh. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 1217. — *Hydrocephalon externum*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 496.)

ESPECE IV. *Hydropisie des paupières.* (*Tumor œdematosus in palpebris*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 510. — *Hydropisie des paupières*, S. Yves, malad. des yeux, pag. 91.)

ESPECE V. *Œdeme des mamelles.* (*Œdema mamarum*, Senn. tom. IV. pag. 751.)

ESPECE VI. Gonflement œdématueux des grandes lèvres, chez les femmes enceintes. (*Levret, art des accouch.* pag. 217.)

ESPECE VII. Enflure œdématueuse des extrémités inférieures, chez les femmes enceintes. (*Puqos, traité des accouch.* pag. 85.)

ESPECE VIII. *Œdématie.* — Enflure œdématueuse des jambes. (*Œdematia*. — *Tumor œdematosus pedum*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 323 & 333.)

GENRE V. Hydatides du poumon. — Hydropisie du poumon par des hydatides, avec difficulté de respirer, oppression, & expectoration plus ou moins fréquente d'hydatides. (*Hydatides pulmonis*, Carol. Pison. de morb. a colluv. serof. pag. 242.)

122 IX. CLASSE, ORDRE II.

GENRE VI. *Hydrocele*. — Tumeur du scrotum, avec fluctuation plus ou moins sensible, & douleur plus ou moins vive. (*Hydrocele*. — *Hydrocele*, Heist, inst. chirurg. tom. II. pag. 793. — *Hydrocele*, Mém. de l'Acad. de chirurg. tom. III. in-4. pag. 85. — *Hydrocele*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 186.)

ESPECE I. Rétention de fluide dans le tissu cellulaire du scrotum. (*Hydrops scroti*, Boeth. van Swiet, de cogn. morb. apher. 1227. — *Hydrocele des nouveaux-nés*, Levret, art des accouch. pag. 249.)

ESPECE II. Rétention de fluide entre la tunique vaginale & la tunique albuginée des testicules. (*Hydrops involuci vaginalis testis*, Boeth. van Swiet, de cogn. morb. apher. 1227. — *Hydrops inter vaginalem & albugineam testiculi*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 187.)

ESPECE III. Rétention de fluide dans la tunique vaginale du cordon spermatique. (*Hydrocele in tunica vaginali*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 187, 188 & 189. — *Hydrocele par la tunique vaginale du cordon spermatique*, Bertrand, traité des oper. de chirurg. pag. 191.)

ESPECE IV. Hydrocele par collection d'une humeur sanguinolente. (*Hamatocele*, Heist, inst. chirurg. tom. II. pag. 803.)

GENRE VII. *Cirfocele*. — Tumeur le long du cordon spermatique, noueuse, sans fluctuation, s'étendant quelquefois jusques sur le testicule, formée par des varices. (*Cirfocele*. — *Cirfocele*, Heister, inst. chirurg. tom. II. pag. 808. — *Cirfocele*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 191.)

GENRE VIII. Difficulté d'éjaculer la semence. (*Seminis ejaculatio lata*, Senn. tom. IV. pag. 610.)

GENRE IX. *Dépôts laiteux*. — Rétention du lait en différentes parties du corps, avant ou après l'accouchement. (*Puzos*, traité des accouchements, pag. 341.)

ESPECE I. Dépôt laiteux avant l'accouchement, avec fièvre aiguë. (*Puzos*, traité des accouch. pag. 371. — *Dépôts laiteux pendant la greffe*, ordinairement dans l'hypogastre, ou sur les extrémités inférieures, *Puzos*, traité des accouch. pag. 381. — *Levret*, art des accouch. pag. 192. — *Dépôts laiteux*, avant l'accouchement.)

ESPECE II. Dépôts laiteux dans les premiers jours de l'accouchement, avec fièvre aiguë, douleur fixe & vive sur une partie du corps (*Puzos*, traité des accouch. pag. 367. & 373.)

ESPECE III. Dépôts laiteux après les couches. (*Dépôts laiteux consécutifs*, ou *après les couches*, *Levret*, art des accouch. pag. 178.)

ESPECE IV. Dépôts laiteux sur les mamelles. (*Puzos*, traité des accouch. pag. 348.)

ESPECE V. Engorgement laiteux des mamelles chez les femmes nouvellement accouchées. (*Levret*, art des accouch. pag. 174.)

ESPECE VI. Engorgement laiteux dans le bassin, après l'accouchement. (*Levret*, art des accouch. pag. 168. — *Dépôts laiteux dans l'hypogastre*, *Puzos*, traité des acc. pag. 356.)

IX. CLASSE, ORDRE II. 123

ESPECE VII. Engorgement laiteux des extrémités inférieures, après l'accouchement.
(*Levret, art des accouch.* pag. 170 & 338.)

ESPECE VIII. Dépôts de lait sur la matrice, quelques jours après l'accouchement.
(*Levret, art des accouch.* pag. 181.)

ESPECE IX. Dépôts de lait sur la matrice, dans le temps où la fièvre de lait devroit arriver. (*Levret, art des accouch.* pag. 180.)

GENRE X. Distension des mamelles pendant la grossesse. (*Gonflement des mamelles pendant la grossesse, Puzos traité des accouch.* pag. 52.)

GENRE XI. Distension douloureuse des mamelles, par la rétention du lait chez les nourrices, & chez les femmes qui cessent de nourrir; souvent avec tumeurs inégales. (*Retentio lactis in mammis à coagulatione vel alius viuis, Senn. tom. IV. pag. 759.*)

GENRE XII. Gonflement de la matrice ou de son museau, plus ou moins sensible au tact, avec douleur des ligaments ronds, difficulté de marcher & de se tenir sur les jambes. (*Engorgement de la matrice ou de son museau, Levret, art des accouch.* pag. 365.)

GENRE XIII. Douleur aiguë dans l'hypochondre droit, périodique, de peu de durée, avec tuméfaction, sans dureté, ni sentiment de pesanteur. (*Inflatio hepatis, Senn. tom. IV. pag. 540.*)

GENRE XIV. Douleur plus ou moins vive de l'hypochondre gauche, avec tumeur, pour ainsi dire, flatueuse. (*Inflatio lienis, Senn. tom. IV. pag. 488.*)

GENRE XV. Contusion. — Pression plus ou moins violente sur une partie du corps, par une cause mécanique, sans être suivie d'une évacuation sensible de sang. (*Contusio, Heft. inst. chirurg. tom. I. pag. 153.*)

ESPECE I. Contusion par un coup, ou par une chute. (*Contusio ielu, impulsu atque iactu, Heft. inst. chirurg. tom. I. pag. 154.*)

ESPECE II. Contusion par les armes à feu. (*Contusion par des balles, des éclats de bombes, &c. Ravaton, chirurg. d'armée, pag. 3.*)

ESPECE III. Contusion par l'air vivement comprimé. (*Contusion par la pression & l'agitation de l'air, Ravaton, chirurg. d'armée, pag. 6.*)

ESPECE IV. Contusions des os du crâne. (*Ravaton, chirurg. d'armée, pag. 10.*)

ESPECE V. Contusions de la poitrine. (*Ravaton, chirurg. d'armée, pag. 27.*)

ESPECE VI. Contusions de l'abdomen. (*Ravaton, chirurg. d'armée, pag. 36.*)

ESPECE VII. Contusions des extrémités. (*Ravaton, chirurg. d'armée, pag. 49.*)

ESPECE VIII. Contusions des articulations. (*Ravaton, chirurg. d'armée, pag. 62.*)

ESPECE IX. Contusions attaquant le corps des os des extrémités. (*Ravaton, chirurg. d'arm. pag. 71.*)

124 *IX. CLASSE, ORDRE III.*
ESPECE X. Contusions des yeux. — (*Maladies qui suivent les coups reçus à l'œil.*
S. Yves, malad. des yeux, pag. 133.)

GENRE XVI. Épanchement de sang dans le tissu cellulaire, par de fortes contusions. (*Ravatou, chirurg. d'armée, pag. 80.*)

GENRE XVII. Rétention des fluides qui arrosent la langue, avec aspérité & sécheresse de cet organe. (*Linguae asperitas & scabritas, Senn. tom. III,*
pag. 250.)

ORDRE TROISIEME.

RÉTENTIONS de matières d'une consistance plus ou moins épaisse, dans une ou plusieurs cavités.

GENRE I. *Corpulence.* — Rétention d'une trop grande quantité d'humeur adipeuse dans le tissu cellulaire du corps. (*Corpulentia. — Corpulentia nimia, Senn. tom. V. pag. 8.*)

GENRE II. *Tumeur adipeuse.* — Tumeur adhérente à la peau, d'une dureté & d'une sensibilité approchant de celle des téguments, plus ou moins étendue, formée par l'extension du tissu cellulaire & par l'accumulation de la graisse. (*Tumores adiposi. — Tumores adiposi, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 272.*)

GENRE III. *Squirrhe.* — Tumeur dure, insensible, souvent de longue durée, difficile à résoudre, & facile à dégénérer en cancer. (*Scirrus. — Scirrus, Senn. tom. V. pag. 28. — Scirrus, Boërh. van Swi. de cogn. morb. aphor. 484.*)

ESPECE I. Squirrhe de glandes salivaires. (*Glandulae salivales nimis tumidae ac induratae, Heist. inst. chirurg. tom. II. pag 665.*)

ESPECE II. Dureté des amygdales. (*Tonsillae induratae, Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 663.*)

ESPECE III. Squirrhe de la langue. (*Scirrus linguae, Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 655.*)

ESPECE IV. Squirrhe des mamelles, par la compression d'un corps étranger.

ESPECE V. Squirrhe des mamelles, par suppression des règles.

ESPECE VI. Squirrhe des mamelles, par virus écrouelleux. (*Glandulae mammarum scrophulis tumentes, Senn. tom. IV. pag 752.*)

ESPECE VII. Squirrhe des mamelles, par virus vénéréen.

ESPECE VIII. Squirrhe des mamelles, sans aucun principe évident.

ESPECE IX. Squirrhe des glandes axillaires ou inguinales, par virus écrouelleux

IX. CLASSE, ORDRE III. 125

ESPECE X. Squirre des glandes axillaires, ou inguinales par virus vénérien.

ESPECE XI. Squirre des glandes axillaires par communication du squirre des mamelles.

ESPECE XII. Squirre du testicule. (*Scirrus testiculi*, Senn. tom. IV. pag. 600.)

ESPECE XIII. Squirre du corps de la matrice, sans virus vénérien. (*Uteri Scirrus*, Senn. tom. IV. pag. 644. — *Squircle de la matrice*, Pujos, traité des acc. pag. 255.)

ESPECE XIV. Squirre du corps de la matrice par virus vénérien. (*Scirrus uteri venereus*, Aßtruc, de morb. venereis, pag. 428.)

ESPECE XV. Squirre du col de la matrice sans principe vénérien. (*Scirrus in cervice uteri*, Senn. tom. IV. pag. 644.)

ESPECE XVI. Squirre du col de la matrice par virus vénérien.

ESPECE XVII. Squirre du gland. (*Scirrus glandis*, Heißt. inst. chirurg. tom. II. pag. 816.)

GENRE IV. Tumeurs lymphatiques, avoisinant le vagin, ou prennant naissance dans la circonference de la matrice; plus ou moins sensibles au tact; pour l'ordinaire indolentes & médiocrement dures. (*Levret, art des accouch.* pag. 374.)

ESPECE I. Tumeurs lymphatiques dans les environs de la matrice & du vagin, sans virus vénérien. (*Levret, art des accouch.* pag. 175.)

ESPECE II. Tumeurs lymphatiques dans les environs de la matrice & du vagin par virus vénérien. (*Levret, art des accouch.* pag. 375.)

GENRE V. Grosseur considérable du testicule, sans inflammation, ni vive douleur.

ESPECE I. Grosseur du testicule, par accumulation de semence.

ESPECE II. Grosseur du testicule, par virus vénérien.

ESPECE III. Grosseur du testicule, à la suite d'un coup ou d'une inflammation.

GENRE VI. *Squircle de l'estomac.* — Douleur gravative, fixe, & de longue durée, dans la région épigastrique; très-légère dans son commencement, & avec digestion difficile; ensuite devenant plus forte & accompagnée de renvois, de vomissement, de gonflement & de dureté dans l'épigastre. (*Scirrus ventriculi*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 14.)

GENRE VII. Tuméfaction du ventre des enfants, de longue durée, souvent avec inégalités dans l'abdomen, douleur & difficulté de respirer. (*Bouffissure du ventre*, Brouzet, educ. med. des enfants, tom. II. pag. 64.)

GENRE VIII. *Obstruction du mésentère.* — Tumeur dure dans la capacité de l'abdomen, plus ou moins étendue vers la région ombilicale, avec borbottements, rapports, colique, constipation, maigreur extrême & abattement des forces. (*Obstratio mésenterii*, Senn. tom. IV. pag. 478.)

GENRE IX. *Tumeur de l'épipoon.* — Tumeur considérable du ventre, indépendante des réguments & des muscles du ventre auxquels elle adhère, plus ou moins douloureuse, ordinairement plus saillante au dessus du nombril, avec anxiété, & difficile digestion. (*Omenti intumescensia*, Senn. tom. IV. pag. 483.)

GENRE X. *Obstruction du foie.* — Tumeur dure du foie, plus ou moins étendue dans l'hypochondre droit, avec douleur gravative & sourde, affaiblissement des forces vitales, couleur jaunâtre des téguments & particulièrement de l'albuginée. (*Obstrucio hepatis*. — *Scirrus hepatis*, Senn. tom. IV. pag. 543. — *Obstrucio hepatis*, Senn. tom. IV. pag. 538.)

GENRE XI. *Obstruction de la rate.* — Tumeur dure de la rate, plus ou moins étendue dans l'hypochondre gauche, avec douleur gravative, abattement des forces vitales & musculaires, digestion lente & souvent très-laborieuse, couleur du visage livide & comme plombée. (*Obstrucio lienis*. — *Scirrus lienis*, Senn. tom. IV. pag. 489. — *Obstrucio lienis*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 66.)

GENRE XII. *Obstruction du pancréas.* — Douleur profonde & plus ou moins aiguë dans l'épigastre & vers le milieu des vertèbres dorsales, avec battement violent de l'artère coeliaque, affaiblissement des forces vitales, maigreur & constipation. (*Obstrucio pancreatis*. — *Obstrucio pancreatis*, Senn. tom. IV. pag. 483. — *Pancreas scirrhosum*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 72.)

GENRE XIII. *Ganglion.* — Tumeur dure, insensible, mobile, ordinairement située sur les tendons, ou sur les ligaments de la main, & rarement sur ceux du pied. (*Ganglion*, Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 1085.)

GENRE XIV. *Loupe.* — Tumeur indolente, ne changeant point la couleur de la peau, plus ou moins mobile & molle, remplie d'une humeur approchant de la consistance & de la couleur de la graisse. (*Lupia*. — *Meliceris*, *atheroma & steatoma*, Senn. tom. V. pag. 43. — *Tumor tunicā comprehensus*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 457.)

ESPECE I. *Taupe.* — Tumeur molle, grande, indolente, située dans le tissu cellulaire des téguments qui recouvrent le crâne; quelquefois avec carie de la table externe du crâne, sur laquelle elle est située. (*Talpa*, Senn. tom. V. p. 44.)

ESPECE II. Tumeur enkystée des paupières. (*Aihérome des paupières*, S. Yves, malad. des yeux, pag. 92.)

ESPECE III. Tumeur folliculeuse vers le petit angle de l'œil, venant de la face interne de la paupière supérieure. (*Tumeur adipeuse*, S. Yves, malad. des yeux, pag. 94.)

ESPECE IV. *Grille.* — Petite tumeur dure & blanche, située sur le bord des paupières. (*Gravelle*, S. Yves, malad. des yeux, pag. 65 & 66.)

IX. CLASSE, ORDRE IV.

127

ESPECE V. Tumeur folliculeuse, grande, molle, indolente, ordinairement située sur le dos. (Natta, Senn. tom. V. pag. 44.)

GENRE XV. *Goëtre*. — Tuméfaction plus ou moins étendue, de la glande thyroïde, ou des autres glandes extérieures du larynx, indolente, plus ou moins dure, située sur la partie antérieure ou sur les parties latérales du col. (Bronchocele. — Bronchocele, Plater. prax. med. tom. III. pag. 201. — Bronchocele, Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 678. — Goëtre, Brouzet, educ. med. des enf. tom. II. pag. 272. — Tumores glandula thyroidæ, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 275.)

GENRE XVI. *Tumeur lombaire*. — Tumeur sur les vertèbres lombaires des nouveaux-nés, médiocrement dure, quelquefois avec fluctuation; accompagnée de foiblesse de la vessie & des parties inférieures, souvent avec paralysie de ces parties (Spina bifida, Bidloo, oper. anat. chirurg. pag. 187. — Spina bifida, Levret, art des accouch. pag. 237. — Tumor ad lumbares vertebrae, Morgagni, de sed. morb. tom. I. pag. 95.)

ORDRE QUATRIÈME.

RÉTENTIONS des matières qui servent au développement & à l'accroissement de diverses parties molles du corps.

GENRE I. Accroissement considérable du globe de l'œil, par la trop grande épaisseur des membranes du globe de l'œil. (Grosseur démesurée du globe de l'œil, par l'épaisseur extraordinaire de ses membranes, S. Yves, malad. des yeux, pag. 128.)

GENRE II. *Mûre*. — Excroissance de chair entre les paupières & le globe de l'œil, venant de la caroncule lacrymale, ou proche de la caroncule lacrymale. (Encanthis, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 519.)

GENRE III. *Staphylome*. — Tumeur presque indolente, petite, située sur la cornée transparente, rarement sur la cornée opaque. (Staphyloma. — Staphylome, S. Yves, malad. des yeux, pag. 178. — Staphyloma, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 581.)

GENRE IV. Excroissances de chair sur le bord des paupières, avec diminution de la vue, & difficulté de mouvoir le globe de l'œil. (Caligo à variis palpebrarum tuberculis & excrescentiis, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 508.)

GENRE V. *Onglet*. — Excroissance membraneuse, venant pour l'ordinaire du grand angle de l'œil, sur laquelle rampent une multitude de vaisseaux

128 IX. CLASSE, ORDRE IV.
sanguins. (*Pterygion*. — *Pterygion*, *S. Yves*, *mélad des yeux*, pag. 118.
— *Pannus*, *sive pterygium oculorum* *Heist. inst. chirurg.* tom. I. pag. 581.)

GENRE VI. *Filet*. — Frein de la langue, d'une conformation à gêner le mouvement de cet organe. (*Frenulum linguæ vitiosum*, *Heist. inst. chirurg.* tom. II. pag. 652. — *Filet*, *Levret*, *art des accouch.* pag. 240.)

GENRE VII. Brides ligamenteuses sur les deux côtés de la langue des enfants, avec difficulté & quelquefois impossibilité de tenter. (*Levret art des accouch.* pag. 241.)

GENRE VIII. *Polype*. — Excroissance charnue, molle, peu douloureuse dans les commencements, ordinairement située dans les cavités qui s'ouvrent immédiatement à l'extérieur. (*Polypus*. — *Polype*, *Levret*, *observat. sur la Cure des polypes*. — *Polype*, *Bertrand*, *oper. de chirurg.* pag. 358.)

ESPECE I. Polype benin du nez. (*Levret*, *observ. sur la cure des polypes*, pag. 215.)

ESPECE II. Polype muqueux du nez. (*Levret*, *observ. sur la cure des polypes*, pag. 314.)

ESPECE III. Polype du nez par virus vénérien.

ESPECE IV. Polype cancéreux du nez. (*Polypus nasalis cancerosus*, *Heist. inst. chir.* tom. II. pag. 619. — *Polype cancéreux du nez*, *Levret*, *observ. sur la cure des polypes*, pag. 216.)

ESPECE V. Polype du vagin. (*Levret*, *observ. sur la cure des polypes*, pag. 145.)

ESPECE VI. *Polype utérin*. — Augmentation du volume de la matrice par un polype, avec dilatation & ramollissement du col de la matrice, tiraillement des ligaments larges & des ligaments ronds, & douleur approchant de celle qui accompagne le travail de l'accouchement. (*Augmentation du volume de la matrice, par un polype utérin*, *Levret*, *art des accouch.* pag. 372. — *Levret*, *observ. sur la cure des Polypes*, pag. 15.)

GENRE IX. Excroissances de chair dans le conduit auditif. (*Tubercula*, *sive carnes excrescentes in ipso aurium meatu*, *Heist. inst. chirurg.* tom. II. pag. 605.)

GENRE X. Excroissance de chair, par l'ouverture de la carie des dents. (*Epulis*, *Plater. prax. med.* tom. III. pag. 198.)

GENRE XI. Excroissance de chair, venant des gencives, & surpassant la hauteur des dents. (*Gingivarum caro luxurians dentium superincarnatio*, *Plater. prax. med.* tom. III. pag. 198.)

GENRE XII. Excroissances charnues venant du palais, ou de l'arrière bouche. (*Excrecentia juxta fauces, vel tonsillas, vel palatum provenientes*, *Heist. inst. chirurg.* tom. II. pag. 664.)

GENRE XIII. Excroissances de chair dans les ulcères. (*Caro in ulceribus excrescens & luxurians*, *Senn. tom. V.* pag. 61.)

GENRE XIV.

IX. CLASSE, ORDRE IV.

119

GENRE XIV. Excroissances fongueuses des membranes du cerveau. (*Fungi cerebri*, Senn. tom. III. pag. 55.)

GENRE XV. *Sarcocèle*. — Tumeur du testicule, médiocrement dure, sans fluctuation, ni douleur, pour l'ordinaire se formant avec lenteur. (*Sarcocèle*. — *Sarcocèle*, Heist. inst. chirurg. tom. III. pag. 789.)

GENRE XVI. *Fraises*. — Excroissances presque sphériques, plus ou moins dures; approchant de la couleur de la peau, souvent d'une couleur rougeâtre, inégales, & adhérant aux teguments par un petit pédicule. (*Fraga*)

ESPECE I. *Fraise*, ou cic bénin.

ESPECE II. *Fraise*, ou cic vénérique. (*Ficus à morbo venereo*, Astruc de morb. vener. tom. I. pag. 391.)

GENRE XVII. *Verrue*. — Excroissance sur la peau, approchant de la couleur des teguments, plus ou moins sensible, inégale, d'une dureté médiocre, & affectant différentes formes. (*Verruca*, Plater. prax. med. tom. III. pag. 211.)

ESPECE I. *Verrue* bénigne. (*Verruca*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 454.)

ESPECE II. *Verrue* vénérique. (*Verruca venerea*, Astruc, de morb. vener. tom. I. pag. 386.)

ESPECE III. *Verrue* avec disposition au cancer. (*Verruca cancrosa*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 456.)

GENRE XVIII. *Condylome*. — Excroissance au bord de l'anus, indolente, médiocrement dure, approchant pour l'ordinaire de la grandeur & de la couleur des hémorroïdes. (*Condyloma*.)

ESPECE I. *Condylome* bénin.

ESPECE II. *Condylome* vénérien. (*Condyloma venereum*, Astruc, de morb. vener. tom. I. pag. 386.)

GENRE XIX. *Criée*. — Excroissance molle, quelquefois dure, d'une couleur rougeâtre, inégale ou dentelée à son extrémité, plus ou moins dure, située autour de l'anus, & sur les parties génitales de l'un & de l'autre sexe; produite par virus vénérien. (*Crista*, Astruc, de morb. vener. tom. I. pag. 386.)

GENRE XX. *Porreau*. — Excroissance charnue, oblongue, petite, déliée, peu sensible, située sur la face intérieure du prépuce, proche de la base du gland, sur le frein; sur les levres de la vulve; & rarement au bord de l'anus. (*Porrus*.)

ESPECE I. *Porreau* bénin.)

ESPECE II. *Porreau* vénérien. (*Porrus venereus*, Astruc, de morb. vener. tom. I. pag. 386.)

Table des Maladies. R

130 IX. CLASSE, ORDRE V.

GENRE XXI. Callosité.—Epaississement de l'épiderme par frôtement, avec dureté & insensibilité. (*Callus cutaneus*, *Plater. prax. med. tom. III. pag. 210.*)

ESPECE I. Callosité des mains ou des pieds.

ESPECE II. Cor au pied. (*Clavus*, *Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 1104.*)

GENRE XXII. Allongement des grandes lèvres, ou des nymphes. (*Levret, art des accouch. pag. 19 & 22.*)

GENRE XXIII. Parties superflues de l'enfant nouveau-né. (*Levret, art des accouch. pag. 239.*)

GENRE XXIV. Union des parties molles qui doivent être défunies.

ESPECE I. Union des paupières entr'elles, ou du globe de l'œil avec les paupières. (*Ancylloblepharum*, *Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 514.*)

ESPECE II. Narines closes. (*Foramina narium præter naturam concreta*, *Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 623.*)

ESPECE III. Union des lèvres entr'elles.

ESPECE IV. Imperforation du conduit de l'oreille.

ESPECE V. Urethre entièrement close, ou en partie. (*Penis urethra non perforata*, *Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 818.*—*Vices de conformatio[n] de l'urethre*, *Levret, art des accouch. pag. 236.*)

ESPECE VI. Imperforation de l'anus. (*Levret, art des accouch. pag. 234.*)

ESPECE VII. Vagin entièrement clos, ou en partie. (*Vagina, vel ex parte, vel integre oclusa*, *Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 955.*—*Vulva imperforée*, *Levret, art des accouch. pag. 23.*)

ESPECE VIII. Cohérence des doigts, par naissance. (*Cohæsio digitorum in utero*, *Celsi, Oper. med. pag. 497.*)

ESPECE IX. Cohérence des doigts, à la suite des ulcères. (*Digitæ inter se invicem cohærentes*, *Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 465.*)

ORDRE CINQUIEME.

RÉTENTIONS d'un ou de plusieurs corps organisés dans une cavité.

GENRE I. Rétention du fœtus dans le bas-ventre, hors de la matrice. (*Anatomie chirurgicale de Palatin*, par *Petit*, *tom. II. pag. 239.*)

ESPECE I. Rétention du fœtus dans le bas ventre, par son développement hors de la matrice. (*Levret, art des accouch. pag. 52.*)

ESPECE II. Rétention du fœtus dans le ventre, par le déchirement de la matrice. (*Levret, art des accouch. pag. 105.*)

GENRE II. *Fœtus mort*, & retenu dans la région hypogastrique. — Grosseur du ventre, avec cessation entière du mouvement du fœtus, diminution des forces vitales de la mère, orifice externe du col de la matrice plus dilaté ; douleur gravative dans l'hypogastre ; mouvement rapide de la grosseur du ventre, vers le côté où la malade se tourne, étant couchée.

ESPECE I. Enfant mort & retenu dans la matrice. (*Smellie, observ. sur les accouch. tom. II, pag. 187.*)

ESPECE II. Enfant mort & retenu dans la capacité du bas-ventre. (*Smellie, observ. sur les accouch. tom. II, pag. 74.*)

ESPECE III. Enfant mort & retenu dans la matrice, longtemps après le terme de neuf mois.

GENRE III. Accouchement laborieux, à cause de la mauvaise situation ou conformatio[n] du fœtus, du placenta, du cordon ombilical & des membranes du fœtus.

ESPECE I. Accouchement laborieux, où le front du fœtus est tourné vers l'os pubis. (*Accouchement laborieux, où le front du fœtus se trouve contre l'os pubis, Smellie, prat. des accouch. tom. I, pag. 287, tom. II, pag. 316 & 545.*)

ESPECE II. Accouchement laborieux, où la face du fœtus se présente la première. (*Smellie, pratique des accouch. tom. I, pag. 292, tom. II, pag. 324.*)

ESPECE III. Accouchement laborieux, où la tête du fœtus est arrêtée par le bord supérieur de l'os sacrum.

ESPECE IV. Accouchement laborieux, où la fontanelle antérieure se présente la première. (*Smellie, observ. sur les accouch. tom. II, pag. 318.*)

ESPECE V. Accouchement laborieux, où la tête du fœtus est arrêtée sur l'os pubis.

ESPECE VI. Accouchement laborieux, où l'enfant présente le front. (*Smellie, observ. sur les accouch. tom. II, pag. 320.*)

ESPECE VII. Accouchement laborieux, où une des oreilles se présente. (*Smellie, observ. sur les accouch. tom. II, pag. 323.*)

ESPECE VIII. Accouchement laborieux, par hydrocéphale. (*Smellie, observ. sur les accouch. tom. II, pag. 417, tom. III, pag. 1.*)

ESPECE IX. Accouchement laborieux, par la grosseur de la tête du fœtus (*Smellie, observ. sur les accouch. tom. II, pag. 403-513.*)

ESPECE X. Enclavement. — Accouchement laborieux, où la tête du fœtus est engagée & retenue dans le détroit inférieur. (*Enclavement de la tête de l'enfant, Levret, art des accouch. pag. 108. — Levret, Accouchemens laborieux, pag. 126.*)

ESPECE XI. Accouchement laborieux, par le passage des mains de l'enfant dans le vagin (*Levret, art des accouch. pag. 135.*)

ESPECE XII. Accouchement laborieux, où le fœtus présente l'épaule. (*Smellie, prat. des accouch. tom. I, pag. 364, 369, 372, tom. II, pag. 331.*)

ESPECE XIII. Accouchement laborieux, où le fœtus présente les hanches. (*Smellie, prat. des Accouchemens, tome I, pag. 340.*)

ESPECE XIV. Accouchement laborieux, dans lequel le fœtus replié sur lui-même

IX. CLASSE, ORDRE V.

en forme de peloton, ou étendu dans toute sa longueur, présente la partie antérieure ou postérieure de son corps. (Smellie, prat. des accouch. tom. I. pag. 352.)

ESPECE XV. Accouchement laborieux, où le fœtus présente les fesses à l'orifice de la matrice. (Smellie, prat. des accouch. tom. I. pag. 334-377.)

ESPECE XVI. Accouchement laborieux, où le fœtus se présente par les genoux.

ESPECE XVII. Accouchement souvent de longue durée, où le fœtus se présente par les pieds. (Levret, art. des accouch. pag. 122. — Accouchement où l'enfant se présente par les pieds, Smellie, prat. des accouch. tom. I. pag. 325.)

ESPECE XVIII. Accouchement laborieux, où le placenta est attaché sur l'orifice de la matrice. (Levret, accouch. labor. part. 2. pag. 448. — Accouchement difficile par le placenta, adhévant aux bords de l'orifice interne de la matrice, Smellie, observ. sur les accouch. tom. III. pag. 146.)

ESPECE XIX. Accouchement laborieux, où le placenta est attaché sur les parties latérales de la matrice. (Levret, accouch. labor. part. 2. pag. 92.)

ESPECE XX. Accouchement laborieux, par la sortie du cordon ombilical, avant le fœtus. (Levret, art. des accouch. pag. 135. — Smellie, prat. des accouch. tom. I. pag. 371.)

ESPECE XXI. Accouchement laborieux, où le cordon ombilical est trop court, (Levret, art. des accouch. pag. 102.)

ESPECE XXII. Accouchement laborieux, où le cordon ombilical entoure le col de l'enfant. (Levret, art. des accouch. pag. 102. — Rétention du corps du fœtus, par le cordon autour du col, Smellie, prat. des accouch. tom. II. pag. 438-504.)

ESPECE XXIII. Accouchement laborieux, par la rupture difficile des membranes. (Puys, traité des accouch. pag. 123. — Accouchement long, à cause de la dureté des membranes, Smellie, observ. sur les accouch. tom. II. pag. 288-295.)

ESPECE XXIV. Accouchement de longue durée, par la rupture prématurée des membranes. (Smellie, observ. sur les accouch. tom. II. pag. 299.)

ESPECE XXV. Accouchement laborieux, par vice de conformatio[n] dans les différentes parties du corps de l'enfant. (Monstres, Smellie, tom. I. pag. 395.)

ESPECE XXVI. Accouchement laborieux, par hydropisie du ventre de l'enfant. (Levret, art. des accouch. pag. 449.)

GENRE IV. Accouchement laborieux, par la conformatio[n] déséquuse, ou par les mauvaises dispositions de la mère.

ESPECE I. Accouchement laborieux, par excès d'embonpoint de la mère. (Levret, art. des accouch. pag. 102.)

ESPECE II. Accouchement laborieux, par convulsions de la mère. (Smellie, observ. sur les accouch. tom. II. pag. 377.)

ESPECE III. Accouchement laborieux, par la grande inclinaison de la matrice. (Deventar, observ. sur les accouch. pag. 276, 295 & 315.)

ESPECE IV. Accouchement laborieux, par la descente du col de la matrice, ou par celle du vagin. (Accouchement laborieux, par l'allongement & la descente du col de la matrice, Levret, art. des accouch. pag. 115.)

ESPECE V. Accouchement laborieux, par la rigidité des parties. (Smellie, observ. sur les accouch. tom. II. pag. 336 & 499.)

IX. CLASSE, ORDRE V.

133

ESPECE VI. Accouchement laborieux, par le resserrement de la partie inférieure de la matrice, ou de son col, au devant des épaules de l'enfant. (Smellie, observ. sur les accouch. tom. II. pag. 395.)

ESPECE VII. Accouchement laborieux, par la mauvaise conformation du bassin. (Smellie, observ. sur les accouch. tom. II. pag. 419.)

ESPECE VIII. Accouchement laborieux, où la tête du fœtus est engagée & retenue dans le bassin mal conformé. (Smellie, observ. sur les accouch. tom. II. pag. 527.)

ESPECE IX. Accouchement laborieux, par la chute du rectum de la mère.

ESPECE X. Accouchement retardé par une perte de sang. (Smellie, observ. sur les accouch. tom. II. pag. 355.)

ESPECE XI. Accouchement laborieux, par une hernie crurale, ou inguinale, ou exomphale de la mère. (Smellie, observ. sur les accouch. tom. II. pag. 169.)

ESPECE XII. Accouchement retardé par des peines d'esprit. (Smellie, observ. sur les accouch. tom. II. pag. 488.)

ESPECE XIII. Accouchement laborieux, par une pierre dans la vessie de la mère. (Smellie, observ. sur les accouch. tom. II. pag. 165.)

ESPECE XIV. Accouchement laborieux, par le gonflement inflammatoire des parties naturelles. (Smellie, observ. sur les accouch. pag. 433.)

ESPECE XV. Accouchement laborieux, par une excroissance polypeuse à l'orifice de la matrice. (Smellie, observ. sur les accouch. tom. II. pag. 435.)

ESPECE XVI. Accouchement laborieux, par des callosités au vagin. (Smellie, observ. sur les accouch. tom. II. pag. 437. tom. III. pag. 387.)

ESPECE XVII. Accouchement laborieux, par foiblesse de la matrice, ou par foiblesse de la mère. (Smellie, observ. sur les accouch. tom. II. pag. 473.)

GENRE V. Rétention d'une partie du fœtus dans la matrice.

ESPECE I. Rétention de la tête du fœtus dans la matrice. (Tête d'enfant restée seule dans la matrice, Levret, accouch. labor. partie I. pag. 1. — Smellie, pratiqu. des accouch. tom. I. pag. 383.)

ESPECE II. Rétention du tronc du fœtus dans la matrice. (Extraction du corps du fœtus, dont on n'a pu éviter l'arrachement de la tête, Levret, accouch. labor. part. II. pag. 1.)

GENRE VI. Rétention du placenta. (Smellie obs. sur les acc. tom. II. pag. 453.)

ESPECE I. Rétention du placenta, qui se trouve dur & squirtheux. (Smellie, obs. sur les accouch. tom. II. pag. 453 & 454.)

ESPECE II. Rétention du placenta, adhérant au fond de la matrice, & dont le cordon est cassé. (Smellie, observ. sur les accouch. tom. II. pag. 454.)

ESPECE III. Rétention du placenta, par la contraction d'une portion de la matrice. (Smellie, observ. sur les accouch. tom. II. pag. 456.)

ESPECE IV. Placenta enkysté. (Levret, accouch. labor. part. II. pag. 119. — Smellie, observ. sur les accouch. tom. II. pag. 459.)

GENRE VII. Faux-germe. — Rétention dans la matrice, d'un corps solide

134. IX. CLASSE, ORDRE VI.
organisé. — Faux-germe ou mole, Levret, art des accouch. pag. 194. — Faux-
germe, Smellie, observ. sur les accouch. tom. II. pag. 111 & 115.)

GENRE VIII. Réention d'un insecte, ou de plusieurs, dans une partie quelconque du corps.

ESPECE I. Insectes retenus dans les sinus du nez. (*Vermes in capite*, Senn. tom. III. pag. 37.)

ESPECE II. Insectes retenus dans le conduit auditif. (*Vermes aurium*, Cels. oper. med. pag. 378. — *Vermes in auribus*, Senn. tom. III. pag. 235.)

ESPECE III. Insectes retenus dans les bronches pulmonaires, avec expectoration plus ou moins fréquente de ces insectes. (*Vermes in pulmone geniti*, Senn. tom. III. pag. 302.)

ESPECE IV. Insectes dans les reins ou dans la vessie. (*Vermes in vesica*, Senn. tom. IV. pag. 587. — *Vermes in renibus*, Morgagni de sed. morb. tom. II. pag. 139.)

ESPECE V. Insectes retenus dans le péricarde, ou dans le cœur. (*Vermes in pericar-
dio*, Senn. tom. III. pag. 352.)

ESPECE VI. Insectes dans le foie. (*Vermes in hepate*, Senn. tom. IV. pag. 545.)

ESPECE VII. Insectes dans l'ombilic. (*Vermes in umbilico geniti*, Senn. tom. IV. pag. 619. — *Vers omphiliaux*, Brouzet, educ. med. des enf. tom. II. pag. 218.)

ESPECE VIII. Insectes dans l'œsophage, dans l'estomac, ou dans les intestins. (*Lumbrici puerorum*, Baglivi, pag. 59. — *Vers des intestins*, Andry, Gener. des vers, tom. I. pag. 188.)

ORDRE SIXIEME.

RÉTENTIONS des matières fécales.

GENRE I. *Constipation*. — Rétention des matières fécales. (*Alvi retentio*, Senn. tom. IV. pag. 437. — *Alvi adstringatio*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 35.)

ESPECE I. Rétention des matières fécales, de plus ou moins longue durée, sans maladie, ni cause évidentes. (*Alvis segnis absque morbo notabili*, Senn. tom. IV. p. 437.)

ESPECE II. Rétention des matières fécales par leur extrême durété. (*Alvi reten-
tio fecum duritate*, Senn. tom. IV. pag. 438.)

ESPECE III. Rétention des matières fécales par l'abus des astringents. (*Alvi reten-
tio ab adstringentibus*, Senn. tom. IV. pag. 438.)

ESPECE IV. Rétention des matières fécales par l'irritation de l'intestin rectum, ou à la suite des violents purgatifs.

ESPECE V. Rétention des matières fécales par affection spasmodique.

ESPECE VI. Rétention des matières fécales par hémorroïdes internes.

ESPECE VII. Rétention des matières fécales par la stupore ou par la paralysie de l'intestin rectum & de l'anus. (*Alvi retentio, ani stupore aut paralyse*, Senn. tom. IV. pag. 438 & 471.)

ORDRE SEPTIEME.

RÉTENTIONS de matières dures & solides, dans une ou plusieurs cavités.

GENRE I. *Exostose.* — Tuméfaction d'une partie de l'os, ou de l'os entier.
(*Exostosis.* — *Exostose, Petit, malad. des os, tom. II. pag. 353.*)

ESPECE I. Exostose bénigne. (*Exostosis benigna. — Exostose bénigne, Petit, malad. des os, tom. II. pag. 430.*)

ESPECE II. *Cal.* — Accroissement de l'os dans l'endroit fracturé & réuni. (*Callus. — Callus, Heist, inst. chirurg. tom. I. pag. 185.*)

ESPECE III. Exostose rhachitique. (*Petit, malad. des os, tom. II. pag. 440.*)

ESPECE IV. Exostose vénérienne. (*Petit, malad. des os, tom. II. pag. 453. — Exostosis venerea, Astrar. de morb. vener. tom. I. pag. 414.*)

ESPECE V. Exostose scorbutique. (*Petit, malad. des os, tom. II. pag. 443.*)

ESPECE VI. Exostose chancreuse. (*Petit, malad. des os, tom. II. pag. 478.*)

ESPECE VII. Exostose scrophuleuse. (*Petit, malad. des os, tom. II. pag. 480.*)

GENRE II. *Ankylose.* — Immobilité des articulations mobiles. (*Ankylosis, Platner. inst. chirurg. pag. 823. — Ankylose, du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 350.*)

ESPECE I. Ankylose glaireuse. (*du Verney, malad. des os, tom. II. pag. 366.*)

ESPECE II. Ankylose sècheuse. (*du Verney, mal. des os, tom. II. pag. 370.*)

ESPECE III. Ankylose exostosée. (*du Verney, mal. des os, tom. II. pag. 378.*)

ESPECE IV. Ankylose par fracture d'un article. (*du Verney, mal. des os, tom. II. pag. 376.*)

ESPECE V. Ankylose purulente. (*Du Verney, mal. des os, tom. II. pag. 375.*)

ESPECE VI. Ankylose vénérienne. (*Ankylosis venerea, Astrar. de morb. vener. tom. I. pag. 402.*)

ESPECE VII. Ankylose par inaction. (*Du Verney, mal. des os, tom. II. pag. 365.*)

ESPECE VIII. Ankylose par la goutte. (*Du Verney, mal. des os, tom. II. pag. 375.*)

ESPECE IX. Ankylose scrophuleuse. (*Du Verney, mal. des os, tom. II. pag. 375.*)

GENRE III. Corps étrangers arrêtés dans l'œsophage. (*Mém. de l'Acad. de chirurg. tom. I. in-4. pag. 445. — Res præternaturales in œsophago vel fauci- bus hærentes, Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 670.*)

GENRE IV. Tumeur dure, quelquefois indolente, située proche du frein de la langue, contenant un calcul., & empêchant de parler, (*Calculus in lin-*

136 IX. CLASSE, ORDRE VII.
guia, Senn. tom. III. pag. 251. — Calculus sub lingua, Heft. inst. chirurg. tom. II. pag. 653.)

GENRE V. Rétention de corps étrangers dans l'estomac, ou dans les intestins.

GENRE VI. Rétention de calculs dans l'estomac, avec douleur aiguë & souvent intermittente, répondant à la région épigastrique, quelquefois avec vomissement de ces calculs. (*Calculi ventriculi*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 83.)

GENRE VII. *Calculs du foie.* — Rétention de calculs dans le foie, avec douleur aiguë, de longue durée, intermittente, pongitive du côté droit sous les fausses côtes, s'étendant jusqu'à la région ombilicale. (*Calculi biliofi*. — *Calculi hepatis*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 84 & 94.)

GENRE VIII. Rétention de calculs dans les intestins, avec douleur plus ou moins aiguë, quelquefois avec déjection de calculs. (*Intestinorum calculi*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 35, 88 & 90.)

GENRE IX. Rétention de calculs dans l'ombilic. (*Lapides umbilici*, Senn. tom. IV. pag. 619.)

GENRE X. *Calculs des reins.* — Douleur gravative dans la région rénale droite, ou dans la région rénale gauche, ou dans l'une & l'autre, très-aiguë, venant par accès, avec vomissement, accompagnée de douleur & de stupeur dans le cordon spermatique & dans le testicule du côté affecté, & souvent dans la cuisse ; avec évacuation de petits calculs par les conduits urinaires. (*Calculi renum*, Senn. tom. IV. pag. 573.)

GENRE XI. *Calcul de la vessie.* — Calcul retenu dans la vessie ; plus ou moins sensible à la sonde ; avec difficulté d'uriner, souvent avec suppression passagère d'urine, accompagné d'une douleur plus ou moins aiguë dans la région hypogastrique, laquelle s'étend le long du canal de l'urethre, & se fait sentir plus vivement à son orifice externe. (*Calculus vesicæ*, Senn. tom. IV. pag. 584. — *Pierre de la vessie*, Bertrandi, Oper. de chirurg. p. 106.)

GENRE XII. *Calcul dans la tunique vaginale.* — Tumeur dans la tunique vaginale, très-dure, peu sensible, causée par des calculs. (*Calculi in tunica vaginali*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 422.)

GENRE XIII. *Calculs des prostates.* — Calculs formés dans les prostates, avec difficulté plus ou moins grande d'uriner ; & accompagnés d'une douleur plus ou moins vive, rapportée au siège des prostates. (*Calculi in prostatis*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 174.)

GENRE XIV. Substance pierreuse dans les ventricules du cerveau, ou dans la substance du cerveau.

GENRE XV.

IX. CLASSE, ORDRE VIII. 137

GENRE XV. *Cornes.* — Excroissances dures, seches, indolentes, plus ou moins élevées, situées sur les articulations des extrémités, particulièrement des mains & des pieds, souvent avec pâleur du visage, abattement des forces musculaires, & appetit excessif. (*Cornua*, *Senn. tom. V.* pag. 45.)

GENRE XVI. Inégalités de l'ongle.

ESPECE I. Inégalités de l'ongle, sans cause évidente. (*Scabrities simplex unguium*, *Senn. tom. V.* pag. 93.)

ESPECE II. Inégalités de l'ongle par la plique polonoise. (*Scabrities unguium à plica polonica*, *tom. V.* pag. 93.)

ESPECE III. Inégalités de l'ongle par virus vénérien. (*Scabrities unguium*, *Astrac de morb. vener.* *tom. II.* pag. 411.)

ORDRE HUITIÈME.

RÉTENTIONS à la surface du corps, de matières colorantes, ou de matières étrangères & opaques.

GENRE I. *Rouffeur.* — Tache de la peau, peu étendue, de couleur jaunâtre, affectant particulièrement le visage, les bras, & les mains. (*Ephelis*, — *Lentigo*, *Senn. tom. V.* pag. 76.)

ESPECE I. Rouffeur de naissance. (*Lentigo in rufis*, *Senn. tom. V.* pag. 76.)

ESPECE II. Rouffeur chez les femmes enceintes. (*Ephelis in gravidis*, *Senn. tom. V.* pag. 76.)

ESPECE III. Rouffeur par le soleil. (*Lentigo à sole*, *Senn. tom. V.* pag. 76.)

ESPECE IV. Rouffeur par le virus vénérien. (*Maculae venereæ ephelidum inflatae*, *Astrac de morb. vener.* *tom. I.* pag. 400.)

GENRE II. Changement de la couleur des cheveux. (*Canities*, *Senn. tom. V.* pag. 85.)

GENRE III. Dents jaunâtres, avec odeur plus ou moins fétide. (*Dentes initiai colore & folidite*, *Senn. tom. III.* pag. 267.)

GENRE IV. Changement de la couleur des ongles. (*Unguium color mutatus*, *Senn. tom. V.* pag. 93.)

GENRE V. *Alphos.* — Tache superficielle de la peau, blanche, jaune ou brune ; formée d'un assemblage de petites taches ; sans douleur, sans ulcère, avec léger enfouissement, n'affectant qu'une partie des teguments. (*Alphus*. — *Vitiligo*, *Plater. prax. med. tom. III.* pag. 72.)

ESPECE I. *Alphos blanc.* — Tache blanchâtre, formée d'un assemblage de petites

Table des Maladies. S

138 IX. CLASSE, ORDRE VIII.
taches discrètes, donnant du sang lorsqu'on les pique. (*Alphus albus*. — *Alphus albus*, Senn. tom. V. pag. 38.)

ESPECE II. *Alphos très-blanc*. — Tache plus blanche & plus enfoncée que l'alphos blanc, fournissant, lorsqu'on la pique, beaucoup plus de sérosité que de sang; avec les poils de la partie affectée, blancs & semblables à de la laine. (*Leuca*. — *Leuca*, Senn. tom. V. pag. 38.)

ESPECE III. *Alphos noir*. — Tache brune de la pesu, légèrement inégale & comme écaillée, formée d'un assemblage de petites taches continues. (*Melas*. — *Alphus niger*, Senn. tom. V. pag. 38.)

GENRE VI. Tache de naissance. (*Nævus maternus*, Senn. tom. V. pag. 78.)

GENRE VII. *Ecchymose*. — Tache superficielle, d'un rouge noirâtre ou livide, produite par le sang extravasé. (*Ecchymosis*, Senn. tom. V. pag. 24.)

ESPECE I. Ecchymose des téguments par un coup, ou par une blessure. (*Ecchymosis*, Platter. inst. chirurg. pag. 452 & 457.)

ESPECE II. Ecchymose du globe de l'œil. (*Sugillation*. — *Cruor in oculum effusus*, Heist inst. chirurg. tom. I. pag. 592.)

GENRE VIII. *Taches hépatiques*. — Taches de la peau, affectant tantôt une partie & tantôt l'autre, principalement le dos, la poitrine & les jambes; ordinairement de la grandeur de la paume de la main, brunes, ou d'un jaune noirâtre, écaillées, avec légère aspérité. (*Maculae hepaticæ*, Senn. tom. V. pag. 78.)

GENRE IX. *Intempérie du foie*. — Couleur jaune du visage, avec sécheresse de la langue, dégoût, chaleur des pieds & des mains, déjection bilieuse, vomissement bilieux. (*Intemperies calida hepatis*, Senn. tom. IV. pag. 536.)

GENRE X. *Ictere noir*. — Couleur des téguments, d'un brun noirâtre. (*Icterus niger*, Senn. tom. IV. pag. 493.)

ESPECE I. Ictere noir, par poison. (*Icterus niger à veneno*, Senn. tom. IV. pag. 493.)

ESPECE II. Ictere noir, avec douleur gravative & tumeur dans l'hypocondre gauche. (*Icterus niger à liene*, Lomm. observ. med. pag. 225. — *Icterus niger à liene*, Senn. tom. IV. pag. 493.)

ESPECE III. Ictere noir précédé de l'ictere jaune, avec douleur dans l'hypocondre droit. (*Icterus niger ab hepate*, Senn. tom. IV. pag. 493. — *Icterus flavus in nigrum*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 310.)

GENRE XI. *Jaunisse*. — Couleur jaune des téguments & de l'albuginée, avec lassitude, urine jaune, constriction spasmodique dans la région épigastrique, & difficulté de respirer. (*Icterus*. — *Morbus regius*, Aretai, oper. med. pag. 84. — *Aurigo*, Lomm. observ. med. pag. 224. — *Icterus*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 301. — *Icterus*, Morgagni, de sed. morb. tom. II. p. 78.)

ESPECE I. Jaunisse par des boissons, ou par des aliments de mauvaise qualité. (*Icterus à perverfa diatâ*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 303.)

ESPECE II. Ictere par l'impression des corps froids, soit intérieurement, soit extérieurement.

IX. CLASSE, ORDRE VIII. 139

ESPECE III. Ictere par des poisons, ou par la morsure des insectes vénimeux. (*Icterus à morfu venenato, & venenatis*, Senn. tom. IV. pag. 570.)

ESPECE IV. Ictere par pléthore. (*Icterus à plethora*, Fred. Hoffm. tom. III. p. 303.)

ESPECE V. Ictere par la fièvre. (*Icterus in febribus symptomaticis*, Senn. tom. IV. pag. 570. — *Icterus febri biliosæ jundus*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 311.)

ESPECE VI. Ictere par la crise d'une fièvre au foie, sans dureté. (*Icterus à crisi febris*, Senn. tom. IV. pag. 570.)

ESPECE VII. Ictere par inflammation du foie. (*Icterus inflammatione hepatis*, Boëth. van Swiet. de cogn. morb. aphor. 918.)

ESPECE VIII. Ictere des nouveaux-nés. (*Levret, art des accouch.* pag. 251.)

ESPECE IX. Ictere par spasme. (*Icterus à spasmis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 302.)

ESPECE X. Ictere par des calculs. (*Icterus à calculis*, Fred. Hoffm. tom. III. p. 303.)

ESPECE XI. Ictere par obstruction des vaisseaux biliaires. (*Icterus ab obstruktione ductuum bilem fecernentium*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 303.)

GENRE XII. Obscurcissement de la vue. — Diminution ou suppression entière de la vue, par un corps opaque adhérant au globe de l'œil, & situé devant la pupille. (*Caligo*, Senn. tom. III. pag. 225. — *Obscuritas cornæ*, Boëth. de morb. ocul.)

ESPECE I. Leucoma. — Tache blanchâtre de la cornée. (*Albugo, Maître-Jan*, malad. de l'œil, pag. 417. — *Albugo*, S. Yves, malad. des yeux, pag. 182.)

ESPECE II. Nuage de la cornée. (*Nebula & nubecula*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 584.)

GENRE XIII. Cataracte. — Abolition de la vue, par opacité dans la pru-nelle. (*Cataracta*, Heist. inst. chirurg. tom. I. pag. 557. — *Suffusio*, Platner. inst. chirurg. pag. 877.)

ESPECE I. Cataracte vraie. (*Maître-Jan*, malad. de l'œil, pag. 111. — *Vraie cataracte*, S. Yves, pag. 187. — *Vraie cataracte*, Mém. de l'Acad. de chirurg. in-4. tom. II. pag. 337 & 578.)

ESPECE II. Cataracte membraneuse. (S. Yves, malad. des yeux, pag. 196.)

ESPECE III. Cataracte par l'altération de la membrane du chaton. (S. Yves, malad. des yeux, pag. 204.)

ESPECE IV. Cataracte secondaire. (Hoin, Mémoires de l'Acad. de chirurg. in-4. tom. II. pag. 425.)

ESPECE V. Cataracte branlante. (S. Yves, malad. des yeux, pag. 210.)

ESPECE VI. Cataracte, avec immobilité de l'uvée.

ESPECE VII. Cataracte avec protubérance du crystallin. (*Protubérance du crystallin*, Maître-Jan, mal. de l'œil, pag. 209.)

ESPECE VIII. Cataracte, par la vapeur qui s'élève des latrines fermées depuis long-temps. (*Cucitas foricariorum*, Ramallini, oper. med. pag. 515.)

ESPECE IX. Cataracte par des coups. (S. Yves, mal. des yeux, pag. 102.)

ESPECE X. Cataracte par la trop vive réflexion de la lumière ou du feu.

ESPECE XI. Cataracte par vieillisse.

ESPECE XII. Cataracte par l'application d'une substance qui détruit la transparence des humeurs de l'œil, ou du cryallin.

ESPECE XIII. Cataracte par la répercussion d'une humeur.

ESPECE XIV. *Glaucome* — Cataracte compliquée avec la goutte sereine. (*Glaucoma*. — *Glaucome*, *Méth. Jan*, pag. 204. — *Glaucome*, *S. Yves*, pag. 205.)

ORDRE NEUVIÈME.

RÉTENTIONS d'air, dans une ou plusieurs cavités.

GENRE I. *Emphyseme*. — Gonflement élastique des téguments, par l'introduction de l'air dans le tissu cellulaire. (*Emphysema*.)

ESPECE I. Emphyseme par l'air introduit à l'aide d'un soufflet, dans une blessure aux téguments.

ESPECE II. Emphyseme par une blessure pénétrant dans la cavité de la poitrine. (*Sarcites flatuofus*, *Senn. tom. IV*. pag. 565.)

ESPECE III. Emphyseme par la fracture des côtes. (*Emphysema fracturâ costarum*, *Heßl. inst. chirurg. tom. I*. pag. 197 & 199.)

ESPECE IV. Emphyseme par une gale répercutee. (*Emphysema levis à scabie fecit*, *Morgagni*, *de sed. morb. tom. II*. pag. 98.)

GENRE II. *Borborygmes*. — Murmures dans le ventre, plus ou moins forts & réitérés, ordinairement sans douleur, ni tension de l'abdomen. (*Borborygmus*. — *Rugitus ventris*, *Plater. prax. med. tom. III*. pag. 582.)

GENRE III. *Météorisme*. — Gonflement élastique du ventre ; douloureux ; de plus ou moins longue durée ; sans fluctuation, & sans rendre aucun son lorsqu'on frappe sur le ventre. (*Meteorismus*. — *Flatulentia*, *Fred. Hoffm. tom. III*. pag. 339.)

ESPECE I. *Météorisme de l'estomac*. — Gonflement élastique de la région épigastrique, avec difficulté de respirer, anxiété & abattement des forces. (*Flatulentia ventriculi*, *Fred. Hoffm. tom. III*. pag. 339.)

ESPECE II. *Météorisme des intestins*. — Gonflement élastique du ventre, avec douleur plus ou moins aiguë autour du nombril, anxiété, abattement des forces & constipation. (*Flatulentia intestinalium*, *Fred. Hoffm. tom. III*. pag. 340.)

ESPECE III. Météorisme d'une portion des intestins. *Flatulentia pars intestinali*, *Fred. Hoffm. tom. III*. pag. 341.)

ESPECE IV. Météorisme par l'action du froid. (*Flatulentia à transpiration impedita*, *Fred. Hoffm. tom. III*. pag. 340.)

ESPECE V. Météorisme symptomatique. (*Meteorismus à morbis progressis*, *Fred. Hoffm. tom. III*. pag. 340.)

ESPECE VI. Météorisme spasmodique. (*Flatulentia apud hystericos, vel hypochondriacos*, *Fred. Hoffm. tom. III*. pag. 341.)

GENRE IV. *Tympanite*. — Gonflement élastique du ventre, de très-longue durée, ordinairement peu douloureux, rendant, lorsqu'on le frappe, un

IX. CLASSE, ORDRE IX. 141

son presque semblable à celui du tambour. (*Tympanites*. — *Tympanites*, *Lomm. observ. med. pag. 231.* — *Tympanites*, *Fred. Hoffm. tom. III. pag. 341.*)
— *Tympanites*, *Combalusier*, *Pneumato-patholog.* — *Tympanites*, *Forstli opera med. tom. II. pag. 396.*)

ESPECE I. Tympanite par rétention d'air dans l'estomac & dans les intestins. (*Tympanites ab aere in ventriculo & intestinis*, *Senn. tom. IV. pag. 565.* — *Tympanites ab aere in ventriculo aut intestinis*, *Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 98.*)

ESPECE II. Tympanite par rétention d'air dans l'abdomen, hors des intestins, entre le péritoine & les intestins. (*Tympanites in ipsa abdominis cavitate*, *Senn. tom. IV. pag. 565.* — *Tympanites ab aere extra ventriculum & intestina*, *Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 99.*)

ESPECE III. Tympanite avec ascite. (*Tympanites cum ascite*, *Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 100.*)

ESPECE IV. Tympanite par la dilatation extrême d'une portion des intestins. (*Tympanites à dilatation flupendâ coli*, *De Haen, rat. med. tom. II. pag. 54.*)

ESPECE V. Tympanite enkystée, avec plus ou moins d'eau. (*Tympanites & hydrops cyclicus*, *De Haen, rat. med. tom. II. pag. 57.*)

ESPECE VI. *Hydropisie seche.* — Gonflement flattueux du ventre, avec fièvre, colique & évacuation de matières fécales semblables à celle des chevies. (*Hydrops fuscus*. — *Hydrops fuscus*, *Baglivi, oper. med. pag. 81.*)

GENRE V. *Tympanite de la Matrice.* — Gonflement presque sphérique & uniforme dans la région hypogastrique, peu douloureux, élastique ; produit rapidement par l'air contenu dans la matrice, lequel s'échappe de temps en temps par le vagin & avec bruit : donnant à la matrice la forme d'un balon qu'on reconnoit par l'introduction du doigt dans le vagin ; avec élévation du col de l'utérus, affaissement des mamelles, nombril arroudi & plus enfoncé que dans la vraie grossesse. (*Inflatio uteri*, *Senn. tom. IV. pag. 638.* — *Fausse grossesse par l'air*, *Leyret, art des accouch. pag. 199.*)

GENRE VI. *Hernie venteuse.* — Tumeur élastique sur la surface du ventre ou du bassin, plus ou moins douloureuse, produite par l'air renfermé dans une portion d'intestin déplacée.

ESPECE I. Hernie venteuse de l'ombilic. (*Pneumatophale*, *Dionis, oper. de chir. p. 108.*)

ESPECE II. Tumeur élastique sur le scrotum, formée par l'air renfermé dans une portion d'intestin reçue dans le scrotum. (*Pneumatocele ab aere intra intussum in scroto inclusum*, *Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 191.*)

GENRE VII. Gonflement élastique du scrotum, souvent douloureux, transparent, produit par l'air retenu dans le tissu cellulaire du scrotum. (*Pneumatocele*, *Plater. prax. med. tom. III. pag. 201.* — *Pneumatocele*, *Heist. inst. chirurg. tom. II. pag. 806.* — *Emphysema Scroti*, *Morgagni, de sed. morb. tom. II. pag. 191.*)

Fin de la Table des Maladies.