

## SERPENTARIAE. Endlicher.

Bearbeitet

von

DR. FRIEDRICH KLOTZSCH.

---

### ARISTOLOCHIEAE, Jussieu.

Genera plant. p. 72.

**Aristolochia**, Tournefort.

Instit. p. 162. tab. 71.

**Aristolochia Petersiana**, Klotzsch.

*Fruticosa, volubilis, glaberrima; caule ramoso anguloso; foliis ovatis profundo-cordatis obtusis vel acutis vel cuspidatis, margine obsolete-crenatis, supra saturato-viridibus, subtus glaucis; racemis in apice ramorum axillaribus solitariis 2—4 floris pedunculatis bracteatis; bracteis magnis ellipticis mucronulatis, basi cordatis et lobis approximatis; calycis limbo tubuloso-lingulato, extus glabro longiusculo stipato, labio elongato-elliptico acuto utrinque attenuato intus sparsim puberulo tubum aequante.*

Standort: Auf steinigem Boden. Rios de Sena. Tette.

Frutex volubilis, ramosus, 4—6 pedalis. Caulis ramique sulcato-angulati, crassitudine pennae anserinae ad pennam passerinam. Folia 2—2½ poll. longa, ad basin 1—2 poll. lata. Pedunculi 4—6 lin. longi. Pedicelli 3 lin. longi. Racemi bipollicares. Bractee 6 lin. longae, 3 lin. latae. Limbus calycis 22 lin. longus.

---