

### Corrigenda.

- Seite 45. *Tephrosia crotalarioides* Kl. ist *Indigofera spiniflora* Hochst.  
- 47. *Tephrosia Apollinea* DC. ist nicht diese, sondern eine neue Art, welche Dr. Schweinfurth *T. Ehrenbergiana* genannt hat.  
- 99. Die als *Crozophora tinctoria* Juss. aufgeführte Pflanze ist *Crozophora plicata* Juss.  
- 126. *Hibiscus variabilis* Grcke. Diese Art muß mit *H. physaloides* Guillem. u. Perr. vereinigt werden. Nach der von den Autoren gegebenen Diagnose und Beschreibung liefs sich die Identität dieser damals nur von der Westküste Africa's bekannten, sehr polymorphen Pflanze mit der in Mossambique gefundenen nicht vermuthen. Exemplare auf den Cap Verdischen Inseln gesammelt, welche ich nach dem Druck des betreffenden Bogens dieses Werks zu sehen Gelegenheit hatte, überzeugten mich von der Identität beider Arten. Die Pflanze kommt übrigens nicht blos im ganzen tropischen Westafrika bis zu den Cap Verdischen und Canarischen Inseln und in Mossambique, sondern auch am Cap der guten Hoffnung vor. Zwei andere hierher gehörige Synonyme sind *H. adscendens* G. Don und *H. heterotrichus* E. Meyer.  
- 140. *Orygia mucronata* Kl. ist *Orygia decumbens* Forsk.  
- 190. *Rogeria microcarpa* Kl. ist *Petalium Murex* L., eine in Ostindien und Ostafrika häufig vorkommende Pflanze.  
- 241. *Convolvulus involuclatus* Kl. ist *Convolvulus rhyinospermus* Hochst.
-