

I. PRIMATES.

Dentes primores incisores: superiores IV, paralleli.

Manuae pectorales binae.

I. HOMO. Nosce te ipsum. (*)

Sapiens. I. H. diurnus; varians cultura, loco.

Ferus. Tetrapus, mutus, hirsutus.

Juvenis uestitus Lithuanus 1661.

Juvenis lupinus Hassiacus. 1544.

Juvenis ovinus Hibernus. Tulp. obs. IV. 9.

Juvenis bovinus Bambergensis Camerar.

B 3

Juve-

(*) NOSCE SE IPSUM gradus est primus sapientiae, dictumque Solonis, quondam scriptum litteris aureis supra Diana templum.

Physiologe: Te contextum Nervis, intertextum Fibris, Machina fragili, sed adolecente in perfectissimam, facultatibus instructam fere omnibus, pluribusque quam reliqua cuncta. Nudum in nuda humo, natali die, abjecit natura, ad vagitus statim et ploratum, manibus, pedibusque devincendum, flens Animal ceteris imperaturum; cui scire nihil sine doctrina: non fari, non ingredi, non vespi, non aliud naturae sponte. Plin. Vides itaque qualem vitam nobis rerum natura permisit, quae primum nascentium omen sicutum esse voluit. Seneca. Sed miseret atque etiam pudet aestimantem, quam sit frivola animalium superbissimi origo. Plin.

Tecum habita.

Diaetetice: Te sanitate et tranquillitate si noveris felicem, Croeso, Salomone, Alexandroque majorem: Te Moderatis conservandum, Nimiis destruendum, Variatis afficiendum, Insuetis frangendum, Consuetis indurandum. Te polyphagum Culina instructissima, per errores gratissima, igne vinoque horronda. Parvo fames constat, magno fastidium. Opinio immensum desiderat; Natura exiguum et parabile, ergo ad supervacanea sudatur. Seneca. Prout vivis, ita ibis.

Cura valetudinem!

Pathologice: Te tumidam usque dum crepueris bullam, piloque pendulam in puncto fugientis temporis. Nihil enim homine imbecillus terra alit. Homer. Nulli vita fragilior, nulli tot morbi, tot curae, tot pericula: Breve universum utique aevi tempus: Pars aqua morti similis exigitur, nec reputantur infantiae auni, qui sensu carent; nec senectae in poenam vivaces; hebescunt sensus, torquent membra, praemoriuntur visus, auditus, incessus, dentes, ciborum instrumenta. Plin. Sic magna pars mortis jam praeterit, quicquid aetatis retro est mors tenet. Totum denique hunc, quem vides populum, quoisque cogitas esse; cito natura revocabit et condet; mors omnes aeque vocat; iratis Diis propitiisque moriendum. Senec. II. 59.

Memento mori!

Naturaliter: Te audacis naturae miraculum, animalium principem, cuius eausfa cuncta genuit natura, esse simium animal flens, ridens, melodum, loquens, docile, judicans, admirans, sapientissimum: sed fragile, nudum, suapte

Juvenis Hannoveranus. 1724.

Pueri Pyrenaici. 1719.

Puella Transfusalana. 1717.

Puella Campanica. 1731.

Johannes Leodicensis Boerhavii.

America- α . *rufus, cholericus, rectus.*

nus. Pilis nigris, rectis, crassis; naribus patulis; facie ephelitica; mento subimberbi.

Pertinax, contentus, liber.

Pingit se lineis daedaleis rubris.

Regitur consuetudine.

Euro- β . *albus, sanguineus, torosus.*

paeus. Pilis flavescensibus prolixis; oculis caeruleis.

Levis, argutus, inventor.

Tegitur vestimentis arctis.

Regitur ritibus.

y. Iuri-

suapte natura inerme, ad omnem fortunae contumeliam projectum, alienae opis indigens, anxiae mentis sollicitaque tutelae, querulac vitae, precarii spiritus, pertinacis spei, tardae sapientiae. Temporis annihilati emortui contemtorem, praesentis vividi dilapidatorem, futuri dubii aestimatorem in vita volucri, pretiosissima, irrevocabili; sic optima quaeque dies miseris mortalibus aevi prima fugit; alium ad quotidianum opus laboriosa egeitas vocat, alium luxus incarcerat, altilemque suffocat; alium ambitio nunquam quieta sollicitat; alias divitiis, quas optaverat, metuit, et voto laborat suo; alium solitudo, alium vestibulum semper obsidens turba. Hic se habere dolet liberos, hic se perdidisse; lacrymae nobis deerunt, antequam caussae dolendi, quas detergant sola oblivia. Sed quousque nos malos nostra mala rapnere; circumferre pericula, ruere in ignotos, iratos sine injuria, ferarum more occidere quem non oderimus, secundos optare ventos, quorum felicitas est ad bella perseverare: parum videlicet ad mortes nostras terra late patet. Senec. cetera animantia congregari contra dissimilia, at homini plura ex homine mala. Plin.

Innocue vivito, Numen adest!

Politice: Te recti loco tenere errorem publicum factam, qui te vix enixum consuetudinis larva induit, nutrit, educat, alit, regit, secundum quam honestus, forris, sapiens, moratus, pius existimaris; cum gubernatus opinione vivas ad consuetudinem, nec ad rationem. Te, inter perituros constitutum, cum nulli contigir impune nasci, beneficii loco petere, ut ultimus cervicem praebeas, dum interim, dulci fortuna ebrios, colligendo in crastinum lapillos fortunae certas, larratu in furorem ageris, aliter theorericę pios odio persequeris, quantosque tumultus excitas, non ut servias, sed cui; nugis irrevocabile tempus consumis; immortalia aeternaque animo volutas, de feris nepotibus pronepotibusque disponis, novas spes oblitus conditoris tuae inchoas, immemor sepulchri arces struis, cum interea longa coenantem mors opprimit, at in agone oculos aperiens ($\alpha\gamma\delta\varphi\omega\pi\tau\omega\zeta$) somnum primo observas; Sic vivimus ut immortales, et morimur, ut mortales. Senec.

Esto antiqua virtute et fide!

Mora-

Afriacus. γ. Iuridus, melancholicus, rigidus.
Pilis nigricantibus; oculis fuscis.
Severus, fastuosus, avarus.
Tegitur indumentis laxis.
Regitur opinionibus.

Afer. δ. niger, phlegmaticus, laxus.
Pilis atris contortuplicatis; cute holofericea; nafo simo; labiis tumidis. Feminis sinus pudoris; mammae lactantes prolixae.
Vafer, segnis, negligens.
Ungit se pingui.
Regitur arbitrio.

(*)

B 4

ε. solo

Moraliter: Te combinatum medullari animato volente justum, et corporeo affectuoso volente gratum, sub larva ineptum, lascivum, sectatorem, ambitiosum, prodigum, querulum, astutum, morosum, invidum, malitiosum, avarum, transformari in attentum, castum, consideratum, modestum, sobrium, tranquillum, sincerum, mitem, beneficum, gratosum, suis contentum. *Uni animantium Inclusus, luxuria, ambitio, avaritia, vivendique cupidio; curat atque etiam post se de futuro.* Plin.
Benefac et laetare!

Theologice: Te ultimum finem creationis;
In telluris globum, Omnipotentis magisterium, introductum; ratione sapiente, secundum sensus concludente, mundi contemplatorem; ut ex opere agnoscere Creatorem omnipotentem, omniscium, immensem et sempiternum DEUM, cuius sub imperio quod moraliter vivas, a justissima ejus nemesi convincaris. (Cetera revelata a Theologis explicanda.)

Duo enim sunt, quae in cognitionem DEI ducant, Creatio et Scriptura.

Augustinus.

DEUS itaque Natura cognoscendus, dein Doctrina recognoscendus.

Tertullianus.

Homo solus DEUM contemplatur, Naturae et revelationis eundem Auctorem, quem Te DEUS esse jussit, et humana qua parte locatus es in re, disce.

Pers. Sat. III. 71.

Memento Creatoris Tui!

(*) Melius forsitan dispescerentur hominum species ita:

albus. α. Structura ad leges pulchritudinis, quas nos quidem putamus esse, quam maxime accommodata.
Huc spectant Europaei fere omnes; incolae Asiae, intra Obium, mare Caspium, montem Imaum, et Gangen sitas; porro Africae septentrionalis, et ipsi Groenlandi et Eskimos.

badius. β. Ex flavo fusi, pilis rarioribus, facie plana, oculis parvis.
Huc referas reliquos Asiae incolas.

niger. γ. Pilis crassis, nafo retuso, labiis tumidis.
Huc pertinent ceteri Africae incolae.

δ. Co-

Monstro- e. solo (a) et arte (b. c.) variat:

- fus. a. *Alpini* parvi, agiles, timidi.
Patagonici magni, segnes.
- b: *Monorchides* ut minus fertiles: *Hottentotti*.
Imherbes plures Americae populi.
- c. *Macrocephali* capite conico: *Chinenes*.
Plagiocephali capite antice compreso: *Canadenses*.

Habitat intra Tropicos Palmis Lotophagus.

Hospitatur extra Tropicos sub novercante Cerere, carnivorus.

DESCRIPTIO: CORPUS erectum, nudum, uti quidem in lucem editur inerme, pilis raris remotissimis adspersum, subsexpedale.

CAPUT obovatum: *Pileus* longius pilosus: *Syncipite* obtuso,
Vertice obtuso, *Occipite* gibbo.

Facies nuda: Frons planiuscula quadrata, *temporibus* compressa, angulis senu intra pileum adscendens. *Supercilia* prominula pilis extrorsum in futuram imbricatis, interstincta *Glabella* planiuscula. *Palpebra superior* mobilis, *inferior* quieta; utraque *ciliis* exstantibus subrecurvatis pectinata: *Oculi* nullo musculo suspensorio detenti, rotundi: *Pupilla* orbiculata absque membrana nictitante. *Genae* gibbae, molliusculae, coloratae. *Mala*e compresiusculae. *Buccae* laxiores. *Nasus* prominens, labio brevior, compressius, apice altior gibbosiorque: *Naribus* ovatis intus hirtis, margine crassiusculo. *Labium superius* subperpendiculare, lacuna exaratum; *labium inferius* erectiusculum, magis gibbum. *Mentum* prominens, obtusum, gibbosum. *Os* maribus fetis barbatum, inprimis mentum fetis fasciculatum. *Dentes* maxillae ipsi insidentes utrinque *Primores* incisores, errecti, paralleli, approximati, magis aequales, plani ac rotundi, quam quidem in aliis animalibus; *laniarii* solitarii, primoribus paulo longiores, breviores tamen, quam in aliis animalibus, utrinque reliquis approximati; *molars* quini, obtusiusculi, non tam alte incisi, quam in aliis animalibus. *Aures laterales*: *auriculae* rotundato-lunatae, appressiusculae,

cupreus. d. Colore cutis ad cuprum accidente.

Huc numerandi reliqui praeter Groenlandos et Eskimos' Americae incolae.

fuscus. e. Ut plurimum colore fusco, naso lato, pilis densioribus.

Huc spectant insularum australium, et plurimarum indicarum incolarum.

G.

usculae, nudae, supra margine fornicatae; infra gibbosae, molles.

TRUNCUS constans collo, thorace, dorso, abdomine.

Collum teretiusculum, capite brevius; *vertebrae* ejus nullo ligamento suspensorio connexae; *cervicis nucha* concava; *gula* supra concava, medio subtus gibba.

Thorax antice posticeque depresso-usculus; *pectus* planiusculum, *jugulo* excavato, *axillis* concavis barbatis, *scrobiculo* planiore. *Mammae* duae, pectorales, distantes, gibbae, rotundatae; *papilla* cylindrica, obtusa, rugosa, *areola* cincta.

Dorsum tergo planiusculo, humeris exstantibus, *interescapulio* depresso.

Abdomen gibbum, laxum; *umbilico* excavato, *epigastrio* planiore, *hypogastrio* gibbosiore, *inguinibus* planiusculo-concavis. *Pubis* regio barbata. *Pelvis* supra dilatata, infra angustata. *Genitalia* exserta: *pene* cylindrico, scroto subrotundo, rugoso cute laxa, *futura* longitudinali per *periureum* excurrente, s. *vulva* gibba compressiuscula, *hymene*, *clitoride*, *nymphisque* instructa, ex qua fluxus adultis sanguinis periodicus. *Cauda* exserta nulla.

ARTUS ex *Manibus* loco pedum anteriorum, et *pedibus* posterioribus.

Manuum *Armi* divaricati crassiusculi, teretes, longitudine pedum. *Cubitus* obtuso-prominulus. *Ulna* crassitie armarum, teres, introrsum planior. *Palmae* rotundatae, dilatatae, planae, extus convexae; *vola* concava; *digiti V*: *Pollex* remotus, brevior, crassior; *Digiti 2, 3, 4, 5* approximati, horum 5 minor reliquis, dein 2, 4, sed 3 paucio longior, medium femoris attingens. *Ungues* omnibus rotundati, obovati, plano-convexi; *lunula* pallida.

Pedum *Femora* approximata, *tumbis* musculosis, *natibus* gibbis carnosis, *genibus* antrorsum versis, obtusissimis, *poplitibus* subtus concavis. *Crura* longitudine femorum; postice musculo-ventricosa, inferne angustiora, antice macra.

Calcanei talis oblongis et (quam in aliis animalibus) latioribus, cum planta pedis ipsa junctis, insistentes, crassi, prominuli, gibbi: *malleolis* lateralibus oppositis, hemisphaericis, duriusculis. *Plantae* oblongae supra convexiusculae, subtus planae, transversim concavae. *Digiti V*: omnes incurvi, subtus gibbi, approximati: *Pollex* crassior, brevior; 2, 3 subaequales, 4, 5 decrescentes, ultimo minimo. *Ungues* ut in manibus omnes.

*Dif*ferit itaque a reliquis corpore erecto nudo; at piloso capite, superciliis, ciliisque, in maturis pube, axillis, in masculo sexu mento. Mammae 2 pectorales. Caput cerebro omnium maximo; uvula; organa loquela; facies abdomini parallela, nuda; naso prominente, compresso, breviore, mento prominente. Cauda nulla. Pedes talis insilentes. Feminis hymen, et menstrua.

2. SIMIA. *Dentes Primores utrinque IV, approximati.*

Laniarii solitarii, longiores, hinc remoti.

Molares obtusi.

* Cauda nulla, *Simiae veterum.*

Troglodytes. 34. *S. ecaudata macrocephala torosa*, dorso et humeris pilosiss., reliquo corpore glabro. *Blumenbach Compend. hist. natur.* I. p. 65. et *de generis humani varietate nativa.* p. 37.

Satyrus indicus. *Tulpii observat. medic.* p. 284. *Tab. XIII.* Chimpanzee. *Scotin. v. Nov. Act. Er. Lips. m. Sept. 1739.* *Tab. V. p. 564.*

Habitat in Angola, 1738. mense Augusto primo in Europam, Londinum scilicet, delatum animal.

Satyrus. I. *S. ecaudata ferruginea*, lacertorum pilis reversis, natibus tectis. *Amoenit. acad.* 6. p. 68. t. 76. f. 4.

Homo sylvestris. *Edw. av.* 5. p. 6. t. 213.

Orang-Utang. *Camper kort Bericht wegens de Ontleding van verschedene Orang-Utangs.* Amsterd. 1778. 8.

Habitat in insula Borneo.

Corpus

Quae de homine troglodyte refert Immortalis Au^rtor, partim figmentis nituntur, partim ad monstruosam morbosam hominum progeniem, partim ad simias pertinent. Ad prima refero praesertim, quae de loquela, cogitationibus, ratiociniis ejus referuntur; alterum testatur citatum Kakurlacko synonymon, tertium Bontius allegatur et reliqua descriptio: Ad fictitia refero pariter luciferum sive hominem caudatum.

Simia quam similis turpissima bestia nobis, *Ennius*; quod Simiae Mammae, Clitoris, Nymphae, Uterus, Uvula, Cilia, Ungues hominis sunt; ligamentum colli suspensorium, ut illi, deficit; *Mirum adeo parum differre stultissimam Simiam a sapientissimo homine.*

capite,
naſculo
mniū
i paral-
, men-
s. Fe-

roxī-
hinc

s pilo-
hifor.
nativa.

. XIII.
· 1739.
repam,

natibus

tleding
8.

Corpus

nitun-
tim ad
gitatio-
ko syn-
a refeſo

ammae,
; lig-
differre

Corpus bipedale, saepius erectum, undique vestitum brunnneum, pilis rarioribus rufo-fuscis, longitudine vix ditti. Pili in lacertis reversi versus cubitum. Nates tectae. Caput rotundum. Frons nuda. Oris margo hirtus. Cilia nigra; superiora longiora, densiora. Superciliorum loco series transversa pilorum. Nares brevissimae subvillosae. Palmae intus glabrae, pollice palma breviore. Plantae forma pedum, pollice brevissimo, reliquis digitis longioribus.

Magna huic cum homine intercedit similitudo, osse etiam hyoideo; ast praeter alia cum simiis communia pollici pedum posteriorum deest unguis, laryngis alia plane est struetura, et tum musculi, tum universa ossium compages ostendunt non natum esse bipedi ingressui animal.

Habetur hujus varietas major quinque vel sex pedum.

Great Ape. Pennant synops. of quadr. n. 64. p. 93.

Pongo. Buffon histoir. natur. Vol. XIV. p. 43.

Homo sylvestris, Orang-Outang. Bont. jav. 84. t. 84.

An sexu aut aetate, vel, quod probabilius, varietate aut specie differunt, patria certissime diversae, quae ipsis est Angola?

Homo sylvestris, Orang-utang. Tyson anat. of a pygmy.

Lond. 1699. 4. f. I. 2.

*Jocko. Buffon histoir. natur. Vol. XIV. p. 43. T. I. **

Cyolock. de Visme act. angl. Vol. XIV. p. 73. T. 3.

Lar.

35. *S. ecaudata, natibus calvis, brachiis longitudine corporis.*

Homo Lar, brachiis longitudine corporis. Mantiss. pl. 2.

p. 521. Miller on various subj. of nat. hist. t. XXVII.

A. B.

Grand Gibbon. Buffon hist. natur. T. XIV. p. 92. T. 2.

Longarmed ape. Pennant Quadr. p. 99. n. 66.

Simia longimana. Schreber Saeugthiere, I. p. 66. Tab. III. I.

Habitat in India, mitis, segnis, frigoris pluviaeque impatiens.

Facie incarnata subnuda, et ingressu saepius erecto magis ad hominem accedit, quam Satyrus. 4 pedum altitudinem assequitur, niger.

Habetur autem varietas fusca vix ultra $2\frac{1}{2}$ pedes alta.

Petit gibbon. Buffon hist. nat. XIV. t. 3.

Schreber Saeugth. T. III. f. 2.

Sylvanus. 2. *S. ecaudata, natibus calvis, capite subrotundo, brachiis brevioribus.*

Simia. Gesn. quadr. 847.

Simia

Simia unguibus omnibus planis et rotundis. *Briff. quadr.*

188.

Cercopithecus. Jonst. quadr. t. 59. f. 5.

Pitheque. *Buffon hist. nat. Vol. I. p. 84.*

Pygmy-ape. *Pennant synops. p. 98. n. 65. T. 12. f. 1.*

Habitat in Africa, Zeylona. Minatur minis, cachinno blanditur, Caffrorum more salutat. Sorbilia manu haurit.

Frons ad superciliorum regionem transverse gibba. Facies brevis plana. Pellis ursina. Scrotum tanquam intra vulvam reconditum; vel penis intra seroti foramen; autumno testiculi intumescunt. Sedes feminae rapi instar exuberans. Lacertorum pili subtus reversi, uti et cervicis. Πιθηκος veterum.

Anatome. E. N. C. d. 2. a. 7. obs. 40.

Inuus. 3. *S. ecaudata, natibus calvis, capite oblongo.*
Simia cynocephala, unguibus planis et rotundatis. Briffon quadr. 191.

Cynocephalus 1 et 2. Alpin. aegypt. p. 241. T. 15. f. 1. et T. 16.

Magot. *Buffon hist. natur. XIV. p. 109. T. 8. 9.*

Barbary-ape. *Pennant synops. p. 100. n. 67.*

Simia Inuus. *Schreber Sacugthiere, I. p. 71. T. V.*

Habitat in Africa.

Simillima S. Sylvano et Cynocephalo, sed rostro produetiore, colore pallidiore; non miscetur cum Sylvano. Ungues omnes rotundati.

* * *Cauda abbreviata: Papiones, Κυνοεφαλα veterum.*

Nemestri- 4. *S. semicaudata subbarbata grisea, iridibus brunneis, natibus calvis.*

Simia brevicaudata. Edw. av. 5. p. 8. t. 214.

Habitat in Sumatra.

Apedia. 5. *S. semicaudata, palmarum pollice approximato, unguibus oblongis: pollicum rotundatis; natibus tectis.*

Simia cauda abrupta, unguibus compressis: pollice palmarum digitis adhaerente. Amoen. acad. I. p. 278.

Habitat in Indiis.

Magnitudo et color sciuri, subgrisea.

Pollex manuum anticarum non remotus. Ungues omnes oblongi compressi, sed pollicum tam anteriorum, quam posteriorum humanis similes. Cauda brevissima, vix pollicis trans-

*transversi. Os fuscum pilis patulis. An a S. sciurea
specie distincta?*

Sphinx. 6. *S. semicaudata*, ore vibrissato, unguibus acuminatis, natibus calvis.

Papio s. Baboon. *Gesn. quadr. 252. t. 253. Aldrov. dig.
260. Jonst. quadr. 145. t. 61. f. 1. Raj. quadr. 158.
Briss. quadr. 192.*

Papion. *Buffon hist. nat. T. XIV. p. 133. T. 13. 14.*

Simia Sphinx. *Schreber Saugthiere, I. p. 80. Tab. VI.*

*Habitat in Borneo, animal libidinosum, mulieribus facile
vim inferens, robustum et ferox.*

*Caput oblongum canis, sed obtusius. Collum longum.
Cauda brevis, erecta. Nates sanguinolentae.*

Mormon. 36. *S. semicaudata* subbarbata nigro-fusca, malis tumidis nudis cyaneis oblique striatis, natibus calvis sanguineis.

Alstroemer Aet. Holmiens. 1766. Vol. 27. p. 138.

Simia semicaudata barbata, vertice setis erectis mitram referentibus obsito, unguibus acutis. *Kramer animal. aust. p. 310.*

Mantegar. *Philosoph. Transact. n. 290.*

Chloras. *Breslauer Natur- u. Kunstgesch. XV. Versf. 177.*

Tufted ape. *Pennant synops. p. 102. n. 68. T. 12. 13. f. 2. 1.
(ic. mal.)*

Simia Mormon. *Schreber Saugthiere, I. p. 65. T. VIII.*

Habitat in India.

Frons pilis erectis fastigiatis canis. Rostrum productum nudum. Nafus sanguineus. Bucca nuda caerulescens, oblique sulcata. Barba alba brevis. Gula flavescens. Collum supra canum, subtus flavescens. Dorium griseo-fuscum. Abdomen exalbidum. Lumbi pilo tenuiore perlucente, cute violacea. Nates tuberosae nudae, sanguineae. Sutura abdominis longitudinalis, nuda, sanguinea. Cauda abbreviata. Ungues acutiusculi, pollicum rotundati. *Georgii.*

Maimon. 7. *S. semicaudata* subbarbata, genis caeruleis striatis, natibus calvis.

Cynocephalus. *Gesn. quadr. 93. t. 93. Clus. exot. 370.*

Cynocephalus 2. *Jonst. quadr. t. 59. f. 4.*

Cercopithecus cynocephalus, anterius longis pilis, nafso violaceo nudo. *Briss. quadr. 214.*

Mandrill. *Buffon hist. nat. XIV. p. 154. T. 16. 17.*

Ribbed.

Ribbed-nose ape. *Pennant Synops. p. 103. n. 69.*

Simia Maimon. Schreber Saeugthier. I. p. 74. T. VII.

Habitat in Guinea.

Diffrat a priori naso similiter caerulecente, et deficiente verticis coma.

Porcaria. 48. *S. semicaudata, capite suillo, rostro nudo, corpore fusco-olivaceo, natibus tectis, unguibus acuminatis. Boddaert Naturf. 22. p. 17. t. 1.2.*

Habitat in Africa, Χειροπίθηκος Aristotelis, 3 pedes et 6 pollices longus.

* * * *Cauda elongata: Cercopithecus, Κῆποι Aristotelis.*

* *buccis saccatis, natibus calvis.*

Cynosu- 37. *S. caudata imberbis, facie elongata, fronte fuliginosa, fascia superciliari albida, genitalibus masculis coloratis, unguibus convexis. Scopoli delic. flor. et faun. insubric. Ticin. 1786. fol. P. I. p. 44. T. XIX.*

Habitat in - - -

Statura canis mediocris; corporis longitudine fere bipedalis. Animal infidum, inquietum, salacissimum.

Hama- 8. *S. caudata cinerea, auribus comosis, unguibus acutiusculis, natibus calvis.*

Simia aegyptiaca, cauda elongata, clunibus tuberosis nudis. Hasselq. it. 189.

Simia supra aures comata. Alpin. hist. nat. Aeg. p. 242. T. 17--19.

Cynocephalus. Gesn. quadr. p. 252. fig. p. 253.

Dog-faced ape. Penn. synops. p. 107. n. 72. Tab. 14. f. 1.

Simia Hamadryas. Schreber Saeugth. I. p. 82. T. X.

Habitat in Africa.

Corpus cinereum. Cauda longitudine vix corporis. Aures longa coma utrinque dependente galericuli in modum. Nates calvae sanguinolentae.

Veter. 9. *S. caudata barbata alba, barba nigra.*

Cercopithecus barbatus albus, barba nigra. Briff. quadr. p. 147.

Simia alba seu incanis pilis, barba nigra promissa. Raj. quadr. p. 158.

Lowando. Buffon hist. nat. T. XIV. p. 169.

β. Simia lactea barbata. Penn. synops. p. 110.

Habitat in Zeylona.

- Silenus. 10. *S. caudata barbata nigra*, barba nigra prolixa.
Cercopithecus barbatus niger, caesarie prolixa faciem cingente. *Briss. quadr. 209.*
Simia Callitrix magnitudine magnorum eynocephalorum.
Alpin. aeg. p. 242. t. 21.
- β. *Simia Silenus caudata barbata*, corpore nigro, barba nivea prolixa. *Syft. edit. X. p. 26.*
Cercopithecus barbatus niger, barba incana promissa. *Raj. quadr. p. 158.*
Ouanderon. Buffon hist. nat. T. XIV. p. 169. T. 18.
Lion-tailed ape. Pennant syn. p. 109. n. 73. T. 13. A. f. I.
Simia Silenus. Schreber Saeugth. Tom. I. p. 88. sqq. Tab. XI.
Habitat in Zeylona et reliqua India.
- Faunus. 11. *S. caudata barbata*, cauda apice floccosa.
Cercopithecus barbatus infra albus, barba incana mucronata, cauda in floccum. *Briss. quadr. 209.*
Cercopithecus barbatus I. Clus. exot. p. 371.
Malbrouck. Buffon hist. nat. T. XIV. p. 224. Tab. 29.
Simia Faunus. Schreber Saeugth. I. p. 90. T. XII.
Habitat in Bengala.
Corpus nigricans. Pectus et abdominis anteriora alba. Earba incana mucronata. Ungues humani.
- Cyno- 15. *S. caudata imberbis*, naribus bifidis elatis, cauda arcuata,
molgus. natibus calvis.
Cercopithecus cynocephalus, naribus bifidis elatis, natibus calvis. *Briss. quadr. 213.*
Cercopithecus angolensis major. Raj. quadr. 155.
Macaque. Buffon hist. nat. XIV. p. 190. t. 20.
Hare-lipped ape. Penn. syn. p. III. n. 74.
Simia cynomolgos. Schreber Saeugth. I. p. 91. T. XIII.
Habitat in Africa; vigilias noctu instituit in arboribus, vix a sequente diversa.
- Cynoce- 16. *S. caudata imberbis flavesiens*, ore producto, cauda recta,
phalos. natibus calvis.
Cercopithecus cynocephalus ex viridescentibus et flavicanti- bus pilis. Briss. quadr. 213.
Cercopithecus. Jonst. quadr. t. 59. f. ult.
Habitat in Africa.
Simillima S. Inuo, sed caudata.

I. Vertebrata I. D. g. Tota. I. Mammalia

32

MAMMALIA PRIMATES. Simia.

Diana. 17. *S. caudata barbata*, fronte barbaque fastigiata. *Aet. Stokh.*
1754. p. 210. Tab. 6.

Cercopithecus barbatus fuscus, punctis albis inspersis, barba
alba. *Briss. quadr. p. 148. n. 23.*

Cercopithecus barbatus guineensis. *Raj. quadr. 159.*

Cercopithecus barbatus 2. *Clus. exot. 371.*

Spotted ape. *Penn. syn. p. 112. n. 75.*

Simia Diana. *Schreber Saeugth. I. p. 94. T. XIV.*

Habitat in Guinea.

Junior ludibunda dejicit omnia, peregrinos mutitando sa-
lutat, irata maxillas biante ore exagitat. Adultior den-
tibus laniariis elongatis mordax et maligna evadit. Cu-
bile purum servat; vocata respondet grec.

Magnitudo felis majoris, nigra punctis albidis. Dorsum
postice ferrugineum. Femora subtus belvola. Gula pectus-
que alba. Frons pilis erectis albis fastigiatis linea trans-
versa in formam lunae crescentis. Barba fastigiata nigra,
subtus alba longiorque, insidens tuberi adiposo. Linea
alba ab ano ad genua ab exteriore latere femorum ducta.
Cauda recta longa nigra, uti facies, aures, abdomen,
pedes.

Sabaea. 18. *S. caudata imberbis flavicans*, facie atra, cauda cinerea,
natibus calvis.

Cercopithecus ex cinereo flavescentis, genis longis pilis albis
obsitis. *Briss. quadr. p. 145. n. 17.*

Cercopithecus de S. Jago. *Edw. av. V. p. 210. t. 215.*

Callitricha. *Buffon hist. nat. T. XIV. p. 272. T. 37.*

Green ape. *Penn. syn. p. 112. t. 76.*

Simia Sabaea. *Schreber Saeugth. I. p. 100. t. XVIII.*

Habitat in Insulis promontorii viridis, ad caput bonaeris spei,
et in finitimis regionibus.

Corpus statura Diana s. Aygulae, magnitudine cati, supra
cinereo-viridi-flavescentis; subtus gula, pectore, abdomi-
ne, femoribus album. Facies nuda, atra. Tempora ex
albido flavescentia pilis longioribus reversis; supercilia ni-
gra setosa. Cauda recta, longitudine corporis, cana.
Pedes cinerei; unguis rotundati, sed in anticis ovati.

Cephus. 19. *S. caudata*, buccis barbatis, vertice flavescente, pedibus
nigris, cauda apice ferruginea.

Cercopithecus nigricans, genis et auriculis longis pilis ex
albo flavidantibus, ore caerulecente. *Briss. quadr. 206.*

Cercop-

2 Cercopithecus / Simia a catankis 2 Simia

MAMMALIA PRIMATES. Simia.

33

Cercopithecus barbatus alias Guineensis. Raj. quadr. 156.

Monstac. Buffon hist. nat. T. XIV. p. 283. t. 39.

Simia Cephus. Schreber Saeugth. I. p. 102. T. XIX.

Habitat in Guinea.

Corpus statura Diana, fuscum, subtus caerulecente-can-dicans. Caput pilis arrectis albidis; lunula supercilio-rum alba transversa; palpebrae superiores albae; buccae pilis patulis; os caerulescens.

Aethiops. 38. S. caudata imberbis, capillatio erecto lunulaque frontis albis. Syst. nat. ed. X. p. 28. n. 14.

Mangabey. Buffon hist. nat. T. XIV. p. 244. t. 82. 83.

White eye-lid ape. Penn. syn. p. 114. n. 77.

Simia Aethiops. Schreber Saeugth. I. p. 105. T. XX. XXI.

Habitat in Madagascar.

Aygula. 21. S. caudata subimberbis grisea, eminentia pilosa verticis reverla longitudinali. Osbeck iter. 99.

Simia nigra magnitudinis mediae. Edw. av. 221. t. 311.

Aigrette. Buffon Hist. nat. T. XIV. p. 190. t. 21.

Simia Aygula. Schreber Saeugth. I. p. 106. T. XXII.

Habitat in India, praesertim Java.

Corpus griseum lupi coloris, subtus gula, pectore, abdomi-neque albicans. Cauda corpore longior cinerea attenuata. Facies planiuscula, albida, nuda. Nasus depresso, bre-vissimus, ab ore remotus, lacuna labii superioris gemina. Bucca subbarbata, pilis sursum versis. Supercilia frontis gibba, setosa, prominentia. Pedes nigri, semipalmati. Ungues pollicum rotundati, reliqui oblongi. Auriculae acutiusculae. Sutura arcuata ab aure versus oculos deorum ad basin maxillae inferioris. Sutura alia cubiti lon-gitudinalis.

Varietas? mea capite rotundiore; facie minus nigra, colore corporis minus ferrugineo; ligata saltat continuo.

nictitans. 23. S. caudata imberbis nigra punctis pallidis adspersa, naso albo, pollice palmarum brevissimo, natibus tectis.

Cercopithecus angolensis alias, totus niger, at insperso cano nigredini per totum corpus, naso albo. Marcgr. Bra-sil. p. 227.

Habitat in Guinea, ludibunda, capite continuo nictitans apud Profess. Botan. Burmannum Amstelodami visa.

Magnitudo fere Sylvani. Os breve. Facies pilosa. Orbitaliae nudae. Irides luteae. Pili corporis nigri, annulis aliquot

aliquot pallidis. Labia et mentum albida. Cauda recta cylindrica, corpore longior. Pedes et cauda nigra. Pollex palmarum non longior primo articulo indicis. Cl. Alstroemer.

- Sinica. 39. *S. caudata imberbis, capillitio undique horizontaliter caput obumbrante. Mantiss. plant. 2. p. 521.*
Bonnet chinois. Buff. hist. nat. T. XIV. p. 224. t. 30.
Chinese ape. Penn. synops. p. 117. n. 83.
Simia sinica. Schreber Sacugth. I. p. 108. t. XXIII.
Habitat in Bengala.
Cauda corpore multo longior: Ungues pollicis rotundi, reliquorum digitorum oblongi.

- Nemaeus. 40. *S. caudata imberbis, buccis barbatis, cauda alba. Mantiss. plant. 2. p. 521.*
Cercopithecus cinereus, genis longis pilis ex albo flavicantibus obsitis, torque ex calcaneo purpurascente. Briffon. quadr. p. 146.
Douc. Buffon hist. nat. T. XIV. p. 298. T. 41.
Cochinchina ape. Penn. syn. p. 119. n. 85.
Simia Nemaeus. Schreber Sacugth. I. p. 110. t. XXIV.
Habitat in Cochinchina.
Statura bipedalis. Facies fere spadicea; aures ejusdem coloris. Frontis fascia angusta magis fusca; pili suprapositi nigri; pili faciem cingentes albidi flavidis intermixtis: Colli ad anteriora torquis ejusdem coloris ac frontis fascia. Humeri et brachia superiora nigra; manus albidae; inguina ejusdem coloris. Crura superius, ut et digitii pedum nigri. Pedes ipsi inde a genibus fusi. Ex hac specie potissimum Bezoar simiae.

- Mona. 41. *S. caudata barbata, lunula superciliari elata ex albo grisea. Cercopithecus pilis ex nigro et rufo variegatis vestitus, pedibus nigris, cauda cinerea. Briff. quadr. p. 141.*
Mone. Buff. hist. nat. T. XIV. p. 258. t. 36.
Varied ape. Penn. syn. p. 118. n. 84.
Simia Mona. Schreber Sacugth. I. p. 97. t. XV.
Habitat in Mauritania et calidiore Asia.
Animal sesquipedale, blandum, docile, frigus ferens.

- rubra. 42. *S. caudata barbata, buccis barbatis, vertice, dorso caudaque ex rufo sanguineis.*
Pates. Buffon hist. nat. T. XIV. p. 208. t. 25. 26.

- recta
Pollex
et. Al-
- er ca-
- i, re-
- antiss.
- vican-
- iffon.
- m co-
- rapo-
- ixtis:
- is fas-
- idae;
- ti pe,
- c hac
- risea,
- pedi-
- auda-
- Red
- Red ape. *Penn. syn. p. 116. n. 8.*
Simia Mona. Schreber Saeugth. I. p. 98. t. XVI.
Animal sesquipedale. Fascia supra oculos nunc alba, nunc nigra. Cauda corpore longior.
- Talapoin. 43. *S. caudata barbata, buccis barbatis, auribus, naso et pedum plantis nigris.*
Talapoin. Buffon hist. nat. T. XIV. p. 287. t. 40. Schreber Saeugth. I. p. 101. t. XVII.
Altitudine pedem non superat. Cauda sesquipedalis.
- Petauri- ita. 44. *S. caudata barbata, dorso, caudae superiore, et pedum anteriore latere ex olivaceo nigris, facie nigra, nasi macula triquetra nivea.*
Blanc-nez. Allamand edit. de l'hist. nat. de Buffon. T. XIV. p. 141. t. 39.
Simia Petauriita. Schreber Saeugth. I. p. 103. t. XIX. B.
*Habitat in Guinea. **
Blandum et agile animal, 13 pollices altum, cauda 20 citer pollices aequante.
- Maura. 45. *S. caudata barbata, buccis et universa facie, palpebris et regione ab oculis ad nasi finem protensa exceptis, barbata, corpore ex luteo fuscō.*
Middle-sized black monkey. Edw. av. 3. p. 221. t. 311.
Simiolus ceilonicus. Seba thes. I. p. 77. t. 48.
Negro ape. Pennant syn. p. 115. n. 80.
Simia Maura. Schreber Saeugth. I. p. 107. t. XXII. B.
Habitat in Zeylona et Guinea.
Agile animal, dum sedet, 7 pollices altum. Cauda corpore longior.
- Roloway. 46. *S. caudata barbata, capite, dorso, manibus pedibusque extrinsecus nigris, interius una eum abdomine et corona pilorum faciem triquetram ambiente albī.*
Palatine ou Roloway. Allamand edit. de l'hist. nat. de Buffon T. XV. p. 77. t. 13.
Habitat in Guinea.
Animal blandum sesquipedale, cauda ejusdem longitudinis.
** * buccis non saccatis, natibus teclis.*
** cauda prehensili.*
- Beelze- bul. 12. *S. caudata barbata nigra, cauda prehensili, extremo pedibusque brunneis.*
Cercopithecus niger, pedibus fuscis. Brijson quadr. 194.

Guariba. *Maregr. brasili.* p. 226.
 Howling baboon. *Bancroft Guiana.* p. 133.
 Ouarine. *Buffon hist. nat. T. XV.* p. 5.
Habitat in America meridionali.
Gregatim noctu et interdiu vagatur, continuo et satis sonoro ululatu sylvas replens, ferox.
Corpus magnitudine vulpis nigrum, pilis longis laevissimis nitidum. Barba rotunda nigra. Pedes et caudae extremum fusca.

Seniculus. 13. S. caudata barbata rufa, cauda prehensili.
Cercopithecus barbatus saturate spadiceus. Briss. quadr. 206.
Cercopithecus barbatus maximus ferruginosus intentorosus, Alacuta, Singe rouge. Barrere Franc. equin. p. 150.
Arabata. Gumilla Orenoquo. 2. p. 8.
Alouate. Buffon hist. nat. T. XV. p. 5.
Habitat Carthagena, in Cayenna, ad Amazonum fluvium in silvis. Transeuntes ex arboribus voce ingrata, rauca admodum, simul clamosa eminusque audienda salutant; vix adspici se sinunt, quin illico clament. Vitent mause fructibus. Jacquin.
Corpus mediocre, colore conformi rubro. Os hominis instar in anteriore faciei parte mento propendente satis magno, ut in homine.

Paniscus. 14. S. caudata imberbis atra, cauda prehensili, palmis tetradactylis.
Simia fusca major, palmis tetradactylis, cauda prehensili ad apicem subtus nuda. Brown jamaic. 489.
Cercopithecus in pedibus anterioribus pollice carens, cauda inferius versus apicem pilis destituta. Briss. quadr. 211.
Coaita. Buffon hist. nat. T. XV. p. 16. t. I.
Quato. Bancroft Guiana. p. 131.
Simia Paniscus. Schreber Saeugth. I. p. 115. t. XXVI.
Habitat in America meridionali. Agilis, audax, gesticulationum et vindictae amans, frigoris impatiens.
Corpus atrum, aliquando potius fuscum, magnitudine molossi. Pedes omnes, quemadmodum abdomen, graciles; hi et cauda dimidia exterior nunc brunnea, nunc cum reliquo corpore atra. Caudae extremitas hinc nuda, qua, quicquid a terra elevat, prehendit. Digi pedum 4-5. Hallmann; est vero pollex reliquis minor, introrsum a reliquis remotus. Ungues manuum rotundati, pedum oblongi scutuli. D. Ayinen. Facies nuda rubra, Auriculae nudae.

trepida. 20. S. caudata imberbis, capillitio erecto, manibus pedibusque caeruleis, cauda prehensili villosa.

Simia, cauda comata. Edw. av. t. 212.

Habitat in Surinamo.

Corpus fuscum subtus ferrugineum. Capitis pili erecti nigri in capillitium hemisphaericum. Cauda pilosa. Ungues rotundati. An sola varietas Apellae?

Fatuellus. 28. S. caudata imberbis, cauda prehensili, capitis fasciculis pilorum duobus corniculorum acmulis. Briff. quadr. 195.

n. 3.

Habitat in America meridionali.

Corpus: Facies, latera, abdomen, crura anteriora fusca; Vertex, medium dorfi, cauda, pedes, crura posteriora nigra. Ungues longi obtusiusculi. Cauda spiralis. An reapse differt ab Apella?

Apella. 29. S. caudata imberbis, cauda subprehensili, corpore fusco, pedibus nigris, natibus tectis.

Cercopithecus fuscus, capitis vertice nigro. Briff. quadr. p. 137. n. I.

Sajou. Buffon hist. nat. T. XV. p. 37. t. 4.

Simia Apella. Schreber Saength. I. p. 119. t. XXVIII.

Habitat in America meridionali.

Agilis, undique circumspiciens, frigoris non valde impatiens, sono pulli meleagridis famelici. Faciei peripheria quasi a barbitonfore rasa.

Capucina. 30. S. caudata imberbis fusca, cauda prehensili hirsuta, pileo artibusque nigris, natibus tectis.

Simia imberbis nigra, cauda longa hirsuta, facie flavescente.

Muf. Ad. Frider. p. 2. t. 2.

Cercopithecus totus niger. Briff. quadr. 139. n. 5.

Sai. Buffon hist. nat. T. XV. p. 51. t. 8.

Weeper. Pennant syn. 127. n. 94.

Simia Capucina. Schreber Saength. I. p. 120. t. XXIX.

Habitat in America meridionali. Tarvis incedit, non saltat, misera et ejulans semper, clamore horrendo hostes pellit;

Notae primariae Simiarum sunt Cauda recta s. prehensilis; Nates calvae s. tectae; Ungues rotundati s. subulati; Mentum barbatum s. imberbe; Buccae saccatae s. non saccatae.

Tecto comis arborum intexto altissimisque columnis innixo obumbrantur terrae aestuantes inter tropicos Indiae, ne adurantur; hoc tectum inhabitant gentes Simiarum cum Psittacis volucribusque aliis.

stridet saepius uti cicada; irata latrat more catus. Caudam spiralem gerit, circumque collum saepius conjicit. Mofchum olet.

Corpus magnitudine felis domesticae, fuscum, at caput, pedes, caudaque nigra. Facies fronte nunc nigra nunc incarnata. Dentes laniarii approximati. Nasus versus oculos carinatus. Rubra varicosa nigra retractilis supra frontem ante pileum. Cauda longa semper curvata, pilis longioribus villosa. Pedes situ transverso ponit, ut postici semper ante anticos collocentur.

sciurea. 31. *S. cadata imberbis, occipite prominulo, unguibus quatuor plantarum subulatis, natibus tectis.*

Simia imberbis, cauda longa, occipite gibbo, unguibus plantarum quatuor oblongis. Mus. Ad. Erider. p. 3.

Cercopithecus pilis ex fusco flavicante et candicante variegatis, pedibus ex flavo rufescens. Briss. quadr. 197.

Simia americana parva subbarbata, caudata, ore e caeruleo nigro, unguibus oblongis. Wagner mus. Baruth. p. I. t. I.

Cercopithecus minor luteus. Barrere franc. équinox. p. 151.

Caitaia, Marcgr. bras. p. 227.

Saimiri. Buffon hist. nat. T. XV. p. 67. t. 51.

Orange ape. Penn. syn. p. 128. n. 95.

Simia sciurea. Schreber Saeugth. I. p. 121. t. XXX.

Habitat in America meridionali. Lepidum animal quiescit supra abdomen; alloquentis aspicit fauces, climatis europei impatiens.

Corpus sciuri, sedentis animalis septem pollices altum, griseo-virens, subtus albidum. Ulnae et tibiae ferrugineae. Cauda villosa, apice nigra, corpore duplo longior. Pollicum unguis rotundati. Os fusco-caerulescens. Superclilia setacea. Aures villis raris albidis.

Morta. 32. *S. cadata imberbis spadicea, ore fusco, cauda nuda squamosa.*

Cercopithecus americanus minor Monkie dictus. Seba mus. I. p. 22. t. 33. f. I.

Cercopithecus dorso spadiceo, ventre glabro, cauda munita. Briss. quadr. 201.

Habitat in America.

Aetate solum minore a S. sciurea differre videtur.

33. S.

Species simiarum inter mammalia plurimae, sed paucissimae rito descriptae et cognitae, plurimae obscurae ignorantur.

- Syrichta. 33. S. caudata imberbis, ore ciliisque vibrissatis.
Cercopithecus caudatus imberbis, ore fusco, cauda nuda squamosa. Gronov. Zooph. 21.
Cercopithecus luzonicus minimus. Pet. gaz. 21. t. 13. f. II.
 * * cauda non prehensili.
- Pithecia. 22. S. caudata imberbis, vellere nigro apice albo, cauda nigra villosissima.
Simia minima capite albido, dorso fuso pene rufescente, cauda crinita. Brown. jam. 489.
Cercopithecus pilis nigris apice albo vestitus, cauda pilis longissimis nigris obliterata. Briff. quadr. 195.
Saki. Buff. hist. nat. T. XV. p. 88. t. 12.
Sakkawinkee. Bancroft Guian. p. 80.
Fox-tailed ape. Penn. syn. p. 130. n. 98.
Simia Pithecia. Schreber Saeugth. I. p. 125. t. XXXII.
Habitat in America meridionali, lepidissima, facile manuiscens.
Corpus aliquando sesquipedale nigrum, pilis omnibus apice albis. Facies pilis brevissimis albidis. Gula et abdomen pilis sordide albicantibus. Ungues longi obtusi.

- Jacchus. 24. S. caudata, auribus villosis patulis, cauda hirsutissima curvata, unguibus tubulatis: pollicum rotundatis.
Ceropithecus taeniis transversis alternatim fuscis et e cincto reo albis variegatus, auriculis pilis albis circumdati. Briff. quadr. 202.
Cercopithecus brasiliensis 3. Sagouin. Clus. exot. 372. t. 372.
Galeopithecus, qui Sagoin a Brasiliensibus nominatur. Gesn. quadr. p. 369.
Cagui minor. Marcgr. bras. 227.
Sanglin on Cagui minor. Edw. av. V. p. 15. t. 218.
Ouittiti. Buff. hist. nat. XV. p. 96. t. 14. Pall. n. nord. Beytr. 2. p. 41.
Striated ape. Penn. syn. p. 132. n. 100.
 $\beta.$ *Cercopithecus ex albido flavetens, moschum redolens.* Briff. quadr. 197.
Cercopithecus brasiliensis primus. Clus. exot. 371.
Habitat in Brasilia, agilis, irrequieta, scandens more sciuri, incurvata non prehensili cauda; rodit ligna, ut mures, edit insecta, fructus, lactucina, panes triticeos marziosque, theam, passeres, indomita, morfitans, felibus infestissima, quibus se sub earum ventre affigit. Sonus stridor sibilans; odor moschi.

Corpus sciuro minus, vix oculo pollices longum, griseo-cinereascens. Caput minimum atrum. Labia et frons alba, sed inter oculos flavescens. Aures antice tegit barba alba, longitudine totius auriculae, ne flatus intret. Cauda corpore longior albo-annulata. Dentes primores 4: intermedii latiores paralleli; laterales acuti, minus apice distantes.

Oedipus. 25. *S. caudata imberbis, capillo dependente, cauda rubra, unguibus subulatis.*

Cercopithecus pilis ex fusco et rufo vestitus, facie ultra auriculas usque nigra et nuda, vertice longis pilis albis obfuso. Briss. quadr. p. 150. t. 28.

Little Lion-monkey. Edw. av. 3. p. 195. t. 195.

Cagui major Brasiliensis. Marcgr. bras. 227.

Pinche. Buff. hist. nat. T. XV. p. 114. t. 17.

Red-tailed ape. Penn. syn. 133. n. 102.

Habitat in America meridionali. Agilis et lepida gestibus leonem imitatur, S. Jaccha satis affinis magnitudine, paulo tamen minore, odore moschi. Vox muris.

Corpus parvum, sex circiter pollicum, griseum, subtus album. Caput capillito dependente longo albo. Facies nigra, ultra aures pilis raris albis. Verruca in utraque bucca. Irides ferrugineae. Auriculae subrotundae, nigrae, nudae. Ungues amnes subulati, excepto pollicis palmarum brevi. Cauda corpore duplo longior, parum pilosa, basi rufa, ceterum nigra. Ani regio rubra.

Rosalia. 26. *S. caudata imberbis, capite piloso, faciei circumferentia pedibusque rubris, unguibus subulatis.*

Cercopithecus ex albido flavicans, faciei circumferentia saturate rufa. Briss. quadr. 200.

Cercopithecus minor dilute olivaceus, parvo capite, Acarima à Cayenne. Barrere Fr. équin. p. 151.

Marikina. Buff. T. XV. p. 108. t. 16.

Silky monkey. Penn. syn. p. 133. n. 101. t. 15.

Simia Rosalia. Schreber Saeguth. I. p. 130. t. XXXV.

Habitat in America meridionali, lepida, et frigoris minus impatiens, quam affines.

Corpus

Simiae suspectae, memores, petulantes, imitatores, gesticulatores, iudociles, minantur, rident, cibos bucca macerant, pediculos venantur, tactu excellunt, natos ulnis gerunt, terrefactae cacant immundae, urinæ meatu saepe distincto a vulva; utero etiam gerentes libidinosæ; phytipbagæ.

- Corpus ex albido flavicans. Pollices omnes unguibus rotundatis. Auriculae nudae, sub capitis pilis occultatae. Briss. argéntata. 47. S. caudata imberbis exalbida, facie rubra, cauda fuscescente. Mant. pl. 2. p. 521.
- Cercopithecus ex cinereo albus argenteus, facie auriculisque rubris splendentibus, cauda castanei coloris. Briss. quadr. p. 142. n. 12.
- Mico. Buffon hist. nat. T. XV. p. 121. t. 18.
- Fair ape. Penn. syn. p. 134. n. 103.
- Simia argentata. Schreber Saeugth. I. p. 131. t. XXXVI.
- Habitat ad Amazonum fluvium, septem pollices longa. Ungues incurvi, pollicum plantarum rotundati.
- Midas. 27. S. caudata imberbis, labio superiore fissō, auribus quadatis nudis, unguibus subulatis, pedibus croceis. Mus. Ad. Frid. 2. p. 4.
- Cercopithecus minimus niger leontocephalus, auribus elephantinis. Barrere Fr. équin. p. 151.
- Cercopithecus niger minimus, manibus et pedibus croceis. Edw. av. 196. t. 196.
- Cercopithecus niger, pedibus croceis. Gronov. zooph. 20.
- Cai. Raj. quadr. 155.
- Tamarin. Buff. hist. nat. XV. p. 92. t. 13.
- Habitat Surinami.
- Magnitudo sciuri. Manus et pedes crocei. Corpus atrum. Cauda duplo longior, nigra. Aures nudae, ampliae, rotusae. Ungues omnes subulati s. ferini, exceptis pollicum plantarum rotundatis s. humanis.

3. LEMUR. Dentes primores superiores IV: intermedii remotis.

inferiores VI longiores,
porrecti, compressi,
paralleli, approximati.

Laniarii solitarii, approximati.
Molares plures sublobati: anteriores
longiores, acutiores.

tardigradus. 1. L. ecaudatus subferrugineus. Schreber Saeugth. I. p. 134. t. XXXVIII.

Simia unguibus indicis pedum posteriorum longis, incurvis
et acutis. Briss. quadr. 190. n. 3.

Simia cynocephala unguibus indicis longis, incurvis et acutis.

Briss. quadr. 191. n. 2.

Animalculum cynocephalum tardigradum dictum. Seba thef. I. p. 55. t. 35.

Cercopithecus ceylonicus seu tardigradus dictus major. Seb. thef. I. p. 75. t. 47. f. 1.

Loris. Buff. hist. nat. T. XIII. p. 210. t. 30.

Tail-lefs Maucauco. Penn. syn. p. 135. t. 16. f. 1.

Habitat in Zeylona, agilis, auditu excellens, monogamus.

Statura sciuri, subferruginea, linea dorsali subfuscā; gula albidiore. Linea longitudinalis oculis interjecta alba.

Facies testa. Auriculae urceolatae, intus bifoliatae.

Pedum palmae plantaeque nudae. Ungues rotundati: indicum plantarum vero subulati. Cauda nulla. Mam- mae 2 in pectore, 2 in abdome versus pectus.

Indri.

9. L. caudatus niger.

Indri. Sonner. it. 2. p. 142. t. 88.

Habitat in Madagascar, 3½ pedes altus, junior facile cicurandus, et ab incolis ad venatum adaptatus; vox ejulantis infantis.

Dentes canini in utraque maxilla 8, primores in superiore 2, in inferiore approximati 4; pedes pentadactyli, unguibus complanatis acutis, plantarum pollice praegrandi; pili densi, sericei, in ani regione crassi, albi; versus genitalia et in facie grisei, ceterum nigri; caudae vestigium tactu discernendum.

Potto.

6. L. caudatus subferrugineus, cauda unicolo.

Potto. Bosman. bestiyo. van de guin. kuſt. II. p. 30. f. 4.

Habitat in Guinea, praeter caudam priori simillimus.

Mongoz.

2. L. caudatus griseus cauda unicolo. Schreber Saugth. I. p. 132 sqq. t. XXXIX. B.

Mongooz. Edw. av. 5. p. 12. t. 216. Walch Naturforsch. VIII. p. 26.

Woolly Maucauco. Penn. syn. p. 136. n. 105.

Corpus griseum vel potius fuscum, subtus album. Fascia oocularis nigra. Manus dilute cinereae.

β. corpore griseo vel fusco, facie manibusque nigris. Edw. av. 5. p. 13.

γ. corpore griseo vel nigro, macula nigra circa oculos.

Simia-sciurus lanuginolus fulcus ex Johannaē insula, an Cercopithecus indicus Bugee dictus Kaji? Petiv. gaz. p. 26. t. 17. f. 5.

δ. cor-

- δ. corpore fusco, naso manibusque albis.
Prosimia fusca, naso, gutture, pedibusque albis. *Briss. quadr.*
p. 156. n. 2.
- ε. corpore toto fusco.
Simius Zambus. *Nieremb. hist. nat. p. 176.*
Prosimia fusca. *Briss. quadr. p. 156. n. 1.*
- ζ. corpore griseo, facie nigra, manibus fulvis. *Schreber Saeugth.*
I. p. 138. t. XXXIX. A.
Prosimia fusca, rufo admixto, facie nigra, pedibus fulvis.
Briss. quadr. p. 157. n. 3.
- Mongous. *Buff. hist. nat. XIII. p. 174. t. 26.*
Habitat in insula Madagascar, S. Johannae et vicinis.
Ungues indicis plantarum subulati, longiores.
- Macaco. 3. L. caudatus niger, collari barbato. *Schreber Saeugth. I.*
p. 142. t. XL. A.
Black Maucaco. *Edw. av. 5. t. 217.*
Ruffed Maucaco. *Penn. syn. p. 138. n. 107.*
- β. corpore fusco.
Lemur cauda floccosa, corpore fusco. *Gronov. zooph. 22.*
- γ. corpore albo.
Antavarre tout blanc. *Cauche rel. de Madag. p. 127.*
- δ. corpore nigro et albo mixto. *Schreber Saeugth. I. p. 142.*
t. XL. B.
Vericassi. *Flacourt voy. p. 153.*
Vari. *Buffon hist. nat. XIII. p. 174. t. 27.*
Habitat in insulis Madagascar, S. Johannae et vicinis. Cu-
bile purum servat; radiis solis delecatatur; dormit in loco
tenebricoso; respuit vva, carnes, pisces; rugitus edit fe-
re instar leonis.
Plantarum unguis indicis fere subulati.
- Catta. 4. L. caudatus, cauda albo nigroque annulata. *Mus. Ad. Frid.*
2. p. 5. Schreber Saeugth. I. p. 143. t. XLI. Hermann
Naturf. XV. p. 159.
Prosimia cinerea, cauda cincta annulis alternatim albis et ni-
gris. *Briss. quadr. p. 222.*
- Simia - sciurus madagascariensis sive Maucaco. *Edw. av. 4.*
197. t. 197.
Mococo. *Buff. hist. nat. XIII. p. 174. t. 22.*
Ring-tail Maucaco. *Penn. syn. p. 137. n. 106.*
Habitat in insulis Madagascar, Franciae, S. Johannae, gre-
garia, mitissima, scandit omnibus pedibus, ut simia.
Victi-

Viicitat fructibus, oleribus, radicibus; cibos tenet manibus; tardiuscula, placida et tranquilla mormurat ut felis. Oculus dexter diurnus pupilla linearis perpendiculari; sinistri nocturnus pupilla orbiculata magna in mea erat; an sic natura vel fato? Ungues indicis palmarum non longiores aut subulati.

murinus. 7. *L. caudatus cinereus*, cauda ferruginea. *Miller on various subjects of natural history.* T. XIII. A. B.
Habitat in Madagascar.
Ungues omnes plani rotundati.

bicolor. 8. *L. caudatus*, supra ex atro griseus, subtus sordide albus, macula frontali cordata sordide alba. *Miller on various subjects.* T. XXXII. f. A.
Habitat in America meridionali.
Capite canem molossum refert. Ungues omnes subulati.

Ianiger. 10. *L. caudatus ex flavo rufescente testaceus subtus albus*, cauda ex rufescente fulva unicolo. *Maquis à bourres. Sonner. it. 2. p. 142. t. 89.*
Habitat in Madagascar, sine cauda novem pollices ultra pedem longus.
Pili molissimi crassi, in regione lumborum ex rubescente fulvi; facies nigra; auriculae minutae; oculi magni, ex virescente grisei; dentes primores in maxilla superiore 2, in inferiore 4; cauda 9 pollices longa; pedes pentadactyli, unguibus longis, pollicum ungue rotundato.

volans. 5. *L. caudatus, membrana ambiente volitans.* † *Pallas Act. Ac. Sc. Petrop. 1780. P. I. Schreber Saeugth. I. p. 146. t. XLIII.*
Cato-Simius volans Camelli. Petiv. gaz. 14. t. 9. f. 8. Act. angl. 277. n. 1065.
Vespertilio admirabilis. Bont. jav. 68. t. 69.
Felis volans ternatea. Seb. mus. I. p. 93. t. 58. f. 2. 3.
*Habitat in Gusurate, insulis Philippinis et Moluccis, victi-
 etans fructibus arborum, gregaria, vespertino tempore.*
Membrana more sciuri s. muris volantis a capite ad manus, a manibus per latera ad plantas, a plantis ad apicem caudae expansa. Ungues acuti. Mammae 2 pectorales. Ex mammis videtur lemuribus s. simiis proximum animalculum. Hujus descriptio et genericae notae, dum modo juniora exempla in Europam pervenerint, etiamnum deficiunt.

4. VES-

4. VESPERTILIO. *Dentes omnes eretti, acuminati,
approximati.*

*Manus palmatae volitantes mem-
brana corpus cingente.*

* *Dentibus primoribus in utraque maxilla quatuor.*

Vampy- **I.** V. ecaudatus, nāso simplici, membrana inter femora di-
rus.

Ternate bat. *Penn. syn. p. 359. n. 274.*

α. colore potissimum nigro. *Schreber Saeugthiere, I. p. 153.
t. XLIV.*

Pteropus rufus aut niger, auriculis brevibus acutiusculis.
Briff. quadr. p. 153.

Vespertilio ingens. *Clus. exot. p. 94.*

Velpertilio volans. *Bont. jav. 68. t. 69.*

Canis volans ternatanus orientalis. *Seb. mus. I. p. 91. t. 57.
f. I. 2.*

Chien volant. *Daubenton act. Paris. 1759. p. 384.*

Roussette. *Buff. hist. nat. X. p. 55. t. 14.*

β. corpore ex atro fusco.
Pteropus fuscus, auriculis brevibus acutiusculis, collo su-
periore rubro. *Briff. quadr. p. 154.*

Chauve-Souris de l'isle Sabuda dans la nouvelle Guinée.
Dampier voy. V. p. 81. t. 5.

Great bat. *Edw. av. 4. p. 180. t. 180.*

Roussette. *Daubent. act. Paris. 1759. p. 385.*

Rougette. *Buff. hist. nat. X. p. 55. t. 17.*

γ. corpore stramineo.
Lesser Ternate bat. *Penn. synops. p. 362. t. 31. f. 1.*

Habitat in Africa occidentali, Asia meridionali, insulis oceani indici, et australis. Noctu haurire sanguinem dormientium servorum, cristas gallorum et lacrymas palmarum fertur, phlebotomus felicissimus in pleuritide. Magnis glomeribus aliquando adhaeret arboribus.

Dentes primores obtusiusculi; laniarii superiores solitarii;
antice ab inferiore dente sulcati; inferiores bini cum den-
te primore parvo obtuso inter utrosque; molares obtusius-
culi plures. Nares vix divisae. Corpus magnitudine
sciuri

Vespertilionum genus nocturnum volitat palmis expansis palmatis membranaque laterali.
Phalaenis in primis vicitans.

sciuri a 5-9 pollices longum. Manuum digitus primus separatus unguiculatus, secundus membranae affixus. Plantae fissae unguiculatae, calcaneis postice excurrentibus in subulatam cartilaginem membranae annexam. Membrana nititans in cantho oculi majore. Uterus simplex.

Specie- 2. *V. ecaudatus, naso infundibuliformi lanceolato.* Schreber
Etrin. *Saeugth. I. p. 159. t. XLV.*

Pteropus auriculis longis patulis, naso membrana antrorsum inflexa aucto. Briff. quadr. 154.

Canis volans maxima aurita ex nova Hispania. Seb. mus. I. p. 92. t. 58. f. 1.

Andira gnacu, vespertilio cornutus. Piso brasili. p. 290.
Vampire. Buff. hist. nat. X. p. 55.

Habitat in America australi. Rolander.

Nares antice infundibulum referentes, superne adscendentibus in folium lanceolatum. Aures ovatae, interius lacinia subulata membranacea, longitudine auriculae. Dentes laniarii solitarii magni; molares anteriores breviores obtusiores. Alarum digitii 4, quorum 1 annexus 2d; pollex brevis ungue arcuato. Pedes digitis 5 aequalibus, unguibus arcuatis. Calcaneus exserit tendinem subulatum secundum marginem membranae inter pedes posticos, non coeuntem cum opposito.

perspicil- 3. *V. ecaudatus, naso foliato plano acuminato.* Mus. Ad. Frid. latus. *p. 7. Schreber Saeugth. I. p. 160. t. XLVI. A.*

Vespertilio americanus vulgaris. Seb. mus. I. p. 90. t. 55. f. 2.

Habitat in America australi.

Palmae huic et sequenti digitis quinque.

Spasma. 4. *V. ecaudatus naso foliato obcordato.* Schreber Saeugth. I. p. 158. t. t. XLVIII.

Vespertilio cauda nulla, naso foliato, auriculis maximis appendiculatis. Gronov. zooph. I. p. 7. n. 27.

Vespertilio subrufus, auriculis duplicibus, naso gemino. Briff. quadr. p. 161. n. 4.

Glis volans ternatanus. Seb. mus. I. p. 90. t. 56. f. 1.

Cordated bat. Penn. syn. p. 364. n. 278.

Habitat in Zeylona et insulis Moluccis.

7. V.

Ovid. met. IV. 12.

*Lucemque perosae,
Nocte volant, seraque tenent a vespera nomen,*

- hastatus. 7. V. ecaudatus, naso foliato trifolii figuram aemulante.
Schreber Saeugth. I. p. 161. t. XLVI. B.
 Le Chauve-fouris fer de lance. *Buff. hist. nat.* XIII. p. 226.
 t. 33.
 Javelin bat. *Penn. syn.* 363. n. 276.
Habitat in America australi, perspicillato affinis, obscure fuscus vel niger.
- soricinus. 8. V. ecaudatus, rostro producto, naso foliato cordato. *Pal-las Spicileg. zoolog.* III. p. 24. t. III. *Schreb. Saeugth.* I. p. 161. t. XLVII.
Vespertilio cauda brevissima, naso foliato acuminato, auriculis subsimplicibus rotundatis. *Gron. zooph.* p. 7. n. 26.
Vespertilio americanus vulgaris. *Edw. av.* 5. 201. t. 201.
 f. 1.
 Leaf bat. *Penn. syn.* 364. n. 277.
Habitat in America australi.
Cauda brevissima. Lingua papillis acutis obsita.
- leporinus. 9. V. caudatus, labio superiore bifido. *Syft. nat. Ed. X.* p. 32.
 n. 5. *Schreber Saeugth.* I. p. 162. t. LX.
Noctilio americanus labio inferiore varicoso. *Syft. nat. Ed. XII.* p. 88. n. 1.
Vespertilio americanus rufus. *Briff. quadr.* 227.
Vespertilio cato similis americanus. *Seb. mus. I.* p. 89. t. 55.
 f. 1.
 Chauve-fouris de la vallée d'Ylo. *Feuillé obs. I.* p. 623.
 Peruvian bat. *Penn. syn.* p. 365. n. 279.
Habitat in America meridionali, viettans fructibus arborum, ratto magnitudine aequalis.
- * * *Dentibus primoribus in maxilla superiore 4, in inferiore 6.*
- auritus. 5. V. caudatus, naso oreque simplici, auriculis duplicatis capite majoribus. *Fn. suec.* 3.
Vespertilio auribus majoribus. *Frisch. av.* t. 103. *Edw. av.* 5. t. 201. f. 3.
Vespertilio caudatus, naso simplici, auriculis maximis inappendiculatis. *Gron. zooph.* p. 23.
Vespertilio murini coloris, auriculis duplicibus. *Briff. quadr.* 160.
Vespertilio auriculis quaternis. *Johnst. av.* p. 34. t. 20.
Oreillar. *Buff. hist. nat.* VIII. p. 118. t. 17. f. 1.
Habitat in Europa. Vere distincta a sequenti species.

murinus. 6. *V. caudatus*, naso oreque simplici, auriculis capite minoribus. *Fn. suec.* 2.

Vespertilio murini coloris auriculis simplicibus. *Briff. quadr.* p. 158. n. 1.

Vespertilio. *Aldrov. ornith.* p. 575. 576.

Vespertilio auribus minoribus. *Frisch. av.* t. 102. *Edw.* av. 4. t. 201. f. 2.

Chauve-fouris. *Buffon hist. nat.* VIII. p. 113. t. 16.

Common bat. *Penn. syn.* p. 371. n. 291.

Habitat in Europa.

*Noctu volat; viicitat in primis phalaenis; praedatur a stri-
gibus; capitur arctii lappae calycibus candefactis; de ter-
ra non evolat. Hybernat mortuus, reviviscit superatis
noctibus plumbeis initio florescentiae. Aestate foetet.*
Anatome E. N. C. d. 2. a. 1. obs. 48.

Noctula. 10. *V. caudatus*, naso oreque simplici, auriculis ovalibus operculatis: operculo exili. *Schreb. Saeugth.* I. p. 166. t. LII.

Vespertilio. *Gesn. av.* p. 694. ic.

Vespertilio alii. *Aldrov. ornith.* p. 575. 576.

Noctule. *Buff. hist. nat.* VIII. p. 128. t. 18. f. 1.

Great bat. *Penn. zool. br. ill.* t. 103.

Habitat in Gallia, Germania, Britannia, aestate foetens.

serotinus. 11. *V. caudatus* flavescens, auriculis brevibus emarginatis. *Schreber Saeugth.* I. p. 167. t. LIII.

Serotine. *Buff. hist. nat.* VIII. p. 129. t. 18. f. 2.

Habitat in Gallia et Germania.

Pipistrel- 12. *V. caudatus* ex atro fuscus, fronte convexa, auriculis ova-
tis, emarginatis, capite vix longioribus. *Schreb. Saeugth.*
I. p. 167. t. LIV.

Pipistrelle. *Buff. hist. nat.* VIII. p. 129. t. 19. f. 1.

*Habitat in Gallia, rarius in Germania, vix duos polices
longus, paulisper foetens.*

Barbastel- 13. *V. caudatus*, buccis elatis pilosis, auriculis magnis infe-
rius angulatis. *Schreber Saeugth.* I. p. 168. t. LV.

Barbastelle. *Buff. hist. nat.* VIII. p. 130. t. 19. f. 1.

Habitat in Burgundia, duos polices longus.

hispidus. 14. *V. caudatus* pilosus, naribus canaliculatis, auriculis longis
angustis. *Schreber Saeugth.* I. p. 169. t. LVI.

Campagnol volant. *Daubent. act. Parif.* 1759. p. 388.

Autre

Autre chauve-souris. *Buff. hist. nat.* X. p. 88. t. 20. f. 1. 2.
Bearded bat. *Penn. syn.* p. 367. n. 202.
Habitat ad Senegal fluvium.

* * * *Dentibus primoribus in maxilla superiore 4, in inferiore 8.*

- pictus.* 15. *V. caudatus, naso simplici, auriculis infundibuliformibus appendiculatis.* *Gronov. zooph.* p. 7. n. 25. *Pallas spicil.* III. p. 7. *Schreber Saeugth.* I. p. 170. t. XLIX.
Vespertilio ternatanus. *Seb. mus.* I. p. 91. t. 56. f. 2. 3.
Muscardin volant. *Daubent. aet. Paris.* 1759. p. 388.
Autre chauve-souris. *Buff. hist. nat.* X. p. 92. t. 20. f. 3.
Striped bat. *Penn. syn.* p. 368. n. 284.
Habitat in Zeylona, ubi Kiriwonla audit.

* * * * *Dentibus primoribus in maxilla superiore 2, in inferiore 6.*

- Nigrita.* 16. *V. caudatus ex flavescente fuscus capitis parte anteriore, pedibus caudaque nigris.* *Schreber Saeugthiere,* I. p. 171. t. LVIII.
Marmotte volante. *Daubent. aet. Paris.* 1759. p. 385.
Chauve-souris étrangère. *Buff. hist. nat.* X. p. 82. t. 18.
Senegal bat. *Penn. syn.* p. 366. n. 281.
Habitat ad fluvium Senegal, quatuor pollices longus.
Adanson.

* * * * *Dentibus primoribus in maxilla superiore 2, in inferiore 4.*

- Molossus.* 17. *V. caudatus, cauda longe ultra membranam connectentem protensa, labio superiore pendulo.* *Pallas spicil. zool.* III. p. 8.
Bull-dog bat. *Penn. syn.* p. 366. n. 280.
 $\alpha.$ major, supra ex cinereo fuscus, infra cinereus, et in medio ventre fuscus. *Schreber Saeugth.* I. p. 171. 172. t. LIX. ic. inf.
Mulot volant. *Daubent. aet. Paris.* 1759. p. 387.
Autre chauve-souris. *Buff. hist. nat.* X. p. 84. t. 19. f. 1.
 $\beta.$ minor, supra subfuscus cinereo mixtus, infra fordide albus.
Schreber Saeugth. I. p. 171. 172. t. LIX. f. sup.
Autre chauve-souris. *Buff. hist. nat.* X. p. 87. t. 19. f. 2.
Habitat in insulis Americae oppositis.

* * * * * Dentibus primoribus in maxilla superiore 2,
in inferiore 0.

cephalo- 18. V. caudatus, capite magno, labiis productis, naribus spirali-
bus, verrucis subocularibus, auriculis parvis non operculatis. *Pallas Spicil. Fusc.* III. p. 10. t. I. *Schreber Saeugth.* I. p. 172. t. LXI.

*Habitat in Moluccis, 2½ pollices longus. Schlosser.
Lingua echinata. Pili supra cinerei, infra albidi.*

* * * * * Dentibus primoribus in maxilla superiore 0, in inferiore 4.

lepturus. 19. V. caudatus, naribus tubulatis, auriculis longis obtusis
operculatis, membranae utriusque pedes connectenti annexo
interius marsupio. *Schreber Saeugth.* I. p. 173. t. LVII.
Habitat in Surinamo. Rudolph.

Ferrum 20. V. caudatus, naso ferro equino simili, auribus caput ae-
quumin. quantibus non operculatis, cauda dimidia corporis lon-
gitudine.

*Fer à cheval. Buff. hist. nat. VIII. p. 131. t. 17. f. 2. p. 132.
t. 20.*

α. major. *Schreb. Saeugth.* I. p. 174. t. LXII. ic. sup.

β. minor. *Schreb. Saeugth.* I. p. 174. 175. t. LXII. ic. inf.

*Habitat in Gallia et Franconia, ab Ill. Daubenton de vesper-
tilionum genere meritissimo detectus.*

* * * * * Dentibus primoribus plane nullis.

novebora- 21. V. caudatus, cauda longa, naso brevi acuto, auribus bre-
vibus rotundis.

New-York bat. Penn. syn. p. 367. t. 31. f. 2.

Habitat in America septentrionali.

* * * * * Dentium numero et ordine (mibi quidem) ignoto.

lascotope- 22. V. caudatus membrana pedes connectente latissima. *Schre-
rus. Saeugth.* I. t. LVIII. B.

lasiurus. 23. V. caudatus labiis tumidis, cauda lata. *Schreb. Saeugth.*
I. t. LXII. B.