

II. BRUTA.

*Dentes primores nulli utrinque.*7. BRADYPUS. *Dentes Primores nulli utrinque.**Molares utrinque VI oblique truncati cylindrici, anteriores duo longiores, amplo hiatu distantes.**Corpus pilis tectum.*tridaety- I. B. pedibus tridaetylis, cauda brevi. *Mus. Ad. Fr. 4.*
lus. Bradypus crinitus, palmis tridaetylis, unguibus arcuatis.*Brown jam. p. 489.*Tardigradus pedibus anticis et posticis tridaetylis. *Briss. quadr. p. 21.*Arctopithecus. *Gesn. quadr. p. 869.*Ignavus. *Clus. exot. p. 372. fig. p. 373.*Luyaert. *Nienhof Brasil. p. 27.*Pigritia sive Haut. *Nieremb. hist. nat. 163. 164.*Sloth. *Edw. av. t. 220.*Ai. *Buffon hist. natur. XIII. p. 34. t. 5. 6.*Pareseux. *Gautier obs. sur l'hist. nat. I. P. 2. p. 81. t. A. f. 4.**Habitat in Americae meridionalis calidioris arboribus. Victitat foliis teneris, imprimis Cecropiae; non bibit; imbres metuit. Facile scandit, tardissime et aegre incedit, vix uno die 50 passus; attonitus quasi caput flectit; sonus senarius ascendens; clamor horrendus, lacrymae miserae.**Corpus pilosissimum griseum; Facies nuda; Gula flava; Auriculae nullae. Cauda subovata. Pedes anteriores longiores posterioribus, divaricatissimi: digiti combinati, in singulis pedibus tres; ungues compressi, validissimi, totidem. Mammæ 2 pectorales.*didaety- 2. B. manibus didaetylis, cauda nulla. *Mus. Ad. Fr. 4.*
lus. *Schreber Saength. II. p. 200. t. LXV.*Bradypus pedibus anticis didaetylis, posticis tridaetylis. *Briss. quadr. p. 22.*Tardigradus Zeylanicus. *Seb. mus. I. p. 54. t. 33. f. 4. et t. 34. f. 1.*Unan. *Buffon hist. nat. XIII. p. 34. t. I.*

D 2

Habi-

Habitat in America meridionali et India. Vitit fructibus et radicibus; olfactu debili, visu magis nocturno, quam diurno.

Corpus pilis ferrugineis undulatis. Caput rotundatum. Auriculae magnae. Ungues in palmis 2, in plantis 3. Mammae 2 pectorales.

8. MYRMECOPHAGA, *Dentes nulli.*

Lingua teres extensilis.

Os angustatum in rostrum.

Corpus pilis tectum.

didactyla. 1. *M. palmis didactylis, plantis tetradactylis, cauda villosa. Mus. Ad. Fr. I. p. 8.*

Myrmecophaga rostro brevi, pedibus anticis didactylis, posticis tetradactylis. Briss. quadr. 98.

Tamandua f. Coati americana alba. Seb. mus. I. p. 60. t. 37. f. 3.

Little ant-eater. Edw. av. t. 220.

Fourmiller. Buffon hist. nat. X. p. 144. t. 30.

Habitat in America australi. Talis lente incedit.

Corpus flavescens, reliquis minus. Rostrum reliquis brevius.

tridactyla. 2. *M. palmis tridactylis, plantis pentadactylis, cauda villosa.*

Myrmecophaga rostro longissimo, pedibus anticis tridactylis, posticis pentadactylis, auriculis longis flaccidis. Briss. quadr. 27.

Tamandua-guacu. Seb. mus. I. p. 60. t. 37. f. 2.

Habitat in India. Lente currit, cauda lata instar muscarum se tegit; arbores etiam scandit.

Mammae pectorales 2, abdominales 6. Plaga lateralis nigra. Dorsum longitudinaliter jubatum. Cauda compressa, subtus nigra, pilis longioribus, supra pilis longioribus apice albis.

An vere distincta species?

jubata. 3. *M. palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, cauda jubata. Schreber Saegth. II. p. 203. t. LXVII.*

Myrme-

Myrmecophagae vescuntur formicis, quarum nidos ungue secant, insecta ipsa lingua acervis inserta alliciunt: Mansuescunt et diu absque victu vivunt; interdum dormiunt, capite sub brachiis recondito, nocte exeunt. Vellus crassissimum.

Myrmecophaga rostro longissimo, pedibus anticis tetradactylis, posticis pentadactylis, cauda longissimis pilis vestita. *Briff. quadr. 24.*

Tamandua-guacu. *Marcgr. bras. 225. t. 225.*

Tamanoir. *Buffon hist. nat. X. p. 141. t. 29.*

Great ant-eater. *Penn. syn. p. 331. n. 260.*

Habitat in America australi, et Africae regno Congo. Cauda dum dormit et contra pluviam se tuctur.

Plaga pectoralis lateralis nigra. Cauda villosissima, pilis longis planis, nec teretibus. Caro ab Americae incolis comeditur.

tetradac- 4. M. palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, cauda calva.
tyla. *Schreber Saeugeth. II. p. 205. t. LXVI.*

Myrmecophaga rostro longissimo, pedibus anticis tetradactylis, posticis pentadactylis, cauda fere nuda. *Briff. quadr. 26.*

Tamandua-i. *Buff. hist. nat. X. p. 144.*

Middle ant-eater. *Penn. syn. p. 332. n. 261.*

Habitat in America meridionali. Noctu exit, die dormit; irata baculum prebendit, stertit posterioribus pedibus infidens.

Caudae extremitas calva, qua se ex ramis arborum suspendere potest. Plaga pectoralis lateralis nigra.

capensis. 5. M. palmis tetradactylis, rostro longo, auriculis magnis pendulis, cauda corpore brevior ad apicem attenuata. *Pallas miscell. zoolog. n. 6.*

Habitat ad Caput bonae Spei, reliquis speciebus major, ut cum porco comparet Kolbe, et centum libras ponderare asserat: Fodit, interdiu dormit, noctu exit.

9. MANIS. Dentes nulli.

Lingua teres extensilis.

Os angustatum in rostrum.

Corpus supra squamis mobilibus offeis tectum.

pentadac- 1. M. pedibus pentadactylis. *Aff. Stockh. 1749. p. 265. t. 6.*
tyla. *f. 3. Schreber Saeugeth. II. p. 210. t. LXIX.*

Philodotus pedibus anticis et posticis pentadactylis, squamis subrotundis. *Briff. quadr. 29.*

Lacertus indicus squamosus. *Bont. jav. p. 60.*

Lacertus squamosus minor fetulis adpersus. *Petiv. gaz. 32. t. 20. f. 2.*

Armadilles squamatus major ceylanicus, feu diabolus tajovanicus dictus. *Seb. mus.* I. p. 88. t. 54. f. 1. et t. 53. f. 4.

Myrmecophagus squamatus f. Daemon thebaicus. *Herm. mus.* 295.

Pangolin. *Buff. hist. nat.* X. p. 180. t. 34.

Short-tailed Manis. *Penn. syn.* p. 329. n. 259.

Habitat in Guinea, China, India et insulis oceani Indici.

tetradactyla. 2. M. pedibus tetradactylis. *Schreber Saeugethiere*, II. p. 211. t. LXX.

Philodotus pedibus tetradactylis, squamis mucronatis, cauda longissima. *Briss. quadr.* 31.

Lacertus squamosus peregrinus. *Clus. exot.* 374.

Lacerta indica yvanae congener. *Aldr. ovip. dig.* 668. t. 667.

Scaly lizard. *Grew rar.* p. 46.

Long-tailed Manis. *Penn. syn.* p. 328. n. 258.

Platagin. *Buff. hist. nat.* X. p. 180. t. 34.

Habitat in India.

10. DASYPUS. *Dentes laniarii* nulli,
molares breves cylindrici utrinque 7 - 8.
Corpus cataphractum testa ossea zonis intersecta.

unicinctus. 1. D. tegmine tripartito, pedibus pentadactylis.

Cataphractus scutis duobus, cingulis duodecim. *Briss. quadr.* 43. *Schreb. Saeugeth.* II. p. 225. t. LXXXV. LXXXVI. f. 11. 12.

Tatu f. Armadillo africanus. *Seb. mus.* I. p. 47. t. 30. f. 3. 4.

Kabasson ou Tatou à douze bandes. *Buff. hist. nat.* X. p. 218. t. 40.

Twelve-banded Armadillo. *Penn. quadr.* p. 326. n. 256.

Habitat in Africa.

Tegmen

Manis videtur formicis, vermibus, lacertis; non sonora, lente incedit, fodit, noctu victum quaerit, irata squamas erigit horrendae, territa in globum se contrahit capite caudaque ventum versus adductis, ut nil conspici queat, nisi squamosus globus. Caro edulis. Cauda pinguis, epulis expetita. Corpus supra squamis basi striatis satisque interstinctis vestitum, ut strobilus; subtus hirtum est. Sed Cauda utrinque squamosa etiam subtus imbricata. Auriculae nuda rotundatae. Ungues primores medii majores, quibus contractis incedit. Myrmecophagae adeo affinis, ut solo vestimento differat.

Tegmen dorsi antèrius septem, postremum novem scutulo-
rum seriebus constat.

- 18 cinc- 7. D. cingulo simplici. *Syst. nat. Ed. VI. XII. I. β.*
tus. Cataphractus scuto unico, cingulis 18. *Briff. quadr. 37.*
Tatu mustelinus. *Raj. quadr. p. 225.*
Cirquincon ou Tatou à dix huit bandes. *Buff. hist. nat. X.*
p. 220.
Weesle-headed armadillo. *Grew mus. p. 19. t. I.*
Habitat in - - -
An vere a quadricincto distinctus et ab 18 cincto Molinae
hist. nat. Chil. L. IV. p. 271. qui palmas tetradactylas
refert?
- tricinctus. 2. Dasypus cingulis tribus, pedibus pentadactylis. *Houtt.*
nat. 2. p. 280. t. 16. f. 2. Schreber Saegth. II. p. 215.
t. LXXI. A. LXXVI. I. 2.
Cataphractus scutis duobus, cingulis tribus. *Briff. quadr. 24.*
Tatu s. Armadillo. *Red. exper. 91. t. 92.*
Tatu s. Armadillo orientalis. *Seb. mus. I. p. 62. t. 38. f. 2. 3.*
Tatu apara. *Marcgr. bras. 232.*
Armadillo s. Tatou genus alterum. *Clus. exot. 109.*
Armadillo. *Grew mus. 17.*
Apas ou tatou à trois bandes. *Buff. hist. nat. X. p. 206.*
Habitat in Brasilia; vivit melonibus, batatis, gallinis.
Loricæ cingulum intermedium est angustissimum; singulo-
rum, etiam squamarum, ex quibus scuta constant, su-
perficies nodosa.
- quadri- 3. D. cingulis quatuor.
cinctus. Cataphractus scutis duobus, cingulis quatuor. *Briff. quadr.*
25.
Cheloniscus. *Column. aquat. 2. p. 15. t. 16.*
An varietas præcedentis? An distinctus ab hoc Dasypus
quadricinctus Molinae hist. nat. Chil. L. IV. p. 270.
- sexcin- 4. D. cingulis senis, pedibus pentadactylis. *Mus. Ad. Fr. 7.*
ctus. *Schreb. Saegth. II. p. 218. t. LXXI. B.*
Cataphractus scutis duobus, cingulis sex. *Briff. quadr. 25.*
Tatu s. Armadillo prima Maregravii. *Raj. quadr. 233.*

D 4

Tatu

Vivitant Dasypi radicibus, melonibus, batatis, carnibus, piscibus, insectis, lumbricis,
nocte exeunt, interdum quieti, fodiunt, mites scuto, quod globi instar contrahunt,
ab adversariis se muniunt, meridionalis potissimum Americae incolae; feminae singu-
lis mensibus pariunt.

- Tatu et Tatu-paba Brasiliensibus. *Marcgr. bras. p. 231.*
 Armadillo. *Olear. mus. p. 7. t. 6. f. 4.*
 Armadillo f. Tatou. *Clus. exot. 330.*
 Encouvert ou Tatou à six bandes. *Buff. hist. nat. X. p. 209. t. 42.*
Habitat in America meridionali. Edulis, victitat melonibus, aliis fructibus, batatis aliisque radicibus, plantationibus infesta.
Cervix etiam scuto tecta. Penis spiralis; glande plano compressa, marginata.
- septem- 5. D. cingulis septenis, palmis tetradactylis, plantis penta-
 cinctus. daetylis. *Amoen. acad. I. p. 281. Schreber Saeugth. II. p. 220. t. LXXII. LXXVI. f. 3. 4.*
 Tatus quadrupes peregrina. *Gesn. quadr. 103.*
Habitat in India et America meridionali.
Scutum anterius antice emarginatum. Cingula non nisi sex mobilia.
- octocin- 8. D. scutis duobus, cingulis octo. *Schreber Saeugthiere, II. p. 222. t. LXXIII. LXXVI. f. 5. 6.*
 ctus. *Cataphraetus scutis duobus, cingulis octo. Briss. quadr. 27. Aiatochtli. Hernand. mex. p. 314.*
Tatouette ou Tatou à huit bandes. Buff. hist. nat. X. p. 212.
An haec et mox praegressa vere distinctae species? an differt octocinctus Molinae hist. nat. Chil. L. IV. p. 271. qui plantas habet pentadactylas?
- novem- 6. D. cingulis novem, palmis tetradactylis, plantis pentadacty-
 cinctus. lis. *Mus. Ad. Fr. 6. Houtt. nat. 2. p. 284. t. 16. f. 3.*
Schreber Saeugth. II. p. 223. t. LXXIV. LXXVI. f. 7-10.
Cataphraetus scutis duobus, cingulis novem. Briss. quadr. 42.
Tatus. Gesn. quadr. p. 935.
Tatu été. Marcgr. bras. p. 235.
Tatu f. Armadillus americanus. Seb. mus. I. p. 45. t. 29. f. 1.
Armadillo f. aiatochtli. Nieremb. hist. nat. p. 158. f. supr.
Pig-headed Armadillo. Grew mus. p. 18.
Cachicame ou Tatou à neuf bandes. Buff. hist. nat. X. p. 215. t. 37.
Habitat in America meridionali, frequens praesertim in Gujana. Caro esculenta.
An propria species IIcinctus Molinae hist. nat. Chil. L. IV. p. 271. palmis tetradactylis, plantis pentadactylis?

36. RHINOCEROS. Cornu solidum perenne conicum, naso insidens, cum offe non cohaerens.

unicornis. I. R. cornu unico. *Gesn. quadr. p. 842. Albin. tab. muscul. 4. 8. Knorr delic. T. II. p. 110. t. K. X. Parsons philosoph. Transact. Vol. XLII. n. 523. Edw. av. t. 221. f. 2.*

Habitat inter et prope tropicos in paludosis, jam Jobo memoratus, sub nomine REEM; in pugnis animalium apud Romanos celebratis vulgatus, per longum tamen temporis spatium in Europa invisus, donec seculo decimo sexto aliqua ejus exempla in Europam devenerint: Victitat vepretibus, spinis, in coeno se volutans, parumper mansuescens, mitis, nisi laceatur, irritatus cum fragore arbores prosternit; retro mingit et coit; unum modo pullum parit. Visus debilis, olfactus et auditus tanto praestantior.

Statura et magnitudine, pedibus brevioribus exceptis, non tamen sagacitate et docilitate ad elephantem, reliqua forma, moribus, voce grunniente propius ad suam praesertim aethiopicum accedit. Cutis dura, ut sagittae, globuli sclopetarii, gladii ictus inde resiliant, nuda pilis, nisi cauda et auriculis: Suturae s. rugae transversales α) capitis postica. β) scapularis. γ) abdominalis ante femora. δ) femoralis trans femora. Caro crassa, spongiosa, vix edulis. Lingua mollis. Cornu basi crinitum, acutum, fibrosum, 3 aliquando pedum longitudinem attingens. Dentes primores adulto nulli, juniore remotissimi solitarii occurrentes. Ungulae tres. Cauda attenuata, pedibus brevior.

bicornis. 2. R. cornubus duobus. *Syst. nat. Ed. X. p. 56. n. 2. Sparrmann act. Holm. 1778. trim. 4. n. 5.*

Habitat in Africa, ossibus ejus, teste nuperius Pallas, frequentissime in Russia, boreali quoque sepultis; jam Paulaniae et Martiali dictus, in nummo Domitiani obvius, a Cosimo sexto seculo memoratus, vix differre videtur specie, neque tamen modo sexu aut aetate.

Caro ad suillam, viscera ad equina accedunt. Cystis fellea nulla. Dentes primores nulli. Cornu alterum supra primum versus frontem.

Rarior est rhinoceros tricornis, tertio tum cornu ex altero priorum excrescente.

5. ELEPHAS. *Dentes Primores* nulli utrinque.
Laniarii superiores elongati,
inferiores nulli.
Proboscis longissima prehensilis.
Corpus nudiusculum.

maximus. I. ELEPHAS. *Briss. quadr.* 45. *Raj. quadr.* 131. *Seb. mus. I.*
t. III. f. I.

Elephantus. Gesn. quadr. 377. *Aldr. quadr. l. I. c. 9.*
Fonst. quadr. 30. *t. 7. 8. 9.* *Edw. av. t. 221. f. I.* *Buff.*
hist. nat. XI. p. I. t. I.

Habitat in *Zonae torridae orbis antiqui paludosis ad amnes,*
secundum nonnullos Behemot Jobi; edit juniores arbores,
ramos, folia, fructus hesperidum praesertim et musae
paradisicae, cujus etiam lignum devorat, Cocos, Gui-
landinae semina, frumentum, vorax, gregarius, lon-
gaevus, docilis, cerebro quamvis perexiguo prudens; pro-
boscidem longissimam extensilem et contractilem, acute
odorantem, ad finem unco flexili instructam loco manus
habet; ea cibum potumque haurit hostemque pellit; ea
praecisa occiditur; murem metuit sub somno, ob tracheae
insertionem. Retro mingit, femina supina jacente coit,
quae per annum gravida est; pullus labiis appressis lac
maternum fugit. Portat domos aliaque, rectore collo insi-
dente; celeri satis passu ingreditur, dexterrime natat.
In bello armatur apud Indos, apud Romanos olim falci-
bus, a pulvere pyrio invento huic usui minus idoneus;
vulnuscule inter exin et atlantem furiosus occiditur.

Maximum quadrupes, adeo ut exempla sint elephanti 4500
libras pondere aequantis. Corpus cinereum, rarius rubef-
cens aut album, pilis raris. Proboscis subtus plana, api-
ce truncata. Oculi parvi. Dentes laniarii superiores
cornuum ad instar sursum exserti (Ebur) fibris crispis
insignes, adeo ut singuli non raro 150 libras pondere ae-
quent. Aures amplissimae, pendulae, dentatae, Aët. angl.
277. p. 1051. Cutis crassissima callosa, tamen ita,
ut globi sclopetarii, etiam plumbei, penetrent, et musca-
rum adeo puncturas sentiat. Mammæ 2 juxta pectus.
Ungues supra apices quinque loborum pedum. Genua fle-
xilia. Collum breve.

Petri G. C. Elephantographia. Lips. 1723.

Anatome in Bibliotheca medica Dublin. 1681.

P. Gil-

P. Gillii nova descriptio elephantii, ad calcem Aeliani de
h. anim. Lugd. 1565. 8. p. 497--525.

(Fr. Serao) opuscoli di fisico argomento. Napol. 1766. 4.
p. 1--62. t. 1.

Ossa elephantii creberrime in zonis etiam temperatis ipsisque
frigidis, adeo Americae sub terra sepulta. Pallas Nov.
Comm. Acad. Scient. Petrop. Vol. XIII. et XVII., et Merk
Lettres 1--3 sur les os fossiles d'éléphant et de rhinocéros,
qui se trouvent en Allemagne etc. à Darmst. 1786. 4.

Pedes vestiuntur corio calloso, quod integrum detrabi potest
instar ungulae equi, et inde sub belluis non inepte milita-
ret; cum vero pedes appareant tanquam unguibus, 5 in
anterioribus et 4 in posterioribus superimpositis, aptius ju-
dicavi, ei locum heic concedere, praeprimis cum mammas
in axillis brachiorum gerat.

6. TRICHECHUS. *Dentes Primores* (adulto) nulli
utrinque.

Laniarii superiores so-
litarii.

Molares ex osse rugoso
utrinque.

Corpus oblongum.

Labia geminata.

Pedes posteriores compedes coad-
unati in pinnam.

Rosmarus. I. T. dentibus laniariis superioribus exsertis remotis. Houtt.
nat. 2. p. 7. t. 11. f. 1. Schreb. Saegthiere, II. p. 262.
t. LXXIX.

Odobenus. Syst. nat. Ed. X. p. 38. Briss. quadr. 48.

Rosmarus. Fonst. pisc. t. 44. Worm. mus. 289. Olcar.
mus. 38. t. 23. f. 3. Bonann. mus. 269. f. 27. Gesn.
aquat. 211.

Equus marinus f. Hippopotamus falso dictus. Raj. quadr.
191. Ellis hudson. t. 6. f. 3.

Mors f. Morsus, Rosmarus. Gesn. aq. 211.

Wall-

Trichechi omnes maris incolae, fucus, corallinis, testaceis, non carne vicillant.

Wallrofs. *Martens spitsb.* 78. t. 1. f. B.

Morse. *Buff. hist. nat.* XIII. p. 358. t. 54.

Habitat intra et circa polum arcticum ad ostia praesertim fluviorum. Mugit instar bovis; dormiens stertit, ad 18 pedes longus, animose contra hostes se defendit, gregarius. Dentes primores juniori animali in maxilla superiore bini exigui; laniarii remotissimi acuminati, subtiliter striati, 30 aliquando libras pondere aequantes, Ebur fibris intertextis non adeo facile flavescens, nucleo tamen in fuscum vergente; molares in utraque maxilla utrinque quatuor exiles, acuti, pone apicem fovea plana excavati. Vibrissae culmi straminei crassitie pellucidae. Nares lunares. Collum crassum. Pedes digitis 5, unguibus brevioribus. Ex pelle lora curruum conficiunt Russi, nuperius Galli. Pinguedo expetita. Sceletum reiectum in arenam potior pars Mammotovacost.

Dugong. 3. T. dentibus laniariis superioribus exfertis approximatis.

Dugon. *Buff. hist. nat.* XIII. p. 374. t. 74.

Indian Wallrus. *Penn. syn.* p. 338. n. 264.

Habitat in mari inter caput bonae spei et insulas philippinas interjecto, rosmano cetera satis similis; caput tamen magis acuminatum et angustius; nares ampliores et altius positae; loco dentium primorum planum inclinatum ad laniarios allidens. Dentes laniarii in maxilla inferiore nulli, in superiore approximati, extrorsum flexi; molares latiores, distantes, in superiore maxilla utrinque 4, in inferiore tres. Mammae 2 pectorales. Caro bovillam sapit.

Manatus. 2. T. dentibus laniariis nullis. *Art. gen.* 79. *syn.* 107.

Manatus. *Rondel. pisc.* 490. *Gesn. pisc.* 213. *Hern. mex.* 323. *Briff. quadr.* 49.

Manati. *Clus. exot.* 133. *Aldr. pisc.* 728.

Manati s. vacca marina. *Raj. quadr.* 193.

Lamantin. *Buff. hist. nat.* XIII. p. 277. t. 57.

australis. α. pilosus, pedibus tetradaetylis unguiculatis.

Habitat in mari africano et americano, praesertim ad ostia fluviorum; quos creberrime ingreditur, parum a littore recedens; 8-17 pedes longitudine, 6-7 latitudine, 500-800 libras pondere aequans. Cutis ex atro cinerea. Dentes molares in utraque maxilla utrinque 9, quadrati, cortice vitreo vestiti. Vertebrae 50.

β. nu-

borealis. β . nudus, pedibus nec digitis nec unguibus instructis.

Habitat ad littus Americae occidentale, et insularum inter Americam et Kamschatkam positarum, frequentissime quoque ostia fluviorum intrans. Longitudine 23 pedes, pondere 8000 libras aequat; cutis dum madet fusca, exsiccata nigra. Loco dentium molarium in utraque maxilla utrinque os rugosum. Vertebrae 60.

Mansuescit saepe sylvestribus americanis musicaque delectatus, veterum Delphinus; vorat indefinenter. Sociatus, femina, adultus et proles. Monogami vere coeunt, femina variis gyris primum fugiente, resupinata. Dorsum inter pascendum ex aquis eminet, avibus ibi pediculos venantibus. Mugitus bovinus. Visus debilis, auditus tanto acutior. Pedes anteriores testudinum marinarum fere ad instar palmati; loco posteriorum cauda horizontalis. Auriculae nullae. Nares distantes regulares. Labium superius muricatum vibrissis rigidis incurvis. Mammae 2 pectorales. V. Decham et Steller Nov. Comm. Petropol. Vol. II. p. 294. sqq. Caro sapidissima. Phocis Cetisque affinis. Quicquid veri habent cantatae toties de Sirenibus fabulae, ad hunc spectare videtur.