

III. FERA.

Dentes primores superiores sex acutiusculi, canini solitarii.

II. PHOCA. *Dentes primores acuti, superiores VI paralleli: exteriores maiores.*

inferiores IV paralleli distincti aquales obtusiusculi.

laniarii duplo longiores, acuti, robusti I, superiores ab incisoribus, inferiores a molaribus remoti.

molares V-VI angusti tricuspidati.

Auriculae nullae.

Pedes postici coaliti.

ursina. 1. Ph. capite auriculato. Schreber Sacugthiere, III. p. 289. t. LXXXII.

Ursus marinus. Steller nov. aet. Petrop. II. p. 331. t. 15.

Habitat in Kamtschatkae maritimis inter Asiam et Americam proximam, primario in insula Beringii, in nova quoque Seelandia et insulis novi anni.

Impetuofissime natant, mares polygami gregatim degunt cum uxoribus, filiis, filiabus ad 120; coeunt in littore resupinata femina; vix metuant hominem; mordent projectum lapidem; senes elumbes quiescunt pingues; proprium lapidem pro lecto habent, quem non deserunt; bella instituunt propter uxores, lectum, aequum et justum; succumbente uno occurrit alter opem latus, mox alteri aliis, ne duo

Phocae genus folidum, curiosum, animosum, pugnax, mansuescens, polygamum, carne succulenta tenera, lardo et corio utile, aquas inhabitat, et sub aqua natat; vix incedit ob pedes anticos retractos, posticos unitos; vivitatis piscibus et marinis, cuius etiam generis esse videtur See-ape. Penn. quadr. 356.

*duo contra unum, usque dum omnes proelio involuti;
moestii lacrymas fundunt copiosissimas.* Steller.

leonina. 2. Ph. capite antice crista^tato, corpore fusco. Schreber Saeugth.
III. p. 297. t. LXXXIII.

Leo marinus. Anson itin. 100. t. 100. Ellis hudson. t. 6.
f. 4.

Loup marin. Pernetty voy. II. p. 40. t. 11. f. 1.

*Habitat ad polum antarcticum et littus Chilense. Tuberculo
ad rostrum basin piloso, quod inflat in vesicam, frontem te-
git, dum eludit baculi ictus. Natant gregatim; pugnant
pro feminis; excubias agunt.*

Mas labio f. fronte crista^tata. Dentes 2 inferioris maxillae
subexserti. Oculi magni. Vibrissae albae, rubro annu-
latae. Pedes omnes palmati, digitis 5-5, unguibus po-
ne apicem enatis; postici compedes interjecta cauda duos
pollices longa, in pinnam horizontalem, digito extimo
crassiore.

jubata. 4. Ph. cervice (maris) jubata. Schreber Saeugth. III. p. 300.
t. LXXXIII. E.

Phoca capite postice jubato. Molina hist. nat. Chil. L. IV.
p. 250.

Leo marinus. Steller nov. aet. Petrop. II. p. 360.

Lion marin. Pernetty voy. II. p. 47. t. 10.

*Habitat in parte septentrionali maris pacifici, littore occi-
dentali Americae, orientali insularum Falkland, Patago-
niae, Kamtschatcae, et potissimum circa insulas, quae in-
ter Kamtschatkam et Americam interjacent, et Kuriles.*

Color spadiceus, juniori animali magis obscurus, feminae
vivacior. Major leonina, ut pondere 160 libras, longi-
tudine 25 pedes asequatur; mugit instar bovis.

vitulina. 3. Ph. capite inauriculato et cervice laevi, corpore fusco.
Schreber Saeugth. III. p. 303. t. LXXXIV.

Phoca f. vitulus marinus. Gesn. aquat. 702. Aldr. pisc. 722.

Jonft. pisc. 44. Dodart aet. 191. t. 191. Raj. quadr. 189.

Phoca oceanica. Steller nov. Comm. Petrop. II. p. 290.

Phoque. Buff. hist. nat. XIII. p. 333. t. 45.

Vitulus maris oceanii. Rond. pisc. p. 458.

Veau marin ou loup de mer. Belon poiff. p. 25. f. 26.

Seal. Penn. br. zool. I. p. 71. t. 48.

B. botnica. Linn. faun. spec. 4. p. 2.

Naso latiore, unguibus longioribus, colore obscuriore differt.

γ) sibi-

y. sibirica, colore argenteo.

Habitat in lacubus Baikal et Orom.

♂. caspica, colore vario.

Habitat in mari, praesertim septentrionali, etiam pacifico, et caspico. Dormiunt in lapide ex aqua eminente; parvunt in glacie, per quam adscendere traduntur halitu, non descendunt. Mammas retrahunt duas abdominis; inter halecum catervos saginantur; a laris provocatae expuunt pisces; ita supra nasum facillime occiduntur. Alias varietates, cinereum, bovis, si adoleverit, magnitudine, albam vel margaritaceam, utramque in aquis ipsis dormientem, griseam, nigrum, et minorem maculatam refert Oedman aet. Stockb. nov. ann. 1784. trim. I. n. 10.

Vibrissae undulatae. Oculi membrana nictitante instructi, humore crystallino globo. Lingua bifida. Foramen ovale fertur apertum esse.

Anatome. E. N. C. d. I. a. 9. obs. 98. et d. 3. a. 7. app. 15.

Mona-
chus.

5. *Ph. capite inauriculato, dentibus incisoribus utriusque maxillae quatuor, palmis indivisis, plantis exunguiculatis.*
Hermann aet. nat. scrutat. Berol. IV. p. 456. t. XII. XIII.

Habitat in mari dalmatico.

groenlan-

6. *Ph. capite laevi inauriculato, corpore griseo, lateribus ludentia.*

Erxleben syst. mamm. p. 588.

Swartsiide. Egede Groenl. fig. p. 62.

Attarfoak. Cranz Groenl. p. 163.

The harp. Penn. syn. n. 269. p. 242.

Habitat in Groenlandia et Newfoundland, nec non circa Kamtschatkam.

hispida.

7. *Ph. capite laevi inauriculato, corpore pallide fusco pilis surrectis hispido.*

Erxleben syst. mamm. p. 589. Schreber

Sacugth. III. p. 312. t. LXXXVI.

Phoca foetida. Müller zool. dan. prodr. p. VIII.

Neitsek. Cranz Groenl. p. 164.

Habitat ad littus Groenlandiae et Labrador. Ex pellibus vestes conficiunt incolae.

cristata.

8. *Ph. capite antice cristato, corpore griseo.*

Erxleben syst. mamm. p. 590.

Klap-myssen. Egede Groenl. p. 62. t. 6.

Blaudrufelus. Olaffsen Isl. I. p. 283.

Neitser-foak. Cranz Groenl. I. p. 164.

Hooded seal. Penn. syn. n. 268. p. 342.

Habitat

Habitat in parte meridionali Groenlandiae, occidentali Islandiae, et circa Newfoundland. Prioribus major, pelle inter pilos albos brevi, densa, nigra lana instruta.

barbata. 9. Ph. capite laevi inauriculato, corpore nigricante. Müller zool. dan. prodr. p. VIII.

Utselur, Wetraselur. Olaff. Isl. I. p. 260.

Utsuk. Cranz groentl. I. p. 165.

Lachtak. Steller nov. comm. Petrop. II. p. 290.

Sea calf. Parsons act. angl. n. 469. p. 383. t. I. f. I.

Grand phoque. Buffon hist. nat. XIII. p. 333. 343.

Habitat ad Scotiam atque Groenlandiam australiorem, vulgaris circa Islandiam. Novembri atque Decembri parit pullos albos. Cutis densa, pilis nigricantibus obsita. Corpus longitudine 12 pedum.

pubilla. 10. Ph. capite laevi subauriculato, corpore fusco. Schreber Saeugth. III. p. 314. t. LXXXV.

Vitulus marinus. Bellon. aquat. p. 19. f. p. 21.

Vitulus maris mediterranei. Rondel. pisc. p. 453.

Veau marin. Dampier voyag. I. p. 116.

Loup marin. Ulloa voy. II. p. 2? 26.?

Vitello marino picciolo. Aless. quadr. IV. t. 171.

Petit phoque. Buffon hist. nat. XIII. p. 333. t. 53.

Habitat in Oceano, mari mediterraneo, ad littus Chilense, ad insulam Juan Fernandez. Φωνη Ariltotelis, Vitulus marinus Plinii.

An hujus forte varietas Phoca porcina Molin. hist. nat. Chil. a. IV. p. 248. rostro longiore, auriculis magis prominulis, pedibus pentadactylis diversa?

12. CANIS. Dentes Primores superiores VI; laterales longiores distantes; intermedii lobati.

Inferiores VI; laterales lobati.

Laniarii solitarii incurvati.

Molares VI-VII. (pluresve quam in reliquis).

familiaris. I. C. cauda (sinistrorum) recurvata. Faun. suec. 5. Amoen. acad. 4. p. 43. t. I. f. I.

Canis. *Gesn. quadr.* 91. *Aldr. dig.* 482. *Jonst. quadr.* 122. *Raj. quadr.* 176.

- domesti- $\alpha.$ auriculis erectis cauda subtus lanata.
cus. *Canis oīnovōg* f. *domesticus.* *Raj. quadr.* p. 177. n. 8.
le Chien de berger. *Buffon hist. nat.* V. p. 241. t. 28.
- pomera- $\beta.$ pilis in capite longioribus, auriculis erectis, cauda sursum
nus. quam maxime curvata.
Chien-loup. *Buffon hist. nat.* V. p. 242. t. 29.
- sibiricus. $\gamma.$ auriculis erectis, pilis per universum corpus longis.
Kosha. *Steller kamtschatk.* p. 182.
Chien de Sibirie. *Buffon hist. nat.* V. p. 242. t. 30.
- islandi- $\delta.$ auricularum erectarum apicibus pendulis, pilis rostro brevi
cus. Fiaar-hund. *Olaff. Isl.* I. p. 30.
Chien d' Islande. *Buff. hist. nat.* V. p. 242. t. 31.
- aquaticus. $\epsilon.$ pilo criso longo instar ovis.
Canis sagax ad aquas. *Aldrov. dig.* p. 556.
Canis aviarius aquaticus. *Gesn. quadr.* p. 256. *Raj. syn.*
p. 177. n. 6.
Grand barbet. *Buffon hist. nat.* p. 246. t. 37.
Water-dog. *Penn. quadr.* II. var. $\delta.$ p. 145.
Budel. *Ridinger Thiere,* t. 18.
- minor. $\zeta.$ minor pilo criso longo, circa auriculas longiore et recta
propendente.
Petit barbet. *Buffon hist. nat.* V. p. 250. t. 38. f. 2.
- brevipilis. $\eta.$ capite minore, rotundato, rostro brevi, cauda sursum cur-
vata.
Canis melitensis brevioribus pilis. *Aldrov. dig.* p. 541.
Gredin. *Buffon hist. nat.* V. p. 247. t. 39. f. 1.
Pyrame (niger maculis flammeis). *Buffon hist. nat.* V. t. 39.
f. 2.
King-Charles-dog (palato pilisque nigris). *Penn. quadr.*
p. 145. n. III. $\alpha.$
- extrarius. $\vartheta.$ auriculis longis lanatis pendulis.
Canis hispanicus, auribus demissis. *Aldrov. dig.* p. 561. 562.
Epagneul. *Buffon hist. nat.* V. p. 246. t. 38. f. 1.
- melitae- $\iota.$ magnitudine sciuri, pilis per totum corpus mollissimis, se-
us. riceis, longissimis.
Canis melitensis hirsutus. *Aldr. dig.* p. 542.
Canis melitaeus. *Raj. syn. quadr.* p. 177. n. 9.
Bichon. *Buffon hist. nat.* V. p. 257. t. 40. f. 1.

- leoninus. π . minimus, pilis abdominis et caudae brevioribus.
Chien-lion. *Buffon hist. nat.* V. p. 251. t. 40. f. 2.
- variega- λ . auriculis parvis subpendulis, rostro exili acuto, pedibus te-
tus. nuibus.
Petit danois. *Buffon hist. nat.* V. p. 247. t. 41. f. 1.
- hybridus. μ . auriculis parvis subpendulis, naso subfimo crasso.
Roquet. *Buffon hist. nat.* V. p. 253. t. 41. f. 2.
An ex λ et ν hybridus?
- fricator. ν . naso resimo, auribus pendulis, corpore quadrato.
Doquin. *Buffon hist. nat.* p. 252. t. 44.
Pug dog. *Penn. quadr.* p. 147. n. V. β .
Cane muffolo. *Aleß. quadr.* III. t. 103.
a. hybridus ex ν et μ .
Artois. *Buffon hist. nat.* V. p. 253.
b. hybridus ex ν et δ .
Chien d'Alicante. *Buffon hist. nat.* V. p. 254.
- Melostus. ξ . magnitudine lupi labiis ad latera pendulis, corpore toroso.
Canis fagax sanguinarius. *Gesn. quadr.* 251.
Dogue. *Buffon hist. nat.* V. p. 249. t. 43.
Bull-dog. *Penn. quadr.* p. 147. n. V. α .
Baerenbeisser. *Ridinger Thiere.* t. 3.
- anglicus. σ . maximus labiis ad latera pendulis, corpore toroso.
Canis bellicosus anglicus. *Aldrov. dig.* p. 559.
Canis mastivus. *Raj. quadr.* p. 176. n. I.
Mastiff. *Penn. quadr.* p. 146. n. IV. δ .
Dogue de forte race. *Buffon hist. nat.* V. p. 252. t. 45.
Englische Dacke. *Ridinger Thiere*, t. I. 2.
- fagax. π . auriculis pendulis, digito spurio ad tibias posticas.
Toutfcher Jagdhund. *Ridinger Thiere*, T. V. icon. duae
ad dextram.
- gallicus. ρ . auriculis pendulis, digito spurio ad tibias posticas, albicans.
Canis venaticus fagax. *Raj. quadr.* p. 174. n. 4.
Chien courant. *Buffon hist. nat.* V. p. 243. t. 32.
Hound. *Penn. quadr.* p. 144. n. II.
Französischer und englischer Parforcehund. *Ridinger Thie-
re*, T. V. ic. duae ad finistr. et T. VI.
- scoticus. σ . scoticus fagax. *Gesn. quadr.* p. 250.
Bloodhound. *Penn. quadr.* p. 144. n. II.
Canis sanguinarius. *Raj. quadr.* p. 174.
Schweishund. *Ridinger Thiere*, T. X.

venaticus. $\tau.$ Leithund. *Ridinger Thiere*, T. IV.

avicula- $v.$ cauda truncata.

rius. Canis fagax ad coturnices capiendas, pantherinus. *Aldrov.*
dig. p. 535.

Canis avarius seu hispanicus campestris. *Raj. quadr.* p. 177.
n. 5.

Spaniel. *Penn. quadr.* p. 145. n. III.

Braque et Braque de Bengale. *Buff. hist. nat.* V. p. 245.
t. 33. et 34.

Hünerhund. *Ridinger Thiere*, T. XIV.

aquatilis. $\varphi.$ cauda truncata, pilis longis asperis.

Barbet. *Ridinger allerley Thiere*, t. 42.

cursorius. $\chi.$ capite longo, rostro robusto, auribus parvis subpendulis,
pedibus longis torosis, corpore longiore graciliore.

Curshund. *Ridinger Thiere*, t. 13.

hiberni- $\psi.$ magnitudine σ , trunco curvato, rostro attenuato. *Schreber*
cus. *Sacugth.* III. p. 327. t. LXXXVII.

Canis grajus hibernicus. *Raj. quadr.* p. 176. n. 3.

Irish greyhound. *Pennant quadr.* p. 146. n. IV. $\alpha.$

turcicus. $\omega.$ magnitudine σ , trunco curvato, rostro attenuato, pilo sub-
crispo. *Ridinger Thiere*, t. 9.

Canis leporarius turcicus. *Aldr. dig.* p. 550?

grajus. $\alpha\alpha.$ magnitudine lupi, trunco curvato, rostro attenuato.
Canis scoticus venaticus. *Gesn. quadr.* p. 249. *Aldrov. dig.*

p. 545.

Canis venaticus grajus seu graecus, nonnullis scoticus. *Raj.*
quadr. p. 176. n. 2.

Levrier. *Buffon hist. nat.* V. p. 240. t. 27.

Common greyhound. *Pennant quadr.* p. 146. n. IV. $\beta.$

Windspiel. *Ridinger Thiere*, t. 7.

hirsutus. $\beta\beta.$ magnitudine lupi, trunco curvato, rostro attenuato, pi-
lo paulo longiore crispo.

Canis leporarius hirsutus. *Aldrov. dig.* p. 549.

Zotiger Windhund. *Ridinger Thiere*, t. 7. f. anter.

italicus. $\gamma\gamma.$ minor, trunco curvato, rostro attenuato.

Levron. *Buffon hist. nat.* V. p. 241.

Italian greyhound. *Pennant quadr.* p. 146. n. IV. $\beta.$ $\mathbf{I}.$

Kleines Windspiel. *Ridinger Thiere*, t. 15.

aegyp- $\delta\delta.$ nudus absque pilis.

tius. Canis sine pilis. *Aldrov. digit.* p. 562.

Canis

Canis pilis carens minor, indian dog. *Brown jamaic.*
p. 486?

Chien türk. *Buffon hist. nat.* V. p. 248. t. 42. f. I.
Naked dog. *Penn. quadr.* p. 147. n. V. δ.

Ianiarius. ♂. corpore angusto, pedibus torosif, cauda robusta recta, pilis brevibus appressis.

Matin. *Buffon hist. nat.* V. p. 239. t. 25.

aprinus. ♀. corpore angusto, pedibus torosif, cauda robusta recta, pilis longis alperis.

Saufinder. *Ridinger Thiere*, t. II.

suillus. ♀. capite rostroque robusto, trunco postice angusto, pedibus longis, pilis longis asperis.

Saurüden. *Ridinger Thiere*, t. 12.

vertagus. ♀. pedibus brevibus, trunco longo saepius variegato.

Turnipit. *Penn. quadr.* p. 145. n. 11. γ.

a. pedibus rectis.

Basset à jambes droites. *Buffon hist. nat.* V. p. 245. t. 35.

f. I.

b. pedibus curvatis.

Vertagus, a Tumble. *Raj. quadr.* p. 177. n. 7.

Basset à jambes tortes. *Buffon hist. nat.* p. 245. t. 35.

f. 2.

Dachschlieffer, Dachswürger. *Ridinger Thiere*, t. 16.

c. pilis longioribus crispis.

america- nus. magnitudine i. capite parvo, auribus pendulis, dorso curvato, cauda brevi.

Alco. *Buffon hist. nat.* XV. p. 150.

a. Ytzucinte porcotli, Canis mexicana, *Hernandez hist. Mexic.* p. 466.

Michuacanens. *Fernand. anim. nov. Hisp.* p. 7.

b. Techichi. *Fernand. anim. nov. Hisp.* p. 10.

Habitat saepius cum homine, passim etiam spontaneus evasit, an in India inquilinus?

Edit carnes, cadavera, vegetabilia farinosa; non perinde olera. Digerit ossa; vomitu a gramine purgatur; cacat supra lapidem. Potat lambendo; mingit ad latus, cum hospite saepe centies; odorat anum alterius; odoratu excellit naso humido; oblique currit; incedit supra digitos; vix fudat; calidus linguam exserit; cubitum iturus circumit locum; dormit auditu acutiore, somniat. Procis rixantibus crudelis; mensruans catullit cum variis; mordet illa illos; cohaeret copula junctus; gravida 63 diebus;

parit saepe 4 ad 8, masculis patri similibus, femineis matris. Fidissimus omnium; hominibus cohabit; blanditur ad domini accessum; ejus infidum non fert; praeccurrit in itinere, in bivio respicit; docilis, amissa inquirit, vigilias noctu instituit, ad venas indicat, ad merces vigilat, pecora ab agris arcet, tarandos coeret, boves ovesque a feris custodit, leones detinet, feras agitat, anatibus adstat, repit assiliens ad rete, occisa a venatore apportat, a rapina defens; veru trahit in Gallia, rhedam in Siberia. Mendicat ad mensam; furatus timet cauda incurvata; invidus edit; inter suos dominus domi; mendicorum hostis, ignotos sine injuria lacepsit. Lambendo vulnera, podagram, carcinomata lenit; ululat ad musicam; mordet projectum lapidem; instanti tempestate foetet aerrotans; taenia laborat; rabiem disseminat; demum caecutit et se ipsum rodit; ab oleo empyreumatico caudae adsperso clamitat; saepe gonorrhoea infectus; a Mahometanis expellitur. Anatomicorum victima in sanguinis circulatione, transfusione, vasis lacteis, nervo resecto etc. medicorum in venenorum efficacia exploranda.

Caput vertice carinatum. Labium inferius lateribus dentatis nudis occultatum. Myctaces ordinibus 5 f. 6. Nares extrorsum recurvato sinu lunares. Auriculae margine baseos superiore reflexo, posteriore duplicato, antico trilobo. Verrucae faciei pilosae 7. Suturæ velleris 8, collares, sternea, cubitales, abdominales, oculares, lumbares, auriculares, anales. Mammae 10: harum 4 in pectore. Pedes subpalmati.

Lupus. 2. C. cauda incurvata. Faun. succ. 6. Schreber Saeugth. III. p. 346. t. LXXXVIII.

Canis ex griseo flavescens. Briss. quadr. p. 170.

Lupus. Gesn. quadr. 634. Aldrov. dig. 144. Jonston quadr. 89. Raj. quadr. 173.

Loup. Buffon hist. nat. VII. p. 39. t. I.

Wolf. Penn. brit. zool. I. p. 61. t. I.

Wolf. Ridinger wilde Thiere, t. 21.

Habi-

Canis genus vorax, morsu lacerans, arbores non scandit, cursu quamvis celer; femina plures pullos parit, mammis plerunque 10 instructa, 4 in pectore, 6 in abdome positis. Caput vertice plano, rostro tenuiore. Truncus antice crassior. Penis nodosus est. Pedes anteriores, excepta hyaena et crocuta, cui quatuor tantummodo sunt, digitis 5, posteriores 4, singulis unguibus longis, paulisper curvatis, immobilibus, cum feli, phocae, urso, mustelae in utrisque pedibus sunt 5.

*Habitat in Americae borealis, Asiae, Africæ, Europæ potissimum sylvis etiam frigidioribus, ex magna Britannia inde ab anno 800 exterminatus. Catervatum incedit, pecora, equos, suos, canes occidit; in sylvis suspiciosissimus vix audet; tractum funiculum metuit, portam non subit, sed sepimentum superfilit; sonitum tubae stentoreae non fert; auditu atque olfactu excellit; coit Januario; gravida per 10 hebdomadas parit pullos 5-9 coecos; adolescit anno tertio, et 15-20 annorum aetatem attingit; summa fame et frigore lacefissus, in propriam speciem et hominem saevit; inediā diu tolerat; unguibus retractis incedit; collum facile flectit; noctu ululat; lichene vulpi-
no occiditur. Fn. suec. 1129. Ström söndm. 391.*

Anatome. E. N. C. d. 2. a. 9. obs. 71. et cent. 10. app. 450.

- mexica- 8. C. cauda deflexa laevi, corpore cinereo fasciis fuscis macu-
nus. lisque fulvis variegato.
Canis cinereus, maculis fulvis variegatus. Briff. quadr. 237.
Quanhpecotli s. Felis montana americana. Seb. mus. I. p. 68.
t. 42. f. 2.
Xoloitzquintli, lupus mexicanus. Hernand. mex. p. 479.
Cuatlachtli, lupus indicus. Fernand. nov. Hisp. 7.
Loup de mexique. Buffon hist. nat. XV. p. 49.
Habitat in calidioribus regni Mexicani.
*Corpus cinereum, fasciis fuscis. Maculae fulvae in fronte,
colla, pectore, ventre, cauda.*
- Thous. 9. C. cauda deflexa laevi, corpore subgriseo, subtus albo.
Habitat in Surinamo.
*Corpus griseum, subtus totum album, magnitudine majo-
ris cati. Aures concolores erectae. Verruca supra ocu-
los, in buccis, sub gula. Lingua lateribus ciliata.*
- Hyaena. 3. C. cauda recta, pilis cervicis erectis, auriculis nudis, pedi-
bus tetradactylis. Schreber Sacugth. III. p. 371. t. XCVI.
Miller on various subj. T. XIX. A.
*Taxus porcinus sive hyaena veterum. Kaempfer amoenit.
exot. p. 411. t. 407. f. 4.*
*Lupus marinus. Bellon. aquat. 33. t. 34. Jonston quadrup.
t. 57. Gesner Thierb. p. 359.*
Hyaena. Briff. quadr. p. 169.
Hyacena. Buffon hist. nat. V. p. 268. t. 25.
Striped hyaena. Penn. syn. p. 161. n. 118.
Indianischer Wolf. Ridinger allert. Thiere, t. 37.

Habitat in Oriente, Persia, Africa, etiam meridionali, Υαινα, Κρονολας, Κρονουλας veterum, Γλαυος etiam Aristotelis, excavat terram degitque in antris; diutius sine cibo vivit; in humana cadavera saevit, quae e tumulis effudit, coemeteriis infesta; quicquid irritatus ore prebendit, mordicus tenet, nee vivus dimittit pertinacissimus, inde venatoribus facilius cedet.

Magnitudo suis, facies apri. Pili dorfi subsphithamei, erecti, apicibus nigris. Oculi rostro propinquiores. Auriculae nudae. Cauda saepius annulis nigricantibus verticillata; crura annulis nigris variegata. Striae corporis fuscae et nigrae, transversales, a dorso ad ventrem ductae. Forsan ad ursi vel melis genus relegandum animal, quod etiam, quemadmodum meles, inter anum et caudam sacrum unguine foetido refertum habet.

Crocuta. 10. *C. cauda recta, corpore nigro maculato, pedibus tetradactylis.* Erxleben hist. mamm. p. 578.

Hyaena sive congener illi Crocuta. Ludolf Aeth. L. I. c. 10. n. 50.

Quumbengo. Barbot Guin. p. 486.

Jachhals vel Boshond. Bossin guin. p. 291.

Spotted Hyaena. Penn. syn. quadr. p. 162. n. 119. t. 17. f. 2.

Habitat in Guinea, Aethiopia, ad caput bonae spei in terrae rupiumque caveis. Noctu praedatur oves, sepulcra adit voratque cadavera, ipsosque homines adoritur. Vox terribilis.

Facies et caput supra nigra. Juba brevis nigra. Corpus pilis brevibus, mollibus, cum artubus rubro-fuscum, maculis rotundis nigris. Cauda brevis nigra villosa.

aureus. 7. *C. cauda recta, corpore pallide fulvo.* Schreber Saeugth. III. p. 365. t. XCIV.

Canis flavus. Briff. quadr. p. 171.

Lupus aureus. Kaempfer amoenit. exot. p. 413. t. 407. f. 3. Raj. quadr. p. 174. Klein quadr. p. 70.

Vulpes indiae orientalis. Valent. mus. 452. t. 452.

Adil. Bellon observ. p. 160.

Chacal, Adive. Buffon hist. nat. XIII. p. 255.

Chien sauvage indien. Vosmaer descript. Amst. 1773.

Schakall. S. G. Gmelin it. ruff. III. p. 80. t. 13. et Güldenstedt nov. comm. Petropol. XX. p. 449. sqq. t. X.

Habi-

Habitat in Asiae regionibus calidioribus, et in Barbaria, Οὐροὶ Aristotelis et Aelianī, Λυνὸς ἔανθος et χρυσός Opiani, Thoës Plinii.

Die lateat in montibus sylvisque; noctu catervatim ad 200 incedit, furto deditus; lente ambulat, capite dependente, at praeda detecta celerrime currit; adultos homines vix invadit, pueros trucidat; edit animalia minora, aves, cibaria varia, fructus quoque horaeos, radices, cadavera e terra effodienda. Coit canino more verno tempore, per mensem gravida; 5-8 pullos parit, valde mansuescit, moschum olet. Uno clamante, clamant remoti alii, ambulante sono nocturno; ululatus execrabilis, quasi ejulatus latratu interceptus. Latratu exagitare fertur feras, hoc audientes reliquae in exercitum concurrere, prosequi miserum cervum, dum leo tigrisve ex insidiis fugientem prostrernat, praedamque voret, circumsedente venatorum corona, usque dum rex satiatus discesserit. An canis ferus?

mesome- 11. C. cauda recta, corpore ferrugineo; fascia dorsali nigra.
las. Erxl. syst. mammal. p. 574. Schreber Saength. III. p. 370.
t. XCV.

Jackhals. Kolbe cap. bon. sp. p. 150.

Chacal. Buffon hist. nat. XIII. p. 268.

Habitat vulgaris ad caput bonae spei.

Facies vulpina; longitudo corporis 2 $\frac{3}{4}$ pedum, caudae pedis unius.

Lycodon. 12. C. cauda recta, corpore toto nigro. Erxl. syst. mamm. p. 560. Schreber Saength. III. p. 353. t. LXXXIX. Miller on various subjects, T. XIX. B.

Vulpeculae nigræ. Scheff. Lappon. p. 340.

Schwarze Füchse. Steller Kamtschatk. p. 124.

Loup noir. Buffon hist. nat. IX. p. 362. t. 41.

Black fox. Penn. syn. quadr. p. 152. n. 112. v.

Lupo nero. Aless. quadr. I. t. 24.

Habitat in Europæ, Asiae, et Americae frigidioribus, omnium astutissimus et lupo satis similis, magnitudinis etiam inter hunc et vulpem intermediae; color totus niger, ut tamen aliquando colore subgriseo, vel argenteis pilorum apicibus variet. Pellis pretiosissima.

Vulpes. 4. C. cauda recta, apice albo. Schreber Saength. III. p. 354. t. XC.

Vulpes. Gesn. quadr. 966. Aldrov. dig. 195. Jonst. quadr. 82. Raj. quadr. 177.

Rénard. *Buffon hist. nat.* VII. p. 75. t. 6.

Fuchs. *Ridinger jagdbare Thiere*, t. 14.

Habitat in Europa, Asia, Africa, regno Chilensi Americae;
Αλωπηξ Aristotelis et Aelianus, Κερδω Oppiani, antra fo-
diens, animal astutissimum; saevit in agnos, anseres, gal-
linas, aviculas, non accipitres foetidioresque; edit ster-
cora animalium; pinguescit uvis; non rapit facile in pra-
dio, quod inhabitat; pruriens noctu clamitat; bombar-
das explosas odoremque pulveris pyrii fugit; pellitur fumo.
Corpus fulvum, pedibus anticis et auricularum apicibus ni-
gris; raro album. Auriculae erectae. Labia alba. Am-
brosiaco fragrat odore supra caudae basin.

Alopex. 5. C. cauda recta: apice nigro. *Schreber Saeugth.* III. p. 358.
 t. XCI.

Vulpes villo deniore et nigricante. *Gesn. quadr.* p. 967.

Charbonnier. *Buffon hist. nat.* VII. p. 82.

Brant-fox. *Penn. syn.* p. 153. ♂.

Habitat in Europa, Asia, regno Chilensi Americae.

Praecedente rario, minor, magis obscurus, cetera satis si-
milis.

Corfac. 13. C. cauda recta fulva, basi apiceque nigra. *Syst. nat.* XII.
 app. 3. p. 23. *Schreber Saeugth.* III. p. 359. t. XCI. B.

Korlaki. *Rytschkow Orenb.* I. p. 232. *Pallas neue nord.*
Beytr. I. 29.

Habitat frequentissimus in magno deserto ab Ural fluvio ver-
sus Irtim; saevit in aves, foetet, clamitat, latrat, vul-
pe minor, ceterum satis similis.

Karagan. 14. C. cauda recta, corpore griseo, auriculis nigris.

Karagan et Steppenfuchse. *Pallas it.* I. p. 199. 234.

Habitat in desertis Kalmyccis et Kirgificis.

cinereo- 15. C. cauda recta, corpore cinereo, collo lateribus fulvo.
 argenteus. *Erxleb. syst. mamm.* p. 567. *Schreb. Saeugth.* III. p. 360.
 t. XCII. A.

Habitat in America boreali, vulpe minor. Griesfuchs.

virginia- 16. C. cauda recta, corpore ex cinereo albicante. *Erxleb. syst.*
 nus. *mamm.* p. 567. *Schreb. Saeugth.* III. p. 361. t. XCII. B.

Canis vulpes cinerea. *Briff. quadr.* p. 174.

Vulpes cinereus americanus. *Klein quadr.* p. 71.

Grey fox. *Catesb. carol.* II. p. 78. t. 78.

Habitat in Carolina, et reliquis Americae borealis calidiori-
bis, in cavis arboribus, facile mansuets.

- Lagopus. 6. C. cauda recta, palmis plantisque pilosissimis. Erxl. syst. mamm. p. 568.
 Canis cauda recta apice concolore. Syst. nat. XII. p. 59.
 Schreb. Saeugth. III. p. 362. t. XCIII. utraq.
 Canis hieme albus, aestate ex cinereo caerulescens. Briss. quadr. p. 174.
 α. Vulpes alba. Kalm. babus. 236.
 Isatis. J. G. Gmelin nov. comm. Petrop. V. 1760. p. 358.
 Buffon hist. nat. XIII. p. 72.
 The arctic fox. Penn. syn. quadr. p. 155. t. 17. f. I.
 β. Vulpes caerulescens. Faun. suec. 14.
Habitat ad omne mare glaciale frequentissimus, etiam in America boreali, in ipso regno Chileni, non in silvis, sed in nudis montibus; degit in cuniculis; edit mures, anseres, nec nisi fame coactus baccas et testacea. Latratus, non foetor vulpis. Graviditas per 9 hebdomadas. Pellis egregia. An hujus vel vulpis potius varietas est?
 γ. Vulpes crucigera fulvus, crucem nigram in dorso gerens.
 Brisson anim. p. 241. n. 6.
 et
 Canis (Culpaeus) cauda recta elongata, apice concolore laevi. Molin. hist. nat. Cbil. L. IV. p. 259?
 Cerdo. 17. C. cauda recta, corpore pallido, auriculis roseis erectis praelongis. Skiöldebrand act. ac. suec. ad ann. 1777. trim. 3. art. 7. t. 6.
Habitat in magno Africæ deserto fabuloſo Saara.
Reliquis speciebus minor, curſu celerrimus, scandit, locutis aliisque insectis vescitur. Canis junioris ad instar latrat.
An revera hujus generis?

13. FELIS. Dentes primores intermedii aequales.
Molares terni.

Lingua retrorsum aculeata.
Ungues retractiles.

- Leo. 1. F. cauda elongata, corpore helvolo. Schreber Saeugth. III. p. 376. t. XCVII. A. B.
 Felis cauda elongata floccosa, thorace jubato. Syst. nat. 6. p. 4. n. I.
 Felis cauda in floccum desinente. Briss. quadr. p. 194. Leo.

Leo. Gesn. quadr. 572. Aldr. dig. 2. Jonst. quadr. 72.
Dodart act. 1. t. 1. et 7. t. 7. Raj. quadr. 162.

Lion. Buffon hist. nat. IX. p. 1. t. 1. 2.

Habitat in Africa, praesertim interiore, rarer in desertis Persiae, Indiae, Japaniae, olim quoque in reliqua calidiori Asiae parte, Palaestina, Armenia, Thracia. Segnis, esuriens praedatur equis et aliis majoribus animalibus, nec nisi famelicus homine; fugatur accensa flamma; canibus coeretur; junior mansuetus; retro mingit. Rugitus horrendus a tracheae annulis integris imbricatis; dormit in aprico, esurit tertio die, tagax; incessus latus, praedantis saliens; halitus foetidus; olfactus debilior; caro Afris esculenta.

Color luteo-rufus, nonnunquam obscurior. Caput magnum, rotundatum. Frons quadrata. Oculi ingentes. Labia pendula. Cor maximum. Mas femina quarta parte maior, ut longitudo 8 pedes aliquando superet; thorax hirsutus; capitis et colli latera pilis flavescens in fuscum vergentibus propendentibus circiter bipedalibus, reliquis pilis brevibus appressis; cauda floccosa.

Anatomie. E. N. C. d. 1. a. 2. obf. 6. Bartholin. act. 1671. n. 17. Nov. comment. Acad. Imper. Petropol. pro ann. 1771. T. XVI.

Tigris. 2. F. cauda elongata, corpore maculis omnibus virgatis. Schreber Saength. III. p. 381. t. XCVIII.

Felis flava, maculis longis nigris variegata. Briss. quadr. p. 195.

Tigris maculis virgatis. Ludolf hist. aeth. comm. p. 151.

Tigris. Gesn. quadr. 936. Aldr. dig. 101. Jonst. quadr. p. 84. t. 54. Bont. jav. p. 53.

Tigre. Buffon hist. nat. IX. p. 129. t. 9.

Habitat in Asia calidiore, etiam China et Japania, in ipso monte Ararat in silvis et dumetis, praesertim ad fluvios; animal astutissimum, crudelissimum, robustissimum, foecidum, tremenda velocitatis; homini pessimum, desolat praeceps Indos; etiam a partu cicuratum insitam ferociam exercet, ut primum a vinculis se liberavit; mas occidit

Felis genus sobrium, scandit facile arbores, cursu celer, noctu potissimum speculatur, castus delabitur in pedes contumelie via obnoxium; glans penis ipsis muricatus retrorsum; retractis unguibus acutissimis incedunt, usque saeviunt; inhibendo sanguinem hauiunt; visa preda caudam movent; vegetabilibus ulro non vescuntur. Feminis multiparis mammae 8, 4 pectorales, 4 abdominales.

dr. 72.
desertis
ua cali-
Segnis,
ualibus,
ua; ea-
Rugi-
s; dor-
lentus,
ebilior;
agnum,
Labia
rte ma-
rax hir-
fuscum
reliquis
4. 1671.
ro ann.

virgatis.
quadr.
151.
quadr.
in ipso
fluvios;
m, foe-
desolat
m fero-
mas oc-
cideit

tur, casu
trorsum;
uem bau-
Feminis

cidit proprios liberos. Visus, qui necavit leonem. Saltu
ex insidiis praedam adoritur.

Pulcherrima fera, maculis virgatis transversis, magnitudi-
ne fere leonis.

Anatomie. E. N. C. d. 1. a. 2. obs. 7. et a. 9. obs. 194.
S. G. Gmelin itin. russ. III. p. 483.

Pardus. 3. *F. cauda elongata, corpore maculis superioribus orbicula-*
tis; inferioribus virgatis. Schreber Saeugth. III. p. 384.
t. XCIX.

Felis ex albo flavicans, maculis nigris in dorso orbiculatis,
in ventre longis. Briff. quadr. p. 194.

Panthera, Pardus, Pardalis, Leopardus. Gesn. quadr.
p. 824. Raj. syn. p. 166.

Pardus maculis seu scutulis varius. Ludolf hist. aeth. comm.
p. 51.

Panthere. Buffon hist. nat. IX. p. 151. t. II. 12.

Habitat in Africa et calidiore Asiae parte; cauda non men-
surata 5 - 6 pedes longa, Παρδαλίς μειών Oppiani; ho-
mini non infesta, nisi irritetur; noctu domus ingreditur,
et catus venatur; ceterum genio et praedandi more tigris
similis.

Uncia. 9. *F. cauda elongata, corpore albido, maculis irregularibus*
nigris. Erxleb. syst. mamm. p. 508. Schreber Saeugth.
III. p. 386. t. C.

Once. Buffon IX. p. 151. t. 13.

Habitat in Africa boreali, Persia, Hircania, Sina, Pan-
thera Plinii, Παρδαλίς ολυγοτέρο Oppiani, prioribus mi-
tior, ut sicurata venati adaptari possit, et minor, ut
corpus ipsum 3½ pedes longitudine non superet.

Leopar-
dus. 10. *F. cauda medioeri, corpore fusco maculis subcoadunatis*
nigris. Erxleb. syst. mamm. p. 509. n. 5. Schreber Saeug-
thiere, III. p. 387. t. CI.

Uncia. Caj. op. p. 42. Gesn. quadr. p. 825.

Léopard. Buffon hist. nat. IX. p. 151. t. 14.

Habitat in Africa, praesertim occidentali; priori vix major,
et moribus similis. Caro Hottentottis edulis.

Onca. 4. *F. cauda medioeri, corpore flavescente, ocellis nigris ro-*
tundato-angulatis medio flavis. Schreb. Saeugthiere, III.
p. 388. t. CII.

Felis flavesens, maculis nigris orbiculatis, quibusdam ro-
fam referentibus variegata. Briff. quadr. p. 196.

Felis

Felis cauda elongata, maculis subrotundis fere aequalibus.

Brown nat. hist. of Jamaic. p. 485.

Pardus aut Lynx brasiliensis, Jaguara dictus, Lusitanis Onza.

Raj. syn. p. 168.

Tlatlauhqui ocelott seu tigris mexicana. Hernand. mex. p. 498.

Jaguara. Marcgraf. bras. p. 235. Pis. ind. p. 103.

Tigre de la grande espece, que les Portugais appellent tigre royal. Perr. anim. III. p. 287.

Habitat in omni America meridionali ad Mexico usque; tigrim ferocitate et moribus, non animositate aequans, quamvis omnibus praecedentibus minor; ex insidiis tribus saltibus praedam rapit; equo insilit supra humeros; se triplo majorem aufert; gustato humano sanguine non deficit; capere primo aethiopem, tum europaeum, ultimo americanum fertur; piscibus etiam vescitur; crocodili hostis; igne fugandus.

Corpus lutescens maculis ocellaribus nigris saepe pupilla nigra una alterave instructis. Abdomen album maculis atris, ut in pedibus, ubi minores. Cauda corpore dimidio brevior, maculis nigris longis. An hujus varietas Guigna Chilensem? s. Felis cauda elongata corpore maculis omnibus orbiculatis?

Pardalis. 5. F. cauda elongata, corpore maculis superioribus virgatis, inferioribus orbiculatis. Schreb. Saeugthiere, III. p. 390. t. CIII.

Felis rufa, in ventre ex albo flavicans, maculis nigris, in dorso longis, in ventre orbiculatis variegata. Briff. quadr. p. 199.

Pardus cauda brevi. Klein quadr. p. 78.

Tlacozelotl, Tlalocelotl, catus pardus mexicanus. Hernand. mexic. p. 512.

Catus pardus s. catus montanus americanorum. Raj. quadr. 169.

Ocelot. Buff. hist. nat. XIII. p. 239. t. 35. 36.

Mexican cat. Penn. syn. p. 177. n. 128.

Habitat in America calidiore, praesertim Terra firma, California et nova Hispania; viso cane arbores adscendit, hominem metuit, ceterum ferox nec mansuescens, simias eludere dicitur.

Magnitudo melis; supra fuscus, subtus albicans; lineae punctatae nigra per totum corpus longitudinaliter sparsa, sed pedes et abdomen tantum punctis; latera lineis latioribus albis

*albis et fuscis pinguntur. Aures breves margine bifidae
absque penicillis. Pedes 5--4. Cauda verticillata-variegata,
proportione cati. Mustaces 4 ordinum, in singulis
ordinibus setae 3--5, albae, basi nigrae, longitudine
capitis.*

jubata. 11. *F. cauda mediocri, corpore fulvo, maculis nigris, collo
jubato.* Erxl. syst. mamm. p. 510. Schreber Saeugth. III.
p. 392. t. CV.

Felis pilis crassis vestita, maculis nigris variegata. Brisson
anim. p. 271. n. 10.

Tygerwolf. Kolbe Vorgeb. p. 171. t. 6. f. 5.

Guépard. Buff. hist. nat. XIII. p. 249. 254.

Hunting cat. Penn. syn. p. 174. n. 125. t. 18. f. 1.

*Habitat in Africa meridionali, et India; cicurata venatui
inservit.*

discolor. 12. *F. cauda elongata, corpore potissimum nigro.* Schreber
Saeugth. III. p. 393. t. CIV. B.

Felis nigra. Erxl. syst. mamm. p. 512. n. 8.

Jaguar. Marcgr. bras. p. 235. Pis. ind. p. 103. Raj.
quadr. p. 169.

Once. des Marchais voy. III. p. 300.

Black tiger. Penn. syn. p. 180. n. 130. t. 18. f. 2.

Habitat in America meridionali, robusta et crudelis.

*Magnitudo vituli annui. Pili breves, colore splendido ex
fusco nigro; labium superius, palmae et plantae albent;
labium inferius, gula, pectus, abdomen, interior pedum
facies albescunt.*

concolor. 9. *F. cauda elongata, corpore immaculato fulvo.* Mantiss. pl.
II. p. 522. Schreber Saeugth. III. p. 394. t. CIV.

*Felis ex flavo rubescens, mento et infimo ventre albicanti-
bus.* Brisson anim. p. 272. n. 11.

Puma s. leo americanus. Hernand. mexic. p. 518.

Cuguacuara. Pis. ind. p. 103.

Cuguacuana. Marcgr. bras. p. 235. Raj. quadr. p. 169.

Panther. Lawson Carol. p. 117. Catesb. app. p. XXV.

Tigris fulvus. Barrere Fr. équinox. p. 166.

Couguar. Buff. hist. nat. IX. p. 216. t. 19.

Brown cat. Penn. syn. p. 179. n. 129.

*Habitat in America a Canada ad Patagoniam usque; scandit
arbores, hominem vix adoritur, ceterum atrox et astuta;
ignem metuit.*

*Magnitudine et habitu corporis ad tigrin' accedit, defectu
macularum differt.*

tigrina. 13. F. cauda elongata corpore fulvo nigro striato maculataque subtus albido. *Erxl. syst. mamm. p. 517. n. II. Schreb. Saeugth. III. p. 396. t. CVI.*

Felis ex griseo flavescens, maculis nigris variegata. Briff. quadr. p. 193.

Felis fera tigrina. Barr. Fr. équin. p. 152.

Maraguao sive Maracaja. Marcgr. brasil. p. 233.

Tepe Maxtlaton. Fernand. nov. Hisp. p. 9.

Margag. Buff. hist. nat. XIII. p. 248. t. 38.

Cayenne cat. Penn. syn. p. 182. n. 132.

Habitat in America australi, non cicuranda, avibus victimis. Vox et magnitudo cati.

Catus. 6. F. cauda elongata annulata.

F. cauda elongata, auribus aequalibus. Faun. suec. 3.

ferus. a. cauda elongata fusco-annulata, corpore fasciis nigricantibus: dorsalibus longitudinalibus tribus, lateralibus spiraliibus. *Schreber Saeugthiere, III. p. 397. t. CVII. A. CVII. Aa.*

Felis pilis ex fusco flavicante et albido variegatis, cauda annulis alternatim nigris, et ex fordide albo flavicantibus. Briff. quadr. 192.

Felis sylvestris. Aldrov. digit. p. 582. fig. p. 583. Jonston quadr. p. 127. t. 72.

Catus sylvestris. Gesn. quadr. p. 353. Klein quadr. p. 75.

Chat sauvage. Buffon hist. nat. VI. p. I. t. I.

Wilde Kaze. Ridinger wilde Thiere, t. 240.

Wild cat. Penn. brit. zool. I. p. 47.

domesti- β. minor, pilis brevioribus et crassioribus. *Schreb. Saeugth. III. p. 397. t. CVII. B. 1.*

Felis domestica. Briff. quadr. 191.

Felis. Aldrov. dig. p. 564.

Felis vel catus. Gesn. quadr. p. 344. fig. p. 345.

Felis domestica. Jonst. quadr. p. 126. t. 72. Raj. quadr. p. 170.

Chat domestique. Buffon hist. nat. VI. t. 2.

angoren- γ. pilis longioribus argenteis sericeis, in collo longissimis. *Schreber Saeugth. III. p. 398. t. CVII. B. 2.*

Felis pilis longissimis toto corpore vestita. Briffon anim. p. 266. n. 4.

Chat d'Angora. Buffon hist. nat. VI. t. 5.

Angora-cat. Penn. quadr. p. 184. n. 133.

ο. nigro,

- hispani- ♂. nigro, albo, aurantioque varius.
cus. Chat d' Espagne. *Buff. hist. nat. VI. t. 3.*
Tortoise-shell Cat. *Penn. quadr. p. 184. n. 133. β.*
- caeruleus. ♀. pilis omnibus ex caeruleo cinereis.
Chat des Chartreux. *Buff. hist. nat. VI. t. 4.*
Blaue Kaze. *Kolbe Vorgeb. p. 153.*
Blue Cat. *Penn. quadr. p. 184. n. 133. γ.*

- ruber. ♂. fascia rubra in dorso a capite incipiente.
Rothe Kaze. *Kolbe Vorgeb. p. 153.*

Habitat in Europae et finitima Asiae silvis. Moribus congenerum, tranquilla ore molat, caudam erigit; excitata agilissima, scandit, irata fremit odore ambrosiaco; oculi noctu lucent; pupilla interdiu perpendiculari oblonga, noctu tereti ampliata; unguibus intro tractis incedit; parce bibit; urina maris corrosiva; ruetus foetidissimus; sternus sepelit; clamando rixandoque misere amat; cum puluis repellibusque ludit; in praedam intenta caudam motet, murium, et in statu fero aliorum etiam minorum quadrupedum et avium leo; pacata in comedantibus; pullos convocat; carnes piscesque edit; calida, salsa vegetabiliaque respuit; os instantem tempestate manu lavat; dorsum in tenebris elecristor; in altum aëta decidit in pedes. Pulices non habet. Coit primo vere, per 63 dies gravida, parit 3-6 caecos per dies novem. Delectatur mero, nepeta, valeriana.

- capensis. 14. F. cauda subelongata fusca nigro-maculata, corpore fulvo supra maculis virgatis infra orbicularibus, auriculis nudis macula lunata alba.

Cape-Tiger. *Penn. quadr. p. 181. n. 131.*

'Nfussi. *Labat éth. I. 177.*

Felis tigrina capensis. *Forster act. angl. Vol. LXXI. P. I. n. I. t. I.*

Habitat in promontorii bonaë spei montosis silvis; moribus cato similis, vietitat leporibus, dipodibus, antilopis; facile curatur, mitis.

- Manul. 15. F. cauda elongata nigro-annulata, capite punctis et fasciis duabus lateralibus nigris insignito. *Pallas itin. III. p. 692. n. 2.*

Habitat in apertis deserti tatarico-mongolici, praesertim circa fluvios Selenga et Dschida; vescitur lepore daurico. Magnitudo vulpis.

- Serval. 16. F. cauda subabbreviata, corpore supra fusco maculis nigris, orbitis ventreque albis. *Erxl. syst. mamm. p. 523. n. 13.* Schreber *Saeugth. III. p. 407. t. CVIII.*
Chat-pard. Perr. anim. I. p. 108. t. 13.
Serval. Buff. hist. nat. XIII. p. 233. t. 35.
Habitat in India et regno Tibetano, ut plurimum in arboribus; hominem metuit, nisi in iram acta; non circuanda.

- Chaus. 17. F. cauda mediocri, apicem versus annulata, apice ipso nigra, corpore reliquo ex fuscescente luteo, auriculis extus brunneis apice nigro barbatis. *Guldenslebt Nov. comm. Petrop. X. ann. 1775. p. 483. t. XIV. XV.* Schreb. *Saeugthiere, III. p. 414. t. CX. B.*
Habitat in silvosis desertorum circa mare caspium sitorum, praesertim in provinceis persicis Gilan et Mafanderan.
Moribus, voce, vietu cato fero similis, magnitudinis inter hunc et lynxem mediae; loca culta non frequentat ferocissimum animal, raro arbores scandit, noctu per inundata et campos vagatur, pisces, mures, aves venaturum in praedam insiliens.

- Caracal. 18. F. cauda subabbreviata et omni corpore unicolore ex fuscescente brunneo, auriculis extus nigris apice barbatis. Schreb. *Saeugth. III. p. 413. t. CX.*
Siyah-ghush. Charleton ex. 21. t. p. 23. Raj. quadr. p. 168. Act. angl. LI. P. 2. p. 648. t. 14.
Lynx cauda vitulina. Klein quadr. p. 77.
Caracal. Buffon hist. nat. IX. p. 262. t. 24. et XII. p. 442.
Persian cat. Penn. quadr. p. 189. n. 137. t. 19. f. 2.
Habitat in Barbaria, Persia et India; noctu praedatur, circumcuratus venatui inservit. Glans laevis.

- rufa. 19. F. cauda abbreviata subtus et apice alba, supra nigro-fasciata, corpore rufo fusco maculato, auriculis apice barbatis. Schreber *Saeugth. III. p. 412. t. CIX. B.*
Bay cat. Penn. quadr. p. 188. n. 136. t. 19. f. 1.
Habitat in provincia noveboracensi; cato magno duplo major.

7. F.

An singularis sit species felis the lesser leopard Pennanti et the particular beautiful kinds of cat Kaempferi, in India orientali et Japonia habitans, decidunt antoptae; idem valet de Gingy Congensium et fele tigrina Tibetana; pariter de Colocolo Chilensis five fele cauda elongata nigro-annulata, corpore albo maculis irregularibus atris flavisque. Molina hist. nat. Chil. p. 261.

Lynx. 7. F. cauda abbreviata, obsolete annulata apice atra, capite et corpore ex albido rufo nigro maculato, auriculis apice barbatis. Schreber Saeugth. III. p. 408. t. CIX.

Felis cauda abbreviata: apice atra, auriculis apice barbatis.
Syft. nat. XII. I. p. 62. n. 7.

Felis cauda truncata, corpore rufescente maculato. Fn. suec. I. n. 4. It. Wyoth. 222.

Felis auricularum apicibus pilis longissimis praeditis, cauda brevi. Briss. quadr. p. 200.

Pinuum dasypus. Nieremb. hist. nat. p. 153.

Lupus cervarius. Gesn. quadr. 677.

Lynx. Aldrov. dig. p. 90. Raj. quadr. p. 166. Jonston quadr. p. 83. t. 71. Buffon hist. nat. IX. p. 231. t. 21. Penn. quadr. p. 186. n. 135.

Loup cervier. Tournef. voy. II. p. 193. t. 193.

Luchs. Ridinger wild. Thiere, p. 22.

β . cauda truncata, corpore albo, maculato. Fn. suec. I. p. 2. n. 5. et II. p. 5. n. 11.

Lynx colore albo, maculis nigris, cauda truncata. Klein quadr. p. 77.

Felis alba maculis nigris variegata, cauda brevi. Briss. anim. p. 274. n. 14.

Habitat in Europae, Americae, Asiae borealis, etiam Japoniae silvis densioribus, in arboribus degens; venatur cervos, martes, aliasque mustelae species, catos, sciuros; viicitat leporibus, scitulis, avibus, ipsisque adeo, si fame prematur, ovibus et capris stabulantibus; astutissimum animal visu et odoratu acutissimo in praedam infilit; coit Februario, et 9 hebdomadibus elapsis 3-4 catulos parit.

Magnitudo circiter vulpis, β paulo inferior. Cauda femoribus paulo brevior; Palpebra superior versus canthum maiorem et inferior albicans. Macula linearis fusca pone oculos. Manus amplissimae.

14. VIVERRA. *Dentes primores VI: intermediis brevioribus.*

laniarii utrinque I, reliquis longior.

molares plures quam tres.

Lingua retrorsum saepe aculeata.

Ungues exserti.

Ichneumon. I. V. cauda e basi incrassata sensim attenuata apice floccosa, pollicibus remotiusculis. Schreber Sacugth. III. p. 427. t. CXV. B.

Mustela pilis ex albido et nigro variegatis vestita. Briff. quadr. p. 181.

Meles digitis mediis longioribus lateralibus aequalibus, unguibus subuniformibus. Hasselq. it. p. 191.

Ichneumon, que les Egyptiens nomment rat de Pharaon. Belon obs. p. 95.

Ichneumon I. lutra Aegypti. Aldrov. dig. p. 298. fig. p. 301.

Ichneumon. Gesu. quadr. p. 566. Alpin. hist. Aeg. p. 234. t. 14. f. 3. Maillet descr. de l' Egypt. p. 90. t. 88. Shaw travels T. II. t. ad p. 74. fig. sup. Penn. quadr. p. 226.

Habitat in Aegypto ad ripas Nili, quo exundante in hortos et pagos recedit. Mansuetus; more felis in domibus murres venatur; his praescirtim, gallinis, vermis, insectis, variisque amphibiis, serpentibus, ranis, lacertis, crocodili ovis vivit; mustelarum, catorum hostis, quos trucidat; animosum et astutum animal repit et profilit ad praedam: Calcaneis incedit.

Frons plana. Labium superius prominens. Auriculae rotundatae. Myltaces simplici serie in omnibus labiis lateralibus ad marginem. Lingua scabra. Cauda longitudine corporis. Folliculus ante aperturam ani sub aestu aperitus. Pili albido et griseo nigrescente verticillati. Magnitudo cati.

Mango. 7. V. cauda e basi crassa sensim attenuata non floccosa, pollicibus remotiusculis. Schreber Sacugthiere, III. p. 430. t. CXVI. A. CXVI. B.

Viverra ichneumon β. Syst. nat. XII. 1. p. 63.

Mustela glauca. Syst. nat. 5. Amoenit. acad. II. p. 109.

Viverra ex griseo rubescens. Briff. quadr. p. 177.

Muste-

Mustela s. viverra Indis Mangutia. *Kaempf. amoen. exot.* 574.
t. 567.
Quil vel Quiopela. *Garcias arom.* p. 214. *Raj. quadr.* 197.
Serpenticida sive Moncus. *Rumpf herbar. amboin. auct.* p. 69.
t. 72. f. 2. 3.
Indiae ichneumon. *Edw. av.* 199. *t. 199.*
Ichneumon indien. *Vosmaer descript. Amst.* 1772. 4.
Ichneumon. *S. G. Gmelin it.* III. *t. 30.*
Mangouste. *Buffon hist. nat.* XIII. p. 150. *t. 19.*
Habitat in Bengala, Persia, aliisque Asiae calidioribus pla-
gis; ichneumone minor et glauca; ceterum moribus, vietu,
praeda, corporis habitu similis; cum serpentibus, ipsaque
naja dimicat, morsa ab his ophiorhizam assumere fertur;
a vento reformidat; cicurata more canis sequitur; mun-
dum animal, frigoris impatiens.

- cafra. 8. V. cauda e basi crassa sensim attenuata apice atra. *Schreber*
Saeugth. III. p. 434. *n. 9.*
Habitat in promontorio bonaë spei; habitu externo muste-
lae putorio similis, longitudine mustelae lutrae aequalis.
Auriculae brevissimae, pilosae. *Myctaces simplici serie, ni-*
grecunt. Pili nitentes, asperi, ex luteo, fuso et nigro
misti. Pedes nigricant.
- Zenik. 27. V. tetradaëtyla, corpore griseo, fasciis 10 transversis ni-
gris, cauda ex atro spadicea, versus apicem nigra.
Zénik des Hottentots. *Sonner. it.* 2. p. 145. *t. 92.*
Habitat in terra Hottentotorum, muris amphibii magnitu-
dine.
Palmarum unguis praelongi, fere recti; plantarum breves,
uncinati; cauda gracilis; rostrum elongatum; dentes, ut
quidem numerat Sonnerat, in utraque maxilla primo-
res 2, canini 6.

- tetradac- 9. V. pedibus tetradaëtyle, naso producto mobili. *Schreber*
tyla. *Saeugth.* III. p. 434. *t. CXVII.* *Miller on various subjects.*
T. XX.
Suricate. Buffon hist. nat. XIII. p. 72. *t. 8.*

F 3

Habi-

Viverris corpus longum, aequalis crassitie, pedes breves, plerumque pentadaëtyli, unguis-
bus immobilibus, auriculae parvae, rostrum acutum, inter orum et genitalia ri-
ma, ducens ad folliculum ungino foetido in propriis glandulis secreto refertum.
Cursus celer; aliae calcaneis incedunt, aliae scandunt, aliae fodunt. Feminae
multiparae. An 2, 3 et 9 cum temnre flavo potius meli jungendae?

Habitat in Africa australi.

Longitudo pedalis, et una cum cauda sesquipedalis; vicitat carnibus, praecipue ovis et piscibus; pedibus anterioribus fodit; facile mansuetus, tunc mitissima.

Nasua. 2. *V. rufa*, cauda albo annulata, naso producto mobili. Schreber Saength. III. p. 436. t. CXVIII.

Ursus naso producto et mobili, cauda annulatim variegata. Briff. quadr. p. 190.

Vulpes minor, rostro superiori longiusculo, cauda annulatim ex nigro et rufa variegata. Quachy. Barr. Fr. équin. p. 167.

Coati. Marcgr. brasili. p. 228.

Coati mondi. Ael. Paris. T. III. P. 3. p. 17. t. 37. Raj. quadr. p. 180. Houttuyn zamenstel II. p. 238. t. 15. f. 2.

Coati noiratre. Buff. hist. nat. VIII. p. 358. t. 48.

Brasilian Weasel. Penn. quadr. p. 229. t. 22. f. 1.

Habitat in America australi, egregie fodit, quae siturus lumbrios; vicitat etiam muribus, pomis, pane; dum irascitur, pessime foetet.

Corpus magnitudine cati, statura lotoris; rufum, ut in vulpe, pilis in dorso rigidulis. Macula albida, supra, infra et pone oculum. Auriculae parvae, supra nigrae. Verruca supra palpebram superiorem, sub oculo, in bucca, sub gula. Gula flavescens. Nasus eductus in proboscidem nigrum, longissimum, undique mobilem, apice introrsum truncatam, absque lacuna subtus. Dentes primores superiores laterales majores; inferiores medii convergentes. Lingua fissuris lobata, ut folium quercur. Cauda erecta, corpore longior, fusca, annulis 10 pallidis, pilis patulis depresso, apice compressa. Pedes calcaneis incidentes tardo gressu, etiam scandentes. Digi singulis 5, pollice non remoto. Ungues acuti compressi.

Narica. 3. *V. subfuscata*, cauda concolore, naso producto mobili. Schreber Saength. III. p. 438. t. CXIX.

Ursus naso producto et mobili, cauda unicolor. Briff. quadr. 190.

Coati brun. Buff. hist. nat. VIII. t. 48.

Habitat in America australi, tam profunde fodens, ut totius animalis sola cauda promineat; cato et nasua paullo major. Edit lumbrios, panem, fructus, radices; aquam etiam intrat, et in arbores ascendit.

Vulpecu- 10. V. tota castanea, naso produc̄to. Schreber Saeugth. III.
la. p. 440. t. CXX.

Yzquiepatl seu vulpecula, quae maitzium torrefactum aemulatur colore. Hernandez mexic. p. 332. Raj. quadr. p. 181.

Coase. Buffon hist. nat. XIII. p. 288. 299. t. 38.

Stifling weesel. Penn. quadr. p. 230. n. 165.

Habitat in Virginia et nova Hispania, foetidissima vietitatem verminibus, scarabaeis, avibus. Longitudo 16 pollicum. Myctaces nigrae. Palmae tetradactylae.

Quasje. 11. V. castanea subtus flavescens, naso produc̄to, cauda annulata. Syst. nat. X. I. p. 44.

Meles ex saturate spadiceo nigricans, cauda fusca annulis flavicantibus quasi cincta. Briff. quadr. p. 185.

Ichneumon de yzquiepatl. Seb. mus. I. p. 68. t. 42. f. 2.

Tamandua mexicana, yzquiepatl seu vulpecula dicta. Seb. mus. I. p. 66. t. 40. f. 2?

Habitat Surinami; fodit, verminibus, insectis, fructibus vescentis, mansuescens, foetida.

Putorius. 4. V. nigricans lineis quinque dorsalibus parallelis albidis. Schreber Saeugth. III. p. 442. t. CXXII.

Mustela nigra, taeniis in dorso albis. Briff. quadr. p. 181.

Polcat. Catesb. carol. II. p. 62. t. 62.

Polcat, Skunk, Fiskatta. Kalm irin. II. p. 378.

Conepate. Buff. hist. nat. XIII. p. 288. t. 40.

Striated Weasel. Penn. quadr. p. 232. n. 166.

Habitat in America septentrionali, antra fodiens, die dormiens, noctu currens, lumbricis et insectis vietitans, carnium, avium, ovorum amans; a canibus dum urgetur, se contrahit; irritatus, instar plurimarum hujus generis specierum, halitum explodit, quo nihil foetidius; incessu tardus nec homines nec feras metuens; uestes foetore inquinatae purgantur sepeliendo per diem. A. Kuhn. Fodit et scandit, talis incedit, cati magnitudine.

Magnitudo martis. Color subtus ex albo et nigro variegatus. Pedes talis incidentes. Ungues 5 - 5: anteriores compressi longi; posteriores breviores, subtus excavati. Dentes primores superiores paralleli depresso aequales; inferiores 6 aequales compressi, quorum 2 interiores; molares 5; laniarii supra et infra utrinque approximati, infra tamen magis. Caput subglobosum, rostro produc̄to, naso nudo; mystacum triplici ordine; rictu brevi; colum brevissimum; palmae breviores unguibus longissimis;

plantarum unguis breviores; cauda horizontalis apice alba, pilis longissimis; penis osse cartilagineo.

Conepatl. 12. V. nigricans, lineis duabus albis dorsalibus per caudam productis.

Conepatl seu vulpecula puerilis. Hernand. mex. p. 232.
Habitat in nova Hispania.

Mephitis. 13. V. dorso albo, linea longitudinali alba. Schreb. Sacugth. III. p. 444. t. CXXI.

Chinche. Buffon hist. nat. XIII. p. 294. t. 39.
Skunk weasel. Penn. quadr. p. 233. n. 167.

Habitat in America a regno Chilensi ad Canadam usque, mansuets; foetore horrendo se defendens, ova venatur. Longitudo 16 pollicum. Pili longi splendidi. Cauda potissimum alba.

Zorilla. 14. V. albo nigroque variegata. Schreber Sacugth. III. p. 445. t. CXXII.

Zorilla. Buffon hist. nat. XIII. p. 289. t. 41.
Mapurito, Mafutiliqui. Gumilla Orenoq. III. p. 240.
Habitat in America australi.

Longitudo 14 pollicum. Cauda corpore brevior posicte alba. Rostrum breve et obtusum. Pili longi.

Mapurito. 15. V. nigra, fascia nivea a fronte ad dorfi medium producta, auriculis nullis.

Viverra Putorius. Mutis act. Holmiens. 1769. p. 68.

Habitat in nova Hispania circa metalla Pamplonae, interdiu dormiens, noctu vagans, cursu veloci; vittat verminibus et insectis, profunda antra fodit.

Longitudo corporis 20, caudae apice albicantis 9 pollicum. Pedes pentadactyli, talis incidentes, unguibus longis. Caput parvum. Rostrum elongatum. Lingua laevis.

vittata. 16. V. nigricans, vitta alba ab humeris ad frontem producta. Schreber Sacugth. III. p. 447. t. CXXIV.

Grison. Buffon hist. nat. ed. Allam. XV. p. 65. t. 8.
Chinche. Feuillé voy. I. 272?

Yaguane; Maikel. Falkner Patagon. p. 158. 159?

Habitat Surinami, forsan in omni America australi.

Pedes pentadactyli. Cauda corpore brevior, pilis etiam brevioribus. Auriculae breves.

- Zeylani- 17. V. supra cinerea, fusco mista, infra albida. Schreb. Saeug-
ca. thiere, III. p. 451.
Martes philippensis. Camell. act. angl. XXV. p. 2204?
Habitat in Zeylona, forsan quoque in insulis Philippinis.
Magnitudine et habitu ad martes accedit. Pedes pentadactyli, unguibus paulisper retractilibus. Cauda longitudine corporis, basi paulo crassiore. Mysticæ albae, ordine 5 plici, labium inferius dentatum. Dentes primores superiores laterales longiores conici, medii obtusi. Lingua verrucosa.
- capensis. 18. V. nigra, dorso griseo albo-marginato. Erxl. syst. mamm. p. 493. Schreb. Saeugth. III. p. 450. t. CXXV.
Mustela subfuscæ, linea longitudinali alba per utrumque latum ducta. Brown. jamaic. p. 486. n. 1?
Stinkbinksen. Kolbe Vorgeb. I. 167.
Blaireau puant. La Caille voyag. p. 182.
Fizzler. Penn. quadr. p. 234. n. 269.
Habitat in capite bonae spei et Guinea, melle sylvestri pasturatur, foctore contra hostes se defendens.
Longitudo bipedalis, caudæ octo pollicum. Auriculae nulæ. Pili longi et asperi. Annon guloni adjungenda?
- Civetta. 19. V. cauda superius maculata, versus apicem fuscæ, juba castanea, dorso cinereo fuscoque maculata. Schreber Saeugth. III. p. 418. t. CXI.
Meles fasciis et maculis albis nigris et rufescens variegata. Briss. quadr. p. 186.
La civette, qu'on nommoit anciennement hyaena. Belon observ. 208. fig. p. 209.
Civetta. Clus. cur. post. p. 57.
Felis zibethi. Gesn. quadr. p. 836. Aldrov. dig. p. 342.
Olear. gottorf. Kunstkam. p. 7. t. 6. f. 3.
Civette. Buffon hist. nat. IX. p. 299. t. 34.
Habitat in Aethiopia, Guinea, Congo, Capite bonae spei. Corporis habitu catum refert, capitis forma propius ad mungo accedit: Sub oculis macula, in dorso numerosæ rotundatae et angulatae maculae castaneæ, quae versus crura in strias abeunt. Pedes ex atro fuscis. Dentes molares in utraque maxilla utriusque sex.
- Zibetha. 5. V. cauda annulata, dorso cinereo nigroque undatum striato. Schreber Saeugth. III. p. 420. t. CXII.
Felis zibethi. Gesn. quadr. p. 837.

Animal zibethi vel hyaena veterum Bellonii. *Aldrov. dig.*
p. 343. *Raj. quadr. p. 178.*

Animal du mufc. *A&L. Parif. 1731. p. 443.*

Zibet. *Buff. hist. nat. IX. p. 299. t. 31.*

Habitat in Arabia, Malabaria, Siam, et insulis Philippinis; fera, indomita, mansueta quidem, sed facile in priorem ferociam revertens; irata pilos dorſi erigit; morsu se defendit; vescitur animalibus minoribus, avibus, pisces, radicibus adeo et fructibus; facile et scandit et currit.

Corpus gracile et oblongum, magis quam quidem civettæ; rostrum quoque longius et tenuius, supra paulisper emarginatum. Dentes primores superiores sex paralleli; intermedii paulo minores; inferiores paralleli: medii paulo breviores; alternis interioribus. Laniarii solitarii, utrinque distantes. Molares acuti, denticulati, inferiores utrinque 5, superiores 6. Auriculae rectæ, breviores quam civettæ. Corporis pili cinereo nigroque undati, rigidusculi, appressi. Pedes fuscæ, subtus nigri. Cauda longior quam civettæ. Longitudo corporis 2½ pedum. Folliculus zibethi inter anum et genitalia in utroque sexu 1, propria apertura folliculi, distincta ab ano et vulva, prominens, ambrosiaca.

Anatome. *Bartholin. cent. 4. n. 1. et cent. 5. n. 49.*

Castellus P. Hyaena odorifera. Francof. 1698. 8.

herma-phrodita. 20. V. cauda elongata apice atra, striis tribus dorsalibus nigris. *Schreber Sacugth. III. p. 426. n. 6.*

Habitat in Barbaria.

Magnitudo inter civettam et genettam media. Rostrum ab apice ad et ultra oculos, gula, mystaces, pedes nigri. Infra oculos et inter mystaces macula alba. Pili longi, ad cutem cinerei, apice nigri. Cauda corpore longior. Ungues lutei. Inter penem et anum regio calva, cute tenera plica dupli. Pallas.

Genetta. 6. V. cauda annulata corpore fulvo-nigricante maculato. *Schreber Sacugth. III. p. 423. t. CXIII.*

Mustela cauda ex annulis alternatim albidis et nigris variegata. Briss. quadr. p. 186.

Genette. Belon obs. p. 73. Gesn. quadr. p. 549.

Genette. Buffon hist. nat. IX. p. 343. t. 36.

Genithkaze, Chat d'Espagne. Ridinger illuminirte Thiere. t. Q.D.S. XXVIII.

Habi-

Habitat circa Constantinopolin, in Asia occidentali et Hispania, mitis et facile mansuecens, ut felis, venatur mures, olet moschum, odore tamen debiliore et fugace.

Ad Zibetham prope accedit, rostrum tamen magis acutum, pedes breviores, cauda longior. Longitudo corporis sine cauda 5 pollicum ultra pedem, cum cauda 2½ pedum. Dentes molares utrinque 6. Pili cinerei, apice spadicei aut nigri.

- Fossa. 21. V. cauda annulata, corpore cinereo nigro maculato. Erxl. syst. mamm. p. 498. Schreber Saengthiere, III. p. 424. t. CXIV.

Fossane. Buffon hist. nat. XIII. p. 163. t. XX. Penn. quadr. p. 237. n. 272. t. 22. f. 2.

Habitat in Madagascar, forsan quoque in continente Africae. Magnitudine et forma ad genetam accedit; neque tamen zibethum olens. Ne folliculus quidem haec tenus inventus.

- tigrina. 22. V. cauda annulata apice fusca, corpore cinereo fusco-maculato, stria a capite ad caudam producta nigra. Schreber Saengthiere, III. p. 425. t. CXV.

Chat-bizaam. Vosmaer descr. d'une espece singul. de chat africain. Amst. 1771.

Habitat in capite bonaे spei.

Magnitudo cati domestici; satis mitis; carnis praesertim avium amans; Zibethum non olet; an a fossa vere distinguita?

- caudivola. 23. V. flava nigro-mixta, cauda unicolor prehensili. Schreber Saengthiere, III. p. 453. t. CXXV. B. et I. p. 145. t. XLII.

Yellow manauaco. Penn. quadr. p. 138. n. 108. t. 16. f. 2.

Habitat in Jamaica, mansuetus et lepidus scandit arbores.

Corpus longitudine 19 circiter pollicum. Cauda vix brevior, apice prehensilis, castanea atro-mixta. Pedes breves et crassi.

- mellivo- 24. V. dorso cinereo, fascia laterali nigra, abdomine nigro, ra. unguibus longis subtus cavis, fossoriis. Blumenbach Naturg. p. 97.

Ratel. Sparrmann aet. Stockb. 1777. t. IV. f. 3.

Habitat ad caput bonaе spei, viettans melle ceraque opium sylvestrium in caveis hystricis, dipodis, cuniculi, canis aurei etc. nidulantium, quos volantes observat, aut culo

- cule indicatore duce quaerit. Vellus villosum, cute robusta, laxe corpus ambiente.*
- fasciata. 25. *V. caudae pilis longis nigris et rufescentibus, corpore griseo fasciis 6 nigris longitudinalibus vario, subtus albo. Chat sauvage à bandes noires des Indes. Sonner. it. 2. p. 193. t. 90.*
Habitat in India, 2 pedes et 9 pollices longa.
Dentes primores in utraque maxilla 2, canini 14 (sec. Sonnerat) pedes pentadactyli, unguibus fortibus uncinatis; oculi vividi.
- malaccen- 26. *V. cauda nigro annulata elongata, corpore griseo supra nigro-guttato, maculis quatuor rotundis supra oculos, fasciis colli dorsique tribus nigris.*
Civette de Malaceea. Sonner. it. 2. p. 144. t. 91.
Habitat in Malacca, cati magnitudine et moribus, ferox, praedans, agilissima, ab arbore in arborem salit, odorem moschi spargens, liquorem ejus acumulum continens, cuius virtutem aphrodisiacam et ventriculum roborantem praedita Malaii.
Corpus margaritaceum, serie gutterum nigrarum 6, septuplii in dorso; caput supra, pedes et femora nigra; auriculae exiguae, rotundae; oculi nigricantes parvi; pedes pentadactyli, unguibus acutis, uncinatis, retractilibus; an ideo felis? Rostrum elongatum, corpus productum vetat.

15. MUSTELA. *Dentes primores superiores VI erecti acutiores distincti. inferiores VI obtusiores conferti: duo interiores.*

Lingua laevis.

* *plantis palmatis, Lutrae.*

- Lutris. 1. *M. plantis palmatis pilosis, cauda corpore quadruplo breviore.*
Lutra marina plantis pilosis, cauda pilosis, cauda corpore quadruplo breviore. Erxl. mamm. p. 445. Schreber Saeugth. III. p. 465. t. CXXVIII.
Lutra marina. Steller nov. comment. Petrop. Tom. II. p. 367. t. 26.

β. L.

brasiliensis. β . L. atri coloris, macula sub gutture flava. *Briff. quadr. fis.* p. 202.

Lutra brasiliensis. *Raj. quadr. p. 189.* *Klein quadr. p. 91.*
Lutra nigricans, cauda depressa et plana. *Barrer. Fr. équin. p. 155.*

Jiya, quae et carigueibeiu a Brasiliensibus. *Marcgr. brasil. p. 234.* *Fonst. quadr. t. 66.*

Saricovienne. *Buffon hist. nat. XIII. p. 319.*

Habitat in oceano Asiam et Americam inter medio, β in fluviis Americae meridionalis.

Caput depresso. Auriculæ minimæ, villosæ, subrotundæ.

Os obtusissimum. Myctaces copiosæ, rigidulæ: supra supercilia; pone oculos; pone sinum oris; ad latera labii inferioris; sub gula. Dentes primores superiores 6 aequales; inferiores 6: duobus alternis interioribus et duobus bilobis lateralibus. Pedes 5-5, palmati omnes. Cauda depresso, corpore paulo brevior. An hujus varietas, an propria species mustela felina, ad littus Chilense obvia, plantis palmatis pilosis, cauda tereti elongata conspicua?

Molina hist. nat. Chil. L. IV. p. 252.

Lutra. 2. *M. plantis palmatis nudis, cauda corpore dimidio breviore.*
Fn. suec. p. 12. *S. G. Gmelin it. III. p. 285. 373.*

Lutra plantis nudis, cauda corpore dimidio breviore. *Erxleb. mamm. p. 448. n. 2.* *Schreber Saeugth. III. p. 457. t. CXXVI. A. B.*

Lutra digitis aequalibus. *Faun. suec. I. n. 10.*

Lutra. *Gesn. quadr. p. 775. fig. p. 776.* *Gesn. aquat. p. 608.*
Aldrov. digit. p. 292. f. 295. *Fonst. quadr. p. 150. t. 68.*
Raj. quadr. p. 187.

Loutre. *Buffon hist. nat. VII. p. 134. t. II.* *XIII. p. 323. t. 45.*

Otter. *Penn. quadr. p. 238. n. 173.*

Fischotter. *Ridinger wilde Thier. t. 28.*

Habi-

Multis quidem notis convenientur lutrae cum mustelis, corpore elongato, aequalis crassitiei, pedibus brevibus, pilis nitentibus, ungnibus immobilibus; in antris degunt, noctu praesertim vagantur et praedantur; ast lutrae in aquis perpetuo degunt, supra et infra aquam natant, pisibus praesertim videntur; non scandunt, aut incurvato corpore, et protensa cauda saliunt, uti mustelae; caput ipsis est crassius et majus, lingua mollibus aculeis instruta; litoris in utraque maxilla molares dentes utrinque 5, mustelis $\frac{4}{3}$ ant $\frac{5}{3}$; an ideo removendae a mustelis proprium genus constituant lutrae?

Habitat in Europae, septentrionalis Americae et ad Persiam usque Asiae aquis dulcibus, flaviis, stagnis, piscinis, non in mari. Vicinitat piscibus, ranis, canceris; piscinas devastat. Nidus sub terra, supra aquae superficiem, aditu sub aqua; coit februario; advocat feminam sono lento susurrando; parit Mayo pullos 3-4. Aestutum et morax animal, ut tamen cicurari possit.

Anatomie. E. N. C. d. I. a. 3. obs. 195. et dec. 2. a. 10. obs. 112. et cent. 10. app. 468.

Lutreola. 3. M. plantis palmatis hirsutis, digitis aequalibus, ore albo.
Fn. suec. 12. Lepechin it. I. p. 176. t. 12.

Lutra minor, plantis hirsutis, digitis aequalibus, ore albo. Erxleb. mamm. p. 451. n. 3. Schreb. Saeugth. III. p. 462. t. CXXVII.

Viverra fusca ore albo. Leche act. Holm. 1759. P. XXI. p. 292. t. II.

Viverra Lutreola. Pallas spicil. zool. XIV. p. 46. t. III. f. 1.

Noerza. Agric. de anim. subterr. p. 39.

Lesser otter. Penn. quadr. p. 239. n. 174. t. 21. f. 2.

Habitat in Germaniae (parcius), Poloniae, Finländiae, Russiae, Sibiriae aquosis, vicinitans piscibus, ranis. Pedem longitudine vix excedit. Cum spec. I. viverris ad jungi vult Pallas.

Vison. 5. M. plantis palmatis, corpore saturate castaneo unicolo. Schreber Saeugth. III. p. 463. t. CXXVII. E.

Mustela pilis coloris saturate castanei in toto corpore vestita. Briss. quadr. p. 178. n. 6.

Viton. Buffon hist. nat. XIII. p. 304. t. 43.

Minx. Lawson Carol. p. 121.

Mink. Kalm. it. III. p. 22.

Habitat in America septentrionali ad aquas; piscibus, avibus, muribus vescitur, aliquando pagos frequentans.

* * pedibus fissis, Mustelae.

barbara. 4. M. pedibus fissis, atra, collo subtus macula alba triloba.

Mustela maxima atra moschum redolens, Tayra. Barrere Fr. équin. p. 155.

Guinea weesel. Penn. quadr. p. 225. n. 161.

Habitat in Guiana et Brasilia.

Corpus statura martis, nigrum pilis rigidioribus. Auriculae rotundae villosae. Area cinerascens ante oculos. Macula sub medio collo, non sub gula, albida. Mamuae 4 pone umbilicum.

An hoc spectat Cuja Chilensis, cauda mediocri, pilis molibus, labio superiore subtruncato conspicua? Molina hist. nat. Ch. p. 258.

- Galera. 12. M. tota fusca, pedibus fissis. Erxl. mamm. p. 453.
Galera subfuscata, cauda elongata, oculis nigris, auribus subnudis appressis, the Guinea fox. Brown. jamaic. p. 485. t. 29. f. 1.
Vansire. Buffon hist. nat. XIII. p. 167. t. 21.
Tayra ou Galera. Buffon hist. nat. XV. p. 155.
Madagascar weefel. Penn. quadr. p. 224. n. 158.
Guinea weefel. Penn. quadr. p. 225. n. 160.
Habitat in Guinea et Madagascar.
- Canaden. 13. M. pedibus fissis, corpore fulvo nigricante, pectore maculatis. Erxl. mamm. p. 455. Schreber Saeugth. III. p. 492. t. CXXXIV.
Pekan. Buffon hist. nat. XIII. p. 304. t. 42.
Habitat in Canada, absque cauda bipedalis.
- Foina. 14. M. pedibus fissis, corpore fulvo nigricante, gula alba. Erxl. mamm. p. 458. Schreber Saeugth. III. p. 472. t. CXXIX.
Mustela pilis in exortu albidis castaneo colore terminatis vestita, gutture albo. Briss. quadr. p. 178.
Martes domestica. Gesner. quadr. p. 765. Aldrov. dig. p. 332. Jonst. quadr. p. 156.
Martes, aliis Foyna. Raj. quadr. p. 200.
Fouine. Buffon hist. nat. VII. p. 161. t. 18.
Martin. Penn. quadr. p. 215. n. 154.
Marder. Ridinger kleine Thiere, t. 85.
Habitat in Anglia, Germania, Gallia et Europa australiore.
Noctu vagatur, quadrupedibus minoribus, ranis, avibus vietitat, gallinarum et ovorum praecipue amans, fructus etiam horaeos vorat, cati infensissimus hostis; mansuescit, si junior captus fuerit; femina 3-4, adulta ad 7 pullos parit.
- Martes. 6. M. pedibus fissis corpore fulvo nigricante, gula flava. Erxl. mamm. p. 455. Schreber Saeugth. III. p. 475. t. CXXX.
Mustela pilis in exortu e cinereo albidis castaneo colore terminatis vestita, gutture flavo. Briss. quadr. p. 179.
Martes silvestris. Gesner quadr. p. 766.
Martes abietum. Raj. quadr. p. 200.
Martes. Aldrov. dig. p. 331.

Marte.

Marte. *Buffon hist. nat.* VII. p. 186. t. 22.

Pine Martin. *Penn. quadr.* p. 216. n. 155.

Marder. *Ridinger wild. Thier.* t. 30.

Habitat in Americae, Asiae et Europae septentrionalis, rarius in Angliae, Galliae, Germaniae, Hungariae incolitis; noctu vagatur, interdiu in cavis arboribus, nidis sciurorum etc. degens; bis praesertim, muribus, aviculis, baccis, fructibus etiam horaeis et melle vittat, hieme etiam columbas et gallinas venatur; coit februario, per 9 menses gravida 7-8 pullos parit. Capite breviore, et pedibus paulo longioribus a Foina distincta.

Zibellina. 9. M. pedibus fissis, corpore obscure fulvo, fronte exalbida, gutture cinereo. *Schreb. Sacugth.* III. p. 478. t. CXXXVI. *Pallas spicil. zool.* XIV. p. 54. t. III. f. 2.

Mustela obscure fulva, gutture cinereo. *Briß. quadr.* p. 180.

Mustela sobella. *Gesn. quadr.* p. 768.

Mustela Zibellina. *Aldr. dig.* p. 335. *Fonst. quadr.* p. 156. *J. G. Gmelin nov. comm. Petrop.* T. V. p. 338. t. 6.

Zibeline. *Buffon hist. nat.* XIII. p. 309.

Sable et Fisher Weasel. *Penn. quadr.* p. 217. et 223. n. 156.

157.

Habitat in Asia et America septentrionali, olim quoque in Lapponia, in Asia ad 58°um, in America ad 40°um latitudinis gradum, catis infesta; mustelis, sciurus, leporibus hieme avibus praecipue tetraonibus, autumno baccis vittat; noctu praedatur, interdiu dormiens; coit Januario; sub finem Martii parit femina 3-5 pullos.

Proxime ad Martem accedit, a quo tamen capite magis porrecto, auriculis longioribus, margine flavescente cinctis, pilis longioribus et splendidissimis, pedibus magis hirsutis, et cauda praesertim, quae brevior est pedibus posticis extensis, differt.

Varietas alba rarissima, vix frequentior ea, quae macula collari albida aut flava insignitur.

Putorius. 7. M. pedibus fissis, corpore flavo nigricante, ore auriculisque albis. *Schreber Saength.* III. p. 485. t. CXXXI. *Fann. suec.* 16.

Mustela pilis in exortu ex cinereo albidis colore nigricante terminatis vestita, oris circumferentia alba. *Briß. quadr.* p. 186.

Mustela flavescente-nigricans, ore albo, collari flavo. *Syst. nat.* VI. p. 5. n. 3.

Puto-

Putorius. *Gesn. quadr.* p. 767. *Aldr. dig.* p. 329. *fig. p. 330.*

Jonst. quadr. p. 154. t. 64. *Raj. quadr.* p. 199.

Putois. *Buffon hist. nat.* VII. p. 199. t. 23.

Polecat. *Penn. quadr.* 213. n. 152.

Iltinis. *Ridinger wild.* Th. t. 20.

Habitat inter Europae, etiam aliquando Russiae asiaticae rupes, lapidum acervos, rudera, in stabulis, horreis, domibus, arboribus cavis; interdiu dormit, noctu prae-datur cuniculos, mures, talpas, gallinas, alias aves, hieme ranas et pisces; ova rapit; alvearia devastat; ano, ut 7, 9, 14, halitu foetidissimo.

Capite crassiore, rostro acutiore, cauda breviore, pilorum potissimum colore a marte differt; in desertis Russiae asia-ticae nonnunquam alba. Mas plerumque subflavus ore albido. Femina albido-subflava.

Furo. 8. M. pedibus fissis, oculis rubicundis.

Mustela corpore pallide flavo. Erxl. mamm. p. 465. Schreb. Sacugth. III. p. 488. t. CXXXIII.

Mustela viverra mas, pilis subflavis, longioribus castaneo terminatis vestita, et Mustela viverra femina, pilis ex albi-do subflavis vestita. Briss. quadr. p. 177.

Mustela silvestris. Aldr. dig. fig. p. 327. Jonst. quadr. p. 154.

Mustela silvestris, viverra dicta. Raj. quadr. p. 198.

Furo. *Gesn. quadr.* p. 762.

Furet et Furet putois. *Buffon hist. nat.* VII. p. 209. t. 26. 25.

Ferret. *Penn. quadr.* p. 214. n. 153.

Habitat in Africa, domestica et venatui adaptata in tem-pe-ratiore Europa; bis coit per annum, per sex hebdomadas gravaida, 5-8 rarius 9 pullos parit.

Putorio minor, a quo etiam capite angustiore, rostro acutio-re, truncu magis elongato et gracili, colore differt.

farmatica. 15. M. pedibus fissis, corpore supra ex luteo et fusco vario.

Pallas it. I. 453. et spic. zool. XIV. p. 79. t. IV. f. 1. Erxleb. mamm. p. 460. Schreber Sacugth. III. p. 490. t. CXXXII.

Mustela peregrina, pedibus fissis, capite et corpore subtus aterrimis, corpore supra brunneo luteoque vario, ore fascia frontali auriculisque albis. Guldentstaedt nov. comm.

Petrop. XIV. p. 441-445. t. 10.

Mustela praecincta et Perewiaska. Rzaczynski hist. nat. Pol. p. 328. et 222.

Vormela (germanice Wormlein). Gesn. quadr. p. 768.

Habitat in Polonia, praesertim Volhynia, et desertis inter Wolgam et Tanaim sitis; voracissima muribus, dipodibus, avibus, vescitur; femina 8 mammis gaudet, vere coit, et per 8 hebdomadas gravida 4-8 pullos parit.

Ad putorium accedit, a quo tamen capite angustiore, corpore magis elongato, cauda longiore, et pilis, si pedes caudamque excipias, brevioribus, distat.

fibirica. 16. M. fulva, palmis plantisque hirsutissimis fissis. *Pallas it. II. 701. et spic. zool. XIV. p. 89. t. IV. f. 2. Erxleb. mamm. p. 471.*

Habitat in Sibiriae silvosis, vorax, carnes etiam et butyrum ex rusticorum culinis praedatur.

Magnitudine ad sarmaticam, moribus ad zibellinam, habitu ad ermineam proprius accedit, ab hac tamen cauda et pedibus longioribus discrepat. Cauda villosa, corpore dimidio brevior. Pili longiores et tenuiores, quam putorio et furoni.

erminea. 10. M. pedibus fissis, caudae apice atro. *Fn. suec. 17. Houttuyn nat. III. p. 206. t. 14. f. 5.*

Mustela hieme alba, aestate supra rutila infra alba, caudae apice nigro. *Briß. quadr. p. 176.*

aestiva. ♂. Mustela caudae apice atro. *Schreber Saugth. III. p. 496. t. CXXXVII. A.*

Rosalet. *Buffon hist. nat. VII. p. 240. t. 31. f. 1.*

Stoat. *Penn. quadr. p. 212. n. 151.*

Wiesel. *Ridinger jagdb. Tb. t. 19.*

hyberna. ♂. Mustela candida in extrema cauda nigricans. *Aldrov. dig. p. 310. Schreber Saugth. III. p. 496. t. CXXXVII. B.*

Mustela candida s. animal ermineum recentiorum. *Raj. quadr. p. 198.*

Hermine. *Buff. hist. nat. VII. p. 240. t. 29. f. 2.*

Hermelin. *S. G. Gmelin it. II. p. 192. t. 23.*

Habitat in Europa et frigidiore America atque Asia ad borealem Persiam et Sinam usque in domibus, lapidum acervis, fluviorum ripis, cavis arboribus, silvis, praesertim betulatis; sciuris et lemmis vietitat, vietu ceterum et moribus

An ad hanc speciem spectat Mustela javanica, Seb. mus. I. p. 77. t. 48. f. 4. utrum ad hanc, an ad vulgarem Boccamale Sardorum, Cetti hist. nat. Sardin. I. t. 5. caudae apice atro, trunco longiore ad ermineam accedens, hominem sequitur, vegetabilibus et carne recenti vescitur, mel amat, vineas infestat.

ribus ad vulgarem, facie et habitu ad martem accedit; ab hoc tamen trunco breviore, nunquam 10 pollices aequante, cauda longiore 4 pollicum, pilis brevioribus et minus splendentibus distat. Corpus in borealibus regionibus hyeme album, excepta cauda, quae dimidia extorrisum nigra. Pellis pretiosa, et olim magni aestimata.

vulgaris. II. M. pedibus fissis, corpore ex rufi fusco, subtus albo, cauda concolore. Erxl. mamm. p. 471. Schreber Saeugth. III. p. 498. t. CXXXVIII.

aestiva. α. Mustela supra rutila, infra alba. Briff. quadr. p. 175.
Mustela vulgaris. Aldr. dig. p. 307. Jonst. quadr. p. 152.
t. 64. Raj. quadr. p. 195.
Mustela. Gesu. quadr. p. 752.
Belette. Buffon hist. nat. VII. p. 225. t. 29. f. 1.
Common Weasel. Penn. quadr. p. 211. n. 150.
Wiesel. Ridinger wilde Thier. t. 30.

nivalis. β. Mustela corpore albo, caudae apice vix pilis ullis nigris.
Syst. nat. XII. p. 69. n. 11.
Mustela cauda truncato-abbreviata corpori concolore. Hellenius aet. Stockh. 1785. trim. 3. n. 9. t. 1.
Habitat in temperatiore et frigida Europa et Asia ad borealem Persiam usque, in septentrionalibus v. g. Westrobothnia, Russia etc. hyeme albescens; erminea dimidio minor, ut vix longitudinem 7 pollicum assequatur; edit pisces, carnes, mures, ova, fungos, non alia vegetabilia; avarissima, foetida, immunda, siticulosa, noctu praedatur, muribus pessima, quos totos relictis solis dentibus consumit, eorum foramina intrat; a fele non facile occiditur; recurrens accurrensque continuo prospicit; terrefacta epilepsia convelli fertur; cicurata lepida; vere 6-8 pluresve pullos parit.

Quiqui. I7. M. pedibus fissis, corpore fusco, rostro cuneiformi. Molina hist. nat. Chil. L. IV. p. 258.

Habitat in regno Chilensi infra terram, muribus viettans, ferox.

16. URSUS. *Dentes primores superiores VI, intus excavati alterni.*

inferiores VI: laterales 2 longiores lobati; secundarii basi interiores.

laniarii solitarii.

molares V--VI: primo laniariis approximato.

Lingua laevis.

Membrana nictitans.

Nasus prominens.

Penis scatens osse curvato.

Arctos. I. U. fuscus nigricans, cauda abrupta. Erxl. mamm. p. 156.

Ursus niger, cauda unicolo. Briss. quadr. 184.

Ursus. Gesn. quadr. 14. Aldrov. dig. 117. Jonst. quadr.

p. 123. t. 55. Raj. quadr. p. 171. Klein quadr. p. 82.

Black bear. Penn. quadr. p. 190. n. 138.

Baer. Ridinger wilde Thier. t. 32.

niger. α. corpore nigro minore. Schreb. Saeugth. III. p. 502. t. CXL.

fuscus. β. corpore fuscō vel ferrugineo. Schreber Saeugth. III. p. 502. t. CXXXIX.

Ours brun des alpes. Buffon hist. nat. VIII. p. 248. t. 31.

albus. γ. corpore nigro pilis albis admixtis.

Ours blanc terrestre. Buffon hist. nat. VIII. p. 248. t. 32.

variegatus. δ. corpore versicolore.

Habitat γ et δ in Islandia, α in uliginosis silvaticis frigidis Europae et Asiae septentrionalis, β etiam in alpibus pyrenaicis, fabaudicis, helveticis, carpathicis, caucasicis, in Polonia, Graecia, Palaestina, Aegypto, Barbaria, Zeylona, India, Japonia, Sina, Persia; vicitat α) radicibus, baccis, aliisque vegetabilibus; β) quoque insectis e. g. formicis, alvearibus apum, cadaveribus et laniana pecorum, cervorum, equorumque; praedam mox inflat, relietam in paludibus defodit; escam lubenter lavat; manus cubans continuo lambit; β fine Junii coit et initio Januarii parit unum plerumque pullum; coit α. fine Octobris, uterum gerit 112 diebus; hybernat abstemius a medio Novembri

vembri in initium regelationis; obambulat plerumque, segnis nisi laceatur, tum agilissime creatus ambabus pugnat; sine injuria hominem non adoritur; ante pugnam pullos adscendere arbores cogit; descendit praeeunte cauda, quam valde metuit; pediculis caret; cantum fugere prohibetur. Pedibus posterioribus insistit; natat. Hispidus membrana nictitante torvus. Pollex reliquis digitis angustior. Mammae 4. Cranium, non cerebrum, leonis minus. Tendines praestantissimi pro filis Lapponum. Caro esitata. Fel amarissimum epilepticis commendatum; pinguedo in cosmetica recepta.

- mariti- 5. U. albus, cauda abrupta, capite colloque elongatis. Erxl.
mus. syst. mamm. p. 160. Schreber Saegthiere, III. p. 513.
t. CXLI.
- Ursus marinus. Pallas it. III. p. 691, et spicil. zoolog. XIV.
p. I-24. t. I.
- Ursus albus, cauda unicolor. Briff. quadr. 188.
- Ursus maritimus albus major arcticus. Martens Spitzb. 73.
t. O. f. C.
- Ursus albus. Jonst. quadr. p. 126. Mus. Worm. p. 319.
Klein quadr. p. 82.
- Ours blanc. Buff. hist. nat. suppl. III. p. 200. t. 34.
- Polar bear. Penn. quadr. p. 192. n. 139. t. 20. f. 1.
- Weisse Baer. Ridinger Baeren, t. 3.
- Habitat intra polum arcticum, frequens in glacie ipsoque mari; caloris impatientissimus, piscibus, phocis, balaenis, rarius, nec nisi famelicus armentis vicitat; Femina per 6-7 menses gravida Martio plerumque binos parit catulos. Mores et usus iidem, qui arcto. Caput majus, quam huic, cranium magis convexum, rostrum crassius.

- america- 6. U. niger, gula genisque ferrugineis. Pallas spicil. zool. XIV.
nus. p. 6. 26.
- Habitat, terra Chilensi et Patagonia excepta, in omni America; vegetabilibus et piscibus praecepsim vicitat. Caro esitata.
- Caput magis elongatum. Auriculae longiores; pili fortiores, molles, recti, longiores, aterrini, tenuiores, magis splendentes.

G 3

2. U.

Animalia sub hoc genere militantia, pedibus pentadactylis, police non remoto talis incedunt, scandunt, palmis quedam manuum instar utuntur.

Meles. 2. U. cauda concolor, corpore supra cinereo, subtus nigro, fascia longitudinali per oculos auresque nigra. Fn. suec. 20. Schreber Saeugth. III. p. 516. t. CXLII.

Meles unguibus anticis longissimis. Syst. nat. VI. p. 6.

Meles pilis ex fordide albo et nigro variegatis vestita, capite taeniis alternatim albis et nigris variegata. Briff. quadr. 183.

Meles. Gesn. quadr. 687. fig. p. 686.

Taxus. Aldr. dig. p. 263. fig. p. 267. Jonst. quadr. p. 146. t. 63. Raj. quadr. 185. Klein quadr. 73.

Blaireau. Buff. hist. nat. VII. p. 104. t. 7. 8.

Common badger. Penn. quadr. p. 201. n. 142.

Tachs. Ridinger jagdb. Thier. t. 17.

alba. β. supra alba, infra ex albo flavicans. Briffon quadr. 185.

maculata. γ. alba maculis ex flavo rubicundis et fuscis. Ridinger allerl. Thier. t. 24.

Habitat in Europa et boreali Asia ad Persiam borealem et Sianam usque, in ipsa quoque Japonia; β) in provincia Americae Noveboracensi; γ) rarissimus, inter rimas rupium et lapidum in silvis, monogamus coit Novembri aut Decembris initio, post novem septimanas femina pariente catus 3-5; vicitat insectis, ovis, foliis fecalis, lathyrique, aliis cum vegetabilibus, quibus corrasis hybernat, admodum pinguiscit; noctu venatur cuniculos, antra fodit inhabitatque; sterlus in distincto et determinato loco deponunt inhabitantes extra antrum singuli; die latet; folliculum putorium supra anum baurit hybernans. Cucrari potest.

Membrana nictitans alba totum oculum tegens. Mammæ 6, 2 pectorales, 4 abdominales. Pedes breves pentadactyli. Longitudo plusquam bipedalis, β) 21 modo pollicum.

Anatome. E. N. C. d. 2. a. 5. obs. 32. et d. 3. a. 3. obs. 163.

labradorius. 7. U. cauda apice villosa ex luteo subfusca, gula, pectore et abdомine albis, palmis tetradactylis. Schreber Saeugth. III. p. 520. t. CXLII. B.

American badger. Penn. quadr. p. 202. n. 143.

Carcajou. Buffon hist. nat. suppl. III. p. 242. t. 49.

Habitat in terra Labrador et ad sinum Hudsonis, mele paule minor, pilis mollioribus longioribus. Auriculae breves albae, nigro marginatae. Caput album, taeniis duabus nigris pone nasum per oculos productis. Pili dorsti initio castanei, tum ex luteo fusi, postea nigri, apice albi. Pedes fusi.

3. U.

- Lotor. 3. U. cauda annulata, fascia per oculos transversali nigra.
Schreber Saegth. III. p. 521. t. CXLIII.
- Ursus cauda elongata. Aet. Stockb. 1747. t. 9. f. 1. Houttuyn nat. 2. p. 237. t. 15. f. 1.
- Ursus cauda annulatum variegata. Briss. quadr. p. 189.
- Mapach. Fernand. anim. n. II. p. 1. Nieremb. hist. nat. p. 175. Jonst. quadrup. t. 74.
- Vulpi affinis americana, Coati Brasiliensibus. Raj. quadr. 179. Catesb. carol. app. p. 29.
- Raccoon. Kalm it. 2. p. 228. 327. et 3. p. 24. Laws carol. 121. Penn. quadr. p. 199. n. 141.
- Coati. Worm mus. 319. Major mosb. 30. Raj. quadrup. 179.
- Wilde zibethartige Kaze. Müller delic. nat. sel. 2. p. 99. t. K. I. f. 2.
- Habitat in Americae praesertim borealis, etiam insularum utrinque Americae oppositarum maritimis, ut plurimum in cavis arboribus, Mayo 2-3 pullos pariens. Edit lubenter ova, gallinas, conchas; cibum lavat, manibus ori admoveat; odoratu tactuque excellit; mentis tenacissimus; dormit a 12 noctis ad 12 diei; pelitur setis porcinis. Lubenter scandit.
- Corpus cinereum, pilis erectis, ferrugineis apice nigris, unde inspectus umbra nigra cingitur. Caput fuscum, fronte alba; fascia nigra trans oculos in medio interrupta linea nigra perpendiculari interjecta. Cauda pilis nigris annulata. Penis osse incurvato scaret.

- Iuscus. 4. U. cauda elongata, corpore ferrugineo, rostro fusco, fronte plagaque laterali corporis.
- Ursus castanei coloris, cauda unicolor, rostro pedibusque nigris. Briffon quadr. p. 188.
- Quickhatch or Wolverene. Edw. av. 2. p. 103. t. 103. Ellis budson. I. p. 40. t. 4.
- Wolverene. Penn. quadr. p. 195. n. 140. t. 20. f. 2.
- Habitat ad sinum Hudsonis; magnitudine ad lupum, capite ad gulosum accedit. Pili longi et asperi; cauda castanea apice obscurior; pedes anteriores tetradactyli, posteriores pentadactyli.

Gulo. 8. U. cauda concolore, corpore rufo-fusco, medio dorsi nigro. Schreber Saength. III. p. 525. t. CXLIV. Georgi it. p. 160. Pallas spicil. zool. XIV. p. 25. t. 2.

Mustela pedibus fissis, corpore rufo-fusco, medio dorsi nigro. Syst. nat. XII. p. 67. Fn. suec. 14. Houtt. nat. II. p. 189. t. 14. f. 4. Gunner act. Nidros. III. p. 123. t. 3. f. 5.

Gulo. Gesn. quadr. p. 554. Aldrov. dig. p. 178. Jonst. quadr. p. 131. t. 57. Scheff. Lappon. 339. Rzaczynsk. polon. 218. Klein quadr. p. 83. t. 5. Penn. quadr. p. 196. Zimmerm. spec. zool. geogr. 309.

Glouton. Buffon hist. nat. suppl. III. p. 240. t. 48.

Rossumaka. Nieremb. hist. nat. p. 188.

Jarf. Genberg act. Stockh. 1773. p. 222. t. 7. 8.

Habitat in Americae, Asiae et Europae terris quam maxime borealibus, rarius in Polonia et Curonia, rarissime in Germania, in montosis praesertim et vastissimi silvis. Coit Januario, parit ut plurimum Majo pullum 1-3 in abditissimis silvarum; astutus et vorax vicitat leporibus, muribus, rangiferis, avibus, cadaveribus, etiam piscibus, caseo aliisque cibis; facilime scandit; homines nunquam sponte adoritur; contra canes foetore horrendo se defendit, post mortem tamen debiliore. Junior cicurari potest. Pellis egregia.

Mele major, plus quam bipedalis, ast gracilior. Artus, quam u. a. breviores crassissimi, robustissimi, villosi, pentadactyli. Cauda cruribus posticis brevior villosa. Mamme 6. Dentes primores superiores intermedii aequales utroque latere quasi lobati, extimi vero longiores conici robusti, altero latere lobati: Inferiores 6 retuso-truncati, 2 alterni interiores, medi minores, extimi crassiores. Laniarii teretes conici, robustissimi, obtusifusculi, superiores paulo majores, antice remoti, extus rugosi, inferiores utrinque approximati. Molares superiores utrinque 5, inferiores 6: omnes lobati, primo ultimoque minuto.

Anatomie. Barth. cent. 4. obs. 30.

17. DIDELPHIS. *Dentes primores minuti rotundati.*

*Superiores X, interme-
diis 2 longioribus.*

*Inferiores VIII, inter-
mediis 2 latioribus
brevissimis.*

laniarii longi.

molares denticulati.

Lingua papillis ciliata.

*Folliculus (plerisque) abdominalis
mammarum.*

marsupia- 1. *D. mammis 8 intra abdomen.* Schreb. Saengtb. III. p. 536.
lis. t. CXLV.

Philander (amboinensis) atro-spadiceus in dorso, in ventre
ex albido cinereo flavicans, maculis supra oculos obscure
fuscis. Briff. quadr. 201.

Philander maximus orientalis. Seb. mus. I. p. 64. t. 39.
Klein quadr. p. 59.

Habitat in Surinamo.

Corpus melis, magnitudo cati majoris aut martis. Nares
perpendiculares, lunares; vibrissae 5 ordinum longae;
fetae pone oris rectum 8, sub gula 5. Auriculae ovales,
laxae, atrae, apicibus albis. Dentes molares lobati; an-
teriores simplices; primi minimi. Tibiae nigrae laeves,
pilis brevibus. Cauda longitudine corporis.

Philan- 2. *D. cauda basi pilosa, auriculis pendulis, mammis quater-
der.* Schreber Saengtb. III. p. 541. t. CXLVII.

Philander (brasiliensis) pilis in exortu albis, in extremitate
nigricantibus vittatus. Briff. quadr. 210.

Tlaquazin f. Tai-ibi brasiliensibus dicta. Seb. mus. I. p. 57.
t. 36. f. 4.

Faras ou Ravale. Gumilla Orin. 3. p. 238.

Habitat in omni meridionali America.

Longitudo corporis 9 pollicum, caudae fere 14 pollicum.
Vibrissae 6 ordinum; margo orbitarum ferrugineus; pe-
des albidi; caudae pars nuda albida, maculis fuscis.

Opos- 3. *D. cauda semipilosa, superciliarum regione pallidiore.*
sum. Schreb. Saengtb. III. p. 537. t. CXLVI. A. B.

Philander saturate spadiceus in dorso, in ventre flavus, maculis supra oculos flavis. Briss. quadr. 207.

Philander. Seb. mus. I. p. 56. 57. t. 36. f. 1. 2. 3.

Vulpes major putoria, cauda tereti et glabra. Acuare. Punt. Barr. Fr. équin. p. 166.

Simivulpa. Gesn. quadr. p. 870. Aldrov. dig. p. 223.

Tlaquatzin. Hernand. mexic. p. 330.

Tai-ibi Brasiliensibus. Marcgr. brasili. 223.

Carigueia. Marcgr. brasili. 222. Pis. brasili. 323. Tyson act. angl. n. 239. p. 105. Cowper act. angl. n. 290. p. 1565.

Opossum. Catesb. Carol. p. 120.

Sarigue, Opossum. Buffon hist. nat. X. p. 279. t. 45. 46.

Virginian Opossum. Penn. quadr. p. 204. t. 21. f. 1.

molucca. β. D. saturate fusca in dorso.

Philander (orientalis) saturate fuscus in dorso, in ventre flavicans, maculis supra oculos flavis. Briss. quadr. 209.

Habitat in Americae calida et temperatori parte, etiam in insulis Antillis; β) in Zeylona, insulis philippinis et moluccis.

Caudae prehensilis ope ab arbore in arborem volvitur, lente ceterum cursus, et tenacis vitae; grunnit; cicurari potest; femina 4-5 catulos parit, quos marsupio condit pertinacissime. Longitudo circiter pedalis. Caput longius et magis acutum, quam philandro, brevius, quam marsupiali. Auriculae breves rotundatae. Mammae 5-7. Cauda corpore brevior, ad ortum pilosa. Caudae nuda pars albida.

Cayopol- 6. D. cauda corpore longiore, marsupio nullo, orbitalium margine nigro. Schreb. Saeugth. III. p. 544. t. CXLVIII.

Philander (africanus) saturate spadiceus in dorso, in ventre ex albido flavicans, cauda ex saturate spadiceo maculata. Briss. quadr. p. 212.

Cayopollin. Fernand. nov. Hisp. p. 10.

Animal

Didelphides Americae potissimum, nunquam Africae aut Europae incolae, in antris silvarum, quae ipsae fodunt, et arboribus degunt, quas caudae quoque prehensilis ope scandunt, lento satis gressu incidentes, avibus, gallinis praesertim, insectis, vermis, vegetabilibus quoque vescuntur. Pedes plerisque pentadactyli, fissi, planitatum pollice remoto mutato. Penis maribus absconditus, glande bifida. Marsupium feminis 1-3 abdominale, quod clavii potest, duobus ossibus firmatum, quae quoque in maribus adsunt.

Animal caudimanum s. cayopollin. *Nieremb. hist. nat.*
p. 158.
Mus africanus kayopolin dictus mas. *Seb. mus. I.* p. 49.
t. 31. f. 3.
Cayopollin. *Buffon hist. nat. X.* p. 350. t. 55.
Mexican opossum. *Penn. quadr. p. 208. n. 146.*
Habitat in montosis novae Hispaniae, rostro crassiore, auriculis brevioribus et angustioribus a praecedente et in sequente diversa. Dentes molares superiores utrinque 5. Cauda 11 pollicum, albida, spadicea maculata, ad ortum pilosa. Corpus 6 pollices longum.

murina. 4. D. cauda semipilosa, mammis senis. *Amoen. ac. I.* p. 279.
Mus. Ad. Fr. 2. p. 8. Schreber Saeugthiere, III. p. 545.
t. CXLIX.
Philander (americanus) saturate spadiceus in dorso, in ventre dilute flavus. *Briss. quadr. p. 211.*
Philander mammis extra abdomen, cauda longissima tereti nuda, corpore longiore. *Gronov. zoophyl. I.* p. 9. n. 33.
Mus sylvestris americanus mas, scalopes dictus. Seb. mus. I.
p. 48. t. 31. f. 1. 2.
Marmose. *Buffon hist. nat. X.* p. 335. t. 52. 53.
Habitat in America australi.
Longitudo corporis perinde ac caudae 6 pollicum. Vibrissae 6 ordinum, capite breviores, infimo ordine albo, ferrugineae. Dorsum convexum una cum vertice ferrugineum. Ungues acutissimi. Mamme circiter 7, cylindraceae.

dorsigera. 5. D. cauda basi pilosa corpore longiore, digitis manuum multicis. *Schreber Saeugth. III.* p. 546. t. CL.
Philander (surinamensis) ex rufi helvus in dorso, in ventre ex flavo albicans. *Briss. quadr. p. 212.*
Genus gliris sylvestris. *Merian. inf. sur. p. 66.* t. 66.
Mus seu forex silvestris americanus. Seb. mus. I. p. 49. t. 31.
f. 4. 5.
Glis silvestris americanus cum catulis suis. *Seb. mus. 2. p. 90.*
t. 84. f. 4.
Philandre de Surinam. *Buffon hist. nat. XV.* p. 157.
Merian opossum. *Penn. quadr. p. 210. n. 149.*
Habitat in Surinamo, in antris infra terram effossis; femina parit 5-6 pullos, quos instante periculo in dorso gerit, caudis maternae cirrhi instar circumvolutis.

Magni-

Magnitudo *Ratti*; orbitae margine fuscō; cauda albida, maris maculis fuscōcentibus praelonga, nuda; palmarum unguēs obtusī, plantarum acuti. Auriculae nitidae, nudae. An eadem cum murina?

cancrivo- 7. D. cauda squamosa fere calva, corpus prope aequante, plantarum ungue pollicari plano.

Crabier. *Buffon hist. nat. suppl.* III. p. 272. t. 54.

Habitat in Cayennae paludosis, interdū in rhizophorīs, canceris brachyuris vīctitat, porcelli instar grunnit, pinguiscit, et cicuratur; femina in cavis arboribus 4-5 pullos parit.

Longitudo fere 17 pollicum. Pili instar lanae crīpsi, intersitis tamen setis, quae a medio dorſi ad caudam usque juba fuscā speciem constituant. Caput, humeri, collum, crura ex flavo rubent, latera et abdomen flavescent; pedes ex fuscō nigri. Margo orbitarum niger. Auriculae breves, ovales, calvae.

brachyu- 8. D. cauda pilosa et auriculis calvis brevissimis, marsupio nullo, corpore rufo. Schreber *Sacugthiere*, III. p. 548.

t. CLI. Pallas *act. ac. Petrop. pro ann. 1780.* II. p. 235. t. V.

Philander obscure rufus in dorso, in ventre helvus, cauda brevi et crassa. Briff. *quadr.* p. 213.

Philander māmīnis extra abdomen, cauda brevi crassa pilosa. Gronov. *zoophyl.* I. p. 9. n. 35.

Muris silvestris americani femina. Seb. *muf.* I. p. 50. t. 31. f. 6.

Short-tailed opossum. Penn. *quadr.* p. 208. n. 147.

Habitat in Americae australis silvis. Femina 9-10 pullos parit.

Longitudo corporis a 3 pollicib⁹ et 2 lineis ad 5 pollices, et 6 lineas, caudae ab 1 pollice et 8 lineis ad 2 pollices et 4 lineas. Capite accedit ad D. Cayopollin; rostrum minus productum quam D. Oposso, minus acutum, quam D. murinae, cui tamen reliquo corpore, marsupii defectu, pene postice infra scrotum exserendo satis similis est. Cauda a crassa basi sensim attenuata; vellus mollissimum, nitidum, per latera capit⁹ et trunci pulcerrime rufum.

orienta- 9. D. cauda ad medium fere pilosa, prehensili, corpore longiore, folliculo abdominali, plantarum digitis duobus intermediis coadunatis. Pallas *misc. zoolog.* p. 59. Erxleb. *mamm.* p. 79. Schreber *Sacugth.* III. p. 550. t. CLII.

Suti-

Surinam opossum. Penn. quadr. p. 209. n. 148.

Coescoes. Valent. ind. 3. p. 272.

Phalanger. Buffon hist. nat. XIII. p. 92. t. 10. II.

Habitat in insulis Moluccis, forsan quoque in nova Hollandia. Comedendi modo et voce ad sciurum accedit, per quam timida; feminae 2-4 mammae, tot etiam pulli.

Capite magis convexo, rostro magis robusto, auriculis et pedibus brevioribus, unguibus longioribus et magis curvatis diversa.

Brunii. 10. D. cauda brevi calva, pedibus posticis longioribus tridactylis. *Schreber Saeugth. III. p. 551. t. CLIII.*

Filander. le Brun voy. I. p. 347. f. 213.

Habitat in - - -

Capite vulpem refert, magnitudine et pilis leporem, pedibus dipodem, folliculo abdominali didelphidem.

Gigantea. 11. D. cauda longa crassa, pedibus posticis triplo fere longioribus, tridactylis. *Schreber Saeugthiere, III. p. 552. t. CLIV.*

Kanguru. Hawkesworth voy. 3. p. 174. t. 51.

Habitat in nova Hollandia; salit, fodit, comedit instar dipodis, aquo tamen dentibus mire differt; hi enim sunt didelphidis. Adultum animal ovem magnitudine aequat; color ex flavescente cinereus; caput magis obtusum, quam aliis didelphidis speciebus; auriculae longae; truncus anterius gracilis, posterius torosus; palmarum unguis atro-nitidi; plantarum digitus medius prominens.

macro-tarsus. 12. D. cauda gracili nuda apice subfloccosa, plantarum talis elongatis nudis ungue pollicari plano. *Schreber Saeugth. III. p. 554. t. CLV.*

Tarsier. Buffon hist. nat. XIII. p. 87. t. 9.

Woolly Jerboa. Penn. quadr. p. 298. n. 225.

Habitat - - -

Inter lemures, dipodes, et didelphides ambiguum animal mure domestico paulo major dentibus recedit ab omnibus aliis mammalibus; habet enim primores acutos in utraque maxilla binos, laniarium utrinque unum, superiores breves, inferiores longos; molares utrinque 6. Pedibus calvis manuum ad instar utitur. Pili crassi, molles, longi, basi ex atro cinerea, apice ferrugineo; caput rotundum; rostrum breve et acutum; auriculae longae, tenues, calvae; cauda praelonga; pedes posteriores anterioribus multo longiores.

18. TALPA. *Dentes primores inaequales superiores VI,
inferiores VIII.*
*Ianiarii I. superiores majores.
molares superiores VII.
inferiores VI.*

europaea. **I.** *T. canda brevi, pedibus pentadactylis.* Erxl. mamm. p. 114.
Schreber Saeugth. III. p. 558. t. CLVI.

Talpa caudata, pedibus pentadactylis. Syst. nat. XII. p. 73.
Fn. suec. 23.

Talpa caudata nigricans, pedibus anticis et posticis pentadactylis. Briff. quadr. 204.

Talpa caudata. It. scan. 332.

Talpa. Gesn. quadr. 931. Aldr. dig. 45. Raj. quadr. 236.

Taupe. Buffon hist. nat. VIII. p. 81. t. 12. suppl. III. p. 193.
t. 32. Gautier observ. I. part. 3. p. 155. t. B.

Mole. Penn. quadr. p. 311. n. 241.

variegata. **β.** *pelle maculis albis varia.* Briff. quadr. 205.

Talpa maculata oostfrisia. Seb. mus. I. p. 68. t. 41. f. 4.

Spotted mole. Edw. glean. 2. p. 122. t. 268.

alba. **γ.** *pelle alba.* Briff. quadr. 205. Seb. mus. I. p. 51. t. 32.
f. 1.

flava. **δ.** *pelle flava.* Penn. quadr. p. 311. n. 241. **β.**

cinerea. **ε.** *pelle cinerea.* Hübch Naturf. 3. p. 98.

T. cinerea palmis angustioribus. Richter Abhandl. über die phys. Beschaff. von Boehmen. Prag et Dresden. 1786. 4.
p. 82.

*Habitat in omnis Europae, borealis quoque Asiae et Africæ
apricis humosis, evertens prata hortosque; vivitans
lumbricis et larvis, nec plantis; expellitur vicino, optime
aquate, quamvis ex locis inundatis in arbores fu-
giat; hybernat; pellis delicatula, pilis mollibus, subtili-
bus,*

*Talpæ infra terram degunt, tubos cylindricos fodunt, vermis potissimum visitant.
Caput crassum rotundatum. Oculi minimi testi; auriculae nullæ. Corpus cras-
sum. Pedes breves. Palmae latæ, magnæ, breviores, quam plantæ, et ungu-
ibus longioribus instructæ.*

*bus, dense appressis; coit vere pene omnium longissimo,
ut videtur monogama; femina parit pullos 4-5.*

Anatome. E. N. C. d. I. a. 2. obs. 51. et d. 2. a. I. obs. 130.

Sepultura. Gleditsch oper. miscell. 3. n. 5.

Paulinus C. F. Talpa. Francof. 1689.

de la Faille Naturgesch. des Maulwurfs. Francof. 1778.

longicau- 3. T. cauda mediocri, pedibus pentadactylis posticis squamo-
data. *Erxleb. mamm. p. 118.*

Long-tailed mole. Penn. quadr. p. 314. n. 244. t. 28.
f. 2.

*Habitat in America boreali, externa facie ad europaeam ac-
cedens, differt tamen cauda longiore bipolllicari, et pilo
spadiceo; plantis squamosis parum pilosis, unguibus lon-
gioribus; corpus 4-6 pollices longum.*

rubra. 4. T. cauda brevi, palmis tridactylis, plantis tetradactylis.
Erxl. mamm. p. 119.

Talpa (americana rufa) caudata ex dilute cinereo rufa, pe-
dibus anticis tridactylis, posticis tetradactylis. Briff.
quadr. p. 206.

Talpa rubra americana. Seb. mus. I. p. 51. t. 32. f. 2.

Red mole. Penn. quadr. p. 315. n. 246.

*Habitat in America, europaea satis similis, paulo tamen
major, cauda initio crassior.*

asiatica. 2. T. ecaudata, palmis tridactylis.

Talpa aurea. Schreber Saeugth. III. p. 562. t. CLVII.

Talpa (sibirica aurea) ecaudata ex viridi aurea, pedibus an-
ticis tridactylis, posticis tetradactylis. Briffon quadr.
p. 206.

Talpa fibericus versicolor, Aspalax dictus. Seb. mus. I. p. 51.
t. 32. f. 4. 5.

Siberian mole. Penn. quadr. p. 313. n. 242.

Habitat in capite bonae spei. Pallas.

Rostrum brevius, quam europaeae; nares calvae. Pili fus-
ci, ut tamen aureo nitore in viorem et rubedinem
vergant.

19. SOREX. *Dentes primores superiores II longi bifidi.*

inferiores II--IV; intermediiis brevioribus.

*laniarii utrinque plures.
molares cuspidati.*

cristatus. 1. *S. naribus carunculatis, cauda brevi.*

Radiated mole. *Penn. quadr. p. 313. n. 243. t. 28. f. 1.*

Habitat in America boreali, facie externa et rostri longitudo ad talpam accedens, radicibus vicinitat.

Pili breves, teneri, dense appressi, atri, palmis niveis, plantis squamosis. Dentes primores inferiores 4, laniarii utrinque 4. Nares singulae caruncula stellato-palmata radiis 10 f. 15 subulatis nudis, ut in erinaceo; cauda subnuda concolor vix ultra 1 $\frac{1}{4}$ pollicem longa; corpus ipsum fere 4 pollicum.

minutus. 2. *S. rostro longissimo, cauda nulla.* Schreber *Saeugth. III. p. 178. t. CLXI. B.*

Sorex (pygmaeus) rostro longissimo, pedibus pentadactylis, cauda nulla. Laxmann *sibir. Brief. p. 72.*

Minute shrew. *Penn. quadr. p. 108. n. 237.*

Habitat in Sibiria, in dumetis humidisculis sub arborum radicibus, nido e lichenibus confecto; colligit semina; cito currit et fodit; mordet; sonus vespertilionis.

Post exilium omnium mammalium minimum, 3j ponderis, pilis tenerrimis nitidum, griseum, subtus albicans. Caput magnitudine fere corporis: rostro attenuato, subtus exarato. Myctaces oculos attingentes. Oculi parvi, retracti. Auriculae dilatatae breves nudac. Pedes 5-5.

aquaticus. 3. *S. plantis palmatis, palmis caudaque breviore albis.* Schreber *Saeugth. III. p. 566. t. CLVIII.*

Talpa virginianus niger. Seb. *muf. 1. p. 51. t. 32. f. 3.*

Brown mole. *Penn. quadr. p. 314. n. 245.*

Habitat in America boreali. P. Kalm.

Statura cristati, vel talpae. Pili nitidi, obscure cinerei, apice fusi. Corpus 5, cauda 1 pollicem longum. Dentes primores inferiores 4.

- moscha- 6. *S. pedibus palmatis, cauda compresso-lanceolata. Pallas
tus. it. I. p. 156. Lepechin it. I. p. 178. t. 13. Erxl. mamm.
p. 127. Schreber Saeugth. III. p. 567. t. CLIX.*
*Castor (moschatus) cauda longa compresso-lanceolata, pe-
dibus palmatis. Syft. nat. XII. 1. p. 79. Fn. suec. p. 11.
n. 28.*
*Castor (mus moschiferus) cauda verticaliter plana, digitis
omnibus membrana inter se connexis. Briss. quadr. p. 92.*
*Mus aquaticus. Clus. exot. p. 375. Jonst. quadr. p. 169.
t. 73.*
Mus aquatilis. Aldrov. dig. p. 447. fig. p. 448.
*Mus aquaticus exoticus. Raj. quadr. p. 217. I. G. Gmelin
nov. comm. Petrop. IV. p. 383. fig. V. tab. 13.*
*Desman. Buff. hist. nat. X. p. 1. t. 1. Güldenstedt berlin.
Naturfr. Besch. III. p. 107. t. 2.*
Long noled beaver. Penn. quadr. p. 260. n. 192.
*Bilamraze. S. G. Gmelin ir. I. p. 28. t. 3. 4. Güldenstedt
Besch. der berl. naturf. Fr. III. p. 107. t. 2.*
*Habitat in regionibus Wolgae et Tanai interjacentibus inter
50 et 57num latitudinis gradum ad lacus, in quorum ri-
pis antra sibi fodit, quorum introitus sub ipsa aqua; vic-
titat acoro.*
*Maximo criceto major; caput talpino simile; rostrum valde
mobile, cartilagineum. Mystacees albidae 12 ordinum.
Oculi minimi. Auriculae nullae. Truncus planus, praet-
er cutem panniculo carnosu obductus. Pellis castoris.
Pedes calvi, supra squamosi, cum cauda nigricantes.
Dentes primores inferiores 4, laniarii utrinque 6, mola-
res superius 4, inferius 3. Ad initium caudae folliculi
7-8 tela cellulosa conjuncti, flavescentes, ex quibus ma-
teria fluida flavescens, penetrantissimo odore Zibethum si-
mulans prodit, cuius singula animalia scrupulum circi-
ter continent.*
- fodiens. 7. *S. cauda mediocri subnuda, corpore nigricante subtus ci-
nero, digitis ciliatis. Erxleb. mamm. p. 124. Schreber
Saeugth. III. p. 571. t. CLXI.*
*Mufaraneus dorso nigro ventreque albo. Merret. pin.
p. 167.*

Mus-

Sorices capite ad talpas, reliquo habitu ad mures accedunt; fodunt, et ut plurimum in-
sestis vermisque visitant; sub terra, quaedam species ad aquas habitant; cor-
pus crassum, pedes pentadactyli; caput productum, conico rostro terminatum.
Oculi minimi.

i bi-
rme-
T.
ngitu-
plan-
niarii
lmata
cauda
us ip-
b. III.
stylis,
borum
; cito
aderis,
Ca-
subtus
i, re-
-5.
Schre-
3.
inerei,
Den-
6. S.

Musaraigne d'eau. *Buffon hist. nat.* VIII. p. 64. t. 11. f. 1.

Watershrew. *Penn. quadr.* p. 308. n. 236.

Habitat in Anglia, Burgundia, Germania, Borussia, Siberia ad fontes et rivos, araneo rario; natat; femina 10 mammis instructa vere parit 9 pullos.

Corpus tres, cauda ultra duos pollices longa; rostrum apex, quam in araneo, latior; pedes longiores; dentes primores inferiores 2, laniarii $\frac{3}{2}$, molares $\frac{4}{3}$.

marinus. 4. S. cauda mediocri, corpore fusco, pedibus caudaque cinereis.

Habitat in Java.

Corpus magnitudine muris musculi. Rostrum elongatum subtilis canaliculatum, cinereum vibrissis longis. Auriculae rotundatae nudiusculae. Dentes primores 2 acuti, paralleli. Pedes pentadactyli, unguiculati. Cauda corpore paulo brevior minus pilosa.

Araneus. 5. S. cauda mediocri, corpore subtus albido. *Fn. suec.* 24. *Schreb. Saength.* III. p. 573. t. CLX.

Musaraneus supra ex fulvo rufus, infra albicans. Briff. quadr. p. 126.

Mus araneus. Gesu. quadr. p. 747. Aldrov. dig. p. 441. fig. p. 442. Jonston quadr. p. 168. t. 66. Raj. quadr. p. 239.

Musaraigne. Buffon hist. nat. VIII. p. 57. t. 10. f. 1.

Foetid shrew. Penn. quadr. p. 307. n. 235.

Habitat in omni Europa et boreali Asia, in acervis lapidum, circa pagos in terra, fimetiis, stabulis, horreis, humidis habitaculis, ad aquas, granis etiam vicinitat; moschi odore infesta praesertim catis, qui occidunt quidem, sed non comedunt; cursus lentior, quam muri musculo; vox subtilis sibilans; vere et aestate femina parit 5-6 pullos.

Longitudo nunquam tres pollices, pondus vix 3 drachmas superat. Dentes, ut in fodiente.

furina- mensis. 8. S. cauda corpore dimidio breviore, corpore supra spadiceo, infra ex albo cinereo flavescente.

Habitat in Surinamo.

Auriculis ad araneum, magnitudine corporis, capite, rostro, dentibus, oculis, pedibus ad fodientem proprius accedit. Cauda brevissimis pilis dense appressis tecta, supra cinerea, infra albida; os album.

- pusillus. 9. *S. auriculis rotundatis, cauda brevi subdisticha.* Erxleb.
mamm. p. 122. S. G. Gmelin it. 3. p. 499. t. 75. f. 1.
Habitat in borealis Periac desertis in autris, quae ipse
fodit.
Dentibus ad araneum accedit, cetera propius ad surinamen-
sem, paulo tamen major, ut $3\frac{1}{2}$ pollices longitudine ae-
quet. Color dorsi obscure griseus, ventris cinereus.
- brasiliensis. 10. *S. fuscus, dorso striis tribus nigro.* Erxl. mamm. p. 127.
Mularaneus figura muris. Maregr. brasili. p. 229.
Mulârâgne de Brésil. Buffon hist. nat. XV. p. 160.
Brasilian shrew. Penn. quadr. p. 309. n. 239.
Habitat in Brasilia, minus timida, ut ipsum catum non ti-
meat. Longitudo corporis 5, caudae 2 pollices aequat.

- exilis. 11. *S. minimus, cauda crassissima tereti.*
Habitat in Siberia, ad fluvium Jenisei; omnium mammalium
minimus, ut drachmam dimidiam pondere non superet;
color magis in fuscum vergit, quam in araneo.

20. ERINACEUS, *Dentes primores superiores II. di-* *stantes.*

inferiores II. approxi-
mati.

laniarii superiores utrin-
que V.

inferiores utrinque III.
molares utrinque supra et
infra IV.

Dorsum spinis tectum.

- europaeus. 1. *E. auriculis rotundatis, naribus cristatis.* Fn. suec. p. 8.
n. 22. Schreber Saengthiere, III. p. 580. t. CLXII.
Erinaceus auriculis erectis. Briff. quadr. p. 128.
Erinaceus parvus nostras. Seb. mus. I. p. 78. t. 49. f. 1. 2.
Echinus terrestris. Gesn. quadr. p. 368. Aldrov. dig. p. 459.
Jonst. quadr. p. 171. t. 68. Raj. quadr. p. 231.
Hérisson. Buffon hist. nat. VIII. p. 28. t. 6.
Common Hedge-hog. Penn. quadr. p. 316. n. 247. t. 28.
f. 3.
Igel. Knorr delic. tom. II. tab. H. f. 3.

Habitat in Europae, frigidissima tamen excepta, (etiam ad Jaici superioris ripas, in deserto Kirgisico, et aliis regionibus apricis Sibiriae australioris) dumetis et sepibus, nidiificans e musco, in fruticibus hybernans, nocturnus; vivitans bufonibus, vermis, coleopteris, cancris, conchis, fructibus, aviculis, cadaveribus; muscos fodit; natat facile; monogamus incedit; meticolosus iratusque in globum decussatis spinis se contrahit; compressis pedibus ejulat; ambroficus; Calmucceis loco felis domesticus. Femina, 5 mammis, tribus pectoralibus, 2 abdominalibus instrusa, vere coit, et initio aestatis 3-5 pullos parit. Caro non esculenta.

Longitudo 10 circiter pollicum. Rostrum acutum; labium superius fissum. Auriculae latae, breves, pilosae; oculi parvi et nigri. Praeputium propendens. Pili captis ex albido fulvi, albis mixti, colli, pedum, spinis intersit fulvi, caudae obscuriores, gulae ex albo cinerei, pectoris et ventris iidem, sed fulvis mixti: Spinae utroque fine ex flavescente cinereae, medio fuscae.

inauris. 2. E. auriculis nullis. Briff. quadr. 184.

*Erinaceus americanus albus. Seb. mus. I. p. 78. t. 49. f. 3.
Habitat in America, modo non varietas prioris.*

malaccensis. 3. E. auriculis pendulis. Briff. quadr. 183.

Hystrix brachyura. Syft. nat. X. I. p. 57.

*Porcus aculeatus f. Hystrix malaccensis. Seb. mus. I. p. 81.
t. 51. f. 1.*

*Habitat in Asia; ex hoc pretiosus lapis f. piedra del porco.
Facies cum Briffono suadent erinacei speciem; an vere distincta hujus hystricisne species?*

auritus. 4. E. auriculis ovalibus longis, naribus cristatis. Pallas nov.

comment. Petropol. XIV. p. 573. t. 21. f. 4. S. G. Gmelin nov. comm. Petrop. XIV. p. 519. t. 16. Schreb. Sacugthiere, III. p. 582. t. CLXIII.

Habitat ad fluviorum Wolgae et Uralis partem inferiorem, etiam orientem versus ultra lacum Baikal, europaeo moribus et habitu satis similis, paulo tamen minor, oculis paulo majoribus, mystacum 4 ordinibus, pedibus paulo longioribus et gracilioribus, cauda breviore, conica, annulata, et fere calva, pilis tenerioribus. Femina ad 7 pullos, aliquando bis per annum parit.

5. E.

- setosus, 5. *E. auriculis brevioribus, occipite satis tecto, cauda brevif-
sima spinosa.* Schreber Saeugth. III. p. 583. t. CLXIV.
Tendrac. Buff. hist. nat. XII. p. 438. t. 57.
Petit Tendrac de Madagascar. Sonner. it. 2. p. 146. t. 93.
*Habitat in Madagascar, forsan et in India, europaeo et au-
rito minor, ut longitudo vix 6 pollices aequet; rostrum
tamen longius, mystaces longae; pedes breves; spinae al-
bidae, medio ex castaneo rubicundae; pili albi. An for-
san idem cum inauri?*
- ecauda- 6. *E. cauda nulla, rostro longissimo acuto.* Schreber Saeugth.
tus. III. p. 584. t. CLXV. CLXV*.
Tanrec, et le jeune Tanrec. Buffon hist. nat. XII. p. 438.
t. 56. et suppl. III. p. 214. t. 37.
*Habitat in Madagascar, priori longior, ut 8 pollices fere
aequet. Os oculique parvi; auriculae rotundatae, longio-
res tamen, quam setoso; spinis medio nigris, cetera fla-
vescentibus modo teguntur vertex, occiput, collum hume-
rique, reliqua dorsi pars setis longis, ejusdem coloris,
ut tamen albae et nigrae intercurrant. Pili flavescentes,
pedum fulvi.*