

IV. GLIRES.

Dentes primores bini supra et infra approximati, a molaribus remoti. laniarii nulli.

21. HYSTRIX. *Dentes primores II oblique scissi. molares VIII.*

Digiti pedum IV - V.

Corpus spinis pilisque tectum.

cristata. 1. *H. palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, capite crista-to, cauda abbreviata.* S. G. Gmelin it. III. p. 107. t. 21. Schreber Saeugth. IV. p. 599. t. CLXVII.

Hystrix capite cristato. Briss. quadr. 125.

Hystrix orientalis cristata. Seb. mus. I. p. 79. t. 50. f. 1.

Hystrix. Gesn. quadr. p. 563. Aldrov. digit. p. 471. fig. p. 474. Jonst. quadr. p. 163. t. 68. Raj. quadr. p. 206.

Pore-epic. Buff. hist. nat. XII. p. 402. t. 51. 52.

Crested porcupine. Penn. quadr. p. 262. n. 193.

Stachelschwein. Ridinger kl. Th. t. 90.

Stachelschwein mit dem Kopfbusch aus Africa. Knorr delic. II. tab. K. II. f. 2.

Habitat in Asia australioris, Africæ, Hispaniae, Italiae antris, quæ ipsa fodit, amplis, et in multas cameras partitis, unico tamen introitu; noctu victimum quaerit in fructibus, radicibus, herbis, buxo praesertim delectata; hostibus infestata in globum se contrahit; femina vere 2-4 pullos parit, qui facile cicurantur.

Longitudo aliquando 2 pedes superat; caput elongatum, compressum; rostrum breve obtusum; labium superius ad nares usque fissum; oculi parvi, nigri; auriculae ovales, latae, breves; cauda conica; pedes breves, crassi. Pili spinis interstici cinerei; spinae ipsae longae, robustae, laeves, nigro et albido annulatae, quas animal, prouti longissimas illas et robustas nuchæ fetas, musculi subcutanei vi erigere et reclinare valet. Cystis fellea non raro lapidem porcinum continet. Caro esculenta.

prehensi- 2. *H. pedibus tetradactylis, cauda elongata prehensili seminu-lis.* Schreber Saeugth. IV. p. 603. t. CLXVIII.

Hystrix

Hystrix (americanus) cauda longissima tenui, medietate extrema aculeorum experite. *Briff. quadr. 129.*
Hystrix americanus, Cuandu Brasiliensibus, Lusitanis Ourico cachieno. *Marcgr. brasili. p. 233.* *Fonst. quadr. p. 60.*
Raj. quadr. p. 208.
Hystrix minor leucophaeus. *Barrer. Fr. équin. p. 153.*
Cuandu. *Pis. Ind. p. 99.*
Coendou. *Buffon hist. nat. XII. p. 418. t. 54.*
Brasilian Porcupine. *Penn. quadrup. p. 264. t. 24. f. 1.*
β. *Hystrix americanus major.* *Briff. quadr. p. 131.*
Hystrix longius caudatus, brevioribus aculeis. *Barrer. Fr. équin. p. 153.*
Cuandu major. *Pis. Ind. p. 324. f. p. 325.*
γ. *Hystrix (novae Hispaniae) aculeis apparentibus, cauda brevi et crassa.* *Briff. quadr. 127.*
Hoitztlacuatzin, seu Tlacuatzin spinosus, hystrix novae Hispaniae. *Hernand. mexic. p. 322.*
Hoitztlacuatzin. *Nieremb. hist. nat. p. 154.*
Habitat in Brasiliæ, Guianæ et novæ Hispaniae silvis; arboreos scandit, earumque fructibus, nec non aviculis viettat; grunnit instar suis; contrahitur in globum; interdiu dormit; cicurari potest; caro edulis.
Longitudo corporis tribus fere pollicibus pedem superat; caudæ 7 pollices aquat.

- dorsata.* 3. *H. palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, dorso solo spinoso.* *Schreber Saeugth. IV. p. 605. t. CLXIX.*
Hystrix (Hudsonis) aculeis sub pilis occultis, cauda brevi et crassa. *Briff. quadr. p. 128.*
Hystrix pilosus americanus. *Catesb. Carol. app. p. 30.*
Cavia Hudsonis. *Klein quadr. p. 51.*
Porcupine from Hudson's bay. *Edw. av. I. p. 52. t. 52.*
Urson. *Buff. hist. nat. XII. p. 426. t. 55.*
Habitat in Canada, nova Anglia, sinu Hudsonis, nova terra; fodiendo infra radices arborum degit, eas adscendit, earumque fructibus et cortice, praesertim juniperi viettat; aquam lambit canis instar, ejusque loco hieme comedit nivem.
Corpus ferrugincum. *Cauda apice subtus alba.* *Aculei inter pilos occultati.*
- maerou- 4. *H. pedibus pentadactylis, cauda longissima, aculeis clava- ra.* *Briff. quadr. 131.**
Hystrix (orientalis) cauda longissima aculeis undique obsita, in extremo paniculata. *Briff. quadr. 131.*

Porcus aculeatus silvestris seu hystrix orientalis singularis.

Seb. mus. I. p. 84. t. 52. f. I.

Hystrix. Bont. jav. 54.

Habitat in insulis oceani indici in silvis.

Auriculae breves, calvae; cauda longitudine corporis apice fasciculo pilorum longorum nodosorum argenteorum coronata. Corpus breve torosum. An forsan hujus varietas Hystrix torosa, descripta a Cl. Merrem, apud Leske Magaz. zur Naturk. und Oekonomie 1786. fasc. II. p. 197. 198.

CAVIA. Dentes primores II cuneati.

molares VIII.

Digiti plantarum III--V.

palmarum IV--V.

Cauda abbreviata aut nulla.

Claviculae nullae.

Paca. I. *C. caudata, pedibus pentadactylis, lateribus flavescente-lineatis. Erxl. mamm. p. 356. n. 7. Schreber Saeugth. IV. p. 609. t. CLXXI.*

Mus (Paca) cauda abbreviata, pedibus pentadactylis, lateribus flavescente-lineatis. Syst. nat. XII. I. p. 81. n. 6.

Cuniculus (Paca) caudatus auritus, pilis obscure fulvis rigidis, lineis ex albo flavescentibus ad latera distinctis. Briss. quadr. p. 144. n. 4. Gronov. zooph. I. p. 4. n. 15.

Cuniculus minor palustris, fasciis albis notatus, Pak. Barr. Fr. équin. p. 152.

Mus brasiliensis magnus porcelli pilis et voce Paca dictus. Raj. quadr. p. 226.

Paca. *Maregr. bras. p. 224. Pis. ind. p. 201. Jonst. quadr. t. 63. Buffon hist. nat. X. p. 269. t. 43. Suppl. III. p. 203. t. 35.*

Laubba. *Bancroft Guian. p. 76.*

Spotted Cavy. *Penn. quadr. p. 244. n. 178.*

Habitat in Guiana, Brasilia, et omni forsan calidore America ad fluvios, ad quos antra fodit mundissima, tribus singula, per quos evadere possit, cuniculis instructa; pinguiscit et junior cicurari potest; femina non nisi unum pullum parit. Caro sapida.

Longitudo circiter bipedalis; corpus supra fuscum, seriebus quinque macularum albarum fere quadunatarum ad latera insigni-

insignitum; collum, pedes et abdomen sordide alba; oculi magni fuscii; auriculae ovatae, tectae, minus acutae; verruca superciliorum, temporum, gulae; collum breve, cauda non nisi 2-3 lineas longa; pedes posteriores, inter quos mammae 2 jacent, anterioribus longiores.

Acouchy. 2. *C. caudata*, corpore olivaceo. *Erxl. mamm. p. 354.* Schreb.
Saeugth. IV. p. 612. t. CLXXI. B.

Cuniculus minor caudatus olivaceus, Akouchy. Barr. Fr.
équin. p. 153.

Acouchy. *Buffon hist. nat. XV. p. 58. suppl. III. p. 211.*
t. 36.

Olive Cavy. *Penn. quadr. p. 246. n. 180.*

Habitat in Guianae silvis, Aguti similis, cuniculo semestri aequalis; et tum colore, tum cauda longiore ab Aguti distincta. Facile cicuratur; femina 1-2 pullos parit.
Caro edulis.

Aguti. 3. *C. caudata*, corpore ex rufo fusco, abdomine flavescente.
Erxleb. mamm. p. 353. Schreber *Saeugth. IV. p. 613.*
t. CLXXII.

Mus (Aguti) cauda abbreviata, palmis tetracylisis, plantis tricylisis, abdomine flavescente. *Syst. nat. XII. I. p. 80.*
n. 2.

Cuniculus (Agouti) caudatus auritus, pilis ex rufo et fusco mixtis rigidis vestitus. *Briff. quadr. p. 143.* Gronov.
zooph. I. p. 4. n. 14.

Mus major fusco-cinerascens, cauda truncata. *Brown. jam.*
p. 484.

Mus silvestris americanus, cuniculi magnitudine, porcelli pilis et voce. *Raj. quadr. p. 226.*

Cuniculus omnium vulgatissimus, Aguti vulgo. Barr. Fr.
équin. p. 153.

Aguti vel Acuti Brasiliensibus. *Marcgr. brasili. p. 224.* Pif.
brasili. p. 102. Jonst. quadr. t. 63.

Agouti. *Buffon hist. natur. VIII. p. 375. t. 50.* Linn. Act.
Holm. 1768. p. 27.

Long nosed cavy. *Penn. quadr. p. 245. n. 179.*

leporina. β. *C. caudata*, corpore supra rufo subtus albo. *Erxl. mamm.*
p. 355.

Caviae, inter mures et cuniculos quasi mediae saliendo lente currunt, non scandunt, in arboribus cavis, aut sub terra degunt, vegetabilibus vicitant.

Mus (leporinus) cauda abbreviata, palmis tetradactylis, plantis tridactylis abdomine albo. *Syst. nat. XII. I. p. 80. n. 3.*

Cuniculus (javensis) caudatus auritus rufescens, fusco admixto. *Briss. quadr. p. 142.*

Java hare. *Catesb. carol. app. t. 18.*

Java cavy. *Penn. quadr. p. 246. n. 181.*

america- γ. Cavia.

na. *Cuniculus (americanus) caudatus auritus pilis rufis rigidis vestitus.* *Briss. quadr. p. 144.*

Cuniculus americanus. *Seb. mus. I. p. 67. t. 41. f. 2.*

Habitat in Brasilia, Guiana, insulisque Antillis in arboribus cavis, aut antris, quae ipsa fodit; interdiu vietum quaerit ex vegetabilibus, quae colligit et asservat, pedibusque posterioribus infidens anterioribus ori admovet; salit potius, quam currit; celeriter crescit; facile cicuratur; coit per totum annum; femina 3 - 5 pullos parit. Caro eadem, quae leporis cuniculi.

Longitudo circiter sesquipedalis. Cauda conica calva, brevissima. Pedes subpalmati.

Apera. 4. C. ecaudata, corpore ex cinereo rufo. *Erxleb. mamm. p. 348.*

Cuniculus (brasiliensis) ecaudatus auritus ex cinereo rufus. *Briss. quadr. p. 149. n. 8.*

Cuniculus brasiliensis, Apera dictus Marcgr. *Raj. quadr. p. 206.*

Cuniculus indicus femina. *Aldrov. dig. p. 393.*

Apera Brasiliensis. *Marcgr. bras. p. 223. Jonst. quadr. t. 63. Piso brasil. p. 103. Buffon hist. nat. XV. p. 160.*

Rock cavy. *Penn. quadr. p. 244. n. 177.*

Habitat in Brasiliae rupestrium antris. Caro sapida.

Color dorſi, qualis in lepore timido; auriculae breves. Palmae tetradactylae. Plantae tridactylae.

Cobaya. 5. C. ecaudata ex albo et rufo vel nigro variegata. *Schreber Saeugth. IV. p. 617. t. CLXXXIII.*

Mus (Porcellus) cauda nulla, palmis tetradactylis, plantis tridactylis. *Syst. nat. XII. p. 79. n. 1. Mus. Ad. Fr. p. 9. Amoen. acad. 4. p. 190. t. 2. it. Westgoth. 224.*

Cuniculus (indicus) ecaudatus auritus albus aut rufus aut ex utroque variegatus. *Briss. quadr. p. 147. n. 7. Gronov. zooph. I. p. 4. n. 16.*

Cuniculus indicus. *Nieremb. hist. nat. p. 160. Aldr. dig. p. 390. 391. Jonst. quadr. p. 162. t. 63. 65.*

Mus

Mus seu cuniculus americanus et guineensis, porcelli pilis
et voce, cavia cobaya brasiliensibus dictus Marcgr. Raj.
quadr. p. 223.

Mus major albo fulvoque varia, cauda nulla. Brown. jam.
p. 484.

Cavia cobaya. Marcgr. bras. 224. Pis. bras. 102. Pal-
las spic. zool. 2. p. 17.

Guinea-pig. Edw. av. t. 294. f. 2.

Cochon d'Inde. Buffon hist. nat. VIII. p. I. t. I.

Restless cavy. Penn. quadr. p. 243. n. 176.

Habitat in Brasilia, hospitatur in Europa. Pipiens, loquax,
inquieta, sequax, calcitrans, attenta, comans, masti-
cans, edit vegetabilia variata, potat lympham puram,
calorem amat; femina mammis duabus, parit pullos per-
fectissimos, mox coit; mas bombylans juniores masculos
mordet paraplecticos.

Longitudo pedalis. Color varius. Pili duri, colli paulo
longiores. Corpus torosum; collum brevissimum. Au-
riculae breves, latae, extrinsecus calvae. Oculi magni,
fuscii, prominuli.

Capyba- 6. C. ecaudata, plantis tridactylis palmatis. Schreb. Saeugth.
ra. IV. p. 620. t. CLXXIV.

Sus (Hydrochaeris) plantis tridactylis, cauda nulla. Syft.
nat. XII. p. 103.

Sus maximus palustris, Cabiai, Cabionara. Barr. Fr. équin.
p. 160.

Hydrochoerus. Briss. quadr. p. 117.

Cavia Capybara. Pallas spic. zool. 2. p. 18.

Capybara Brasiliensibus. Marcgr. bras. p. 230. Pis. bras.
p. 99. Jonst. quadr. t. 60. Raj. quadr. p. 126.

Capivard. Froger voy. p. 123.

Cabiai. Buffon hist. nat. XII. p. 384. t. 49.

Thicknosed tapir. Penn. quadr. p. 83. n. 61.

Habitat in Americae australis parte occidentali, in regioni-
bus silvosis paludosis ad magnos fluvios; saccharo aliis-
que vegetabilibus, piscibus quoque vescitur, quos noctu-
capit; natat, pingue scit, mitis, monogama; femina non
nisi unicum parit pullum.

Longitudo $2\frac{1}{2}$ pedibus major; caput oblongum; rostrum an-
gustum; nares nigricantes, subrotundae; labium superius
fissum; mystaces nigrae; oculi magni, nigri; auriculae
breves, rectae, calvae, nigrae; collum breve, crassum;
pedes

s, plan-
30. n. 3.
fco ad-

rigidis

2.
arbori-
viëtum
, pedi-
movet;
sicura-
parit.

, bre-
namm.

rufus.
quadra-

quadr.
p. 160.

Pal-

breber
plantis
p. 9.

ut ex
onov.

. dig.

Mus

pedes breves; plantae tetradae^ctylae; pili setosi, dorso longissimi, plurimi utroque fine nigri, medio flavescentes.

23. CASTOR. Dentes primores superiores truncati, angulo transverso excavati.

inferiores apice transversi.
molares utrinque IV.

Cauda longa depressa squamosa.
Claviculae perfectae.

Fiber. I. C. cauda ovata plana calva. Fn. suec. n. 27. Mus. Ad. Fr.

I. p. 9. Schreber Saeugth. IV. p. 623. t. CLXXV.

Castor castanei coloris, cauda horizontaliter plana. Briff. quadr. p. 133.

Castor. Gesn. quadr. p. 309. aquat. p. 185. Rondel. aquat. p. 236. Aldrov. digit. p. 276. Jonst. quadr. p. 147. t. 68. Raj. quadr. p. 209. Buff. hist. nat. VIII. p. 282. t. 36. Penn. quadr. p. 255. n. 190.

Fiber. Bellon. aq. 30.

Beaver. Catesb. carol. app. p. 29.

Biber. Ridinger kl. Th. t. 84.

β. Castor albus, cauda horizontaliter plana. Briff. quadrup. 135.

Habitat hodienum in Europae, Asiae, Americae borealis ad ripas fluviorum lacuumque solitarias silvas, vicitans corticibus sorbi, salicis, potissimum populi, ligno magnoliae glaucae, radice acori et al. vix piscibus. Lenite graditur, at dexterrime natat, interdiu quietus, profunde dormit, mundissimus; junior facile cicuratur, mitis; monogamus coit hieme erectus; femina 4 mammis instruta per 4 menses gravida 2 parit pullos, rarius 3 - 4. Architectura in construenda ad ripas domo superat, excepta humana, omnium animalium. Aet. Stockh. 1756. p. 207.

Corpus 2½-3 pedes longum, cauda dimidio brevior, quarta sui parte corpori proxima pilosa; pedes pentadae^ctyli, plantae palmatae; oculi parvi, auriculae breves crinitae; collum crassum et breve; corpus torosum, dorso convexo; pili molliores breviores ferruginei, longiores durioresque castanei, quo magis borealem terram inhabitat, eo obscuriores, ut aliquando nigri; alias albi, aut albi maculis

huid
brius.

24.

Coy

zibe
cu

culis cinereis. aut albi interfitis rubris, rariſſime flavescentes. Glandulae ſalivales inſignes, et ad dextram cardiae alia adhuc glandula, quae per 18 patula orificia humorem ſuum largiter in ventriculum effundit. Prope genitalia extera et anum inter binas magnasque glandulas ſebacēas medii haerent duo folliculi cellulosi, graveolens caſtoreum, ſinguli circiter 3ij continentes; ruſſicum et boruſſicum canadensi melius.

Marius J. Caſtorologia. Wien. 1685.

Anatome. Wepfer Eph. N. C. d. I. a. 2. obf. 251. Sarrafin aet. Paris. 1704. p. 48. Aet. Petrop. T. II. p. 415.

huius-
brius.

2. C. cauda compressa lanceolata pilosa, palmis lobatis, plantis palmatis. Molina hift. nat. Chil. p. 253.

Habitat in Chilenium ſluviorum lacuumque profundissimis. Animofum animal pifcibus cancerisque vietitat, diu ſub aqua manet; neque architectura fibri, neque caſtoreum; femina 2-3 pullos parit.

Corpus circiter tripedale; caput fere quadratum; rostrum obtusum; oculi parvi; auriculae breves rotundae; pili ſimiliter duplicitis generis; qui teneriores, mollitie ſuperant pilos cuniculi, ut pelliariis magni aeftimetur pellis in dorſo cinerea, in ventre albida.

24. MUS. Dentes primores ſuperiores cuneati. molares utrinque III, rarius II. Claviculae perfectae.

* cauda apice compressa.

Coypus. 1. M. cauda mediocri ſubcompressa pilosa, plantis palmatis. Molina hift. nat. Chil. p. 255.

Habitat in aquis Chilenib⁹, lutrae facie et colore, dentium numero muri accedens, ut tamen non niſi 2 molares ad utrumque primorum latus habeat. Cauda crassa; pedes pentadactyli; auriculae rotundae. Femina 5-6 pullos parit.

zibethi- 2. M. cauda longa compresso-lanceolata, pedibus fissis. Schre-
cus. ber Saeugth. IV. p. 638. t. CLXXVI.

Caſtor zibethicus. Syſt. nat. XII. I. p. 79.

Caſtor (mus moschiferus canadensis) cauda verticaliter plana, digitis omnibus a ſe invicem separatis. Briff. quadr. 136.

Rat

Rat musqué. *Sarrafis act. Paris. 1725. p. 323. t. II. f. I. 2.*

Desmans rottor. *Kalm it. 3. p. 19.*

Ondatra. *Buffon hist. nat. X. p. I. t. I.*

Musk beaver. *Penn. quadr. p. 259. n. 191.*

Habitat in America boreali ad aquas lentoires, ad quarum ripas domus exstruit, simpliciores tamen, quam castor fiber; victirat etiam conchis, aestate praesertim herbis et fructibus, hieme radicibus, potissimum acori et nymphae; monogamus coit aestate; femina 6 mammis gaudens abdominalibus 3-6 pullos parit, ut nonnulli volunt, ter-quater per annum; dexterrime natat et mergitur; in terra tamen incedens vacillat.

Cauda apice ancipiti ad castorem, eadem longiore ipsaque magnitudine ad murem decumanum, facie et auriculis crinitis satis brevibus ad amphibium proprius accedit; longitudo circiter pedalis, pondus trium librarum; cauda corpore paulo brevior, fusca; digiti plantarum ordinibus pilorum longorum alborum densis ciliati, unguibus rubicundis. Pili molles ex atro fusci. Glandulae sebaceae ad anum humore oleoso moschum aestate potissimum graviter olente plenae.

* * myosuri, cauda tereti calva.

Piloides. 3. M. cauda longiuscula squamata truncato-obtusa, corpore albido. *Pallas glir. p. 91. n. 38.*

Mus (albus zeylonicus) albus, cauda longissima. *Briff. quadr. (ed. bat.) p. 122. n. 8.*

β. Castor cauda linearis tereti. *Brown. jam. p. 484.*

Rat musqué. *Rochef. antill. p. 140.*

Piloris. *Buffon hist. nat. X. p. 2.*

Musk Cavy. *Penn. quadr. p. 247. n. 183.*

Habitat in India, β) in insulis Antillis in antris, quae ipse fodit, etiam in domibus, moschato odore infestus,

Magnitudine ad cobayam accedit; auriculae magnae, calvae; cauda 4 pollicum; palmae tetradaëtylae, ut pollicis locum nodus suppleat; plantae pentadaëtylae.

Caraco. 4. M. cauda longa squamosa obtusiuscula, corpore griseo, plantis subsemipalmatis. *Pall. glir. p. 91. n. 39. p. 335. t. 23. Schreber Saeugth. IV. p. 643. t. CLXXVII.*

Habitat in Siberia quam maxime orientali ad aquas, ad cuius ripas cuniculos fodit; egregie natat; domus etiam frequentat.

Cor-

decun
nus

Ratt

Corpus 6, cauda 4½ pollices longitudine superat; pondus 6–7 uncias aequat. Caput angustum, elongatum; oculi auriculis propiores, quam naribus; palmae tetradactylae, ut verruca pollicis vices suppletat; plantae pentadactylae, digitis plica cutis connexis.

Color dorsi, ut in decumano, fuscus cinereo mixtus, ventris ex albido in cinereum vergens, pedum sordide albus.

decuma- 6. M. cauda longissima squamata, corpore setoso griseo subtus nus. albido. Pallas glir. p. 91. n. 40. Schreber Saeugth. IV. p. 645. t. CLXXVIII.

Mus (norvegicus) cauda elongata, palmis tetradactylis cum unguiculo pollicari, corpore rufo. Erxl. mamm. p. 381. n. 1.

Mus (silvestris) cauda longissima, supra dilute fulvus, infra albicans. Briff. quadr. p. 170. n. 3.

Mus aquaticus. Gejn. aquat. p. 732.

Surmulot. Buff. hist. nat. VIII. p. 206. t. 27.

Norway rat. Penn. brit. zool. p. 47.

Brown rat. Penn. quadr. p. 300. n. 227.

Habitat in India et Persia, unde hoc demum seculo in Europam devenit, ad aquarum ripas antra sibi fodiens, urbes etiam, aquaeductus, cloacas, stabula, horrea, hortos, campos, domus frequentans, cato detectatus, lepori cuniculo cedens, a mustelis domatur; praeter vegetabilia carne quoque, gallinis, ipsisque congenibus vicitat; audacissimus; per hiemem non dormit; aquam non metuit, et dexterime natat; migrat gregatim; femina ter per annum 12–15, imo 18 et 19 pullos parit. An forsan mus caspius Aelianii?

Pondus animalis ab 3vij ad libram unam; corpus adulti longitudine vix superat 9, cauda 7½ pollices; haec ex 200 fere annulis conflata; digitii distinetissimi; mystaces capite producendo longiores; oculi magni nigri prominuli.

Rattus. 12. M. cauda longissima squamosa, corpore atro subtus canescente. Pallas glir. p. 93. n. 41. Schreber Saeugth. IV. p. 647. t. CLXXIX.

Mus (Rattus) cauda elongata subnuda, palmis tetradactylis cum unguiculo pollicari, plantis pentadactylis. Syft. nat. XII. p. 83. Fn. suec. 2. p. 12. n. 33. Müll. prodr. p. 5. n. 31.

Mus (Rattus) cauda longissima, obscure cinereus. Briff. quadr. p. 168. n. 1. Gronov. zooph. p. 4. n. 18.

Mus

Mus domesticus major, quem vulgo rattum vocant. *Gesu.*
quadr. p. 731.

Mus domesticus major sive ratus. Raj. quadr. p. 217.

Rattus. Aldrov. dig. p. 415.

Glis. Jonst. quadr. t. 66.

Sorex. Hufnagel archetyp. p. 3. t. III.

Rat. Buffon hist. nat. VII. p. 278. t. 36.

Common rat. Penn. brit. zool. I. p. 97.

Black rat. Penn. quadr. p. 299. n. 226.

Habitat in Persia et India, nunc etiam, boreali parte excepta, in Europa, ex qua per naves in Africam et Americanam delata esse fertur; in Tahiti tamen frequens, rarioer in reliquis maris australis insulis. Caurus et animosus, parum bibit; sed voracissimus omnia, quae occurunt, comedit, domibus pessimum animal, cibis et utensilibus infestum omnibus; ne suae quidem ipsius speciei parcens; praedatur a bubone aliisque strigibus, a mustelis, non semper a catis. Femina 10 mammis instructa aliquoties per annum 5-6 pullos parit.

Pondus ratti aliquando ad 3vj accedit, rarissime modo 6-7 drachmas aequat. Longitudo corporis vix 8 pollices aequat; cauda aequalis 250 circiter annulis conspicua, tenuis. Color ut plurimum supra nigricans, infra cinereus; rarius supra in fuscum aut cinereum vergens, aut cinereus maculis albis, aut totius animalis albus, oculis rubris.

Muscu-
lus.

13. *M. cauda elongata subnuda, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis: pollice mutico. Fn. suec. 34.*

Mus cauda longissima squamosa, corpore fusco subtus cinerascente. Pallas glir. p. 95. n. 43. Schreber Saugth. IV. p. 654. t. CLXXXI.

Mus cauda longa nudiuscula, corpore cinereo fusco, abdome subalbescente. Fn. suec. I. p. II. n. 31. Mus. Ad. Frid. I. p. 9.

Mus (Sorex) cauda longissima, obscure cinereus, ventre subalbescente. Briff. quadr. p. 169. n. 2. Gronov. zooph. I. p. 4. n. 19.

Mus domesticus minor, cauda longa subnuda, corpore fusco-cinerascente, abdomine albidente. Brown. jam. p. 484.

Mus domesticus vulgaris f. minor. Raj. quadr. p. 219. Sloan. jam. 2. p. 330.

Mus domesticus minor. Aldr. dig. p. 417.

Mus domesticus. Jonst. quadr. p. 165. t. 66.

Mus.

- Gesn. Mus. *Hufnagel archetyp.* p. 1. tab. 3. 10. p. 2. t. 8. p. 4.
 t. 2.
 Souris. *Buffon hist. nat.* VII. p. 309. t. 39. *suppl.* III. p. 181.
 t. 30.
 Common mouse. *Penn. quadr.* p. 302. n. 229.
Habitat in domibus Europae et Asiae mediae, nunc etiam Americae; polyphagus consumit cibaria, cerealia, carnes, cadavera, quae colligit; parum bibt; salax omni anni tempore coit, et fertilissimus, ut femina semper 5-6 pullos pariat; miris, timidus, cursu celerrimus, vix incarcerandus; praedatur a ratto, cato, mustela, erinaceo, strige; in horreis pellitur ebulo et solano nigro.
Longitudine 3½ pollices non superante, et ungue pollicari palmarum nullo a ratto differt.
Varietas nigra, flavescens, albo-maculata, alba maculis cinereis, et nitidissima tota alba oculis rubris rario.
- silvaticus. 17. M. cauda longa squamosa, corpore griseo lutescente subtus lateribusque abrupte albo. *Pallas glir.* p. 94. n. 42.
Schreber Saeugth. IV. p. 651. t. CLXXX.
 Mus cauda mediocri, palmis tetradaethylis, plantis pentadactylis, corpore griseo pilis nigris, abdomine albido. *Syst. nat.* XII. I. p. 84. *Fn. suec.* 2. p. 12. n. 36.
 Mus cauda longa, supra e fusco flavescens, infra ex albo cinerascens. *Briss. quadr.* p. 174. n. 9.
 Mus (campestris major) cauda longissima, fuscus ad latera rufus. *Briss. quadr.* p. 171. n. 4.
 Mus agrestis minor. *Gesn. quadr.* p. 733.
 Mus domesticus medius. *Raj. quadr.* p. 218.
 Mulot. *Buff. hist. nat.* VII. p. 325. t. 41.
 Field-rat. *Penn. quadr.* p. 302. n. 230.
 β. Harvett-rat. *Penn. quadr.* p. 302. n. 231.
Habitat in omnibus Europae silvis, campis, hortis, dumetis, bieme quoque in horreis et domibus; vivitat cerealibus, arborumque seminibus, quae colligit, aviculis quoque, congeneribus, et defectu aliorum propria specie; asperes durissimos saepe uno die perforat; praedatur ab accipitribus, vulpe, putorio, marte.

Magni-

Mures in antris latebrisque habitant, celerrime currunt et scandunt, nonnullae species etiam natant; noctu praeceps victimum querunt, potissimum vegetabilem, quem palmis ori admovent. Feminae & circiter mammis glandent, et plures simul eosque saepius per annum pullos parvunt. Nonnullae species migrant. Auriculae breves rotundatae. Palmarum digiti plerisque modo 4, ut pollicis locum verruca suppletat.

Magnitudine musculum aequat; cauda longitudine corporis, supra nigricans, infra alba; pedes splendide albi. Hujus etiam datur varietas tota alba oculis rubris.

agrarius. 7. M. cauda longa squamosa, corpore lutescente, striga dorsali nigra. *Pallas it. I. p. 454. glir. p. 95. n. 44. et p. 341. t. 24. A. Schreber Saeugth. IV. p. 658. t. CLXXXII.*

Mus rubeus. Schwenckf. ther. Siles. p. 114.

Muris alia species. S. G. Gmelin it. I. p. 151. t. 29. f. 2.

Habitat in Russia a Tanai ad Jenisei fluvium, in Silesia, rarius in Germania, gregarius et migratorius.

*Longitudo vix 3 pollices, pondus vix 3*lb* assequitur. Abdomen cum pedibus album, palmarum pollex ungue exiguo.*

minutus. 8. M. cauda longa squamosa corpore supra ferrugineo subtus albido. *Pallas it. I. p. 454. n. 4. glir. p. 96. n. 45. et p. 345. t. 24. B. Schreb. Saeugth. IV. p. 660. t. CLXXXIII.*

Habitat in imperio russico, in Siberia pulchrior, ut supra eleganter flaveat, infra niveus sit.

Musculo dimidio minor; cauda fere bipollicaris. Femina mare minor minusque pulchra.

foricinus, IO. M. cauda mediocri subpilosa, rostro producto, auriculis orbiculatis vestitis, velleris dorso flavicante griseo, abdomino albido. *Schreber Saeugth. IV. p. 661. t. CLXXXIII. B.*

Habitat Argentorati. Hermann.

Longitudo vix ultra 2 pollices, et 5 lineas; mystacum ordines 7. Ungues brevissimi; cauda unicolor flavescens, cinereo intermixta, subtus magis pilosa. Abdomen album.

vagus. 14. M. cauda longissima nudiuscula, corpore cinereo, fascia dorsali nigra, auribus plicatis. *Pallas glir. p. 90. n. 36. p. 327. t. 22. f. 2. Schreber Saeugthiere, IV. p. 663. t. CLXXXIV. f. 2.*

Mus subtilis. Pallas it. 2. p. 705. n. II. a.

Habitat in desertis inter fluvios Ural, Irtysch et Ob positis satis frequens, in fissuris rupium, infra lapides, truncos arborum; vivitat praesertim seminibus, minoribus etiam animalibus; per hiemem dormit; gregatim migrat.

*Pondus 3*lb* non inferius; longitudine paulo major, quam forcino; pedes tenerrimi albidi; cauda corpore paulo longior, supra cinerea, infra albicans prebensilis. Dentes primores flavi; molares in superiore maxilla 2. Feminis mammae 8. Ungues longi.*

- orporis,
i. Hu-
- ga dor-
p. 341.
XII.
- f. 2.
fia, ra-
- Abdo-
ciguo.
- subtus
45. et
XXIII.
supra
- Femina
- iriculis
abdo-
XIII. B.
- a ordi-
ns, ci-
album.
- fascia
n. 36.
• 663.
- positis
runcos
etiam
- am so-
o lon-
- Dentes
eminis
5. M.
- betuli-
nus. 15. M. cauda longissima nudiuscula, corpore fulvo fascia dor-
fali nigra, auriculis plicatis. *Pallas glir. p. 90. n. 35.*
p. 332. t. 22. f. 1. Schreber Sacugthiere, IV. p. 664.
t. CLXXXIV. f. 1.
Mus subtilis. *Pallas it. 2. p. 705. n. 11. β.*
*Habitat solitarius in betuletis deserti Ilichimenis et Baraben-
sis, etiam inter fluvios Ob et Jenisei; vago satis similis
moribus et facie, paulo tamen minor. Cauda supra fusca,
infra albida.*
- pumilio. 18. M. cauda mediocri nudiuscula, corpore ex fulvo cinereo,
fronte nuda et lineis quatuor dorsalibus nigris. *Sparr-
mann aet. Stockh. nov. ai. 1784. p. 239. tab. VI.*
*Habitat in silvis Sitzicamae pone caput bonaे spei; pondus
θiv.*
- striatus. 19. M. cauda longiuscula subnuda, corporis striis plurimis pa-
rallelis albo-guttatis. *Pallas glir. p. 90. n. 37.*
Mus cauda elongata subnuda, palmis tetradaëtylis, plantis
pentadaëtylis, corpore striis punctatis. *Syst. nat. XII. I.*
p. 84.
Mus cauda longa, striis corporis longitudinalibus ex punctis
albis. *Mus. Ad. Frid. I. p. 10.*
Mus (orientalis) cauda longa, rufus, lineis in dorso albi-
cantibus margaritarum aemulis. *Briffon quadr. p. 175.*
n. 10.
Mus orientalis. *Seb. mus. 22. t. 21. f. 2.*
Oriental rat. *Penn. quadr. p. 304. n. 232.*
*Habitat in India, musculo dimidio minor, fuscescens, 12
seriebus punctorum alborum insignitus, infra albicans,
auriculis brevibus calvis, cauda fere calva longitudine
corporis. An vera propria species?*
- barbarus. 20. M. cauda mediocri, corpore fulvo striis decem pallidis,
palmis tridaëtylis, plantis pentadaëtylis. *Syst. nat. XII.*
Tom. I. P. 2. add.
*Habitat in Africa boreali, musculo minor; supra fuscus li-
neis decem longitudinalibus albidis, infra albicans; cauda
calva annulata, longitudine corporis. An forsan ad ca-
viam releganda?*
- * * * cunicularii cauda terete, pilosa.
- saxatilis. 21. M. cauda longiuscula, auribus vellere majoribus, palmis
subtetradætylis. *Pallas glir. p. 80. n. 19. p. 255. t. 23. B.*
Schreber Sacugth. IV. p. 667. t. CLXXXV.

Habitat in Sibiriae parte quam maxime orientali in fissuris rupium.

Longitudine 4 pollices, pondere 9 drachmas aequat. Rostrum acutum et auriculae ovales fuscae. Dorsum fuscum flavescente mixtum; venter albicans; pedes nigricantes; cauda sesquipollucaris, superius fusca, inferius alba.

Cyanus. 22. M. cauda mediocri subpilosa, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, corpore caeruleo subtus albido. *Molina hist. nat. Chil. p. 266.*

Habitat in regno Chilensi, silvatici facie et magnitudine, sed pilis caeruleis, auriculis rotundis, perquam timidus; magnum in caveis suis, in plures cameras partitis, radicum tuberosarum penum colligit, quam incolae crebro afferunt.

amphibius. 11. M. cauda longitudine dimidia corporis, auribus vix velles prominulis, pedibus subtetradactylis. *Pallas glir. p. 8c. n. 20. Schreber Saeugth. IV. p. 668. t. CLXXXVI.*

Mus cauda elongata pilosa, plantis palmatis. *Syst. nat. XII. p. 82. Fn. succ. 2. p. 12. n. 32.*

Mus cauda mediocri, palmis tetradactylis cum unguiculo pollucari, corpore nigricante. *Erxl. mamm. p. 386. n. 3.*

Mus (aquaticus) cauda longa, pilis supra e nigro et flavescente mixtis, infra cinereis vestitus. *Briss. quadr. p. 175. n. 11.*

Mus agrestis major. *Gesn. quadr. p. 733.*

Mus major aquaticus sive ratus aquaticus, et Mus agrestis major macrourus Gesneri. *Raj. quadr. 217. et 219.*

Rat d'eau. *Buffon hist. nat. VII. p. 368. t. 43.*

Water-rat. *Penn. quadr. p. 301. n. 228.*

Eine Maeuseart. *S. G. Gmelin it. I. p. 151. t. 29. f. 1.*

terrestris. β. Mus cauda mediocri subpilosa, palmis subtetradactylis, plantis pentadactylis, auriculis vellere brevioribus. *Syst. nat. XII. p. 82. n. 10. Fn. succ. 2. p. 11. n. 31.*

Mus agrestis capite grandi brachyurus. *Raj. quadr. p. 218.*

paludosus. γ. Mus cauda mediocri pilosa, palmis subtetradactylis, plantis pentadactylis, auriculis vellere brevioribus, ater. *Mant. plant. 2. p. 522.*

niger. δ. Mus amphibius niger.

macula- ε. Mus amphibius macula magna alba dorsali, et linea alba pectorali.

Habi-

Habitat in omni Europa et septentrionali Asia ad mare usque glaciale in aquosis praesertim ripis aquarum praecipitibus, in humido quoque lutosoque agrorum, pratorum, hortorum solo, radices, arborum quoque, rodit, herbarum effodit, hisque praecipue vietit; mordax et animosus; natat et aqua mergitur. Caro Facutis deliciosa, a quibus etiam pellis adaptatur. Femina mare minor, et magis flavescens, mammis 8, 4 pectoralibus, 4 abdominalibus instruta, coitus tempore moschum olet, et Aprili ad 8 usque pullos parit.

Pondus inter 3ij et 3iiij intermedium; longitudo corporis 6 $\frac{1}{2}$, caudae 3 pollicum. Rostrum, prouti truncus, breve et crassum; auriculae ovatae, margine erinitae.

alliarius. 23. M. cauda unciali, auribus majusculis subpilosis, corpore cinereo subtus albido. *Pallas glir. p. 80. n. 18. p. 252. t. XIV. C. Schreber Saeugth. IV. p. 671. t. CLXXXVII.*
Habitat in Siberia ad fluvios Jenisei, Kan et Angara, alliorum bulbis vietitans, quorum magnam penum colligit.
Muri arvali affinis, ut tamen capite, mystacibus et auriculis ad musculum proprius accedat. Palmae tetradae $\ddot{\text{y}}\text{l}\text{a}e$. Cauda 1 $\frac{1}{2}$ pollicem longa, alba, stria dorsali fusca. Corpus 4 $\frac{1}{2}$ pollices longum. Mammae 8.

rutilus. 24. M. cauda unciali, auriculis vellere longioribus, palmis subtetradactylis, corpore supra fulvo subtus cano. *Pallas glir. p. 79. n. 17. p. 246. t. XIV. E. Schreber Saeugth. IV. p. 672. t. CLXXXVIII.*

Habitat in Siberia, varietas minor forsan quoque in Germania; in antris congenerum, arboribus cavis, hieme in acervis frumenti, horreis, domibus; hieme per nivem currit; carnem amat.

Arvali satis affinis; pedes tamen magis pilosi, albi; cauda vix ultra pollicem longa, praeter striam fuscam supra flavescens, subtus alba. Corpus pondere ad 3 $\frac{1}{2}$ ad 3vij, longitudine tres pollices 7 $\frac{1}{2}$ lineas aequat.

gregalis. 25. M. cauda sesquiunciali, auriculis vellere longioribus, palmis subtetradactylis, corpore cinerascente. *Pallas glir. p. 79. n. 16. p. 238. Schreber Saeugthiere, IV. p. 674. t. CLXXXIX.*

Mus socialis. Georgi it. p. 162.

Habitat in Sibiriae orientalis siccis; sub cespite nidum, multis foraminibus pervium, et cameris pro penu radicum,

praesertim lili pomponii et allii tenuissimi condenda cinctum fodit.

Oecono minor, sociali longior, ut feminae sex linearum ultra 4 pollices longitudinem affequantur, maribus pollice brevioribus.

oecono- 26. *M. cauda subsesquiunciali, auriculis nudis in vellere molli latentibus, palmis subtetradactylis, corpore fusco. Pallas glir. p. 79. n. 15. p. 225. t. XIV. A. it. III. p. 692. n. 4. Georgi it. p. 161. Schreber Saeugth. IV. p. 675. t. CXC. Habitat in Sibiria a fluvio Irtysch ad oceanum orientalem usque, in humidis praesertim et profundis vallibus, in quibus sub cespite nidum multiplici exitu, et ad ejus latera cameram aut plures cameras pro condenda insigni, quam colligit, radicum praesertim tuberosarum penu excavat; veris initio coit, quo tempore femina moschum olet, probabiliter pluries per annum, femina tamen non nisi 2-3 pullos semel parit; gregatim migrat linea recta, et aquas in hoc itinere tranat, ab avibus, piscibus, apris, vulpibus aliisque feris turbatur; ab ipsis hominibus non penu modo sua spoliatur, sed ipsum a Jakutis animal quoque comeditur.*

An hoc spectat mus glareolus, a b. O. F. Müller in insula Lalandia repertus, et a Schrebero Saeugth. IV. t. CXC. B. depictus?

laniger. 27. *M. cauda mediocri, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, corpore cinereo lanato. Molina hist. nat. Chil. p. 267.*

Habitat in terrae Chilensis borealibus sub terra, mundus, docilis, mitis et facile cicurandus, vietitac bulbis, cepae potissimum; femina bis per annum 5-6 pullos parit.

Longitudo 6 pollicum; auriculae exiguae acutae; rostrum breve, pili longissimi, telae aranearum in modum teneri, ut Peruani olim lanae optimae in locum adhiberent.

arvalis. 16. *M. cauda unciali, auriculis vellere prominulis, palmis subtetradactylis, corpore fusco. Pall. glir. p. 79. n. 14. Schreber Saeugth. IV. p. 680. t. CXCI.*

Mus (gregarius) cauda corpore triplo breviore subpilosa, corpore griseo subtus pedibusque albis. Syst. nat. XII. I. p. 85.

Mus (terrestris) cauda mediocri, auriculis vellere brevioribus, corpore supra ferrugineo subtus cinereo. Erxleb. mamm. p. 395. n. 7.

Mus

Mus (campestris minor) cauda brevi, pilis e nigricante et
fordide luteo mixtis in dorso, et saturate cinereis in ven-
tre vestitus. Briss quadr. p. 176. n. 12.

Mus campaignolo. Gesn. quadr. p. 733.

Campagnol. Buff. hist. nat. VII. p. 369. t. 47.

Short-tailed rat. Penn. quadr. p. 305. n. 233.

Habitat in omnibus Europae, ipsiusque Sibiriae et Hircaniae
dumetis, campis, pratis et hortis, praecipue ad aquas;
victitat frumento, nucibus, glandibus, quas in fructu an-
tris colligit; a vulpe, putorio, mustela, cato, mure sil-
vatico praedatur; femina aliquoties per annum semper
8-12 pullos parit. Infestatur acaris minutis.

Longitudo 3 circiter pollicum; pondus maris 3vj - 3vj, fe-
minae ad 3sj. An hujus forte varietas Mus (agrestis)
cauda abbreviata, corpore nigro fusco, abdomine cineras-
cente. Fn. suec. ed. 2. p. 11. n. 30?

socialis. 28. M. cauda semunciali, auriculis orbiculatis brevissimis, pal-
mis subtetradactylis, corpore pallido subitus albo. Pallas
glir. p. 77. n. 13. p. 218. t. XIII. B. it. 2. p. 705. n. 10.
Schreb. Saeugth. IV. p. 682. t. CXCII.

Mus alias et mus microurus. S. G. Gmelin it. 2. p. 173.
t. 11. et 3. p. 500. t. 57. f. 2.

Habitat frequens in sicca arena deserti inter fluvios Wolga
et Ural siti; circa mare caspium et in montibus Hirca-
niae, parmas et femina, aliquando cum pullis in antris;
tulipae praesertim bulbis victitat, a mustelis, putoriis,
lutris, cornicibus comeditur.

Pondus circiter 3vj, longitudo 5 lineis superat 3 pollices.

Lagurus. 29. M. brachyurus, auriculis vellere brevioribus, palmis sub-
tetradactylis, corpore cinereo linea longitudinali nigra.
Pallas glir. p. 77. n. 12. p. 210. t. XIII. A. it. 2. p. 704.
Schreb. Saeugth. IV. p. 684. t. CXCIII.

Habitat in solo arenaceo lutoso desertorum flaviis Ural, Je-
nisei et Irtysh adjacentium, singula animalia in nido ro-
tundo angusto; gregatim migrat; victitat potissimum iri-
de pumila, muris quoque aliis speciebus; motu lentiore,
et siti, dum dormit, ad arctomyias accedit; hieme tamen
non obrigescit; salax a primo vere pluries per annum
coit, quo tempore femina moschum olet, quae semper 5-6
pullos parit.

Pondus maris 3viss, longitudo 7½ lineas ultra 3 pollices
aequat; cauda maris sesquilinea longior, quam feminae.

torqua- 30. *M. brachyurus*, auribus vellere brevioribus, palmis pen-
tadactylis, corpore ferrugineo vario, torque interrupta
albida, linea spinali nigra. *Pallas glir.* p. 77. n. 11. p. 206.
t. XI. B. *Schreber Sacugth.* IV. p. 686. t. CXCIV.

*Habitat in parte quam maxime boreali montis Ural et uligino-
nis mari glaciali conterminis; lichene rangiferino et ni-
vali, bulbisque polygoni vivipari vicitat; migrat.*

*Arvali magnitudine, lemno habitu proprius accedit; cauda
obtusa fusca.*

Lemmus. 5. *M. brachyurus*, auriculis vellere brevioribus, palinis pen-
tadactylis, corpore fulvo nigroque vario subtus albo.
Pallas glir. p. 77. n. 10. p. 186. t. XII. A. B. *Schreber
Sacugth.* IV. p. 687. t. CXCV. α . β .

*Mus cauda abbreviata, pedibus pentadactylis, corpore fulvo
nigro-vario. Syst. nat. XII. I. p. 80. Fn. suec. p. 11. n. 29.
aet. Stockb. 1740. p. 75. f. 45.*

Mus Lemmus. Fabric. it. norw. p. 191.

*Mus norwegicus, vulgo Leming. Raj. quadr. p. 327. Worm.
mus. p. 321.*

*Cuniculus (norvegicus) caudatus auritus ex flavo rufo et ni-
gro variegatus. Briss. quadr. p. 145. n. 5.*

Lemmus. *Gesn. quadr.* p. 731. *Olaus Magn. sept.* p. 617.
Bestiola Leem dicta. Aldrov. digit. p. 436. *Jonst. quadr.*
p. 168.

Lemming. *Pontoppid. hist. nat. Norweg.* 2. p. 58.

Leming. *Buffon hist. nat.* XIII. p. 314.

Lapland marmot. *Penn. quadr.* p. 274. n. 202. t. 25. f. 2.

*Habitat in montibus nivalibus Scandinaviae, et parte quam
maxime boreali catenae montium Uralensis, ut tamen po-
sterior ambitu corporis multo minore, unguibus pilisque
multo brevioribus, et colore minus vario potissimum ful-
vo diverget, eo etiam, quod in antris suis penum pabuli
colligat. Vicitat betulae nanae amentis, lichene rangi-
ferino et aliis; mordax, sibilat, bieme sub nive currit;
femina aliquoties per annum 5-6 pullos parit, quo facto,
singulis circiter 10 annis, insigni gelu praesertim immi-
nente, universus animalium exercitus auctumno, noctu
praesertim linea recta, a qua nullo obstaculo deflecti se
sinunt, aut versus mare, aut in planities migrat, quo in
itinere tamen multa aqua submersa, feris accipitribusque
occisa pereunt, et sequente aestate, pauca tamen, in mon-
tes redeunt. Wormii historia animalis e Norvegia.
Haffn. 1653. 4. hunc fissit.*

Anatome. *Bartholin. cent.* 2. p. 301.

- hudso- 31. M. brachyurus, auriculis nullis, plantis pentadactylis,
nius. vitta dorsali ex luteo fuscescente, pectore et abdomine al-
bis. Pallas glir. p. 209. Schreber Saeugth. IV. p. 691.
t. CXCVI.

Habitat in terra Labrador.

*Mas femina longior, ut 5 pollices asequatur; color potissi-
mum cinereus; cauda pilis longis rigidis fordide albis ve-
stita. Pedes breves.*

- mauli- 32. M. cauda mediocri pilosa, auriculis acuminatis, pedibus
nus. pentadactylis. Molina hist. Chil. p. 268.

*Habitat in provinciae Chilenis Maule silvis, marmotae co-
lore et longitudine pilorum affinis, duplo tamen major,
rostro elongato, mystacum ordinibus 4, pedibus pen-
taglyptis, cauda longiore pilosa distans. An ad arcto-
myas relegandus?*

* * * * buccati, buccis facculiferis.

- Acredula. 33. M. buccis facculiferis, auriculis sinuatis, corpore griseo
subtrus albido. Pall. glir. p. 86. n. 22. p. 257. t. XVIII. A.
Schreb. Saeugth. IV. p. 695. t. CXCVII.

Mus migratorius. Pallas it. 2. p. 703. n. 5.

*Habitat in districtu Sibiriae Orenburgensi ad fluvium Ural.
Longitudo corporis 4 polices, caudae annulatae supra fus-
cae, ceterum cum pedibus albae 8 lineas aequat.*

- Cricetus. 9. M. buccis facculiferis, corpore subtrus aterrimo, cicatricibus
lumbaribus detonsis. Pall. glir. p. 83. n. 21. Schreber
Saeugth. IV. p. 695. t. CXCVIII. A.

*Mus cauda mediocri, auriculis rotundatis, corpore subtrus
nigro, lateribus rufescientibus: maculis tribus albis.
Syst. nat. XII. I. p. 82.*

Glis Cricetus. Klein quadr. p. 56.

*Glis (Marmota Argentoratenis) ex cinereo rufus in dorso,
in ventre niger, maculis tribus ad latera albis. Briss.
quadr. p. 166.*

Porellus frumentarius. Schwenckf. ther. p. 118.

Cricetus. Agricol. subterr. p. 486. Gesn. quadr. p. 738.

Raj. quadr. 221. Claudio E. N. C. dec. III. n. 5. p. 376.

*Hamster. Buffon hist. nat. XIII. p. 117. t. 14. Meyer Thie-
re, Norib. 1748. fol. t. 81. 82. S. G. Gmelin it. I. p. 33.
t. 6. Sulzer Versuch einer Naturgeschichte des Hamsters.
Gotha 1773.*

German marmot. Penn. quadr. p. 271. n. 200.

6. *Cricetus totus niger*. *Lepechin* it. I. p. 192. t. 15. *Pallas* it. I. p. 128. *Georgi* it. 2. p. 851. *Sulzer Naturg. des Hamsters*. fig. in titul. *Schreb. Saeugth.* IV. t. CXCVIII. B. *Habitat in Siberia et Russia australi, Polonia, Slavonia, Hungaria, Silesia, Bohemia, et Germania transrhena*, *prae-*
fertim Thuringia; Cavernas fodiunt singula animalia sub-
terra plurimis concamerationibus, duplice foramine: al-
tero obliquo aditu, in quo etiam sterquilinium deponunt,
altero perpendiculari specula; vicinitat per aëstatem herbis,
radicibus et fructibus, rarius carne et animalibus; colligit
pro autumno biemisque initio frumentum, fabas, pisa,
viciae, lini semina, pinguis per alteram biemis partem
dormit; Aprili coit; femina 8 mammis instructa per men-
sem circiter gravida aliquoties per annum, prima vice
3-4, post 6-9 pullos parit. Lente currit, nec scandit,
aut celerrime fodit, pedibus posterioribus insistere potest;
interdix ut plurimum latet, mordicus se defendit, et bre-
vi afferem sesquipolligare perforat; a putorio, mustelis,
catis, canibus, vulpibus, accipitribus occiditur, homini
ob noxas arvis illatas detestatus, ob pellem frumentique
penum, rarius ob carnem aestimatus, occiditur arsenico,
aut veratri pulvere cum farina et melle in pulm cocto.
Mas femina duplo major, ut $1\frac{1}{4}$ libram medicam pondere,
longitudine 10 pollices aequat. Color variat, rarissimi
sunt criceti toti candidi aut flavescentes, vix frequentiores
albi nigris maculis, aut nigri albis in dorso maculis, aut
rōstro albo fronteque cinerascente, aut maxilla inferiore
alba conspicui. Cauda $2\frac{1}{2}$ pollicum, pilis longis tecta;
Pedes breves, anteriores tetradaëtyli cum verruca polli-
cari ungue rotundato instructa, posteriores pentadaëtyli.

'arenarius. 34. *M. buccis sacculiferis* corpore cinereo lateribus subtusque
 albo, cauda pedibusque albis. *Pallas glir.* p. 36. n. 24.
 p. 265. t. XVI. A. it. 2. p. 704. n. 7. *Schreb. Saeugth.*
 IV. p. 707. t. CXCIX.

Habitat in deserto arenoso Barabae ad fluvium Siberiae Ir-
tysch; mordax, et, noctu praecipue, agilis, amat potif-
simum legumina astragali tragacanthoidis.

Pondus 3vij, longitudo $3\frac{1}{2}$ pollicum; pili tenerrimi; palmae
tetradaëtylae; myltaces capite magno longiores.

'phaeus. 35. *M. buccis sacculiferis*, corpore caudaque fusco-cinerascen-
 tibus subtus albis. *Pall. glir.* p. 86. n. 23. p. 261. t. XV. A.
Schreber Saeugth. IV. p. 708. t. CC.

Mus alpinus. Hablizl apud S. G. Gmelin it. IV. p. 172.
Habi-

Pallas
g. des
VIII. B.
, Hun-
, prae-
lia sub-
re: al-
onunt,
herbis,
colligit
, pisa,
partem
r men-
a vice
randit,
poteſt;
et bre-
uſtelis,
domini
ntique
ſenico,
cto.
ndere,
riſſimi
ntiores
, aut
feriore
tecta;
polli-
ſyli.
tusque
n. 24.
eugth.
iae Ir-
potif-
almae
raſcen-
XV. A.
72.
Habi-

Habitat in deserto Sibiriae prope Zarizyn; et in montibus Persiae funamisicis, campis oryza confitis damnosus; hieme non dormit.

Pondus 3vj, longitudo 5 lineas ultra 3 pollices, caudae 9-9½ lineas aequat; auriculae et ſtria caudae longitudinalis fuſeſcunt.

fongarus. 36. M. buccis facculiferis, dorſo cinereo, linea spinali nigra, lateribus albo fuſcoque variis, ventre albo. *Pallas glir. p. 86. n. 25. p. 269. t. XVI. B. it. II. p. 703. n. 6. Schreber Saeugth. IV. p. 709. t. CCI.*

Habitat in Sibiriae deserto arenoso Baraba ad fluvium Irtyſch, cum reliquis hujus tribus antra pro colligendo viētu fodiens.

Pondus 3v - 3vß; longitudo corporis 3 pollicum, caudae crassae, obtusae, pilosae 4½ linearum; verruca pollicaris absque ungue; mystaces capite breviores; auriculae longiores.

Furunculus. 37. M. buccis facculiferis, corpore supra griseo, ſtriga dorsali nigra, subtus albido. *Pallas glir. p. 86. n. 26. p. 273. t. XV. A. Schreb. Saeugth. IV. p. 710. t. CCII.*

Mus barabensis. Pallas it. II. p. 704. n. 8.

Furunculus myodes. Mefferschmid Mus. Petrop. p. 343. n. 109.

Habitat in Dauria, deserto Sibiriae Baraba ad fluvium Ob et inter fluvios Onon et Argun; astragalorum atriplicumque ſeminibus viēlitans, arenario affinis, 3 pollices longus; auriculae magnae, ovales, pilis nigris, margine albo; cauda pollicaris, tenuis et acuta; verruca pollicaris ungue instruēta.

* * * * * *subterranei, auriculis nullis, oculis minimis, cauda abbreviata aut nulla.*

talpinus. 38. M. brachyrus fuscus, dentibus primoribus supra infraque cuneatis, auriculis nullis, palmis pentadactylis foſſoriis. *Pallas glir. p. 77. n. 9. p. 176. t. XI. A. et nov. comm. Petrop. 14. p. 568. t. 21. f. 3. Schreb. Saeugthiere, IV. p. 711. t. CCIII.*

Spalax minor. Erxl. mamm. p. 379.

Habitat in Russiae temperatoris planiciebus, in humo, quam criceti in modum perforat; singula animalia cavernam ſibi fodunt; lathyri tuberosi, phlomidis tuberosae tuberibus, tulipae bulbis praefertim viētitat; per hiemem non

*non dormit; per diem visus debilis; coit initio Aprilis,
quo tempore zibethum olet; femina 3 - 4 pullos parit.
Muri amphibio affinis.*

Pondus 3ij aliquando, longitudo 3 pollices et 9 lineas aequat.

capensis. 39. *M. brachyurus*, dentibus primoribus supra infraque cuneatis, auriculis nullis, palmis pentadactylis, ore albo. *Pallas glir. p. 76. n. 8. p. 172. t. VII. Schreb. Sacugth. IV. p. 713. t. CCIV.*

Hainster. Kolbe Vorgeb. d. gut. Hofn. p. 158.

Taupe du cap de bonne esperance. Buff. hist. nat. Amsterd. Suppl. V. p. 22. t. 9.

Habitat in capite bonaे spei, hortis infestus.

Longitudo 5½ pollicum. Caput rotundatum.

mariti-
mus. 40. *M. brachyurus* dentibus primoribus superioribus sulcatis, auriculis nullis, pedibus pentadactylis, corpore supra albidō flavescente mixto, ad latera et subtus ex albo cinereo. *Schreber Sacugth. IV. p. 715. t. CCIV. B.*

Zand-moll. Mason. act. angl. Vol. 66. P. I. p. 304.

Taupe du cap. la Caille journ. p. 299.

Taupe des dunes. Allamand apud Buffon hist. natur. Amst. Suppl. V. p. 24. t. X.

Habitat in capitis bonaе spei collibus arenariis maritimis, quos cuniculis suis excavat; lente currit, celerius fodit; mordax; vietitatem radicibus bulbisque ixiarum, antholyzorum, gladiolorum, iridum.

Capensi affinis, capite tamen magis conico; longitudo pedalis; cauda pilosa; dentes primores inferiores longiores pro arbitrio animalis removeri a se invicem possunt.

Aspalax. 41. *M. brachyurus*, incisoribus supra infraque cuneatis, auriculis nullis, unguibus palmarum elongatis. *Pallas glir. p. 76. et 165. t. X. et it. III. p. 692. Schreber Sacugth. IV. p. 716. t. CCV.*

Mus myospalax. Laxmann sibir. Brief. p. 75. act. Stockh. 1773.

Habitat in Dauria, et ultra fluvium Irtysh inter Alei et Tscharysch in humo nigra aut arena compacta, quam naribus pedibusque fodiendo cuniculos sibi longissimos patrat; lilii pomponii et erythronii, aliis quoque radicibus bulbisque vietitat.

*Longitudo a 5 - 8½ pollices. Cauda teres obtusa calva.
Color supra ex flavo cinerascens, subtus ex albo cinereus.*

Aprilis,
parit.
aequat.
cunea-
albo.
acugth.
msterd.
ulcatis,
pra al-
inereo.
Anst.
itimis,
fodit;
ntholy-
peda-
giiores
, auri-
is glir.
ueugth.
Stockh.
Alei et
quam
ios pa-
ticibus
calva.
ereus.
2. M.

Typhlus. 42. *M. ecaudatus*, palmis pentadactylis, incisoribus supra infraque latis, oculis auriculisque nullis. *Pallas glir.* p. 76, n. 6. p. 154. t. VIII. *Schreber Saeugthiere*, IV. p. 718. t. CCVI.

Mus oculis minutissimis, auriculis caudaque nullis, corpore rufo cinereo. *Lepechin it.* I. p. 238. et nov. comm. *Petrop.* XIV. p. 504. t. XV. f. 1.

Spalax microphthalmus. *Güldenstaedt nov. comm. Petrop.* XIV. p. 409. t. 8. 9.

Spalax major. *Erxl. mamm.* p. 377.

Slepez. *S. G. Gmelin it.* I. p. 131. t. 22.

Habitat in Russia australi, in cespite humum nigrum contegente antrum (*singula animalia sibi proprium*) dentibus, capite, pedibus, ipsoque ano fodiens; radicibus, praesertim chaerophylli bulbosi vicitat; cum loco oculorum bulbillos tantum cute velatos habeat, caecutit, tanto acutiore auditu tactuque gaudens; mordicus se defendit; vere et aestate coit; femina 2 mammis instructa 2-4 pullos parit.

Pondus 3vij superat, longitudo 8 pollices vix aequat; pili molles, dense appressi, ferruginei cinereo admisto. Dentes primores rugosi.

ARCTOMYS. Dentes primores cuneati, 2 in utraque maxilla.

molares superiores utrinque 5,
inferiores 4.

Claviculae perfectae.

Marmota. I. A. capite auriculato, corpore fusco subtus rufescente. *Schreber Saeugth.* IV. p. 722. t. CCVII.

Mus capite gibbo auriculato, cauda villosa brevi, palmis te tradaetylelis, corpore fusco subtus rufescente. *Pallas glir.* p. 74. n. 1.

Mus cauda abbreviata subpilosa, auriculis subpilosis, buccis gibbis. *Syst. nat.* XII. p. 81. n. 7.

Mus alpinus. *Gesn. quadr.* p. 743. fig. p. 744. *Aldr. dig.* p. 445. *Zonst. quadr.* t. 67. *Raj. quadr.* p. 221.

Mus montanus. *Matthiol. comm.* p. 368.

Glis (*Marmota alpina*) pilis e fusco et flavicante mixtis veltus. *Briss. quadr.* p. 165. n. 6.

Glis (*Marmota*) corpore supra fusco-cinereo, subtus cinereo-flavescente. *Erxl. mamm.* p. 358. n. 1.

Glis

Glis Marmota Italica. Klein quadr. p. 56.

Marmotte. Buffon hist. nat. VIII. p. 219. t. 28.

Alpine Marmot. Penn. quadr. p. 268. n. 594.

Habitat in alpibus Sabaudicis, Helveticis, Rhaeticis, Noricis, Pyrenaicis, arboribus denudatis, siccis, apricis summis; vietit radicibus, herbis, gramine tenerrimo, et potissimum mutellina; cicurata, quicquid offertur; parum bibit; solem amat; per tribus 5-9-12-14 habitat, custode adventum hostis per sibilum indicante, quem fugiunt omnes, et si non amplius possint, mordicus se defendunt; alias cavernas, multis cuniculis instructas et aditibus, per quos effugit, sibi pro aestate, alias, in quibus ore allatum foenum pro lecho colligit, et a fine Septembris ad Martium usque alto somno sepulta jacet, pro hieme; manibus cibum ori admovet; talis incedit; saepe erecta; facilis in planicie, quam sub terra capit; facile cicuratur, caloris amantissima, rebus cibariis, vestimentis, supellecili noxia, vix in conclavi calido somni hiberni obliterata; coit Aprili et Mayo; femina per 6-7 septimanas gravida 2-4 pullos parit. Am Stein.

Pondus marmotae, auctummo ipso, 9 libras, longitudo pedem et tres pollices non excedit. Caput crassum, vertice plano, rostro crasso atque obtuso, dum sedet animal, saepe erectum; maxillae inferioris partes binae mobiles; auriculae pilosae cinereae; genae pilis longioribus tectae et cinetae. Mytaces utrinque serie 6plici; verruca nigra supra oculos setis 6, infra oculos setis 7. Corpus breve, crassum; futura a gula ad annum. Pedes breves; palmarum pollex conicus, ungue plano obscuro; cauda recta, 6 pollicum, longis pilis vestita, apice ex atro fuso. Caro sapida, tenera. Pinguedo et ipsa pellis monticolis usitatum remedium.

Monax. 2. A. capite auriculato, rostro caerulecente, cauda longiuscula villosa, corpore griseo. Schreb. Sacugth. IV. p. 737. t. CCVIII.

Mus capite gibbo auriculato, rostro caerulecente, cauda longiuscula villosa, palmis tetradactylis, corpore griseo. Pallas glir. p. 74. n. 2.

Mus cauda mediocri pilosa, corpore cinereo, auriculis subrotundis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis. Syst. nat. Ed. XII. p. 81. n. 8.

Glis (Marmotta americana) fuscus, rostro e cinereo caerulecente. Briss. quadr. p. 164. n. 5.

Glis

Bobad

Emp

Glis (Monax) corpore fusco, lateribus ventreque pallidioribus. Erx. mamm. p. 361.

Monax. Edw. av. 2. t. 104. Buffon hist. nat. XIII. p. 136. suppl. III. p. 175. t. 28.

Maryland Marmot. Penn. quadr. p. 270. n. 198.

Habitat in America septentrionali paulo calidiori ad insulas Bahamicas, cavernas in rupibus fodit, sub arboribus casuis hybernans.

Lepore cuniculo paulo major; rostrum magis acutum, quam marmotae; auriculae subrotundae; unguis longi et acuti; cauda corpore dimidio brevior, nigricans. Cl. Alstroemer.

Bobac. 3. A. capite auriculato, cauda villosa, palmarum ungue pollicari, corpore griseo subtus luteo. Schreb. Saeugth. IV. p. 738. t. CCIX.

Mus (Arctomys) capite gibbo auriculato, cauda brevi villofa, palmarum ungue pollicari, corpore griseo subtus luteo. Pallas glir. p. 75. 97. 98. t. 5.

Glis (Marmotta polonica) flavicans, capite rufescente. Briss. quadr. p. 165.

Bobak. Rzaczinski hist. nat. Pol. p. 235. Buffon hist. nat. XIII. p. 136. t. 18. Forster act. angl. Vol. 57. p. 343. Penn. quadr. p. 268.

Habitat in siccis et apricis montium planitiebus a Borysthenis ripis per medianam et temperatiorem Asiae partem ad Sinam et Camischatcam usque; cavernas quoque profundissimas sibi fodens, in quibus 20-24 habitant; mane et meridie prodit, custode tamen sollicite circumspiciente et socios monente; timidum animal, excepta humo pluviis madente, solis vegetabilibus viicitat; palmis se defendit; facile curatur, plantis infidet, manibusque cibum ori admovet; aestate vorax, hieme dormit. Caro esculenta; pinguedo coriariis et pellionariis adhibita.

Pondus animalis libras 14 medicas, longitudo 16 pollices vix excedit. Oculi parvi. Auriculae ovatae; cauda annulata, apice atra, 4 pollices et 4 lineas longa, recta. Mamiae feminae 8.

Empetra. 4. A. capite auriculato, cauda villosa, corpore supra vario subtus rufo. Schreber Saeugth. IV. p. 743. t. CCX.

Mus (Empetra) capite gibbo auriculato, cauda villofa brevi, palmis tetradaetylis, corpore supra vario, subtus rufo. Pall. glir. p. 75. n. 4.

Glis

Glis (canadensis) corpore griseo, ventre cruribusque aurantiis. Erxl. mamm. 363.

Quebec marmot. Penn. quadr. p. 270. n. 199. t. 24. f. 2.

Canadian marmot. Forster aet. angl. LXII. p. 378.

Habitat in Canada, et reliqua boreali America, similiter sibilans; lepore cuniculo vix major, ut longitudo aliquando vix 11 pollices superet; cauda 2½ pollicum.

pruinosa. 5. A. capite auriculato, cauda pedibusque nigris, dorsi, laterum et abdominis pilis duris, longis, basi cinereis, medio nigris, apice albidis.

Hoary Marmot. Penn. bift. p. 398. n. 261.

Habitat in borealis Americae septentrionalis, habitu monachis; nasi apex niger; auriculae ovatae; genae albidae; vertex et unguis fuscus.

Citillus. 6. A. auriculis nullis, cauda villosa, corpore vario. Schreb. Saeugth. IV. p. 746. t. CCXI. A. B.

Mus capite gibbo, auriculis nullis, cauda brevi villosa, corpore vario! Pallas nov. comm. Petrop. XIV. p. 549. t. 21. f. 1. 2. et glir. p. 76. 119. t. VI. VI.B.

Mus cauda abbreviata, corpore cinereo, auriculis nullis. Synt. nat. XII. I. p. 80. n. 4.

Mus Suslica. Guldens. nov. comm. Petrop. XIV. p. 389. t. 7.

Mus noricus f. Citillus. Agric. subt. p. 485. Gesn. quadr. p. 835. Raj. quadr. p. 220. Rzacz. pol. p. 235. auct. p. 327.

Citellus. Schwenckf. Sil. p. 86. Aldr. dig. p. 436.

Cuniculus (germanicus) caudatus, auriculis nullis, cinereus. Briff. quadr. 147. n. 6.

Glis (Citellus) auriculis nullis. Erxl. mamm. 366.

Orientalischer Hamster. S. G. Gmelin it. p. 30. t. 5.

Casan Marmot et Earleso Marmot. Penn. quadr. p. 273. et 276. n. 201. et 203. t. 25. f. 1.

Zisel et Suslic. Buffon bift. natur. XV. p. 139. 144. 195. Suppl. III. p. 191. t. 31.

Habitat in Russia australi ad Kamtschateam usque et insulas huic Americaeque intermedias, Persiam et Sinam, rarius bodie

Arctomyes hybernant, diurnam vitam agunt, radicibus granisque videntant, quae interdiu conquirunt, scandunt, foduntque atra sub terra, in quibus habitant. Caput ipsis gibbum, rotundatum; auriculae breves aut nullae; corpus crassum; cauda brevis, villosa; palmae tetradaeyleae cum pollice brevissimo; plantae pentadaeyleae; caecum ampliatum.

bodie in reliqua Europa, in campus apertis, siccis, elatis
incultis, in solo cespitoso et lutoso, ad vias publicas, nun-
quam in silvis et paludibus; antra sibi, singula singulis
animalia, femina profundiora fodit, in quibus pro hiemis
initio et fine frumentacea, herbas teneriores, baccas, ra-
vius mures et aviculas colligit; parum bibit; hybernat;
a primis tamen veris auspiciis coelo sereno interdiu victum
quaerit, quem plerumque pedibus anterioribus ori admo-
vet; salit; plantis insidendo dormit; sibilat; facillime ci-
curatur, in primis mas; femina mordacior per 20 - 30
dies gravida Maii initio 3-4-6-8 pullos parit; a pu-
toriis, mustelis, falconibus, ipsisque cornicibus et ardeis
praedatur. Pellis vere bona. Caro nonnullis edulis.

Magnitudo colorque perquam variat; illa nunc marmotam
assequitur, nunc murem amphibium vix aequat; color
plerumque ex einereo flavus, subtus sordide albus, ut ta-
men aliquid undulati vel punctati intersit, cauda conco-
lore; alias supra canus fusco aut flavo undulatim mixtus,
subtus pallide flavescens, cauda longiori fere sciuri; alias
(leucopictus) supra griseus albo-maculatus, subtus ex al-
bo flavescens, orbitalum albus, caudae brevioris, et re-
gionis a naribus ad oculos sitae ex flavo subfuscus. An-
mus ponticus Aristotelis et Plinii?

Gundi. 7. A. capite auriculato, corpore testaceo rufescente. Rothmann
apud Schloëzer Briefw. I. p. 339. Pall. glir. p. 98. not.
Gundi Marmot. Penn. hist. 2. p. 405. n. 264.
Habitat in Barbaria prope Massifin versus montum Atlas.
Magnitudo L. Cuniculi. Auriculae truncatae meatu
amplo.

25. SCIURUS. Dentes primores II, superiores cuneati. inferiores acuti.

molares ad utrumque latus su-
periores V.
inferiores IV.

Claviculae perfectae.

Cauda disticha.

Mystaces longae.

* scandentes.

Vulgaris. I. S. auriculis apice barbatis, cauda dorso concolore. Erxl.
mamm. p. 411. Schreber Saeugth. IV. p. 757. t. CCXII.

K.

Sciur.

Sciurus auriculis apice barbatis, palmis tetradaethylis, plantis pentadaethylis. *Syst. nat.* XII. I. p. 86. n. I. *Faun. suec.* 37.

Sciurus palmis foliis saliens. *Syst. nat.* VI. p. 9. *Mus. Ad. Fr.* I. p. 8.

Sciurus (vulgaris) rufus, quandoque griseo admixto. *Briss. quadr.* p. 150. n. I.

Sciurus vulgaris rubicundus. *Klein quadr.* p. 53.

Sciurus vulgaris. *Raj. quadr.* p. 214.

Sciurus. *Gesn. quadrup.* p. 845. *Aldrov. dig.* p. 396. fig. p. 398. *Jonst. quadr.* p. 163. t. 66. *Schwenckf. theriotr. Sil.* p. 121.

Ecureil. *Buffon hist. nat.* VII. p. 253. t. 32.

Common squirrel. *Penn. quadr.* p. 279. n. 206.

Eichhoernlein. *Ridinger jagdb.* Th. t. 20.

Eichhoernchen. *S. G. Gmelin it.* I. p. 35. t. 7. *Falck Beytr.* 3. p. 311.

varius. ♂. S. hieme caerulecenti-cinereus, aestate ruber, abdomine albo. *Erxl. mamm.* p. 414. α.

Sciurus (varius) ex candido cinereus. *Briss. quadr.* p. 152. n. 4.

Sciurus varius, Varus vulgo dictus. *Aldr. dig.* p. 403. fig. p. 405.

Sciuri, qui mures pontici et a colore varii dicuntur. *Jonst. quadr.* p. 163.

Mus ponticus s. venetus, quem vulgo varium vocant. *Gesn. quadr.* p. 741.

niger. ♀. Sciurus niger. *Erxl. mamm.* p. 415. β.

albus. ♂. Sciurus totus albus, oculis rubris. *Erxl. mamm.* p. 416. γ.

Sciurus albus sibiricus. *Briss. quadr.* p. 151. n. 2.

Sciurus albus. *Wagn. Helv.* p. 185. *S. G. Gmelin it.* I. p. 35. t. 8.

Habitat in Europae, frequentissimus in omnis Russici imperii arboribus silvaticis.

Aestate ruher, abdomine albo, hyeme caerulecenti-cinereus. Viicit nucibus, strobilis, baccis etc. manu cibum ori admovet; superfuum cibum defodit; parum bibit, hieme nivem; cortice lignoque insidens navigare fertur; nidus globosus e muscis; sedens se obumbrat cauda; a marte praedatur; pellis hyberna aestimata, caro edulis. Coit Martio et Aprili; femina per mensem gravida 3 - 4 - 7 pullos parit, bis per annum.

Anatome. *E. N. C. Cent.* 10. app. 449.

niger. 2. *S. niger*, auriculis imberibus. *Erxleb. mamm. p. 417.*
Schreber Saeugth. IV. p. 776. t. CCXV.
Sciurus niger. Syst. nat. XII. 1. p. 86. Klein quadr. p. 53.
Briss. quadr. p. 151. n. 3.
Quauhtechalott thliltic, Sciurus mexicanus. Hernand. mex.
p. 582. Fernand. nov. Hisp. p. 8.
Black squirrel. Catesb. Carol. 2. p. 73. t. 73. Penn. quadr.
p. 284. n. 210. t. 26. f. 2.
Ecureil noir. Buffon hist. nat. X. p. 121.
Habitat in America septentrionali ad novam Hispaniam usque, gregarius, zae infestus, cauda breviore.

vulpinus. 8. *S. rufus cinereo miltus magnus*, auriculis imberibus.
Fox-squirrel. Lawson Carol. p. 124.
Cat-squirrel. Penn. hist. p. 411. n. 273. β.
Habitat in America septentrionali, cinereo major et ravior, cetera satis affinis; pili duriores, quam vulgaris; caudae auricularumque apex rufus. Schoepf.

cinereus. 3. *S. cinereus*, ventre albo, auriculis imberibus. *Erxleb. mamm. p. 418. n. 3.* *Schreber Saeugthiere, IV. p. 766. t. CCXIII.*
Sciurus virginianus cinereus major. Syst. nat. XII. 1. p. 86.
Raj. quadr. p. 215. Klein quadr. p. 53.
Sciurus (virginianus) cinereus, auriculis ex albo flavicantibus. Briss. quadr. p. 153. n. 6.
Sciurus major griseus, cauda extrema comosa, pilis diffusis. Browne jam. p. 483.
Grey squirrel. Catesb. Carol. 2. p. 74. t. 74. Penn. quadr. p. 282. n. 209. t. 26. f. 3.
Petit gris. Buff. hist. nat. X. p. 116. t. 25.
Habitat in Americae septentrionalis arboribus silvaticis, nidificat in cavis arboribus, vulgari simillimus, sed major, ut pedem longitudine aequet, zae pariter aliquando infestus; a crotalo comeditur.

hudso- 12. *S. auriculis imberibus*, dorso glauco, ventre cinereo, cauda breviore ex rufescente glauca nigro marginata. *Forster aet. angl. Vol. LXII. p. 378.* *Pall. glir. p. 377. Schreber Saeugth. IV. p. 777. t. CCXIV.*

Sciuri plerique agiles, structurae delicioris, facile cierandi, scandunt in arboribus, pauci sub terra habitant; fructibus seminibusque vescuntur; alii saliendo currunt, alii quasi volando. Caput latum, auriculis ovalibus longius. Corpus satis crassum; pedes breves, anteriores digitis 4 cum vestigio pollicis, posteriores 5; cauda longa villosa.

Hudson's Bay squirrel. *Penn. quadr. p. 280. n. 206. a. t. 26.*
f. 1.

Habitat in pinetis frigidioris Americae septentrionalis, colore per omnem annum eodem.

carolinensis. 13. S. ex cinereo, albo et ferrugineo mixtus, subtus albus, cauda fusca atro mixta, albo marginata, auriculis imberibus.

Lesser grey-squirrel. *Penn. quadr. p. 283. n. 209. a.*
Habitat in Carolina, vulgari minor, colore variabili.

persicus. 14. S. obscurus, lateribus albus, subtus flavus, auriculis imberibus, cauda ex atro cinerea annulo albo. *S. G. Gmelin it. III. p. 379. t. 43.*

Habitat in alpibus Persiae hircaniceis, colore constanti, vulgari facie moribusque similis; tarsi rubent.

anomalus. 15. S. supra flavus fusco mixtus, subtus obscure fulvus, cauda concolore, auriculis imberibus rotundatis. *Schreber Saeugth. IV. p. 781. t. CCXV. C.*

Habitat in Georgia Asiae. Güldenstaedt.

Vulgari major, ore albo, narium apice nigro, genis fulvis; mystacibus orbitisque fuscis; auriculis flammatis, intus magis albidis.

bicolor. 16. S. supra niger, infra fulvus, auriculis acutis imberibus, palmarum ungue pollicari magno rotundato. *Sparrmann aet. Soc. Gothenburg. I. p. 70. Schreber Saeugth. IV. p. 781. t. CCXVI.*

Javan squirrel. *Penn. hist. p. 409. n. 269.*

Habitat in insula Java, 12 polices longus, cauda ejusdem longitudinis; auriculae crinitae; palmarum ungues acuti, pollex brevissimus; plantae nigrae.

erythraeus. 17. S. supra ex flavo et fusco mixtus, infra ex sanguineo fulvus, auriculis ciliatis, cauda ex sanguineo fulva. *Pallas glir. p. 377.*

Rudly squirrel. *Penn. hist. p. 409. n. 271.*

Habitat in India, vulgari paulo major; stria caudae longitudinalis nigricans; verruca pollicaris magna.

macrourus. 18. S. cauda corpore duplo longiore grisea. *Ind. zool. t. I. Erxleb. mamm. p. 420. Schreber Saeugth. IV. p. 783. t. CCXVII.*

Sciurus zeylonicus, pilis in dorso nigricantibus, Rukkaia dictus. Raj. quadr. p. 215.

Long-

- Long-tailed squirrel. *Ind. zool. t. 1.*
 Ceylon squirrel. *Penn. quadr. p. 281. n. 207.*
Habitat in insula Zeylon, vulgari triplo major, supra niger, infra pallide flavus, auriculis subbarbatis, naribus incarnatis; genarum stria bifurea nigra; macula inter aures flava.
- maximus. 19. S. supra ex rubicundo fuscus, subtus niger, cauda nigra, auriculis subbarbatis. *Schreber Sacugthiere, IV. p. 784. t. CCXVII. B.*
 Le grand ecureil de la côte de Malabar. *Sonnerat voyag. 2. p. 139. t. 87.*
Habitat in regione Indiae Mahé, et littore malabarico, cati magnitudine; vox sonora; visibilitas succo laetio nucum coecos. Auriculae erectae parvae; pili longi; unguis robusti nigri; verruca pollicaris brevissima, ungue instructa. An vere differt a macrouro?
- abessini- 20. S. supra ex ferrugineo niger, subtus cinereus, cauda sesqui-
cus. *Thevenot it. 5. p. 34.*
 Abessinian squirrel. *Penn. hist. p. 408. n. 268.*
Habitat in Abessinia, vulgari triplo major, obscurum adhuc animal.
- indicus. 21. S. cauda longitudine corporis apice aurantia. *Erxl. mantm. p. 420.*
 Bombay squirrel. *Penn. quadr. p. 280.*
Habitat in India circa Bombay, 16 pollices longus, supra sordide purpureus, subtus flavus; auriculae barbatae.
- flavus. 4. S. auriculis subrotundis, pedibus pentadactylis, corpore luteo.
 Sciurus cauda tereti, pilis brevibus, auriculis subrotundis.
Amoen. acad. 1. p. 281.
 Fair squirrel. *Penn. quadr. p. 285. n. 212.*
Habitat Carthagene in America, forsan quoque in Gufurate Indiae.
Magnitudine dimidio minor Sc. vulgari, luteus, apicibus pilorum albis. Pollex anticus solo fere exiguo ungue constat. Auriculae imberbes. An vera sciuri species?
- palma- 5. S. subgriseus; striis tribus flavicantibus, caudaque albo ni-
ruum. groque lineata. *Schreber Sacugth. IV. p. 302. t. CCXX.*
Sciurus (palmarum, Mus palmarum vulgo) coloris ex ruflo et nigro mixti, taeniis in dorso flavicantibus. Briff. quadr. p. 156. n. 10.

Mustela africana. Clus. exot. p. 112. Nieremb. hist. nat. p. 172. Jonst. quadr. p. 153. Raj. quadr. p. 216.
Le palmiste. Buffon hist. nat. X. p. 126. t. 26.
Palm-squirrel. Penn. quadr. p. 287. n. 215.
Habitat in Africæ et Asiae regionibus calidioribus, nucum cocos præfertim amans.
Longitudo corporis 2 pollicum et 10 linearum, caudæ eretæ, non obumbrantis vix minor; color subtus ex cinerascente vel flavescente albus; variat aliquando striis dorsalibus 5. Auriculae breves, latae, subrotundæ, crinitæ.

getulus. 6. *S. fuscus*, striis quatuor albidis longitudinalibus. Schreber Saeugth. IV. p. 806. t. CCXXI.

Sciurus (getulus) coloris ex rufo et nigro mixti, taeniis in lateribus alternatim albis et fuscis aut nigris. Briss. quadr. p. 157. n. II.

Sciurus getulus. Aldrov. dig. p. 405. fig. p. 406. Gesn. quadr. p. 112. Jonst. quadr. p. 163. t. 67. Raj. quadr. p. 216.

Barbaresque. Buff. hist. nat. X. p. 126. t. 27.

Barbarian squirrel. Edw. av. 4. t. 198.

Barbary squirrel. Penn. quadr. p. 287. n. 215. β.

Habitat in Barbariae littore occidentali, praecedenti satis similis, 5 pollices longus, cauda striata; color corporis subtus albus; unguis nigri, verrucae pollicaris palmarum nullus.

striatus. 7. *S. flavus*, striis quinque fuscis longitudinalibus.
Striped Dormouse. Penn. hist. p. 422. n. 286.

asiaticus. α. *Sciurus striatus.* Pallas glir. p. 378. Georgi it. I. p. 163.
Sciurus major variegatus, Furunculus sciuroides Messerschmidii. I. G. Gmelin nov. comm. Petrop. 5. p. 344. t. 9.

Eureil Suisse. Buff. hist. nat. X. p. 126. t. 28.
Bomdoeskje. Le Bruyn it. p. 432. t. 254.

america- β. *Sciurus pallidus*, striis quatuor fuscis longitudinalibus.
nus. Mus. Ad. Frid. I. p. 8. Schreber Saeugth. IV. p. 790. t. CCIX.

Sciurus (carolinensis) rufus, taeniis in dorso nigris, taeniis ex albo flavescentibus intermixtis. Briss. quadr. p. 155. n. 9.

Sciurus a Cl. D. Lyster observatus. Raj. quadr. p. 216.

Ground-

Ground-squirrel. *Laws. Carol.* p. 124. *Catesb. Carol.* 2.
p. 75. t. 75. *Brickell N. Carol.* p. 129. *Edw. av.* 4.
t. 181. *Penn. quadr.* p. 288. n. 216.

Ecureil Suisse. *Charlev. nouv. Fr.* 3. p. 134.

Koesselvissa. *Kalm it.* 2. p. 419.

Habitat α) in omni Asia boreali ad fluvios europaeos Dwina
et Kama usque, β) in America septentrionali magis orien-
tali minusque frigida ad novam Hispaniam usque, in sil-
vis sub terra, in qua criceti more, cum quo communes
etiam habet buccas sacculiferas, cavernas sibi fodit pro
habitaculo condendaque victimus penus, concamerationibus
distinctis; victimat seminibus variis, α) pinus cembrae po-
tissimum, β) zea aliorumque cerealium, adeo ut segeti-
bus infestus sit; β) difficile cicuratur.

Longitudo 6, β) 10 lineis 5 pollices superat; pondus nun-
quam 3ij. Caput magis oblongum, quam praecedentibus;
auriculae breviores, subrotundae, calvae; corpus magis
attenuatum; pedes breviores; pili breves, asperi.

aestuans. 9. *S. griseus* subtus flavescens.

Sciurus (brasiliensis) coloris ex flavo et fusco mixti, taeniis
in lateribus albis. *Briff. quadr.* p. 154. n. 7.

Sciurus brasiliensis. *Maregr. brasili.* p. 230.

Brasilian squirrel. *Penn. quadr.* p. 286. n. 213.

Habitat in Brasilia et Guiana, 8 $\frac{1}{4}$ pollices longus, cauda 10
polices aequante, tereti, pilis nigris flavo annulatis; au-
riculae subrotundae, imberbes.

dschin- 22. *S. testaceus*, fasciis lateralibus orbitisque albis, cauda nigra.

schicus. Sonnerat it. 2. p. 140.

Habitat in provincia Indiae Dschinschi; vulgari paulo major.

variega- 23. *S. corpore supra nigro albo fuscoque variegato.* Erxleb.

tus. mamm. p. 421. Schreber Saeugth. IV. p. 789. t. CCXVIII.

Quauhtecallotlquapachtl aut Coztiocotequallin. Fernand.
nov. Hisp. p. 9.

Coquallin. Buff. hist. nat. XIII. p. 109. t. 13.

Varied squirrel. *Penn. quadr.* p. 285. n. 211.

Habitat in nova Hispania, sub arborum radicibus aliisque in
cavernis, in quibus etiam zea aliorumque cerealium pro-
bieme penum colligit.

Longitudo fere pedalis; auriculae breves, imberbes, una
cum ore albae; caput cetera nigrum aurantio mistum;
mystaces cum unguibus nigrae.

Degus. 24. *S. fuscō-flavescens*, linea humerali nigra. *Molina hist.*
nat. Chil. p. 269.

*Habitat in Chili gregatim circa dumeta in cavernis, quae
confortium inter se alunt; vivit radicibus et fructibus,
quorum penum colligit; non hybernat, ceterum myoxo
gliri satis affinis. Caro olim edulis.*

*Mure ratto paulo major; caput breve, rostrum acutum;
auriculae rotundatae; cauda apice floccosa, concolor.*

mexica- 25. *S. cinereo-fuscus*, striis 5 - 7 albidis longitudinalibus.
nus. *Erzl. mamm. p. 428. n. 12.*

*Sciurus (novae Hispaniae) obscure cinereus, taeniis in dor-
so albicantibus. Briff. quadr. p. 154. n. 8.*

*Sciurus rarissimus ex nova Hispania, taeniis albis. Seb.
muf. I. p. 76. t. 47. f. 2.*

Tlamototl. Fern. an. p. 9.

Mexican squirrel. Penn. quadr. p. 286. n. 214.

*Habitat in nova Hispania, 5½ pollices longus, cauda paulo
longiore; auriculae margo calvus; mas taeniis 7, femi-
na 5.*

madagaf- 29. *S. palmarum* digito medio calvo, valde elongato, planta-
cariensis. *Aye-Aye. Sonner. it. 2. p. 137. t. 86.*

*Habitat in occidentali parte insulae Madagascar; cauda lon-
ga non mensurata ultra 18 pollices longus, sub terra vi-
vens, ignavus, timidus, somnolentus, vermis vivit, vici-
nos digitorum ope ex arborum foraminibus extrahit, du-
bi generis, gressu moribusque bradypodi affinis, dentibus,
cauda, pedibus pentadactylis sciuro propior.*

*Auriculae amplae, complanatae, nigrae, pilis longis horri-
dae; fasciculi pilorum supra oculos et nares, in genis et
mento; lanugo ex albo fulva; pili longi nigri; facies et
guttur ex albo fulvum; cauda sesquipedalis, complanata,
pilis longis densis a basi ad medium albis, altera parte ni-
gris testa; digitus pedum longi, unguibus palmarum omni-
bus, plantarum 4 subulatis, uncinatis.*

* * vo-

*An Sciurus gujanensis Bancrofti, ad vulgarem facie et magnitudine accedens, supra ex
pallido flavescente fuscus, lateribus subtusque albus, cauda longissima villosa ma-
culata, et Sc. gujanensis de la Borde, mordax, facile tamen cicurandus, ru-
fescens, ratto non major, solitarie in silvarum arboribus degens, maripae, auranæ,
comonæ seminibus vivit, semel per annum 2 pullos pariens, propriam consi-
tuant speciem, judicent antoptae.*

*** volantes.

Volucel- 26. *S. hypochondriis extensis volitans, cauda elongata villosa.*
la. *Pallas glir. p. 353. 359. Schreber Saeugth. IV. p. 808.*
t. CCXXII.

Mus (volans) cauda elongata villosa, palmis tetradactylis,
plantis pentadactylis, hypochondriis extensis volitans.
Syst. nat. XII. I. p. 75. n. 21. Mus. Ad. Fr. 2. p. 10.
Sciurus minimus, hypochondriis prolixis volans, ventre al-

bido. Brown. jam. p. 438.

Sciurus americanus volans. Raj. quadr. p. 215.

Quimichpatlan. Fern. nov. Hisp. p. 8.

Flying squirrel. Catesb. Carol. 2. p. 76. t. 76. 77. Edw.
av. 4. t. 191. Penn. quadr. p. 418. n. 283.

Ecureil volant. de Pratz Louisian. 2. p. 98.

Polatouche. Buffon hist. nat. X. t. 21.

Habitat in temperatori et calidiori Americae septentrionali parte in silvarum arboribus gregatim, fructibus semi-nibusque visitans, quae vespere noctuque conquirit, interdiu in nido ex foliis parata dormiens; facile et egregie curandus.

Corpus 5 pollices longum; caput paulo crassius; oculi maxi-mi prominuli nigri; auriculae subrotundae, pellucidae, subcalvae, ex griseo cinereae; mystaces nigrac, capite longiores; collum breve; pili tenerrimi, mollissimi, supra cinerei, apice flavi, subtus in medio albi, in ambitu ci-nerei; cauda teres, 4 pollicum. Cutis ab auribus ad brachia, et femora et caudam extensa, anterius ad bra-chia ad digitos usque et ad proprium ossiculum, calcare simile et tarso affixum firmatum, posterius ad femora ad tarsum usque; quam cutem dum extensis brachiis et fe-moribus tendit, in aere suspenditur, et recta via quasi volando movetur; natat etiam.

hudso-nius. 27. *S. hypochondriis prolixis volitans, supra ex rubicundo fuscus, subtus ex flavescente albido, cauda villosa plana,*

Sciurus volans major. Pallas glir. p. 354.

Greater flying squirrel. Forster act. angl. 62. p. 379.

Severn River squirrel. Penn. hist. p. 418. n. 282.

Habitat in America septentrionali circa sinum Jacobi et flu-vium Severn, vulgari vix major. Pili sat longi, basi ex atro cinerei, apice ex rubicundo fusi. Cutis tensilis, ut in Volucella.

volans. 10. *S. hypochondriis prolixis volitans, cauda rotundata. Schreber Saeugth. IV. p. 813. t. CCXXXIII.*

Sciurus hypochondriis prolixis volitans. Fn. succ. 2. p. 13. n. 38. Mus. Ad. Fr. I. p. 8.

Sciurus (volans) obscure cinereus cute ab anticis cruribus ad postica membranae in modum extensa volans, et (sibiricus volans) dilute cinereus, cute ab anticis cruribus ad postica extensa, volans. Brisson quadr. p. 157. n. 12. et p. 159. n. 13.

Sciurus volans. Rzacz. aet. p. 316. Klein aet. angl. 1733. t. 35. f. 1. Seb. mus. I. p. 67. t. 41. f. 3. Pallas glir. p. 355.

Sciurus petaurista volans. Klein quadr. p. 24.

Mus ponticus aut scythicus, Sciurusve, quem volantem cognominant, licebit et Sciurum latum nominare. Gesn. quadr. p. 743.

Quadrupes volatile Russiae. Duvernoi Comm. petrop. 5. p. 218.

Polatouche. Buffon hist. nat. X. p. 95.

Flying squirrel. Penn. quadr. p. 293. n. 221.

Habitat in betuletis Sibiriae, rarius Lapponiae, Livoniae, Poloniae, excepto coitus tempore solitarius, betulae gemmis, turionibus, amentis potissimum vittitans; interdiu latent, ceterum hieme etiam, temperatori aere nidum ex muscis in arboribus cavis confectionum relinquunt; membranae inter femora expansae auxilio per altitudinem 20 et plurium orygarum devolvitur; sibilat; mordax; difficile cicurandus. Femina Majo 2-3, rarius 4 pullos parit.

Diffrerit a Sc. Volucella magnitudine plus tota tertia parte excedente, colore non in flavum inclinante, sed supra candide leucophaeo subtus candidissimo, caudaque supra vix fuso inumbrata; forma capitis breviore et magis globosa; cauda breviore ex paucioribus vertebris composita, vix dimidiam corporis longitudinem excedente; oculis naso propioribus, circulo magis atro cinetis, artibus anterioribus brevioribus, at posterioribus tibiis longioribus. Pallas.

Petau
ita

MY

Glis.

Sagitta. 11. *S. hypochondriis prolixis volitans, cauda plano-pinnata lanceolata.*

Habitat in Java. Nordgren.

Tota statura sciuri vulgaris, palmam longus praeter caudam, supra ferrugineo-fuscus, subtus ferrugineo-pallidus. Caput ovatum. Auriculae ovatae obtusae vestitae;

Mylla-

Mystaces longitudine capitis. Seta una in mala. Labium superius fessum, inferius breve. Dentes fusi, obtusifusculi. Pedes 4 - 5. Manuum calcar setaceum, cartilagineum, longitudine ipsius ulnae intra cutem. Cutis extensa a capite ad carpum; a carpo ad genu in membranam testam concoloram ciliatam. Femora postice ciliata pilis. Pedes subtestacei; digiti omnes ultimo geniculo supra prominuli. Ungues compressi. Scrotum ovatum; magnum, vestitum. Praeputium elongatum vestitum. Cauda longitudine corporis, valde depressa, obtusa.

- Petauri- 28. *S. hypochondriis prælixis volans, supra saturatissime ex-
sta. castaneo, subtus dilute ferrugineus, vel supra niger, sub-
tus canus, cauda corpore longiore, villossima, terete, ni-
gricante, medio ferruginea. Pallas miscell. zoolog. p. 54.
t. VI. f. 1. 2. Schreber Sæugth. IV. t. CCXXIV.*
*Sciurus maximus volans s. Felis volans. Briss. anim. Lugd.
B. 1762. p. 112. n. 15.*

*Civetta volans. Valent. Ind. 3. p. 269. 270.
Taquan. Hist. gen. des voyag. XV. l. 4. f. 9. p. 51.
Habitat in oceani indici insulis, congeneribus major, ut pe-
dem et sex pollices longitudine aequet; caput magis globo-
sum; mystaces unguisque nigri; feminæ mammae 6 pe-
ctorales et abdominales, papilla longa, linearis.*

MYOXUS. Dentes primores II. superiores cuneati. inferiores compressi.

Mystaces longae.

*Cauda villosa teres versus apicem cras-
fior.*

*Pedes aequalis longitudinis, anteriores te-
tradactyli.*

- Glis. I. *M. canus subtus albidus. Schreb. Sæugth. IV. t. CCXXV.
Sciurus canus subtus albidus. Syst. nat. XII. 1. p. 87. Erxl.
mamm. p. 429.
Sciurus epilepticus, cinereus prussicus. Klein quadr. p. 54.
Mus cauda pilosa, corpore supra obscure cinereo, subtus ex-
albido. Briss. quadr. 160.
Mus Glis. Pall. glir. p. 88. n. 33.
Glis. Gesn. quadr. 619. Aldrov. dig. p. 407. fig. p. 409.
Jonst. quadr. p. 164. t. 67. Raj. quadr. p. 229.
Loir.*

Loir. *Buffon hist. nat.* VIII. p. 158. t. 24.

Fat squirrel. *Penn. quadr.* p. 289. n. 217.

Habitat in Europae et Asiae australis silvis, Eleioς Aristoteles, Muoξος Oppiani, glis Plinii, olim apud Romanos ob carnem sapidam in glirariis nutrita; vivit glandibus, nucibus, pomorum seminibus; nidificat in cavis arborum, pullis 9-12; mordax; interdiu latet; autumno pinguefit; Octobri gregatim migrat in latebras subterraneas, ibique hybernat in finem Maji usque. Peles ob pilos molissimos venduntur.

Longitudo corporis 6 pollicum, caudae canae 5; auriculae tenues nudae; genae albae; mystaces capite longiores. Mammae 10, 6 pectorales, 4 abdominales.

Dryas. 2. M. ex griseo rufus subtus sordide albus, linea nigra recta, utrinque per oculos ad auriculas ducta. *Schreber Saeugth.* IV. t. CCXXV. B.

Colore, cauda breviore, magis villosa, maculae nigrae ponere auriculas defecuta a Nitela diversus.

Nitela. 3. M. rufus subtus ex albo cinereus, macula nigra circa oculos et pone auriculas. *Schreb. Saeugth.* IV. t. CCXXVI.

Mus (quercinus) cauda elongata pilosa, macula nigra sub oculis. *Syst. nat.* XII. I. p. 84. n. 15.

Mus Nitedula. *Pallas glir.* p. 88. n. 32.

Sciurus canus subtus albidus, macula nigra sub oculis. *Erxl. mamm.* p. 432. n. 15.

Glis supra obscure cinereus, infra ex albo cinerascens, macula ad oculos nigra. *Briss. quadr.* 161.

Mus avellanarum. *Gesn. quadr.* p. 833. *Jonst. quadr.* p. 168. t. 66.

Mus avellanarum major. *Aldr. dig.* p. 439. *Raj. quadr.* p. 419.

Lerot. *Buff. hist. nat.* VIII. p. 181. t. 25.

Garden-squirrel. *Penn. quadr.* p. 290. n. 218.

Habitat in Europae et Sibiriae australis praesertim hortis, quorum fructus omnis generis destruit, praesertim persica mala amat; nidificat in rimis murorum et cavis arboribus; coit vere, parit aestate 5-6 pullos; fortis ratti odorem spirat.

Corpus 5, cauda 4 pollices longitudine non excedit; oculi majusculi, nigri; auriculae oblongae.

Muscardinus. 4. M. rufus, gula albicante, plantarum pollicibus muticis. *Schreb. Saeugth.* IV. t. CCXXVII.

Sciurus

- Sciurus avellanarius. *Erxl. mamm. p. 433. n. 16.*
Mus (avellanarius) cauda elongata pilosa, corpore rufo, gu-
la albicante, pollicibus posticis muticis. Syst. nat. XII. I.
p. 83. n. 14. Fn. suec. 35.
- Mus avellanarius. *Pall. glir. p. 89. n. 34.*
Glis supra rufus subtus albicans. Briss. quadr. 162.
- Mus avellanarum minor. *Raj. quadr. 220. Jonst. quadr.*
p. 168. Aldrov. dig. p. 439.
- Muscardin. *Buffon hist. nat. VIII. p. 193. t. 26.*
- Dormouse. *Edw. av. 119. t. 266. Penn. quadrup. p. 291.*
n. 219.
- Habitat in Europae sepibus densis silvisque, rarius in hortis.*
Colligit nuces, glandes, quas erectus edit, superfluas de-
fodit; nidum parat e gramine, muscis, foliis in cava ar-
bore minus alta vel frutice; femina 3-4 pullos parit; in
Anglia altilis. Musculo aequalis, ut vix 3 pollices lon-
gitudine attingat, at minus gracilis; oculi magni, pro-
minuli, nigri; auriculae breves, rotundatae, nudae,
tenues; cauda corpore vix longior.

26. DIPUS. *Dentes primores utrinque II.**Pedes anteriores brevissimi.**posteriores longissimi.**Cauda elongata, apice floccosa.*

Jaculus. I. D. pedibus tetradactylis, palmarum unguiculo pollicari.
Schreb. Saength. IV. t. CCXXVIII.

Jaculus orientalis. *Erxl. mamm. p. 404. n. I.*

Mus (jaculus) cauda elongata floccosa, palmis subpentadac-
tylis, femoribus longissimis, brachiis brevissimis. Syst.
nat. XII. I. p. 85. n. 20. Mus. Ad. Fr. 2. p. 9. Forsk.
Fn. orient. p. IV.

Mus (jaculus vel aegyptius) pedibus posticis longissimis, cau-
da corpore longiore extremo villosa. Hasselq. it. Pal. 198.
act. Stockh. 1752. p. 123. t. 4. f. I. act. Ups. 1750. p. 17.
Pall. glir. p. 87. n. 27. t. XX.

Mus montanus. *Moncon. aegypt. 288.*

Cuni-

Myoxi omnes hybernant et dipodes; hi incedunt vel potius saliunt bipedes super pedum
plantis, opitulante cauda elongata rigida ad 3-4 ve pedum distantiam; vescun-
tur solis vegetabilibus; terram fodunt subterranei; interdum dormiunt, noctu vi-
giles; cibum palmis ori admovent; aquam palmis digitis incurvatis hauriunt.

Cuniculus pumilio saliens, cauda longissima. I. G. *Gmelin nov. comm. Petrop.* 1760. Vol. 5. p. 351. t. 9. f. 1.

Cuniculus minor caudatus dauricus. *Mus. petrop.* 1. p. 344. n. 123.

Cuniculus f. Lepus indicus, Utias dictus. *Aldrov. quadr.* 395.

Aegyptii mures alii. *Gesn. quadr.* p. 837.

Agnus filiorum Israël. *Pr. Alpin Aeg.* p. 232.

Jerboa or Gerboa; et Daman Israël. *Shaw trav.* p. 248. 376.

Aegyptian et Siberian Gerboa. *Penn. quadr.* p. 295. 296. n. 222. 223. t. 25. f. 3.

Gerbua. *Edw. av.* t. 219.

Gerbo. *le Brun it.* 287. t. 210.

Gerbo ou Gerboise et Alagtaga. *Buff. hist. nat.* XIII. p. 141.

Erdhaase. S. G. *Gmelin it.* 1. p. 26. t. 2.

Lepus cauda elongata. *Syst. nat. Ed.* IX. n. 4.

Habitat in Aegypto, Arabia, Calmuccia, et australi Siberia in solo firme, campisque herbidis; quiescens plantas abdomini applicat, et supra genua inflexa sedet, palmas vero gulae admoveat, ita ut vix conspiciantur; hominem non valde metuit, neque tamen penitus cicuratur; vescitur radicibus, gramine, tritico, sesamo, et certe, qui in Siberia habitat, foenum ante hiemem secat, siccaturque in acervos rotundusclos coactum cuniculis importat. Caro Calmuccis Arabibusque edulis.

Corpus ultra 7 pollices longum; facies leporis; pedes posteriores una cum femoribus nudis anterioribus triplo, corpore etiam longiores. Cauda 10 circiter pollicum, pallide fusca, extremo nigro apice albo; mammae 8 remotissimae; pili supra pallide fusti, subtus candidi, auriculae pedesque carnei coloris.

Sagitta. 2. D. plantis tridactylis, unguiculo pollicari nullo. Schreber Saength. IV. t. CCXXIX.

Mus Sagitta. Pallas it. 2. p. 706. glir. p. 87. t. XXI.

Habitat in Arabia et ad Irtim fluvium in arena mobili campisque arenosis aridissimis; corpore modo 5 pollices cum 11 lineis, cauda minore flocco terminata 6 pollices cum 5 lineis, artubus posterioribus 6 circiter pollices longa, horum femora minus crassa et carnosa, et digiti subtus pilis longis hirsutissimis vestiti; auriculae capite magis globo multo longiores.

3. D.

- cafer. 3. D. palmis pentadactylis, plantis tetradactylis. Schreber
Saeugthiere, IV. t. CCXXX. Pallas glir. p. 87. n. 29.
Yerba capensis. I. R. Forster et Sparrmann act. Stockh. ann.
1778. 2. n. 3. et 4. t. 3. Miller on various subj. of nat.
hist. t. XXXI. A. B.
*Habitat in capite bonae spei, reliquis major, 12 pollices
longus, colore supra spadiceo, subtus ex flavescente albo;
capite magis oblongo, rostro acutiore, auriculis longioribus,
unguis, palmarum potissimum, multo longioribus,
cauda villofissima, 17 pollices longa, apice nigra distincta.
Aqua in cavernas ducta pellitur. Caro sapida.*
- meridia- 4. D. palmis subtetradactylis, plantis pentadactylis, cauda
nus. concolore. Schreb. Saeugth. IV. t. CCXXXI.
Mus meridianus. Pallas it. 2. p. 702. longipes. glir. p. 88.
n. 30. t. XVIII. B.
Mus (longipes) cauda elongata vestita, palmis tetradactylis,
plantis pentadactylis, femoribus longissimis. Syst. nat.
XII. 1. p. 84. n. 19.
Mus cauda longa vestita, pedibus posticis longitudine cor-
poris flavi. Mus. Ad. Fr. 1. p. 9.
Jaculus palmis tetradactylis, plantis pentadactylis. Erxleb.
mamm. p. 409.
Torrid Jerboa. Penn. quadr. p. 297. n. 224.
*Habitat in torridis regionibus, in deserto quoque arenoso,
versus mare caspium, Uralem fluvium et Wolganum inter-
jacente, ubi pterococci astragalorumque quorundam semi-
nibus vescitur; cuniculos trifores ulnam circiter profun-
dos fodens.*
Corpus 4 pollices cum 9 lineis longum, supra pallide fulvum
aliquando subgriseum, subtus lacteum postice incrassatum;
caput magis oblongum, quam jaculo, rostro producione;
auriculae insignes ovales; os pedesque albi;
horum volae villofissimae, anteriorum pollex vix unguicu-
latus; posteriorum femora carnosissima; cauda vix ultra
3 pollices longa, crassa, largiter pilosa.
- tamarici- 5. D. palmis subtetradactylis, plantis pentadactylis, cauda ob-
nus. solete annulata. Schreber Saeugth. IV. t. CCXXXII.
Mus tamariscinus. Pallas it. 2. p. 202. glir. p. 88. n. 31.
t. XIX.
*Habitat in saltis versus mare Caspium sitis, tamaricem et
nitrarium ferentibus, quorum forsan vescitur fructibus,
quorumque sub radicibus cuniculos agit profundissimos
bifores.*

Elegan-

Elegantissimus longitudine aequat sex pollices, sexque lineas; colore supra ex griseo lutescente subtus albo; oculi magni, superciliis orbitisque albis; auriculae magnae, ovales, nudiusculae; palmarum verruca pollicaris insignis; cauda vix pollices superans, pilosa, apice subfloscosa.

22. LEPUS. *Dentes primores II, superiores duplicati; interioribus minoribus.*

* *caudati.*

Viscaccia. 5. *L. cauda elongata setosa. Molina hist. nat. Chil. p. 272.*
Alia species cunicularum, quem vocant Vizcacha. *Laet amer. p. 407.*

Viscacha. *Nieremb. hist. nat. p. 161.*

Les Viscachos. *Feuillée obs. 3. p. 32.*

Habitat in regni Peruani et Chilensis frigidioribus, ad montium radices et in planicie, cuniculo moribus facieque, vulpi colore et cauda, qua se adversus hostes defendit, similis, cavernas sibi fodens in duas contignationes partitas, quarum una habitaculo inservit, inferior condendo viettui, quem noctu conquirit. Pili tenerrimi mollissimi, ut telas ex iis contexerent sub Yncarum imperio Peruani, pileos hodiendum confiant Chilenses. Caro alba, tenera, sapida.

timidus. 1. *L. cauda abbreviata, auriculis apice nigris, capite longioribus. Faun. suec. 25. Schreber Saeugthiere, IV. t. CCXXXIII. A.*

Lepus. Gesn. quadr. 69. Aldr. digit. 247. Jonst. quadr. t. 65. Raj. quadr. 204.

Lepus cauda abbreviata, pedibus posticis longitudine corporis dimidi, auriculis apice nigris. Erxl. mamm. p. 325. n. I.

Lievre. *Buff. hist. nat. VI. p. 246. t. 38.*

Common Hase. *Penn. quadr. p. 248. n. 184.*

Hase. *Ridinger jagdb. Th. t. 13.*

β. cornutus, (nisi fabulosus). *Schreber Saeugthiere, IV. t. CCXXXIII. B.*

Lepores cornuti. Klein quadr. p. 52. t. 3.

Habitat ubique in Europa, in Bulgaria frequentissimus, in Oriente quoque, Persia boreali, Japonia, Zeylona, perque totam fere Asiam, in Aegypto, Barbaria, America boreali, ipsoque regno Chileni; noctu pascitur; vietnatrum.

lineas;
oculi ma-
nagiae,
signis;
cosa.

plica-
us.

272.
Laet

ad mon-
acieque,
defendit,
nes par-
ondendo
ollissimi,
Peruani,
tenera,

longio-
re, IV.

2. quadr.
e corpo-
p. 325-

re, IV.

nus, in
na, per-
America
viicitat
rumi-

ruminans ramulis fruticum, cortice arborum; inermis timidusque auditu et visu excellit, atque cursu valet, in primis montem ascensurus, currit gyros sensim breviores, retro deviat exsiliendo; capitur a canibus, felibus, accipitribus; proœcto sub venatu in altum pileo sese occultat sub proximo frutice metu accipitris; mordet truncum transscendendum, cervice fragili; delectatur tympano, pulicibus obnoxius; urina foetida non in cubile mittenda; mas in propriam saevit prolem; adolescit primo anno, et oculo annos non superat; immensus parturitione per totam aëstatem, superfoetatione haud rara; coit primum Februario et Martio; femina clitoride magna instructa, per 30-31 dies gravida 3-4 pullos parit.

Longitudo circiter bipedalis; oculi magni extantes, membrana nictitante, dormientis aperti. Mentum album; nares humidae, motitantes; labium superius fissum; pili faciei, dorſi, et laterum basi albi, medio nigri, apice rufi; gula cum pectore rufa; venter albus; cauda supra nigra, subtus alba; femora postica crassa; pedes lanati; cavitas utrinque e regione pubis.

Lagographia Waldungii W. Amberg. 1679. 4. et Paullini C. F. Vienn. 1691. 4. Anatome E. N. C. d. I. a. 2. obs. 251. et ann. 3. obs. 93. et d. 3. ann. 5. obs. 225. Bartholin. act. Hafn. 1671. n. 136.

variabilis. 6. **L.** cauda abbreviata, excepto auricularum capite breviorum apice nigro hieme totus albus. Schreber Saeugthiere, IV. t. CCXXXV. B. Pallas glir. P. I. T. IV. f. I.

Lepus (albus) caudatus plane candidus. Briff. an. p. 139. n. 2.

Lepus albus. Aldrov. dig. p. 349. Wagn. Helvet. 177.

Lepus albissimus. Klein quadr. p. 51.

Lepus candidus. Jonst. quadr. p. 160.

Alpine hare. Forster act. angl. LXII. p. 375. Penn. quadr. p. 249. t. 23. f. I.

niger. **B.** caudatus plane niger. Briff. anim. p. 139. n. 3.

Lepus niger. Klein quadr. p. 52.

hybridus. **γ.** hieme lateribus tantum albescens. Schreber Saeugth. IV. t. CCXXXV. C.

Habitat in alpinis et frigidioribus Europæ, Asiae et Americae regionibus; **β)** rarer colorem non mutans in Russia et Siberia; **γ)** ex variabili et timido prognatus in Russia australi; in Siberia et Russia aliquando in campestria migrans, vere in montes revertens.

Timido major, ut 4 pollicibus et ultra longitudine superet duos pedes; ast caro durior, minus sapida; artus breviores; cauda minor ex paucioribus vertebris composita, per totum annum penitus alba; velleris color aestivus in γ ad timidi satis accedit; β) fuscus, niger, aliquando aterrimus nitidus, uti per integrum annum; α) in capite ex griseo rufescens, aurium dorsique fuscus, cervicis e fusco cinerascens, laterum sensim incanescens, ventris canus.

america- 7. *L. cauda abbreviata, pedibus posticis corpore dimidio longioribus, auricularum caudaeque apicibus griseis. Erxl. mamm. p. 330. n. 2. Schoepf. Naturf. XX. p. 32.*

Lepus (hudsonius) apice aurium caudaeque cinereo. Pallas glir. p. 30.

Hudson's bay quadruped. Barrington act. angl. LXII. p. II.

American Hare. Forster act. angl. LXII. p. 376.

Habitat in America boreali nocturnus sub arborum radicibus inque cavis arboribus, nec fodiens; femina semel vel bis in anno 5-7 pullos parit.

Color idem, qui timidi; magnitudo inter variabilem et cuniculum media; pedes posteriores longiores, quam huic.

Caro bona.

Tolai. 8. *L. cauda abbreviata, auricularum margine summo nigro. Pallas glir. p. 17. t. 4. f. 2. Schreber Saeugthiere, IV. t. CCXXXIV.*

Lepus (dauricus) cauda elongata, gula nigra. Erxl. mamm. p. 335.

Cuniculus insigniter caudatus coloris leporini. I. G. Gmelin nov. comm. Petrop. V. p. 357. t. II. f. 2.

Tolai. Buffon hist. nat. XV. p. 138.

Baikal-Hare. Penn. quadr. p. 253. n. 188.

Habitat trans lacum Baikal Sibiriae in deserto Gobensis ad Tibetum usque, major praecedentibus speciebus, aestate colore fere eodem, quo variabilis, hieme tamen vix mutato paulo dilutiori; pedes, quam huic graciliores, femora posteriora longiora; cauda longior quam cuniculo et variabili, brevior autem, quam timido, hujus ad caudam area quoque illa nigra accedit. Pondus hibernum adulti 7 fere librarum russicarum; feminae gravidae Aprili 8 $\frac{1}{2}$.

9. E.

Leporibus pedum anteriorum digiti 5, posteriorum 4.

superet
brevio-
ta, per
n y) ad
lo ater-
spite ex
e fusco
nus.

lio lon-
Erxl.

Pallas
LXII.

radici-
mel vel

et cu-
n huic.

nigro.
re, IV.

mamm.

Gmelin

eensi ad
aeftate
vix mu-
, femo-
iculo et
caudant
adulti
rili 8½.
9. E.

minimus. 9. L. cauda abbreviata, auriculis pilosis concoloribus. *Mol-*
lina hist. nat. Chil. p. 272.

Habitat in regno Chilensi, mure arvensi vix major, corpo-
re fere conico, auriculis parvis, acutis, rostro oblongo,
palmis tetradaehtylis, plantis pentadaehtylis, pilis tenerri-
mis, at brevibus, carne alba, sapida, Chilensis domes-
ticus, cuniculo colorum varietate, fertilitate, qua femi-
na singulis fere mensibus 6, 7 et plures pullos parit, et
hostibus, felibus scilicet rattiisque similis, sed eum ab-
horrens.

Cunicu- 2. L. cauda abbreviata, subconcolore, auriculis apice atris,
lus. cruribus posticis trunco brevioribus. *Pallas glir. p. 30.*
Erxleb. mamm. p. 331. n. 3. Schreber Saeugthiere, IV.
t. CCXXXVI. A.

Lepus cauda abbreviata, auriculis nudatis. Synt. nat. XII. I.
p. 77. Fn. suec. 2. p. 10. n. 26.

Lepus cauda abrupta, pupillis rubris. Synt. nat. II. p. 46.
VI. p. 9. n. 3. Mus. Ad. Fr. I. p. 9.

Lepus (Cuniculus nostras) caudatus obscure cinereus. Briss.
regn. anim. p. 140. n. 4.

Cuniculus. Plin. hist. mund. VIII. c. 29. 55. 58. Agric.
anim. subt. p. 16. Gesn. quadr. p. 394. Aldrov. dig.
p. 382. fig. p. 385. Jonst. quadr. p. 161. t. 65. Raj.
quadr. p. 205.

Lapin, Lapin sauvage. Buff. hist. nat. VI. p. 303. t. 50.

Rabbit. Penn. quadr. p. 251. n. 186.

domesti- β. C. oculis pulchre rubris.
cus. *Lapin domestique. Buffon hist. nat. VI. t. 51.*
a. colore nigro. *Schreb. Saeugth. IV. t. CCXXXVI. B.*
b. colore albo.
c. colore variegato.
d. pilis ex argenteo cinereis, pedibus fuscis.

argenteus. *Lepus caudatus dilute cinereus. Briss. regn. an. p. 191.*
n. 5.
Le Riche. Buff. hist. nat. VI. t. 52.
Silver-haired Rabbit. Penn. quadr. ind.

angoren- γ. C. pilis longioribus undulatis sericeis. *Schreber Saeugth.*
sis. *IV. t. CCXXXVI. C.*
Lepus (Cuniculus angorensis) caudatus pilis tenuissimis et
longissimis toto corpore vestitus. Briss. regn. an. p. 141.
n. 6.

Lapin d'Angora. *Buffon hist. nat.* VI. t. 53. 54.
Angora-Rabbit. *Penn. quadr.* p. 252. n. 186. β.

russicus. ♂. *cinereus capite auriculisque fuscis, pelle dorſi gulæque fac-*
cata.

Russian rabbit. *Penn. quadr.* p. 252. t. 23. f. 2.

Habitat in temperatis et calidioribus Europæ, inque cali-
dioribus Afiae et Africæ, e. g. in Madera, hospitatur
quoque in frigidioribus; cuniculos agit in arenosis, inter-
diu latens; capitur a falconibus, mele, putorio; ad octo
vel novem usque annos vivit; femina per 30 - 31 dies
gravida, septies per annum 4-8 pullos parit, sexto vitæ
mense adultos. Pellis, praesertim ♂d, et ♀, bona; caro
alba passim esculenta.

Lepore timido minor, circiter sesquipedalis; auriculae capite
breviores; feri color ex fusco cinereus, cauda supra ni-
gra subtus alba.

Anatome. *Perv. obs.* 10.

capensis. 3. *L. cauda longitudine capitis, pedibus rubris.*

The cape Hare. *Penn. quadr.* p. 253. n. 189.

Habitat ad caput bonæ spei; fodiens, cauda rufa. I. Bur-

mannus.

* * *ecaudati.*

brasiliensis. 4. *L. auritus, collari albo, cauda nulla.* *Pallas glir.* p. 30.

Lepus cauda nulla. *Syst. nat.* IX. n. 1. XII. 1. p. 78. n. 4.

Cuniculus brasiliensis Tapeti. *Maregr. bras.* 223. *Pis-*
bras. 102. *Raj. quadr.* 205.

Tapeti. *Buff. hist. nat.* XV. p. 162.

Brasilian Hare. *Penn. quadr.* p. 252. n. 187.

Habitat in America meridionali; non fodiens, facie cunicu-
li, magnitudine et colore timidi.

pusillus. 10. *L. ecaudatus, fusco griseoque mixtus, auribus subtriangu-*
lis albo marginatis. *Pallas glir.* p. 30-45. t. 1. et 4. f.

3-9. et nov. comm. *Petrop.* XIII. p. 534. t. 14. et it. 1.

p. 155. 2. p. 533. 3. p. 498. *Schreber Sæugthiere,* IV.

t. CCXXXVII. *Lepechin it.* 1. p. 260.

Lepus cauda nulla, auriculis rotundatis. *Mant.* II. p. 522.

Lepus cauda nulla, auriculis brevibus rotundatis. *Erxleb.*

mamm. p. 338. n. 8.

Habitat in australioribus montium Uralensium promontoriis,
herbidis collibus et convallibus apricis, passim quoque ad
Irtin et inter apricos montes regionis metalliferae sub alpi-

bus

bus altaicis sitae, cytisi supini, robiniae frutescentis, cerasi pumilae, mali sylvestris flores, frondes, corticem potissimum amans, in locis siccis cuniculos fodiens, voce quam maxime sonora per omnem annum excepta hieme se prodens, mitis, et facile cicurandus; parum dormit, sed saepius potat; columbis et quasi subsultans, non tamen celeriter incedit, noctu vigil; inter calidissima animalia; femina Maji fine parit pullos 5-6.

Pondus nunquam 3 iuss, hieme vix 3 iuss, longitudo 6 pollices 9 lineas excedit; color vix mutatur; pilis rigidiusculis supra pallide griseis et apice nigrescentibus, ad ima latera pedesque extremos pallide lutescentibus, subtus ex canescenti albidis, ad gulum canis; caput magis oblongum, quam praegressis; truncus gracilis agitabundus, exilis; oculi murinti; artus breves; vellus mollissimum, prouicum, lanugine tenerrima ex fuscescente plumbea.

alpinus. II. *L. ecaudatus rufescens, auriculis rotundatis plantisque fuscis. Pallas it. II. p. 569. et 701. t. A. glir. p. 30. et 45-59. t. 2. et 4. f. 10-12. Schreber Saeugthiere, IV. t. CCXXXVIII.*

Lepus cauda nulla, auriculis elongatis, corpore lutescente. Erxl. mamm. p. 337. n. 7.

Mustela daurica cauda carens corpore breviore et crassiore, pilis in dorso rufescentibus, Ochodona daurica anurinos. Catal. mus. Petrop. p. 343. n. 114. 115.

Habitat in magni jugi altaici ad ultimum usque Asiae angulum, montiumque ultra Jeniseam Lenam sitorum asperritatis et inaccessis scopulis, ubi inter saxa cuniculos agit, aliquando in cavis arborum truncis degens, interdiu, nisi coelo turbido latens; vocem acutam, quasi fistulae edit; Augusto gramina potissimum silvatica molifissima et tenerima aliasque herbas secat, et siccata Septembri in acervos fere conicos compingit, hieme nive obtectos, tramite cum antris conjunctos, venatorum equis in pabulum cessuros; capitur a mustela zibellina et sibirica, infestatur oestro leporino.

*Pondus a 3 i. ad 1*1*/*2*, longitudo a 7 pollicibus ad 9 et 7 lineas variat; facies magis stupida et fera, quam pusillo; caput magis oblongum et tenuius; rostrum minus obtusum; oculi satis exigui, nigri; auriculae magnae; corpus mi-*

Leporibus omnibus, excepto Molinæ sive minimo, palmae pentadactylæ, plantæ tetradactylæ.

*nus elongatum et magis ventricosam. Mammae 2 ingui-
nales, 4 thoracicae. Color subtus magis obsoletus; gula
summa cinerascens.*

Ogotona. 12. *L. ecaudatus, griseo-pallidus, auriculis ovalibus subacu-
tis concoloribus. Pall. glir. p. 30. 59 - 70. t. 3. et 4. f.
14 - 16. Schreber Saeugth. IV. t. CCXXXIX.*

*Mustela mungalica, cauda carens, corpore breviore, Ochodon-
da mungalica Messerschmidii. Cat. Mus. Petrop. I.
p. 343. n. 112.*

*Habitat in montosis ultra lacum Baikal sitis, et per omne
Mongolorum, praesertim Gobeense desertum, in rupe-
stribus quidem inter lapidum acervos in arenosis in cuni-
culis bi-vel triforis, quorum plures aliquando uni inser-
viunt; noctu potissimum vagans; voce acutissime strida-
la, pyri baccatae corticem, ulmique pumilae virgulta
amans, vere etiam alias in arena nascentes herbas come-
dit, quas autumno in acervos colligit; agilissimus vix ci-
curatur; capitur a mustelis variis, fele manal, falconi-
bus minoribus, picis caudatis, strigibus.*

*Diffr. ab alpino et pusillo, quibus satis similis videtur, magni-
tudine, pondus enim in feminis aliquando vix 3iv, in
masculis nunquam 3viss aequat, longitudo 6 pollices
7 lineas vix excedit, a posteriore, cui similior, colore
per ommem annum pallidissimo, pedibus robustioribus,
auricularum figura et fusco colore.*

HYRAX. *Dentes primores superiores II lati distantes.
inferiores IV contigui lato-
plani, bis crenati.*

molares magni ubique IV.

Palmae digitis IV.

Plantae digitis III.

Cauda nulla.

Claviculae nullae.

*capensis. I. H. palmarum unguibus planis, plantarum unico subulato:
Schreb. Saeugth. IV. t. CCXL.*

*Cavia capensis. Syst. natur. XII. 3. p. 223. Pallas miscell.
zoolog. p. 34. t. 3. et 4. f. 5 - 13. Spicil. zool. fasc. 2. p. 16.
t. 2. 3.*

Cavia

Cavia (capensis) ecaudata, dentibus primoribus infra quatuor. Erxl. mamm. p. 352. n. 3.

Marmotte du cap de bonne esperance. Buff. hist. nat. Suppl. ed. 12. Tom. V. p. 293.

Cape cavy. Penn. quadr. p. 247. n. 182.

Klipdas. Gr. a Mellin Schrift. der berl. naturf. Ges. III. p. 271. t. V.

Habitat ad caput bonae spei.

Vox acuta, auditus acris, incessus reptabundus, vinctus vegetabilis; agilis, mundus, parum bibit, salit, caloris amantissima. Pediculi et taeniae. Magnitudo circiter marmotae, ut adulta tribus pollicibus tribusque lineis pedem superet: Caput breve; rostro brevissimo obtuso, occipite crasso; oculi mediocres; auriculae ovales patulæ, semi-absconditæ, lanuginosæ, fuscae; artus brevissimi, humeris femoribusque intra pellem latentibus. Corpus breve, trunco contracto, abdomine ventricosissimo. Vellus lanuginosum intus canescens, extus griseum, ad latera sordide ex griseo album; in dorso longitudinaliter subfuscum, pilis longioribus rudioribus nigris exstantibus, praeter setulas longiores passim in vellere sparsas. Palmae quadrilobae, loborum apice ungue plano orbiculato notato; plantae ex binis lobis et digito unguiculato compositæ.

syriacus. 2. H. pedibus unguiculatis. Schreber Saugth. IV. t. CCXI. B.
Habitat in Syria.

Corpus magis elongatum, dorso setis ex acie prominentibus notato, supra fuscum, infra exalbidum. Rostrum magis oblongum. Ungues brevissimi.

2 ingui-
s; gula

subacu-
et 4. f.

Ocho-
trop. I.

er omne

n rupe-
n cuni-

i inser-
stridu-

irgulta
s come-

vix ci-
falconi-

magni-

iv, in
pollices

colore
us, au-

antes.
i lato-

bulato:

miscell.
p. 16.

Cavia