

V. PECORA.

Dentes primores superiores nulli.
inferiores VI aut VIII a molari-
bus remotissimi.

Pedes unguinati.
Mammae inguinales.

27. CAMELUS. *Cornua nulla.*
Dentes primores inferiores VI spathi-
formes.
laniarii distantes, superio-
res III,
inferiores II.
Labium superius fissum.

Drome- I. C. topho dorfi unico. *Briss. quadr. 45. Raj. quadr. 143.*
 darius. *Forsk. Fn. orient. p. IV.*

Camelus vulgaris. Forsk. Fn. orient. p. IV.

Camelus Dromas. Gesn. quadr. p. 171. fig. p. 172. Pr. Al-
pin. aeg. I. p. 223. t. I.

Camelus. Jonston quadr. p. 95. t. 41. 42. 43.

Dromedarius. Gesn. Thierb. p. 234. f. p. 234. Charlet.
exerc. p. 13.

Arabian Camel. Penn. quadr. p. 60. n. 50.

Habitat ferus in Asiae temperatae desertis, rarior ad utrum-
que montium Soongoricorum latus, ad fluvium Ili, mon-
tem Mufart, et in Mongolia, Sibiriae finitima; junior ci-
curatus et cultus in omni Oriente, Africa, ipsisque insulis
Jamaica et Barbados, varietate numerosissima, mitis, nisi
oestro agitatus; pro itineribus in desertis arenosis siticulo-
sis portandisque oneribus utilissimus; portat enim ad 1200
libras; lente festinat, nec ultra adsuetum percurrit spa-
tium, nec plus instituto onere recipit; famem fert patien-
tissime, potuque per plures dies caret, stirpibus deserto-
rum spinosissimis, reliquis animantibus detestatis conten-
tus. Pellis pretiosa; caro Arabibus in deliciis; lac potu-
lentum.

Pili molliores, coloris ex rufo cinerei, in collo et topho lon-
giores; altitudo 6½ pedum; caput parvum, auriculis bre-
vibus,

vibus, ore et gingivis cartilagine obductis; collum longum, gracile, curvatum; pedes bifidi, callis in anterioribus quatuor, in posterioribus duobus; cauda pedibus brevior; sternum callo unico; ventriculus secundus cellulofus pro aqua pura in siticulosis desertis diutius asservanda. Camelus Arabiae Veterum.

baetrianus. 2. C. tophis dorfi duobus. *Briff. quadr.* 53. *Forster act. angl.* Vol. 57. p. 343. *Forsk. Fn. orient.* p. IV. *Raj. quadr.* p. 145.

Dromedarius. *Jonst. quadr.* p. 42. 43. 44. f. 1.

Camelus turcicus. *Pr. Alpin. aeg.* 1. p. 223. t. 13.

Camelus. *Gesn. quadr.* p. 162. f. p. 163. *Schwenckf. theatriotr.* p. 72. *Aldrov. bis.* 907. 889.

Chameau. *Buff. hist. nat.* XI. p. 211. 426. t. 22.

The baetrian Camel. *Penn. quadr.* p. 63. n. 51.

Trampelthier oder Dromedar. *Knorr delic. nat. sel. tab.* K. 6.

Habitat ferus in India boreali et versus Sinam in desertis, cultus in Oriente et Africa, praecedenti rarior, pro magnatibus, major et cursu celerior, tophe posteriore majore, ceterum satis affinis; occiditur luxu; coit difficillime, mense Februario, femina per integrum annum gravida parit unicum pullum, per duos annos lactandum, et tertio anno adultum. Καμηλος et Camelus baetrianus Veterum.

Ex hoc et Dromedario hybridi.

Glama. 3. C. dorso laevi, tophe pectorali. Camelus pilis brevissimis. *Briff. quadr.* 55. Camelus peruvianus, Glama dictus. *Raj. quadr.* 145. Pelon Ichiatl Oquitli, Ovis peruana. *Hernand. mex.* p. 660. Ovis peruana. *Charlet. exerc.* p. 9. *Jonst. quadr.* t. 46. Cervocamelus. *Jonst. quadr.* t. 29. Hirschcamel. *Gesn. Thierb.* p. 239. Ελαφοκαμηλος. *Marcgr. brasil.* p. 243. Llama. *Laet amer.* p. 405. *Ulloa voy.* 1. p. 365. t. 24. f. 5. *Penn. quadr.* p. 64. n. 52. Lama. *Buffon hist. nat.* XIII. p. 16.

Habitat in montibus regni Peruani altioribus, moribus, cursu, usu, ruminatione, difficili coitu, famis sitisque tolerantia, habitu externo et fabrica interna praecedentibus similis; collum longum; caput parvum inerme; auriculae mediocres, oculi magni, rotundi, nalis brevis, pedes longio-

longiores, fissi, cauda brevis, pili longi, qui trahi in fila possunt; ventriculi 4, quorum secundus cellulofus; mari penis longus, tenuis, retro flexus, feminae, quae raro gemellos parit, vulva angusta; mitis, docilis, gressu firmo, securo, cicuratur.

Ast differt altitudine minore, vix $4\frac{1}{2}$ pedibus aequali; longitudine sexpedali; pinguedine multa subcutanea, auriculis acutis melius formatis, collo minus incurvato, dorso aequabiliore, cauda pulchriore, pedibus elegantioribus, setis aequalibus, cursu celeriore, pilis longioribus mollioribus, ex albo, nigro et fusco variis, tubere pectorali, oleo flavido continue madente. Vox hinniens. Arma pedes, dentes, saliva, quam in hostes expuit; salax, jam triennis, sub finem aestatis coit fere furens; femina per quinque aut sex menses gravida, mammis binis instructa, parit pullum unicum. Portat ad 150 libras, et per tres quatuorve dies continuos tria quotidie milliaria germanica, tunc per diem quiescens, fatigatus succumbit; compressis testiculis compellitur obstinatus. Caro vervecinae aemula.

- Huana-
cus. 5. C. corpore piloso, dorso gibbo, cauda erecta. *Molina hist. nat. Chil. p. 281.*
Pernicheatl. Fernand. anim. p. 11.
Guanaco, sive Huanacu. Laët amer. p. 406. Ovalle Chile. p. 44. Cieza Peru. p. 233. Ulloa voy. I. p. 366. t. 24. f. 5. Hawkesw. seer. I. p. 148.
Habitat in montium catena, Cordilleras, hieme planities regni Peruviani et Chilensis frequentans, ad Glamam quidem moribus, usu, multisque notis externis accedens, sed nec ferus, nec cicuratus unquam cum ea coiens, defectu praeterea tophi pectoralis, dorso gibboso, pedibus posterioribus brevioribus, cursu magis subsultante satis distinctus; supra flavus, subtus exalbidus, septem circiter pedes longus, et tres pollices ultra quatuor pedes altus; cauda cervinae, auriculae equinis similes. Caro juniorum sapida, adultiorum paulisper dura, nisi salita.
- arcuca-
nus. 6. C. corpore lanato laevi, rostro superne curvo, cauda pendula. *Molina hist. nat. Chil. p. 279.*
Aries moromorus. Nieremb. hist. nat. p. 182.
Sheep. Ovalle Chile. p. 44.
Sheep of Peru. Cieza Peru. 232.
Moutons. Feuillé journ. 3. p. 23.
Moutons de Perou. Frézier voy. I. p. 264. t. 22. f. A.

Habi-

Habitat in regnis Chilensi et Peruano, praeter collum longum et pedes altos capite, rostro, auriculis flaccidis pendulisque, oculis, cauda (breviore tamen), lana (molliore tamen), arietis satis similis, sex circiter pedes longus, et posteriorius vix ultra quatuor pedes altus, nunc albus, nunc niger, nunc fuscus, nunc cinereus. Caro sapida.

Olim ad portanda onera, arandaque arva adhibitus, et ex lana vestimenta contexta, nunc pretiosiores modo telae, sericeis nitore similes.

Vicugna. 7. C. corpore lanato laevi, rostro fimo obtuso, cauda erecta.

Molina hist. nat. Chil. p. 277.

Vicuna, Vicunna, Vicunnas. *Laët amer. p. 406. Nie-remb. hist. nat. p. 184. f. p. 185. Cieza Peru. p. 233.*

Ulloa voyag. I. p. 506. 525. t. 24. f. 3.

Vicognes ou Vicunas. *Fréz. voy. I. p. 266.*

Camelus (Vigogne) pilis prolixis toto corpore vestitus. *Briss. an. p. 57. n. 4.*

Habitat in abruptis cacuminibus montium Cordilleras, praesertim in provinciis Chilensibus, Coquimbo et Copiapò, gregarius, frigoris patientissimus, timidus, celerrimusque, funi adstupet alligatis panniculis, difficulter cicurandus, carne sapida, lana pileis et telis idonea, ad sericeas accedentibus.

Caprae hirco habitu caudaque aliquantum similis, ast collo viginti pollices longo, capite rotundo inermi, auriculis parvis erectis et acutis, rostro brevi, pedibus duplo altioribus, lana egregia tenerrima, rosea, facillime tingenda, ab hac; corpore graciliore, rostro lanaque brevior, hac autem teneriore a Paco distincta, cum qua non coit. In ejus ventriculo bezoar.

Paco. 4. C. topis nullis, corpore lanato, rostro oblongo.

Camelus peruvianus laniger Pacos dictus. Raj. quadr. 147.

Klein quadr. p. 42.

Alia species Pacos dicta. Hernand. Mex. p. 663.

Paco. Laët amer. p. 405. Buffon hist. nat. XIII. p. 16.

Alpagne. Fréz. voy. I. p. 267.

Pacos. Penn. quadr. p. 66. n. 53.

Habitat in regni Peruani montibus altioribus, gregarius, praecedentibus minor, et oneribus 50-70 libras excedentibus portandis impar; caro minus bona, lana, quam vicugnae, quidem longior, sed minus tenera, supra in fero

fero animali purpurea, subtus alba, in cicurato nigro, albo rufoque variegata, ad parandas telas, semisericearum similes, adhibita.

28. MOSCHUS. *Cornua nulla.*
Dentes primores inferiores VIII.
laniarii superiores solitarii
exserti.

moschi- I. M. folliculo umbilicali. *Pallas spicil. zool. fasc. 13. t. 4-6.*
 ferus. *Schreber Saecul. V. t. CCXLII.*

Moschus. Schroeck histor. mosch. Vienn. 1682. 4. t. 44.
Brun it. 121. t. 121.

Animal moschiferum. Nicremb. hist. nat. p. 184. I. G. Gmelin nov. comm. Petrop. IV. p. 393. Raj. quadr. p. 127.

Capreolus moschi, Bifamthier. Gesn. quadr. p. 786. Thierb. p. 50. fig. p. 50. 51. Jonst. quadr. t. 29.

Capra moschi. Aldrov. bisulc. p. 743. f. p. 744. Jonst. quadr. p. 78. Charlet. exerc. p. 10.

Tragus moschiferus, moschus. Klein quadr. p. 18.

Tragulus (moschus) ad umbilicum folliculum moschiferum gerens. Briss. regn. anim. p. 97. n. 5.

Musc. Buff. hist. nat. XII. p. 361.

Tibet-Musk. Penn. quadr. p. 56. n. 46. t. 10. f. 1.

Habitat in maximis et palmaribus Asiae magis orientalis jugis alpinis, praesertim altissima totaque rupibus et montibus inclusa regione, inter Altaicas alpes easque, quae Tibetanos ab Indis dirimunt, interposita, solitarius, rupestria praerupta, convalles altis frigidisque montibus inclusas, pineta intermontana, promontoria nivalium cacuminum quam maxime sequens; sexto jam seculo a Cosma dictus; saliendo, currendo, scandendo, nando agilissimus, timidissimus et difficulter cicurandus; Novembri et Decembri coit, maribus mordicus pro venere pugnantibus, mite ceterum animal. Caro edulis, juniorum lapida.

Magni-

Pecoribus ventriculi 4: Rumem, reticulum, omasus, abomasus; ideoque ruminantia phytiphaga et sedifera; unguolata etiam sunt, uti sues, unguibus calceiformibus propriis geminis, praeter posticas 2 succenturiatas. Aegagropila his frequens a pilis deglutitis. Horum dentata dentibus lanariis carent cornibus, et cornuta carent lanariis, at mihi cranium capreoli cornutum cum lanariis.

Magnitudo capreoli semestris; pondus ab 18-35 libras medicas; longitudo adulti vix infra duos pedes tresque pollices, vix excedens duos pedes cum 11 pollicibus; caput fere capreoli elegantissimum, vellus cervino grossius, sed levissimum, mollius, laxum, altissimum, colore pro aetate annique tempore variabili, potissimum ex fusco nigrescente, subtus canescente, rarius albedo; junioribus virgis et maculis insignitum aetate increfcente sensim evanidis, a pellationariis et coriariis adhibitum. Cauda brevissima. Ad praeputii orificium folliculus moschiferus subovalis, hinc planus inde gibbus, orificio simplicissimo patulus, in hinnulis vacuus, in adultis sesquidrachma, imo duis drachmis ambrosiaca, in tibetanis quidem praestantioris, quam quidem in sibiricis, in quibus castoreum subolet, unguinosae, grumosae, friabilis, obscure brunneae refertus.

- indicus. 2. M. supra rufus, subtus albidus unicolor, unguis succenturiatis, cauda longiore. Schreb. Saeugth. V. t. CCXLV. Tragulus (indicus) pilis brevibus, supra fulvis, infra albicantibus. Briss. regn. anim. p. 95. n. 1. Habitat in India, moschifero vix major; caput equino simile; auriculae erectae, oblongae; pedes graciles.
- pygmaeus. 3. M. supra fusco-rufus, subtus albus, unguis succenturiatis nullis. Erxl. mamm. p. 322. n. 3. Moschus pedibus humano digito angustioribus. Syst. nat. XII. p. 92. Capra cornibus teretibus conicis obtusis curvis, latere anteriore rugoso. Syst. nat. X. p. 69. Tragulus (guineensis) pilis longissimis obscure fulvis. Briss. regn. anim. p. 96. n. 2. Cervus pusillus guineensis; Cervula parvula africana, rubida sine cornibus; Hinnulus seu cervus juvenis pergracilis africanus; Cervus africanus pilo rubro. Seb. mus. I. p. 70. 73. t. 43. f. 1. 2. 3. t. 45. f. 1. Tragulus, Cervula parva africana ex Guinea, eornis; Tragulus sive Hinnulus aut Cervus juvenis pergracilis africanus; Tragulus guineensis pilo rubro longiore. Klein quadr. p. 22. Chevrotain des Indes orientales. Buff. hist. nat. XII. p. 315. 341. t. 42. 43. f. 1. 3-8. Guinea-Musk. Penn. quadr. p. 59. n. 49.

Habi-

An hujus etiam generis animal elaphi magnitudine ex Formosa stags without horns Nicub. Eastind. p. 209?

Habitat in India, Java, aliisque oceani indici insulis; 9½ pollices longus, cauda pollicari, auriculis longis.

- Meminna. 4. M. supra cinereo-olivaceus, subtus albus, lateribus albo-maculatis, unguis succenturiatis nullis. *Erxleb. mamm. p. 322. n. 2. Schreber Saength. V. t. CCXLIII.*

Meminna. *Knox Ceyl. p. 21.*

Chevrotain à peau marquetée de taches blanches. *Buffon hist. nat. XII. p. 315.*

Indian Musk. *Penn. quadr. p. 59. n. 48. t. 10. f. 2.*

Habitat in Ceylona, sesquipedalis, auriculis longis, cauda brevissima.

- javanicus. 5. M. supra ferrugineus subtus longitudinaliter albus, cauda longiuscula villosa subtus et apice alba, unguis succenturiatis exiguis. *Pallas spicil. zool. XII. p. 18. XIII. p. 28.*

Habitat in Java, cuniculi magnitudine, pedibus pygmaei; naso auriculisque nudis; scopis genuum, sinibus in inguine et ante oculum nullis; cervix ex griseo canescens, fuscis pilis intermistis; ejusdem coloris maculae binae subconnexae in collo subtus albo; sub gula pili duo longi divergentes; vertex longitudinaliter nigricans.

- americanus. 6. M. rufo-fuscus, ore nigro, gula alba. *Erxl. mamm. p. 324. n. 4.*

Tragulur furinamentis. *Klein'quadr. p. 22.*

Tragulus (furinamentis) ex rufo luteus maculis albis variegatus. *Briff. regn. an. p. 96. n. 3.*

Cervula furinamentis subrubra albis maculis notata. *Seb. mus. 1. p. 71. t. 44. f. 2.*

Biche de Guiane. *des March. voy. 3. p. 281.*

Wirreboerra. *Bancroft Guian. p. 123.*

Brasilian Musk. *Penn. quadr. p. 58. n. 47.*

Habitat in Guiana et Brasilia, agilis, celerrimus, timidissimus, vix capreoli magnitudine. Pili breves mollesque, capitis collique supra fusci, colli subtus albi, corporis erurumque ex rufo fusci. Crura posteriora anterioribus longiora; cauda brevis; auriculae 4 pollicum. An forsitan pullus capreoli americani?

29. CERVUS. *Cornua solida, tenera corio hirto tecta apiceque crescentia, denudata, annua, furcata.*

Dentes primores inferiores VIII. laniiarii nulli (interdum solitarii superius).

Pygargus. 1. C. cauda nulla, cornibus trifurcis. *Pallas it. 1. p. 97. 453. Schreber Saengeth. V. t. CCLIII.*

Cervus Aha. *S. G. Gmelin it. 3. p. 496. t. 56.*

Habitat summos Hircaniae et Russiae Sibiriaeque ultra Wolgam sitae montes, hieme in campestria descendens, capreolo similis sed major; vellus altissimum, subtus et in artubus lutescens, circa nasum et ad latera labii inferioris nigrum, labii apice ipso, cluniumque regione albis. Cornua basi tuberculata; auriculae intus albo villo tectae, orbitae ciliis pilisque sparsis nigris longis munitae.

Alces. 2. C. cornibus acaulibus palmatis, caruncula gutturali. *En. suec. 39. Schreb. Saengeth. V. t. CCXLVI. A. B. Miller on various subjects of nat. hist. t. X. A.*

Cervus (Alces) cornibus ab imo ad summum palmatis. *Briss. regn. anim. p. 93. n. 9.*

Alces. *Caesar bell. gall. VI. c. 27. Gesn. quadr. p. 1. 2. Scheff. Lopp. p. 336. Charlet. exerc. p. 12.*

Achlis. *Plin. hist. nat. VIII. c. 15.*

Alce. *Plin. hist. nat. VIII. c. 15. Schwenckf. theriotr. p. 53. Aldrov. bisulc. p. 866. f. p. 869. 870. Fons. quadrup. t. 30. 31. Olear. mus. t. 9. f. 2. Bonann. mus. t. 295. Mus. Worm. p. 336. Raj. quadr. p. 86. I. F. Leopold diss. de alce. Basil. 1700. 4.*

Mosse. *Laët americ. p. 68.*

Mose-Deer in America. *Dudley act. angl. n. 368. p. 165.*

Mose-Deer of New-England. *Dale act. angl. n. 444. p. 384.*

Elk. *Lawson carol. p. 123. Penn. quadr. p. 40. n. 35. t. 7. f. 1. 2.*

Original. *Charlev. nouv. Franc. 3. p. 126.*

Elan. *Buff. hist. nat. XII. p. 79. t. 7. 8. 9.*

Habitat in Americae, Europae, Asiae ad Japoniam usque borealibus potissimum populetis, equi magnitudine, mitis excepto oestri tempore; ungulis ferit; his crepitantibus 50 millia-

milliaria de die percurrit, corio globum plumbeum fere eludente. Caro bona.

- Elaphus. 3. C. cornibus ramosis totis teretibus recurvatis. *Fu. suec.* 40. *Schreb. Sacugth.* V. t. CCXLVII. A, B, C, D, E.
Cervus cornibus teretibus ad latera incurvis. *Briff. regn. anim.* p. 86. n. 1.
Ελαφος. Aristot. hist. an. II. c. 7. et 18. VI. c. 29. IX. c. 6. *Aelian. anim.* VI. c. 11. 13. VII. c. 39. XII. c. 18. *Oppian. cyneg.* II. 176.
Cervus. *Plin. hist. nat.* VIII. c. 32. *Gesn. quadr.* p. 354. *Schwenckf. theriotr.* p. 81. *Aldrov. bisulc.* p. 769. fig. p. 774. *Fonst. quadrup.* p. 82. t. 32. 35. *Mus. Worm.* p. 338. *Scheff. Lapp.* p. 337. *Charlet. ex.* p. 11. *Wagn. Helv.* p. 173. *Sibb. Scot. an.* p. 9. *Raj. quadr.* p. 84. *Rzacz. Polon.* p. 216.
Cerf, biche et faon de cerf. *Buff. hist. nat.* VI. p. 63. t. 9. 10. 12.
Stag. *Penn. quadr.* p. 49. n. 38.
Edler Hirsch, Wild oder Thier. *Ridinger jagdb. Th.* t. 4. 5.
- Hippelaphus. β. C. pilis in collo longioribus major, senior. *Erxl. mamm.* p. 304.
Cervus (germanicus) cornibus teretibus ad latera incurvis, collo infra jubato. *Briff. regn. anim.* p. 87. n. 2.
Ἴππελαφος. Aristot. hist. anim. II. c. 5.
Τραγυλαφος. Plin. hist. nat. VIII. c. 33.
Tragelaphus. *Gesn. quadr.* p. 1101. *Charlet. exerc.* p. 12.
Hippelaphus mas, Rosshirsch. *Fonst. quadr.* t. 35.
Brandhirsch et Pferdhirsch. *Gesn. Thierb.* p. 199. 210.
- corficanus. γ. C. minor fuscus. *Erxl. mamm.* p. 304.
Cerf de Corfe. *Buff. hist. nat.* VI. p. 95. t. 11.
- canadensis. δ. C. cornibus amplissimis. *Erxl. mamm.* p. 305.
Cervus (canadensis) cornibus teretibus ab imo ad summum cute pilosa tectis. *Briff. regn. an.* p. 88. n. 3.
Stag. *Brick. North-carol.* p. 109.
Stag in Virginia. *Dale act. angl.* n. 444. p. 384.
Stag of Carolina. *Lawson carol.* p. 123.
Stag of America. *Catesb. Carol. app.* p. XXVIII.
Habitat in omni Europa, et boreali America atque Asia ad Japoniam usque gregarius mare duce; bene natat; triginta annos aetate vix superat; mitis cetera, Augusto et Septembri oestro furit, maribus de femina violenter pugnantibus; haec raro cornuta, per octo menses gravida unum

unum parit biunulum, raro gemellos; sine Februarii Martioque cornua amittit, recuperat Julio. Pellis eximia. Caro sapida.

Pulcherrimum animal $3\frac{1}{2}$ pedes altum, supra ex rufo-fuscum, subtus albescens, varius totum album, junius albobaculatum, fossa lacrymali ante oculos distinctum. Cornuum rami numero quotannis crescunt.

Anatomic. E. N. C. cent. 10. app. 448.

Graba *Eleographia*. Jenae 1668. 8. I. G. Agricola *cervi natura*. Amberg. 1617. 4.

- Tarandus. 4. C. cornibus ramosis recurvatis teretibus; summitatibus palmatis. *Fn. succ.* 41. *Amoen. acad.* 4. p. 144. t. I. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 11. *Schreber Sacugth.* V. t. CCXLVIII. A. B. C. C.
- Tarandus. *Plin. hist. nat.* VIII. c. 34. *Aldrov. bisulc.* p. 859. fig. p. 861. *Fonst. quadr.* p. 90. t. 37. *Charlet. exerc.* p. 12. *Scheff. Lappon.* p. 321. fig. p. 327.
- Tapxvdoc.* *Aelian. anim.* II. c. 16.
- Rangifer. *Gesn. quadr.* p. 950. *Aldr. bisulc.* p. 863. *Fonst. quadr.* t. 37. *Mus. Worm.* p. 337. *Scheffer Lapp.* p. 338. *Charlet. exerc.* p. 12. *Klein quadr.* p. 23. t. 1. *Raj. quadr.* p. 88. *Olear. mus.* 16. t. 10. f. 3.
- Renne.* *Buffon hist. nat.* XII. p. 79. t. 10. 11. 12.
- Rein. Penn. quadr.* p. 46. n. 36. t. 8. f. 1.
- Rangifer. α. C. cornuum summitatibus omnibus palmatis. *Briff. regn. anim.* p. 92. n. 8.
- Reinthier et Tarandthier.* *Gesn. Tierb.* p. 206. 207. 208. 209.
- Renthier.* *Gr. v. Mellin Schr. der berl. naturf. Ges.* Vol. 1. n. 1.
- groenlandicus. β. C. cornibus teretibus ab imo ad summum cute pilosa tectis, naso piloso. *Briff. regn. anim.* p. 88. n. 4.
- Capra groenlandica.* *Raj. quadr.* p. 90.
- Greenland Deer.* *Catesb. Carol. app.* p. XXVIII.
- Greenland-Buck.* *Edw. av.* 1. t. 51.
- Caribou. γ. C. cornibus rectis, ad basin ramo unico antrorsum verso. *Briff. regn. anim.* p. 91. n. 6.
- Caribou.* *Charlev. nouv. Franc.* 3. p. 129. *Dobbs Hudf.* p. 20. 22.

Habi-

Cervi cystide fellea carent; pedibus anterioribus calcitrant; sylvis delectantur.

Habitat in alpibus Americae, Europae, Asiae, maxime septentrionalibus ad Camtschatcam et Spitzbergen usque, tamen etiam in Russia magis australi, et, quamvis minor, in Sardinia; in Lapponia aestate alpes incolit, hieme in deserta plana descendit, vere culice pipiente, oestro et tabano tarandi ad alpes retropulsus; crepitantibus unguis, victitat lichene rangiferino sub nive sepulto; mas cornua amittit mox a pruritu, fine Novembris, femina pariter cornuta, cornibus tamen minoribus, ad initium, retinens cornua, dum pariat; parit autem, per 33 hebdomadas gravida, circa finem Septembris jam pruriens, medio Maji saepe gemellos; aetatem 16 annorum domesticus non superat; colitur enim frequenter in Lapponia, ad trahendam rhedam, ob lac, carnem, pellem, ex qua vela quoque conficiunt Samoedae; castratus cornua raro amittit ante novum annum.

Corpus magnitudine damae, domestici tres pedes altum, 4 pedes longum, feri majus, supra fuscum, aetate sensim canescens, tandem album, subtus cum ore, perinaeo et cauda album; pili densissimi, colli subtus longiores; mari praeputium propendens; feminae mammae 6, quarum 2 posteriores spuriae.

Anatome. Bartholin. act. Hafn. 1671. n. 135. Houstun act. Stockh. 1774. Vol. XXV. trim. 2. n. 4.

Dama. 5. *C. cornibus ramosis recurvatis compressis: summitate palmata. Fn. suec. 42. Schreber Saeugth. V. t. CCXLIX. A. B.*

Cervus (Dama vulgaris) cornuum unica et altiore summitate palmata. Briss. regn. anim. p. 91. n. 7.

Cervus palmatus, Dama, Dama-cervus. Klein quadr. p. 25.

Cervus platyceros. Raj. quadr. p. 85.

Platyceros. Plin. hist. nat. XI. c. 37.

Ἐλαφος εὐρωπαϊκός et Ἰορκός. Oppian. cyneg. II. 293. 296.

Dama vulgaris. Gesn. quadr. p. 335. fig. p. 1100. Schwenckf. theiotr. p. 87. Aldrov. bisulc. p. 741. Fost. quadr. p. 77. t. 31.

Dain et Daine. Buff. hist. nat. VI. p. 167. t. 27. 28.

Fallow-Deer. Penn. quadr. p. 48. n. 37.

Dann-Hirsch. Ridinger jagdb. Th. t. 7.

Damhirsch. Gesn. Thierb. p. 202. fig. p. 203. Gr. a Melin Schr. der berl. naturf. Ges. Vol. II. n. 9.

Habitat, elapho tamen rarior, et plerumque minor, in Europa ad Persiam borealem usque, Fachmur scripturae sacrae,

crae, rufus, fuscus, albo maculatus, rarius totus albus, gregarius, facile cicurandus, viginti annos vix superans; femina e cornis per 8 menses gravida, unum, rarius binos, vix tres hinnulos parit. Arcetur filo horizontali. It. goth. 335. Caro proba.

Anatome hermaphroditi. *Journal encyclopéd. 1776. P. II.*

- virginia- 8. C. cornibus ramosis antrorsum versis parum palmatis. Penn.
nus. *quadr. p. 51. n. 39. t. 9. f. 2.*
Dama virginiana. *Raj. quadr. p. 86.*
Cervus platyceros. *Sloan. jam. 2. p. 328.*
Chevreuil. *Du Pratz Louif. 2. p. 69.*
Fallow-Deer. *Lawsf. Carol. p. 123. Catesb. Carol. app. p. XXVIII. Brickell North-carol. p. 109.*
Habitat in Carolina et Virginia, damae satis affinis, ast altior, cruribus et cauda longioribus, colore magis cinereo distinctus; ceterum gregarius, agilis, facile cicurandus, hieme muscis arborum victitans; vermibus in capite et gutture obnoxius; caro sicca; pellis eximia.
- Axis. 9. C. cornibus ramosis teretibus erectis: summitate bifida, corpore albo-maculato. *Erxleb. mamm. p. 312. Schreber Saeugeth. V. t. CCL.*
Axis. *Plin. hist. nat. VIII. c. 21. Raj. quadr. p. 89. Buff. hist. nat. XI. p. 397. t. 38. 39. Penn. quadr. p. 51. n. 40.*
β. unicolor, cornuum summitate trifurcata. *Penn. hist. p. 106. n. 48.*
γ. cornibus insignibus albidis: apice trifureato. *Penn. quadr. p. 52. n. 41.*
Habitat in India, et insulis oceani indici, facile cicuratur, olfactus acerrimi; caro salita edulis.
Magnitudo damae, color pallide rufus; cauda supra rufa subtus alba.
- porcinus. 10. C. cornibus graeilibus trifurcis, supra fuscus, subtus cinereus. *Schreb. Saeugeth. V. t. CCLI.*
Porcine Deer. *Penn. quadr. p. 52. n. 42. t. 8. f. 2.*
Habitat in India, 3 pedes cum 6 pollicibus longus, 2 pedes cum 4 pollicibus altus; cornua 13 pollices longa; corpus crassiusculum; cauda 8 pollicum; pedes graciles.
- mexicana- 11. C. cornibus apice trifurcatis antrorsum versis, rufus. Penn.
nus. *hist. of quadr. p. 110. n. 52.*
Cervus major, corniculis brevissimis, Biche des bois. *Bar-rer. Fr. équin. 151.*

Teutlal maçame. *Hernandez an. mexic.* 324.

Baieu. *Bancr. Gui.* 122.

Chevreuil d' Amerique. *Buffon hist. nat.* VI. p. 210, 243.
t. 37.

Habitat in nova Hispania, Guiana et Brasilia.

Cornua crassa, robusta 10 pollicum; magnitudo capreoli;
junioris pellis maculata. Caput magnum; oculi magni
splendidi; caro cervina deterior.

Capreo- 6. C. cornibus ramosis teretibus erectis: summitate bifida; cor-
lus. pore fusco-rufo. *Fn. suec.* 43. *Schreb. Saeugthiere*, V.
t. CCLII. A. B. *Erxl. mamm.* p. 313.

Cervus (Capreolus) cornibus teretibus erectis. *Briff. regn.*
an. p. 89. n. 5.

Caprea. *Plin. hist. nat.* VIII. c. 53. 58. X. c. 72. XI. c. 37.
Aldrov. bisulc. p. 738. *Fonst. quadr.* p. 77. t. 31. *Raj.*
quadr. p. 89.

Capreolus. *Gesfn. quadr.* p. 324. 1098. *Schwenckf. theriotr.*
p. 78. *Fonst. quadr.* t. 33. *Mus. Worm.* p. 339. *Wagn.*
Helv. p. 173. *Sibb. Scot. an.* p. 9. *Klein quadr.* p. 24.

Dorcas. *Charlet. exerc.* p. 12. *Rzacz. Polon.* p. 217.

Chevreuil et Chevrette. *Buff. hist. nat.* VI. t. 198. t. 32. 33.

Roe. *Penn. quadr.* p. 53. n. 43.

Rehbock. *Gesfn. Thierb.* p. 144. fig. p. 144. 145. *Ridinger*

jagdb. Th. t. 9.

*Habitat parvis gregibus in Europae Asiaeque silvis minori-
bus montosis; agilis, cornua deponit auctumno, recupe-
rat hieme; prurit Novembris initio; femina non cornuta
per 20 - 22 hebdomadas gravida parit Aprili gemellos.
Caro eximia.*

Pedes fere 4 longus, $2\frac{1}{2}$ altus. Pili molles, aestate breves
supra rufi apicibus griseis, hieme longiores subgrisei, dor-
so nigricante, subtus albi. Facies nigricans; cornua 6-8
pollicum, tri-raro quadrifurca; crura gracilia; cauda
pollicaris.

Muntjac. 12. C. cornibus teretibus pilosis retroversis trifureis: apice su-
periori uncinato. *Schreb. Saeugth.* V. t. CCLIV.

Ribfaced Deer. *Penn. hist. of quadr.* p. 107. n. 50.

Habi-

*Hujus quoque generis esse videntur, an vere diversae a recensitis speciebus? Temama-
çame Hernand. mexic. p. 325. Cugnaça - Apara et Cugnaçu - ete Marcgr. brasl.
235. Pif. ind. p. 97. fig. p. 98. Biche des bois et Biche des palcutviers Barr.
fr. 64. 15. Mazames et Cariacou. Buff. hist. nat. XII. p. 317. 347. t. 44.*

Habitat per exiguas greges in insulis Java et Zeylon, porcini habitu, capreolo paulo minor; a cornibus costae tres longitudinales ad oculos procedunt. Caro eximia.

243. guineen- 7. C. griseus subtus nigricans. *Mus. Ad. Frid. I. p. 12.*
 fis. Grey-Deer. *Penn. quadr. p. 55. n. 45.*
Habitat in Guinea; an vere hujus generis?

CAMELOPARDALIS. Cornua simplicissima pelle
 tecta, fasciculo pilo-
 rum nigro terminata.
Dentes primores inferiores
 VIII spatulati extimo
 externe profunde bi-
 lobo.

- Giraffa. 1. C. *Schreb. Saengeth. V. t. CCLV. Plin. hist. nat. VIII. c. 18.*
Oppian. cyneg. III. 461. Gesn. quadr. p. 160. Aldrov.
bifule. p. 927. fig. p. 931. Jonst. quadr. p. 98. t. 39. 45.
Charlet. exerc. p. 13. Raj. quadr. p. 90. Pr. Alp. aeg.
I. p. 236. t. 14. f. 4. Ludolf aeth. I. c. 10. n. 33. comm.
p. 149.
Cervus Camelo-pardalis. Syst. nat. XII. p. 92. n. 1. Haf-
selq. it. Pal. p. 203. act. Ups. 1750. p. 15.
Orasius, Orasius. Vincent. specul. doct. 19. c. 97. Albert.
de anim. p. 223.
Giraffa. Nieremb. hist. nat. p. 191.
Camelus indicus, alius camelus, camelus indicus versicolor.
Jonst. quadr. t. 40.
Gyrassa. Bellon. obs. p. 118. fig. p. 119.
Giraffe. Theven. cosmogr. I. fol. 388. b. fig. fol. 389. a.
Lobo abiss. I. p. 292. Buffon hist. nat. XIII. p. 1.
Giraffa. Klein quadr. p. 22. Briss. quadr. 61.
Camelpard. Gesn. Thierb. p. 236. f. p. 237. 238. Penn.
quadr. p. 10. n. 12.
Habitat in regione Sennar, inter Aegyptum superiorem et
Aethiopian, in Aethiopia ipsa (hic a Cosma jam visa) et
Abissinia rara, rarissima in Africa magis meridionali in
silvis frondosis, mitis, timida, celerrima, elegans; pro-
na cubat more cameli; gramine pascitur divaricatis pedi-
bis anterioribus, visitans tamen potissimum arborum
foliis.

Magnitudo cameli mediocris; color ex albido et rufo mistus, maculis numerosis ferrugineis; caput equinum, auriculis satis parvis; collum erectum, compressum, ceterum cameli longissimum; dorsum subconvexum, et ab occipite ad caudam usque jubatum; cauda teres, lumborum dimidia longitudine, subfloccosa; crura cylindrica, anteriora posterioribus multo longiora, ita ut animal antierius 17, posterius modo 9 pedes altitudine aequet.

ANTILOPE. Cornua concava sursum versa teretia, annulata vel spiralia, persistentia.

Dentes primores inferiores VIII.
laniarii nulli.

- leuco-
phaea. 1. A. cornibus recurvatis teretiusculis annulatis, corpore caerulefcente. *Pallas misc. zool. p. 4. spicil. zool. I. p. 6. XII. p. 12. Schreber Saeugth. V. t. CCLXXVIII.*
Blauer Bock. *Kolbe Vorgeb. p. 141.*
Blue Antelope. *Penn. quadr. p. 24. n. 13.*
Habitat ad caput bonae spei; cervo dama major, subtus albus; litura ante oculos pedesque albi; cauda septem pollicum, apice subfloccoso, albo; cornua 20 pollices longa, annulis 20, apice laevi.
- Lerwia. 2. A. cornibus recurvis rugosis, corpore rufescente, nucha barbata. *Pallas spicil. zool. XII. p. 12.*
Antilope (Kob) cornibus medio flexis basi annulatis, apicibus maxime approximatis. *Erxl. mamm. p. 293. n. 23.*
Kob. *Buff. hist. nat. XII. p. 210. 267. t. 32. f. 1.*
Fish-tall f. Lerwee. *Shaw it. I. p. 313.*
Gambian Antelope. *Penn. quadr. p. 39. n. 34.*
Habitat in Africa magis boreali, ad fluvios potissimum Gambia et Senegal; cervi damae magnitudine; fasciculo pilorum insigni in nucha, et scopis genuum anteriorum longioribus distincta. Cornua 13 pollicum, annulis 8-9, apice laevi.
- Rupicapra. 3. A. cornibus erectis teretibus laevigatis, apice retrorsum uncinatis. *Pallas misc. zool. p. 7. spic. zool. I. p. 4. XII. p. 12. Schreb. Saeugth. V. t. CCLXXIX.*
Antilope (rupicapra) cornibus erectis uncinatis, corpore supra ferrugineo. *Erxl. mamm. p. 268. n. 1.*

Capra

Capra (Rupicapra) cornibus erectis uncinatis. *Syst. nat.* XII. p. 95. n. 4.

Hircus (Rupicapra) cornibus teretibus erectis rugosis, ad apicem laevibus et uncinatis. *Briss. regn. anim.* p. 66. n. 4.

Αἰξ ἄγρια. *Oppian. cyneg.* II. 338.

Rupicapra. *Plin. hist. nat.* VIII. c. 53. XI. c. 37. *Gesn. quadr.* p. 321. fig. p. 319. *Bellon. obs.* p. 57. *Aldrov. bis.* p. 725. fig. p. 727. *Fonst. quadr.* p. 74. t. 27. 32.

Charlet. exerc. p. 9. *Wagn. Helv.* p. 183. *Raj. quadr.* p. 78. *Klein quadr.* p. 17. *Scheuchz. it. alp.* I. p. 155.

Rzac. Pol. 223.

Chamois. *Perr. anim.* I. p. 201. t. 29. *Buff. hist. nat.* XII. p. 136. 177. t. 16. *Penn. quadr.* p. 17. n. 10.

Gems. Gesn. Thierb. p. 140. *Ridinger jagdb. Th.* t. 12.

Cemas Aeliani et Herodici. *Bochart hierozoic.* L. III. c. 22.

Habitat in alpibus sabaudicis, valesiacis, helveticis, rhaeticis, noricis, carpathicis, graecis, cretensibus, italicis, delphinatus, pyrenaicis, caucasi, tauri, summis inaccessis gregaria, in dies rarior, victitans ramorum arbusculis, herbis, radicibus, potissimum mei athamantae, ex quibus etiam aegagropilae. Kram. austr. 320.; *celerrima, timida, visu, olfactu, auditu excellit, vocem sibilantem edit; hieme in speluncis rupium latens, coit Octobri et Novembri; et femina Martio et Aprili 2-3 pullos parit. Magnitudo hirci, cruribus tamen longioribus; pili, aestate inprimis, breviores ex rufo fusci, dorso linea nigricante, in fronte, vertice, gula, auricularum interna facie albi; cornua utriusque sexui nigra, praeter apicem rugosa; pone haec sinus subcutaneus; labium superius subsissum; genua barbata. Cauda brevis, subtus etiam nigricans. Pellis eximia. Caro sapida.*

Dama. 4. A. cornibus antrorsum incurvis, corpore albo, dorso fasciaque oculari fulvis. *Pallas misc. zoolog.* p. 5. *Spicil. zool. Fasc.* I. p. 8. XII. p. 13. n. 4. *Schreber Saengthiere*, V. t. CCLXIV.

Dama. *Plin. hist. nat.* VIII. c. 53. XI. c. 37. *Gesn. quadr.* p. 334. *Aldr. bisulc.* p. 729. *Fonst. quadr.* p. 75. t. 27.

Raj. quadr. p. 83.

Nanguer ou Nanguer. *Buff. hist. nat.* XII. p. 213. t. 32. f. 3. t. 34.

Swift Antelope. *Penn. quadr.* p. 30. n. 22.

Habitat ad Senegal, celerrima, facileque mansuescens, 4 ferre pedes longa, 2 cum 8 pollicibus alta, supra fulva, subtus

tus alba, pectore albo maculato; cornua utrique sexui, 8 pollices longa; dentes primores in maxilla inferiori tantum 6.

- redunca. 5. A. cornibus apice antrorsum recurvis, corpore rufescente subhirta. *Pallas misc. zool. p. 5. spicil. zool. I. p. 8. XII. p. 13. n. 5. Schreber Saecugh. V. t. CCLXV. Kemas. Aelian. hist. an. l. 14. c. 4. Nagor. Buff. hist. nat. XII. p. 326. t. 46. Red Antilope. Penn. quadr. p. 30. n. 23. Habitat ad Senegal fluvium, tota fere pallide rufa, 4 pedes longa, 2 pedes cum 3 pollicibus alta; auriculac 5 pollices, cornua $5\frac{1}{2}$ longa.*

- Tragocamelus. 6. A. cornibus antrorsum incurvis, cervice jubata, dorso gibbo, cauda longa floccosa. *Pallas misc. zool. p. 5. spicil. zool. I. p. 9. XII. p. 13. n. 6. Schreber Saecughiere, V. t. CCLXII.*

Antilope cornibus in frontem reduncis, corpore supra cinereo, fronte macula rhombea nigra. *Erxl. mamm. p. 279. n. 9.*

Biggel. *Mandelsl. it. I. p. 122.*

Quadruped brought from Bengal. *Parsons act. angl. n. 476. p. 465. t. 3. f. 9.*

Indostan Antelope. *Penn. quadr. p. 29. n. 20.*

Habitat in India, cameli more procumbens, quem etiam collo aemulatur; 5 circiter pedes alta. Pili in corpore et cauda breves, molles, cinerei, in cauda 22 pollices longa longiores; cornua 7 pollices longa; palcavia tauri cum pilis longioribus.

- picca. 7. A. cornibus antrorsum incurvis, cervice colloque jubatis, cauda longa floccosa, pedibus albo nigroque annulatis. *Pallas spic. zool. XII. p. 14. n. 7. Schreber Saecugh. V. t. CCLXIII. A. B.*

Antilope (albipes) cornibus in frontem reduncis, maculis albis supra ungulas. *Erxl. mamm. p. 280.*

White-footed Antelope. *Penn. quadr. p. 29. n. 21. t. 6. f. 1. 2.*

Nyl-ghau. *Hunter act. angl. Vol. LXI. p. 170. Naturf. VII. p. 236. t. V.*

Habitat in India, 4 circiter pedes alta; color obscure griseus, in femina ecorni magis in fuscum vergens; cornua brevina; auriculac magnac, nigro striatae; juba nigra; femi-

feminae pedes supra ungulas fasciis tribus nigris et duabus albis.

- Saiga. 8. A. cornibus distantibus lyratis pallido-diaphanis, naso cartilagineo ventricoso. *Pallas misc. zool. p. 6. spicil. zool. XII. p. 14. n. 8. p. 21. t. I. et III. f. 6. 9. 10. 11. S. G. Gmelin it. II. p. 174. t. 12. et nov. comm. Petrop. Vol. XVI. P. I. p. 512. Forster act. angl. LVII. p. 344.*
 Antilope (scythica), cornibus rectiusculis diaphanis, corpore albedo. *Pallas spic. zool. I. p. 9. Erxl. mamm. p. 289. Penn. quadr. p. 35. n. 30.*
 Capra (tatarica) cornibus teretibus rectiusculis perfecte annulatis apice diaphanis, gula imberbi. *Syst. natur. XII. p. 97. n. 11.*
 Colus. *Strabo geogr. L. VII. Gesn. quadr. p. 893. Jonst. quadr. t. 27.*
 Suhac. *Aldrov. bisulc. p. 763. Charlet. exerc. p. 11. Rzacz. Pol. p. 224. auct. p. 320.*
 Ibx imberbis. *I. G. Gmelin nov. comm. Petrop. V. p. 345. VII. summ. p. 39. t. 19.*
 Saiga. *I. G. Gmelin it. sib. I. p. 212. Buffon hist. nat. XII. p. 198. t. 22. f. 2.*
Habitat in regionibus Russiae minoris et Poloniae, montibus Carpathicis, Danubialibus, Caucaseis, Cerauniis, maribus Pontico, Calpio, et Aralienfi, alpibus Altaicis interpositis desertis, aridis, apricis salsuginosis ad 55^{um} latitudinis gradum, auctumno praesertim, gregaria, mirae pernicitatis, brevi tamen fatigata, timida, voce ovis, olfactu acris; junior mansuescens maxime sensibilis; sub finem Novembris coit, tunc mas pro feminis contra hostes pugnat, et austrum versus migrat; femina ecornis, molliori etiam pilo gaudens, ante medium Maji unum ut plurimum pullum parit; erecta incedit; habitus minus elegans; saepe retrograda pascitur, herbasque a latere carpit, oestro infestata, odoris balsamici; aliquando tricornis, raro unicornis; caro vix assata edulis.

M 5

Magni-

Antilopae mediae quasi inter cervos et capras habitu cervino, cornibus caprinis, cysti-
 de feltea gaudent, sinibus subocularibus satis insignibus, inguinum cavernis plica
 septis, scopis genuum, oculis pulcherrimis nigris gaudent, timidae, agiles, et ce-
 leres, corpore pedibusque ut plurimum graciliores, gregariae incedunt saepe ad ali-
 quot millia; vescuntur potissimum fruticulis; rarius plana et silvas, quam colles
 incolunt, in America et, Rupicapra Saigaque excepta, in Europa exules, cali-
 diova praesertim Africae et Asiae inhabitant. Caro saepius esculenta, alias mo-
 schum aut hircum redolet.

Magnitudo damae; longitudo 4 pedes excedens; nares patentissimae, osse nasali, septoque osseo nullo; dentes molares utrinque sex; collum artusque graciles; vellus aestivum breve laevissimum per dorsum et latera ex griseo lutescens, artubus infra genua saturatius, collo corporeque subtus et artubus interius album, infra oculos sensim albescens; hybernum longius ad 2 pollices subhirtum, ex griseo pallidum, extrorsum albidum.

gutturo- 9. *A. cornibus lyratis, corpore rufescente, scopis genuum nullis. Pallas spic. zool. Fasc. XII. p. 14. n. 9. p. 46. t. II. et III. f. 14-17.*

Antilope. *Bellon. it. I. p. 311. 319.*

Capra flava. *du Halde chin. 2. p. 253. 278. 290.*

Capra gutturosa campestris hydrophobos, cornibus non ramosis circellatim undulatis, sinu gemino leniter inflexis. *Messerschm. mus. petrop. I. p. 336. n. 12.*

Caprea campestris gutturosa. *L. G. Gmelin nov. comm. Petrop. V. p. 347. t. 9.*

Habitat in desertis Mongoliae, omnibusque inter Tibetum et Sinam ad austrum extensis, gregaria, colles, et pascuca sicca, aprica, rupestris amans, plantis modo dulcibus vescens, cursu et saltu vix fatiganda, junior facile mansuescens; multo serius Saiga prurit, femina demum Junii initio prolem pariente.

Magnitudo et forma cervicaprae; longitudo (maris) 4 pedum et 4 pollicum; altitudo 2 pedes et 6 pollices excedens; dentes molares ubique sex; sinus lacrimales minimi; cornua rugis annularibus circiter 20; collum larynge maximo in medio colli fluctuante conspicuum; loco scoparum in genibus pili vix elongati; cauda brevis; cavernae inguinales maximae; color omni aetati idem, aestate supra potissimum ex griseo ferrugineus, subtus albicans; mari folliculus insignis ad praeputii orificium, vacuus, rarius ceruminis specie repletus.

subguttu- 23. *A. cornibus lyratis, corpore supra ex cinerascete brunneo, infra niveo, fascia laterali ex albido lutescente. Schreb. Saeugth. V. t. CCLXX. B. Gùldenstedt act. Petrop. 1778. I. p. 251. t. 9-12.*

Habitat in Persia inter mare caspium et nigrum, habitu et magnitudine capreolum simulans, gregaria, artemisia pontica potissimum victitans; femina parit Majo; caro sapida. Cornua ultra 13 pollices longa, apice laevia;

via; caput laryngis sub cute prominens; genua scopis hirta.

- Pygarga. 10. A. cornibus lyratis, collo fanguineo, tergo rufo-canefcente, fascia laterali faturata, clunibus albis. *Pall. spic. zool. I. p. 10. XII. p. 15. n. 10. Schreber Saeugthiere, V. t. CCLXXIII. Sparrmann act. Stockh. 1780. 3. 4.*

Antilope Dorcas. *Pallas misc. zool. p. 6.*

White-faced Antelope. *Penn. quadr. p. 34. f. p. 28.*

Cervicapra. *Houttuyn Linn. ed. belg. III. t. 24. f. 1.*

Mountain-antelope. *Russell alepp. p. 54?*

Koba. *Buff. hist. nat. XII. p. 210. 267. t. 32. f. 2?*

Habitat in Africa, forsan etiam in citeriore Asia, egregie saliens, hirco major, ut 5 pedes et 4 pollices altitudine aequet; caro sapidissima; cornua 16 pollicum, mari annulata, feminae laevia; auriculae et cauda 7 pollicum; facies alba.

- Dorcas. 11. A. cornibus lyratis, corpore supra fulvo, subtus albo, fascia laterali fusca. *Pallas misc. zoolog. p. 6. n. 7. spicil. zool. I. p. 11. n. 8. XII. p. 15. n. 11. Schreber Saeugth. V. t. CCLXIX. Sparrm. act. Stockh. 1778. trim. 2. n. 4.*

Capra (Dorcas) cornibus teretibus perfecte annulatis recurvatis contortis. *Syst. nat. XII. 1. p. 96. n. 10.*

Hircus (Gazella africana) cornibus teretibus arcuatis, ab imo ad summum fere annulatis, apice tantummodo laevi. *Briss. regn. anim. p. 69. n. 10.*

Gazelle. *Buff. hist. nat. XII. p. 201. t. 23.*

Gazella africana cornibus brevioribus ab imo ad summum fere annulatis, et circa medium inflexis. *Raj. quadrup. p. 80.*

Δορκας. Aelian. hist. anim. XIV. c. 4.

Dorcas antiquorum, Tzebi biblica. *Shaw it. p. 152. 357.*

Barbarian Antelope. *Penn. quadr. p. 33. n. 26. f. in tit.*

Habitat in Africa, etiam boreali, Arabia, Syria, Dischon Moysis, ceruo dama dimidio minor; cornua 12 pollicum, annulis prope basin circiter 13; genua longis pilis hirta. Cauda supra nigra, subtus alba.

- Kevela. 12. A. cornibus lyratis, majusculis, compressis, tergo fulvescente, strigis pallidis, fascia laterali nigrescente. *Pallas misc. zool. p. 7. n. 9. spicil. zool. I. p. 12. n. 9. XII. p. 15. n. 12. Schreber Saeugth. V. t. CCLXX.*

Ibex capensis? *Kolb. cap. I. p. 166.*

Ahu. *Kaempf. amoen. p. 408.*

Kevel. *Buff. hist. nat.* XII. p. 258. t. 26.

Flathorned Antelope. *Penn. quadr.* p. 34. n. 27.

Habitat in Africa, ad fluvium Senegal, et Persia, gregaria, facile mansuescens, moschum redolens, parvi capreoli magnitudine; cornua utriusque sexui annulis 14-18; caro, ut plerorumque congenerum, sapidissima.

Corinna. 24. A. cornibus sublyratis rectiusculis tenuibus laevigatis, corpore fulvescente subtus albo, fascia laterali capitis fusco-alba. *Pallas misc. zool.* p. 7. n. 10. *Spic. zool.* I. p. 12. XII. p. 15. n. 12. β . *Schreber Sacugh.* V. t. CCLXXI.

Habitat in Africa, capreolo minor; cornua gracilia, 6 pollicum, rugis circularibus annulata, an femina Kevellae, cum qua colore moschato, summaque agilitate et velocitate convenit?

Bubalis. 13. A. cornibus crassis lyrato-contortis rugosis, apice directis, capite caudaque elongatis. *Pallas spic. zool.* I. p. 12. n. 10. XII. p. 16. n. 13.

Antilope cornibus medio flexis spiralibus, faciei linea nigra. *Erxleb. mamm.* p. 291.

Antilope Bufelaphus. *Pallas misc. zool.* p. 7.

Βουβαλος. *Oppian. cyneg.* II. p. 300. *Aristot. de part. anim.* L. III. c. 2.

Bubalus. *Plin. hist. nat.* VIII. c. 15. *Gesn. quadr.* p. 330. *Aldrov. bisulc.* p. 363. 365. 735. *Fonst. quadr.* p. 52.

Bubalus antiquorum, Yachmur biblicus. *Shaw it.* p. 151. 358.

Bufelaphus Caji. *Gesn. quadr.* p. 121. *Raj. quadr.* p. 81.

Cervus Temamacama. *Seb. mus.* I. p. 69. t. 42. f. 4.

Capra Dorcas. *Houttuyn ed. Linn. belg.* p. 213. t. 24. f. 3.

Hartebeest. *Sparrmann act. Stockb.* 1779. 2. n. 4. t. 5. f. 3. *sup.*

Vache de Barbarie. *Act. paris.* I. p. 205. *Valent. amphith. zoot.* p. 88. t. 14.

Bubale. *Buffon hist. nat.* XII. p. 294. t. 37. 38. f. 1. 2.

Cervine Antelope. *Penn. quadr.* p. 37. n. 32.

Habitat in Africa, praesertim boreali, et Arabia; gregaria; caro tenera, sed sicca.

Altitudo 4 pedum; habitus corporis inter cervinum et vacinum intermedius; caput bovillum; cornua robusta nigra ad 20 pollices longa; cauda pedalis, floccosa, asinina.

Gnu. 25. A. cornibus basi antrorsum, versus medium retrorsum ver-
fis, corpore ferrugineo, cervice jubata, cauda ex albo
cinerea. *Sparrm. act. Stockh. 1779. l. n. 7. t. 3. Penn.
hist. p. 62. n. 16.*
*Habitat in planitiibus Africae pone caput bonae spei a ma-
gnis Namaiquas occupatis, gregaria, ferox, cornibus
pugnans, habitu caudaque equinis, capite bovillo, femo-
ribus cervinis, pilis et sinibus lacrymalibus antilopes.*
*Altitudo 3½, longitudo aliquando 6½ pedes superans. Cor-
nua nigra in utroque sexu, 5 pollicibus pedem superantia.*
*Color obscure fuscus; pectoris niger; jubae cinereus. Ca-
ro sapida.*

Oryx. 14. A. cornibus rectissimis subulatis argute rugosis, corpore
griseo, striga dorsali nigricante, pilo postico contrario.
*Pallas spic. zool. XII. p. 16. n. 14. et p. 61. Schreb. Saeu-
thiere, V. t. CCLVII.*
Antilope (recticornis) cornibus teretibus rectissimis, basi an-
nularis. *Erxl. mamm. p. 272. n. 3.*
Antilope bezoartica. *Pallas miscell. p. 8. spicil. zool. I.
p. 14.*
Antilope recticornis. *Pallas nov. comm. Petrop. XIII. p. 468.
t. 10. f. 5.*
Capra (Gazella) cornibus teretibus longissimis: basi annula-
tis. *Syst. nat. XII. 1. p. 96. n. 7. Briss. quadr. 67.*
Oryx. *Agatharch. peripl. Plin. hist. nat. II. c. 40. VIII.
c. 53. X. c. 73. Columella rust. IX. c. 1. Martial. epigr.
I. 13. Macrob. saturn. l. 3.*
Gazella indica, cornibus rectis longissimis nigris, prope ca-
put tantum annularis. *Raj. quadr. p. 79.*
Capra Gazella africana. *Hasselq. it. p. 283.*
Pasan. *Buff. hist. nat. XII. p. 212. t. 33. f. 3.*
Aegyptian Antelope. *Penn. quadr. p. 25. n. 14.*
*Habitat ad caput bonae spei, in Aegypto, Arabia, India
in planis, Zebi scripturae sacrae, magnitudine cervi da-
mae, subtus alba, cornibus tripedalibus, cauda pedali
apice nigra.*

Oreotra- 26. A. cornibus rectissimis subulatis, basi parum rugosis, ca-
pitate rufa, corpore ex flavo virescente subtus ex albo ci-
nereo, cauda brevissima. *Schreb. Saeugeth. V. t. CCLIX.*
Habitat in Africa.

Gazella. 15. A. cornibus subulatis subarcuatis rugosis. *Pallas spic. zool.* XII. p. 17. n. 15.

Capra (bezoardica) cornibus teretibus arcuatis totis annulatis, gula barbata. *Syst. nat.* XII. p. 96. n. 9.

Hircus cornibus teretibus arcuatis, ab imo ad summum fere annulatis. *Briff. quadr.* 69. n. 10.

Hircus bezoardicus. *Aldrov. bisulc.* p. 756. *Major Ephem. N. Cur. Dec. 1. a. 8. p. 1. t. 1. Mus. Bresl. t. 10. f. 3. 4. Valent. mus. museor. ed. germ. I. p. 193. t. 36. f. 2. 4.*

Animal bezoarticum. *Raj. quadr.* 80.

Gazella. *Bell. obs.* 120. *Pr. Alp. aegypt.* p. 232. t. 14.

Bezoar-Antelope. *Penn. quadr.* p. 26. n. 15.

Animal ignotum. *Gesn. quadr.* p. 309. ic. p. 38.

Algazel. *Buff. hist. nat.* XII. p. 211. t. 33. f. 1. 2.

Habitat in India, Persia, ipsa boreali, Aegypto et Aethiopia, gregaria, colles celerrime adscendens, facile cicuranda, colore rufo, pectore albo, fugacissima, autumno pruriens, verè pariens. In hujus non raro, frequentius in maris et adulti abomaso bezoar genuinum orientale, virens et caeruleus, in patria sua odoratissimum, et quam maxime aromaticum.

Leucoryx. 16. A. cornibus subulatis rectis convexe annulatis, corpore lacteo. *Pallas spicil. zool.* XII. p. 17. n. 16.

Oryx. *Oppian. cyneg.* II. vers. 445.

Gazellae indicæ cornu singulare. *Nov. comm. petrop.* XIII. p. 470. t. 10. f. 5.

Antelope Leucoryx. *Penn. hist.* p. 68. t. 20.

Habitat in insula sinus Bassorici Gow Bahrein; nivea, faciei modo media parte, genis et artubus rubicundis. Nafus vaccinus; cornua longa, acuta, nigra, gracilia; cauda subfloccosa.

Oreas. 17. A. cornibus subulatis rectis carinato-contortis, corpore griseo. *Pallas spicil. zool. Fasc. XII.* p. 17. n. 17. *Schreber Saeugth. V. t. CCLVI.*

Antilope Oryx. *Pallas misc. zool.* p. 9. *spicil. zool. Fasc. I.* p. 15.

Mazame. *Seba mus. I.* p. 69. t. 42. f. 3.

Africanisches Elendthier. *Kolb. Vorgeb. der gut. Hofn. I.* p. 145. t. 3. f. 1.

Coudou. *Buff. hist. nat.* XII. p. 357. t. 46. b. 47.

Indian Antelope. *Penn. quadr.* p. 26. n. 16.

Eland. *Sparrm. act. Stockh.* 1779. 2. n. 5. t. 5. fig. inf. *Habi-*

Habitat in Indiae, Congo et Africae meridionalis alpestribus, ut plurimum gregaria, parum pernix. Caro sapidissima; ex cornibus fistulas tabacarias conficiunt Hottentottae.

Altitudo 5-8 pedum; cornua ad 2 pedes longa, in utroque sexu ex atro fusca; corpus ex caeruleo cinereo, juba cervicis dorsique nigra; caput rubicundum; cauda subfloccosa apice nigra; sinus lacrymales nulli.

scripta. 18. A. cornibus subulatis rectis contortis, corporis strigis albis decussatis. *Pallas misc. zool. p. 8. n. 14. Spicil. zool. I. p. 15. XII. p. 18. n. 18. Schreb. Saengeth. V. t. CCLVIII. Guib. Buff. hist. nat. XII. p. 305. 327. t. 40. 41. f. 1. Harnessed Antelope. Penn. quadr. p. 27. n. 17.*

Habitat gregaria in campestribus et silvis, fluvio Senegal adjacentibus; color castaneus; pedum digiti albo-maculati; cauda 10, cornua 9 pollices longa.

Grimmia. 19. A. cornibus conicis compressis rectissimis rugoso-striatis, hinc detritis, fossa suboculari atra. *Pallas misc. p. 8. 10. t. 1. 3. 4. f. 3. a. b. Spic. zool. I. p. 38. t. 3. XII. p. 18. n. 19. Schreber Saengeth. V. t. CCLX.*

Antilope cornibus rectis basi subannulatis, inter cornua fasciculo tophoso. *Erxl. mamm. p. 276. n. 7.*

Moschus (Grimmia) capite fasciculo tophoso. *Syst. nat. XII. 1. p. 92. n. 2.*

Tragulus (africanus) in medio capite fasciculum pilosum erectum gerens. *Briss. regn. anim. p. 97. n. 4.*

Capra (Grimmia) capite fasciculo tophoso, cavitate infra oculos. *Syst. nat. II. p. 51. VI. p. 14. n. 10. X. 1. p. 70. n. 10.*

Capra silvestris africana. *Grimm misc. nat. curios. dec. 2. a. 4. p. 131. f. 13. Raj. quadr. p. 80. Klein quadrup. p. 19.*

Grimme. *Buffon hist. nat. XII. p. 307. 329. t. 41. f. 2. 3.*

Guinea-Antelope. *Penn. quadr. p. 27. n. 18.*

Habitat in Guinea, magnitudine pulli bimestris cervi damae; supra cinereo flavoque admisso fusca, subtus alba; cornua (feminae nulla) nigra, 18 pollices longa, basi longitudine 3 pollicum leviter annulata. Cauda brevis, supra nigra.

Pygmaea. 20. A. cornibus conicis brevibus convexis basi rugosis. *Pallas spic. zool. XII. p. 18. n. 20.*

Der Hirsche ihre Koenige. *Bossm. guin. p. 252.*

Cervus juvenis perpusillus. *Seb. mus.* I. p. 70. t. 43. f. 3.
Guevei-Cajor. *Adanson apud Buffon hist. nat.* XII. t. 43.
 f. 2.

Royal Antelope. *Penn. quadr.* p. 28. n. 19.

Habitat in Africa torrida; agilissima, 12 pedum altitudine saliens, mitis, 9 pollices altitudine non superans, ex rubicundo fusca. Cornua nigra, gagatae ad instar lucida, 2 pollices longa, feminae nulla.

sylvatica. 27. A. cornibus subspiralibus annulatis carinatis, apice laevibus acutis, corpore supra fusco, postice albo-maculato, infra potissimum albo. *Sparrm. act. Stockh.* 1780. 3. n. 7. t. 7. *Schreb. Saength.* V. t. CCLVII. B.

Habitat pone caput bonae spei in silvis, scriptae aliquantum affinis, sed minor, ut tres pedes altitudine vix superet, monogama. Cornua $10\frac{1}{2}$ - 13 pollices longa, nigra, feminae nulla; collum dorsumque subjugatum. Caro esculenta.

Strepsiceros. 21. A. cornibus spiralibus carinatis subrugosis, corpore strigis transversis et spinali albis. *Pallas misc. zool.* p. 9. *spic. zool.* I. p. 17. XII. p. 19. 67. *Schreber Saengthiere,* V. t. CCLXVII.

Cervus capensis. *Collini act. ac. Theod. Palat.* I. p. 487.

Strepsiceros. *Gesn. quadr.* p. 295. 323. ic. 31. *Fonst. quadr.* p. 54. t. 24.

Bos strepticeros. *Aldr. bis.* p. 368. f. p. 369.

Animal anonymum. *Houttuyn syst. nat. ed. belg.* III. t. 26. f. 1. 2.

Condoma. *Buff. hist. nat.* XII. p. 301. t. 39. f. 1. 2.

Striped Antelope. *Penn. quadr.* p. 31. n. 24.

Africanischer Kutu. *Knorr delic.* II. t. K. 5. f. 1. 4. K. II.

Habitat ad caput bonae spei, 9 pedes longa, 4 alta; corpus gracile e griseo rubens, subtus griseum; collum jugatum; pectus cristatum; facies nigricans, lineis duabus albis; cornua pallide fusca, 3 pedes et 9 pollices longa; cauda 2 pedum, supra fusca, subtus alba, apice nigra.

Cervicopra. 22. A. cornibus spiralibus teretibus annulatis, corpore fulvescente adumbrato. *Pallas misc. zool.* p. 9. *spic. zool.* I. p. 18. 19. t. 1. 2. XII. p. 19. n. 22. *Schreber Saength.* V. t. CCLXVIII.

Antilope cornibus spiralibus annulatis, corpore supra fusco subtus albo. *Erxl. mamm.* p. 283. n. 14.

Anti-

30.

Aega
grus.

Hirc

- Antilope, et Antilope des Indes. *Buff. hist. nat.* XII. p. 215.
217. t. 35. 36. fig. 1. 2.
- Capra (Cervicapra) cornibus teretibus dimidiato-annulatis flexuosis contortis. *Syst. nat.* II. p. 50. VI. p. 14. n. 7.
X. I. p. 69. n. 8. XII. I. p. 96. n. 8.
- Hircus (Gazella) cornibus teretibus dimidiato-annulatis bis arcuatis. *Briss. quadr.* 68. n. 8.
- Capra bezoartica. *Aldrov. bis.* p. 256. *Olear. mus. gott.* p. 13. t. 9. f. 7.
- Strepsiceros et Addax. *Plin. hist. nat.* XI. c. 37.
- Gazella. *Jonst. quadr.* t. 29. *Aët. Paris.* I. p. 84. *Valent. amphib. zoot.* p. 105. t. 19. *Scheuchz. bibl. sacr.* IV. t. 576.
- Gazella africana f. Antilope. *Charlet. exerc.* p. 67. *Raj. quadr.* p. 79. n. 4. *Grew mus.* p. 24.
- Tragus Strepsiceros. *Klein quadr.* p. 18.
- Lidmæ arabum. *Shaw trav.* p. 243.
- Common Antelope et brown common Antelope. *Penn. quadr.* p. 32. n. 25.
- Habitat in Africa magis boreali, et India, cervo dama paulo minor; cauda brevis, supra nigra, subtus alba; caput nigricans, orbitis albis, ore fusco; cornua erecta nigra, ut plurimum fere tota annulata, apicibus 16 pollices distantia, 14 circiter pollices longa, feminae uniparae per 9 menses gravidæ nulla.*

30. CAPRA. Cornua concava sursum versa, erecta, compressa, scabra.

Dentes primores inferiores VIII. lanarii nulli.

Mentum barbatum.

- Aega- I. C. cornibus carinatis arcuatis, gula barbata. *Pallas spicil. zool.* XI. p. 45. t. 5. f. 2. 3. *S. G. Gmelin it.* III. p. 493.
grus. Capricerva. *Kaempf amoenit. exot.* p. 398. t. 4. n. 1.
Steinbok. *Ridinger jagdb. Th.* t. 11.
Chevre sauvage. *Tavernier it.* 2. 143.
Caucasian ibex. *Penn. hist.* p. 52. n. 14.
- Hircus. β. C. cornibus carinatis arcuatis. *Syst. nat.* XII. p. 94. n. 1.
Fn. suec. 44. *Forster aët. angl.* LVII. 344.
Hircus cornibus interioribus cultratis exterioribus rotundatis, infra carinatis arcuatis. *Briss. regn. an.* p. 62. n. 1.

- Tragus domesticus. *Klein quadr.* 15.
 Capra domestica. *Sloan. jam.* 2. p. 328.
 Hircus domesticus. *Charlet. exerc.* p. 9.
 Caper hispanicus. *Fonst. quadr.* t. 26.
 Capra, hircus, hoedus. *Plin. hist. nat.* VIII. c. 50. *Gesn. quadr.* p. 270. 301. f. 302. 314. *Aldrov. bis.* p. 619. fig. p. 635. *Fonst. quadr.* p. 65. t. 26. 27. *Sibb. Scot. an.* p. 8. *Raj. quadr.* p. 77. *Rzac. Pol.* p. 239. *Schwenckf. theriotr.* p. 97. 98. 100. 101.
 Τράγοι et Αἴρες. *Aristotel. hist. anim.* V. c. 11. VI. c. 15. VIII. c. 13. IX. c. 4. *Oppian. cyneg.* II. 326.
 Bouc et Chevre. *Buff. hist. nat.* V. p. 59. t. 8. 9.
 Geyfs et Bock. *Gesn. Tierb.* p. 127. fig. p. 128. 135.
 Domestic goat. *Penn. quadr.* p. 14.
- angoren- γ. C. pilis longissimis crispis toto corpore vestita. *Briss. regn.*
 is. an. p. 64. n. 2.
 Αἴξ ἐν λυμῶ. *Aelian. an.* XVI. c. 30.
 Capra angorensis. *Hasselq. it.* 206. *Olear. mus.* t. 10. f. 2. *Forster act. angl.* LVII. p. 344.
 Chevre d'Angora. *Tournef. it.* 2. p. 185. *Buffon hist. nat.* V. p. 71. t. 10. 11.
 Angora goat. *Penn. quadr.* p. 15.
- mambri- δ. C. cornibus reclinatis, auribus pendulis, gula barbata. *Syst.*
 ca. nat. XII. p. 95. n. 3.
 Capra syriaca cornibus minimis erectis, parumper retrorsum incurvis, auribus longissimis pendulis. *Briss. regn.* an. p. 72. n. 13.
 Capra indica, et Capra indica aut mambrina, aut syriaca potius. *Gesn. quadr.* p. 1097. 1098.
 Capra auribus oblongis. *Pr. Alp. aeg.* I. p. 229.
 Capra auribus demissis. *Aldr. bisulc.* p. 769. f. p. 768.
 Capra mambrina; indica et mambrina syriaca. *Fonst. quadr.* p. 81. t. 26.
 Capra mambrina f. syriaca Gesneri. *Raj. quadr.* p. 81.
 Geyssen mit hangenden Ohren. *Rauwolf it.* 3. p. 26.
 Chevre mambrine ou chevre du levant. *Buff. hist. nat.* XII. p. 152. 154.
 Other kind of goats. *Russel. alepp.* p. 52.
 Syrian Goat. *Penn. quadr.* p. 15. t. 5. f. 1. 2.

s. C.

Angorensia animalia: Capra, Ovis, Catus, Lepus, cur lanata pilis longioribus, tenerioribus, mollioribus?

depressa. ε. C. cornibus depressis incurvis minimis cranio incumbenti-
bus. *Syst. nat.* XII. I. p. 95. n. 5.

Hircus (Capra parva americana) cornibus depressis incurvis
minimis cranio incumbentibus. *Briss. regn. an.* p. 65. n. 4.

Autre petite chevre à cornes rabattues, Bouc d'Afrique,

Chevre naine. *Buff. hist. nat.* XII. p. 154. t. 18. 19.

African goat. *Penn. quadr.* p. 16.

reversa. ζ. C. cornibus erectis apice recurvis. *Syst. nat.* XII. I. p. 95.
n. 6.

Ibex parvus americanus. *Briss. regn. an.* p. 65. n. 5.

Petite chevre à cornes droites et recourbées à la pointe;

Bouc de Juda; Chevre de Juda. *Buffon hist. nat.* XII.

p. 154. 186. t. 20. 21.

Whidaw goat. *Penn. quadr.* p. 16.

Capricor- η. C. cornibus brevibus apice antrorsum versis ad latera annu-
nus, latis.

Capricorne. *Buff. hist. nat.* XII. p. 146. t. 15.

Capricorne Goat. *Penn. quadr.* p. 16.

Habitat ferus in Caucasi Taurique praesertim, in aliis etiam
Persiae, Indiae, Japoniae, forsitan quoque Candiae, Afri-
cae, ipsiusque Europae alpibus inferioribus, cervum agi-
litate, aliquantum etiam habitu simulans, varietatibus
omnibus major, cornibus feminae quidem nullis aut exi-
guis, at mari longe majoribus, robustis, rugosis, ex fusco
cinerascentibus; cervice artubusque robustissimis; capite
crasso duro; arunco insigni castaneo, sinu ante oculos mi-
nusculos antroque inguinali nullo, cauda brevissima atra;
colore ex griseo vel cinereo rufescente, linea spinali ni-
gra; vellere hirto; ventriculo bezoar continente; β) hospi-
tatur per omnem Europam, et reliquas telluris partes,
vilitans ramulis arborum frondibusque variis, licheni-
bus, ipsa cicuta, euphorbiis aliisque impune venenatis et
medicatis; loca montosa amat, albo nigroque colore va-
riat, aetatem 10-12 annorum assequitur, raro ecornis
aut quadricornis; ferus iterum factus ex cicure in insula
Juan Fernandez reperiri fertur; pecus insidum, petulans,
bellicosum, saliens, salax; capra per 5 menses gravida 1
aut 2 rarius 3-4 hoedos pariente; hircum olens, frigoris
impatiens, arbores decorticans, corio tenaci indutum,
lana caprina tectum, lacte quoque et caseo utile. γ) hos-
pitatur circa Angoram, lana ad pedes dependente nivea,
serici aemula, camelina dicta; cornua torta ad latera
protracta, ut ovis hispanicae; auriculae planae lanceola-
tae,

zæ, declinatae, nec erectae canaliculatae. δ) habitat in Syria, hirco paulo major, cornibus nigris, pilis fulvis. ε) habitat in Africa, culta hodiernum in America meridionali, boedi magnitudine, pilis longis pendulis, cornibus triangulis lunatis crassis vix digitum longis, cranio ita appressis, ut cutem fere perforent. ζ) habitat in regno africano Juda, boedi annui magnitudine, pilis brevibus cervinis, cornibus vix digitum longis, cum ε coiens.

- Ibex. 2. C. cornibus supra nodosis in dorsum reclinatis, gula barbata. *Briff. regn. an. p. 64. n. 3.*
 C. cornibus lunatis rotundatis, supra rotundatis in dorsum reclinatis. *Erxl. mamm. p. 261. n. 2.*
 Capra (alpina) cornibus longissimis subtriangularibus supra nodosis, in dorsum reclinatis. *Girtanner apud Liechtenberg Magazin IV. 2. p. 30.*
 Ibex alpium fibiricarum. *Pallas spic. zool. XI. p. 31. t. 3. et V. f. 4.*
 Ibex. *Plin. hist. nat. VIII. c. 53. Gesn. quadr. p. 331. et 1099. Aldrov. bis. p. 730. f. p. 732. Jonst. quadrup. p. 75. t. 25. 28. Charl. exerc. p. 10. Wagn. Helvet. p. 176. Raj. quadr. p. 77. Klein quadr. p. 16.*
 Hirci feri quoddam genus Cretae familiare. *Bell. obs. p. 20. Bouquetin. Buff. hist. nat. XII. p. 136. t. 13.*
 Wild Goat. *Penn. quadr. p. 13. n. 9.*
 Steinbock. *Gesn. Thierb. p. 148. Knorr delic. II, t. K. 5. f. 2.*
Habitat in Camtschaticis, fibiricis, arabicis, cretensibus, italicis, penninis, helveticis, rhaeticis, noricis (in posterioribus hodiernum in dies rarior) alpiibus praeruptis inaccessis, gregarius, agillimus, perniciosissimus, saliendo dexterrimus, junior cicurandus; femina 1-2 boedos pariente; aegagro major, mare tamen feminam superante, cui etiam aruncus et cornua minora, mammae duae.
 Caput breve, rostro crasso compresso; oculi minusculi; cornua vastissima, aliquando tripedalia, 8-10 libras ponderantia, infra rotundata, magis quam Aegagro arcuata, carinata, ex griseo nigricantia. Crura gracilia; cauda brevis, subtus nuda, supra et apice atra; pili corporis longi, fulvi vel cani, in junioribus sordide grisei, dorsali linea nigricante, macula magna atra supra et infra genua

Caprae cornibus digladiant, montosa amant; an vere genere distinctae ab ovibus?

nua anteriora, quae ceterum alba. Pellis tenuis. An sibiricus specie diversus?

- caucasica. 3. C. cornibus retrorsum et extrorsum arcuatis, apice denuo introrsum vergentibus obsolete triquetris antice nodosis. *Güldenstedt act. Petrop. 1779. P. 2. p. 273. t. XVI. XVII. Habitat in Caucasi summis jugis schistosis nudis, circa summas origines fluviorum Terek et Cuban, in Cachetia quoque et Ossetino tractu, Novembri (nunquam cum capra domestica) coiciens et Aprili pariens.*

Cornua mari, quam hirco longa majora per arcum 28 pollicum, feminae tanto minora; huic ex griseo fusca, illi sordide nigra. Color animalis supra ex brunneo cervinus, subtus albidus, extremitatibus nigris, fascia spinali angusta fuscescente; pili basi cinerei, rigidiusculi, lanugine cinerea interposita; magnitudo hirci, habitus tamen latior et brevior.

31. OVIS. Cornua concava retrorsum versa intorta rugosa.

Dentes primores inferiores VIII. lanarii nulli.

- Aries. 1. O. cornibus compressis lunatis. *Fn. succ. 45. Amoen. ac. IV. p. 169.*
 Aries laniger, cauda rotunda brevi. *Briff. regn. an. p. 74. n. 1.*
 Ovis domestica, cujus mas aries dicitur, foetus agnus. *Sloane jam. 2. p. 328.*
 Ovis domestica. *Raj. quadr. p. 73.*
 Προβατων. *Aristot. hist. anim. V. c. 11. VI. c. 19. VIII. c. 13. IX. c. 4. Aelian. anim. VII. c. 27.*
 Pecus, Aries, Ovis, Vervex, Agnus. *Plin. hist. nat. VIII. c. 47. 48. Gesn. quadr. p. 872. 912. 925. 927. Aldrov. bisulc. p. 370. Foss. quadr. p. 54. t. 22. Charlet. exerc. p. 8. Sibb. Scot. an. p. 8. Reacz. Polon. p. 242. Schwenckf. theriotr. p. 56. 60.*
 Brebis et Belier. *Buff. hist. nat. V. p. 1. t. 1. 2.*
 Ram. *Penn. quadr. p. 10. n. 8.*
 Schaaf, Widder, Hammel, Lamb. *Gesn. Thierb. p. 320. 321. 327. 329.*
 anglica. α. O. mutica, cauda serotoque ad genua usque pendulis.
 Ovis anglicana. *Amoen. acad. IV. p. 174.*
 Hornlets Sheep. *Penn. hist. p. 34. C.*

- rustica. β . O. cornuta, cauda lanaque brevior, hac rigidior.
Ovis rustica. *Amoen. ac.* IV. p. 174.
Ovis brachyura; Ovis rustica. *Pallas spic. zool.* XI. p. 59. 61.
- hispanica. γ . O. cornuta, cornuum spira extrorsum tracta, lana molliore, copiosiore.
Ovis hispanica. *Amoen. acad.* IV. p. 174.
- polycerata. δ . O. e Gotlandia 248. *Pall. spic. zool.* XI. t. 4. f. 1. c. f. 2. b. t. 3. f. 5.
Ovis polycerata. *Amoen. ac.* IV. p. 174.
Ovis sexcornis et tricornis. *Aldr. bisulc.* p. 397.
Brebis à plusieurs cornes, Belier d'Islande, Brebis d'Islande. *Buff. hist. nat.* XI. p. 354. 387. t. 31. 32.
Many-horned Sheep. *Penn. quadr.* t. 3. f. 2. 3.
- africana. ϵ . O. pilis brevibus.
Ovis africana. *Amoen. acad.* IV. p. 173. *Raj. quadrup.* p. 75.
Aries pilosus, pilis brevibus vestitus. *Briff. regn. an.* p. 76. n. 4.
Ovis africana, pro vellere lanoso pilis brevibus hirtis vestita. *Sloane jam.* 2. p. 328.
Ovis aethiopica. *Charlet. exerc.* p. 9.
- guineensis. ζ . O. auribus pendulis, palcaribus laxis pilosis, occipite prominente. *Syst. nat.* XII. 1. p. 98. n. 2.
Aries (Ovis guineensis) pilosus, pilis brevibus vestitus, juba longissima, auriculis longis pendulis. *Briff. regn. an.* p. 77. n. 5.
Aries guineensis f. angolensis. *Marcgr. bras.* p. 234. *Fonst. quadr.* t. 46. *Klein quadr.* p. 14.
Ovis guineensis f. angolensis Marcgravii. *Raj. quadr.* p. 75. *Sloan. jam.* 2. p. 328.
Adim-mayn. *Marmol. afr.* 1. p. 59.
Moutons. *Adens. Seneg.* p. 37.
Moutons de Guinée. *Des Marches it.* 1. p. 129.
Belier du Senegal, Belier des Indes, autre Belier des Indes, Brebis des Indes. *Buff. hist. nat.* XI. p. 359. 392. t. 34 - 36.
Sheep of Sahara. *Shaw it.* p. 241.
African sheep. *Penn. quadr.* p. 12.
- laticaudata. η . O. arabica platyura. *Russ. alepp.* 51. t. 52.
Ovis αραβιος. *Aelian. anim.* X. c. 4.
Arabiae oves. *Aldrov. bisulc.* p. 404. f. p. 405.
Ovis turcica. *Charlet. exerc.* p. 9.

Ovis cauda obesa. *Ludolf aeth. 1. c. 10. n. 14.*

Ovis laticauda. *Raj. quadr. p. 74.*

Aries f. ovis *πλατυκερωσ* orientalis. *Klein quadr. p. 14.*

Ovis laticauda, platyceros f. arabica. *Amoen. ac. IV. p. 173.*

Ovis laticauda. *I. G. Gmelin nov. comm. Petrop. V. p. 343. t. 8.*

Aries (ovis laticauda) laniger, cauda latissima. *Briff. regn. an. p. 75. n. 2.*

Ovis featopyga, Aries kirgificus. *Pall. spic. XI. p. 63. t. 4. f. 1. 2. a. b.*

Moutons de Barbarie ou à grosse queue. *Chardin it. 3. p. 37.*

Mouton de Barbarie, mouton d'Arabie. *Buff. hist. nat. XI. p. 355. t. 33.*

Broad-tailed sheep. *Shaw it. p. 241. Penn. quadr. p. 4. t. 1.*

Schaaff, deren Schwaentz gar feilft. *Rauwolf it. 3. p. 26.*

Arabisches Schaaf. *Gesn. Thierb. p. 326.*

Die hiefige Schaaf. *Osb. Ostind. p. 188.*

Buchari- 9. O. auriculis magnis pendulis, pulvinari adiposo minore.
ca. *Pallas spic. zool. XI. p. 78.*

longi- 1. O. cauda longissima.
cauda. *Alterum genus. Raj. quadr. p. 74.*

Ovis arabica. *Fonst. quadr. t. 23.*

Aries (ovis longicauda) laniger, cauda longissima. *Briff. regn. an. p. 76. n. 3.*

Ovis dolichura five tscherkessica. *Pall. spic. zool. XI. p. 60.*

Schaaffe. *Olear. it. p. 567.*

Ein ander arabisch Schaaff. *Gesn. Thierb. p. 326.*

capensis. 2. O. auriculis magnis pendulis, cauda magna ex adipe vix pro-
minente.

Cape-sheep. *Penn. quadr. t. 4. f. 2.*

Hospitatur in omni tellure, sicca, salsa, aprica, calida amat, stupidissimum et maxime imbecille forte omnium quadrupedum, anno secundo jam adolescens, annorum 14 aetatem vix superans, aetate dentes mutans, parum bibens, balans, timidum minatur hosti calcitrando mungendoque, pellit eum arietando; comedit inprimis festucam ovinam, in arvis bursam pastoris, laeditur a pruno spinosa, equiseto, ranunculo, flammula, antherico ossifrago, kalmia, myosotide palustri, anemone nemorosa; infestatur

N 4

Oves cornibus arietant, aprica sticulosa amant.

festatur hippobosca ovina, pediculo ovis, oestro ovis, acaro ricino, fasciola hepatica, hydatide in cerebro nidulante, laborat hinc vertigine, hepatitide, ictero, phthisi, hydrope, scabie, variolis; aries unus sufficit 20 ovibus, quae per 23 hebdomades gravidae, 1, 2 raro 3 agnos pariunt. α) vulgaris per Angliam, maxima in provincia Lincolnshire; β) vulgatissima per omnem Europam, maxime borealem, lana rigidior, brevior, minus crispa, cornibus spiraliter retortis, introrsum angulatis planis, apice complanatis, aliquando nullis; oculis subcaeruleis glaucis in prominentia sincipitis ovali, pupilla oblonga, cavitate ante cantum anteriorem profunda gluten secernente, cauda terete, genua non attingente; velleris color plerumque albus, aliquando niger aut maculatus. γ) vulgatior in Hispania, ex qua etiam in alias Europae partes delata, cornuum spira extrorsum dilatata; δ) in Islandia terrisque borealibus crebro occurrit, neque inter numerosos nomadum tataricarum greges infrequens, cornibus 3, 4, 5, 6, intermedio, aut intermediis erectis, exterioribus extrorsum revolutis, cauda plerumque brevi, et lana duriuscula brevi. ε) in Africa, ζ) similiter in deserto Saharae et Guinea obvia, in American quoque translata, colore varia, magnitudine rusticam aequans, cornibus parvis, deorsum usque ad oculos incurvatis, cauda genua attingente. η) frequentissime alba, aliquando atra, brunnea, maculata, rarius cana, hospitatur inter gentes nomadicas Asiae fere omnes, praesertim Kirgisos, porro in Persia, Sina, omni Oriente, Syria, Arabia, Aegypto, caudae loco, cuius nihil fere superest, nisi coccyx, pulvinari adipis crassissimo, 30 aliquando libras pondere superante, instructa. θ) Bucharis domestica, hybrida, ut videtur, ex η et ι, cauda oblongata, depressa, pingui, subtus nuda, apice tenui, lanato, vellere lacteo, atro, cano, et ex albo argenteo pretiosissimo, in Persia quoque, Syria, Palaestina, variisque Africae regionibus obvia. ι) in capite bonae spei culta.

Ammon. 2. O. cornibus arcuatis semicircularibus subtus planiusculis, palearibus laxis pilosis. *Erxl. mamm. p. 250. n. 2.*

Capra (Ammon) cornibus arcuatis semicircularibus subtus planiusculis, palearibus laxis pilosis, gula imberbi. *Syst. nat. XII. 1. p. 97. n. 12.*

Hircus (Capra orientalis) cornibus supra rotundatis, infra planis, semicirculum referentibus. *Briff. regn. an. p. 71. n. 12.*

Musimon

Mufion et Ophion. *Plin. hist. nat. VIII. c. 49. XXVIII. c. 9. et 15.*

Mufion f. Mufion. *Gesu. quadr. p. 934.*

Tragelaphus. *Bellon. obs. p. 54.*

Mufion et Tragelaphus Bellonii. *Raj. quadr. p. 75. 82.*

Tragelaphus, Mouffon. *Klein quadr. p. 20.*

Kameuni Barani oder Mufions. *Steller Camtschatc. p. 127.*

Stepnie Baranni. *I. G. Gmelin it. sibir. I. p. 368.*

Rupicapra cornibus arietinis. *I. G. Gmelin nov. comm. Per-rop. IV. p. 388. summ. p. 53. t. 8. b. f. 2. 3.*

Ovis fera sibirica, vulgo Argali dicta. *Pall. spic. zool. XI. p. 3. t. 1. 2.*

Mouffon. *Buff. hist. nat. XI. p. 352. t. 29. Cetti stor. nat. of Sard. I. t. 3.*

Siberian goat. *Penn. quadr. p. 18. n. II.*

Das wilde Schaaf, et der Weifsars der Alten. *Gesn. Thierb. p. 154. 155.*

Orientalisches Schaaf. *S. G. Gmelin it. III. p. 486. t. 55.*

Habitat parvis gregibus in apricis rupestribus et desertis tractus alpini Asiae mediae, in Camtschatea, insulis Kurilicis, forte etiam in California reliquaque America occidentali, certius in Barbariae, Sardiniae, Corhaeae, Graeciae montibus altissimis, celerrima, agilis, fera, cornibus pessime feriens, arietem ferum simulans, altero anno jam adulta, aetatem 14 annorum non superans; Martia unum vel duos agnos pariens, carne et adipe delicata.

Magnitudo cervae minoris; color aestate potissimum ex cinereo fuscescens admisto griseo, subtus e cinereo albidus; hieme supra ex ferrugineo griseus, subtus e griseo albicans; cauda brevissima alba, apice fuscescens; pili hieme sesquipollicares, vere depositi; auriculae acutae erectae; oculi magni, iride fusca s. caerulea; cornua, tertio jam anno progerminantia, albida, annulata, reflexa, compressa, feminae minora, potius falcata; aliquando nulla. Pedes posteriores anterioribus longiores.

Pudu. 4. O. cornibus teretibus laevibus divergentibus.

Capra (Pudu) cornibus teretibus laevibus divergentibus, gula imberbi. *Molina hist. nat. Chil. p. 273.*

Habitat gregaria in montibus Americae Cordiglieras, nive ingruente in valles australes descendens, facile tum capi-enda et cicuranda, docilis; magnitudine boedi semestris, habitu caprae birici, at cornibus extorsum incurvatis

parvis, feminae nullis, mento imberbi differt; color obscurus.

- Strep- 3. O. cornibus rectis earinatis flexuoso-spiralibus.
 ceros, Hircus (Capra cretensis) laniger cornibus teretibus erectis, ab imo ad summum spiraliter intortis. *Briff. regn. an. p. 73. n. 15.*
Ois ξουθου. Oppian. cyneg. 2. p. 376.
 Strepficeros. *Plin. hist. nat. XI. c. 37. Buff. hist. nat. XI. p. 358.*
 Cretensis aries, strepficeros nominatus. *Bellon. obs. p. 20. f. p. 21.*
 Cretenses arietes. *Aldrov. bisulc. p. 406. f. p. 407.*
 Ovis cretensis. *Fonst. quadr. t. 45. Besch. der berl. Naturf. IV. p. 624. t. XX.*
 Ovis strepficeros cretica Bellonii. *Raj. quadr. p. 75.*
 Aries strepficeros. *Klein quadr. p. 14.*
 Cretan Sheep. *Penn. quadr. p. 11. t. 3.*
 Wilde Straubengeyß. *Gesn. Thierb. p. 151. fig. p. 152.*
Habitat in Candia et insulis Archipelagi, frequenter culta in Hungaria et Austria; an parens arietis, cui magnitudine aequalis, figura corporis similis est?

32. BOS. *Cornua concava, antrorsum versa, lunata, laevia.*

Dentes primores inferiores VIII. laniarum nulli.

- Taurus. 1. B. cornibus teretibus extrorsum curvatis, palcaribus laxis.
 ferus. α. a. Urus. *Caes. Gall. VI. c. 28. Gesn. quadr. p. 157. Aldrov. bisulc. p. 347. fig. p. 348. Fonst. quadr. p. 50. t. 20. Raj. quadr. p. 70. Klein quadr. p. 11. Bell. it. 1. p. 211. Rzacz. Pol. p. 228.*
 Bos ferus. *Plin. hist. nat. VIII. c. 15.*
 Bos silvestris. *Charlet. exerc. p. 8.*
 Bos (Urus) cornibus crassis brevibus sursum reflexis, fronte crispata. *Briff. regn. an. p. 80. n. 3.*
 Auerochs. *Gesn. Thierb. p. 299. Buff. hist. nat. XI. p. 284. Ridinger wilde Th. t. 37.*
 b. Bonatus. *Plin. hist. nat. VIII. c. 15. Gesn. quadr. p. 145. Aldrov. bisulc. p. 358. f. p. 361. Fonst. quadr. p. 51. t. 18. 19. Charlet. exerc. p. 8. Raj. quadrup. p. 71. Buff. hist. nat. XI. p. 284.*

color
erectis,
gn. an.
nat. XI.
p. 20.
Naturf.
52.
r culta
agnitu-
inata,
s laxis.
r. Al-
o. t. 20.
p. 211.
fronte
p. 284-
p. 145.
p. 51.
p. 71.
Bovaa-

Βοῦσσος. *Aristot. hist. anim.* II. c. 5. 7. XI. c. 71.

Μονωψ. *Aelian. anim.* VII. c. 3.

Bos (Bonafus) cornibus deorsum inflexis, juba supra col- lum longissima. *Briss. an.* 84.

Bos cornibus in se flexis, juba longissima. *Syst. nat.* XII. 1. p. 99.

c. Bison. *Plin. hist. nat.* VIII. c. 15. *Gesn. quadr.* p. 143. *Aldr. bif.* p. 353. 357. *fig. p.* 355. 356. *Fonst. quadr.* p. 51. t. 16. 17. *Charlet. exerc.* p. 8. *Sibb. Scot. an.* p. 7. *Raj. quadr.* p. 71. *Rzac. Polon.* p. 214. *Buff. hist. nat.* XI. p. 284.

Bos cornibus divaricatis, juba longissima, dorso gibbofo. *Syst. nat.* XII. 1. p. 99. n. 3.

Bos (Bison albus) cornibus sursum reflexis, juba longif- fina, et Bos (Bison) cornibus sursum reflexis, dorso gib- bofo, juba barbaque longissima. *Briss. regn. an.* p. 82. n. 5. 6.

Βισωβε. *Oppian. cyneg.* 2. p. 159.

Wyfent. *Gesn. Thierb.* p. 296.

domesti- β. Bos, Taurus, Vacca, Vitulus. *Plin. hist. nat.* VIII. c. 45- 46. *Gesn. quadr.* p. 24. 25. 103. 124. *Schwenckf. the- riotr.* p. 63. 65. 70. *Aldr. bif.* p. 13. *fig. p.* 36. *Fonst. quadr.* p. 13. 15. *Wagn. Helv.* p. 167. *Sibb. Scot. an.* p. 7. *Rzac. Polon.* p. 37. *Sloan. jam.* 2. p. 327.

Bos domesticus. *Fonst. quadr.* p. 36. t. 14. *Charlet. exerc.* p. 8. *Raj. quadr.* p. 70.

Bos (domesticus) cornibus teretibus inflexis. *Mus. Ad. Fr.* I. p. 12.

Bos (domesticus) cornibus laevibus teretibus, sursum refle- xis. *Briss. regn. an.* p. 78. n. 1.

Taurus domesticus cum vacca. *Klein quadr.* p. 10.

Boeuf. *Buff. hist. nat.* IV. p. 437. t. 14.

a. B. indicus major, rufus, cornibus brevissimis, gibbo adi- poso humerali. *Penn. histor. of quadrup.* p. 16. n. A. t. 1. *fig. inf.*

b. B. indicus minor, cornibus fere erectis antrorsum versis, gibbo adiposo humerali. *Penn. hist. of quadr.* p. 17. t. 1. *f. sup.*

Bos (indicus) cornibus aure brevioribus, dorso gibbo, ju- ba nulla. *Syst. nat.* XII. 1. p. 99. n. 6.

Bos scythicus gibbosus. *Charlet. exerc.* p. 8.

Zebu. *Buff. hist. nat.* XI. p. 285. 439. t. 42.

Little indian Buffalo. *Edw. av.* 200. t. 200.

c. Bos

- c. Bos abessinicus, tophis dorsalibus, cornibus cuti adhaerentibus pendulis. *Penn. hist. of quadr. p. 17. n. C.*
 d. Bos madagascariensis niveus, cameli magnitudine, auriculis pendulis, gibbosus. *Penn. hist. of quadr. p. 17. n. D.*
 e. Bos Tinianensis niveus, auriculis nigris. *Penn. hist. of quadr. p. 17. n. E.*
 f. Bos africanus niveus celer, cruribus gracilioribus, cornibus elegantioribus, ungulis splendide nigris. *Penn. hist. of quadr. p. 17. n. F.*
 g. Bos europaeus. *White act. litt. et philos. Macul. I. c. 27.*

Habitat in silvis uliginosis Poloniae, Prussiae, Lithuaniae, montium Carpathicorum, Caucasi, Patagoniae, (α. c. Ζουρ-βρος Nicetae) hospitatur ubique, pro ratione climatis, pabuli vitaeque generis magis minusve a primo statu declinans, β. a. in India et insula Madagascar, b. in India, Persia, China, c. in Abessinia et insula Madagascar, d. in regno Africae Adel et insula Madagascar, e. in insula Timian, f. in Africa, nomine lant vel dant. g. maximus in Polonia, Holfatia, Belgio, minimus in Scotia boreali, in qua, quemadmodum etiam in Islandia et passim in Anglia uterque sexus aliquando e cornis occurrit; animosus, iracundus, furibundus cornibus hostem petit, fronte torva, crispa validaque, utilissimus labore suo agris colendis, stercore lactificandis, carne, lacte, caseo, butyro, sebo, cornibus; lui magis obnoxius aliis animalibus domesticis; infestatur oestris bovis, tabanis, conope calcitrante, pediculis; laeditur a cicuta, aconito, anemone; vivit ad 14-15 annos; vacca uterum gerit per 9 menses.

2. B. cornibus divaricatis, juba longissima, dorso gibboso. *Syst. nat. XII. I. p. 99. n. 3. β.*

Bos (Bifon americanus) cornibus sursum reflexis, dorso gibboso, capite pilis longissimis obsito. *Briss. regn. an. p. 83. n. 7.*

Taurus mexicanus. *Hernand. mex. p. 587.*

Tauri vaccaeque Quivirae regionis. *Fernand. an. p. 10.*

Armenta. *Laët amer. p. 303.*

Taurus Quivirensis et tauri novi orbis. *Nieremb. hist. nat. p. 181. 182.*

Bifon

Boves cornu ferunt, pascua depressa amant; difficile genus, cuius species vix certis limitibus circumscriptae, prouti in ovis et caprae generibus, facile varietates pro speciebus habentur, eo vice versa.

Bifon ex Florida allatus. *Raj. quadr.* p. 71. *Klein quadr.* p. 13.

Boeuf du Canada. *Charlev. nouv. Fr.* 3. p. 131.

Boeuf sauvage. *du Pratz Louif.* 2. p. 66.

Bifon d'Amerique. *Buffon hist. nat.* XI. p. 305.

Buffelo. *Laws. Carol.* p. 115. *Brick. Northcar.* p. 107.

Buffalo. *Catesb. Carol. app.* p. XXVII. t. 20.

American Oxen or Beeves. *Dobbs Hudf.* p. 41.

American Bull. *Penn. quadr.* p. 8. n. 6. t. 2. f. 2.

Wilde Ochsen und Kühe. *Kalm. it.* 2. p. 350. 425. 3. p. 351.

Habitat gregarius in nova Hispania, et interioribus Americae borealis partibus in uliginosis inter altas arundines; quamvis ferox, junior tamen cicurari potest; pondus 1600-2900 librarum acquirit; au vere distincta a tauro species, cum quo coit?

Cornua brevia, nigra, teretia, basi multum distantia; gibbus magnus et altus carnosus; pectus crassum et robustum; posteriora trunci gracilia et debilia, aestate nuda. Cauda pedalis, floccosa. Pili capitis et gibbi longissimi lanati, undulati, ferruginei.

moscha- 3. B. cornibus approximatis basi latissimis introrsum deorsum-
tus. que, apice extrorsum flexis acuminatis. *Penn. hist. of quadr.* p. 27. n. 9. t. 2. f. 2.

Boeuf musqué. *Ferenia apud Charlev. nouv. Franc.* 3. p. 131.

Musk Ox. *Dobbs Hudf.* p. 18. 25.

Habitat in America boreali a regno novo Mexicano ad terram Cristinos, ossibus per maris fluctus in Sibiriam delatis, cervae magnitudine. Cornua in apice frontis, duos pedes longa, basi duos similiter pedes amplitudine aequante, ad 60 libras ponderantia. Pili longissimi sericci obscuri. Caro moschum olet.

grun- 4. B. cornibus teretibus extrorsum curvatis, vellere propen-
niens. dente, cauda undique jubata.

Vacca grunniens villosa, cauda equina. *I. G. Gmelin nov. comm. Petrop.* V. p. 339. t. 7.

Bubalus cauda equina. *Pallas act. Petrop.* I. p. II. p. 332.

Boeuf

Boeuf velu. *le Brun it.* I. p. 120. t. 129.

Vache de tartarie. *Buff. hist. nat.* XV. p. 136.

An other species of oxen, called bubuls by the Tartars.
Bell. trav. I. p. 212.

Grunting bull. *Penn. quadr.* p. 5.

Tangutischer Büffel mit dem Pferdeschweife. *Pallas nord.*
Beytr. I. p. 1. t. 1.

Habitat, hodiernum rarior, in regno Tibetano, hospitatur et colitur numerosa varietate magnitudinis, pilorum, coloris, in Sibiria, China, India, Persia, jam Aeliano, Cosmae, Guil. de Rubriquez, Marco Polo aliisque notatus; ferox, potissimum vulneratus aut alio modo irritatus; aestus impatiens, colorem rubrum aliosve serenos aegre fert; dum irascitur, corpus concutit, caudam erigit, oculis minatur, et subito ac inopinato in hostem fertur; domesticus tamen, reseclis ut plurimum cornibus, onera portat et jugum, aratrum trahit et currus. Vox grunniens, vaccae frequentior; coit cum vacca domestica; an parens bubali, cum quo interna structura convenit?

Magnitudo varia, feri spectabilior; caput breve, nasus latus, labia crassa et pendula, auriculae amplae, inferius acutae, pilis asperis hirtae; cornua brevina, gracilia, valde acuminata, basi distantia, medio inter utrumque fasciculo pilorum longo; pilis in medio frontis radiatis. Cervix jubata, juba alba, aliquando ad caudam usque protensa; caput una cum reliquo corpore nigrum, ut tamen domesticus colore quoque multum variet, pilis inferioribus longissimis, reliquis hircinis; ungulae latae; cauda lata, ad 6 pedes longa, ex pilis longis sericeis, argentei vel nivei coloris constata, Sinensibus, Indis, Turcis magni aestimata. Ventriculo nonnunquam inest species lapidis bezoar. Caro vix edulis, nisi vitulorum.

Bubalus. 5. B. cornibus resupinatis intortis, antice planis.

Bos (Bubalus) cornibus compressis, sursum reflexis, resupinatis, fronte crispa. *Briss. regn. an.* p. 81. n. 4.

Bos indicus. *Plin. hist. nat.* VIII. c. 45.

Βοεὺς ἀγριοὺ ἐν Ἀραχωτοῖς. *Aristot. hist. an.* L. 2. c. 1.

Bubalus. *Gesn. quadr.* p. 139. *Jonst. quadr.* t. 20. *Raj. quadr.* p. 72.

Buffe-

Buffelus. Aldr. *bif.* p. 365. *fig.* p. 366. *Fonst. quadr.* p. 53.
Charlet. *exerc.* p. 8. *Klein quadr.* p. 10.

Buffalus. Pall. *nov. comm. Petrop.* XIII, p. 460. t. 11. 12.

Boves inusitatae magnitudinis, Taurelephantes. Ludolf *Aethiop.* I. c. 10. n. 1.

Buffe. Buffon *hist. nat.* XI. p. 284. t. 25.

Buffalo. Barbert Guin. p. 209. 486. *Penn. quadr.* p. 7. n. 5.

Büffel. *Gefn. Thierb.* p. 58.

Büffelochsen. Kolbe *Vorgeb.* p. 143. t. 5. f. 2.

Habitat in Asia, cultus in variis ejus Africaeque provinciis, nec non in Hungaria et Italia, in quam posteriorem imperante Longobardis Agilulfo primum delatus, in calidissimis plagis fere pilis nudus, iracundo mugitus fortis; annulo oris regitur, onera portat, aratrum currumque trahit, lacte etiam, quamvis magis sebaceo utilis; coit cum vacca vulgari. Tauro major, corpore crassiore, robustiore, cute durissimo, pilis nigris aut rubris, capite parvo, fronte crispa. Cornua nigra, crassa, paulisper compressa, sursum reflexa, parum resupinata.

caffer.

6. B. cornibus basi latissimis et approximatis, tum divaricatis deorsum, post sursum apice introrsum curvatis, juba brevi. *Sparrmann act. Stockb.* 1779. I. n. VIII. t. 3. f. inf.

Cape ox. *Penn. hist. of quadr.* p. 28. n. 9. *Masson act. angl.* LXVI. p. 296. *Forster it.* I. p. 83.

β? Bos (Bubalus africanus) cornibus teretibus sursum reflexis, in sese recurvis. *Briss. regn. an.* p. 79. n. 2.

Elegans et parvus africanus bos, quem veteres Graeci bubalum appellarunt. *Bellon. obs.* p. 119.

Juvenca silvestris. *Pr. Alp. Aeg.* I. p. 233. t. 14. f. 2.

Africanus bos. *Raj. quadr.* p. 73. *Aldr. bif.* p. 363. *fig.* p. 364. *Fonst. quadr.* p. 52.

Bubalus africanus. *Fonst. quadr.* t. 18.

Exiguus africanus bos. *Klein quadr.* p. 11.

Petit bocuf de Belon. *Buff. hist. nat.* XI. p. 299.

Africanischer Büffel. *Gefn. Thierb.* p. 60.

Dwarf ox. *Penn. hist.* p. 30. n. 10. t. 2. f. 3.

Habi-

Habitat gregarius in Africa, praesertim in silvis pone caput bonae spei versus septentrionem sitis, etiam in Guinea, ferox (β. tamen mitior), callidus et atrocissimus, ne homini quidem parcens, celer, ut tamen equum montem ascendendo non assequatur, et robustus; coeno volutatur, crassior et rudior reliquis; 8 circiter pedes longus, 5½ altus, ater; cornua nigra, basi angusto canali intermedio separata, eadem 13 pollices lata, ut magnam capitis partem tegant, ultra pedem nonnunquam longa, et 25 libras pondere aliquando aequantia; auriculae pendulae; pili pollicem circiter longi, rigidi, adultiori bovi laeves, ante genua et subtus longiores, undulati. Cutis tenax, crassa; caro rudis, sed succulenta et ferini saporis.