

VI. BELLUAE.

*Dentes primores obtuse truncati.**Pedes unguulati.*

33. EQUUS. *Dentes primores superiores VI erecto-paralleli.*
inferiores VI prominentiores.
laniarii solitarii inclusi utrinque remoti.
Mammae II. inguinales.

* *pedibus bifulcis.*

- bifulcus. 6. E. pedibus bifulcis. *Molin. hist. nat. Chil. p. 284.*
Habitat in America australi, praesertim praeruptis rupibus montium Cordilleras, pedibus ad pecora, dentibus, magnitudine, habitu, ad equi genus accedens, ut quasi medium inter utrumque constituat, ferox et celer, hinnitu et auriculis caballo, structura interna, figura externa, magnitudine, pilis, colore, rostro, oculis, collo, dorso, cauda, pedibus, genitalibus asino similior, ut tamen crux nigra humeralis desit.

* * *pedibus solidungulis.*

- Caballus. I. E. pedibus solidungulis, cauda undique fetosa.
 Equus cauda undique fetosa. *Syst. nat. XII. I. p. 100. n. I.*
 Equus auriculis brevibus erectis, juba longa. *Briff. regn. an. p. 100. n. I.*
 ἵππος. *Aristot. hist. an. I. c. 5. 7. II. c. 5. 8. 18. III. c. 10. V. c. 11. VI. c. 22. VII. c. 17. VIII. c. 11. IX. c. 5. Aelian. anim. III. c. 2. IV. c. 6. 7. 8. 11. Oppian. cyneg. I. 166.*
 Equus, Equa, Equiferus. *Plin. hist. nat. VIII. c. 42. X. c. 63. XI. c. 37. XXVIII. c. 10. 11. Gesn. quadr. p. 442. fig. p. 443. Schwenckf. theriotr. p. 89. Aldr. solidung. p. 2. fig. p. 21. Fonst. quadrup. p. I. t. 1-4. Charlet. exerc. p. 3. Wagn. Helv. p. 174. Sibb. Scot. an. p. 6. Raj. quadr. p. 62. Rzacz. Polon. p. 217. 240. Sloane jamaic. II. p. 327.*
 Cheval. *Buff. hist. nat. IV. p. 174. t. I.*

Horfe.

- Horfe. *Penn. quadr. p. 1. n. 1.*
 Ross. *Gesn. Thierb. p. 306. f. p. 307.*
- ferus. *α.* Equus ferus. *Hasselq. palaeft. p. 282.*
 Wild horfes. *Bell. it. 1. p. 212.*
 Wilde Pferde. *I. G. Gmelin it. 1. p. 211. III. 2. p. 510. S. G.*
Gmelin it. 1. p. 44. t. 9. Pallas it. 1. p. 211.
 Tarpany. *Rytschk. Orenb. 1. p. 233.*
- domesti- *β.* Equus domesticus. *Klein quadr. p. 4.*
 cus. *Habitat gregatim ferus in campis Bessarabieis, inque deser-*
tis circa Tanain, et per omnem Tatariam magnam obviis,
hospitatur ubique, per Hispanos quoque in Americam
delatus, varietate innumera; ex domestico ferus iterum
factus reperitur hodie, potissimum in Tauria, passim gre-
garius, mare duce, minor, vix domandus.
Animal herbivorum, rarissime carnivorum, generosum, su-
perbum, fortissimum in currendo (ut visus sit equus, qui
minuti secundi tempore 82½ pedes anglicos cucurrit) por-
tando, trahendo; aptissimum equitando, cursu furens,
silvis delectatur; posteriora curat; cauda conopes taba-
nosque abigit, alterum scalpit; pullum injuriae obnoxium
reponit; hinnitu sociam vocat. Calcitrando pugnat; su-
dans se volutat; vegetabilia edit bove propius, semina dif-
feminat; ventriculo exiguo simplici, intestino colo coeco-
que maximo, cystide fellea nulla, non vomit; sterces in-
calescit. Equuleus hippomane natus pedibus elongatis.
Laeditur globulo auri, acicula pedis, nasi capistro, den-
tibus sebo illitis, padi herba, phellandrii curculione? co-
nope irritante. Edit impune aconitum. Utero gerit 290
dies. Lanarios dentes anno quinto acquirit; primores
mutat anno secundo, tertio, quarto. Tataris caro escu-
lenta, lac, etiam fermentascens, potulentum, pellis in co-
rium versa.
- Hemio- *5. E. unicolor, pedibus solidungulis, cauda calva extremitate*
 nus. *pilosa, cruce nulla. Pallas it. III. p. 217. n. nord. Beytr.*
II. p. 1. t. 1. nov. comm. Petrop. XIX. p. 394. t. 7.
Habitat in desertis inter fluvium Onon et Argun interpositis
(hodiernum rarius), gregarius in desertis mongolicis, po-
tissimum deserto Gobi ad Sinæ regniq; Tibetani fines us-
que, apricos, salsos, planos, herbosos campos amans, sil-
vas

Equi pedibus posticis calcitrant; mares mammas in penis glande habent.

vas montesque nive candidos abhorrens, timidus providusque, cursu celerrimus, haecenus non cicuratus, auditu et olfactu acutissimo, hinnitu magis sonoro, quam equi; infestatur lue in caballos et boves propaganda; mordendo et calcitrando pugnat; prurit Augusto; parit equa vere pullum, ut plurimum unicum. Caro Mongolis Tungusisque deliciofa; pellis navium speciei adaptatur.

Magnitudine et habitu proxime accedit ad mulum, at pulcrrior, auriculis caudaque ad zebream, unguis et reliquo corpore ad asinum, artubus ad equum; differt tamen capite magno, fronte plana antrorsum angustata, collo graciliore quam reliquis speciebus, et magis terete, pilis hieme sesquipollicaribus, mollibus, basi pallide glaucis, cetera pallidis Isabellae colore, dorfi undulatis, aestate vix $3\frac{1}{2}$ lineas longis; verticibus multis; cauda pene vaccina. Pondus circiter 560 libris medicis aequale, longitudo 5 pedes superans; cauda pedem et 12 pollices longa, apice floccoso nigro. Dentes 34.

Afinus. 2. E. pedibus solidungulis, cauda extremitate fetosa, cruce nigra (mari) supra humeros.

Equus cauda extremitate fetosa, cruce nigra supra humeros.

Syst. nat. XII. I. p. 100. n. 2. Fn. suec. I. n. 35.

Equus auriculis longis flaccidis, juba brevi. Briss. quadr. 70.

Asne. Buff. hist. nat. IV. p. 377. t. II.

Als. Penn. quadr. p. 3. n. 3.

Esel. Gesn. Thierb. p. 91.

ferus. α. Afinus silvestris. Plin. hist. nat. VIII. c. 30. Klein quadr. p. 7.

Onager. Plin. hist. nat. VIII. c. 44. et 58. Aldrov. solid.

p. 352. Jonst. quadr. p. 20. t. 7. 8. Raj. quadr. p. 63.

Pallas act. Petrop. ann. 1777. P. II. p. 258. n. nord. Beytr.

II. p. 22. t. 2.

Ονυγρος. Oppian. cyneg. III. 183.

Onager, Onager five Afinus silvestris. Gesn. quadr. p. 19.

Afinus. Charleton exerc. p. 4.

Equus (Onager) auriculis longis, juba brevi, pelle tubercu-

lis parvis scabra. Briss. regn. an. p. 104. n. 5.

L'asne sauvage. Marmol. Afric. I. p. 53.

Wild asses. Bell. it. I. p. 212.

Wilder Esel. Pallas neue nord. Beytr. II. p. 22. t. I. Hablizl

n. nord. Beytr. IV. p. 88.

domesti- β. Afinus. Plin. hist. nat. VIII. c. 43. Gesn. quadr. p. 3. fig.

cus.

p. 4. Schwenckf. theriotr. p. 61.

Aldrov. solid. p. 295

Fonst. quadrup. p. 16. t. 6. Sibb. Scot. an. p. 6. Raj. quadrup. p. 63. Sloan. jamaic. 2. p. 327. Klein quadr. p. 6.

Ὀνος. Aristotel. hist. anim. I. c. 17. II. c. 18. V. c. 11. VI. c. 23.

Anc. Tavern. it. I. p. 344. Chardin it. 3. p. 33.

Esel. Osb. Ostind. p. 35.

mulus. γ. hybridus ex asino et equa, sterilis.

Equus (Mulus) auriculis longis erectis, juba brevi. Briss. regn. anim. p. 103. n. 4.

Ὀπεύς. Aristot. hist. anim. I. c. 7. II. c. 5. VI. c. 24.

Mula, Mulus. Plin. hist. nat. VIII. c. 44. XI. c. 37.

Mulus. Gesn. quadr. p. 793. Schwenckf. theoriotr. p. 62.

Aldrov. solid. p. 358. Fonst. quadr. p. 21. t. 6. Charlet.

exerc. p. 4. Raj. quadr. p. 64. Sloan. jam. II. p. 327.

Asinus biformis. Klein quadr. p. 6.

Grands mulets. Buff. hist. nat. IV. p. 401.

Maulesel. Gesn. Thierb. p. 108. Osb. Ostind. p. 35.

hinnus. δ. hybridus ex equo et asina, sterilis.

Ἰνυός. Aristot. hist. an. I. c. 7.

Mula, Hinnus. Plin. hist. nat. VIII. c. 44.

Hinnus. Gesn. quadr. p. 18. Aldrov. solid. p. 358. Fonst.

quadr. p. 21. Charlet. exerc. p. 4. Raj. quadr. p. 64.

Petits mulets. Buffon hist. nat. IV. p. 401.

Habitat gregarius in desertis magnae Tartariae montosis, bieme post coitum in Indiam meridionalem et Persiam migrans, circa urbem Casbin frequentissimus, olim quoque in Natio- lia, Syria, Arabia et Africa, hospitatur cultus et degenerare fere ubique, frigoris, non aequè plagarum et penuriae impatiens, spinis victitans, piger, tardus, mansuetus, stupidus, rudens, libidinosus, auriculis magnis, flaccidis, juba brevi, colore cinereo, linea dorsali et transversali scapularum nigra; at α) celerrimus, agilissimus, structurae elegantioris et altioris, quam β), feras venans, tigridi tamen vincendae impar, non difficulter cicurandus, visu, auditu olfactuque acutissimo pollens, aquam pluviasque salvas et amaras amans, coloris candidi in argenteum splendorem vergentis, vertice tamen, colli truncique lateribus pallide luteis; juba ex nigricante fusca; linea dorsalis coffeam colore aemulatur; pili equinis molliores. Caro Kirgisica deliciofa; pellis egregium exhibet corium (chagrin), praeparationis modo demum granulatum. Longitudo 4 pedum cum 10 pollicibus. β) optimus in re- gioni-

gionibus calidioribus, in Angliam non delatus ante regnum Elizabethae; ad 30 annos vivit, post dies 290 parit pullum plerumque unicum; γ) rarissime foecundus, optimus hispanicus, maximus sabaudicus, ad equum habitu et magnitudine propius accedens. δ) multo minor et deterior, magis rubicundus, auriculis equi, juba et cauda asini.

- Zebra. 3. E. pedibus solidungulis, dilute fuscus, fasciis fuscis. Equus fasciis fuscis vericolor. *Syst. nat.* XII. I. p. 101. n. 3. Equus (Zebra) auriculis brevibus erectis, juba brevi, lineis transversis vericolor. *Briss. regn. an.* p. 101. n. 2. Equus indicus. *Fonst. quadr.* t. 5. Equus brasiliensis. *Jacob. mus. reg.* p. 3. t. 2. f. 1. *Laur. mus. reg.* t. 3. f. 18. Equus ferus genere suo, Zebra, Zecora. *Klein quadr.* p. 5. Zebra. *Purch. pilgr.* 2. p. 1001. *Charlet. exerc.* p. 4. *Raj. quadr.* p. 64. *Barbot guin.* p. 486. *Bancr. Guian.* p. 486. *Penn. quadr.* p. 2. n. 2. Male Zebra. *Edw. av.* t. 222. Zebra indica. *Aldrov. solidung.* p. 416. fig. p. 417. *Fonst. quadr.* p. 21. t. 5. Zecora. *Ludolf aeth.* I. c. 10. n. 35. *comm.* p. 150. Zeura ou Zecora. *Lobo abiss.* I. p. 291. Asne de beauté extraordinaire. *Thevenot it.* 2. p. 473. Espece de fort beaux anes. *Dampier it.* 2. p. 250. Zébre. *Buff. hist. nat.* XII. p. 1. t. 1. Wilder Esel. *Kolbe Vorgeb.* p. 146. t. 3. f. 2. Indianisch Maulthier. *Gesn. Thierb.* p. 120. Africanisches Tygerpferd oder Eselpferd. *Kuorr delic.* II. tab. K. 8. *Habitat in Africae meridionalis campis gregarius, pulcerri- mus, celerrimus, malignus, indocilis, junior tamen ci- curandus, cum asino coiens. Magnitudo muli; juba bre- vis erecta, una cum capite et corpore deorsum striata, cruribus digitisque transversim striatis; auriculae erectae; cauda asini. Femina ejusdem penitus coloris.*
- Quagga. 4. E. pedibus solidungulis, supra castaneus, fasciis fuscis, ad latera maculatus, subtus, pedibus cruribusque, albus. Quacha. *Penn. hist.* p. 14. n. 3. Opuagha. *Masson aet. angl.* LXVI. p. 297. Zebre. *Buff. hist. nat.* XII. p. 1. t. 2. Female Zebra. *Edw. av.* t. 223.

Habitat in Africa meridionali gregibus separatis, crassior et robustior Zebra, faciliusque cicuranda, ita ut curruum trahendo adaptari queat.

34. HIPPOPOTAMUS. *Dentes primores in utraque maxilla IV.*

superiores per paria remoti.

inferiores prominentes, intermediis longioribus.

laniarii solitarii, inferiores longissimi oblique truncati, recurvati.

Pedes margine unguiculati.

amphibius.

I. H. pedibus quadrilobis. *Syst. nat. X. p. 74. Houttuyn 3. p. 405. t. 28.*

Behemoth. Job c. 40.

Ποταμιος ἵππος. Aristot. hist. anim. II. c. 7. 12. Aelian. anim. V. c. 53.

Hippopotamus. Plin. hist. nat. VIII. c. 25. et 26. XI. c. 12. 37. et 39. XXXII. c. 11. Bel. poiss. p. 47. fig. p. 50. et obs. p. 104. Gesn. aquat. p. 494. Column. aq. p. XXVIII. fig. p. XXX. Aldrov. dig. p. 181. 183-185. Jonst. quadr. p. 108. t. 49. Charlet. exerc. p. 14. Ludolf Acth. I. c. 10. n. 1. p. 155. Raj. quadr. p. 123. Shaw it. p. 427. Klein quadrup. p. 34. t. 3. Briss. quadr. p. 122. Hasselq. palaeft. p. 280. Forsk. fn. orient. p. IV. Radziwil it. hierosf. 142. Sparrmann atk. Stockh. 1778. IV. n. 12. Chemniz Naturf. XXI. p. 84.

Hippopotamo. Zerenghi monogr.

Hippopotame ou cheval marin. Theven. it. I. p. 491. Marmol. afr. I. p. 51. Dampier it. 3. p. 359. Fuffieu atk. Paris. 1724. p. 209. Lobo abiss. I. p. 258. Maillet aeg. 2. p. 31. Adans. Seneg. p. 73. Buffon hist. nat. XII. p. 22. t. 3. et 6. f. 1-3. Penn. quadr. p. 78. n. 59.

Cheropotamus et Hippopotamus. Pr. Alpin. I. V. 245. t. 22-25.

River

River-horse or Hippopotamus. *Grew mus. reg. soc. p. 14.*
t. 1.

Hippopotami or River-horses, Water-elephants, Ker-ka-monon. *Barbot Guin. p. 73. 117.*

Seekuh. *Kolbe Vorgeb. p. 168. t. 6. f. 1.*

Wasserochs. *Knorr delic. II. tab. K. 12.*

Habitat in fluviis Africae a Nigro usque ad caput bonae spei, in lacubus Aethiopiae, quos transfuit Nilus, in Nilo quoque superiore, olim etiam in inferiore, rarior ad ostia fluviorum, jam a Cosma in Aethiopia et Aegypto observatus, polygynus, gregarius, aliquando sex milliaribus a littore vagatus, sacchari, colocasiae, oryzae, milii plantationes devastat, pabulum quaesiturus, quod noctu fit; radicibus quoque arborum vescitur, nunquam piscibus; cicurandus utique et mitis, nisi irritatus aut vulneratus, quo facto naviculas adeo aquae innotantes hominesque in iis inclusos summa audacia aggreditur; tarde incedit in sicco, et humiles aggeres non transcendit; velocissime autem natat, et in fundo aquae ingreditur, ut tamen non diu infra aquam permanere possit; dormit in insulis fluviorum mediis arundine obsitis, ibique femina parit pul- lum unicum, quem tamen in aquis lactat. Vox inter mugitum bovis et elephantis intermedia valde sonora. Dentes albiissimi durissimi ipso ebore duriores, nec tam facile flavescentes, ut ideo ad hominum dentes resarciendos adaptentur. Caro esculenta. Cutis clypeis adaptatur.

Magnitudo fere elephantis, ut 4000-5000 libras pondere, 17 aliquando pedes longitudine, 7 fere altitudine aequet; capite quamvis insigni, trunco et habitu bovem, pedibus ursum, cute tenacissima densissima rhinocerotem, laniariis, cauda, posteriore trunci parte, vitae genere suam aliquantum refert; os amplissimum; auriculae minutae et acutae, pilis brevibus, tenuibus ciliatae; oculi naresque exigui; labia fasciculis pilorum; dentes laniarii aliquando 27 pollices longi, et 9 uncias ultra 6 libras ponderosi; dentes molares similiter albiissimi, ad utrumque latus utriusque maxillae 6-8. Cutis obscura, pilis albidis raris, in cervice paulo densioribus, tecta; cauda circiter pedalis, calva; crura brevia, crassa; lobi pedum non annexi.

TAPIR. *Dentes primores in utraque maxilla X.
laniarii nulli.
Pedes anteriores unguis IV.
posteriores unguis III.*

- americana- I. T. *Briff. regn. an. p. 119. Buff. hist. nat. XI. p. 444. t. 43.
nus. Penn. quadr. p. 82. n. 60.*
Tapihires. Thevet cosinogr. II. fol. 937. b.
*Tapiirete. Marcgr. Bras. p. 229. Pis. Ind. p. 101. Raj.
quadr. p. 126. Klein quadr. p. 36.*
*Hippopotamus (terrestris) pedibus posticis trifulcis. Syst.
nat. X. I. p. 74. n. 2.*
Beori animal. Laët amer. p. 328.
*Danta. Nieremb. hist. nat. p. 187. Jonst. quadr. p. 216.
Cieza Peru. p. 20.*
Antes. Nicab. Brasil. p. 23.
*Anta. Marcgr. Bras. p. 229. Gum. Orin. I. p. 300. Buff.
hist. XI. p. 444.*
Vache montagnarde. Dampier it. 3. p. 356.
Elan. Condam. it. p. 163.
*Sus aquaticus multifulcus, Tapir, Maypoury. Barr. Fr.
éq. p. 160.*
Sus aquaticus multifulcus. Fermin Surin. 2. p. 80.
Hydrochaerus Tapir. Erxl. mamm. p. 191. n. I.
Wasserfchwein. Knorr delic. II. tab. K. 13.
*Habitat gregarius in silvis et fluviis plagarum orientalium
Americae australis ab isthmo Darien ad Amazonum us-
que fluviium, dormit interdiu in silvis obscurissimis et
densissimis, noctu cibum quaerit, et gramine, saccharo,
fructibus victitat; mitis, facileque cicurandus, meticulo-
sus, salax, egregie natat, urinatur et in aquae fundo
incedit; timefactus etiam aquam intrat. Caro america-
norum palato arridet. Animal eorum, quae Americae
propria sunt, maximum, vaccae minoris magnitudine,
habitu suis; cutis tenax; vellus fuscum pilis brevibus, ju-
nioribus albo-maculatum; auriculae subrotundae, erectae,
majusculae; oculi minuti; dentes molares supra et infra
utrinque 5; maxilla utraque acuta; nasus (mari) elonga-
tus in proboscidem tenuem, extensilem, lateribus sulca-
tam, ultra maxillam inferiorem prominentem; collum
crassum, breve, cervice setis sesquipollicaribus jubata;
dorsum arcuatum; pedes breves, unguis nigris cavis;
cauda brevissima nuda.*

35. SUS. *Dentes primores superiores* IV convergentes.
inferiores (plerisque) VI
prominentes.

laniarii superiores II breviores.
inferiores II exserti.

Rostrum truncatum, prominens, mobile.

Pedes (ut plurimum) bifulci.

Scrofa. 1. S. dorso antice setoso, cauda pilosa. *Fn. suec.* 21. *Amoen.*
ac. V. p. 461.

ferus. α. S. caudatus auriculis brevibus subrotundis, cauda pilosa.
Briff. quadr. 75.

Υς αἴγριος. *Aristot. hist. an.* I. c. 2.

Καπρος. *Aristot. hist. anim.* II. c. 9. et II. V. c. 13. *Op-*
pian. cyneg. III. 364.

Συς αἴγριος. *Aelian. anim.* V. c. 45.

Sus. *Charlet. exerc.* p. 13.

Sus ferus. *Plin. hist. nat.* VIII. c. 51.

Sus agrestis five aper. *Raj. quadr.* p. 96.

Porcus. *Plin. hist. nat.* XVIII. c. 35. *Fonst. quadr. t.* 48.
Klein quadr. p. 25.

Aper. *Gesn. quadr.* p. 1039. *fig. p.* 1040. *Schwenckf. the-*
riotr. p. 54. *Aldr. bifulc.* p. 1013. *fig. p.* 1025. *Fonst.*
quadrup. p. 105. *t.* 47. 48. *Rzacz. Polon.* p. 213. *auct.*
p. 305.

Cochons sauvages, ou marons, ou sangliers. *Des Marchy.*
it. 3. p. 296.

Sanglier et Marcassin. *Buff. hist. nat.* V. p. 99. *t.* 14. et 17.
f. 1.

Wild Hog. *Brown Jam.* p. 487.

Wild Schwein. *Gesn. Thierb.* p. 336. *Ridinger jagdb. Th.*
t. 6.

domesti- β. S. caudatus, auriculis oblongis acutis, cauda pilosa. *Briff.*
cus. *quadr.* p. 74.

vulgaris. α. Sus, Verres, Scrofa. *Plin. hist. nat.* VIII. c. 51. X. c. 63.
et 73. XI. c. 37. et 39. *Gesn. quadr.* p. 982. *fig. p.* 983.
Schwenckf. theriotr. 123. *Aldr. bif.* 937. *fig. p.* 1006.
Fonst. quadr. p. 99. *t.* 47. *Sibb. Scot. an.* p. 9.

Υς. *Aristot. hist. an.* II. c. 5. et 7. V. c. 13. VI. c. 8. et
28. VIII. c. 9. *Aelian. an.* III. c. 3. X. c. 16.

Sues fodiunt naribus, orbiculo tendinibus affixo, radicesque evellunt.

- Sus seu porcus domesticus. *Raj. quadrup. p. 92. Sloan. jam. II. p. 328.*
 Porci. *Rzac. Pol. p. 243. auct. p. 333.*
 Cochon, Verrat et Cochon de lait. *Buffon hist. nat. V. p. 99. t. 16. et 17. f. 2.*
 Schwein. *Gesn. Thierb. p. 331.*

- monungulus. b. S. ungula indivisa. *Aristot. hist. an. II. c. 7. Plin. hist. nat. XI. c. 46.*
 finensis. c. S. dorso subnudo, abdomine ad terram usque propendente. *It. Wyoth. 62. It. scan. 72.*

Habitat in Europa australiore, Persia boreali, Japonia, a Syria ad lacum Baical, in ipsa Africa boreali, hospitatur, zona frigida excepta, ubique, frigus enim non fert; odore pollet, naribus fodiens terram; quisquilias, stercus, succulenta, radices variaque spurcata, ipsamque non raro prolem vorans; multa feligens; pinguiissimum, adipe inter cutem et panniculum carnosum collecto, stupidum, somnolentum, lente festinans, tempestatum praenuncium et impatiens animal; apricatur in sole, in coeno se volutat, immundum, grunniens accurrit clamanti affini adversus hostem spumante ore, dentibusque immane, crotalis infestum, quos sine noxa vorat; libidine subat; tardum venere; pene laxo longo, mammis numerosissimis, prole multa ad 20, quam per 4 menses utero gerit; dentes non amittit, et 25-30 annorum aetatem assequitur. Caro et multae aliae partes ganeae numerosa materies. Infestatur pediculis, hydatidibus; laborat scrophulis, scabie; occiditur pipere.

- α) nigro-canescens, junior striis longitudinalibus flavescens et fuscis, lana inter setas profundius radicata nulla; lardum nullum; rostrum et dentes laniarii longiores; auriculae breviores subrotundae; animal celerrimum parit Majo et Junio. β. a. in temperatioribus majus, frequentissime albicans, sed et luteum, nigrum, cinereum, rubrum, maculatum, in Tataria majore ex argenteo cinereum, auriculis longioribus, acutis, subpendulis; β. b. Upsaliae frequens alibique; β. c. in Sina insulisque maris indici et australis, nunc etiam passim in Europa, culta varietas minor, ex albo nigroque variegata, aut ex nigro paululum canescens, magis munda, pedibus brevioribus, cauda brevissima, pendula; carne albidiore et sapidiore.

- Porcus. 2. S. dorso postice setoso, cauda longitudine pedum, umbilico cystifero.
 Sus (guineensis) caudatus, auriculis longis et acuminatis, cauda nuda. *Briss. regn. anim. p. 109. n. 4.*
 Porcus guineensis. *Marcgr. brasil. p. 230. Fonst. quadr. t. 46. Raj. quadr. p. 96. Klein quadr. p. 26.*
 Cochon de Guinée. *Buff. hist. nat. XV. p. 146.*
 Guinea-Hog. *Brown. jam. p. 487. Penn. quadr. p. 69.*
 β. Cochon de Siam. *Buff. hist. nat. V. p. 99. t. 15.*
Habitat in Guinea, inde in Brasiliam delatus, β. in regno Siamensi; serosae affinis, an mera varietas? capite reliquoque corpore minor; cauda nuda; auriculae elongatae valde acuminatae; corpus rufum, pilis brevibus rubris splendentibus, longioribus circa cervicem et supra clunes.
- Tajassu. 3. S. dorso cystifero, cauda nulla.
 Sus (Aper mexicanus) ecaudatus, folliculum ichorosum in dorso gerens. *Briss. regn. an. p. 111. n. 6.*
 Sues, quibus umbilicus in dorso. *Aldr. bis. p. 939.*
 Sus minor, umbilico in dorso, Tajacu, Cochon noir. *Barr. Fr. équin. p. 161.*
 Porcus americanus. *Charlet. exerc. p. 14. Seb. mus. I. t. III. f. 4.*
 Porcus moschiferus. *Klein quadr. p. 25.*
 Quauhtla Coymatl, Quapizotl. *Hernand. mex. p. 637.*
 Coyamatl seu Quauhioyamatl. *Fernand. an. p. 8.*
 Tajassoub, Sanglier. *Thevet cosmogr. II. fol. 936. b.*
 Zainus. *Nieremb. hist. nat. p. 170. Fonst. quadr. p. 107. t. 46. Mus. Worm. p. 340.*
 Tajaçu. *Marcgr. brasil. p. 229. Pis. Ind. p. 98. Tyson act. angl. n. 153. p. 359. Raj. quadr. p. 97.*
 Javaris. *Rochefort antill. p. 138.*
 Espèce de cochon, qu'on appelle Peccary. *Waser it. p. 222.*
 Sangliers appellés Pecaris. *des March. it. 3. p. 296.*
 Javalies o Paquiras. *Gumill. Orin. I. p. 293.*
 Pingo. *Fermin Surin. 2. p. 79.*
 Pecari ou Tajaçu. *Buff. hist. nat. X. p. 21. t. 3. 4.*
 Picary. *Bancr. Guian. p. 125.*
 Mexican Hog. *Penn. quadr. p. 72. n. 56.*
Habitat gregarius in calidissimarum Americae regionum, novae Hispaniae, Panamae, Brasiliae, Guianiae, et insularum Antillarum silvis montosis, ferus, facile tamen circumdandus, coeni non amans, neque pinguescens, uti quidem serosa; victitat fructibus, radicibus, serpentibus,
 repti-

reptilibus; caro bona, modo statim a morte animalis excindatur cystis dorsalis.

Figura accedit ad scrofam sinensem, longitudine ad 3 pedes; dentes laniarii superiores ore clauso vix conspicui; auriculæ breves, erectæ, acuminatæ; oculi plani; collum breve crassum; setæ majores, quam scrofæ, ad aculeos erinacei accedentes, ex nigro canescentes, albo annulatae, cervicis et dorsi longissimæ; cyllis versus clunes posita, liquore castoreum fere olente referta.

africanus. 6. S. dentibus primoribus duobus. *Penn. hist. of quadr. p. 132. n. 63.*

Sanglier de cap verd. *Buffon hist. nat. XIV. p. 409. XV. p. 148.*

Habitat in Africa a capite viridi ad caput bonæ spei.

Corpus setis longissimis tenuibus tectum; caput elongatum; nasus gracilis; dentes canini lati, eboris duritie, superiores crassi, oblique truncati; molares in utraque maxilla utrinque VI, anteriores maximi; maxilla superior inferiori multo longior; auriculæ angustæ, erectæ, acuminatæ, apice setis longissimis barbatae; cauda gracilis floccosa, primum crurum articulum attingens.

aethiopi- 4. S. faculo molli sub oculis. *Syst. nat. XII. 3. p. 223.*

cus. *Aper aethiopicus. Pallas miscell. zool. p. 16. t. 2. spicil. zool.*

II. p. 3. t. 1. XI. p. 84. t. 5. f. 7.

Engalla. Meroll. Cong. p. 667. Sorrento it. apud Church. I. 667.

Emgalo or Engulo. Barbot Guin. p. 487.

Porc sanglier. Flacourt Madag. p. 151.

Sanglier hideux. Damp. it. 1. p. 405.

Sanglier du cap verd. Buff. hist. nat. suppl. III. p. 76. t. II.

African wild boar. Deslandes Martyn's mem. acad. V. 386.

Ethiopian hog. Penn. quadr. p. 70. n. 53.

Habitat in Madagascar et calidissimis Africae interioris, ferox, lamium purpureum fere olens, celer, scrofa agilior, vivacior, astutior, cum qua non coit; nondum adultus 4 pedes, et 9 pollices longus.

Corpus crassum, latum, nudiusculum, setis fasciculatis ex fusco nigris, in dorso longioribus, in nucha longissimis; caput ingens; coltrum truncatum, deorsum flexum, fere corneum; os parvum; loco dentium primorum, quibus caret, gingivæ antè duræ, convexæ, laeves; laniarii infra minores, supra majores, apice sursum verso; mola-

molares utrinque VI. auriculæ subacutæ; oculi in summo capite, parvi, sibi auriculisque propiores, quam in serofa, sub his saccus mollis, cute laxa nigra, cum appendice duriore zygomatica utrinque. Cauda nuda.

Babyrus- 5. S. dentibus duobus caninis fronti innatis.

ia. Sus dentibus caninis versus frontem reclinatis. *Erxl. mamm.*

p. 188. n. 5.

Sus (Aper orientalis) caudatus, dentibus caninis superioribus ab origine sursum versis arcuatis, cauda floccosa.

Briff. regn. an. p. 110. n. 5.

Ἰς τετρακερως. *Aelian. anim. XVII. c. 10.*

Aper in India. *Plin. hist. nat. VIII. c. 52.*

Aper cornutus. *Calpurn. eclog. 7. v. 58.*

Aper indicus orientalis, Babi Kacfa dictus. *Seb. mus. I. p. 80.*

t. 50. f. 2.

Porcus indicus Babyroussa dictus. *Raj. quadr. p. 96. Klein quadr. p. 25.*

Strange Hogs, Hogs with hornes. *Purch. pilgr. II. p. 1695.*

V. p. 566.

Horned hog. *Grew mus. reg. soc. p. 27. t. 1.*

Indian hog. *Penn. quadr. p. 73. n. 57. t. 11. f. 1.*

Baby roussa, Babiroussa, Babyrusa, Babi-Rocfa. *Bont. ind.*

or. p. 61. *Jacob. mus. reg. p. 5. t. 2. f. 5. Laus. mus.*

reg. t. 3. f. 28. *Valent. Amboin. 3. p. 268. Buff. hist.*

nat. XII. p. 379. t. 48.

Eberhirsch oder Hirschheber. *Knorr delic. II. t. K. 7.*

Habitat in insula Java, Celebes et Buero prope Amboinam, in reliquis insulis oceani indici hospitatur cicuratus, an Χοιρελαφος Cosmae? gregarius, olfactu acri; herbis foliisque victitans, bene natans et urinans; voce serofae similis; carne bona; magnitudo cervi.

Corpus gracilius, quam congeneribus, ex fusco griseum, fere lanatum, dorso tamen adpersis setis mollibus; caput oblongum angustum, oculis minutis; auriculis parvis, erectis, acutis; dentes molares in utraque maxilla utrinque V; laniarii superiores perforantes maxillam superiorem, recurvati instar duorum cornuum, inferiores magni minus recurvi; crura longa gracilia; cauda longa, contorta, apice floccosa.