

VII. CETE.

Spiracula ad calvariae anteriora posita.

Pedes nulli.

Pinnae pectorales absque unguibus.

Cauda horizontalis.

37. MONODON. *Dentes duo in maxilla superiore exserti praelongi recti spirales.*

Fistula respiratoria in parte calvariae anteriore et superiore.

Monoce- I. Monodon. *Art. gen. 78. syn. 108. Fn. succ. 48. Mus.*
ros. *Ad. Fr. I. p. 52. Müller zool. dan. prodr. p. 6. n. 44.*

Monoceros, Unicornu marinum. Charlet. exerc. pisc. p. 47.

Monoceros piscis e genere cetaceo. Willughb. pisc. p. 42. app. p. 12. t. A. f. 2. Raj. pisc. p. 11.

Unicornu marinum. Mus. Worm. p. 282. 283.

Narhwal. Klein miss. pisc. II. p. 18. t. 2. f. C.

Narhwal oder Einhorn. Andersf. Isl. p. 225. Cranz Groenl. p. 146.

Einhorn. Mart. Spizb. p. 94.

Eenhiörning ou le Narhval, Lioorne. Egede Groenl. p. 56.

Habitat in Americae et Europae oceano septentrionali, velocissime natans, ut, quamvis non rarus, raro tamen capiatur.

Animal 20-22, si fides aliis, 40-60 pedes longum, 12 circiter latum. Cutis alba in dorso nigro-maculata, lardo copioso subjacente; pinna dorsalis nulla, pectorales 2 exiguae; caput parvum; oculi perexigui; dentes, unicornu nomine vulgo venientes, juniore animali 2, interdum laevus, labium superius perforantes, adultiori saepissime unicus. Unicornu alterum fictitium esse, mechanicis et zoologicis argumentis evincit Camper.

38. BA-

Cetorum species in mari rubro variores, pauciores rite cognitae; quibusdam pinna dorsalis, omnibus pinna caudae et pectorales, nullis anales aut ventrales, cum pedes in caudam coadunati.

38. BALAENA. *Dentium* loco in maxilla superiore
laminae corneae.*Fistula* respiratoria duplici orificio
externo supra caput.

- Myftice-
tus, I. B. naribus flexuosis in medio anteriore capite, dorso impenni. *Fn. succ.* 49. *Artic. gen.* 76. *syn.* 106.
- Balaena (groenlandica) fistula duplici in fronte, maxilla inferiore multo latiore. *Linn. mus. Ad. Frid.* I. p. 51.
- Balaena dorso impinni, fistula in medio capite, dorso caudam versus carinato. *Gron. zooph.* 139.
- Balaena (vulgaris groenlandica) bipinnis, in dorso nigricans, in ventre alba, dorso laevi. *Briff. regn. an.* p. 347. n. 1.
- Balaena major, laminas corneas in maxilla superiore habens, fistula donata, bipinnis Sibb. et Balaena vulgaris edentula, dorso non pinnato. *Raj. pisc.* p. 16. et 6.
- Balaena vera Zorydrageri. *Klein miss. pisc.* II. p. 11.
- Balaena vera Rondeletii, et Balaena Rondeletii, Gesneri et aliorum. *Willughb. pisc.* p. 38. 35.
- Balaena vulgo dicta sive musculus. *Rondelet. pisc.* p. 475.
- Balaena vulgo dicta sive Myfticetus Aristotelis, Musculus Plinii. *Gesn. aquat.* p. 132.
- Balaena vulgaris. *Charlet. exerc. pisc.* p. 46.
- Balaena vulgi. *Mus. Worm.* p. 281. *Jonst. pisc.* p. 216. *Aldrov. pisc.* p. 688.
- Balaena. *Plin. hist. nat.* IX. c. 6. 7. 13. *Schonev. ichth.* p. 24. *Aldrov. pisc.* p. 675. *fig.* p. 677-682. *Sibb. Scot. an.* p. 23.
- Φαλαίνα. *Aristot. hist. an.* I. c. 5. III. c. 16. *Aelian. anim.* V. c. 4.
- Μυσικήτος. *Aristot. hist. an.* III. c. 10.
- Hvalfisk. *Egede Groenl. fig.* p. 48.
- Der rechte groenlaendische Wallfisch. *Andersf. Isl.* p. 212. *Cranz Groenl.* p. 141.
- Wallfisch. *Mart. Spitzb.* p. 98. t. Q. f. a. b.
- β. Balaena (islandica) bipinnis ex nigro candicans, dorso laevi. *Briff. regn. an.* p. 350. n. 2.
- Balaena glacialis. *Klein miss. pisc.* II. p. 12.
- Autre espece, qu'on appelle Nord-kapper. *Egede Groenl.* p. 53.
- Nordcaper. *Andersf. Isl.* p. 219. *Cranz Groenl.* p. 145.

γ. Balaena major, laminas corneas in superiore maxilla habens, bipinnis, fistula carens Sibb. *Raj. pisc. p. 16.* (nisi ficta sit.)

Habitat versus polum arcticum, potissimum circa Groenlandiam et Spitzbergen, timidum, velocissimum animal, quamvis omnium maximum, ut 50-60, imo secundum alios 70-80, aliquando 100 pedes longitudine aequet, β. tamen minor graciliorque varietas; vixitat cancro pedato et oculato, Argonauta arctica et Clione bitentaculata, β. medusis clupeisque. Femina, mammis 2 parvis abdominalibus gaudens, 9-10 menses gravida, simplicem, raro duplicem parit prolem, ad 10 pedes longam, quam mire amat. Caro sicca, in cauda magis succulenta, mollior, edulis, parum tamen sapida. Laminae corneae frequentissimi usus, apice et margine fissae in setas, in unico animali circiter 700, media longissima 18-20 pedibus aequali. Lardum inter cutem et carnem copiosissimum, ut ex unica balaena ejus obtineantur 70-90 dolia, ex quo tunc excoquitur oleum; has propter partes capitur, captura jam Hidori et Vincentii tempore notissima, teste Guilielmo Britone, poeta seculi duodecimi, eo tempore ad littora Galliae lucrosa et vulgata.

Caput partem tertiam corporis efficit, supra planiusculum tecti instar cum tuberculo, in quo spiracula; os longum, forma litterae S curvatum, ad oculos usque protensum; maxilla inferior, medio praesertim, latissima; lingua mollis, maxillae inferiori adhaerens, alba, ad latera nigromaculata; oculi bovillorum magnitudine, laterales, remotissimi supra aures; cutis crassitie pollicis, epidermis calami scriptorii, nitida, raro tota nigra vel nigro et flavo varia, rarius tota alba. Angulus subacutus a medio cauda subbifida secundum dorso medium extensus, brevis. Penis vaginatus, 6-8 pedes longus.

Phyfalus.

2. B. fistula duplici in medio anteriore capite, dorso extremo pinna adiposa. *Fn. suec. 50. Art. gen. 77. syn. 107.*

Balaena tripinnis, ventre laevi. *Briss. regn. an. p. 352. n. 5.*

Balaena edentula, corpore strictiore, dorso pinnato. *Raj. pisc. 9. Klein miss. pisc. II. p. 13.*

Phyfalus bellua f. Phylater. *Gesn. aquat. p. 851.*

Phylater. *Plin. hist. nat. IX. c. 4. XXXII. c. 11. Rondel. pisc. p. 485. Aldrov. pisc. p. 689. Jonst. pisc. p. 217. Charlet. exerc. pisc. p. 47. Sibb. Scot. an. p. 23. Wilughbb. pisc. p. 41.*

Finne-

Finne-fiske. *Egede Groenl.* p. 48.

Finnfisch. *Mart. Spizberg.* p. 125. *tab. Q. fig. c.* *Andersf.*
Isl. p. 219. *Cranz Groenl.* p. 145.

Habitat in oceano americano et europaeo aequalis cum mysticeto longitudinis, sed minus pinguis, triplo vel quadruplo gracilior, oris rictu ampliore, laminis corneis brevioribus caeruleis, carne magis sapida; aquam majori vi ex fistulis ejicit, vescitur clupeis et scombris; corpus nitidum fuscum subtus album. Pinna dorsalis recta acuta, 3-4 pedes longa.

- Boops. 3. B. fistula duplici in rostro, dorso extremo protuberantia cornea. *Art. gen.* 77. *syn.* 107.
Balaena tripinnis, ventre rugoso, rostro acuto. *Briss. regn. anim.* p. 355. n. 7.
Balaena tripinnis nares habens cum rostro acuto et plicis in ventre. *Raj. pisc.* 16.
Jubartes. *Klein miss. pisc.* II. p. 13.
Jupiterfisch. *Andersf. Isl.* p. 220. *Cranz Groenl.* p. 146.
Habitat in Oceano septentrionali et meridionali 46 pedes longa, circa pinnas pectorales 20 pedes in ambitu crassa, laevissima, nigra, abdomine albo, secundum longitudinem rugoso. Caput oblongum, rostro subacuto; lingua 5 pedes longa, bovillae similis; oculi prope angulos oris siti, bovillorum magnitudine.
- gibbosa. 5. B. dorso gibboso, pinna dorsali nulla.
α. Balaena bipinnis, gibbis dorsalibus sex. *Briss. regn. anim.* p. 351. n. 4.
Balaena gibbis dorsalibus sex. *Erxl. mamm.* p. 610. n. 5.
Balaena gibbis vel nodis sex, balaena macra. *Klein miss. pisc.* II. p. 13.
Knotenfisch oder Knobbelfisch. *Andersf. Isl.* p. 225. *Cranz Groenl.* p. 146.
β. Balaena (novae Angliae) bipinnis, unico in dorso gibbo. *Briss. regn. anim.* p. 351. n. 3.
Balaena gibbo unico prope caudam. *Klein miss. pisc.* II. p. 12.
Pflokfisch. *Andersf. Isl.* p. 224. *Cranz Groenl.* p. 146.
Habitat β. circa novam Angliam, gibbo versus caudam sito caput humanum superante; α. figura mysticeti, laminis corneis albis.

Museu- 4. B. fistula duplici in fronte, maxilla inferiore multo latiore.
lus. *Art. gen. 78. syn. 107. spec. 106.*

Balaena tripinnis, ventre rugoso, rostro rotundo. *Briffon regn. an. p. 353. n. 6.*

Balaena tripinnis, maxillam inferiorem rotundam et superiorem multo latiore habens *Sibb. Raj. syn. pisc. p. 17.*

Φαλενα, Balena, Balaena, Baleine, Italis Capidolio. *Bell. aquat. p. 4. 6.*

Balena Bellonii. *Aldrov. pisc. p. 676.*

Habitat in mari scotico, victitans clupeis, supra nigra, subtus alba, 78 pedes longa, ambitu 35 pedes superante; maxilla inferior semicircularis, superior apice acuta; riētus ingens; laminae corneae nigrae breves, ut longissimae tres pedes non excedant; fistula pyramidalis, versus frontem posita, septo divisa; abdomen rugis plurimis; dorsum pinna adiposa.

rostrata. 6. B. ore rostrato, dorfi pinna adiposa.

Balaena (rostrata) minima rostro longissimo et acutissimo. *Müller zool. dan. prodr. p. 7. n. 48. Chemniz Besch. der berl. Naturf. IV. 183.*

Balaena ore rostrato, balaena tripinnis edentula minor, rostro parvo. *Klein miss. pisc. II. p. 13.*

Habitat in mari norwegico, Boopi satis similis, subpinguis, nigerrima, 25 pedes longa, celerrime natans, visu acuto; maxilla inferior superiore crassior, in superiore dentem lateralem solitarium, laminas corneas nullas observavit Chemniz, an ergo hujus generis?

39. PHYSETER. *Dentes in maxilla inferiore, nulli in superiore.*

Fistula in capite s. fronte summa.

Catodon. 1. Ph. dorso impinni, fistula in rostro.

Catodon fistula in rostro. *Art. gen. 78. syn. 108.*

Cetus (minor) bipinnis, fistula in rostro. *Briff. regn. anim. p. 361. n. 4.*

Balae-

Balaena minor, in inferiore maxilla tantum dentata, sine pinna aut spina in dorso Sibb. *Raj. pisc. p. 15.*

Habitat in Oceano septentrionali, 24 circiter pedes longus; capite rotundo, victu parvo; fistula nasum referente in rostro.

macrocephalus. 2. Ph. dorso impinni, fistula in cervice.

Catodon fistula in cervice. *Fn. suec. 53. Art. gen. 78. syn. 108.*

α. Cetus bipinnis supra niger infra albicans, fistula in cervice. *Briff. regn. an. p. 357. n. 1.*

Catodon fistula in nucha, dorso topho instructo, the Spermaceti Whale. *Brown. jam. p. 459.*

Cete Pot Walfish Batavis maris accolis dictum, et Balaena major, in inferiore tantum maxilla dentata macrocephala, bipinnis Sibb. *Raj. pisc. p. 11. 15.*

Balaena. *Jonst. pisc. p. 215. t. 41. 42. Willughb. pisc. t. A. 1. f. 3.*

Aliud cete admirabile. *Clus. exot. p. 131.*

Cete Clusio descriptum, Pot-Walfisch Batavis maris accolis dictum. *Willughb. pisc. p. 41.*

Cete Clusii. *Klein miss. pisc. II. p. 14.*

Cetus dentatus. *Mus. Worm. p. 280. Charlet. exerc. pisc. p. 47. Sibb. Scot. an. p. 23.*

Cachelot. *Klein miss. pisc. II. p. 14. Egede Groenl. p. 54. Anderf. Isl. p. 232. Cranz Groenl. p. 148.*

β. Cetus (albicans) bipinnis ex albo flavescens, fistula in cervice, dorso laevi. *Briff. regn. anim. p. 359. n. 2.*

Balaena albicans, Weisfisch Martensii et Zorgdrageri. *Klein miss. pisc. II. p. 12.*

Albus piscis cetaceus. *Raj. pisc. p. 11.*

Poisson blanc, Hviid-fiske. *Egede Groenl. p. 55.*

Weisfisch. *Mart. Spitzb. p. 94.*

γ. Cetus (novae Angliae) bipinnis, fistula in cervice, dorso gibboso. *Briff. regn. an. p. 360. n. 3.*

Dudleji Balaena. *Klein miss. pisc. II. p. 15.*

Habitat α) in oceano Europaeo, β) in freto Davis, γ) circa novam Angliam; α) ad et ultra 60 pedes longus, 36 pedes in ambitu crassus, supra niger infra albus; caput crassissimum, maxilla inferiore minore cum dentibus 46 duplici serie 2-3 pollices ex gingiva exsertis, a totidem alveolis in maxilla superiori exceptis. Mammae retractiles. Viſtat potiffimum ſepia octopodia.

Ex hujus capite ſperma ceti, propriae cavitati offeae, cute communi obteſtae incluſum; ex inteſtinis aegri debilisque ambra grifea, quae non eſt, niſi ejus ſcybala, praeter naturam indurata. Schwediauer act. angl. ann. 1783. P. I. n. 15.

β . figura myſticeti, capite tamen acutiore; 15-16 pedes modo longus, ex albo flavescens; dentibus parumper incurvis, compressis, apice rotundatis.

γ . ex cinereo nigricans 60-70 pedes longus, 30-40 in ambitu crassus, gibbere dorsali pedem crasso, capite praegrandi, oculis exiguis; maxilla inferior superiore multo angustior dentibus plurimis munita, superior totidem alveolis.

microps. 3. Ph. dorſo pinna longa, maxilla ſuperiore longiore. Art. gen. 74. ſyn. 104.

α . Cetus tripinnis, dentibus acutis arcuatis falciformibus. Briff. regn. an. p. 363. n. 6.

Balaena major in inferiore tantum maxilla dentata, dentibus arcuatis falciformibus, pinnam ſeu ſpinam in dorſo habens Sibb. Raj. piſc. p. 15.

Balaena major, in inferiore tantum mandibula dentata, dentibus arcuatis falciformibus, pinnam ſeu ſpinam in dorſo habens. Klein miſſ. piſc. II. p. 15.

Dritte Species der Cachelotte. Anderſ. Isl. p. 248.

β . Cetus tripinnis, dentibus acutis, rectis. Briff. regn. anim. p. 362. n. 9.

Zweyte Species der Cachelotte. Anderſ. Isl. p. 246.

Habitat in oceano ſeptentrionali; caput maximum; maxilla ſuperior tot alveolis exarata, quot dentibus armata inferior, oculi exigui; cutis laeviſſima. α) ad 70 pedes longus ex fuſco nigricans, phocaenas exagitat ſaepe uſque in ipſam

ipsam terram. Dentes 42 rotundi, parumper compressi, faucis instar curvati, medio crassiores; fistula paululum sub rostri medio; pinna dorsalis sat longa acuminata, ut spinam fere referat.

β) 80-100 pedes longus, supra nigricans, subtus albicans, gibbere altissimo in parte dorsi superiore, et pinna caudam versus posita; caput dimidia fere corporis longitudine; oculi splendentes, flavicantes; lingua parva, acuta; dentes crassi, recti, apice acuti, quasi serrae.

Turſio. 4. Ph. dorsi pinna altissima, apice dentium plano. *Art. gen.* 74. *ſyn.* 104.

Cetus tripinnis, dentibus in planum definentibus. *Briffon regn. anim.* p. 364. n. 7.

Balaena macrocephala tripinnis, quae in mandibula inferiore dentes habet minus inflexos et in planum definentes *Sibb. Raj. piſc.* p. 16.

Mular Nierembergii. *Klein miſſ. piſc.* II. p. 15.

Habitat in oceano ſeptentrionali, 100 pedes longus et longior, pinna dorsi longissima, acuta, erecta, ut navis malum quasi referat, fistula in fronte posita, dentibus minus inflexis et apice planis; ceterum micropi similis.

40. DELPHINUS. Dentes in maxilla utraque.

Fistula in calvariae parte anteriore et superiore.

Phocaena. 1. D. corpore subconiformi, dorso lato, rostro subobtusum. *Fn. ſuec.* 51. *Art. gen.* 75. *ſyn.* 104.

Delphinus (Phocaena) pinna in dorso una, dentibus acutis, rostro brevi obtuso. *Briff. regn. an.* p. 371. n. 2. *Bloch Fiſch. Deutſchl.* 2. p. 119. t. 92.

Turſio. *Plin. hiſt. nat.* IX. c. 9. *Bellon. aq.* p. 15. *Rondelet piſc.* p. 474. *Schonev. ichth.* p. 77. *Klein miſſ. piſc.* II. p. 26. t. 2. A. B. 3. B.

Φοκαίνα, Turſio, Marſouin. *Bellon. aq.* p. 16.

Phocaena. *Rondelet piſc.* p. 473. *Gefn. aq.* p. 837. *Aldrov. piſc.* p. 719. *fig.* p. 720. *Fonſt. piſc.* p. 221. t. 41. *Charlet.*

let. exerc. pisc. p. 48. Sibb. Scot. an. p. 23. Willughb. pisc. p. 31. t. A. I. fig. 2. Raj. pisc. p. 13. Rzacz. Pol. auct. p. 245. Klein miss. pisc. I. p. 24.

Meerschwein oder Tunin. *Mart. Spitzb. p. 92. Andersf. Isl. p. 253. Crantz Groenl. p. 151.*

Niser ou le Marfouin. *Egede Groenl. p. 60.*

Delphin oder Nifen. *Gunner. act. Nidrosf. II. p. 237. t. 4.*

Habitat in oceano Europaeo et mari Balthico, 5-8 pedes longus, supra ex nigro caerulefcens, subtus albus; caput obtusiusculum; oculi perexigui; pone hos foraminulum auditorium, interque eos spiraculum lunatum, sinu antrosum verso; dentes parvi acuti, in utraque maxilla 46; penis foramen lineare pone umbilicum sive sub pinna dorsali; anus medius inter penem et caudam sub bifurcam.

Delphis. 2. D. corpore oblongo subtereti, rostro attenuato acuto. *Art. gen. 76. syn. 105.*

Delphinus pinna in dorso una, dentibus acutis, rostro longo acuto. *Briss. regn. an. p. 369. n. 1.*

Δελφίς. Aristot. hist. an. I. c. 5. II. c. 9. III. c. 1. 7. 16. IV. c. 9. 10. IX. c. 74. Aelian. an. I. c. 18. II. c. 6. V. c. 6. VIII. c. 3. X. c. 8. XI. c. 12. 22. XII. c. 6. 45.

Delphinus. *Plin. hist. natur. IX. c. 7. 8. XI. c. 37. Bellon. aquat. p. 7. fig. p. 9. 10. Rondel. pisc. p. 459. Gesn. aquat. p. 380. fig. p. 381. Aldr. pisc. p. 701. 703. 704. Jonst. pisc. p. 218. t. 43. Mus. Worm. p. 288. Charlet. exerc. pisc. p. 47. Willughb. pisc. p. 28. t. A. I. fig. 1. Raj. pisc. p. 12. Rzacz. Pol. auct. p. 238. Klein miss. pisc. II. p. 24. t. 3. f. A.*

Porcus marinus. *Sibb. Scot. an. p. 23.*

Delphin. *Andersf. Isl. p. 254. Crantz Groenl. p. 152.*

Habitat in oceano Europaeo, et mari pacifico, adhaerens saepius balaenis, ut exsiliant; supra niger, subtus albus; major phocaena, minor orca, ita ut longitudine 9-10 pedes, crassitie, si diametrum metiaris, 2 pedes aequet, phocaena hinc gracilior; rostrum longius et magis acutum, supra cinctum fascia lata transversa; dentes subulati;
oris

oris scissura magna ad thoracem usque; genitalia inter umbilicum et anum media; renes conglomerati.

- Orca. 3. D. rostro sursum repando, dentibus latis ferratis. *Mantiff. M. 2. p. 523. Fu. suec. 52. Art. gen. 76. syn. 106. Gunn. act. Nidros. 4. p. 110.*

Delphinus (Orea) pinna in dorso una, dentibus obtusis. *Briff. regn. an. p. 373. n. 4.*

Balaena minor utraque maxilla dentata *Sibb. Raj. pisc. p. 15.*

Orea. *Plin. hist. nat. IX. c. 6. XXXII. c. II. Bellon. aquat. p. 16. fig. p. 18. Rondel. pisc. p. 483. Gesn. aquat. p. 748. Schonev. ichth. p. 53. Aldrov. pisc. p. 697. fig. p. 698. Jonst. pisc. p. 217. Charlet. exerc. pisc. p. 47. Willughb. pisc. p. 40. Raj. pisc. p. 10. Klein miss. pisc. II. p. 22. t. 1. f. 1. Steller Camtschatc. p. 104.*

Wagnhyalur vel Hualhund. *Mus. Worm. p. 279.*

Butskopf. *Mart. Spitzb. p. 93. Andersf. Isl. p. 252. Cranz Groenl. p. 151.*

Buts-kopper. *Egede Groenl. p. 56.*

- β. Delphinus pinna in dorso una gladii recurvi aemula, dentibus acutis, rostro quasi truncato. *Briff. regn. an. p. 372. n. 3.*

Delphinus (Orea) dorsi pinna altissima, dentibus subconicis parum incurvis. *Müll. zool. Danic. prodr. p. 8. n. 57.*

Schwerdtfisch. *Andersf. Isl. p. 255. Cranz Groenl. p. 152.*

Noch ein ander Art grosse Fische. *Mart. Spitzb. p. 94.*

Habitat in oceano Europaeo, mari atlantico, ad polum antarcticum, in freto Davis, maximus congenerum, ut 24-25 pedes longitudine, 12-13 latitudine aequet, supra niger subtus albus, cum phocis, quas pinnae dorsalis ope a lapidibus detrudit, continuum bellum gerens, has et balaenas turmatim aggrediens, et una cum pleuronectis maximis occidens et devorans. Maxilla inferior superiore multo major; rostrum sinum; dentes obtusi 40; oculi parvi; spiraculum planum biloculare. Pinna s. spina dorsalis β) ensiformis, cute communi vestita, basi latior, saepe sexpedalis.

Leucas. 4. D. rostro conico obtuso, deorsum inclinato, pinna dorsali nulla. *Pall. it.* III. p. 84. t. IV.

D. pinna in dorso nulla. *Briss. regn. an.* p. 374. n. 5.

Beluga. *Penn. quadr.* p. 357.

Bieluga. *Steller Camtschatc.* p. 106.

Wittfisch oder Weisfisch. *Anderf. Isl.* p. 251.

Weisfisch. *Cranz Groenl.* p. 150.

Habitat ad polum arcticum, rarius in fluvios ascendens, gregarius, glaberrimus, lubricus, albus, junior tamen parumper nigricans, 18 pedes nunquam excedens longitudine, medio crassior, versus utrumque finem magis attenuatus, celerrime natans. Caput oblongum, parvum; oculi exigui, rotundi, prominuli; spiraculum in fronte, in palato per septum divisum; dentes in utraque maxilla utrinque 9 breves, et satis obtusi. Pinnae pectorales pingues, ossibus digitalibus 5. Cauda cartilaginea, biloba. Mammae feminae 2, lacte albo refertae; penis mari triumphalis brachii crassitie absque cartilagine aut osse.