

dorsali

CLASSIS II.

A V E S.

*Ipsi laetitia voces ad sidera mittunt
Intonsi montes, ipsae jam carmina rupes,
Ipsa sonant arbusta.*

VIRGIL. eccl. V. 62.

AËREAE vocales Volucres pulcherrimae, *Mandibulis protractis nudis,*
Corpo pennis imbricato. Alis duabus pennatis volitantes bipedes
dignoscuntur.

AVES levissimae modici ponderis et magnitudinis, testas pennis plumisque, destitutae *Auriculis, Labiis, Scroto, Dentibus, Utero, Vesica urinaria, Epiglottide, Fornice, Corpore calloso, Diaphragmate.*

PENNAE avibus propriae imbricatum in quincuncem dispositae, interstinctae *Plumis*, distinctae a *Remigibus Reelribusque*, omnes supra convexae, subitus concavae: latere exteriore angustiores; interiore latiores; anteriore laxiores; posteriore strictiores; scilicet e baseos cylindro tubulo referto aerifero vase lymphaticis simili, Rachi elongatae, bifariam radiis parallelis approximatis distinctis itidem pinnatis ancipites.

*Colore ludunt, sed variant aetate, sexa, tempestate, climate; constantiores Remiges et Reelrices, quae attente notandae. *)*

Nuda cutis utrinque ad colli latera a capite versus interscapulum, ab axillis per latera pectoris fere ad inguina et ad femora postica.

OVA his animalibus communia (p. 8. n. 4.) numero diversis vario, sed majora pro mora exelusionis siccae, semper putamine calcareo obiecta, incubatu calido excludenda Parentis, in *Nido* artificioso.

Trachea multis musculis munita, annulis constat mere cartilagineis, in nonnullis avibus ipsa adeo branchia.

Receptacula aërea per totum corpus dispersa, ad volatum cantumque summe necessaria cum pulmonibus aut ore commercium alentia, ut pro arbitrio aëre vel impleri vel evacuari possint; hue spectat tela cellulosa abdominalis subaxillaris aliaque subcutanea, potissimum vero (exceptis scolopacibus, fulicis, et anseribus) ossa intus cava et

P 5

medul-

AS-
*) Att. Stockb. 1740. p. 370. t. 1. f. 10. II.

medullae expertia, femoris, brachii, sterni, costae, coxae, humeri, claviculae, dorfi quoque spina, in paucioribus cranium aut maxilla inferior, in quae posteriora per os aut tubum Eustachii intrat aer.

DIVIDITUR Avium corpus in *Caput, Truncum, Artus.*

Caput tegitur supra *Pileo e Vertice, Fronte et Occipite unitis, cingens rostrum antice Capistro, in quo Lora e lineis duabus nudis a rostro ad oculos ducta; Orbitae ambiant oculos, supra quos Super-cilia; inter oculos et aures Tempora; inter oculos vero et gulam Genae sunt.*

Rostrum in variis varium: *Rectum, Incurvum, Recurvatum, Teres, Compressum, Depressum, Conicum, Subulatum, Cylindricum, An-gulatum, Cultratum, Fornicatum, Uncinatum.*

Mandibulæ nudaæ edentulæ, quibusdam pone apicem emarginatae, paucis serratae, exporrectæ in Rostrum cornuum, Naribus pertusum, superioris basi quibusdam Cera nuda vestita, Vibrissis peccinatis ciliatis ad faucis exterioris margines.

Lingua carnosa, cartilaginea, emarginata, lacera, pennacea, ciliata, integra s. acuta.

Oculi laterales *Palpebris Membranaque nictitante detergendi; lente crystallina mobilissima, in loculis nigris, plicatis, conicis recondita. Superciliorum loco interdum linea picta, rarius carunculata.*

Aures truncatae absque auriculis, quarum loco pennae strigibus longæ.

Barba Myctacea ad mandibulas inferiores, mobilis Momotae, Pendulo; in ipso peccore pendula Meleagridi adulto; at *Capitulum reversum* tegit basin rostri Corvis, Picis, Strigibus.

Crista pennacea pilei Frontalis, Verticalis, Occipitalis, Erecta, Recurvata, Deflexa, Plicatilis, Compressa; *Carunculae* vero carnosæ nudaæque Frontis, Verticis, Nuchæ, Superciliorum, Gulæ, Juguæ, sunt ornamenta capitis in variis.

Collum elongatum, erectiusculum, teres, supra incipit *Nucha*, continuatur *Cervice*; infra vero incipit *Gula*, continuatur *Jugulo*.

TRUNCUS ovatus conflans *Dorso* coadunato macro, subtus supra *Sternum* magnum carinatum musculissimo *Pectore, Claviculis* coadunatis in *Furcam, Abdomine* minore, postice sub uropygio perforato *Ano*, genitalibus communis, et terminato *Cristo*.

ARTUS sunt Brachiales *Alae*, veri *Pedes*, Caudale *Uropygium*.

ALAE compressæ, *Ossium* articulis mobiles, testæ *Pennis*, demum *Tetricibus* primis secundisque, postice ciliatae *Remigibus*; explicantur hæc in fornicateum ventilabrum volitanti; complicantur stabulanti primoribus tubeuntibus secundarias, ut hæc latere anteriore depin-

humeri,
maxilla
at aer.

, cin-
nudis a
Super-
gulam

Teres,
n, An-

inatae,
pertu-
r pecti-

ciliata,
lente
ondita.

rigibus

Pendu-
um re-

a, Re-
rnofae
e, Ju-

, con-
lo.

i Sier-
coadu-
erfora-

emum
olican-
stabu-
eriore
depin-

depingant specificum *speculum* nitidum Anatum; nec deficiunt, nisi in *Impennibus pelagicis* (*Diomedea demera*, *Alca impenni*) vel volatui ineptis (*Struthione*, *Dido*).

OSSA α . *Brachii* 1 elongatum. β . *Cubiti* 2 elongata. γ . *Carpi* 2 brevissima. δ . *Metacarpi* 2 connexa mediocria. ε . *Digitii* 2 attenuata, altero majore biarticulato, compresso; altero minuto. ζ . *Pollicis* vero 1 minutum, infidens basi anteriori metacarpi, raro *spina* evadens (*Parris*, *Charadrio*, *Struthioni*) adjacente spina setacea.

REMIGES Primores X: quorum 1—4 *Digitii*, 5—10 *Metacarpi*; Secundarii 10—20 s. 28 *Cubiti*, nulli vero *Brachii*; at *Alula* spuria pennis 3 s. 5 *Pollici* insidet.

PEDES ex Femore, Tibia, Digitis, Unguis.

FEMORA ex Osse Femoris Crurisque binis altero setaceo, carnosa, pennis testa, praeterquam cruribus denudatis in *vadantibus* Grallis; ceterum plerisque aequilibrio supposita, nisi in *Compedibus* ambulare nelciis, quibus intra commune abdominis tegmen recundita (*Alcis*, *Colymbis*); nonnullis *Armillae* supra genua cingunt coloratae.

TIBIAE ex osse Tarsi elongato, maiores, angustae, tendinosae, nudae, rariusve *villosoe plumaſae*, paucis postice *Spina calcara-*
tae, inprimis matculis.

DIGITI e Metatarsi phalangibus, plerumque IV, quorum unus posticus breviorque, intermedius anterior vero longior, sed *Scansoriis* digitii antici 2, posticique 2; *Cursoriae* vero postico destituantur *tridactylae* (*Charadrius*, *Haematopus*, *Otis*, *Casuarius*), rarissime *didaactylae* (*Struthio Camelus*). Sunt vero *Digitii* distincti *Fissipedibus* plerisque; vel intermedius adnatus laterali *Gressoriis*; vel anteriores intertexti membrana integra *Natatoris*; quae fissa in *Lobatis*, vel basi tantum intertexta *Semipalma-*
tis vadantibus, vel articulus membranula marginali *Pinnatis*.

UNGUES acuti, quibusdam obtusi, paucis marginati, paucissimis muticis nulli.

UROPYGIUM sessile, cordatum, glandula gemina caudae brevi adposita tumidum, supra pertusum *Poro oleifero*, cincto Penicillo, ambitu ciliatum Rectricibus Caudae:

RECTRICES saepe XII (1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1); plures (18) Gallinis; pauciores (10) Picis (*Pico*, *Certhiae*, *Cuculo*, *Yungi*, *Bucero*, *Ramphasto*, *Trochilo*).

CAUDA

CAUDA inde vel Pedibus brevior *brachyuris*, vel longior *macrouris*;
ex Rectricibus aequalibus *integra*, vel ad latera per gradus bre-
vioribus *cuneata*, aut lateralibus longioribus *forficata*, in quibus
omnibus Rectricibus complicatis subeunt laterales intermediae.

VOLATILES hae, Telluris vigiles libidinosique musici, cantu tamen
aut amorum interprete, aut adscitio; pleraque *Diurnae*; paucae
Nocturnae (e. g. *Striges*, *Caprimulgj*), quarum variae Noctu can-
tant (*Luscinia*, *Turdi*) et Mane (*Tetraones*, *Gallinacei*), pleraque
inermes sunt, cum Alarum remigibus se facile in aethera recipient
ab hostibus terrestribus, et Caudae rectricibus aereos diverso volatu
eludant, nisi in terra negotiari necesse sit, quibus odor vel ingratus
hostes arect, vel abolitus occultat; dum aliae speculantur hostem
appropinquantem indicantque aliis: *Lanius*, *Yunx*, *Parra*, *Hae-
matopus*, *Meleagris*, *Hirundo purpurea* etc.

ARMA paucis, praeter *Rostrum* et *Ungues* plerisque.

Cornua Meleagridi cornutae, *Palamedeae*.

Calcaria Pavoni, *Phalano*, *Tetraoni*.

Spinae (*pollicares*) *Struthioni Cameloi*, *Parrae*,
Charadrio spinoso, *Palamedeae*.

VENERE *monogama* junguntur pleraque Aves, *polygama* pauciores, ut
Gallinae, *Anates*. Illae utriusque sexus conjugentis viribus fruunt
nidum saepe artificiosissimum (pendulum, natantem, concameratum,
argilosum, foraminosum, nullumve) uteri succedaneum, incubant
sedulac ovis (1 *Alca*, 2 *Colymbus*, 3 *Larus*, 4 *Corvus*, 5-8 *Hi-
rundo*, pluribus *Anates*, *Gallinae*), pullos famelicac alunt (osten-
dendo, porrigendo, regurgitando,) fovent, curant, pro aris et fo-
cis defendunt,* dum in his otientur mares. Nuptias celebrant
vestitu, musica, ludibus plerique.

MIGRATIONES annuas inter septentrionales aestivas et australes hyber-
nas plagas arcticae Telluris plures instituunt internuncii hi naturae,
ne hyeme demergerentur boreales omnes insectivorae. Sic migrant
plurimi *Passeris* in primis *tenuirostres*, ob defectum insectorum;
Grallae ob denegatum glacie aditum vermis et amphibiis: *Anse-
res* ob congelatas aquas includentes pisces etc. Revocant vero eas-
dem Dies aestatis longiores, eiborum copia, densiores vestitus,
nuptiae paratae. Pauciores hybernant.

HABITANT aliae intra *Tropicos*, ut *Rhaeton*; intra *Poles*, ut *Procellaria*
glacialis; aliae alibi, ad *Africæ* promontorium australe *Procel-
laria capensis*; in *India* *Paradilea*, *Pavones*; in *Africa* *Struthio I.*
Pele-

*) *Mof. Denteron*, XXII, 6. 7.

erouris;
dus bre-
i quibus
ediac.

t tamen
paucae
tu can-
eraeque
ecipiant
volatu-
ngratus
hostem
, Hae-

Parrae,
res, ut
struunt
ratum,
cubant
-8 Hi-
Costen-
et fo-
ebrant

hyber-
nitrac,
migrant
orum;
Anse-
o cas-
titus,

ocella-
rocel-
hio I.
Pele-

Pelecanus I. in *America* Palamedea, *Plophia*. In *Pelago* impennes coimpedes; in *Mari Procellariae*; in *Lacubus Colymbi*; in *Fluviis* *Mergi*; in *Cataraetis Cinclus*; in *Littoribus Charadrii*; in *Paludibus* *Scolopaces*, *Tringae*; in *Campis Otis*, in *sylvis* *Lanius* insuitus; in *Arboribus Passeres*; in *Rupibus Bubo*; in *Pagis Pica*, *Hirundo*; in *Alpibus Turdus roseus*, *Emberiza nivalis* etc.

VICTUS cuique suis. Aliae Carnivore: vorant *Cadavera Accipitres*, *Corvi*; *Pisces Anseres*; *Insecta Passeres tenuirostres*, et *trochili*; *larvas Cerambycum Pici*; *Lepidopterorum Cuculus*; *Ricinos Crotophaga*; *Oestros Buphaga*; *Oniscos Cinclus*; *Phryganeas Hirundines*; *Conchas Haematopus*; *Cancros Mycetaria*, *Cancroma*; *Squillas Recurvirostra*, *Lumbricos Crex*. Aliae Phytiphagae: viuent Plantis Anseres; *Pomis Pittaci*; *Nucibus Caryocatactes*; *Nucleis Coccothraustes*; *Strobilis Curvirostra*, *Enucleator*.

OPERA, nec sine fructu, peragunt sua singulae: sedentes *Accipitres* *Cadavera auferunt*, ut vivis pareant; incidentes *Picae Quisquiliae* impuras verminofasque devorant; natantes *Anseres Aquarum nimios hospites minuant*; vadantes *Grallae* inquirunt in *Paludum animalcula*; currentes *Gallinae* decidua grana legunt; salientes *Passeres arbutorum herbarumque Semina Insectaque carpunt*; eoque varia lemina *Piscium*, *Insectorum*, *Plantarumque saepius in remotissima loca deferunt naturae disseminatores*. Conquiruntur *Venatu*; *Falconaria*; *Aucupio*; instituantur *Faltones ad venatum*, *Parrae ad pastoritiam*, *Pelecani ad piscaturam*, *Passeres ad musicam*. Manuefcunt *Gallinae*, *Anates*, *Passeresque variis*. In Ornithone f. avario coluntur ob *carnes*, *ova*, *plumas*, *pennas*, pulchritudinem, sonum.

HISTORIA Avium absolvitur *Descriptione*, *Habitatione*, *Volatu*, *Migratione*, *Nuptiis*, *Nidificatione*, *Ovatione*, *Incubatione*, *Educatione*, *Vitu*.

GENERUM Charakteres desumendi a *Rostro*, *Lingua*, *Naribus*, *Cera*, *Caruncula*, reliquisque partibus denudatis.

ORNITHOLOGI eminentiores in Veteres et Recentiores dispescuntur.

VETERUM *Bellonius* 1557 et *Gesnerus* 1555 patres artis; horum aves collegit et auxit 1599 *Aldrovandus*, Brasilienses novas addente *Marcgravio* 1648; has omnes digessit et auxit *Willughby* cum suo *Rajo* 1713, iconesque varias dedit *MarSiglius* 1726.

RECENTIORES vivis *Coloribus* nova luce illustrarunt artem, *Europaeas Albinus* 1731, *Europae meridionalis* (1772–1782) *Bernini*, *Sardas* (1776) *Cetti*, *Germanicas Frischius* 1734, *belgicas* (1770–1778) *Noze-*

Nozemannus et *Seppii*, suecicas nonnullas *Tengmalm*, borussicas *Bockius*, britannicas *Hages* 1775, has aequa ac indicas 1768–1777. *Pennantus*, rariorum novarumque avium Centuriam unam *Catesby* 1731, tres et ultra centuriā pulcerissimas *Edwards* 1745, centuriā novem et ultra (ab anno 1775) *Daubentonius*, pauciores *Jos. Fr. Nob. a Jacquin* 1784, *Bl. Merrem* 1784–1786, et in musei Carlsonianae descriptione *Sparrmannus* 1786; ova variarum avium descripta a *Günthero* pinxit *Wirsingius* (1703).

Avium anatomie et physiologia multa debet *Reaumurio*, *Hemisynio*, *Campero*, *Huntero*, *Blumenbachio*, *Merrem*, *Blochio*, *Vicq d' Azyr*, *Pallas*, *Güldenstaedtio*, *Silberschlagio*, *Malacarne*.

SYSTEMATICAM in formam aves reducere tentavit de suecicis *Fauna mea* 1746, *Systemaque Naturae* 1758; omnes collegit et digessit *Briffonius* 1760, cui integrum exercitum et notarum et novarum obtulere labores et museum magni *Reaumurii*. Nuperius idem tentarunt 1781 *Pennant* et 1785 *Latham*.

ASSERVANTUR vel in *spiritu vini* integrae, vel siccatae; vel exuviis integris *farctis* aut dimidiatis *gypso* fixato repletis, methodo *Schaefferi*.

I. AC

II. P

III.

IV.

ORDI-

ORDINUM Charakteres.

I. ACCIPITRES.

ROSTRUM (*Uncus trahens*) subincurvatum. *Mandibula superiore pone apicem utrinque dilatata & dente armata: Naribus patulis. PEDES insidentes, breves, robusti: Digitis sub geniculis verrucosis, Unguis arcuatis acutissimis.*

CORPUS Capite Colloque musculosis; Cute tenaci. Impurum.

VICTUS: Laniena Rapinaque e cadaveribus.

NIDUS in altis; Ova circiter 4; Femina praestantior. Monogamia.

Analogi Feris.

II. PICAE.

ROSTRUM (*Cuneus farriens*) cultratum dorso convexo.

PEDES ambulantes, breves, validiusculi.

CORPUS tenaciusculum impurum.

VICTUS e Quisquiliis.

NIDUS in Arboribus; Mas alens feminam incubantem. Monogamia.

Analogae Primatibus.

III. ANSERES.

ROSTRUM (*Cibrum colans*) laeve, epidermide tectum, apice auctum.

PEDES natatorii digitis membrana palmatis: *Tibiis compressis, brevibus.*

CORPUS pingue, Cute tenaci, Plumis praestantioribus. Ranceens.

VICTUS in Aquis ex Plantis, Piscibus etc.

NIDUS saepius terrestris. Mater rarius porrigit pullis; frequentius Polygamia.

Analogi Belluis.

IV. GRALLAE.

ROSTRUM (*Bacillus tentans*) subcylindricum.

PEDES vadantes *Femoribus* *seminudis.*

CORPUS

CORPUS compressum pelle tenuissima; Cauda brevi; Sapidum.

VICTUS in Paludibus ex animalculis.

NIDUS in terra saepius; Nuptiis variis.

Analogae Brutis.

41.

42.

43.

44.

V. GALLINAE.

ROSTRUM (*Harpa colligens*) convexum: Mandibula superiore fornicate supra inferiorem; Naribus membrana cartilaginea forniciatis.

PEDES cursorii Digitis subtus scabris.

CORPUS sebaceum, musculosum. Purum.

VICTUS in Terra e Granis in ingluvie macerandis. Pulveratrices.

NIDUS in Terra absque arte; Ovis numerosis. Pullis cibus monstrandus. Polygamia.

Analogae Pecoribus.

66.

65.

64.

48.

60.

52.

51.

53.

50.

54.

VI. PASSERES.

ROSTRUM (*Forceps excipiens*) conico-acuminatum.

PEDES salientes, teneri, fissi.

CORPUS tenellum: *Granivorus* Purum, *Insectivorus* Impurum.

VICTUS in arboribus e Seminibus aut Insectis.

NIDUS artificiosus; Pullis cibus inculcandus. Monogamia. Cantus.

Analogi *Gliribus*.

55.

45.

49.

59.

58.

57.

56.

CHA-

CHARACTERES AVIUM.

I. ACCIPITRES.

41. VULTUR. Rostrum aduncum. Caput denudatum. — 4.
 42. FALCO. Rostrum aduncum basi Cera teclum. — 7.
 43. STRIX. Rostrum aduncum capistro reverso. — 4.
 44. LANIUS. Rostrum rectiusculum, emarginatum.

II. PICAE.

* Pedibus ambulatoriis.

66. TROCHILUS. Rostrum incurvatum, filiforme, apice tubulosa. 3. 3.
 65. CERTHIA. Rostrum incurvatum, acuminatum. 2. 2.
 64. UPUPA. Rostrum incurvatum, obtusiusculum. 2. 2.
 GLAUkopis. Rostrum incurvatum, fornicatum. Lingua serrata,
ciliata.
 48. BUPHAGA. Rostrum rectum, quadrangulare.
 60. SITTA. Rostrum rectum, apice cuneato.
 52. ORIOLO. Rostrum rectum, conicum acutissimum.
 51. CORACIAS. Rostrum cultratum, apice incurvo.
 53. GRACULA. Rostrum cultratum, aequale, basi calva.
 50. CORVUS. Rostrum cultratum, capistro reverso.
 54. PARADISEA. Rostrum subcultratum, capistro holosericeo.

* * Pedibus scansorii.

- RAMPHASOS. Rostrum serratum. Lingua pennacea.
 55. TROGON. Rostrum serratum, apice aduncum.
 45. PSITTACUS. Rostrum cera obduclum. Lingua carnosa.
 49. CROTOPHAGA. Rostrum rugosum, margine angulatum.
 59. PICUS. Rostrum angulatum. Lingua lumbriiformis.
 58. YUNX. Rostrum laeve. Lingua lumbriiformis.
 57. CUCULUS. Rostrum laeve. Nares marginatae.
 56. BUCCO. Rostrum laeve, emarginatum, aduncum.

*** Pe-

Nares capistri pennis recumbentibus obtectae in Corvo, Pico, Buccone, Strige;
 Mandibulae serratae in Rampaſto, Bucco, Trogone.

Q

* * * *Pedibus gressoriiis.*

47. BUCEROS. Rostrum *serratum*, fronte *ossea*.
 48. ALCEDO. Rostrum *trigonum*, *rectum*.
 49. MEROPS. Rostrum *incurvatum*, *compressiusculum*.
 50. TODUS. Rostrum *lineare*, *depressum*, *rectum*.

89.

86.

87.

91.

92.

93.

III. ANSERES.

* *Rostro denticulato.*

67. ANAS. Rostrum *unguiculatum*, *denticulis membranaceis*.
 68. MERGUS. Rostrum *unguiculatum*, *denticulis subulatis*.
 74. PHAETON. Rostrum *culturatum*.
 73. PLOTUS. Rostrum *subulatum*.

94.

83.

* * *Rostro edentulo.*

78. RHYNCOPS. Rostrum *mandibula superiore breviore*.
 71. DIOMEDEA. Rostrum *mandibula inferiore truncata*.
 APTENODYTA. Rostrum *rectum*, *angustum*, *ad latera sulcatum*.
 69. ALCA. Rostrum *rugis lateralibus transversis*.
 70. PROCELLARIA. Rostrum *naribus superincumbentibus*, *subcylindricis*.
 72. PELECANUS. Rostrum *cinctum facie nuda*.
 76. LARUS. Rostrum *sub apice subtrus gibbum*.
 77. STERNA. Rostrum *subulatum*, *apice compresso*.
 75. COLUMBUS. Rostrum *subulatum*, *lateribus compressiusculum*.

90.

88.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

IV. GRALLAE.

* *Pedibus tetradactylis.*

79. PHOENICOPTERUS. Rostrum *infrarectum*, *denticulatum*. Pedes *palmati*.
 80. PLATAEA. Rostrum *depressum*, *spatulatum*.
 81. PALAMEDEA. Rostrum *apice uncinatum*, *acutum*.
 82. MYCTERIA. Rostrum *mandibula inferiore crassiore subadscen-*
dens.
 85. TANTALUS. Rostrum *arcuatum*, *facco gulari*.
 84. ARDEA.
 CORRIDA. Rostrum *rectum acutiusculum*.
 Rostrum *rectum*, *angustum*.

104.

89. RE-

89. RECURVIROSTRA. Rostrum *subulato* - *attenuatum*, *depressum*, *re-curvum*.
 86. SCOLOPAX. Rostrum *rectum*, *teretiusculum*, *obtusiusculum*.
 87. TRINGA. Rostrum *teretiusculum* *obtusum*. Pollex vix *in-sistens*.
 91. FULICA. Rostri *basis* *fron te calva*.
 92. PARRA. Rostri *basis* *fron te carunculis mobilibus*.
 93. RALLUS. Rostrum *subcarinatum*. Corpus *compressiusculum*.
 VAGINALIS. Rostrum *crassum*, *subconvexum*, *mandibulae super-iорis apice vaginae corneaе inclusо*.
 94. PSOPHIA. Rostrum *subfornicatum*. Nares *ovatae*.
 83. CANCROMA. Rostrum *ventricosum*.
 SCOPUS. Rostrum *crassum*, *compressum*. Nares *lineares*, *obliquae*.
 GLAREOLA. Rostrum *breve*, *rectum*, *apice uncinatum*. Nares *lineares*, *obliquae*.

* * Pedibus cursoriis f. *tridactylis*.

90. HAEMATOPUS. Rostrum *compressiusculum*, *apice cuneo*.
 88. CHARADRIUS. Rostrum *teretiusculum*, *obtusum*.

V. GALLINAE.

95. OTIS. Rostrum *subfornicatum*. Lingua *emarginata*.
 96. STRUTHIO. Rostrum *conicum*. Alae non *volitantes*.
 97. DIDUS. Rostrum *medio coarctatum*, *ruga sum*, *facie nuda*.
 98. PAVO. Rostrum *nudum*. Vertex *pennis revolutis*.
 99. MELEAGRIS. Facies *nuda carunculis verrucosa*.
 PENELOPE. Caput *pennatum*; rostrum *denudatum*.
 100. CRAX. Rostrum *basi cera obductum*.
 101. PHASIANUS. Genae *nudae*, *laeves*. Mas *calcaratus*.
 102. NUMIDA. Carunculae *binae*, *ad basin mandibularum*.
 103. TETRAO. Supercilia *nuda*, *papillosa*.

VI. PASSERES.

* Crassirostres.

109. LOXIA. Rostrum *conico-ovatum*.
 COLIUS. Rostrum *crassum*, *supra convexum*, *subtus angustatum*.

112. FRINGILLA. Rostrum *conicum, acutum.*

PHYTOMA. Rostrum *conicum, rectum, serratum.*

110. EMBERIZA. Rostrum *subconicum, mandibula inferiore latiore, carinata.*

* * Curvirostres, *mandibulae superioris apice incurvato.*

3 118. CAPRIMULGUS. Rostrum *incurvum, depresso, ciliatum. Nares tubulofae.*

2 117. HIRUNDO. Rostrum *incurvum, depresso.*

115. PIPRA. Rostrum *incurvum, subulatum.*

* * * Emarginatirostres, *mandibula superiore pone apicem emarginata.*

107. TURDUS. Rostrum *emarginatum, subulatum, basi compressum.*

108. AMPELIS. Rostrum *emarginatum, subulatum, basi depresso.*

111. TANAGRA. Rostrum *emarginatum, subulatum, basi conoidem.*

113. MUSCICAPA. Rostrum *emarginatum, subulatum, basi ciliatum.*

* * * Simplicirostres, *rostro recto integro attenuato.*

116. PARUS. Rostrum *subulatum. Lingua truncata. Capitulum reversum.*

114. MOTACILLA. Rostrum *subulatum. Lingua incisa. Unguis posticus modicus.*

105. ALAUDA. Rostrum *subulatum. Lingua bifida. Unguis posticus elongatus.*

106. STURNUS. Rostrum *subulatum, apice depresso marginato.*

104. COLUMBA. Rostrum *subfornicatum. Nares gibbosae, membrana obliterata.*

I. AC-

I. ACCIPITRES.

Rostrum e mandibula superiore angulum utrinque exserens.

41. VULTUR. *Rostrum rectum, apice aduncum.*

Caput impenne, antice nuda cute.

Lingua bifida.

Collum retractile.

Gryphus. 1. V. maximus, caruncula verticali, longitudine capitis, gula nuda.

Vultur Grypus Gryphus. Klein av. 45.

Cuntur. Laet amer. 401. Raj. av. II.

Condor. Fréz. it. III. Condam. it. 175. Briss. ornith. I. p. 473. n. 12. Buff. ois. I. p. 184. Molin. chil. p. 236.

Condur. Latham syn. of birds. I. I. p. 4.

Habitat in America australi, nidificans ad montes praeeruptissimos sub rupibus prominulis, ova bina alba ponens; famelicus ovibus, hoedis, imo vitulis praedatur, et sunt, qui pueros decennes abripuisse, binas aves vaccam dilacerasse et vorasse tradunt; in terram devolans fusurro attinacit et surdos fere reddit homines.

Avis maxima, femina tameum major, quae crista quoque cervicali, colore fusco, torque nullo a mare differt. Alae maximae, intra quarum extremitates pedes 9-12-13-16; Remex longitudine pedum 2 $\frac{1}{2}$, crassitie sesquipollieis; corpus nigrum, dorso albo; collum torquatum pennis longioribus albis; gula rubens; caput fusca lanugine tectum; oculi nigri, iride spadicea; rostrum nigrum, apice albido. Pedes nigri, unguibus rectiusculis; cauda parva.

bengalensis. 2. V. fuscus, capite colloque anterius denudato dilute castaneo, rostro plumbeo, apice nigro. Latham syn. of birds. I. I. p. 19. n. 16. t. I.

Q 3

Habi-

Vultures voracissimi cadavera porius appetunt, imo putrescentia, vix nisi famelici vivis animalia, audaces, tardius volant, nisi certam altitudinem attigerint, et gregatim; olsadu pollent acutissimo; ex septentrionali Europa et Asia, et, si Auram excepéris, ex boreali quoque Americo exules. Vix distincti specierum varietatumque, imo generis ipsius a sequente limitus.

AC-

*Habitat in regno Bengalensi, 2 pedes cum 6 pollicibus longus.
Caput collumque posterius lanugine fuscâ teclum; pedes
ex atro fusi, unguibus nigris. Ingluvies supra pectus
pendet.*

Papa.

3. V. naribus carunculatis, vertice colloque denudato.

Vultur. *Albt. av. 2. p. 4. t. 4.**Cozequaualtli. Hernand. mex. 319. Raj. av. 361.*King of the Vultures. *Edw. av. 2. t. 2.*Rex vulturum. *Briß. av. 1. p. 470. t. 36.*Roi des vautours. *Buff. hist. natur. des ois. I. p. 169. t. 6.
planch. enlum. 428.*

*Habitat in America australi, insulisque oceanii americanii;
victans serpentibus, lacertis, ratis etc. cadaveribus,
hinc foetens; alte volitat.*

Magnitudo gallopavonis feminae. Caput collique pars su-
perior quasi excoriata; area oculorum nuda, crocea. Vitta
nigricante lanugine ab occidente caput cingit. Corpus e ru-
fescente album. Remiges ex cinerascente nigri. Pedes
cum rostri apice rubri. Cera aurantia, et pone hanc
carunculae dentatae.

Mona-
chus.

4. V. vertice gibbosof, corpore nigro.

Crested black Vulture. *Edv. av. t. 290.*Vultus arabicus. *Briß. av. app. 29.**Habitat in Arabia, melanaëto major.*

Caput cum collo lanugine cinerea teclum; orbita alba; ro-
strum apice nigrum, cera pedesque caerulescentes, ungu-
ibus nigris; humeri pennis laxis cinereis coronati, intra
quas dormiens avis caput retrahit.

Aura.

5. V. fusco-griseus, remigibus nigris, rostro albo.

Tzopilotl s. Aura. *Hernand. mex. 331.*Uruba, Tzopilotl or Aura. *Willoughb. orn. 68.*Uruba Brasiliensis. *Maregr. brasili. 207.*Gallinazo. *Ulloa it. I. p. 60. 201.*Turkey Buzzard. *Catesb. Car. I. p. 6. t. 6.*Carriion crow. *Sloan. jamaic. 2. p. 294. t. 254. Raj. av.
p. 180.*Vultur brasiliensis. *Raj. av. p. 10. Briß. av. I. p. 468.*Vultur pullus, capite implumi, cute crassa rugosa, ultra
aperturas nasales laxata. *Brown. jam. 471.*

Vaca.

Vautour du Brésil. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 175. pl.
enlum. n. 187. *)

Carrion Vulture. *Arch. zool.* II. 191. *Latham syn.* I. I. p. 9.
n. 5.

Jotá. β. *V. niger*, remigibus fuscis, rostro cineraceo. *Molin. hist.*
nat. Chil. p. 235.

Habitat in America, etiam boreali, insulisque adjacentibus,
insulis quoque novi anni.

Privilegio munitus in America cadavera serpentesque vo-
rans, eaque simul cum canibus, quasi germanis fratribus,
summa concordia dilacerans; saepe carnes e culinaturans,
ceterum haud difficulter cicurandus; foetidum stercoris
humani odorem spirat, captusque materiam adhuc foeti-
diorem evomit; noctu gregarie dormit in summis arborum
cacuminibus: Jacquin.

Magnitudo circiter gallopavonis, quamvis varia. Corpus
nigrum e purpureo et viridi micans. Irides ex croceo cae-
rulecentes. Pedes carnei. Caput rufescens.

β. similiter foetidissimus, iners vix nisi lacessitus vocifera-
tur voce muris, nidum inter rupes aut in terra struit ex
foliis pennisque, et ova elidit bina alba, quasi infumata.
Junior totus albus, sensim autem nigrescit, ut tamen ro-
strum, apice excepto, alteat, remiges, pedes et irides
fuscæ sint.

cinereus. 6. *V. fuscō-nigricans*, remigibus et rectricibus in cinereum
vergentibus, pedibus pennis fuscis vestitis. *Briss. ornith.*
I. p. 130. n. 1.

Vultur cinereus. *Raj. syn.* p. 9. n. I.

Vautour ou grand Vautour. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 158.
t. 5. planch. enlum. n. 425.

Cinereous or ash-coloured Vulture. *Will. orn.* p. 66. n. I.
Latham syn. p. 14. n. 8.

Habitat in Europa, frequens in montibus altis, sex pollici-
bus longitudinem tripedalem superans.

Caput, guttus, collique pars superior fuscæ teguntur lanu-
gine; sub gutture prominent penulae longae pilorum ae-
mulac, ut barbam efficiant. Digihi flavi, unguibus ni-
gris. An pernopteri varietas?

Q. 4

8. V.

*) Prodierunt quidem hæc tabulae cura Daubentonii junioris, sed consilio Buffoni,
hinc ejus nomine semper allegatae, quicquidmodum alterum quoque de avibus opus,
quamvis magna ejus pars B. Guénée de Montbeillard debetur.

fusca. 8. *V. fuscus*, remigibus ex fusco nigricantibus, primariis apice albis fusco maculatis, rectricibus ex griseo fuscis, pedibus nudis. *Briss. ornith.* p. 131. n. 2.

Avoltojo Griffone. *Cetti Ucc. di Sard.* 3. G. 3.

Vautour de Malte. *Buff. hist. nat. des oif.* I. p. 161. pl. enlum. n. 427.

Habitat in Europa, potissimum in insula Malta.

Magnitudine inter phasianum colchicum et gallopavonem intermedia. Caput fusa lanugine rectum; cervix pennis angustis; rostrum nigrum; pedes flavescentes, unguibus obscuris. An specie differt a perenoptero?

niger. 9. *V. niger*, remigibus rectricibusque fuscis, pedum pennis nigris. *Briss. ornith.* p. 131. n. 4.

Vultur niger. *Raj. syn.* p. 9. n. 2.

Avoltojo nero. *Cetti Ucc. di Sard.* 9. G. 9.

Swarthy Vulture. *Charl. ex.* p. 71. n. 4.

Black Vulture. *Will. orn.* p. 66. *Latb. syn.* p. 16. n. 10.

Habitat in Aegypto et Sardinia, magnus.

Caput lanugine fusa rectum, colli pars proxima plane nuda, et cum orbitis pedibusque ad digitos usque lanatis alba. Lingua laevis non serrata. Rostrum bipoedicare initio rectum, apice longius uncinato, naribus rotundis 3 lineas diametro aequantibus. An mera varietas perenopteri?

leucocephalos. 10. *V. plumis niveis*, remigibus rectricibusque nigris, torque plumarum albo.

Vultur leucocephalus. *Briss. ornith.* p. 134. n. 9.

Vultur albus. *Raj. syn.* p. 10.

Petit Vautour. *Buff. hist. nat. des oif.* I. p. 164.

Vautour de Norwege. *Buff. pl. enlum.* n. 449.

White Vulture et Cinereous Vulture. *Willoughb. ornith.* p. 67. n. 6. et 66. n. 1.

Habitat in Sardinia et Norwegia, nigro minor, ut vix aliquot pollicibus tres pedes longitudine superet, cauda aliisque medioribus; borealis varietas fere tota nivea, capite colloque tamen impennibus rubicundis, rostro flavo, puncto nigro notato; unguibus nigris; in sarda varietate pennae, rectricibus remigibusque exceptis, ex cinereo, fusco et griseo mistae; caput et finitima pars colli lanugine alba vestita.

Vultures communes quoque in Candia, Cypro, reliquaque Archipelagi et maris mediterranei insulis, paucis speciebus rite definitis; pelles praeparatae ab incolis pectori et ventriculi regioni appositae digestionis promovendae ergo portantur.

*s ap-
i, pe-
l. en-
m in-
ennnis
uibus
ennnis
to.
e nu-
is al-
initio
lineas
ri?
orque
nith.
e ali-
alis-
capite
uncto
unae,
t gri-
a ve-
ftita.
is me-
peditori*

*stata. Squamae digitii medii a primo inde articulo II.
An mera perenopteri aut fulvi potius varietas?*

fulvus. **II.** *V. superne ex griseo rufescens, capite, collo et torque albis, remigibus rectricibusque nigris. Briss. ornith. p. 133. n. 7. Hablitz apud S. G. Gmelin it. IV. p. 179. et Pal-las n. nord. Beytr. IV. p. 58.*

Vultur fulvus baeticus congener. Raj. syn. p. 10. n. 7.

Griffon. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 151.

Vulture. Albin. av. III. p. 1. t. I.

*Fulvous Vulture. Will. orn. p. 67. n. 7. Lath. syn. I. I.
p. 17. n. 11.*

*Habitat in montibus Persiae quoque alpibus sunamisticis, fal-
cone fulvo major; Caput et collum alba lanugine tectum;
rostrum cinereum, basi cute nigra tectum; irides obscure
flavae; colli infima pars multiplici serie pennarum lon-
garum, acutarum, setacearum ex albo rufescientium cinc-
ta; in medio pectoris fovea lanugine alba vestita, et
pennis longis angustis rufescientibus cincta. Pennae sub-
tus basi albae, apice rufae. Pedes plumbi, ultra femo-
ris medium intus lanugine densa alba, extus pennis lon-
gis rufescientibus tecti, unguibus nigris.*

*perenop-
terus.* **7.** *V. remigibus nigris, margine exteriore (praeter extimas)
canis.*

*Vultur (perenopterus) capite nudo, gula plumosa. Hasselq.
it. 209.*

*Falco montanus aegyptiacus. Hasselq. act. Stockh. 1751.
p. 196.*

Vultur aquilina. Alb. av. 2. p. 3. t. 3.

Vulturine Eagle of Aldrovand. Will. orn. p. 64. t. 4.

β. Vultur aegyptius. Briss. p. 131. n. 3.

Vultur facer aegyptius. Aldr. av. I. p. 378. t. 379.

Sacre Egyptien. Belon hist. d'ois. p. 110. t. pag. III.

Sacre d'Egypte. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 167.

*Habitat in Aegypto, Palaestina, Syria, Caramania, Persia.
Purgat Caire terram a cadaverum foetore, stipendiis al-
lectus. Hasselq. Palaestinae agri desererentur ob murium
copiam, nisi haec aves catervatim advolarent. Bellon.
Olim hunc capitale occidere Aegyptiis. Herodot.*

*Mas totus albus. Remigibus atris, margine exteriore ca-
nis, exceptis duobus primis unicoloribus. Femina tota
fusca. Remigibus quatuor extimus concoloribus. Rostrum
atrum cera flava. Hasselq. Nares perpetuo stillant. Raj.
Pedes nudi.*

cristatus. 12. *V. cristatus*, ex rutilo nigricans, pectore magis ad rufum inclinante, pedibus nudis. *Briss. ornith.* p. 132. n. 6.
Vultur leporarius Gesneri. *Raj. syn.* p. 10. n. 4.
Vautour à aigrettes. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 159.
Hare Vulture. *Will. orn.* p. 67. n. 4. *Latham syn.* I. I. p. 17. n. 12.

Habitat in densis et desertis silvis, in arboribus altissimis nidificans, celeriter ingrediens, et tum cursu, tum volatu aves, pisces, leporis, cuniculos, ipsas vulpes et hinnulos persequens. Stans cristam, quasi cornua ex capite prominentia in volante ave non conspicua, erigit.

Alarum apices sex pedum intervallo distant; pedes flavi; ungues et rostrum nigrescunt; cauda longa et recta; antebujus, ant sequentis generis, decidant autoptae.

barbarus. 13. *V. ex atro fuscus, subtus albus in fuscum inclinans, pedibus lanatis, digitis plumbeis, unguibus fulcis.*

Vultur barbatus. *Briss. ornith.* p. 137. n. 13.

Bearded Vulture. *Edw. av.* 106. t. 106. *Lath. syn.* I. I. p. 11. n. 6.

Habitat in Africa, praesertim Barbaria, falconis fulvi magnitudine.

Rostrum ex purpurascente carneum; mandibula inferior fasciculo plumarum nigrarum pendularum barbata; supercilia rubra; irides flavae; capit maxima pars lanugine alba vestita, fronte tamen, genis, et oculorum area nigra; cervix pennis angustis acuminatis, longis, albicanibus testa.

42. FALCO. *Rostrum aduncum, basi cera instruatum. Caput pennis arcte rectum. Lingua bifida.*

* *Femoribus longissimis.*

serpentina. 33. *F. ater occipite cristato, rectricum apice albo, duabus intermediis longissimis.* I. F. Miller ill. of nat. hist. t. XXVIII. A. B.

Sagittarius. *Vosmaer monogr.* t. 8.

Secretaire. *Sonner. it.* p. 87. t. 50.

Messager du Cap de bonne esperance. *Buff. planch. enl.* n. 721.

Secretary or Sagittarius. *Aet. angl.* LXI. p. 175. *Latham synops.* I. I. p. 20. n. 17. t. 2.

Habi-

Habitat in interiori Africa, et insulis Philippinis, gliribus et amphibiis vittans, facile cicurandus.

Femorum longitudine ad grallas accedit, ceteris notis ad hoc genus spectat; altitudo tripedalis; rostrum nigrum aquilae; cera alba; area oculorum nuda aurantia; irides pallide cinereae; cauda rotundata; femora fuscescientia, unguibus brevibus, nigris, uncinatis, non valde acutis. Crista erigi et deprimi potest.

* * *Gypaëti, rostro apice demum adunco, basi setis porrectis barbato.*

Harpyja. 34. F. capite pennis elongatis cristato, subtus varius.
Vultur capite testo pennis elongatis cristato. *Syst. nat. XII.*

I. p. 121. n. 2.

Aquila brasiliensis cristata. Briss. av. I. p. 446.

Aquilae cristatae genus. Raj. av. 161.

Yzquauhtli. Hern. mex. p. 34. Raj. av. p. 161.

Urutaurana. Marcgr. brasili. 203. t. 204. Raj. av. p. 7.

Crested Eagle. Will. orn. p. 63. t. 4.

Crested Vulture. Latham syn. I. I. p. 6. n. 2.

Habitat in nova Hispania et America australi. Fertur unicco iethu cranium hominis findere, quem saepius adoritur; erectus sedet; penitus occipitis saepius erigit in formam coronae.

Magnitudo arietis. Color subtus ex nigro, candido et fulvo mixtus, in collo, dorso, cauda et crista surrecta niger. Oculi membrana nitilitante. Sub ingluvie pennae albæ, quas iratus demittit usque ad pedum digitos. Alæ et cauda subtus albo et nigro punctata, in modum tigridis.

Jacquini. 35. F. pennis capitis elongatis plurimis, pedibus nudis, corpore subtus niveo.

Vultur (coronatus) capite testo pennis elongatis plurimis, pedibus nudis. Jacquin Beytr. zur Gesch. der Voeg. p. 15. n. XI.

Habitat in montibus novae Granadæ, junior cicurandus, Harpyjæ affinis.

Dum erectus sedet, 2½ pedum altitudinem monstrat: Dorsum, alæ, colli maxima pars, et rostrum nigrescunt; caput ex rufescente cinereum coronatum corona concolore pennarum plurium semipedalium fere decumbentium, quas avis irata erigit; cauda longa albida, taeniis transversis nigris. Pedes digitique flavi, unguibus nigris.

36. F.

ambustus. 36. F. pallide fulvus, capistro nudo, cera ampla, pedibus caerulecentibus.

Tawny Vulture. Brown. Illustr. p. 2. t. I. Lath. syn. I. I. p. 19. n. 15.

Habitat in insulis Falkland, 4 pollices ultra 2 pedes longus. Rostrum breve, crassum, obscurum; cera setis hispida; mandibula inferior fasciculo pennarum tenuium longarum barbata; testrices remigum ex pallide fulvo et fuso mixtae; cauda sordide alba, fuso fasciata. Ungues longi, leviter curvati.

angolen- 37. F. albus, cera caerulecente, orbitis carneis et nudis, tec-
tis.

Angola-Vulture. Penn. tour in Wales. p. 228. t. 19. Lath. syn. I. I. p. 18. n. 14.

Habitat in Angola.

Rostrum albicans, longum, parum aduncum; irides stramineae; testrices alarum primariae extimae albo punctatae; caudae apex albus; pedes sordide albi et squamosi.

barbatus. 38. F. albido-rutilus, dorso fuso, taenia nigra supra et infra oculos.

Vultur (barbatus) albidus, dorso fuso, gula barbata, rostro incarnato, capite linea nigra cineto. Syst. natur. XII. I. p. 123. n. 6.

Gypaëtos grandis. Storr Alpenr. I. p. 69.

Perenopterus f. gypaëtos. Aldr. orn. I. p. 216. t. 217. 219. Gesu. av. 199. Will. orn. 33. t. 4. Raj. av. 8. Alb. av. 2. p. 2.

Vultur alpinus. Briss. av. I. p. 464.

Laemmergeyer. Andreeae Brief. aus der Schweiz, p. 195. t. 12.

β . Vultur aureus. Gesu. av. 783. t. 781. Aldrov. av. I. p. 277. t. 276. Briss. ornith. p. 132. n. 5. Hablitz apud Pallas n. nord. Beytr. IV. 64. et S. G. Gmelin it. IV. p. 185.

Vultur bacticus. Aldrov. ornith. I. 273. t. 274. Will. orn. 35. Raj. av. 10.

Vultur fulvus Gesneri. Raj. av. p. 10. n. 5.

Golden vulture. Lathani syn. p. 18. n. 13.

γ . Falco (magnus) cera caerulecente, pedibus et corpore sub-
tus castaneis albo mixtis, cauda cinerea. S. G. Gmelin it.
III. p. 365. t. 38.

Habitat gregibus parvis in alpibus helveticis, rhaeticis, no-
ricis, β et γ perfcisis, Netcher sacrae scripturae ex senten-
tia Oedmanni.

Chry-

Albic

coro-
tus

Chrysaëto major, ut 4 pedes longitudine aequet, et distan-
tia apicis alarum expansarum 9 pollicibus 8 pedes superet.
Rostrum rectangulum unco utrinque bisulco, cinereum,
rubicundo mixtum, ad latera cinctum et subtus munitum
setis rigidis nigris; nares magnae, ovales, similibus setis
teflae. Remiges 28, splendide cinereae; rectrices 12,
medio cinereae. Pedes ad digitos usque hirsuti; unguis
nigri, robusti, minus curvati, quam aquilis.
Nidificat in antris rupium inaccessarum, ova 3-4 ponens;
viicit animalibus alpinis, ut ipsas rupicapras, capras,
agnos praedetur, et ipsi adeo homini dormienti infestus
esse dicatur; neque tamen cadavera ipsa respuit. Habi-
tu externo, gregario volatu, cadaverum appetitu ad vul-
turem, reliquo vietu, capite et collo, audacia ad aqui-
las accedit.

Albicilla. 39. F. cera pedibusque flavis, rectricibus albis: intermediis
apice nigris.

Vultur albicilla. *Syst. nat. XII. I. p. 123. n. 8.* *Fn. succ. 55.*
Briünnich orn. 12.

Aquila Albicilla. *Briff. av. I. p. 427.*
Pygargus, Albicilla, Hirundinaria. *Bell. av. 15.* *Gesn.*
av. 205. *Raj. av. 7. n. 5.*

Grand Pygargue. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 99.* *pl. enlum.*
n. 411.

White-tailed Eagle. *Will. orn. p. 61.*

Cinereous Eagle. *Brit. zool. I. p. 170. t. 18.* *Lath. syn. I. I.*
p. 33. n. 8.

Braunfahler Adler. *Frisch t. 70.*

*Habitat in Europa, praesertim Scotia, et insulis adjacenti-
bus; ferit pisces maximos, iisque viicit auceps.*

*Magnitudo Gallopononis; longitudo 2 pedum cum 9 pollici-
bus; caput et collum pallide cinereum; irides et rostrum
pallide flava; hoc basi elongatum; frons inter oculos et
nares nuda, setulis tantum adspersa, caeruleo-scaena. Cor-
pus et alae cinereae, fusco intermixto. Cauda alba. Pe-
des infra genua lanati, splendide flavi. Ungues nigri.*

* * * *Aquilæ, majores pedibus plerumque hirsutis.*

*corona-
tus.* 1. F. cera ferruginea, pedibus lanatis albis nigro punctatis,
pectore rufo, lateribus nigro fasciatis.

Aquila africana crinita. *Briff. av. I. p. 448.*

Crowned Eagle. *Edw. av. 3. p. 31. t. 224.* *Lath. syn. p. 27.*
n. I.

Habi-

Habitat in Guinea, minor europaeis.

Subtus albus, maculis nigris rotundis; pennae in vertice capitinis longae, ut crista ad instar erigi et deprimi possint; rostrum ferrugineum; irides aurantiae; area oculorum cum fronte albida. Cauda supra obscure cinerea, nigro fasciata; digiti aurantii; unguis nigri.

Che-
riway.

40. F. cera rosea, pedibus flavis, corpore ferrugineo, capite albido, vertice cristato ferrugineo. *Jacquin Beytr. p. 17. n. XII. t. 4.*

Habitat in insula Amba, ad litus Verazuelae sita.

Crista pennis longioribus constans, quas tamen avis non erigere videtur. Orbitae albidae; oculi flavi; rostrum caerulefascens; remiges longissimae nigrescentes. Cauda alis longior, pariter potissimum nigrescens; uropygium album; unguis nigri.

Tharus. 41. F. cera pedibusque luteis, corpore albo-nigrescente, vertice cristato. *Molin. hist. nat. Chil. p. 234.*

Habitat in Chili frequentissimus, nidum in altissimis arboribus ex surculis, lana, pili, plumis struens, ova 5 ponens, viettans cadaveribus, et avibus domesticis.

Magnitudo capi grandioris. Capitis corona ex pennis nigris, quarum exteriores longiores; rostrum albidum. Remiges rectricumque apices nigri. Pedes squamati, unguibus robustis; mas albidus nigro maculatus; femina paulo minor, grisea.

Melanaë- 2. F. cera lutea, pedibusque semilanatis, corpore e ferrugineo nigricante, striis flavis.

Melanaëtos f. aquila valeria. Gefn. av. 203. Aldr. orn. I. p. 197. t. 199. 200. Raj. av. 7. n. 4. Alb. av. 2. p. 2. t. 2. Briff. av. I. p. 434.

Aigle commune. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 86. pl. enlum. n. 409.

Black Eagle. Will. orn. p. 61. sect. 3. t. 2. Latham syn. I. I. p. 28. n. 2.

Habitat in Europa.

Longitudo 2 pedum et 10 pollicum; rostrum ex corneo in caeruleum colorem vergens; irides castaneae; caudae pars exterior alba, nigricantibus maculis, apex nigricans; crura sordide alba; digiti lutei; unguis nigri.

42. F.

Glaucopis.

leucocophalus.

Ossifragus.

Gypæa
ar
or
ve
li
m
in
tu

Glaucous. 42. F. cera et pedibus semilanatis citrinis, dorso et pectore fuscō, capite et cervice ex flavicante albī, fl̄riis fuscis, remigibus nigris. *Merrem Beytr. II. p. 25. t. 7.*

Habitat in monte Dransberg prope Goettingam.

Longitudo 1 pedis, 9 pollicum, 3 linearum; rostrum glaucum; nares maguae, ovatae, pone has setae nigrae; os interius et lingua rosea, haec carnosa margine magis cornuta, apice vix bifida; irides canae, flavo permixtæ; frons lunulis fuscis insignita. Crura brevia, pennis mollioribus testū; pedes antice semilanati; unguibus nigris. Cauda supra ex rubicundo fusca, subtus sordide alba, utrinque taeniis 6 nigris.

leucocephalus. 3. F. cera lutea pedibusque semilanatis, corpore fuscō, capite caudaque albī.

Aquila leucocephalus. Briff. av. I. p. 423.

Pygargue. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 99. pl. enlum. n. 411.

Bald Eagle. Catesb. Carol. I. p. 1. t. 1. Lath. syn. p. 29. n. 3.

White headed Eagle. Arct. zool. II. p. 196. n. 89.

Habitat in Europæ et Americæ silvis acerofis, porcis, agnis, pisibus viellitans, quos posteriores ab baliaeto captos huic auferit; nidus amplius, foetens, in insula Beringii rupibus innixus, ovis duobus.

Longitudo 3 pedum cum 3 pollicibus, pondus librarium 9.

Rostrum luteum; irides, caput, collum, cauda carent; digitæ flavent; unguis nigricant; reliquum corpus chocaladam colore aemulatur.

Ossifraga. 4. F. cera lutea pedibusque semilanatis, corpore ferrugineo, rectricibus latere interiore albī.

Aquila ossifraga. Briff. ornith. I. p. 125. n. 9.

Ossifraga. Gesn. av. 263. Aldr. ornith. I. p. 222. t. 225. 228. Brünn. orn. 13.

Haliaetus l. Ossifraga. Raj. av. p. 7. n. 3.

Orfraye

Gypæti, vultures inter et aquilas quasi medii, cadavera appetunt, et viva venantur animalia; aquilæ et falcones nobiliore habitu cadavera abhorrent; illæ capiunt oves, leporis, scirros, auferes, serpentes, pīces; hi potissimum aves; altissime volant, ut saepē vix videantur; haerent quasi suspensi in aëre; visu excellunt, solitarii degunt, nisi tempore copulæ; jaculi instar cadunt prosequendo prædam; famem diu tolerant; pane ingestæ moriuntur, aetate sexuque variant; paciscuntur inducias cum avibus in primis domesticis, quandiu cuculus cuculat, ut haec feriantur sub nidificatione, incubatione, pullitie. Succus gastricus acidus, acer.

Orfraye on Ossifrage, Grand aigle de mer. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 112. t. 3. pl. enlum. n. 112.* 415.
Sea Eagle or Osprey. *Br. zool. I. p. 167. t. 17. Arct. zool. 2. p. 194. n. 86. Will. orn. p. 59. t. 1. Lath. syn. I. 1. p. 30. n. 4.*

Habitat in Europa et boreali America, in botanica quoque insula, piscibus potissimum viellitans, quos ipse capit. Chrysaëro affinis, pedibus tamen vix infra genua lanatis. Magnitudo Gallopavonis: Pennae basi albae, medio ferrugineae, apice nigrae. Remiges nigricantes; secundariae latere tenuiore albicantes. Rectrices latere interiori albae, rhachi nivea. Tectrices caudae fere albae. Pedes lutei. Femina obscure ferruginea.

Chrysaë. 5. F. cera lutea, pedibusque lanatis luteo-ferrugineis, corpore fusco-ferrugineo vario, cauda nigra basi cinereo-undulata. *Fn. suec. 54.*

Chrysaëtos f. Aquila aurea. *Briff. av. I. p. 431.*

Aquila germana. *Gefn. av. 168.*

Aquila chrysaëtos. *Raj. av. 6. n. 1. Aldr. orn. I. p. III. 114, 115.*

Grand aigle. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 76. pl. enl. n. 410.* Golden Eagle. *Brit. zool. I. p. 161. t. 16. Alb. av. II. t. 1. Will. orn. p. 58. t. 1. Lath. syn. p. 31. n. 5.*

Habitat in Europa et Sibiriae deserto Uralensi, sereno coelo altissima petens, instante tempestate terrae propior.

Pondus 12 librarum, longitudo 3 pedum, latitudo 7 pedum et 4 pollicum. Pedes ad digitos usque pennis testi.

fulvus. 6. F. cera flava, pedibusque lanatis fusco-ferrugineis, dorso fusco, cauda fascia alba.

Aquila. *Briff. av. I. p. 419. Aldr. orn. I. p. 17. Dodart act. 3. p. 89. t. 49.*

Aquila fulva f. Chrysaëtos, cauda annulo albo cincta. *Raj. av. 6. n. 2.*

Aigle commun. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 86. pl. enlum. n. 409.*

Golden Eagle, with a white ring about it's tail. *Will. orn. p. 59.*

Black Eagle. *Brit. zool. I. p. 165. Arct. zool. 2. p. 195. n. 87.*

Ring-tailed Eagle. *Latham syn. I. 1. p. 32. n. 6.*

canaden- 7. F. cera flava pedibusque lanatis, corpore fusco, cauda alba fis. apice fusco. *Syst. nat. X. p. 88.*

White tailed Eagle. *Edw. av. I. t. 1. Voy. budf. 3. p. 54. t. 2. Habi-*

leuco
ster

japon
fis.

Plane

amer
nus

albus

ist. nat.
Et. zool.
m. I. I.
quoque
capit.
lanatis.
ferrugi-
ndariae
ri albae,
es lutei.

corpo-
-undu-

p. III.

n. 410.
II. t. I.

o coelo

pedum

dorso

Dodart

Raj.

enlum.

ill. orn.

i. n. 87.

da alba

54. t. 2.

Habi-

- Habitat in Europa, America et Asia septentrionali in rupibus altissimis nidificans, et docilis, ut variae Tatarorum tribus, Marco Polo jam notante, capiendis leporibus, antilopis, vulpibus, ipsisque lupis adaptent, qui etiam rectrices arcubus suis accommodant.*
- Frons inter oculos et nares nuda. Pectus punctis trigonis maculatum; pedes ad digitos usque pennis hirsuti. *An femina Melanaëti?*
- leucoga- 43. F. albus, dorso, alis, caudaque obscure fuscis, caudae ster. apice albo, pedibus flavis.
White-bellied Eagle. *Lath. syn. I. I. p. 33. n. 7. a.*
Longitudo 2 pedum cum 9 pollicibus. Rostrum amplum, ex fuscescente luteum; unguis nigri.
- japonen- 44. F. cera obscura, pedibus luteis, corpore fuso- sis.
Japoneſe Eagle. *Lath. syn. I. I. p. 33. n. 7. b.*
Habitat in insulis Japan, pedem et 11 pollices longus. Rostrum angustum, basi caeruleum, apice nigricans, subtus flavescens; frons bubali colore; reliqui capitis et corporis pennae fuscae, apice ferrugineæ; gula alba, nigro striata, lunula nigra cincta; pectoris ventrisque pennae margine ex flavicante albo; unguis magni, nigri.
- Plancus. 45. F. cera, area oculorum pedibusque aurantiis, occipitis crista nigra, pectore et corpore supra griseo nigro-undulato, subtus nigro, cauda alba, fasciis transversis nigris.
I. F. Miller Illustr. t. 17. Cook it. II. p. 184. t. 32.
Plaintif Eagle. *Latham syn. I. I. p. 34. n. 9.*
Habitat in terra del Fuogo, 25 pollices longus; alae fuscae; caudae apex, rostrum unguisque nigri.
- america- 46. F. cera pedibusque lanatis luteis, capite, collo et pectore obscure cinereis, genarum fascia transversa, dorso, ventre, alis, caudaque nigris.
Black-cheeked Eagle. *Lath. syn. I. I. p. 35. n. 10. Arct. zool. 2. p. 196. n. 88.*
Habitat in America septentrionali, fulvum magnitudine ae- quans. Rostrum caeruleum.
- albus. 47. F. totus albus.
Aquila alba. *Briff. orn. p. 123. n. 3.*
Aquila alba cygnea. *Klein av. p. 42. n. 7.*
White Eagle. *Charl. onom. p. 63. n. 9. Latham syn. I. I. p. 36. n. 12.*

R

Habi-

- Habitat in alpibus, et Rheni ripis, Chrysaëti magnitudine;*
an mera varietas?
- candidus. 48. F. albus, alarum apice nigro.
 White Eagle. *Arct. zool.* 2. p. 197. *du Pratz Louis.* 2.
 p. 75.
 Louisiane white Eagle. *Lath. syn.* I. I. p. 36. n. 13.
- Habitat in Louisiana, incolis magni aestimata, qui pennis*
eius symbolum pacis exornant, praecedente paulo minor.
- naevius. 49. F. cera pedibusque lanatis luteis, corpore ferrugineo in-
 fra alas albo-maculato.
 Aquila naevia. *Briss. orn.* p. 122. n. 4.
 Petit aigle. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 91.
 Rough-footed Eagle. *Charl. onom.* p. 63. n. 6. *Lath. syn.*
 I. I. p. 37. n. 14.
 Steinadler. *Frisch Vög.* t. 71.
- Habitat in Europa, gliribus praesertim vicitans.*
Magnitudo galli grandis; longitudo 2 pedum cum 7½ polli-
cibus; irides flavae; tectrices caudae secundariae albae;
ungues nigri.
- macula-
 tus. 50. F. cera pedibusque lanatis luteis, corpore supra ferrugi-
 neo, subtus fulso.
 Morphno congener. *Raj. av.* p. 7. n. 7. *Will. orn.* p. 63.
 Spotted Eagle. *Latham syn.* I. I. p. 38. n. 15.
 Longitudo bipedalis. Rostrum magnum et unguis nigri;
 irides cinereae; pennae scapularum et tectrices alarum apti-
 ce macula ovali albicante insignitae, dorsi maculis colo-
 ris bubalini; venter similibus lineis striatus.
- albicau-
 dus. 51. F. cera pedibusque nudis luteis, capite et collo ex cinereo
 in castaneum vergente, corpore supra obscure ferrugineo,
 subtus ferrugineo et nigricante, cauda alba.
 Aquila Albicilla minor. *Briss. ornith.* p. 124. n. 6.
 Petit Pygargue. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 99.
 Pygargus of Aldrovand. *Will. orn.* p. 62.
 Fawn-killing Eagle. *Charl. onom.* p. 63. n. 4.
 Lesser white-tailed Eagle. *Lath. syn.* I. I. p. 39. n. 16.
 Erne. *Gesn. av.* p. 205.
Habitat in Europa.
Magnitudo galli grandis; longitudo 2 pedum et 2 pollicum;
rostrum et irides flavicant; pennarum apices nigricant;
ungues nigri.

52. F.

- gallicus. 52. F. rostro cinereo, pedibus nudis flavicantibus, corpore ex griseo fusco, subtus (mari) albido maculis ruficentefuscis.
- Aquila Pygargus. Briss. orn. p. 127. n. 11.
- Pygargus. Johnst. av. p. 4. t. 2.
- Jean le Blanc. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 124. t. 4. pl. enlum. n. 413. Lath. syn. p. 39. n. 17.
- Habitat in Gallia, rario in reliqua Europa, muribus, ratitis, ranis viellitans, in terra, rarius in arboribus nidificans, 3 uplurimum ova grisea ponens.
- Melanaëto vix minor, 2 pedes et pollicem longus. Irides flavae. Rectrices albae striis transversis fuscis, margine et apice fuscae. Ungues cinerei.
- australis. 53. F. fuscus, cera flava, cauda nigra, apice punctis sordide albicantibus.
- Statenland Eagle. Latham syn. I. I. p. 40. n. 19.
- Habitat in Statenland; vox gallinae; magnitudo et longitudo Flanci. Forster.
- niger. 54. F. cera pedibusque lanatis luteis, capite, cervice, ventre et testicibus alarum ferrugineis, gula, pectore, dorso remigibusque nigris.
- Black-backed Eagle. Brown. Ill. p. 4. t. 2. Latham syn. p. 42. n. 22.
- Magnitudo Chrysaëti; rostrum et unguis nigri; cauda basi ad medium usque alba; reliqua parte dimidio nigra.
- leucoryphos. 55. F. cera ex livido cinerea, pedibus pallide albicantibus semilanatis, corpore subalbuloso fusco, verticis macula trigona et gula albis.
- Aquila leucorypha. Pallas it. I. p. 454.
- White-crowned Eagle. Lath. syn. I. I. p. 42. n. 23.
- Habitat in australioribus ripis fluvii Ural, balaëto vix major, habituque simili. Lingua rotundata integra. Irides ex fusco griseae, alae obsolete nigrae, remigibus interius albis; cauda longiuscula, rigida, aequalis; unguis maximus, nigri.
- Mogilnik. 56. F. cera lutea, pedibus lanatis et reliquo corpore obscure ferrugineis, dorso albo admisto.
- Aquila Mogilnik. S. G. Gmelin Nov. comm. Petrop. XV. p. 445. t. XI. b.
- Russian Eagle. Lath. syn. I. I. p. 43. n. 24.

R 2

Habi-

aegyp
tius.

Habitat in desertis ad Tanain sitis, fulvo minor, 2 pedes et 3 pollices longus, muribus et aviculis vicitans. Rostrum, pupilla, unguis, remiges nigra; palpebrae paleae caeruleae; irides turidae; cauda aequalis; rectrices nigrae, fasciis obsolete griseis, apice rufae.

cristatus. 57. F. capite cristato, dorso, gula alisque nigris, ventre albo, cauda fasciis 4 cinereis parallelis.

Crested Falcon. *Dillon it. per Hisp.* p. 80. t. 3.

Caracca Falcon. *Latham syn.* I. 1. p. 81. n. 64.

Magnitudo *Gallopavonis*; mandibula inferior potius recta.

lagopus. 58. F. cera pedumque lanatorum digitis nudis luteis, corpore nigro albo-maculato, rectricibus albis, versus apicem nigris. *Brünnich orn. bor.* p. 4.

Falco norwegicus. *Leemius de Lapp.* p. 236.

Graa falk. *Act. nidros.* IV. p. 417. t. 13.

Rough-legged Falcon. *Brit. zool. app.* t. 1. *Arct. zool.* 2. p. 200. n. 92. *Lath. syn.* I. 1. p. 75. n. 54.

Habitat in Europa Americaque septentrionali; 2 pedes 2 que pollices longus. Caput, collum et pectus ex flavieante alba, striis paucim oblongis, fuscis.

ferox. 59. F. cera viridi, corpore supra fusco, dorso, abdomine et uropygio niveo, maculis castaneis vario, rectricibus aequalibus fuscis, fasciis quatuor obsolete. *S. G. Gmelin nov. Comm. Petr.* XV. p. 442. t. X.

Fierce Eagle. *Lath. syn.* I. 1. p. 33. n. 7.

Habitat Africanae, rapacissimus, nec ipsa cadavera respiciens.

Longitudo 2 pedum, et 1 pollicis; rostrum ex plumbeo nigrum; palpebrae caeruleae; irides flavae; caput et collum ferruginea, admixto albido; remiges 26 nigrae, subtus candidae, versus apicem griseae; rectrices 12 aequales, subtus albae; unguis acutus.

maritimus. 60. F. cera pedibusque flavis, corpore caudaeque apice albo, cruribus colore ex rubicundo et albo mixto. v. *Wurmbs apud Lichtenberg Magazin für das Neueste aus der Phys.* IV. 2. 6.

Habitat in Javae maritimis, cadaveribus piscibusque vicitans, 4 pedes cum 2 pollicibus longus, 1 pedem, 5 pollices altus; rostrum flavum.

61. F.

- 2 pedes
ae pal-
ectrices
tre al-
recta.
corpore
apicem
ool. 2.
es 2 que
vieante
nine et
bus ac-
Gmelin
era re-
beo ni-
collum
subtus
quales,
e albo,
Wurm-
r Phys.
e victi-
5 pollir
- aegyp-
tius. -
- Milvus.
61. F. cera pedibusque semilanatis flavis supra cinereus subtus ferrugineus; alis supra fusca, cauda forficata, fusco fasciata, longitudine corporis.
Habitat in Aegypto, hieme frequens, cubitum longus.
Rostrum flavum; remiges versus apicem nigrae; alae subtus ex griseo fuscae; cauda longitudine corporis, cinerea; unguis nigri.
12. F. cera flava, cauda forficata, corpore ferrugineo, capite albidiore. *Fn. succ. 57.*
Milvus regalis. Briss. av. I. p. 414. t. 33.
Milvus. Gesn. av. 610. Aldrov. orn. 392. t. 368. Raj. av. 17. Günther Nest. u. Eyer. t. 25.
Milan royal. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 197. t. 7. pl. enlum. n. 422.
Kite or Glead. Brit. zool. n. 53. Will. orn. p. 74. t. 6. Albin. av. I. p. 4. t. 4. Hayes brit. birds t. 5. Lath. syn. I. I. p. 61. n. 43.
Hünergeyer. v. Wurmb apud Lichtenberg neutstes aus der Physik und Naturgeschichte, IV. 2. p. 6.
β. Milvus vertice et gula castaneis. *S. G. Gmelin it. I. p. 147.*
γ. Accipiter Korschun. *S. G. Gmelin nov. comm. Petrop. XV. p. 444. t. II. a.*
δ. Milvus jaicensis, testricibus dorsi violaceis, pennarum singularum apice fligmate albo notato. *Lepechin it. II. p. 180. t. 2.*
Habitat in Europa, Asia, Africa, quisquiliis vorans et pullos gallinaceos; pacatissime volans, tempestates praesagit, supra nubes volitans serenitatem aeris, clamore pluvias; ponit ova terna subrotunda albida, maculis sordide luteis varia; migrat trans pontum euxinum in Asiam; ultimo Aprilis die per 14 dies tot pontum euxinum praetervolantes vidit, ut homines numero superarent, Bellonius it. 108.
Longitudo bipedalis, γ) in desertis ad Tanain obvii, 21½ modo pollicum, δ) 1 pedis et 10 pollicum; irides flavac; cauda 12 pollicum; unguis nigri; crura pennis testa; pulmones pulchri. γ) rostrum ex plumbeo nigrum, ceras color in virorem vergens; area oculorum alba; capitulum latera dilute fusca; caput reliquum cum gula et jugulo eleganter castaneum; remiges rectricesque nigrae apice vinaceae. δ) ad fluvium Ural obvii peniae apice albae, remiges striis maculisque alternis albis et cerasini coloris notatae, a medio ad apicem ex nigro in viridem aut ceruleum colorem vergentes; rectrices apice striis 2 angustis flava et alba.

R 3

62. F.

- ater. 62. F. cera pedibusque flavis, supra ex fusco niger, capite et subtus albido, cauda forficata.
Milvus niger. Briss. ornith. p. 117. n. 34.
Milan noir. Buffon hist. nat. des ois. I. p. 203. pl. enlum. n. 472.
 Black Gled. Sibb. Scot. ill. II. 3. p. 15.
 Black kite. Lath. syn. I. 1. p. 62. n. 44.
 Eraunermaldgeyer. Kramer elench. p. 326. n. 5.
Habitat in Europa, milvo minor; cauda parum forficata; crura gracilia; unguis nigri.
- austria- 63. F. cera pedibusque semilanatis flavis, corpore supra castaneo, subtus testaceo fusco maculato, cauda forficata.
 austri- Austrian Kite. Lath. synopf. I. 1. p. 62. n. 45.
 austri- Brauner Geyer. Kramer elench. 327. n. 6.
Habitat in Austriae silvis, avibus viettans et vespertilio-
nibus.
Magnitudo circiter milvi; rostrum flavum puncto nigro; oris anguli flavi; irides et unguis nigri; palatum caeruleum; frons et gula albida fusco-maculata; caput, pectus et alae castaneae; cauda parva, fasciis nigricantibus, pennis apice albis.
- brasiliens- 64. F. pedibus flavis, corpore rufo, punctis albis et flavis vario, cauda ex albo et fusco varia.
Circus brasiliensis. Briss. ornith. p. 116. n. 31.
Milvus brasiliensis. Raj. av. p. 17. n. 6.
Caracara. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 222.
 Brasilian Kite. Will. orn. p. 76. n. 9. Latham syn. p. 63. n. 47.
Habitat in Brasilia, gallinis infestus.
Magnitudo milvi; rostrum et unguis longi acutissimi nigricant; oculi cum iridibus flavent; pectus et abdomen non-nunquam carent; cauda 9 pollices longa.
- furcatus. 25. F. cera obscura, pedibus flavescensibus, corpore supra fusco subtus albido, cauda forficata longissima.
Milvus carolinensis. Briss. ornith. p. 118. n. 36.
Falco peruvianus, cauda furcata. Klein av. p. 51. n. 14.
Hirundo maxima peruviana, avis praedatoris calcaribus instrueta. Feuill. it. 2. p. 33.
Milan de la Caroline. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 221.
Swallow-tailed Hawk. Catesb. carol. I. p. 4. t. 4.
Swallow-tailed Falcon. Arct. zool. p. 210. n. 108. t. X.
Lath. syn. p. 60. n. 42.

Forsk
lii.Halia
tos.arun
ceu
carol
nenfcay
neal

Habi

Habitat in Carolina et Peru, viellans lacertis, serpentibus, insectis, quae volando potissimum caput; milvo minor, tamen bipedalis.

Rostrum basi setis circumseptum; irides rubrae; caput collumque nivea; dorsum splendore purpureo et viridi.

Forskah. 121. F. cera pedibusque semilanatis flavis, supra cinereus subtus ferrugineus, alis supra fuscis, cauda forcicata fuscocasciata longitudine corporis. *Forsk. Fn. arab. p. I.*
Habitat in Aegypto, hieme frequens, cubitalis.

Haliaëtos. 26. F. cera pedibusque caeruleis, corpore supra fusco, subtus albo, capite albido. *Fn. suec. 63.*
Haliaëtos s. aquila marina. *Briff. ornith. p. 126. n. 10.*
Haliaëtos. *Aldrov. orn. I. p. 188. 190.*
Morphuus. *Aldrov. orn. I. p. 211. Raj. av. p. 7. n. 6.*
Balbuzard. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 103. t. 2. planch. enl. n. 414.*
Bald Buzzard. *Will. orn. p. 69. t. 6.*
Fisk Gjoc. *Leenus 234.*
Osprey. *Brit. zool. I. n. 46. Arct. zool. 2. p. 199. n. 91.*
Lath. syn. I. I. p. 45. n. 26.

arundina- β. F. cera cinerea, pedibus pallidis, corpore supra griseo infra albido, cauda aequali. *S. G. Gmelin it. II. p. 163.*

caroli- γ. F. cauda fusca concolore, vertice nigro, aut fusco albo variegato, ventre albo.
nenensis. Falco piscator Antillarum et carolinensis. *Briff. orn. p. 105.*
n. 14. et 15.
Piscator. *Raj. av. p. 19. n. 2.*
Faucon pecheur de la Caroline. *Buff. hist. nat. des ois. I.*
p. 142.
Fishing Hawk. *Catesb. Carol. I. t. 2.*

cayen- δ. F. corpore ex ferrugineo fusco, linea alba a mandibula superiore per utrumque oculum ad occiput similiter album ducta. *Lath. syn. I. I. p. 47. n. 26. B.*
neensis. Habitat in Europa, America et Sibiria, in insula quoque maris pacifici Isle of Pines, inter arundines degens et nigrificans, viellans anatibus et piscibus, potissimum majoribus, quos capiendo submergit.

Longitudo circiter 11 pollicum ultra pedem. Area fusca descendit ab utroque oculo per latera collis ad alas.

- Antilla-ruum. 65. F. fuscus, vertice nigro, ventre albo.
Falco Antillarum. *Bris. ornib. p. 104. n. 13.*
Mans fenny. *Raj. av. p. 19. n. 1. du Tartre hist. des an-*
till. 2. p. 252. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 144. Lath.
syn. I. 1. p. 47. n. 27.
Habitat in Antillis; habitu et pennis ad aquilas spectat, fal-
conibus tamen vix major; avibus et amphibitis vicitans.
Pedes et unguis duplo maiores et validiores, quam fal-
conibus.
- finensis. 66. F. cera pedibusque luteis, corpore supra fusco, subtus fla-
- pond
riani
- vicante.
Chinese Eagle. *Lath. syn. I. 1. p. 35. n. 11. t. 3.*
Habitat in India.
Rostrum unguisque magni nigri; irides fuscae; vertex ob-
scurus; alarum taenia media valde obscura.
- * * * * Falcones, minores, pedibus nudis.
- orienta-lis. 67. F. pedibus plumbeis, stria superciliari ferruginea, capite
et corpore supra obscure fusco, subtus ex ferrugineo fu-
- aequ
Gial
- scico, cauda albo-maculata.
Oriental Hawk. *Lath. syn. I. 1. p. 32. n. 7. c.*
Habitat in Japonia; 17 pollices longus; rostro amplio unguis-
busque nigris; mandibula inferior lutea; caput magis ob-
scurum reliquo corpore; pennae stria media nigra; testri-
ces alarum secundariae albo maculatae; cauda 8 pollices
longa.
- indicus. 68. F. cera pedibusque luteis fronte et uropygio albis, cor-
- Butc
- porre supra ex rufescente, ventre ex ferrugineo fusco albi-
- do striato, cauda fusca, fasciis quinque nigris.
Javan Hawk. *Lath. syn. I. 1. p. 32. n. 7. d.*
Habitat in Java, 17 pollices longus.
Rostrum basi flavum, apice nigrum; testrices alarum infe-
riores sordide ex rufescente albæ, ferrugineo undulatae;
remiges striis transversis apicibusque nigris; testrices
caudæ albo-punctatae. Gula et pectus ex rufescente fus-
cae. Ungues nigri.
- novae Hollan- diae. 69. F. albus, cera pedibusque luteis, ungue posteriore ante-
- rioribus duplo longiore.
New-Holland white Eagle. *Lath. syn. I. 1. p. 40. n. 18.*
Habitat in nova Hollandia, 20 pollices longus; orbitis fla-
vis. Forster.

70. F.

- Urubitinga. 70. F. cera pedibusque flavis, corpore fusco, alis nigricantibus cinereo militis, cauda alba apice nigra albo punctata. Aquila brasiliensis. Briss. orn. p. 128. n. 12.
 Urubitinga. Will. orn. p. 64. Raj. av. p. 8. n. 9. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 141.
 Brasiliian Eagle. Latham syn. I. I. p. 41. n. 20.
Habitat in Brasilia, anseris semestris magnitudine. Rostrum crassum, nigrum; oculi magni.
- pondice- 71. F. cera caerulecente, pedibus luteis, corpore castaneo, rianus, capite, collo et pectore albis, linea longitudinali pennarum media fusca. Aquila ponticeriana. Briss. orn. p. 129. n. 15.
 Aigle de Pondichery. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 136. pl. enlum. n. 416.
 Pondichary-Eagle. Lath. syn. I. I. p. 41. n. 21.
Habitat in India, incolis facer, pedem cum 7 pollicibus longus.
Rostrum cinereum, apice flavum; remiges sex priores parte media exteriori nigricantes; unguis nigri.
- æquino- 72. F. pedibus luteis, capite, collo dorsoque ex atro fuscis, tialis. pectore rufo, alarum teætricibus et humeris colore succuladæ, cauda nigra, rectricibus, exceptis duabus intermediis, signo albo V notatis. Aequinoctial Eagle. Latham syn. I. I. p. 43. n. 25.
Habitat in Cayenna, 21 pollices longus; rostrum unguisque pallidi, illius apex niger.
- Buteo. 73. F. cera pedibusque luteis, corpore fusco, abdomine pallido, maculis fuscis. Fn. succ. 60. Scop. ann. I. p. 15. n. 4.
 Buteo vulgaris. Gesn. av. 46. Aldr. orn. I. p. 369. 370. Raj. av. p. 16.
 Buteo. Briss. orn. p. 116. n. 32.
 Buteo. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 206. t. 8. pl. enlum. n. 419.
 Buzzard. Brit. zool. I. p. 188. n. 54. t. 25. Arct. zool. 2. p. 207. n. 3.
 Common Buzzard. Will. orn. p. 70. Alb. av. I. t. I. Latham syn. I. I. p. 48. n. 28.
Habitat in Europa, avibus, reptilibus, mammalibus ministris, insectis vicitans; 8 pollicibus pedem longitudine superans, colore varius; rostrum plumbeum; irides obscurae; unguis nigri.

- gallina- 73. F. cera pedibusque flavis, corpore supra fusco, subtus ru-
rius. fo maculis ovalibus fusciis, cauda fusca fasciata.
Circus major, gros Buzzard. *Briss. ornith.* p. 114. n. 28.
Hünerhabicht, Hünergeyer. *Frisch. av.* t. 72.
- naevius. 74. Falco minor, alis magis variegatis. *Briss. ornith.* p. 116.
n. 28. A.
*Habitat in Europa, 8-11 pollicibus pedem longitudine su-
perans: Rostrum unguisque nigri; irides croceae.*
- jamai- 74. F. cera pedibusque luteis, corpore ex fuscescente bubali-
censis. no, subtus pallidiore maculato, vertice obsoleto.
Cream-coloured Buzzard. *Lath. syn.* I. I. p. 49. n. 30.
Habitat, rarer tamen in Jamaica, speciosa avis.
Rostrum unguisque nigri; irides flavae; dorsi pennae et
rectrices rachi medioque fuscae; pedes breves.
- borealis. 75. F. cera pedibusque pallide flavis, corpore supra fusco,
subtus albo, cauda obsoleta ferruginea versus apicem stria
transversa nigra.
American Buzzard. *Lath. syn.* I. I. p. 50. n. 31.
Red-tailed Falcon. *Arct. zool.* 2. p. 205. n. 100.
*Habitat in America boreali, potissimum Carolina, buteoni
aequalis.*
Rostrum unguisque nigri; gula alba fusco admixta; jugu-
lum et pectus dorso pallidiora; uropygium album.
- Leveria- 76. F. pedibus flavis, capite fusco et albo alternatim striato,
nus. corpore supra fusco, subtus albo, alis obscure fuscis.
Leverian Falcon. *Arct. zool.* 2. p. 206. n. 101.
Habitat in Carolina, buteoni aequalis.
Rostrum obscurum; pennae apice macula insigni alba noto-
tae; rectrices taeniis 9 albis, et totidem obscuris, mediae
obscuris et cinereis.
- rufus. 77. F. pedibus flavis, corpore rufo, supra in fuscum vergen-
te, cauda cinerea.
Circus rufus. *Briss. orn.* p. 115. n. 30.
Harpag. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 217. pl. enl. n. 460.
Harpy. *Lath. syn.* I. I. p. 51. n. 32.
Fischgeyer, Brandgeyer. *Frisch. av.* t. 78.
*Habitat in Galliae et Germaniae humilioribus, praesertim
fluviorum ripis, pisces vivos ex aqua praedans.*
Longitudo pedis et 8 pollicum; unguis rostrumque nigri-
cant; irides croceae.

78. F.

- btus ru-
28.
p. 116.
dine fu-
bubali-
30.
nnae et
fusco,
em stria
buteoni
jugu-
striato,
cis.
a notor
mediae
tergen-
460.
sertim
nigri-
78. F.
- variega-
tus.
78. F. pedibus flavis, capite colloque albidis ferrugineo - ma-
culatis, corpore supra fuscō, subtus albo, cauda obscure
fuscā striis obsoletis decussantibus.
Speckled Buzzard. *Lath. syn. I. 1. p. 97. n. 83.*
Habitat in America boreali.
Habitus *buteonis*; longitudo 12 pollices excedens; rostrum
obscurum; unguis nigri; an vere differt a sequente?
- albidus. 79. F. pedibus flavis, corpore albo maculis magnis fuscis, cau-
da obscura striis punctisque albis.
Buzzardet. *Arct. zool. 2. p. 211. n. 109.*
Habitus *buteonis*, cruribus tamen longioribus. Longitudo
15 pollicum; maculae subtus rariores; tectrices minores
fuscæ.
- apivorus. 28. F. cera nigra, pedibus seminudis flavis, capite cinereo,
caudae falcia cinerea apice albo. *Fn. suec. 65.*
Buteo apivorus. *Raj. av. 16. Briss. av. I. p. 410.*
Bondrée. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 208. pl. enlum. n. 420.*
Honey Buzzard. *Brit. zool. I. n. 26. Will. orn. p. 72.*
t. 3. *Albin. av. I. p. 2. t. 2. Lath. syn. I. 1. p. 52. n. 33.*
Habitat in Europa, viettans muribus, aviculis, reptilibus,
insectis, praesertim apibus.
- aerugi-
nolus. 29. F. cera virescente, corpore griseo, vertice, gula, axillis
pedibusque luteis. *Fn. suec. 66.*
Circus palustris. *Briss. ornith. p. 115. n. 29.*
Circus. *Gefn. av. 49. Aldrov. orn. I. p. 351.*
Milvus aeruginosus. *Aldrov. orn. I. p. 395. Raj. av. 17.*
Nozeman niederl. *Vogel, t. 8. 9.*
Busard. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 218. t. 10. pl. enlum.*
n. 424.
Moor Buzzard. *Brit. zool. I. n. 57. t. 27. Will. orn. p. 75.*
t. 7. *Lath. syn. I. 1. p. 53. n. 34.*
*Habitat in Europa in paludibus nidificans, avibus aquati-
cis, piscibus, cuniculis viettans.*
- javani-
eus. 80. F. cera nigra, medio lutea, pedibus luteis, capite, collo
et pectore castaneis dorso fuscō. v. *Wurmb apud Lieb-
tenberg Magaz. IV. 2. 8.*
Habitat in maritimis Javae, piscibus viettans.
- cinereus. 81. F. cera pedibusque caerulecentibus, linea supraoculari al-
ba fusco - maculata, corpore supra ex cinereo - fuscō albi-
do admisto.

Falco

Falco freti Hudsonis. *Briff. orn.* p. 103. n. 10.

Faucon de la Baye d'Hudson. *Buff. hist. nat. des ois.* I.

p. 223.

Ashcoloured Buzzard. *Edw. av.* t. 53. *Latham syn.* I. 1.

p. 55. n. 35.

Habitat in freto Hudsonis, tetraonibus vicitans.

Magnitudo gallinae mediocris; cauda supra ex cinereo fusca,
taeniis transversis griseis, subtus cinerea, taeniis albis.

Irides flavae. An mera buteonis varietas?

lineatus. 82. F. cera pedibusque flavis, corpore supra obscurae fusco,
subtus rufo lineis albis et pallide ferrugineis, rectricibus
obscurae fuscis, apice striisque duabus transversis sordide
albis.

Barred-breasted Buzzard. *Latham syn.* I. 1. p. 56. n. 36.

Red-shouldered Falcon. *Arct. zool.* 2. p. 206. n. 102.

Habitat in insula Longa, 20-22 pollices longus.

Rostrum caeruleum; unguis nigri; caput et collum ex fla-
vicante alba, lineis obscuris striata.

obsole-
tus. 83. F. corpore obscurae fusco, subtus leviter albo-maculatis,
rectricibus mediis obsolete fuscis.

Plain Falcon. *Arct. zool.* 2. p. 208. n. 104.

Habitat in freto Hudsonis, bipedalis; rostrum nigrum.

rustico-
lus. 7. F. cera, palpebris, pedibusque luteis, corpore cinereo al-
boque undulato, collari albo. *Fn. suec.* 56.

Collared Falcon. *Arct. zool.* 2. p. 222. G. *Lath. syn.* I. 1.
p. 56. n. 37.

*Habitat in Suecia, Sibiria, Groenlandia, gallinae magni-
tudine.*

Rostrum plumbeum; corpus subtus album, maculis exiguis
cordatis fuscis; cauda taeniis 12-13 alternatim albis et
fuscis; unguis nigri.

novae
Seelan-
diac. 84. F. cera pedibusque luteis, corpore ex atro fusco, subtus
rufo-maculato, cauda aliquo griseo-maculatis.

New-Zealand Falcon. *Lath. syn.* I. 1. p. 57. n. 38. t. 4.

*Habitat in nova Seelandia, vultur affinis, 18 pollices, fe-
mina 23 pollices longa; rostrum caeruleum, apice nigrum;
irides nudaque orbitae caeruleae, feminae flavae; huic
collum et abdomen lineis albidis, cauda taeniis transver-
sis albis notata.*

30. F.

- palumba- 30. F. cera nigra, margine pedibusque flavis, corpore fusco,
rius. rectricibus fasciis pallidis, superciliis albis. Fn. suec. 67.
Accipiter palumbarius. Gefn. av. 51. Aldr. orn. I. p. 342.
t. 343. Raj. av. 18. n. I.
Asterias. Aldr. orn. I. p. 336. t. 340. 341.
Astur. Briss. orn. p. 91. n. 3.
Autour. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 230. t. 12. pl. enlum.
n. 418. 461.
Goshawk. Brit. zool. I. n. 52. Arct. zool. 2. p. 204. n. 99.
Albin. av. 2. p. 8. t. 8. Will. orn. p. 85. t. 3. 5. Lath.
syn. I. I. p. 58. n. 39.
Großer gesperberter Falk, großer gepfeilter Falk. Frisch.
av. t. 82. (mas.) Falck it. III. t. 21.
*Habitat in Europa, Calmuccia, America boreali, gallinis
infestus, et ad venatum volucrum adaptandus; 10 polli-
cibus et ultra pedem longitudine excedens.*
Rostrum caeruleum, apice nigrum; irides flavae; caput fu-
cum; corpus subtus totum album nigro-undulatum;
cauda cinerea longa, apice alba; unguis nigri.
- cayen- 85. F. pedibus caeruleis, capite et collo ex caerulecente al-
nensis. bis, dorso aliquo obscurae cinereis, jugulo, pectore et
abdomine albicantibus.
Cayenne Falcon. Lath. syn. I. I. p. 59. n. 40.
Habitat in Cayenna.
Rostrum caeruleum; unguis et remiges primariae nigrae,
secundariae nigro-lineatae; caudae apex albus, taeniae
4 - 5 alternatim albae et nigrae.
- macrou- 85. F. cera pedibusque luteis, rostro nigricante, corpore su-
rus. pra cinereo subtus albo, remigibus interioribus cinereis
apice albis. S. G. Gmelin it. I. p. 48. nov. comm. Petrop.
XV. p. 439. t. 8. 9. Lepechin it. I. p. 260.
Long-tailed Falcon. Lath. syn. I. I. p. 59. n. 41.
*Habitat in Russia lanarii magnitudine, 7 pollicibus pedem
longitudine superans; cauda fere 9 pollicum; rostrum ni-
grum, basi viride.*

13. F.

Falconaria ars, scilicet ars falcones columba et lanio capiendi, ad anciupium et ven-
tum antiloparum, ardearum, avicularum, etc. instituendi, tataris nonnullis gen-
tibus familiaris, in Europa propriis artificibus commissa, in luxuriam magnatum,
transit in scientiam; omnes fere falcones possunt ita instrui; v. d' Espanon Fal-
conaria. Francof. 1617. 4.

gentilis. 13. F. cera pedibusque flavis, corpore cinereo maculis fuscis, cauda fasciis quatuor nigricantibus. *Fn. suec.* 58. *Scop. ann.* I. p. 15.

Falco gentilis. Gesn. av. 71. Aldr. orn. I. p. 481. Raj. av. 13. Briff. av. I. p. 339.

Gentle Falcon. *Brit. zool. n. 50. t. 21. 22. Arct. zool. 2. p. 203. n. 98. Albin. av. 2. p. 4 t. 6. Will. orn. 46. Lath. syn. I. I. p. 64. n. 48.*

Habitat in alpibus Europacis, America boreali, ad Volgam, viicitans tetraonibus, palumbario major; rostrum plumbeum; irides flavae; caput subferrugineum, maculis oblongis nigris; cauda albo punctata; ungues nigri.

commu- 86. F. fuscus, pennarum margine rufo, cauda taeniis trans-
nis. veris saturatoribus, rostro ex cinereo caerulecente, cera, iridibus pedibusque luteis.

Falco. Briff. orn. p. 92. n. 4.

Faucon. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 249.*

Schwarzbrauner Falk. *Frisch. av. t. 74.*

hornoti- β. F. in cinereum vergens. *Briff. orn. p. 93. n. 4. A.*
nus. Faucon fors. *Buff. hist. nat. des ois. I. t. 15. pl. entum.*
n. 470.

Gearling Falcon. *Lath. syn. I. I. p. 65. n. 49. A.*

Annuus falco.

gibbosus. γ. F. gibbosus. *Raj. av. p. 14. n. 6. Briff. orn. p. 93. n. 4. B.*
Faucon haggard ou bossu. *Buff. hist. nat. des ois. I. t. 16.*
pl. entum. n. 471.

Haggard Falcon. *Will. orn. p. 80. Latham syn. I. I. p. 66.*
n. 49. B.

Senex avis.

leucoce- δ. Falco. *Briff. orn. p. 93. n. 4. C.*
phalus. White-headed Falcon. *Lath. syn. I. I. p. 66. n. 49. C.*
Rauh-fuis geyer; gelbbrauner Geyer. *Frisch. av. t. 75.*

albus. ε. F. albus. *Raj. av. p. 14. n. 7. Briff. orn. p. 94. n. 4. D.*
White Falcon. *Will. orn. p. 80. n. 7. Lath. syn. I. I. p. 66.*
n. 49. D.

Weifser Falk, weisser Geyer. *Frisch. av. t. 80.*

ater. ζ. F. niger. *Briff. orn. p. 94. n. 4. E.*
Falco columbarius Nebbi dictus. *Raj. av. p. 161.*
Faucon passager. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 263. pl. entum.*
n. 469.

Black hawk or Falcon. *Edw. av. I. t. 4.*

Black

- fusca,
Scop.
Raj.
ool. 2.
n. 46.
olgam,
plum-
dis ob-
trans-
, cera,
enlum.
n. 4. B.
t. 16.
. p. 66.
C.
75.
t. D.
. p. 66.
enlum.
Black
- naevius. η . F. maculatus. *Briff. orn.* p. 95. n. 4. F.
Spotted Falcon. *Edw. av.* I. t. 3.
Spotted-winged Falcon. *Lath. syn.* I. I. p. 68. n. 49. F.
- fuscus. δ . F. corpore supra fusco maculis obscurioribus, subtus albo
maculis fuscis.
Falco fuscus. *Briff. orn.* p. 95. n. 4. G.
Brown Falcon. *Lath. syn.* I. I. p. 68. n. 49. G.
Braunfahler Geyer. *Friscb. av.* t. 76.
- ruber. ι . F. maculis nigris et rubris. *Briff. orn.* p. 96. n. 4. H.
Falco rubens. *Raj. av.* p. 14. n. 10.
Red Falcon. *Will. orn.* p. 81. n. 10. *Lath. syn.* I. I. p. 69.
n. 49. H.
- indicus. κ . F. corpore subtus ex rubescente fulvo.
Falco ruber indicus. *Briff. orn.* p. 96. n. 4. I.
Falcones rubri indici Aldrovandi. *Raj. av.* p. 14. n. 11.
Will. orn. p. 81. n. 9.
Red Indian Falcon. *Lath. syn.* I. I. p. 69. n. 49. I.
- italicus. λ . F. pectore luteo, maculis ferrugineis, alis versus apicem
albo-maculatis.
Falco italicus. *Zonst. av.* p. 19. *Briff. orn.* p. 97. n. 4. K.
Italian Falcon. *Lath. syn.* I. I. p. 70. n. 49. K.
- arcticus. μ . F. islandus. *Briff. orn.* p. 97. n. 4. L.
Arctic Falcon. *Lath. syn.* I. I. p. 70. n. 49. L.
Habitat in Europa, ϵ) eriam in Sina, η) in fredo Hudsonis,
 π) in India, venatui aptissimus.
- islandus. β . F. cera pedibusque flavis, corpore fusco, subtus albo ma-
culis cordatis nigris, cauda albo fasciata. *Brünn. orn. bor.*
p. 2. n. 9.
- albus. β . F. albus, supra maculis exiguis cordatis nigris, caudae al-
bae rectricibus duabus intermediis obsolete nigro fasciatis.
Brünn. orn. bor. p. 2. n. 7.
- macula-
tus. γ . F. albus, maculis cordatis magnis, rectricibus albis, singu-
lis nigro-fasciatis. *Brünn. orn. bor.* p. 2. n. 8.
Habitat in Islandia, ϑ pollicibus pedem longitudine excedens;
caput album, ferrugineo admisso; dorsum obscurum sin-
gulis pennis albidis, fusco-fasciatis, et albo marginatis;
cauda rotundata, fasciis circiter 14 alternis fuscis et al-
bis; unguis nigri, posterior praelongus.

S. F.

barbarus. 8. F. cera pedibusque luteis, corpore caerulecente fuscōque maculato, pectore immaculato, cauda fasciata.

Falco barbaricus. Briss. orn. p. 99. n. 6. A.

Falco tunetanus. Aldr. av. I. p. 483. Raj. av. 14. n. 9.

Barbary Falcon. Will. orn. p. 81. Alb. av. 3. p. 2. t. 2.
Lath. syn. I. I. p. 72. n. 51.

Habitat in Barbaria, magnitudine et colore ad lanarium accedens, 17 pollices longus. Rostrum nigrum; irides flavae; alae vix maculatae; pectus ex flavicante album in caeruleum vergens, abdomen maculis oblongis nigris; cauda fasciis 7 transversis fuscis. An mera peregrini varietas?

peregrinus. 88. F. cera pedibusque luteis, corpore supra cinereo fuscōfasciato, subtus ex rufō albo, taeniis nigricantibus, cauda albo-punctata.

Falco peregrinus. Raj. av. p. 13. n. 1. Briss. orn. p. 98. n. 6.

Faucon pelerin. Buff. hist. nat. des oif. I. p. 249.

Peregrine Falcon. Brit. zool. n. 48. t. 20. Arct. zool. 2. p. 203. Will. orn. p. 76. t. 8. Latham syn. I. I. p. 73. n. 52.

tataricus. 8. F. alis supra rufis, digitis praelongis. Briss. orn. p. 100. n. 6. B.

Faucon de Tartarie ou Barbarie. Bel. hist. des oif. p. 116.

Tatarian Falcon. Lath. syn. I. I. p. 73. n. 52. A.

Habitat in Europa et boreali Asia et America.

Migratorius; an non nisi actate deformis gentilis?

versicolor. 89. F. cera flava, capite et corpore supra albo, maculis ex rufescente dilute fuscis, subtus albo, pectore ferrugineo primum rumper maculato.

Spotted Falcon. Brit. zool. n. 55. t. 26. Latham syn. I. I. p. 74. n. 53.

Habitat in Anglia, buteonis magnitudine. Rostrum nigrum; alae fasciis cinereis; cauda dilutius et obscurius fuscis.

pennatus. 90. F. cera pedibusque luteis, corpore supra ex nigricante fuscō, et fōrdide griseo variegato, subtus ex flavo fuscō lineis longitudinalibus nigricantibus, pedibus ad digitos usque pennatis.

Faucon pata. Briss. orn. VI. app. p. 22. t. 1.

Booted Falcon. Lath. syn. I. I. p. 75. n. 55.

Magni-

Magnitudo *Gyrfalcons*; longitudo pedis, et $7\frac{1}{4}$ pollicum; rostrum nigricans; palpebrae luteae; caput et cervix ex fulvo grisea, lineis nigricantibus; cauda fusca, versus apicem nigricans, apice grisea, ad latera albo-maculata. Ungues nigri.

- spadiceus. 91. F. cera flava, corpore spadiceo ferrugineo admixto, inferius ad latera albo, pedibus ad digitos usque pennatis. *Falco spadicus* or *Chocolate Falcon*. *Forster aet. angl. LXII.* p. 281. et *amer. catal. p. 9.* *Chocolate-colored Falcon*. *Arct. zool. 2. p. 201. n. 94. t. IX.* *Bay-Falcon* et *Placentia Falcon*. *Lath. syn. I. I. p. 54. n. 34. A. et 76. n. 57.*
- β. F. uropygio albo. *White-rumped Bay-Falcon*. *Lath. syn. I. I. p. 54. n. 34. B. Habitat in freto Hudsonis, et nova terra, vicitans anatibus, quibus in rupibus inhiat.* *Longitudo pedis et 10 pollicum; rostrum nigrum; rectrices duae intermediae nigrae et cinereae, ceterae extus obscurae, intus albo et nigro variae.* *Digitus breves.*
- S. Johannis. 92. F. cera pedibusque pennatis flavis, corpore fusco, supra lineis obliquis nigris et fordiis albis, subtus paucimaculis albis et flavicantibus, cauda fasciata apice alba. *S. John's Falcon*. *Arct. zool. 2. p. 200. n. 93. t. IX. Lath. syn. p. 77. n. 58.* *Habitat in freto Hudsonis et nova terra; pedem et 9 pollices longus.* *Digitus breves.*
- facer. 93. F. cera pedibusque caeruleis, dorso, pectore et tectricibus alarum primoribus fusco-maculatis, cauda maculis reniformibus. *Falco facer*. *Briff. orn. p. 98. n. 4. M. Raj. av. p. 13. n. 2. Sacre. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 246. t. 14. Will. orn. p. 77. Lath. syn. I. I. p. 77. n. 59.* β. *Falco facer*. *Forster aet. angl. LXII. p. 382.* *Sacre. Arct. zool. 2. p. 202. n. 96.* *American Sacre. Lath. syn. I. I. p. 78. n. 59. A.* *Habitat β) in freto Hudsonis, nova terra, Tataria, heic ad venatum institutus; frigoris patientissimus, ardeam albam potissimum venatur; Aprili et Mayo in locis desertis ova plerumque 2 ponens, bipedalis; caput obscure fuscum; pennae abdominis albae, medio fusco maculatae; tectrices alarum, remigesque primariae lineis transversis albis;* S *cauda*

useoque
n. 9.
2. t. 2.

ium ac-
ides fla-
lbum in
nigris;
rini va-

fusco-
is, cau-
p. 98.

zool. 2.
p. 73.

p. 100.

116.

ex ru-
neo p.

n. I. I.

igrum;
fis.

ricante
o fusco
digitos

Magni-

- ceyl
fi
grise
Gy
can
can
isla
ci
suf
- cauda fusca, ad latera maculis ovalibus transversis rubris. Pedes ad digitos fere pennati.
- novae terrae. 94. F. cera pedibusque flavis, occipite ferrugineo, corpore supra fusco, subtus ferrugineo, cauda lineis dilutius et saturatius fuscis varia.
New foundland Falcon. *Art. zool. 2. p. 201. n. 95.* *Lath. syn. I. 1. p. 79. n. 60.*
Habitat in nova terra, 20 pollices longus; pedes semipennati.
- stellaris. 95. F. pedibus caeruleis, corpore nigricante maculis radiatis, subtus ex albo et nigro mixto. *Briff. orn. p. 103. n. II.*
Blae-footed Falcon. Will. orn. p. 82. c. 11.
Starry Falcon. Lath. syn. I. 1. p. 79. n. 61.
Magnitudo habitusque peregrini; alas tamen breviores; cauda longior; irides aureae.
- hyemalis. 96. F. cera flava, capite dorsoque ex atro fuscis, cervice albostriata, pectore et abdomine albis, maculis cordatis.
Winter Falcon. *Art. zool. 2. p. 209. n. 107.*
 $\beta.$ Northern Falcon. *Lath. syn. I. 1. p. 79. n. 62.*
Habitat bieme in provincia Noveboracensi, pygargi magnitudine. Tectrices alarum obscurae, margine sordide albo, extimae aurantio; cauda lineis fuscis et nigris, apice alba; rostrum nigrum; pedes longi, graciles.
- cirrhatus. 97. F. cera pedibusque pennatis luteis, capitis crista retrorsum pendula, corpore supra nigro, subtus albo et nigro striato.
Falco indicus cristatus. *Briff. orn. p. 104. n. 12.*
Falco indicus cirrhatus. *Raj. av. p. 14. n. 12.*
Faucon hupé des Indes. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 271. n. 4.*
Crested indian Falcon. *Will. orn. p. 82. n. 12.* *Lath. syn. I. 1. p. 80. n. 63.*
Habitat in India, palumbarii circiter magnitudine; rostrum obscure caeruleum; irides flavae; cervix fulva; cauda fasciis transversis nigris et cinereis; unguis nigri.
- melano-leucos. 98. F. pedibus luteis, capite, collo, dorso, humeris, et remigibus nigris, reliquo corpore, tectricibus alarum et cauda albis.
Black and white indian Falcon. *Penn. ind. zool. t. 3.* *Lath. syn. I. 1. p. 81. n. 65.*
Habitat in Zeylon, 16 pollices longus; rostrum, unguis, tectrices alarum medise plures nigricant; irides flavent; orbitae albo maculatae.

99. F.

ceylanen- 99. F. cera flava, corpore lacteo, occipitis pennis duabus de-
fisis. pendentibus.

Ceylonese crested Falcon. *Lath. syn. I. I. p. 82. n. 66.*
Habitat in Zeylon; rostrum obscurum.

griseus. 100. F. cera pedibusque flavis, corpore supra obscure griseo,
subtus albo, maculis oblongis nigris, rectricibus longis,
intermediis duabus concoloribus, reliquis maculatis.

Grey Falcon. *Brit. zool. n. 49. Lath. syn. I. I. p. 82. n. 67.*
Habitat in Anglia, corvi magnitudine.

Rostrum caerulescens; irides rubrae; caput anterius obscure
fuscum, posterius album, ad latera cum gula bubalinum;
remiges albo-maculatae.

Gyrfalco. 27. F. cera caerulea, pedibus luteis, corpore fuscō, subtus
fasciis cinereis, caudae lateribus albīs. *Fn. suec. 64.*

Brown Jerfalcon. *Lath. syn. I. I. p. 82. n. 68.*

Habitat in Europa, gruibus, ardeis, columbis infestus.
Variat pedibus caeruleis et flavis.

candi- 101. F. cera pedibusque ex caerulecente cinereis, corpore
cans. albo fuscō maculato.

Gyrfalco. *Aldrov. orn. I. p. 471. t. 473. Raj. av. 13. n. 3.*
Gerfault. Briss. orn. I. p. 370. n. 19. t. 30. f. 2. Buff. hist.
nat. des oif. I. p. 239. t. 13. pl. entum. n. 215. 446. 462.

Gerfalco. *Will. orn. p. 78. n. 3.*

Gyrfalcon. *Brit. zool. n. 47. Arct. zool. 2. p. 221.*

White Jerfalcon. *Lath. syn. I. I. p. 83. n. 69.*

islandi- β. Gerfault d' Islande. *Briss. orn. I. p. 373. t. 31.*
cus. Iceland Jerfalcon. *Lath. syn. I. I. p. 84. n. 69. A.*

Habitat in Islandia et Scotia boreali, palumbarii magnitudine;
rostrum ex caeruleo cinereum, apice nigricans;
ungues plumbei; irides et orbitae caeruleae, (β. irides lu-
teae). β. Corpus supra fuscum, dorsi et alarum maculis
albis, subtus album nigro maculatum. Pedes flavi.

sufflator. 17. F. cera pedibusque luteis, corpore fuso albido, oculo-
rum operculis osseis.

Surinam Falcon. *Lath. syn. I. I. p. 85. n. 70.*

Habitat in Surinamo et Cayenna; iratus aut territus caput
inflat ad magnitudinem corporis. Rolander.

Corpus supra fuscum, plumis basi albis; subtus luteo, albo
fuscoque maculatum, uti etiam rectrices. Nares lobo
carneo intercalari.

cachin- 18. F. cera pedibusque luteis, palpebris albis, corpore fuscō
nans. albidoque vario, annulo nigro verticem album cingente,

Laughing Falcon. *Lath. syn.* I. I. p. 85. n. 71.

Habitat in America meridionali; hominem observans cachin-
nos edit. Rolander.

Corpus supra dorsum, alas, uropygium fuscum; sed alba
sunt collum, gula, pectus, abdomen, alae subtus. Cauda
fasciis luteis nigrisque.

Lanarius. 24. F. cera lutea, pedibus rostroque caeruleis, corpore subtus
maculis nigris longitudinalibus. *Fn. suec.* 62.

Lanarius. Gesn. av. 76. Aldr. orn. I. p. 488. Raj. av.
p. 15. n. 13. Briss. orn. p. 105. n. 16.

Lanier. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 243.

Lanneret. Albin. av. 2. p. 7. t. 7.

Lanner. Brit. zool. n. 51. t. 23. Arct. zool. 2. p. 225. Will.
orn. p. 82. n. 13.

Brown Lanner. Lath. syn. I. I. p. 86. n. 72.

Habitat in Europa, desertis Uralensi, Baraba aliisque tata-
ricis, migratorius; nidificans in arboribus humilibus;
venatui aptissimus.

Taenia alba cingit frontem supra oculos. Pedes breves, et
prouti nonnunquam cera, caeruleentes; pectus album,
flavo tinctum, maculis fuscis; remiges primariae et cau-
da obscura; haec utrinque, illae intus maculis ovalibus
ferrugineis.

albicans. 102. F. cera pedibusque luteis, corpore subtus albicante, re-

migibus nigricantibus.

Lanarius albicans. Briss. orn. p. 107. n. 18.

Lanarius. Aldrov. orn. I. p. 380. fig. p. 181.

White Lanner. Lath. syn. I. I. p. 87. n. 73.

β. Lanarius rectricibus duabus intermediis griseis, reliquis ma-
culatis albis.

Lanarius. Aldrov. orn. I. p. 380. fig. p. 183.

Habitat in Europa, an vere distinctus a lanario?

cyaneus. 10. F. cera alba, pedibus fulvis, corpore caeruleo-canescente,

arcu superciliari albo gulam cingente.

Lanarius cinereus. Briss. orn. p. 106. n. 17.

Oiseau S. Martin. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 212. planch.
entum. n. 459.

Blue Hawk. Edw. av. 5. p. 33. t. 225.

Hen-harrier. Brit. zool. n. 58. t. 28. Lath. syn. I. I. p. 88.
n. 74. Hayes brit. Birds t. 1.

Grau-weisse Geyer. Frisch av. t. 79. 80.

Habi-

- fusco
igente,
cachin-
d alba
Cauda
subtus
ij. av.
Will.
tata-
libus;
es, et,
lbum,
t cau-
alibus
e, re-
is ma-
cente,
lanch.
p. 88.
Habi-
- Habitat in Europa et Africa, 17 pollices longus.
Rostrum nigrum; irides, aliquando etiam cera, luteae; occiput album, maculis dilute fuscis; pectus et abdomen similiter alba, prius obscurè striatum; rectrices 2 intermediae utrinque, reliquæ extus griseæ, intus albae, obscure striatae.
- pygar- 11. F. cera pedibusque flavis, corpore cinereo, abdomine pal-
gus. lido, maculis oblongis rufis, oculorum orbita alba. *Scop.*
ann. I. p. 14.
Falco torquatus. *Briss. av. I. p. 345.*
Subbuteo. *Gesn. av. 48.*
Pygargus. *Alb. av. 2. p. 5. t. 5. et 3. p. 3. t. 3. Will. orn.*
t. 7. Raj. av. 17. n. 5.
Soubute. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 215. t. 9. planch. enl.*
n. 443. 480.
Ring tail. *Brit. zool. n. 59. Arct. zool. 2. p. 209. n. 106.*
Will. orn. p. 72. Lath. syn. I. I. p. 89. n. 75. Hayes
brit. Birds t. 2.
Habitat in Europa, et temperatoriæ Sibiria, $7\frac{1}{2}$ pollicibus pedem longitudine superans; rostrum pallidum; irides flavæ; cauda longiuscula, obscure fasciata, albo punctata; mas subtus maculis transversis, femina longitudinalibus.
- hudso- 19. F. cera pedibusque flavis, dorso fusco, superciliis albis,
nius. speculo alarum caerulecente.
Accipiter freti Hudsonis. *Briss. av. 6. app. 18.*
Ringtail Hawk. *Edw. av. 107. t. 107.*
Hudson's bay Ringtail. *Lath. syn. I. I. p. 91. n. 76.*
Habitat ad fretum Hudsonis, pedem et $9\frac{1}{2}$ pollices longus.
Rostrum unguisque nigri; corpus subtus album, maculis ex rufo fuscis; rectrices 2 intermediae subfuscæ, extimiae albae, reliquæ ex caerulecente cinereæ, singulæ striis transversis fuscis.
- Buffoni. 103. F. cera caerulea, pedibus luteis, corpore supra spadiceo,
subtus ex rufescente bubalino, superciliis flavis, caudæ
fasciis pallide et obscure fuscis.
Cayenne Ringtail. *Lath. syn. I. I. p. 91. n. 76. A.*
Habitat in Cayenna, bipedalis.
Rostrum unguisque nigri; pennæ primariae intus obscuræ,
extus ex cinereo caeruleæ, fasciis fuscis, in secundariis
magis obsoletis; remiges apice albae.

uligino-fus. 104. F. cera pedibusque aurantiis, corpore supra fusco, subtus splendide ferrugineo, caudae taeniis quatuor nigris.

Marth Hawk. *Arct. zool.* 2. p. 208. n. 105. *Edw. av.* 4. t. 291. *Lath. syn.* I. I. p. 90. n. 75. A.

Habitat in Jamaica, Pennsylvania, heic aestate in locis uliginosis aviculas, reptilia, serpentes venans, hieme discedens, bipedalis.

Rostrum caerulescens; orbitae aurantiae; irides castaneae; linea nigra ab angulo rostri pone oculos ducta; supra hanc alba genas cingens et ad cervicem pergens; caput, collum et pectoris superior pars ex nigro et ferrugineo varia; tectrices alarum fuscae; pedes crassi, breves, robusti.

II, 19, 103 et 104 perquam inter se affines.

Lithofal-co. 105. F. cera lutea, corpore supra cinereo, subtus rufo maculis longitudinalibus fuscis, cauda cinerea, versus apicem nigricante, apice alba.

Lithofalco. *Briff. orn.* p. 101. n. 8.

Lithofalco et Dendrofalco. *Raj. av.* pl. 18. n. 8.

Rochier. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 286. pl. enlum. n. 447. Stone-or Treefalcon. *Will. orn.* p. 80. *Latham syn.* I. I. p. 93. n. 77.

Tinnunculi magnitudine, 12 $\frac{1}{4}$ pollices longus; rostrum ex caerulecente cinereum; irides luteae; rectrices 2 intermediae unicolores, reliquae nigro-fasciatae.

monta-nus. 106. F. pedibus luteis, corpore supra ex fusco cinereo, gula juguloque albido maculatis, caudae basi cinerea, medio nigricante, apice albo.

Falco montanus. *Raj. av.* p. 13. n. 4. *Briff. orn.* p. 101. n. 9.

Mountain Falcon. *Will. orn.* p. 78. *Lath. syn.* I. I. p. 93. n. 78.

β. Falco montanus cinereus *Briff. orn.* p. 102. n. 9. A.

Falco montanus secundus Aldrovandi. *Will. orn.* t. 9.

Peregrino minor, cauda breviore; β) pedem et 9 pollices longus; rostrum nigrum; irides β) flavae; unguis nigri; corpus β) subtus niveum; colli maculae nunc ferrugineae, nunc nigrae; aliquando collum et pectus tota nigra; adul-ti caput nigrum. An varietas Lithofalconis?

Tinnunculus. 16. F. cera pedibusque flavis, dorso rufo punctis nigris, pectore striis fuscis, cauda rotundata. *Fn. suec.* 61. *Scop. ann.* I. p. 16.

Tinnunculus f. Cenchrus. Gesn. av. 54. *Aldr. orn.* I. p. 356. t. 358.

- , sub-
ris.
av. 4.
s uli-
dice-
neae;
banc
ollum
aria;
fli.

macu-
picem

447.
I. I.
im ex
inter-
gula
nedio
101.
93.

offices
igri;
neae,
adul-
pec-
Scop.
356.
358.
- Cresserelle. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 280. t. 18. planch. enlum. n. 401. 471.*
Kestrel, Kestril, Stannel, or Wind-hover. *Brit. zool. n. 60. Arct. zool. 2. p. 226. M. Will. orn. p. 84. t. 5. Latb. syn. I. I. p. 94. n. 78. Hayes brit. birds. t. IV.*
Rother Falk, et Rothelgeyer. *Frisch. av. t. 84. 85.*
- griseus. β . *Tinnunculus pennis griseis. S. G. Gmelin it. p. 49. t. 10.*
alauda- γ . *Accipiter alaudarius. Briss. orn. p. 110. n. 22.*
rius. *Maeuse-Falk. Frisch. av. t. 88.*
Habitat in Europae et Sibiriae, potissimum turribus, aviculis, muribus, insectis viellitans; advenit ex migratione primo die germinationis s. veris, una cum motacilla alba. Olim ad capienda perdices aliasque minores aves instruetus.
Caudae fascia lata nigra versus apicem; rectrices, intermedii exceptis, apice albae; mari corona capitidis et cauda dilute griseae; dorsum et alas, ex purpurascente rufae, nigro maculatae; feminae longe ponderosiori caput rufescens, corona nigro-striata, dorsum, cauda, rectricesque alarum ferrugineae, nigro-lineatae.
- bohemi- 107. *F. pedibus flavescentibus, corpore supra cinereo, subtus candido, remigibus quinque exterioribus extus nigris, orbitis albis.*
cus. *Maeuse-habicht, Missylauce. Jos. Mayer boehm. Abb. 6.*
 β . *313.*
Habitat in Bohemiae montosis, muribus viellitans, vespere denum conspicuus, vix ultra pedem longus.
Rostrum versus oris angulos flavescentes; irides flavae; cauda acuta, longa; pedes crassifusculi, infra genua plumosi; unguis nigri teretifusculi.
- piscator. 108. *F. pedibus fuscis, capite ferrugineo; pennis elongatis, corpore supra cinereo, subtus ex flavicante pallide albo, cauda supra dilute fusca, subtus ex caerulecente cinerea.*
Faucon pêcheur. Dampier it. 3. p. 318.
Faucon pêcheur de Senegal ou Tanas. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 275. pl. enlum. p. 478.

S 4

Fishing

Difficillime in hoc genere pluribusque aliis definiendi limites specierum et varietatum, cum aetas, sexus, clima, vitae genus, generatio hybrida pennarum ipsiusque cerae colorem mutet.

Fishing Falcon. *Lath. syn. I. I. p. 95. n. 80.*

Habitat in terra Senegal, piscibus vietitans, quos non integrōs deglutit.

Roftrum iridesque flavae; margo pennarum superiorum ex ferrugineo fuscus; inferiorum medium macula fusa.

badius. 109. F. pedibus pallidis, capite et corpore supra fusco, subtus albo, lunulis flavis, cauda dilute fusca, lineis 4 obscurioribus.

Brown Hawk. *Brown. Illustr. p. 6. t. 3. Lath. syn. I. I. p. 96. n. 81.*

Habitat in Zeylon, 13 pollices longus.

Roftrum caeruleum, apice nigro; irides flavae; tectrices alarum margine albo; humeri maculis albis; unguis nigri.

aquilinus. 110. F. cera pedibusque flavis, corpore supra caeruleo, subtus ex rubicundo albo, collo ex purpurascente rufo.

Petit Aigle d'Amérique. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 142. pl. enlum. n. 417.*

Red-throated Falcon. *Lath. syn. I. I. p. 97. n. 82.*

Habitat in America australi, 16-18 pollices longus.

Roftrum caeruleum; orbitae flavae; irides aurantiae; unguis nigri.

fuscus. 111. F. cera cinerea, pedibus flavis, corpore nigro-undulato, supra ex cinereo fusco, subtus albicans. *I. F. Miller illustr. t. XVIII.*

American brown Hawk. *Lath. syn. I. I. p. 98. n. 84.*

Habitat in America, Nisi magnitudine et facie; roftrum dilute plumbeum; vertex et latera capitinis striis longitudinalibus albis; abdomen ex rufescente fusco, in femina numerosioribus; cauda ex cinereo fusca, striis tribus transversis obscure fusco, apice pallido; unguis nigri.

Nifus. 31. F. cera viridi, pedibus flavis, abdomine albo griseo undulato, cauda fasciis nigricantibus. *Fn. suec. 68. Scop. ann. I. p. 17.*

Accipiter. *Briss. orn. p. 89. n. I.*

Accipiter fringillarius. *Gesn. av. 51. Aldr. orn. I. p. 344. t. 346. 347. Bell. av. 19.b. Raj. av. 18.*

Moscheutes. *Aldr. orn. 345.*

Epervier. *Buffon hist. nat. des ois. I. p. 225. t. II. planch. enlum. n. 412. 466. 467.*

Sparrow Hawk. *Brit. zool. n. 62. Arct. zool. 2. p. 226. N. Alb.*

Alb. av. 3. p. 4. t. 4. et 1. p. 5. t. 5. Will. orn. p. 86.

Lath. syn. I. I. p. 99. n. 85. Hayes brit. birds. t. III.

Sperber. Frisch. av. t. 90. 91. 92. Günther Nester u. Eyer. t. 6.

macula- β . *Accipiter maculatus. Briss. orn. p. 90. A.*

tus. *Spotted Sparrowhawk. Lath. syn. I. I. p. 100. n. 85. A.*

laeteus. γ . *Accipiter corpore toto lacteo unicolo.*

White Sparrow Hawk. Lath. syn. I. I. p. 100. n. 85. B.

Habitat in Europa, etiam maxime boreali, et Madera, audax, gallinis, perdricibus, columbis, passeribusque maxime infestus; venatur egregie alaudas; hinc ejus usus in aucupiis.

Mas 12, **femina** 15 *pollices longa; rostrum caerulescens; caput, dorsum, tectrices alarum, et cauda in aliis ex obscuro caerulecente cinerea, in aliis obscure fusca, pennis margine ferrugineis; mari in colorem columbinum vergentia, β) albo maculata; gula, pectus, et abdomen ex albido flava, mari obscuriora, undis obscure fuscis, vel aurantiis, in femina magis abruptis et numerosioribus; in β) fusca, maculis paucis albis; caudae apex albus, tacniae 5 latae nigrae, β) subtus alternatim albae et fuscae.*

dubius. **112.** *F. cera pedibusque flavis, capite obscuro striis ferrugineis, corpore supra fusco subtus sordide albo, striis fulcis, cauda obscure cinerea, taeniis 4 nigris.*

Dubious Falcon. Arct. zool. 2. p. 213. n. 112.

Habitat in Noveboraco et Carolina, Niso valde affinis, 10 pollices longus.

Rostrum obscurum; irides flavac; tectrices alarum margine ferrugineo; remiges primariae obscure cinereae, nigrolineatae.

obscurus. **113.** *F. cera pedibusque flavis, occipite et cervice albo maculatis, corpore supra obscure fulvo, subtus albido nigrolineato, cauda obscure fusca fasciata, albo-punctata.*

Dusky Falcon. Arct. zool. 2. p. 213. n. 113.

Habitat in Noveboraco, praecedente minor.

Rostrum caerulescens; caput obscure fuscum; tectrices alarum margine leviter ferrugineo; remiges primariae obscure; cauda brevis, taeniis 4 obscuris, totidemque angustioribus albis.

columba- **21.** *F. cera pedibusque luteis, corpore fusco subtus albido, cauda fusca fasciis quatuor linearibus albis.*

Accipiter Carolinensis. Briss. orn. p. 110. n. 21.

*Epervier des pigeons. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 238.
Pigeon Hawk. Arct. zool. 2. p. 212. n. 111. Catesb. Carol. I. p. 3. t. 3. Lath. syn. I. I. p. 101. n. 86.
Habitat in America septentrionali, 10½ pollices longus, migratorius, aviculus vietitans.
Rostrum albicans, apice nigro; irides luteae; corpus subtus ex flavicante album, striis fuscis; unguis nigri.*

superciliosus. 22. F. cera, pedibus palpebrisque luteis, corpore fusco albidu-
do undulato, remigibus ferrugineis nigro fasciatis.
Gujana Falcon. Lath. syn. I. I. p. 102. n. 87.

Habitat in Surinamo, Guiana.

*Magnitudo Picae; habitus Nisi; corpus supra fuscum, sub-
tus totum etiam in femoribus confertim nigro undulatum;
remiges secundariae margine posteriore albido; cauda ni-
gra, fasciis duabus latis et apice cinereis; crissum album
strigis aliquot nigris; uropygium albo nigroque varium;
supercilia subtus nuda, prominula; lora setis nigris pa-
tentibus; rostrum et unguis nigri; tectrices alarum infe-
riores albae lineolis tenuissimis nigris.*

vespertinus. 23. F. cera, pedibus palpebrisque luteis, crisco femoribusque
ferrugineis. S. G. Gmelin it. I. p. 67. II. p. 163. Lepe-
chin it. I. p. 230.

Ingrian Falcon. Lath. syn. I. I. p. 102. n. 88.

*Habitat in Ingria et omni Russia, etiam Siberia, Kober et
Derbnitschok dictus, vespere et noctu volitans, in cacu-
mine arborum nidificans, aut picam ex nido expellens; co-
turnices praefertim venans.*

*Magnitudo columbae; corpus ex fuso caerulescens; venter
ex albo caerulescens; caput fuscum; rostrum flavum, api-
ce fuso; rectrices 12 supra et subtus fuscæ; remiges ex
albo caerulecentes; primores 1–7 apice nigricantes; pe-
des nudi. G. de Demidoff.*

vespertinoides. 114. F. cera, pedibus palpebrisque luteis, femoribus nigris,
collo, pectori et ventre fulcescentibus albo-maculatis.
Falck it. 3. p. 329.

*Habitat in Permia, Sibiriæ provincia Issetensi et Baschkiria,
vespertino dimidio minor, ut vix drachma pondus dua-
rum unciarum superet.*

magnirostris. 115. F. cera pedibusque flavis, corpore supra fuso, subtus
albo ferrugineo striato, cauda fasciis nigris et albis.

Eper-

Subbi-
teo.

aura-
tius

plu-

38.
us. Ca-
us, mi-
subtus
albi-
n, sub-
latum;
uda ni-
albūm
riūm;
ris pa-
m infe-
busque
Lepe-
bez et
cacu-
is; co-
venter
t, api-
ges ex-
s; pe-
nigris,
ulatis.
ikiria,
dua-
subtus
Eper-
- Epervier à gros bec de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois. I.*
p. 237. pl. enlum. n. 464.
 Great-billed Falcon. *Lath. syn. I. I. p. 103. n. 89.*
Habitat in Cayenna, Niso major, pedibus tamen brevioribus, rostro longiore et crassiore nigro; irides aurantiae; pennarum corpus supra, pectusque tegentium fuscarum margo ferrugineus; unguis nigri.
- Subbuteo. 14. F. cera pedibusque flavis, dorso fuscō, nucha alba, abdōmine pallido, maculis oblongis fuscis. *Fn. suec. 59.*
Dendrofallo. Raj. av. p. 14. n. 8. Briff. av. I. p. 375.
Subbuteo. Aldrov. orn. I. p. 374. Alb. av. I. p. 6. t. 6.
Raj. av. p. 15. n. 14.
Hoibreau. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 277. t. 17. pl. enlum. n. 431. 432.
Hobby. Brit. zool. n. 61. Arct. zool. 2. p. 227. O. Will. orn. p. 83. Lath. syn. I. I. p. 103. n. 90.
Habitat in Europa et Sibiria, alaudis infestus, quae eum ita exhorrire dicuntur, ut in sinum hominis se recipiant; hinc alaudis capiendis olim adhibitus; migratorius 12 pollices longus.
Rostrum caeruleum; orbitae flavae; irides castaneae, rarius flavae; genae lunula nigra notatae; rectrices laterales fasciis nigricantibus; unguis nigri.
- aurantius. 116. F. rostro pedibusque plumbeis, corpore supra obscure fuscō lineis angustis albidis decussantibus, gulae pennis albidis angustis longissimis, jugulo et pectore aurantiis, abdōmine caudaque fusciis interrupte striatis.
Orange-breasted Hobby. Lath. syn. I. I. p. 105. n. 91.
Habitat in Surinam, Subbuteonis magnitudine, 15 pollices longus.
Rostrum $\frac{3}{4}$ pollicis longum, basi albicans; cervix, vertex et rectrices alarum unicolores; jugulum maculis rotundatis albis; abdomen lineis coloris bubalini striatum; rectrices caudae inferiores ferrugineae; cauda basin versus albo lineata; pedes longi, graciles; unguis nigri.
- plumbeus. 117. F. cera obscura, pedibus luteis, corpore cinereo, dorsi parte superiore ex plumbeo atro, rectricibus intus maculis tribus albis.
Spotted-tailed Hobby. Lath. syn. I. I. p. 106. n. 92.
Habitat in Cayenna, Nisi magnitudine.
Rostrum et unguis nigri; caput collumque cinerea; pedes breves.

118. F.

Aesalon. 118. F. cera pedibusque flavis, capite ferrugineo, corpore supra ex caerulecente cinereo, maculis striisque ferrugineis, subtus ex flavicante albo, maculis oblongis.

Aesalon. Briss. orn. p. III. n. 23.

Aesalon Bellonii et Aldrovandi. Raj. av. p. 15. n. 15.

Merlin. Brit. zool. n. 63. Will. orn. p. 85. t. 3. Latham syn. I. I. p. 106. n. 93.

Kleinster Rothfalk. Frisch. av. t. 89.

novebo- β. Aesalon fronte cinerea, vertice, dorso et telectricibus alarum
racealis. castaneis, temporum macula triangulari alba nigro marginata, cauda castanea striis transversis nigris, subtus albidis et nigris.

New-York Merlin. Lath. syn. I. I. p. 107. n. 93. A.

caribaea- γ. Aesalon supra rufus, subtus albus, utrinque maculis nigris.
rum. Aesalon Antillarum. Briss. orn. p. III. n. 24.
Esmerillon Gry Gry. du Tertre hist. des ant. 2. p. 253.
Raj. av. p. 19. n. 3.

Falcona- δ. Aesalon habitu subbuteonis, cetera lithofalconi similior.
riorum. Esmerillon des Fauconniers. Buff. hist. nat. des oif. I. p. 288.
t. 19.

Esmerillon. Buff. planch. enlum. n. 468.

Habitat in Europa, β) in Noveboraco, γ) in insulis Caribaeis, migratoriis, olim venatui adhibitus; 12 $\frac{1}{2}$, β) 9 pollices longus.

Rostrum magis minusve in caeruleum vergens; irides obscurae, cauda striis transversis 8-15 alternis obscuris et rubentibus; ungues nigri.

Sparre- 20. F. cera lutea, capite fusco, vertice abdomineque rubro,
rius. alis caerulecentibus.

Aesalon carolinensis. Briss. av. I. p. 386. t. 32. f. I.

Falco minor rufescens. Brown. jam. p. 471.

Emerillon de la Caroline. Buff. hist. nat. des oif. I. p. 291.
planch. enlum. n. 465.

Little Hawk. Catesb. Carol. I. p. 5. t. 5.

Little Falcon. Arct. zool. 2. p. 211. n. 110. Latham syn.
I. I. p. 110. n. 94.

Habitat in Virginiam, Carolina et S. Domingo.

Magnitudo Aesalonis, feminae paulo major; rostrum et irides flavescentes; caput ex caerulecente cinereum; vertex et corpus supra ex aurantio fusca striis transversis nigris, quae similiter in telectricibus alarum; cauda ex rubro fusa, nigro-

domini
cenfis

minu

caeri
cer

regi

pore su-
ugineis,

5.
Latham

alarum
to mar-
btus al-

nigris.

9. 253.

ior.
p. 288.

's Cari-
, β) 9

obscu-
et ru-

rubro,

. 291.

u syn.

et iri-
vertex
nigris,
fusca,
nigro-

nigro-punctata; pedes lutei. Feminae *caput cingitur maculis 7 nigricantibus*.

domini- 119. F. cera pedibusque luteis, capite cinereo, corpore supra ex rubro fusco, subtus ferride albo, utrinque nigro-maculato, rectricibus 8 intermediis castaneis, versus apicem nigris, apice albis.

Emerillon de S. Domingue. *Briss. ornith.* I. p. 389. n. 26.
t. 32. f. 2.

St. Domingo Falcon. *Lath. syn.* I. I. p. 111. n. 95.

Habitat in insula S. Domingo.

Rostrum flavum, apice nigro; irides flavae; rectrices extimae mari extus et apice albae, intus castaneae macula transversa nigra, versus opicem; feminae extus albae, maculis 5 nigris, intus castaneae, secundae castaneae prope apicem albidae, macula nigra; unguis niger.

minutus. 32. F. cera fusca, pedibus luteis, corpore subtus albo, rectricibus fuscis nigro fasciatis.

Accipiter minor. *Briss. av.* I. p. 315. t. 30. f. 1.
Habitat in Melita, magnitudine turdi, 11 $\frac{1}{2}$ pollices longus.
Rostrum et unguis nigri; corpus supra fuscum, rufo varium; subtus striis ex rufo fuscis transversis; pectus aliquando maculis lanceolatis notatum.

caeruleus- 9. F. cera, palpebris, pedibus subtusque luteis, dorso nigro-caerulecente, temporibus linea alba inclusis.

caeruleus- 9. F. cera, palpebris, pedibus subtusque luteis, dorso nigro-caerulecente, temporibus linea alba inclusis.

Faucon de Bengale. *Briss. orn. app.* p. 20. n. 38.
Little black and orange Indian Hawk. *Edw. av.* 108. t. 108.
Bengal Falcon. *Lath. syn.* I. I. p. 112. n. 97.
Habitat in Bengala, minimus sui generis, neque ultra 6 $\frac{1}{2}$ pollices longus.
Rostrum nigricans; synciput candidum; area oculorum nutida, flava; genae albae, linea nigra; cauda nigra; rectrices 2 intermediae unicolores; reliquae intus striis transversis albis; unguis niger.

regulus. 120. F. cera virescente, pedibus obscure flavis, torque ferrugineo, corpore supra plumbeo, subtus albido maculis ex ferrugineo fulcis. *Pall. it.* 2. p. 707.

Siberian Falcon. *Lath. syn.* I. I. p. 113. n. 98.

Habitat, rarius tamen, in Siberia, alaudis viicitans, praecedente minor, ut vix semilibram pondere aequet; rostro et habitu *Trinunculi*.

Irides

Irides fuscæ; vertex fuscus, lineis nigricantibus; alarum margo albus, subtus varius; rectrices versus apicem plumbeæ, fasciis subtus obsoletis, margine nigro, apice albo.

virgin
na.

43. STRIX. Rostrum aduncum (absque cera).

Nares oblongae pennis setaceis recumbentibus obtectæ.

Caput grande; auribus oculisque magnis.
Lingua bifida.

* Auriculatae, pennis auricularum instar extantium.

- Bubo. I. St. corpore rufo. Fn. suec. 69. Scop. ann. I. p. 18.
 Bubo. Bell. av. 25. a. Gesn. av. 234. Aldr. orn. I. p. 502.
 Briff. av. I. p. 477. n. I. Raj. av. p. 24. n. I.
 Duc ou Grand Duc. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 322. t. 22.
 planch. enlum. n. 435.
 Great Horn-Owl, or Eagle-owl. Alb. av. 2. p. 9. t. 9.
 Will. orn. p. 99. t. 12.
 Eagle-owl. Brit. zool. n. 64. t. 29.
 Great eared Owl. Lath. syn. I. I. p. 116. n. I.
 Schuffut. Frisch. av. t. 93.
 β. Bubo atheniensis.
 Bubo italicus. Briff. orn. p. 140. n. I. A.
 Black-winged Horn-owl. Alb. av. 3. t. 6.
 Eagle-owl. Will. orn. p. 99. n. 2.
 Great-horned Owl from Athens. Edw. av. 37. t. 227.
 γ. Bubo pedibus nudis. Briff. orn. p. 141. n. I. B.
 Great Horn-Owl. Will. orn. p. 100. n. 3.
 δ. Bubo magellanicus.
 Jacuruto. Marcgr. bras. p. 199.
 Hibou des terres magellaniques. Buff. pl. enlum. n. 385.
 Habitat in Europæ, etiam Calmucciae, δ) in America aut
 stralis ruderibus, montibus, cavernis, rupibus. Miner
 vae avis, unde noëtus Athenas mittere; venatur lepores,
 cuniculos, talpas, rattos, mures, rarius vespertilioes
 et amphibia.
 Magnitudo aquilæ; irides flavæ; caput corpusque lineis et
 maculis nigris, fuscis, cinereis, ferrugineis eleganter va
 rium; alæ longæ; cauda brevis, lineis transversis obscuris;
 pedes testacei, (excepto γ) ad digitos pennati; unguis
 magni, valde adunci, obscuri.

scand
ca.

zeyle
nenſi

Afio.

Strix

13. St.

- alarum
n plum-
ce albo.

ecum-

agnis.

ium.
p. 502.
t. 22.
9. t. 9.

7.

385.
ica att.
Miner-
lepores,
tiliones

ineis et
ter va-
obscu-
ungues

13. St.
- virginia. 13. St. corpore supra fusco lineis subtilibus rufis cinereisque vario, subtus pallide cinereo, striis transversis fulcis, jugulo et lateribus pectoris ex aurantio fuscis striatis.
Bubo virginianus. Briss. orn. p. 141. n. 2.
Horned Owl. Ellis Hudson'sb. p. 40. t. 2.
Great horned Owl from Virginia. Edw. av. 2. t. 60.
Eagle Owl. Arct. zool. 2. p. 228. n. 114.
Virginian Eagle Owl. Lath. syn. I. I. p. 119. n. 2.
Habitat in omni America, in Astracania ad Caspium usque, et polo arctico proprius; noctu vocem edens ingratissimam, funestum Americae inquilinis omen.
*Bubone paulo minor; an ejus varietas? Pennae auricula-
rum magnae; rostrum nigrum; irides aureae; alas et cauda taeniis fuscis; pedes ad digitos usque plumis cine-
reis vestiti; unguis cornue.*
- scandia-
ca. 2. St. corpore albido. Fn. suec. 70.
Bubo lapponicus. Briss. orn. p. 142. n. 3.
Scandinavian Eagle Owl. Lath. syn. I. I. p. 120. n. 3.
Habitat in alpibus Lapponiae; magnitudine gallopavonis, nigris maculis insignita; an pariter varietas Bubonis?
- zeypo-
nenfis. 14. St. corpore supra ex rufescente fusco, subtus ex flavicante albo, circulis faciei ex rufescente fuscis, nigro-striatis.
Ceylonese Eagle Owl. Lath. syn. I. I. p. 120. n. 4.
*Great Ceylonese Horned-owl. Brown's illustr. zool. p. 8.
t. 4.*
Habitat in insula Zeylan, 11 pollicibus pedem longitudine superans.
Rostrum corneum; irides flavae; auriculae breves, acutae; remiges primores et cauda lineis transversis nigris, albis et pallide rufis; pedes seminudi.
- Asio. 3. St. corpore supra ferrugineo, subtus cinereo, alis punctis quinque albis.
Scops carolinensis. Briss. av. I. p. 497.
Little Owl. Catesb. Carol. I. p. 7. t. 7.

Red

Strix differt a falcone, ut phalaena a papilio; altera enim diurna altera nocturna est.
 Noctu pleraque praedantur aviculis, muribus, vespertilionibus; pedes plerisque lanati, ne frigescant, digito extimo retrorsum trahili; aures amplae, membrana vestitae, quae retrotraetta tubam Eustachianam auri humanae simulat; oculi magni noctu lacentes, ut cum acutius videant; die pleraque coecutiunt, passim opprobrio expositae; remigium exteriorum una alterave ferrata; unguis uncinatus, acutus.

- Red Owl. *Arct. zool.* 2. p. 231. n. 117. t. XI.
 Red Eared Owl. *Lath. syn.* I. 1. p. 123. n. 8.
Habitat in Noveboraco ad Carolinam usque, 10½ pollices longa.
Corpus supra striis, subtus maculis nigris oblongis; remiges primariae lineis nigris, rufis et albis; cauda rufa, obscure lineata; pedes ad ungues usque pennati.
- mexica- 15. St. corpore ex fusco et nigro vario.
 na. *Alio mexicanus. Briss. orn. p. 146. n. 9.*
Tecolotl. Raj. av. p. 160.
Mexican Eared Owl. Lath. syn. I. 1. p. 123. n. 7.
Habitat in nova Hispania. Oculi magni aurei.
- america- 16. St. capite et corpore supra cinereo, subtus ferrugineo, uropygio albo, nigro maculato, alis caudaque ferrugineis lineis transversis cinereis et griseis.
 na. *Alio americanus. Briss. orn. p. 145. n. 7.*
Bubo ocreo-cinereus pechore maculoso. Feuill. journ. des obs. ed. 1725. p. 59.
Habitat in America australi, Oti magnitudine, an ejus varietas?
Rofrum luteum; irides aureae; orbitae cinereae; pedes flavi; ungues nigri.
- Otus. 4. St. auricularum pennis senis. *Fn. suec.* 71. *Scop. ann.* I. p. 18.
Alio. Briss. av. I. p. 486.
*Otus f. Alio. Bell. av. 25. 6. *Gesn. av. 223. Aldr. orn.* I. p. 525. *Raj. av. 25.*
Hibou, appellé Canot. Charlev. nouv. Fr. 3. p. 5. 6.
Moyen Duc ou le Hibou. Buff. hist. nat. des vif. I. p. 342. t. 22. pl. enlum. 29.
Horn-owl. Will. orn. p. 100. Albin. av. 2. t. 10.
Long-eared Owl. Brit. zool. n. 65. Arct. zool. 2. p. 229. n. 115. Lath. syn. I. 1. p. 121. n. 5.
Rothes Kaeuzlein. Frisch. av. t. 99.
Habitat in America, Europa, Asia borealibus, ad Astracaniam usque, et in ipsa Aegypto, valde sonora, non migratoria, in arboribus nidificans, et ova 4 alba Aprili ponens.
*Pennae auricularum longissimae flavae et nigrae; irides flavae; dorsum testricesque alarum obscure fusca, grisea et ex flavicante ferruginea; pectus et abdomen pallide flavata striata; cauda cinereo et obscurius lineata. Longitudo 14 pollicum.**

17. St.

brachios.

brasili-

naevi

indic

Zoro

- brachyo- 17. St. auricularum penna brevi, corpore supra fuscō, pennis
tos. margine flavis, subtus pallide flavo, longitudinaliter stria-
to. *Forster act. angl. LXII. p. 384. n. 2.*
Short-eared Owl. *Brit. zool. n. 66. t. 31. Arct. zool. 2.
p. 229. n. 116. Lath. syn. I. I. p. 124. n. 9.*
- Chouette ou grande Chevêche. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 372.
t. 27. pl. centum. n. 438.*
- Habitat in America et Europa, potissimum boreali, Sibiria,
14 pollices longa, muribus vigilans, quibus invigilat,
audax. Cauda obscure fuscā; rectrices intermediae cir-
culo flavo.
- brasilia- 18. St. corpore supra pallide ex ferrugineo fuscō albo macula-
na. to, subtus albido maculis ex ferrugineo fuscis.
Afio brasiliensis. *Briff. orn. p. 145. n. 8.*
Cabure ou Caboure. *Will. orn. p. 107. n. 8. Buff. hist. nat.
des ois. I. p. 383.*
- Noctua Brasiliensis Cabure dicta. *Raj. av. p. 26. n. 7.*
Brazilian Eared owl. *Lath. syn. I. I. p. 125. n. 10.*
- Habitat in Brasilia, turdi magnitudine; rostrum, irides, pe-
des breves cum digitis flavicant.
- naevia. 19. St. corpore griseo, subtus pallidiore, utrinque maculis fer-
ruginis et nigris, capitris pectorisque pennis nigro-pun-
ctatis.
- Mottled Owl. *Arct. zool. 2. p. 231. n. 118. t. XI. Lath.
syn. I. I. p. 126. n. 11.*
- Habitat in Noveboraco, Majo pariens, 11 pollices longa.
Facies alba, fuscō maculata; humeri testricesque alarum
maculis magnis albis.
- indica. 20. St. dorso obscuro, testricibus alarum griseis nigro lineatis,
pectore bubalino, maculis exiguis sagittatis nigris.
Little Hawk Owl of Ceylon. *Penn. ind. zool. t. 3.*
Indian Eared Owl. *Lath. syn. I. I. p. 127. n. 12.*
- Habitat in insula Zeylon, 7 pollices longa.
Rostrum obscurum, setis longis cinetum; caput obscure fuscum;
orbitae pallide cinereae; pedes seminudi, subtus ex
rufescente flavi.
- Zorca. 21. St. auricularum pennis 8-9. *Cetti ucc. di Sardegna. p. 60.*
Habitat in Italia, Sardinia, solitaria, non migrans, 7 pol-
lices longa, ululans.
- Rostrum ex virescente flavidum; digitū nudi.

T

22. St.

Ny

carnioli- 22. St. corpore ex cinereo albicante, maculis striisque trans-
ca. veris nigricantibus variegato. *Scop. ann. I. p. 19.*

*Strix capite subaurito, corpore ex nigro, albo et fusco te-
nuissime undulatim mixtis variegato. Kramer elench.
p. 323. n. 3.*

*Habitat in silvis Carnioliae frigidioris, in rupium fissuris
cavisque arboribus nidificans, ova alba 4-2 ponens;
pulli scarabeo majali nutriuntur.*

*Habitus passerinus; auriculae in cadavere vix conspicuae;
irides flavae; cauda fuscocens maculata; remiges 6 pri-
mae uno latere albido maculatae.*

deminu- 23. St. minor, corpore rufo. *Pall. it. 2. p. 707. n. 14.*
ta. Yaickan Eagle Owl. *Lath. syn. I. I. p. 128. n. 14.*

*Habitat in lucis campestribus et montanis ad fluvium mon-
tesque Uralenses; buboni colore structuraque similis, ast
multo minor, ut vix libram pondere aequet.*

pulchella. 24. St. minima, corpore toto griseo, fusco, ferrugineo albo-
que vario. *Pall. it. I. p. 466. nov. comm. Petrop. XV.
p. 490. t. XXVI. f. I. Lepech. it. 2. t. 4.*

Siberian eared Owl. *Lath. syn. I. I. p. 130. n. 16. t. 5. f. I.*

*Habitat circa Catharinopolin Sibiriae, et reliquo australi
Wolgae littore; ultra 9 pollices longa.*

*Rostrum, pedes, unguesque sordidi; irides flavae; dorsum
sordide cinereum; alae maculis albis oblongis; cauda ru-
fescens, fasciis et punctulis fuscis.*

Scops. 5. St. auricularum penna solitaria.

*Scops. Briff. av. I. p. 495. t. 37. f. I. Aldr. orn. I. 8. c. 4.
Raj. av. p. 25. n. 3. Lath. syn. I. I. p. 129. n. 15.*

*Scops ou petit Duc. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 353. t. 24.
pl. enlum. n. 436.*

Little Horn-owl. Will. orn. p. 101. t. 12.

Horn- oder Ohreule. Günth. Neft. u. Eyer, t. 40.

*Habitat in Europa, ex Anglia tamen exul, 7½ polices lon-
ga, cum muribus agrestibus aliquando bella gerens.*

*Auricularum pennae a morte vix conspicuae; color pro aeta-
te multum variat, ex griseo, rufo, fusco et nigricante
mixtus; pedes pariter fusco-maculati; digitii unguesque
fusci.*

Ter
malunebu
fa

cine

Wa
t

** non

- trans-
sco te-
lench.
ffuris
onens;
icuae;
6 pri-

mon-
s, aft

albo-
XV.
i. f. I.
ustrali
orsum
da ru-

3. c. 4.
t. 24.

c. lon-
aeta-
icante
iesque
* non
- * * non auriculatae.
- Nyctea. 6. St. corpore albido, maculis lunatis distantibus fuscis. *Fn.*
Scop. ann. I. p. 20.
Strix alba freti Hudsonis. Briss. av. I. p. 522.
Hibou blanc d' Islande. Anders. hist. I. p. 85. t. I.
Harfang. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 387. planch. enlum. n. 458.
Great white Owl. Edw. av. 61. t. 61.
Snowy Owl. Arct. zool. 2. p. 233. n. 121. Lath. syn. I. I. p. 132. n. 17.
Habitat in America, Europa, Asia, potissimum borealibus, interdiu volando velocissime ardeas venatur, lepores, mures, aliquando cadaveribus contenta ululans, buboni fere aequalis, bipedalis.
Hyeme evadit saepius immaculata nivea.
- Teng-
malmi. 44. St. corpore griseo, maculis pisiformibus albis, iridibus fla-
vis. *Tengmalmi aet. Stockh. ann. 1783. trim. I.*
Habitat in Uplandia Sueciae, merulac magnitudine.
- nebulosa. 25. St. capite, collo, pectore, dorso et testricibus alarum fus-
cis albo-maculatis, abdomine et crasso fordide albis fusco-
striatis, cauda fusco et albido fasciata, apice albida. *For-
sier aet. angl. LXII. p. 424.*
Grey Owl. Aet. angl. LXII. p. 386.
*Barred Owl. Arct. zool. 2. p. 234. n. 122. t. XI. Latham
syn. I. I. p. 133. n. 18.*
*Habitat in fretto Hudsonis et Noveboraco, leporibus, ardeis,
muribus viettans, bipedalis; rostro iridibusque flavis.*
- cinerea. 26. St. capite, cervice, et testricibus alarum fuliginosis, lineis
fordide albis, pectore et abdomine albidis, maculis ma-
gnis oblongis obscure fuscis.
Sooty Owl. Arct. zool. 2. p. 232. n. 120.
Cinereous Owl. Lath. syn. I. I. p. 134. n. 19.
*Habitat in fretto Hudsonis, per paria volans, muribus et le-
poribus viettans, Maji medio in pinu nidificans, et ova 2
obscure maculata ponens; bipedalis.*
*Rostrum albidum; irides flavae; cauda striis obliquis fuscis
et fordide albis; pars cutis a gula ad crissum denudata.*
- Wapacu-
thu. 27. St. dorso et testricibus caudae albis, obscure maculatis,
pectore et abdomine fordide albis, lineis rufescentibus
decussantibus. *Arct. zool. 2. p. 231. n. 119.*

Habitat in silvis circa fretum Hudsonis, esculenta, muribus et aviculis viettans, in terra secca ex musco nidum seruens, bipedalis.

Junior albet; rostrum et unguis nigra, incurvata; irides flavae; spatium inter oculos, genas, et gularum album; capitis penicularum apex niger; humeri et tectrices alarum albent, maculis rufescitibus.

cunicula- 28. St. corpore supra fusco subtus albo, pedibus tuberculatis pilosis. *Molina hist. nat. Chil. p. 233. Klein av. p. 57. n. 9. Feuill. obs. phys. ed. 1714. p. 562.*

Noctua coquimbana. Briss. orn. p. 155. n. 11.

Coquimbo Owl. Lath. syn. I. 1. p. 145. n. 33.

Habitat in Chili, interdiu aliquando cum femina volans, insectis et amphibiis viettans, ova 4 alba flavoque varia in cuniculos longos ponens, columbae magnitudine. Irides flavae; corpus supra albo-maculatum.

Aluco. 7. St. capite ferrugineo, iridibus atris, reinibus primoribus ferratis. *It. oel. 69. Scop. ann. I. p. 20. n. 4. Tengmalm nov. act. Stockh. ann. 1782. 2. n. 8.*

Strix cinerea. Raj. av. p. 26. n. 3.

Ulula. Gesn. av. 773. Aldr. orn. I. p. 540. Briss. av. I. p. 507.

Hulotte. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 358. pl. enlum. n. 441. Aldrovandus former Aluco. Will. orn. p. 104. t. 13.

Aluco Owl. Lath. syn. I. 1. p. 134. n. 20.

Grabeule. Frisch. av. t. 94.

Habitat in Europa, Calmuccis sacra, aestate in silvarum arboribus cavis, bieme hominum habitationes accedens, viettans muribus, ova 4 sordide grisea in nido buteonis, tinnunculi, cornicis, picac ponens.

Longitudo 15 pollicum; rostrum ex flavicante album aut virens; corpus supra obscure ferrugineum maculis nigris et albidis; subtus album, maculis nigris transversis et longitudinalibus; pedes albi, maculis exiguis nigris.

sylvestris. 29. St. capillatio eleganti, iridibus glaucis, corpore albo fuscoque vario. *Scop. ann. I. p. 21. n. 13.*

Austrian Owl. Lath. syn. I. 1. p. 136. n. 21.

Habitat in Carniola, galli habitu, et mediae magnitudinis; a basi unius auris per frontem transit ad basin alterius radius plumosus albicans.

29. St.

- alba. 30. St. corpore supra rufo griseo maculato, subtus albo; remigibus recticibusque rufis, his apice albis. *Scop. ann. I.*
p. 21. n. 14.
White austrian owl. *Lath. syn. I. I. p. 136. n. 22.*
Habitat in Foro Julii, gallinae fere habitu, rostro albo, capillitii margine rufo.
- Noctua. 31. St. iridibus fuscis, corpore pallide rufo, maculis fuscis longitudinalibus. *Scop. ann. I. p. 22. n. 15.*
Rufous austrian Owl. *Lath. syn. I. I. p. 136. n. 23.*
Habitat in Carnioliae silvis, columbae habitu.
- rufa. 32. St. iridibus caerulecentibus, corpore ferrugineo fusco-maculato. *Scop. ann. I. p. 22. n. 16.*
Ferruginous austrian Owl. *Lath. syn. I. I. p. 137. n. 24.*
Habitat in Idriæ silvis, praecedentis habitu.
- solonien- 33. St. corpore supra ex atro fusco, fulvo admisto, subtus albo, cauda alba versus apicem lincis nigricantibus decus-santibus.
Ulula sive noctua minor dorso ferrugineo, ventre albido.
Salerne orn. p. 56.
Solognese Owl. Lath. syn. I. I. p. 137. n. 25.
Habitat in Galliae provincia Soloniensi, 15 pollices longa; vertex circulusque pennarum faciei exterior rufo alboque varius; digitæ cornuei.
- flammea. 34. St. corpore luteo punctis albis, subtus albido punctis nigricantibus.
Strix capite laevi, corpore luteo. *Fn. succ. 73.*
Aluco. *Briff. orn. p. 147. n. 2.*
Aluco minor. *Aldrov. orn. I. p. 536. 538. Raj. av. p. 25.*
A. I. Brünn. orn. 17.
Ululæ genus alterum. *Gesn. av. 775.*
Tuidara. *Maregr. braf. p. 205.*
Effraie ou Frelaie. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 366. t. 26.*
planch. enlum. n. 440. 474.
Common Barn or White Owl. *Will. orn. p. 104. t. 13.*
White Owl. *Brit. zool. n. 67. Arct. zool. 2. p. 235. n. 124.*
Albin. av. 2. t. II. Lath. syn. I. I. p. 138. n. 26.
Schlaefereule, Perleule. *Frisch. av. t. 97.*
Habitat in Europa et America, borealiori quoque Asia, Mon-golis sacra, 14 pollices longa; voltrum album; irides ob-ſcuræ; rectrices intus albae, extus obscure lineatae.

T 3

9. St.

fridula. 9. St. corpore ferrugineo, remige tertia longiore. *Fn. suec.* 77.

Scop. ann. I. p. 22. n. 12.

Strix. *Gesn. av.* 738. *Aldrov. orn.* 561. t. 563. *Raj. av.* p. 25. *Briss. av.* I. p. 500.

Chat huant. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 362. t. 25. *planch. enlum.* 437.

Brown Owl. *Albin. av.* I. t. 9.

Common brown or Joy Owl. *Will. orn.* p. 102. t. 14.

Tawny Owl. *Brit. zool.* n. 68. *Arct. zool.* 2. p. 237. B. *Lath. syn.* I. I. p. 139. n. 27.

Braune oder Stockeule, gelbliche oder braune Eule. *Frisch. av.* t. 96. 95.

Habitat in Europae et Tatariae australioris desertis, 19 uncias ponderans.

Caput ferrugineum, cum reliquo corpore supra maculis punctatisque obscurioribus; pectus et abdomen flavicant, albo intermixto, subtus striis obscuris; cauda maculis lineisque pallide ferrugineis et nigris.

Ulula. 10. St. corpore supra fusco albo-maculato, rectricibus fasciis linearibus albis. *Fn. suec.* 78. *Nozem. nederl. Vogel.* t. 33. 34.

Noctua major. *Briss. av.* I. p. 511.

Noctua faxatilis. *Gesn. av.* 622. *Aldr. orn.* I. p. 545.

Chouette ou grande Chevêche. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 372. t. 27. *planch. enlum.* 438.

Grey Owl. *Will. orn.* p. 103.

Great brown Owl. *Alb. av.* 3. t. 7.

Brown Owl. *Brit. zool.* n. 69. *Arct. zool.* p. 236. n. 125.

Lath. syn. I. I. p. 140. n. 28.

Steineule. *Frisch. av.* t. 98.

β. Noctua minor aucuparia. *Nozem. nederl. Vogel.* t. 37.

Habitat in Europa et nova terra, 14 pollices longa.

Irides castaneae; caput, alae et dorsum maculis nigris, humeri tecricesque alarum albis; pectus pallide cinereum, striis obscuris.

funerea. 11. St. corpore fusco, iridibus flavis. *Fn. suec.* 75.

Chat huant de Canada. *Briss. orn.* I. p. 518. n. 6. t. 37. f. 2.

Chouette ou grande Chevêche de Canada. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 391. n. 5.

Canada Owl. *Lath. syn.* I. I. p. 142. n. 29.

Habitat in Europa et America septentrionali.

Cor-

Corpus supra fuscum, maculis albis; caput supra atrum punctis albis; rostrum supra album; pectus et abdomen albida fasciis linearibus transversis; remiges 5 primores interiores ad marginem exteriorem non maculatae; rectrices fasciis angustis albidis: intermediis vix apice alben-tibus.

hudsonia. 34. St. corporis pennis supra fuscis margine albis, subtus al-bis, lineis transversis nigris, rostro iridibusque aurantiis.

Strix freti Hudsonis. Briff. orn. p. 151. n. 7.

Caparacoch. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 385. n. 2.

Little Hawk Owl. Edw. av. 2. t. 62.

Hawk Owl. Arct. zool. 2. p. 234. n. 123. Lath. syn. I. I.

p. 143. n. 30.

Habitat in freto Hudsonis, interdiu praedans, Niso vix major.

Vertex fuscus albo maculatus; facies alba, fusco intermis-to, nigro marginata; uropygium fuscum, fasciis pallidis; cauda alaque longae; an varietas funereae?

uralensis. 35. St. corpore albido, maculis in singularum pennarum me-dio longitudinalibus fuscis. Lepech. it. 2. t. 3. Pall. it. I.

p. 455.

Chouette à longue queue de Sibirie. Buff. planch. enl. 463.

Ural Owl. Lath. syn. I. I. p. 148. n. 37.

Habitat in montibus Uralensibus.

Rostrum cereum; irides palpebrae nigrae; orbitae cine-reae; uropygium album; cauda longa, cuneiformis; an varietas funereae?

accipitri- 36. St. corpore supra lutescente, subtus ex lutescente albo, li-na.

turris utrinque longitudinalibus nigris subtus gutta-

tis, iridibus citrinis. Pall. it. I. p. 455. n. 6. S. G. Gme-

lin. it. 2. p. 163. t. 9.

Caspian Owl. Lath. syn. I. I. p. 147. n. 36.

Habitat ad mare Caspium, ululae magnitudine.

Rostrum nigrum; alae subtus et crissum alba; remiges ex-tus lutescentes, intus albae, nigro tessellatae; cauda alis brevior rotundata, nigrans, lateribus albida; fasciata.

An varietas funereae?

javanica. 37. St. corpore cinereo hinc inde rufescente, maculis albis et nigris, subtus fordide albo hinc inde rufescente, maculis nigris. de Wurmb apud Lichtenberg Magaz. IV. 2. 10.

Habitat in Java.

- novae Seeländiae. 38. St. iridibus flavis, corpore supra fusco albo-maculato, subtus fulvo.
New Zealand Owl. *Lath. syn.* I. 1. p. 149. n. 39.
Habitat in nova Seelandia, passerinae magnitudine; rostro corneo apice nigro. Forster.
- cayennensis. 39. St. corpore rufo striato, transversim fusco undulato, iridibus flavis.
Chat huant de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 391. pl. entum. n. 442.
Cayenne Owl. *Lath. syn.* I. 1. p. 146. n. 35.
Habitat in Cayenna, magnitudine stridulæ; rostrum cornuum; unguis nigri.
- domini- 40. St. corpore subtus rufo, pectore parumper maculato.
cenis. Chouette ou grande Chevêche de S. Domingue. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 392. n. 6.
S. Domingo Owl. *Lath. syn.* I. 1. p. 146. n. 34.
Habitat in insula S. Dominici, ululae perquam affinis, rostro tamen majore, robustiore, magis aduncu distincta.
- Tolchi- 41. St. iridibus pallide flavis, corpore supra nigro, pallide flavo, albo, et fulvo vario, subtus albo.
quatl. Chouette du Mexique. *Briff. orn.* I. p. 524. n. 10.
Tolchiquatl. *Raj. av.* p. 160.
New Spain Owl. *Lath. syn.* I. 1. p. 145. n. 32.
Habitat in nova Hispania.
Rostrum, unguis, testrices alarum inferiores nigra.
- Chichic- 42. St. corpore fulvo, albo fusco et nigro vario, oculis nigris, palpebris caeruleis.
tli. Chat huant du Mexique. *Briff. orn.* I. p. 523. n. 9.
Chichetli. *Raj. av.* p. 160.
Mexican Owl. *Lath. syn.* I. 1. p. 144. n. 31.
Habitat in nova Hispania, gallinae magnitudine.
- acadica. 43. St. corpore supra spadiceo albo-maculato, subtus sordide albo ferrugineo intermixto.
Acadian Owl. *Lath. syn.* I. 1. p. 149. n. 38. t. V. f. 2.
Habitat in America Septentrionali, 7 pollices longa.
Rostrum fuscum; irides flavæ; vertex pallide maculatus; orbitæ cinereæ; digiti fusi.
- passerina. 44. St. remigibus maculis albis quinque ordinum, *Fn. suec.* 79.
Scop. ann. I. p. 22. n. 17.
Noctua minor. *Briff. av.* I. p. 514. *Raj. av.* p. 26. n. 6.
Noctua

- Noctua minima. *Gesn.* av. 620. *Aldrov. orn.* I. p. 543.
t. 544.
 Chevêche ou petite Chouette. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 377.
t. 28. planch. enlum. n. 439.
 Little Owl. *Brit. zool.* 2. p. 236. n. 126.
Albin. av. 2. t. 12. *Will. orn.* p. 105. t. 13. *Edw. av.*
39. t. 228. Lath. syn. I. I. p. 150. n. 40.
 Kleinstes Kaeuzlein. *Frisch.* av. t. 100.
 β . Noctua minor. *S. G. Gmelin nov. comm.* Petrop. XV. p. 447.
t. XII.
 Habitat in Europa et boreali America, solitaria, viginans
 vespertilionibus, muribus, gryllis, in coniferis nidificans,
 ova bina ponens, 7-8 pollices, $\beta.$ fere pedem longa.
 Rostrum ex albicante fuscum; caput, dorsum, tectricesque
 alarum dilute fuscum maculis albis; pectus albicans, fer-
 rugineo varium.

44. LANIUS. Rostrum rectiusculum, dente utrinque versus apicem, basi nudum.

Lingua lacera.

- forficatus. 1. L. cauda forficata, crista frontali erecta, corpore nigro-
 viridante.
 Drongo. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. p. 586.
 Gobe-mouche hupé de Madagascar. *Buff. planch. enlum.*
n. 189.
 Muscicapa madagascariensis nigra major cristata. *Briss. av.*
2. p. 388. n. 16. t. 37. f. 4.
 Fork-tailed crested Shrike. *Lath. syn.* I. I. p. 158. n. 1.
 Habitat in capite bonae spei, Madagascar, Sina, non sem-
 per cristata, 10 pollices longa; cauda longa.
 caeruleus. 2. L. cauda forficata, corpore nigro-caerulecente, abdomi-
 ne albo.
 Lanius bengalensis, cauda bifurca. *Briss. av.* 2. p. 89.
 Fingah. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 108.
 Fork-tailed Indian Butcher-Bird. *Edw. av.* t. 56.
 Fork-tailed Shrike. *Lath. syn.* I. I. p. 158. n. 2.
 Habitat in Bengala, cornices persequens, $7\frac{1}{2}$ pollices longus.
 Pectus obscure cinereum.
 castaneus. 5. L. cauda cuneiformi, rectricibus intermediis apice, extimis
 totis ferrugineis, corpore supra castaneo, subtus albo.

T 5

Cher-

Chernut backed Shrike. *Lath. syn. I. 1. p. 159. n. 3.*
Longitudo II pollicum; rostrum, alae, pedesque nigra;
frons ex atro fusca; vertex, occiput, nucha, cervix
cinerea.

eristatus. 3. *L. cauda cuneiformi, capite cristato, corpore rufescente*
subtus fulvo fuscoque undulato.

Lanius bengalensis rufus. Briff. av. 2. p. 173.
Crested red or rousset-coloured Butcher bird. Edw. av.
t. 54.

Crested red Shrike. *Lath. syn. I. 1. p. 134. n. 18.*
Habitat in Bengala, 6 $\frac{1}{2}$ pollices longus, non semper cristatus.
Rostrum cornuum; pone oculos lunula nigra; cauda supra
rufa, subtus grisea; pedes cum ungibus nigri.

canaden- 4. *L. cauda cuneiformi, capite cristato, corpore rufescente sub-*
tus albido.

Lanius canadensis. Briff. av. 2. p. 171. t. 18. f. 3.
Pie-griesche hupé de Canada. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 316.
pl. enlum. n. 479 f. 2.

Crested Shrike. *Arct. zool. 2. p. 239. n. 129. Lath. syn.*
I. 1. p. 182. n. 35.
Habitat in Canada, 6 $\frac{1}{2}$ pollices longus; rostrum unguisque
nigri; crista rubens; genae obscurae, maculis albis; ju-
gulum pectusque ex flavicante rubent; abdomen cinere-
um; rectrices alarum nigrae margine albo, cauda nigra,
albo-punctata.

ludovi- 6. *L. cauda cuneiformi cinereus, remigibus nigris basi rectri-*
cibusque apice albis.

Lanius canadensis. Briff. av. 2. p. 162. t. 15. f. 2.
Pie-griesche de la Louisiane. Buff. planch. enlum. n. 397.

- Louisiane Shrike. *Lath. syn. I. 1. p. 162. n. 5.*
Habitat in Ludovicia, excubitori et collurioni affinis.
Fascia sub oculis nigra; rectrices mediae 6, 6 totae nigrae,
reliquae basi apiceque albae; remiges secundariae apice
albae.

Nengeta. 7. *L. cauda cuneiformi apice alba, corpore cinereo subtus*
albido.

Cotinga cinerea. Briff. av. 2. p. 353.

Guiraru

Lanii accedunt ad accipitres laniana, ad picos moribus, ad passeris statura, adeo-
que tanquam inter hos medii; digitus medius articulo primo connexus.

- Guiraru Nhengeta. *Maregr. brasili.* 209.
 Guiraru Nheengeta brasiliensis. *Raj. av. p. 166. n. 5.*
 Guirarou. *Buff. hist. nat. des ois. 4. p. 459.*
 Guirarou or american Chat. *Will. orn. t. 235.*
 Grey Pye of Brasil. *Edw. av. t. 318.*
 Grey Shrike. *Lath. syn. I. 1. p. 183. n. 36.*
 ♂. Cotinga gris de Cayenne. *Buff. pl. entom. 699.*
 Variété du Guirarou. *Buff. hist. nat. des ois. 4. p. 461.*
*Habitat in Brasiliæ, Surinami, Gujanæ, Russiæ, Sibiræ
potissimum aquosæ gregarius, 9 pollices longus. Irides
sapphirinae; alæ et cauda nigricant.*
- curvirostris. 8. L. cauda cuneiformi, corpore albo, dorso nigro, remigibus primoribus quinque macula alba.
Collurio madagascariensis. Briff. av. 2. p. 191. t. 19. f. 1.
Ecorcheur de Madagascar. Buff. pl. entom. n. 228.
*Vanga ou Becarde à ventre blanc. Buff. hist. nat. des ois. I.
p. 312.*
 Hookbilled Shrike. *Lath. syn. I. 1. p. 171. n. 19.*
Habitat in Madagascar, fructibus vicitans, 10 pollices longus. Mandibulae inferioris apex reflexus, uti superioris; occiput ex nigro virescens; tectrices alarum majores oblique albo punctatae. Rectrices medietate interiore cinereæ, exteriore nigrae, apice albo; pedes plumbei; unguis nigricantes.
- collaris. 9. L. cauda cuneiformi, corpore nigro subtus albo, remigibus primoribus basi albis.
Lanius capitidis bonae speci. Briff. av. 2. p. 182. t. 15. f. 1.
*Pie-griesche du cap de bonne esperance. Buff. pl. entom.
n. 477. f. 1.*
 Collared Shrike. *Lath. syn. I. 1. p. 163. n. 7.*
*Habitat ad caput bonae speci, exhibitoris magnitudine, 12
fere pollices longus. Rostrum et caput nigricant; rectri-
ces, intermediis 4 exceptis, apice albae.*
- Iucionensis. 10. L. cauda cuneiformi, macula aurium nigra, rectricibus rufescientibus apice fusco-fasciatis.
Lanius lucionensis. Briff. av. 2. p. 169. t. 18. f. 1.
Luzonian Shrike. Lath. syn. I. 1. p. 172. n. 21.
Habitat in insula Luzonia, 7½ pollices longus.
*Rostrum et corpus supra ex griseo fuscum, subtus et ad la-
tera ex rufescente album lineatum.*

II. L.

- Excubitor. II. L. cauda cuneiformi lateribus alba, dorso cano, alis nigris macula alba. *Fn. suec.* 80. *Scop. ann.* I. p. 23. n. 18. *Brünnich orn.* 21. 22. *Nozeman nederl. Vog.* t. 63.
Lanius cinereus. *Briff. av.* 2. p. 141.
Lanius cinereus major. *Gesn. av.* 579. *Aldr. orn.* I. p. 384. t. 386. *Raj. av.* 18.
Ampelis caeruleofuscens, alis caudaque nigricantibus. *Fn. suec.* I. n. 181.
Castrica palombina. *Olin. uccell.* t. 41.
Pie-griete grise. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 296. t. 20. *pl. enlum.* 445.
 Greater Butcher bird or Mattagess. *Will. orn.* p. 87. t. 10. *Albin. av.* 2. t. 13.
 Great Shrike. *Brit. zool.* I. n. 71. t. 33. *Arct. zool.* 2. p. 238. n. 127. *Catesb. Carol. app.* p. 36.
 Great cinereous Shrike. *Lath. syn.* I. I. p. 160. n. 4.
 Neuntoeder. *Frisch. av.* t. 60.
 albus. β. L. corpore albo, pedibus flavicantibus, rostro unguibusque nigricantibus.
 major. γ. L. teetrichibus alarum minoribus, humerisque rufescientibus.
Lanius cinereus major. *Briff. orn.* p. 198. n. 2.
 Gesner's great Butcher-bird. *Will. orn.* p. 88.
 Groclerer Neuntoeder. *Frisch. av.* t. 59.
Habitat in Europa et boreali America, in silvis, inter primas veris aves; nidum ex gramine siccо et plumis struit, 7 ova caeruleofuscа fuscо-maculata ponit; praedam transfigit; accipitres adventantes observat, et aviculis indicare dicitur.
Rofstrum pedesque nigra; vertex cum cervice canus; genae albae, linea nigra; corpus subitus album; arcubus pallide fusca; teetriches alarum minores nigrae; rectrices nigrae et, exceptis intermediis 2, apice albo.
 Collurio. I2. L. cauda subcuneiformi, dorso griseo, rectrichibus quatuor intermediis unicoloribus, rostro plumbeo. *Fn. suec.* 81. *Scop. ann.* I. p. 24. n. 19. *Nozem. nederl. Vogel.* t. 65. *Günther Nest. n. Eyer.* t. 23.
Lanius minor rufus seu 3ius Aldrovandi. *Raj. av.* p. 18. A. 4.
Merulæ congenæ alia. *Raj. av.* p. 67. n. 13. *Will. orn.* p. 195. n. 3.
 Collurio. *Briff. av.* 2. p. 152.
Ecorcheur. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 304. t. 21. *planch. enlum.* n. 31. f. 2.

Lesser

- nigris
n. 18.
3.
2. 384.
Fn.
t. 20.
t. 10.
ol. 2.
usque
tibus.
r pri-
ruit,
edam
tis in-
genae
palli-
es ni-
atuor
c. 81.
t. 65.
o. 18.
orn.
anch.
Lesser
- Lesser Butcher bird, called in Yorkshire Flusher. *Will. orn.*
p. 88. Alb. av. 2. t. 14.
Red backed Shrike. *Brit. zool. I. n. 72. Arct. zool. 2.*
p. 240. n. 131. Lath. syn. I. 1. p. 167. n. 15.
- varius. $\beta.$ Collurio varius. *Briss. orn. p. 201. n. 5.*
Lesser variegated Butcher bird. *Will. orn. p. 189.*
Variegated Shrike. *Lath. syn. I. 1. p. 168. n. 16.*
- rufus. $\gamma.$ Lanius rufus. *Briss. orn. p. 199. n. 3.*
Lanius minor cinereiceps. *Raj. av. p. 19. A. 6.*
Ampelis dorso griseo, macula ad oculos longitudinali. *Fn.*
suec. I. n. 180. t. 2.
Ampelis tertia. *Kram. clencb. p. 363.*
Pie-griesche rousse. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 103. pl.*
enlum. n. 9. f. 2. et n. 31. f. 1.
An other Sort of Butcher bird. *Will. orn. p. 89. §. 4.*
Wood Chat. *Brit. zool. n. 73. Latham syn. I. 1. p. 169.*
n. 17.
- senega-
lenfis. $\delta.$ Pie-griesche rousse du Senegal. *Buff. planch. enl. n. 477.*
f. 2.
- melano-
cephalus. $\epsilon.$ Pie-griesche à tête noire du Senegal. *Buff. planch. enlum.*
n. 474.
Habitat in Europa, ♂. et ♀. ad Senegal fluvium, in dumetis
et sepibus nidum struens, in quo ova 6 alba versus finem
latiorem circulo ex rufescente fusco notata ponit; vicitat
insectis et aviculis; scarabaeos et grylos pruno spinosa per-
forat; cerebra avicularum effodit; sonis quoscunque imi-
tari gestiens, 7½ pollices longus.
- antigua-
nus. 29. L. cauda longa cuneiformi, corpore supra ex flavicante
rufo, subtus albo, capite, rostro, alis, pedibus cauda-
que supra nigris.
Pie-griesche d'Antigue. *Sonnerat it. p. 114. t. 70.*
Antiguan Shrike. *Lath. syn. I. 1. p. 171. n. 20.*
Habitat in insula Philippina, Panay, collurionis magnitu-
dine. Rostri magni mandibula superior longissima, valde
adunca; alae breves; rectrices 2 intermediae totae nigrae;
reliquae subtus rufescentes, apice rufo.
- niger. 30. L. niger, cauda subcuneiformi.
Black Shrike. *Lath. syn. I. 1. p. 187. n. 38.*
Habitat in Jamaica, 7 pollices longus, rostro pollicari, Ty-
ranni rostro multum simili.

Leveria. 31. L. cauda longa cuneiformi apice alba, rostro, capite, collo, pectoris medio, alis, pedibusque nigris, reliquis partibus albis.

Magpie Shrike. *Lath. syn. I. t. p. 192. n. 49.*

Turdi magnitudine; picae habitu et facie. Longitudo 10 pollicum; rectrices alarum majores, remigesque secundariae margine albo; rectrices 2 intermediae $4\frac{1}{2}$, reliquae 2 pollices longae.

atricapil- 32. L. cauda cuneiformi, et vertice, cervice, humeris aliquo-
lus. nigris, corpore supra murino, subtus ex caerulecente ci-
nereo. *Merrem Beytr. II. p. 30. t. X.*

*Habitat in Surinamo, carduelis magnitudine, longitudinem
5 pollicum vix superans; alae breves; rectrices alarum
remigesque secundariae margine albo; rectrices, exceptis
duabus intermediis, apice albo.*

pomera- 33. L. supra niger, subtus albus, occipite dorsoque colli sa-
nus. turate ferrugineis nigro circumdati, alarum maculis
utrinque duabus uryopygique albis. *Sparmann mus.
Carlson. n. I. t. I.*

*Habitat in Pomerania; rostrum, pedes, alaque nigrae;
remiges tamen 8 primariae basi albae; rectrices 2 inferio-
res et extimae albae; his proximae 2 vel 3 apice, nec non
a basi ad medium fere alblicant.*

Tyran- 13. L. cinereus, subtus albus, vertice nigro, stria longitudinali-
nus. fulva.

Muscicapa Tyrannus. Briff. av. 2. p. 391.

Tyran. Buff. pl. enlum. n. 537.

Tiriri ou Pipiri. Buff. hist. nat. des ois. 4. p. 572.

Kleiner americanischer Neuntoeder. Frisch. av. t. 62.

Tyrant Shrike. Lath. syn. I. t. p. 184. n. 37.

Tyrant Fly-catcher. Arct. zool. 2. p. 384. n. 263.

domini- β. Tyrannus dominicensis. *Briff. orn. 2. p. 394. n. 19. t. 18.
f. 2.*

Saint Domingo Tyrant. Lath. syn. I. t. p. 185. n. 37. A.

caroli- γ. Tyran de la Caroline. *Buff. hist. nat. des ois. 4. p. 577.
Gobe-mouche de la Caroline. Buff. pl. enlum. n. 676.*

*Tyrant of Carolina. Catesb. carol. I. p. 55. t. 55. Latham
syn. I. t. p. 186. n. 37. B.*

ludovi- δ. Tyran de la Louisiane. *Buff. hist. nat. des ois. 4. p. 579.
Gobe-mouche de la Louisiane. Buff. pl. enlum. n. 676.*

Loui-

Louisiana Tyrant. *Arct. zool.* 2. p. 385. n. 264. *Latb. syn.*

I. I. p. 186. n. 37. C.

Habitat in America septentrionali, B. insula S. Dominici et Jamaica, turdi magnitudine, 8 circiter pollices longus, in cavis arborum nidificans; ferox et audax, ita ut plures simul aquilam ipsam adoriantur, et pellant, femina incubante.

Rostrum et pedes cum unguibus ex nigricante fusca; irides fuscae; capitinis stria verticalis longitudinalis e pennis fulvis apice nigricantibus; cauda fusca, margine rufo. B. pectus cinereum; d. rostrum nigrum; pedes et corpus supra plumbeum; tectrices majores alarum remigesque margine albo; cauda extus et apice alba.

Schach. 14. L. lutescens fronde aliisque nigris.

Lanius A - seack. Osb. it. 227.

Chinese Shrike. Latb. syn. I. I. p. 173. n. 22.

Habitat in Sina. P. Osbek.

Magnitudo Tyranni; caput et collum supra griseum; collum subtus ex testaceo albido; dorsum et abdomen pallide testacea; remiges nigrae, primores basi albae, secundariae apice albantes.

Pitangua. 15. L. niger, subtus flavus, vertice stria fulva, fascia oculari alba.

Tyrannus brasiliensis. Briff. av. 2. p. 401. t. 36. f. 5.

Pitangua guacu. Maregr. bras. 216. Raj. av. 165.

Pitanga guacu or Bemtere. Will. orn. p. 198.

Bentaveo ou Cuiriri. Buff. hist. nat. des ois. 4. p. 579. t. 27.

Tyran du Brésil. Buff. pl. enlum. n. 212.

Brasilian Shrike. Latb. syn. I. I. p. 187. n. 39.

Habitat in Brasilia, 9 pollices longus.

Pone et infra oculos macula fusca; gula alba; pennae corporis supra tegentes margine flavo; alae subtus flavae; cauda fusca, margine rufo, subtus olivacea.

rufus. 17. L. rufus, subtus albus, capite nigro - virescente.

Lanius madagascariensis rufus. Briff. av. 2. p. 178. t. 18. f. 4.

Pie-griesche rousse de Madagascar. Buff. pl. enlum. n. 298. f. 2.

Schet-bé. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 313.

Rufous Shrike. Latb. syn. I. I. p. 180. n. 31.

Habitat in Madagascar; 8 fere pollices longus.

Rostrum

*Rostrum plumbeum; pedes cum unguibus cornicis; cauda rufa,
margini fusco; collum ex virecente nigrum, feminae anterius griseum.*

barbarus. 18. *L. niger*, subtus ruber, vertice femoribusque fulvis.

Lanius senegalensis ruber. *Briff. av. 2. p. 185. t. 17. f. 2.*
Gonolak. *Buff. hist. nat. des ois. 1. p. 314.*

Pie-griesche du Senegal. *Buff. pl. enlum. n. 56.*

Habitat in Senegal, 9 fere pollices longus.

Rostrum, alae, cauda, pedes et unguis nigra; caput, cer-
vix, crissum, et teetrices alarum inferiores flava.

sulphura- 19. *L. fuscus*, subtus flavus, capite nigricante: fascia ambi-

tus, albida.

Lanius cayanensis luteus. *Briff. av. 2. p. 176. t. 16. f. 4.*

Pie-griesche jaune de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 296.*

Becarde à ventre jaune. *Buff. hist. nat. des ois. 1. p. 312.*

Yellow-bellied Shrike. *Lath. syn. I. 1. p. 188. n. 40.*

Habitat in Cayenna, 9 fere pollices longus.

Gula jugulumque alba; pedes grisei; unguis et rostrum ni-
griantes; alae et cauda fuscae, margine rufo.

cayanus. 20. *L. cinereus*, capite remigibus rectricibusque primoribus

nigris.

Lanius cayanensis cinereus. *Briff. av. 2. p. 158. t. 14. f. 1.*

Pie-griesche grise de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 304.*

Becarde. *Buff. hist. nat. des ois. 1. p. 311.*

Cayenne Shrike. *Lath. syn. I. 1. p. 181. n. 41.*

naevius. 21. *Lanius cayennensis naevius.* *Buff. av. 2. p. 160. t. 14. f. 2.*

Pie-griesche tachetée de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 377.*

Habitat in Cayenna, 8½ pollices longus.

Rostrum basi rubrum, apice nigrum; pedes cinerei; unguis
nigri; 21. *per singularum peniarum longitudinem medium*
stria nigra.

senega- 21. *L. griseus*, subtus albidus, vertice fascia que oculari nigris,

rectricibus nigris apice albis.

Lanius senegalensis cinereus. *Briff. av. 2. p. 167. t. 17. f. 1.*

Pie-griesche grise du Senegal. *Buff. pl. enlum. n. 297. f. 1.*

Senegal Shrike. *Lath. syn. I. 1. p. 162. n. 6.*

Habitat in Senegal, 9 fere pollices longus.

Remiges latere exteriore rufae. *Rectrices 6: 6 fasciis obso-*
lete fusciis, apice concolores.

22. L.

- da rufa,
inae an-
- s.
f. 2.
- ut, cer-
- ambien-
- f. 4.
296.
312.
0.
- rum ni-
- noribus
4. f. 1.
04.
- bicolor.
4. f. 2.
n. 377.
- ungues
medium
- nigris,
7. f. 1.
7. f. 1.
- is obso-
22. L. cinereus subtus albidus, loris nigris, rectricibus rufescientibus.
- Lanius madagascariensis minor. Briss. av. 2. p. 264. t. 16. f. 1. 2.
- Cali-calic et Bruja. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 315.
- Petite pie-griesche de Madagascar. Buff. pl. enlum. n. 299. f. 1. 2.
- Madagascar Shrike. Lath. syn. I. I. p. 174. n. 24.
- Habitat in Madagascar, vix 5 pollices longus, passeris magnitudine.
- Macula nigra utrinque inter nares et oculos; alarum rectrices superiores rufae; rectrices maximam partem rufae. Mas gula juguloque nigro.
- Emeria. 23. L. griseus subtus albus temporibus uropygioque rubris.
- Lanius bengalensis fuscus. Briss. av. 2. p. 175. n. 14.
- Muscicapa Emeria. Syst. nat. X. I. p. 236. n. 7.
- Rouge-queue. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 309.
- Bengal Redstart. Albin. av. 3. p. 24. t. 56.
- Indian Redstart. Edw. av. 4. t. 190.
- Bengal Shrike. Lath. syn. I. I. p. 175. n. 25.
- Habitat in Bengala, $5\frac{1}{2}$ pollices longus.
- Rostrum ex cinereo fuscum; irides albidae; vertex et occiput nigra; abdomen et caudae rectrices superiores rubra; ad utrumque colli latus maculae 4 nigrae curvae; cauda pallide fusa; pedes cum unguibus nigri.
27. L. caeruleus subtus albus, capistro nigro. Mant. 1771. p. 124.
- Lanius madagascariensis caeruleus. Briss. av. 2. p. 197. t. 16. f. 3.
- Loxia madagascaria. Syst. nat. XII. I. p. 306. n. 42.
- Pie-griesche bleue de Madagascar. Buff. pl. enlum. n. 32. f. 2. n. 298. f. 1.
- Blue Shrike. Lath. syn. I. I. p. 178. n. 29.
- Habitat in Madagascar, vicitans insectis, $6\frac{1}{2}$ pollices longus.
- Rostrum, caput, margo remigum, rectrices 2 intermediae, margo 4 proximarum exterior caerulea; pennae rostrum cingentes, reiniges, basi excepta, rectrices extimae, pedes et unguis nigra; femina subtus sordide alba.
- leuco- 28. L. corpore supra nigrante, subtus albido, rostro, pecto-
rhyngchos, re, abdomine et uropygio albis.
- Lanius manillensis. Briss. av. 2. p. 180. n. 17. t. 18. f. 2.

U

Pie-

Pie-griesche de Manille. *Buff. pl. enlum. n. 9. f. I.*
 Longraien. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 310.*
 White-bellied Shrike. *Lath. syn. I. I. p. 181. n. 33.*
Habitat in Manilla, 7 pollices longus.
Alae, cauda, pedes et ungues nigricant.

- ferrugineus. 34. L. corpore supra ex fusco nigro, jugulo et pectori fordiste albis, abdomine ferrugineo.
Ferruginous bellied shrike. Lath. syn. I. I. p. 163. n. 8.
Habitat ad caput bonae spei, 9 pollices longus.
Rostrum plumbeum; cauda obscure fusca unicolor; pedes nigri.

- tabuensis. 35. L. corpore supra olivaceo, gula et pectori cinereis, abdome ex flavicante fulvo, cauda pedibusque fuscis.
Tabuan Shrike. Lath. syn. I. I. p. 164. n. 9.
Habitat in insulis amicis maris australis, 9 fere pollices longus.
Rostrum fuscum; vertex ex virescente, tempora ex olivaceo fusca; alae margine exteriore nigrae; remiges secundariae ex atro fuscae margine fordiste albo.

- pacificus. 36. L. niger, capite colloque in virescentem colorem vergentibus, abdomine et cauda magis obscuris.
Pacific Shrike. Lath. syn. I. I. p. 164. n. 10.
Habitat in insulis maris australis, 11 pollices longus.
Rostrum obscurum, $\frac{3}{4}$ pollicem longum; capitidis collique penae valde angustae; cauda 3 pollices longa; digiti ad oratum discreti, medius longissimus.

- septentrionalis. 37. L. rostro nigro, pedibus plumbeis, corpore supra fusco, gula et pectori cinereis, abdomine crisoque virescentibus.
Northern Shrike. Lath. syn. I. I. p. 165. n. 11.
Habitat in America septentrionali, fere 8 pollices longus.
Nares rotundae, parvae; ad basin mandibulae superioris setae 5-6 nigrae; rectrices 4 intermediae fuscae unicolores, reliquae intus apice albae, omnes 2 pollices longae; pedes breves; ungues robusti, fusi.

- viridis. 38. L. capite, alis et corpore supra obscure viridibus, hoc subtus albo, cauda nigra.
Lanius madagascariensis minor viridis. Briff. av. 2. p. 195. n. 25. t. 15. f. 2.
Tcha-chert. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 310.

Pic

Pie grecche de Madagascar. *Buff. pl. enlum. n. 32. f. 2.*

Green Shrike. *Lath. syn. I. I. p. 179. n. 30.*

Habitat in Madagascar, 6 fere pollices longus.

Alae longae; rectrices 2 intermediae obscure virides, reliquae margine exteriori; pedes unguesque nigri.

fordide

n. 8.

pedes

, abdo-

longus.

livaceo-

cunda-

vergen-

ue pen-

ad or-

fusco,

cescen-

gus.

erioris

unico-

ngae;

, hoc

. 195.

Pie

leucoce- 39. *L. albus, corpore supra ex virecente nigro, canda supra phalos.* ex virecente atro, subtus nigro, rostro, pedibus et unguibus plumbeis.

Lanius madagascariensis major viridis. Briff. av. 2. n. 24. t. 19. f. 2.

Grande pie-griesche verdâtre de Madagascar. *Buff. planch. enlum. n. 374.*

Tchah-chert-be. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 314.

White-headed Shrike. Lath. syn. I. I. p. 180. n. 32.

Habitat in Madagascar, rufo affinis, 8 pollices longus.

domini- 40. *L. niger, abdomine et uropygio albis.* canus. Pie-griesche Dominicaine. *Sonnerat it. p. 55. t. 26.*

Habitat in insulis philippinis, velocissime volans, audax, corvis potissimum infestus; an mera leucorhynchi varietas? passere major.

Rostrum cinereum, robustum, conicum, basi setis munitum.

panayen- 41. *L. rostro pedibusque nigris, capite, gula, jugulo, pecto- sis.* re et abdomine rubris, cervice, alis caudaque fusca. Pie-griesche rouge de l'isle de Panay. *Sonnerat it. p. 114. t. 70.*

Habitat in insula Panay, collurionis magnitudine; irides igneae.

albus. 42. *L. albus, rostro, cauda, pedibus, et plurima alarum parte nigris.* Pie-griesche blanche de l'isle de Panay. *Sonner. it. p. 115. t. 72.*

Habitat in insula Panay, collurione rufo duplo major; remiges majores fascia alba.

varius. 43. *L. corpore supra ex cinereo fusco, gula et pectore ex bu- bali colore flavo, abdomine, uropygio et crasso fordide ex fuscescente albo, interscapulis albis, cauda alisque fusca.*

White-shouldered Shrike. Lath. syn. I. I. p. 190. n. 43.

Habitat in Brasilia. Pennant.

Rostrum pedesque nigri; frons genaeque maculis pallidioribus.

U 2

44. L.

nævius. 44. L. corpore supra nigro, subtus cinereo, tectricibus alarum singulis macula oblonga alba.

Spotted Shrike. *Lath. syn. I. 1. p. 190. n. 45.*

Habitat in Cayenna, doliato similis, sed minor.

Rostrum pedesque nigri; paucae pennae ad exortum dorso apice albo; remiges margine albo; rectrices apice albo.

obscurus. 45. L. corpore supra obscure atro, subtus albo, supercilio albo, pedibus fuscis.

Dusky Shrike. *Lath. syn. I. 1. p. 191. n. 46.*

Nævio aequalis; rostrum corneum; alae cum cauda obscuriores; pedes fusi.

fusca. 46. L. corpore supra fusco, subtus albo, area inter rostrum oculosque, apice remigum secundariarum, margineque primariarum flavicantibus.

Brown Shrike. *Lath. syn. I. 1. p. 191. n. 47.*

Magnitudo Piprae; rostrum corneum, apice nigrum; pedes nigri.

rubra. 47. L. ruber, alis caudaque ocellatis apice nigris.

Red Lanius or Butcher bird of Surinam. *Bancr. Gujan. p. 154.*

Red Shrike. *Lath. syn. I. 1. p. 192. n. 48.*

Habitat in Surinamo.

america- 48. L. niger, remigum primorum macula, genis gulaque albinus, pectoro et abdomine cinereis.

Black-crowned Shrike. *Arct. zool. 2. p. 238. n. 128.*

Habitat in America septentrionali, Excubitore minor, ludoviciano affinis.

Cauda longa; rectrices intermediae totae nigrae; reliquæ apice albo, albedine versus exteriora nigredinem sensim fere dolente.

minor. 49. L. cinereus, gula alba, pectoro et abdomine roseis, fronte, linea oculari caudaque nigris.

Pie-grieche d'Italie. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 298. pl. enium. n. 32.*

Habitat in Italia, Hispania, Russia, nengetae affinis.

Remiges nigrae; primariae macula ad basin, secundariae apice albo; rectrices extimae albae.

50. L.

- alarum Natka. 50. L. cauda rotundata, vertice et corpore supra nigro, hoc sub-
tus albo, torque albo.
Natka Shrike. *Arct. zool.* 2. p. 239. n. 130.
Habitat in finu Natka Americae septentrionalis ultra 7 pol-
lices longus.
Rostrum pedesque nigri; supra oculos linea alba ad nucham
protensa; infra hanc alta nigra; tectrices alarum mino-
res nigrae, majores albæ; remiges primarie obscuræ,
marginæ ex flavicante fusco; secundariae nigrae, mar-
ginæ et apice albæ; rectrices nigrae, & extimæ apice al-
bo. Latham.
- n dorſi
albo. melano- 51. L. rostro, capite, gulaque nigris, corpore olivaceo sub-
cephalos. tus pallidiore, cauda fascia lata nigra, apice flava.
Black-headed Shrike. *Lath. syn.* I. 1. p. 165. n. 12. t. VI.
Habitat in insulis Sandwich maris australis, 6 circiter polli-
ces longus; pedes obscuri.
- ilio al- obſcu-
re. melano- 52. L. capite supra & ferrugineo griseo superciliis albidis, fas-
rus. cia nigra per oculos ad aures ducta, corpore supra ex griseo
cristato, subtus ex lutescente albido, cauda rotunda-
ta. *Pall. it.* 3. p. 693. n. 5.
Short tailed Shrike. *Lath. syn.* I. 1. p. 166. n. 13.
Habitat rario in Dauuriae rupeſtribus, collurionis magni-
tudine.
Uropygium subferrugineum; gula et crissum fere albæ;
alæ nigricantes, tectricum apice griseo; rectrices 10 ex
griseo fuscae, praeter medias apice albæ.
- Gujan. que al- phoeni- 53. L. fascia per oculos nigricante, corpore supra ex griseo ru-
curus. fuscente, subtus ex lutescente albido, cauda longa rotun-
data et uropygio intense rufis. *Pall. it.* 3. p. 693. n. 6.
Rufous tailed Shrike. *Lath. syn.* I. 1. p. 166. n. 14.
Habitat in rupeſtribus ad Ononem, Collurionis magnitudine
et facie.
- , ludo- doliatuſ. 16. L. cauda rotundata, corpore albo nigroque confertim sub-
fasciato. *Mus. Ad. Frid.* 2. p. 12.
Lanius cayennensis striatus. *Briff. av.* 2. p. 187. n. 21. t. 29.
f. 3.
Pic-griesche rayée de Cayenne. *Buff. planch. enlum.* n. 297.
f. 2.

U 3

Black

Black and white Butcher-bird. *Edw. av. 5. p. 35. t. 226.*
Pied Shrike. Lath. syn. I. I. p. 190. n. 44.

Habitat in Cayenna, 6½ pollices longus.

*Rostrum obscurum; pedes et unguis fuscus; singulae pennae
 fasciis albis et nigris; capitum longiora albae apice nigrae,
 quas dum erigit, cristatus apparet; ales cum cauda ni-
 grae, maculis transversis albis.*

jocosus. 24. *L. cauda rotundata, corpore griseo, palpebra inferiore
 purpurea, ano sanguinco. Amoen. acad. 4. p. 238.*

Merula sinensis cristata minor. Briss. av. 2. p. 255. t. 21. f. 2.

Jocose Shrike. Lath. syn. I. I. p. 175. n. 26.

*Habitat in Sina, alaudae magnitudine, 7½ pollices longus.
 Osbeck.*

*Vertex niger; tempora, gula et jugulum alba; abdomen
 albicans; cauda fusca, rectrices 4 exteriores apice albo;
 pedes cum unguibus nigri; rostrum magis rectum, quam
 in reliquis, sed utrinque intra apicem emarginatum.*

inaustus. 25. *L. dorso cinereo, rectricibus rufis, intermediis duabus ci-
 nereis fascia nigricante, cauda rotundata.*

Corvus infaustus. En. suec. 93. Brünn. orn. p. 10.

Corvus russicus. S. G. Gmelin it. I. p. 50.

*Merula faxatilis. Gesn. av. 732. Raj. av. p. 68. n. 3. Briss.
 av. 2. p. 238.*

*Merle de roche. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 351. t. 23. pl.
 entum. n. 562.*

Codirosso maggiore. Olin. acc. t. 47.

*Greater Redlart. Alb. av. 3. p. 51. t. 55. Will. orn. p. 197.
 t. 36.*

Rock Shrike. Lath. syn. I. I. p. 176. n. 27.

minor. β. *Turdus faxatilis. Syst. nat. XII. I. p. 294. n. 14.*

Merula faxatilis minor. Briss. av. 2. p. 240.

Petrococephalus. Gesn. av. 767.

Blaukoepfige rothe Amsel. Friesch. av. t. 32.

*Habitat in omnis Europae, regionis quoque Uralensis silvis
 desertis, alpinis, turdis corvisque satis affinis; moribus
 ratiem lani, protervus, comedentes peregrinatores saepe
 adiens, carnesque disjectas rapiens, ceterum vermicibus et
 insectis vicitans, pullosque nutritius; nidum in rupium
 caver-*

226.

ennae
igrae,
da ni-

eriore

l.f. 2.

ngus.

omen
albo;
quam

us ci-

Briff.

., pl.

197.

cavernis inaccessis struens, in coque 3 - 4 ova ponens;
cantu grato. Longitudo fere 8 pollicum, β. minor.

Rostrum fere pollicare, nigricans, utrinque emarginatum;
pedes et alae similiter nigricant; cauda 3 pollices longa,
rectricibus 2 intermediis fuscis, reliquis rufis; caput et
collum obscure (in β. ex caerulecente) cinerea; maculis
exiguis rufis et fuscis; superior dorfi pars obscure fusca
(in β. nigricans, rufo et ex caerulecente cinereo mista),
inferior cinerea (in β. et alba); pectus et abdomen au-
rantia, maculis parvis albis fuscisque; pennarum radii
taxi. An turdi species, forte saxatilis?

faustus. 26. L. griseus, subtus ferrugineus, lineola alba pone oculos,
cauda rotundata. Amoen. acad. 4. p. 241.

White wreathed Shrike. Lath. syn. I. 1. p. 178. n. 28.

Habitat in Sina, turdi pilaris magnitudine.
Rostrum cum pedibus pallidum; alae rotundatae; remiges
subfuscæ, marginibus griseis, lineis obsoletis fuscis de-
cussantibus; cauda fusca, similiter lineata.

II. PICAE.

Rostrum subcompressum convexum.

45. PSITTACUS. *Rostrum aduncum: mandibula superiori mobili, cera (in multis) instructa.*

Nares in rostri basi rotundae.

Lingua carnosa obtusa integra.

Pedes scandorii.

* *Macroura, cauda cuneiformi.*

Macao. I. *Ps. ruber, remigibus supra caeruleis, subtus rufis, pennis scapularibus caeruleo et viridi variis, genis nudis rugosis.* Scop. orn. I. p. 26.

Ara brasiliensis. Briff. av. 4. p. 184. t. 19. f. 1.

Psittacus maximus alter. Aldr. orn. I. p. 665. t. 666. Raj. av. p. 29. n. 2.

Ara premier. Fermin Surin. 2. p. 173.

Ara rouge. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 179. planch. enlum. n. 12.

Maccaw. Albin. av. I. p. II. t. II. Will. orn. p. 73.

Red and blue Maccaw. Edw. av. 158. t. 158. Bancr. Guj. p. 156. Latb. syn. I. I. p. 199. n. 1.

Habitat in America meridionali, ulnam longe superans. Nidificat in silvis palmiferis, quarum fructibus potissimum vivitat, in arboribus cavis, binz ova ponens, magnitudine columbinorum, facie ovorum perdricis; bis in anno pruriunt, mare et femina alternatim incubante; junior facile cicurandus, non item adulter; caro comeditur, quamvis dura et insipida.

Corpus magnitudine gallinae, coccineum; rostri mandibula superior alba, inferior nigra; tempora alba; remiges postissimum exteiiores caeruleae, telectricibus pluribus luteis; cauda longissima, rubra, rectricibus lateralibus caeruleis.

52. Ps.

Psittacus omnibus proprium, quod eis lingua latior, quam ceteris avibus. Plin.

Aracanga. 52. Ps. dilute coccineus, pennis scapularibus luteis viridi terminatis, remigibus supra caeruleis, subtus rufis, genis nudis rugosis.

Ara jamaicensis. Briss. av. 4. p. 188. n. 2.

Psittacus erythroxanthus. Gesn. av. 721. Aldr. orn. I. p. 683.

Araeanga. Marcgr. bras. 206. Raj. av. p. 29. n. 3.

Petit Ara rouge. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 180. planch. enlum. n. 641.

Maccaw from Jamaica. Alb. av. 2. t. 17. Brown jam. p. 472.

Maccaw called Aracanga. Will. orn. p. III.

Red and yellow Maccaw. Bancr. Gujan. p. 156. Lath. syn. I. I. p. 201. n. 2.

Habitat in Guiana, Brasilia, Jamaica, praecedenti aequalis.

Rectrices supra coccineae, violaceo admisto, infra obscurae rubrae; 2 intermediae utrinque in prima medietate obscurae rubrae.

militaris. 2. Ps. viridis, alis caeruleis, fronte caudaque rubris, genis nudis lineis plumosis.

Largett Guiana Parrot. Bancr. Guj. p. 158.

Great green Maccaw. Edw. av. t. 313.

Military Maccaw. Lath. syn. I. I. p. 202. n. 3.

Rostrum nigrum; uropygium, rectricumque apices caerulei.

Ararauna. 3. Ps. supra caeruleus subtus luteus, genis nudis: lineis plu-

mosis.

Ara brasiliensis cyano-crocea. Briss. av. 4. p. 193. t. 20.

Psittacus maximus cyano-croceus. Aldrov. orn. I. p. 664.

Raj. av. p. 28. I. p. 181. 5. Sloan. jam. 2. p. 296.

Ara bleu. Ferm. Surinam. 2. p. 174. Buff. hist. nat. des ois.

6. p. 191. planch. enlum. n. 36.

Ararauna. Marcgr. bras. 206. Alb. av. 3. p. 10. t. 10, et 2. p. 16. t. 17.

Aldrov. blue and yellow Maccaw et brasiliian Ararauna. Will. orn. p. 110. n. 1. et III. n. 4. t. 15.

Blue and yellow Maccaw. Edw. av. 159. t. 159. Latham syn. I. I. p. 204. n. 4.

Psittaci capite magno, vertice plano, monogami per parva incedunt pedibus brevibus, garruli, dociles, longaevi; videntur in primis nucibus, glandibus, cucurbitae, carthamus feminibus, in patria saepe edules; scandunt rostro, irati penas erigunt; inter apes simiae; ex regionibus borealibus exulant, ad 34° latitudinis obvii; 25° utrinque ab aequatore distantia frequentissimi.

caeru-
latus. **β.** Psittacus maximus caeruleus varius, cauda producta. Brown.
jam. p. 272.

Ara jamaicensis cyaneo-crocea. Briss. av. 4. p. 191. n. 3.
Blue Maccaw. Alb. av. 3. t. 10. Lath. syn. I. I. p. 205.
n. 4. A.

*Habitat in Jamaica, Guiana, Brasilia, Surinamo, aequalis
cum praecedentibus magnitudinis.*

Caerulea supra collum, dorsum, alas, caudam, subtus col-
lo, pectori, abdomine; cauda lutea feminae, rubra mari-
ni; nigra rostrum et gula; palpebrae serratae papilis ni-
gris; tempora nuda alba, lineata (non in β) punctis plu-
miosis caeruleo-nigris.

Makawu-
anna. **53.** Ps. supra obscure viridis, capite viridi caeruleo admisto,
gula, jugulo et pectoris parte superiore rufescens, ex rubeo.
pectoris parte inferiore et abdome viridibus, uropygio

Perruche ara. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 277.

Perruche ara de Cayenne. Buff. pl. entom. n. 864. Barrer.
Fr. équin. p. 145.

Parrot Maccaw. Lath. syn. I. I. p. 205. n. 5.

*Habitat in Cayenna et Guiana, migratorius, 18 pollices
longus.*

Genae nuda; cauda 9 pollices longa, alaque supra obscure,
subtus ex flavecente virides.

ater. **54.** Ps. niger cum splendore viridi, rostro oculisque rubenti-
bus, pedibus flavis.

Ara noir. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 202.

Ararauna ou Machao. de Laët descr. des ind. orient. p. 490.
Black Maccaw. Lath. syn. I. I. p. 206. n. 6.

*Habitat in Gujanæ partibus interioribus incultis, in rupium
montiumque aridorum et steriliuum cacumine.*

obscurus. **4.** Ps. fuscus, genis nudis rubris, vertice cinereo-nigrescente
vario, cauda cinerea. Hasselq. it. 236.

Obscure Parrot. Lath. syn. I. I. p. 206. n. 7.

Habitat in Africa, picac magnitudine.

Rostrum et capitulum, pedes et unguis nigra; orbitae al-
vae; irides flavæ; cervix et alae supra nigrae; abdomen
cinereum.

nobilis. **5.** Ps. viridis, genis nudis, humeris coccineis. Mus. Ad. Frid.
2. p. 13.

Noble Parrot. Lath. syn. I. I. p. 207. n. 8.

Habi-

Brown.
n. 3.
205.
equalis
us col-
ra ma-
llis ni-
lis plu-
lmisto,
ntibus,
opygio
Sarrer.
pollices
fscure,
ibenti-
490.
upium
fcente
japoni-
tae al-
lomen
.Frid.
Habi-

Habitat in Surinamo, turturis magnitudine.
Facies nuda, alba.

- severus. 6. Ps. viridis, genis nudis, remigibus rectricibusque caeruleis subtus purpurascens. *Mus. Ad. Fr.* I. p. 13. *Scop. ann.* I. p. 27. n. 23.
Ara brasiliensis viridis. *Briff. av.* 4. p. 198. n. 6.
Maracana. Maregr. bras. 207. *Will. orn.* p. 112. n. 5. 6.
Raj. av. p. 29. n. 5. *Sloan. jam.* 2. p. 297.
Ara vert. Buff. hist. nat. des oif. 6. p. 194. t. 8.
Ara vert du Brésil. Buff. pl. enlum. n. 383.
Brasilian green Maccaw. Edw. av. 41. t. 229. *Lath. syn.*
I. I. p. 208. n. 9.
β. *Ara brasiliensis erythrochlora.* *Briff. av.* 4. p. 198. n. 7.
Habitat in Jamaica, Guiana, Brafilia, 5 circiter pollicibus pedem longitudine superans.
Kotrum, unguis, et genarum lineae nigra; irides aureae;
pennae virides, in β. obscurius; frons ex castaneo pur-
purascens, in β. fusca, vertex caeruleus, in β. magis in
viridem vergens; cauda supra viridis, versus apicem cae-
ruea; pedes fisci.
- Eupatria. 7. Ps. viridis, genis nudis, humeris coccineis, rostro purpureo.
Psittaca ginginiana. *Briff. av.* 4. p. 343. n. 64. t. 29. f. I.
Perruche de Gingi. Buff. pl. enlum. n. 239.
Grande perruche à ailes rougeatres. Buff. hist. nat. des oif. 6.
p. 156.
Gingi Parrot. Lath. syn. I. I. p. 209. n. 10.
Habitat in regno Gingi Indiae, 21 pollices longus.
Orbitae nudae rubicundae; corpus supra ex olivaceo profun-
de viride, subtus pallide virens flavescente admisto; gula
jugulumque cinerascens; cauda et alae, exceptis telectricibus
superioribus rubris, virides; pedes rubentes; unguis
nigri.
- japonicus. 8. Ps. viridis, subtus rectricibusque lateralibus ruber, remigibus caeruleis.
Psittacus erythrochlorus macrourus. *Aldr. orn.* I. p. 678.
t. 681. Raj. av. p. 34. n. 3.
Psittaca japonensis. Briff. av. 4. p. 362. n. 71.
Perruche verte et rouge. Buff. hist. nat. des oif. 6. p. 159.
Red and yellow or pale green Parrot of Aldrovandus. Will.
orn. p. 116.
Japoneis Parrot. Lath. syn. I. I. p. 209. n. 11.

Habi-

*Habitat in Japonia, non tamen boreali; quae psittacis caret.
Cauda corpore longior, rectricibus 2 intermediis viridibus
scapis albis, reliquis rubris scapis nigris; rostrum et irides
rubent; macula ante et pone oculum, et intercapitulum
caeruleum; gula ex ferrugineo rubra; corpus sub-
tus lineis longitudinalibus nigris; pedes et ungues nigri.*

amboi- 9. *Pf. coccineus, dorso caeruleo, alis macula viridi.*
nensis. *Psittaca amboinensis coccinea. Briss. av. 4. p. 378. t. 28. f. 2.*

Lori Perruche tricolor. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 138.

Perruche rouge d' Amboine. Buff. pl. enlum. n. 240.

Amboina red Parrot. Lath. syn. I. 1. p. 210. n. 12.

Habitat in Amboina, 15½ pollices longus.

*Rostrum, pedes et ungues rubri, illud apice nigrum; rectri-
ces caudae inferiores medio violaceae, rectrices 2 inter-
mediae ex violaceo fuscae 9½ pollices, extimae binae vivi
6 pollices longae, margine interiore rubro.*

cyanoce- 10. *Pf. viridis, capite gulaque caeruleis.*
phalus. *Psittaca cyanocephala. Briss. av. 4. p. 359. t. 19. f. 2.*

Perruche à tête bleue. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 145.

*Perruche à tête bleue des Indes orientales. Buff. pl. enlum.
n. 192.*

Blue-headed Parrot. Lath. syn. I. 1. p. 211. n. 13.

Habitat in India, 11½ pollices longus.

*Mandibula superior flava, apice cinerascente, inferior cine-
rascens; area oculorum nuda flavicans; corpus subtus ex
viridi flavicans; gula violacea in caeruleum vergens; colli
latera lutea; alae subtus cinereae; cauda subtus ex flavi-
cante cinerea; pedes caerulefentes; ungues grisei.*

haemato- 50. *Pf. corpore supra viridi, jugulo et pectore aurantio, pen-
tus. narum margine caeruleo, abdomine caudaque viridibus.*

Mant. 1771. p. 574.

Psittaca amboinensis varia. Briss. av. 4. p. 364. n. 72.

Perruche à face bleue. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 150.

Perruche d' Amboine. Buff. pl. enlum. n. 61.

Red breasted Parrakeet. Edw. glean. t. 232.

Red breasted Parrot. Lath. syn. I. 1. p. 212. n. 14.

molucca- β. *Perruche des Moluques. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 150.*
nus. *pl. enlum. n. 743.*

novae γ. *Blue-bellied Parrot. Brown Illustr. p. 14. t. 7.*

Hollan- *Habitat in Amboina, γ. in nova Hollandia; 11, β. 10, γ. 15*
dia. *pollices longus.*

Rostrum

Rostrum ex flavicante, $\beta.$ ex rubicundo album, $\gamma.$ rubicundum, cera flavicante; capistrum et pars verticis, $\beta.$ totum caput, $\gamma.$ caput collumque caerulea; occipite tamen virecente; pectus $\beta.$ et $\gamma.$ rubrum flavo admiso; abdomen $\gamma.$ caeruleum, $\beta.$ macula caerulea notatum.

- atricapil- 55. Ps. supra caeruleus, gula, jugulo pectoraque rubris, abdo-
lus. minie crisoque viridibus, vertice nigro, torque viridi et
rubro.

Ara moluccensis varia. Briss. av. 4. p. 197. n. 5.
Psittacus orientalis exquisitus Loeri dictus. Seb. thes. I. p. 63;
f. 4.

Psittacus capite nigro, collari viridi. Klein av. p. 25. n. 16.
Grande perruche à bandeau noir. Buff. hist. nat. des ois. 6.
p. 158.

Habitat in Moluccis, 14 pollices longus.
Alae, teetricesque caudae superiores caeruleae, inferiores
virides rubro variae; cauda supra viridis, subtus rubra
margine nigro.

- tabuen- 56. Ps. capite, collo, pectoro et abdome purpureis, dorso
sis. et teetribus alarum viridibus, lunula cervicem terminan-
te, remigibus primariis caudaeque maxima parte caeruleis.

Tabuan Parrot. Lath. syn. I. I. p. 214. n. 16 t. 7.
Habitat in insulis amicis maris australis, 19 pollices longus.
Rostrum nigrum, mandibulæ inferioris basis pennis viridi-
bus cincta; alae spuriae caeruleae; remiges secundariae
virides margine caeruleo; rectrices 2 intermediae 8 polli-
ces longae caeruleae, margine et apice viridi; reliquæ
caeruleæ scapis nigris; pedes obscuri.

- papuen- 57. Ps. capite collo et pectoro rubris, occipitis macula caerulea lunulisque duabus nigris, alis dorsique parte viridi-
bus, cetera dorfi parte, abdome et caudae apice rubris.

Petit Lori Papon, Sonnerat it. p. 175. t. III.

Papuan Lory. Lath. syn. I. I. p. 215. n. 17.

$\beta.$ Psittacus taenia abdominis transversa nigra margine viridi.
 $\gamma.$ Psittacus coccineus, cauda breviore, dorfi parte posteriore
ex caeruleo atra, macula inter alas lutea.

$\delta.$ Ps. abdominis medio viridi.

Habitat in Papua, 16 pollices longus.

Rostrum rubrum; alae breves; dorsum posterius stria longi-
tudinali media caerulea; ad utrumque alarum latus ma-
cula oblonga lutea; caudae $\frac{2}{3}$ virides, reliquum luteum;
pedes rubri.

II. Ps.

care.
ridibus
et iri-
rcapu-
is sub-
nigri.

8. f. 2.
38.

teetri-
inter-
vae viv

45.
enlum.

r cine-
btus ex
; colli-
e flavi-

, pen-
ridibus.

50.

p. 150.

, $\gamma.$ 15
oftrum



borneus. II. *Ps. ruber*, remigibus rectricibusque apice viridibus, alis macula caerulea, orbitis fusca.

Psittaca coccinea bonarum fortunarum insulae. *Briff. av. 4.* p. 373. n. 77.

Lori Perruche rouge Nr. 1. *Buff. hist. nat. des ois. 6.* p. 137.
Longtailed Scarlet Lory. *Edw. av. 173.* t. 173. *Lath. syn. I. 1.* p. 216. n. 18.

Habitat in India, 9½ pollices longus.

Rostrum aurantium; orbitae nudae; remiges pecten et viridibus inclinant; rectrices caudae inferiores rubrae, margine caeruleo.

indicus. 58. *Ps. coccineus*, fusco et violaceo variegatus, capite et collo superioribus, pectore et taenia pone oculos violaceis, rectricum majorum apice dilute fusco, minorum rectricibusque ex fusco violaceis.

Psittaca indica coccinea. *Briff. av. 4.* p. 376. t. 25. f. 2.

Lori Perruche violet et rouge Nr. 2. *Buff. hist. nat. des ois. 6.* p. 138.

Perruche des Indes orientales. *Buff. pl. entum. n. 143.*

Indian Lory. *Lath. syn. I. 1.* p. 217. n. 19.

Habitat in Amboina, 11 fere pollices longus.

Rostrum rubicundum, apice nigro; pedes et ungues fusci.

elegans. 59. *Ps. capite, collo et corpore subtus rubro, supra fusco, intercapulis pallide caeruleis rubro mixtis, cauda ex viridante fusca, apice albicante.*

Beautiful Lory. *Lath. syn. I. 1.* p. 217. n. 20.

β. *Ps. alis, cauda et corpore supra viridibus.* *Lath. syn. I. 1.* p. 218.

Longitudo 15 (β. 12) pollicum; rostrum ex flavicante fuscum, β. plumbeum, apice flavo.

guebien- 60. *Ps. splendide ruber, remigibus nigris transversim fasciatis, cauda ex rubro fusca.*

Petit Lory de Guéby. *Sonner. it.* p. 174. t. 109.

Lori rouge et violet. *Buff. hist. nat. des ois. 6.* p. 135.

Lori de Guéby. *Buff. pl. entum. n. 684.*

Gueby Lory. *Lath. syn. I. 1.* p. 219. n. 21.

Habitat in insula Gueby, amazono dimidio minor, 9½ pollices longus.

Rostrum et irides igneae; fascia alarum rubra; annulus purpureus a cervice ad pectus progrediens.

61. *Ps.*

- s, alis
av. 4.
p. 137.
b. syn.
caeruleum
iridem
argine
t collo
is, re-
electri-
. 2.
soif. 6.
3.
usci.
co, in-
x viri-
. I. I.
te fuf-
fascia-
5.
1/2 pol-
us pur-
II. Pf.
- janthi- 61. Pf. capite et corpore supra rubro, subtus violaceo, hume-
nus. ris caeruleis, cauda alisque viridibus et rubris.
Perroquet violet. *Ferm. Surin.* 2. p. 175.
Habitat in Amazoniae littore.
Rostrum nigrum; irides aureae.
- variega- 62. Pf. coccineus, nucha, dorfi initio, pectori et abdomino
tus. purpureo-caeruleis, alis supra rubris, subtus flavis, cau-
da viridi.
Variegated Lory. *Lath. syn. I. I. p. 220. n. 22.*
Habitat in India, 10-11 pollices longus.
Rostrum obscurum; color abdominis posterioris in virescen-
tia nigrum vergens; rectrices basi intus rubicundae, versus
apicem extus caeruleae.
- novae 63. Pf. niger cum splendore caeruleo, cauda subtus rubra, or-
Guineae. bitis nudis fulcis.
Lori noir de la nouvelle Guinée. *Sonner. it. p. 175. t. III.*
Forrest it. p. 133.
Black Lory. *Lath. syn. I. I. p. 221. n. 23.*
Habitat in nova Guinea.
Rostrum pedesque nigricantes; irides circulis duobus, altero
caeruleo, altero minori ex rubro fusco.
- javani- 64. Pf. coccineus, orbitis nudis argenteis, capite cristato, gu-
cus. la grisea, jugulo et pectori roseis, humeris et alis ex ru-
bro et viridi mixtis, rectricibus duabus intermediis cocci-
neis, reliquis roseis viridi-mixtis apice caeruleo.
Psittaca javensis cristata coccinea. *Briff. av. 4. p. 381. n. 80.*
Psittacus parvus Bontii. *Raj. av. p. 34. n. 5.*
Perruche huppée. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 160.*
Bontius's small Parrakeet. *Will. orn. p. 120. n. 7.*
Crested red Parrakeet. *Lath. syn. I. I. p. 223. n. 25.*
Habitat in Java, alaudae magnitudine.
Rostrum griseum; cera albicans; oculi nigri.
- Jandaya. 65. Pf. supra viridis, subtus flavius, capite colloque flavis.
Psittacula brasiliensis lutea. *Briff. av. 4. p. 399. n. 91.*
Jandaya. *Will. orn. p. 116. S. 4. n. 5.* *Raj. av. p. 34. n. 5.*
Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 262.
Yellow-headed Parrot. *Lath. syn. I. I. p. 224. n. 26.*
Habitat in Brasilia.
Rostrum, pedes et ungues nigri; orbitae nudae, albae;
irides aureae; abdominis pars posterior viridis.

- folstitia- 12. Ps. luteus, alarum tectricibus viridibus, orbitis rubris,
lis. restringebus lateralibus extus caeruleis.
Psittacus aurantius. L. F. Miller illustr. t. V. A.
Psittaca angolensis lutea. Briss. av. 4. p. 371. n. 76.
Perruche jaune. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 147.
Perroquet from Angola. Albin. av. 3. t. 13.
Angola Yellow Parrot. Lath. syn. I. 1. p. 224. n. 27.
Habitat in Angola, turturis magnitudine, $11\frac{1}{2}$ pollices longus.
Rostrum ex virefcente, cera pallide cinerea; irides flavae;
dorsum maculis ex flavo viridibus; tectrices alarum a
corpo remotissimae margine caeruleo; rectrices 6 inter-
mediae utrinque ex flavicante virides; pedes et unguis
rubicundi.
- Guarou- 66. Ps. flavus, remigibus majoribus viridibus.
ba, Psittaca brasiliensis lutea. Briss. av. 4. p. 369. n. 74.
Quijubatui. Raj. av. p. 35. Will. orn. p. 117.
Quarouba ou Perruche jaune. Buff. hist. nat. des ois. 6.
p. 272.
Perruche jaune de Cayenne. Buff. planch. enlum. n. 525.
Erafilian yellow Parrot. Lath. syn. I. 1. p. 225. n. 28.
- mexica- β. Psittaca mexicana lutea. Briss. av. 4. p. 374. n. 75.
nus. Avis Cocho Psittaci mexicanus species. Seb. thes. I. t. 64. f. 4.
Habitat in Brasilia et Amazonia, β. in nova Hispania, $11\frac{1}{2}$
pollices longus, solitarius, et rarer, facile quidem circu-
randus, sed lingua minus docili.
Rostrum griseum; oculi nigri; cauda longissima; in β. ro-
strum rubens; caput pallide, collum ex aurantio rubrum;
tectrices alarum superiores ex viridi, rubro et aurantio
variae.
- caroli- 13. Ps. viridis, capite, collo genibusque luteis. Scop. ann. I.
nensis. p. 29. n. 25.
Psittaca carolinensis. Briss. av. 4. p. 350. n. 67.
Perroquet no. 7. Ferm. Surin. 2. p. 176.
Perruche à tête jaune. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 274.
Perruche de la Caroline. Buff. planch. enlum. n. 499.
Papegay à tête auvore. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 247.
Caroline Parrot. Arct. zool. 2. p. 242. n. 132. Catesb. Ca-
rol. I. p. 11. t. II. Lath. syn. I. 1. p. 227. n. 29.
Habitat in Guiana, moris maturantibus in Carolinam et
Virginiam migrans, gregarius, pomariis valde infestus;
in arboribus eavis solum humilioris spongiosi nidum struens,

Alex-
dri.

rubris,
et ova ut plurimum 2 subrotunda nivea ponens; facile ci-
cavandus, non tam ten loquax.
Rostrum ex flavicante album; pedes albi.

- Alexan- 14. Ps. viridis, collaris pectoreque rubro, gula nigra. *Amoen.*
dri. *acad.* 4. p. 236. *Mus. Ad. Frid.* 2. p. 14. *Scop. ann.* I.
p. 29. n. 26.
Psittacus (cubicularius), cauda cuneiformi, digito interiore
postico mutato. *Haffelg. it.* 235.
Psittacus torquatus macrourus antiquorum. *Aldr. av.* I.
p. 678. Raj. av. p. 33. n. 1.
Psittaca torquata. *Briff. av.* 4. p. 323. n. 55.
Perrocello. *Olin. accell.* 24. t. 24.
Grande Perruche à collier d'un rouge vif. *Buff. hist. nat. des*
ois. 6. p. 141.
Perruche à collier des isles Maldives. *Buff. planch. enlum.*
n. 642.
Ring Parrakeet. *Will. orn.* p. 115. *Edw. av.* t. 292. f. 1.
Alexandrine Parrakeet. *Lath. syn.* I. I. p. 234. n. 37.
β. Psittacus torque roseo.
Perruche à collier couleur de rose. *Buff. hist. nat. des ois.* 6.
p. 152. planch. enlum. n. 551.
γ. Psittacus torque purpureo.
Psittaca indica torquata. *Briff. av.* 4. p. 326. n. 56.
Bracelat Parrakeet from the East Indies. *Albin. av.* 2. t. 18.
δ. Psittacus torque duplići.
Psittaca borbonica torquata. *Briff. av.* 4. p. 328. n. 57. t. 27.
f. 1.
Perruche à double collier. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 143.
Perruche à collier de l'isle de Bourbon. *Buff. planch. enlum.*
n. 215.
ε. Psittacus capite cyaneo.
Psittaca cyanocephalos. *Briff. av. app.* p. 129.
Perruche à tête d'azur. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 148.
Blue headed Parrakeet. *Edw. av.* t. 292.
ζ. Psittacus javanius. *Osbeck it.* I. p. 156.
Habitat in Asia australi, insulisque maris indici, δ. etiam
in Africa, β. in sola Africa, columbae plerunque magni-
tudine, primus innotuit expeditione Alexandri magni.
Rostrum magis minusve rubrum; in β. mandibulæ superio-
ris apice et inferiore nigra; in γ. mandibula superiore au-
rantia, inferiore nigra; in ζ. inferiore flava; cera in hoc
nigra; irides luteæ; orbitae nudæ incarnatae, in ζ. fus-
cae; caput in ε. cyaneum, in ζ. ex pallide caeruleo et
X palli-

pallide flavo mistum; occiput in $\beta.$ in violaceum vergens; vertex in $\gamma.$ ex caerulecente viridis; tempora in $\zeta.$ nigricant; gula in $\epsilon.$ cyanea, in $\zeta.$ pallide rubra; jugulum et pectus in $\gamma.$ et $\zeta.$ pallide rosea; in $\delta.$ stria lutea; alae macula purpurascente; in $\zeta.$ testrices alarum superiores macula flava, remiges subtus cinereae, margine caeruleae; in $\zeta.$ alae subtus dilute cinereae, rectricibus 5 luteis. Cauda margine caeruleo, subtus pallide flava; in $\delta.$ subtus ex flavo cinerea; in $\epsilon.$ supra caerulea, subtus flava, in $\zeta.$ flavicans. Pedes obscuri; in $\beta.$ et $\epsilon.$ cinerei; in $\zeta.$ ex virescente grisei.

pertinax. 15. *Pſ. viridis*, genis fulvis, remigibus rectricibusque canescens.

Mus. Ad. Frid. I. p. 14.

Psittaca illiniaca. *Briff.* av. 4. p. 353. n. 68.

Tui-aputejuba. *Marcgr. bras.* 206. *Raj. av.* p. 34. n. 2.

Tui species secunda. *Raj. av.* p. 181. n. 6. *Will. orn.* p. 116.

Apupetuba. *Buff. hist. nat. des oif.* 6. p. 269. t. 13.

Perruche Illinoise. *Buff. pl. enlum.* n. 528.

Yellow-faced Parrakeet. *Edw. av.* 49. t. 234.

Illinois Perrot. *Arct. zool.* 2. p. 243. n. 133. *Lath. syn.* I. I.

p. 228. n. 30.

Kleiner langschwaenziger grüner Papagay. *Frisch.* av. t. 54.

Habitat in America, gregatim in septentrionalem migrans, castaneis, pisis etc. vittatis, et nidum in habitaculis terminatum sruens; agilis, voce parum articulata, 13 circiter pollices longus. Caro esculenta.

Rostrum cinereum; irides, frons, aliquando et occiput aurantia; remiges primariae margine extremo caeruleae; pectus et abdomen ex flavicante virent.

Leverianus. 67. *Pſ. pallide viridis*, capite colloque flavis, uropygio puniceo, remigibus rectricumque apice caeruleis.

Crimson vented Parrot. *Lath. syn.* I. I. p. 229. n. 31.

Habitat in Asia australi, suis grandis.

simaragdi- 68. *Pſ. splendide viridis*, abdome postiore, uropygio et cauda ex ferrugineo castaneis.

Perruche émeraude. *Buff. hist. nat. des oif.* 6. p. 262.

Perruche des terres magellaniques. *Buff. pl. enlum.* n. 85.

Emerald Parrot. *Lath. syn.* I. I. p. 230. n. 32.

Habitat in fredo Magellani? 13 pollices longus.

Rostrum et pedes obscuri; cauda apice viridis.

16. *Pſ.*

- canicula- 16. Ps. viridis fronte rubra, occipite remigibusque extimis
ris. caeruleis, orbitis fulvis.
Psittaca brasiliensis. Briff. av. 4. p. 339. n. 62.
Perruche à front rouge. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 268. pl.
enlum. n. 767.
Red and blue headed Parrakeet. Edw. av. 4. t. 176. Lath.
syn. I. I. p. 242. n. 40.
Habitat in Americae calidioribus, majoris turdi magnitudine.
Corpus subtus ex virescere luteum; rostrum nigricans; oculi
nigri; pedes rufescens; remiges latere exteriore vires-
centes; cauda elongata.
- aerugi- 17. Ps. viridis, vertice, remigibusque primoribus caeruleis,
nosus. orbitis cinereis.
Psittaca martinica. Briff. av. 4. p. 356. n. 69.
Perruche à gorge brune. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 257.
Brown-throated Parrakeet. Bancr. Guj. p. 162. Edw. av. 4.
t. 177. Lath. syn. I. I. p. 243. n. 41.
Habitat in America insulisque adjacentibus, 10 pollices lon-
gitudine excedens.
Rostrum, cera, et pedes cum unguibus cinerea; irides ex
flavante badiæ; corpus subtus ex flavante viride; ca-
pistrum, genae, gula et jugulum ex griseo fusca, flavo
admixta; cauda corpore brevior, subtus flavicans.
- rufiro- 18. Ps. viridis, rostro pedibusque rubris, rectricibus apice cae-
stris. rulecentibus, orbitis incarnatis. Mus. Ad. Fr. 2. p. 13.
Psittaca. Briff. av. 4. p. 319. n. 54.
Tui Nr. I. Raj. av. p. 34. Will. orn. p. 116.
Perruche. Buff. planch. enlum. n. 550.
Sinvialo. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 265.
Small green longtailed Parrakeet. Brown. Jam. 472.
Long tailed green Parrakeet. Edw. av. 4. t. 175. Latham
syn. I. I. p. 230. n. 33.
- gujanen- β. Psittaca aquarum Lupiarum insulae. Briff. av. 4. p. 330.
sis. n. 58.
Green Parrot of Guiana. Bancr. Guj. p. 161.
Habitat in America australi, 12 pollices longitudine supe-
rans, β. turdi magnitudine; gregarius, facile cieuran-
dus, docilis, loquacissimus.
Pedes cum unguibus incarnati; in β. etiam rostrum; irides
aurantiae, in β. extus rubicundae, interius cinereae; or-
bitæ quoque cinereæ; pedes et ungues albidæ.

ornatus. 19. Ps. luteo-viridis, occipite, gula pectoreque rubris, vertice auribusque caeruleis orbitis cinereis.

Psittaca indica varia. Briff. av. 4. p. 366. n. 73.

Perruche Lori. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 145.

Perruche variée des Indes orientales. Buff. pl. enlum. n. 552.

Lory Parrakeet. Edw. av. 4. p. 174. t. 174. Latham syn. I. I. p. 221. n. 24.

Habitat in India, 8 pollices longus.

Rostrum pallide aurantium; cera subfuscă; irides aurantiae; vertex et macula pone et supra oculos ex atro caerulea; cauda subtus rubicunda; pedes et ungues cinerei.

Jaguilma. 69. Ps. viridis, remigibus apice fuscis, orbitis fulvis. Molina hist. nat. Chil. p. 228.

Habitat in regno Chilensi, aestate in montibus Cordilleras, turturis magnitudine, sonorus, gregibus numerosissimis, fertilissimus, gemmas arborum herbasque vorans, campis infestissimus; caro sapidissima tenera.

gujanèn- 70. Ps. viridis, genis rubro-maculatis, testricibus alarum minoribus coccineis, majoribus flavis, remigibus infra lutes, margine versu apicem nigricante.

Psittaca gujanensis. Briff. av. 4. p. 331. n. 59. t. 28. f. I.

Perruche pavouane. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 255.

Perruche de la Gujane. Buff. planch. enlum. n. 167. 407.

Pavouane Parrot. Lath. syn. I. I. p. 232. n. 34.

Habitat in Guiana, et insulis Caribaeis, pedem longus, ferox,

Cera rostrumque albicans; apex hujus cinereus; pedes grisei; ungues nigricantes.

margina- 71. Ps. viridis, testricibus alarum nigris, minorum marginis ex flavicante fusco, majorum caeruleo.

Perruche de l'isle de Luçon. Sonner. it. p. 80. t. 44.

Varied-winged Parrot. Lath. syn. I. I. p. 233. n. 35.

Habitat in insula Luzonia.

Capitulum splendide virens; rostrum magnum incarnatum, irides albae; vertex caeruleus; corpus supra gramineum, subtus ex flavicante viride; pedes nigricantes.

Sonnera- 72. Ps. viridis, torque caeruleo, macula ad alarum exortum rubra.

Perruche à collier de l'isle de Luçon. Sonner. it. p. 80.

t. 43.

Blue collared Parrot. Lath. syn. I. I. p. 234. n. 36.

Habitat in insula Luzonia.

Rostrum

Rostrum et irides rubrae; caput, collum et abdomen ex griseo viridia; alae et dorsum graminea; rectrices 2 intermediae gramineae, ceterae ex griseo virides; pedes ex nigricante grisei.

n. 552. pondice. 73. Ps. viridis, fronte striaque a mandibula utrinque ad gulam rianus. nigris, facie alba et caerulecente, pectore ex purpureo caeruleo, cauda subtus straminea.

Perruche à Moustaches. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 149.

Perruche de Pondichery. Buff. pl. enlum. n. 517.

Mustacho Parrakeet. Lath. syn. I. I. p. 238. n. 38.

Molina dilleras, barbatus. β. Ps. capite a basi rostri ad oculos castaneo, linea a naribus ad oculos fusca, gulae dorsum ducta nigra, nucha rubra. Bearded Parrakeet. Lath. syn. I. I. p. 238. n. 38. A.

Habitat in regione Pondichery, 11 pollices longus. Testrices alarum flavo variae; in β. remiges margine caeruleo, rostrum rubrum, vertex viridis, pedes obscuri.

um erythrocephalus. 74. Ps. viridis, capite rubro, caeruleo admisto, gula nigra, torque nigro et pallide viridi.

Blossom headed Parrakeet. Lath. syn. I. I. p. 239. n. 39.

Psittaca ginginiana erythrocephalos. Briff. av. 4. p. 346. n. 65. t. 29. f. 2.

Perruche à tête rouge. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 144.

Perruche à tête rouge de Gingi. Buff. pl. enlum. n. 264.

bengalenlis. β. Ps. vertice genisque roseis, occipite rectricibusque duabus intermediis supra totis, reliquis margine caeruleis.

Psittaca bengalensis. Briff. av. 4. p. 348. n. 66.

Petite perruche à tête couleur de rose à longs brins. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 154.

Perruche de Mahé. Buff. planch. enlum. n. 888.

Perruche à tête rouge de l'isle de Luçon. Sonner. it. p. 79. t. 42.

Parrakeet from Bengal. Albin. av. 3. p. 7. t. 14.

Rose-headed ring Parrakeet. Edw. glean. t. 233. Latbam. syn. I. I. p. 239. n. 39. A.

borneus. γ. Ps. capite, gula, jugulo, pectore, et abdominis parte anteriore florum perlicorum in modum rubris.

Bornean Parrakeet. Lath. syn. I. I. p. 240. n. 39. B.

malaccensis. δ. Ps. colore magis in flavum vergente, area oculorum et occipite roseis.

Grande perruche à longs brins. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 155.

Perruche de Malac. *Buff. pl. enlum. n. 887.*

Malacca Parrakeet. *Lath. syn. I. I. p. 241. n. 39. C.*

*Habitat in India, insulisque oceani indici, II, B. 10, γ. 12,
δ. 16 pollices longus.*

Roftrum rubens, mandibula inferiore in γ. et β. nigra, su-
periore in hac posteriori varietate lutea; cera in β. sub-
fusca, in γ. una cum orbitis cinerea; in hac etiam fron-
tis macula viridis, et linea nigra ab altero oculo ad alte-
rum dueta; in δ. torques nullus; corpus subtilis, in δ.
etiam supra e. viridi in flavum vergens; teetrices alarum
macula rubra; cauda interiori margine, in β. subtus fla-
va, in δ. in caeruleum inclinans. Pedes et ungues cinerei,

plum-
beus.

75. Pf. viridis, rostro, pedibus orbitisque plumbeis, fronte,
genis gulaque fusco, rectricum margine et apice caeruleis.
Brown fronted Parrakeet. *Lath. syn. I. I. p. 243. n. 41. A.*
*Longitudo 11½ pollicum; irides castaneae; vertex caerulef-
cens; remiges margine caeruleae; an varietas aeruginosus?*

oliva-
ceus.

76. Pf. olivaceus, occipitis macula caeruleo-
cens, viridi et aurantio variis.
Perruche aux ailes chamarées. *Buff. hist. nat. des oif. 6.
p. 151.*

Perroquet de l'isle de Luçon. *Buff. pl. enlum. n. 287.*

Lace-winged Parrakeet. *Lath. syn. I. I. p. 244. n. 42.*

Habitat in insula Luzonia, ultra 11 pollices longus.

Roftrum rubrum; alarum medium caeruleum; cauda $\frac{1}{3}$ lon-
gitudinis totius corporis; alae complicatae ad medium
caudae usque; pedes obscuri.

virescens. 77. Pf. virescens, teetrichibus alarum minoribus basi intusque
albis, extus et apice flavis, remigibus quinque primis in-
tus nigris, margine albo, septem proximis albis, margi-
ne et apice flavis.

Psittaca cayenensis. *Briff. av. 4. p. 334. n. 60. t. 27. f. 2.*

Perruche à ailes variées. *Buff. hist. nat. des oif. 6. p. 259.*

Petite perruche verte de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 359.*

Yellow winged Parrakeet. *Lath. syn. I. I. p. 244. n. 43.*

*Habitat in Cayenna numerosissimus, non timidus, docilis,
erythrinae coralliodendri floribus se delectans, 8 pollices lon-
gitudine superans.*

Roftrum cum cera albidum; teetriches alarum a corpore re-
motissimae ex virescente caeruleae; subtus corpori proxi-
mae sulphureae, exteriores ex caeruleente virides; remi-
ges

ges plurimae extus et apice flavae, intus ex flavicanti albae; 4 corpori proximae virides; rectrices margine interiorie flavicantes.

*versico-
lor.* 78. *Pf. viridis*, capite gulaque fuscis, hac fulvo undulata, alis caeruleis plica flammea, abdomine ex purpurascente dilute caeruleo, venis fuscis.

Perruche à gorge variée. *Buff. hist. nat. des oif.* 6. p. 259.
Perruche à gorge tachetée de Cayenne. *Buff. planch. enlum.*

n. 144.

Perruche Nr. 2. *Fermin Surin.* 2. p. 177.

Waved-breasted Parrakeet. *Lath. syn. I. I.* p. 245. *n. 44.*

Habitat in Cayenna et Surinamo, virescenti aequalis.

Rostrum, pedes et ungues nigrae; irides flammee; capistrum supra schistii, subtus cæli colore; cauda linea longitudinali ex purpurascente dilute caerulea (lilac), subtus ex rubro fusca.

*incarna-
tus.* 79. *Pf. viridis*, rostro, pedibus et unguibus incarnatis, cera orbitisque albidi, gula teætricibusque alarum rubris.

Psittaca indica. *Briff. av.* 4. p. 341. *n. 63.*

Perruche à gorge rouge. *Buff. hist. nat. des oif.* 6. p. 157.

Little redwinged Parrakeet. *Edw. glean.* t. 236. *Latham.*
syn. I. I. p. 246. *n. 46.*

Habitat in India, 8½ pollices longus.

Irides castaneæ; cauda 4½ pollices longa.

murinus. 80. *Pf. olivaceus*, facie, gula et pectori murinis, remigibus viridibus.

Perruche. *Pernatt. it. Malouin.* I. p. 312.

Perruche fouris. *Buff. hist. nat. des oif.* 6. p. 148.

Perruche à poitrine grise. *Buff. planch. enl.* n. 768.

Habitat in Montevideo, mansuetus et docilis, 10 pollices longus.

Rostrum et pedes grisei; cauda 5 pollicum.

cornutus. 81. *Pf. viridis*, capite coccinaeo, pennis duabus elongatis exstantibus, torque et uropygio stramineis, remigum rectri- eumque margine exterioriæ caeruleo.

Horned Parrot. *Lath. syn. I. I.* p. 248. *n. 48. t. 8.*

Habitat in nova Caledonia, 11 pollices longus.

Rostrum et pedes ex atro caerulei; tempora aurantia; irides aureae; pennae 2 verticis exstantes 1½ pollices longae; rectrices alarum intus et apice obscurae; cauda subtus atra.

caledoni- 82. Pf. olivaceus, vertice ex virescente flavo, rectricibus apice
cus. albicantibus, & extimis margine exteriori pallide caeruleis.

Caledonian Parrot. *Lath. syn. I. I. p. 248. n. 49.*

Habitat in nova Caledonia, 12 pollices longus.

*Rostrum caeruleoscens, apice pallido; capistrum supra rubrum,
subtus caeruleum; corpus supra magis in viridem, subtus
magis in flavum colorem vergens; pedes ex atro caerulei;
an femina cornuti?*

novae 83. Pf. viridis, fronte purpurea, vertice badio, stria a basi ro-
Seelan- stri per oculos ducta rubra, rectricibus caeruleoscentibus,
diae. intermediarum duarum margine viridi, uropygio rubro.

Red rumped Parrot. *Lath. syn. I. I. p. 249. n. 50.*

Habitat in nova Seelandia, 15 pollices longus.

*Rostrum profunde caeruleum apice nigrum; in cervice pen-
nae nonnullae pallide flavae, in dorso medio ex pallide fer-
ruginoso fuscae; tempora pallide viridia; abdomen ex ci-
nereo viride; remiges primariae fuscae, margine caeruleo-
scente, secundariae et alae spuriae obscurae margine vi-
ridi et apice pallide ferrugineo; pedes nigri.*

novae 84. Pf. olivaceus, capite cristato et gula flavis, macula pone
Hollan- oculos rubra, fascia alarum obliqua alba.

Crested Parrakeet. *Lath. syn. I. I. p. 250. n. 51.*

Habitat in nova Hollandia, 12 pollices longus.

*Rostrum pallidum; crista pennis 6 gracilibus, quarum 2 pol-
lices 3 fere longae, reliquae breviores; pedes obscuri;
feminae caput et corpus magis in badium vergunt; uro-
pygio et cauda lineis transversis griseis pilla.*

ulieta- 85. Pf. olivaceus, capite ex atro fusco, uropygio obscure ru-
nus. bro, alis caudae obscuris.

Society Parrot. *Lath. syn. I. I. p. 250. n. 52.*

Habitat in Ulietea, 10½ pollices longus.

*Rostrum ex atro caeruleum, apice nigrum; pennae margi-
ne obscure, subtus magis in flavum vergentes; pedes nigri.*

multico- 86. Pf. viridis, capite, gula et abdomine caeruleis, pectore
lor. anteriore rubro, posteriore et cauda subtus lutea, tor-
que albo.

White collared Parrot. *Gener. of birds. p. 59. t. 2. Lath.
syn. I. I. p. 251. n. 53.*

Habitat in insulis oceanii indici; rostrum rubrum.

87. Pf.

- s apice
eruleis.
- abrum,
fabrus
erulei;
- asi ro-
ntibus,
rubro.
- ce pen-
de fer-
ex ci-
caeru-
ine vi-
- a pone
- 2 pol-
fscuri;
; uro-
- re ru-
- nargi-
nigri.
- ectore
, tor-
- Lath.
7. Pf.
- aureus. 87. Pf. viridis, cera orbitisque ex caeruleitate incarnatis, vertice aureo, testicibus alarum fascia obliqua caerulea. Psittaca brasiliensis. Briss. av. 4. p. 337. n. 61.
Perruche couronnée d'or. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 271.
Golden-crowned Parrakeet. Edw. glean. t. 235. Latham syn. I. I. p. 251. n. 54.
Habitat in Brasilia.
Rostrum nigrum; irides aurantiae; gula ex flavicante viridis, rubro admisto; pedes rubicundi; unguis nigricantes.
- lineatus. 48. Pf. viridis, remigibus subtus fuscis, margine interiore pallidis.
Magnitudo turturis; color subtus magis in flavum vergens; alas subtus lineis pallidis longitudinalibus tenuissimis; cauda corpore longior.
- pacificus. 88. Pf. viridis fronte et macula pone oculos et utrumque ad uropygium rubra, alarum margine exteriore caeruleo, cauda subtus cinerea.
Pacific Parrakeet. Lath. syn. I. I. p. 252. n. 56.
β. Pf. macula ad uropygium nulla.
γ. Pf. uropygio rubro.
δ. Pf. vertice flavo.
Habitat in insulis maris pacifici, 12 pollices longus.
Rostrum argenteum, apice nigro; pedes fusi; unguis nigri.
- palma-
rum. 89. Pf. viridis, rostro pedibusque rubris, remigum apice et margine atro.
Palm Parrot. Lath. syn. I. I. p. 253. n. 57.
Habitat in insula Tanna, palmas frequentans, 8 polices longus.
Color subtus magis pallidus, in abdomine et caudae apice in flavum vergens.
- australis. 90. Pf. viridis, vertice caeruleo pennis elongatis cristato, gula et abdomine medio rubris, femoribus purpureis.
Blue crested Parrakeet. Lath. syn. I. I. p. 254. n. 58.
Habitat in insulis Sandwich, 6½ pollices longus.
Rostrum aurantium; frons pallide viridis; rectrices 2 intermediae virides, apice flavo; reliquae flavicantes, margine et apice viridi; pedes obscuri, unguis nigri.
- taitianus. 91. Pf. caeruleus, capitinis pennis elongatis, gula juguloque albis, rostro pedibusque rubris.
Arimanion. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 175.

Petite Perruche de l'isle de Taiti. *Buff. planch. enl. n. 455. f. 2.*

Otaheitian blue Parrakeet. *Lath. syn. I. I. p. 255. n. 59.*

Habitat in insula Taiti, sonorus, frequens, musae fructibus viicitans, longitudine 5 pollices parum excedens.

pygmae. 92. *Ps. viridis, pennarum apice ex virescente flavo, remigibus intus obscuris.*

Pygmy Parrakeet. *Lath. syn. I. I. p. 256. n. 60.*

Habitat in insulis maris australis, 6 pollices longus. Rostrum albicans; cera obscura; pedes plumbei.

agilis. 20. *Ps. viridis, tectricibus remigum primorum caerulecentium fulvis, cauda vix elongata subtus rubra, orbitis cinereis.*

Psittacus cayenenis. Briss. av. 4. p. 237. n. 23.

Criq. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 228.

Criq de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 839.

Little green Parrot. Edw. av. 4. t. 168.

Agile Parrot. Lath. syn. I. I. p. 297. n. 101.

Habitat in America, 10½ pollices longus, coccothraustae magnitudine.

Rostrum et pedes cinerea; irides badiæ; remiges intus et apice nigrae; rectrices 2 intermediae virides; 3 proximæ intus ¾ longitudinis rubrae.

* * *Brachyuri, canda aequali.*

coronatus. 21. *Ps. viridis, crista plicatili rubra apice caerulea.*

Cockatoo of Guiana. Bancr. Guj. p. 160.

Crowned Cockatoo. Lath. syn. I. I. p. 259. n. 65.

Habitat in Surinamo et Guiana, cristati magnitudine.

Frons flava; crista coccinea, apice lucide caeruleo; rectrices extimæ latere exteriori caeruleæ; crissum rubrum, pennarum apice caeruleo.

aterimus. 93. *Ps. niger, crista magna dilutiore, genis rubris nudis.*

Kakatoës noir. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 97.

Great black Cockatoo. Edw. glean. t. 316.

Black Cockatoo. Lath. syn. I. I. p. 260. n. 66.

Habitat in nova Hollandia, magnitudine Macao.

Rostrum obscure fuscum; pedes ex fusco nigri.

sulphureus. 94. *Ps. albus, crista plicatili acuminata, et macula infra' oculos sulphureis.*

Cacatua luteo-cristata. Briss. av. 4. p. 206. n. 9.

Kaka-

- Kakatoës à hupe jaune. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 93. pl. enlum. n. 14.*
 Crested Parrot or Cockatoo. *Albin. av. 3. t. 12.*
 Lesser white Cockatoo. *Edw. glean. t. 317. Lath. syn. I. I. p. 258. n. 64.*
Habitat in insulis Moluccis, 14½ pollices longus.
Rostrum et cera nigricant; irides rubent; color subtus in sulphureum inclinans; pedes nigri.
- philippi- 95. Ps. albus, crista sulphurea plicatili apice alba, orbitis ex flavicante rubris, rectricibus caudae inferioribus rubris albo punctatis.
Cacatua minor. Briss. av. 4. p. 212. n. 11. t. 22. f. 1.
 Petit Kakatoës à bec couleur de chair. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 96.*
 Petit Kakatoës des philippines. *Buff. pl. enlum. n. 191.*
 Red-vented Cockatoo. *Brown illustr. p. 10. t. 5. Latham syn. I. I. p. 258. n. 63.*
Habitat in insulis Philippinis, 13½ pollices longus.
Rostrum album, basi utplurimum cinereum; cera grisea; orbitae ex flavicante rubrae; cristae pennae longissimae Jesquipollicares; inferiorum aliquae pallide rubrae; rectrices 2 intermediae albae, laterales intus ad medium usque sulphureae; pedes et ungues plumbei.
- moluc- 96. Ps. albus in colorem dilute roseum inclinans, crista subtus rubra, rectricibus lateralibus intus a basi ad medium usque sulphureis.
Cacatua rubro cristata. Briss. av. 4. p. 209. n. 10.
 Kakatoës à hupe rouge. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 95. pl. enlum. n. 498.*
 Greater Cockatoo. *Edw. av. 4. t. 160.*
 Great red-crested Cockatoo. *Lath. syn. I. I. p. 257. n. 62.*
Habitat in insulis moluccis, 17½ pollices longus.
Rostrum ex caeruleo nigrum; cera et ungues nigra; orbitae griseae; irides rubrae; crista 6½ pollices longa; pedes plumbei.
- cristatus. 22. Ps. albus, crista plicatili flava.
Cacatua. Briss. av. 4. p. 204. n. 8. t. 21.
 Psittacus albus cristatus. *Aldrov. orn. I. II. c. 4. Raj. av. p. 30. n. 1.*
 Kakatoës à hupe blanche. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 92.*
 Kakatoës des Moluques. *Buff. pl. enlum. n. 263.*

White

White crested Parrot of Aldrovandus. *Albin. av. 3. p. 12.*

t. 12. Will. orn. p. 112. t. 15.

Great white Cockatoo. *Lath. syn. I. 1. p. 256. n. 61.*

Habitat in insulis Moluccis, 18 pollices longus.

Rostrum, cera, irides, pedes et ungues nigra; orbitae nude et albae; remiges et laterales rectrices a basi ad medium intus sulphureae; cervicis pennae laxae et fluctuantes; crista 5 pollices longa, uti 92-96 upupae plicatilis, tegens verticis calvitiem pennis dupli serie, sed alternatim connivente imbricatis, quas erigit affectu quovis exercitatus.

erythro- 23. *Ps. cinereus, uropygio, rectricibus remigibusque coccineis.*
leucus. *Psittacus erythroleucus. Aldrov. orn. I. p. 675. Raj. av.*

p. 31. n. 7.

Cacatua alis et cauda rubris. Briff. av. 4. p. 214. n. 12.

Kakatoës à ailes et queue rouges. Buff. hist. nat. des oif. 6. p. 96.

Red and white Parrot. Will. orn. p. 114. n. 8. Lath. syn. I. 1. p. 260. n. 67.

Magnitudo gallinae; longitudo 17 pollicum; rostrum et ungues nigrae; dorsi pars inferior punicea; pedes nigricantes.

eritha- 24. *Ps. canus, temporibus nudis albis, cauda coccinea. Mus.*
cus. *Ad. Frid. I. p. 14. Scop. ann. I. p. 31. n. 30.*

Psittacus guineensis cinereus. Briff. av. 4. p. 310. n. 49.

Psittacus cinereus s. subcaeruleus. Aldr. orn. I. p. 675. t. 676.

Raj. av. p. 31. n. 8.

Perroquet cendré ou Jaco. Buff. hist. nat. des oif. 6. p. 100. pl. enlum. n. 311.

Ash-coloured Parrot. Will. orn. p. 114. n. 7. Albin. av. I. t. 12. Lath. syn. I. 1. p. 261. n. 68.

Grauer Papagay mit rothem Schwanz. Frisch. av. t. 51.

β. Psittacus alis rubris. Briff. av. 4. p. 313. n. 49. A.

γ. Psittacus rubro-varius. Briff. av. 4. p. 313. n. 49. B.

Ash-coloured and red Parrot. Edw. av. 4. t. 163.

δ. Psittacus ruber, capite cinereo, genis nudis, remigibus primariis ex cinereo fulcis. Scopol. ann. I. p. 32. n. 31.

Habitat in Africa occidentali, 20 pollices longus, loquax varias modulatur gutture voces, scurilli strepitu, quicquid et audit, ait.

Rostrum nigrum; cera alba; irides ex flavicante albæ; pedes cinerei; ungues nigricantes.

97. *Ps.*

- p. 12.
tae nu-
ad me-
i&uan-
catis, lterna-
pis ex-
cineis.
aj. av.
12.
ois. 6.
b. syn.
et un-
nigri-
Mus.
49.
t. 676.
p. 100.
av. I.
51.
igibus
t. 31.
'oquax
quic-
e; pe-
7. Pf.
- cinereus. 97. Pf. totus ex caerulecente cinereus.
Psittacus brasiliensis cinereus. Briff. av. 4. p. 313. n. 50.
Maracana. Will. orn. p. 112. n. 5.
Maracana Brasiliensis, prima Maregravii. Raj. av. p. 29.
n. 4.
Cinereous Parrot. Lath. syn. I. I. p. 263. n. 69.
Habitat in Guinea, erithaco major.
- meridio- 98. Pl. supra ex virescente cinereus, subtus spadiceus, orbitis,
nalis. vertice, occipite et cervice cinereis, pennarum apice fusco.
Southern brown Parrot. Lath. syn. I. I. p. 264. n. 70.
Habitat in nova Seelandia, 16 pollices longus.
Rostrum ex caeruleo nigrum; pedes nigri.
- masca- 49. Pf. cinereus capistro subtus nigro, orbitis nudis rubicun-
rinus. dis, rectricibus lateralibus basi albicantibus. Mantiss.
1771. p. 524. Briff. av. 4. p. 315. n. 52.
Mascarin. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 120. t. 5. pl. enlum.
n. 35.
Mascarine Parrot. Lath. syn. I. I. p. 265. n. 72.
Habitat in Mascarin, 13½ pollices longus.
Rostrum, cera et pedes rubicunda; vertex et cervix pallidiores; ungues grisei.
- fuscus. 99. Pf. totus ex cinereo fuscus. Briff. av. 4. p. 314. n. 51.
Brown Parrot. Lath. syn. I. I. p. 266. n. 73.
Longitude 13½ pollicum.
- garrulus. 25. Pf. ruber, orbitis cinereis, genis alisque viridibus, re-
ctricibus medietate postica caeruleis. Mus. Ad. Frid. 2.
p. 14.
Psittacus ruber, remigibus rectricibusque introrsum purpu-
reis. It. wgoth. 137.
Lorius ceramensis. Briff. av. 4. p. 215. n. 13.
Lory. Raj. av. p. 151. n. 5.
Purple Parrot. Charlet. exerc. p. 75. n. 16.
Scarlet Parrakeeto with green and black Wings. Will. orn.
p. 117.
Lory de Ceram. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 129. var. 2.
Ceram Lory. Lath. syn. I. I. p. 269. n. 76.
Ganz rother Papagay. Frisch. av. t. 45.
- aurorae. β. Pf. coccineus alis viridibus nigrisque, rectricibus flavis, me-
diata postica virescentibus. Syft. nat. 10. n. 22.
Psittacus coccineus orientalis, alis ex viridi et nigro variis.
Raj. av. p. 31. n. 9.
Noira variété. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 129. n. 1.
- γ. Psit-

moluc-
cenfis.

γ. Psittacus humeris luteo · maculatis. *Briff. av. 4. p. 219. n. 14.*
t. 23. f. 1.

Lori Noira. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 127.*

Lori des Moluques. *Buff. pl. enlum. n. 216.*

Scarlet Lori. *Edw. av. 4. t. 172. Lath. syn. I. 1. p. 270.*
n. 76. R.

δ. Psittacus teétriibus alarum plurimis caeruleo punctatis.

Habitat in insulis Moluccis, 10 $\frac{1}{4}$ pollices longus.

Rostrum aurantium; cera cinerea; irides flavae; pedes fuscii,
in $\beta.$ nigri; unguis nigri; teétrices alarum minores et
inferiores ex flavo et viridi variae; $\beta.$ virides; $\gamma.$ primo
flavae, tum virides, dein virides flavo punctatae; alae
spuriae violaceae; remiges majores obscure virides intus
coccineas, apice cinereas; in $\beta.$ nigrae, extrorsum virides
subtus obscure; in $\gamma.$ obscure virides, in caeruleum
vergentes. Reétrices 2 intermediae basi virides, tum ru-
brae punctis viridibus, proximae $\frac{2}{3}$ longitudinis rubras,
tum virides, reliqua basi coccineae, tum violaceae pun-
ctis obscure viridibus; in $\beta.$ exterior pars caudae flava,
apex ex flavo viridis; in $\gamma.$ reétrices omnes subtus ex ru-
bro flavae.

domicel- *la.* *26. Ps. ruber, pileo violaceo, alis viridibus, humeris genibus-*
que caeruleis, orbitis fuscis.

Lorius orientalis indicus. *Briff. av. 4. p. 22. n. 15. t. 24. f. 1.*

Lory des Indes orientales. *Buff. pl. enlum. n. 84.*

Lori à collier. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 130.*

Second black-cap Lory. *Edw. av. 4. t. 171.*

Purple - capped Lory. *Lath. syn. I. 1. p. 271. n. 77.*

β. Psittacus pileo caeruleo.

Lorius torquatus indicus. *Briff. av. 4. p. 130. n. 18.*

Lori à collier. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 131.*

Lori male des Indes orientales. *Buff. pl. enlum. n. 119.*

Laurey from the Brasils. *Albin. av. I. t. 13.*

Habitat in insulis Moluccis et nova Guinea, docilis, distin-
cte loquens, 11 fere pollices longus.

Rostrum rubrum, in $\beta.$ flavicans; cera cinerea; orbitae
 $\beta.$ nigrae; irides flavae; lunula ad petitus, $\beta.$ torques
flavus, $\beta.$ dorso, uropygio et abdome ex albo et roseo mi-
stis; $\beta.$ cauda purpurea, teétriibus ejus ex albo et rubro
variis; $\beta.$ remiges caeruleae, minores cum teétriibus ex
flavicante virides; pedes subatri; unguis nigri.

27. Pf.

- n.14. Lory. 27. Ps. purpureus, pílo violaceo, alis viridibus, pectore, genibus caudaque caeruleis, orbitis subincarnatis.
Lori philippensis. Briss. av. 4. p. 225. n. 16. t. 23. f. 2.
Lori tricolor. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 132.
Lory des Philippines. Buff. pl. enlum. n. 168.
Firſt black cap Lory. Edw. av. 4. t. 170.
Black-capped Lory. Lath. syn. I. 1. p. 273. n. 78.
Habitat in insula Yolo et reliquis Philippinis, 10½ pollices longus.
Roſtrum et irides aurantia; cera cinerea; rectrices partim rubrae, partim virides, exteriores margine extremo violaceae; pedes nigricantes.
- punicetus. 100. Ps. saturate coccineus, subtus violaceus, teſtricibus alarum minoribus et inferioribus, remigibusque intus et subtus ex nigricante fulcīs.
Lorius amboinensis. Briss. av. 4. p. 231. n. 19.
Lory d' Amboine. Buff. pl. enlum. n. 518.
Lori Cramoisi. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 133.
Blue breasted Parrot. Brown's illuſtr. t. 6.
Crimson Lory. Lath. syn. I. 1. p. 273. n. 79.
Habitat in Amboina, 11½ pollices longus.
Roſtrum rubrum, aliquando nigrum; cera orbitaeque nigricantes; irides aurantiae; rectrices apice fōrdide rubrae aut aurantiae; pedes fulci; unguis nigri.
- ruber. 101. Ps. ruber, area oculorum remigibusque nigris, alarum macula et teſtricibus caudae inferioribus cyaneis, caudae apice badio.
Lori de Gilolo. Sonner. it. p. 177. t. 112.
Lori rouge. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 134.
Lori de la Chine. Buff. pl. enlum. n. 519.
Molucca Lori. Lath. syn. I. 1. p. 274. n. 80.
 $\beta.$ Ps. humeris, abdomine, criffo, remigum fecundiarum et teſtricum alarum majorum apicibus caeruleis.
Habitat in Moluccis insulis et nova Guinea, 9-10 pollices longus.
- grandis. 102. Ps. ruber, subtus ex rubro, caeruleo, violaceo et viridi mixtus, nucha violacea, alis cyaneis, caudae apice flavo.
Purpur-roode Lori. Vosmaer Monogr. 1769. p. 10. t. 7.
Lori de la nouvelle Guinée. Buff. pl. enlum. n. 683.
Grand Lori. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 135. Lath. syn. I. 1. p. 275. n. 81.

 $\beta.$ Pfitz.

β . Psittacus corpore supra ex fusco et viridi vario, subtus caeruleo, alarum margine et tectricibus alarum inferioribus caeruleis, cauda badia.

Habitat in Zeylona, 13 pollices longus. Rostrum nigrum.

guineen- 103. Pf. capite colloque coccineis, superciliis et pectore flavescientibus, alis ex luteo virentibus apice caeruleis, abdome, uropygio caudaque subtus canis, apice coccineis.

Miller illustr. t. XXIX.

Yellow-breasted Lory. Lath. syn. I. 1. p. 276. n. 82.

Habitat in Guinea, 10 pollices longus.

Rostrum nigrum; cera, gula, et orbitae albae; unguis nigri.

paragua- 104. Pf. coccineus, capite, cervice, crissō, cauda, humeris aliisque nigris.

Lorius brasiliensis. Briss. av. 4. p. 229. n. 17.

Paragua. Raj. av. p. 33. n. 4. Will. orn. p. 115. n. 9. Buff. bist. nat. des ois. 6. p. 248.

Paraguan Lory. Lath. syn. I. 1. p. 277. n. 83.

Habitat in Brasilia? Rostrum cinereum; irides rubrae.

niger. 29. Pf. cauda elongata aequali, corpore caerulecente nigro, rostro orbitisque albidis.

Psittacus madagascariensis niger. Briss. av. 4. p. 317. n. 53.

Vaia ou Perroquet noir. Buff. bist. nat. des ois. 6. p. 119. t. 4.

Perroquet noir de Madagascare. Buff. pl. enlum. v. 500.

Black Parrot of Madagascare. Edw. av. 1. t. 5.

Black Parrot. Lath. syn. I. 1. p. 264. n. 71.

Habitat in Madagascare, 13½ pollices longus.

Rostrum rubicundum; irides fuscæ; pedes carnei; unguis nigri.

caeruleo- 28. Pf. caeruleus, ventre, uropygio caudaque viridibus, vertice flavo, remigibus rectricibusque rubris.

Psittacus gujanensis caeruleus. Briss. av. 4. p. 304. n. 46.

Psittacus versicolor s. erythrocyanus. Aldr. orn. I. p. 675. Raj. av. p. 31. n. 6.

Crik rouge et bleu. Buff. bist. nat. des ois. 6. p. 226.

Red and blue Parrot. Will. orn. p. 114. n. 6. Lath. syn. I. 1. p. 277. n. 84.

Habitat in Guiana, 9 pollices longus.

Rostrum nigricans; orbitae nudæ, albidae; irides flavæ; pedes ex rubro grisei.

104. Pl.

- varius. 105. Ps. ex fusco et cyaneo varius, genis, gula juguloque albocantibus, remigibus rectricibusque obscure fuscis, latere exteriore cyanis. Maerter phys. Arb. der eintr. Fr. zu Wien. I. 2. p. 48.
Habitat in America australi, parum ultra 5 pollices longus; rostro pedibusque flavescensibus, unguibus nigris.
- violaceus. 106. Ps. violaceus viridi et nigro admixto varius, dorso ex fusco viridi, remigibus majoribus nigris, reliquis ex luteo, viridi et rubro variis, rectricum macula rosea.
Psittacus aquarum Lupiarum insulae. Briss. av. 4. p. 302. n. 44.
Crick à tête violette. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 233.
Perroquet de la Guadeloupe. du Tertre antill. 2. p. 250. fig. p. 246.
Ruff-necked Parrot. Lath. syn. I. 1. p. 268. n. 75.
Habitat in insula aquarum Lupiarum.
Rostrum et orbitae incarnata.
- fringilla- 107. Ps. viridis, capite cyaneo, genis, gula, jugulo, maculatus abdominis ex lacteo sanguineis, abdomine violaceo.
Maerter phys. Arb. der eintr. Fr. zu Wien. I. 2. p. 47.
Habitat in America australi, fringillae magnitudine, 6 pollices longitudine superans. Rectrices latere interiori et apice, rostrum et pedes pallide lutea; unguis subfuscus.
- choracus. 108. Ps. viridis, subtus cinereus, orbitis incarnatis. Molina hist. nat. Chil. p. 228.
Habitat in Chili, moribus et viatu cum Jaquima conveniens.
- finensis. 109. Ps. viridis, alarum rectricibus inferioribus rubris, majoribus nonnullis et margine caeruleis, cauda subtus fulva.
Psittacus finensis. Briss. av. 4. p. 291. n. 39.
Perroquet de la Chine. Buff. pl. enlum. n. 514.
Perroquet vert. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 116.
Grand perroquet vert de la nouvelle Guinée. Sonner. it. p. 174. t. 108.
Green and red Parrot from China. Edw. glean. t. 231. Lath. syn. I. 1. p. 278. n. 85.
Habitat in Sina australi, Amboina, nova Guinea, gallinae magnitudine.
Cera nulla; orbitae non nudae; mandibula inferior nigra, superior rubra, apice flavicans; irides aurantiae; pedes et unguis nigri.

- macro- 110. Ps. viridis subtus in flavum vergens, alis ex cyaneo et
rhynchos. viridi multis, tectricibus nigris.
Perroquet à bec couleur de sang. *Buff. hist. nat. des ois. 6.*
p. 122.
- Perroquet de la nouvelle Guinée. *Buff. pl. enlum. n. 713.*
Great billed Parrot. *Lath. syn. I. I. p. 278. n. 86.*
Habitat in nova Guinea, 14 pollices longus.
Rostrum magnum, sanguineum.
- grami- III. Ps. viridis, subtus olivaceus, fronte et vertice caeruleis,
neus. cauda subtus flava.
Grand Perroquet vert à tête bleue. *Buff. hist. nat. des ois. 6.*
p. 122.
- Perroquet d'Amboine. *Buff. pl. enlum. n. 862.*
Amboina Parrot. *Lath. syn. I. I. p. 279. n. 87.*
Habitat in Amboina, 16 pollices longus. Pedes plumbei.
- leucoce- 30. Ps. viridis, remigibus caeruleis, fronte alba, orbitis niveis.
phalus. *Psittacus martinicanus. Briff. av. 4. p. 242. n. 26.*
Amazone à tête blanche. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 212.
t. 9.
Perroquet à front blanc du Senegal. *Buff. pl. enlum. n. 335.*
White-headed Parrot. *Edw. av. 4. t. 166.*
White-fronted Parrot. *Lath. syn. I. I. p. 279. n. 88.*
- β. *Psittacus martinicanus gutture rubro. Briff. av. 4. p. 244.*
n. 27.
- Psittacus leucocephalus. Aldr. orn. I. p. 670. Raj. av. p. 31.*
n. 5. p. 181. n. 7.
- Amazone à tête blanche. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 212. var.*
Perroquet de la Martinique. *Buff. pl. enlum. n. 549.*
White-headed Parrot. *Will. orn. p. 113. n. 5. Lath. syn.*
I. I. p. 280. n. 88. A.
- γ. *Psittacus capite a fronte ad verticem albo, ceterum pallide*
caeruleo.
White crowned Parrot. *Lath. syn. I. I. p. 281. n. 88. B.*
- δ. *Psittacus martinicanus cyanocephalus. Briff. av. 4. p. 251.*
n. 29.
- Papagai à ventre pourpre. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 242.*
Papagai à ventre pourpre de la Martinique. *Buff. pl. enlum.*
n. 548.
- Ash crowned Parrot. *Latham syn. I. I. p. 281. n. 88. C.*
Habitat in insula Martinica, β. etiam in Jamaica, et in no-
va Hispania.
- Corpus magnitudine columbae, viride, pennarum margine*
fusco aut rubro; caput supra et ad latera caeruleum, in
β. po-

$\beta.$ postice viride; gula tota rubra, in $\gamma.$ et $\delta.$ viridis; remiges nigrae latere exteriore denudato caeruleae; rectrices aequales virides, basi rubrae, apice flavescentes; at \mathbf{I}, \mathbf{I} latere exteriore caeruleo, 6, 6 unicolores; abdomen postice non raro ferrugineum.

ochroce- 112. Pf. viridis , vertice flavo, tectricibus alarum rubris, remigibus ex viridi, nigro, violaceo et rubro variis, rectricibus duabus extimis basi intus rubris.

phalus. Psittacus amazonicus brasiliensis. Briss. av. 4. p. 272. n. 35.
t. 26. f. 1.

Amazone à tête jaune. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 208.

Yellow-headed Amazons Parrot. Latham syn. I. I. p. 282.
n. 89.

$\beta.$ Amazone à tête jaune, var. I. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 209.
Perroquet vert et rouge de Cayenne. Buff. planch. enlum.
n. 312.

$\gamma.$ Psittacus poikilorrhynchos Aldrovandi. Raj. av. p. 30. n. 3.
Psittacus amazonicus poikilorrhynchos. Briss. av. 4. p. 270.
n. 34.

Amazone à tête jaune, var. 2. Buff. hist. nat. des ois. 6.
p. 210.

Aldrovandus his Parrot, with a parti-coloured bill. Will.
orn. p. 113.

Habitat in America australi, $\gamma.$ ad 18 pollices longus.

Roftrum cinereum, basi rubrum; in $\beta.$ rubens; in $\gamma.$ mandibula superior supra ex caerulecente viridis, lateribus ochracea, apice macula alba, inferior plumbea, medio flava; irides flavae; vertex in $\beta.$ macula tantum flava; pedes plumbei; ungues nigri.

barba- 113. Pf. viridis , orbitis et fronte cinereis, vertice, genis, gu-
densis. la, jugulo, alarumque tectricibus minoribus flavis, ma-
joribus caeruleis, remigibus primariis multis extus viola-
ceis, reliquis a basi ad medium rubris, cetera caeruleis.

Ashfronted Parrot. Lath. syn. I. I. p. 284. n. 90.

Habitat in Barbados, columbae magnitudine.

Roftrum corneum; pedes cinerei; ungues nigri.

lucionen- 31. Pf. viridis , occipite uropygioque caeruleis, alis nigro, cae-
sis. ruleo rubroque notatis.

Psittacus lucionensis. Briss. av. 4. p. 295. n. 41. t. 22. f. 2.
Manilla Green Parrot. Lath. syn. I. I. p. 296. n. 98.

aneo et
ois. 6.
713.

eruleis,
ois. 6.

niveis.

212.

335.

244.

31.

var.

b. syn.

pallide

B.

251.

242.

enlum.

C.

in no-

argine

m., in

$\beta.$ po-

Habitat in insula Luzonia, columbae magnitudine, 12½ pollices longus.

Rostrum coccineum, apice album; cera rubens; pedes cinerei; unguis nigricantes.

aestivus. 32. *Ps. viridis luteo-submaculatus, fronte caerulea, humeris sanguineis, orbitis incarnatis.*

Psittacus amazonicus. Briss. av. 4. p. 256. n. 31.

Ajuru-curaau. Raj. av. p. 32. n. 1. Marcgr. brasf. 205.

Aouron-couraou. Buff. hist. nat. des oif. 6. p. 215.

Perroquet Amazone. Buff. planch. enlum. n. 547.

Maregravius middle-sized Parrot, 1st species. Will. orn. p. 115.

Common Amazons Parrot. Lath. syn. I. 1. p. 284. n. 91.

β. *Psittacus jamaicensis icterocephalus. Briss. av. 4. p. 233. n. 20.*

Psittacus viridis melanorhynchos. Aldrov. av. l. II. c. 7.

Raj. av. p. 30. n. 4.

Aourou-couraou, var. 1. Buff. hist. nat. des oif. 6. p. 216.

Black-billed green Parrot of Aldrovandus. Will. orn. p. 113. n. 4.

Jamaica-Parrot. Brown. jam. p. 473. Lath. syn. I. 1. p. 285. n. 91. A.

γ. *Psittacus amazonicus jamaicensis. Briss. av. 4. p. 276. n. 36.*

Psittacus viridis alarum costa superne rubente. Raj. av. p. 30. n. 2. p. 181. n. 6.

Aourou-couraou, var. 2. Buff. hist. nat. des oif. 6. p. 217.

Common green Parrot with the ridge of the wing red. Will. orn. p. 113. n. 2.

Main Parrot. Brown. jam. p. 472. Lath. syn. I. 1. p. 285. n. 91. B.

δ. *Psittacus brasiliensis cyanocephalus. Briss. av. 4. p. 234. n. 21.*

Aourou-couraou, var. 3. Buff. hist. nat. des oif. 6. p. 219.

Ajuru-curuca. Raj. av. p. 33. n. 3. Will. orn. p. 115. sect. 9.

Blue-topped Parrot. Lath. syn. I. 1. p. 286. n. 91. C.

ε. *Psittacus amazonicus varius. Briss. av. 4. p. 281. n. 37. t. 26. f. 2.*

Ajurucurau 2. Marcgr. brasf. 205.

Aourou-couraou, var. 4. Buff. hist. nat. des oif. 6. p. 219.

Psittacus major, seu mediae magnitudinis, Marcgr. 2. species. Raj. av. p. 33. n. 2.

Second species of Maregrave. Will. orn. p. 115. f. 9.

Great green Parrot from the Westindies. Edw. av. 4. t. 162.

Habi-

Habitat in America australi.
Corpus magnitudine columbae, dorso adsperso pennis fulvis;
facies flava; frons caerulea; vertex albidus, in d. caeruleus,
macula flava; rectrices apice pallidiores; 1, 2, 3, basi
interiori rubrae; at 1 latere etiam exteriore caerulea;
humeri fulvi vel sanguinei; remiges primores nigrae api-
ce caerulecentes latere exteriore nigrae, exteriore virides;
secundariae anteriores latere exteriore versus basin rubrae;
rostrum, saltant apice nigrum, e. cinereum.

- 2½ pol-
es cine-
umeris
05.
· p. 115.
· 91.
p. 233.
I. c. 7.
. 216.
p. 113.
p. 285.
. n. 36.
. p. 30.
p. 217.
I. Will.
p. 285.
4. n. 21.
p. 219.
p. 115.
C.
7. t. 26.
p. 219.
2. spe-
. t. 162.
Habi-
- amazo-
nius.
33. Ps. subvirescens, fronte flava, temporibus fulvis.
Psittacus amazonicus fronte lutea. Briss. av. 4. p. 261. n. 32.
Aourou-couraou, var. 5. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 221.
Brasilian yellow-fronted Parrot. Latham syn. I. I. p. 287.
n. 91. E.
Habitat in Brasilia et Amazonum terra, aetate valde affi-
nis, forte varietas, sed duplo major. Remiges exte-
rioris caeruleae, medio rubrae; rectrices extimae medio ex-
teriori caeruleae; laterales interiori latere rubrae.
- luteus.
114. Ps. viridis, vertice cyaneo, humeris flavis, tectricibus
alarum majoribus macula aurantia.
Yellow shoultered Parrot. Lath. syn. I. I. p. 288. n. 92.
Habitat in America meridionali, 11 pollices longus.
- ochro-
pterus.
115. Ps. viridis, fronte orbitisque albidi, vertice, genis,
gula, jugulo, tectricibusque alarum remotioribus flavis.
Psittacus amazonicus, gutture luteo. Briss. av. 4. p. 287.
n. 38.
Crick à tête et gorge jaune. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 222.
Yellow-headed Creature. Bancr. Gujan. p. 159.
Yellow-winged Parrot. Lath. syn. I. I. p. 289. n. 93.
Habitat in America australi, 13 pollices longus, minus
docilis.
Rostrum albidum; pennae corporis superiores margine nigro;
tectrices alarum minores corpori proximae rubrae, mar-
gine flavo; remiges nigrae, nonnullae margine caeruleo
et viridi; mediae 4 basi intus rubrae; rectrices 4 inter-
mediae apice flavicantes; proximae tres basi ad medium
usque rubrae; extimae margine exteriori caeruleae; pe-
des cinerei.
- pulveru-
lentus.
116. Ps. viridis et supra quasi farina conspersus, capitis macu-
la flava, alarum rubra.
Meunier ou Crick poudré. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 225.
Meunier

Meunier de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 861.
 Meally green Parrot. Lath. syn. I. I. p. 291. n. 94.
Habitat in Cayenna, distinete garriens, americanorum maximus.
Rostrum ex albido corneum; pennae faciei margine obsoleto fuso; remiges extrorsum nigrae.

havanen- 117. Ps. viridis, fronte, gula et jugulo ex cinereo caeruleis,
 sis. pectoris macula magna rubra, orbitis cinereis.

Psittacus amazonicus gutture caeruleo. Briff. av. 4. p. 266.
 n. 33. t. 25. f. I.

Crick à face bleue. Buff. hist. nat. des oif. 6. p. 227.
 Perroquet de la Havane. Buff. pl. enlum. n. 360.

Blue-fronted Parrot. Lath. syn. I. I. p. 291. n. 95.
Habitat Havanae, 12 pollices longus.

Pennae supra apice nigro, subtus caerulecenti; remiges ma-
 jores nigrae; pedes grisei.

paradisi. 34. Ps. luteus, gula, ventre, rectricumque basi rubris.

Psittacus luteus insulae Cubae. Briff. av. 4. p. 308. n. 48.

Papagai de Paradis. Buff. hist. nat. des oif. 6. p. 237.

Perroquet de Cuba. Buff. pl. enlum. n. 336.

Cuba Parrot. Brown. jam. p. 473.

Parrot of Paradise of Cuba. Catesb. carol. I. t. 10.

Paradis Parrot. Lath. syn. I. I. p. 300. n. 105.

Habitat in Cuba, 12½ pollices circiter longus.

Rostrum, pedes nudaque orbitae alba; irides rubrae; re-
 miges majores albae; rectrices 2 intermediae totae, reli-
 quae extrema tertia parte flavae, ceterum rubrae.

aurora. 50. Ps. flavus, axillis, alarum marginibus, remigibusque ma-
 joribus extrorsum in medio rubris. Mant. 1771. p. 524.

Psittacus luteus. Briff. av. 4. p. 306. n. 47.

Perroquet jaune. Salern. orn. p. 69. n. 9. t. 7. f. 2. Buff.
 pl. enlum. n. 13.

Amazone jaune. Buff. hist. nat. des oif. 6. p. 214. t. 10.

Aurora-Parrot. Lath. syn. I. I. p. 301. n. 106.

Habitat in Brasilia, aetivo aequalis, 12 pollices longus.

Rostrum, cera, pedes et ungues alba; palpebrae et irides
 rubrae; cauda rotundata; rectrices 4 extimae a basi ad
 medium intus rubrae.

patteri- 47. Ps. luteo-virens, macula alarum alisque subtus caeruleis.
 nus. Mus. Ad. Frid. I. p. 14. 2. p. 16.

Psittacula brasiliensis. Briff. av. 4. p. 384. n. 81.

Tuiete.

Tuiete. *Raj. av. p. 34. n. 6. Will. orn. p. 116. c. 14. n. 6.*
 Eté ou Toui - étó. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 283.*
 Least green and blue Parrakeet. *Edw. glean. t. 235.*
 Short tailed yellow with green Parroquet. *Bancr. Gujan.*

p. 162.

Little blue and green Parrakeet. *Latham syn. I. I. p. 319.*
n. 127.

Habitat in Brasilia et Guiana, *passeris magnitudine, 4 pol-*
lices longus.
 Rostrum, cera, orbitae, pedes et unguis aurantia; remi-
 ges subtrs, et testrices alarum primariae caeruleae.

cyanoly- 118. *Pf. luteo-vires, collari caeruleo, uropygio rubro. Mo-*
feos. *lin. hist. nat. Chil. p. 227.*

Habitat in regno Chilensi, columba paulo major, segetibus
valde infesta, in abyssis praecipitibus nidificans, et ova
plerumque bina alba, columbinis aequalia ponens, docilis
et mansuetus; caro esculenta, junioris sapidissima.

48. fordidus. 40. *Pf. subfuscus, gula caerulea, alis caudae viridibus, ro-*
stro crissaque rubris.

Psittacus novae Hispaniae. Briff. av. 4. p. 303. n. 45.

Papagai brun. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 246.
 Dusky Parrot. *Edw. av. 4. t. 167. Lath. syn. I. I. p. 304.*
n. 110.

Habitat in nova Hispania, collari magnitudine.
 Cera nigricans; orbitae nudae, pallide cinereae; irides ha-
 diae; tempora, occiput, uropygium, et cauda supra vi-
 rescentia; testrices caudae inferiores rubrae; pedes plum-
 bei; unguis nigri.

domini- 119. *Pf. viridis, frontis fascia rubra, cervicis dorsique lunulis*
nigris, remigibus caeruleis.

Papagai à bandau rouge. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 241.

Perroquet de S. Domingue. Buff. pl. enlum. n. 792.

Red banded Parrot. Lath. syn. I. I. p. 300. n. 104.

Habitat in insula S. Dominici, 9½ pollicis longus.

Rostrum pallide incarnatum; pedes cinerei.

erythro- 120. *Pf. viridis, orbitis nigricantibus, dorso medio nigro, in-*

pter. *feriore parte caerulea, testricibus alarum rubris.*

Crimson winged Parrot. Lath. syn. I. I. p. 299. n. 103.

Longitudo 10 pollicum; rostrum rubrum; cera et pedes for-
dida; cauda paulo longior.

festivus. 35. *Ps. viridis*, fronte purpurascente, superciliis gulaque caeruleis, dorso sanguineo.

Tavoua. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 240.*

Perroquet tahué de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 840.*

Festive Parrot. *Lath. syn. I. 1. p. 298. n. 102.*

Habitat in Guiana, agitissimus, sed ferox et ingratus, columbae magnitudine, II pollices longus.

Rostrum plumbeum, apice nigro; cera ex griseo nigra; irides croceae; pedes cinerei; unguis nigri.

robustus. 121. *Ps. viridis*, capite cinerascente, alarum teetrichibus fodi- de nigris margine viridibus, remigibus teetrichibusque fus- cis, alarum macula rubra.

Robust Parrot. *Lath. syn. I. 1. p. 296. n. 100.*

Magnitudo columbae; longitudo 12 pollicum; rostrum ma- gnum, album; capistrum supra nigricans; verticis pennae per medium fardide striatae; pedes fardidi.

magnus. 122. *Ps. viridis*, remigibus majoribus caeruleis, minoribus subtus rubris.

Grand Perroquet vert de la nouvelle Guinée. *Sonnier. it. p. 74. t. 108.*

New-Guinea Green Parrot. *Lath. syn. I. 1. p. 296. n. 99.*

Habitat in nova Guinea, aestivi magnitudine.

Mandibula superior colore auripigmenti; inferior nigra; irides flammeae; Vireo graminea.

Taraba. 123. *Ps. viridis*, capite, gula, jugulo, pectori et teetrichibus alarum minoribus rubris.

Psittacus brasiliensis erythrocephalus. *Briff. av. 4. p. 240. n. 24.*

Tarabe. *Raj. av. p. 33. n. 5. Will. orn. p. 114. n. 9.*

Tarabé ou Amazone à tête rouge. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 211.*

Habitat in Brasilia.

Rostrum pedesque cinerea; unguis nigri.

brasiliensis. 36. *Ps. viridis*, facie rubra, temporibus caeruleis, orbitis ci- nereis.

Psittacus brasiliensis, fronte rubra. *Briff. av. 4. p. 254. n. 30.*

Crick à tête bleue. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 232. var. 3.*

Brasilian green Parrot. *Edw. av. 4. t. 161. Baner. Guj. p. 160. Lath. syn. I. 1. p. 294. n. 96. C.*

Habitat in Brasilia, columbae magnitudine; an varietas au- tumnalis?

Color

Color viridis *flavo contaminatus*; ruber *infra flexuram alae et in exteriore latere rectricum 2, 2*; caeruleus *in latere exteriore remigum rectricumque primorum*.

autumna- 37. *Ps. viridis*, fronte remigumque macula coccineis, vertice lis,

Psittacus americanus. *Briff. av. 4. p. 293. n. 40.*

Crick à tête bleue. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 232. var. 2.*

Lester green Parrot. *Edw. av. 4. t. 164. Bancr. Guj. p. 160.*

Autumnal Parrot. *Lath. syn. I. 1. p. 293. n. 96. B.*

β. *Psittacus fronte gulaque caeruleis.*

Crick à tête bleue. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 230.*

Blue faced green Parrot. *Edw. glean. t. 230. Lath. syn.*

I. 1. p. 293. n. 96.

Blue headed Creature. *Bancr. Gujan. p. 158.*

γ. *Psittacus capite ex rubro et albido vario.*

Crick à tête bleue. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 231. var. 1.*

Cocco. *Fernand. hist. nov. Hisp. p. 38.*

Habitat in Guiana.

Magnitudo columbae; oculorum regio caerulea; alarum rectrices primores caeruleae basi rubrae; remiges posteriores virides; rectrices supra virides, apice flavescentes, extimo latere exteriore caeruleo; subtus flavae, basi rufescentes, medio macula viridi.

accipitri- 38. *Ps. viridis*, capite griseo, collo pectoreque subviolaceo varius.

Psittacus varius indicus. *Briff. av. 4. p. 300. n. 43.*

Psittacus elegans. *Clus. exot. 365. Raj. av. p. 32. n. II.*

Perroquet varié. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 117.*

Hawk-headed Parrot. *Edw. av. 4. t. 165. Lath. syn. I. 1.*

p. 266. n. 74.

β. *Psittacus capitis pennis albis longis angustis nigro striatis.*

Papagai maillé. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 239. t. 12.*

Perroquet maillé. *Buff. pl. enlum. n. 526.*

Habitat in India, β. nunc in Guiana domesticus; irritatus pennas capitis erigit.

Magnitudo columbae; longitudo $12\frac{1}{2}$ pollicum; rostrum cum cera nigricans; orbitae nudae nigricantes; irides ex flavo badiae; pedes cum unguibus plumbei.

men- 39. *Ps. viridis*, capite caerulecente, crisco rubro. *Scop. ann. I.*

p. 33.

Psittacus gujanensis cyanocephalus. *Briff. av. 4. p. 247. n. 28.*

Y 5

Papagai

Papagai à tête et gorge bleue. *Buff. hist. nat. des ois.* 6.
p. 243.

Perroquet à tête bleue de Cayenne. *Buff. pl. enlum.* n. 384.
Blue-headed Parrot. *Edw. glean.* t. 314. *Lath. syn.* I. I.
p. 301. n. 107.

Habitat in Guiana, parum docilis, voce monedulae. D.
Bierchen.

Corpus magnitudine turturis; caput collumque caerulescens
pennis fuscis apice caeruleis; dorsum et alae virides; te-
ctrices alarum ex flavescente virides; remiges virides, in-
teriori margine fuscae; abdomen virens, pennarum apice
caerulecente; rectrices virides apice caerulecentes, sed
I, 2, 3 interiore latere a basi ad medium sanguineae,
exteriori latere totae caeruleae; crissum rubrum, apice
pennarum ex flavescente caeruleo; rostrum corneum, man-
dibula superiore lateribus fulva; oculi nigri; orbitae ex
caeruleo canescentes.

purpu- 124. Ps. supra ex atro fuscus, subtus purpureus, vertice genis-
reus. que nigris, orbitis caeruleis, torque sordide punctato, re-
migibus rectricibusque caeruleis.

Perroquet violet. *Barrer. Fr. equin.* p. 144.

Papagai violet. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 244.

Perroquet varié de Cayenne. *Buff. pl. enlum.* n. 408.

Little dusky Parrot. *Edw. glean.* t. 315. *Lath. syn.* I. I.
p. 302. n. 108.

Habitat in Surinamo, columbae domesticae magnitudine,
parum docilis.

Rostrum sordidum, macula ad utrumque latus aurantia;
rectrices laterales latere interiore rubicundae, apice cae-
ruleae; pedes sordidi.

melano- 41. Ps. viridis subtus luteus, pileo nigro, pectore albo, orbi-
cephalus. tis incarnatis. *Mus. Ad. Frid.* 2. p. 15.

Psittacus mexicanus, pectore albo. *Briff. av.* 4. p. 297. n. 42.

Psittacus atricapillus. I. Fr. *Miller illustr.* t. 4. A.

Maïpouri. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 250.

Petite perruche Maïpouri de Cayenne. *Buff. planch. enlum.*
n. 527.

White breasted Parrot. *Edw. av.* 4. p. 169. *Lath. syn.* I. I.
p. 305. n. 112.

Habitat in nova Hispania, Guiana et Caraccas in silvis, tur-
turis magnitudine, indocilis, et nisi pullus vix cicurandus;
volando parvis gregibus sibilans, crassior et brevior
reliquis speciebus.

Rostrum

pilea

ludo-
cian

coll

sen-
lu

*s oif. 6.
n. 384.
yn. I. I.
ae. D.
ulescens
des; te-
ides, in-
m apice
tes, sed
uineae,
, apice
u, man-
bitac ex
genis-
uto, re-*

*Rostrum et cera incarnata; genae flavae; cervix aurantia;
remiges majores exteriore latere caeruleae, interiori et
subtus nigrae, minorum primae virides, margine flavo;
reliquae virides; cauda rotundata; pedes ex cinereo fuscii;
ungues nigricantes.*

*pileatus. 125. Ps. viridis, capite nigro, orbitis albis, humerorum ma-
cula cyanea, caudae apice caeruleo.*

Caïca. Buff. hist. nat. des oif. 6. p. 253.

Perruche à tête noire de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 744.

Hooded Parrot. Lath. syn. I. I. p. 306. n. 113.

*Habitat in Cayenna, 8½ pollices longus, reliquis speciebus
crassior, migratorius.*

*Rostrum et pedes rubri; gula flavicans; rectrices 2 inter-
mediae totae virides.*

*ludovi- 126. Ps. thalassinus, capite fulvo, versus rostrum in ruborem
cianus. vergente.*

*Papagai à tête aurore. Buff. hist. nat. des oif. 6. p. 247.
du Praz ir. 2. p. 128.*

Orange-headed Parrot. Lath. syn. I. I. p. 304. n. III.

*Habitat in Louisiana, bromeliae, liriodendri seminibus vi-
etitans, magnis gregibus volans, ferus, valde sonorus;
cicuratus parum, parumque docilis.*

collarius. 42. Ps. viridis, gula rubente.

Psittacus minor, collo miniaceo. Raj. av. p. 181. n. 8.

Psittacus jamaicensis, gutture rubro. Briff. av. p. 241. n. 25.

Xaxabes. Ovied. I. 4. c. 4.

Sassebé. Buff. hist. nat. des oif. 6. p. 245.

Common Parrot of Jamaica. Sloan. jam. p. 297. n. 9.

Red-throated Parrot. Lath. syn. I. I. p. 303. n. 109.

Habitat in Jamaica, columbae magnitudine.

Jugulum rubrum; remiges nigrae, margine viridi.

*senega- 43. Ps. viridis subtus luteus, capite cinereo, orbitis nigris nudis.
lus. Psittacula senegalensis. Briff. av. 4. p. 400. n. 92. t. 24. f. 2.*

*Perroquet à tête grise. Buff. hist. nat. des oif. 6. p. 123. pl.
enlum. n. 288.*

Senegal Parrot. Lath. syn. I. I. p. 307. n. 114.

*Habitat frequens ad Senegal fluvii littora arenosa, voce in-
grata et acuta; quini senive volant, in arborum cacumi-
nibus quiescentes.*

*Longitudo 8½ pollicum; rostrum cinereum; cera nigricans;
irides flavae; remiges et alae spuriae cinereae, margine
exte-*

exteriore viridi; rectrices cinereae, margine et apice vi-rides; pedes ex rubicundo cinerei.

Tuipara. 127. *Ps. pallide viridis, frontis lunula rubra, alarum macula media flava.*

Tuipara Tupinambis. *Raj. av. p. 35. n. 7. Will. orn. p. 117. Psittacula brasiliensis erythrocephalos. Briff. av. 4. p. 383. n. 82.*

Red-fronted Parrot. *Lath. syn. I. 1. p. 308. n. 115.*

Habitat in Brasilia, alaudae magnitudine.

Rostrum incarnatum; cauda brevissima; pedes et ungues grisei.

chryso- 44. *Ps. viridis, alis macula caerulea fulvaque, orbitis nudis
pterus. albis.*

Psittacula alis deauratis. Briff. av. app. p. 130. n. 97.

Perruche aux ailes d'or. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 170. Golden-winged Parrakeet. Edw. glean. t. 293. f. 2. Lath. syn. I. 1. p. 309. n. 116.

Habitat in India, alauda vix major.

Rostrum album; remiges primores 4 margine exteriori caeruleae, interiori fuscae; reliquae supra aurantiae, subtus luteae.

pullarius. 45. *Ps. viridis, fronte rubra, cauda fulva, fascia nigra, orbitis cinereis. Mus. Ad. Fr. 2. p. 15. Scop. ann. I. p. 33. n. 34.*

Psittacus minimus. Clus. exot. 365.

Psittacus pusillus viridis aethiopicus Clusi. Raj. av. p. 31. n. 10.

Psittacus minor versicolor. Seb. mus. 2. p. 40. t. 40. f. 1.

Psittacula guineensis. Briff. av. 4. p. 387. n. 85.

Perruche à tête rouge, ou moineau de Guinée. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 165. t. 7.

Petite perruche mâle de Guinée. Buff. planch. enlum. n. 60.

Little red-headed Parrakeet; or Guinea Sparrow. Albim. av. 3. t. 15. Edw. glean. t. 237.

Red-headed Guinea-Parrakeet. Latham syn. I. 1. p. 309. n. 117.

Kleinster grüner Papagay mit rother Stirn und Kehle. Frisch. av. t. 54.

Habitat in Guinea frequens, in Aethiopia, India, et insula Java, morum alienorum, non perinde vocis dexterminus imitator, suae speciei amantissimus; alaudae magnitudine, 5 $\frac{1}{2}$ pollices longus.

Rostrum

Rostrum rubrum; cera cinerea; irides caerulecentes; gula rubra; uropygium caeruleum; rectrices 2 intermediae totae, reliquae apice virides; pedes et unguis grisei.

indicus. 128. *Ps. viridis*, orbitis pallide incarnatis, vertice rubro vel aurantio, uropygii parte postica rubra, remigibus intus, cauda subtus ex caerulecente viridibus.

Psittacula indica. Briff. av. 4. p. 390. n. 86.

Smallest red and green Indian Parrot. Edw. av. 1. t. 6.

Red and green Indian Parrot. Lath. syn. I. 1. p. 311. n. 118.

Habitat in India, alaudae magnitudine.

Rostrum aurantium; rectrices caudae superiores rubrae; pedes et unguis incarnati.

galgulus. 46. *Ps. viridis*, uropygio pectoreque coccineis, vertice (maris) caeruleo. Amoen. ac. 4. p. 236. Mus. Ad. Frid. 16. Osb. it. 101.

Avicula cechini. Aldr. orn. I. 20. p. 560.

Psittacula malaccensis. Briff. av. 4. p. 386. n. 84?

Perruche à tête bleue. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 163.

Petite perruche de Pérou. Buff. pl. enlum. n. 190. f. 2.

Petite perruche de l'isle de Luçon. Sonner. it. p. 76. t. 33. fig. inf.

Sapphire-crowned Parrakeet. Edw. glean. t. 293. f. 2. Lath. syn. I. 1. p. 312. n. 119. A.

β. *Psittacula Philippensis.* Briff. av. 4. p. 392. n. 87. t. 30. f. 1.

Perruche des Philippines. Buff. pl. enlum. n. 520. f. 1. 2.

Coulacissi. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 169.

Philippine Parrakeet. Lath. syn. I. 1. p. 311. n. 119.

Habitat in insulis Philippinis, forsitan etiam aliis oceani indici, 5 modo pollices longus, et adhuc minor. Pede altero suspensus dormit; cocos succo recenti se delefant.

Remiges subtus caeruleae, excepto margine exteriore; rectrices subtus caerulecentes; jugulum sanguineum, qui tam color, prouti caeruleus verticis, in femina deest.

β. *Kostrum rubrum;* caput ex flavo viride; occipitis fascia transversa aurantia; rectrices caudae rubrae; remiges nigricantes margine profunde viridi; cauda rotundata; pedes et unguis rubri.

Anaca. 129. *Ps. viridis*, subtus ex rufu fusca, vertice badio, dorsi macula caudae pallide fusca, alarum margine rubro.

Psittacula brasiliensis fusca. Briff. av. 4. p. 403. n. 93.

Anaca Brasiliensis. Raj. av. p. 35. n. 8. Will. orn. p. 117. c. 4. n. 8.

Anaca.

apice vi-
macula
t. p. 117.
p. 383.

ungues
tis nudis
7.
170.
Lath.

riori cae-
iae, sub-

ra, orbi-
t. p. 33.

v. p. 31.
o. f. 1.
Buff. hist.
m. n. 60.
Albin.
p. 309.
Frisch.
et insula-
territimus
agnitudi-
Rostrum

Anaca. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 260.*
Chestnut-crowned Parrakeet. Lath. syn. I. I. p. 314. n. 120.
Habitat in Brasilia et Guiana, alaudae magnitudine.
Rostrum et orbitae fusca; tectrices caudae inferiores ex rufi-fuscae; remiges majores apice thalassinae; pedes et ungues nigricantes.

purpura-tus. 130. Ps. viridis, vertice et cervice cinereis, uropygio alarum marginie spuriarumque apice caeruleis, cauda purpurea nigro-marginata.

Purple tailed Parrakeet. *Lath. syn. I. I. p. 315. n. 121.*
Habitat in Cayenna, 8 pollices longus.

Rostrum flavescens; dors pars inferior caerulea; humeri fusi; cauda vix rotundata; tectrices caudae praelongae; rectrices 2 intermediae virides, nigro-punctatae; pedes cinerei; unguis flavicantes.

canus. 131. Ps. viridis, capite, gula, juguloque ex viridi griseis, caudae rotundatae fascia lata nigra.

Psittacula madagascariensis. Briff. av. 4. p. 394. n. 88. t. 30. f. 2.

Perruche à tête grise. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 171.*

Petite perruche de Madagascar. *Buff. pl. enlum. n. 791. f. 2.*

Grey-headed Parrakeet. *Lath. syn. I. I. p. 315. n. 122.*
Habitat in insulis Madagascar et S. Mauritii, 5 $\frac{1}{2}$ pollices longus.

Rostrum griseum; pedes et unguis cani; feminae caput virende.

melano-pterus. 132. Ps. pallide viridis, dorso, tectricibus alarum, caudae fascia remigibusque primariis nigris, secundariis flavescentibus caeruleo-punctatis.

Perruche aux ailes variées. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 172.*

Petite perruche de Batavia. *Buff. pl. enlum. n. 791. f. 1.*

Petite perruche de l'isle de Luçon. *Sonner. it. p. 78. t. 41.*

Black-winged Parrakeet. *Brown illusfr. t. 8. Latham syn. I. I. p. 316. n. 123.*

Habitat in Java et Luzonia, 6 pollices longus.

Rostrum et pedes sordidi; color subtus in caeruleo-vestimentem vergens; caudae pars superior purpurascens; rectrices 2 intermediae unicolores; tectrices caudae inferiores rectricibus aequales.

capen-sis. 133. Ps. viridis, remigibus nonnullis caeruleis, rostro pedibusque rubentibus.

Perru-

Perruche aux ailes bleues. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 173.*

Petite perruche au cap de bonne esperance. *Buff. pl. enlum. n. 455. f. I.*

Blue-winged Parrakeet. *Lath. syn. I. I. p. 317. n. 124.*

Habitat in capite bona speci.

134. *Ps. viridis*, occipitis fascia flava transversim nigro striata. *Petite perruche à collier de l'isle de Luçon. Sonner. it. p. 77. t. 39.*

Perruche à collier. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 173.*

Collared Parrakeet. *Lath. syn. I. I. p. 317. n. 125.*

Habitat in insulis Philippinis, loqui nescius.

Rostrum, irides et pedes ex nigricante grisea. Feminae occiput cyaneum, striis transversis nigris.

135. *Ps. viridis*, vertice coccineo, pectore caeruleo, remigibus majoribus nigris. *Perruche à ailes noires. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 174.*

Petites perruches de l'isle de Luçon. *Sonner. it. p. 77. t. 4. Luzonian Parrakeet. Lath. syn. I. I. p. 318. n. 126.*

Habitat in insula Luzonia; pede altero suspensus dormit, succum recentem ex coco promanantem liguriens.

Rostrum, irides et pedes flava; abdominis color in flavicantem vergens; testrices caudae superiores rubrae; feminae capistrum et pectus rubrum; cervix macula flava.

Tovi. **136.** *Ps. viridis*, juguli macula pallide aurantia, alarum fascia lata castanea cum splendore aureo viridi.

Psittacula gutture luteo. Briff. av. 4. p. 396. n. 89. t. 30. f. 3.

Tovi à gorge jaune. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 280.*

Petite perruche à gorge jaune d'Amérique. *Buff. pl. enlum. n. 190. f. I.*

Magnitudo alaudae cristatae; longitudo $6\frac{3}{4}$ pollicum; pedes grisei.

Tirica. **137.** *Ps. viridis*, rostro incarnato, pedibus et unguibus caerulecentibus.

Psittacula brasiliensis. Briff. av. 4. p. 382. n. 81.

Tui-Tirica. *Raj. av. p. 34. n. 3. Will. orn. p. 116. c. 4. f. 4. n. 3.*

Tirica. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 281.*

Petite Jaseuse. *Buff. pl. enlum. n. 837.*

Green Parrakeet. *Brown. jam. p. 473. Latham syn. I. I. p. 320. n. 129.*

138. Ps.

z. 120.
x rufo
angues

alarum
rpurea
I.
eri fus-
ongae;
pedes

s, cau-
. t. 30.
L.
I. f. 2.
22.
pollices

put vi-
lae fa-
fscienti-
p. 172.
. 1.
t. 41.
m syn.

centem
cices 2
reEtri-

edibus-
Perru-



Sosove. 138. Ps. viridis, alarum et te^ctricium caudae macula dilute flava.

Sosové. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 280.

Petite perruche de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 456. f. 2.

Cayenne Parrakeet. Lath. syn. I. I. p. 320. n. 130.

Habitat in Guiana, facile cœcurandus, et eximie garrulus.
Rostrum et pedes grisea.

Tui. 139. Ps. viridis, fronte aurantia, orbitis flavis.
Psittacula brasiliensis i^cterocephalos. Briff. av. 4. p. 398. n. 90.

Tui species 4. Raj. av. p. 34.

Tovi à tête d'or. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 284.

Petite perruche de l'isle de S. Thomas. Buff. planch. enlum. n. 456. f. 1.

Tui of the Brasiliens, 4th species. Will. orn. p. 116. f. 4.

Gold-headed Parrakeet. Lath. syn. I. I. p. 321. n. 131.

Habitat in Brasilia, sturni magnitudine.

Rostrum nigrum; oculi magni et nigricantes.

erythro- chlorus. 140. Ps. viridis, capite cristato, alis caudaque rubris.
Psittacula cristata. Briff. av. 4. p. 404. n. 94.

Psittacus erythrochloros cristatus Aldrovandi. Raj. av. p. 34. n. 4.

Crested red and green Parrot of Aldrovandus. Will. ornith. p. 116. f. 3.

Crested red and green Parrakeet. Latham syn. I. I. p. 321. n. 132.

Irides rubrae; crista pro arbitrio mobilis, pennis sex conflans, tribus majoribus.

mexica- nus. 141. Ps. viridis, fronte cristata, te^ctricibus alarum et cauda purpureis, orbitis caeruleis, gula flava, cœvice rubra.

Psittacula mexicana cristata. Briff. av. 4. p. 405. n. 95.

Avis de cocho, psittaci species mexicana vario colore. Seb. mns. I. p. 94. t. 39. f. 2.

Crested mexican Parrakeet. Lath. syn. I. I. p. 322. n. 133.

Habitat in nova Hispania, 7 pollices longus.

Rostrum flavum; remigum margo albus; pedes et ungues cinerei.

dilute
f. 2.
ulus.
3. n. 90.
enlum.
6. f. 4.
131.
v. p. 34.
. ornith.
p. 321.
sex con-
et cauda
rubra.
95.
re. Seb.
2. n. 133.
ungues

46. RAMPHASTOS. *Rostrum maximum, inane, con-
vexum, extrosum serra-
tum: mandibula utraque
apice incurva.*

*Nares pone rostri basin, lon-
gae, angustae.
Lingua pennacea.
Pedes scanforii (plerisque).*

- viridis.** 1. *R. viridis abdomine flavo, uropygio rubro.*
Tucana cayennensis viridis. Briff. av. 4. p. 423. n. 8. t. 33.
f. 2.
Toucan verd de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 727. 728.
Green Toucan. Lath. syn. I. I. p. 331. n. 9.
Habitat in Cayenna, 14 pollices longus.
*Mandibularum dentes albi; inferior nigra, basi et circa na-
res rubra; superior supra flava, ad latera rubra, linea
media nigra; orbitae nudae iridesque flavae; pedes plum-
bei; unguis nigri; cauda cuneata, subtus in cinereum
vergens; caput, gula et jugulum mari nigra, feminae ba-
dia, fascia nigra angusta transversa terminata.*
- pavoni-
nus.** 9. *R. viridis, pennis rubris et pavoninis hinc inde interspersis.*
Tucana mexicana viridis. Briff. av. 4. p. 423. n. 7.
Xochitenacatl. Fern. hist. n. Hisp. p. 51. c. 187.
Hochicat. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 125.
Pavonine Toucan. Lath. syn. I. I. p. 331. n. 8.
*Habitat in novae Hispaniae calidioribus maritimis, piscibus
victitare fertur, dicolori magnitudine.*
Rostrum ex flavo et nigro varium; pedes et unguis nigri.
- piperivo-
rus.** 2. *R. viridis, antice niger, crisco femoribusque rubris.*
Tucana cayennensis torquata. Briff. av. 4. p. 429. n. 10.
t. 32. f. 2.
Kouluk. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 128.

Toucan

*Genus hoc in sola America australi intra tropicos obvium, frigoris impatiens, fructibus
praesertim palmarum vicitat, facile cicuratur; in patria parvo gregibus, numero
oiono vel denario volitat, in arborum cavis a picis relixis nidificat, bina ova
ponens, numerosum.*

Z

RAM

Toucan à collier de Cayenne, et Toucan à ventre gris de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 577. et 729.*

Green Toucan. *Edw. glean. t. 330.*

Piperine Toucan. *Lath. syn. I. I. p. 334. n. II.*

Habitat in Cayenna, 13 pollices longus.

Rostrum nigrum, basi rubrum; orbitae incarnatae aut caerulentes; tempora macula aurantia; cervicis lunula aurantia; remiges fuscae, margine viridi; cauda cuneiformis, subtus fusca, apice badia; tectrices caudae inferiores rubrae; pedes plumbei; unguis nigri. Femina subtus grisea, cervice fusca.

Aracari. 3. R. viridis, fascia abdominali, crasso uropygioque rubris, abdomine flavo.

Ramphastos rostro nigro, mandibula superiore lateribus alba, basi triloba. *Syst. nat. I. p. 104.*

Tucana brasiliensis viridis. *Briss. av. 4. p. 426. n. 9. t. 33. f. 2.*

Aracari. *Marcgr. bras. 217. Raj. av. p. 44. n. 2. Will. orn. p. 140. t. 22. Lath. syn. I. I. p. 332. n. 10.*

Grigri. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 126.*

Toucan verd du Brésil. *Buff. pl. enlum. n. 166.*

Habitat in Brasilia, Surinamo, Cayenna, ultra 16 pollices longus.

Rostri mandibula superior dorso et apice nigra, lateribus albicans, basi triloba ad nares, arcu albo ad radicem; inferior nigra. Caput, alae et cauda nigra; pectus et abdomen flava coccineaque, cum macula nigra subrotunda in medio pectore, similisque macula transversalis ad initium ventris. Uropygium coccineum; femora rufa.

Jacquin.

torqua- 10. R. supra niger, subtus albicans, abdomine viridi, postice tus. rubro, torque rubro.

Tucana mexicana torquata. *Briss. av. 4. p. 421. n. 6.*

Cochiténacatl. *Fern. hist. nov. Hisp. p. 46. c. I. 60.*

Cochicat. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 124.*

Collared Toucan. *Lath. syn. I. I. p. 330. n. 7.*

Habitat in novae Hispaniae maritimis, 18 pollices longus; pectoribus viellitare fertur.

Rostri mandibula superior albicans, inferior nigra; irides ex rubicundo flavae; caput collumque nigra; tectrices caudae inferiores rubrae; femora purpurea; pedes ex virescente cinerei; unguis nigri.

4. R.

pisciv
rus.

eryt
rhyt

Tuc

- piscivo- 4. R. nigricans, fascia abdominali criscoque rubris, uropygio
rus. albo.
Tucana brasiliensis gutture albo. *Briss. av. 4. p. 413. n. 3.*
Picus americanus. *Hern. mex. 697.*
Xochitenacatl tertia. *Raj. av. p. 178. n. 6.*
Toucan à gorge blanche de Cayenne, appellée Tocan. *Buff. pl. enlum. 262.*
Toucan or brasiliian Pye. *Edw. av. 2. t. 64. Bancr. Guj. p. 163.*
Brasilian Toucan. *Lath. syn. I. I. p. 327. n. 4.*
Habitat in America australi, 21 pollices longus.
Rostrum luteum, apicis macula coccinea, mandibula inferior
caerulea; pedes caerulei; nigra pileus, dorsum, alae,
cauda, venter, femora; albida tempora, gula, pectus,
uropygium; rubra fascia pectoralis et crissum.
- erythro- II. R. nigricans, genis, gula, et jugulo albis, testicibus cau-
rhynchos, dae superioribus sulphureis, inferioribus et pectoris lunu-
la rubris.
Tucana cayennensis gutture albo. *Briss. av. 4. p. 416. n. 4.*
t. 31. f. 2.
Red-beaked Toucan. *Edw. glean. t. 238. Lath. syn. I. I. p. 328. n. 5.*
Habitat in America australi, praecedentis magnitudine.
Rostrum basi dorsoque flavum, mandibulae superioris apice
inferiorisque fundo rubris, naribus nigro-marginatis;
orbitae caerulecentes; pedes plumbei; unguis nigri.
- Tucanus. 5. R. nigricans, fascia abdominali, criscoque flavis.
Ramphastos rostro rubro, carina obtusa albida. *Syst. nat. I. p. 103.*
Tucana, *Marcgr. bras. 217.*
Tucana brasiliensis gutture luteo. *Briss. av. 4. p. 419. n. 5.*
t. 32. f. 1.
Toucan surinamensis niger ex albo, flavo, rubro mixtus.
Pet. gaz. t. 44. f. 13.
Toucan à gorge jaune du Brésil. *Buff. pl. enlum. n. 307.*
Yellow-breasted Tucan. *Edw. glean. t. 329. Latham syn. I. I. p. 326. n. 3.*
Habitat in America australi, 19 pollices longus.
Genae, gula et cervix aurantiae; fascia abdominalis et cris-
sum in rubrum colorem vergunt; uropygium sulphureum;
rostrum nigrum, basi griseum; pedes et unguis plumbei.

4. R.

Z 2

6. R.

picatus. 6. R. nigricans, pectore luteo, crisco rectricumque apicibus rubris, uropygio nigro.

Ramphastos rostro rubro apice nigro, carina compressa. *Syst. nat.* I. p. 103.

Tucana. *Briss. av.* 4. p. 408. n. I.

Pica brasiliensis. *Gesn. av.* 800. *Aldr. orn.* I. p. 801. Raj. av. p. 44. n. I.

Brazilian Pyc or Toucan. *Albin. av.* 2. t. 25. *Will. orn.* p. 128. t. 20.

Toucan à ventre rouge. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 122.

Preacher Toucan. *Lath. syn.* I. I. p. 329. n. 6.

Habitat in Guiana et Brasilia, 8½ pollicibus pedem longitudine excedens.

Rostrum ex flavicanti viride, apice rubicundum; abdomen rubrum; cauda apice rubro-punctata.

dicolore. 7. R. nigricans, pectore, abdomine, crisco uropygoque rubris, gula lutea.

Tucana cayennensis, gutture luteo. *Briss. av.* 4. p. 411. n. 2. t. 31. f. I.

Toucan à gorge jaune. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 118.

Toucan à gorge jaune de Cayenne. *Buff. pl. enlum.* n. 269.

Yellow-throated Toucan. *Lath. syn.* I. I. p. 325. n. 2.

Habitat in Cayenna, 17 pollices longus.

Rostrum olivaceum, basi nigrum, mandibularum margine rubro; genae sulphureae; jugulum aurantium, margine sulphureo.

Toco. 12. R. nigricans, gula, jugulo et uropygio albis, orbitis, pectoris circulo criscoque rubris.

Toucan de Cayenne, appellé Toco. *Buff. pl. enlum.* n. 82.

Toco. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 117. *Lath. syn.* I. I. p. 325. n. I. t. 9.

Habitat in Cayenna, 9-10 polices longus.

Rostrum ex rubicundo flavum basi nigrum, mandibulae superiores apice nigro.

luteus. 13. R. ex flavicante albus, striis colli lateralibus duabus nigris, cauda et aliis ex albo et nigro variis, teccricibus alarum minoribus flavis.

Tucana lutea. *Briss. av.* 4. p. 432. n. II.

Alia Xochitenacatl. *Nieremb. hist. nat.* p. 207. *Johnst. av.* p. 119.

Aracari à bec noir. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 130.

An

An other sort of Xochitenacatl, Toucan or Brasilian Pye.

Will. orn. p. 386.

Blackbilled Toucan. *Lath. syn. I. I. p. 335. n. 12.*

Habitat in nova Hispania, columbae magnitudine.

Rostrum nigrum; irides flavae; pedes fuscis; unguis flavi-
cantes.

Raj. caeruleus. 14. *R. caeruleus, cinereo admisto.*

Tucana caerulea. Briss. av. 4. p. 433. n. 12.

Xochitenacatl. *Nieremb. hist. nat. p. 209. Fern. hist. p. 47.*
c. 146. Johnst. av. p. 126. 157. t. 56.

Blue Toucan. *Lath. syn. I. I. p. 335. n. 13.*

Habitat in novae Hispaniae maritimis, columbae magnitu-
dine.

Rostrum corpore ipso longius; oculi nigri; irides fulvae.

dubius. 15. *R. gula caerulea.*

Blue throated Toucan. *Lath. syn. I. I. p. 336. n. 14.*

albus. 16. *R. totus albus.*

White Toucan. *Lath. syn. I. I. p. 336. n. 15.*

Momota. 8. *R. pedibus gressorii.*

Momot. *Will. orn. p. 386. t. 24. Raj. av. p. 164. Briss.*
av. 4. p. 465. t. 35. f. 3.

Guira Guainumbi. *Maregr. brasf. 193. Raj. av. p. 49. n. 4.*

Houtou ou Momot. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 430. t. 20.*

Momot du Brésil. *Buff. pl. enlum. n. 370.*

Brazilian sawbilled Roller. *Edw. glean. t. 328.*

Brazilian Motmot. *Lath. syn. I. I. p. 338. n. 1. t. 10.*

$\beta.$ *Momotus varius. Briss. av. 4. p. 469. n. 2.*

Yayaquitotl. *Raj. av. p. 167. n. 19.*

Yayaquitotl or longtailed Bird. *Will. orn. p. 386.*

Variegated Motmot. *Lath. syn. I. I. p. 340. n. 1. A.*

Habitat in Americae australis densis silvis, solitarius, in
terra, aut fovea, a Dasypode relicta nidum struens ex gra-
mine secco, et bina ova ponens; viellans insectis, et car-
ne cruda, cuius frustula in aqua macerat, rostro prehen-
sa violentis ictibus verberat. Vox rauca, tremula, debi-
lis. Jacquin.

Corpus magnitudine merulac sesquipedale, splendide oliva-

ceum, subtus ferrugineum, in $\beta.$ ex viridi, fulvo, cae-

ruleo, et cinereo mixtum. Caput majusculum vertice cae-

ruleo medio nigro; mystaces ad angulos oris longiores mo-

biles; remiges caeruleae; cauda cuneiformis, $11\frac{1}{2}$ pollices

longa,

Z 3

An

longa, teētricibus 2 intermedis longioribus in medio non-nunquam nudis; rostrum mediocre, vix 2 pollices longum, atrum; pedes nigri, digito uno postico; unguis aduncus.
Differat a praecedentibus rostro minore, pedibusque non scandens; an ideo generis distincti? Vtare videntur lingua pennacea, rostrique serrae.

47. BUCEROS. *Rostrum convexum, curvatum, cul-tratum, magnum, extrorsum ferratum: Frontis calvaria nuda, osseο-gibbosa.*

Nares pone rostri basin.

Lingua acuta, brevis.

Pedes gressorii.

bicornis. I. B. fronte ossea plana antrorum bicorni. *Amoen. acad. 4. p. 237.*

Hydrocorax philippensis. Briss. av. 4. p. 568. n. 2.

Rhinoceros avis prima varietas. Will. orn. t. 17. f. 1.

Calao. Pet. gaz. 43. t. 28. f. 6. et t. 31. f. 1. Edw. av. 2. p. 151. t. 281. f. D.

Philippine Hornbill. Lath. syn. I. 1. p. 345. n. 3.

B. Calao vel Cayao. Aet. angl. vol. 23. p. 1394.

Habitat in insulis Philippinis magnitudine gallinae niger, subitus albus; remigum macula alba; cauda longiuscula nigra; rectrices 10, extimae 4 utrinque albae; pedes viventes.

B. rostro cinnabarinus, abdome nigro, dorso et uropygio ex fusco cinereis, voce porci aut vituli, Indis adoratus, fructibus vivit, quos integrus deglutit, et exterioribus partibus concoctis, nucleos illaeos eruetat.

abyssini- 5. B. niger, fronte ossea prominentia antrorum semicirculari, cus. orbitis, gula jugulique parte nudis ex violaceo fuscis, remigibus majoribus albis.

Calao d' Abyssinie. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 155.

Grand Calao d' Abyssinie. Buff. pl. entom. n. 779.

Abyssinian Hornbill. Lath. syn. I. 1. p. 347. n. 4.

Habi-

Aves hujus generis in antiquo orbe easdem regiones occupant, quam superioris in America, vidu quoque, uti quidem videtur, iis similes.

nigrae; haec arcu sordide griseo terminata; occiput et cervix pallide castanea; dorsum, humeri, uropygium, tectrices alarum caudaeque fusca; pectus et abdomen nigrantia, hoc postice flavicans; cauda ex cinereo sordide alba; pedes ex griseo fusi; unguis nigri.

- Rhinoce- 3. B. cornu mandibulari frontis recurvato.
ros. Hydrocorax indicus. Briff. av. 4. p. 571. n. 4.
Rhinoceros. Bont. jav. 63. t. 64. Olear. mus. t. 15. f. 4.
Worm. mus. 293. Aldr. orn. I. p. 84. Besler. mus. t. 20.
Lath. syn. I. I. p. 342. n. 1.
Corvus indicus cornutus seu Rhinoceros avis Bontii. Raj.
av. p. 40. n. 8.
Horned Indian Raven or Rhinoceros-Bird. Will. orn. p. 127.
t. 17. Edw. glean. t. 281. f. B.
Calao Rhinoceros. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 161.
Bec de l' oiseau Rhinoceros. Buff. pl. enlum. 934.
Habitat in India, insulisque oceanii Indici, tripedalis, rassis,
muriibus, carne, cadaveribus vicitans, venatores conco-
mitans, exenta intestina ingurgitatura, gallopavonis fe-
re magnitudine.
Rostrum 10 pollices longum ex albidente flavum; mandibula
superior basi rubra, inferior nigra; cornu 8 pollices lon-
gum, ex albo et nigro varium; corpus nigrum, subtus
et postice sordide album; cauda 12 pollices longa; tectri-
ces inferiores albae et nigrae; rectrices basi et apice albae,
in medio nigrae; pedes et unguis obscure grisei.
- galcatus. 8. B. rostro rectiusculo, prominentia fere quadrata, posterius
rotundata, anterius plana.
Calao à casque rond. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 159. pl.
enlum. n. 933.
Helmet Hornbill. Lath. syn. I. I. p. 343. n. 2. Edw. glean.
t. 281. f. C.
Rostrum 8 pollices longum, plurimam partem rubrum.
- panayan- 9. B. ex virescente niger, subtus ex rubro fuscus, prominen-
sis. tia mandibulae superioris supra acuta, et ad latera plana.
Calao à bec ciselé de l' isle de Panay. Sonner. it. p. 122.
t. 82. 83.
Calao de l' isle de Panay. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 145.
pl. enlum. n. 780. 781.
Panayan Hornbill. Lath. syn. I. I. p. 353. n. 8.
Habitat in insula Panay, coracis magnitudine.

Rostrum

put et
gium,
en ni-
ordide

f. 4.
t. 20.
Raj.
. 127.
rattis,
conco-
nis fe-
dibula
es lon-
subtus
teetri-
albae,

sterius
9. pl.
glean.
ninen-
plana.
. 122.
. 145.
ostrum

manil-
lensis.

Rostrum longissimum, arcuatum, fuscum, lateribus transver-
sim rugosum, sulcis aurantiis; orbitae nudae fuscae; iri-
des albidae, caput collumque feminae alba, macula ma-
gna triangulari ex virescenti nigra; rectrices 10, a basi
ultra medium ex rufo lutea, apice nigra; pedes plumbei.

10. B. supra ex nigricante fuscus, subtus fordide albus, rostro
non ferrato: prominentia exigua.
Calao de Manille. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 144. planch.
enlum. n. 891.
Manilla Hornbill. Lath. syn. I. I. p. 354. n. 9.
Habitat in insula Manilla.
Rostrum minus curvatum, apice magis acuto; caput collum-
que alba, fuso-undulata; temporum macula nigra;
caudae fascia media rufa.
- nasutus. 4. B. fronte laevi, rectricibus basi apiceque albis.
Crotophaga. Forskal Faun. arab. p. 2. n. 4.
Hydrocorax senegalensis melanorhynchos. Briff. av. 4. p.
573. n. 5. t. 46. f. 1.
Tock. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 141.
Calao à bec noir du Sénégal. Buff. pl. enlum. n. 890.
Blackbilled Hornbill. Lath. syn. I. I. p. 355. n. 10.
β. Hydrocorax senegalensis erythrorhynchos. Briff. av. 4.
p. 575. t. 46. f. 2.
Calao à bec rouge de Senegal. Buff. pl. enlum. n. 260.
Habitat ad fluvium Senegal, et in aliis calidioribus antiqui
orbis; fructibus vicitans, junior facile cicurandus, ma-
gnitudine picae.
Rostrum deorsum curvatum cum pedibus nigrum, adultiori
rubrum; corpus supra fordide griseum, pennarum apice
albido, subtus fordide album; genarum frisia similiter for-
dide alba; rectrices 2 intermediae fordide griseae; reli-
quae 10 ad medium usque et apice albae, ceterum nigri-
cantes; unguis nigri.
- albus. 11. B. niveus, rostro pedibusque nigris.
White Toucan. Hawkesw. it. I. p. 123.
White Hornbill. Lath. syn. I. I. p. 357. n. II.
Captus inter insulas Tinian et Pulotimoen, anseris magni-
tudine.
Rostrum angustum, et pedem longum.

obscen- 12. B. rostri prominentia supra rotundata septem- vel octoloba.
rus. Wreathed Hornbill. *Lath. syn.* I. I. p. 358. n. 12.
Indian Raven. *Will. orn.* t. 78.
Rostrum 5 - 6 pollices longum, prominentia pollicem alta;
mandibularum margo non ferratus.

48. BUPHAGA. *Rostrum rectum subquadrangulare:*
mandibulis gibbis integris, extorsum gibbosioribus.
Pedes ambulatorii.

africana. I. Buphaga. *Briss. av.* 2. p. 457. n. I. t. 42. f. 2.
Pie-boeuf. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 175. t. 14. *planch.*
enlum. n. 293.
African Beef-eater. *Lath. syn.* I. I. p. 359. n. I. t. 12.
Habitat ad fluvium Senegal; dorso boun insidens extrahit
oestrorum larvas; alaudae cristatae magnitudine, 8½
pollices longa.
Corpus supra ex griseo fuscum, subtus et uropygio flavicans;
rostrum nunc flavicans apice rubro, nunc nigrum, 10
lineas longum; cauda cuneiformis; rectrices 12 acutae, ex
griseo fuscae, lateralibus interius rufis; pedes et unguis
fusci.

49. CROTOPHAGA. *Rostrum compressum, semiovatum, arcuatum, dorsato-carinatum: mandibula superiore margine utrinque angulata.*

Nares perviae.

Ani. I. Cr. minor, pedibus scandentiis.
Crotophagus. Briss. av. 4. p. 177. t. 18. f. 2.
Crotophagus ater, rostro breviore compresso arcuato-cul-
trato. Brown. jam. 474.
Monedula tota nigra major garrula, mandibula superiore ar-
cuata. Sloan. jam. 2. p. 298. t. 256. f. I.
Ani. *Marcgr. bras.* 193. *Will. orn.* p. 120. *Raj. av.* p. 35.
n. 10. et p. 185. n. 129.
Cacalototl. Raj. av. p. 168. n. 27.

Ani

Ani des savanes. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 420.

Petit bout de petun. Buff. pl. enlum. n. 102. f. 2.

Razor-billed Blackbird. Catesb. car. app. t. 3.

Lesser Ani. Lath. syn. I. I. p. 360. n. I. t. 13.

Habitat in America australi, insulisque Americam spectantibus gregaria; nidificant in eodem nido amplissimo saepe 50; singulae feminæ sibi propinquae suis ovis, quae bis in anno pariunt, marini coloris, versus utrumque finem maculata, incubant, quae foliis tegunt. Viicit frumentis, seminibus, vermicibus, insectis, potissimum gryllis, imprimis vero acaris riciinis in bobus copiofissimis, ideoque accendentibus hinc boves se prostertere feruntur, ut ricos evellant, qui alias nimium multiplicarentur.

Longitudo 13½ pollicum; corpus nigrum; cauda longa, cuneiformis, rectricibus 10 confans; mandibula superior apice incurvata; nares ovatae; lingua carnosa, integra; pedes nigri.

major. 3. Cr. major, pedibus scandoriis.

Crotaphagus major. Briss. av. 4. p. 180. t. 18. f. 2.

Grand Bout de Petun. Buff. pl. enlum. n. 102. f. 1.

Ani des palétuviers. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 423. t. 19.

Salern. orn. p. 73. n. 10.

Greater Ani. Lath. syn. I. I. p. 362. n. 2.

Habitat in Cayenna, facile ciceranda, et psittaci more docilis; 18 pollices longa, ceterum praecedenti similis.

ambula- 2. Cr. pedibus ambulatoriis.

toria. Walking Ani. Lath. syn. I. I. p. 363. n. 3.

Habitat in Surinamo, praecedenti, si pedes excipias, simillima; rectrices 10.

GLAUCOPIS. Rostrum incurvatum, fornicatum, mandibula inferiore breviore subtus ad basin carunculata.

Nares depressae, membrana subcartilaginea semitecta.

Lingua subcartilaginea apice incisa et ciliata.

Pedes ambulatorii.

cinerea. 1. Glaukopis.

Cinereous Wattle-bird. Latham syn. I. I. p. 364. n. I.
f. 14.

Habi-

Habitat in nova Seelandia, picae magnitudine, 15 pollices longa; in terra ambulans, rarius arboribus insidens, bacis, insectis, aviculis quoque vicitans, sibilans et murmurans. Caro sapidissima. Forster.

Rostrum nigrum, prout totum corpus una cum pedibus; caruncula primo caerulea, post aurantia; irides egregie caeruleae; cauda longa, cuneiformis, relectricibus 12 constans; pedes longi; unguis posterior reliquis longior.

50. CORVUS. *Rostrum convexum, cultratum. Nares pennis setaceis recumbentibus obtectae.*

Lingua cartilaginea bifida. Pedes ambulatorii.

hotten- 1. *C. virescenti-ater, cauda aequali, mystacibus longissimis.*
tottus. *Monedula capititis bonae spei.* Briff. av. 2. p. 33. n. 10. t. 2.
f. 2.

Choucas moustache. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 79.
Choucas du cap de bonne esperance. Buff. pl. enlum. n. 226.
Habitat ad caput bonae spei, 11 $\frac{1}{4}$ pollices longus.
Supra nares mystaces nigrae tres pollices longae, breviores et rigidæ in angulis oris; pennæ cervicis angustiores et longiores reliquis, laxæ, et quasi fluitantes.

Corax. 2. *C. ater, dorso atro-caerulecente, cauda subrotundata.*
Faun. groenl. p. 62. n. 38.

Corvus maximus. Scop. ann. I. p. 34. n. 45.
Corvus. Gesn. av. 334. Aldrov. orn. I. p. 684. t. 685.
Jonst. av. 38. t. 16. Raj. av. p. 39. n. 1. Briff. av. 2. p. 8. n. 1.
Corbeau. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 13. t. 2. pl. enlum. n. 495.

Raven. Arct. zool. 2. p. 245. n. 134. Brit. zool. I. p. 218. n. 74. Alb. av. 2. p. 19. t. 20. Will. orn. p. 121. t. 18.
Lath. syn. I. I. p. 367. n. 1.

Rabe. Frisch. av. t. 63.

β. Corvus varius. Briff. av. 2. p. 12. n. 1. A.
Cacalotl. Fernand. hist. nov. Hisp. p. 48.

γ. Corvus albus. Briff. av. 2. p. 12. n. 1. B. Schwenckf. av. Silef. p. 245.

δ. Corvus feroxensis ex albo et nigro mixtus. Brünnich ornith. bor. p. 8.

Habi-

Habitat in omni Europa, Sibiria, Camtschatea, America boreali ad novam usque Hispaniam, duos ut plurimum pedes duosque pollices longus, vicitat cadaveribus, aviculis vivis, agnis infirmis, famelicus adeo pellibus siccis et excrementis, ovis, piscibus, testaceis, baccis, feris, in regionibus potissimum magis borealibus, convivalis, furto deditus, clamitans, loqui addiscit; nidificat in altis arboribus aut rupibus; coit Martio, parit Aprili 5-6 ova, ex caerulecente viridia fusco-maculata, quibus mas interdiu, femina noctu incubat; longaevis, olfactu acerimo praeditus. Caro Groenlandis edulis, pellis in vestimentis adhibita, alae scopulis, remiges fijae pescatui.

Rostrum paulisper curvatum, dente utrinque exiguo.

- clericus. 20. C. totus niger, mento albo, rostri basi cinerea. *Sparrmann mus. Carlsson. t. 2.*
Habitat in Suecia, rarissimus, an vere distincta a corace species?
Color in maxima corporis parte fuliginosus; remigum et rectricum supra in violaceum vergens.

- australis. 21. C. totus niger, menti pennis laxioribus, remigibus ex fuscenti nigris.
South-sea Raven. Lath. syn. I. I. p. 369. n. 2.
Habitat in insulis amicis maris australis, 19 pollices longus.
Cauda 8 pollices longa.

- Corone. 3. C. atro-caerulescens totus, cauda rotundata, rectricibus acutis. *Fn. suec. 86. Scop. ann. I. p. 35. n. 36.*
Cornix. Gesn. av. 320. t. 321. Aldr. orn. I. p. 734. t. 736.
Raj. av. p. 39. n. 2. Briff. av. 2. p. 12. n. 2.
Corneille. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 45. t. 3. pl. enlum.
n. 483.
Carrión Crow. Brit. zool. I. n. 75. t. 34. Arct. zool. 2.
p. 246. n. 135. Albin. av. 2. t. 21. Will. orn. p. 122.
t. 18. Lath. syn. I. I. p. 370. n. 3.
 β . Cornix varia. *Briff. av. 2. p. 15. n. 2. A.*
Corvus varius. Brünn. orn. bor. p. 8. n. 8.
Bunte Kraehe, schekige Kraehe. Frisch. av. t. 66.
 γ . Cornix alba. *Briff. av. 2. p. 15. n. 2. B.*
Habitat in Europa, Sibiria, boreali America, insulis Philippinis, nova Guinea, nova Hollandia, nova Caledonia, Madera, corace minor, 18 pollices longa; cadaveribus et vivis adeo animalibus minoribus et debilioribus vicitans, sed fructibus etiam, seminibusque, hinc segetibus aliquando

do infesta; in silvarum arboribus nidificat, et 5 – 6 ova parit, coracinis similia.

Tota ex atro caerulescens, coracis modo dorsum; femina minus splendida; fances, prouti etiam thoracis, nigrae; trachea proprius musculis instrueta, subtus ad dichotomiam antice 4, postice 2.

frugile- 4. C. ater, fronte cinerascente, cauda subrotundata. Faun. gus. Suec. 87. It. oel. 67.

Cornix frugilega. Aldrov. orn. I. p. 751. t. 753. Raj. av. p. 39. n. A. 3. Briss. av. 2. p. 16. n. 3.

Freux ou Frayonne. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 55. planch. enlum. n. 484.

Rook. Brit. zool. I. n. 76. Arct. zool. 2. p. 250. n. A. Albin. av. 2. p. 21. t. 22. Will. orn. p. 123. t. 18. Lath. syn. I. I. p. 372. n. 4.

Schwarze Kraeh. Frisch. av. t. 64.

Habitat in Europa et occidentali Sibiria, magnis gregibus mane potissimum et vespere volitans; plures pernoctant in arbore, unde facile capiuntur, valde sonori; vermis, larvis, potissimum scarabaeorum, sed seminibus etiam vivitant, binc agris infestis; Martio jam nidificare incipiunt, ovaque pariunt cornicinis similia. Juniorum caro sapida. Nigredini intermixtus Splendor purpureus; caudae supra viridis; rostrum magis rectum, gracilis, debilis, quam praecedenti, 2½ pollices longum, basi albicans, naribus nudatis.

Cornix. 5. C. cinerascents, capite, jugulo, alis caudaque nigris. Fn. Suec. 88. Scop. ann. I. p. 35. n. 37.

Cornix cinerea. Briss. av. 2. p. 19. n. 4.

Cornix cinerea frugilega. Gesn. av. 332. Aldrov. orn. I. p. 754. t. 755. Raj. av. p. 39. n. A. 4.

Cornille mantelée. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 61. t. 4. pl. enlum. n. 76.

Roxton Crow. Albin. av. 2. p. 22. t. 23. Will. orn. p. 124. t. 77.

Hooded Crow. Brit. zool. I. n. 77. Arct. zool. 2. p. 251. n. B. Flor. Scot. I. p. 20. t. 2. Lath. syn. I. I. p. 374. n. 5.

Nebel-

Plurimae corvi species in omni climate obviae, perquam sonorae, in arboribus nidificant, et 6 ova pariunt; viclus plurimis ex animali et vegetabilis mixtus.

Nebelkrache. *Frisch. av. t. 65.*
 Graue Krau, Krauveitl. *Kram. elench. p. 333.*
Habitat in Europa et Asia, Alberto magno jam dicta, Octo-
bri ex Subalpinis in planities descendens, gregaria, cada-
veribus, quisquiliis, vivis quoque animalibus minoribus, avi-
bus, testaceis, ranis, coquleis, insectis horumque larvis,
rarius baccis semenibusque viicitans; in Suecia relegata,
at injuste, quum purget prata a larvis phalaenae calamit-
tosae graminumque radicibus subjacentibus tipularum lar-
vis; ventis adversa confidet; lepide capitur cucullo papy-
raceo in nive.
Magnitudo frugilegi; longitudo 22 pollicum.

dauricus. 22. C. ater, vertice ex caeruleo atro, cervice, jugulo et ab-
 domine albis. *Pall. it. 3. p. 694. n. 8.*
Cornille du Sénégal. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 67. pl.

ennum. n. 327.

Chines black Raven with white neck. Osb. it. I. p. 377.
White-brested Crow. Fryer it. p. 21. Latham syn. I. I.

p. 376. n. 6. t. 15.

β . Corvus totus niger, cervice juguloque fuscis.

Habitat in Sina, Mongolia, Persia, ad lacum Bajkal, flu-
viumque Lena, in insula Ivanna, et ad fluviūm Senegal,
gregaria, monedulae facie et magnitudine, 12 pollices et
ultra longus; insectis fructibusque viicitans.

Cauda et alae nitore virescente.

caledoni- 23. C. cinereus, rostro, palpebris, cauda pedibusque nigris.
 cus. *New caledonian Crow. Latham syn. I. I. p. 377. n. 7.*
Habitat in nova Caledonia, 15 circiter pollices longus.
Cauda 5 polices, rostrum 14 lineas longum; irides flavof-

centes.

jamai- 24. C. totus niger.
 cenis. *Cornix jamaicensis. Briss. av. 2. p. 22. n. 5.*
Corneille de la Jamaique. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 67.
Chattering Crow or Cacao Walk. Raj. av. p. 181. Sloan.

jamaic. 2. p. 298. Lath. syn. I. I. p. 377. n. 8.

Habitat in Jamaicæ montanis, perpetuo garrulus, baccis et
scarabæis viicitans, 18 pollices longus.

Monedu- 6. C. fuscus, occipite incano, fronte, alis caudaque nigris.
 la. *In. suec. 89. Scop. ann. I. p. 36. n. 38.*
Graçulus f. monedula. Gesn. av. p. 520. t. 521.

Mone-

6 ova
emina
igrae;
choto-

Faun.
aj. av.
lanch.

n. A.
Latb.

regibus
tant in
mibus,
etiam
e inci-
um ca-
nreus;
acilius;
basti al-

s. Fn.

orn. I.

t. 4. pl.

p. 124.

p. 251.

p. 374.

Nebel-
us nidi-

Monedula f. Lopus. *Aldr. orn.* I. p. 770. t. 771. *Raj. av.* p. 40. A. 5. *Briss. av.* 2. p. 24. n. 6. *Günther Neft. u. Eyer t. II. f. inf.*

Choucas. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 69. *pl. enlum.* n. 523. **J**ackdaw. *Brit. zool.* I. n. 81. t. 34. *Arct. zool.* 2. p. 251. C. *Alb. av.* I. t. 14. *Will. orn.* p. 125. t. 19. *Lath. syn.* I. I. p. 378. t. 9.

Dohle, graue Dohle. *Frisch. av.* t. 67. *Kram. elench.* p. 334.

B. Monedula torquata. *Briss. av.* 2. p. 27. n. 6. A.

Helvetian Daw. *Charlet. ex.* p. 75. n. 7. *onom.* p. 68. n. 7. *Johnß. av.* t. 16.

y. Monedula candida. *Briss. av.* 2. p. 27. n. 6. B. *Schwenckf. av.* Sil. p. 305. *Rzacz. aust. hist. Pol.* p. 396.

d. Monedula nigra. *Briss. av.* 2. p. 28. n. 7. **C**houcas noir. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 69. *pl. enlum.* n. 522.

Chough. *Charlet. ex. et onom.* p. 67. n. 3. *Sibbald Scot. ill.* p. 2. l. 3. p. 15.

Schwarze Dohle. *Frisch. av.* t. 68.

e. Monedula nigerrima, rostro pedibusque miniatis. S. G. *Gmelin it.* 3. p. 365. t. 39.

z. Monedula alis albis, rostro subcurvo.

z. Monedula rostro forficato.

g. Monedula fulcescens, humeris albis.

Habitat in Europae, et occidentalis Sibiriae, s. in Persiac agris, bieme in turribus antiquis summis gregaria, furto pariter dedita, facile cicuranda, ova parit pallidiora, minora, minusque maculata, quam cornices.

Longitudo 13 circiter pollicum; irides albae.

glandarius. 7. C. teetricibus alarum caeruleis, lineis transversis albis nigrisque, corpore ferrugineo variegato. *Faun. succ.* 90. *Scop. ann.* I. p. 36. n. 39.

Garrulus. *Briss. av.* 2. p. 47. n. 1. *Nozeman nederl. Vogel.* t. 1.

Pica glandaria. *Gesn. av.* 700. *Aldr. orn.* I. p. 788. t. 789. *Raj. av.* p. 41. A. 2.

Ghiandaja. *Olin. uccell.* p. 35.

Jeay. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 107. t. 8. *planch. enlum.* n. 481.

Jay. *Brit. zool.* I. n. 79. *Arct. zool.* 2. p. 252. E. *Albin. av.* I. p. 16. t. 16. *Will. orn.* p. 130. t. 19. *Lath. syn.* I. I. p. 37. n. 19. *Hayes brit. birds* t. 7.

Holz-

- aj. av.
lef. u.
n. 523.
51. C.
b. syn.
p. 334.
3. n. 7.
venckf.
argyro-
phthal-
mus.
enlum.
scot. ill.
S. G.
Persiac
i, furto
lidiora,
albis ni-
fuec. 90.
lerl. Vo:
. t. 789.
. enlum.
Albin.
atb. syn.
Holz-
- Holzschrreyer, Eichenheher, Nusshéher. *Frisch. av. t. 55.*
Kram. cl. p. 335. Günth. Neft. u. Eyer, t. 38.
- β. *Garrulus albus. Briss. av. 2. p. 51. n. 1. A.*
Habitat in Europa, et ad montes Uralenses Sibiriae, in silvis, inquietus, facile curandus et docilis, nidum ex bacillis, radicum fibris, tenerioribusque ramis struens, et ova pariens columbinis aequalia, ex cinereo-olivacea, maculis pallide fuscis; colligit nubes, glandes, alias fructus, superfluos defodit sciritque, vicitat etiam segete, aviculis, ovis.
Longitudo 13 pollicum; macula utrinque ad os nigra; capitis pennae praelongae.
25. *C. niger, pectore cyaneo, oculis argenteis, cauda apice alba, rostro pedibusque nigris. Jacquin Beytr. zur Gesch. der Voeg. p. 1.*
Habitat Carthaginæ in America, glandarii magnitudine, in silvis densissimis, vocem claram, sibilantem, non ingratis edens, insectis, fructibus et seminibus vicitans, curatus quoque carne cruda et cocta.
Alae extrinsecus, et macula utrinque supra infraque oculos cyanea.
- dubius. 26. *C. fusco-ferrugineus, vertice temporibusque nigris, collo et abdome flavecentibus, rostro, oculis pedibusque nigris. Jacquin Beytr. zur Gesch. der Voegel, p. 2.*
Habitat Carthaginæ in America.
Lineæ 2 albae a basi rostri trans oculos ad occiput, ubi convergunt.
- cristatus. 8. *C. telectricibus alarum lineis transversis nigris, corpore caeruleo, collari nigro.*
Garrulus canadensis caeruleus. Briss. av. 2. p. 54. n. 2. t. 4. f. 2.
Pica glandaria caerulea cristata. Robert ic. 1676. t. 14.
Geay bleu de Canada. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 120. pl. enlum. n. 529.
Blue Jay. Arct. zool. 2. p. 249. n. 138. Catesb. car. 1. p. 15. t. 15. Edw. glean. 60. t. 239. f. 1. Latham syn. I. 1. p. 386. n. 20.
Habitat in America septentrionali, glandario similis, sed multo minor, 11 pollices longus, gregarius, in uliginosis nidificans, cantu gratissimo; vicitat famelicus vermis et serpentibus, alias nucibus castaneis, potissimum zae-

seminibus, hinc agris, hac confitis infestissimus. Major parit ova olivacea, maculis ferrugineis.
Capitis crista caerulea, stria nigra a rostro ultra oculos produeta; genae cum gula et abdomine albae; pectus ex erinaceo rubrum; dorsum pallide purpureum; tectrices alarum, et remiges secundariae caeruleae, haec etiam una cum tectorium ordine albo-punctatae; cauda longa cuneiformis nigro et caeruleo lineata apice alba; pedes nigri.

Stelleri. 27. C. corpore supra nigro, subtus, alis, caudaque longa cuneiformi caeruleis, capite cristato.

Steller's Crow. *Arct. zool. 2. p. 249. n. 139. Lath. syn. I. I. p. 387. n. 21.*

Habitat in sinu Natka Americae borealis, 15 pollices longus. Tectrices alarum minores remigesque primariae intus fodiadæ; remiges secundariae rectricesque intermediae nigro lineatae.

cayanus. 9. C. subviolaceus subtus candidus, jugulo fronteque nigris, cauda apice alba.

Garrulus cayanensis, tribus utrinque maculis in capite albis.

Briß. av. p. 52. n. 2. t. 4. f. 1.

Geay de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 373.

Blanche-coëffe ou Geay de Cayenne. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 118.

Cayenne Jay. Lath. syn. I. I. p. 389. n. 22.

Habitat in Cayenna, 13 pollices longus.

Rostrum, pedes et ungues grisea; capistrum, genae et nucha nigra; cauda rotundata violacea.

Caryoca- 10. C. fuscus alboque punctatus, alis caudaque nigris: rectrices apice albis: intermediis apice detritis. *Fn. suec. 91. Scop. ann. I. p. 37. n. 40.*

Corvus cinereus, cauda alisque nigris. Fn. suec. I. n. 75.

Caryocatactes. Gesn. av. 245. Will. orn. 90. t. 20. Raj. av. p. 42. Nozem. nederl. Vogel. t. 3.

Merula faxatilis. Aldr. ornith. 2. p. 630.

Nucifraga. Briß. av. 2. p. 59. n. I. t. I. f. I.

Casse-noix. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 122. t. 9. planch. enlum. n. 50.

Nut-cracker. Brit. zool. 2. app. p. 625. t. 3. Arct. zool. 2. p. 252. D.

Waldstarl, Steinheher. Kram. el. p. 334.

Tannenheher. Frisch. av. t. 56.

Nuskrache. Schrank Naturf. XVIII, p. 67.

Habi-

Majo
os pro-
ex eri-
es ala-
m una
ga cu-
s nigri.

iga cu-

longus.
fordi-
nigro

nigris,
e albis.

at. des

et nu-

rectri-
ec. 91.

75.
Raj.

planch.

zool. 2.

Habi-

Habitat in Europa et Sibiria ad Camtschateam usque, in pinetis potissimum, colligit editque infesta, baccas, nuces, praesertim pini pineae; in cavis arborum nidificans, moribus picae similis, 13 pollices longus.

Corpus maculis triangularibus albis; crissum album; vertex caudaeque tectrices non maculatae. Pennae narium aliquando deficientes; lingua bicuspidata.

- Balicas- II. C. virescenti ater, cauda forficata.
fius. Corvus splendide nigro-viridans. Buff. av. 2. p. 31. n. 9.
t. 2. f. 1.
Choucas des Philippines. Buff. pl. enlum. n. 603.
Balicasse des Philippines. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 83.
Habitat in insulis Philippinis, eximie cantans.
Rostrum, pedes et ungues nigra; cauda fere 4 pollices longa.
- novae 28. C. fronte, capistro, caudaque nigris, capite, collo, dorso
Guineae. et pectoris parte superiore obscure cinereis, inferiore, ab-
domine, crissu et uropygio albis transversim nigro-striatis.
Choucas de la nouvelle Guinée. Buff. hist. nat. des ois. 3.
p. 80. pl. enlum. n. 629.
New Guinea Crow. Lath. syn. I. 1. p. 381. n. 13.
Habitat in nova Guinea, pedem longus.
Rostrum nigricans; stria nigra per et pone oculos ducta; pedes breves, fordini.
- papuen- 29. C. cinereus, abdomine albo, remigibus ex nigricante
fisi. fuscis.
Choucas de la nouvelle Guinée. Buff. hist. nat. des ois. 3.
p. 81. pl. enlum. n. 630.
Papuan Crow. Lath. syn. I. 1. p. 382. n. 14.
Habitat in nova Guinea, 11 pollices longus.
Rostrum fere pollicare, flavicans, dorso mandibulae superiores angulato; pedes parvi cinerei; ungues breves.
- nudus. 30. C. niger, pileo ex mollioribus plumis contexto, collo rarius plumis contexto.
Colnud de Cayenne. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 82. planch.
enlum. n. 609.
Bare-necked Crow. Lath. syn. I. 1. p. 382. n. 15.
Habitat in Cayenna, monedulae magnitudine.
Rostrum basi latum, fordini caeruleum; alarum pennae non-nullae dilute griseae.

- calvus.** 31. C. ex ferrugineo fusces, fronte et vertice calvis.
Choucas chauve. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 80. pl. enlum. n. 521.
 Bald Crow. *Latham syn. I. 1. p. 383. n. 16.*
Habitat in Cayenna, 13 pollices longus.
Rostrum paulisper curvatum, sordide nigrum; pedes sordidi; color subtus et in electricibus caudae superioribus dilutior.
- pacificus.** 32. C. cinereus, subtus in spadiceum vergens, occipite, cere, alis caudaque nigris, alarum caudaeque apice albo.
Pacific Crow. Lath. syn. I. 1. p. 383. n. 17.
Habitat in insulis maris australis, 10½ pollices longus.
Rostrum, pedes et ungues nigra; frons et gula pallida; rectrices 2 intermediae totae nigrae.
- tropicus.** 33. C. niger, cristro punctis sordide albis, cauda rotundata.
Tropic Crow. Lath. syn. I. 1. p. 384. n. 18.
Habitat in insula O-why-hee maris australis 12½ pollices longus.
Rostrum 1½ pollicem longum, basi latum; color supra splendens, alarum et caudae in virecentem vergens; pedes et ungues nigri.
- erythro-** 34. C. corpore supra fusco subtus albicante, cauda cuneiformi,
rhynchos. remigibus basi dilute violaceis, medio nigris, apice albis.
Geay de la Chine à bec rouge. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 115. pl. enlum. n. 622.
Red-billed Jay. Lath. syn. I. 1. p. 390. n. 24.
Habitat in Sina, glandario major.
Rostrum pedesque rubri; frons, jugulum et pectus aterrima; occiput et cervix dilute grisea; ungues albicantes, longi, adunci, apice nigri.
- sinensis.** 35. C. supra ex rufo rubens, vertice fusco, superciliis albis, cauda fusca cuneiformi taenia versus apicem nigra, maculisque ad apicem rectricum sordide albis subrotundis.
Chinese Jay. Latham syn. I. 1. p. 390. n. 35.
Habitat in Sina, glandarii magnitudine et habitu.
Rostrum pedesque plumbei; linea trans et pone oculos ducta nigra; macula ex caerulecente et albo mixta circulo nigro inclusa ad aures; mentum album; remiges secundariae fuscae.

36. C.

- sibiricus. 36. C. supra cinereus, subtus ex ferrugineo aurantius, remigibus rectricibus 2 intermediis cinereis, reliquis rectricibus aurantiis.
Geay de Siberie. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 118. pl. enlum. n. 608.*
Siberian Jay. *Lath. syn. I. 1. p. 391. n. 26.*
Habitat in Siberia, 10 pollices longus.
Rostrum *sordidum*; frons, genae, mentum, et jugulum *palida*; vertex ex *subfuscō niger*, *subrufatus*; uropygium ex *ferrugineo aurantium*; pedes *cinerei*.
- peruviana. 37. C. supra dilute viridis, subtus dilute flavus, vertice albo, fasciculo gulæ jugulique nigro, rectricibus tribus utrinque exterioribus flavis.
Geay du Perou. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 116. n. 2. pl. enlum. n. 625.*
Peruvian Jay. *Lath. syn. I. 1. p. 391. n. 27.*
Habitat in Peru.
Rostrum *sordidum*, basi linea caerulea circumscriptum; cauda cuneiformis.
- flavus. 38. C. supra ex virescente fulvescens, subtus flavus, mento et superciliis albis, alis caudaque ex rubescente fuscis.
Garlu ou Geay à ventre jaune de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 119. pl. enlum. n. 249.*
Yellow-bellied Jay. *Lath. syn. I. 1. p. 392. n. 28.*
Habitat in Cayenna, 9 pollices longus.
Rostrum *nigrum*; vertex *stria media*, *longitudinali aurea*; pedes *graciles*, *breves*, *plumbei*.
- aser. 12. C. violaceo-niger, cauda cuneiformi.
Habitat in Africa; nonne idem cum senegalensi?
- cyanus. 39. C. cinereus, vertice splendide atro, alis caudaque cyaneis, rectricibus longissimis, intermediis apice albis. *Pall. it. 3. p. 694. n. 7.*
Blue Crow. *Lath. syn. I. 1. p. 394. n. 30.*
Habitat in Dauria, in quam gregarius adventat Aprili, timidissimus, astutus, clamofus, in arbustis et salicetis nidificans, habitu moribusque picae similis, magnitudine laniis infausti. Corpus subtus magis albidum.
- Pica. 13. C. albo nigroque varius, cauda cuneiformi. *Fn. suec. 92.*
Scop. ann. I. p. 38. n. 41.
Pica. *Nozeman nederl. Vogel. t. 2.*

Aa 3

Pica

Pica varia s. caudata. Gesn. av. 695. Aldr. orn. I. p. 784.
t. 785. Jonst. av. 44. t. 17. Briss. av. 2. p. 35. n. 1.

Pie. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 85. t. 7. pl. enlum. 488.

Magpye or Piapet. Brit. zool. I. n. 18. Arct. zool. 2. p. 247.
n. 136. Hayes brit. birds. t. 8. Raj. av. p. 41. t. 1.
Will. orn. p. 127. t. 19. Albin. av. I. t. 15.

B. Pica candida. Briss. av. 2. p. 39. n. 1. A. t. 3. f. 1.

Habitat in Europa et boreali America atque Asia ad Japon
usque, in Madera insula, ad pagos, in turribus, inter
hostes offensos, sylvarum ofor, junior facile cicurandus, et
tum per quam docilis; vietus animalis et vegetabilis, quis-
quiliae, ova, pulli gallinarum anserumque; nidus artifi-
ciosus, introitu unico; ova virescantia, maculis creberri-
mis nigris. Migrat.

Longitudo 18 pollicum; nigro colori splendor viridis et pur-
pureus; cauda valde longa.

senega- 14. C. nigro-violaceus, cauda cuneiformi, artubus nigris.
lensis; Pica senegalensis. Briss. av. 2. p. 40. n. 2. t. 3. f. 2.

Pie du Senegal. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 97. pl. enlum.
n. 538.

African Crow. Lath. syn. I. I. p. 394. n. 31.

Habitat ad fluvium Senegal, picae magnitudine, 14 pollices
longus.

Color subitus sordide niger; rostrum nigrum; remiges recti-
cesque fuscæ, margine ex violaceo nigro.

caribæ- 40. C. supra ferrugineus, subtus albus, capite, collo, cauda-
us. que cuneiformi albo-striata caeruleis, torque maculaque
occipitali albis.

Galculus antillarum. Briss. av. 2. p. 8. n. 6.

Pica Antillarum, et Pica persica Aldrovandi? Raj. av. p. 152.
et p. 4. n. 6.

Pie des Antilles. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 101. 129.

Habitat in insulis Antillis, picae magnitudine.

Rostrum pedesque rubri; macula occipitis (in mare) lineis
transversis nigris; uropygium tectricesque caudae superio-
res flavæ; remiges ex caeruleo virides, tectrices alarum
minores castaneæ, mediae virides, majores caeruleæ, (in
femina virides) scapis marginibusque albidos.

africa- 41. C. supra fuscus, subtus sordide cineraceens, capite suberi-
nus. stato colloque purpureis, cauda cuneiformi apice alba.

African Crow. Lath. syn. I. I. p. 396. n. 33.

Habi-

p. 784.
n. I.
488.
p. 247.
I. t. I.

Japon
, inter
idus, et
is, quis-
s artifi-
reberri-

et pur-

igris.

enlum.

pollices

s rectri-

cauda-
culaque

. p. 152.

29.

) lineis
superio-
alarum
ae, (in

subcri-
lba.

Habi-

*Habitat in Africa, pedem et 10 pollices longus.
Rostrum pedesque rubri; occipitis pennac apice griseo; remi-
ges exteriori margine caerulecentes.*

- mexica- 42. C. totus ex caeruleo ater.
nus. Pica mexicana major. *Briss. av. 2. p. 43. n. 4.*
Hoitzanatl. *Raj. av. p. 162.*
Criard. *Pernett. it. mal. I. p. 185.*
Hocisana. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 103.*
Mexican Crow. *Lath. syn. I. I. p. 396. n. 34.*
*Habitat in nova Hispania, ad oppida, perpetim sonorus, mo-
nedulae magnitudine.*
Rostrum, pedes et ungues nigri.
- furina- 43. C. viridis, occipite remigumque primariarum apice cya-
menfis. neis, macula cervicis et pone aures pallide viridibus, cau-
da ferdida.
Surinam Daw. *Brown. illustr. t. 10.*
Surinam Crow. *Lath. syn. I. I. p. 397. n. 35.*
Habitat in Surinamo, corones magnitudine.
Color profundus variabilis; rostrum remigesque primariae
ferdida; pedes incarnati.
- Zanoe. 44. C. nigricans, capite colloque subfulvis, cauda longa.
Pica mexicana minor. *Briss. av. 2. p. 44. n. 5.*
Tzanahoei, seu Pica mexicana Hernand. *Raj. av. p. 162.*
Zanoe. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 106.*
Lesser mexican Crow. *Lath. syn. I. I. p. 397. n. 36.*
*Habitat in nova Hispania, picae magnitudine, eique moribus,
astutia, garrulitate, docilitate similis.*
Rostrum, pedes et ungues nigra.
- brachyu- 15. C. viridis, subtus lineisque capitis fulvescentibus, alis ma-
rus. cula alba.
Merula viridis moluccensis. *Briss. av. 2. p. 316. n. 56. t. 32.*
f. I.
Pica indica vulgaris. *Raj. av. p. 195. t. I. f. 10.*
Breve de Bengale. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 414.*
Merle de Bengale. *Buff. planch. enlum. n. 258.*
Short-tailed Crow. *Lath. syn. I. I. p. 398. n. 37.*
- β. Corvus philippensis.
Merula viridis moluccensis. *Briss. av. 2. p. 319. n. 57. t. 32.*
f. 2.
Breve des Philippines. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 413. n. I.*
Merle des Philippines. *Buff. pl. enlum. n. 89.*

Aa 4

γ. Cor-

γ. Corvus bengalensis.Breve. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 413. n. 2.*Madras Jay. *Raj. av. p. 195.*Bengal Quail. *Alb. av. I. t. 31.*Short-tailed Pye. *Edw. glean. t. 324.***δ. Corvus madagascariensis.**Breve de Madagascar. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 414. n. 4.*Merle des Moluques. *Buff. pl. enlum. n. 257.**Habitat in insulis oceanii indici, 6-7 pollices longus.**Rostrum fuscum; caput nigrum, in γ. taeniis nigris, albis et ex aurantio fuscis alternantibus; anguli oris aurantii; irides albidae; gula, remiges et cauda nigrae, bae apice viridi; pedes aurantii; unguis sordide rubri.***canaden-** 16. *C. fuscus*, fronte flavicante subtus rectricumque apicibus albus.*Garrulus canadensis fuscus. Briss. av. 2. p. 54. n. 3. t. 4. f. 2.**Geay brun de Canada. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 117. pl. enlum. n. 530.**Cinereous Crow. Arct. zool. 2. p. 248. n. 137. Lath. syn. I. I. p. 389. n. 23.**Habitat in America boreali, et occidentalis potissimum ejus partis silvis, hieme ad habitacula hominum, audax, furto deditus, per paria volitans, vix ceterandus, penum pro bieme colligens, algis, vermis, carne vicitans, nidificans primo vere in pinibus, ovaque caerulea pariens, incolis detestatus, ad 11 pollices longus.**Rostrum robustum nigrum; nares fasciculo pennarum albidarum tectae; genae ex rufescente sordide albae; verticis pennae longae et nigrae; alae, cauda longa, cuneiformis, et pedes nigrae.***Pyrrhocorax.** 17. *C. nigricans*, rostro luteo, pedibus nigris.*Pyrrhocorax. Gesn. av. 527. Aldrov. av. I. p. 769. t. 16. Briss. av. 2. p. 30. n. 8. t. I. f. 2.**Choucas des Alpes. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 76. t. 6. pl. enlum. n. 531.**Alpine Crow. Lath. syn. I. I. p. 183. n. II.**Choagh. Hayes brit. Birds. t. 6.**Habitat in alpibus Helveticis, 15 pollices longus; voce auēta ingrata; seminibus vicitans, hinc segetibus infestus; caro sapida.**Ungues nigri, pedes aliquando flavi; rostrum, prouti tribus insequentibus, subulatum curvum, longius.***18. C.**

- Graculus. 18. C. violaceo-nigricans, rostro pedibusque rubris. S. G.
Gmelin it. 3. t. 39.
- Gracula pyrrhocorax. Scop. ann. I. p. 42. n. 46.
- Monedula Pyrrhocorax. Hasselq. it. p. 238. n. 19.
- Coracias. Aldr. orn. I. p. 766. t. 368. Briss. av. 2. p. 3.
n. I. t. I. f. I. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. I. t. I. pl.
ennum. n. 255.
- Coracias f. Pyrrhocorax. Raj. av. p. 40. n. 6.
- Graculi tertium genus. Gesn. av. 522.
- Cornish Chough. Alb. av. 2. t. 24. Borlas. Cormw. p. 249.
t. 24. Will. ornith. p. 126. t. 19.
- Red-legged Crow. Brit. zool. I. n. 80. Latbam syn. I. I.
p. 401. n. 39.
- Habitat in alpibus Helveticis et Noricis, Anglia, Scotia,
Aegypto, Candia, Persia, inquietus, clamitans, vorax,
intimidus, furto deditus, moribus monedulae, gregarius,
in circulo volans, in ripibus nidificans, ova partiens
4-5 alba, maculis flavis, visitans baccis juniperi, lo-
cufisis, blattis.
- Magnitudo monedulae; longitudo 16 pollicum; iridum cir-
culus exterior rubens; interior griseus; palpebrae rubrae;
ungues magni, adunci, nigri.
- Australis. 45. C. supra niger, subtus cinereus, rostro rubro, testicibus
alarum albo maculatis, cauda rotundata.
- Cayenne red-billed Crow. Lath. syn. I. I. p. 403. n. 40.
- Habitat in Cayenna, turdi viscivori magnitudine, II polli-
ces longus.
- Rostrum Jesquipollicare; setae narium nigrae; pedes sordidi;
ungues nigri.
- Eremita. 19. C. virescens, capite flavescente, occipe suberistato, ro-
stro pedibusque rubris.
- Upupa Eremita. Syft. nat. X. I. p. 118. n. 3.
- Coracias cristata. Briss. av. 2. p. 6. n. 2.
- Corvus sylvaticus. Gesn. av. 351. Aldr. orn. 3. p. 267. 270.
- Coracias hupé ou Sonneur. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 9.
- Gesner's Wood Crow. Will. orn. p. 396.
- Wood Crow from Switzerland. Albin. av. 3. t. 16.
- Hermit Crow. Lath. syn. I. I. p. 403. n. 41.
- Habitat in alpibus Helveticis, Apenninis, Noricis, gallinae
magnitudine, altissime volans, gregarius, migratorius,

Aa 5

in

*in rupibus, turribus, et antiquis aedificiis nidificans, 2-3
ova pariens, junior facilime cicurandus. Caro sapida.
Color niger, cum splendore viridi; caput striis rubris;
cauda brevis.*

51. CORACIAS. *Rostrum cultratum apice incurvatum, basi pennis denudatum.
Lingua cartilaginea bifida.
Pedes ambulatorii.*

Garrula. 1. *C. caerulea*, dorso rubro, remigibus nigris. *Fn. suec.* 94.
Scop. ann. I. p. 40. n. 44.

Cornix caerulea. *Gesn. av.* 335. *Aldr. ornith.* I. p. 790.
t. 791. 792. *Günrb. Nest. u. Eyer.* t. 14.

Galculus. *Briss. av.* 2. p. 64. n. 1. t. 5. f. 2.

Garrulus argentoratensis. *Raj. av.* p. 41. n. 3.

Rollier. *Buff. planch. enlum.* n. 486.

Rollier d'Europe. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 135. t. 70.

Roller. *Brit. zool. app.* p. 624. t. 2. *Arct. zool.* 2. p. 253. G.
Raj. av. p. 42. *Will. orn.* p. 131. t. 20. *Edw. av.* t. 109.

Blauer Räker, *Birkheher.* *Frisch. av.* t. 57.

Habitat in Africa, Syria, Sibiria et Europa, gregaria, sonora, migratoria, timida, in arboribus, praesertim betula, rarius in argilla nidificans, ova pariens dilute virentia, maculis innumeris obscuris, viellitans scarabaeis, vermis, ranis, glandibus, frugibus; caro multis deliciosa.

Magnitudo corvi glandarii.

Pone aures macula utrinque calva; remiges primariae subtus caeruleae; rectrices intermediae sordide virides, ceterae caeruleae, exteriori margine nigro-punctatae; pedes flavicantes.

indica. 2. *C. caerulea* antice testacea, pileo viridi.

Blue Jay from the East-indies. *Edw. glean.* t. 326.

Indian Roller. *Lath. sys.* I. I. p. 412. n. 7.

Habitat in Zeylon, garrulae similis, 11 polices longa.

Rostrum nigrum, sesquipollicare; vertex ex caeruleo viridis; cervix dorique pars superior testacea; tempora et gula albo-striata; alae ex viridi et caeruleo mixtae; rectrices exteriores media sui parte thalassinae.

3. C.

Coraciae genus per omnem terrarum orbem dispersum; pedibus brevibus ab affinis distinguum,

- caffra. 3. C. caerulea, remigibus margine exteriore luteis.
Cape-Roller. *Lath. syn. I. I. p. 412. n. 8.*
Habitat in Aethiopia. I. Burmann.
Femina ex caerulecente nigra.
- abyssini- 7. C. viridis, genis albis, humeris, uropygio et remigibus ma-
ca. joribus caeruleis, dorso remigibusque secundariis ex au-
rario fuscis.
Rollier d' Abyssinie. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 143. planch.*
enlum. n. 626.
Abyssinian Roller. *Lath. syn. I. I. p. 408. n. 2.*
Habitat in Abyssinia.
- fenega- 8. C. supra ex rubente fusca, subtus, capite, cauda, alarum-
lenfis. que parte superiore ex caerulecente thalassinis, facie al-
ba, humeris remigibusque caeruleis.
Rollier du Sénégal. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 143. planch.*
enlum. n. 326.
Swallow-tailed Indian Roller. *Edw. glean. t. 327.*
Senegal Roller. *Lath. syn. I. I. p. 408. n. 3.*
Habitat ad fluvium Senegal, et in Zeylon, corvi glandarii
magnitudine.
Rostrum nigrum; cauda fureata; pedes ex rubente incarnati.
- madagaf- 9. C. ex ferrugineo purpurascente fusca, uropygio, erisco et
cariensis. cauda ex caeruleo viridibus, hac versus apicem fascia pur-
purascente, apice ipso, remigibusque supra ex atro cae-
ruleis.
Rollier de Madagascar. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 148.*
Rolle de Madagascar. *Buff. pl. enlum. n. 501.*
Madagascar Roller. *Lath. syn. I. I. p. 413. n. 11.*
Habitat in Madagascar, cyaneae magnitudine.
Rostrum breve, flavum; oculi magni; remiges interiori
margini nigrae; pedes ex rubente fusi.
- orienta- 4. C. viridis, jugulo caeruleo striato, rectricibus apice nigris.
lis. Galgulus indicus. *Briff. av. 2. p. 75. n. 4. t. 7. f. 2.*
Rollier des Indes. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 147. planch.*
enlum. n. 619.
Oriental Roller. *Lath. syn. I. I. p. 411. n. 6.*
*Habitat in India, corvi glandarii magnitudine, 10 $\frac{1}{2}$ polli-
ces longa.*
Rostrum flavicans, basi latius, apice magis aduncum, quam
reliquis speciebus; corpus supra ex viridi in fuscum, sub-
tus ex caeruleo in viridem vergens; caput et cervix fusca;
remi-

- remiges ex caeruleo et nigro mixtae, macula in medio magna pallide caerulea; rectrices basi virides, 2 intermediae nigrae, reliquae caeruleae; pedes flavicantes; unguis nigri.*
- bengalensis. 5. *C. subfulva, subtus caeruleo, collo subtus violaceo pallido striato, cauda integra.*
Corvus bengalensis. Syst. nat. X. I. p. 106. n. 6.
Galgulus mindanensis. Briss. av. 2. p. 69. n. 2. t. 6. f. 1.
Cuit ou Rollier de Mindanao. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 144. pl. enlum. n. 285.
Bengal Pye. Albin. av. I. t. 17.
Bengal Roller. Latham syn. I. I. p. 410. n. 5.
Habitat in Bengala, et insula Mindanao, 12½ pollices longa.
Rostrum unguisque nigricans; vertex viridis; colori fulvo violaceus admixtus; dorsi pars inferior cum uropygio caerulea; pectus rufum, in violaceum colorem vergens; rectrices alarum minores, caudaeque superiores ex atro caerulea; alarum majores remotioresque ex caeruleo virides, mediae ex caeruleo et viridi mixtae, proximae virides; remiges 5 primariae ex atro caeruleae; rectrices 2 intermediae obscure virides, reliquae ex caeruleo virides, basi et apice caeruleae; pedes grisei.
- caudata. 6. *C. subfulva, subtus caeruleo, collo subtus violaceo pallido striato, rectricibus extimis longissimis.*
Galgulus angolensis. Briss. av. 2. p. 72. n. 3. t. 7. f. 1.
Rollier d'Angola. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 144. planch. enlum. n. 88.
Long-tailed Roller. Lath. syn. I. I. p. 409. n. 4.
Habitat in Angola, corvi glandarii magnitudine, 15½ pollices longa.
Rostrum et unguis nigricans; occiput et cervix virent; dorsi pars inferior, cum uropygio et rectricibus alarum caerulea; rectrices caudae superiores ex caeruleo virides; abdomen, femora, rectrices alarum et caudae inferiores, et ad medium usque remiges thalassina; rectrices 2 intermediae obscure virides, reliquae ex caeruleo virides, pars extimarum supra ceteras producta ex atro caerulea; pedes grisei.
- caerulea. 10. *C. supra ex caeruleo pallide viridis, subtus ferruginea, alarum apice nigro.*
Blue Roller. Lath. syn. I. I. p. 412. n. 9.
Longitudo 8 pollicum; rostrum sordidum.

II. C.

- io ma-
uediae
nigri.
o pal-
c. i.
3. p.

longa,
i ful-
pygio
gens;
c atro
eo vi-
ae vi-
trices
viri-

o pal-
lanch.

½ pol-
rent;
arum
rides;
iores,
inter-
pars
; pe-

, ala-

1. C.
- cyanea. 11. *C. tota splendide cyanea.*
Ultramarine Roller. *Lath. syn. I. I. p. 413. n. 10.*
Longitudo 8 pollicum; rostrum sordidum.
- cayen-
nenfis. 12. *C. ex fuscescente viridis, subtus sordide alba, superciliis
albis, gulæ stria utrinque nigra, cauda cuneiformi.*
Grivard ou Rolle de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois. 3.
p. 134. pl. enlum. n. 616.*
Cayenne Roller. *Lath. syn. I. I. p. 415. n. 15.*
Habitat in Cayenna, 9 pollices longa.
Rostrum robustum, rubens, versus apicem paulisper curva-
tum; pedes pallide grisei, longiores, quam in reliquis
speciebus.
- mexica-
na. 13. *C. ex rufo grisea, subtus et alis dilute griseis, flammeo
admitto.*
Galgulus mexicanus. *Briff. av. 2. p. 83. n. 8.*
Merula mexicana. *Seb. mus. I. t. 64. f. 5.*
Rollier du Mexique. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 148.*
Mexican Roller. *Lath. syn. I. I. p. 413. n. 12.*
Habitat in nova Hispania, turdo multo major.
- striata. 14. *C. ex caeruleo atra, striis ex virescente caeruleis, rostro,
cauda pedibusque nigris.*
Blue striped Roller. *Lath. syn. I. I. p. 414. n. 13. t. 16.*
Habitat in nova Caledonia, 8 pollicies longa.
Irides rubrae; femina non striata ex cinereo grisea; remigi-
bus teetrichibusque alarum nigris, margine cinereo.
- varia. 15. *C. nigra, subtus, dorsi parte inferiore, uropygio et teetrichi-
bus caudae superioribus alba, cauda aequali nigra api-
ce alba.*
Cassican de la nouvelle Guinée. *Buff. hist. nat. des ois. 7.
p. 134. t. 7. pl. enlum. n. 628.*
Pied Roller. *Lath. syn. I. I. p. 415. n. 16.*
Habitat in nova Guinea? 13 pollicies longa, dubii generis.
Rostrum 2½ pollicum, caerulescens; teetriches alarum ex albo
et nigro variae; secundariarum aliae nigrae, aliae albæ;
remiges majores alarumque margo exterior nigra; reetriches 2 intermediae totae nigrae; pedes plumbei; unguis
robusti, acuti, nigri.
- sinensis. 16. *C. viridis, subtus ex flavicante alba, cauda cuneiformi,
apice alba.*
Galgulus sinensis. *Briff. av. 2. p. 77. n. 5. t. 6. f. 2.*

Rolle

Rolle de la Chine. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 132.

Rollier de la Chine. *Buff. pl. enlum.* n. 620.

Chinese Roller. *Lath. syn.* I. 1. p. 414. n. 14.

Habitat in Sina, rarer, corvi glandarii magnitudine, 11½ pollices longa.

Roftrum, irides, pedes et unguis rubent; Itria nigra per oculos ducta; femora grisea; tectrices alarum, remiges que olivaceae; barum nonnullae apice albo.

docilis. 17. C. alba cum rubicundo intersperso, subtus badia pedibus luteis, rectricibus nigris, apice albis. *S. G. Gmelin it.* 3. p. 378. t. 42.

Habitat in Asia australi, monedulae magnetudine, docilis, imitabunda.

Roftrum luteum; remiges 9 priores ad medium usque albae, reliqua parte nigrae, ceterae totae nigrae; unguis incarnati.

52. ORIOLUS. *Roftrum conicum, convexum, acutissimum rectum: mandibula superiore paulo longiore, obsolete emarginata.*

Lingua bifida acuta.

Pedes ambulatorii.

Galbula. 1. O. luteus, Ioris artubusque nigris, rectricibus exterioribus postice flavis. *Aet. Stockh.* 1750. p. 127. t. 3. f. 5.

Coracias Oriolus. *Fn. suec.* 95. *Scop. ann.* 1. p. 41. n. 45. *Forsk. Fn. arab.* p. 7.

Oriolus. *Gefn. av.* 713. *Briff. av.* 2. p. 320. n. 58. *Nozeman nederl. Vogel.* t. II.

Chlorion. *Gefn. av.* 261.

Galbula f. Picus nidum suspendens. *Raj. av.* p. 58. n. 5.

Loriot. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 254. t. 17. *pl. enlum.* n. 26.

Yellow Bird from Bengal. *Albin. av.* 3. t. 19.

Witwall. *Will. orn.* p. 198.

Golden Thrush. *Edw. av.* t. 185.

Oriole. *Brit. zool. app.* n. 4. t. 4.

Golden Oriole. *Lath. syn.* I. 2. p. 449. n. 43.

Kirschvogel. *Günth. Nest. u. Eyer.* t. 47.

β. Ieterus maderaspatus naevius. *Briff. av.* 2. p. 91. n. 5.

Mottled Jay. *Raj. av.* p. 195. n. 9. t. 1. f. 7.

Yellow

chine
fis.

mela
cepha

Aves

- Yellow Starling from Bengal. *Albin. av. 2. t. 41.*
 Yellow indian Starling. *Edw. av. t. 186.*
- γ. *Oriolus indicus.* *Briff. av. 2. p. 328. n. 60.*
Chloris indicus. *Aldr. av. 1. fig. p. 862.* *Johnst. av. t. 41.*
Loriot des Indes. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 264.*
Habitat in Europa, Asia, Africa, migratorius, vicitans cerasis, uvis, sicubus, insectis; nidus e foliis urceolatus in ramificationibus arborum; ova 4-5 sordide alba; maculis exiguis obscure fuscis; caro sapida; vox acuta.
Longitudo 9½ pollicum; rostrum et irides rubent; in β. corpus maculis nigris conspersum; lora artusque in femina ex virescente fusca; alae hinc inde maculis flavis, magna que in medio, feminae sordidae, in γ. maculis caerulefcentibus insignitae; in β. tectrices alarum remigesque nigricantes; rectrices 2 intermediae apice demum, reliquae a medio inde flavae; feminae cauda sordide viridis, rectribus 2 intermediis ex flavicante albis, in β. nigricans, in γ. taenia in medio caerulecente; pedes plumbei; unguis nigri; in β. caput collumque nigra; tectrices caudae nigro-maculatae.
- chinensis. 2. *O. luteus, artubus nigris apice luteis, fascia occipitis nigra,*
Oriolus cochinenis. *Briff. av. 2. p. 326. n. 59. t. 33. f. 1.*
Coulavan. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 262.*
Couliavan de la Cochinchine. *Buff. pl. enlum. n. 570.*
Habitat in Cochinchina, nonne varietas Galbulae?
Rostrum flavum; pedes nigri; fascia occipitis ab oculo per occiput ad oculum ducta.
- melanocephalus. 3. *O. luteus, capite, remigibus, apicibusque rectricum intermedianarum nigris.*
Sturnus luteolus. *Syst. nat. X. 1. p. 167.*
Oriolus bengalensis. *Briff. av. 2. p. 329. n. 61.*
Pica maderaspatica sturni instar maculata. *Raj. av. p. 175.*
t. 1. f. 7.
Loriot de la Chine. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 262. planch.*
enlum. n. 79.
Black headed indian Iterus. *Edw. av. t. 77.* *Alb. av. 2. p. 41. t. 41.*

Habi-

Aves hujus generis gregariae, sonorae, voraces, frugivorae, numerosae, potissimum in America habitant, nidis saepe pendulis.

*Habitat in regione Maderaspatana, 8 $\frac{3}{4}$ pollices longa, Galbulae varietas.
Irides badiæ; gula et pedes nigri; alae striis longitudinalibus flavis insignitæ.*

radiatus. 21. *O. fulvus, capite, gula juguloque nigris albo punctatis, alarum tectricibus remigibusque nigris margine albo.*

Oriolus capite striato. Briff. av. 2. p. 332. n. 62.

Merula bicolor Aldrovandi. Raj. av. p. 67. n. 11.

Loriot à tête rayée. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 265.

Aldrovandus brasiliensis Merula. Will. orn. p. 193. §. 5.

Striped-headed Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 453. n. 44.

Corpus subtus pallidius; pedes flavi; unguis rubicundi.

Picus. 22. *O. rufus, capite, collo et pectore albo maculatis, canda rotundata.*

Talapiot. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 82. pl. enlum. n. 605.
Climbing Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 453. n. 45.

Habitat in Gujanæ arboribus, quas pici instar confundit, infectaque pone corticem latentia extrahit, 7 pollices longus.
Rostrum ex flavicante griseum; abdominis color in fuscum vergens; pedes nigricantes.

Icterus. 4. *O. fulvus, capite, jugulo, dorso, remigibus tectricibusque nigris, macula alarum alba. Scop. ann. I. p. 39. n. 40.*

Oriolus. Briff. av. 2. p. 86. n. 1. t. 8. f. 1.

Coracias Xanthornus. Scop. ann. I. p. 39. n. 42.

Guira-Tangaina. Marogr. bras. 192. Raj. av. p. 45. n. 6.

Will. orn. p. 141.

Troupiale. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 203. t. 16. planch. enlum. n. 532.

Banana Bird from Jamaica. Alb. av. 2. t. 40.

Large Banana Bird from Jamaica. Brown. jam. p. 447.

Yellow and black Pie. Raj. av. p. 181. n. 10. Sloan. jam. p. 301. t. 259. f. 4. Catesb. carol. app. t. 5.

Icteric Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 424. n. 6.

Habitat in America calidiore, insulisque Caribæis, agilis et audax, chrysalides porissimum persequitur, nidum cylindricum, ab extremo arboris ramo pendulum, in America frequenter ad necanda insecta domesticus, tum perquam docilis, 9 $\frac{1}{2}$ pollices longus.

Rostrum ut plurimum nigrum, basi fusca; orbitae nudæ caerulentes; irides flavicantes; alarum fasciae duæ obliquæ albæ; pedes aliis nigri, aliis plumbei, aliis ex griseo albi.

23. O.

- novae Hispaniac. 23. O. flavus, capite, gula, remigibus caudaque nigris, tectricibus alarum majoribus apice flavo, minoribus totis nigris.
Icterus mexicanus. Briss. av. 2. p. 88. n. 2.
Avis americana de Acolchichi nigro-lutea. Seb. mus. I. t. 54.
f. 4.
Acolchi de Seba. Buff. hist. nat. des oif. 3. p. 206.
Mexican Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 425. n. 8.
Habitat in nova Hispania, Icteri magnitudine.
Rostrum longum, flavum.
- annulatus. 24. O. flavus, capite colloque nigris, tectricibus alarum majoribus remigibusque nigricantibus flavicante marginatis, cauda nigricante annulata.
Icterus cauda annulata. Briss. av. 2. p. 89. n. 3.
Avis Ocotzinitzan, columbae magnitudine. Seb. mus. I.
p. 97. t. 63. f. 3.
Arc-en-queue. Buff. hist. nat. des oif. 3. p. 207.
Habitat in America, columbae magnitudine.
Rostrum flavum; pedes grisei.
- brasiliensis. 25. O. flavus, pectore maculato, capite dorsoque dilute fuscis maculatis, abdomine albo, cauda alisque fuscis, his apice albidis.
Icterus brasiliensis. Briss. av. 2. p. 93. n. 8.
Small yellow and brown Bird. Sloan. jam. p. 309. n. 43.
Brazilian Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 426. n. 9.
Habitat in Jamaicæ dumetis, 4 pollices longus.
Rostrum $\frac{1}{2}$ pollicem longum; orbitæ flavæ; pedes fuscæ;
ungues flavi.
- Japacani. 26. O. ex nigro et dilute fusco, subtus ex albo et flavo varius, lineis transversis nigris, capite caudaque nigricantibus.
Japacani. Raj. av. p. 84. n. 12. Will. orn. p. 240. Buff.
hist. nat. des oif. 3. p. 208. Lath. syn. I. 2. p. 426. n. 10.
Brasiliano duplo major; rostrum nigrum; irides aureæ;
pedes sordidi; ungues acuti et nigri.
- Costototl. 27. O. niger, subtus caudaque ex croceo et nigro varius.
Icterus novae Hispaniae. Briss. av. 2. p. 95. n. 10.
Xochilol et Costototl. Buff. hist. nat. des oif. 3. p. 210.
New Spain Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 427. n. 11.
Habitat in nova Hispania, sturni magnitudine.
Alæ subtus cinereæ; junior avis tota flava, exceptis alarum apicibus nigris.

Bb

28. O.

griseus. 28. O. ex nigro et flavo varius, dorso, femoribus et abdome
ne cinereis.

Icterus cinereus novae Hispaniae. Briss. av. 2. p. 96. n. 11.

Tocolin. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 213.

Grey Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 427. n. 12.

Habitat in novae Hispaniae silvis, sturni magnitudine, non
canorus; caro sapida.

phoeni- 5. O. niger, alarum tectricibus fulvis.
ceus. Icterus pterophoeniceus. Briss. av. 2. p. 97. n. 12.
Pterophoenicus Indiarum. Nieremb. nat. 225.
Acolchichi. Hern. mex. 14. Raj. av. p. 166. n. 6.
Commandeur. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 214.
Troupiale à ailes rouges. Buff. pl. enlum. n. 402.
Scarlet-feathered Indian Bird. Will. orn. p. 391.
Red-winged Starling. Catesb. Carol. I. t. 13. Alb. av. I.
t. 13.
Red-winged Oriole. Arct. zool. 2. p. 255. n. 140. Lath.
syn. I. 2. p. 428. n. 13.

Habitat gregibus numerosissimis in America a Novo-Horaco
ad novam Hispaniam usque, sturni magnitudine, 8 - 9
pollices longus, oryzae segetes devastans, insectis ceterum
victitans, et vermis, qui ea ave extirpata tanto laetius
vivunt et multiplicantur. Nidum sfruit densum pen-
dulum inter arundines ea altitudine, ut suetus avellere
non possint; ova parit alba striis raris et irregularibus
nigris.

Tota avis nigra, exceptis iridibus albis, alarumque tectri-
cibus fulvis vel rubris.

america- 29. O. niger, mento, jugulo, pectori alarumque angulo su-
nus. periore rubris.

Merula indica, pectori cinnabarino, an Jacapu Maregr.?
Raj. av. p. 67. n. 10.

Troupiale de Cayenne. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 218. pl.
enlum. p. 236. f. 2.

Red-breasted Indian Blackbird. Will. orn. p. 194. n. 7.

Mocking bird of Guiana. Bancr. Guj. p. 177.

Red-breasted Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 430. n. 14.

Habitat in Guiana et Cayenna, 7 pollices longus, grata ca-
norus, imitabundus, nudo cylindrico longo pendulo.

oryzivo- 30. O. niger, capitis, colli pectorisque splendore purpureo.
rus. Rice Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 423. n. 5.

Habitat in Cayenna, 9 pollices longus.

Rolstrum sequipollicare, basi convexum et protuberans.

31. O.

- ludovi- 31. O. ex nigro et albo varius, capite, collo, abdomine et
cianus. uropygio albis, alis caudaque cuneiformi violaceis mar-
gine albo.
Cassique de la Louisiane. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 242.*
pl. enlum. n. 646.
White-headed Oriole. *Arct. zool. 2. p. 260. n. 148. Lath.*
syn. I. 2. p. 422. n. 4.
Habitat in America boreali, porissimam Louisiana, 10 polli-
ces longus.
Rostrum nigrum, pollicare; pedes plumbi.
- hudso- 32. O. sordidus, capite, gula, tectricibus alarum nonnullis
nius. inferioribus, remigibus primoribus, femoribus, pectoris-
que striis albis.
Hudsonian white-headed Oriole. *Arct. zool. 2. p. 260. n. 148.*
Habitat in sinu Hudsonis, 8½ pollices longus, rarius.
- eristatus. 33. O. aterrimus, vertice pennis aliquot elongatis suberistato.
Xanthornus maximus. *Pall. spicil. zool. 6. p. 3. t. 1.*
Cassique huppé de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 241.*
pl. enlum. 344.
Creited Oriole. *Latham syn. I. 2. p. 421. n. 3.*
β. Xanthornus olivaceus, subtus badius. *Lath. syn. I. 2. p. 421.*
n. 3. A.
γ. Cassique vert de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 240.*
pl. enlum. n. 328.
Grüner Citronvogel. *Naturf. IV. p. 1. t. 1.*
Habitat in Surinamo et Cayenna, 18, β. 20, γ. 14 polli-
ces longus.
Rostrum majuscum sordide flavum, in β. apice aurantium,
in γ. totum rubrum, basi versus frontem denudata, gib-
bosae, rotundata et convexa; nares laterales subrotundae,
parvulae in fulco obsoleto, ante topum plumaceum horri-
dulum lateraliter in rostrum excurrentem positae demu-
datae; lingua angusta canaliculata, profunde in 2 laci-
nias acute siffa; pili ad oris angulos vel tenerimi, vel
nulli; cauda rotundata, tectricibus 2 intermediis nigris,
in β. badiis, reliquis citrinis; in γ. corpus antice cum
tectricibus alarum viride, postice badium; remiges pedes-
que nigra.
- haemor- 6. O. niger, uropygio coccineo. *Briß. av. 2. p. 98. n. 13. t. 8.*
rhou. *f. 2.*
Cassique rouge de Brésil ou Jupuba. *Buff. hist. nat. des ois.*
3. p. 238. pl. enlum. n. 482.

- flav
- Bal
- spu
- Ieterus
- Red-rumped Oriole. *Lath. syn. I. 2. p. 420. n. 2.*
 $\beta.$ Cassique brun. *Ornith. de Salern. p. 112.*
Habitat in Brasilia, Cayenna, $\beta.$ in Guiana, 11 pollices longus.
Rostrum sulphureum; in $\beta.$ corpus ex atro fuscum, uropygium vinaceum.
- persicus. 7. O. niger, dorso postico, maculaque rectricum alarum basique rectricum luteis.
Cassicus luteus. Briff. av. 2. p. 100. n. 14. t. 9. f. 1.
Cassique jaune du Brésil. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 235. pl. enlum. n. 184.
Pica persica. Bell. ex. 292. Aldr. orn. I. p. 793. t. 795. Will. orn. 90. Raj. av. 42.
 $\beta.$ Jupujuba. *Maregr. bras. 193.*
Jupujuba s. Japu. Raj. av. p. 46. n. 7.
Brasilian Jupujuba, or Japu of Maregrave. Will. orn. p. 142.
- $\gamma.$ Black and yellow Daw of Brasil. *Edw. av. p. 319.*
Habitat in calidioribus Americae australis; nidus alembici forma prope pagos ex arboris extremis ramis pendens (ex una nonnunquam 400) ex stramine, setis, pilis, totlandia usneoides contextus, ter non raro per annum pariens.
Rostrum flavescens; lingua $\beta.$ caerulea; irides caeruleae; pedes et ungues nigri; in $\gamma.$ nigredini purpureus splendor affulget; in $\beta.$ rectrices subtus flavae, altera parte nigrae, supra nigrae, extimae basi flavae.
- mexicanus. 8. O. nigricans, subtus capiteque luteus.
Ieterus fuscus novae Hispaniae. Briff. av. 2. p. 105. n. 17.
Troupiale à calotte noire. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 222. Troupiale jaune à calotte noire de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 533.
Black-crowned Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 431. n. 17.
Habitat in nova Hispania et Cayenna, 19 fere pollices longus.
Rostrum, pedes et ungues flavidant; collum flavum; vertex ex atro fuscus; cauda et alae nigrae.
- ruber. 34. O. miniatus, alis, abdomine et cauda nigerrimis.
Troupiale rouge d'Antigue. Sonner. it. p. 113. t. 68.
Red Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 431. n. 16.
Habitat in Antigua insulae Panay.
Rostrum pedesque nigricant.
- gujanensis. 9. O. nigricans, marginibus pennarum griseis, pectore colligatis.
O. nigricans, marginibus pennarum griseis, pectore colligatis subtus rubris.

Icterus gujanensis. Briss. av. 2. p. 107. n. 18. t. 11. f. 1.
 Troupiale de la Guiane. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 218.
 pl. enlum. n. 536.
 Guiana Oriole. Latham syn. I. 2. p. 430. n. 15.
Habitat in Guiana, ultra 7 pollices longus.
 Pennarum margo, caudaeque striae grisea; corpus a mento
 ad abdomen rubrum; pedes et unguis fuscus.

flavus. 35. O. aureus, dorso postico, alis, caudaque nigris.
 Troupiale jaune d'Antigue. Sonner. it. p. 113. t. 69.
 Antiguan yellow Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 432. n. 18.
Habitat in Antigua insulae Panay, et America australi.
 Rostrum et pedes nigricant; irides rubent.

Baltimo- 10. O. nigricans, subtus fasciaque alarum fulvus.
 re. Icterus minor. Briss. av. 2. p. 109. n. 19. t. 12. f. 1.
 Baltimore. Arct. zool. 2. p. 257. n. 142. t. 12. Catesb. Ca-
 rol. I. t. 48. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 231. pl. enlum.
 n. 506. f. 1. Lath. syn. I. 2. p. 433. n. 19.
*Habitat in America boreali, ante biennem discedens, 7 polli-
 ces longus; nidum struit marsupii forma apice patulum
 foramine laterali biantem ex bifurcatura ramorum lirio-
 dendri, platani etc. pendulum.*
 Rostrum plumbeum; tectrices alarum majores nigrae apice
 albo; remiges primores sordidae, margine albo; rectrices
 2 intermediae nigrae, reliquae parte inferiori nigrae, re-
 liqua aurantiae.
 Feminae caput et dorsum olivaceum subfusco marginatum;
 corpus subtus, caudaeque tectrices flavae; cauda ipsa for-
 dida, margine flavo.

spurius. 11. O. niger, subtus fulvus, fascia alarum alba.
 Icterus minor spurius. Briss. av. 2. p. 111. n. 20. t. 10. f. 3.
 Baltimore Bastrand. Arct. zool. 2. p. 258. n. 143. Buff. hist.
 nat. des ois. 3. p. 233. pl. enlum. n. 506. f. 2. Latham
 syn. I. 2. p. 433. n. 20. Catesb. Carol. I. t. 49.
*Habitat in America boreali, praecedentis magnitudine, pau-
 lo tamen brevior; nido ex arbore malo pendulo; ovis 5.*
 Dorsi pars inferior tectricesque caudae fulvae; alarum mi-
 nores dilute badiae, majores nigrae, margine sordide al-
 bo; remiges sordidae margine albo; cauda nigra cunei-
 formis.
 Feminae caput cervixque olivacea, gula nigra; tectrices ala-
 rum remigesque sordidae margine albo; corpus subtus ex
 virescente flavidum; cauda sordida, margine flavo.

- textor. 36. *O. flavus*, capite fusco cum splendore aureo, remigibus rectricibusque nigricantibus margine aurantio.
Cap-more. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 226.
Troupiale male et femelle du Sénégal. *Buff. planch. enlum.* n. 375. 376.
Weever-Oriole. *Lath. syn.* I. 2. p. 435. n. 21.
Habitat ad fluvium Senegal, voce acuta, galbulae magnitudine; uterque sexus nidum fruit.
Rostrum cornicum; caput aliquando per biemem flavum; cervix nonnunquam fusca, alae caudaque sordidae flavo marginatae, et abdomen cum femoribus albicans; irides aurantiae; pedes rubescentes.
- Bonana. 12. *O. fulvus*, capite pectoraque castaneis, dorso, remigibus rectricibusque nigris.
Icterus minor nidum suspendens. *Sloane jam.* 2. p. 299. t. 257. f. 1.
Xanthornus. *Briss. av.* 2. p. 115. n. 22. t. 12. f. 2.
Xochitotoli. *Hern. mex.* 40. *Raj. av.* p. 167. n. 12.
Carouge. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 243. *planch. enlum.* n. 535. f. 1.
Bonana Bird. *Brown. jam.* p. 477. *Lath. syn.* I. 2. p. 436. n. 22.
Habitat in insulis Americae meridionali obversis, 7 pollices longus; natus intertextus e foliorum fibrillis quartam globi partem efformans sub folio musae, quod parietem ejus constituit.
Rostrum, dorsi pars superior, remiges et cauda nigra; colum castaneum; uropygium punctis castaneis insignitum; pedes et ungues grisei.
- nidipendulus. 37. *O. capistro et torque nigris*, vertice, collo, dorso caudaque ex rubicundo fuiscis, pectora et abdomine ex fusco flavis.
Icterus minor, nidum suspendens, watchy Picket, spanish Nightingale, american Hangnest. *Raj. av.* p. 184. *Sloan. jam.* p. 300. n. 17. t. 258. f. 3.
Hangnest Oriole. *Lath. syn.* I. 2. p. 437. n. 23.
Habitat in Jamaiae silvis, voce suavi, nido ex arborum altarum extremis ramis pendulo.
Rostrum album; alae obscurius fuscae, albo intermisso.
- varius. 38. *O. niger*, subtus, uropygio, et rectricibus alarum minibus ferrugineus.
Carouge de Cayenne. *Buff. pl. chlum.* n. 607. f. 1.
Bastard

Baftard Baltimore female. *Catesb. carol.* I. t. 49. f. inf.
 Chesnat and black Baltimore. *Lath. syn.* I. 2. p. 437. n. 24.
Habitat in Cayenna, 6 pollices longus.
*Roſtrum et pedes ex caeruleo atra; remigum secundaria-
 rum margo exterior ferdide albus.*

Xanthor- 13. *O. luteus*, gula remigibus rectricibusque nigris.
 nus. *Xanthornus mexicanus*. *Briff. av.* 2. p. 118. n. 23. t. II. f. 2.
Avis Ayoquantotl. *Hern. mex.* 54. *Seb. mus.* 2. p. 102.
 t. 96. f. 5. *Raj. av.* p. 171.
Carouge du Mexique. *Buff. pl. enlum.* n. 5. f. 1.
Petit Cul-jaune de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 247.
Lesser Bonana Bird. *Edw. glean.* t. 243. *Lath. syn.* I. 2.
 p. 439. n. 25.
Habitat in Jamaica et nova Hispania, 7½ pollices longus.
*Roſtrum nigricans; rectrices alarum nigrae, plurimae mar-
 gine, remiges intus, basin versus albae; pedes et unguis
 nigri.*

domini- 14. *O. niger*, corpore postico, rectricibus alarum maculaque
 censis. luteis.
Xanthornus dominicensis. *Briff. av.* 2. p. 121. n. 25. t. 12.
 f. 3.
Carouge de S. Domingue. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 247.
pl. enlum. n. 5. f. 2.
S. Domingo Oriole. *Lath. syn.* I. 2. p. 439. n. 26.
*Habitat in nova Hispania, insulisque Jamaica et S. Domini-
 ci, 8 pollices longus; cantus galbulae; nidus ab extremis
 ramis arborum ad aquas plantatarum positus perae forma
 multilocularis. Utrum femina Xanthorni, an cum aya-
 nensi et chrysocephalo in unam speciem conjugendus?*

Jamacaii. 39. *O. flavus*, capite, jugulo, humeri macula, alis, cauda-
 que nigris.
Xanthornus brasiliensis. *Briff. av.* p. 120. n. 24.
 Jamacaii. *Raj. av.* p. 75. *Will. orn.* p. 137. t. 42. *Salern.*
orn. p. 221. n. 4. t. 16. f. 5.
Brasilian Oriole. *Lath. syn.* I. 2. p. 439. n. 27.
*Habitat in Brasilia, nidum filis affigens musae folio, 10 fere
 pollices longus.*
*Roſtrum nigrum, basi caeruleum; rectries alarum macula
 media alba; pedes fuscii.*

cayanan- 15. *O. niger*, macula alarum lutea.
 sis. *Xanthornus cayanensis.* *Briff. av.* 2. p. 123. n. 26. t. 9. f. 2.
 B b 4 Carou-

igibus
 nnum.
 magni-
 ; cer-
 mar-
 es au-
 igibus
 . 299.
 enlum.
 . 436.
 pollices
 n glo-
 ejus
 ; col-
 uitum;
 cauda-
 fuso
 panish
 Sloan.
 borum
 .
 mino-
 Baſtard

Carouge de l'isle de S. Thoma. *Buff. hist. nat. des ois. 3.*
p. 248. *pl. enlum. n. 535. f. 2.*

Yellow-winged Pye. *Edw. glean. t. 322.*

Yellow-winged Oriole. *Lath. syn. I. 2. p. 440. n. 28.*

Habitat in Cayenna et insula S. Thomae, 8 pollices longus.
Rostrum nigrum; cauda rotundata.

Ixcopte- 40. O. niger, macula alarum alba.

rus. White-winged Oriole. *Lath. syn. I. 1. p. 440. n. 29.*

β . White-backed Oriole. *Arct. zool. 2. p. 257. n. 141.*

White backed Maik-thieves. *Kalm it. 2. p. 274.*

Habitat in Cayenna, $\beta.$ ad Noveboracum usque, cayanensis magnitudine.

Rostrum pedesque nigra.

ieteroce- 16. O. niger, capite colloque luteis.

phalus. Xanthornus ietercephalus cayanensis. *Briff. av. 2. p. 124.*
n. 27. t. 12. f. 4.

Cornix atra, capite collo pectoraque flavis. *Nov. Comm.*
Petr. II. p. 435. t. 15. f. 7.

Coiffes jaunes. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 217. 250.*

Carouge de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 343.*

Yellow-headed Starling. *Edw. glean. t. 323.*

Yellow-headed Oriole. *Lath. syn. I. 2. p. 441. n. 30.*

Habitat in Cayenna, 7 pollices longus.

Rostrum nigricans; pedes et unguis fusci.

melan- 17. O. griseus nigro-punctatus, fascia oculorum atra.

cholicus. Fringilla melanocholica. *Syst. nat. X. 1. p. 180. n. 7.*
Xanthornus naevius. *Briff. av. 2. p. 126. n. 29.*

Shomburger. *Edw. av. t. 85. Lath. syn. I. 2. p. 441. n. 31.*
 β . Troupiale tacheté de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois. 3.*
p. 223. *pl. enlum. n. 448. f. 1. 2.*

Habitat in nova Hispania, $\beta.$ in Cayenna, alaudae magnitudine, 6 pollices longus.

Rostrum cum pedibus incarnatum; irides badiæ, $\beta.$ aurantiae; pennæ singulæ macula media nigricante; remiges et cauda nigricantes margine ex rufo fusco; genæ et gula nigra, haec in $\beta.$ alba.

capensis. 18. O. fusco-olivaceus subtus luteus.

Xanthornus capitis bonaæ speci. *Briff. av. 2. p. 128. n. 30.*

Carouge du Cap de bonne esperance. *Buff. planch. enlum.*
n. 607. f. 2.

Carouge

- Carouge olive de la Louisiane. *Buff. hist. nat. des ois. 3.*
p. 251.
- Olive Oriole. *Arct. zool. 2. p. 260. n. 149.* Latham syn.
I. 2. p. 444. n. 35.
- Habitat ad caput bonae speci, et in Louisiana, 7 pollices longus.
- Rostrum, pedes et ungues fusca, verticis color in griseum,
gulae jugulique in aurantium vergens, tectrices alarum
fuscæ, margine et apice olivaceis, remiges fuscæ margi-
ne olivaceo.
- caeru- 41. O. niger aut cinereus, capite, alis caudaque caeruleis.
leus. Xanthornus caeruleus. *Briff. av. 2. p. 125. n. 28.*
Small blue Jay. *Raj. av. p. 95. n. II. t. I. f. II.*
Blue Oriole. *Lath. syn. I. 2. p. 444. n. 36.*
Habitat in regione Maderaspatana. Rostrum rufum.
124. viridis. 42. O. viridis, superciliis, genis, gulaque flavis, tectricum
alorum nonnullarum apice albo.
Yellow-throated Oriole. *Arct. zool. 2. p. 261. n. 150.*
Habitat in sinu Hudsonis, 9 pollices longus.
- ferrugi- 43. O. niger, pennarum margine ferrugineo, capite et cervi-
neus! ne ex nigricante purpurecentibus, abdomine sordido.
Rusty Oriole. *Arct. zool. 2. p. 260. n. 146.*
Habitat in Noveboraco, 7-8 polices longus.
Rostrum et pedes sordidi; area oculorum nigra; alarum
caudaeque splendor virescens.
- fusca. 44. O. niger, capite ex ferrugineo fusco, cauda sordida.
Brown headed Oriole. *Arct. zool. 2. p. 259. n. 145.*
Habitat in Noveboraco, gregarius.
- niger. 45. O. totus niger.
Icterus niger. *Briff. av. 2. p. 103. n. 15. t. 10. f. I.*
Troupiale noir. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 320. pl. enlum.*
n. 534.
Black Oriole. *Arct. zool. 2. p. 259. n. 144.* Latham syn.
I. 2. p. 445. n. 37.
*Habitat in America boreali, 10 fere polices longus, gregar-
ius, vermbus et scarabæis viellans, incubationis tempo-
re suavissime cantans; nidum in arboribus struit, 8 cir-
citer pedibus supra terram elatum, et ova 5 parit obscuri
coloris, maculis nigris notata.*
Femina coloris ex virecente fusci; subtus et capite in cine-
reum colorem vergens.

- minor. 46. O. niger, capitis nigredini caeruleo colore intermixto.
Petit Troupiale noir. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 221.*
Troupiale de la Caroline. *Buff. pl. enlum. n. 606. f. 1.*
Lesser black Oriole. *Lath. syn. I. 2. p. 446. n. 38.*
Habitat in America, 6 pollices longus, facile cicurandus.
Feminae etiam in aliis et cauda color caeruleus intermixtus.
- oliva- 47. O. olivaceus, capite, gula, jugulo, et pectore fuscis, alis
ceus. nigris.
Troupiale olive de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 225.*
pl. enlum. n. 606. f. 2.
Cayenne Olive Oriole. *Lath. syn. I. 2. p. 447. n. 39.*
Habitat in Cayenna.
Rostrum et pedes nigra.
- Auna- 48. O. fuscus, macula suboculari mentoque albis, jugulo et
laſchken- pectore ex ferrugineo fuscis.
fis. Aoonalaſchken Oriole. *Lath. syn. I. 2. p. 447. n. 40.*
Habitat in Aunalaſchka, 8 pollices longus.
Rostrum et pedes fusca.
- caudacu- 49. O. varius, rectricibus angustis acuminatis,
tus. Sharp-tailed Oriole. *Arct. zool. 2. p. 261. n. 151.* *Lath.*
syn. I. 2. p. 448. n. 41. t. 17.
Habitat in Noveboraco, alaudae magnitudine.
Rostrum obscurum; vertex fuscus et cinereus; genae fuscae;
pectus, femora et crissum pallide flavescens, maculis fuscis;
abdomen album; dorsum ex cinereo, nigro et albo
varium; remiges rectricesque alarum fuscae, bae margi-
ne ferrugineo; cauda obscure olivacea, fasciis obsoletis;
pedes pallide fuscii.
- sinensis. 50. O. albus, capite, collo, pectore, et superiore dorsi parte
cinereis, remigibus chalybeis, cauda rotundata ex chaly-
beo et albo mixta.
Kink. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 253.* *Latham syn. I. 2.*
p. 448. n. 42.
Kinck de la Chine. *Buff. pl. enlum. n. 617.*
Habitat in Sina.
Rostrum ex rubicundo fuscum; pedes incarnati.
- aureus. 19. O. flavo-fulvus, capistro, gula, rectricibus primariis re-
ctricumque extremitate nigris.
Icterus indicus. *Briſſ. av. app. p. 37. n. 31.*
Paradisea flavo-fulva. *Muf. Ad. Frid. I. p. 15.*

Rollier

Rollier de Paradis. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 149.*
 Golden Bird of Paradise. *Edw. av. t. 112. Lath. syn. I. 2.*
p. 483. n. 8.
Habitat in India, 8 pollices longus.
Rostrum fuscum.

viridis. 51. O. olivaceus, subtus in viridem vergens, alarum apice et
 teetrichibus inferioribus flavis, superioribus et majoribus
 fuscis flavo marginatis, cauda rotundata.
Icterus minor viridis. Briff. av. 2. p. 113. n. 21. t. 2. f. 2.
Troupiale de S. Domingue, appellé le Sifleur. Buff. hist.
nat. des ois. 3. p. 230. pl. enlum. n. 236. f. 1.
Whittler-Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 443. n. 34.
Habitat in insula S. Dominici, 7 fere pollices longus.
Rostrum corneum; pedes et ungues grisei.

furcatus. 52. O. niger, dorso, uropygio, remigibus, caudaque furcata
 in caeruleum vergentibus, teetrichibus caudae inferioribus
 albis.
Icterus cauda bifida. Briff. av. 2. p. 105. n. 16.
Fork-tailed Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 443. n. 33.
Habitat in nova Hispania.
Rostrum flavum; cauda longa; pedes cum unguibus nigri.

chrysoce- 20. O. niger, pileo teetrichibus alarum caudaeque luteis.
 phalus. Xanthornus icterocephalus americanus. *Briff. av. app. p. 38.*
t. 2. f. 2.
 Goldkoepfige gelbschulterichte Atzel. *Merrem Beytr. I.*
p. 14. t. 3.
Habitat in America, ultra 8 pollices longus, alaudae magnitudine.
Occiput et femora aurea; rostrum nigrum; pedes cum unguibus ex nigro fusi.

53. GRACULA. *Rostrum convexo-cultratum, basi*
nudiusculum.
Lingua integra, auctiuscula, car-
nosa.
Pedes ambulatorii.

religiosa. 1. Gr. nigro-violacea, macula alarum alba, fascia occipitis
 nuda flava.
Mainatus. Briff. av. 2. p. 305. n. 49. t. 28. f. 2.
Corvus javanicus. Obs. it. 102.

Stur-

sto.
I.
I.
dus.
miflus.is, alis
p. 225.

Latb.

fuscae;
lis fus-
et albo
margi-
cletis;i parte
chaly-

t. I. 2.

iis re-

Rollier



Sturnus indicus. *Bont. jav.* 67. *Raj. av.* p. 68. n. 2.

Mainate. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 416. t. 25.

Mainate des Indes orientales. *Buff. pl. enlum.* n. 268.

Bontius indian Stare. *Will. orn.* p. 145. t. 38.

Minor from the Eastindies. *Albin. av.* 2. p. 35. t. 38.

Lesser Minor or Mino. *Edw. av.* I. t. 17.

Minor Grakle. *Lath. syn.* I. 2. p. 455. n. 1.

$\beta.$ Mainatus major. *Briff. av.* 2. p. 308. n. 50.

Grand Mainate. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 419.

Greater Minor or Mino. *Edw. av.* I. t. 17.

Habitat in India, insulisque oceanii indici, $10\frac{1}{2}$ pollices longa, $\beta.$ major, mansueta, fructibus, cerasis, uvis etc. viellitans, in aedibus loquacissima, praestantior psittaco, egregie sibilans.

Rostrum rubrum apice flavum; pedes fulvi; pennae capitis (exceptis intermeditis) brevissimae, holasericaceae; fascia nuda infra oculos fere ad nucham; remiges 2-8 fascia alba.

calva.

2. Gr. subcinerea, capite utrinque nudo.

Merula calva. *Briff. av.* 2. p. 280. n. 36. t. 26. f. 2.

Merle chauve des Philippines. *Buff. pl. enlum.* n. 200.

Goulin. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 420.

Iting, Tabaduru, vel Gulin (Palalacae species). *Camel. Aet. angl.* 23. p. 1397. n. 43.

Bald Grakle. *Lath. syn.* I. 2. p. 497. n. 2.

Habitat in Philippinis, vorax, viellitans fructibus, in cavis arborum, potissimum cocos nidificans.

Rostrum pedesque fusca; latera capitis, dum irascitur avis, coccinea; linea verticis plumosa nigra.

foetida. 3. Gr. nigra, remigibus extus caerulecentibus, fascia collari nuda.

Fetid Grakle. *Lath. syn.* I. 2. p. 460. n. 4.

Habitat in America. Rolander.

Magnitudo picae; caput plumis erectis brevissimis quasi holosericum; rostrum fere cuculi; nares ovatae nudae; lingua acuta; alae compositis remigibus extus caerulecentes absque alba macula; rectrices aequales.

Barita. 4. Gr. subgrisea, humeris caeruleis, remigibus extus viridibus.

Monedula tota nigra. *Sloan. jam.* 2. p. 299. t. 257. f. 2.

Raj. av. p. 185. n. 28.

Boat-

Graculæ omnes extra Europam habitant, rostro crasso, ad latera compresso; ad basim ejus nares exiles; unguis adunci, acuti; digitorum anteriorum medius basi cum exterioro connexus.

Boat-tailed Grackle. *Arct. zool.* 2. p. 264. n. 154. Lath.
syn. I. 2. p. 460. n. 5. t. 18.

Habitat in insulis Antillis, et calidiori Americae borealis parte, hic insectis et zea, ibi musarum fructibus vicitans, quos devastat. Rolander.

Rostrum breviusculum, cultratum, nigricans, basi nudum, subtus albicans; alae complicatis remigibus virides; explicatae remiges intus nigrae; cauda rotundata, viridis dum complicata, et supra concava.

crista- 5. Gr. nigra, remigibus primoribus basi rectricibusque apice
tella. albis, rostro flavo.

Merula sinensis cristata. *Briss. av.* 2. p. 253. n. 21.

Merle huppé de la Chine. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 367.
pl. enlum. 507.

Chinese Starling or Blackbird. *Edw. av.* I. t. 19.

Crested Grackle. *Lath. syn. I. 2. p. 464. n. 7.*

Habitat in Sina, oryza, vermis, insectis vicitans, egrie loquax et sibilans, 8½ pollices longa.

Color nigricans, in caeruleum vergens; irides aurantiae; frontis pennae elongatae, cristae in modum erigendae; remiges majores a basi ad medium usque albae, ceterum ex atro caeruleo; pedes flavi.

Saularis. 6. Gr. nigro-caeruleo-scapularis, ab domine, macula alarum, rectricibusque lateralis albis.

Lanius bengalensis niger. *Briss. av.* 2. p. 184. et *suppl.* p. 41.
n. 19.

Saularis maderaspatus. *Raj. av.* p. 197. t. 2. f. 19. 20.

Pic-griesche noire de Bengale. *Buff. hist. nat. des ois.* I.
p. 299.

Bengal Magpie or Dial-bird. *Alb. av.* 3. p. 17. t. 17. 18.

Little Indian Pic. *Edw. av.* t. 181.

Dial Grackle. *Lath. syn. I. 2. p. 465. n. 8.*

Habitat in Bengala, turdi viscivori magnitudine.

Femina supra quidem nigra, jugulo tamen et pectore fusca.

Quiscalis. 7. Gr. nigro-violacea, cauda rotundata.

Pica jamaicensis. *Briss. av.* 2. p. 41. n. 3.

Pic de la Jamaïque. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 97. n. 2.

Purple Jackdaw. *Catesb. carol.* I. p. 12. t. 12.

Barbado's Blackbird. *Brown. jam.* p. 476.

Purple Grackle. *Arct. zool.* 2. p. 263. n. 153. *Lath. syn. I. 2.*
p. 462. n. 6.

Tequix-



Tequixquiacatzanatl. Fern. Mex. 21.

Masdieb. Kalm it. 3. p. 33.

Habitat in America septentrionali ad novam Hispaniam et Jamaicam usque, migratoria, suaviter cantans, in arboribus abditarum ut plurimum regionum nidificans, ova pariens 5-6, caerulentia, maculis striisque nigris insignita, famelica quidem oryza, hordeo, avena, tritico viettitans, lubentius tamen zizania aquatica et zea mays, qua consitos agros devastat, hinc Virginianis invisa avis, aqua et igne interdicta, sed injuste, destruit enim bruchos pisii, et prata infestantes vermes, ita ut ea fere extirpata omne gramen comedunt viderent 1750. Pensylvaniæ incolae. Caro parum sapida.

Longitudo 13 $\frac{1}{2}$, feminae 11 $\frac{1}{2}$ pollicum. Rostrum et pedes nigra; irides argenteæ; cauda longa, cuneiformis, tina cum alis purpurea; femina tota, praecipue dorso, alis, caudaque obscura.

Atthis. 8. Gr. viridi-caerulea, abdomine ferrugineo, pedibus sanguineis.

Corvus (aegyptius) viridi-maculatus, dorso medio caeruleo. Hasselq. it. 140. n. 20.

Egyptian Grakle. Lath. syn. I. 2. p. 466. n. 9.

Habitat in Aegypto, insectis viettitans, alaudae magnitudine, 4 pollices longa.

longiro- 9. Gr. brunnea, subtus ochroleuca, capite et collo atris, fas-
stra. fcia collari nuda rugosa, alarum area alba, cauda cunei-
formi nigra, teetricibus ferrugineis. Pall. spicil. 6. p. 5.
t. 2. f. 2.

Longbilled Grakle. Lath. syn. I. 2. p. 466. n. 10.

β . Oriolus nobilis, edle Atzel. Merrem Beytr. I. p. 8. t. 2.

Habitat in America australi, β . in insulis Sandwich ultra
8 pollices longa.

Rostrum nigrum, longius, quam reliquis speciebus, naribus in medio positis; lingua profunde bifida, marginibus laceras; irides obscurae; remiges primariae basi oblique albae; pedes longi robusti nigri; habitus gracilis.

β . Sturni magnitudine; voltri basi nullis setis cineta; naribus semilunaribus; colore splendide nigro, pennarum quorundam bumeralium, et teetricum caudae inferiorum flavo, rectricum extimarum albo, basi extus lutea differt.

10. Gr.

sturnina. 10. Gr. cana, verticis macula, dorsoque inter alas violaceo-
atro, caudae alarumque nitore viridi, harum friga gemi-
na alba. *Pall. it. 3. p. 695.*

*Habitat in Dauriae australioris salicetis circa Ononem et
Argunum, speciosa, habitu, nido, ovorumque colore stur-
ni aemula.*

*Femina decolor, sordide cinerea, dorso fusco, alis cauda-
que sine splendore atris.*

cayen- 11. Gr. striata, supra rufa, subtus flavicans, capite et gula ex
nensis. rufo et albo variis, cauda cuneiformi acuminata alisque
rufis unicoloribus.

*Picucule de Cayenne. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 82. pl.
entum. n. 621.*

Climbing Grakle. Lath. syn. I. 2. p. 467. n. II.

*Habitat in Gujanæ interioribus, pici instar arbores adcen-
dens, 10 pollices longa.*

*Rostrum nigrum, 2 fere pollicum, paulisper incurvatum;
pedes 1 $\frac{1}{4}$ pollicem longi, cum unguibus nigri.*

caruncu- 12. Gr. cinerea, cauda remigibusque atris, vertice mentoque
lata. carunculatis.

*Tringa carunculata capensis. Walch Naturf. II. p. 9. t. 2.
17. p. 14.*

Cockscomb Starc. Lath. syn. II. 1. p. 9. n. 7.

Habitat ad caput bonaæ speci? 6 pollices longa.

54. PARADISEA. *Rostrum capistri plumis tomento- sis tectum.*

*Pennae hypochondriorum lon-
giores.*

*Rectrices duae superiores singu-
lares denudatae.*

apoda. 1. P. pennis hypochondriorum corpore longioribus, rectrici-
bus duabus intermediis longis setaceis.

*Manucodiata. Briss. av. 2. p. 130. n. 1. t. 13. f. 1. Raj. av.
p. 20. n. 1. p. 21. n. 3. 5. 6. 7. p. 22. n. 8. 9. Marcgr.
brasil. 201.*

*Paradisea lutea, cauda, pectore abdomineque brunneis, gula
azurea. It. Wgoth. 139. Mus. Ad. Frid. 1. p. 15.*

*Oiseau de Paradis. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 151. t. 12.
pl. entum. n. 254.*

Para-

Paradisea avis. *Clus. exot.* 360. *Olear. mus.* 24. t. 13. f. 1.
Seb. mus. 1. p. 24. t. 13. f. 1. *Hern. mex.* 317. t. 318.
Worm. mus. 294. f. 294. *Bradl. nat.* t. 12. f. 1. 2. *Cal-*
ceol. mus. 669. t. 673. *Besl. mus.* 32. t. 9. f. 1.
 Birds of Paradise. *Will. orn.* p. 91. n. 1. p. 92. n. 3. 5. 6. 7.
 p. 93. n. 8. 9. t. 11.

Greater Bird of Paradise. *Albin. av.* 3. t. 9. *Edw. av.* t. 110.
Lath. syn. 1. 2. p. 471. n. 1.

Great Bird of Paradise from Aroo. *Forr. it.* p. 135.

β. Smaller Bird of Paradise from Papua. *Forr. it.* p. 137.

Habitat in insulis Moluccis, et reliquis novae Guineae vici-
nis, anni tempore humido in novam Guineam revertens;
gregatim volat, duce praeante, sturnorum in morent
clamitans, audax, ornamenti et mercaturae in India ma-
teries, apoda perperam dicta veteribus.

Femina reætricibus modo 2 intermediis brevioribus; sunt hæc
 apice attenuatae, nudaæ, reætæ; cauda perperam dicta
 sunt pennæ elongatae dorsi et hypochondriorum.

β. minor, in arboribus altis nidificat, maris collo et rostro
 longioribus.

regia. 2. P. reætricibus duabus intermediis filiformibus, apice lunato-
 pennaceis. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 15.

Rex avium paradisearum. *Pet. gaz.* 1. t. 53. f. 2. *Clus.*
exot. 362. t. 362. *Olear. mus.* 24. t. 13. f. 2. *Raj. av.*
 p. 22. n. 10. *Seb. mus.* 1. t. 38. f. 5.

Manucodiata minor. *Briff. av.* 2. p. 136. n. 2. t. 13. f. 2.

Manucode. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 163. t. 13. pl. enlum.
 n. 496.

Roi des oiseaux de Paradis. *Sonner. it.* p. 156. t. 95.

Supposed King of the greater birds of Paradise. *Will. orn.*
 p. 96. t. 77. *Edw. av.* t. 111.

King's Bird. *Forr. it.* p. 141. n. 7.

King Paradise Bird. *Lath. syn.* 1. 2. p. 475. n. 2.

Habitat in Aroo reliquaque oceani indici insulis, humido
anni tempore novam Guineam repetens, alaudae magni-
tudine,

Aves hujus generis in nova Guinea potissimum habitant, ex hac siccâ anni tempore in
 vicinas insulas migrantes, paucos modo gradus ab aequatore distantes; siætas (Seb.
 mus. 1. t. 60. f. 1. 2. 3.) e psittacis aliisque vendidit saepe museis aëtus Sinensis.
 Nares exiguae, pennis reætæ; cauda reætricibus 10, 2 intermediae basi et apice mo-
 do barbatae; pedes magui robusti, digitorum anteriorum medius primo articulo
 exteriori connexus.

13. f. I.
t. 318.
2. Cal-
5. 6. 7.

t. 110.

37.
eae vici-
vertens;
morent
idia ma-

sunt bae-
m dicta
et rostro

lunato-

Clus.
Raj. av.

f. 2.
l. enlum.

Vill. orn.

humido
magni-
tudine,

tempore in
ictas (Seb.
Sinenium,
apice mo-
o articulo

tudine, 5 pollices circiter longa, praecedente rario, solitaria, baccas rubras appetens.

Purpurea, pectorali caerulecente; cirrhi caudae longissimi; pennae sub alis reliquis longiores, quamvis cauda breviores et truncatae.

- tristis. 3. P. area nuda pone oculos trianguli, capite colloque fusca. Merula philippensis. Briss. av. 2. p. 278. n. 35. t. 26. f. I. Martin. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 423. pl. enlum. n. 219. Paradise Grakle. Lath. syn. I. 2. p. 458. n. 3.
Habitat in insulis Philippinis, omnivora, vorax, oestris boum dorso infixis, grylliis, aliis insectis, his deficienibus ipsis columbarum pullis, ratis, fructibus, dactylis, uvis, frumento viettans, bis in anno nidum in bifurcationibus palmarum struens, ova 4 pariens, junior facile eicuranda, docilis et imitabunda.
Magnitudo monedulae; longitudo $9\frac{1}{2}$ pollicum; rostrum et pedes flavi; corpus subfuscum; remiges primores a basi ad medium albae; rectrices, exceptis intermediis, spicæ albae. Ob rostri basin plumis tomentosis tectam huic generi, ceterum graculis magis affinis.
- magnifica. 4. P. supra spadiceus, gula viridi lunulis aureis, cervicis fascieulo pennarum flavarum.
Magnifique de la nouvelle Guinée, ou Manucode à Bouquets. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 166.
Oiseau de Paradis, furnommé le Magnifique. Buff. planch. enlum. n. 631. Sonner. it. p. 163. t. 98.
Magnificent Paradise Bird. Latham syn. I. 2. p. 477. n. 3. t. 19.
Habitat in nova Guinea, monedulae magnitudine, 9 pollices longa.
Remiges primores fuscae; secundariae profunde flavae; remiges intermediae longissimæ, barba brevissima; pedes et rostrum flava; hoc apice et basi nigrum.
- nigra. 5. P. nigra, subtus obsolete viridis, occipite, nucha, cervice, et media abdominis fascia laetus viridibus aureo-lunulatis, arcu aureo cum lunulis rubris ab angulo oris ad gulari protenso.
Gorget Paradise Bird. Lath. syn. I. 2. p. 478. n. 4. t. 20.
Habitat in insulis oceanii indici, monedulae magnitudine. Rectrices 12 inaequales; 2 intermediae 22, extimae 5 modis pollices longae.

- superba. 6. *P. subcristata viridi aurea*, subtus laete viridis, gula violacea, alis nigris, caudae splendore caeruleofcente.
Manucode noir de la nouvelle Guinée, dit le Superbe. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 169. pl. enlum. n. 632.*
Oiseau de Paradis à gorge violet, surnommé le Superbe.
Sonner. it. p. 157. t. 96.
Superb Paradise Bird. *Lath. syn. I. 2. p. 479. n. 5.*
Habitat in nova Guinea.
Rostrum nigrum; pedes fusci; sub alis fasciculus plumarum nigrarum tomentosarum in dorso conspicuus.
- aurea. 7. *P. cristata nigra*, verticis, genarum et gulæ nitore violaceo, jugulo, pectori, maculaque cervicali viridi-aureis.
Siflet ou Manucode à six filets. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 171. pl. enlum. n. 633.*
Oiseau Paradis à gorge dorée. *Sonner. it. p. 158. t. 97.*
Gold-breasted Paradise Bird. *Lath. syn. I. 2. p. 481. n. 6.*
Habitat in nova Guinea, turturis magnitudine.
Rostrum et pedes nigricant; irides flavent; crista pene erecta, pennis aliquot dimidia parte albis, reliquis totis nigris; ad utrumque capitis latus tres pennae praeter apicem imberbes, adeo longae, ut primam caudae cuneiformis quartam partem attingant.
- viridis. 8. *P. thalassina*, dorso, abdomine, uropygio caudaque chalybeis.
Calybé de la nouvelle Guinée. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 173. pl. enlum. n. 634.*
Oiseau de Paradis verd. *Sonner. it. p. 164. t. 99.*
Blue green Paradise Bird. *Lath. syn. I. 2. p. 482. n. 7.*
Habitat in nova Guinea, 16 pollices longa.
Rostrum crassum, nigrum; plumae capitis tomentosae.
- alba. 9. *P. tota alba*. *Penn. ind. zool. n. 5.*
 $\beta.$ *Paradisea anterius nigra, posterius alba*. *Penn. ind. zool. n. 5. $\beta.$*
Habitat rariissima in insulis Papuanis.

55. TROGON. *Rostrum capite brevius, cultratum, aduncum, margine mandibularum ferratum.*

Pedes scansorii.

- strigilatus. 1. *Tr. cinereus*, alis strigis albis.
Trogon cayanensis cinereus. Briff. av. 4. p. 165. n. 1. t. 16.
f. 1. Ger. orn. 2. p. 53. t. 188.

Courou-

Couroucou de la Gujane. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 293.
pl. enlum. n. 765.*
Cinereous Curucui. *Lath. syn. I. 2. p. 489. n. 3.*
*Habitat in Guiana, Cayenna, monedula paulo major, 12½
pollices longus.*
Rorstrum, pedes et ungues obscure cinerea; abdomen, et
rectrices caudae inferiores aurantia; cauda nigricans.

- Curucui. 2. Tr. viridi-aureus, subtus fulvus, gula nigra.
Trotan brasiliensis viridis. *Briss. av. 4. p. 173. n. 4.*
Picis congener Curucui. *Klein av. p. 28.*
Curucui Brasiliensis. *Marcgr. bras. p. 211. Will. orn.
p. 296. t. 22. Raj. av. p. 45. n. 4. Jonst. av. p. 216. t. 60.
Tzinitzean. Fern. nov. Hisp. c. 43. p. 23. Nieremb. hist.
nat. 230. Will. orn. 303. Raj. av. 163.*
Couroucou à ventre rouge. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 207.
t. 14.*
Couroucou à ventre rouge de Cayenne. *Buff. pl. enl. n. 452.*
Red-bellied Curucui. *Lath. syn. I. 2. p. 485. n. 1.*
Rothbauchichter Kuruku. *Merrem Beytr. 2. p. 37. t. 9.*
β. Tr. teetricibus alarum fuscis, area nuda infra oculos nulla.
Avis anonyma tertia. *Marcgr. bras. p. 219.*
γ. Tr. abdomine flavo.
Psittacus flammmeus viridis et cinereus, rostro ferrato. *Feuill.
suit. de journ. p. 20.*
Green yellow-bellied Cuckow. *Edw. glean. t. 331.*
Grüner Kuckuk mit dem gelben Bauch. *Seligm. austl. Voe-
gel. 9. t. 21.*
δ. Tr. cinereus intermixto viridi-aureo, cauda longa.
Couroucou gris à longue queue de Cayenne. *Buff. hist. nat.
des ois. 6. p. 288. pl. enlum. n. 737.*
*Habitat in nova Hilpania, Brasilia, Peru, δ. in Cayenna,
solitarius in densissimis silvis, non cicurandus, in cavis
arboribus bis in anno 3-4 ova alba, columbinis aequalia
pariens, pullosque prodeentes vermis et insectis nutriens;
pica paulo minor, 10½ pollices longus.*
Rectrices laterales fasciis albis nigrisque; intermediae apice
nigrae.

Cc 2

3. Tr.

Aves hujus generis in calidiori modo climate obviae solitariae degunt in densarum hu-
midarumque silvarum arboribus, harumque ramis inferioribus; brevissime volant,
insectisque vivitant; corpus producunt, pedes breves; cauda longissima, ex 12
rectricibus constans.

a viola-
. Buff.
uperbe.

marum

: viola-
ireis.

ois. 3.

97.
n. 6.erecta,
nigris;
tem im-
is quar-

ue cha-

s ois. 3.

7.

ae.

id. zool.

atum,
libula-

I. t. 16.

Courou-



- viridis.* 3. Tr. viridi-aureus, subtus luteus, gula nigra, fascia pedo-
rali viridi-aurea.
Trogon cayanensis viridis. *Briff. av. 4. p. 168. n. 2. t. 17.*
f. 1.
Couroucou à ventre jaune. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 291.*
Couroucou de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 195.*
Yellow-bellied Curucui. *Lath. syn. I. 2. p. 488. n. 2.*
β. Trogon cayennensis viridis, ventre candido. *Briff. av. 4.*
p. 170. n. 3.
Couroucou verd à ventre blanche de Cayenne. *Buff. hist. nat.*
des ois. 6. p. 293.
Habitat in Cayenna, $11\frac{1}{2}$ pollices longus.
- rufus.* 4. Tr. rufus, abdomine, crisco, femoribusque flavis, tectri-
cibus alarum nigro et griseo striatis, remigibus restringi-
que medianarum apicibus nigris.
Couroucou à queue rousse de Cayenne. *Buff. hist. nat. des*
ois. 6. p. 293. pl. enlum. n. 736.
Rufous Curucui. *Lath. syn. I. 2. p. 490. n. 4. t. 21.*
Habitat in Cayenna, 9 pollices longus.
Remigum margo obscurus; rectrices utrinque 3 exteriores
stria transversis nigris et albis, apice albo; abdomen pe-
desque obscura.
- viola-
ceus.* 5. Tr. violaceus, superciliis flavis, dorso uropygioque viridi-
aureis, alis fuscis, rectricibus intermediis ex caerulecenti
viridibus apice nigris.
Lanius capite, collo pectoraque e violaceo nigrantibus,
digitis duobus anticis totidemque posticis. *Koelreuter nov.*
act. Petrop. II. p. 436. n. 7. t. 16. f. 8.
Couroucou à chaperon violet. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 294.*
Violet-headed Curucui. *Lath. syn. I. 2. p. 491. n. 5.*
Longitudo $9\frac{1}{2}$ pollicum; rostrum plumbeum, apice albidum,
versus frontem nigricans; rectrices caudae superiores vi-
ridi-aureae; rectrices 2, 2, partim ex caerulecenti vi-
rides, partim nigrae, tres extimae nigrae, lineis et apici-
bus albis.
- macula-
tus.* 6. Tr. fuscescens, lineis obscuris, vertice viridi, alarum mar-
ginibus, caudaeque obscurae lineis, remigum secunda-
riarum et tectricum alarum apicibus albis.
Spotted Curucui. *Brown. illustr. t. 13. Lath. syn. I. 2. p.*
491. n. 6.
Habitat in Zeylon.
Rostrum fuscum.

7. Tr.

- pedo-
 . t. 17.
 p. 291.
 2.
 av. 4.
 ist. nat.
 teetri-
 tricum-
 rat. des
 teriores
 nen pe-
 viridi-
 lescente
 intibus,
 ter nov.
 p. 294.
 libidum,
 ores vi-
 ti viri-
 et apici-
 m mar-
 ecunda-
 I. 2. p.
 7. Tr.
fasciatus. 7. Tr. fascia pectorali alba.
Fasciated Curucui. Ind. zool. t. 5. Lath. syn. I. 2. p. 492.
n. 7.
Trogon ceylonensis. Briff. av. 4. n. 7.?
Band-Kuruku. Walch Naturf. 17. p. 17.
Habitat in Zeylonae arboribus emortuis, in aliis arboribus
niidificans.
Rostrum nigrum, crassum, paulisper arcuatum, basi setis
circumscriptum; orbitae nuda, caeruleae; irides flavae;
caput collumque nigra; abdomen ex rubente aurantium;
dorsum lomentaceum; testrices caudae griseae; testrices
alarum cum humeris albo et nigro undulatae; remiges et
pedes obscuri; cauda praelonga, inaequalis, apice nigra.

56. BUCCO. *Rostrum cultratum, lateraliter compres-*
sum, apice utrinque emarginato, in-
curvato, rectu infra oculos protenso.
Nares pennis recumbentibus obtectae.
Pedes scansorii.

- Tamatia. 2. B. ex rufo fuscus, subtus ex rufo albus, nigro maculatus,
 gula aurantia, torque dimidiato.
 Tamatia. Raj. av. p. 65. n. 6. Will. ornith. p. 190. t. 59.
 Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 94.
 Barbu à ventre tacheté de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 746.
 Spotted bellied Barbet. Lath. syn. I. 2. p. 494. n. 1.
Habitat in Cayenna et Brasilia solitarius, in locis abditis,
in primis silvis, vicitans insectis, carne insipida; 6½ pol-
lices longus.
 Caput praegrande; rostrum nigrum; vertex et frons rufes-
 cunt; pone oculos area magna nigra; pedes nigri.
 cayen-
 nensis. 3. B. niger, subtus ochroleucus, fronte gulaque rubris.
 Bucco Cayennensis. Briff. av. 4. p. 95. n. 2. t. 7. f. 1.
 Tamatia à tête et gorge rouges. Buff. hist. nat. des ois. 7.
 p. 96.
 Barbu de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 206. f. 1.
 Cayenne Barbet. Lath. syn. I. 2. p. 495. n. 2.
 3. Bucco Cayanensis naevius. Briff. av. 4. p. 97. n. 3. t. 7. f. 4.
 Barbu de S. Domingue. Buff. pl. enlum. n. 746. f. 2.
 Yellow Woodpecker with black spots. Edw. glean. t. 333.
 Habi-
 Cc 3

*Habitat in Cayenna, Guiana, insula S. Dominici, alaudae
cristatae magnitudine 7 pollices longa.
♂. subtus flavus, maculis nigris.*

capensis. 1. *B. rufus fascia humerali fulva, pectorali nigra,*
Bucco. Briss. av. 4. p. 92. n. 1. t. 6. f. 2.

Tamatia à collier. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 97. t. 4.

Barbu à collier de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 395.

Collared Barbet. Lath. syn. I. 2. p. 497. n. 3.

Habitat in Guiana, rario, 7 $\frac{1}{4}$ pollices longus.

Rostrum corneum; pedes et unguis cinerei.

elegans. 4. *B. viridis, capite gulaque rubris caeruleo marginatis, remi-*
gibus fuscis, jugulo et pectorale flavo, hoc rubro-macu-
lato, abdomine ochroleuco viridi-maculato.

Bucco Maynanensis. Briss. av. 4. p. 102. n. 5. t. 7. f. 3.

Beau Tamatia. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 98.

Barbu des Maynas. Buff. pl. enlum. n. 330.

Beautiful Barbet. Lath. syn. I. 2. p. 498. n. 4.

Habitat in provincia Maynas ad Amazonum fluvium, reli-
quies speciebus agilior, passeris magnitudine, 6 fere polli-
ces longus.

Rostrum, pedes et unguis cinerei; illius apex ochroleucus;
ab angulo oris stria utrinque caerulea; cauda cuneiformis,
rectricibus 10; remigum margo viridis.

macro- 5. *B. niger, fronte, rectricum apice subtusque albus, fascia*
pectorali nigra.

Tamatia noir et blanc. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 99.

Le plus grand Barbu à gros bec de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 689.

Greater pied Barbet. Lath. syn. I. 2. p. 498. n. 5.

Habitat in Cayenna, 7 pollices longus.

Rostrum praegrande; pedes obscuri.

melano- 6. *B. niger, humerorum macula, stria pone oculos, cau-*
dae apice et subtus albus, fascia pectorali nigra.

Tamatia noir et blanc. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 99.

Le plus petit Barbu à poitrine noire de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 688.

Lesser pied Barbet. Lath. syn. I. 2. p. 499. n. 6.

Habi-

Aves hujus generis, in Africa, potissimum in Asia et America calidiori inquilinae,
stupidae; rostrum robustum, rectinseculum, setis fere penitus obtusum; rectrices ple-
rumque 10 debiles.

*Habitat in Cayenna, 5 pollices longus.
Rostrum magnum, apice bifidum; fronti candor intermixtus;
gula et colli latera alba; hypochondriis nigredo adspersa;
pedes obscuri.*

philippi- 7. B. viridis, vertice (maris) fasciaque pectorali rubris, area
nenis. oculorum, gula, jugulo subtusque flavus.

Bucco philippensis. Briss. av. 4. p. 99. n. 4. t. 7. f. 2.
Barbu à gorge jaune. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 102. t. 5.
Barbu des Philippines. Buff. pl. enlum. n. 331.
Yellow-throated Barbet. Lath. syn. I. 2. p. 500. n. 7.

Habitat in insulis Philippinis, passeris magnitudine, 5½ pol-

lices longus.

*Rostrum et ungues fusca; color subtus sordide flavus, striis
longitudinalibus obscure viridibus; pedes flavicantes. Fe-
mina area oculorum, jugulum et pectus ex flavicante al-
ba; neque in pectore neque in capite rubor ullus.*

niger. 8. B. niger, subtus albus, stria supraoculari flava utrinque ad
collum producta, torque albo.

Barbu de l'isle de Luçon. Sonner. it. p. 68. t. 34.
Barbu à gorge noire. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 103.
Black-throated Barbet. Lath. syn. I. 2. p. 501. n. 8.

β. Bucco capitis bonae spei.

Barbu à plastron noir. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 104.
Barbu du cap de bonne esperance. Buff. pl. enlum. n. 688.

f. I.

Habitat in insulis philippinis, β. in capite bonae spei.

*Pennae laterales colli dorsique macula flava; testrices ala-
rum 4 fimbria alba, 1 fimbria flava; reliquae infra hanc
ad apicem flavo-maculatae; remiges nigrae, margine fla-
vo; rectrices praeter 4 intermedias fimbria flava; pedes
rostrumque nigra.*

β. supra ex fusco et flavo mixtus; uropygium splendide fla-
vescens; cauda fusca, margine flavo.

parvus. 9. B. ex nigricante fuscus, subtus albus fusco-maculatus, gu-
la flava.

Petit Barbu. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 105.

Barbu du Sénégal. Buff. pl. enlum. n. 746. f. 2.

Little Barbet. Lath. syn. I. 2. p. 503. n. 9.

Habitat ad fluviū Senegal, 4 pollices longus.

*Rostrum fuscum; stria alba ab angulis oris infra oculos; pe-
des incarnati; color supra nitore fulvo, in alis caudaque
viridi.*

- dubi**
- grandis.** 10. B. viridis, tectricibus caudae inferioribus rubris.
 Grand Barbu. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 106.
 Grand Barbu de la Chine. *Buff. pl. enlum.* n. 871.
 Grand Barbet. *Latham syn.* I. 2. p. 503. n. 10.
Habitat in Sina, 11 pollices longus.
Rostrum albicans, apice nigrum; color capitis et juguli in caeruleum, cervicalis et dorſi in badium vergens; pedes obscure flavi.
- viridis.** 11. B. viridis, capite et collo ex griseo fuscis, area oculorum alba.
Barbu vert. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 107.
Barbu de Mahé. *Buff. pl. enlum.* n. 870.
Green Barbet. *Lath. syn.* I. 2. p. 504. n. 11.
Habitat in India, 6½ pollices longus.
Rostrum albicans; remiges majores fuscae; pedes obscuri.
- Lathami.** 12. B. olivaceus, remigibus caudaque obscuris, facie mento que ex subfuscō rufescente.
Buff faced Barbet. *Lath. syn.* I. 2. p. 504. n. 12. t. 22.
Longitudo 6 pollicum, rostrum pallidum; pedes cum unguibus flavi.
- fuscus.** 13. B. fuscus, macula pectoris magna triangulari alba.
White breasted Barbet. *Lath. syn.* I. 2. p. 505. n. 13.
Habitat in Cayenna, alaudae magnitudine, 7 pollices longus.
Rostrum ex subfuscō atrum, basi flavum; cauda cuneiformis.
- rubrica-**
pillus. 14. B. vertice gulaque coccineis, dorso, tectricibus alarum, et cauda viridibus, abdomine albo, pectore flavo ſtria transversa nigra, altera rubra.
Red-crowned Barbet. *Brown's Illuſtr.* p. 30. t. 14. *Lath. syn.* I. 2. p. 505. n. 14.
Habitat in insula Zeylon, 5½ pollices longus.
Rostrum obscurum; linea nigra supra utrumque oculum ad genas; supra humeros utrinque area magna albicans; rectrices exteriores obscurae; pedes rubicundi.
- Zeylani-**
cus. 15. B. viridis, genis nudis flavis, capite colloque pallide fuscis.
Yellow-checked Barbet. *Brown's illuſtr.* p. 34. t. 15. *Lath. syn.* I. 2. p. 506. n. 15.
Habitat in insula Zeylon, praecedentis magnitudine.
Rostrum rubrum; pedes pallide flavi.

57.

can

16. B.

dubius. 16. B. niger, subtus ruber, fascia pectorali crissoque nigris.
 Barbican. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 132.*
 Barbican des côtes de Barbarie. *Buff. pl. enlum. n. 602.*
 Doubtfull Barbet. *Lath. syn. I. 2. p. 506. n. 16.*
*Habitat in maritimis Barbariae, 9 pollices longus, inter
 Ramphastom et Buccinem ambiguus, huic tamen patria,
 lingua carnosa, setisque basin rostri obsidentibus propior.*
Rostrum rubens; pedes breves, ex rubente fuscii.

lorum
 cinereus. 17. B. niger, subtus cinereus, rostro miniato, cauda rotun-
 data.
Wax billed Barbet. Lath. syn. I. 2. p. 507. n. 17.
Habitat in Cayenna, 11½ pollices longus.
Teétrices alarum corpori proximae ex nigro et albo variae;
pedes obscuri.

57. CUCULUS. Rostrum teretiusculum.

Nares margine prominulae.
Lingua sagittata, plana, integra.
Pedes scandorii.

canorus. I. C. cauda rotundata nigricante albo-punctata. *Fn. suec. 96.*
Scop. ann. I. p. 44. n. 48. Nozem. nederl. Vogel. t. 61.
Cuculus. Gesu. av. 363. Aldrov. ornith. I. p. 409. 415.
t. 414. 416. Bell. av. 22. Briss. av. 4. p. 105. n. 1.
Cuculo. Olin. uccell. p. 38.
Coucou. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 305. pl. enlum. n. 811.
Cuckow. Brit. zool. I. n. 82. t. 36. Arct. zool. 2. p. 266.
n. A. Raj. av. p. 23. Will. orn. p. 97. t. 10. 77. Al-
bin. av. I. t. 8. Hayes brit. Birds t. 17. 18. Latham
syn. I. 2. p. 509. n. 1.
Kuckuk. Frisch av. t. 40. 41. Kram. el. p. 337. Bloch
Besch. der berl. Naturf. 4. p. 582. t. XVIII. f. 1.
β. Cuculus rufus. Briss. av. 4. p. 110. n. 1. A.
γ. Cuculus griseo-undulatus, rectricibus intermediis ordine
punctorum alborum dupli notatus, rostro, orbitis pedi-
busque sulphureis. Beske Schr. der berl. naturf. Ges. 7.
p. 452.
Habitat in Europa et septentrionali Asia, 14 pollices longus,
passeribus et insectis eorumque larvis viettans, non raro
migratorius; more aliarum avium ventriculum ante inte-
stina positum habens.

Incubare ipse impotens, ova sordide alba, maculis chalybeis et ferrugineis notata hina vel unum in alienis nidis parit, in primis in motacilarum, quae incubant, et nutriunt enim pullum mensibus aestatis pulcherrimis frondosentiae, florescentiae, grossificationis, dum cuculus aridis infidens arborum ramis famelicus semper cocolans advocat nutritorem.

capensis. 23. *C. virente fusco, subtus albus nigro lineatus, genis, gu-
la, jugulo, cauda et tectricibus alarum superioribus ru-
fis, rectricum apice albo.*

*Coucou du cap de bonne esperance. Buff. hist. nat. des ois. 6.
p. 353. pl. enlum. n. 390.*

Cape Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 513. n. 2.

Habitat in capite bonae spei, canoro minor.

Rostrum et pedes fusca; irides flavae.

*orienta-
lis.* 2. *C. cauda rotundata, corpore nigro-virente nitente, rostro
fusco.*

Cuculus indicus niger. Briff. av. 4. p. 142. n. 18. t. 10. f. 1.

Coucou noir des Indes. Buff. pl. enlum. n. 274. f. 1.

Coukeel. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 383. n. 1.

Eastern black Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 518. n. 10.

β. C. corpore nigro-caerulecente, rostro nigro.

Coukeel. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 383. n. 2.

Habitat in India, 16, β. 14 polices longus.

Pedes ex griseo fusci; unguis nigri.

*minda-
nensis.* 3. *C. cauda rotundata, corpore viridi aureo fusco albo macu-
lato, subtus albo nigricanteque undulato.*

*Cuculus mindanensis naevius. Briff. av. 4. p. 130. n. 12.
t. 12. f. 1.*

*Coucou varié de Mindanao. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 373.
pl. enlum. n. 277.*

Mindanao Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 515. n. 5.

*Habitat in insulis Philippinis, praesertim Mindanao, 14½
polices longus.*

*Gula jugulumque fusca, maculis albis; remiges fuscae, bar-
ba exteriore maculis rufis, interiore albis notata; cauda
fusco-aurea, fasciis transversis rufis; rectricum quarun-
dam apex albus. Pedes cum unguibus grisei.*

Vetula. 4. *C. cauda cuneiformi, corpore subfuscō; subtus testaceo, ci-
lliis rubris.*

*Cuculus jamaicensis longirostris. Briff. av. 4. p. 116. n. 5.
t. 17. f. 2.*

Cucu-

- Cuculus cinereus rostro longiore. *Feuillée per. p. 416.*
Picus major leucophaeus f. canescens, pluviae avis et senex
dictus. Raj. av. p. 182. n. 13.
- Cacco. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 402.*
Coucou à long bec de la Jamaïque. Buff. pl. enlum. n. 772.
Other sort of Old man or Rain-Bird. Sloan. jam. p. 313.
n. 53. t. 258. f. 2.
- Long billed Rain Cuckow. *Latham syn. I. 2. p. 535. n. 32.*
Habitat in Jamaicæ silvis et dumetis, mansuetus, pluvia
instante clamitans, breviter volans, picae instar ince-
dens, seminibus, vermis, scarabaeis, serpentibus mi-
noribus, ranis, lacertis, aviculis, ratti viettans, 15
pollices longus.
- Rostrum sesquipollice longius, mandibula superiore nigra,
inferiore albicans; vertex fuscus; palpebrae punctis coc-
cineis; gula jugulumque albida; rectrices 2 intermediae
ex cinereo olivaceæ; reliqua nigrae, apice albo; pedes
ex caeruleo atri.
- pluvialis. 24. C. ex cinereo olivaceus, subtus rufus, gula juguloque
albis.
- Cuculus jamaicensis. *Briff. av. 4. p. 114. n. 4.*
Coucou dit le Vieillard ou l'oiseau de pluie. Buff. hist. nat.
des ois. 6. p. 398.
- Old man or Rainbird. *Raj. av. p. 182. n. 12. Sloan. jam.*
p. 312. n. 52. t. 258. f. 1. Brown. jam. p. 476.
- Rain Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 536. n. 33.*
Habitat in Jamaica, vetulæ affinis, 16–17 pollices longus.
Rectrices extimæ margine albo.
- minor. 25. C. ex cinereo olivaceus, subtus rufescens, mento albo.
Petit vieillard. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 401.
- Coucou des Paletuviers de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 813.*
- Mangrove Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 537. n. 34.*
Habitat in Cayenna, 12 pollices longus, infectis potissimum
coleopteris viettans, ceterum pluviali similis.
- glanda-
rius. 5. C. cauda cuneiformi, capite subcribato, fascia oculari nigra.
Cuculus Andalusiae. Briff. av. 4. p. 126. n. 10.
- Grand Coucou tacheté. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 361.*
Great Spotted Cuckow. Edw. av. t. 57. Latham syn. I. 2.
p. 513. n. 3.
- Habitat in Andalusia, picæ magnitudine.*
- Rostrum nigrum; crista ex caerulecente cinerea; humeri,
rectrices alarum superiores et caudæ fusca, maculis exi-
guis

guis albis et pallide cinereis; remiges fuscae; cauda nigricans, apice albo.

hon
tus.

ferratus. 26. *C. niger*, speculo alarum albo. *Sparrmann mus. Carlson.* n. 3.

Habitat ad caput bonae spei, ex virescente et caerulecenti splendide niger.

Macula alarum superne et infra serrata; cauda corpore longior.

tahitiensis. 27. *C. fuscus*, subtus albus fusco striatus, superciliis albis, remigibus ferrugineo maculatis.

Coucou brun varié de noir. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 376. Ara Wereroa. Cook ir. 4. p. 272.

Society Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 514. n. 4.

Habitat in insulis Societatis, picace magnitudine, 19 pollices longus.

Rostri mandibula superior nigricans, inferior pallida; irides pallide flavae; crissum album; cauda cuneiformis, lineis transversis ex ferrugineo fusca, apicibus albis; pedes virescentes.

senegalensis. 6. *C. cauda cuneiformi*, corpore griseo subtus albo, pileo rectricibusque nigricantibus.

Cuculus senegalensis. Briff. av. 4. p. 120. n. 7. t. 8. f. 1.

Coucou du Sénégâl. Buff. pl. enlum. n. 332.

Rufalbin. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 370.

Strait-heeled Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 525. n. 18.

Habitat ad fluvium Senegal; canoro major, 15 $\frac{1}{4}$ pollices longus.

Rostrum nigrum; uropygium et rectrices caudae superiores fuscae, striis profundioribus; remiges rufae, apice subfuso; pedes et unguis grisei; posteriorum internus rectus, longior.

bengalensis. 28. *C. ferrugineus* albo lineatus, subtus ex flavicante fuscus, cauda cuneiformi.

Lark-heeled Cuckow. Brown. illustr. p. 26. t. 13. Lath. syn. I. 2. p. 525. n. 19.

Habitat in Bengala, alauda major.

Rostrum obscurum; remiges ex rubente fuscae, et praeter 1 et 2 nigro lineatae; rectrices exteriores obscurae apice fuso, reliquae lineis nigris et angustioribus fusca notatae; pedes nigri; unguis posteriorum interior longus rectus.

7. C.

- nigri-
arlson.
lescente
corpo-
ois, re-
p. 376.
9 polli-
rides
, lineis
des vi-
ileo re-
f. I.
pollices
periores
ice sub-
rectus,
fuscus,
Lath.
aeter 1
ice fus-
otatae;
rectus.
7. C. cauda cuneiformi, corpore nigricante albo maculato,
subtus albo cinereoque fasciato.
Cuculus malabaricus naevius. Briss. av. 4. p. 136. n. 15.
t. II. A. f. 2.
Cuil. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 375.
Coucou tacheté de Malabar. Buff. pl. enlum. n. 294.
Sacred Cuckow. Latham syn. I. 2. p. 526. n. 20.
Habitat in Malabarica, reptilibus vicitans, hinc forte inco-
lis sacratus, canoro minor, 11½ pollices longus.
Remiges et cauda cinereae, transversim albo maculatae; pe-
des et ungues pallide cinerei.
- puncta-
tus. 8. C. cauda cuneiformi, corpore nigricante rufo-punctato,
subtus rufo striatis nigris, rectricibus rufo-fasciatis.
Cuculus indicus naevius. Briss. av. 4. p. 134. n. 14. t. 10.
f. 2.
Coucou brun piqueté de roux. Buff. hist. nat. des ois. 6.
p. 377.
Coucou tacheté des Indes orientales. Buff. pl. enlum. n. 771.
Rufous spotted Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 517. n. 8.
Habitat in India et insulis Philippinis, canoro major, 16½
pollices longus.
Rostrum cornuum; a basi ejus ad aures infra oculos fascia
rufa; pedes ex griseo fusci; ungues nigricantes.
- panaya-
nus. 29. C. ex atro fuscus, maculis ex rufo flavis, subtus rufus, striis
transversis nigris, gula nigra, cauda aequali.
Coucou tacheté de l'isle de Panay. Sonner. it. p. 120. t. 78.
Panayan spotted Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 517. n. 9.
Habitat in insula Panay, punctato satis similis, canoro major.
Rostrum nigrum; irides flavae; maculae capitis, colli, dorfi,
gulae, rectricum alarum ex rufo flavae oblongae, remi-
gum transversae flavicantes, nigris admixtae; cauda ex
rufo flava, nigro cancellata; pedes plumbei.
- naevius. 9. C. cauda cuneiformi, corpore fusco ferrugineoque, jugulo
strigis fuscis, rectricibus apice rufescens.
Cuculus cayanensis naevius. Briss. av. 4. p. 128. n. 11. t. 9.
f. 1.
Coucou brun varié de roux. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 411.
Coucou tacheté de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 812.
Spotted Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 539. n. 38.
β. *Cuculus gula grisea, rectricibus lateralibus apice, et abdo-*
mine albis.

Habi-

Habitat in Cayenna, β. etiam in Guiana, coturnices venans, 12 fere pollices longus.

Mandibula superior dorso nigra, lateribus rufa, inferior tota rufa; corpus subtus ex rufo album; verticis pennae longae, fuscae, apice rufae; cervix ex rufo grisea; remiges ex griseo fuscae, margine et apice rufae; pedes cinerei; unguis ex griseo fusci.

punctu-
latus.

30. C. cauda cuneiformi, corpore fusco pennarum apice rufescente, subtus sordide albo.

Punctated Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 541. n. 39.*

Habitat in Cayenna, 9 pollices longus.

Rostrum nigrum, pollicem longum; pedes satis longi.

ridibun-
dus.

31. C. fulvus, gula, jugulo, et pectore cinereis, abdomine, femoribus et tectricibus caudae inferioribus nigris.

Cuculus mexicanus. *Briss. av. 4. p. 119. n. 6.*

Quapactol ou Rieur. *Buff. hist. nat. des ois. 4. p. 408. n. 4.*

Laughing Bird or Quapactototl. *Raj. av. p. 174. Will. orn. p. 387.*

Laughing Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 539. n. 37.*

Habitat in nova Hispania; vox hominis ridentis, incolas terrens.

Longitudo 16 pollicum; rostrum ex caerulecente atrum; irides albae; cauda dimidia corporis longitudine.

Guira.

32. C. cristatus ex flavicante albus, cauda aliquo fusca, capite in medio fusco ad latera flavicante, collo in medio flavicante, ad latera fusco.

Cuculus cristatus brasiliensis. *Briss. av. 4. p. 144. n. 19.*

Guira cantara. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 407.*

Guira acantagara. *Raj. av. p. 45. n. 5. Will. orn. 140. n. 9. t. 22.*

Habitat in Brasiliae silvis, valde clamans, picae magnitudine, 14½ pollices longus.

Rostrum obscure flavum, pollicem longum; irides fuscae; cauda apice alba; pedes thalassini.

america-
nus.

10. C. cauda cuneiformi, corpore supra cinereo subtus albo, mandibula inferiore lutea.

Cuculus carolinianus. *Briss. av. 4. p. 112. n. 5.*

Vieillard à ailes rousses. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 400.*

Coucou de la Caroline. *Buff. pl. enlum. n. 816.*

Caroline Cuckow. *Arct. zool. 2. p. 265. n. 155. Catesb. Carol. I. t. 9. Lath. syn. I. 2. p. 537. n. 35.*

Habi-

sclo-
ceus

macu-
tus

niger

ater.

Habitat in America septentrionali, migratorius, Majo adveniens, auctumno discedens; nidum ut plurimum in malis ex baculis radicibusque struens, et 4 ova ex caeruleofuscate alba pariens, 12 pollices longus.

Remiges primariae extrinsecus fuscac interius aurantiae; remiges, exceptis 2 intermediis, apice albae; pedes obscuri.

rufescens. scolopaceus. 11. C. cauda cuneiformi, corpore undique griseo fuscoque nebuloso.

Cuculus bengalensis naevius. Briff. av. 4. p. 132. n. 13.

Boutfallick. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 372.

Brown and spotted Indian Cuckow. Edw. av. t. 59.

Indian spotted Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 516. n. 6.

Habitat in Bengala, turdo vis major, 14 pollices longus.

Rostrum et pedes ex luteo sordide virent; remiges et humeri striis transversis fuscis et rufis; cauda rufescens, tamen obliquis fuscis.

maculatus. 33. C. cauda cuneiformi, corpore supra ex virescente griseo maculis albis, subtus ex fusco alboque vario.

Coucou tacheté de la Chine. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 378. pl. enlum. n. 764.

Chinese spotted Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 516. n. 7.

Habitat in Sina, 14 pollices longus.

Rostrum supra nigricans, subtus flavum; caput collumque nigricantia, maculis circa oculos albis; nitor supra fusco-aureus; pedes flavicantes.

niger. 12. C. cauda cuneiformi, corpore nigro nitido, rostro flavo.

Cuculus bengalensis niger. Briff. av. 4. p. 141. n. 17.

Couckeel. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 384. n. 3.

Black Indian Cuckow. Edw. av. t. 58.

Habitat in Bengala, 9 pollices longus; an mera orientalis varietas?

Nitor viridis et violaceus; pedes ex rubicundo fusi; unguis nigricantes.

albo, ater. 34. C. cauda cuneiformi, corpore splendide nigro, capite peninis elongatis cristato, remigum quinque primarum basi alba.

Crested black Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 519. n. 11.

Habitat in promontorio bonae spei; an forte idem cum serrato?

35. C.

- melano- 35. C. niger, subtus albus, cauda cuneiformi, apice alba, ma-
 leucos. cula alarum alba, capite suberifato.
 Jacobin huppé de Coromandel. *Buff. hist. nat. des ois.* 6.
 p. 380. *pl. enlum.* n. 872.
 Coromandel Crested Cuckow. *Lath. syn.* I. 2. p. 520. n. 12.
Habitat in Coromandel, 11 pollices longus.
 Pedes fuscii.

pilanus. 36. C. cauda cuneiformi, corpore supra ex albo et nigro vario,
 subtus albo, capite nigro cristato, gula et pectore rufis.
 Cuculus ex albo et nigro mixtus. *Orn. ital.* p. 81. t. I.
 Coucou huppé noir et blanc. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 362.
 Pisan Cuckow. *Latham syn.* I. 2. p. 520. n. 13.
Habitat Pisis, semel tantum deprehensus, ova 4 pariens,
canoro paulo major.
 Rostrum ex virescente fuscum; tectrices caudae inferiores ru-
 fae; remiges rufae, rectrices nigræ, utraeque apice al-
 bæ; pedes virides.

madagaf- 37. C. olivaceus fusco undulatus, subtus fulvus, gula olivacea
 cariensis. flavo temperata.
 Coucou verdâtre de Madagascar. *Buff. hist. nat. des ois.* 6.
 p. 364. *pl. enlum.* n. 815.
 Great Madagascar Cuckow. *Lath. syn.* I. 2. p. 521. n. 14.
 ♂. Cuculus area capitis caerulecente sulcata circulo nigro
 cincta.
Habitat in Madagascar, 21½ pollices longus.
 Rostrum nigrum; irides aurantiae; abdominis pars poste-
 rior, et caudae tectrices inferiores fuscae; femora cinerea;
 cauda 10 pollices longa; rectricum lateralium aliquac.
 apice albo; pedes ex flavicante fuscii.

domini- 13. C. cauda cuneiformi, corpore griseo fusco subtus exalbi-
 cus. do, rectricibus lateralibus tribus apice albis.
 Cuculus dominicensis. *Briss. av.* 4. p. 110. n. 2. t. 9. f. 2.
 Cendrillard. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 413.
 St. Domingo Cuckow. *Lath. syn.* I. 2. p. 541. n. 40.
 ♂. Cuculus subtus candidus.
Habitat in Guiana, insula S. Dominici et Louisiana, turdi-
magnitudine, 10½ pollices longus.
 Remiges rufae, apice et margine ex griseo fuscus; rectrices
 praeter 2 intermedias nigræ apice albo, extimæ margi-
 ne quoque albo; rostrum, pedes et ungues ex griseo fuscus.

14. C.

- cayanus. 14. C. cauda cuneiformi, corpore castaneo purpurascente subtus cinereo, rectricibus omnibus apice albis.
Cuculus cayanensis. Briss. av. 4. p. 122. n. 8. t. 8. f. 2.
Coucou piaye. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 414.
Coucou de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 211.
Cayenne Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 542. n. 41.
 $\beta.$ *Cuculus cayanensis minor.* Briss. av. 4. p. 124. n. 9. t. 16. f. 2.
 $\gamma.$ *Cuculus rostro rubro, capite cinereo, gula et pectore rufis, abdomine ex cinereo nigro.*
Habitat in Cayenna, ad ripas, mansuetus, vittans insectis, 16 fere, $\beta.$ 10 $\frac{1}{4}$ pollices longus.
Rostrum, pedes et ungues ex griseo fusca; remiges apice fuscae; rectrices castaneae, versus apicem nigrae, apice albae; cauda 10 pollices longa.
- tranquil- 38. C. niger, subitus in cinereum vergens, cauda cuneiformi, tectorum alarum superiorum margine albo.
Coucou noir de Cayenne. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 416. pl. enlum. n. 512.
Cayenne black Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 543. n. 42.
Habitat in Cayenna, solitarius, reliquis speciebus minus inquietus, 11 pollices longus.
Rostrum et irides rubent.
- tenebro- 39. C. niger, abdomine et femoribus ferrugineis, uropygio crissoque albis, cauda aequali. Pall. n. nord. Beytr. 3. p. 3. t. I. f. 1.
Petit Coucou noir de Cayenne. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 417. pl. enlum. n. 505.
White-rumped black Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 544. n. 43.
Habitat in Cayennae arborum ad aquas crescentium ramis folitarius, immotus, vittans insectis; nidificat in cavis arborum aut terrae, 8 $\frac{1}{4}$ pollices longus.
Rostrum obscurum subulatum; nares setis circiter 10 cinctae, rihtus setis circiter 8; fascia inter pectus et abdomen aurantia; pedes flavi, breves; trogoni affinis.
- pyrrho- 40. C. niger, subitus albus, vertice genarumque parte coccineis circulo albo cinctis, caudae praelongae apice albo.
Red-headed Cuckow. Ind. zool. t. 6. Lath. syn. I. 2. p. 544. n. 44.
Habitat in Zeylon, fructibus vittans, 16 pollices longus.
Rostrum arcuatum, ex virecente flavum; caput collumque maculis exilibus albis; pedes caerulescens.

- caeruleus. 15. *C. cauda rotundata, corpore caeruleo.*
Cuculus madagascariensis caeruleus. Briss. av. 4. p. 157. n. 26.
t. 13. f. 1.
Tait-son. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 191. t. 18.
Coucou bleu de Madagascar. Buff. pl. enlum. n. 295. f. 2.
Blue Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 531. n. 29.
Habitat in Madagascar, canori magnitudine, 17 polices longus.
Rostrum, pedes et unguis nigra; remiges et cauda nitore viridi et violaceo.
- finensis. 16. *C. cauda cuneiformi longa, corpore caeruleo subtus albo, rectricum apicibus macula alba.*
Cuculus finensis caeruleus. Briss. av. 4. p. 157. n. 27. t. 14.
A. f. 2.
San-hia de la Chine. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 389.
Chinese Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 530. n. 28.
Habitat in Sina, 13 polices longus.
Rostrum, irides, pedes et unguis rubent; vertex albus, pennis caeruleis; reliquum caput et gula nigricans; area alba rotunda ad genas.
- afer. 41. *C. viridi-aeneus, subtus splendide griseus, capite colloque cinereis, vertice nigricanti-aeneo, cauda aequali viridi-aurea, subtus nigra.*
Cuculus madagascariensis major. Briss. av. 4. p. 160. n. 28.
t. 15. f. 1.
Grand Coucou de Madagascar. Buff. pl. enlum. n. 587.
Vaurou-driou. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 395.
African Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 532. n. 30.
β. Cuculus fuscus subtus rufescens, capitis collique striis transversis fuscis rufisque.
Grand Coucou de Madagascar. Buff. hist. nat. des ois. 6.
p. 396.
Habitat in Madagascar, columbae majoris magnitudine, 15 polices longus.
Rostrum rectum, 2 polices longum, nigricans; ab eo ad oculum utrinque linea nigra; remiges majores nigricantes, minores obsolete virides; pedes rubicundi; unguis nigri.
- indicator. 42. *C. ex ferrugineo griseus, subtus albus, palpebris nudis nigris, humerorum macula flava, cauda cuneiformi ferruginea. Mill. illustr. t. XXIV. f. A.*
Coucou indicateur. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 392. n. 22.
Honey

Perf

bras
fi

n. 26.
f. 2.
ollices
nitore
albo,
t. 14.
9.
, pun-
ea al-
colla-
ali vi-
n. 28.
7.
trans-
ois. 6.
te, 15
eo ad
rican-
ngues
brasili-
lis ni-
ferru-
n. 22.
Honey

Honey Guide. Sparrmann aEt. angl. 67. p. 38. t. I.
Honey Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 533. n. 31.
*Habitat in interiore Africa, mellis causa apium sylvestrium
alvearia exquirens, et voce sua hominibus indicans, ni-
dum lagenae forma, ex gracilibus corticis filamentis struit,
incolis magni aestimatus, ut trucidare nefas sit, & polli-
ces longus.*

*Rostrum basi fuscum, apice luteum, setis basin cingentibus;
femorum pennae albae, stria longitudinali nigra; remi-
ges supra fuscae, subtus ex griseo fuscae; rectrices 1, 1
angustissimae, ferrugineae, 2, 2 fuliginosae margine in-
teriori albidae, 3, 3 albae, apice fuscae, macula nigra
ad interiorem rhachis notatae; reliquae similes, macula
tamen nigra sensim disparente.*

Persa. 17. C. cauda aequali, capite cristato, corpore viridi-caerule-
cente, remigibus fanguineis.

Cuculus guineensis cristatus viridis. Briff. av. 4. p. 152.
n. 24.

Crown Bird from Mexico. Albin. av. 2. p. 19. t. 19.

Touraco. Edw. av. 1. t. 7. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 300.
t. 15. Lath. syn. I. 2. p. 545. n. 46.

Touraco de Guinée. Buff. pl. enlum. n. 601.

*Habitat in variis Africæ partibus, vegetabilibus, potissi-
mum fructibus vicitans, picae magnitudine, trogoni per-
quam affinis.*

*Rostrum obscure rubrum, breve, subconicum, margine,
mandibulae praesertim superioris, serratum; lingua car-
tilaginea, plana, acuta; nares pennis recumbentibus te-
ctæ; irides budiae; palpebrae carunculis rubris cinctæ;
crista mobilis apice rubens fere conica; pennae molles,
quasi sericeæ; fascia ocularis nigra; linea alba supra et
infra oculos; humeri, dorsi pars inferior, uropygium,
cauda, rectrices caudæ superiores alarumque majores ex
caerulecente purpurea; abdominis pars infima et latera,
femora, rectricesque caudæ inferiores nigricant; pedes
cum unguibus cinerei, posticorum digitorum exterior vix
retroversus cum anteriore plica cutanea cohaerens.*

brasiliensi. 18. C. cauda subaequali, capite cristato, corpore rubro, re-
migibus flavescentibus.

Cuculus brasiliensis cristatus ruber. Briff. av. 4. p. 154. n. 25.

Cuculus brasiliensis venustissime pictus. Seb. mus. I. p. 102.
t. 66, f. 2.

Couroucoucou. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 298.*

Red-crested Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 545. n. 45.*

Habitat in Brasilia, pyrrhocephalo paulo minor, 10 pollices longus.

Rostrum dilute rubrum; crista nigro-varia; abdominis rubori flavedo intermisita; remiges et cauda flavae cum tintura nigra.

cristatus. 19. C. cauda rotundata, capite cristato, corpore cinereo-virescente nitente.

Cuculus madagascariensis cristatus. *Briff. av. 4. p. 149. n. 22. t. 12. f. 2.*

Coucou huppé de Madagascar. *Buff. pl. enlum. n. 589.*

Coua. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 365. n. 4. t. 16.*

Madagascar crested Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 522. n. 15.*

Habitat in Madagascar, corvi glandarii magnitudine, 14 pollices longus.

Rostrum et pedes nigra; irides aurantiae; pectus vinaceum; abdomen albidum cum tintura rufa; remiges et cauda virescentes, subtus cinereae; rectrices exteriores apice albo-

aegyptius. 43. C. fuscus, subtus ex rufo albus, capite et cervice obscure, cauda cuneiformi splendide viridi, remigibus rufis.

Houhou d'Egypte. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 367.*

Egyptian Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 522. n. 16.*

β. Cuculus splendide niger, alis rufis.

Coucou des Philippines. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 369. pl. enlum. n. 824.*

γ. Cuculus alis spadiceis.

Coucou vert d'Antigue. *Sommer. it. p. 181. t. 80.*

Habitat in Aegypto β. in insulis Philippinis, γ. in Antigua solitarius, aut geminus in dumetis ad aquas positis, victimans locustis, 14-15 pollices longus.

Rostrum nigrum; irides splendide rubrae, in γ. nigrae; caput et cervix, in β. quoque gula, jugulum, pectus et abdomen obscure viridia, in hoc in atrum vergentia; tectrices alarum superiores rufae in viridem vergentes; remiges 3 ultimae totae rufae, reliquae apice splendide viridi; pectus nigrantes.

radiatus. 44. C. ex fusco ater, subtus flavus nigro-lineatus, gula genisque vinaceis, vertice ex nigricante griseo.

Coucou brun et jaune à ventre rayé. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 379.*

Coucou

Coucou à ventre rayé de l'isle de Panay. *Sonner. it. p. 120.*

t. 79.

Panayan Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 527. n. 21.*

Habitat in insula Panay, canori magnitudine.

Rostrum nigrum; irides aurantiae; remigum pars inferior albo-maculata; cauda nigra lineis et apice albis, aequalis; pedes rubicundi.

flavus. 45. *C. testaceus, subtus flavescens, vertice gulaque dilute griseis, cauda cuneiformi nigra albo-lineata.*

Petit coucou à tête grise et ventre jaune. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 382. n. 15.

Coucou petit de l'isle de Panay. *Buff. planch. enlum. n. 814.*

Sonner. it. p. 122. t. 81.

Yellow bellied Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 527. n. 22.*

Habitat in insula Panay, ultra 8 pollices longus.

Rostrum pedesque flavescunt, apice illius nigro; irides flavae.

auratus. 46. *C. cauda cuneiformi, corpore supra viridi-aureo, subtus albo, capitis strigis quinque, teetrum alarum, remigum secundiarum rectricumque apicibus albis.*

Coucou vert doré et blanc. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 385.

Coucou vert du cap de bonne esperance. Buff. pl. enlum. n. 657.

Gilded Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 527. n. 23.*

Habitat ad caput bonaë speci, 7 pollices longus.

Rostrum ex virecente fuscum; pedes grisei.

lucidus. 47. *C. supra viridis, subtus albus, utrinque viridi-aureo-lunulatus, remigibus caudaque fuscis.*

Shining Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 528. n. 24. t. 23.

Habitat in nova Seelandia, praecedenti affinis, 7 pollices longus.

Rostrum pedesque caerulecentes; irides badiæ; teetrices caudae inferiores albae.

coronatus. 20. *C. cauda cuneiformi, corpore nigro subtus albo, torque candido.*

Cuculus coromandelensis cristatus. Briff. av. 4. p. 147. n. 21. t. II. A. f. 1.

Coucou huppé de Coromandel. Buff. pl. enlum. n. 274.

Coucou huppé à collier. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 388.

Collared Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 529. n. 26.

Habitat in Coromandel, 12½ pollices longus.

D d 3

Rostrum

- 55
- Rostrum et pedes cinerea; irides flavicantes; caput cristatum, macula ad utrumque latus parva rotunda grisea; gula et femora nigrantia; remiges primariae rufae; secundariae nigrantes, margine rufo; cauda nigrans.**
- cornu-** **21.** *C. cauda cuneiformi, capite crista bifida, corpore fuliginoso.*
tus, *Cuculus brasiliensis cornutus.* *Briff. av. 4. p. 145. n. 20.*
Atingacu camucu. *Marcgr. bras. p. 256. Will. orn. p. 146.*
t. 38. Raj. av. p. 165. n. 5.
Atingacu du Brésil. *Buff. hist. nat. des ois. 4. p. 409.*
T *Horned Cuckow.* *Latham syn. I. 2. p. 530. n. 27.*
Habitat in Brasilia, 12 pollices longus.
Rostrum ex virente flavum; irides sanguineae; crista cornu aemula mobilis; corpus subtus cum pedibus et unguibus cinereum; cauda apice alba.
- paradi-** **22.** *C. caudae rectricibus extimis binis longissimis apice dilatatis, capite cristato, corpore viridi.*
feus, *Cuculus siamensis cristatus viridis.* *Briff. av. 4. p. 141. n. 23.*
t. 14. A. f. 1.
Coucou à longs brins. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 387.*
Paradise Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 529. n. 25.*
Habitat in Siam, corvi glandarii magnitudine, 17 pollices longus.
Rostrum nigrans; irides caeruleae; pedes et unguis grisei.
- Tolu.** **48.** *C. nigrans, uropygio et abdome ex virescente nigris, humeris remigibusque castaneis, cauda cuneiformi atroviridi, subtus nigra.*
Cuculus madagascariensis. *Briff. av. 4. p. 138. n. 16. t. 13.*
f. 2.
Coucou de Madagascar. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 369.*
t. 17.
Coucou de Madagascar, appellé Toulou. *Buff. pl. enlum.*
n. 295. f. 1.
Long-heeled Cuckow. *Latham syn. I. 2. p. 524. n. 17.*
Habitat in Madagascar 14 $\frac{1}{2}$ pollices longus, aegyptio valde affinis.
Rostrum fuscum; pennae superiores longiusculae, angustae, rigidae, stria per longitudinem ex rufo alba notatae; tecrices alarum castaneae, scapis purpurascensibus; remiges apice fuso; pedes et unguis nigri; digitorum posteriorum interior altera longior.

58. YUNX. *Rostrum teretiusculum acuminatum, debilius paulisper incurvum,
Nares concavae denudatae.
Lingua teres lumbriciformis longissima
apice mucronata.
Rectrices decem flexiles.
Pedes scandentes.*

Torquil. I. Y. ex albo, griseo, nigro, et ferrugineo varia. *Fn. suec.*
la. 97. t. I. f. 97. *Bell. av.* 76. a. *Gesu. av.* 573. *Aldr.*
orn. I. p. 863. t. 866. *Johnst. av.* t. 42. *Raj. av.* p. 44.
A. 8. *Rudb. lapp.* 66. t. 66. *Briff. av.* 4. p. 4. n. I. t. I.
f. I. *Scop. ann.* I. n. 50.
Cuculus subgriseus maculatus, rectricibus nigris fasciis undulatis. *Fn. suec.* I. p. 78. t. I. f. 78.
Torcol. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 84. t. 3. *planch. enlum.*
n. 698.
Wryneck. *Brit. zool.* n. 83. *Arct. zool.* 2. p. 267. *Albin.*
av. I. t. 21. *Will. orn.* p. 138. t. 22. *Lath. syn.* I. 2.
p. 548. t. 24. *Hayes brit. birds* t. X.
Drehhals. *Frisch av.* t. 38.
β. Yunx supra maculis transversis, subtus striis longitudinalibus flavis.
Jyngi congener. *Aldr. orn.* I. p. 868. t. 869. *Will. orn.*
t. 22.
Torquilla striata. *Briff. av.* 4. p. 7.
Habitat in Europae et Sibiriae, Persiae et Indiae truncis arborum putrescentibus, ex quibus larvas extrahit, bis formisque potissimum viettans, migratoria; collum contorquendo circumspiciens; ova parit eburnei candoris 8 - 10.
Magnitudo alaudae; longitudo 7 pollicum; corpus supra ex griseo, nigro, albo et ferrugineo varium; cauda grisea, maculis nigris, fasciis 4 latis nigris.

- minutis- 2. Y. supra ex atro cinerea, subtus fordide alba.
fima. *Picus minutissimus. Pallas n. nord. Beytr.* 3. p. 5. t. I. f. 2.
Picus cayennensis minor. Briff. av. 4. p. 83. n. 32.
Petit pic de Cayenne. *Ferm. Surin.* 2. p. 170. *Buff. planch.*
enlum. n. 786. f. I.
Très petit pic de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 37.
Minute Woodpecker. *Lath. syn.* I. 2. p. 596. n. 48.

D d 4

Habi-

Habitat in Cayenna, 3½ pollices circiter longus, certhiae familiaris magnitudine.

Rostrum nigricans, basi flavum; caput nigrum albo-guttatum; mari ad frontem area miniata; genae ex nigricante cinereae; alae extus nigricantes, intus cinereae; rectrices 1, 1 rachi interna albae, margine angusto subfuscō; 2, 2 totae nigrae; reliquae ad apicem fere fascia obliqua alba; pedes nigri, robusti.

59. PICUS. *Rostrum polyedrum, rectum, apice cuneato.*

Nares pennis setaceis recumbentibus obtectae.

Lingua teres, lumbriciformis, longissima, ossea, missilis, mucronata, apice retrorsum aculeata setis.

*Rectrices 10 durae rigidae acuminatae.
Pedes scandorii.*

martius. I. *P. niger, pileo coccineo. Fn. suec. 98. Scop. ann. I. p. 46. n. 51.*

Picus niger. Briss. av. 4. p. 21. n. 6.

Picus niger maximus. Gesn. av. 708. Aldr. orn. I. p. 843. t. 844. Raj. av. p. 42. n. 1.

Pic noir. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 41. t. 2. pl. enlum. n. 596. orn. de Salern. t. 10. f. 2.

Greatest black Woodpecker. Arct. zool. 2. p. 276. A. Will. orn. p. 135. t. 21. Albin. av. 2. t. 27. Lath. syn. I. 2. p. 552. n. 1.

Schwarzspecht. Frisch. av. t. 34.

Habitat in Europae, Sibiriae et regni Chilensis populis, nidos magnos et profundos struens, ovaque pariens 2 - 3 candida; 17 - 18 pollices longus, formicis aliisque infectis, eorumque larvis viettans.

Femina occidente modo rubra.

lignarius. *22. P. pileo coccineo, corpore albo caeruleoque vittato. Molina hist. nat. Chil. p. 209.*

Habitat in regni Chilensis arboribus, quas tum emortuas tum vegetas rostro robusto perforat adeo, ut nidum in fossis foraminibus struat; hinc arboribus pomiferis infestus.

2. P.

- principa- 2. P. niger, crista coccinea, linea utrinque collari, remigibus que secundariis albis.
 Picus niger carolinensis. Briss. av. 4. p. 26. n. 9.
 Picus imbricatus. Nieremb. nat. p. 223. Will. orn. 301.
 Quatatomomi. Raj. av. p. 162. Will. orn. p. 390.
 Grand pic noir à bec blanc. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 46.
 Pic noir huppé de la Caroline. Buff. pl. enlum. n. 690.
 Largest white-billed Woodpecker. Catesb. car. I. t. 16.
 White-billed Woodpecker. Arct. zool. 2. p. 268. n. 156.
Lath. syn. I. 2. p. 553. n. 2.
*Habitat in America a nova Jersey ad Brasiliam usque, cor-
 nitis magnitudine, 16 pollices longus; foramina spiralia
 excavata.*
*Rostrum eburneum, 3 pollices longum; irides flavae; crista
 occipitis conica; dorsi pars inferior alba.*
- pileatus. 3. P. niger, crista rubra, temporibus aliquis maculis albis.
 Picus virginianus pileatus. Briss. av. 4. p. 29. n. 10.
 Pic noir à hupe rouge. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 48.
 Pic noir huppé de la Louisiane. Buff. pl. enlum. 718.
 Larger red-crested Woodpecker. Catesb. car. I. p. 17. t. 17.
 Pileated Woodpecker. Arct. zool. 2. p. 269. n. 157. *Lath.*
Syn. I. 2. p. 554. n. 3.
*Habitat in Americae septentrionalis silvis, zae spicas rostro
 defruens, 6 ova pariens, ex quibus Junio excunt pulli.*
*Longitudo 18 pollicum; rostrum 2 polices longum, mandi-
 bula superiore obscura, inferiore albida; irides aureae;
 crista linea fuscescente cincta; taenia nigra ab oculis ad
 occiput ducta; infra banc linea fuscescens ab ortu rostri
 per collum ad alarum initium; mentum et gula alba; pe-
 des obscuri. Feminae frons fusca.*
- lineatus. 4. P. niger, crista coccinea, linea a rostro utrinque collari ad medium dorsum alba.
 Picus niger cayanensis cristatus. Briss. av. 4. p. 31. n. 11.
t. I. f. 2.
 Ipecu. *Marcgr. bras. 207.*
 Picus varius brasiliensis, Ipecu dictus. Raj. av. p. 43. n. 7.

D d 5

Ouan-

Pici, Alberto M. jam satis noti, et memorati, arbores, potissimum aegrotantes et emor-
 tuas, aliquando tamen etiam sanas confidunt, insecta larvasque insectorum, li-
 gnum intus rodentes, arboremque destruetas, rostro secante, sono stridulo terre-
 faciente, auditu percipiente, lingua acuta bastata intrante extrahunt (act. angl.
 350, p. 509.) iniuste proscripti et silvis expulsi.

Quantou ou pic noir hupé de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 50. pl. enlum. n. 717.*

Pic noir ou charpentier. *Fermín Surin. 2. p. 170.*

Brasilian Woodpecker, called Ipecu. *Will. orn. p. 138. t. 22.*

Lineated Woodpecker. *Lath. syn. I. 2. p. 556. n. 4.*

Habitat in Cayenna, magnitudine viridis, 14 fere pollices longus.

Rostrum sesquipollicare, cornuum; mandibula inferior stria coccinea; caput coccineum; genae cinerascentes; gula, abdomen, et crissum ex rufo alba, striis transversis nigris; cauda cuneiformis; pedes et ungues grisei.

rubicolis. 23. *P. fuscus, subtus fulvus, capite cristato colloque sanguineis.*

Pic à cou rouge. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 53.*

Grand pic hupé à tête rouge de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 612.*

Red-necked Woodpecker. *Lath. syn. I. 2. p. 558. n. 5.*

Habitat in Cayenna, 16 polices longus.

Rostrum pallidum; crista occipitalis; pedes plumbei.

melanoleucus. 24. *P. niger, subtus, linea collari utrinque, nucha et uropygio albus, crista posterius ex luteo fuscolecente.*

Buff-crested Woodpecker. *Lath. syn. I. 2. p. 558. n. 6. t. 25.*

Habitat in Surinamo, 12½ polices longus.

Pectus et abdomen sordide album, lineis transversis nigris.

hirundinaceus. 5. *P. niger, occipite coccineo, humeris albido punctatis.*

Picus niger novae Angliae. Briff. av. 4. p. 24. n. 7.

Petit pic noir, var. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 54.*

Lesser black Woodpecker. *Albin. av. 3. t. 23. Lath. syn. I. 2. p. 559. n. 7.*

β . *P. peitoris area rubra, abdomine ex nigro et griseo vario.*

Petit pic noir. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 54.*

Petit pic noir de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 694. f. 2.*

γ . *Picus verticis area rubra, oculorum alba, occipite aureo.*

Habitat in America septentrionali, β . et γ . in Cayenna, hirundinis circiter magnitudine.

Rostrum fuscum; irides albidae; alarum anguli, et abdominis postrema pars alba; pedes flavicantes; in β . supra oculos intermissus candor; dorsi pars inferior, et uropygium alba; femina neque rubri, neque flavi aliquid monstrat; in γ . universum pectus area sanguinea; crissum albo et nigro lineatum; remiges nonnullae secundariae apice albo-punctatae.

6. P.

- iat. des
3. t. 22.
pollices
or stria
ula, ab-
nigris;
guineis.
enlum.
t. 5.
uropy-
6. t. 25.
nigris.
itis.
ath. syn.
eo vario.
. f. 2.
aureo.
enna, bi-
abdomi-
ipra ocul-
opygium
onstrat;
um albo-
iae apice
6. P.
- passeri-
nus. 6. P. olivaceo - flavicans, subtus fusco candidanteque fasciatus.
Picus dominicensis minor. Briff. av. 4. p. 75. n. 29. t. 4.
f. 2.
Petit pie olive de S. Domingue. Buff. hist. nat. des ois. 7.
p. 29.
Passerine Woodpecker. Lath. syn. I. 2. p. 588. n. 37.
Habitat in insula S. Dominici, alaudae magnitudine, 6 pol-
lices longus.
Rostrum, pedes et unguis grisei; vertex ruber; tempora ex
rufo grisea; tectrices alarum majores plurimae macula
ochroleuca; remigum majorum margo interior fuscus, al-
bido dentatus.
- striatus. 25. P. niger, olivaceo striatus, subtus olivaceus, fronte, ge-
nis, gula, jugulo, et pectore griseis, vertice, occipite,
uropygio et tectricibus caudae superioribus rubris.
Picus dominicensis striatus. Briff. av. 4. p. 65. n. 25. t. 4.
f. 1.
Pic rayé de S. Domingue. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 27.
pl. enlum. n. 281.
Rayed Woodpecker. Lath. syn. I. 2. p. 587. n. 36.
β. Picus vertice nigro.
Picus dominicensis striatus minor. Briff. av. 4. p. 67. n. 26.
t. 3. f. 2.
Pic rayé à tête noire de S. Domingue. Buff. planch. enlum.
n. 614.
Habitat in insula S. Dominici, 9 fere pollices longus.
Rostrum cornuum; remiges nigricantes, rhachi exteriore
flavo, interiori albido-maculatae, pedes et unguis ni-
gricantes.
- mela-
nochlo-
ros. 26. P. ex nigro et flavo varius, crista aurea, cauda nigra.
Picus varius americanus cristatus. Briff. av. 4. p. 34. n. 12.
Grand pic rayé de Cayenne. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 30.
pl. enlum. n. 719.
Gold-crested Woodpecker. Lath. syn. I. 2. p. 589. n. 38.
Habitat in Cayenna, magnitudine viridis.
Rostrum obscurum; genae rubicundae; inter basin rostri et
oculos area purpurea; corpus nigro et flavo undulatum,
striatum, et potissimum subtus maculatum.
- flaves-
cens. 27. P. niger, crista, genis, cervice, gula, tectricibus caudae
superioribus et alarum interioribus, strigisque alarum et
dorsi transversis flavis.

Yellow.

Yellow-crested Woodpecker. *Brown. Illustr. t. 12. Lath.*
Syn. I. 2. p. 589. n. 39.

Habitat in Brasilia, monedulae magnitudine.

Crista longa, laxa, pendula; pedes obscure virides.

cayen- 28. *P. olivaceus*, pennis versus apicem macula nigra notatis,
 nensis. vertice, gula, caudae nigris, occipite rubro, genis al-
 bidis, abdomine flavicante.

Picus striatus cayennensis. Briff. av. 4. p. 69. n. 27.

Petit pic rayé de Cayenne. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 31.

Pic rayé de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 613.

Cayenne Woodpecker. Lath. syn. I. 2. p. 590. n. 40.

Habitat in Cayenna, 7½ pollices longus.

*Rostrum nigricans; gula albo-maculata; femora et tectrices
 caudae inferiores maculis rarioribus nigris; humeri te-
 tricesque alarum striis transversis nigricantibus; remiges
 nigricantes, scapis flavis; rectrices 2 extimae scapis fla-
 vis, lineis nigris et rufis; pedes grisei.*

exalbi- 29. *P. exalbidus cristatus*, taenia mandibulae inferioris longitu-
 dus. dinali rubra, alis fuscis rufisque, cauda nigra.

Picus cayenensis albus. Briff. av. 4. p. 81. n. 31.

Charpentier jaune. Fermin Surin. 2. p. 171.

*Pic jaune de Cayenne. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 32. pl.
 enlum. n. 509.*

Yellow Woodpecker. Lath. syn. I. 2. p. 591. n. 41.

*Habitat in Cayenna, viridi minor, 9 pollices longus, 3 ova
 alba fere globosa pariens, ex quibus Aprili excurrent pulli.*

*Rostrum ochroleucum; occiput cristatum; color sordide al-
 bus, nonnunquam flavescens; taenia rubra feminae nulla;
 tectrices alarum fuscae, margine flavicante; pedes et un-
 gues grisei.*

cinnamo- 30. *P. cinnamomeus*, maculis rarioribus ochroleucis, crista et
 meus. dorsi parte inferiore obscure flavicante, gula utrinque
 macula lata sanguinea, rostro, cauda pedibusque nigris.

Pic mordoré. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 34.

Pic jaune tacheté de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 524.

Ferruginous Woodpecker. Arct. zool. 2. p. 271. n. 159. t. 13.
Lath. syn. I. 2. p. 592. n. 42.

*Habitat in Cayenna, Guiana, Carolina australi, viridis
 magnitudine, 11 pollices longus.*

Feminac rubor nullus.

31. P.

Lath.

multico- 31. *P. cristatus rufus, subtus pallide ferrugineus, capite, gula et cervice aurantiis, nucha, jugulo, pectore alarumque maculis nigris.*

Pic à cravate noire. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 35.

Pic à cravate noire de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 863.

Black-breasted Woodpecker. Lath. syn. I. 2. p. 593. n. 43.

Habitat in Cayenna et Guiana, viridis magnitudine.

Rostrum pallidum; caudae apex maculaeque nigra; pedes plumbei.

erythro- 7. *P. capite toto rubro, alis caudaque nigris, abdomine albo.*

Mus. Ad. Fr. 2. p. 21.

Picus erythrocephalus virginianus. Briss. av. 4. p. 53. n. 19.

z. 3. f. 1.

Picus capite toto rubro. Kalm it. 3. p. 43.

Pic noir à domino rouge. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 55.

Pic de Virginie. Buff. pl. enlum. n. 117.

Red-headed Woodpecker. Arct. zool. 2. p. 271. n. 160. Castesb. Car. I. t. 20. Latham syn. I. 2. p. 561. n. 8.

Habitat in America septentrionali, migratorius, glandibus, zea, pomisque vietitans, hinc perquam infestus, ideo olim lege, nunc tamen abrogata proscriptus; prius et altius reliquis speciebus nidificans, 9 $\frac{1}{2}$ pollices longus.

Rostrum plumbeum; dorsum nigrum; remiges secundariae albae, fasciis duabus nigris transversis; pedes nigri; feminae caput fuscum.

ruber. 31. *P. capite, collo et pectore rubris, dorso aliquo nigris, abdomine ochroleuco.*

Red breasted Woodpecker. Lath. syn. I. 2. p. 562. n. 9.

Habitat in Cayenna, erythrocephalo paulo minor.

Rostrum corneum; a naribus ad vel infra oculos linea fuscens; tectrices alarum minores complures albo punctatae, majores nonnullae exteriori rachi albae, inferiores ex albo et nigro variae; remiges nigrae albo maculatae.

obscurus. 32. *P. obscurus, exalbido striatus et undulatus, subtus albus, remigibus primoribus nigris, secundariis albis versus apicem nigro fasciatis.*

White-rumped Woodpecker. Latham syn. I. 2. p. 563. n. 10.

Habitat in insula longa (Long Island), 9 pollices longus.

Rostrum corneum; tectrices alarum majores nigrae; pedes nigri; utropygium album.

33. P.

otatis,
nis al-

p. 31.

trices
eri te-
aniges
is fla-

ngitu-

32. pl.

3 ova-
ulli.
de al-
nulla;
et un-

ista et
inque-
gris.

t. 13.

iridis

I. P.



fasciatus. 33. P. niger, facie, vertice et fascia mandibulae inferioris rubris, orbitis albis, temporibus et abdomine albo et nigro striatis. Striped bellied Woodpecker. *Lath. syn. I. 2. p. 563. n. 11.*

auran-
tius. 8. P. supra aurantius, nucha, uropygio rectricibusque nigris. *Picus capitis bonae speciei. Briss. av. 4. p. 78. n. 10. t. 6. f. 1.*
Orange Woodpecker. *Lath. syn. I. 2. p. 585. n. 32.*
Habitat ad caput bonae speciei, 10½ pollices longus.
Rostrum, pedes et unguis plumbet; vertex et occiput nigra; pone oculos utrinque ad occiput, et a naribus infra oculos ad utrumque colli latus alba; genae, gula jugulumque sordide grisea; dorsi pars inferior nigricans; pectus et abdomen sordide alba; remiges fuscae, nonnullae albo maculatae.

senega-
lenis. 34. P. supra aureus, subtus griseo et exalbido undulatus, vertice rubro, fronte temporibusque fuscis, rectricibus alaris et uropygio virecentibus, rectricibus nigris, exterioribus flavo maculatis.
Petit pic rayé du Sénégal. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 25.*
Petit pic du Sénégal. *Buff. pl. enlum. n. 345. f. 2.*
Gold backed Woodpecker. *Lath. syn. I. 2. p. 586. n. 33.*
Habitat ad fluvium Senegal, passere non major.
Rostrum pedesque obscuri.

capensis. 35. P. griseus, dorso, collo et pectore olivaceis, remigibus obscuris, uropygio et rectricibus caudae superioribus rubris, rectricibus nigris.
Pic à tête grise du cap de bonne esperance. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 26. pl. enlum. n. 786. f. 2.*
Cape Woodpecker. *Lath. syn. I. 2. p. 786. n. 34.*
Habitat ad caput bonae speciei, alauda minor.
Rostrum et pedes plumbea.

auratus. 9. P. griseo nigroque transversim striatus, gula pectoreque nigra, nucha rubra, uropygio albo. *Forster act. angl. V. 62. p. 387.*
Picus canadensis striatus. *Briss. av. 4. p. 70. n. 28.*
Cuculus auratus. *Syß. nat. X. I. p. 112.*
Picus major alis aureis. *Kalm. it. 3. p. 42.*
Pic rayé de Canada. *Buff. pl. enlum. n. 693.*
Pic aux ailes dorées. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 39.*
Gold-winged Woodpecker. *Arst. zool. 2. p. 270. n. 158.*
Catesb. Car. I. f. 18. Lath. syn. I. 2. p. 597. n. 49.
Habi-

cafer

oliva
ceus.carol
nus.

ubris,
riatis.
n. II.
nigris.
, f. I.

igra;
ocu-
jugu-
; pe-
nullae

, ver-
s ala-
exte-
. 25.
33.
igibus
us ru-
nat.

ue ni-
gl. V.

. 158.
9.
Habi-

Habitat in America septentrionali, viridi vix minor, 11 pollices longus, in sinu Hudsonis migratorius, heic in arboribus cavis ova 4-6 pariens et vermisbus infectisque vicitans; alias in terra nidificans, neque arbores ascendens, infectis, horum tamen defectu baccis etiam ijsaque gramine vicitans, carne sapida.

Rostrum cuculi nigrum; vertex cinereus; occiput et genae rubra; pectoris pars superior lunula nigra notatum; reliquum pectus cum abdomine albido, nigro-maculatum; dorsum cum testricibus alarum pallide fuscum, lineis nigris; remiges primores cinereae, scapis et infra aureae; uropygium album, nigro-maculatum; cauda nigra, margine albo, scapis aureis; pedes obscuri; feminae gula cinerea.

- cafer. 36. *P. supra fuscus, subtus vinaceus nigro-guttatus, alis subtus, scapisque remigum et rectricum miniatis.*

Habitat ad caput bonae spei, aurato multum similis, sed minor.

Rostrum fuscum, ad utrumque latus stria rubra notatum; cauda acuta, rectricibus apice bifurcata.

- oliva-
ceus. 37. *P. olivaceus, collo subtus, pectore et uropygio pallide rubris, gula jugulo, remigibus et crasso obsovere fuscis, cauda supra nigra.*

Crimson-breasted Woodpecker. Lath. syn. I. 2. p. 599. n. 50.
Habitat ad caput bonae speci, 10½ pollices longus.

Rostrum aurati, nigrum; scapi remigum rectricumque flavicantes; rectrices subtus ex olivaceo flavae, apice bifurcae; pedes nigri.

- caroli-
nus. 10. *P. pileo nucha rubris, dorso fasciis nigris, rectricibus mediis albis nigro-punctatis.*

Picus varius jamaicensis. Briss. av. 4. p. 59. n. 23.

Picus ventre rubro. Kalm. it. 3. p. 43.

Epeiche ou Pic varié de la Jamaïque. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 72.

Pic varié femelle de la Jamaïque. Buff. pl. enlum. n. 597.

Jamaica Woodpecker. Sloan. Jam. p. 299. n. 15. t. 255. n. 2. Edw. glean. 5. t. 244.

Red bellied Woodpecker. Catesb. Carol. I. t. 19. f. 2.

Carolina Woodpecker. Arct. zool. 2. p. 272. n. 161.

- β. *Picus fronte genisque pallide fuscescentibus, ventre pallido ex flavicante fuso.*

γ. *Picus*

- viri
y. *Picus maculis gulae et subocularibus rubris.*
Epeiche ou Pic rayé de la Louifiiane. *Buff. hist. nat. des ois.*
7. p. 73. pl. enlum. n. 692.
Habitat in America septentrionali, et Antillis majoribus,
majore major, 10½ pollices longus.
Rostrum, cauda, pedes et ungues nigra; irides badiæ; ver-
tex in femina ex rufo albus; genae ochroleucae; gula et
jugulum olivacea, colore versus abdomen sensim in ru-
brum abeunte; pars abdominis inferior lineis transversis
fuscis notata.
- undatus. 11. *P. testaceus nigro-undulatus, temporibus sanguineis.*
Red-cheeked Woodpecker. *Edw. glean. t. 332. Lath. syn.*
I. 2. p. 594. n. 44.
Habitat in Guiana et Surinamo, 9 pollices longus.
Rostrum fuscescens; pedes obscuri.
- rufus. 38. *P. rufus nigro undulatus.*
Pic roux. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 36.
Pic roux de Cayenne. *Buff. pl. enlum.* n. 694. f. 1.
Rufous Woodpecker. *Lath. syn.* I. 2. p. 594. n. 45.
Habitat in Cayenna et Guiana, vix torquillæ magnitudine.
Rostrum pallidum; alæ et cauda obscuriores; dorsum palli-
dius; pedes plumbei.
- chloroce- 39. *P. olivaceus subtus albo-maculatus, collo et capite sub-*
phalus. *cristato flavis, vertice rubro.*
Petit pic à gorge jaune. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 37.
Pic à gorge jaune de Cayenne. *Buff. pl. enlum.* n. 784.
Yellow headed Woodpecker. *Lath. syn.* I. 2. p. 595. n. 46.
Habitat in Guiana, torquillæ magnitudine.
Rostrum et pedes plumbei; ad angulos oris stria rubra.
- minia- 40. *P. cristatus ruber, subtus albus, jugulo roseo, rostro cau-*
tus. *daque caeruleis, tectricibus caudæ viridibus.*
Red-winged Woodpecker. *Ind. zool. t. 4. Lath. syn.* I. 2.
p. 595. n. 47.
Habitat in Java, 9 pollices longus.
Menti macula flava; remiges nigræ, maculis magnis albis;
pedes obscuri.
- Pitiu. 41. *P. fuscus, albo guttatus, cauda brevi. Molina hist. nat.*
Chil. p. 209.
Habitat in Chili, columbae habitu, non in cavis arboribus,
*sed ad ripas, montiumque declivia nidificans, ova plerum-
que 4 pariens; caro incolis aestimata.*

12. P.

- des oif.
oribus,
te; ver-
gula et
in ru-
nsverfis
eis.
uth. syn.

itudine.
um palli-
pite sub-
37.
784.
5. n. 46.
abra.
ostro cau-
syn. I. 2.
nis albis;
bift. nat.
urboribus,
a plerum
12. P.
- viridis.** 12. *P. viridis*, vertice coccineo. *Fn. succ.* 99. *Scop. ann.* 1.
p. 47. n. 52.
Picus viridis. *Gesn. av.* 710. *Aldr. orn.* 1. *p. 848. t. 849.*
Raj. av. p. 42. A. 2. *Briff. av.* 4. *p. 9. n. 1.* *Nozem.*
nederl. Vogel. t. 23.
Pic verd. *Buff. bift. nat. des oif.* 7. *p. 7. t. 1. pl. enlum.*
n. 371. 879.
Woodspite, Rainfowl, Highhoe, Hewhole. *Will. orn.* p. 135.
t. 21.
Green Woodpecker. *Brit. zool.* n. 84. *Arct. zool.* 2. *p.*
277. B. Albin. av. 1. *t. 18.* *Latham syn.* I. 2. *p. 577.*
n. 25. *Hayes brit. Birds t. X.*
Grünspecht. *Frisch av.* t. 35. *Günth. Nest. u. Eyer.* t. 5.
f. inf.
β. *Pic verd.* *Fermin Surin.* 2. *p. 169.*
Habitat in Europa, 13 pollices longus, foraminibus exactis-
sime rotundis arborem pertundens ad partem emortuam
usque, ova 5-6 virescentia nigro-maculata pariens, api-
bus in silvis delegetatur.
Rostrum obscurum, 2 pollices longum; iridum circulus in-
terior rubicundus, exterior albus; tempora nigricantia;
remiges obscurae, maculis albidis; cauda obscura et vi-
rescente cancellata, apice nigra; pedes ex virescente ci-
nerei.
- bengal-** 13. *P. viridis*, crista rubra, nucha nigra, subtus anticeque al-
Iensis. bus nigro-maculatus.
Picus viridis bengalensis. *Briff. av.* 4. *p. 14. n. 2.*
Pic verd de Bengale. *Buff. bift. nat. des oif.* 7. *p. 23. planch.*
enlum. n. 695.
Bengal Woodpecker. *Alb. av.* 3. *p. 21. t. 22.* *Lath. syn.*
I. 2. p. 580. n. 26.
Spotted Indian Woodpecker. *Edw. av.* 4. *t. 182.*
β. *Zeylonischer Specht.* *Naturf.* 13. *p. 14. t. 1. 17. p. 16.*
γ. *Pic grivelé ou grand pic de l'isle de Luçon.* *Sommer. it.* p. 73.
t. 37.
Palala ou pic vert tacheté des Philippines. *Buff. bift. nat.*
des oif. 7. *p. 21.*
Pic verd des Philippines. *Buff. pl. enlum.* n. 691.
Habitat in Bengala, β. in Zeylon, γ. in insula Luzonia,
viridi minor, γ. aequalis.
Rostrum pedesque nigricant; irides γ. rubent; vertex niger
maculis albis, in β. numerosioribus; in γ. caput cum
crista et collo, dorso et alis splendide fuscum viridi inter-
misto;

misto; gula et jugulum ex nigro alboque varia; pectus abdominalisque pars superior alba, pennarum margine fuscō; inferior cum crissō alba; in ♂. gula et pectus fuscā, maculis anomatis albīs; in ♀. gula, jugulum, pectus et abdomen alba, pennarum margine nigro; dorsi pars superior flava, in ♂. nigra; inferior viridis, in ♂. una cum teētricibus alarum rubra; alae virides dilutiās maculatae, teētricibus inferioribus et minoribus superioribus fuscis albo maculatis; in ♂. remiges majores fuscāe, albo-maculatae; alias nigrae strigis albīs; cauda ex virente nigra, in ♂. fuscā, in ♀. ex atro fuscā, fascia alba, teētricibus superioribus rubris.

- goensis. 42. P. viridis, subtus albidus, vertice et occipite cristato rubris, cauda taeniaque ab oculis ad alas ducta nigris, alis aureis.

Pic vert de Goa. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 22. pl. enlum. n. 696.*

Goa Woodpecker. *Lath. syn. I. 2. p. 582. n. 27.*

Habitat in Goa, bengalensi affinis, viridi minor.

Rostrum nigrum; occiput linea alba circumscriptum; teētrices alarum minores nigrae; remiges minores ex nigro et albo variae; pennae subtus nigro marginatae; pedes plumbei.

- manilensis. 43. P. fordide viridis, vertice griseo-maculato, remigibus caudaque nigrantibus, teētricibus caudae superioribus rubris.

Pic verd de l'isle de Luçon. *Sonner. it. p. 73. t. 36.*

Manilla green Woodpecker. *Lath. syn. I. 2. p. 583. n. 28.*

Habitat in insula Luzonia, goensi minor.

Rostrum pedesque nigrant.

- Goertan. 44. P. supra ex griseo-fuscus, subtus ex flavicante griseus, alarum maculis fordide albīs, vertice et uropygio rubris.

Goertan ou pic vert du Sénégal. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 25.*

Pic appellé Goertan du Sénégal. *Buff. pl. enlum. n. 320.*

Crimson-rumped Woodpecker. *Latham syn. I. 2. p. 583. n. 29.*

Habitat ad fluvium Senegal, viridi multo minor.

Rostrum cum pedibus plumbeum.

- canus. 45. P. cinereus fronte obsoleta rubro maculata, dorso, humeris et teētricibus alarum et caudae viridibus, uropygio flavo, remigibus caudaque fuscis, gula albida.

Picus

Picus viridis norwegicus. *Briss. av.* 4. p. 18. n. 4.
Grey-headed green Woodpecker. *Edw. av.* 2. p. 65. *Lath.*
syn. I. 2. p. 583. n. 30.
Habitat in Norwegia, Russia, Sibiria et Helvetia, magnitudine viridis, Tungusis edulis.
Rostrum basi flavicans; remiges maculis flavidantibus, cauda lineis obscuris notata; pedes et ungues nigri.

persicus. 46. *P. luteus, supra, remigum apicibus et oculorum areis ferrugineus.*

Picus luteus persicus. *Briss. av.* 4. p. 20. n. 5.
Picus luteus cyanopus persicus. *Raj. av.* p. 44. n. 9.
Persian Woodpecker. *Will. orn.* p. 141. *Lath. syn. I. 2.*

p. 584. n. 31.
Habitat in Persia, viridis circiter magnitudine, capite tamen colloque crassioribus, rostro longiore, ferrugineo; pedes caerulentes; ungues nigri.

semirostris. 14. *P. maxilla superiore breviore.* *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 16.
Halfbilled Woodpecker. *Lath. syn. I. 2. p. 586. n. 35.*

Habitat in India, rostro forsitan lusu naturae mutilato, Martii magnitudine.
Rostrum pallidum; caput fuscum, singulis pennis apice flavidantibus; corpus supra fuscum in cinereum vergens, subitus album; cauda alaque fusca; remigum margo exterior albo-maculatus.

pubescens. 15. *P. dorso longitudinali villoso, rectrice extima alba maculis quatuor nigris.*

Picus varius virginianus minor. *Briss. av.* 4. p. 50. n. 18.
Epeiche ou pic varié de Virginie. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 76.

Smallest Woodpecker. *Catesb. Carol.* 1. p. 21. t. 21. f. 1.
Downy Woodpecker. *Arct. zool.* 2. p. 264. n. 165.

Little Woodpecker. *Lath. syn. I. 2. p. 573. n. 19.*

Habitat in America septentrionali, numerosissimus, audax gregatim invadit arbores, quas innumeris foraminibus pertundit, et trucidat, hinc, pomariis potissimum, infestissimus, passeris magnitudine, villoso cetera multum similis, sed minor.

Mas occipite rubro.

villosum. 16. *P. dorso longitudinali subvilloso, rectricibus extimis totis albis.* *Kalm. it.* 3. p. 43.

Picus varius virginianus. *Briss. av.* 4. p. 48. n. 17.

Ee 2

Epeiche

Epeiche ou Pic chevelu de Virginie. *Buff. hist. nat. des ois.*
7. p. 75.

Pic varié mâle de Virginie. *Buff. pl. enlum. n. 754.*
Hairy Woodpecker. *Arct. zool. 2. p. 263. n. 164. Catesb.*
Car. 1. t. 19. f. 2. Lath. syn. I. 2. p. 572. n. 18.

Habitat in America septentrionali a sinu Hudsonis ad Caro-
linam frequentissimus, pomariis similiter infestissimus, a
9-12 fere pollices longus.

Roftrum corneum; caput nigrum, occipitis fascia, in mare,
transversa rubra, genae lineis duabus albis, totidemque
nigris; corpus subtus album; dorsum nigrum; alae ni-
grae, maculis albis in series dispositis; rectrices 2 inter-
mediae totae nigræ, 2 extimæ totae albæ, reliquæ ni-
græ striis albis decussantibus.

major. 17. P. albo nigroque varius, crisco occipiteque rubro. *Fn.*
suec. 100. Scop. ann. I. p. 47. n. 53. Kram. el. p. 335.

n. 3.

Picus albo nigroque varius, rectricibus tribus lateralibus
utrinque albescientibus. *Fn. suec. I. n. 81.*

Picus albo-nigroque varius major. *Nozem. nederl. Vogel.*
t. 22.

Picus varius major. *Raj. av. p. 43. A. 4. Briff. av. 4. p. 34.*
n. 13.

Epeiche ou pic varié. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 57. pl.*
enlum. n. 196. et 595.

Greater spotted Woodpecker or Witwall. *Brit. zool. n. 85.*
t. E. Arct. zool. 2. p. 272. n. 162. Albin. av. I. t. 19.
Will. orn. p. 137. t. 21. Hayes brit. birds t. 9. Lath.
syn. I. 2. p. 564. n. 12.

Buntspecht. *Friseb. av. t. 36.*

Habitat in Europa, septentrionali America et Siberia orientali, 9 pollices longus.

Frons ex rufescente lutescens; vertex niger; occiput feminæ
pariter nigrum; dorsum nigrum; humeri albi; alae et
cauda lineis nigris et albis; pectus et abdomen alba, in
flavicantem colorem vergentia.

medius. 18. P. albo nigroque varius, crisco pileoque rubris. *Fn. suec.*
101. Scop. ann. I. p. 48. n. 34.

Picus albo nigroque varius, rectricibus tribus lateralibus
apice albo variegatis. *Fn. suec. I. n. 82.*

Picus major. *Aldr. orn. I. p. 845. t. 846.*

Picus varius ex albo et nigro. *Gesn. av. 709.*

Picus

Picus varius minor. *Raj. av. p. 43.* *Briff. av. 4. p. 38.* *n. 14.*
t. 2. f. 1.

Pic varié à tête rouge. *Buff. pl. enlum. n. 611.*

Middle spotted Woodpecker. *Brit. zool. n. 86.* *t. 37.* *Arct. zool. 2. p. 278.* D. *Lath. syn. I. 2. p. 565.* *n. 13.*

Habitat in Europa, majori satis similis, sed minor, et 8½ pollices longus.

minor. 19. P. albo nigroque varius, vertice rubro, crisco testaceo.

Fn. suec. 102. *Scop. ann. I. 49.* *n. 55.*

Picus albo nigroque varius, rectricibus tribus lateralibus se-minigris. *Fn. suec. 83.* *Hasselq. it. 242.*

Picus varius tertius. *Raj. av. p. 43.* *n. 6.*

Picus alias minor s. graminis. *Gesn. av. 709.*

Picus varius minor. *Aldr. orn. I. p. 847.* *Raj. av. p. 43.*

n. 5. *Briff. av. 4. p. 41.* *n. 15.*

Petit Epeiche. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 62.* *pl. enlum. n. 598.*

Lesser spotted Woodpecker. *Brit. zool. n. 89.* *t. 37.* *Brit. zool. 2. p. 278.* E. *Will. orn. 138.* *t. 31.* *Albin. av. I. t. 20.* *Lath. syn. I. 2. p. 566.* *n. 14.*

Kleiner Buntspecht. *Frisch av. t. 37.*

Habitat in Europa et Asia, ipsa adeo australi, hujus generis minimus, ut 5½ modo pollices longitudine aequet, ceterum medio satis similis.

Dorsum lineis albis et nigris; alae areis latis albis.

tricolor. 47. P. niger striis transversis albis, pectore et abdomine rubris.

Picus varius mexicanus major, et Picus varius mexicanus minor. *Briff. av. 4. p. 57.* *et 59.* *n. 21.* *22.*

Quauchochopitli, seu avicula ligna excavans. *Fern. hist. n. hisp. c. 94.* *Raj. av. p. 163.*

Epeiche du Mexique. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 70.*

Varied Woodpecker. *Lath. syn. I. 2. p. 568.* *n. 15.*

Habitat in nova Hispania, magnitudine medii.

canaden-sis. 48. P. albus, vertice, dorso, humeris et rectricibus duabus intermediis nigris, reliquis et alis ex albo et nigro variis.

Picus varius canadensis. *Briff. av. 4. p. 45.* *n. 16.* *t. 2. f. 2.*

Quauhtotopotli alter. *Fern. hist. n. Hisp. c. 165.* *p. 47.*
Raj. av. p. 162.

Epeiche du Canada, première espece. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 69.*

Pic du Canada. *Buff. pl. enlum. n. 345.* *f. 1.*

Canada spotted Woodpecker. *Arct. zool.* 2. p. 273. n. 163.

Lath. syn. I. 2. p. 569. n. 16.

Habitat in Canada, majoris magnitudine.

Taenia alba caput circumscribens; altera nigra albo marginata ab oculis per cervicem; humeralibus intermixtae paucae pennae albae.

varius. 20. P. albo nigroque varius, vertice rubro, criffo albo fusco-fasciato.

Picus varius carolinus. Briff. av. 4. p. 62. n. 24.

Pic varié de la Caroline. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 77. pl. enlum. n. 785.

Yellow-bellied Woodpecker. Arct. zool. 2. p. 275. n. 166.

Catesb. Carol. I. t. 21. f. 2. *Lath. syn.* I. 2. p. 574. n. 20.

Habitat in America septentrionali numerosissimus, et fructibus infestissimus, 9 polices longus.

Feminae rubor nullus; maris vertex linea nigra circumseptus; mentum rubrum; pectus et abdomen flavicans; illud nigro-maculatum; testrices alarum nigrae, lineis duabus transversis albis; remiges primariae ex albo et nigro variae; cauda nigra.

flavipes. 49. P. niger subtus albus, pedibus flavis.

Yellow-legged Woodpecker. Arct. zool. 2. p. 275. n. 167.

Magnitudo p. minoris; occiput nigrum; alarum margo superior albus.

bicolor. 50. P. ex griseo et albo varius, capitis cristati lateribus albis, remigibus fuscis albo maculatis.

Epeiche ou Pic varié de la Encénada. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 74. pl. enlum. n. 748. f. 1.

Encenada Woodpecker. Lath. syn. I. 2. p. 575. n. 21.

Pico minore paulo major; rostrum plumbeum, uti et pedes; irides albae; corpus supra transversim, subtus perpendiculariter varium; femina tota fusca, crista carens.

Cardinalis. 51. P. niger, subtus albus nigro-maculatus, vertice et occipite rubris.

Pie Cardinal de l' isle de Luçon. Sonner. it. p. 72. t. 35.

Grand pie varié de l' isle de Luçon. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 67.

Cardinal Woodpecker. Lath. syn. I. 2. p. 576. n. 22.

Habitat in insula Luzonia, viridis magnitudine.

Pedes et rostrum nigricant; mandibulæ superioris basis pennis griseis cincta; ad utrumque capitis latus pone oculos per

163.
rgi-
xtae
isco-
. pl.
166.
. 20.
ucti-
sept-
illud
dua-
igro

167.
supe-
, re-
. des
des;
endi-
occi-
5.
if. 7.
pen-
culos
per
- per collum ad alas stria alba; pennae colli inferiores, dor-
sique superiores albo-marginatae; alae maculis albis; re-
migum rectricumque scapi flavi.*
- nubicus. 52. P. ex albo, rufo et fusco varius, vertice nigro albo-ma-
culato, occipite rubro subcristato, pectore albido nigro-
guttato, cauda rufo fuscoque lineata.
Epeiche de Nubie ondée et tacheté. *Buff. hist. nat. des ois. 7.*
p. 66.
Pic tacheté de Nubie. *Buff. pl. enlum. n. 667.*
Habitat in Nubia, majore minor, 7½ pollices longus.
*Rostrum nigrum; irides pallide fuscae; frons subfuscata; men-
tum et crissum albidum; pedes glauci.*
- moluc-
censis. 53. P. fusco-ater albo-undulatus, subtus albidus fusco sagit-
tatus, remigibus rectricibusque fuscis albo-maculatis.
Petit epeiche brun des Moluques. *Buff. hist. nat. des ois. 7.*
p. 68.
Petit pic des Moluques. *Buff. pl. enlum. n. 748. f. 2.*
Brown Woodpecker. *Latham syn. I. 2. p. 577. n. 24.*
Habitat in insulis Moluceis, minoris magnitudine.
*Rostrum et pedes obscura; genae albae; infra oculos macu-
la fusca.*
- tridacty-
lus. 21. P. albo nigroque varius, pedibus tridactylis. *Fn. suec. 103.*
Aet. Stockb. 1740. p. 222. Scop. ann. I. p. 49. n. 56.
Forster aet. angl. 62. p. 388.
Picus tridactylus anomalus. *Mus. petrop. 368.*
Three-toed Woodpecker. *Arct. zool. 2. p. 275. n. 168. Edw.*
av. 3. t. 114. Latham syn. I. 2. p. 600. n. 51.
β. Picus varius cayanensis. *Briff. av. 4. p. 54. n. 20.*
Epeiche ou pic varié ondée. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 78.*
Pic tacheté de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 553.*
Woodpecker with three toes. *Bancr. Guj. p. 164.*
*Habitat in America, Europa et Sibiria, rarius in australi,
11 pollices longus.*
Vertex europaeo aureus, americano ruber; irides glaucae;
genae lineis longitudinalibus 3 nigris, 2 albis; occiput
dorsumque nigra; hoc superius albo maculatum; alae cau-
daque nigrae; remiges primariae et rectrices extimae ma-
culis albis; corpus subtus album; pedes obscuri.

60. SITTA. *Rostrum subulatum teretiusculum, rectum, porrectum, integerrimum, mandibula superiore paulo longiore, apice compresso.*

Lingua emarginato-lacera, brevis, apice cornea.

Nares exiguae vibrissis testae.

Pedes ambulatorii.

euro-
paea,

I. *S. rectricibus nigris, lateralibus quatuor infra apicem albis.*
Fn. suec. 104. Scop. ann. I. p. 50. n. 57. Kram. elench.
p. 362.

*Sitta I. Picus cinereus. Gesn. av. 711. Aldr. orn. I. p. 852.
t. 853. Raj. av. p. 47. A. 4. Briss. av. 3. p. 588. n. 1.
t. 29. f. 3.*

*Sittelle ou Torchepot. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 460. t.
20. pl. enlum. n. 623. f. 1.*

Woodcracher. Plot Oxfordsb. p. 175.

Nutbreaker. Albin. av. 2. t. 28.

Nuthatch or Nutjobber. Brit. zool. I. n. 89. t. 38.

European Nuthatch. Lath. syn. I. 2. p. 648. n. 1.

Blauspecht. Frisch av. t. 39.

β. *Sitta minor. Briss. av. 3. p. 592.*

Petit torchepot. Belon ois. p. 305.

Petite Sittelle. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 470.

γ. *Sitta carolinensis. Briss. av. 3. p. 596. n. 4.*

*Sittelle à tête noire. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 473. var. 5.
Smaller Loggerhead. Brown jam. p. 475.*

Nuthatch. Catesb. Carol. I. t. 22.

Blackheaded Nuthatch. Arct. zool. 2. p. 281. n. 171.

δ. *Sitta carolinensis minor. Briss. av. 3. p. 598. n. 4.*

*Petite Sittelle à tête brune. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 474.
var. 6.*

Loggerhead. Sloane jam. p. 301. t. 259. f. 2.

Small Nuthatch. Catesb. Carol. I. t. 22.

Leis Nuthatch. Arct. zool. 2. p. 282. n. 172.

ε. *Sitta subtilis alba, capite colloque fuliginoso, dorso nigro.*
Beske Schr. der naturf. Berl. Ges. 7. p. 455.

Habitat in Europae, Russiae asiaticae, γ. et δ. Americae septentrionalis temperatoris arborum truncis, bieme habitaculis hortisque appropinquans, caudam motacillae inflatae moti-

re-
im,
gio-
api-

albis.
mch.

852.
n. 1.

o. t.

r. 5.

474.

gro.

sep-
ita-
par-
toti-

motitans, solitarius, moribus ceterum picis multum similiis, coleoptera et larvas insectorum sub cortice arborum latentes effodiens, nuces rostro perforans et comedens, nidostruens reperto congruo foramine arboris, aliquando a pico reliquo, illudque limo obliniens pro capacitate introitus; ova parvula 6-7 fornicatae alba rufo maculata, fidiissima mater; junioris caro sapida; noctu cantillans.

Longitudo 6 fere pollicum; feminae paulo minor; corpus ex cano caeruleo, subtus album; linea atra per oculos et aures; hypochondria et femora ferruginea; uropygium ex albo et ferrugineo varium; rectrix 1 fascia alba, 2 macula alba, 3 et 4 apice albo, 5 dorso concolor.

β. minor, per paria conspicua, pugnax; γ. capite colloque nigris, δ. fascis potissimum distinctae.

canaden- sis. 2. *S. superciliis albis.*

Sitta canadensis. Briff. av. 3. p. 592. n. 2. t. 29. f. 4.

Sittelle du Canada. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 471.

Torchepot du Canada. Buff. pl. enlum. n. 623. f. 2.

Canada Nuthatch. Arct. zool. 2. p. 281. n. 170. Latham syn. I. 2. p. 651. n. 2.

Habitat in America, Asia, Europa septentrionali, non migrans, europaea magnitudine, cuius forsitan varietas.

Vertex, cervix et humeri nigra; dorsum et uropygium glauca; genae, pectus et abdomen alba; remiges primariae obscurae, margine griseo; rectrices duae intermediae griseae; reliquae nigrae, macula ad apicem alba; crurum ferrugineum.

jamai- eensis. 3. *S. pileo nigro.*

Sitta jamaicensis. Briff. av. 3. p. 394. n. 3.

Sitta major, capite nigro. Raj. av. p. 185. n. 33.

Sitta f. Picus cinereus major capite nigro. Sloan. jam. 2. p. 300. t. 259. f. 1.

Sittelle à huppe noire. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 472.

Loggerhead. Brown. jam. p. 475.

Jamaica Nuthatch. Lath. syn. I. 2. p. 652. n. 3.

β. Sitta jamaicensis minor. Briff. av. 3. p. 596.

Petite Sittelle à huppe noire. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 473.

Least Loggerhead. Brown. jam. p. 475.

Habitat in Jamaicae dumetis, stupida, 5½ pollices longa, β. minor.

Corpus supra cinereum, subtus album; remiges nigricantes, margine cinereo; cauda nigricans, lineis transversis albis; rostrum, pedes et ungues nigra.

Ee 5

4. S.

- major. 4. *S. subtilis albida, capite dorsoque griseis, gula alba, remigibus caudaque nigris margine aurantiis.*
Sitta f. picus cinereus major, rostro curvo. Raj. av. p. 186.
n. 34.
Grande Sittelle à bec crochu. Buff. hist. nat. des ois. 5-
p. 475.
An other sort of Loggerhead. Sloane jam. p. 301. n. 19.
Great Nuthatch. Lath. syn. I. 2. p. 653. n. 4.
Habitat in Jamaica, vermbus, cimicibus e. c. viellitans,
7½ pollices longa.
Rostrum medio crassius, apice aduncum.
- naevia. 5. *S. supra plumbea, subtus glauca, gula alba, tectricibus alarum supra albo-punctatis.*
Sittelle grivelée. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 476.
Wall-creeper of Surinam. Edw. glean. t. 346.
Spotted Nuthatch. Lath. syn. I. 2. p. 654. n. 5.
Habitat in Surinamo, 6 pollices longa.
Caput ex caeruleo-plumbeum; tectrices alarum interiores obscurae albo-marginatae; pennae inferiores linea media longitudinali alba in punctum terminata; pedes obscure fuscii.
- surinamensis. 6. *S. subtilis sordide alba, capite colloque ex rufo castaneis, dorsi medio albo, alis caudaque nigris, tectricum alarum rectricumque apicibus, et remigum secundiarum margine albis.*
Surinam Nuthatch. Lath. syn. I. 2. p. 654. n. 6. t. 28.
Habitat in Surinamo, hujus generis minima, 3½ pollices longa.
Rostrum paulisper incurvum, obscure fuscum; occiput et cervix maculis oblongis nigris notata.
- caffra. 7. *S. corpore subtus flavo, superne flavo nigroque vario, pedibus nigris. Sparrm. mus. Carlson. t. 4.*
Habitat ad caput bonaë spei.
Rostrum rectiusculum, subdepressum, mandibula superiore convexiuscula, subtriquetra; color subtus lutescens; rectrices supra nigricantes, subtus olivaceae, apice flavicanentes; unguis lutescens.
- sinensis. 8. *S. palpebra inferiore purpurea. Osb. it. 2. p. 12.*
Chineæ Nuthatch. Lath. syn. I. 2. p. 655. n. 7.
Habitat in Sina, saepius cicuratus, oryzae seminibus viellitans.

Caput

Caput cum rostro nigrum cristatum; dorsum obscure ferrugineum, glauco colore internitente; abdomen et pectus alba, gularis versus nigra; prope oculos macula exigua coccinea, et proxima huic area magna nivea; a temporibus ad gularis linea nigra; mentum et gula alba, limitibus nigris; uropygium flavum; rectrices alarum ferrugineae; rectrices nigritantes, apice albae.

61. TODUS. *Rostrum subulatum depresso-sculptum, obtusum, rectum, basi setis patulis.*

*Lingua — —
Pedes gressorii.*

viridis. 1. *T. viridis, pectore rubro.*

Todus. Briss. av. 4. p. 528. n. 1. t. 41. f. 2.

Rubecula-viridis elegantissima. Sloane jam. 2. p. 306. t. 263. f. 1. Raj. av. p. 187. n. 40.

Todier de l'Amérique septentrionale. Buff. hist. nat. des oif. 7. p. 225. t. II.

Todier de S. Domingue. Buff. pl. enlum. n. 585. f. 1. 2.

Green Sparrow or green Hummingbird. Brown. jam. p. 476. Edw. av. 3. t. 121.

Green Tody. Gen. of birds p. 61. t. 6. f. 1.

Habitat in calidiori America, insulisque vicinis, solitarius, stupidus, mollioribus insectis vivitans, 4 pollices longus.

Mandibula superior fusca, inferior aurantia; irides castaneae; corpus subtus ochroleucum; gulae macula rubra; pedes et unguis grisei. Mari corpus supra caerulescens, abdomen album, pectus roseum.

cinereus. 2. *T. cinereus subitus luteus.*

Todus cinereus. Briss. av. app. p. 134. Pall. spic. 6. t. 3. A.

Tie-tic ou Todier de l'Amérique meridionale. Buff. hist. nat. des oif. 7. p. 223.

Todier de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 585. f. 3.

Grey and yellow Fly-catcher. Edw. glean. t. 262.

Cinereous Tody. Lath. syn. I. 2. p. 658. n. 2.

Habitat in Surinami et Gujanæ locis apertis, insectis vivitans, viridi paulo major.

Rostrum

Todi genus in calidiori praesertim America habitat, musicapæ satis affine, cui ramen anteriorum digitorum medius ab ortu inde discretus.

Caput

Rostrum obscurum, basi rubens; frons atra; tectrices alarum superiores et remiges ex atro fuscae margine luteo; cauda subcuneata; rectrices 2 intermediae nigrae, reliquae fuscae, apice (in mare) albo; pedes incarnati.

fusca. 3. *T. ferrugineus subtus olivaceus albo-maculatus, tectricibus alarum fascia obscura notatis.*

Brown Tody. *Gener. of Birds*, p. 62. t. 6. f. 2. *Lath. syn. I. 2. p. 659. n. 3.*

Habitat in calidiori America, viridi minor.

caeruleus. 4. *T. caeruleus, gula alba, temporibus, gula et abdomine aurantiis.*

Todier bleu à ventre orangé. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 229.*

Todier de Juda. *Buff. planch. enlum. n. 783. Salern. orn. p. 126. n. 16.*

Blue Tody. *Lath. syn. I. 2. p. 659. n. 4.*

Habitat in America, viridis magnitudine, 3½ pollices longus. Rostrum et pedes incarnata; infra oculum area purpurascens.

varius. 5. *T. ex caeruleo, nigro et viridi varius, rostro, capite, gula, cervice, pedibus, unguibus et cauda nigris, caudae margine et tectricibus alarum superioribus viridibus.*

Todus varius. *Briss. av. 4. p. 531. n. 2.*

Ispida indica. *Aldrov. av. 3. p. 520.*

Todier varié. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 229.*

Habitat in India, reguli magnitudine.

leucocephalus. 6. *T. ater, capite subcristato gulaque lacteis. Pall. spicil. 6. p. 19. t. 3. f. 2.*

White-headed Tody. *Lath. syn. I. 2. p. 660. n. 6. t. XXIX.*

Habitat in America, phoenicuri magnitudine.

Rostrum nigricans; mandibula inferior alba, apice nigricans; alas breves; remiges interius et subtus, apicibus que obsoletae, fuscescentes; cauda brevis, aequalis.

brachyurus. 7. *T. niveus, vertice, cervice, dorso caudaque brevi nigris. Pall. spic. 6. p. 18. 19.*

Short-tailed Tody. *Lath. syn. I. 2. p. 660. n. 7.*

Habitat in America, praecedentis habitu et magnitudine.

plumbeus. 8. *T. supra ex plumbeo canus, subtus lacteus, remigibus rectricibusque nigris. Pall. spicil. 6. p. 17.*

Plumbeous Tody. *Lath. syn. I. 2. p. 661. n. 8.*

Habi-

obscu
rus.

regiu

parac
faeus

*Habitat in Surinamo, reguli magnitudine, cinerei rostro.
Remigum et tectorum secundiarum, rectricumque latera-
lium margo albus; color verticem versus sensim nigricans.*

- obscu- 9. T. supra ex fusco niger, subtus folidissime albus.
rus. Dusky Tody. *Aret. zool.* 2. p. 283. n. 173. *Lath. syn.* I. 2.
p. 661. n. 9.
*Habitat in insula Rhode, luscinae magnitudine, insectis
vielitans, arbores emortuas frequentans, cantu suavi.
Reiniges et tectorices marginis griseae; cauda aequalis.*
- regius. 10. T. ex atro fuscus, subtus rufescens, crista spadicea apice
nigro-maculata, mento, superciliis et pectore albis.
Roi des Gobe-mouches. Buff. hist. nat. des ois. 4. p. 552.
Tyran hupé de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 289.
King Tody. Latham syn. I. 2. p. 662. n. 10.
*Habitat in Cayenna, 7 pollices longus.
Rostrum obscure fuscum; crista verticis transversa, 4-5 or-
dinibus pennarum apice rotundatarum constans; tectorices
alarum ex rubicundo fuscae; remiges obscurae; pectus
lineis transversis nigricantibus; pedes incarnati.*
- paradi- 11. T. capite cristato nigro, corpore albo, cauda cuneata, re-
facus. *eticibus intermediis longissimis.*
Muscicapa paradisi. Synt. nat. XII. I. p. 324. n. 1.
Corvus paradisi. Synt. nat. X. I. p. 107.
*Pica Papoensis, Icterus maderaspatarum cristatus, et Musci-
capa cristata alba capitis bonae spei. Briff. av.* 2. p. 45.
n. 6. p. 92. n. 7. p. 414. n. 20. t. 41. f. 2.
Manucoditota cristata ex albo nigroque varia. Raj. av. 195.
t. 2. f. 13.
Avis paradisi. Seb. mus. I. p. 85. t. 52. f. 3.
*Verdiolle, et Moucherolle hupé à tête couleur d'acier poli.
Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 105., 4. p. 558.
*Gobe-mouche blanc hupé du Cap de bonne esperance. Buff.
pl. enlum.* t. 234. f. 2.
Pied bird of paradise. Edw. av. t. 113.
Paradise Fly-catcher. Lath. syn. II. I. p. 345. n. 44.
- β. Todus alis caudae helvolis.
Muscicapa cristata capitis bonae spei. Briff. av. 2. p. 418.
n. 31. t. 41. f. 1.
- γ. Todus subtus albus, pectore ex caerulecente cinereo.
Crested long-tailed Pie. Edw. glean. t. 325.

δ. To.

Habi-

8. *Todus cristatus brasiliensis*.

Muscicapa brasiliensis cristata. *Briss. av. 2. p. 416. n. 30.*

Avis paradisiaca brasiliensis, seu *Curiri Acamaky cristata*.

Sel. mus. 2. t. 87. f. 2.

Habitat in Africa et insula Madagascar, muscis vietitans, alaudae magnitudine, 7 plerumque pollices longitudine superans.

Caput azureum, crista declinata; corpus album, rachi pennarum nigra; remiges nigrae utroque margine albae; rectrices niveae, rachi et margine exteriore nigrae.

ferrugi-
neus.

12. *T. ex ferrugineo niger, subtus ferrugineus, cauda fusca, temporibus obscurum et albo variis.*

Ferrugineous bellied Tody. Lath. syn. I. 2. p. 662. n. 11.

Habitat in Cayenna, 7½ pollices longus.

Rostrum nigrum; nares ovatae; supercilia pallida; remiges cum pedibus obscurae.

novus.

13. *T. fuscus, subtus albus, jugulo et pectore fusco maculatis, unguibus flavis.*

White-chinned Tody. Lath. syn. I. 2. p. 663. n. 12.

Longitudo 9 pollicum; nares ovales; cauda rotundata; pedes fusi.

platy-
rhynchos.

14. *T. ex fuscō lutescens, subtus luteus, gula albicante, vertice plumbeo, aliis caudae fuscis, rostro maximo. Pall. spicil. 6. p. 19. t. 3. C.*

Broad-billed Tody. Lath. syn. I. 2. p. 664. n. 13.

Magnitudo Luseiniae; rostrum semiocale, acutum, planum; naribus late excavatis albicantibus; pedes cum unguibus slavecentes.

macro-
rhynchos.

15. *T. niger, mento, genarum lateribus, abdomine, crisco, uropygoque rubris.*

Great-billed Tody. Lath. syn. I. 2. p. 664. n. 14. t. 30.

Magnitudo praecedentis, longitudo 8 pollicum; rostrum basi latum, ceterum praecedentis, ex atro caeruleum, apice mandibularumque marginibus albidis; rectrices caudae superiores rubrae; scapularium pennarum sex albae, acuminatae, supra alas pendulae.

cristatus. 16. *T. crista coccinea, corpore fusco albo-maculato. Naturf. 17. p. 21. n. 5. t. I.*

Habitat in Guinea.

Pen-

Pennae cristae apice nigro - marginatae; rostrum depresso - tenue, lanceolatum, obtusum; nares exiguae, parum tectae; corpus supra obscurum ex griseo fuscum; testrices alarum adsperso albo, remiges nigrantes; gula ex albito cinerea; pectus et abdomen fuso et obscure cinereo undulata; rectrices fuscae, subtus dilutius, 2 intermediae nigrantes.

62. ALCEDO. Rostrum trigonum, crassum, rectum, longum, acuminatum.

Lingua carnosa, brevissima, plana, acuta.

Pedes gressorii plerisque.

cristata. I. A. brachyura subcristata caerulea, subtus rufa, crista nigro-undulata.

Alcedo amboinensis cristata. Seb. mus. I. t. 63. f. 4.

Ispida philippensis cristata. Briff. av. 4. p. 483. n. 6. t. 37. f. 3.

Petit Martin - pêcheur hupé des Philippines. Buff. pl. entum. n. 756. f. 1.

Vintli. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 205.

Crested Kingfisher. Lath. syn. I. 2. p. 632. n. 22.

β. Ispida indica cristata. Briff. av. 4. p. 506. n. 17. Alcedo cristata orientalis elegantissime picta. Seb. mus. I. p. 104. t. 67. f. 4.

Habitat in Amboina et insulis Philippinis, 5 pollices circiter longa.

Rostrum nigrum; crista virens; ad utrumque colli latus stria caerulea ab oculo incipiens; humeri, testrices alarum superiores, remigum minorum, rectricumque margines, et rectrices 2 intermediae totae violacea; genae rufae; gula ex rufo alba; remiges fuscae; pedes cum unguibus rubicundi. In Germania visam referunt Sander et Goeze Naturf. I. p. 182. et 15. p. 157.

orientalis. 16. A. viridis subtus rufa, vertice, gula, fascia oculari, remigibusque caeruleis.

Ispida indica. Briff. av. 4. p. 479. n. 4. t. 37. f. 1. A.

Eastern Kingfisher. Latham syn. I. 2. p. 633. n. 23.

Habitat in India, 4½ polices longa.

Rostrum rubrum; supra oculos stria alba; infra area rufa; rectricum margo exterior viridis; pedes et unguis nigri.

2. A.

. 30.
cristata.

titans,
itudine

chi pen-
ae; re-

fusca,

t. II.

remiges

macula-

ta; pe-

te, ver-
o. Pall.

, pla-
cum un-

, criso,

. 30.
um base

, apice
idae fu-
e, acu-

Naturf.

Pen-

- inda. 2. A. brachyura virens subtus fulva, fascia pectorali nebulosa. Spotted Kingsfisher. *Edw. glean.* t. 335. *Lath. syn.* I. 2. p. 642. n. 32.
Habitat in Guiana, 7 pollices longa.
Rostrum nigrum; linea supra infraque oculos fulva; alae albo punctatae; pedes rubri.
- surina- 17. A. brachyura caerulea, subtus albicans, pectore rufo, ver-
mensis. tice ex virescente atro: maculis transversis viridibus.
Martin-pêcheur. *Fermín surin.* 2. p. 181.
Surinam Kingsfisher. *Lath. syn.* I. 2. p. 642. n. 33.
*Habitat in Guiana, in foveis prope aquas nidificans, 5-6
ova pariens, et piscibus vivitans.*
*Rostrum nigrum; rictus croceus; dorsum lineis obsoletis ni-
gris; menti mediique abdominis candori admixtus rubor;
pennarum pectoris apex dilute caeruleus.*
- Ispida. 3. A. brachyura supra cyanea, subtus fulva, loris rufis. *Scop.*
ann. I. p. 55. n. 64.
Ispida supra caerulea subtus ferruginea. *Mus. Ad. Fr.* I.
p. 16.
Ispida. *Gesn. av.* 571. *Raj. av.* p. 48. n. A. I. *Olin. av.*
39. *Aldr. orn.* 3. p. 518. t. 520. *Briff. av.* 4. p. 471.
n. I.
Alcyon. *Gesn. av.* 85. *Aldr. orn.* 3. p. 497.
Martin-pêcheur ou Alcyon. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 64.
pl. enlum. n. 77.
European Kingfisher. *Brit. zool.* I. p. 246. t. 38. *Arch.*
zool. 2. p. 284. A.
Common Kingfisher. *Lath. syn.* I. 2. p. 626. n. 16.
Kingfisher. *Albin. av.* I. t. 54. *Will. orn.* p. 146. t. 24.
β. Ispida senegalensis. *Briff. av.* 4. p. 485. n. 7. t. 39. f. I.
Baboucard. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 193.
*Habitat in Africa, Asia et Europa, frigoris patientissima,
ova 7 aut plura in fovea ad aquam posita pariens, pisces
integros devorans, quorum reliquias indigestas glomera-
tim evomit; gentium borealium philtrum; 7 pollices longa.*
*Rostrum nigrum; vertex testricesque alarum virides, ma-
culis caeruleis; cauda elegantissime caerulea; pedes rubri.*
4. A.

Genus hoc per omnem terrarum orbem dispersum, ad aquas potissimum habitat; pis-
ibus vivitans, quos mira arte capit, integros deglutit, et partium indigestarum
glomeris evomit; alis, quamvis plerumque brevibus, celeriter volat; color caeru-
lens cum varietatibus dominans; nates exiguae, in plurimis speciebus testae.

ebulosa.
n. I. 2.

z; alae

fo, ver-
is.

, 5-6

letis ni-
rubor;

. Scop.

. Fr. I.

lin. av.
p. 471.

7. p. 64.

Arct.

t. 24.
f. I.

tissima,
, pisces
lomera-
es longa-
es, ma-
es rubri.

4. A.

it, pisci-
ligestiarum
or caeru-
lae.

- Eritha- 4. A. brachyura, dorso caeruleo, abdomine luteo, capite uro-
ca. pygoque purpureis; gula nuchaque albis.
Ispida bengalensis torquata. Briff. av. 4. p. 503. n. 15.
Martin - pêcheur à front jaune. Buff. hist. nat. des ois. 7.
p. 195.
Bengal Kingfisher. Alb. av. 3. p. 28. t. 29.
Red-headed Kingfisher. Lath. syn. I. 2. p. 629. n. 17.
β. Alcedo minor, capite et cervice ex aurantio rubris.
Red-headed Kingsfisher. Gener. of birds, p. 61. t. 5.
Habitat in Bengala, ispidae magnitudine, ultra 6 pollices longa.
Rostrum pedesque rubri.
- purpu- 18. A. subitus rufescente-aurea, capite, uropygio caudaque ru-
rea. fo-aureis, dorso teetricibusque alarum ex caeruleo atris,
remigibus nigris, gula alba.
Martin - pêcheur pourpré. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 199.
Martin - pêcheur de Pondichery. Buff. pl. enlum. n. 778. f. 2.
Purple Kingsfisher. Lath. syn. I. 2. p. 630. n. 18.
Habitat in India, erithaceae magnitudine.
Rostrum pedesque rubri; pone oculos versus dorsum proce-
dens linea purpurea, caeruleo terminata.
- madaga- 5. A. subbrachyura rufa, gula alba, remigibus nigricantibus.
cariensis. Ispida madagascariensis. Briff. av. 4. p. 508. n. 18. t. 38. f. 1.
Martin - pêcheur de Madagascar. Buff. hist. nat. des ois. 7.
p. 199.
Martin - pêcheur roux. Buff. pl. enlum. n. 778. f. 1.
Rufous Kingsfisher. Lath. syn. I. 2. p. 630. n. 19.
Habitat in Madagascar, 5½ pollices longa.
Rostrum pedesque rubri; corpus subitus ex ruflo album; cau-
da nigricans, rectricum margo exterior, et 2 intermediae
rotae rufae.
- caeruleo- 19. A. caerulea, subitus rufa, gula alba, remigibus nigrican-
cephala. tibus.
Martin - pêcheur à tête bleue. Buff. hist. nat. des ois. 7.
p. 198.
Petit Martin - pêcheur du Sénégal. Buff. pl. enlum. n. 356.
f. inf.
Blue headed Kingsfisher. Lath. syn. I. 2. p. 631. n. 20.
Habitat in Madagascar, 4 pollices longa.
Rostrum pedesque rubri; vertex splendide caeruleus, dilu-
tius undulatus.

AVES PICAE. Alcedo.

450

benga- 20. A. ex caeruleo viridis, subtus rufa, cauda remigibusque
lenis. fuscis, capite striis transversis caeruleis notato.

Ispida bengalensis. Briff. av. 4. p. 475. n. 2.

Martin - pêcheur de Bengale. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 201.

Little indian Kingfisher. Edw. av. I. t. II. f. inf.

Indian Kingsfisher. Lath. syn. I. 2. p. 631. n. 21.

β. Ispida bengalensis minor. Briff. av. 4. p. 477. n. 3.

Little indian Kingfisher. Edw. av. I. t. II. f. sup.

Habitat in Bengala, 4½ pollices longa, β. minor.

Rostrum nigrum, mandibulae inferioris basi incarnata; fas-
cia ocularis rufa; hujus loco in β. maculae duae rufae,
altera ad basin mandibulae superioris, altera pone aures;
tectrices alarum superiores ex caeruleo virides, apice cae-
ruleae; remigum caudaeque margo ex caeruleo viridis,
in β. concolor.

superci- 6. A. submacroura viridis, subtus alba, fascia viridi, superci-
lioſa. liis fulvis.

Ispida americana viridis. Briff. av. 4. p. 490. n. 9.

Martin - pêcheur vert et orange. Buff. hist. nat. des ois. 7.
p. 218.

Martin - pêcheur petit verd de Cayenne. Buff. planch. enlum.
n. 756. f. 2. 3.

Little green and orange Kingsfisher. Edw. glean. t. 245.

Supercilious Kingsfisher. Lath. syn. I. 2. p. 643. n. 34.

Habitat in America, 6 pollices longa.

Rostrum nigricans, mandibulae superioris basi rubicunda;
gula, jugulum, tectrices alarum interiores et hypochon-
dria aurantia; remiges ex atro fuscae utrinque fulvo-
maculatae; rectrices 2 intermediae totae virides, reliquae
intus albo maculatae; pedes incarnati.

leuco- 21. A. ex caeruleo viridis, subtus flavescens, capite et cervice
rhyncha. spadiceis, remigibus cinereis, cauda supra caerulea, sub-
tus cinerea.

Ispida americana caerulea. Briff. av. 4. p. 505. n. 16.

Alcedo americana s. Apiastra. Sch. mus. I. t. 53. f. 3.

Martin - pêcheur à bec blanc. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 200.

White - billed Kingsfisher. Lath. syn. I. 2. p. 644. n. 35.

Habitat in America, vix 5 pollices longa.

Rostrum albidum; tectrices alarum a corpore remotissimae
cinereae.

brasiliens- 22. A. ex rufo, badio, fusco et albo varia, subtus alba, remi-
fis. gibus majoribus caudaeque rufis: maculis transversis albis.

Ispi-

Ispida brasiliensis. Briss. av. 4. p. 510. n. 19.
 Gip-gip. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 217.
 Brasilian Kingsfisher. Lath. syn. I. 2. p. 641. n. 31.
Habitat in Brasilia, ispidae magnitudine.
Roftrum oculique nigri; fascia ocularis, pedes et ungues fuscii.

- america- 23. A. ex nigricante viridis, subtus alba, viridi maculata, pe-
 na, storis jugulique area rufa.
 Martin-pêcheur vert et blanc de Cayenne. Buff. hist. nat.
 des ois. 7. p. 216. pl. enlum. n. 591. f. 1. 2.
 White and green Kingsfisher. Lath. syn. I. 2. p. 641. n. 30.
Habitat in Cayenna, 6 pollices longa.
*Roftrum nigrum; ab ejus basi linea alba infra oculos ad oc-
 ciput producita; alae maculis nonnullis albis; pedes rubri;
 feminae nulla area rufa.*

- bicolor. 24. A. viridis, subtus ex rufo aurea, fascia pectoris nigro et
 albo undulata, alis caudaque albo maculatis.
 Martin-pêcheur vert et roux. Buff. hist. nat. des ois. 7.
 p. 215.
 Martin-pêcheur vert et roux de Cayenne. Buff. pl. enlum.
 n. 592. f. 1. 2.
 Rufous and green Kingsfisher. Lath. syn. I. 2. p. 640. n. 29.
Habitat in Cayenna, ispidae magnitudine, 8 pollices longa.
*Roftrum nigrum; a naribus ad oculos stria rufa, torquis
 dimidiatus rufus, feminae nullus, nec fascia pectoralis;
 pedes rubicundi.*

- macu- 25. A. fusca flavescenti-maculata, subtus alba fusco-maculata,
 lata. gula flava.
 Ispida brasiliensis naevia. Briss. av. 4. p. 524. n. 25.
 Matuiti. Raj. av. p. 165. n. 3. Will. orn. p. 199. t. 38.
 Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 212.
 Brasilian spotted Kingsfisher. Lath. syn. I. 2. p. 640. n. 28.
Habitat in Brasilia, sturni magnitudine.
Roftrum rubrum, mandibula superiore paulisper longiore;
pedes et ungues cinerei.

- Alcyon. 7. A. macroura cristata caerulescens, abdomine albo, pectore
 ferrugineo, macula alba ante poneque oculos.
 Ispida cristata carolinensis. Briss. av. 4. p. 512. n. 21.
 Alcyon. Raj. av. p. 184. n. 14.
 Kingfisher. Catesb. carol. I. t. 69.
 Belted Kingsfisher. Arct. zool. 2. p. 279. n. 169. Latham
 syn. I. 2. p. 637. n. 27.

usque
201.; fas-
rufae,
aures ;
ce cae-
riridis,

uperci-

ois. 7.

enlum.

245.

34.

icunda;
ochon-
fulvo-
reliquaecervice
ca, sub-

6.

3.

. p. 200.
. 35.

ottissimae

, remi-
tis albis.

Ispi-

- β. Ispida Iudoviciiana.*
Martin - pêcheur de la Louisiane. *Buff. pl. enlum. n. 715.*
Crab catcher. *Sloan. jam. 2. p. 313. n. 54. t. 55. f. 3.*
- γ. Ispida dominicensis cristata.* *Briss. av. 4. p. 415. n. 22.*
Martin - pêcheur hupé de S. Domingue. *Buff. pl. enlum. n. 593.*
Jaguacati. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 210.*
American Kingfisher. *Edw. av. 3. t. 115.*
- δ. Ispida brasiliensis cristata.* *Briss. av. 4. p. 511. n. 20.*
Jaguacati guacu. *Marcgr. bras. 194. Raj. av. p. 49. n. 2.*
Will. orn. p. 147. n. 2. t. 24.
Habitat in America a sinu Hudsonis ad novam Hispaniam usque, *β.* in Louisiana et Jamaica, *γ.* in insula S. Dominici, vere versus finum Hudsonis migrans, *δ.* in Guiana et Brasilia, piscibus, aliquando etiam lacertis viitans, ad ripas altiores nidificans, foramine profundo horizontali, ova 4 alba pariens, ex quibus Junio prodeunt pulli; caro rancida; longitudo 13 pollicum.
Rostrum nigrum, in *β.* ex atro fuscum; in *γ.* mandibulae inferioris basi rubicunda; caput in *β.* plumbeum, in *γ.* cum superiore corporis parte splendide ferrugineum; torquis albus; in *β.* mentum, gula jugulunque alba; pectoris fascia transversa ferruginea, in *γ.* punctata; tectrices alarum, remiges rectricesque apice albae; in *β.* remiges secundariae cum rectribus, in *γ.* et *δ.* remiges omnes albo maculatae; remiges primariae nigrae, maculis transversis albis; in *δ.* remiges rectricesque nigrae; pedes et unguis fusi; in *β.* pedes rubri, abdomine ferrugineo; in *γ.* pedes rubri, unguis nigri; in *δ.* pedes et unguis nigri.

torquata. 8. A. macroura subcristata cano-caeruleo-sens, torque albo, alis caudaque albo-maculatis.

Ispida mexicana cristata. *Briss. av. 4. p. 518. n. 23. t. 41. f. 1.*

Achalalacthi s. Piscium vorax. *Hernand. mex. 13. Will. orn. p. 390. Raj. av. p. 126.*

Alatli. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 208.*

Martin - pêcheur hupé du Mexique. *Buff. pl. enlum. n. 284.*

Cinereous Kingfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 636. n. 26.*

Habitat in Martinica et Mexico, picae magnitudine, 15½ pollices longa.

Rostrum ex atro fuscum basi rubens. Pedes rubri.

cayen- 26. A. caerulea subtus alba, fascia infra occiput transversa nigra.
nen-
sis. *Ispida cayennensis.* *Briss. av. 4. p. 492. n. 10.*

Tapa-

Taparara. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 207.
 Cayenne Kingsfisher. *Lath. syn. I. 2.* p. 635. n. 25.
Habitat in Cayenna et Guiana, numerosa, solitaria, in riperum antris ova pariens, sturno vix minor, 9½ pollices longa.
Mandibula superior nigra, inferior rubra; uropygium cyanum; remigum caudaeque margo caeruleus; pedes rubri.

atrica-pilla. 27. A. ex violaceo caeruleo, subtus alba, capite, cervice, humeris, alarumque apicibus nigris, abdomine rufescente.
Martin-pêcheur à coëffe noire. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 189.

Martin-pêcheur de la Chine. Buff. planch. enlum. n. 673.
Black-capped Kingsfisher. Lath. syn. I. 2. p. 624. n. 15.

β. *Alcedo luzonica.*
Martin-pêcheur de l'isle de Luçon. Sonner. it. p. 65. t. 31.
Alcedo australis, supra nigra, subtus alba, abdomine ferrugineo.
Habitat in Sina, β. in insula Luzonia, 10 pollices longa.
Rostrum pedesque rubri.

tuta. 28. A. macroura, supra olivacea, subtus alba, superciliis albis, torque ex virescente nigro.
Respected Kingsfisher. Lath. syn. I. 2. p. 624. n. 14.
Habitat in insula Tahiti, incolis sacra, 8½ pollices longa.
Rostrum nigrum, mandibula inferiore alba; pedes nigri.

venerata. 29. A. fusca, subtus pallida, cauda rotundata, remigum, teccricum, rectricumque margine viridi.
Venerated Kingsfisher. Lath. syn. I. 2. p. 623. n. 13.
Habitat in insula amica, Apye, incolis sacra, 9 pollices longa.
Rostrum nigrum, mandibulae inferioris basi alba; remigum rectricumque scapi badii; pedes obscuri.

sacra. 30. A. ex dilute caeruleo viridis, subtus alba, superciliis pallide ferrugineis, remigibus caudaeque nigricantibus.
Sacred Kingsfisher. Lath. syn. I. 2. p. 621. n. 12.
 β. *Alcedo superciliis albis.*
 γ. *Alcedo vertice ex virescente nigro, subtus et nucha pallide ferruginea. Lath. syn. I. 2. t. 27.*
 δ. *Alcedo capite nigro, vertice caeruleo, superciliis, cervice et abdomine lutescentibus, alis caudaeque caeruleis.*
 ε. *Alcedo torque albo.*

Martin-pêcheur à collier blanc des philippines. Sonner. it.
p. 67. t. 33. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 192.

Habitat in insulis Societatis, ♂. in nova Seelandia, ♀. in insulis Philippinis, incolis sacra, ispida major, 9½ pollices longa.

Rostrum plumbeum, in ♂. nigrum, mandibula inferiore subtus alba, in ♀. basi flavicante; infra oculos striga angusta ex aurantio ferruginea, infraque hanc in nucha altera caerulea, in ♂. et ♀. nigra; colli laterumque pectoris penae albae in ♂. cinereo, in ♀. obscurō marginatae; mentum in ♀. album; in ♂. gula collumque alba; crissum in ♂. nigrum; remigum caudaeque margo exterior caeruleus; uropygium in ♀. pallide cyaneum; pedes nigri, in ♀. obscuri, in ♂. fuscii, in ♀. nigricantes.

chloroce- 31. A. viridis, collo albo, torque nigro, alis caudaque thalassinis.

Martin - pêcheur à tête verte. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 190.*
Martin - pêcheur à tête verte du cap de bonne esperance. *Buff. pl. enlum. n. 783.*

Green - headed Kingfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 620. n. II.*

Habitat in insula Molucca Bouro, 9 pollices longa.

Rostrum, cauda subtus, pedesque nigricant.

cacrulea. 32. A. caerulea, subtus rufa, superciliis et torque albis.

Ispida indica torquata. *Briff. av. 4. p. 481. n. 5. t. 37.f. 2.A.*
White collared Kingfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 620. n. 10.*

Habitat in India, ispida major, 7 fere pollices longa.

Rostrum griseum, apicem versus nigricans; sub oculo macula rufa; gula pallide rufescens; uropygium caudaeque tectrices superiores egregie virent; pedes grisei; unguis nigricans.

fusca. 33. A. cristata olivacea subtus exalbida obscure striata, temporebus et occipite sordide albis, cauda rotundata ferrugineo et chalybeo lineata apice alba.

Le plus grand Martin - pêcheur. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 181.*

Grand martin - pêcheur de la nouvelle Guinée. *Buff. pl. enl. n. 663. Sonner. it. p. 171. t. 106.*

Great brown Kingfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 609. n. 1.*

Habitat in nova Guinea, huius generis maxima, 18 pollices longa.

Rostrum mandibula superior nigra, inferior alba, basi nigra; crista feminae nulla, maris constans pennis angustis fuscis dilutius striatis; feminae vertex, utriusque fexus genae collique latera ex atro fusca; feminae torques albus, et dorium

dorsum integrum olivaceum; mari hujus pars inferior cum uropygio pallide thalassina; ejusdem coloris macula in tectricum alarum media; remiges in femina ex vidente fuscae, in mare margine exteriore caeruleae, intus et apice nigrae; basi in nonnullis alba; pedes flavi, feminae ex atro fusi; unguis nigri.

capensis. 9. A. macroura cinereo-caerulea, subtus fulva, pectori testaceo, rostro rubro.

Ispida capitis bonae speci. Briss. av. 4. p. 488. n. 8. t. 36. f. 3. Martin-pêcheur du cap de bonne esperance. Buff. pl. enlum. n. 590.

Martin-pêcheur à gros bec. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 184. Habitat ad caput bonae speci, 14 pollicés longa.

Rostrum apice nigricans; caput cinereum in fulvum vergens; corpus supra ex caeruleo viride, dorsi parte superiore in cinereum vergente; pedes et unguis rubri.

maxima. 34. A. subcristata ex plumbeo nigra albo-punctata, gula alba, jugulo nigro, pectori et abdomine sanguineis. Pall. spicil. 6. p. 15.

Oiseau. Bosman it. guin. p. 273. f. n. 13.

Great african Kingfisher. Lath. syn. I. 2. p. 611. n. 3.

β. Alcedo ex nigricante grisea albo-maculata, subtus rufa, postice alba.

Martin-pêcheur hupé. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 188. pl. enlum. n. 679.

Habitat in Africa, cornicis magnitudine.

Rostrum atrum, naribus linearibus; verticis nucha equum pluma in cristam elongatae; latera colli litura potissimum alba notata; feminae pars colli et jugulum ex testaceo ferruginea; pectus et abdomen alba, lineolis transversis nigris, lacerti alarum albi guttis raris nigris notati; remiges nigrae apice punctisque in seriem dispositis albis; rectrices nigrae apice albo, geminaque guttarum albarum serie; pedes nigerrimi.

senegalensis. 10. A. macroura cyanea subtus alba, capite cano, tectricibus alarum nigris.

Ispida senegalensis major. Briss. av. 4. p. 494. n. 11. t. 40. f. 1.

Alcedo semicaerulea. Forsk. Fn. arab. p. 2. n. 5.

Martin-pêcheur à tête grise. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 194.

Martin-pêcheur à tête grise du Sénégal. Buff. pl. enlum.

n. 594.

β. Alcedo ex caeruleo viridis, subtus ex fulvescente flava.

Ff 4

Martin-

Martin-pêcheur Crabier. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 183.*
pl. enlum. n. 334.

Crab-eating Kingfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 618. n. 9.*

γ. Alcedo capite colloque obscure albis.

δ. Alcedo supra caerulea, subtus ex rufo flava, gula alba.

Martin-pêcheur bleu et noir du Sénégal. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 194.*

Martin-pêcheur du Sénégal. *Buff. pl. enlum. n. 356. f. 1.*

Habitat in Africa et Arabia, potissimum ad fluvium Senegal,
γ. in S. Jago et Abyssinia, 9, β. 12, δ. 7 pollices longa.

Rostri mandibula superior rubra, inferior nigra, in β. utraque ferruginea, in γ. rubra, in δ. rufa; caput columque cana, genarum macula nigra, in δ. caerulea; in β. pone utrumque oculum stria et in alarum teletribus area nigra; remiges nigrae, basi intus albae, margine exteriore ex caeruleo virides; in γ. alae nigrae fascia transversa media caerulea, intus ferrugineae albidae et obscurae; pectus et abdomen in γ. ferruginea; rectrices nigrae, margine exteriori ex caeruleo virides, in β. totae ex caeruleo virides, in δ. caeruleae, in γ. supra caeruleae, subtus obscurae; pedes nigri, in β. ferruginei, in γ. et δ. rubri.

leucocephala. 35. A. ex caeruleo viridis, capite, collo et subtus alba, remigibus fulvis.

Martin-pêcheur à tête et cou couleur de paille. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 190.*

Martin-pêcheur de Java. *Buff. pl. enlum. n. 757.*

White-headed Kingfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 617. n. 8.*

Habitat in Java, 12 pollices longa.

Candor in stramineum colorem vergens; vertex striis nigris; dorsum ex caeruleo viride; cauda et alae ex viridi profunde caeruleae; remigum margo caeruleus.

flavicans. 36. A. subtus flavicans, capite dorsoque viridibus, rostro rubro, cauda caerulea.

Habitat in insula Celebes, Ten-rou-joulon incolis dieta.

smyrnensis. 37. A. macroura ferruginea, alis, cauda, dorsoque viridibus. *Scop. ann. I. p. 55. n. 65.*

Ispida smyrnenis. Briff. av. 4 p. 499. n. 13.

Smyrna Kingfisher. *Albin. av. 3. t. 37. Lath. syn. I. 2. p. 615. n. 7.*

β. Ispida madagascariensis caerulea. *Briff. av. 4. p. 496. n. 12. t. 38. f. 2.*

Martin-pêcheur bleu et roux. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 182.*
Grand-

- . 183.
9.
1.
at. des
f. 1.
megal,
longa.
. utra-
ollum-
in β.
area
exte-
trans-
obscu-
igrae,
x cae-
, sub-
rubri.
remi-
F. hist.
8.
igris;
li pro-
ro ru-
ieta.
dibus.
. I. 2.
n. 12.
. 182.
Grand - Martin - pêcheur de Madagascar. *Buff. pl. ent. n. 232.*
Great Gambia Kingfisher. *Edw. av. I. t. 8.*
γ. Ispida major bengalensis. *Briff. av. 4. p. 501. n. 14.*
Martin - pêcheur de la côte de Malabar. *Buff. pl. ent. n. 894.*
Great Bengal Kingfisher. *Albin. av. 3. t. 28.*
Habitat circa Smyrnam, β. ad Gambiam et in Madagascar,
γ. in Bengala, 8½, β. 10, γ. 10½ pollices longa.
Rostrum rubrum; irides albidae, in γ. flavae; gula alba,
in β. ochroleuca; fascia pectoralis, in γ. jugulum quoque,
pectus et abdominis anterior pars alba; testrices alarum
corpori proximae in β. violaceae, exteriore, remiges 10
primariae media parte extus, reliquae barba tota extero-
re, et cauda supra thalassina, base subtus nigra; in γ.
testrices alarum partim caeruleae, partim ferrugineae;
remiges primariae intrus et subtus nigricantes; pedes ru-
bri, in γ. cum unguibus aurantii; alias ungues nigri-
canes, in β. fuscæ.
- novae 37. A. nigra, albo-maculata.
Guineæc. Martin - pêcheur de la nouvelle Guinée. *Sonner. it. p. 171.*
t. 107.
New Guinea Kingsfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 614. n. 6.*
Habitat in nova Guinea.
Rostrum, irides, pedesque nigricant; maculae irregulares,
in capite, dorso, alis, et cauda rotundæ; in collo et ab-
domine oblongæ; ad utrumque colli latus binae amplæ.
- aegyptia. 38. A. fusca maculis ferrugineis, subtus albida maculis cine-
reis. *Hasselq. it. p. 245. n. 23.*
Egyptian Kingsfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 613. n. 5.*
*Habitat in Aegypto, in sycomoro et phoenice nidificans, ra-
nis, piscibus, insectis viettans.*
Rostrum nigricans; gula ex ferrugineo alba; testrices cau-
dae superiores totae albae; cauda aequalis cinerascens;
pedes virescentes; ungues nigricantes.
- semicæ. 41. A. brachyura, dorso postico, cauda medioque alarum cae-
rulea. *Forsk. Fn. arab. p. 2.*
*Habitat circa Yemen Arabiae, pici minoris magnitudine, spi-
thamam circiter longa.*
Rostrum pedesque miniati.
- rudis. 12. A. macroura nigra albido varia, subtus alba.
Ispida ex albo et atro varia. *Briff. av. 4. p. 520. n. 24. t. 39.*
f. 2.

Martin - pêcheur pie. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 185.*
 Martin - pêcheur hupé du cap de bonne esperance. *Buff. pl. enlum. n. 716.*
 Black and white Kingsfisher. *Edw. av. I. t. 9. Lath. syn. I. 2. p. 612. n. 4.*
Habitat in Asia et Africa, 11 pollices longa.
Rostrum et pedes cum unguibus nigri; supercilia alba; pen-
nae capitii et cervicis nigrae albo-marginatae; remiges
majores apice nigrae; cauda alba, fascia versus apicem
nigra; rectrices 2 extimae maculis 2 semicircularibus nigris.

Dea. 13. A. rectricibus duabus longissimis medio attenuatis, corpo-
re nigro-caerulecenti, aliis virescentibus.

Ispida ternatana. Briss. av. 4. p. 525. n. 26. t. 40. f. 2.
Avis paradisiaca ternatana. Seb. mus. I. p. 74. t. 46. f. 3.
Martin - pêcheur des Moluques. Salern. orn. p. 126. n. 10.
Martin - pêcheur de Ternate. Buff. pl. enlum. n. 116.
Martin - pêcheur à longs brins. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 196.

Ternate Kingsfisher. Lath. syn. I. 2. p. 634. n. 24.
Habitat in insula Ternate, sturni magnitudine, ultra 13
pollices longa.

Rostrum aurantium; caput, cervix et alae splendide caerulea;
dorsum et humeri fusca, margine caeruleo; uropygium
corpusque subtus album in roseum vergens; rectri-
ces intermediae caeruleae, basi et apice roseae, reliquae
ex roseo albae, exteriori margine fusco; pedes et unguis
rubicundi.

paradi- 14. A. rectricibus intermediis duabus longissimis, corpore vi-
fe. ridi-aureo, pedibus scansoriis.

Galbula longicauda. Briss. av. 4. p. 89. n. 2. t. 5. f. 2.
Jacamar à longue queue. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 22. pl.
enlum. n. 271.

Swallow-tailed Kingsfisher. Edw. av. I. t. 10.

Paradise Jacamar. Lath. syn. I. 2. p. 605. n. 3.
Habitat in Surinamo, insectis vittitans, per paria volans,
alaudae magnitudine, 11½ pollices longa.

Rostrum quadrangulare, acuminatum, cum pedibus ad di-
gitos usque plumos nigrum; caput ex violaceo fuscum;
gula, jugulum, teetricesque alarum inferiores alba; rectri-
ces 2 intermediae 6, reliquae unum pollicem longae.

grandis. 39. A. cupreo-aurea, subtus ferruginea, capite artubusque vi-
ridi aureis, pedibus scansoriis. *Pall. Spicil. 6. p. 10.*

Great

Great Jacamar. *Lath. syn. I. 2. p. 605. n. 2.*

*Magnitudo pici viridis; rostrum tetraëdrum, planilaterum,
naribus nudis; digiti anteriores fissi; cauda cuneiformis,
corpore longior.*

Galbula. 15. A. cauda cuneiformi, corpore viridi-aureo, subtus rufo,
pedibus scanforiis.

Galbula. *Briss. av. 4. p. 86. n. 1. t. 5. f. 1.*

Jacamaciri. *Marcgr. bras. 202. Raj. av. p. 44. n. 3. Will.
orn. p. 139. t. 22. Edw. glean. t. 334.*

Jacamar. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 220. t. 10. pl. enlum.
n. 238.*

Cupreous Jacamar. *Gener. of birds, p. 60. t. 3.*

Green Jacamar. *Lath. syn. I. 2. p. 603. n. 1.*

β. Galbula cauda longiore. *Lath. syn. I. 2. t. 26.*

*Habitat in Gujanæ et Brasiliæ silvis humidis densioribus fre-
quens, et solitaria, vittans insectis, velociter, sed bre-
viter volans, voce brevi, suavi, edulis, alaudae fere ma-
gnitudine, et vix 9 pollices longa.*

Roftrum quadrangulare, 2 pollicum, acuminatum, nigrum,
naribus ad basin ovatis; irides glaucae; mentum album,
nonnunquam flavicans; corpus subtus in β. dilute ferru-
gineum; pedes brever, debiles, plumosi, ex virescente fla-
vi, unguibus nigris.

tridactyl. 40. A. pedibus tridactylis. *Mantiss. 1771. p. 524. Pall. spic. 6.
la. p. 10. t. 2. f. 1. Vosm. monogr. Amstel. 1768. t. 1.*

Martin-pêcheur de l'isle de Luçon. *Sonner. it. p. 66. t. 32.*
Three-toed Kingsfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 645. n. 36.*

*Habitat in Surinamo et India, insulisque oceanii indici, is-
pidæ magnitudine, 4 circiter pollices longa.*

Roftrum tetraëdrum cum pedibus ochroleucum; corpus sub-
tus album; in aliis vertex ferrugineus, cinctu violaceo;
macula temporum azurea, infra hanc alia longitudinalis
alba; genæ ochroleucae; gula nivea; remiges ex ferru-
gineo nigrae, margine interiore ferrugineæ, apice azu-
reæ; cauda ferruginea; in aliis corpus supra ex rufo fer-
ruginum, vertice tamen, uropygio et pennarum dorso-
lium nonnullarum apice violae in modum tinctis; pectus
ferrugineum; in aliis caput et corpus supra colore florum
syringæ; alae ex caeruleo atrae, remigum margine cae-
ruleo; pedes rubicundi.

63. MEROPS. *Rostrum curvatum, tetraëdrum, compressum, carinatum, acutum.*

Nares exiguae ad basin rostri.

Lingua gracilis apice (plerumque) laciniata.

Pedes gressorii.

Apiaoster. I. M. dorso ferrugineo, abdomine caudaque viridi-caerulef-
cente, rectricibus duabus longioribus, gula lutea. *Mus.*
Ad. Fr. 2. p. 21. Scop. ann. I. p. 54. n. 63.

Merops. *Bell. av. 16. Gesn. av. 599. Aldr. orn. I. p. 871.
t. 872. et 873. Charl. onom. 87. t. 87. Raj. av. p. 49. n. 3.*

Merops galilaeus. *Hasselq. it. 247. n. 24. Forsk. Fn. arab.
p. I. n. 3.*

Apiaoster. *Briss. av. 4. p. 532. n. 1.*

Ispida cauda molli. *Kram. el. p. 337.*

Guépier. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 480. t. 23. pl. enlum.
n. 938.*

Bee-eater. *Alb. av. 2. t. 44. Will. orn. p. 147. t. 24.*

Common Bee-eater. *Latham syn. I. 2. p. 667. n. 1.*

β. Schaeghaghi. *Forsk. Fn. arab. p. I.*

*Habitat in Europa et Asia, cicadis, culicibus, muscis, api-
bus praesertim, insectorum defectu feminibus visitans,
gregaria, nidum struit in cavernis subterraneis ad aquas
ex muscis, et 5-7 ova alba parit, 10 pollices longa.*

*Rostrum nigrum; irides rubrae; frons ex caeruleo virens;
vertex, occiput et cervix badia; a rostro ad occiput stria
nigra; cauda cuneiformis, thalassina, rectricum margin-
e intus cinereo; pedes spadicei, unguibus ex rubicundo
nigris.*

viridis. 2. M. virens, fascia pectorali nigra, gula caudaque caeruleis,
rectricibus duabus elongatis.

Merops viridis supra ferruginea. *Amoen. acad. 4. p. 237.*

Ispida viridis supra ferruginea. *Osb. it. p. 96.*

Apiaoster madagascariensis torquatus. *Briss. av. 4. p. 549.
n. 8. t. 42. f. 2.*

Guespier à collier de Madagascar. *Buff. pl. enlum. n. 740.*

Guépier vert à gorge bleue. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 497.*

Indian Bee-eater. *Gen. of birds p. 60. t. 7. Edw. av. 4.
t. 183. Lath. syn. I. 2. p. 670. n. 2.*

β. Apiaoster bengalenensis torquatus. *Briss. av. 4. p. 552. n. 9.*

Bengal Bee-eater. *Albin. av. 3. t. 30.*

γ. Me-

- γ. Merops aegyptius. *Forsk. Fn. arab. p. I. n. 2.*
 δ. Apiaaster philippensis minor. *Briss. av. 4. p. 555. n. 10. t. 43.*
 f. 2.
 *Habitat in Bengala et Java, γ. in Aegypto, δ. in insulis
 Philippinis, passeris magnitudine, fere 10 pollices longus.
 β. ultra 11 polices, δ. 7½.*
 *Rostrum nigrum; gula in γ. flava, caudaque aequalis; fas-
 cia pectoralis in δ. caerulea, et cauda pariter aequalis;
 pedes fusci, in γ. incarnati.*
3. M. flavescens, uropygio virecente, remigibus apice rubris,
 restricibus basi luteis.
 *Merops alter. Gesn. av. 601. t. 602. Aldr. orn. I. p. 875.
 t. 876. Raj. av. p. 49. n. 4.*
 Apiaaster icterocephalus. Briss. av. 4. p. 537. n. 2.
 *Guêpier à tête jaune. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 510.
 Other Bee-eater of Aldrovandus. Will. orn. p. 148.
 Yellow-headed Bee-eater. Lath. syn. I. 2. p. 672. n. 3.
 Habitat in Europa australi, apiastro paulo minor.
 *Taenia ocularis nigra; dorsum et humeri badia; testrices
 alarum minores caerulecentes, majores flavae; remiges
 nigrae; pedes flavi.**
4. M. viridis, linea frontis supra infraque oculos alba, gula
 flavante, restricibus duabus elongatis.
 *Apiaaster madagascariensis. Briss. av. 4. p. 546. n. 7. t. 42. f. I.
 Guêpier de Madagascar. Buff. pl. enlum. n. 259.
 Patirich. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 495.
 Supercilious Bee-eater. Lath. syn. I. 2. p. 673. n. 4.*

β. Merops persica. *Pall. it. 2. p. 708. n. 16. t. D.*
 *Habitat in Madagascar, β. migratorius ad mare caspium,
 ultra 11 polices longus, β. apiastri magnitudine.
 Rostrum et oculorum area nigra; vertex ex virecente ba-
 dius; pedes fusci; unguis nigri; in β. frons cyanea, lora
 nigra; area sub collo magna ex sanguineo rufa.*

5. M. viridis, subtus flavescens, uropygio caeruleo, cauda ae-
 quali.
 *Apiaaster philippensis major. Briss. av. 4. p. 560. n. 12. t. 43.
 f. I.*
 *Grand guêpier des philippines. Buff. pl. enlum. n. 57.
 Guêpier vert à queue d'azur. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 404.
 Philippine Bee-eater. Lath. syn. I. 2. p. 674. n. 5.
 *Habitat in insulis Philippinis, apiastro minor, ultra 8½ pol-
 lices longus.*
 *Rostrum nigrum; linea ocularis nigra; pedes et unguis fusci.**

6. M.

cinereus. 6. *M. rubro flavoque variegatus, subtus flavo-rubescens, rectricibus duabus longissimis rubris.*

Apiaster mexicanus. Briss. av. 4. p. 541.

Avicula de Quauhcilui. Seb. mus. I. p. 50. t. 31. f. 10.

Guêpier à tête grise. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 491.

Cinereous Bee-eater. Latham syn. I. 2. p. 675. n. 6.

Habitat in nova Hispania, alaudae magnitudine, 9 $\frac{1}{4}$ pollices longus.

Rostrum viride; caput, remiges et rectrices exteriores cinerea.

cafer. 7. *M. griseus, crisco flavo, cauda longissima.*

Merops fuscus, ani regione flava. Koelreuter n. comm. ac.

Petrop. II. p. 429. t. 14. f. 1.

Guêpier gris d'Aethiopie. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 492.

Habitat in Aethiopia.

Inter pulchre delineatas icones animalium ultra 150, quas misit amicissimus I. Burmannus, visa est haec avis. An idem cum promerope?

flavicans. 8. *M. albidus, capite albo et fulvo vario, pectore rubicundo, dorso flavo, uropygio, alis, caudaque rufis, rectricibus 2 intermediae longissimis.*

Apiaster flavicans. Briss. av. 4. p. 539. n. 3.

Manucodiata secunda Aldrovandi. Raj. av. p. 21. n. 2.

Guêpier à tête jaune et blanche. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 490.

Aldrovandus's second bird of Paradise. Will. orn. p. 91. t. II.

Yellow Bee-eater. Lath. syn. I. 2. p. 676. n. 7.

Apiastro major, 20 pollices longus; rostrum breve, ex flavicante virens; lingua longa, acuta; oculi flavi; palpebrae rubrae; rectrices 2 intermediae 8 pollicibus reliquis longiores.

brasiliensis. 9. *M. rutilus, supra ex fusco et nigro varius, cauda remigibus pallide caeruleis.*

Apiaster brasiliensis. Briss. av. 4. p. 540. n. 4.

Pica brasiliensis. Seb. mus. I. t. 66. f. 1.

Merops rouge et bleu. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 479.

Brasilian Bee-eater. Latham syn. I. 2. p. 676. n. 8.

Habitat in Brasilia, apiastri magnitudine, 9 pollices longus. Rostrum, alae subtus et pedes cum unguibus flavi; rectrices alarum minores obscurae rubrae.

badius. 10. *M. ex caeruleo viridis, capite, cervice, humerisque badiis, rectricibus supra caeruleis, subtus ex griseo fulcis, intermediae duabus longioribus acuminatis.*

Apiaaster

Apiaster ex Franciae insula. *Briff. av. 4. p. 543. n. 6. t. 44.*

f. 2.

Guêpier de l'isle de France. *Buff. pl. enlum. n. 252.*

Guêpier maron et bleu. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 493.*

Chestnut Bee-eater. *Lath. syn. I. 2. p. 677. n. 9.*

$\beta.$ Merops alis caudaque badiis.

Guêpier maton et bleu du Sénégal. *Buff. hist. nat. des ois. 6.*

p. 494.

Guêpier à longue queue du Sénégal. *Buff. pl. enlum. n. 314.*

Habitat in Franciae Insula, $\beta.$ ad fluvium Senegal, 10-12 pollices longus.

Fascia infraocularis fusca; tectrices alarum superiores virides, subtus fulvae, in $\beta.$ badiæ; remiges subtus griseæ, 4 intimæ totæ virides, 13 mediæ apice nigrae; rectrices marginè interiori griseæ; 2 intermediae 2 pollicibus et ultra longiores, in $\beta.$ nigrae; rostrum nigrum; pedes rubicundi; unguis nigricans.

chrysoce- II. M. viridi-aureus, subtus ex caeruleo viridis, capite et cervice fulvis, gula flava, rectricibus duabus intermediis longioribus.

Grand guêpier vert et bleu à gorge jaune. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 502.*

Yellow-throated Bee-eater. *Lath. syn. I. 2. p. 678. n. 10.*

Longitudo 10 pollicum; frons et supercilia ex caeruleo viridia; tectrices caudæ superiores virides.

angolen- 12. M. viridis aureo-nitens, fascia oculari cinerea nigro maculata, alis caudaque cuneiformi subtus cinereis, gula flava, jugulo badio.

Apiaster angolensis. *Briff. av. 4. p. 558. n. 11. t. 44. f. 1. A.*
Petit Guêpier vert et bleu à queue étagée. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 503.*

Angola Bee-eater. *Lath. syn. I. 2. p. 679. n. 11.*

Habitat in Angola, 5½ pollices longus.

Rostrum et unguis nigri; pedes cinerei; color subtus in caeruleum vergens.

erythro- 13. M. viridis, subtus flavicans, capite et cervice rubris, gula flava, alis caudaque aequali subtus cinereis.

Apiaster indicus erythrocephalus. *Briff. av. 4. p. 563. n. 13.*
t. 44. f. 3. A.

Guêpier à tête rouge. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 508.*

Red-headed Bee-eater. *Lath. syn. I. 2. p. 679. n. 12.*

Habi-

Habitat in India, 6 pollices longus.

Rostrum nigrum; irides rubrae; fascia ocularis nigra; rectrices 2 intermediae remigesque marginae cinereae; pedes cinerei; unguis nigrans.

nubicus. 14. M. ex caeruleo viridis subtus ruber, dorso, alis caudaque furcata lateritiis.

Guêpier rouge à tête bleue. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 506.*

Guêpier de Nubie. *Buff. pl. enlum. n. 649.*

Blue headed Bee-eater. *Lath. syn. I. 2. p. 680. n. 13.*

Habitat in Nubia, apastro vix minor, 10 pollices longus.

Rostrum nigrum; remiges majores apice ex caeruleo cinnereae, secundariae ex atro fuscæ; pedes dilute cinerei.

erythro- 15. M. olivaceus subtus exalbidus, gula flava, alis caudaque rubris apice nigris.

Guêpier rouge et vert du Sénégal. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 507.*

Petit guêpier du Sénégal. *Buff. pl. enlum. n. 318.*

Redwinged Bee-eater. *Lath. syn. I. 2. p. 681. n. 14. t. 31.*

Habitat ad fluviatum Senegal, 6 pollices longus.

Rostrum pedesque nigri.

cayen- 16. M. viridis, alis caudaque apice nigra rufis.

Guêpier vert à ailes et queue rousses. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 509.*

Guêpier à queue et ailes rousses de Cayenne. *Buff. pl. enl. n. 454.*

Cayenne Bee-eater. *Lath. syn. I. 2. p. 681. n. 15.*

Habitat in Cayenna.

Rostrum nigrum; remiges basi albae, et prouti rectrices, ad latera nigrae; pedes ex flavescere solito longiores.

surina- 17. M. varius, occipite rubente, cervice ex virente flavo, remigibus virentibus, nigro et caeruleo variis.

Guêpier. *Fermin surin. 2. p. 184.*

Surinam Bee-eater. *Lath. syn. I. 2. p. 682. n. 16.*

Habitat in Surinamo.

Irides spadiceæ; unguis nigri.

novae 18. M. ex virecente splendide niger, rectricibus alarum majoribus et fasciculo pennarum crisparum ad utrumque collum latus albis, rectricibus caudæ aequalis caeruleis.

New Zealand Creeper. *Brown. zool. illustr. p. 18. t. 9. Cook it. I. p. 48.*

Pōē Bee-eater. *Lath. syn. I. 2. p. 682. n. 17.*

Habi-

Habitat in nova Seelandia, 11 pollices longus, incolis sacer, egregie cantans, carne delicata.

Pedes et ungues nigri; os interius cum lingua flavum; haec apice nigra, setis horrida; pennae colli laxae, longae, aliquantum crispatae, stria per medium scapi longitudinem alba.

niger.

19. M. niger, fasciculo plumarum magno pone alas, crissoque flavis, cauda cuneiformi, rectricibus duabus extimis extus et apice albis.

Yellow-tufted Bee-eater. *Lath. syn. I. 2. p. 683. n. 18.*

Habitat in insula O-why-hi et vicinis, alaudae magnitudine, 14 pollices longus, frequens; flavae pennae ornamenti loco inserviant incolis.

Nares membrana tectae; lingua apice filamentosa; pennae capitis gulæque breves, rectricesque acuminatae; duas intermediae 7, extimae 2 pollices longae.

rufus.

20. M. rufus, remigibus fuscis extiore margine rufis.

Fournier. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 476.*

Fournier des Buenos Ayres. *Buff. pl. enlum. n. 739.*

Rufous Bee-eater. *Lath. syn. I. 2. p. 683. n. 19.*

Habitat in Bonariis, 8½ pollices longus.

Corpus subtus in flavum vergens; cauda 3 pollicum; digitus pedum ab ortu inde separati, uti promeropis; unguis digiti posterioris reliquis major.

moluc-
censis.

21. M. griseus, orbitis nudis, genis nigris, cauda subaequali.

Polochion. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 477.*

Molucca Bee-eater. *Lath. syn. I. 2. p. 684. n. 20.*

Habitat in insula Bouro, ex Moluccis una, cuculi canori circiter magnitudine, 14 pollices longus.

Rostrum nigricans, 2 pollicum, naribus in ejus medio per viis, postice membrana tectis; lingua rostri longitudine, penicillo pilorum terminata; occipiti candor admixta; gulæ pennae nonnullæ apice argenteæ; rectrices 5½ pollices longae, extimis paulo brevioribus; pedes obscuri; digitus exterior basi cum medio connexus; posterioris unguis reliquis multo major.

64. UPU-

Meropes in America rariores, insectis, nonnulli apibus vespisque potissimum videntur, alcedines imitantur struendo nidum, voce plerique ingrata. Upupa a promero. pe vix differt, nisi cristá.

Gg

64. UPUPA. *Rostrum arcuatum, longum, gracile, convexum, subcompressum, obtusum.*

Nares exiles ad basin rostri.

Lingua obtusa, integerrima, triquetra, brevissima.

Pedes ambulatorii.

Erops. 1. U. cristata variegata. Fn. suec. 105. Scop. ann. I. p. 53.
n. 62.

Upupa. Bell. av. 72. a. Gesn. av. 776. Aldrov. orn. 2. p. 702. Jonst. av. t. 42. Raj. av. p. 48. A. 6. Kram. el. p. 337. Charl. onom. 63. t. 63. Briss. av. 2. p. 455. n. I. t. 43. f. 1. Nozem. nederl. Vog. t. 66.

Hupe ou Puput. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 439. pl. enlum. n. 52.

Bubbola. Olin. ucc. p. 36.

Ter-choous or Meslinger-bird. Pocock it. I. p. 209.

Hoop or Hoopoe. Brit. zool. I. n. 90. Arct. zool. 2. p. 283. A. Will. ornith. p. 145. Albin. av. 2. t. 42. 43. Edw. glean. t. 345.

Wiedhopf. Frisch av. t. 43. Günth. Nest. u. Eyer, t. 27. Habitat in Europa, Asia et Africa, *solitaria, migratoria, vicitans insectis, putroris amans, in cavis arborum, vel murorum, ipsa tellure, bis vel ter per annum ova pariens 2-7 cinerea, perdricis ovis paulo minora, sed longiora; non nisi terrefacta cristam erigit, 12 pollices longa.*

Crista pallide aurantia, apice nigra; dorsum et alae lineis nigris albisque; collum ex rubente fuscum; pectus et abdomen alba; rectrices 10 nigrae, lunula in medio alba; pedes nigri.

capensis. 4. U. cristata fusca, subtus alba, alarum macula alba.

Huppe noire et blanche du cap de bonne esperance. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 463.

Huppe du cap de bonne esperance. Buff. pl. enlum. n. 697.

Madagascar Hoopoe. Latb. syn. I. 2. p. 690. n. 2.

Habitat in insularum Madagascari et Bourbon, nec non capitibus bona spei densis silvis, 16 pollices longa.

Rostrum flavicans; lingua apice filamentosa; palatum tuberculis plenum; crista minor, quam epopi, acuminata, alba; rectrices 12, 2 intermediae reliquis paululum breviores;

res; pedes et unguis flavidantes; posterioris digitus unguis magnus, valde uncinatus.

- Promerops. 2. U. rectricibus sex, intermediis longissimis. *Mill. illustr. t. VI. A.*
Promerops superne fuscus, inferne albus, pectore rufescente.
Briff. av. 2. p. 461. n. 1. t. 43. f. 2.
Promerops gris à ventre tacheté. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 469.
Promerops du cap de bonne esperance. Buff. pl. enl. n. 637.
Cape promerops. Lath. syn. I. 2. p. 692. n. 5.
Habitat frequens ad caput bonae ipsi, alaudae circiter magnitudine, 17 pollices longa.
Rorulum, pedes et unguis nigra; uropygium et testrices caudae superiores olivaceae, inferiores flavae; gula alba; jugulum et pectus rufescens; abdomen album, in mare una cum pectore maculatum; rectrices 12, intermediae 6 12 $\frac{1}{4}$ pollicies, extimae 2 tantum longae.
- mexicana. 5. U. grisea, thalassino et purpurascente admisto, subtus flava, remigibus majoribus caeruleis, rectricibus quatuor intermediis longioribus.
Promerops mexicanus. Briff. av. 2. p. 463. n. 2.
Avis Ani mexicana cauda longissima, Seb. mus. I. p. 73. t. 45. f. 3.
Promerops à ailes bleues. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 467.
Mexican Promerops. Latham syn. I. 2. p. 691. n. 4.
Habitat in novae Hispaniae montibus altioribus, museis, apibus, aliis insectis larvisque vicitans, 18 $\frac{1}{4}$ pollices longa.
Rorulum nigricans, ad latera flavicans; supra oculos macula flava; cauda 12 $\frac{1}{4}$ pollices longa ex nigricante grisea, viridi et purpureo tinctu intermixta.
- paradisea. 3. U. castanea cristata, rectricibus duabus longissimis.
Promerops indicus cristatus. Briff. av. 2. p. 464. n. 3.
Avis paradisiaca cristata orientalis rarissima. Seb. mus. I. p. 48. t. 30. f. 5.
Promerupe. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 465.
Crested Promerops. Lath. syn. I. 2. p. 691. n. 3.
Habitat in India, rarior, sturni magnitudine, 19 pollices longa.
Rorulum, pedes et unguis plumbei; caput et collum egregie nigra; verticis pennae 2 pollicum in cristam elongatae; dorsum, uropygium, humeri, alas et cauda pallide badia;

pectus, abdomen et rectrices caudae inferiores pallide cinerea; rectrices 2 intermediae 14, reliquae 3 pollices longae.

fusca. 6. U. fusca, subtus grisea albo nigroque striata, vertice chalybeo, gula juguloque nigris, rectricibus duabus intermediis longissimis.

Promerops brun de la nouvelle Guinée. Sonner. it. p. 164. t. 100.

Promerops brun à ventre rayé. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 471. t. 22.

Promerops de la nouvelle Guinée. Buff. pl. enlum. n. 638. New Guinea brown Promerops. Lath. syn. I. 2. p. 694. n. 6. Habitat in nova Guinea, 22 pollices longa.

Rostrum, irides et pedes nigra; feminae caput collumque fusca, occipiti, dorso, aliquo viror admixtus; rectrices 12, intermediae duae 13, extimae brevissimae 4 pollices longae.

magna. 7. U. nigra, capite, cervice et pectori, pennarumque humeralium, subalarium et ad caudae latus positarum falcatarum parte exteriore viridi-aureis, cauda longissima.

Grand Promerops de la nouvelle Guinée. Sonn. it. p. 166. t. 101. Buff. planch. enlum. n. 639.

Grand Promerops à paremens frisés. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 472.

Grand Promerops. Lath. syn. I. 2. p. 695. n. 7. t. 32.

Habitat in nova Guinea, 4 fere pedes longa.

Rostrum 3 pollicum, et pedes nigri; nigredini supra violaceus, ad alas caeruleus tintitus adspersus; rectrices 12, binae intermediae 21 pollices, extimae 5 modo longae.

aurantia. 8. U. fulva, capite colloque aureis, cauda aequali.

Promerops barbadensis. Briss. av. 2. p. 466. n. 4.

Avis paradisiaca americana elegansissima. Seb. mus. I. p. 102. t. 66. f. 3.

Promerops orangé. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 474.

Orange Promerops. Latham syn. I. 2. p. 697. n. 8.

β . Promerops mexicanus luteus. Briss. av. 2. p. 467. n. 5.

Cochitotol. Fern. hist. n. Hisp. c. 161. Raj. av. p. 168.

Promerops orangé (fem.). Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 472.

Habitat in Barbados, β . in novae Hispaniae calidioribus, vermibus et seminibus vicitans, sturni magnitudine, $9\frac{1}{2}$ pollices longa.

Rostrum

Rostrum aureum, basi plumis rubris cinctum, in β. nigrum; remiges majores ex rubro aurantiae; in β. alae, collum et caput ex cinereo nigroque varia; pedes flavi, in β. cincturei, unguibus nigris.

65. CERTHIA. *Rostrum arcuatum, tenuem, subtrigonum, acutum.*

Lingua acuta.

Pedes ambulatorii.

familia- 1. *C. grisea*, subtus alba, remigibus fusca: decem macula
ris, *Fn. suec. 106. Scop. ann. I. p. 52. n. 59.*

*Certhia. Gesn. av. 251. Aldrov. orn. I. p. 869. t. 870.
Bell. av. 98. a. Raj. av. p. 47. n. 5. Bris. av. 3. p. 603.
n. I. Nozem. nederl. Vogel, t. 30. Günth. Nest. u.
Eyer, t. II. f. sup.*

*Ispida cauda rigida. Kram. el. p. 337. n. 2.
Grimpereau. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 481. t. 21. f. I.
pl. enlum. n. 681. f. I.*

*Creeper. Brit. zool. n. 91. t. 39. Arct. zool. 2. p. 285.
n. 174. Will. orn. p. 144. t. 23. Albin. av. 3. t. 25.
Latb. syn. I. 2. p. 701. n. I.*

β. *Certhia major.*
Grand Grimpereau. *Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 486.*

*Grafspecht. Frisch av. t. 39.
Habitat in Europae et septentrionalis Asiae atque Americae
arboribus reptans, ex rimis corticis muscisque adhaeren-
tibus insecta, eorumque ova et larvas exquirens, quibus
vicitat; primo vere nidificat, et 20 ova parit.*

*Caput collumque fuscum, striis nigris; uropygium muste-
linum; testrices alarum ex fuso et nigro variae; remi-
ges obscurae, morgine albo, lineis ferrugineis, 4 - 14
macula alba notatae; pectus et abdomen argentea; cauda
praelonga mustelina; rectrices acuminatae.*

viridis. 26. *C. supra virens, subtus pallide luteo viridique varia, remi-
gum fuscarum margine exteriore viridi. Scop. ann. I. p.
52. n. 60.*

Gg 3

Green

*Certhiae genus per omnem tellurem dispersum, insectis potissimum vicitat; navibus
exiguis, rectricibus 12, pedibus majoribus, digito posteriore magno, unguibus un-
cinatis et longis conspicuum; plurimis speciebus lingua acuta, aliis apice compla-
nata, aliis ciliata, paucis tubulosa.*

Green Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 702. n. 2.*

Statura familiaris; stria caerulea a basi rostrum utrinque descendens; gulæ macula rufa; pedes nigri.

pacifica. 27. C. nigra, subtus obscura, humeris, dorso inferiore, uropygio crissoque flavis, tectricibus alarum inferioribus niveis.

Great hook-billed Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 703. n. 3.*

Habitat in insulis amicis maris australis, 8 pollices longa; rostrum valde curvatum fuscum, basi pallidius; tectrices caudae superiores et nonnullæ alarum interiores flavæ; alæ spuriae ochroleucae; pedes ex atro fusi.

obscura. 28. C. olivacea, remigibus caudaque aequali viridi-marginata obscuris.

Hookbilled green Creeper. *Latham syn. I. 2. p. 703. n. 4. t. 33. f. 1.*

Habitat in insulis Sandwich, ab incolis ad vestimenta eorum plumosa adhibita, 7 pollices longa.

Rostrum ex fuso atrum, semicirculi ad instar curvatum; nares membrana tectæ; inter oculos naresque stria fusca; abdominis color in flavum paulisper vergens; pedes obscure fusi, genibus albis; ditti posterioris unguis praelongus.

coccinea. 29. C. coccinea, alis candaque nigris. *Forster Goett. Magaz. I. 6. p. 346. Blumenb. Naturg. ed. 2. p. 190.*

Hookbilled red Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 704. n. 5.*

Carmosinrother Honigsauger. *Merrem Beytr. I. p. 16. t. 4.*
Habitat in insulis Sandwich, ab incolis similiter ad vestimenta plumosa adhibita, longitudine vix 6 pollices adaequans; magnitudine passeris.

Rostrum capite longius, acinacis modo curvatum, albidum; pedes cum unguibus longis albantes; rectrices breves, acuminatae; alarum margo et pennarum gularium radix alba.

falcata. 30. C. viridis, subtus caudaque violacea, remigibus, abdome et crissu pallide fulcis.

Sickle billed Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 705. n. 6.*

Longitudo 5½ pollicum; rostrum obscurum, falcatum; capitis nitor violaceus; tectrices alarum majores pedesque pallide fusca; unguis nigri.

- Sovi- 31. *C. viridis subtus flavescens, uropygio olivaceo, pectore
manga. fusco: fasciis duabus transversis altera caerulea, altera ba-
dia, cauda nigra.*
*Certhia madagascariensis violacea. Briss. av. 3. p. 638. n. 18.
t. 32. f. 2. 3.*
*Sovi-manga. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 494.
Violet Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 705. n. 7.
Habitat in Madagascar, reguli magnitudine, 4 pollices longa.
Rostrum, cum pedibus et unguibus nigrum, lingua apice
bifida paulo brevius; femina subtus flava, supra olivacea;
mari tectrices alarum subtus ochroleucae; dorsum infe-
rius caudaeque tectrices superiores olivacea, inferiores cum
macula humerorum flavae; rectrices margine virides.*
- manil- 32. *C. viridis, caeruleo et violaceo nitens, subtus ex olivaceo
lensis. grisea, collo ex viridi, caeruleo, violaceo, flavo fascia-
tim vario remigibus fuscis.
Habitat in Manilla, 4 pollicibus brevior.
Inter humeros duae maculae flavae; tectrices alarum sup-
riores fuscae.*
- burboni- 33. *C. ex vidente fusca, subtus griseo varia, uropygio flavo,
ca. remigibus caudaeque nigricantibus.
Sovi-manga de l'isle de Bourbon. Buff. hist. nat. des ois. 5.
p. 516.
Grimpereau de l'isle de Bourbon. Buff. pl. enlum. n. 681.
f. 2.
Yellow-rumped Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 736. n. 41.
Habitat in insula Bourbon, 5 pollices circiter longa.
Rostrum et pedes nigri; hypochondria rufa.*
- fannio. 34. *C. olivacea, vertice subviolaceo, genarum macula alba,
remigibus caudaeque subfurcata fuscis.
Mocking Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 735. n. 39.
Habitat in nova Seelandia, 7½ pollices longa, voce grata va-
ria, imitabunda; capite a purpureo antherali polline flo-
rum, quibus immiscet avis, nonnunquam purpureo.
Rostrum obscurum; nares magnae, membrana tectae; irides
fuscæ; corpus supra magis in viridem, subtus in flavum
colorem vergens; remigum secundiarum rectricumque
margo olivaceus; pedes obscure glauci, unguibus nigris,
posteriore longiore.*

aurantia. 35. *C. viridis subtus flavicans, jugulo aurantio, remigibus caudaque nigris.*

Orange breasted Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 734. n. 38.*

Habitat in Africa, 4 pollices longa. Smeathman.

Rostrum nigrum; pedes obscuri,

flavipes. 36. *C. viridis subtus caerulea, alis caudaque nigris.*

Blue-throated Creeper. *Latham syn. I. 2. p. 734. n. 37.*

Habitat in Cayenna, 4½ pollices longa.

Rostrum et ungues nigri; abdomen pallidius caeruleum; lateribus collis intermissus color ochroleucus; pedes flavi.

ochro-chlora. 37. *C. viridis, genis, gula et abdomine flavis, pectore et hypochondriis ex flavicante viridiibus caerulecentemaculatis.*

Yellow-cheeked Creeper. *Gen. of birds p. 60. t. 3. f. 2.*
Lath. syn. I. 2. p. 734. n. 36.

Habitat in Surinamo, familiari dimidio minor.

Cardinalis. 38. *C. niger, capite, collo, pectore et linea per medianam dorsi longitudinem rubris, cauda aequali.*

Cardinal Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 733. n. 35. t. 33. f. 2.*

Habitat frequens in cultis insulae Tannae, nectarque e floribus jugere fertur; familiaris magnitudine.

Rostrum nigrum, basi albicans; lingua longa, extensilis, altera media parte ciliata; stria nigra a rostro ad oculos; irides spadiceae; pedes plumbei; ungues nigri.

carunculata. 39. *C. olivacea, mento gulaque aurantiis, pectore ferrugineo, abdomine cinerascente, caruncula ad basin mandibulae inferioris flavicante.*

Wattled Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 732. n. 34.*

Habitat in insula maris australis Tonga Tabu, 7½ pollices longa.

Lingua rostro longior, in quatuor quasi filamenta partita; caruncula fasciculo plumarum flavorum cineta; irides cinereae; pedes ex glauco atri; ungues nigri.

fusca. 40. *C. fusca, gula et pectore fusco alboque lineatis.*

Brown Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 732. n. 33.*

Habitat in terra maris australis, 6 pollices longa.

Rostrum medium macula pallide aurantia; pennae ad collis latera margine albo; abdomen pallidius; cauda aequalis; pedes nigri; ungues nigri, longi, adunci.

- gibus
8.
7.
; las.
vi.
t hy-
acu-
f. 2.
dorsi
f. 2.
flo-
filis,
ulos;
ineo,
oulae
llices
tita;
es ci-
i la-
alis;
. C.
- muraria. 2. *C. cinerea*, macula alarum fulva. *S. G. Gmelin it. 3. t. 19.*
f. 2. Scop. ann. I. p. 51. n. 58.
Certhia muralis. Briss. av. 3. p. 607. n. 2. t. 30. f. 1.
Picus murarius. Gesn. av. 712. Aldr. orn. I. p. 851. t. 852.
Raj. av. p. 46. n. 1. Kram. elench. p. 336. n. 6.
Grimpereau de muraille. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 487.
t. 22. pl. enlum. n. 372. f. 1. 2.
Wallcreeper or Spider catcher. Will. ornith. p. 143. t. 23.
Edw. glean. t. 361. Latham syn. I. 2. p. 730. n. 32.
Mauerspecht. Goetz Naturf. 17. p. 40.
Habitat in Europae australioris turribus, arcibus, muri,
reptans, solitaria, autumno migrans, viettans insectis
potissimum araneis, volatu vago et incerto, voce acuta;
nidificat aliquando in craniis; moribus familiariter affinis,
passeris magnitudine, $6\frac{1}{2}$ pollices longa.
Rostrum subulatum, cultratum, capite longius; collum sub-
tus albidum; remiges nigrae: 1, 2 latere tenuiore macu-
lis duabus albis; maeula alarum rosea et tectricibus et re-
migum latere interiore; rectrices albicantes; unguis va-
lidi praesertim posterior. Feminae gula jugulumque alba.

pusilla. 3. *C. fusca*, subtus alba, superciliis candidis, tectricibus fus-
cis: extimus apice albis.
Certhia indica. Briss. av. 3. p. 621. n. 9.
Sovi-manga brun et blanc. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 498.
Little brown and white Creeper. Edw. av. I. t. 26.
Habitat in India, familiariter dimidio minor, $3\frac{1}{2}$ pollices lon-
ga; an sferatae varietas?
A rostro ad oculum utrinque stria nigra; remigum margo
aeneus.

capensis. 4. *C. fusca*, tectricibus nigricantibus: extima exterius albo
fimbriata.
Certhia capitis bonae speci. Briss. av. 3. p. 618. n. 7.

melanura. β. *C. capite dorsoque violaceis, pectore et abdomine virescen-*
tibus, alis fuscis, cauda nigra subbifida, tibiis digitisque
atris. Sparrmann mus. carls. t. 5.
Habitat ad caput bonae speci, reguli magnitudine, 4 polli-
cibus longior.
Rostrum, cauda et pedes nigricant.

olivacea. 5. *C. olivacea*, subtus fusca, orbitis albicantibus.
Certhia olivacea madagascariensis. Briss. av. 3. p. 625. n. 11.
Sovi-manga olive à gorge pourpre. Buff. hist. nat. des ois. 5.
p. 507.

Grimpereau olive de Madagascar. Buff. pl. enlum. n. 375.

f. 1.

Olive creeper. Lath. syn. I. 2. p. 713. n. 14.

Habitat in Madagascar, familiari minor, 4 pollices longa.

Rostrum nigrum; rectrices extimae apice albae; reliquae cum remigibus fuscae, tinctu olivaceo; pedes pallide fuscus.

- carruca- 6. C. olivacea subtus flavescens, rectricibus aequalibus.
ria. Certhia philippensis. Briss. av. 3. p. 615. n. 5. t. 30. f. 3.
Grimpereau gris des Philippines. Buff. hist. nat. des ois. 5.
p. 508. pl. enlum. n. 576. f. 2.

Grey Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 714. n. 15.

Habitat in insulis Philippinis, 4½ pollices longa.

Rostrum validius, quam congeneribus, cum pedibus unguibusque nigrum; lingua apice bifida; stria a mento ad pectus, rectricesque alarum superiores violaceae; remiges fuscae; rectrices nigrae, margine chalybeo, apice albido.

- jugula- 7. C. subgrisea, subtus lutea, gula violacea, rectricibus duabus extimis apice flavis.
ris. Certhia philippensis minor. Briss. av. 3. p. 616. n. 6. t. 33.
f. 5.
- Petit grimpereau des Philippines. Buff. hist. nat. des ois. 5.
p. 509. pl. enlum. n. 576. f. 3.
- Habitat in insulis Philippinis, praecedente minor, 3½ pollices longa; an varietas praecedentis?
- Rostrum, pedes et ungues nigricantes.

- caerulea- 8. C. caerulea, fascia oculari, gula, remigibus rectricibusque nigris. Mus. Ad. Fr. 2. p. 22. Scop. ann. I. p. 53. n. 61.
Certhia cayanensis caerulea. Briss. av. 3. p. 626. n. 12. t. 31.
f. 4.

Avis Hoitzillin, papilio vocata. Seb. mus. I. t. 61. f. 5.

Variété de Guitguit noir et bleu. Buff. hist. nat. des ois. 5.
p. 531.

Certhia of Guiana. Bancr. guj. p. 164.

Blue Creeper. Edw. av. I. t. 21. f. 1. Lath. syn. I. 2. p. 725.
n. 27.

Habitat in Cayenna, nidam retortae forma ex culmis graminum struens, et subtus biantem ex debilium ramiculorum apice suspendens; 4 pollices longa.

- brasilia- 41. C. nigra, vertice viridi-aureo, uropygio, gula, juguloque
na. violaceis, pectore ex purpureo radio,

Certhia

375.

ga.
iquae
fusci.f. 3.
ij. 5.ingui-
id pe-
miges
lbido.

dua-

t. 33.

ij. 5.

polli-

usque
n. 61.

t. 31.

5.

ij. 5.

. 725.

r gra-

muscu-

loque

erthia

Certhia brasiliensis violacea. *Briff. av. 3. p. 661. n. 30. t. 32.*
f. 4.

Guit-guit noir et violet. *Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 541.*

Black and violet Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 730. n. 31.*

Habitat in Brasilia, reguli cristati magnitudine, 3½ pollices longa.

Dorilum inferius, testrices alarum minores, et caudae superiores, margo caudae violacea; femora badia.

variegata. 42. C. caeruleo, nigro, flavo et albo undulata, subtus crocea, vertice rubro, occipite caeruleo.

Certhia americana varia. *Briff. av. 3. p. 665. n. 32.*

Avicula americana, variis coloribus picta. *Seb. mus. 2. t. 3.*
f. 3.

Guit-guit varié. *Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 540.*

Variegated Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 729. n. 30.*

Habitat in America, 5 pollices longa.

Genae et area infraocularis ex caeruleo et albo mixta.

cayana. 9. C. viridis nitida, subtus albo-striata, rectricibus viridibus: lateralibus interius nigricantibus.

Certhia viridis cayennensis. *Briff. av. 3. p. 636. n. 17. t. 33.*
f. 2.

Certhia corpore supino viridi, gula lutea. *Nov. comm. Petrop. 2. p. 430. t. 14. f. 2.*

Guit-guit vert tacheté. *Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 538.*
 Grimpereau vert tacheté de Cayenne. *Buff. planch. entom. n. 682. f. 2.*

Cayenne Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 728. t. 29.*

Habitat in Cayenna, familiaris magnitudine, ultra 4 pollices longa.

Rostrum nigrum; mandibulae inferioris linea utrinque; genae albae; macula prope oculos et gula (mari) rufae; testrices caudae inferiores flavicantes, remiges nigricantes, margine exteriore viridi, interiore grisea; pedes cum unguibus cinerei.

chalybea. 10. C. viridis nitens, pectori rubro: fascia antica chalybea.

Certhia torquata capitis bonae speci. *Briff. av. 3. p. 643.*
n. 20. t. 32. f. 1.

Sovi-manga à collier. *Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 502.*

Grimpereau du cap de bonne esperance. *Buff. pl. entom. n. 246. f. 3.*

Purple indian Creeper. *Edw. glean. t. 265.*

Collared Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 709. n. 10.*

Habi-

Habitat ad caput bonae spei, egregie cantans, insectis et florum nectare vicitans, 4½ pollices longa; an mas capensis?

Rostrum, pedes et unguis nigri; testrices caudae superiores viridi-aureae; inferiores cum abdomine cinereae; remiges griseae; rectrices nigricantes apice griseae, 10 mediae marginé exteriore viridi-aeneae, interiore cinereae.

afr. II. C. viridis, abdomine albo, pectori rubro, uropygio cæruleo.

Sovi-manga vert à gorge rouge. *Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 514.*

Red-breasted green Creeper. *Edw. glean. t. 347.*

African Creeper. *Latham syn. I. 2. p. 717. n. 18.*

β. C. abdomine cinereo, fasciculo plumarum flavarum subalari, lingua apice bifida.

γ. C. mento, gutture et pectori ex purpureo caeruleis, fascia pectorali rubra.

Habitat ad caput bonae spei, cantu luscinae, 4½ pollices longa.

Rostrum obscurum; corporis nitor aureo-aeneus; remiges majores et cauda obscure fuscae; pedes nigri.

Spiza, 12. C. viridis, capite remigibusque nigricantibus.

Motacilla Spiza. Syst. nat. X. I. p. 188. n. 27.

Certhia americana viridis atricapilla. Briss. av. 3. p. 634. n. 16.

Avicula americana altera. Seb. mis. 2. t. 3. f. 4.

Guit-guit vert et bleu à tête noire. *Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 534.*

Black-headed Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 726. n. 28.*

β. Certhia brasiliensis viridis atricapilla. *Briss. av. 3. p. 633. n. 15.*

Guitguit vert et bleu à tête noire, var. I. *Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 535.*

Grimpereau à tête noire du Brésil. *Buff. pl. enlum. n. 578. f. 2.*

Green black-cap Flycatcher. *Bancr. Guj. p. 182. Edw. av. I. t. 25. f. 1.*

Schwarzplattige Spielart des hochbeinigten Bienenfressers. *Merr. Beytr. I. t. 5.*

γ. Certhia brasiliensis viridis. *Briss. av. 3. p. 631. n. 14.*

Grimpereau verd du Brésil. *Buff. pl. enlum. n. 578. f. 1.*

Guit-

- Guit-guit vert et bleu à gorge blanche. *Buff. bist. nat. des ois. 5. p. 536.*
 Blue headed green Fly-catcher. *Edw. av. I. t. 25. f. 2.*
- ♂. C. tota viridis.
 Guit-guit tout vert. *Buff. bist. nat. des ois. 5. p. 527.*
 Grimpereau vert de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 682. f. 1.*
 Allgreen Creeper. *Edw. glean. t. 348.*
Habitat in America meridionali, 5½ pollices longa, rostro, naribus, pedibus meropi affinis.
Caput et gula nigra; in ♂. gula viridis; in ♀. vertex caeruleus, gula alba; ♂. tota viridis.
- sperata, 13. C. purpurea subtus coccinea, capite, gula, uropygioque purpureis.
Certhia philippensis purpurea. Briff. av. 3. p. 655. n. 27. t. 31. f. 2. 3.
 Sovi-manga marron-pourpré à poitrine rouge. *Buff. bist. nat. des ois. 5. p. 497.*
 Grimpereaux des Philippines. *Buff. pl. enl. n. 246. f. 1. 2.*
 Red-breasted Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 706. n. 8.*
- ♀. C. gula violacea.
 Grimpereau troisième de l'isle de Luçon. *Sonner. it. p. 63. t. 30. D.*
 Sovi-manga à gorge violette et poitrine rouge. *Buff. bist. nat. des ois. 5. p. 499.*
Habitat in insulis philippinis, 4 pollices longa, cantu lusciniae.
Rostrum nigrum; basi albicans, lingua furcata brevius; ab dominis pars posterior ex flavicante olivacea; testrices alarum minores violaceae et viridi-aureae, mediae fuscae apice badiae, majores cum remigibus fuscae margine rufae; cauda nigra, nitore chalybeo, margine exteriore violaceo aureo-nitente; pedes cum unguibus fusci; femina supra et infra olivacea.
In ♂. caput pallide virens; dorsum cum testricibus alarum spadicum; uropygium cum cauda chalybeum; caudae testrices inferiores virides.
- senega-lensis. 14. C. nigro-violacea, vertice gulaque viridi-aureis, pectore coccineo.
Certhia senegalensis violacea. Briff. av. 3. p. 660. n. 29. t. 34. f. 2.
 Sovi-manga violet à poitrine rouge. *Buff. bist. nat. des ois. 5. p. 500.*
 Senegal Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 709. n. 9.*

Habi-

*Habitat ad fluvium Senegal, 5 pollices longa.
Rostrum nigrum; juguli, pectorisque pennae basi nigrae,
medio viridi-aureae, apice coccineae; alac et cauda fusca;
pedes cum unguibus nigricantes.*

purpu-
rea.

43. C. tota purpurea.

Certhia virginiana purpurea. *Briff. av. 3. p. 654. n. 26.*
Avis virginiana phoenicea de Atototl dicta. Seb. mus. I.
t. 72. f. 7.
Oiseau pourpré à bec de grimpereau. *Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 526.*
Purple Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 723. n. 25.*
Habitat in Virginia, 4½ pollices longa, egregie cantans.

guttura-
lis.

15. C. nigricans, gutture viridi-nitente, pectore purpureo.
Certhia brasiliensis nigricans. *Briff. av. 3. p. 659. n. 28. t.*
23. f. 3.
Grimpereau brun du Brésil. *Buff. pl. enlum. n. 578. f. 3.*
Oiseau brun à bec de grimpereau. *Buff. hist. nat. des ois. 5.*
p. 525.
Green-faced Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 723. n. 24.*
Habitat in Brasilia, ultra 5 pollices longa.
Rostrum pedesque nigri; frons viridi-aurea; pectoris pen-
nae basi ex atro fuscae, medio ex violaceo virides, apice
rubrae; rectrices alarum minores purpureae.

Pinus.

16. C. flava supra olivacea, alis caeruleis fasciis duabus albis.
Parus americanus. *Briff. av. 3. p. 576. n. 15.*
Figuier des sapins. *Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 296.*
Pine-Warbler. *Arct. zool. 2. p. 412. n. 318. Latham syn.*
II. 2. p. 483. n. 107.
Pine-creeper. *Catesb. carol. I. p. 46. t. 46. Edw. glean.*
t. 277. f. 2.
Habitat aestate in Americae septentrionalis, Carolinae prae-
fertim et Pensilvaniae pinetis, 4½ pollices longa.
Lora nigra; pedes cum rostro fuscii; abdomen et crissum al-
bum; rectrices fuscae, extimae extus albae. Femina zo-
ta fusca.

eruenta-
ta.

17. C. nigro-caeruleo-scapularis, subtus alba, vertice, cervice, dor-
so uropygioque rubris.
Certhia bengalensis. *Briff. av. 3. p. 663. n. 31.*
Sovi-manga rouge, noir et blanc. *Buff. hist. nat. des ois. 5.*
p. 514.

Black,

Black, white and red indian Creeper. *Edw. av. 2. t. 81.*

Red-spotted Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 736. n. 40.*

Habitat in Bengala, 3½ pollices longa.

Roftrum pedesque nigri.

flaveola. 18. C. nigra subtus lutea, superciliis exalbidis, rectricibus extimis apice albis.

Certhia f. saccharivora jamaicensis. *Briff. av. 6. app. p. 117. n. 33.*

Sucrier. *Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 542.*

Black and yellow Creeper. *Edw. av. 3. t. 122. Lath. syn. I. 2. p. 737. n. 42.*

β. Certhia martinicana f. saccharivora. *Briff. av. 3. p. 611. n. 3. t. 34. f. 5.*

Lutcinia f. Philomela e fusco et luteo varia. *Sloan. jam. 2. p. 307. t. 259. Raj. av. p. 187. n. 45.*

Yellow bellied Creeper. *Edw. glean. t. 362. f. 3.*

γ. Certhia bahamensis. *Briff. av. 3. p. 620. n. 8.*

Bahama Titmouse. *Catesb. Car. I. t. 59.*

Bahama Creeper. *Arct. zool. 2. p. 285. n. 175.*

Habitat in insulis Americae mediae vicinis, reguli circiter magnitudine, insectis vivitans, succunque ex sacchari cannis jugens.

sanguinea. 44. C. sanguinea, remigibus caudaque nigris, abdomine obscuro, crrosso albo.

Crimson Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 739. n. 43.*

Habitat in insulis Sandwich, 5 pollices longa.

Roftrum obscurum; remigum secundariarum margo badius; rectrices acuminatae, scapis albis; pedes nigri.

virens. 45. C. olivacea, remigum rectricumque margine flavo.

Olive-green Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 740. n. 44.*

Habitat in insulis Sandwich, 5 pollices longa; an femina Janguineae?

Roftrum pedesque obscuri.

rubra. 46. C. rubra, alis caudaque nigris, crrosso albo.

Scarlet Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 740. n. 45.*

Habitat in insula maris australis, vix 4 pollices longa.

Rofstro, pedibus et unguibus nigris, abdominis parte inferiore alba distincta a coccinea; an satis?

- cinnamomea. 47. *C. cinnamomea* subtus alba.
Cinnamom Creeper. Latham syn. I. 2. p. 740. n. 46.
Rostrum nigrum; cauda c. familiaris; pedes obscuri; longitudo 5 pollicum.
- macassariensis. 48. *C. viridi-aurea*, subtus ex nigricante fusca.
Polytmus indicus. Briff. av. 3. p. 675. n. 6.
Avis Tfioei indica orientalis. Seb. mus. I. p. 100. t. 63. f. 3.
Macassar Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 741. n. 47.
Habitat in insulis Bally et Macassar, 4½ pollices longa.
Rostrum albidum; cauda viridi-aurea; pedes cum unguibus nigri.
- indica. 49. *C. caerulea*, gutture albido.
Polytmus caeruleus indicus. Briff. av. 3. p. 682. n. 10.
Avis colubri orientalis. Seb. mus. 2. p. 20. t. 19. f. 2.
Indian Creeper. Latham syn. I. 2. p. 741. n. 48.
Habitat in India, 4½ pollices longa.
Rostrum pedesque nigri.
- amboinensis. 50. *C. cinerea*, subtus viridis, capite colloque flavis, pectore rubro, alis nigris.
Polytmus amboinenensis. Briff. av. 3. p. 685. n. 12.
Avis amboinenensis, Tfioei vel Kakopit dicta. Seb. mus. 2. p. 62. t. 62. f. 2.
Amboinan Creeper. Latham syn. I. 2. p. 741. n. 49.
Habitat in Amboina, 2¾ pollices longa.
Rostrum flavicans.
- mexicana. 51. *C. rubra*, gutture viridi, remigum apice caerulecente.
Trochilus coccineus. Syst. nat. VI. p. 29. n. 76. 3.
Certhia rubra mexicana. Briff. av. 3. p. 651. n. 24.
Avicula mexicana f. Hoitzillin. Seb. mus. I. p. 70. n. 6.
Oiseau rouge à bec de grimpereau. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 522.
Red Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 721. n. 23.
 β . *Certhia mexicana rubra atricapilla. Briff. av. 3. p. 653. n. 25.*
Avicula de tatac ex nova Hispania. Seb. mus. I. p. 74. t. 70. f. 8.
Colius. Moehring gen. av. 16. p. 36.
Grimpereau rouge à tête noire du Mexique. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 524.
Habitat in nova Hispania, 4½ pollices longa.

Rostrum

Rostrum, femora, pedes et ungues flava; in β. caput nigrum; rectrices alarum superiores aureae.

- cinerea. 52. C. cinerea, uropygio et rectricibus alarum viridibus, remigibus fusco-fuscis, abdomine flavicante, crissu albo, cauda nigra.

Cinereous Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 721. n. 22.*

Habitat ad caput bonaeris specie, 9 pollices longa.

Rostrum linguae aequale, et pedes nigri; mandibulae inferior utrinque stria flavicante; dorsi pars inferior viridis; pectoris et abdominis medio viror admixtus; cauda cuneiformis; rectrices 2 intermediae 2½ pollicibus reliquis longiores.

- pulchella. 19. C. rectricibus duabus intermediis longissimis, corpore viridi-nitente, pectore rubro.

Certhia longicauda senegalensis. *Briss. av. 3. p. 645. n. 21. t. 34. f. 3.*

Avicula amboinensis discolor. *Seb. mus. 2. t. 7. f. 2.*

Sovi-manga vert doré changeant à longue queue. *Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 519.*

Grimpereau à longue queue du Sénégal. *Buff. pl. enlum. n. 670. f. 1.*

Beautiful Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 715. n. 20.*

Habitat ad Senegal fluvium, 7½ pollices longa.

Rostrum, pedes et rectrices nigricantes, hac margine aureae; 2 intermediae 2½ pollicibus reliquis apice rotundatis longiores; abdomini candor admixtus; remiges cum rectricibus alarum majoribus fuscae.

- famosa. 20. C. rectricibus intermediis 2 longissimis, corpore viridi-nitente, axillis luteis, loris nigris.

Certhia longicauda capitis bonaeris specie. *Briss. av. 3. p. 647. n. 22. t. 34. f. 1.*

Trochilus afer. *Syst. nat. X. I. p. 119. n. 2.*

Grand Sovi-manga vert à longue queue. *Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 521.*

Grimpereau à longue queue du cap de bonne esperance. *Buff. pl. enlum. n. 83. f. 1.*

Famous Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 720. n. 21.*

Habitat ad caput bonaeris specie, 9 pollices longa.

Rostrum, pedes cum unguibus, et cauda nigra; rectrices 2 intermediae 2½ pollicibus longiores, et utrinque, reliquaem margine tantum exteriore viridi-aureae; rectrices alarum majores, remigesque nigricantes, margine virides.

- des. Femina ex virente fusca, subtus flavicans, uropygio viridi, alis caudaque ex atro fuscis.
- philippi- 21. C. rectricibus intermediis 2 longissimis, corpore subgriseo
na. virelcente, subtus albo-flavescens.
Certhia philippensis. Briff. av. 3. p. 613. n. 4. t. 30. f. 2.
Grimpereau des Philippines. Buff. pl. enl. n. 576. f. 1.
Grimpereau second de l'isle de Luçon. Sonner. it. t. 30. B.
Philippine Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 711. n. 12.
Habitat in insulis Philippinis, 4 $\frac{1}{2}$ pollices longa.
Rostrum et pedes cum unguibus nigri; lingua tubulosa, fur-
cata; remiges fuscae, margine pallidiores; rectrices 2 in-
termediae nigrae aureo-nitentes; ceterae nigricantes api-
ce albae.
- violacea. 22. C. rectricibus intermediis 2 longissimis, corpore violaceo
nitente, pectore abdomineque luteis.
Certhia longicauda minor capitis bonae spei. Briff. av. 3.
p. 649. n. 23. t. 33. f. 6.
Sovi-manga à longue queue et à capuchon violet. Buff. hist.
nat. des ois. 5. p. 517.
Petit grimpereau à longue queue du cap de bonne esperance.
Buff. planch. enlum. n. 670. f. 2.
Violet-headed Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 718. n. 19.
Habitat ad caput bonae spei, ultra 6 polices longa; nidum
struens artificiosum laxum ex materiis sericeis, curruc-
riae affinis, at rostro longiori.
Rostrum, pedes et unguis nigricantes; dorsum inferius,
uropygium et testrices caudae superiores olivacea; ala-
rum inferiores griseae, superiores majores cum remigibus
fuscae; cauda cuneiformis ex atro fusca.
- seylo- 23. C. pileo viridi, dorso ferrugineo, abdomine flavo, gula
nica. uropygioque azureis.
Certhia philippensis olivacea. Briff. av. 3. p. 623. n. 10.
t. 34. f. 4.
Grimpereau olive des Philippines. Buff. pl. enl. n. 576. f. 4.
Sovi-manga olive à gorge pourpre. Buff. hist. nat. des ois. 5.
p. 506.
Grimpereau premier de l'isle de Luçon. Sonner. it. t. 30. A.
β. C. viridis subtus alba, mento, gula, pectore, dorso ali-
que fuscis, cauda nigra.
Habitat in insulis Philippinis, 4, β. 4 $\frac{1}{2}$ pollices longa.
Rostrum subulatum, nigrum, longitudine capitis; dorsum
ex ferrugineo-olivaceum; remiges fuscae, apicis margine palli-

- pallido; rectrices aequales, nigrantes: extimis 1, 2 apicis margine albido; pedes nigri.*
- cyanæa.** 24. *C. caerulea, fascia oculari, humeris, alis caudaque nigris, pedibus fulcis.*
Certhia brasiliensis caerulea. Briff. av. 3. p. 628. n. 13. t. 31. f. 5.
Avicula de Guit-guit ex insula Cuba. Seb. mus. 1. p. 96. t. 60. f. 5.
Guiracoereba. Marcgr. bras. 212. Raj. av. p. 83. n. 11.
Will. orn. p. 239. c. 20.
Guit-guit noir et bleu. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 529.
Grimpereau du Bréfil. Buff. planch. enlum. n. 83. f. 2.
Black and blue Creeper. Edw. glean. t. 264. f. 1. Lath. syn. I. 2. p. 724. n. 26.
Habitat in Brasilia et Cayenna, 4 $\frac{1}{4}$ pollices longa.
Rostrum, occiput et unguis nigra; lingua rostri longitudine, ciliata; vertex beryllinus; remigum latus interius et rectrices alarum inferiores sulphurea; feminæ alae subtus ex flavicante cinereae.
- Lotenia.** 25. *C. caerulea, fascia pectorali rubro-aurea, loris atris.*
Certhia madagascariensis viridis. Briff. av. 3. p. 641. n. 19. t. 33. f. 4. 5.
Angala-dian. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 510.
Grimpereau verd de Madagascar. Buff. pl. enl. n. 575. f. 2. 3.
Loten's Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 715. n. 16.
Habitat in Madagascar et Zeylon. I. G. LOTEN p. m. Gubernator Zeylon, qui hortum botanicum primus in India condidit, et tot raris avibus me aliquosque dotavit.
Nidum sicut forma calycis ex lanagine plantarum, 5 - 6 ova pariens, ab araneæ specie aliquando expulsa, 5 $\frac{1}{4}$ pollices longa, colore varians.
Rostrum subulatum nigrum, capite duplo longius; lingua apice compressa; caput, collum, dorsum, uropygium, rectrices caudae superiores alias caeruleo-nitentia, alias viridi-aurea; pectus, abdomen et crissum splendide nigra, in femina sordide alba, nigro maculata, rarius abdomen fuscum; fascia pectoralis ignita vel violacea; rectrices aequales, remigesque nigrae; rectrices alarum minores violaceae, mediae viridi-aureae, majores nigrae, margine exteriori viridi-aureae.
- omnico-** 53. *C. viridis, omnis generis coloribus intermixta.*
lor. *Avis zeylonica omnicolor. Seb. mus. 1. t. 69. f. 5.*
Falcinellus omnicolor zeylanicus. Klein ord. av. p. 107. n. 8.
Greengold Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 716. n. 17.

Hh 2

Habi-

Habitat in Zeylon, 8 fere pollices longa, ab araneae majori specie infestata.

Nitor aureus; rostrum 1½, cauda 2½ pollices longa.

- caffra.* 54. *C. fusca, pectore abdomineque pallidis, rectricibus intermediis longioribus. Mantif. pl. alt. p. 525.*
Habitat ad caput bonae spei, turdi magnitudine, et rostro duplo longiori.
Rostrum nigrum, parum compressum, nonnihil incurvum; gula pallida, pilis nigris hirsuta; uropygium ex flavescente virescens; crissum flavissimum; cauda nigra, cuneata, longitudine corporis; rectricibus quatuor mediis triplo longioribus, intermediis 2 longissimis; remiges nigræ.

66. TROCHILUS. *Rostrum subulato-filiforme, apice tubulato, capite longius: mandibula superior vaginans inferiorem.*

Lingua filiformis, filis duobus coalitis tubulosa.

Pedes ambulatorii.

* *curvirostres.*

- paradi-* 1. *Tr. ruber, alis caeruleis, capite cristato, rectricibus interfeus.* mediis longissimis.
Polytmus mexicanus longicaudus ruber cristatus. Briff. av. 3. p. 692. n. 16.
Mellivora avis cristata cum duobus pennis longis in cauda. Seb. mus. I. p. 97. t. 61. f. 4.
Colibri huppé. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 54.
Paradise Humming Bird. Lath. syn. I. 2. p. 745. n. 1.
Habitat in nova Hispania, 8½ pollices longa.
Rostrum pedesque nigri; remiges testricesque alarum caeruleæ.
- galeri-* 23. *Tr. viridi-aureus, remigibus rectricibusque fuscis, crista purpurea. Mol. hist. nat. Chil. p. 219.*
Habitat in regno Chileni.
Corpus subtus colore aurorae; collum dorsumque viridia; tota avis auri nitore resplendet.
- exilis,* 24. *Tr. ex virescente fuscus, coccineo nitens, remigibus caudaque nigris, crista basi viridi apice aurea.*
Hummingbird of a black colour. Baner. Guj. p. 166.

Little

- Little Hummingbird. *Lath. syn.* I. 2. p. 764. n. 29.
Habitat in Guiana, $1\frac{1}{2}$ pollices longa, et vix 50 grana pondere aequans.
Rostrum nigrum.
- Pella. 2. Tr. ruber, rectricibus intermediis longissimis, capite fusco, gula aurata uropygoque viridi. *Polytmus surinamensis longicaudus ruber.* *Briff. av.* 3. p. 690. n. 15.
 Grand Colibri. *Fermín Surin.* 2. p. 195.
 Colibri topaze. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 46.
 Colibri de Cayenne, dit le Topaz. *Buff. pl. enlum.* n. 599. f. 1.
 Long-tailed red Hummingbird. *Edw. av.* I. t. 32.
 Topaz Hummingbird. *Lath. syn.* I. 2. p. 746. n. 2.
Habitat in Surinamo, 6 pollices circiter longus.
Rostrum, caput et cervix nigra; pectus roseum; dorsum testricesque alarum ex aurantio rubent; rectrices et intermediae rectrices purpureae; reliquae aurantiae; femina fere tota viridi-aurea.
- superciliosus. 3. Tr. fuscus nitens, rectricibus intermediis longis, abdomine subincarnato, superciliis albis. *Polytmus cayanensis longicaudus.* *Briff. av.* 3. p. 686. n. 13. t. 35. f. 5.
 Brin blanc. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 49.
 Colibri à longue queue de Cayenne. *Buff. pl. enl.* n. 600. f. 3.
 Supercilious Hummingbird. *Lath. syn.* I. 2. p. 747. n. 3.
Habitat in Cayenna, 6 pollices non adsequens.
Rectrices 2 intermediae pollice reliquis longiores media parte fuscus nitentes, altera alba; reliquae basi fuscae, altera parte nigrae, apice nigro, albo marginato; pedes et unguis fuci.
- cyanurus. 25. Tr. viridis, subtus cinereus, fronte, gutture, rectricibus que duas intermediis longioribus caeruleis.

H h 3

Polyt-

Trochili, aviculas omnium minima, in sola America, et si duas excipias, quae versus septentrionalem migrant, sola meridionali obviae, pedibus rostroque debilibus, naribus minutis, lingua emissili, rectricibus caudae 10, coloribus nitidissimis conspicuae; audaces et pugnaces, volando velocissimae, suspensae in aere vietum capiunt, nectar e floribus fugentes, insecta quoque deglutiunt, quorum quippe reliquias in ventriculo invenit Cl. Brandis; alarum motu magis sonorae, quam vox, gregariae, nidum hemisphaericum ex lanugine thapsi eleganter struunt, et ab arborum ramis inter folia latenter suspendunt; ova 2 alba, pisces magnitudine parvunt, quibus mas et femina alternativim incubant; iuniores ab araneis infestatae, ab America incolis picturis adhibitae; aqua e siphone explosa humectatae capiuntur; hybernare traduntur.

- Polytmus mexicanus longicaudus. *Briss. av. 3. p. 688. n. 14.*
Avis Yayaquirototl. Seb. mus. I. p. 84. t. 51. f. 7.
Blue tailed Hummingbird. Lath. syn. I. 2. p. 749. n. 5.
Brin bleu. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 51.
Habitat in nova Hispania, ficedulae magnitudine, 8 $\frac{1}{4}$ pollices longus.
Rostrum flavicans; rectrices, quo extiores, eo breviores; intermediae extimis ultra 2 pollices longiores; pedes flavi.
- Polytmus. 4. Tr. virescens, rectricibus lateralibus longissimis, pileo rectricibusque fulcis.
 Polytmus viridans, aureo varie splendens, pennis binis uropygii longissimis. *Brown. jam. 475.*
Melliluga jamaicensis atricapilla, cauda bifurca. Briss. av. 3. p. 729. n. 19.
Oiseau-mouche à longue queue noire. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 39.
Longtailed Hummingbird. Alb. av. 3. t. 49.
Longtailed black cap Hummingbird. Edw. av. I. t. 34. Bancr. Guj. p. 169.
Black capped Hummingbird. Lath. syn. I. 2. p. 748. n. 4.
Habitat in Jamaica et America australi, 9 $\frac{1}{2}$ pollices longa.
Rostrum flavum, apice nigrum; irides flavae; cervix nigra; alarum margo albus; rectrices alarum, remigesque ex violaceo fuscae; cauda bifurca, rectricibus inaequalibus, nigricantibus; pedes nigri.
- forficatus. 5. Tr. viridis, rectricibus lateralibus longissimis, pileo rectricibusque caeruleis.
 Polytmus major nigricans aureo varie splendens, pennis binis uropygii longissimis. *Brown. jam. p. 475.*
Mellisuga jamaicensis, cauda bifurca. Briss. av. 3. p. 728. n. 18.
Oiseau-mouche à longue queue, or, vert et bleu. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 38.
Long tailed green Hummingbird. Edw. av. I. t. 33.
Forktailed Hummingbird. Lath. syn. I. 2. p. 750. n. 6.
Habitat in Jamaica, ultra 7 pollices longus.
Rostrum, pedesque nigri; corpus subtilis album; remiges ex violaceo fuscae, 3 corpori proximae viridi-aureae; rectrices extimae 3 pollicibus longiores, reliquae, quo extiores, eo breviores.
- furcatus. 26. Tr. viridi aureus, rectricibus extimis longioribus, dorso superiore, pectore et rectricibus alarum minoribus splendide violaceis, aliis caudaque nigris.

Melli-

- Mellisuga jamaicensis violacea cauda bifurca. *Briff. av. 3.*
p. 732. n. 20. t. 37. f. 6.
- Oiseau-mouche violet à queue fourchue. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 37.*
- Lesser fork-tailed Hummingbird. *Lath. syn. I. 2. p. 751. n. 7.*
Habitat in Jamaïca, Brasilia et Cayenna, 4 pollices longus.
Rostrum nigrum; rectrices extimae $1\frac{1}{2}$ pollices longae; pedes cum unguibus nigricantes.
- macrou- 27. Tr. viridi-aureus, capite et gutture violaceis, abdominis
 rus. area alba, cauda bifurca chalybea.
Mellisuga cayenensis, cauda bifurca. Briff. av. 3. p. 726.
n. 17. t. 36. f. 9.
- Mellivora avis maxima. *Sloan. jam. 2. p. 309. t. 264. f. 4.*
Raj. av. p. 83. n. 3.
- Guainumbi. *Marcgr. bras. 197. Raj. av. p. 187. n. 41.*
Will, orn. p. 231. n. 3.
- Oiseau-mouche à longue queue couleur d'acier bruni. *Buff.*
hist. nat. des ois. 6. p. 36.
- Cayenne forktailed Hummingbird. *Lath. syn. I. 2. p. 751. n. 8.*
Habitat in Jamaïca, 6 pollices longus.
Rostrum pedesque nigri; rectrices extimae $3\frac{3}{4}$, intermediae
 $1\frac{1}{4}$ pollices longae.
- purpura- 28. Tr. viridis, vertice, alis caudaque bifurca purpureis, tor-
 tus. que caeruleo.
Purple-crowned Honey-sucker. Gen. of birds, p. 63. t. 8. f. 2.
Purple crowned Hummingbird. Lath. syn. I. 2. p. 764. n. 27.
- auratus. 29. Tr. viridi-aureus, mento, gutture et pectore rubro-aurcis,
 abdomine nigro.
Garnet-throated Hummingbird. Latham syn. I. 2. p. 752.
n. 9. t. 34.
- $\beta.$ Tr. genis nucha gulaque rubro-aureis, capite et corpore
 nigris viridi-nitentibus.
Grenat. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 48.
Longitude $4\frac{1}{4}$, in $\beta.$ 5 pollicum; rostrum pedesque nigri;
feminae mentum, guttur et pectus viridi-aurea.
- leucurus. 6. Tr. viridi-aureus, rectricibus aequalibus albis, collari rubro.
Polytmus surinamensis. Briff. av. 3. p. 674. n. 5.
Collier rouge. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 59.
Colibri à collier de Surinam. Buff. pl. enl. n. 600. f. 4.
White-tailed Hummingbird. Edw. glean. t. 256. Latham
syn. I. 2. p. 757. n. 17.

Hh 4

Habi-

Habitat in Surinam, 4½ pollices longa.

Rostrum et pedes nigri; corpus subtus ex griseo album; alae obscure purpureae; rectrices 8 exteriores albae, extimae 2 apice nigricantes.

grami-
neus.

30. Tr. viridi aureus, subtus albus, gutture smaragdino, pectori nigro, cauda purpurea.

Hausse col vert. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 58.

Black-breasted Hummingbird. Lath. syn. I. 2. p. 756. n. 16.

Feminae in pectore areae duae albae.

viola-
ceus.

31. Tr. violaceus, alis caudaque viridi-aureis.

*Polytmus cayennensis violaceus. Briss. av. 3. p. 683. n. II.
t. 35. f. 3.*

Colibri violet. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 57.

Colibri violet de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 600. f. 2.

Violet Hummingbird. Lath. syn. I. 2. p. 756. n. 15.

Habitat in Cayenna, 4½ pollices longus.

Rostrum pedesque nigri.

macula-
tus.

32. Tr. viridi-aureus, subtus albus, colli lateribus rufis, maculis colli viridi, pectoris nigra, caudae subtus violaceis, albis et fuscis.

Colibri à cravate verte. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 56.

Colibri à gorge verte de Cayenne. Buff. pl. enl. 671. f. 1.

Green-throated Humming bird. Lath. syn. I. 2. p. 755. n. 14.

Magnitudo punctulata.

punctu-
latus.

33. Tr. viridi-aureus, gutture et testicibus alarum albo-maculatis, remigibus ex violaceo fuscis, cauda ex virescente fusca apice alba.

Polytmus punctulatus. Briss. av. 3. p. 669. n. 2.

Hoizitziltototl. Fern. hist. mex. p. 705.

Zitzil ou colibri piqueté. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 50.

Spotted Hummingbird. Lath. syn. I. 2. p. 755. n. 13.

Habitat in nova Hispania, 5½-6 pollices longus.

Rostrum et pedes cum unguibus nigri.

albus.

34. Tr. viridi-aureus, subtus, ad latera colli, et rectricum 6 exteriorum apices albus, cauda violacea.

Colibri à queue violette. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 55.

Colibri à queue violette de Cayenne. Buff. planch. enlum. n. 671. f. 2.

Violet tailed Hummingbird. Lath. syn. I. 2. p. 754. n. II.

Habitat in Cayenna, 6 pollices longus.

Remiges ex violaceo fuscae; pedes obscuri.

7. Tr.

- jugula- 7. Tr. caeruleo-scapularis, rectricibus aequalibus, collo subtus sanguineo.
ris. Colibri à gorge carmin. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 56.
Red-breasted Humming-bird. *Edw. glean.* t. 266. f. 1.
Lath. syn. I. 2. p. 753. n. 10.
Habitat in Surinamo, $4\frac{1}{2}$ pollices longus.
Rostrum, vertex, occiput, abdomen, femora, cauda nigra;
pennarum margine caeruleo; tempora splendide rubra;
alae virides nitore aureo; uropygium caeruleum; pedes
breves nigricantes.
- auran- 35. Tr. fusca, capite aurantio, gula et pectore flavis, alis
tius. purpureis, cauda ferruginea.
Orange-headed Honey-sucker. *Gen. of birds* p. 63. t. 8. f. 3.
Orange headed Humming-bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 764. n. 28.
- flavi- 36. Tr. viridis fronte flava remigibus primariis caudaque nigris.
frons. Yellow fronted Honey-sucker. *Gen. of birds*, p. 62. t. 8. f. 1.
Yellow-fronted Humming-bird. *Latham syn.* I. 2. p. 763.
n. 26.
- Thau- 8. Tr. viridis nitens, rectricibus aequalibus albo-fimbriatis:
mantias. extima exterius alba.
Polytmus. *Briff. av.* 2. p. 667. n. 1.
Avicula americana, Colubris. *Seb. mus.* I. t. 59. f. 5.
Guanumbi 6 species. *Marcgr. bras.* 197. *Raj. av.* p. 83.
n. 6. *Will. orn.* p. 232. n. 6.
Colibri. *Buff. pl. enlum.* n. 600. f. 1.
Petit Colibri. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 64.
Admirable Humming-bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 763. n. 25.
Habitat in America meridionali, parum ultra $2\frac{1}{2}$ pollices
longus.
Rostrum mandibula superior cum pedibus et unguibus nigra;
inferior alba; alae fuscae; in abdome inferiore macula
alba; rectrices 2 intermediae totae viridi-aureae.
- domini- 9. Tr. viridis nitens, subtus subcinereus, rectricibus medio
-cus. ferrugineis, apice albis.
Polytmus dominicensis. *Briff. av.* 3. p. 672. n. 4. t. 35. f. 4.
Vert perlé. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 62.
St. Domingo Humming-bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 762. n. 24.
Habitat in insula S. Dominici, vix ultra 4 pollices longus.
Rostrum pedesque fusci; color subtus margaritaceus; alae
fuscae, tintæ violaceo admisto; cauda subtus colore cha-
lybis politi.

- venustif- 37. Tr. ruber, dorso caeruleo, alis nigris.
fimus. *Polytmus mexicanus cyaneus. Briss. av. 3. p. 681. n. 9.*
Avicula mexicana cyaneo colore venustissima. Seb. mus. I.
p. 102. t. 65. f. 3.
Gros Colibri. du Tertre antill. 2. p. 263.
Colibri bleu. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 61.
Crimson-headed blue Humming-bird. Latham syn. I. 2.
p. 762. n. 23.
Habitat in nova Hispania, regulo dimidio minor.
- margari- 38. Tr. viridi-aureus, subtus margaritaceus, cauda basi cha-
taccus. lybea, medio ex purpureo fusca, apice alba: fascia ex
atro fusca.
Plastron blanc. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 61.
Colibri de St. Domingue. Buff. pl. entom. n. 680. f. 1.
Grey-necked Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 761. n. 22.
Habitat in insula S. Dominici, 4 pollices longus.
- hirsutus. 39. Tr. viridi-aureus, subtus ex rufo albus, remigibus ex vio-
laceo fusco, cauda nigricante apice alba, pedibus hirsutis.
Polytmus brasiliensis. Briss. av. 3. p. 670. n. 3.
Guainumbi 4ta species. Marcgr. bras. p. 197.
Guainumbi minor, rostro incurvo. Raj. av. p. 83. n. 4.
Will. orn. p. 232. n. 4.
Colibri à ventre roussâtre. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 63.
Rufous-bellied Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 760. n. 21.
*β. Trochilus subtus rufus, rectricibus obscuris, exterioribus
altera parte rufis.
Habitat in Brasilia, 3½-4 pollices longus.*
*Rostri mandibula superior nigra, inferior flava apice nigra;
pedes ad digitos usque pennati ochroleuci; digitii nigri.*
- multico- 40. Tr. fuscus subtus miniatus, vertice, mento, pectore et
lor. dorsi medio viridibus, fascia oculari caerulea, cauda ae-
quali.
Harlequin Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 760. n. 20.
*Longitudo 4½ pollicum; fascia a rostro per oculos ad nucham
usque, parte inferiore nigro marginata.*
- cinereus. 41. Tr. viridis nitens subtus cinereus, remigibus fuscis, cau-
dae rotundatae rectricibus 2 intermediis totis viridibus,
proximis duabus nigris, reliquis altera parte chalybeis,
altera albis.
Ash bellied Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 759. n. 19.
Longitudo 6 pollicum; rostrum pedesque nigri.

IO. Tr.

- Mango. 10. Tr. viridis nitens, rectricibus subaequalibus ferrugineis, abdome atro.
Polytmus jamaicensis. Briss. av. 3. p. 679. n. 8. t. 35. f. 1.
Guainumbi 5 species. Maregr. bras. 197.
Guainumbi minor, rostro nigro. Raj. av. p. 83. n. 5. Will. orn. p. 252. n. 5.
Plastron noir. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 59.
Colibri de la Jamaïque et Colibri du Mexique. Buff. planch. enlum. n. 680. f. 3. 2.
Mango Humming-bird. Alb. av. 3. t. 49. b. Lath. syn. I. 2. p. 758. n. 18.
- β. *Mellivora avis maxima. Raj. av. p. 187. n. 43. Sloan. jam. 2. p. 308. t. 264. f. 3.*
Habitat in nova Hispania, Brasilia, insulisque S. Dominici et Jamaica, 4 pollices et ultra longus, nidum ex gossypio struens.
Corpus subtus nigrum, colore hoc per intermediam lineam caeruleam a virendine separato; crissum album; remiges ex violaceo fuscae, rectrices 2 intermediae, pedesque nigri: Aliquando gutturi album.
In β. corpus supra ex nigricante virens, pennis ad apicem aeneo-marginatis; mentum, guttur et pectus splendide purpurea, pteria media nigra; abdomen obscurum; crissum utrinque fasciculo pennarum albarum stipatum; rectrices 2 intermediae obscure virides; reliquae purpureae, apice nigrae.
- holoseri- 11. Tr. viridis, rectricibus aequalibus supra nigris, fascia pe-
 ceus. *ctorali caerulea, abdome nigro.*
Polytmus mexicanus. Briss. av. 3. p. 676. n. 7. t. 35. f. 2.
Avis auricoma mexicana. Seb. mus. I. t. 99. f. 4.
Colibri vert et noir. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 53.
Black-bellied green Humming-bird. Edw. av. I. t. 36.
Black-bellied american Humming-bird. Bancroft Guj. p. 169.
Black-bellied Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 754. n. 12.
Habitat in nova Hispania et Guiana, 4½ pollices longus.
Rostrum, cauda, pedesque nigri; caput, collum, et supra corpus viridi-aurea; abdominis fascia alba, aut utrinque areae duae albæ.
- gularis. 42. Tr. flavescens, gula uropygoque caeruleis, abdome albo, alis caudaque nigris. *Miller illusir. t. 20. A.*
Habitat in India?

43. Tr.

fulvus. 43. Tr. fulvus, remigibus rectricibusque atris subtus fuscis centibus. Maerter phys. Arb. der eintr. Fr. zu Wien. I. I. p. 76.

Habitat in America meridionali, crassitie fringillae, ultra 5 polices longus.

Rostrum pedesque corniei; cauda 2 circiter pollices longa, rectricibus 12 constans, an ideo cum sequente ad certhiae forsan genus spectat?

varius. 44. Tr. viridi-aureus, subtus ex fusco albicans, fascia pectoralis duplici ex viridi cyanea et sanguinea. Maerter phys. Arb. der eintr. Fr. zu Wien, I. I. p. 75.

Habitat in America meridionali, pollicis humani crassitie, 4½ pollices circiter longus.

Rostrum pedesque nigri; remiges pallide fuscae; tectrices caudae superiores ex viridi cyaneae; rectrices 12, 1½ pollices longae, fuscae viridi adumbratae, omnium, exceptis intermediis, apice albido.

* * rectirostris.

capensis. 66. Tr. viridi, rectricibus intermediis longis, tectricibus alarum caeruleis. Mantiss. pl. alt. 2. p. 525.

Habitat ad caput bona Ipe, hirundinis rusticae magnitudine, sericeo nitens.

Remiges rectricesque nigrae; haec aequales, praeter intermedias triplo longiores, margine baseos sericeo-viridi; crissum nigrum cyaneo maculatum.

Colubris. 12. Tr. viridi-aureus, rectricibus nigris: lateralibus tribus ferrugineis apice albis, gula flammacea.

Mellisuga carolinensis, gutture rubro. Briss. av. 3. p. 716. n. 13. t. 36. f. 6. 5.

Tomineio mariana virescens, gutture flammeo. Pet. gaz. t. 3. f. 8.

Passer muscatus. Gesn. av. 655.

Guainumbi I. Marçgr. bras. 196. Will. orn. 165. Raj. av. p. 82. n. 1.

Rubis. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 13.

Humming-bird. Catesb. Carol. I. p. 65. t. 65.

Red-throated Humming-bird. Edw. av. I. t. 38. Lath. syn. I. 2. p. 769. n. 35.

Red-throated Honey-sucker. Arct. zool. 2. p. 286. n. 176.

Tomineo. β. Tr. rectricibus subaequalibus basi ferrugineis apice albis, corpore supra fulvo subtus albido. Mus. Ad. Fr. 2. p. 23.

Ourisia I. Tomineo. Clus. exot. 96.

Habi-

- fuscesc.
Wien.
ultra 5
longa,
erthiae
pecto-
r phys.
assitie,
ctrices
 $\frac{1}{2}$ pol-
excep-
- us ala-
gnitu-
terme-
; crif-
tribus
. 716.
t. gaz.
Raj.
Lath.
t. 176.
albis,
p. 23.
Habi-
- Habitat in America, etiam septentrionali, ad Canadam usque, hieme tamen appropinquante in meridionalem redux, 3½ pollices longus.*
- Rostrum nigrum, ¾ pollices longum; mentum et gula coccinea, cum nitore vivacissimo aureo, in femina alba.*
- 45.** Tr. viridi-aureus, subtus griseus, cauda chalybea apice grisea, pectoris pennis albo fimbriatis.
Mellisuga cayenensis gutture naevio. Briff. av. 3. p. 706. n. 7. t. 36. f. 2.
Oiseau-mouche à gorge tachetée. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 31.
Oiseau-mouche tacheté de Cayenne. Buff. planch. enlum. n. 276. f. 2.
Spotted-necked Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 772. n. 36.
- β.** Tr. subtus albus, pectoris pennis griseo-marginatis, cauda tota ex virefcente nigra.
Habitat in Cayenna, 4 pollices longus.
Rostrum mandibula superior nigra, inferior albicans, apice nigra; rectrices 2 intermediae splendore aeneo; pedes cum unguibus nigri.
- 46.** Tr. viridi-aureus, gula rubro-aurea, alis caudae rufis.
Oiseau-mouche à gorge rouge du Brésil. Buff. pl. enlum. n. 276. f. 4.
Rubis emeraude. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 31.
Mellisuga brasiliensis gutture rubro. Briff. av. 3. p. 720. n. 14. t. 37. f. 4.
Ruby-throated Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 768. n. 34.
Habitat in Brasilia et Guiana, 4½ pollices longus.
Rostrum, pedes et unguis nigri; rectrices alarum majores, remigesque margine ex violaceo fuscae; rectrices margine ex viridi-aureo fuscae, intermediae reliquis breviores.
- 47.** Tr. viridi-aureus subtus albus, fascia infraoculari nigra, fasciculis (in mare) utrinque infra aures duobus pennarum violacearum, pedibus hirsutis.
Mellisuga cayenensis major. Briff. av. 3. p. 722. n. 15. t. 37. f. 3.
Oiseau-mouche à oreilles. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 32.
Violet-eared Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 767. n. 33.
β. Tr. fascia infraoculari purpurea, prope aures terminata area magna, infra quam macula alia ex viridi caerulea.
Habitat in Cayenna, 4½ fere pollices longus.
Rostrum pedesque nigri; femora fusca; rectrices 4 intermediae nigrae, in caeruleum vergentes, reliquae albae; pennae

pennae fasciculorum 5 - 6, reliquis moliores et duplo longiores.

Ourissia. 13. Tr. viridi-auratus, rectricibus subaequalibus fusco-aureis, remigibus nigris, abdomine caeruleo.

Mellisuga surinamensis, pectore caeruleo. Briff. av. 3. p. 711. n. 10.

'Emeraude-amethyste. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 27.

Oiseau-mouche à poitrine bleue de Surinam. Buff. pl. enl. n. 227. f. 3.

Green and blue Humming-bird. Edw. av. I. t. 35. f. 2. Lath. syn. I. 2. p. 767. n. 32.

β. Tr. viridis, subtus caeruleus, menti macula aurantia, remigibus caudaque obscuris.

Habitat in Surinamo, vix 4 pollices longus.

Rostrum, pedes et unguis nigri; pectus, dorsum et abdominis pars superior caerulea; abdominis pars inferior, alas et cauda fuscae.

moschi- 14. Tr. viridi-aureus, rectricibus aequalibus ferrugineis: extimus apice fuscis, remigibus nigris. Syft. nat. X. I. p. 120. n. 8. 12. Mus. Ad. Fr. 2. p. 24.

Mellisuga brasiliensis, gutture topazino. Briff. av. 3. p. 699. n. 3. t. 37. f. 1.

Avis Colubri Thaumantias. Seb. mus. I. p. 61. t. 37. f. 4.

Guainumbi 8 species. Marcgr. bras. 197. Will. orn. p. 232. n. 8. Raj. av. p. 83. n. 8.

Colibri Nr. 3. Fermin Surin. 2. p. 196.

Rubis-topaze. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 19.

Oiseau-mouche à gorge topaze du Brésil. Buff. pl. enlum. n. 227. f. 2.

Trochilus with a ferruginous tail. Bancr. Guj. p. 168.

Ruby-necked Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 779. n. 46.

Habitat in Guiana, Brasilia, Surinamo, Curacao, 4 lineas ultra 3 pollices longus.

Rostrum, pedes et unguis nigriscant; vertex et occiput colore rubini; guttur topazii; corpus subtus fuscum, qui tintetur etiam supra admisitus; femina subtus ex griseo albicans, area ad pectus et jugulum aurea.

mellisu- 15. Tr. viridi-aureus, rectricibus aequalibus caeruleis, remigibus atro-caerulecentibus, tibiis pennatis. Mus. Ad. Fr. 2. p. 23.

Mellisuga cayanensis. Briff. av. 3. p. 704. n. 6. t. 36. f. 3. Colubri s. Florisuga. Seb. mus. 2. p. 42. t. 41. f. 2. 4.

Guai-

- Guainumbi 9 species. *Marcgr. bras.* 197. *Will. orn.* p. 232.
n. 9. Raj. av. p. 83. n. 9.
 Vert-doré. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 29.
 Oiseau-mouche de Cayenne. *Buff. pl. enlum.* n. 276. f. 3.
Habitat in Cayenna, 2 pollices et 10 lineas longus.
 Rostrum, digiti et unguis nigri; rectrices caudae inferiores
 et crura ex griseo fuscæ; tibiae fuscæ.
- Pegasus. 16. Tr. rectricibus basi virescentibus, corpore virescente au-
 reo, subtus subgriseo, tibiis pennatis.
Mellisuga cayanensis, ventre griseo. *Briff. av.* 3. p. 709.
n. 9. t. 36. f. 4.
 Grey-bellied Humming-bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 778. n. 44.
Habitat in Cayenna; an varietas leucogastræ?
 Rostrum, digiti et unguis nigri; rectrices aequales nigro-
 purpureæ, lateralium apice griseo.
- leucoga- 48. Tr. viridi-aureus, subtus albus, cruribus fuscis, cauda nigra.
 ster. *Mellisuga cayanensis* ventre albo. *Briff. av.* 3. p. 707. n. 8.
t. 36. f. 7.
 Guainumbi 1 species. *Marcgr. bras.* 197. *Raj. av.* p. 82.
n. 1. et p. 187. n. 49. Will. orn. p. 231. n. 1.
 Cravate dorée. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 25.
 Oiseau-mouche à cravate dorée de Cayenne. *Buff. planch.*
enlum. n. 672. f. 3.
 Gold-throated Humming-bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 777. n. 43.
Longitudo 3½ pollicum; rostri mandibula superior nigra, in-
terior alba, apice nigra; cauda nitore chalybis; pedes et
ungues nigri.
- striatus. 49. Tr. fuscus, subtus albus: stria longitudinali viridi-aurea,
 pileo fuso, remigibus nigris, caudae basi cinnamomea,
 apice obscuro.
 Brown-crowned Humming-bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 776.
n. 42.
Habitat in insula Tobago, 3-4 pollices longus.
Rostrum et pedes nigri; nonnunquam stria longitudinalis
fuscæ aut obscura; rectrices duæ intermediae ex caeruleo
atrae; reliquæ rufæ, extrema tertia parte atrae, apice
supra albae.
- obscurus. 50. Tr. caeruleus, vertice obscuro, mento et gutture viridi-
 nitentibus, dorsi medio virescente, uropygio, alis cauda-
 que purpureis.
 Dusky-crowned Humming-bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 776.
n. 41.

Longi-

Longitudo 4 $\frac{1}{4}$ pollicum; rostrum obscurum; tectrices alarum ex purpureofuscante caeruleo; dorsi pars inferior obscure purpurea; pedes nigri.

- bicolor. 51. Tr. smaragdino-aurēus, capite gulaque cyaneis.
Colibri Nr. 2. *Fermin surin.* 2. p. 195.
Saphir-émeraude. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 26.
Sapphire-and Emerald-Humming-bird. *Latham syn.* I. 2. p. 775. n. 40.
Habitat in Guadeloupe, mediae magnitudinis.
- sapphiri- 52. Tr. viridi-aureus, jugulo et pectore sapphirinis, alis et
nus. tectricibus caudae superioribus fuscis, inferioribus, cauda
ipla et gula rufis.
Saphir. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 26.
Sapphire Humming-bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 775. n. 39.
β. Tr. pectore sapphirino, ventre albo, cauda ex caeruleo atra.
Habitat in Guiana.
Rostrum album, apice nigrum; abdominis pars inferior alba.
- niger. 17. Tr. rectricibus subaequalibus, corpore nigro subtus auro-
ato, crasso albo, tibiis pennatis. *Mus. Ad. Fr.* I. p. 18.
Mellisuga dominicensis. *Briss. av.* 3. p. 702. n. 5. t. 36. f. 8.
Black Humming-bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 774. n. 38.
Habitat in insula S. Dominici, 2 $\frac{1}{4}$ pollices longus, an femina mellifugi?
Rostrum, digiti et unguis nigri; corpus subtus ex albicante
griseum; gula maculis minutis fuscis; cauda chalybea.
- cyanoce- 53. Tr. viridi-aureus, capite, remigibus rectricibusque caeruleis,
phalus. ab domine rubro. *Molin. hist. nat. Chil.* p. 218.
Habitat in Chili, nucis juglandis magnitudine.
Rostrum albidum; alis caudaeque corpore triplo longiori ad-
mixta purpura.
- amethy- 54. Tr. viridi-aureus, subtus ex cinerascente et fusco varius,
stinus. gutture amethystino, cauda furcata.
Petit oiseau-mouche à queue fourchue de Cayenne. *Buff.*
pl. enlum. n. 672. f. 1.
Amethyste. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 16.
Amethystine Humming-bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 787. n. 59.
Habitat in Cayenna, colubris magnitudine.
Alae breves.
- viridissi- 55. Tr. viridi-aureus, ab domine albo, cauda chalybea.
mus. Or-ver, *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 17.

All.

alarum
obscure

yn. I. 2.

alis et
, cauda

39.
eo atra.

or alba.

us aura-

9. 18.

36. f. 8.

5.

in femi-

lbicante
ybea.

e caeru-

218.

iore ad-

varius,

Buff.

7. n. 59.

a.

All.

All-green Humming-bird. *Edw. glean. t. 360. f. 1.* *Lath.*
syn. I. 2. p. 786. n. 58.

Habitat in insula Tobago, 2 pollices longus.

glauco- 56. Tr. viridi-aureus, fronte caerulea, crisso albo, remigibus
pis. ex violaceo fuscis, pedibus pennatis, cauda chalybea sub-
furcata.

Mellisuga brasiliensis cauda bifurca. Briff. av. 3. p. 724.
n. 16. t. 36. f. 5.

Guainumbi major. Raj. av. p. 82. n. 2.

Marégrave's second Humming-bird. Will. orn. p. 231. n. 2.
Blue-fronted Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 786. n. 57.

Habitat in Brasilia, 4½ pollices longus.
Rostrum nigrum; crura, tibiae, et digitii fusca.

rufus. 57. Tr. rufus subtus exalbidus, vertice viridi-aureo, gurgite
et pectore coccineo-aureis, remigibus ex purpurascente
fuscis.

Ruffed Honey-sucker. Arct. zool. 2. p. 290. n. 177.

Ruffnecked Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 785. n. 56.
t. 35.

Habitat in sinu Americae Natka, 3½ pollices longus.

*Rostrum pedesque nigri; colli pennae laterales nonnullae
elongatae mobiles; rectrices alarum obscure virescentes;
rectrices splendide rufae acuminatae: linea media longi-
tudinali et apice nigris; cauda cuneata.*

*Feminae corpus supra viridi-aureum; gula maculis modo
coccineis.*

ornatus. 58. Tr. viridi-aureus, subtus nitente-fuscus, fascia uropygii
alba, crista (in mare) verticis et fasciculo pennarum infra
aures utrinque rufo.

Hupecol. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 18.

Oiseau-mouche, dit Hupecol de Cayenne. Buff. pl. enlum.
n. 640. f. 3.

Tufted-necked Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 784. n. 55.

Habitat in Cayenna, colubri potius minor.

*Abdomen inferius album; gutturi viridi-aureum; crista ca-
pitis longa; pennae fasciculorum angustae, mobiles, in-
aequales, ultra dimidium pollicem non longae, ad apicem
macula viridi nitente notatae.*

puni- 59. Tr. pallide fuscus, crista caerulea.
ceus. Crested brown Humming-bird. *Lath. syn. I. 2. p. 784. n. 54.*
Magnitudo cristati; alae et cauda obscuriores.

cristatus. 18. Tr. viridis, alis fuscis, abdomine fusco cinereo, crista caerulecente, tibiis pennatis.

Mellisuga cristata. *Briß. av.* 3. p. 714. n. 12. t. 37. f. 2.

Oiseau-mouche hupé. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 22.

Oiseau-mouche hupé de Cayenne. *Buff. pl. enlum.* n. 227. f. 1.

Green strait-billed Humming-bird. *Bancr. Guj.* p. 168.

Crested Humming-bird. *Edw. av.* 1. t. 37.

Crested green Humming-bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 783. n. 53.

Habitat in Cayenna, 3 pollices longus.

Rostrum et digitii nigri; cauda ex violaceo nigra.

longicaudus. 60. Tr. viridi-aureus, gula smaragdina, alis rectricibusque fuscis, intermediis duabus longissimis.

Oiseau-mouche à raquettes. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 23.

Racket-tailed Humming-bird. *Latham syn.* I. 2. p. 782. n. 52.

Longitudo $2\frac{1}{2}$ pollicum; rectrices 2 intermediae 10 lineis longiores, parte eminente nuda, apice demum barbata.

Carbunculus. 61. Tr. niger, capite, collo et pectore rubris, alis fuscis, cauda rufo-aurea.

Escarboucle. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 28.

Carbuncle Humming-bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 782. n. 51.

Habitat in Cayenna, rarus, paulo major.

Rostrum ad medium usque pennis rectum.

cyano-
melas. 62. Tr. ex albo et caeruleo varius, gula et pectore rubris.

Black and blue Humming-bird. *Bancr. Guj.* p. 167. *Lath. syn.* I. 2. p. 782. n. 50.

Habitat in Terra firma et insulis Caribaeis, exili duplo major.

Remiges rectricesque magnae, splendide nigrae.

gujanensis. 63. Tr. viridis, crista capitis et pectore rubris, remigibus rectricibusque ex viridi, rubro et purpureo variis.

Small green and crimson Humming-bird. *Bancr. Guj.* p. 168.

Gujana Humming-bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 781. n. 49.

Habitat frequens in Guiana, 2 pollices longus.

Rostrum oculique splendidi nigri.

Tobaci. 64. Tr. viridi-nitens, fascia abdominalis femoribusque albis, crissō pallide fuscō, remigibus caudaque subfurcata ex caeruleo atris.

Toba-

- crista
2.
227.
68.
n. 53.
ie ful-
p. 23.
782.
's lon-
, cau-
51.
Lath.
duplo
is re-
Guj.
albis,
ra ex-
Toba-
- elatus.** 19. Tr. virescente-aureus, rectricibus aequalibus ferrugineis apice nigris, pileo rubro cristato.
Habitat in insula Tobago, 4 pollices longus.
Rostrum obscurum, mandibula inferiore flava; pedes fuscii.
- mellivo-
rus.** 20. Tr. rectricibus nigris: lateralibus albis, capite caeruleo, dorso viridi, abdomine albo.
Mellisuga surinamensis torquata. Briss. av. 3. p. 713. n. 11.
Oiseau-mouche à collier, dit la Jacobine. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 34.
Oiseau-mouche, dit la Jacobine de Cayenne. Buff. planch. enlum. n. 640. f. 2.
White-bellied Humming-bird. Edw. av. 1. t. 35. f. 1.
Latham syn. I. 2. p. 765. n. 31.
Habitat in Surinamo, ultra 4 pollices longus.
Rostrum et pedes cum unguibus nigri; collum caeruleo-nitens; cervicis annulus albus; remiges ex violaceo fuscae; cauda subfurcata; rectrices omnes apice nigrae.
- campy-
lopterus.** 65. Tr. viridi-aureus subtus griseus, rectricibus lateralibus fuscis apice albis, remigum 3-4 scapis medio incurvis.
Oiseau-mouche à larges tuyaux. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 35.
Oiseau-mouche à larges tuyaux de Cayenne. Buff. pl. ent. n. 672. f. 2.
Brond-shafted Humming-bird. Latham syn. I. 2. p. 765. n. 30.
Habitat in Cayenna, rarior, 4½ pollices longus.
Alae acinacis more curvae.
- ruber.** 21. Tr. rectricibus lateralibus violaceis, corpore testaceo fusco submaculato.

Mellisuga surinamensis. *Briff. av. 3. p. 701. n. 4.*

Oiseau-mouche pourpre. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 24.*

Little brown Humming-bird. *Edw. av. I. t. 32. Bancr.*

Guj. p. 168. Lath. syn. I. 2. p. 778. n. 45.

Habitat in Surinamo et Guiana, ultra 3 pollices longus.

Corpus subitus pallide badium, maculis ad pectus nigricantibus; temporum fascia longitudinalis fusca; pedes cum unguibus, rostrique mandibula superior nigra, inferior carneus, apice nigra.

mini-
mus.

22. Tr. rectricibus lateralibus margine exteriore albis, corpo-
re viridi- nitente subtus albido.

Mellisuga. *Briff. av. 3. p. 695. n. 1. t. 36. f. 1.*

Guainumbi 7 species. *Marcgr. bras. 197. Raj. av. p. 187.
n. 44. Will. orn. 132.*

Guainumbi minor, corpore toto cinereo. *Raj. av. p. 83.
n. 7.*

Le plus petit oiseau-mouche. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. II.
t. 1.*

Le plus petit oiseau-mouche de l'Amérique. *Buff. pl. enlum.
n. 276. f. 1.*

Least Humming-bird. *Sloan. jam. 2. p. 307. n. 38. t. 264.
f. 1. Edw. av. 105. t. 105. f. inf. Brown jam. p. 475.
Latham syn. I. 2. p. 788. n. 60.*

*Habitat in America meridionali, insulisque vicinis, omni-
um notarum avis minima, ut longitudine $\frac{1}{4}$ pollicem,
pondere 20-45 grana aequet; exempli 6 granorum men-
tionem facit Beireis.*

*Rostrum nigrum; alae ex violaceo fuscae; rectrices ex cae-
rulecente atrae, nitentes; 1, 1 totae griseae; 2, 2 a me-
dio ad apicem griseae; pedes cum unguibus fusi. Fe-
mina supra sordide fusca cum splendore viridi, subtus sor-
dide alba.*

Les grāt

Mamz

Louje

dant.

Sigmilbukh

Aren

Pon whl.

24.
Bancr.

5.
rican-
s cum
ferior

corpo-

187.

p. 83.

p. II.

nlum.

264.

475.

*omni-
llicem,
t men-*

*x cae-
a me-
Fe-
us for-*

Tib
Roma
Suec.
Saxoni
(Imperio)
Dona
Hungaria
Polonia
Silesia
Itali
Talnia
Portu
Gemen
Transilv
Braga
Portugal
Orbani
Nicas
Ezra
Contra
Pancro
Graecie
Iudea
Ethi
Ethi