

I. ACCIPITRES.

Rostrum e mandibula superiore angulum utrinque exserens.

41. VULTUR. *Rostrum rectum, apice aduncum.*

Caput impenne, antice nuda cute.

Lingua bifida.

Collum retrahibile.

Gryphus. 1. V. maximus, caruncula verticali, longitudine capitis, gula nuda.

Vultur Gryps Gryphus. Klein av. 45.

Cuntur. Laet amer. 401. Raj. av. 11.

Condor. Fréz. it. 111. Condam. it. 175. Briss. ornith. I. p. 473. n. 12. Buff. ois. I. p. 184. Molin. chil. p. 236.

Condur. Latham syn. of birds. I. I. p. 4.

Habitat in America australi, nidificans ad montes praeruptissimos sub rupibus prominulis, ova bina alba ponens; famelicus ovibus, boedis, imo vitulis praedatur, et sunt, qui pueros decennes abripuisse, binas aves vaccam dilacerasse et vorasse tradunt; in terram devolans susurro attinacit et surdos fere reddit homines.

Avis maxima, femina tamen major, quae crista quoque cervicali, colore fusco, torque nullo a mare differt. Alae maximae, intra quarum extremitates pedes 9-12-13-16; Remex longitudine pedum 2½, crassitie sesquipolllicis; corpus nigrum, dorso albo; collum torquatum pennis longioribus albis; gula rubens; caput fusca lanugine tecum; oculi nigri, iride spadicea; rostrum nigrum, apice albido. Pedes nigri, unguibus rectinquisculis; cauda parva.

bengalenfis. 2. V. fuscus, capite colloque anterius denudato dilute castaneo, rostro plumbeo, apice nigro. Latham syn. of birds. I. I. p. 19. n. 16. t. I.

Q 3

Habi-

Vultures voracissimi cadavera porius appetunt, imo putrescentia, vix nisi famelici vivæ animalia, audaces, tardius volant, nisi certam altitudinem attigerint, et gregatim; osfacta pollent acutissimo; ex septentrionali Europa et Asia, et, si Anram exceperis, ex boreali quoque America exiles. Vix distincti specierum varietatumque, imo generis ipsius a sequente limitis.

*Habitat in regno Bengalensi, 2 pedes cum 6 pollicibus longus.
Caput collumque posterius lanugine fusca tectum; pedes
ex atro fuscis, unguibus nigris. Ingluvies supra pectus
pendet.*

Papa.

3. V. naribus carunculatis, vertice colloque denudato.

Vultur. *Albin. av. 2. p. 4. t. 4.**Cozcaquauhtli. Hernand. mex. 319. Raj. av. 361.*King of the Vultures. *Edw. av. 2. t. 2.*Rex vulturum. *Briss. av. 1. p. 470. t. 36.*Roi des vautours. *Buff. hist. natur. des ois. I. p. 169. t. 6.
planch. enlum. 428.*

*Habitat in America australi, insulisque oceanii americanii;
victans serpentibus, lacertis, rassis etc. cadaveribus,
hinc foetens; alte volitat.*

Magnitudo gallopavonis feminae. Caput collique pars superiore quasi excoriata; area oculorum nuda, crocea. Vitta nigricante lanugine ab occidente caput cingit. Corpus et rufescente album. Remiges ex cinerascente nigri. Pedes cum rostro apice rubri. Cera aurantia, et pone hanc carunculae dentatae.

Mona-
chus.

4. V. vertice gibboso, corpore nigro.

Crested black Vulture. *Edw. av. t. 290.*Vultus arabicus. *Briss. av. app. 29.**Habitat in Arabia, melanæto major.*

Caput cum collo lanugine cinerea tectum; orbita alba; rostrum apice nigrum, cera pedesque caerulecentes, ungibus nigris; humeri pennis laxis cinereis coronati, intra quas dormiens avis caput retrahit.

Aura.

5. V. fusco-griseus, remigibus nigris, rostro albo.

Tzopilotl s. Aura. *Hernand. mex. 331.*Urubu, Tzopilotl or Aura. *Willougbb. orn. 68.*Urubu Brasiliensis. *Marcgr. brasili. 207.*Gallinazo. *Ulloa it. I. p. 60. 201.*Turkey Buzzard. *Catesb. Car. I. p. 6. t. 6.*Carrion crow. *Sloan. jamaic. 2. p. 294. t. 254. Raj. av.
p. 180.*Vultur brasiliensis. *Raj. av. p. 10. Briss. av. I. p. 468.*Vultur pullus, capite implumi, cute crassa rugosa, ultra aperturas nasales laxata. *Brown. jam. 471.*

Vaca-

Vautour du Brésil. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 175. pl. enlum. n. 187. *)*

Carrión Vulture. *Arct. zool. II. 191. Latham syn. I. 1. p. 9. n. 5.*

Jotá. $\beta.$ *V. niger, remigibus fuscis, rostro cineraceo. Molin. hist. nat. Chil. p. 235.*

Habitat in America, etiam boreali, insulisque adjacentibus, insulis quoque novi anni.

Privilegio munitus in America cadavera serpentesque vorans, eaque simul cum canibus, quasi germanis fratribus, summa concordia dilacerans; saepe carnes e culina furans, ceterum haud difficulter cicurandus; foetidum stercoris humani odorem spirat, captusque materiam adhuc foetidorem evomit; noctu gregarie dormit in summis arborum cacuminibus: Jacquin.

Magnitudo circiter gallopavonis, quamvis varia. Corpus nigrum e purpureo et viridi micans. Irides ex croceo caerulecentes. Pedes carnei. Caput rufescens.

$\beta.$ *similiter foetidissimus, iners vix nisi lacestis vociferatur voce muris, nidum inter rupes aut in terra struit ex foliis pennisque, et ova elidit bina alba, quasi infumata. Junior totus albus, sensim autem nigrescit, ut tamen rostrum, apice excepto, albeat, remiges, pedes et irides fusca sint.*

cinereus. 6. *V. fuscō-nigricans, remigibus et rectricibus in cinereum vergentibus, pedibus pennis fuscis vestitis. Briff. ornith. I. p. 130. n. 1.*

Vultur cinereus. Raj. syn. p. 9. n. 1.

Vautour ou grand Vautour. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 158. t. 5. planch. enlum. n. 425.

Cinereous or ash-coloured Vulture. Will. orn. p. 66. n. 1. Latham syn. p. 14. n. 8.

Habitat in Europa, frequens in montibus altis, sex pollicibus longitudinem tripedalem superans.

Caput, guttura, collique pars superior fusca teguntur lanugine; sub gutture prominent penuulae longae pilorum acumulac, ut barbam efficiant. Digihi flavi, unguibus nigris. An pernopteri varietas?

Q. 4

8. V.

*^o) Prodierunt quidem hae tabulae cura Daubentonii junioris, sed consilio Buffoni, hinc ejus nomine semper allegatae, quemadmodum alterum quoque de avibus opus, quamvis magna ejus pars B. Guenein de Montbeillard debeatur.

fuseus. 8. *V. fuscus*, remigibus ex fuso nigricantibus, primariis apice albis fusco maculatis, rectricibus ex griseo fuscis, pedibus nudis. *Briss. ornith.* p. 131. n. 2.

Avoltojo Griffone. Cetti Ucc. di Sard. 3. G. 3.

Vautour de Malte. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 161. pl. enlum. n. 427.

Habitat in Europa, potissimum in insula Malta.

Magnitudine inter phasianum colchicum et gallopavonem intermedia. Caput fusca lanugine tectum; cervix pennis angustis; rostrum nigrum; pedes slavecentes, unguibus obscuris. An specie differt a percnoptero?

niger. 9. *V. niger*, remigibus rectricibusque fuscis, pedum pennis nigris. *Briss. ornith.* p. 131. n. 4.

Vultur niger. Raj. syn. p. 9. n. 2.

Avoltojo nero. Cetti Ucc. di Sard. 9. G. 9.

Swarthy Vulture. Charl. ex. p. 71. n. 4.

Black Vulture. Will. orn. p. 66. Lath. syn. p. 16. n. 10.

Habitat in Aegypto et Sardinia, magnus.

Caput lanugine fusca tectum, colli pars proxima plane nuda, et cum orbitis pedibusque ad digitos usque lanatis alba. Lingua laevis non ferrata. Rostrum bipollicare initio rectum, apice longius uncinato, naribus rotundis 3 lineas diametro aequantibus. An mera varietas perenopteri?

leucocephalos. 10. *V. plumis niveis*, remigibus rectricibusque nigris, torque plumarum albo.

Vultur leucocephalus. Briss. ornith. p. 134. n. 9.

Vultur albus. Raj. syn. p. 10.

Petit Vautour. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 164.

Vautour de Norwege. Buff. pl. enlum. n. 449.

White Vulture et Cinereous Vulture. Willoughb. ornith. p. 67. n. 6. et 66. n. 1.

Habitat in Sardinia et Norwegia, nigro minor, ut vix aliquot pollicibus tres pedes longitudine superet, cauda aliisque mediocribus; borealis varietas fere tota nivea, capite colloque tamén impennibus rubicundis, rostro flavo, puncto nigro notato; unguibus nigris; in sarda varietate pennae, rectricibus remigibusque exceptis, ex cinereo, fuso et griseo mistae; caput et finitima pars colli lanugine alba veftita.

Vultures communes quoque in Candia, Cypro, reliquisque Archipelagi et maris mediterranei insulis, paucis speciebus rite definitis; pelles praeparatae ab incolis pediori et ventriculi regioni appositae digestionis promovendae ergo portantur.

*stata. Squamae digiti medii a primo inde articulo II.
An mera perenopteri aut fulvi potius varietas?*

fulvus. II. V. superne ex griseo rufescens, capite, collo et torque albis, remigibus rectricibusque nigris. *Briss. ornith. p. 133.
n. 7. Hablizl apud S. G. Gmelin it. IV. p. 179. et Pal-
tas n. nord. Beytr. IV. p. 58.*

Vultur fulvus baeticus congener. Raj. syn. p. 10. n. 7.

Griffon. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 151.

Vulture. Albin. av. III. p. 1. t. 1.

*Fulvous Vulture. Will. orn. p. 67. n. 7. Lath. syn. I. 1.
p. 17. n. 11.*

*Habitat in montibus Persiae quoque alpibus sunamisicis, fal-
cone fulvo major; Caput et collum alba lanugine tectum;
rostrum cinereum, basi cute nigra tectum; irides obscure
flavae; colli infima pars multiplice serie pennarum lon-
garum, acutarum, setacearum ex albo rufescientium cinc-
ta; in medio pectoris fovea lanugine alba vestita, et
pennis longis angustis rufescientibus cincta. Pennae sub-
tus basi albae, apice rufae. Pedes plumbei, ultra femo-
ris medium intus lanugine densa alba, extus pennis lon-
gis rufescientibus tecti, unguibus nigris.*

perenop- 7. V. remigibus nigris, margine exteriore (praeter extimas)
terus. canis.

*Vultur (perenopterus) capite nudo, gula plumosa. Hasselq.
it. 209.*

*Falco montanus aegyptiacus. Hasselq. act. Stockh. 1751.
p. 196.*

Vultur aquilina. Alb. av. 2. p. 3. t. 3.

Vulturine Eagle of Aldrovand. Will. orn. p. 64. t. 4.

β. *Vultur aegyptius. Briss. p. 131. n. 3.*

Vultur facer aegyptius. Aldr. av. I. p. 378. t. 379.

Sacre Egyptien. Belon hist. d'ois. p. 110. t. pag. 111.

Sacre d'Egypte. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 167.

*Habitat in Aegypto, Palaestina, Syria, Caramania, Persia.
Purgat Caii terram a cadaverum foetore, stipendiis al-
lectus. Hasselq. Palaestinae agri deferentur ob nurium
copiam, nisi haec aves catervatim advolarent. Bellon.
Olim hunc capitale occidere Aegyptiis. Herodot.*

*Mas totus albus. Remigibus atris, margine exteriore ca-
nis, exceptis duobus primis unicoloribus. Femina tota
fusca. Remigibus quatuor extimis concoloribus. Rostrum
atrum cera flava. Hasselq. Nares perpetuo stillant. Raj.
Pedes nudi.*

cristatus. 12. *V. cristatus*, ex rutilo nigricans, pectore magis ad rufum inclinante, pedibus nudis. *Briss. ornith.* p. 132. n. 6.

Vultur leporarius *Gesneri.* *Raj. syn.* p. 10. n. 4.

Vautour à aigrettes. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 159.

Hare Vulture. *Will. orn.* p. 67. n. 4. *Latham syn.* I. I. p. 17. n. 12.

Habitat in densis et desertis silvis, in arboribus altissimis nidificans, celeriter ingrediens, et tum cursu, tum volatu aves, pisces, lepores, cuniculos, ipsas vulpes et hinnulos persequens. Stans cristam, quasi cornua ex capite prominentia in volante ave non conspicua, erigit.

Alarum apices sex pedum intervallo distant; pedes flavi; unguis et rostrum nigrescunt; cauda longa et recta; aequalibus, asequentis generis, decidunt autoptae.

barbarus. 13. *V. ex atro fuscus*, subtus albus in fuscum inclinans, pedibus lanatis, digitis plumbeis, unguibus fulcis.

Vultur barbatus. *Briss. ornith.* p. 137. n. 13.

Bearded Vulture. *Edw. av.* 106. t. 106. *Lath. syn.* I. I. p. 11. n. 6.

Habitat in Africa, praesertim Barbaria, falconis fulvi magnitudine.

Rostrum ex purpurascente carneum; mandibula inferior fasciculo plumarum nigrarum pendularum barbata; supercilia rubra; irides flavae; capitis maxima pars lanugine alba vestita, fronte tamen, genis, et oculorum area nigra; cervix pennis angustis acuminatis, longis, albicanibus testa.

42. FALCO. Rostrum aduncum, basi cera instrutum.

Caput pennis arte testum.

Lingua bifida.

* *Femoribus longissimis.*

Serpentaria. 33. *F. ater occipite cristato, rectricum apice albo, duabus intermediis longissimis.* I. F. Miller ill. of nat. hist. t. XXVIII. A. B.

Sagittarius. *Vosmaer monogr.* t. 8.

Secretaire. *Sonner.* it. p. 87. t. 50.

Messager du Cap de bonne esperance. *Buff. planch. enl.* n. 721.

Secretary or Sagittarius. *Aet. angl.* LXI. p. 175. *Latham synops.* I. I. p. 20. n. 17. t. 2.

Habi-

Harp

Jac

Habitat in interiori Africa, et insulis Philippinis, gliribus et amphibiis viettans, facile cicurandus.

Femorum longitudine ad grallas accedit, ceteris notis ad hoc genus spectat; altitudo tripedalis; rostrum nigrum aquilae; cera alba; area oculorum nuda aurantia; irides pallide cinereae; cauda rotundata; femora fuscescens, unguibus brevibus, nigris, uncinatis, non valde acutis. Crista erigi et deprimi potest.

* * *Gypaëti, rostro apice demum adunco, basi setis porrectis barbato.*

Harpyja. 34. F. capite pennis elongatis cristato, subtus varius.

Vultur capite testo pennis elongatis cristato. Syst. nat. XII.

I. p. 121. n. 2.

Aquila brasiliensis cristata. Briss. av. I. p. 446.

Aquilae cristatae genus. Raj. av. 161.

Yzquauhtli. Hern. mex. p. 34. Raj. av. p. 161.

Urutaurana. Marcgr. brasili. 203. t. 204. Raj. av. p. 7.

Crested Eagle. Will. orn. p. 63. t. 4.

Crested Vulture. Latham syn. I. I. p. 6. n. 2.

Habitat in nova Hispania et America australi. Fertur unicco iectu cranium hominis findere, quem saepius adoritur; erectus confidet; penitus occipitis saepius erigit in formam coronae.

Magnitudo arietis. Color subtus ex nigro, candido et fulvo mixtus, in collo, dorso, cauda et crista surrecta niger. Oculi membrana nititante. Sub ingluvie pennae albæ, quas iratus demittit usque ad pedum digitos. Alae et cauda subtus albo et nigro punctata, in modum tigridis.

Jacquini. 35. F. pennis capitis elongatis plurimis, pedibus nudis, corpore subtus niveo.

Vultur (coronatus) capite testo pennis elongatis plurimis, pedibus nudis. Jacquin Beytr. zur Gesch. der Voeg. p. 15. n. XI.

Habitat in montibus novae Granadae, junior cicurandus, Harpyjae affinis.

Dum erectus sedet, $2\frac{1}{2}$ pedum altitudinem monstrat: Dorsum, alae, colli maxima pars, et rostrum nigrescunt; caput ex rufescente cinereum coronatum corona concolore pennarum plurium semipedalium fere decumbentium, quas avis irata erigit; cauda longa albida, taeniis transversis nigris. Pedes digitique flavi, unguibus nigris.

ambustus. 36. F. pallide fulvus, capistro nudo, cera ampla, pedibus caerulecentibus.

Tawny Vulture. Brown. Illustr. p. 2. t. I. Lath. syn. I. I. p. 19. n. 15.

Habitat in insulis Falkland, 4 pollices ultra 2 pedes longus. Rostrum breve, crassum, obscurum; cera setis hispida; mandibula inferior fasciculo pennarum tenuium longarum barbata; tectrices remigum ex pallide fulvo et fusco mixtae; cauda sordide alba, fusco fasciata. Ungues longi, leviter curvati.

angolen- 37. F. albus, cera caerulecente, orbitis carneis et nudis, tectrices alarum primariis, caudaeque basi nigris.

Angola-Vulture. Penn. tour in Wales. p. 228. t. 19. Lath. syn. I. I. p. 18. n. 14.

Habitat in Angola.

Rostrum albicans, longum, parum aduncum; irides stramineae; tectrices alarum primariae extimae albo punctatae; caudae apex albus; pedes sordide albi et squamosi.

barbatus. 38. F. albido-rutilus, dorso fusco, taenia nigra supra et infra oculos.

Vultur (barbatus) albidus, dorso fusco, gula barbata, rostro incarnato, capite linea nigra cincto. Synt. natur. XII. I. p. 123. n. 6.

Gypaëtos grandis. Storr Alpenr. I. p. 69.

Percnopterus f. gypaëtos. Aldr. orn. I. p. 216. t. 217. 219. Gesu. av. 199. Will. orn. 33. t. 4. Raj. av. 8. Alb. av. 2. p. 2.

Vultur alpinus. Briss. av. I. p. 464.

Laemmergeyer. Andreae Brief. aus der Schweiz, p. 195. t. 12.

β. Vultur aureus. Gesu. av. 783. t. 781. Aldrov. av. I. p. 277. t. 276. Briss. ornith. p. 132. n. 5. Hablitzl apud Pallas n. nord. Beytr. IV. 64. et S. G. Gmelin it. IV. p. 185.

Vultur baeticus. Aldrov. ornith. I. 273. t. 274. Will. orn. 35. Raj. av. 10.

Vultur fulvus Gefneri. Raj. av. p. 10. n. 5.

Golden vulture. Latham syn. p. 18. n. 13.

γ. Falco (magnus) cera caerulecente, pedibus et corpore subtus castaneis albo mixtis, cauda cinerea. S. G. Gmelin it. III. p. 363. t. 38.

Habitat gregibus parvis in alpibus helveticis, rhaeticis, noricis, β et γ perficiis, Neclher sacrae scripturæ ex sententia Oedmani.

Cbry-

Albic

coron
tus

Chrysaëto major, ut 4 pedes longitudine aequet, et distan-
tia apicis alarum expansarum 9 pollicibus 8 pedes superet.
Rostrum rectiusculum unco utrinque bisulco, cinereum,
rubicundo mixtum, ad latera cinctum et subtus munitum
setis rigidis nigris; nares magnae, ovales, similibus setis
tectae. Remiges 28, splendide cinereae; rectrices 12,
medio cinereae. Pedes ad digitos usque hirsuti; unguis
nigri, robusti, minus curvati, quam aquilis.

Nidificat in antris rupium inaccessarum, ova 3-4 ponens;
victimat animalibus alpinis, ut ipsis rupicapras, capras,
agnos praedetur, et ipsi adeo homini dormienti infestus
esse dicatur; neque tamen cadavera ipsa respuit. Habi-
tu externo, gregario volatu, cadaverum appetitu ad vul-
turem, reliquo victu, capite et collo, audacia ad aqui-
las accedit.

Albicilla. 39. F. cera pedibusque flavis, rectricibus albis: intermediis
apice nigris.

Vultur albicilla. *Syst. nat. XII. I. p. 123. n. 8.* *Fn. suec. 55.*
Brünnich orn. 12.

Aquila Albicilla. *Briss. av. I. p. 427.*
Pygargus, Albicilla, Hirundinaria. *Bell. av. 15.* *Gesn.*
av. 205. *Raj. av. 7. n. 5.*

Grand Pygargue. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 99.* *pl. enlum.*
n. 411.

White-tailed Eagle. *Will. orn. p. 61.*

Cinereous Eagle. *Brit. zool. I. p. 170. t. 18.* *Lath. syn. I. I.*
p. 33. n. 8.

Braunfahler Adler. *Frisch t. 70.*

Habitat in Europa, praesertim Scotia, et insulis adjacenti-
bus; ferit pisces maximos, iisque victimat auceps.

Magnitudo Gallopavonis; longitudo 2 pedum cum 9 pollici-
bus; caput et collum pallide cinereum; irides et rostrum
pallide flava; hoc basi elongatum; frons inter oculos et
nares nuda, setulis tantum adspersa, caerulescens. Cor-
pus et alae cinereae, fusco intermixta. Cauda alba. Pe-
des infra genua lanati, splendide flavi. Ungues nigri.

* * * Aquilae, majores pedibus plerumque hirsutis.

corona- I. F. cera ferruginea, pedibus lanatis albis nigro punctatis,
tus. peccore rufo, lateribus nigro fasciatis.

Aquila africana cristata. *Briss. av. I. p. 448.*

Crowned Eagle. *Edw. av. 3. p. 31. t. 224.* *Lath. syn. p. 27.*
n. I.

Habi-

Glauc
pis,

Habitat in Guinea, minor europaeis.

Subtus albus, maculis nigris rotundis; pennae in vertice capitis longae, ut cristae ad instar erigi et deprimi possint; rostrum ferrugineum; irides aurantiae; area oculorum cum fronte albida. Cauda supra obscure cinerea, nigro fasciata; digiti aurantii; unguis nigri.

Che-
riway.

40. F. cera rosea, pedibus flavis, corpore ferrugineo, capite albido, vertice cristato ferrugineo. *Jacquin Beytr. p. 17. n. XII. t. 4.*

Habitat in insula Amba, ad litus Verazuelae sita.

Crista pennis longioribus constans, quas tamen avis non erigere videtur. Orbitae albidae; oculi flavi; rostrum caerulescens; remiges longissimae nigrescentes. Cauda alis longior, pariter potissimum nigrescens; uropygium album; unguis nigri.

Tharus. 41. F. cera pedibusque luteis, corpore albo-nigrescente, vertice cristato. *Molin. hist. nat. Chil. p. 234.*

Habitat in Chili frequentissimus, nidum in altissimis arboribus ex surculis, lana, pilis, plumis struens, ova 5 ponens, viettans cadaveribus, et avibus domesticis.

Magnitudo capi grandioris. Capitis corona ex pennis nigris, quarum exteriores longiores; rostrum albidum. Remiges rectricumque apices nigri. Pedes squamati, unguibus robustis; mas albidus nigro maculatus; femina paulo minor, grisea.

Melanaë- 2. F. cera lutea, pedibusque semilanatis, corpore e ferrugineo nigricante, striis flavis.

Melanaëtos f. aquila valeria. Gesn. av. 203. Aldr. orn. I. p. 197. t. 199. 200. Raj. av. 7. n. 4. Alb. av. 2. p. 2. t. 2. Briff. av. I. p. 434.

Aigle commune. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 86. pl. enlum. n. 409.

Black Eagle. Will. orn. p. 61. sect. 3. t. 2. Latham syn. I. t. p. 28. n. 2.

Habitat in Europa.

Longitudo 2 pedum et 10 pollicum; rostrum ex corneo in caeruleum colorem vergens; irides castaneae; caudae pars exterior alba, nigricantibus maculis, apex nigricans; crura sordide alba; digiti lutei; unguis nigri.

leucoce
phalus.

Offisfra
gus.

Gypaë
an
02
ve
li
m
in
ta

Glaucopis. 42. F. cera et pedibus semilanatis citrinis, dorso et pectore fuscō, capite et cervice ex flavicante albīs, striis fuscīs, remigibus nigrīs. *Merrem Beytr. II. p. 25. t. 7.*

Habitat in monte Dransberg prope Goettingam.

Longitudo 1 pedis, 9 pollicum, 3 linearum; rostrum glaucum; nares magnae, ovatae, pone has setae nigrac; os interius et lingua rosea, haec carnoſa margine magis cornea, apice vix bifida; irides canae, flavo permixtæ; frons lunulis fuscis insignita. Crura brevia, pennis mollioribus tecta; pedes antice semilanati; unguibus nigris. Cauda supra ex rubicundo fusca, subtus sordide alba, utrinque taeniis 6 nigris.

leucocephalus. 3. F. cera lutea pedibusque semilanatis, corpore fuscō, capite caudaque albīs.

Aquila leucocephalos. Briss. av. I. p. 423.

Pygargue. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 99. pl. enlum. n. 411.
Bald Eagle. Catesb. Carol. I. p. 1. t. 1. Lath. syn. p. 29.

n. 3.
White headed Eagle. *Arct. zool. II. p. 196. n. 89.*

Habitat in Europae et Americae silvis acerofisis, porcīs, agnīs, piscibus viētitanis, quos posteriores ab haliaeēto captos huic aufert; nidus amplius, foetens, in insula Beringii rupibus innixus, ovis duobus.

Longitudo 3 pedum cum 3 pollicibus, pondus librarum 9.
Rostrum luteum; irides, caput, collum, cauda carent; digitī flavent; ungues nigricant; reliquum corpus chocaladam colore acumulatur.

Ossifragus. 4. F. cera lutea pedibusque semilanatis, corpore ferrugineo, rectricibus latere interiore albīs.

Aquila ossifraga. Briss. ornith. I. p. 125. n. 9.

Ossifraga. Gesn. av. 263. Aldr. ornith. I. p. 222. t. 225.
228. Brünn. orn. 13.

Haliaetus f. Ossifraga. Raj. av. p. 7. n. 3.

Orfraye

Gypaēti, vultures inter et aquilas quasi medii, cadavera appetunt, et viva venantur animalia; aquilae et falcones nobiliore habitu cadavera abhorrent; illae capiunt oves, leporēs, sciurus, anseres, serpentes, pisces; hi potissimum aves; altissime volant, ut saepe vix videantur; haerent quasi suspensi in aere; visu excellunt, solitarii degunt, nisi tempore copulæ; jaculi instar cadunt prosequendo praedam; famem diu tolerant; pane ingestō moriuntur, aetate sexuque variant; paciscuntur indicias cum avibus in primis domesticis, quamdiu cuculus cuculat, ut hae feriantur sub nidificatione, incubatione, pullitie. Succus gastricus acidus, acer.

Orfraye or Ossifrage, Grand aigle de mer. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 112. t. 3. pl. enlum. n. 112. 415.

Sea Eagle or Osprey. *Br. zool.* I. p. 167. t. 17. *Arct. zool.* 2. p. 194. n. 86. *Will. orn.* p. 59. t. 1. *Lath. syn.* I. 1. p. 30. n. 4.

Habitat in Europa et boreali America, in botanica quoque insula, piscibus potissimum vicitans, quos ipse capit. Chrysaëo affinis, pedibus tamen vix infra genua lanatis.

Magnitudo Gallopavonis: Pennae basi albae, medio ferrugineae, apice nigrae. Remiges nigricantes; secundariae latere tenuiore albicantes. Rectrices latere interiori albae, rhachi nivea. Teetrices caudae fere albae. Pedes lutei. Femina obscure ferruginea.

Chrysaë. 5. F. cera lutea, pedibusque lanatis luteo-ferrugineis, corpora fusco-ferrugineo vario, cauda nigra basi cinereo-undulata. *Fn. suec.* 54.

Chrysaëtos f. Aquila aurea. *Briff. av.* I. p. 431.

Aquila germana. *Gesn. av.* 168.

Aquila chrysaëtos. *Raj. av.* 6. n. 1. *Aldr. orn.* I. p. III. 114, 115.

Grand aigle. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 76. pl. enl. n. 410.

Golden Eagle. *Brit. zool.* I. p. 161. t. 16. *Alb. av.* II. t. 1. *Will. orn.* p. 58. t. 1. *Lath. syn.* p. 31. n. 5.

Habitat in Europa et Sibiriae deserto Uralensi, sereno coelo altissima petens, instanti tempestate terrae propior.

Pondus 12 librarum, longitudo 3 pedum, latitudo 7 pedum et 4 pollicum. Pedes ad digitos usque pennis testi.

fulvus. 6. F. cera flava, pedibusque lanatis fusco-ferrugineis, dorso fusco, cauda fascia alba.

Aquila. *Briff. av.* I. p. 419. *Aldr. orn.* I. p. 17. *Dodart aet.* 3. p. 89. t. 49.

Aquila fulva f. Chrysaëtos, cauda annulo albo cincta. *Raj. av.* 6. n. 2.

Aigle commun. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 86. pl. enlum. n. 409.

Golden Eagle, with a white ring about it's tail. *Will. orn.* p. 59.

Black Eagle. *Brit. zool.* I. p. 165. *Arct. zool.* 2. p. 195. n. 87.

Ring-tailed Eagle. *Latham syn.* I. 1. p. 32. n. 6.

canaden- sis. β. F. cera flava pedibusque lanatis, corpore fusco, cauda alba apice fusco. *Syst. nat.* X. p. 88.

White tailed Eagle. *Edw. av.* I. t. 1. *Voy. budf.* 3. p. 54. t. 2. *Habi-*

leuco
ster

japon
fis.

Plane

amer
nus

albus

Habitat in Europa, America et Asia septentrionali in rupibus altissimis nidificans, et docilis, ut variae Tatarorum tribus, Marco Polo jam notante, capiendis leporibus, antilopis, vulpibus, ipsisque lupis adaptent, qui etiam rectrices arcubus suis accommodant.

Frons inter oculos et nares nuda. Pectus punctis trigonis maculatum; pedes ad digitos usque pennis hirsuti. An femina Melanaëti?

leucoga- 43. F. albus, dorso, alis, caudaque obscure fuscis, caudae ster.

apice albo, pedibus flavis.

White-bellied Eagle. *Lath. syn. I. I. p. 33. n. 7. a.*

Longitudo 2 pedum cum 9 pollicibus. Rostrum amplum, ex fuscescente luteum; unguis nigri.

japonen- 44. F. cera obscura, pedibus luteis, corpore fusco.

sis. Japonese Eagle. *Lath. syn. I. I. p. 33. n. 7. b.*

Habitat in insulis Japan, pedem et 11 pollices longus. Rostrum angustum, basi caeruleum, apice nigricans, subtus flavescens; frons bubali colore; reliqui capitis et corporis pennae fuscae, apice ferrugineae; gula alba, nigro striata, lunula nigra cincta; pectoris ventrisque pennae margine ex flavicante albo; unguis magni, nigri.

Plancus. 45. F. cera, area oculorum pedibusque aurantiis, occipitis crista nigra, pectore et corpore supra griseo nigro-undulato, subtus nigro, cauda alba, fasciis transversis nigris.

I. F. Miller *Illust. t. 17. Cook it. II. p. 184. t. 32.*

Plaintif Eagle. *Latham syn. I. I. p. 34. n. 9.*

Habitat in terra del Fuogo, 25 pollices longus; alae fuscae; caudae apex, rostrum unguisque nigri.

america- 46. F. cera pedibusque lanatis luteis, capite, collo et pectore obscure cinereis, genarum fascia transversa, dorso, ven-

tre, alis, caudaque nigris.

Black-cheeked Eagle. *Lath. syn. I. I. p. 35. n. 10. Arct. zool. 2. p. 196. n. 88.*

Habitat in America septentrionali, fulvum magnitudine aequans. Rostrum caeruleum.

albus. 47. F. totus albus.

Aquila alba. *Briss. orn. p. 123. n. 3.*

Aquila alba cygnea. *Klein av. p. 42. n. 7.*

White Eagle. *Charl. onom. p. 63. n. 9. Latham syn. I. I. p. 36. n. 12.*

Habitat in alpibus, et Rheni ripis, Chrysaëti magnitudine; an mera varietas?

candidus. 48. F. albus, alarum apice nigro.
White Eagle. *Arct. zool.* 2. p. 197. *du Pratz Louis.* 2. p. 75.

Louisiane white Eagle. *Lath. syn.* I. 1. p. 36. n. 13.

Habitat in Louisiana, incolis magni aestimata, qui pennis ejus symbolum pacis exornant, praecedente paulo minor.

naevius. 49. F. cera pedibusque lanatis luteis, corpore ferrugineo infra alas albo-maculato.

Aquila naevia. *Briss. orn.* p. 122. n. 4.

Petit aigle. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 91.

Rough-footed Eagle. *Charl. onom.* p. 63. n. 6. *Lath. syn.* I. 1. p. 37. n. 14.

Steinadler. *Frisch Vög.* t. 71.

Habitat in Europa, gliribus praesertim viellitans.

Magnitudo galli grandis; longitudo 2 pedum cum $7\frac{1}{2}$ pollicibus; irides flavae; tectrices caudae secundariae albae; unguis nigri.

macula-tus. 50. F. cera pedibusque lanatis luteis, corpore supra ferrugineo, subtus fulso.

Morphno congener. *Raj. av.* p. 7. n. 7. *Will. orn.* p. 63.

Spotted Eagle. *Latham syn.* I. 1. p. 38. n. 15.

Longitudo bipedalis. Rostrum magnum et unguis nigri; irides cinereae; pennae scapularum et tectrices alarum apice macula ovali albicante insignitae, dorso maculis coloris bubalini; venter similibus lineis striatus.

albicaudus. 51. F. cera pedibusque nudis luteis, capite et collo ex cinereo in castaneum vergente, corpore supra obscure ferrugineo, subtus ferrugineo et nigricante, cauda alba.

Aquila Albicilla minor. *Briss. ornith.* p. 124. n. 6.

Petit Pygargue. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 99.

Pygargus of Aldrovand. *Will. orn.* p. 62.

Fawn-killing Eagle. *Charl. onom.* p. 63. n. 4.

Lesser white-tailed Eagle. *Lath. syn.* I. 1. p. 39. n. 16.

Erne. *Gesn. av.* p. 205.

Habitat in Europa.

Magnitudo galli grandis; longitudo 2 pedum et 2 pollicum; rostrum et irides flavicant; pennarum apices nigricant; unguis nigri.

52. F.

gallicus. 52. F. rostro cinereo, pedibus nudis flavicantibus, corpore ex griseo fusco, subtus (mari) albido maculis ruficentefuscis.

Aquila Pygargus. Briss. orn. p. 127. n. 11.

Pygargus. Johnst. av. p. 4. t. 2.

Jean le Blanc. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 124. t. 4. pl. ennum. n. 413. Lath. syn. p. 39. n. 17.*

Habitat in Gallia, rarer in reliqua Europa, muribus, ratibus, ranis visitans, in terra, rarius in arboribus nidificans, 3 ut plurimum ova grisea ponens.

Melanaëto vix minor, 2 pedes et pollicem longus. Irides flavae. Rectrices albae striis transversis fuscis, margine et apice fuscæ. Ungues cinerei.

australis. 53. F. fuscus, cera flava, cauda nigra, apice punctis sordide albicantibus.

Statenland Eagle. Latham syn. I. 1. p. 40. n. 19.

Habitat in Statenland; vox gallinae; magnitudo et longitudo Planci. Forster.

niger. 54. F. cera pedibusque lanatis luteis, capite, cervice, ventre et tectricibus alarum ferrugineis, gula, pectore, dorso remigibusque nigris.

Black-backed Eagle. Brown. III. p. 4. t. 2. Latham syn. p. 42. n. 22.

Magnitudo Chrysaëti; rostrum et ungues nigri; cauda basi ad medium usque alba; reliqua parte dimidio nigra.

leucoryphos. 55. F. cera ex livido cinerea, pedibus pallide albicantibus semilanatis, corpore subalbulofo fuscō, verticis macula triangularis et gula albis.

Aquila leucorypha. Pallas it. I. p. 454.

White-crowned Eagle. Lath. syn. I. 1. p. 42. n. 23.

Habitat in australioribus ripis fluvii Ural, balaëto vix major, habituque simili. Lingua rotundata integra. Irides ex fuscō griseac, alae obsolete nigrae, remigibus interius albis; cauda longiuscula, rigida, aequalis; unguis maximus, nigri.

Mogilnik. 56. F. cera lutea, pedibus lanatis et reliquo corpore obscure ferrugineis, dorso albo admisto.

Aquila Mogilnik. S. G. Gmelin Nov. comm. Petrop. XV. p. 445. t. XI. b.

Russian Eagle. Lath. syn. I. 1. p. 43. n. 24.

Habitat in desertis ad Tanain sitis, fulvo minor, 2 pedes et 3 pollices longus, muribus et aviculis vicitans. Rostrum, pupilla, unguis, remiges nigrae; palpebrae pallide caeruleae; irides luridae; cauda aequalis; rectrices nigræ, fasciis obsolete griseis, apice rufæ.

aegyp
tius.

cristatus. 57. F. capite cristato, dorso, gula alisque nigris, ventre albo, cauda fasciis 4 cinereis parallelis.
Crested Falcon. *Dillon it. per Hisp.* p. 80. t. 3.
Caracca Falcon. *Latham syn. I.* 1. p. 81. n. 64.
Magnitudo *Gallopavonis*; mandibula inferior potius recta.

lagopus. 58. F. cera pedumque lanatorum digitis nudis luteis, corpore nigro albo-maculato, rectricibus albis, versus apicem nigris. *Brünnich orn. bor.* p. 4.
Falco norwegicus. *Leemius de Lapp.* p. 236.
Graæ falk. *Aet. nidros.* IV. p. 417. t. 13.
Rough-legged Falcon. *Brit. zool. app. t. I.* *Arct. zool. 2.* p. 200. n. 92. *Lath. syn. I.* 1. p. 75. n. 54.
Habitat in Europa Americaque septentrionali; 2 pedes 2que pollices longus. Caput, collum et pectus ex flavieante alba, striis passim oblongis, fuscis.

ferox. 59. F. cera viridi, corpore supra fusco, dorso, abdomine et uropygio niveo, maculis castaneis vario, rectricibus aequalibus fuscis, fasciis quatuor obsoletis. *S. G. Gmelin nov. Comm. Petr.* XV. p. 442. t. X.
Fierce Eagle. *Lath. syn. I.* 1. p. 33. n. 7.
Habitat Africanae, rapacissimus, nec ipsa cadavera respuens.
Longitudo 2 pedum, et 1 pollicis; rostrum ex plumbeo nigrum; palpebrae caeruleae; irides flavæ; caput et collum ferruginea, admixto albido; remiges 26 nigrae, subtus candidae, versus apicem griseae; rectrices 12 aequales, subtus albae; unguis acutus.

mariti-
mus. 60. F. cera pedibusque flavis, corpore caudaeque apice albo, cruribus colore ex rubicundo et albo mixto. *v. Wurmbs apud Lichtenberg Magazin für das Neueste aus der Phys.* IV. 2. 6.
Habitat in Javae maritimis, cadaveribus pisibusque vici-
tans, 4 pedes cum 2 pollicibus longus, 1 pedem, 5 polli-
cis altus; rostrum flavum.

61. F.

Milvu

- aegyp- 61. F. cera pedibusque semilanatis flavis supra cinereus subtus
-tius. ferrugineus; alis supra fusca, cauda forficata, fusco fas-
ciata, longitudine corporis.
Habitat in Aegypto, hieme frequens, cubitum longus.
Rostrum flavum; remiges versus apicem nigrae; alae subtus
ex griseo fuscae; cauda longitudine corporis, cinerea;
ungues nigri.
- Milvus. 12. F. cera flava, cauda forficata, corpore ferrugineo, capite
albidiore. *Fn. suec.* 57.
Milvus regalis. Briss. av. I. p. 414. t. 33.
Milvus. Gesn. av. 610. Aldrov. orn. 392. t. 368. Raj.
av. 17. Günther Nest. u. Eyer. t. 25.
Milan royal. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 197. t. 7. pl. enlum.
n. 422.
Kite or Glead. Brit. zool. n. 53. Will. orn. p. 74. t. 6.
Albin. av. I. p. 4. t. 4. Hayes brit. birds t. 5. Lath.
syn. I. I. p. 61. n. 43.
Hünergeyer. v. Wurmb apud Lichtenberg neutest aus der
Physik und Naturgeschichte, IV. 2. p. 6.
β. Milvus vertice et gula castaneis. S. G. Gmelin it. I. p. 147.
γ. Accipiter Korschun. S. G. Gmelin nov. comm. Petrop. XV.
p. 444. t. II. a.
δ. Milvus jaicensis, testricibus dorsi violaceis, pennarum singu-
larum apice stigmata albo notato. Lepechin it. II. p. 180.
t. 2.
Habitat in Europa, Asia, Africa, quisquiliis vorans et pul-
los gallinaceos; pacatissime volans, tempestates praesagit,
supra nubes volitans serenitatem aeris, clamore pluvias;
ponit ova terna subrotunda albida, maculis sordide luteis
varia; migrat trans pontum euxinum in Asiam; ultimo
Aprilis die per 14 dies tot pontum euxinum prætervolan-
tes vidit, ut homines numero superarent, Bellonius it. 108.
Longitudo bipedalis, γ) in desertis ad Tanain obvii, 21½
modo pollicum, δ) 1 pedis et 10 pollicum; irides flavae;
cauda 12 pollicum; unguis nigri; crura penitus testa;
pulmones pulchri. γ) rostrum ex plumbeo nigrum, ce-
rae color in virorem vergens; area oculorum alba; capi-
tis latera dilute fusca; caput reliquum cum gula et jugulo
eleganter castaneum; remiges rectricesque nigrae apice
vinaceae. δ) ad fluvium Ural obvii pennae apice albae,
remiges striis maculisque alternis albis et cerasini coloris
notatae, a medio ad apicem ex nigro in viridem aut cae-
ruleum colorem vergentes; rectrices apice striis 2 angustis
flava et alba.

- ater. 62. F. cera pedibusque flavis, supra ex fusco niger, capite et subtus albidus, cauda forficata.
Milvus niger. Briss. ornith. p. 117. n. 34.
Milan noir. Buffon hist. nat. des ois. I. p. 203. pl. enlum. n. 472.
 Black Gled. Sibb. Scot. ill. II. 3. p. 15.
 Black kite. Lath. syn. I. 1. p. 62. n. 44.
 Brauner maldgeyer. Kramer elench. p. 326. n. 5.
Habitat in Europa, milvo minor; cauda parum forficata; crura gracilia; unguis nigri.
- austria- 63. F. cera pedibusque semilanatis flavis, corpore supra castaneo, subtus testaceo fusco maculato, cauda forficata.
 austriacus. Austrian Kite. Lath. synops. I. 1. p. 62. n. 45.
 Brauner Geyer. Kramer elench. 327. n. 6.
Habitat in Austriae silvis, avibus vietitans et vespertilio-
nibus.
Magnitudo circiter milvi; rostrum flavum puncto nigro; oris anguli flavi; irides et unguis nigri; palatum caeruleum; frons et gula albida fusco-maculata; caput, pectus et alae castaneae; cauda parva, fasciis nigricantibus, pennis apice albis.
- brasiliensis. 64. F. pedibus flavis, corpore rufo, punctis albis et flavis vario, cauda ex albo et fusco varia.
Circus brasiliensis. Briss. ornith. p. 116. n. 31.
Milvus brasiliensis. Raj. av. p. 17. n. 6.
 Caracara. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 222.
 Brasilian Kite. Will. orn. p. 76. n. 9. Latham syn. p. 63. n. 47.
Habitat in Brasilia, gallinis infestus.
Magnitudo milvi; rostrum et unguis longi acutissimi nigricant; oculi cum iridibus flavent; pectus et abdomen non nunquam cudent; cauda 9 pollices longa.
- furcatus. 25. F. cera obscura, pedibus flavescentibus, corpore supra fusco subtus albido, cauda forficata longissima.
Milvus carolinensis. Briss. ornith. p. 118. n. 36.
 Falco peruvianus, cauda furcata. Klein av. p. 51. n. 14.
 Hirundo maxima peruviana, avis praedatoris calcaribus instrueta. Feuill. it. 2. p. 33.
 Milan de la Caroline. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 221.
 Swallow-tailed Hawk. Catesb. carol. I. p. 4. t. 4.
 Swallow-tailed Falcon. Arct. zool. p. 210. n. 108. t. X.
Lath. syn. p. 60. n. 42.

Habi-

Forsk
- lii.Halial
tos.arun
- cer
carol
nenfcayo
neaf

Habitat in Carolina et Peru, viettans lacertis, serpentibus, insectis, quae volando potissimum capit; milvo minor, tamen bipedalis.
Rostrum basi setis circumseptum; irides rubrae; caput columque nivea; dorsum splendore purpureo et viridi.

Forskah- 121. F. cera pedibusque semilanatis flavis, supra cinereus sub-
 lii. tutus ferrugineus, alis supra fusca, cauda forficata fusco-
 fasciata longitudine corporis. *Forsk. Fn. arab. p. 1.*
Habitat in Aegypto, hieme frequens, cubitalis.

Haliaë- 26. F. cera pedibusque caeruleis, corpore supra fusco, subtus
 tos. albo, capite albido. *Fn. suec. 63.*
Haliaëtos f. aquila marina. Briss. ornith. p. 126. n. 10.
Haliaëtos. Aldrov. orn. I. p. 188. 190.
Morpho. Aldrov. orn. I. p. 211. Raj. av. p. 7. n. 6.
*Balbuzard. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 103. t. 2. planch.
 enl. n. 414.*
Bald Buzzard. Will. orn. p. 69. t. 6.
Fisk Gjoc. Leems 234.
Osprey. Brit. zool. I. n. 46. Arct. zool. 2. p. 199. n. 91.
Lath. syn. I. I. p. 45. n. 26.

arundina- β. F. cera cinerea, pedibus pallidis, corpore supra griseo in-
 ceus. fra albido, cauda aequali. *S. G. Gmelin it. II. p. 163.*

caroli- γ. F. cauda fusca concolore, vertice nigro, aut fusco albo va-
 nensis. riegato, ventre albo.
Falco piscator Antillarum et carolinensis. Briss. orn. p. 105.
n. 14. et 15.
Piscator. Raj. av. p. 19. n. 2.
Faucon pecheur de la Caroline. Buff. hist. nat. des ois. I.
p. 142.
Fishing Hawk. Catesb. Carol. I. t. 2.

cayen- δ. F. corpore ex ferrugineo fusco, linea alba a mandibula su-
 nensis. periore per utrumque oculum ad occiput similiter album
 ducta. *Lath. syn. I. I. p. 47. n. 26, B.*
Habitat in Europa, America et Sibiria, in insula quoque
maris pacifici Isle of Pines, inter arundines degens et ni-
dificans, viettans anaribus et piscibus, potissimum majo-
ribus, quos capiendo submergit.

Longitudo circiter 11 pollicum ultra pedem. Area fusca
descendit ab utroque oculo per latera colli ad alas.

Antilla- 65. F. fuscus, vertice nigro, ventre albo.
rum. Falco Antillarum. Briss. ornith. p. 104. n. 13.
Mans fenny. Raj. av. p. 19. n. 1. du Tarter biſt. des an-
till. 2. p. 252. Buff. biſt. nat. des ois. I. p. 144. Lath.
syn. I. 1. p. 47. n. 27.
*Habitat in Antillis; habitu et pennis ad aquilas spectat, fal-
conibus tamen vix major; avibus et amphibiis vivitans.
Pedes et unguis duplo maiores et validiores, quam fal-
conibus.*

finensis. 66. F. cera pedibusque luteis, corpore supra fusco, subtus fla-
vicante.
Chinese Eagle. Lath. syn. I. 1. p. 35. n. II. t. 3.
Habitat in India.
*Rostrum unguisque magni nigri; irides fuscae; vertex ob-
scurus; alarum taenia media valde obscura.*

* * * * Falcoes, minores, pedibus nudis.

orienta- 67. F. pedibus plumbeis, stria superciliari ferruginea, capite
lis. et corpore supra obscure fusco, subtus ex ferrugineo fus-
co, cauda albo-maculata.
Oriental Hawk. Lath. syn. I. 1. p. 32. n. 7. c.
*Habitat in Japonia; 17 pollices longus; rostro amplio ungui-
busque nigris; mandibula inferior lutea; caput magis ob-
scurum reliquo corpore; pennae stria media nigra; teet-
rices alarum secundariae albo maculatae; cauda 8 pollices
longa.*

indicus. 68. F. cera pedibusque luteis fronte et uropygio albis, cor-
pore supra ex rufescente, ventre ex ferrugineo fusco albi-
do striato, cauda fusca, fasciis quinque nigris.
Javan Hawk. Lath. syn. I. 1. p. 32. n. 7. d.
Habitat in Java, 17 pollices longus.
*Rostrum basi flavum, apice nigrum; teetrices alarum infe-
riores sordide ex rufescente albæ, ferrugineo undulatae;
remiges stria transversis apicibusque nigris; teetrices
caudæ albo-punctatae. Gula et pectus ex rufescente fus-
cae. Ungues nigri.*

novae 69. F. albus, cera pedibusque luteis, ungue posteriore ante-
Hollan- rioribus duplo longiore.
diae. New-Holland white Eagle. Lath. syn. I. 1. p. 40. n. 18.
*Habitat in nova Hollandia, 20 polices longus; orbitis fla-
vis. Forster.*

- Urubi-tinga. 70. F. cera pedibusque flavis, corpore fusco, alis nigrican-
tibus cinereo multis, cauda alba apice nigra albo punctata.
Aquila brasiliensis. Briss. orn. p. 128. n. 12.
Urubitanga. Will. orn. p. 64. Raj. av. p. 8. n. 9. Buff.
hist. nat. des ois. I. p. 141.
Brazilian Eagle. Latham syn. I. I. p. 41. n. 20.
Habitat in Brasilia, anseris semestris magnitudine. Rostrum
crassum, nigrum; oculi magni.
- pondice-rianus. 71. F. cera caerulecente, pedibus luteis, corpore castaneo,
capite, collo et pectore albis, linea longitudinali pen-
norum media fusca.
Aquila ponticeriana. Briss. orn. p. 129. n. 15.
Aigle de Pondichery. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 136. pl.
enlum. n. 416.
Pondichary-Eagle. Lath. syn. I. I. p. 41. n. 21.
Habitat in India, incolis sacer, pedem cum 7 pollicibus
longus.
Rostrum cinereum, apice flavum; remiges sex priores parte
media exteriore nigricantes; unguis nigri.
- aequino-ctialis. 72. F. pedibus luteis, capite, collo dorsoque ex atro fuscis,
pectore rufo, alarum tectricibus et humeris colore succo-
ladae, cauda nigra, rectricibus, exceptis duabus inter-
mediis, signo albo V notatis.
Aequinoctial Eagle. Latham syn. I. I. p. 43. n. 25.
Habitat in Cayenna, 21 pollices longus; rostrum unguisque
pallidi, illius apex niger.
- Buteo. 73. F. cera pedibusque luteis, corpore fusco, abdomine pal-
lido, maculis fuscis. Fn. succ. 60. Scop. ann. I. p. 15.
n. 4.
Buteo vulgaris. Gesn. av. 46. Aldr. orn. I. p. 369. 370.
Raj. av. p. 16.
Buteo. Briss. orn. p. 116. n. 32.
Buse. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 206. t. 8. pl. enlum. n. 419.
Buzzard. Brit. zool. I. p. 188. n. 54. t. 25. Arct. zool. 2.
p. 207. n. 3.
Common Buzzard. Will. orn. p. 70. Alb. av. I. t. 1. La-
tham syn. I. I. p. 48. n. 28.
*Habitat in Europa, avibus, reptilibus, mammalibus mino-
ribus, insectis vicitans; 8 pollicibus pedem longitudine*
*superans, colore varius; rostrum plumbeum; irides obscu-
rae; unguis nigri.*

- gallina- 73. F. cera pedibusque flavis, corpore supra fusco, subtus ru-
rius. fo maculis ovalibus fuscis, cauda fulca fasciata.
Circus major, gros Buzzard. *Briff. ornith. p. 114. n. 28.*
Hünerhabicht, Hünergeyer. *Frisch. av. t. 72.*
- naevius. 73. Falco minor, alis magis variegatis. *Briff. ornith. p. 116.*
n. 28. A.
Habitat in Europa, 8 - 11 pollicibus pedem longitudine su-
perans: Rostrum unguisque nigri; irides croceae.
- jamaic- 74. F. cera pedibusque luteis, corpore ex fuscescente bubali-
censis. no, subtus pallidiore maculato, vertice obsoleto.
Cream-coloured Buzzard. *Lath. syn. I. 1. p. 49. n. 30.*
Habitat, rarius tamen in Jamaica, specia avis.
Rostrum unguisque nigri; irides flavae; dorsi pennae et
rectrices rachi medioque fuscae; pedes breves.
- borealis. 75. F. cera pedibusque pallide flavis, corpore supra fusco,
subtus albo, cauda obsoleta ferruginea versus apicem stria
transversa nigra.
American Buzzard. *Lath. syn. I. 1. p. 50. n. 31.*
Red-tailed Falcon. *Arct. zool. 2. p. 205. n. 100.*
Habitat in America boreali, potissimum Carolina, buteoni
aqualis.
Rostrum unguisque nigri; gula alba fusco admixta; jugu-
lum et pectus dorso pallidiora; uropygium album.
- Leveria- 76. F. pedibus flavis, capite fusco et albo alternatim striato,
nus. corpore supra fusco, subtus albo, alis obscure fuscis.
Leverian Falcon. *Arct. zool. 2. p. 206. n. 101.*
Habitat in Carolina, buteoni aequalis.
Rostrum obscurum; pennae apice macula insigni alba nota-
tae; rectrices taeniis 9 albis, et totidem obscuris, mediae
obscuris et cinereis.
- rufus. 77. F. pedibus flavis, corpore rufo, supra in fuscum vergen-
te, cauda cinerea.
Circus rufus. *Briff. orn. p. 115. n. 30.*
Harpag. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 217. pl. enl. n. 460.*
Harpy. *Lath. syn. I. 1. p. 51. n. 32.*
Fischgeyer, Brandgeyer. *Frisch. av. t. 78.*
Habitat in Galliae et Germaniae humilioribus, praesertim
fluviorum ripis, pisces vivos ex aqua praedans.
Longitudo pedis et 8 pollicum; unguis rostrumque nigri-
cant; irides croceae.

- btus ru-
28.
p. 116.
dine su-
bubali-
30.
nnae et
fusco,
em stria
buteoni
jugu-
striato,
cis.
a nota
mediae
vergen-
460.
sertim
nigri-
78. F.
variega- 78. F. pedibus flavis, capite colloque albidis ferrugineo - ma-
tus. culatis, corpore supra fusco, subtus albo, cauda obscure
fuscata striis obsoletis decussantibus.
Speckled Buzzard. *Lath. syn.* I. I. p. 97. n. 83.
Habitat in America boreali.
Habitus buteonis; longitudo 12 pollices excedens; rostrum
obscurum; unguis nigri; an vere differt a sequente?
- albidus. 79. F. pedibus flavis, corpore albo maculis magnis fuscis, cau-
da obscura striis punctisque albis.
Buzzardet. *Arch. zool.* 2. p. 211. n. 109.
Habitus buteonis, cruribus tamen longioribus. Longitudo
15 pollicum; maculae subtus rariores; tectrices minores
fuscae.
- apivorus. 28. F. cera nigra, pedibus seminudis flavis, capite cinereo,
caudae fascia cimerea apice albo. *Fn. suec.* 65.
Buteo apivorus. *Raj. av.* 16. *Briff. av.* I. p. 410.
Bondrée. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 208. *pl. enlum.* n. 420.
Honey Buzzard. *Brit. zool.* I. n. 26. *Will. orn.* p. 72.
t. 3. *Albin. av.* I. p. 2. t. 2. *Lath. syn.* I. I. p. 52. n. 33.
Habitat in Europa, viettans muribus, aviculis, reptilibus,
insectis, praesertim apibus.
- aerugi- 29. F. cera virescente, corpore griseo, vertice, gula, axillis
nosus. pedibusque luteis. *Fn. suec.* 66.
Circus palustris. Briff. ornith. p. 115. n. 29.
Circus. Gefn. av. 49. *Aldrov. orn.* I. p. 351.
Milvus aeruginosus. *Aldrov. orn.* I. p. 395. *Raj. av.* 17.
Nozeman niederl. *Vogel,* t. 8. 9.
Busard. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 218. t. 10. *pl. enlum.*
n. 424.
Moor Buzzard. *Brit. zool.* I. n. 57. t. 27. *Will. orn.* p. 75.
t. 7. *Lath. syn.* I. I. p. 53. n. 34.
*Habitat in Europa in paludibus nidificans, avibus aquati-
cis, piscibus, cuniculis viettans.*
- javani- 80. F. cera nigra, medio lutea, pedibus luteis, capite, collo
eus. et pectore castaneis dorso fusco. v. *Wurmb apud Lich-*
tenberg Magaz. IV. 2. 8.
Habitat in maritimis Javae, piscibus viettans.
- cinereus. 81. F. cera pedibusque caerulestibus, linea supraoculari al-
ba fusco - maculata, corpore supra ex cinereo - fusco albi-
do admisto.

Falco freti Hudsonis. *Briss. orn.* p. 103. n. 10.

Faucon de la Baye d'Hudson. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 223.

Ashcoloured Buzzard. *Edw. av.* t. 53. *Latham syn.* I. 1. p. 55. n. 35.

Habitat in freto Hudsonis, tetraonibus viellitans.

Magnitudo gallinae mediocris; cauda supra ex cinereo fusca, taeniis transversis griseis, subtus cinerea, taeniis albis. Irides flavae. *An mera buteonis varietas?*

lineatus. 82. F. cera pedibusque flavis, corpore supra obscure fusco, subtus rufi lineis albis et pallide ferrugineis, reétricibus obscure fuscis, apice striisque duabus transversis sordide albis.

Barred-breasted Buzzard. *Latham syn.* I. 1. p. 56. n. 36.

Red-shouldered Falcon. *Arct. zool.* 2. p. 206. n. 102.

Habitat in insula Longa, 20-22 pollices longus.

Rostrum caeruleum; unguis nigri; caput et collum ex flavicante alba, lineis obscuris striata.

obsole- 83. F. corpore obscure fusco, subtus leviter albo-maculatis, tus. reétricibus mediis obsolescentibus fuscis.

Plain Falcon. *Arct. zool.* 2. p. 208. n. 104.

Habitat in freto Hudsonis, bipedalis; rostrum nigrum.

rustico- 7. F. cera, palpebris, pedibusque luteis, corpore cinereo alboque undulato, collari albo. *Fn. suec.* 56.

Collared Falcon. *Arct. zool.* 2. p. 222. G. *Lath. syn.* I. 1. p. 56. n. 37.

Habitat in Suecia, Sibiria, Groenlandia, gallinae magnitudine.

Rostrum plumbeum; corpus subtus album, maculis exiguis cordatis fuscis; cauda taeniis 12-13 alternatim albis et fuscis; unguis nigri.

novae 84. F. cera pedibusque luteis, corpore ex atro fusco, subtus rufo-maculato, cauda alisque griseo-maculatis. Seelan- diae.

New-Zealand Falcon. *Lath. syn.* I. 1. p. 57. n. 38. t. 4.

Habitat in nova Seelandia, vulturi affinis, 18 pollices, femina 23 pollices longa; rostrum caeruleum, apice nigrum; irides nudaeque orbitae caeruleae, feminae flavae; huic collum et abdomen lineis albidis, cauda taeniis transversis albis notata.

- palumba- 30. F. cera nigra, margine pedibusque flavis, corpore fuscō,
rius. rectricibus fasciis pallidis, superciliis albīs. Fn. suec. 67.
Accipiter palumbarius. Gesn. av. 51. Aldr. orn. I. p. 342.
t. 343. Raj. av. 18. n. 1.
Asterias. Aldr. orn. I. p. 336. t. 340. 341.
Astur. Briss. orn. p. 91. n. 3.
Autour. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 230. t. 12. pl. enlum.
n. 418. 461.
Goshawk. Brit. zool. I. n. 52. Arct. zool. 2. p. 204. n. 99.
Albin. av. 2. p. 8. t. 8. Will. orn. p. 85. t. 3. 5. Lath.
syn. I. I. p. 58. n. 39.
Großer gesperberter Falk, grosser gepfeilter Falk. Frisch.
av. t. 82. (mas). 81. (fem.) Falck it. III. t. 21.
Habitat in Europa, Calmuccia, America boreali, gallinis
infestus, et ad venatum volucrum adaptandus; 10 polli-
cibus et ultra pedem longitudine excedens.
Rostrum caeruleum, apice nigrum; irides flavae; caput fuf-
cum; corpus subtus totum album nigro-undulatum;
cauda cinerea longa, apice alba; unguis nigri.
- cayen- 85. F. pedibus caeruleis, capite et collo ex caerulecente al-
nensis. bis, dorso alisque obscure cinereis, jugulo, pectore et
abdomine albicantibus.
Cayenne Falcon. Lath. syn. I. I. p. 59. n. 40.
Habitat in Cayenna.
Rostrum caeruleum; unguis et remiges primariae nigrae,
secundariae nigro-lineatae; caudae apex albus, taeniae
4 - 5 alternatim albae et nigrae.
- macrou- 85. F. cera pedibusque luteis, rostro nigricante, corpore su-
rus. pra cinereo subtus albo, remigibus interioribus cinereis
apice albīs. S. G. Gmelin it. I. p. 48. nov. comm. Petrop.
XV. p. 439. t. 8. 9. Lepechin it. I. p. 260.
Long-tailed Falcon. Lath. syn. I. I. p. 59. n. 41.
Habitat in Russia lanarii magnitudine, 7 pollicibus pedem
longitudine superans; cauda fere 9 pollicum; rostrum ni-
grum, basi viride.

13. F.

Falconaria ars, scilicet ars falcones columba et lanio capiendi, ad ancupium et vena-
tum antiloparum, ardearum, avicularum, etc. instituendi, tataris nonnullis gen-
tibus familiaris, in Europa propriis artificibus commissa, in luxuriam magnatum,
transit in scientiam; omnes fere falcones possunt ita instrui; v. d' Espanon Fal-
conaria. Francof. 1617. 4.

gentilis. 13. F. cera pedibusque flavis, corpore cinereo maculis fuscis, cauda fasciis quatuor nigricantibus. *Fn. suec.* 58. *Scop. ann.* I. p. 15..

Falco gentilis. *Gesn. av.* 71. *Aldr. orn.* I. p. 481. *Raj. av.* 13. *Briss. av.* I. p. 339.

Gentle Falcon. *Brit. zool.* n. 50. t. 21. 22. *Arct. zool.* 2. p. 203. n. 98. *Albin. av.* 2. p. 4. t. 6. *Will. orn.* 46. *Lath. synops.* I. I. p. 64. n. 48.

Habitat in alpibus Europaeis, America boreali, ad Volgam, vicitans tetraonibus, palumbario major; rostrum plumbeum; irides flavae; caput subferrugineum, maculis oblongis nigris; cauda albo punctata; unguis nigri.

communis. 86. F. fuscus, pennarum margine rufo, cauda taeniis transversis saturatioribus, rostro ex cinereo caerulecente, cera, iridibus pedibusque luteis.

Falco. *Briss. orn.* p. 92. n. 4.

Faucon. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 249.

Schwarzbrauner Falk. *Frisch. av.* t. 74.

hornatus. β. F. in cinereum vergens. *Briss. orn.* p. 93. n. 4. A. *Faucon fors.* *Buff. hist. nat. des ois.* I. t. 15. pl. enlum. n. 470.

Gearling Falcon. *Lath. syn.* I. I. p. 65. n. 49. A. *Annuus falco.*

gibbosus. γ. F. gibbosus. *Raj. av.* p. 14. n. 6. *Briss. orn.* p. 93. n. 4. B. *Faucon haggard ou bossu.* *Buff. hist. nat. des ois.* I. t. 16. pl. enlum. n. 471.

Haggard Falcon. *Will. orn.* p. 80. *Latham syn.* I. I. p. 66. n. 49. B.

Senex avis.

leucoccephalus. δ. Falco. *Briss. orn.* p. 93. n. 4. C. White-headed Falcon. *Lath. syn.* I. I. p. 66. n. 49. C. Rauh-fuis geyer; gelbbrauner Geyer. *Frisch. av.* t. 75.

albus. ε. F. albus. *Raj. av.* p. 14. n. 7. *Briss. orn.* p. 94. n. 4. D. White Falcon. *Will. orn.* p. 80. n. 7. *Lath. syn.* I. I. p. 66. n. 49. D.

Weisser Falk, weisser Geyer. *Frisch. av.* t. 80.

ater. ζ. F. niger. *Briss. orn.* p. 94. n. 4. E. *Falco columbarius Nebbi dictus.* *Raj. av.* p. 161. *Faucon passager.* *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 263. pl. enlum. n. 469.

Black hawk or Falcon. *Edw. av.* I. t. 4.

Black

- fuscis,
Scop.
Raj.
ool. 2.
rn. 46.
olgam,
plum-
ilis ob-
s trans-
e, cera,
enlum.
n. 4. B.
t. 16.
. p. 66.
C.
75.
4. D.
. p. 66.
enlum.
Black
- naevius. η . F. maculatus. *Briß. orn. p. 95. n. 4. F.*
Schwarzbrauner Habicht. *Frisch. av. t. 83.*
Spotted Falcon. *Edw. av. I. t. 3.*
Spotted-winged Falcon. *Lath. syn. I. I. p. 68. n. 49. F.*
- fuscus. δ . F. corpore supra fusco maculis obscurioribus, subtus albo
maculis fuscis.
Falco fuscus. *Briß. orn. p. 95. n. 4. G.*
Brown Falcon. *Lath. syn. I. I. p. 68. n. 49. G.*
Braunfahler Geyer. *Frisch. av. t. 76.*
- ruber. ι . F. maculis nigris et rubris. *Briß. orn. p. 96. n. 4. H.*
Falco rubens. *Raj. av. p. 14. n. 10.*
Red Falcon. *Will. orn. p. 81. n. 10. Lath. syn. I. I. p. 69.
n. 49. H.*
- indicus. κ . F. corpore subtus ex rubescente fulvo.
Falco ruber indicus. *Briß. orn. p. 96. n. 4. I.*
Falcones rubri indici Aldrovandi. *Raj. av. p. 14. n. 11.
Will. orn. p. 81. n. 9.*
Red Indian Falcon. *Lath. syn. I. I. p. 69. n. 49. I.*
- italicus. λ . F. pectore luteo, maculis ferrugineis, alis versus apicem
albo-maculatis.
Falco italicus. *Zonst. av. p. 19. Briß. orn. p. 97. n. 4. K.*
Italian Falcon. *Lath. syn. I. I. p. 70. n. 49. K.*
- arcticus. μ . F. islandus. *Briß. orn. p. 97. n. 4. L.*
Arctic Falcon. *Lath. syn. I. I. p. 70. n. 49. L.*
*Habitat in Europa, ε) etiam in Sina, η) in freto Hudsonis,
η) in India, venatui aptissimus.*
- islandus. $\delta\gamma$. F. cera pedibusque flavis, corpore fusco, subtus albo ma-
culis cordatis nigris, cauda albo fasciata. *Brünn. orn. bor.
p. 2. n. 9.*
- albus. β . F. albus, supra maculis exiguis cordatis nigris, caudae al-
bae rectricibus duabus intermediis obsolete nigro fasciatis.
Brünn. orn. bor. p. 2. n. 7.
- macula- γ . F. albus, maculis cordatis magnis, rectricibus albis, singu-
tus. lis nigro-fasciatis. *Brünn. orn. bor. p. 2. n. 8.*
*Habitat in Islandia, 9 pollicibus pedem longitudine excedens;
caput album, ferrugineo admisto; dorium obscurum sin-
gulis pennis albidis, fusco-fasciatis, et albo marginatis;
cauda rotundata, fasciis circiter 14 alternis fuscis et al-
bis; unguis nigri, posterior paelongus.*

barbarus. 8. F. cera pedibusque luteis, corpore caerulefcente fuscoque maculato, pectore immaculato, cauda fasciata.

Falco barbaricus. *Briss. orn. p. 99. n. 6. A.*

Falco tunetanus. *Aldr. av. I. p. 483. Raj. av. 14. n. 9.*

Barbary Falcon. *Will. orn. p. 81. Alb. av. 3. p. 2. t. 2. Lath. syn. I. I. p. 72. n. 51.*

Habitat in Barbaria, magnitudine et colore ad lanarium accedens, 17 pollices longus. Rostrum nigrum; irides flavae; alae vix maculatae; pectus ex flavicante album in caeruleum vergens, abdomen maculis oblongis nigris; cauda fasciis 7 transversis fuscis. An mera peregrini varietas?

peregrinus. 88. F. cera pedibusque luteis, corpore supra cinereo fasciato, subtus ex rufo albo, taeniis nigricantibus, cauda albo-punctata.

Falco peregrinus. *Raj. av. p. 13. n. 1. Briss. orn. p. 98. n. 6.*

Faucon pelerin. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 249.*

Peregrine Falcon. *Brit. zool. n. 48. t. 20. Arct. zool. 2. p. 203. Will. orn. p. 76. t. 8. Latham syn. I. I. p. 73. n. 52.*

tataricus. 89. F. alis supra rufis, digitis praelongis. *Briss. orn. p. 100. n. 6. B.*

Faucon de Tartarie ou Barbarie. *Bel. hist. des ois. p. 116.*

Tatarian Falcon. *Lath. syn. I. I. p. 73. n. 52. A.*

Habitat in Europa et boreali Asia et America.

Migratorius; an non nisi actate deformis gentilis?

versico- 89. F. cera flava, capite et corpore supra albo, maculis ex ru-
lor. fuscis, subtus albo, pectore ferrugineo pa-
rumper maculato.

Spotted Falcon. *Brit. zool. n. 55. t. 26. Latham syn. I. I. p. 74. n. 53.*

Habitat in Anglia, buteonis magnitudine. Rostrum nigrum; alae fasciis cinereis; cauda dilutius et obscurius fuscis.

pennatus. 90. F. cera pedibusque luteis, corpore supra ex nigricante fuso, et fordide griseo variegato, subtus ex flavo fuso lincis longitudinalibus nigricantibus, pedibus ad digitos usque pennatis.

Faucon pata. *Briss. orn. VI. app. p. 22. t. 1.*

Booted Falcon. *Lath. syn. I. I. p. 75. n. 55.*

Magni-

Magnitudo *Gyrfalconis*; longitudo pedis, et $7\frac{1}{4}$ pollicum; rostrum nigricans; palpebrae luteae; caput et ceryx ex fulvo grisea, lineis nigricantibus; cauda fusca, versus apicem nigricans, apice grisea, ad latera albo-maculata. Ungues nigri.

- spadiceus. 91. F. cera flava, corpore spadiceo ferrugineo admixto, inferius ad latera albo, pedibus ad digitos usque pennatis. *Falco spadiceus* or Chocolate Falcon. *Forster aet. angl. LXII.* p. 281. et *amer. catal. p. 9.*
Chocolate-colored Falcon. *Arct. zool. 2. p. 201. n. 94. t. IX.*
Bay-Falcon et *Placentia Falcon.* *Lath. syn. I. I. p. 54. n. 34. A. et 76. n. 57.*
- β. F. uropygio albo.
White-rumped Bay-Falcon. *Lath. syn. I. I. p. 54. n. 34. B.*
Habitat in freto Hudsonis, et nova terra, viellitans anatibus, quibus in rupibus inhiat.
Longitudo pedis et 10 pollicum; rostrum nigrum; rectrices duae intermediae nigrae et cinereae, ceterae extus obscurae, intus albo et nigro variae. *Digiti breves.*
- S. Johani. 92. F. cera pedibusque pennatis flavis, corpore fusco, supra lineis obliquis nigris et fordiste albis, subtus passim maculis albis et flavicantibus, cauda fasciata apice alba.
S. John's Falcon. *Arct. zool. 2. p. 200. n. 93. t. IX. Lath. syn. p. 77. n. 58.*
Habitat in freto Hudsonis et nova terra; pedem et 9 pollices longus. *Digiti breves.*
- facer. 93. F. cera pedibusque caeruleis, dorso, pectore et tectricibus alarum primoribus fusco-maculatis, cauda maculis reniformibus.
Falco facer. *Briff. orn. p. 98. n. 4. M. Raj. av. p. 13. n. 2.*
Sacre. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 246. t. 14. Will. orn. p. 77. Lath. syn. I. I. p. 77. n. 59.*
β. *Falco facer.* *Forster aet. angl. LXII. p. 382.*
Sacre. *Arct. zool. 2. p. 202. n. 96.*
American Sacre. *Lath. syn. I. I. p. 78. n. 59. A.*
Habitat β) in freto Hudsonis, nova terra, Tataria, heic ad venatum institutus; frigoris patientissimus, ardeam albam potissimum venatur; Aprili et Majo in locis desertis ova plerumque 2 ponens, bipedalis; caput obscure fuscum; pennae abdominis albae, medio fusco maculatae; tectrices alarum, remigesque primariae lineis transversis albis;

- ceyl.
fi
grise
Gyr
can
can
isla
cu
fuf
- cauda fusca, ad latera maculis ovalibus transversis rubris. Pedes ad digitos fere pennati.
- novae terrae.** 94. F. cera pedibusque flavis, occipite ferrugineo, corpore supra fusco, subtus ferrugineo, cauda lineis dilutius et saturatius fuscis varia. New foundland Falcon. *Arct. zool. 2. p. 201. n. 95.* *Lath. syn. I. 1. p. 79. n. 60.* Habitat in nova terra, 20 pollices longus; pedes semipennati.
- stellaris.** 95. F. pedibus caeruleis, corpore nigrieante maculis radiatis, subtus ex albo et nigro mixto. *Briff. orn. p. 103. n. 11.* Blae-footed Falcon. *Will. orn. p. 82. c. 11.* Starry Falcon. *Lath. syn. I. 1. p. 79. n. 61.* Magnitudo habitusque peregrini; alae tamen breviores; cauda longior; irides aureae.
- hyemalis.** 96. F. cera flava, capite dorsoque ex atro fuscis, cervice albostriata, pectori et abdomine albis, maculis cordatis. Winter Falcon. *Arct. zool. 2. p. 209. n. 107.* $\beta.$ Northern Falcon. *Lath. syn. I. 1. p. 79. n. 62.* Habitat hieme in provincia Noveboracensi, pygargi magnitudine. Teetrices alarum obscurae, margine sordide albo, extimae aurantio; cauda lineis fuscis et nigris, apice alba; rostrum nigrum; pedes longi, graciles.
- cirrhatus.** 97. F. cera pedibusque pennatis luteis, capit is crista retrorsum pendula, corpore supra nigro, subtus albo et nigro striato. Falco indicus cristatus. *Briff. orn. p. 104. n. 12.* Falco indicus cirrhatus. *Raj. av. p. 14. n. 12.* Faucon hupé des Indes. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 271. n. 4.* Crested indian Falcon. *Will. orn. p. 82. n. 12.* *Lath. syn. I. 1. p. 80. n. 63.* Habitat in India, palumbarii circiter magnitudine; rostrum obscure caeruleum; irides flavae; cervix fulva; cauda fasciis transversis nigris et cinereis; unguis nigri.
- melano-leucos.** 98. F. pedibus luteis, capite, collo, dorso, humeris, et remigibus nigris, reliquo corpore, teetricibus alarum et cauda albis. Black and white indian Falcon. *Penn. ind. zool. t. 3. Lath. syn. I. 1. p. 81. n. 65.* Habitat in Zeylon, 16 pollices longus; rostrum, unguis, teetrices alarum mediae plures nigricant; irides flavent; orbitae albo maculatae.

- ceylanen. 99. F. cera flava, corpore lacteo, occipitis pennis duabus de-
fisis. pendentibus.
Ceylonese crested Falcon. *Lath. syn. I. I. p. 82. n. 66.*
Habitat in Zeylon; rostrum obscurum.
- griseus. 100. F. cera pedibusque flavis, corpore supra obscure griseo,
subtus albo, maculis oblongis nigris, rectricibus longis,
intermediis duabus concoloribus, reliquis maculatis.
Grey Falcon. *Brit. zool. n. 49. Lath. syn. I. I. p. 82. n. 67.*
Habitat in Anglia, corvi magnitudine.
*Rostrum caerulescens; irides rubrae; caput anterius obscure
fuscum, posterius album, ad latera cum gula bubalinum;
remiges albo-maculatae.*
- Gyrfalco. 27. F. cera caerulea, pedibus luteis, corpore fuso, subtus
fasciis cinereis, caudae lateribus albis. *Fn. suec. 64.*
Brown Jerfalcon. *Lath. syn. I. I. p. 82. n. 68.*
Habitat in Europa, gruibus, ardeis, columbis infestus.
Variat pedibus caeruleis et flavis.
- candi- 101. F. cera pedibusque ex caerulecente cinereis, corpore
cans. albo fuso-maculato.
Gyrfalco. *Aldrov. orn. I. p. 471. t. 473. Raj. av. 13. n. 3.*
Gerfault. *Briss. orn. I. p. 370. n. 19. t. 30. f. 2. Buff. hist.
nat. des ois. I. p. 239. t. 13. pl. enlum. n. 215. 446. 462.*
Gerfalcon. *Will. orn. p. 78. n. 3.*
Gyrfalcon. *Brit. zool. n. 47. Arct. zool. 2. p. 221.*
White Jerfalcon. *Lath. syn. I. I. p. 83. n. 69.*
- islandi- β. Gerfault d' Islande. *Briss. orn. I. p. 373. t. 31.*
cus. Iceland Jerfalcon. *Lath. syn. I. I. p. 84. n. 69. A.*
*Habitat in Islandia et Scotia boreali, palumbarii magnitu-
dine; rostrum ex caeruleo cinereum, apice nigricans;
ungues plumbei; irides et orbitae caeruleae, (β. irides lu-
teae). β. Corpus supra fuscum, dorsi et alarum maculis
albis, subtus album nigro maculatum. Pedes flavi.*
- sufflator. 17. F. cera pedibusque luteis, corpore fuso albido, oculo-
rum operculis osseis.
Surinam Falcon. *Lath. syn. I. I. p. 85. n. 70.*
*Habitat in Surinamo et Cayenna; iratus aut territus caput
inflat ad magnitudinem corporis. Rolander.*
*Corpus supra fuscum, plumis basi albis; subtus luteo, albo
fuscoque maculatum, uti etiam rectrices. Nares lobo
carneo intercalari.*

- cachin- 18. F. cera pedibusque luteis, palpebris albis, corpore fusco
nans. albidoque vario, annulo nigro verticem album cingente,
Laughing Falcon. *Lath. syn.* I. I. p. 85. n. 71.
Habitat in America meridionali; hominem observans cachin-
nos edit. Rolander.
Corpus supra dorsum, alas, uropygium fuscum; sed alba
sunt collum, gula, pectus, abdomen, alae subtus. Cauda
fasciis luteis nigrisque.
- Lanarius.** 24. F. cera lutea, pedibus rostroque caeruleis, corpore subtus
maculis nigris longitudinalibus. *Fn. suec.* 62.
Lanarius. *Gesn.* av. 76. *Aldr. orn.* I. p. 488. *Raj. av.*
p. 15. n. 13. *Briff. orn.* p. 105. n. 16.
Lanier. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 243.
Lanneret. *Albin. av.* 2. p. 7. t. 7.
Lanner. *Brit. zool.* n. 51. t. 23. *Arct. zool.* 2. p. 225. *Will.*
orn. p. 82. n. 13.
Brown Lanner. *Lath. syn.* I. I. p. 86. n. 72.
Habitat in Europa, desertis Uralensi, Baraba aliisque tata-
ricis, migratorius; nidificans in arboribus humilibus;
venatus aptissimus.
Taenia alba cingit frontem supra oculos. Pedes breves, et,
prouti nonnunquam cera, caerulecentes; pectus album,
flavo tinctum, maculis fuscis; remiges primariae et cau-
da obscura; haec utrinque, illae intus maculis ovalibus
ferrugineis.
- albicans. 102. F. cera pedibusque luteis, corpore subtus albicante, re-
migibus nigricantibus.
Lanarius albicans. *Briff. orn.* p. 107. n. 18.
Lanarius. *Aldrov. orn.* I. p. 380. fig. p. 181.
White Lanner. *Lath. syn.* I. I. p. 87. n. 73.
β. Lanarius rectricibus duabus intermediis griseis, reliquis ma-
culatis albis.
Lanarius. *Aldrov. orn.* I. p. 380. fig. p. 183.
Habitat in Europa, an vere distinctus a lanario?
- cyaneus. 10. F. cera alba, pedibus fulvis, corpore caeruleo-canescente,
arcu superciliari albo gulam cingente.
Lanarius cinereus. *Briff. orn.* p. 106. n. 17.
Oiseau S. Martin. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 212. *planch.*
entum. n. 459.
Blue Hawk. *Edw. av.* 5. p. 33. t. 225.
Hen-harrier. *Brit. zool.* n. 58. t. 28. *Lath. syn.* I. I. p. 88.
n. 74. Hayes brit. Birds t. I.
Grau-weisse Geyer. *Frisch av.* t. 79. 80.

Habi-

*Habitat in Europa et Africa, 17 pollices longus.
Rostrum nigrum; irides, aliquando etiam cera, luteae; occiput album, maculis dilute fuscis; pectus et abdomen similiter alba, prius obscure striatum; rectrices 2 intermediae utrinque, reliquae extus griseae, intus albae, obscure striatae.*

pygar- 11. F. cera pedibusque flavis, corpore cinereo, abdomine palido, maculis oblongis rufis, oculorum orbita alba. *Scop. ann. I. p. 14.*

Falco torquatus. Briss. av. I. p. 345.

Subbuteo. Gesn. av. 48.

Pygargus. Alb. av. 2. p. 5. t. 5. et 3. p. 3. t. 3. Will. orn. t. 7. Raj. av. 17. n. 5.

Soubuse. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 215. t. 9. planch. enl. n. 443. 480.

Ring tail. Brit. zool. n. 59. Arct. zool. 2. p. 209. n. 106. Will. orn. p. 72. Lath. syn. I. I. p. 89. n. 75. Hayes brit. Birds t. 2.

Habitat in Europa, et temperatori Sibiria, 7½ pollicibus pedem longitudine superans; rostrum pallidum; irides flavae; cauda longiuscula, obscure fasciata, albo punctata; mas subtus maculis transversis, femina longitudinalibus.

hudso- 19. F. cera pedibusque flavis, dorso fusco, superciliis albis, nius. speculo alarum caerulecente.

Accipiter freti Hudsonis. Briss. av. 6. app. 18.

Ringtail Hawk. Edw. av. 107. t. 107.

Hudson's bay Ringtail. Lath. syn. I. I. p. 91. n. 76.

Habitat ad fretum Hudsonis, pedem et 9½ pollices longus.

Rostrum unguisque nigri; corpus subtus album, maculis ex rufo fuscis; rectrices 2 intermediae subfuscæ, extimæ albæ, reliquæ ex caerulecente cinereæ, singulæ striis transversis fuscis.

Buffoni, 103. F. cera caerulea, pedibus luteis, corpore supra spadiceo, subtus ex rufescente bubalino, superciliis flavis, caudæ fasciis pallide et obscure fuscis.

Cayenne Ringtail. Lath. syn. I. I. p. 91. n. 76. A.

Habitat in Cayenna, bipedalis.

Rostrum unguisque nigri; pennæ primariae intus obscuræ, extus ex cinereo caeruleæ, fasciis fuscis, in secundariis magis obsoletis; remiges apice albæ.

uligino- 104. F. cera pedibusque aurantiis, corpore supra fusco, sub-
fus.

Marsh Hawk. *Arch. zool.* 2. p. 208. n. 105. *Edw. av.* 4.
t. 291. *Lath. syn.* I. 1. p. 90. n. 75. A.

*Habitat in Jamaica, Pennsylvania, heic aestate in locis uli-
ginosis aviculas, reptilia, serpentes venans, hieme disce-
dens, bipedalis.*

*Rostrum caerulescens; orbitae aurantiae; irides castaneae;
linea nigra ab angulo rostri pone oculos ducta; supra banc
albagena cingens et ad cervicem pergens; caput, collum
et pectoris superior pars ex nigro et ferrugineo varia;
rectrices alarum fuscae; pedes crassi, breves, robusti.*

II, 19, 103 et 104 perquam inter se affines.

Lithofal- 105. F. cera lutea, corpore supra cinereo, subtus rufo macu-
co.

lis longitudinalibus fuscis, cauda cinerea, versus apicem

nigricante, apice alba.

Lithofalco. *Briss. orn.* p. 101. n. 8.

Lithofalco et Dendrofalco. *Raj. av.* p. 18. n. 8.

Rochier. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 286. *pl. enlum.* n. 447.

Stone-or Treefalcon. *Will. orn.* p. 80. *Latham syn.* I. 1.
p. 93. n. 77.

*Tinnunculi magnitudine, 12½ pollices longus; rostrum ex
caerulecente cinereum; irides luteae; rectrices 2 inter-
mediae unicolores, reliquae nigro-fasciatae.*

monta- 106. F. pedibus luteis, corpore supra ex fusco cinereo, gula
nus.

juguloque albidi maculatis, caudae basi cinerea, medio

nigricante, apice albo.

Falco montanus. *Raj. av.* p. 13. n. 4. *Briss. orn.* p. 101.
n. 9.

Mountain Falcon. *Will. orn.* p. 78. *Lath. syn.* I. 1. p. 93.
n. 78.

β. Falco montanus cinereus *Briss. orn.* p. 102. n. 9. A.

Falco montanus secundus Aldrovandi. *Will. orn.* t. 9.

*Peregrino minor, cauda breviore; β) pedem et 9 pollices
longus; rostrum nigrum; irides β) flavae; unguis nigri;
corpus β) subtus niveum; colli maculae nunc ferrugineae,
nunc nigrae; aliquando collum et pectus tota nigra; adul-
ti caput nigrum. An varietas Lithofalconis?*

Tinnun- 16. F. cera pedibusque flavis, dorso rufo punctis nigris, pec-
culus.

tore striis fuscis, cauda rotundata. *Fn. suec.* 61. *Scop.*

ann. I. p. 16.

Tinnunculus f. Cenchrus. *Gesn. av.* 54. *Aldr. orn.* I. p. 356.
t. 358.

- t. 358. 359. Raj. av. p. 16. n. 16. Briss. av. I. p. 393.
 n. 27.
- Cresserelle. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 280. t. 18. planch.
 enlum. n. 401. 471.
- Kestrel, Kestril, Stannel, or Wind-hover. Brit. zool. n. 60.
 Arct. zool. 2. p. 226. M. Will. orn. p. 84. t. 5. Lath.
 syn. I. I. p. 94. n. 78. Hayes brit. birds. t. IV.
 Rother Falk, et Rothelgeyer. Frisch. av. t. 84. 85.
- griseus. β. Tinnunculus pennis griseis. S. G. Gmelin it. p. 49. t. 10.
- alauda-
rius. γ. Accipiter alaudarius. Briss. orn. p. 110. n. 22.
 Maeuse-Falk. Frisch. av. t. 88.
Habitat in Europae et Sibiriae, potissimum turribus, aviculis, muribus, insectis viettans; advenit ex migratione primo die germinationis s. veris, una cum motacilla alba. Olim ad capiendas perdices aliasque minores aves instruetus.
Caudae fascia lata nigra versus apicem; rectrices, intermedii exceptis, apice albæ; mari corona capitidis et cauda dilute griseæ; dorsum et alae, ex purpurascente rufæ, nigro maculatae; feminæ longe ponderosiori caput rufescens, corona nigro-striata, dorsum, cauda, tectricesque alarum ferrugineæ, nigro-lineatae.
- bohemi-
cus. 107. F. pedibus flavescentibus, corpore supra cinereo, subtus candido, remigibus quinque exterioribus extus nigris, orbitis albis.
 Maeuse-habicht, Missylauce. Jos. Mayer boehm. Abb. 6.
 p. 313.
Habitat in Bohemiae montosis, muribus viettans, vespere denum conspicuus, vix ultra pedem longus.
Rostrum versus oris angulos flavescens; irides flavæ; cauda acuta, longa; pedes crassiusculi, infra genua plumosi; unguis nigri teretiusculi.
- piscator. 108. F. pedibus fuscis, capite ferrugineo; pennis elongatis, corpore supra cinereo, subtus ex flavicante pallide albo, cauda supra dilute fusca, subtus ex caerulecente cinerea.
 Faucon pecheur. Dampier it. 3. p. 318.
 Faucon pecheur de Senegal ou Tanas. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 275. pl. enlum. p. 478.

Difficillime in hoc genere pluribusque aliis designandi limites specierum et varietatum, cum aetas, sexus, clima, vitae genus, generatio hybrida pennarum ipsiusque cerac colorem mutet.

Fishing Falcon. *Lath. syn. I. I. p. 95. n. 80.*

Habitat in terra Senegal, piscibus vicitans, quos non integrum deglutit.

Rostrum iridesque flavae; margo pennarum superiorum ex ferrugineo fuscus; inferiorum medium macula fuscata.

badius. 109. F. pedibus pallidis, capite et corpore supra fusco, subtus albo, lunulis flavis, cauda dilute fusca, lineis 4 obscurioribus.

Brown Hawk. *Brown. Illustr. p. 6. t. 3. Lath. syn. I. I. p. 96. n. 81.*

Habitat in Zeylon, 13 pollices longus.

Rostrum caeruleum, apice nigro; irides flavae; testrices alarum margine albo; humeri maculis albis; unguis nigri.

aquilinus. 110. F. cera pedibusque flavis, corpore supra caeruleo, subtus ex rubicundo albo, collo ex purpurascente rufo.

Petit Aigle d'Amerique. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 142. pl. enlum. n. 417.*

Red-throated Falcon. *Lath. syn. I. I. p. 97. n. 82.*

Habitat in America australi, 16-18 pollices longus.

Rostrum caeruleum; orbitae flavae; irides aurantiae; unguis nigri.

fuscus. 111. F. cera cinerea, pedibus flavis, corpore nigro-undulato, supra ex cinereo fusco, subtus albicante. [I. F. Miller illustr. t. XVIII.]

American brown Hawk. *Lath. syn. I. I. p. 98. n. 84.*

Habitat in America, Nisi magnitudine et facie; rostrum dilute plumbeum; vertex et latera capitinis striis longitudinalibus albis; abdomen ex rufescente fuscis, in femina numerosioribus; cauda ex cinereo fusca, striis tribus transversis obscure fuscis, apice pallido; unguis nigri.

Nifus. 31. F. cera viridi, pedibus flavis, abdomine albo griseo undulato, cauda fasciis nigricantibus. *Fn. suec. 68. Scop. ann. I. p. 17.*

Accipiter. *Briss. orn. p. 89. n. 1.*

Accipiter fringillarius. *Gesn. av. 51. Aldr. orn. I. p. 344. t. 346. 347. Bell. av. 19. b. Raj. av. 18.*

Moscheutus. *Aldr. orn. 345.*

Epervier. *Buffon hist. nat. des ois. I. p. 225. t. II. planch. enlum. n. 412. 466. 467.*

Sparrow Hawk. *Brit. zool. n. 62. Arct. zool. 2. p. 226. N. Alb.*

Alb. av. 3. p. 4. t. 4. et 1. p. 5. t. 5. Will. orn. p. 86.

Lath. syn. I. 1. p. 99. n. 85. Hayes brit. birds. t. III.

Sperber. Frisch. av. t. 90. 91. 92. Günther Nester u. Eyer. t. 6.

macula- β . *Accipiter maculatus. Briss. orn. p. 90. A.*
tus. Spotted Sparrowhawk. *Lath. syn. I. 1. p. 100. n. 85. A.*

laeteus. γ . *Accipiter corpore toto laeteo unicolo.*
White Sparrow Hawk. *Lath. syn. I. 1. p. 100. n. 85. B.*

Habitat in Europa, etiam maxime boreali, et Madera, audax, gallinis, perdricibus, columbis, passeribusque maxime infestus; venatur egregie alaudas; hinc ejus usus in aucupiis.
Mas 12, femina 15 pollices longa; rostrum caerulescens; caput, dorsum, tectrices alarum, et cauda in aliis ex obscuro caerulecente cinerea, in aliis obscure fusca, pennis margine ferrugineis; mari in colorem columbinum vergentia, β) albo maculata; gula, pectus, et abdomen ex albido flava, mari obscuriora, undis obscure fuscis, vel aurantiis, in femina magis abruptis et numerosioribus; in β) fusca, maculis paucis albis; caudae apex albus, tæniae 5 latae nigrae, β) subtus alternatim albae et fuscae.

dubius. **112.** F. cera pedibusque flavis, capite obscuro striis ferrugineis, corpore supra fulvo subtus sordide albo, striis fuscis, cauda obscure cinerea, taeniis 4 nigris.
Dubious Falcon. *Arct. zool. 2. p. 213. n. 112.*

Habitat in Noveboraco et Carolina, Niso valde affinis, 10 pollices longus.
Rostrum obscurum; irides flavac; tectrices alarum margine ferrugineo; remiges primariae obscure cinereae, nigrolineatae.

obscurus. **113.** F. cera pedibusque flavis, occipite et cervice albo maculatis, corpore supra obscure fulvo, subtus albido nigrolineato, cauda obscure fusca fasciata, albo-punctata.

Dusky Falcon. *Arct. zool. 2. p. 213. n. 113.*

Habitat in Noveboraco, præcedente minor.

Rostrum caerulescens; caput obscure fuscum; tectrices alarum margine leviter ferrugineo; remiges primariae obscure; cauda brevis, taeniis 4 obscuris, totidemque angustioribus albis.

columba- **21.** F. cera pedibusque luteis, corpore fusco subtus albido, rius. cauda fusca fasciis quatuor linearibus albis.

Accipiter Carolinensis. Briss. orn. p. 110. n. 21.

Epervier des pigeons. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 238.
 Pigeon Hawk. Arct. zool. 2. p. 212. n. 111. Catesb. Carol. I. p. 3. t. 3. Lath. syn. I. I. p. 101. n. 86.
Habitat in America septentrionali, 10 $\frac{1}{2}$ pollices longus, migratorius, aviculis viettans.
Rostrum albicans, apice nigro; irides luteae; corpus subtus ex flavicante album, striis fuscis; unguis nigri.

superciliosus. 22. F. cera, pedibus palpebrisque luteis, corpore fuscō albidō undulato, remigibus ferrugineis nigro fasciatis.

Gujana Falcon. Lath. syn. I. I. p. 102. n. 87.

Habitat in Surinamo, Guiana.

Magnitudo Picæ; habitus Nisi; corpus supra fuscum, subtus totum etiam in femoribus confertim nigro undulatum; remiges secundariae margine posteriore albido; cauda nigra, fasciis duabus latis et apice cinereis; crissum album strigis aliquot nigris; uropygium albo nigroque varium; supercilia subtus nuda, prominula; lora setis nigris patentibus; rostrum et unguis nigri; tectrices alarum inferiores albae lineolis tenuissimis nigris.

vespertinus. 23. F. cera, pedibus palpebrisque luteis, crisco femoribusque ferrugineis. S. G. Gmelin it. I. p. 67. II. p. 163. Lepechin it. I. p. 230.

Ingrian Falcon. Lath. syn. I. I. p. 102. n. 88.

Habitat in Ingria et omni Russia, etiam Siberia, Kober et Derbnitschok dictus, vespere et noctu volitans, in cactamine arborum nidificans, aut picam ex nido expellens; coturnices praesertim venans.

Magnitudo columbae; corpus ex fuscō caerulescens; venter ex albo caerulescens; caput fuscum; rostrum flavum, apice fuscō; rectrices 12 supra et subtus fuscae; remiges ex albo caerulecentes; primores 1-7 apice nigricantes; pedes nudi. G. de Demidoff.

vespertinoides. 114. F. cera, pedibus palpebrisque luteis, femoribus nigris, collo, pectori et ventre fuscescentibus albo-maculatis.

Falck it. 3. p. 329.

Habitat in Permia, Sibiriae provincia Issetensi et Baschkiria, vespertino dimidio minor, ut vix drachma pondus duarum unciarum superet.

magnirostris. 115. F. cera pedibusque flavis, corpore supra fuscō, subtus albo ferrugineo striato, cauda fasciis nigris et albis.

Eper-

Subb
teo.

aura
tius

plu

Epervier à gros bec de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois. I.*
p. 237. *pl. enlum. n. 464.*

Great-billed Falcon. *Lath. syn. I. I. p. 103. n. 89.*

Habitat in Cayenna, Niso major, pedibus tamen brevioribus, rostro longiore et crassiore nigro; irides aurantiae; pennarum corpus supra, pectusque tegentium fuscum margo ferrugineus; unguis nigri.

Subbuteo. **14.** F. cera pedibusque flavis, dorso fusco, nucha alba, abdome pallido, maculis oblongis fuscis. *Fn. suec. 59.*

Dendrofalco. *Raj. av. p. 14. n. 8. Briff. av. I. p. 375.*

Subbuteo. *Aldrov. orn. I. p. 374. Alb. av. I. p. 6. t. 6.*

Raj. av. p. 15. n. 14.

Hobreau. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 277. t. 17. pl. enlum. n. 431. 432.*

Hobby. *Brit. zool. n. 61. Arct. zool. 2. p. 227. O. Will. orn. p. 83. Lath. syn. I. I. p. 103. n. 90.*

Habitat in Europa et Sibiria, alaudis infestus, quae eum ita exhorre dicuntur, ut in sinum hominis se recipiant; hinc alaudis capiendis olim adhibitus; migratorius 12 pollices longus.

Rostrum caeruleum; orbitae flavae; irides castaneae, rarius flavae; genae lunula nigra notatae; rectrices laterales fasciis nigricantibus; unguis nigri.

aurantius. **116.** F. rostro pedibusque plumbeis, corpore supra obscure fusco lineis angustis albidis decussantibus, gulae pennis albidis angustis longissimis, jugulo et pectore aurantiis, abdome caudae fuscis interrupte striatis.

Orange-breasted Hobby. *Lath. syn. I. I. p. 105. n. 91.*

Habitat in Surinam, Subbuteonis magnitudine, 15 pollices longus.

Rostrum $\frac{3}{4}$ pollicis longum, basi albicans; cervix, vertex et rectrices alarum unicolores; jugulum maculis rotundatis albis; abdomen lineis coloris bubalini striatum; rectrices caudae inferiores ferrugineae; cauda basin versus albo lineata; pedes longi, graciles; unguis nigri.

plumbeus. **117.** F. cera obscura, pedibus luteis, corpore cinereo, dorsi parte superiore ex plumbeo atro, rectricibus intus maculis tribus albis.

Spotted-tailed Hobby. *Lath. syn. I. I. p. 106. n. 92.*

Habitat in Cayenna, Nisi magnitudine.

Rostrum et unguis nigri; caput collumque cinerea; pedes breves.

118. F.

Aefalon. **118.** F. cera pedibusque flavis, capite ferrugineo, corpore supra ex caerulecente cinereo, maculis striisque ferrugineis, subtus ex flavicante albo, maculis oblongis.

Aefalon. *Briss. orn. p. III. n. 23.*

Aefalon Bellonii et Aldrovandi. *Raj. av. p. 15. n. 15.*

Merlin. *Brit. zool. n. 63. Will. orn. p. 85. t. 3. Latham syn. I. I. p. 106. n. 93.*

Kleinster Rothfalk. *Frisch. av. t. 89.*

novebo- **β.** Aefalon fronte cinerea, vertice, dorso et tectricibus alarum
racensis. castaneis, temporum macula triangulari alba nigro marginata, cauda castanea striis transversis nigris, subtus albidis et nigris.

New-York Merlin. *Lath. syn. I. I. p. 107. n. 93. A.*

caribaea- **γ.** Aefalon supra rufus, subtus albus, utrinque maculis nigris.
rum. Aefalon Antillarum. *Briss. orn. p. III. n. 24.*

Esmerillon Gry Gry. *du Tertre hist. des ant. 2. p. 253.
Raj. av. p. 19. n. 3.*

Falcona- **δ.** Aefalon habitu subbuteonis, cetera lithofalconi similior.
riorum. Esmerillon des Fauconniers. *Buff. hist. nat. des oif. I. p. 288.
t. 19.*

Emerillon. *Buff. planch. enlum. n. 468.*

Habitat in Europa, β) in Noveboraco, γ) in insulis Caribaeis, migratorius, olim venatui adhibitus; $12\frac{1}{2}$, β) 9 pollices longus.

Rostrum magis minusve in caeruleum vergens; irides obscurae, cauda striis transversis 8-15 alternis obscuris et rubentibus; unguis nigri.

Sparre- **20.** F. cera lutea, capite fusco, vertice abdomineque rubro,
rius. alis caerulecentibus.

Aefalon carolinensis. *Briss. av. I. p. 386. t. 32. f. I.*

Falco minor rufescens. *Brown. jam. p. 471.*

Emerillon de la Caroline. *Buff. hist. nat. des oif. I. p. 291.
planch. enlum. n. 465.*

Little Hawk. *Catesb. Carol. I. p. 5. t. 5.*

Little Falcon. *Arct. zool. 2. p. 211. n. 110. Latham syn.
I. I. p. 110. n. 94.*

Habitat in Virginia, Carolina et S. Domingo.

Magnitudo Aefalonis, feminae paulo major; rostrum et irides flavescentes; caput ex caerulecente cinereum; vertex et corpus supra ex aurantio fusca striis transversis nigris, quae similiter in tectricibus alarum; cauda ex rubro fusca,
nigro-

nigro-punctata; pedes lutei. Feminae caput cingitur maculis 7 nigricantibus.

domini. 119. F. cera pedibusque luteis, capite cinereo, corpore supra ex rubro fusco, subtus luteo-albo, utrinque nigro-maculato, rectricibus 8 intermediis castaneis, versus apicem nigris, apice albis.

Emerillon de S. Domingue. *Briss. ornith.* I. p. 389. n. 26.
t. 32. f. 2.

St. Domingo Falcon. *Lath. syn.* I. I. p. 111. n. 95.

Habitat in insula S. Domingo.

Rostrum flavum, apice nigro; irides flavae; rectrices extimae mari extus et apice albae, intus castaneae macula transversa nigra, versus apicem; feminae extus albae, maculis 5 nigris, intus castaneae, secundae castaneae prope apicem albidae, macula nigra; unguis nigri.

minutus. 32. F. cera fusca, pedibus luteis, corpore subtus albo, rectribus fuscis nigro-fasciatis.

Accipiter minor. *Briss. av.* I. p. 315. t. 30. f. 1.

Habitat in Melita, magnitudine turdi, 11 $\frac{1}{2}$ pollices longus.

Rostrum et unguis nigri; corpus supra fuscum, rufo varium; subtus striis ex rufo fuscis transversis; pectus aliquando maculis lanceolatis notatum.

caeruleus. 9. F. cera, palpebris, pedibus subtusque luteis, dorso nigro-caerulecente, temporibus linea alba inclusis.

Faucon de Bengale. *Briss. orn. app.* p. 20. n. 38.

Little black and orange Indian Hawk. *Edw. av.* 108. t. 108.

Bengal Falcon. *Lath. syn.* I. I. p. 112. n. 97.

Habitat in Bengala, minimus sui generis, neque ultra 6 $\frac{1}{2}$ pollices longus.

Rostrum nigricans; synciput candidum; area oculorum nuda, flava; genae albae, linea nigra; cauda nigra; rectrices 2 intermediae unicolores; reliquae intus striis transversis albis; unguis nigricans.

regulus. 120. F. cera virescente, pedibus obscure flavis, torque ferrugineo, corpore supra plumbeo, subtus albido maculis ex ferrugineo fuscis. *Pall. it.* 2. p. 707.

Siberian Falcon. *Lath. syn.* I. I. p. 113. n. 98.

Habitat, rarius tamen, in Siberia, alaudis vicitans, praecedente minor, ut vix semilibram pondere aequet; rostro et habitu Timunculi.

Irides

Irides fuscae; vertex fuscus, lineis nigricantibus; alarum margo albus, subtus varius; rectrices versus apicem plumbeae, fasciis subtus obsoletis, margine nigro, apice albo.

43. STRIX. *Rostrum aduncum (absque cera).*

Nares oblongae pennis setaceis recumbentibus obtectae.

Caput grande; auribus oculisque magnis.
Lingua bifida.

* *Auriculatae, pennis atricularum instar exstantium.*

- Bubo. I. St. corpore rufo. *Fn. suec.* 69. *Scop. ann.* I. p. 18.
Bubo. *Bell. av.* 25. a. *Gesn. av.* 234. *Aldr. orn.* I. p. 502.
Briff. av. I. p. 477. n. 1. *Raj. av.* p. 24. n. 1.
Duc ou Grand Duc. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 322. t. 22.
planch. enlum. n. 435.
Great Horn-Owl, or Eagle-owl. *Alb. av.* 2. p. 9. t. 9.
Will. orn. p. 99. t. 12.
Eagle-owl. *Brit. zool.* n. 64. t. 29.
Great eared Owl. *Lath. syn.* I. 1. p. 116. n. 1.
Schuffut. *Frisch. av.* t. 93.
- β. Bubo atheniensis.
Bubo italicus. *Briff. orn.* p. 140. n. 1. A.
Black winged Horn-owl. *Alb. av.* 3. t. 6.
Eagle-owl. *Will. orn.* p. 99. n. 2.
Great-horned Owl from Athens. *Edw. av.* 37. t. 227.
- γ. Bubo pedibus nudis. *Briff. orn.* p. 141. n. 1. B.
Great Horn-Owl. *Will. orn.* p. 100. n. 3.
- δ. Bubo magellanicus.
Jacurutu. *Marcgr. bras.* p. 199.
Hibou des terres magellaniques. *Buff. pl. enlum.* n. 385.
Habitat in Europae, etiam Calmucciae, δ) in America australis ruderibus, montibus, cavernis, rupibus. Miner- vae avis, unde noctuas Athenas mittere; venatur lepores, cuniculos, talpas, rattos, mures, rarius vespertiliones et amphibia.
- Magnitudo aquilae; irides flavae; caput corpusque lineis et maculis nigris, fuscis, cinereis, ferrugineis eleganter varium; alae longae; cauda brevis, lineis transversis obscuris; pedes testacei, (excepto γ) ad digitos pennati; unguis magni, valde adunci, obscuri.

- alarum
n plum-
ce albo.

ecum-

agnis.

ium.
p. 502.

. t. 22.

9. t. 9.

7.

385.
rica aut-
Miner-
leporis,
tiliones

ineis et
ter va-
obscu-
ungues

13. St.
n pluri-
bus.
e. t. 22.
9. t. 9.

7.

385.
rica aut-
Miner-
leporis,
tiliones

ineis et
ter va-
obscu-
ungues

13. St.
- virginia. 13. St. corpore supra fusco lineis subtilibus rufis cinereisque vario, subtus pallide cinereo, striis transversis fulcis, jugulo et lateribus pectoris ex aurantio fuscis striatis.
Bubo virginianus. Briss. orn. p. 141. n. 2.
Horned Owl. Ellis Hudson'sb. p. 40. t. 2.
Great horned Owl from Virginia. Edw. av. 2. t. 60.
Eagle Owl. Arct. zool. 2. p. 228. n. 114.
Virginian Eagle Owl. Lath. syn. I. I. p. 119. n. 2.
Habitat in omni America, in Africana ad Camchateam usque, et polo arcticō proprius; noctu vocem edens ingratissimam, funestum Americae inquininis omen.
Bubone paulo minor; an ejus varietas? Pennae auricula- rum magnae; rostrum nigrum; irides aureae; alas et cauda taeniis fuscis; pedes ad digitos usque plumis cine- reis vestiti; unguis cornui.
- scandia- 2. St. corpore albido. Fn. suec. 70.
ca. *Bubo lapponicus. Briss. orn. p. 142. n. 3.*
Scandinavian Eagle Owl. Lath. syn. I. I. p. 120. n. 3.
Habitat in alpibus Lapponiae; magnitudine gallopavonis, nigris maculis insignita; an pariter varietas Bubonis?
- seylo- 14. St. corpore supra ex rufescente fusco, subtus ex flavicante albo, circulis faciei ex rufescente fuscis, nigro-striatis.
nensis. *Ceylonese Eagle Owl. Lath. syn. I. I. p. 120. n. 4.*
*Great Ceylonese Horned-owl. Brown's illustr. zool. p. 8.
t. 4.*
Habitat in insula Zeylan, 11 follicibus pedem longitudine superans.
Rostrum corneum; irides flavae; auriculae breves, acutae; remiges primores et cauda lineis transversis nigris, albis et pallide rufis; pedes seminudi.
- Asio. 3. St. corpore supra ferrugineo, subtus cinereo, alis punctis quinque albis.
Scops carolinensis. Briss. av. I. p. 497.
Little Owl. Catesb. Carol. I. p. 7. t. 7.

Red

Strix differt a falcone, ut phalaena a papilione; altera enim diurna altera nocturna est. Noctu pleraque praedantur aviculis, muribus, vespertilionibus; pedes plerisque lanati, ne frigescant, digito extimo retrorsum trahili; aures amplae, membrana vestitae, quae retrotraet tubam Eustachianam auris humanae simulat; oculi magni noctu lucentes, ut tum acutius videant; die pleraque coecunt, passeribus opprobrio expositae; remigum exteriorum una alterave ferrata; unguis uncinatus, acutus.

- Red Owl. *Arct. zool.* 2. p. 231. n. 117. t. XI.
 Red Eared Owl. *Lath. syn.* I. 1. p. 123. n. 8.
Habitat in Noveboraco ad Carolinam usque, 10 $\frac{1}{2}$ pollices longa.
Corpus supra striis, subtus mactulis nigris oblongis; remiges primariae lineis nigris, rufis et albis; cauda rufa, obscure lineata; pedes ad ungues usque pennati.
- mexica- 15. St. corpore ex fusco et nigro vario.
 na. *Asio mexicanus. Briss. orn.* p. 146. n. 9.
Tecolotl. Raj. av. p. 160.
Mexican Eared Owl. Lath. syn. I. 1. p. 123. n. 7.
Habitat in nova Hispania. Oculi magni aurei.
- america- 16. St. capite et corpore supra cinereo, subtus ferrugineo, uro-
 na. pygio albo, nigro maculato, alis caudaque ferrugineis li-
 neis transversis cinereis et griseis.
Asio americanus. Briss. orn. p. 145. n. 7.
Bubo ocreo-cinereus pectore maculofo. Feuill. journ. des obs. ed. 1725. p. 59.
Habitat in America australi, Oti magnitudine, an ejus varietas?
Rostrum luteum; irides aureae; orbitae cinereae; pedes flavi; ungues nigri.
- Otus. 4. St. auricularum pennis senis. *Fn. suec.* 71. *Scop. ann.* I. p. 18.
Asio. Briss. av. I. p. 486.
Otus f. Asio. Bell. av. 25. 6. *Gesn. av.* 223. *Aldr. orn.* I. p. 525. *Raj. av.* 25.
Hibou, appellé Canot. Charlev. nouv. Fr. 3. p. 5. 6.
Moyen Duc ou le Hibou. Buff. hist. nat. des vif. I. p. 342. t. 22. *pl. enlum.* 29.
Horn-owl. Will. orn. p. 100. *Albin. av.* 2. t. 10.
Long-eared Owl. Brit. zool. n. 65. *Arct. zool.* 2. p. 229. n. 115. *Lath. syn.* I. 1. p. 121. n. 5.
Rothes Kaeuzlein. Frisch. av. t. 99.
Habitat in America, Europa, Asia borealibus, ad Astracaniam usque, et in ipsa Aegypto, valde sonora, non migratoria, in arboribus nidificans, et ova 4 alba Aprili ponens.
Pennae auricularum longissimae flavae et nigrae; irides flavae; dorsum tectricesque alarum obscure fusca, grisea et ex flavicante ferruginea; pectus et abdomen pallide flavae striata; cauda cinereo et obscurius lineata. Longitudo 14 pollicum.

- brachyo- 17. St. auricularum penna brevi, corpore supra fuscō, pennis
margine flavis, subtus pallide flavo, longitudinaliter stria-
to. *Forster act. angl. LXII. p. 384. n. 2.*
*Short-eared Owl. Brit. zool. n. 66. t. 31. Arct. zool. 2.
p. 229. n. 116. Lath. syn. I. I. p. 124. n. 9.*
*Chouette ou grande Chevêche. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 372.
t. 27. pl. centum. n. 438.*
*Habitat in America et Europa, potissimum boreali, Sibiria,
14 pollices longa, muribus vigilans, quibus invigilat,
audax. Cauda obscure fusa; rectrices intermediae cir-
culo flavo.*
- brasilia- 18. St. corpore supra pallide ex ferrugineo fuscō albo macula-
to, subtus albido maculis ex ferrugineo fuscis.
Astro brasiliensis. Briss. orn. p. 145. n. 8.
*Cabure ou Caboure. Will. orn. p. 107. n. 8. Buff. hist. nat.
des ois. I. p. 383.*
Noctua Brasiliensis Cabure dicta. Raj. av. p. 26. n. 7.
Brasilian Eared owl. Lath. syn. I. I. p. 125. n. 10.
*Habitat in Brasilia, turdi magnitudine; rostrum, irides, pe-
des breves cum digitis flaviant.*
- nævia. 19. St. corpore griseo, subtus pallidiore, utrinque maculis fer-
ruginosis et nigris, capitis pectorisque pennis nigro-pun-
ctatis.
*Mottled Owl. Arct. zool. 2. p. 231. n. 118. t. XI. Lath.
syn. I. I. p. 126. n. 11.*
*Habitat in Noveboraco, Majo pariens, 11 pollices longa.
Facies alba, fuscō maculata; humeri tectricesque alarum
maculis magnis albis.*
- indica. 20. St. dorso obscuro, tectricibus alarum griseis nigro lineatis,
pectorale bubalino, maculis exiguis sagittatis nigris.
Little Hawk Owl of Ceylon. Penn. ind. zool. t. 3.
Indian Eared Owl. Lath. syn. I. I. p. 127. n. 12.
*Habitat in insula Zeylon, 7 pollices longa.
Rostrum obscurum, setis longis cinetum; caput obscure fus-
cum; orbitae pallide cinereae; pedes seminudi, subtus ex
rufescente flavi.*
- Zorca. 21. St. auricularum pennis 8-9. *Cetti ucc. di Sardegna. p. 60.*
*Habitat in Italia, Sardinia, solitaria, non migrans, 7 pol-
lices longa, ululans.*
Rostrum ex virescente flavum; digitii nudi.

- carnioli- 22. St. corpore ex cinereo albicante, maculis striisque trans-
ca. veris nigricantibus variegato. *Scop. ann. I. p. 19.*
Strix capite subaurito, corpore ex nigro, albo et fusco te-
nuissime undulatim mixtis variegato. *Kramer elench.*
p. 323. n. 3.
Habitat in silvis Carnioliae frigidioris, in rupium fissuris
cavisque arboribus nidificans, ova alba 4-2 ponens;
pulli scarabeo majali nutriuntur.
Habitus passerinus; auriculae in cadavere vix conspicuae;
irides flavae; cauda fuscescens maculata; remiges 6 pri-
mae uno latere albido maculatae.
- deminu- 23. St. minor, corpore rufo. *Pall. it. 2. p. 707. n. 14.*
ta. Yaickan Eagle Owl. *Lath. syn. I. I. p. 128. n. 14.*
Habitat in lucis campestribus et montanis ad fluvium mon-
tesque Uralentes; buboni colore structuraque similis, ast
multo minor, ut vix libram pondere aequet.
- pulchella. 24. St. minima, corpore toto griseo, fusco, ferrugineo albo-
que vario. *Pall. it. I. p. 466. nov. comm. Petrop. XV.*
p. 490. t. XXVI. f. I. Lepech. it. 2. t. 4.
Siberian eared Owl. *Lath. syn. I. I. p. 130. n. 16. t. 5. f. I.*
Habitat circa Catharinopolin Sibiriae, et reliquo australi
Wolgae littore; ultra 9 pollices longa.
Rostrum, pedes, unguesque sordidi; irides flavae; dorsum
sordide cinereum; alae maculis albis oblongis; cauda ru-
fescens, fasciis et punctulis fuscis.
- Scops. 5. St. auricularum penna solitaria.
Scops. *Briff. av. I. p. 495. t. 37. f. I. Aldr. orn. I. 8. c. 4.*
Raj. av. p. 25. n. 3. Lath. syn. I. I. p. 129. n. 15.
Scops ou petit Duc. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 353. t. 24.*
pl. enlum. n. 436.
Little Horn-owl. *Will. orn. p. 101. t. 12.*
Horn- oder Ohreule. *Günth. Nest. u. Eyer, t. 40.*
Habitat in Europa, ex Anglia tamen exul, 7½ pollices lon-
ga, cum muribus agrestibus aliquando bella gerens.
Auricularum pennae a morte vix conspicuae; color pro aeta-
te multum variat, ex griseo, rufo, fusco et nigricante
mixtus; pedes pariter fusco-maculati; digitii unguesque
fusci.

** non

* * non auriculatae.

Nyctea. 6. St. corpore albido, maculis lunatis distantibus fuscis. Fn.

suec. 76. Scop. ann. I. p. 20.

Strix alba freti Hudsonis. Briss. av. I. p. 522.

Hibou blanc d'Islande. Anders. hist. I. p. 85. t. I.

Harfang. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 387. planch. enlum. n. 458.

Great white Owl. Edw. av. 61. t. 61.

Snowy Owl. Arct. zool. 2. p. 233. n. 121. Lath. syn. I. I. p. 132. n. 17.

Habitat in America, Europa, Asia, potissimum borealibus, interdiu volando velocissime ardeas venatur, lepores, mures, aliquando cadaveribus contenta ululans, buboni fere aequalis, bipedalis.

Hyeme evadit saepius immaculata nivea.

Teng- 44. St. corpore griseo, maculis pisiformibus albis, iridibus fla-
malmi. *mali. Tengmalm act. Stockh. ann. 1783. trim. I.*

Habitat in Uplandia Sueciae, merulae magnitudine.

nebulos- 25. St. capite, collo, pectore, dorso et tectricibus alarum fuscis albo-maculatis, abdomine et crissō sordide albis fusco-striatis, cauda fulco et albido fasciata, apice albida. Forster act. angl. LXII. p. 424.

Grey Owl. Act. angl. LXII. p. 386.

Barred Owl. Arct. zool. 2. p. 234. n. 122. t. XI. Latham syn. I. I. p. 133. n. 18.

Habitat in freto Hudsonis et Noveboraco, leporibus, ardeis, muribus viettans, bipedalis; rostro iridibusque flavis.

cinerea. 26. St. capite, cervice, et tectricibus alarum fuliginosis, lineis sordide albis, pectore et abdomine albidis, maculis magnis oblongis obscure fuscis.

Sooty Owl. Arct. zool. 2. p. 232. n. 120.

Cinereous Owl. Lath. syn. I. I. p. 134. n. 19.

Habitat in freto Hudsonis, per paria volans, muribus et leporibus viettans, Maji medio in pinu nidificans, et ova 2 obscure maculata ponens; bipedalis.

Rostrum albidum; irides flavae; cauda striis obliquis fuscis et sordide albis; pars cutis a gula ad crissum denudata.

Wapacu- 27. St. dorso et tectricibus caudae albis, obscure maculatis, thu. pectore et abdomine sordide albis, lineis rufescensibus decussantibus. Arct. zool. 2. p. 231. n. 119.

Habitat in silvis circa fretum Hudsonis, esculentia, muribus et aviculis vivitans, in terra sicca ex musco nidum sicut ens, bipedalis.

Junior albet; rostrum et unguis nigra, incurvata; irides flavae; spatium inter oculos, genas, et gularis album; capitis pennarum apex niger; humeri et tectrices alarum albent, maculis rufescientibus.

cunicula- 28. St. corpore supra fusco subtus albo, pedibus tuberculatis ria, pilosis. *Molina hist. nat. Chil. p. 233. Klein av. p. 57. n. 9. Feuill. obs. phys. ed. 1714. p. 562.*

Noctua coquimbana. Briss. orn. p. 155. n. 11.

Coquimbo Owl. Lath. syn. I. I. p. 145. n. 33.

Habitat in Chili, interdiu aliquando cum femina volans, insectis et amphibiis vivitans, ova 4 alba flavoque varia in cuniculos longos ponens, columbae magnitudine.

Irides flavae; corpus supra albo-maculatum.

Aluco. 7. St. capite ferrugineo, iridibus atris, remigibus primoribus ferratis. *It. oel. 69. Scop. ann. I. p. 26. n. 4. Tengmalm nov. act. Stockh. ann. 1782. 2. n. 8.*

Strix cinerea. Raj. av. p. 26. n. 3.

Ulula. Gesn. av. 773. Aldr. orn. I. p. 540. Briss. av. I. p. 507.

Hulotte. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 358. pl. enlum. n. 441.

Aldrovandus former Aluco. Will. orn. p. 104. t. 13.

Aluco Owl. Lath. syn. I. I. p. 134. n. 20.

Grabeule. Frisch. av. t. 94.

Habitat in Europa, Calmuccis sacra, aestate in silvarum arboribus cavis, bieme hominum habitationes accedens, vivitans muribus, ova 4 sordide grisea in nido buteonis, tinnunculi, carnicis, picae ponens.

Longitudo 15 pollicum; rostrum ex flavicante album aut virens; corpus supra obscure ferrugineum maculis nigris et albidis; subtus album, maculis nigris transversis et longitudinalibus; pedes albi, maculis exiguis nigris.

sylvestris. 29. St. capillito eleganti, iridibus glaucis, corpore albo fuscque vario. *Scop. ann. I. p. 21. n. 13.*

Austrian Owl. Lath. syn. I. I. p. 136. n. 21.

Habitat in Carniolia, galli habitu, et mediae magnitudinis; a basi unius auris per frontem transit ad bosin alterius radius plumosus albicans.

- alba. 30. St. corpore supra rufo griseo maculato, subtus albo; remigibus rectricibusque rufis, his apice albis. *Scop. ann. I. p. 21. n. 14.*
White austrian owl. Lath. syn. I. I. p. 136. n. 22.
Habitat in Foro Julii, gallinae fere habitu, rostro albo, capillitii margine rufo.
- Noctua. 31. St. iridibus fuscis, corpore pallide rufo, maculis fuscis longitudinalibus. *Scop. ann. I. p. 22. n. 15.*
Rufous austrian Owl. Lath. syn. I. I. p. 136. n. 23.
Habitat in Carnioliae silvis, columbae habitu.
- rufa. 32. St. iridibus caerulecentibus, corpore ferrugineo fusco-maculato. *Scop. ann. I. p. 22. n. 16.*
Ferruginous austrian Owl. Lath. syn. I. I. p. 137. n. 24.
Habitat in Idriae silvis, praecedentis habitu.
- solonien- 33. St. corpore supra ex atro fusco, fulvo admisto, subtus albo, cauda alba versus apicem linceis nigricantibus decussantibus.
Ulula five noctua minor dorso ferrugineo, ventre albido.
Salerne orn. p. 56.
Sologne Owl. Lath. syn. I. I. p. 137. n. 25.
Habitat in Galliae provincia Soloniensi, 15 pollices longa; vertex circulusque pennarum faciei exterior rufo alboque varius; digitii cornet.
- flammea. 8. St. corpore luteo punctis albis, subtus albido punctis nigricantibus.
Strix capite laevi, corpore luteo. Fn. suec. 73.
Aluco. Briss. orn. p. 147. n. 2.
Aluco minor. Aldrov. orn. I. p. 536. 538. Raj. av. p. 25.
A. I. Brünn. orn. 17.
Ululae genus alterum. Gesn. av. 775.
Tuidara. Maregr. braf. p. 205.
Effraie ou Fretaie. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 366. t. 26.
planch. enlum. n. 440. 474.
Common Barn or White Owl. Will. orn. p. 104. t. 13.
White Owl. Brit. zool. n. 67. Arct. zool. 2. p. 235. n. 124.
Albin. av. 2. t. II. Lath. syn. I. I. p. 138. n. 26.
Schlaefereule, Perleule. Frisch. av. t. 97.
Habitat in Europa et America, borealiori quoque Asia, Mongolia sacra, 14 pollices longa; rostreum album; irides obscurae; rectrices intus albae, extus obscure lineatae.

stridula. 9. St. corpore ferrugineo, remige tertia longiore. *Fn. suec.* 77.
Scop. ann. I. p. 22. n. 12.

Strix. *Gesn. av.* 738. *Aldrov. orn.* 561. t. 563. *Raj. av.* p. 25. *Briff. av.* I. p. 500.

Chat huant. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 362. t. 25. *planch. enlum.* 437.

Brown Owl. *Albin. av.* I. t. 9.

Common brown or Joy Owl. *Will. orn.* p. 102. t. 14.

Tawny Owl. *Brit. zool.* n. 68. *Arct. zool.* 2. p. 237. *B. Lath. syn.* I. I. p. 139. n. 27.

Braune oder Stockeule, gelbliche oder braune Eule. *Frisch. av.* t. 96. 95.

Habitat in Europae et Tatariae australioris desertis, 19 uncias ponderans.

Caput ferrugineum, cum reliquo corpore supra maculis punctisque obscurioribus; pectus et abdomen flavicant, albo intermixto, subtus striis obscuris; cauda maculis lineisque pallide ferrugineis et nigris.

Ulula. 10. St. corpore supra fusco albo-maculato, rectricibus fasciis linearibus albis. *Fn. suec.* 78. *Nozem. nederl. Vogel.* t. 33. 34.

Noctua major. *Briff. av.* I. p. 511.

Noctua faxatilis. *Gesn. av.* 622. *Aldr. orn.* I. p. 545.

Chouette ou grande Chevêche. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 372. t. 27. *planch. enlum.* 438.

Grey Owl. *Will. orn.* p. 103.

Great brown Owl. *Alb. av.* 3. t. 7.

Brown Owl. *Brit. zool.* n. 69. *Arct. zool.* p. 236. n. 125. *Lath. syn.* I. I. p. 140. n. 28.

Steineule. *Frisch. av.* t. 98.

β. Noctua minor aucuparia. *Nozem. nederl. Vogel.* t. 37.

Habitat in Europa et nova terra, 14 pollices longa.

Irides castaneae; caput, alae et dorsum maculis nigris, humeri tectricesque alarum albis; pectus pallide cinereum, striis obscuris.

funerea. 11. St. corpore fusco, iridibus flavis. *Fn. suec.* 75.

Chat huant de Canada. *Briff. orn.* I. p. 518. n. 6. t. 37. f. 2.

Chouette ou grande Chevêche de Canada. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 391. n. 5.

Canada Owl. *Lath. syn.* I. I. p. 142. n. 29.

Habitat in Europa et America septentrionali.

Cor-

Corpus supra fuscum, maculis albis; caput supra atrum punetis albis; rostrum supra album; pectus et abdomen albida fasciis linearibus transversis; remiges 5 primores interiores ad marginem exteriorem non maculatae; rectrices fasciis angustis albidis: intermediis vix apice alben-tibus.

- hudsonia. 34. St. corporis pennis supra fuscis margine albis, subtus albis, lineis transversis nigris, rostro iridibusque aurantiis. *Strix freti Hudsonis. Briss. orn. p. 151. n. 7.*
Caparacoch. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 385. n. 2.
Little Hawk Owl. Edw. av. 2. t. 62.
Hawk Owl. Arct. zool. 2. p. 234. n. 123. Lath. syn. I. 1.
p. 143. n. 30.

Habitat in freto Hudsonis, interdiu praedans, Niso vix major.
Vertex fuscus albo maculatus; facies alba, fuscō intermixta, nigro marginata; uropygium fuscum, fasciis pallidis; cauda alaeque longae; an varietas funereae?

- uralensis. 35. St. corpore albido, maculis in singularum pennarum medio longitudinalibus fuscis. *Lepech. it. 2. t. 3. Pall. it. 1. p. 455.*
Chouette à longue queue de Sibirie. Buff. planch. enl. 463.
Ural Owl. Lath. syn. I. 1. p. 148. n. 37.
Habitat in montibus Uralensibus.
Rostrum cereum; irides palpebraeque nigrae; orbitae cinereae; uropygium album; cauda longa, cuneiformis; an varietas funereae?

- accipitri-na. 36. St. corpore supra lutescente, subtus ex lutescente albo, lituris utrinque longitudinalibus nigricantibus subtus guttatis, iridibus citrinis. *Pall. it. 1. p. 455. n. 6. S. G. Gmelin. it. 2. p. 163. t. 9.*
Caspian Owl. Lath. syn. I. 1. p. 147. n. 36.
Habitat ad mare Caspium, ululae magnitudine.
Rostrum nigrum; alae subtus et crissum alba; remiges extus lutescentes, intus albae, nigro tessellatae; cauda alis brevior rotundata, nigricans, lateribus albida; fasciata.
An varietas funereae?

- javanica. 37. St. corpore cinereo hinc inde rufescente, maculis albis et nigris, subtus fordide albo hinc inde rufescente, maculis nigris. *de Wurm apud Lichtenberg Magaz. IV. 2. 10.*
Habitat in Java.

- novae Seelan- diae. 38. St. iridibus flavis, corpore supra fusco albo-maculato, subtus fulvo.
New Zealand Owl. *Lath. syn.* I. I. p. 149. n. 39.
Habitat in nova Seelandia, passerinae magnitudine; rostro corneo apice nigro. Forster.
- cayen- nensis. 39. St. corpore rufo striato, transversim fusco undulato, iridibus flavis.
Chat huant de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 391. pl. enlum. n. 442.
Cayenne Owl. *Lath. syn.* I. I. p. 146. n. 35.
Habitat in Cayenna, magnitudine stridulae; rostrum cornutum; unguis nigri.
- domini- censis. 40. St. corpore subtus rufo, pectori parumper maculato.
Chouette ou grande Chevêche de S. Domingue. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 392. n. 6.
S. Domingo Owl. *Lath. syn.* I. I. p. 146. n. 34.
Habitat in insula S. Dominici, ululae perquam affinis, rostro tamen majore, robustiore, magis aduncu distincta.
- Tolchi- quatli. 41. St. iridibus pallide flavis, corpore supra nigro, pallide flavo, albo, et fulvo vario, subtus albo.
Chouette du Mexique. *Briff. orn.* I. p. 524. n. 10.
Tolchiquatli. *Raj. av.* p. 160.
New Spain Owl. *Lath. syn.* I. I. p. 145. n. 32.
Habitat in nova Hispania.
Rostrum, unguis, testrices alarum inferiores nigra.
- Chichic- tli. 42. St. corpore fulvo, albo fusco et nigro vario, oculis nigris, palpebris caeruleis.
Chat huant du Mexique. *Briff. orn.* I. p. 523. n. 9.
Chichietli. *Raj. av.* p. 160.
Mexican Owl. *Lath. syn.* I. I. p. 144. n. 31.
Habitat in nova Hispania, gallinae magnitudine.
- acadica. 43. St. corpore supra spadiceo albo-maculato, subtus sordide albo ferrugineo intermixto.
Acadian Owl. *Lath. syn.* I. I. p. 149. n. 38. t. V. f. 2.
Habitat in America septentrionali, 7 pollices longa.
Rostrum fuscum; irides flavae; vertex pallide maculatus; orbitae cinereae; digitus fuscus.
- passerina. 42. St. remigibus maculis albis quinque ordinum, *Fn. suec.* 79.
Scop. ann. I. p. 22. n. 17.
Noctua minor. *Briff. av.* I. p. 514. *Raj. av.* p. 26. n. 6.
Noctua

- Noctua minima. *Gesn. av. 620. Aldrov. orn. I. p. 543.*
t. 544.
 Chevêche ou petite Chouette. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 377.*
t. 28. planch. enlum. n. 439.
 Little Owl. *Brit. zool. n. 70. Arct. zool. 2. p. 236. n. 126.*
Albin. av. 2. t. 12. Will. orn. p. 105. t. 13. Edw. av.
39. t. 228. Lath. syn. I. I. p. 150. n. 40.
 Kleinstes Kaeuzlein. *Frisch. av. t. 100.*
 $\beta.$ Noctua minor. *S. G. Gmelin nov. comm. Petrop. XV. p. 447.*
t. XII.
Habitat in Europa et boreali America, solitaria, vicitans
vespertilionibus, muribus, gryllis, in coniferis nidificans,
ova bina ponens, 7-8 pollices, $\beta.$ fere pedem longa.
Rostrum ex albicante fuscum; caput, dorsum, testrices quo
alarum dilute fusca maculis albis; pectus albicans, fer-
rugineo varium.

44. LANIUS. Rostrum rectiusculum, dente utrinque versus apicem, basi nudum.

Lingua lacera.

- forficata. 1. L. cauda forficata, crista frontali erecta, corpore nigro-
tus.
 Drongo. *Buff. hist. nat. des ois. 4. p. 586.*
 Gobe-mouche hupé de Madagascar. *Buff. planch. enlum.*
n. 189.
Muscicapa madagascariensis nigra major cristata. Briss. av.
2. p. 388. n. 16. t. 37. f. 4.
 Fork-tailed crested Shrike. *Lath. syn. I. I. p. 158. n. 1.*
Habitat in capite bonaë spei, Madagascar, Sina, non sem-
per cristata, 10 pollices longa; cauda longa.
- caerulea. 2. L. cauda forficata, corpore nigro-caerulecente, abdomi-
ne albo.
Lanius bengalensis, cauda bifurca. Briss. av. 2. p. 89.
Fingah. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 108.
 Fork-tailed Indian Butcher-Bird. *Edw. av. t. 56.*
 Fork-tailed Shrike. *Lath. syn. I. I. p. 158. n. 2.*
Habitat in Bengala, cornices persequens, 7½ pollices longus.
Pectus obscure cinereum.
- castaneus. 5. L. cauda cuneiformi, rectricibus intermediis apice, extimis
totis ferrugineis, corpore supra castaneo, subtus albo.

Chernut backed Shrike. *Lath. syn. I. I. p. 159. n. 3.*

Longitudo 11 pollicum; rostrum, alae, pedesque nigra;
frons ex atro fusca; vertex, occiput, nucha, cervix
cinerea.

cristatus. 3. *L. cauda cuneiformi, capite cristato, corpore rufescente*
subtus fulvo fuscoque undulato.

Lanius bengalensis rufus. Briss. av. 2. p. 173.

Crested red or rousset-coloured Butcher bird. *Edw. av.*
t. 54.

Crested red Shrike. *Lath. syn. I. I. p. 134. n. 18.*

Habitat in Bengala, 6½ pollices longus, non semper cristatus.
Rostrum cornuum; pone oculos lunula nigra; cauda supra
rufa, subtus grisea; pedes cum unguibus nigri.

canaden- 4. *L. cauda cuneiformi, capite cristato, corpore rufescente sub-*
fis.

Lanius canadensis. Briss. av. 2. p. 171. t. 18. f. 3.

Pie-griesche hupé de Canada. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 316.*
pl. enlum. n. 479. f. 2.

Crested Shrike. *Arct. zool. 2. p. 239. n. 129. Lath. syn.*
I. I. p. 182. n. 35.

Habitat in Canada, 6½ pollices longus; rostrum unguisque
nigri; crista rubens; genae obscurae, maculis albis; ju-
gulum pectusque ex flavicante rubent; abdomen cinere-
um; rectrices alarum nigrae margine albo, cauda nigra,
albo-punctata.

ludovi- 6. *L. cauda cuneiformi cinereus, remigibus nigris basi rectri-*
cibusque apice albis.

Lanius canadensis. Briss. av. 2. p. 162. t. 15. f. 2.

Pie-griesche de la Louisiane. *Buff. planch. enlum. n. 397.*

Louiliane Shrike. *Lath. syn. I. I. p. 162. n. 5.*

Habitat in Ludovicia, excubitori et collurioni affinis.

Fascia sub oculis nigra; rectrices mediae 6, 6 totae nigrae,
reliquae basi apiceque albae; remiges secundariae apice
albae.

Nengeta. 7. *L. cauda cuneiformi apice alba, corpore cinereo subtus*
albido.

Cotinga cinerea. Briss. av. 2. p. 353.

Guiraru

Lanii accedunt ad accipitres tanienas, ad picos moribus, ad passeris statura, adeo-
que tanquam inter hos medii; digitus medius articulo primo connexus.

Guiraru Nhengeta. *Maregr. brasili.* 209.
 Guiraru Nheengeta brasiliensis. *Raj. av. p. 166. n. 5.*
 Guirarou. *Buff. hist. nat. des ois. 4. p. 459.*
 Guirarou or american Chat. *Will. orn. t. 235.*
 Grey Pye of Brasil. *Edw. av. t. 318.*
 Grey Shrike. *Lath. syn. I. 1. p. 183. n. 36.*
 ♂. Cotinga gris de Cayenne. *Buff. pl. enlum. 699.*
 Variété du Guirarou. *Buff. hist. nat. des ois. 4. p. 461.*
*Habitat in Brasiliae, Surinami, Gujanæ, Russiae, Sibiriae
 potissimum aquosis gregarius, 9 pollices longus. Irides
 sapphirinae; alae et cauda nigricant.*

- curvirostris. 8. L. cauda cuneiformi, corpore albo, dorso nigro, remigibus primoribus quinque macula alba.
Collurio madagascariensis. Briff. av. 2. p. 191. t. 19. f. 1.
Ecorcheur de Madagascar. Buff. pl. enlum. n. 228.
*Vanga ou Becarde à ventre blanc. Buff. hist. nat. des ois. I.
 p. 312.*
Hookbilled Shrike. Lath. syn. I. 1. p. 171. n. 19.
Habitat in Madagascar, fructibus vicitans, 10 pollices longus. Mandibulæ inferioris apex reflexus, uti superioris; occiput ex nigro virescens; rectrices alarum majores oblique albo punctatae. Rectrices medietate interiore cinereæ, exteriore nigrae, apice albo; pedes plumbei; unguis nigricantes.
- collaris. 9. L. cauda cuneiformi, corpore nigro subtus albo, remigibus primoribus basi albis.
Lanius capitidis bonae spei. Briff. av. 2. p. 182. t. 15. f. 1.
*Pie-griesche du cap de bonne esperance. Buff. pl. enlum.
 n. 477. f. 1.*
Collared Shrike. Lath. syn. I. 1. p. 163. n. 7.
Habitat ad caput bonae spei, exhibitoris magnitudine, 12 fere pollices longus. Rostrum et caput nigricant; rectrices, intermediis 4 exceptis, apice albae.
- lucionensis. 10. L. cauda cuneiformi, macula aurium nigra, rectricibus rufescientibus apice fusco-fasciatis.
Lanius lucionensis. Briff. av. 2. p. 169. t. 18. f. 1.
Luzonian Shrike. Lath. syn. I. 1. p. 172. n. 21.
Habitat in insula Luzonia, 7½ pollices longus. Rostrum et corpus supra ex griseo fuscum, subtus et ad latera ex rufescente album lineatum.

- Excubitor. 11. L. cauda cuneiformi lateribus alba, dorso cano, alis nigris macula alba. *Fn. suec.* 80. *Scop. ann.* 1. p. 23. n. 18. *Brünnich orn.* 21. 22. *Nozeman nederl. Vog.* t. 63. *Lanius cinereus.* *Briff. av.* 2. p. 141. *Lanius cinereus major.* *Gesn. av.* 579. *Aldr. orn.* 1. p. 384. t. 386. *Raj. av.* 18. *Ampelis caeruleoens,* alis caudaque nigris antibus. *Fn. suec.* 1. n. 181. *Castrica palombina.* *Olin. uccell.* t. 41. *Pie-griette grise.* *Buff. hist. nat. des ois.* 1. p. 296. t. 20. *pl. enlum.* 445. *Greater Butcher bird or Mattagess.* *Will. orn.* p. 87. t. 10. *Albin. av.* 2. t. 13. *Great Shrike.* *Brit. zool.* 1. n. 71. t. 33. *Arct. zool.* 2. p. 238. n. 127. *Catesb. Carol. app.* p. 36. *Great cinereous Shrike.* *Lath. syn.* 1. 1. p. 160. n. 4. *Neuntoeder.* *Frisch. av.* t. 60.
- albus. 12. L. corpore albo, pedibus flavis antibus, rostro unguibusque nigris antibus.
- major. 13. L. teatricibus alarum minoribus, humerisque rufescentibus. *Lanius cinereus major.* *Briff. orn.* p. 198. n. 2. *Gesner's great Butcher-bird.* *Will. orn.* p. 88. *Groclerer Neuntoeder.* *Frisch. av.* t. 59. *Habitat in Europa et boreali America, in silvis, inter primas veris aves; nidum ex gramine sicco et plumis struit, 7 ova caeruleo-fusco-maculata ponit; praedam transfigit; accipitres adventantes observat, et aviculis indicare dicitur.* *Rostrum pedesque nigra; vertex cum cervice canus; genae albae, linea nigra; corpus subitus album, arcubus pallide fuscois; teatrices alarum minores nigrae; rectrices nigrae et, exceptis intermediis 2, apice albo.*
- Collurio.* 12. L. cauda subcuneiformi, dorso griseo, rectricibus quatuor intermediis unicoloribus, rostro plumbeo. *Fn. suec.* 81. *Scop. ann.* 1. p. 24. n. 19. *Nozem. nederl. Vogel.* t. 65. *Günther Nefi. n. Eyer.* t. 23. *Lanius minor rufus seu 3^{ius} Aldrovandi.* *Raj. av.* p. 18. A. 4. *Merulæ congenere alia.* *Raj. av.* p. 67. n. 13. *Will. orn.* p. 195. n. 3. *Collurio.* *Briff. av.* 2. p. 152. *Ecorcheur.* *Buff. hist. nat. des ois.* 1. p. 304. t. 21. *planch. enlum.* n. 31. f. 2.

Lesser

- nigris
n. 18.
3.
3. 384.
Fn.
t. 20.
t. 10.
ol. 2.
usque
tibus.
r pri-
ruit,
edam
lis in-
genae
palli-
es ni-
atuor
c. 81.
t. 65.
b. 18.
orn.
anch.
Letter
- Lesser Butcher bird, called in Yorkshire Flusher. *Will. orn.*
p. 88. Alb. av. 2. t. 14.
 Red backed Shrike. *Brit. zool. I. n. 72. Arct. zool. 2.*
p. 240. n. 131. Lath. syn. I. I. p. 167. n. 15.
- varius. $\beta.$ Collurio varius. *Briss. orn. p. 201. n. 5.*
 Lesser variegated Butcher bird. *Will. orn. p. 189.*
 Variegated Shrike. *Lath. syn. I. I. p. 168. n. 16.*
- rufus. $\gamma.$ Lanius rufus. *Briss. orn. p. 199. n. 3.*
 Lanius minor cinereoens. *Raj. av. p. 19. A. 6.*
 Ampelis dorso griseo, macula ad oculos longitudinali. *Fn.*
suec. I. n. 180. t. 2.
 Ampelis tertia. *Kram. clench. p. 363.*
 Pie-griesche rouffe. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 103. pl.*
enlum. n. 9. f. 2. et n. 31. f. I.
 An other Sort of Butcher bird. *Will. orn. p. 89. §. 4.*
 Wood Chat. *Brit. zool. n. 73. Latham syn. I. I. p. 169.*
n. 17.
- senega- $\delta.$ Pie-griesche rouffe du Senegal. *Buff. planch. enl. n. 477.*
 lensis. $f.$ 2.
- melano- $\varepsilon.$ Pie-griesche à tête noire du Senegal. *Buff. planch. enlum.*
 cephalus. $n.$ 474.
Habitat in Europa, $\delta.$ et $\varepsilon.$ ad Senegal fluvium, in dumetis
et sepibus nidum struens, in quo ova 6 alba versus finem
latiorem circulo ex rufescente fusco notata ponit; vicinitat
insectorum et aviculis; scarabaeos et gryllos pruno spinosa per-
forat; cerebra avicularum effudit; sonos quoscunque imi-
tari gestiens, 7½ pollices longus.
- antigua- 29. L. cauda longa cuneiformi, corpore supra ex flavicante
 nus. rufo, subtus albo, capite, rostro, alis, pedibus cauda-
 que supra nigris.
 Pie-griesche d' Antigue. *Sonnerat it. p. 114. t. 70.*
 Antiguan Shrike. *Lath. syn. I. I. p. 171. n. 20.*
Habitat in insula Philippina, Panay, collurionis magnitu-
dine. Rostri magni mandibula superior longissima, valde
adunca; alae breves; rectrices 2 intermediae totae nigrae;
reliquae subtus rufescentes, apice rufo.
- niger. 30. L. niger, cauda subcuneiformi.
 Black Shrike. *Lath. syn. I. I. p. 187. n. 38.*
Habitat in Jamaica, 7 pollices longus, rostro pollucari, Ty-
ranni rostro multum simili.

Leveria- 31. L. cauda longa cuneiformi apice alba, rostro, capite, col-
nus. lo, pectoris medio, alis, pedibusque nigris, reliquis par-
tibus albis.

Magpie Shrike. *Lath. syn.* I. 1. p. 192. n. 49.

Turdi magnitudine; picae habitu et facie. Longitudo 10
pollicum; tectrices alarum majores, remigesque secunda-
riae margine albo; rectrices 2 intermediae 4 $\frac{1}{2}$, reliquae
2 pollices longae.

atricapil- 32. L. cauda cuneiformi, et vertice, cervice, humeris aliquo
lus. nigris, corpore supra murino, subtus ex caerulecente ci-
nero. *Merrem Beytr.* II. p. 30. t. X.

Habitat in Surinamo, carduelis magnitudine, longitudinem
5 pollicum vix superans; alae breves; tectrices alarum
remigesque secundariae margine albo; rectrices, exceptis
duabus intermediis, apice albo.

pomera- 33. L. supra niger, subtus albus, occipite dorsoque colli fa-
nus. turate ferrugineis nigro circumdati, alarum maculis
utrinque duabus uropygioque albis. *Sparmann mus.*
Carlson. n. 1. t. 1.

Habitat in Pomerania; rostrum, pedes, alaeque nigrae;
remiges tamen 8 primariae basi albae; rectrices 2 inferio-
res et extimae albae; his proximae 2 vel 3 apice, nec non
a basi ad medium fere albant.

Tyran- 13. L. cinereus, subtus albus, vertice nigro, stria longitudinali
nus. fulva.

Muscicapa Tyrannus. Briss. av. 2. p. 391.

Tyran. Buff. pl. enlum. n. 537.

Tiriri ou Pipiri. Buff. hist. nat. des ois. 4. p. 572.

Kleiner americanischer Neuntoeder. Frisch. av. t. 62.

Tyrant Shrike. Lath. syn. I. 1. p. 184. n. 37.

Tyrant Fly-catcher. Arct. zool. 2. p. 384. n. 263.

domini- β. *Tyrannus dominicensis. Briss. orn. 2. p. 394. n. 19. t. 18.*
censis. *f. 2.*

Saint Domingo Tyrant. Lath. syn. I. 1. p. 185. n. 37. A.

caroli- γ. *Tyran de la Caroline. Buff. hist. nat. des ois. 4. p. 577.*

Gobe-mouche de la Caroline. Buff. pl. enlum. n. 676.

Tyrant of Carolina. Catesb. carol. I. p. 55. t. 55. Latham
syn. I. 1. p. 186. n. 37. B.

Iudovi- δ. *Tyran de la Louisiane. Buff. hist. nat. des ois. 4. p. 579.*

Gobe-mouche de la Louisiane. Buff. pl. enlum. n. 676.

Loui-

Schae

Pitan

rufu

Louisiana Tyrant. *Arch. zool. 2. p. 385. n. 264. Lath. syn.*
I. I. p. 186. n. 37. C.

Habitat in America septentrionali, β. insula S. Dominici et Jamaica, turdi magnitudine, 8 circiter pollices longus, in cavis arborum nidificans; ferox et audax, ita ut plures simul aquilam ipsam adoriantur, et pellant, femina incubante.

Rostrum et pedes cum unguibus ex nigricante fusca; irides fuscae; capitinis stria verticalis longitudinalis e pennis fulvis apice nigricantibus; cauda fusca, margine rufo. β. pectus cinereum; δ. rostrum nigrum; pedes et corpus supra plumbeum; tectrices majores alarum remigesque margine albo; cauda extus et apice alba.

Schach. 14. L. lutescens fronte aliquo nigro.

Lanius A - sack. Osb. it. 227.

Chinese Shrike. Lath. syn. I. I. p. 173. n. 22.

Habitat in Sina. P. Osbek.

Magnitudo Tyranni; caput et collum supra griseum; collum subtus ex testaceo albido; dorsum et abdomen pallide testacea; remiges nigrae, primores basi albae, secundariae apice albicantes.

Pitangua. 15. L. niger, subtus flavus, vertice stria fulva, fascia oculari alba.

Tyrannus brasiliensis. Briss. av. 2. p. 401. t. 36. f. 5.

Pitangua guacu. Marcgr. bras. 216. Raj. av. 165.

Pitanga guacu or Bemtere. Will. orn. p. 198.

Bentaveo ou Cuiriri. Buff. hist. nat. des ois. 4. p. 579. t. 27.

Tyran du Brésil. Buff. pl. enlum. n. 212.

Brasilian Shrike. Lath. syn. I. I. p. 187. n. 39.

Habitat in Brasilia, 9 pollices longus.

Pone et infra oculos macula fusca; gula alba; pennae corporis supra tegentes margine flavo; alae subtus flavae; cauda fusca, margine rufo, subtus olivacea.

rufus. 17. L. rufus, subtus albus, capite nigro-virescente.

Lanius madagascariensis rufus. Briss. av. 2. p. 178. t. 18. f. 4.

Pie-griesche rousse de Madagascar. Buff. pl. enlum. n. 298. f. 2.

Schet-bé. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 313.

Rufous Shrike. Lath. syn. I. I. p. 180. n. 31.

Habitat in Madagascar; 8 fere pollices longus.

Rostrum

Rostrum plumbeum; pedes cum unguibus cornui; cauda rufa, margin'e fusco; collum ex vire scente nigrum, feminae anterius griseum.

barbarus. 18. *L. niger*, subtus ruber, vertice femoribusque fulvis.

Lanius senegalensis ruber. *Briss. av. 2. p. 185. t. 17. f. 2.*

Gonolak. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 314.*

Pie-griesche du Senegal. *Buff. pl. enlum. n. 56.*

Habitat in Senegal, 9 fere pollices longus.

Rostrum, alae, cauda, pedes et unguis nigra; caput, cervix, crissum, et rectrices alarum inferiores flava.

sulphura- 19. *L. fuscus*, subtus flavus, capite nigricante: fascia ambientata albida.

Lanius cayanensis luteus. *Briss. av. 2. p. 176. t. 16. f. 4.*

Pie-griesche jaune de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 296.*

Becarde à ventre jaune. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 312.*

Yellow-bellied Shrike. *Lath. syn. I. I. p. 188. n. 40.*

Habitat in Cayenna, 9 fere pollices longus.

Gula jugulumque alba; pedes grisei; unguis et rostrum nigricantes; alae et cauda fuscae, margine rufo.

cayanus. 20. *L. cinereus*, capite remigibus rectricibusque primoribus nigris.

Lanius cayanensis cinereus. *Briss. av. 2. p. 158. t. 14. f. 1.*

Pie-griesche grise de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 304.*

Becarde. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 311.*

Cayenne Shrike. *Lath. syn. I. I. p. 181. n. 41.*

naevius. β. *Lanius cayennensis naevius.* *Buff. av. 2. p. 160. t. 14. f. 2.*

Pie-griesche tachetée de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 377.*

Habitat in Cayenna, 8½ pollices longus.

Rostrum basi rubrum, apice nigrum; pedes cinerei; unguis nigri; β. per singularum pennarum longitudinem medium stria nigra.

senega- 21. *L. griseus*, subtus albidus, vertice fascia que oculari nigris, rectricibus nigris apice albis.

Lanius senegalensis cinereus. *Briss. av. 2. p. 167. t. 17. f. 1.*

Pie-griesche grise du Senegal. *Buff. pl. enlum. n. 297. f. 1.*

Senegal Shrike. *Lath. syn. I. I. p. 162. n. 6.*

Habitat in Senegal, 9 fere pollices longus.

Remiges latere exteriore rufae. Rectrices 6: 6 fasciis obsolete fuscis, apice concolores.

- da rufa,
inae an-
- s.
f. 2.
- ut, cer-
- ambien-
- f. 4.
296.
312.
0.
- rum ni-
- noribus
4. f. 1.
504.
4. f. 2.
n. 377.
- ungues
medianam
- nigris,
7. f. 1.
7. f. 1.
- is obso-
22. L.
- madagaf- 22. *L. cinereus* subtus albidus, loris nigris, rectricibus rufescen-
tibus.
Lanius madagascariensis minor. *Briff. av. 2. p. 264. t. 16.*
f. 1. 2.
Cali-calic et Bruja. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 315.*
Petite pie-griesche de Madagascar. *Buff. pl. enlum. n. 299.*
f. 1. 2.
Madagascar Shrike. *Lath. syn. I. I. p. 174. n. 24.*
Habitat in Madagascar, vix 5 pollices longus, passeris ma-
gnitudine.
Macula nigra utrinque inter nares et oculos; alarum rectri-
ces superiores rufae; rectrices maximam partem rufae.
Mas gula juguloque nigro.
- Emeria. 23. *L. griseus* subtus albus temporibus uropygioque rubris.
Lanius bengalensis fuscus. *Briff. av. 2. p. 175. n. 14.*
Muscicapa Emeria. *Syst. nat. X. I. p. 236. n. 7.*
Rouge-queue. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 309.*
Bengal Redstart. *Albin. av. 3. p. 24. t. 56.*
Indian Redstart. *Edw. av. 4. t. 190.*
Bengal Shrike. *Lath. syn. I. I. p. 175. n. 25.*
Habitat in Bengala, 5½ pollices longus.
Rostrum ex cinereo fuscum; irides albidae; vertex et occi-
put nigra; abdomen et caudae rectrices superiores rubra;
ad utrumque colli latus maculae 4 nigrae curvae; cauda
pallide fusca; pedes cum unguibus nigri.
- bicolor. 27. *L. caeruleus* subtus albus, capistro nigro. *Mant. 1771.*
p. 124.
Lanius madagascariensis caeruleus. *Briff. av. 2. p. 197. t. 16.*
f. 3.
Loxia madagascaria. *Syst. nat. XII. I. p. 306. n. 42.*
Pie-griesche bleue de Madagascar. *Buff. pl. enlum. n. 32.*
f. 2. n. 298. f. 1.
Blue Shrike. *Lath. syn. I. I. p. 178. n. 29.*
Habitat in Madagascar, viettans insectis, 6½ pollices longus.
Rostrum, caput, margo remigum, rectrices 2 intermediae,
margo 4 proximarum exterior caerulea; pennae rostrum
cingentes, remiges, basi excepta, rectrices extimae, po-
des et unguis nigra; femina subtus sordide alba.
- leuco- 28. *L. corpore supra nigricante, subtus albido, resto, pecto-*
rhynchos, *re, abdomine et uropygio albis.*
Lanius manillensis. *Briff. av. 2. p. 180. n. 17. t. 18. f. 2.*

Pie-griesche de Manille. *Buff. pl. enlum. n. 9. f. 1.*

Longraien. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 310.*

White-bellied Shrike. *Lath. syn. I. I. p. 181. n. 33.*

Habitat in Manilla, 7 pollices longus.

Alae, cauda, pedes et ungues nigricant.

ferrugi- 34. *L. corpore supra ex fusco nigro, jugulo et pectore sordide
neus. albis, abdomine ferrugineo.*

Ferruginous bellied shrike. *Lath. syn. I. I. p. 163. n. 8.*

Habitat ad caput bonae spei, 9 pollices longus.

*Rostrum plumbeum; cauda obscure fusca unicolor; pedes
nigri.*

tabuenſis. 35. *L. corpore supra olivaceo, gula et pectore cinereis, abdo-
mine ex flavicante fulco, cauda pedibusque fuscis.*

Tabuan Shrike. *Lath. syn. I. I. p. 164. n. 9.*

Habitat in insulis amicis maris australis, 9 fere pollices longus.

*Rostrum fuscum; vertex ex virescente, tempora ex olivaceo
fusca; alae margine exteriore nigrae; remiges secunda-
riae ex atro fuscae margine sordide albo.*

pacificus. 36. *L. niger, capite colloque in virescentem colorem vergen-
tibus, abdomine et cauda magis obscuris.*

Pacific Shrike. *Lath. syn. I. I. p. 164. n. 10.*

Habitat in insulis maris australis, 11 pollices longus.

*Rostrum obscurum, $\frac{3}{4}$ pollicem longum; capitis collique pen-
tae valde angustae; cauda 3 pollices longa; digiti ad or-
tum discreti, medius longissimus.*

septen- 37. *L. rostro nigro, pedibus plumbeis, corpore supra fusco,
trionalis. gula et pectore cinereis, abdomine crissaque fuscacen-
tibus.*

Northern Shrike. *Lath. syn. I. I. p. 165. n. 11.*

Habitat in America septentrionali, fere 8 pollices longus.

*Nares rotundae, parvae; ad basin mandibulae superioris
setae 5-6 nigrae; rectrices 4 intermediae fuscae unico-
lores, reliquae intus apice albae, omnes 2 pollices longae;
pedes breves; ungues robusti, fusi.*

viridis. 38. *L. capite, alis et corpore supra obscure viridibus, hoc
subtus albo, cauda nigra.*

Lanius madagascariensis minor viridis. Briff. av. 2. p. 195.

n. 25. t. 15. f. 2.

Tcha-chert. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 310.

Pie

Pie grieche de Madagascar. *Buff. pl. enlum. n. 32. f. 2.*
 Green Shrike. *Lath. syn. I. 1. p. 179. n. 30.*
Habitat in Madagascar, 6 fere pollices longus.
Alae longae; rectrices 2 intermediae obscure virides, reli-
quae margine exteriori; pedes unguisque nigri.

- leucocephalus. 39. L. albus, corpore supra ex virescente nigro, cauda supra ex virescente atro, subtus nigro, rostro, pedibus et unguibus plumbeis.
Lanius madagascariensis major viridis. Briss. av. 2. n. 24.
t. 19. f. 2.
 Grande pie-griesche verdâtre de Madagascar. *Buff. planch. enlum. n. 374.*
Tcha-chert-be. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 314.
 White-headed Shrike. *Lath. syn. I. 1. p. 180. n. 32.*
Habitat in Madagascar, rufo affinis, 8 polices longus.
- dominicana. 40. L. niger, abdomine et uropygio albis.
 Pie-griesche Dominicaine. *Sonnerat it. p. 55. t. 26.*
Habitat in insulis philippinis, velocissime volans, audax,
corvis potissimum infestus; an mera leucorbynchi varie-
tas? passere major.
Rostrum cinereum, robustum, conicum, basi setis munitum.
- panayensis. 41. L. rostro pedibusque nigris, capite, gula, jugulo, pecto-
 re et abdomine rubris, cervice, alis caudaque fuscis.
 Pie-griesche rouge de l'isle de Panay. *Sonnerat it. p. 114.*
t. 70.
Habitat in insula Panay, collurionis magnitudine; irides
igneae.
- albus. 42. L. albus, rostro, cauda, pedibus, et plurima alarum par-
 te nigris.
 Pie-griesche blanche de l'isle de Panay. *Sonner. it. p. 115.*
t. 72.
Habitat in insula Panay, collurione rufo duplo major; re-
miges majores fascia alba.
- varius. 43. L. corpore supra ex cinereo fusco, gula et pectore ex bu-
 bali colore flavo, abdomine, uropygio et crisco fordiste
 ex fuscescente albo, interscapuliis albis, cauda alisque
 fuscis.
 White-shouldered Shrike. *Lath. syn. I. 1. p. 190. n. 43.*
Habitat in Brasilia. Pennant.
Rostrum pedesque nigri; frons genaeque maculis pallidioribus.

naevius. 44. L. corpore supra nigro, subtus cinereo, tectricibus alaruin singulis macula oblonga alba.

Spotted Shrike. *Lath. syn. I. I. p. 190. n. 45.*

Habitat in Cayenna, doliatu similis, sed minor.

Rostrum pedesque nigri; paucae pennae ad exortum dorſi apice albo; remiges margine albo; rectrices apice albo.

obscurus. 45. L. corpore supra obscure atro, subtus albo, supercilio albo, pedibus fuscis.

Dusky Shrike. *Lath. syn. I. I. p. 191. n. 46.*

Naevio aequalis; rostrum corneum; alae cum cauda obscurores; pedes fusi.

fuscus. 46. L. corpore supra fusco, subtus albo, area inter rostrum oculosque, apice remigum secundariarum, margineque primariarum flavicantibus.

Brown Shrike. *Lath. syn. I. I. p. 191. n. 47.*

Magnitudo Piprae; rostrum corneum, apice nigrum; pedes nigri.

ruber. 47. L. ruber, alis caudaque ocellatis apice nigris.

Red Lanius or Butcher bird of Surinam. *Bancr. Gujan. p. 154.*

Red Shrike. *Lath. syn. I. I. p. 192. n. 48.*

Habitat in Surinamo.

america- 48. L. niger, remigum primorum macula, genis gulaque al- nus, bis, pectore et abdomine cinereis.

Black-crowned Shrike. *Arct. zool. 2. p. 238. n. 128.*

Habitat in America septentrionali, Excubitore minor, ludoviciano affinis.

Cauda longa; rectrices intermediae totae nigrae; reliquae apice albo, albedine versus exteriora nigredinem sensim fere delente.

minor. 49. L. cinereus, gula alba, pectore et abdomine roseis, fronte, linea oculari caudaque nigris.

Pie-grieche d'Italie. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 298. pl. enlum. n. 32.*

Habitat in Italia, Hispania, Russia, nengetae affinis.

Remiges nigrae; primariae macula ad basin, secundariae apice albo; rectrices extimae albae.

50. L.

Natka. 50. L. cauda rotundata, vertice et corpore supra nigro, hoc subtus albo, torque albo.

Natka Shrike. *Arch. zool.* 2. p. 239. n. 130.

Habitat in finu Natka Americae septentrionalis ultra 7 pollices longus.

Rostrum pedesque nigri; supra oculos linea alba ad nucham protensa; infra hanc alia nigra; rectrices alarum minores nigrae, maiores albae; remiges primariae obscurae, margine ex flavicante fuso; secundariae nigrae, margine et apice albis; rectrices nigrae, 4 extimae apice albo. Latham.

melanocephalos. 51. L. rostro, capite, gulaque nigris, corpore olivaceo subtus pallidiore, cauda fascia lata nigra, apice flava.

Black-headed Shrike. *Lath. syn.* I. 1. p. 165. n. 12. t. VI.

Habitat in insulis Sandwich maris australis, 6 circiter pollices longus; pedes obscuri.

brachyurus. 52. L. capite supra et ferrugineo griseo superciliis albidis, fascia nigra per oculos ad aures dueta, corpore supra ex griseo cittereo, subtus ex lutescente albido, cauda rotunda. *Pall. it.* 3. p. 693. n. 5.

Short tailed Shrike. *Lath. syn.* I. 1. p. 166. n. 13.

Habitat varior in Dauuriae rupestribus, collurionis magnitudine.

Uropygium subferrugineum; gula et crissum fere alba; alae nigricantes, teccicum apice griseo; rectrices 10 ex griseo fuscae, praeter medias apice albae.

phoenicurus. 53. L. fascia per oculos nigricante, corpore supra ex griseo rufescente, subtus ex lutescente albido, cauda longa rotundata et uropygio intense rufis. *Pall. it.* 3. p. 693. n. 6.

Rufous tailed Shrike. *Lath. syn.* I. 1. p. 166. n. 14.

Habitat in rupestribus ad Ononem, Collurionis magnitudine et facie.

doliatus. 16. L. cauda rotundata, corpore albo nigroque confertim subfasciato. *Mit. Ad. Frid.* 2. p. 12.

Lanius cayennensis striatus. Briff. av. 2. p. 187. n. 21. t. 29. f. 3.

Pie-griesche rayee de Cayenne. *Buff. planch. enlum.* n. 297. f. 2.

Black and white Butcher-bird. *Edw. av. 5. p. 35. t. 226.*
Pied Shrike. *Lath. syn. I. 1. p. 190. n. 44.*

Habitat in Cayenna, 6 $\frac{1}{2}$ pollices longus.

*Rostrum obscurum; pedes et unguis fuscus; singulae pennae
fasciis albis et nigris; capitibus longiores albae apice nigrae,
quas dum erigit, cristatus apparere; alae cum cauda ni-
grae, maculis transversis albis.*

jocosus. 24. *L. canda rotundata, corpore griseo, palpebra inferiore
purpurea, ano sanguineo. Amoen. acad. 4. p. 238.*

Merula sinensis cristata minor. Briff. av. 2. p. 255. t. 21. f. 2.

Jocoſe Shrike. Lath. syn. I. 1. p. 175. n. 26.

*Habitat in Sina, alaudae magnitudine, 7 $\frac{1}{2}$ pollices longus.
Osbeck.*

*Vertex niger; tempora, gula et jugulum alba; abdomen
albicans; cauda fusca, rectrices 4 exteriores apice albo;
pedes cum unguibus nigri; rostrum magis rectum, quam
in reliquis, sed utrinque intra apicem emarginatum.*

infaustus. 25. *L. dorso cinereo, rectricibus rufis, intermediis duabus ci-
nereis fascia nigrante, cauda rotundata.*

Corvus infaustus. En. suec. 93. Brünn. orn. p. 10.

Corvus russicus. S. G. Gmelin it. 1. p. 50.

*Merula saxatilis. Gesn. av. 732. Raj. av. p. 68. n. 3. Briff.
av. 2. p. 238.*

*Merle de roche. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 351. t. 23. pl.
entum. n. 562.*

Codirosso maggiore. Olin. acc. t. 47.

*Greater Redstart. Alb. av. 3. p. 51. t. 55. Will. orn. p. 197.
t. 36.*

Rock Shrike. Lath. syn. I. 1. p. 176. n. 27.

minor. β. *Turdus saxatilis. Syß. nat. XII. 1. p. 294. n. 14.*

Merula saxatilis minor. Briff. av. 2. p. 240.

Petrocosyphos. Gesn. av. 767.

Blaukoepfige rothe Amsel. Frisch. av. t. 32.

*Habitat in omnis Europae, regionis quoque Uralensis silvis
desertis, alpinis, turdis corvisque satis affinis; moribus
tamen lanii, protervus, comedentes peregrinatores saepe
adiens, carnesque disiectas rapiens, ceterum vermis et
insectis vicitans, pullosque nutriendis; nidum in rupium
caver-*

cavernis inaccessis struens, in coque 3 - 4 ova ponens;
cantu grato. Longitudo fere 8 pollicum, $\beta.$ minor.
Rostrum fere pollicare, nigricans, utrinque emarginatum;
pedes et alae similiter nigricant; cauda 3 pollices longa,
rectricibus 2 intermediis fuscis, reliquis rufis; caput et
collum obscure (in $\beta.$ ex caerulecente) cinerea; maculis
exiguis rufis et fuscis; superior dorsi pars obscure fusca
(in $\beta.$ nigricans, rufo et ex caerulecente cinereo mixta),
inferior cinerea (in $\beta.$ et alba); pectus et abdomen au-
rantia, maculis parvis albis fuscisque; pennarum radii
laxi. An turdi species, forte saxatilis?

fauftus. 26. L. griseus, subtus ferrugineus, lineola alba pone oculos,
cauda rotundata. Amoen. acad. 4. p. 241.

White wreathed Shrike. Lath. syn. I. 1. p. 178. n. 28.

Habitat in Sina, turdi pilaris magnitudine.

Rostrum cum pedibus pallidum; alae rotundatae; remiges
subfuscæ, marginibus griseis, lineis obsoletis fuscis de-
cussantibus; cauda fusca, similiter lineata.