

II. PICAE.

Rostrum subcompresso convexum.

45. PSITTACUS. *Rostrum aduncum: mandibula superiori mobili, cera (in multis) instructa.*

Nares in rostri basi rotundae.

*Lingua carnosa obtusa integra.
Pedes scansorii.*

* *Macrouri, cauda cuneiformi.*

Macao. I. *Pſ. ruber, remigibus supra caeruleis, subtus rufis, pennis scapularibus caeruleo et viridi variis, genis nudis rugosis.*
Scop. ann. I. p. 26.

Ara brasiliensis. Briff. av. 4. p. 184. t. 19. f. I.

Psittacus maximus alter. Aldr. orn. I. p. 665. t. 666. Raj.
av. p. 29. n. 2.

Ara premier. Fermin Surin. 2. p. 173.

Ara rouge. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 179. planch. enlum.
n. 12.

Maccaw. Albin. av. I. p. II. t. II. Will. orn. p. 73.

Red and blue Maccaw. Edw. av. 158. t. 158. Bancr. Guj.
p. 156. Lath. syn. I. I. p. 199. n. I.

Habitat in America meridionali, ulnam longe superans.
Nidificat in silvis palmiferis, quarum fructibus potissimum
viicit, in arboribus cavis, bina ova ponens,
magnitudine columbinorum, facie ovorum perdricis; bis
in anno pruriunt, mare et femina alternatim incubante;
junior facile cicurandus, non item adultior; caro come-
ditur, quamvis dura et insipida.

Corpus magnitudine gallinae, coccineum; rostri mandibula su-
perior alba, inferior nigra; tempora alba; remiges po-
tissimum exteiiores caeruleae, telectricibus pluribus luteis;
cauda longissima, rubra, electricibus lateralibus caeruleis.

52. Pſ.

Psittacis omnibus proprium, quod eis lingua latior, quam ceteris avibus. Plin.

Aracan- 52. Ps. dilute coccineus, pennis scapularibus luteis viridi terminatis, remigibus supra caeruleis, subtus rufis, genis nudis rugosis,

Ara jamaicensis. Briss. av. 4. p. 188. n. 2.

Psittacus erythroxanthus. Gesn. av. 721. Aldr. orn. I. p. 683.

Aracanga. Marcgr. bras. 206. Raj. av. p. 29. n. 3.

Petit Ara rouge. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 180. planch. enlum. n. 641.

Maccaw from Jamaica. Alb. av. 2. t. 17. Brown jam. p. 472.

Maccaw called Aracanga. Will. orn. p. III.

Red and yellow Maccaw. Bancr. Gujan. p. 156. Lath. syn. I. I. p. 201. n. 2.

Habitat in Guiana, Brasilia, Jamaica, praecedenti aequalis.

Rectrices supra coccineae, violaceo admisto, infra obscure rubrae; 2 intermediae utrinque in prima medietate obscure rubrae.

militaris. 2. Ps. viridis, alis caeruleis, fronte caudaque rubris, genis nudis lineis plumosis.

Largest Guiana Parrot. Bancr. Guj. p. 158.

Great green Maccaw. Edw. av. t. 313.

Military Maccaw. Lath. syn. I. I. p. 202. n. 3.

Rostrum nigrum; uropygium, rectricumque apices caerulei.

Arara- 3. Ps. supra caeruleus subtus luteus, genis nudis: lineis plu-
nra. mosis.

Ara brasiliensis cyano-crocea. Briss. av. 4. p. 193. t. 20.

Psittacus maximus cyano-croceus. Aldrov. orn. I. p. 664.

Raj. av. p. 28. I. p. 181. 5. Sloan. jam. 2. p. 296.

Ara bleu. Ferm. Surinam. 2. p. 174. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 191. planch. enlum. n. 36.

Ararauna. Marcgr. bras. 206. Alb. av. 3. p. 10. t. 10, et 2. p. 16. t. 17.

Aldrov. blue and yellow Maccaw et brasiliian Ararauna. Will. orn. p. 110. n. I. et III. n. 4. t. 15.

Blue and yellow Maccaw. Edw. av. 159. t. 159. Latham syn. I. I. p. 204. n. 4.

U 5

β. Psit-

Psittaci capite magno, vertice plano, monogami per paria incedunt pedibus brevibus, gorruli, dociles, longaevi; vicitant in primis uncibus, glandibus, cucurbitae, carthamus feminibus, in patria sinepe edules; scandunt rostro, irati penas erigunt; inter ayes siniae; ex regionibus borealibus exulant, ad 34° latitudinis obvii; 25° utrinque ab aequatore distantia frequentissimi.

eaeru- *B.* Psittacus maximus caeruleus varius, cauda producta. Brown.
Ieus. jam. p. 272.

Ara jamaicensis cyaneo-crocea. Briss. av. 4. p. 191. n. 3.
Blue Maccaw. Alb. av. 3. t. 10. Lath. syn. I. I. p. 205.
n. 4. A.

*Habitat in Jamaica, Guiana, Brasilia, Surinamo, aequalis
cum praecedentibus magnitudinis.*

Caerulea supra collum, dorsum, alas, caudam, subtus col-
lo, pectore, abdomine; cauda lutea feminae, rubra mari-
ri; nigra rostrum et gula; palpebrae ferratae papillis ni-
gris; tempora nuda alba, lineata (non in β) punctis plu-
mosis caeruleo-nigris.

Makawu- 53. Ps. supra obscure viridis, capite viridi caeruleo admisto,
anna. gula, jugulo et pectoris parte superiore rufescensibus,
pectoris parte inferiore et abdomine viridibus, uropygio
ex rubro fusco.

Perruche ara. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 277.

Perruche ara de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 864. Barrer.
Fr. équin. p. 145.

Parrot Maccaw. Lath. syn. I. I. p. 205. n. 5.

*Habitat in Cayenna et Guiana, migratorius, 18 pollices
longus.*

Genae nudae; cauda 9 pollices longa, alaque supra obscure,
subtus ex flavescente virides.

ater. 54. Ps. niger cum splendore viridi, rostro oculisque rubenti-
bus, pedibus flavis.

Ara noir. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 202.

Ararauna ou Machao. de Laët descr. des ind. orient. p. 490.
Black Maccaw. Lath. syn. I. I. p. 206. n. 6.

*Habitat in Gujanæ partibus interioribus incultis, in rupium
montiumque aridorum et sterilium cacumine.*

obscurus. 4. Ps. fuscus, genis nudis rubris, vertice cinereo-nigrescente
vario, cauda cinerea. Hasselq. it. 236.

Obscure Parrot. Lath. syn. I. I. p. 206. n. 7.

Habitat in Africa, picæ magnitudine.

Rostrum et capitulum, pedes et unguis nigra; orbitæ al-
bae; irides flavæ; cervix et alac supra nigrae; abdomen
cinereum.

nobilis. 5. Ps. viridis, genis nudis, humeris coccineis. Mus. Ad. Frid.
2. p. 13.

Noble Parrot. Lath. syn. I. I. p. 207. n. 8.

Habi-

Habitat in Surinamo, turturis magnitudine.

Facies nuda, alba.

- severus. 6. *Ps. viridis*, genis nudis, remigibus rectricibusque caeruleis subtus purpurascientibus. *Mus. Ad. Fr.* I. p. 13. *Scop. ann.* I. p. 27. n. 23.
Ara brasiliensis viridis. *Briss. av.* 4. p. 198. n. 6.
Maracana. *Marcgr. bras.* 207. *Will. orn.* p. 112. n. 5. 6.
Raj. av. p. 29. n. 5. *Sloan. jam.* 2. p. 297.
Ara vert. *Buff. hist. nat. des oif.* 6. p. 194. t. 8.
Ara vert du Brésil. *Buff. pl. enlum.* n. 383.
Brasilian green Macaw. *Edw. av.* 41. t. 229. *Lath. syn.* I. I. p. 208. n. 9.
β. *Ara brasiliensis erythrochlora*. *Briss. av.* 4. p. 198. n. 7.
Habitat in Jamaica, Guiana, Brasilia, 5 circiter pollicibus pedem longitudine superans.
Kotrum, unguis, et generum lineae nigra; irides aureae; pennae virides, in β. obscurius; frons ex castaneo purpurascens, in β. fusca, vertex caeruleus, in β. magis in viridem vergens; cauda supra viridis, versus apicem caerulea; pedes fuscii.
- Eupatria. 7. *Ps. viridis*, genis nudis, humeris coccineis, rostro purpureo.
Psittaca ginginiana. *Briss. av.* 4. p. 343. n. 64. t. 29. f. I.
Perruche de Gingi. *Buff. pl. enlum.* n. 239.
Grande perruche à ailes rougeatres. *Buff. hist. nat. des oif.* 6. p. 156.
Gingi Parrot. *Lath. syn.* I. I. p. 209. n. 10.
Habitat in regno Gingi Indiae, 21 pollices longus.
Orbitae nudae rubicundae; corpus supra ex olivaceo profunde viride, subtus pallide virens flavescente admixto; gula jugulumque cinerascens; cauda et alae, exceptis rectricibus superioribus rubris, virides; pedes rubentes; unguis nigri.
- japonicus. 8. *Ps. viridis*, subtus rectricibusque lateralibus ruber, remigibus caeruleis.
Psittacus erythrochlorus macrourus. *Aldr. orn.* I. p. 678. t. 681. *Raj. av.* p. 34. n. 3.
Psittaca japonensis. *Briss. av.* 4. p. 362. n. 71.
Perruche verte et rouge. *Buff. hist. nat. des oif.* 6. p. 159.
Red and yellow or pale green Parrot of Aldrovandus. *Will. orn.* p. 116.
Japoneic Parrot. *Lath. syn.* I. I. p. 209. n. II.

Habi-

Habitat in Japonia, non tamen boreali, quae psittacis caret. Cauda corpore longior, rectricibus 2 intermediis viridibus scapis albis, reliquis rubris scapis nigris; rostrum et irides rubent; macula ante et pone oculum, et intercapuum caeruleum; gula ex ferrugineo rubra; corpus subtus lineis longitudinalibus nigris; pedes et unguis nigri.

- amboi- 9. *Ps. coccineus, dorso caeruleo, alis macula viridi.*
nensis. *Psittaca amboinensis coccinea. Briff. av. 4. p. 378. t. 28. f. 2.*
Lori Perruche tricolor. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 138.
Perruche rouge d'Amboine. Buff. pl. enlum. n. 240.
Amboina red Parrot. Lath. syn. I. I. p. 210. n. 12.
Habitat in Amboina, 15½ pollices longus.
Rostrum, pedes et unguis rubri, illud apice nigrum; rectrices caudae inferiores medio violaceae, rectrices 2 intermediae ex violaceo fuscae 9½ pollices, extimae binae vix 6 polices longae, margine interiore rubro.

- cyanoce- 10. *Ps. viridis, capite gulaque caeruleis.*
phalus. *Psittaca cyanocephala. Briff. av. 4. p. 359. t. 19. f. 2.*
Perruche à tête bleue. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 145.
Perruche à tête bleue des Indes orientales. Buff. pl. enlum. n. 192.
Blue-headed Parrot. Lath. syn. I. I. p. 211. n. 13.
Habitat in India, 11½ pollices longus.
Mandibula superior flava, apice cinerascente, inferior cinerascens; area oculorum nuda flavicans; corpus subtus ex viridi flavicans; gula violacea in caeruleum vergens; colla latera lutea; alae subtus cinereae; cauda subtus ex flavicante cinerea; pedes caerulescentes; unguis grisei.

- haemato- 50. *Ps. corpore supra viridi, jugulo et pectore aurantio, pen-
tus. narum margine caeruleo, abdomine caudaque viridibus.*
Mant. 1771. p. 574.
Psittaca amboinensis varia. Briff. av. 4. p. 364. n. 72.
Perruche à face bleue. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 150.
Perruche d'Amboine. Buff. pl. enlum. n. 61.
Red breasted Parrakeet. Edw. glean. t. 232.
Red breasted Parrot. Lath. syn. I. I. p. 212. n. 14.

- molucca- β. *Perruche des Moluques. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 150.*
nus. *pl. enlum. n. 743.*
novae γ. *Blue-bellied Parrot. Brown Illustr. p. 14. t. 7.*
Hollan- *Habitat in Amboina, γ. in nova Hollandia; 11, β. 10, γ. 15*
dia. *pollices longus.*

Rostrum

Rostrum ex flavicante, $\beta.$ ex rubicundo album, $\gamma.$ rubicundum, cera flavicante; capitulum et pars verticis, $\beta.$ totum caput, $\gamma.$ caput collumque caerulea; occipite tamen virescente; pedes $\beta.$ et $\gamma.$ rubrum flavo admisto; abdomen $\gamma.$ caeruleum, $\beta.$ macula caerulea notatum.

- atricapil- 55. Ps. supra caeruleus, gula, jugulo pectoreque rubris, abdo-
lus. *Ara moluccensis varia. Briss. av. 4. p. 197. n. 5.*

*Psittacus orientalis exquisitus Loeri dictus. Seb. thes. 1. p. 63.
f. 4.*

*Psittacus capite nigro, collari viridi. Klein av. p. 25. n. 16.
Grande perruche à bandeau noir. Buff. hist. nat. des ois. 6.
p. 158.*

Habitat in Moluccis, 14 pollices longus.

*Alae, tectricesque caudae superiores caeruleae, inferiores
virides rubro variae; cauda supra viridis, subtus rubra
margine nigro.*

- tabuen- 56. Ps. capite, collo, pectore et abdomine purpureis, dorso
sis. et tectricibus alarum viridibus, lunula cervicem terminan-
te, remigibus primariis caudaeque maxima parte caeruleis.

Tabuan Parrot. Lath. syn. I. 1. p. 214. n. 16. t. 7.

*Habitat in insulis amicis maris australis, 19 pollices longus.
Rostrum nigrum, mandibulæ inferioris basis pennis viridi-
bus cincta; alae spuriae caeruleae; remiges secundariae
virides margine caeruleo; rectrices 2 intermediae 8 polli-
ces longae caeruleae, margine et apice viridi; reliquæ
caeruleæ scapis nigris; pedes obscuri.*

- papuen- 57. Ps. capite collo et pectore rubris, occipitis macula caeru-
sis. lea lunulisque duabus nigris, alis dorsique parte viridi-
bus, cetera dorsi parte, abdomine et caudae apice rubris.

Petit Lori Papon. Sonnerat it. p. 175. t. III.

Papuan Lorý. Lath. syn. I. 1. p. 215. n. 17.

$\beta.$ Psittacus taenia abdominalis transversa nigra margine viridi.
 $\gamma.$ Psittacus coeruleus, cauda breviore, dorsi parte posteriori
ex caeruleo atra, macula inter alas lutea.

$\delta.$ Ps. abdominalis medio viridi.

Habitat in Papua, 16 pollices longus.

*Rostrum rubrum; alae breves; dorsum posterius stria longi-
tudinali media caerulea; ad utrumque alarum latus ma-
culæ oblonga lutea; caudæ $\frac{2}{3}$ virides, reliquum luteum;
pedes rubri.*

- borneus. 11. Ps. ruber, remigibus rectricibusque apice viridibus, alis macula caerulea, orbitis fuscis.
Psittaca coccinea bonarum fortunarum insulae. Briss. av. 4. p. 373. n. 77.
Lori Perruche rouge Nr. 1. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 137.
Longtailed Scarlet Lory. Edw. av. 173. t. 173. Lath. syn. I. I. p. 216. n. 18.
Habitat in India, 9½ pollices longus.
Rostrum aurantium; orbitae nudae; remiges punctis caeruleis et viridibus; rectrices 2 extimae in colore viridem inclinant; tectrices caudae inferiores rubrae, margine caeruleo.
- indicus. 58. Ps. coccineus, fusco et violaceo variegatus, capite et collo superioribus, pectore et taenia pone oculos violaceis, rectricum majorum apice dilute fusco, minorum rectricibusque ex fusco violaceis.
Psittaca indica coccinea. Briss. av. 4. p. 376. t. 25. f. 2.
Lori Perruche violet et rouge Nr. 2. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 138.
Perruche des Indes orientales. Buff. pl. enlum. n. 143.
Indian Lory. Lath. syn. I. I. p. 217. n. 19.
Habitat in Amboina, 11 fere pollices longus.
Rostrum rubicundum, apice nigro; pedes et ungues fusi.
- elegans. 59. Ps. capite, collo et corpore subtus rubro, supra fusco, intercapuliis pallide caeruleis rubro mixtis, cauda ex viridente fusca, apice albicante.
Beautiful Lory. Lath. syn. I. I. p. 217. n. 20.
 $\beta.$ Ps. alis, cauda et corpore supra viridibus. Lath. syn. I. I. p. 218.
Longitudo 15 ($\beta.$ 12) pollicum; rostrum ex flavicante fuscum, $\beta.$ plumbeum, apice flavo.
- guebien- 60. Ps. splendide ruber, remigibus nigris transversim fasciatis, cauda ex rubro fusca.
 sis. *Petit Lory de Guéby.* Sonner. it. p. 174. t. 109.
Lori rouge et violet. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 135.
Lori de Guéby. Buff. pl. enlum. n. 684.
Gueby Lory. Lath. syn. I. I. p. 219. n. 21.
Habitat in insula Gueby, amazono dimidio minor, 9½ pollices longus.
Rostrum et irides igneae; fascia alarum rubra; annulus purpureus a cervice ad pectus progrediens.

- janthi- 61. Ps. capite et corpore supra rubro, subtus violaceo, hume-
nus. ris caeruleis, cauda alisque viridibus et rubris.
Perroquet violet. *Ferm. Surin.* 2. p. 175.
Habitat in Amazoniae littore.
Rostrum nigrum; irides aureae.
- variega- 62. Ps. coccineus, nucha, dorsi initio, pectore et abdomine
tus. purpureo-caeruleis, alis supra rubris, subtus flavis, cau-
da viridi.
Variegated Lory. *Lath. syn. I. I.* p. 220. n. 22.
Habitat in India, 10-11 pollices longus.
Rostrum obscurum; color abdominis posterioris in virescente-
nigrum vergens; rectrices basi intus rubicundae, versus
apicem extus caeruleae.
- novae 63. Ps. niger cum splendore caeruleo, cauda subtus rubra, or-
Guineae. bitis nudis fuscis.
Lori noir de la nouvelle Guinée. *Sonner. it.* p. 175. t. III.
Forrest *it.* p. 133.
Black Lory. *Lath. syn. I. I.* p. 221. n. 23.
Habitat in nova Guinea.
Rostrum pedesque nigricantes; irides circulis duobus, altero
caeruleo, altero minori ex rubro fuso.
- javani- 64. Ps. coccineus, orbitis nudis argenteis, capite cristato, gu-
cus. la grisea, jugulo et pectore roseis, humeris et alis ex ru-
bro et viridi mixtis, rectricibus duabus intermediis cocci-
neis, reliquis roseis viridi-mixtis apice caeruleo.
Psittaca javensis cristata coccinea. *Briff. av.* 4. p. 381. n. 80.
Psittacus parvus Bontii. *Raj. av.* p. 34. n. 5.
Perruche huppée. *Buff. hist. nat. des oif.* 6. p. 160.
Bontius's small Parrakeet. *Will. orn.* p. 120. n. 7.
Crested red Parrakeet. *Lath. syn. I. I.* p. 223. n. 25.
Habitat in Java, alaudae magnitudine.
Rostrum griseum; cera albicans; oculi nigri.
- Jandaya. 65. Ps. supra viridis, subtus flavus, capite colloque flavis.
Psittacula brasiliensis lutea. *Briff. av.* 4. p. 399. n. 91.
Jandaya. *Will. orn.* p. 116. S. 4. n. 5. *Raj. av.* p. 34. n. 5.
Buff. hist. nat. des oif. 6. p. 262.
Yellow-headed Parrot. *Lath. syn. I. I.* p. 224. n. 26.
Habitat in Brasilia.
Rostrum, pedes et unguis nigri; orbitae nudae, albae;
irides aureae; abdominis pars posterior viridis.

- folititia. 12. Ps. luteus, alarum tectricibus viridibus, orbitis rubris, tectricibus lateralibus extus caeruleis.
 Psittacus aurantius. L. F. Miller illustr. t. V. A.
 Psittaca angolensis lutea. Briss. av. 4. p. 371. n. 76.
 Perruche jaune. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 147.
 Perroquet from Angola. Albin. av. 3. t. 13.
 Angola Yellow Parrot. Lath. syn. I. 1. p. 224. n. 27.
Habitat in Angola, turturis magnitudine, 11½ pollices longus.
Rostrum ex virescente, cera pallide cinerea; irides flavae;
dorsum maculis ex flavo viridibus; tectrices alarum a corpore remotissimae margine caeruleo; rectrices 6 intermediae utrinque ex flavicante virides; pedes et unguis rubicundi.
- Guarou- 66. Ps. flavus, remigibus majoribus viridibus.
 ba. Psittaca brasiliensis lutea. Briss. av. 4. p. 369. n. 74.
 Quijubatui. Raj. av. p. 35. Will. orn. p. 117.
 Quarouba ou Perruche jaune. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 272.
 Perruche jaune de Cayenne. Buff. planch. enlum. n. 525.
 Erafilian yellow Parrot. Lath. syn. I. 1. p. 225. n. 28.
- mexica- β. Psittaca mexicana lutea. Briss. av. 4. p. 374. n. 75.
 nus. Avis Cocho Psittaci mexicanus species. Seb. thes. I. t. 64. f. 4.
Habitat in Brasilia et Amazonia, β. in nova Hispania, 11 pollices longus, solitarius, et rarer, facile quidem cicutrandus, sed lingua minus docili.
Rostrum griseum; oculi nigri; cauda longissima; in β. rostrum rubens; caput pallide, collum ex aurantiorum rubrum; tectrices alarum superiores ex viridi, rubro et aurantio variae.
- caroli- 13. Ps. viridis, capite, collo genibusque luteis. Scop. ann. I.
 nensis. p. 29. n. 25.
 Psittaea carolinensis. Briss. av. 4. p. 350. n. 67.
 Perroquet no. 7. Ferm. Surin. 2. p. 176.
 Perruche à tête jaune. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 274.
 Perruche de la Caroline. Buff. planch. enlum. n. 499.
 Papegay à tête aurore. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 247.
 Caroline Parrot. Arct. zool. 2. p. 242. n. 132. Catesb. Carol. I. p. 11. t. 11. Lath. syn. I. 1. p. 227. n. 29.
Habitat in Guiana, moris maturantibus in Carolinam et Virginiam migrans, gregarius, pomariis valde infestus;
in arboribus cavis soli humilioris spongiosi nidum struens,

- rubris,
7.
longus.
flavae;
arum a
6 inter-
ungues
ois. 6.
525.
28.
64. f. 4.
nia, II
m cictu-
n β. ro-
ubrum;
urantio
ann. I.
274.
247.
esb. Ca-
nam et
festis;
fruens,
et
- et ova ut plurimum 2 subrotunda nivea ponens; facile ci-
curandus, non tamen loquax.
Rostrum ex flavicante album; pedes albi.
- Alexan- 14. Ps. viridis, collari pectoreque rubro, gula nigra. *Amoen.*
dri. *acad.* 4. p. 236. *Mus. Ad. Frid.* 2. p. 14. *Scop. ann.* 1.
p. 29. n. 26.
Psittacus (cubicularius), cauda cuneiformi, digito interiore
postico mutico. *Hasselq. it.* 235.
Psittacus torquatus macrourus antiquorum. *Aldr. av.* 1.
p. 678. *Raj. av.* p. 33. n. 1.
Psittaca torquata. *Briff. av.* 4. p. 323. n. 55.
Perrococco. *Olin. accell.* 24. t. 24.
Grande Perruche à collier d'un rouge vif. *Buff. hist. nat. des*
oif. 6. p. 141.
Perruche à collier des isles Maldives. *Buff. planch. enlum.*
n. 642.
Ring Parrakeet. *Will. orn.* p. 115. *Edw. av.* t. 292. f. 1.
Alexandrine Parrakeet. *Lath. syn.* I. 1. p. 234. n. 37.
β. Psittacus torque roseo.
Perruche à collier couleur de rose. *Buff. hist. nat. des oif.* 6.
p. 152. *planch. enlum.* n. 551.
γ. Psittacus torque purpureo.
Psittaca indica torquata. *Briff. av.* 4. p. 326. n. 56.
Bracelet Parrakeet from the East Indies. *Albin. av.* 2. t. 18.
δ. Psittacus torque duplii.
Psittaca borbonica torquata. *Briff. av.* 4. p. 328. n. 57. t. 27.
f. 1.
Perruche à double collier. *Buff. hist. nat. des oif.* 6. p. 143.
Perruche à collier de l'isle de Bourbon. *Buff. planch. enlum.*
n. 215.
ε. Psittacus capite cyaneo.
Psittaca cyanocephalos. *Briff. av. app.* p. 129.
Perruche à tête d'azur. *Buff. hist. nat. des oif.* 6. p. 148.
Blue headed Parrakeet. *Edw. av.* t. 292.
ζ. Psittacus javanius. *Osbeck it.* 1. p. 156.
Habitat in Asia australi, insulisque maris indici, δ. etiam
in Africa, β. in sola Africa, columbae plerumque magni-
tudine, primus innotuit expeditione Alexandri magni.
Rostrum magis minusve rubrum; in β. mandibulae superio-
ris apice et inferiore nigra; in γ. mandibula superiore au-
rantia, inferiore nigra; in ζ. inferiore flava; cera in hoc
nigra; irides luteae; orbitae nudae incarnatae, in ζ. fus-
cae; caput in ε. cyaneum, in ζ. ex pallide caeruleo et

pallide flavo mistum; occiput in ♂. in violaceum vergens; vertex in ♀. ex caerulecente viridis; tempora in ♀. nigricant; gula in ♂. cyanea, in ♀. pallide rubra; jugulum et pectus in ♀. et ♀. pallide rosea; in ♂. stria lutea; alae macula purpurascente; in ♀. tectrices alarum superiores macula flava, remiges subtus cinereae, margine caeruleae; in ♀. alae subtus dilute cinereae, tectricibus 5 luteis. Cauda margine caeruleo, subtus pallide flava; in ♂. subtus ex flavo cinerea; in ♂. supra caerulea, subtus flava, in ♀. flavicans. Pedes obscuri; in ♂. et ♂. cinerei; in ♀. ex virescente grisei.

pertinax. 15. *Pſ. viridis*, genis fulvis, remigibus rectricibusque canescentibus. *Muf. Ad. Frid.* I. p. 14.

Psittaca illiniaca. *Briff. av.* 4. p. 353. n. 68.

Tui-aputejuba. *Marcgr. bras.* 206. *Raj. av.* p. 34. n. 2.

Tui species secunda. *Raj. av.* p. 181. n. 6. *Will. orn.* p. 116.

Apujetuba. *Buff. hist. nat. des oif.* 6. p. 269. t. 13.

Perruche Illinoise. *Buff. pl. enlum.* n. 528.

Yellow-faced Parrakeet. *Edw. av.* 49. t. 234.

Illinois Perrot. *Arct. zool.* 2. p. 243. n. 133. *Lath. syn.* I. I. p. 228. n. 30.

Kleiner langschwaenziger grüner Papagay. *Frisch. av.* t. 54. *Habitat in America*, gregatim in septentrionalem migrans, castaneis, pistis etc. vicitans, et nidum in habitaculis terminum struens; agilis, voce parum articulata, 13 circiter pollices longus. Caro esculenta.

Rostrum cinereum; irides, frons, aliquando et occiput aurantia; remiges primariae margine extremo caeruleae; pectus et abdomen ex flavicante virent.

Leverianus. 67. *Pſ. pallide viridis*, capite colloque flavis, uropygio puniceo, remigibus rectricumque apice caeruleis.

Crimson vented Parrot. *Lath. syn.* I. I. p. 229. n. 31.

Habitat in Asia australi, satis grandis.

smaragdi- 68. *Pſ. splendide viridis*, abdomine posteriore, uropygio et cauda ex ferrugineo castaneis.

Perruche émeraude. *Buff. hist. nat. des oif.* 6. p. 262.

Perruche des terres magellaniques. *Buff. pl. enlum.* n. 85.

Emerald Parrot. *Lath. syn.* I. I. p. 230. n. 32.

Habitat in fredo Magellani? 13 pollices longus.

Rostrum et pedes obscuri; cauda apice viridis.

- canicula- 16. Ps. viridis fronte rubra, occipite remigibusque extimis
ris. caeruleis, orbitis fulvis.
Psittaca brasiliensis. Briss. av. 4. p. 339. n. 62.
Perruche à front rouge. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 268. pl.
enlum. n. 767.
Red and blue headed Parrakeet. Edw. av. 4. t. 176. Lath.
syn. I. I. p. 242. n. 40.
Habitat in Americae calidioribus, majoris turdi magnitudine.
Corpus subtus ex virescente luteum; rostrum nigricans; oculi
nigri; pedes rufescentes; remiges latere exteriore vires-
centes; cauda elongata.
- aerugi- 17. Ps. viridis, vertice, remigibusque primoribus caeruleis,
nosus. orbitis cinereis.
Psittaca martinica. Briss. av. 4. p. 356. n. 69.
Perruche à gorge brune. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 257.
Brown-throated Parrakeet. Bancr. Guj. p. 162. Edw. av. 4.
t. 177. Lath. syn. I. I. p. 243. n. 41.
Habitat in America insulisque adjacentibus, 10 pollices lon-
gitudine excedens.
Rostrum, cera, et pedes cum unguibus cinerea; irides ex
flavicante badiae; corpus subtus ex flavicante viride; ca-
pistrum, genae, gula et jugulum ex griseo fusca, flavo
admixta; cauda corpore brevior, subtus flavicans.
- rufiro- 18. Ps. viridis, rostro pedibusque rubris, rectricibus apice cae-
llitis. rulecentibus, orbitis incarnatis. Mus. Ad. Fr. 2. p. 13.
Psittaca. Briss. av. 4. p. 319. n. 54.
Tui Nr. I. Raj. av. p. 34. Will. orn. p. 116.
Perruche. Buff. planch. enlum. n. 550.
Sinvalio. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 265.
Small green longtailed Parrakeet. Brown. Jam. 472.
Long tailed green Parrakeet. Edw. av. 4. t. 175. Latham
syn. I. I. p. 230. n. 33.
- gujanen- β. Psittaca aquarum Lupiarum insulae. Briss. av. 4. p. 330.
fis. n. 58.
Green Parrot of Guiana. Bancr. Guj. p. 161.
Habitat in America australi, 12 pollices longitudine supe-
rans, β. turdi magnitudine; gregarius, facile cicurandus, docilis, loquacissimus.
Pedes cum unguibus incarnati; in β. etiam rostrum; irides
aurantiae, in β. extus rubicundae, interius cinereae; or-
bitae quoque cinereae; pedes et unguis albi.

ornatus. 19. Ps. luteo-viridis, occipite, gula pectoreque rubris, vertice auribusque caeruleis orbitis cinereis.

Psittaca indica varia. Briff. av. 4. p. 366. n. 73.

Perruche Lori. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 145.

Perruche variée des Indes orientales. Buff. pl. enlum. n. 552.

Lory Parrakeet. Edw. av. 4. p. 174. t. 174. Latham s. n.

I. I. p. 221. n. 24.

Habitat in India, 8 pollices longus.

Rostrum pallide aurantium; cera subfuscata; irides aurantiae; vertex et macula pone et supra oculos ex atro caerulea; cauda subtus rubicunda; pedes et unguis cinerei.

Jaguilma. 69. Ps. viridis, remigibus apice fuscis, orbitis fulvis. Molina hist. nat. Chil. p. 228.

Habitat in regno Chileni, aestate in montibus Cordilleras, turturis magnitudine, sonorus, gregibus numerosissimis, fertilissimus, gemmas arborum herbasque vorans, campis infestissimus; caro sapidissima tenera.

gujanen- 70. Ps. viridis, genis rubro-maculatis, teetricibus alarum minoribus coccineis, majoribus flavis, remigibus infra luteis, margine versus apicem nigricante.

Psittaca gujanensis. Briff. av. 4. p. 331. n. 59. t. 28. f. I.

Perruche pavouane. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 255.

Perruche de la Gujane. Buff. planch. enlum. n. 167. 407.

Pavouane Parrot. Lath. syn. I. I. p. 232. n. 34.

Habitat in Guiana, et insulis Caribaeis, pedem longus, ferox; Cera rostrumque albicans; apex hujus cinereus; pedes grisei; unguis nigricantes.

margina- 71. Ps. viridis, teetricibus alarum nigris, minorum marginis ex flavicante fusco, majorum caeruleo.

Perruche de l'isle de Luçon. Sonner. it. p. 80. t. 44.

Varied-winged Parrot. Lath. syn. I. I. p. 233. n. 35.

Habitat in insula Luzonia.

Capitulum splendide virens; rostrum magnum incarnatum, irides albæ; vertex caeruleus; corpus supra gramineum, subtus ex flavicante viride; pedes nigricantes.

Sonnera- 72. Ps. viridis, torque caeruleo, macula ad alarum exortum rubra.

Perruche à collier de l'isle de Luçon. Sonner. it. p. 80. t. 43.

Blue collared Parrot. Lath. syn. I. I. p. 234. n. 36.

Habitat in insula Luzonia.

Rostrum

Rostrum et irides rubrae; caput, collum et abdomen ex griseo viridia; alae et dorsum graminea; rectrices 2 intermediae gramineae, ceterae ex griseo virides; pedes ex nigricante grisei.

pondice- 73. *Ps. viridis*, fronte striaque a mandibula utrinque ad gulam nigris, facie alba et caerulecente, pectore ex purpureo caeruleo, cauda subtus straminea.

Perruche à Moustaches. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 149.*

Perruche de Pondichery. *Buff. pl. enlum. n. 517.*

Mustacho Parrakeet. *Lath. syn. I. 1. p. 238. n. 38.*

barbatus. β . *Ps. capite a basi rostri ad oculos castaneo, linea a naribus ad oculos fusca, gulæ deorsum ducta nigra, nucha rubra.*

Bearded Parrakeet. *Lath. syn. I. 1. p. 238. n. 38. A.*

Habitat in regione Pondichery, 11 pollices longus.

Tectrices alarum flavo variae; in β . remiges margine caeruleo, rostrum rubrum, vertex viridis, pedes obscuri.

erythro- 74. *Ps. viridis*, capite rubro, caeruleo admisto, gula nigra, torque nigro et pallide viridi.

Blossom headed Parrakeet. *Lath. syn. I. 1. p. 239. n. 39.*

Psittaca ginginiana erythrocephalos. Briss. av. 4. p. 346.

n. 65. t. 29. f. 2.

Perruche à tête rouge. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 144.*

Perruche à tête rouge de Gingi. *Buff. pl. enlum. n. 264.*

benga- β . *Ps. vertice genisque roseis, occipite rectricibusque duabus*
cephalus. intermediis supra totis, reliquis margine caeruleis.

Psittaca bengalensis. Briss. av. 4. p. 348. n. 66.

Petite perruche à tête couleur de rose à longs brins. *Buff.*
hist. nat. des ois. 6. p. 154.

Perruche de Mahé. *Buff. planch. enlum. n. 888.*

Perruche à tête rouge de l'isle de Luçon. *Sonner. it. p. 79.*

t. 42.

Parrakeet from Bengal. *Albin. av. 3. p. 7. t. 14.*

Rose-headed ring Parrakeet. *Edw. glean. t. 233. Latham*
syn. I. 1. p. 239. n. 39. A.

borneus. γ . *Ps. capite, gula, jugulo, pectore, et abdominis parte anteriore florum percicorum in modum rubris.*

Bornean Parrakeet. *Lath. syn. I. 1. p. 240. n. 39. B.*

malac- δ . *Ps. colore magis in flavum vergente, area oculorum et oc-*
cipite roseis.

Grande perruche à longs brins. *Buff. hist. nat. des ois. 6.*
p. 155.

Perruche de Malac. *Buff. pl. enlum. n. 887.*

Malacca Parrakeet. *Lath. syn. I. I. p. 241. n. 39. C.*

*Habitat in India, insulisque oceanii indici, II, β. 10, γ. 12,
δ. 16 pollices longus.*

*Rostrum rubens, mandibula inferiore in γ. et β. nigra, su-
periore in hac posteriori varietate lutea; cera in β. sub-
fuscata, in γ. una cum orbitis cinerea; in hac etiam fron-
tis macula viridis, et linea nigra ab altero oculo ad alte-
rum ducta; in δ. torques nullus; corpus subtus, in δ.
etiam supra e. viridi in flavum vergens; tectrices alarum
macula rubra; cauda interiori margine, in β. subtus fla-
va, in δ. in caeruleum inclinans. Pedes et ungues cinerei,*

plum-
beus.

75. *Ps. viridis, rostro, pedibus orbitisque plumbeis, fronte,
genis gulaque fusca, rectricem marginem et apice caeruleis.*
Brown fronted Parrakeet. *Lath. syn. I. I. p. 243. n. 41. A.*
*Longitudo 11½ pollicum; irides castaneae; vertex caerulef-
cens; remiges marginem caeruleas; an varietas aeruginosi?*

oliva-
ceus.

76. *Ps. olivaceus, occipitis macula caeruleofuscata, aliis ex cae-
ruleo, viridi et aurantio variis.*

Perruche aux ailes chamarées. *Buff. hist. nat. des oif. 6.
p. 151.*

Perroquet de l'isle de Luçon. *Buff. pl. enlum. n. 287.*

Lace-winged Parrakeet. *Lath. syn. I. I. p. 244. n. 42.*

Habitat in insula Luzonia, ultra 11 pollices longus.

*Rostrum rubrum; alarum medium caeruleum; cauda ¾ lon-
gitudinis totius corporis; alae complicatae ad medium
caudae usque; pedes obscuri.*

virescens. 77. *Ps. virescens, tectricibus alarum minoribus basi intusque
albis, extus et apice flavis, remigibus quinque primis in-
tus nigris, margine albo, septem proximis albis, margi-
ne et apice flavis.*

Psittaca cayenensis. Briss. av. 4. p. 334. n. 60. t. 27. f. 2.

Perruche à ailes variées. *Buff. hist. nat. des oif. 6. p. 259.*

Petite perruche verte de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 359.*

Yellow winged Parrakeet. *Lath. syn. I. I. p. 244. n. 43.*

*Habitat in Cayenna numerosissimus, non timidus, docilis,
erythrinae coralliodendri floribus se delectans, 8 pollices lon-
gitudine superans.*

*Rostrum cum cera albido; tectrices alarum a corpore re-
morissimae ex virescente caeruleae; subtus corpori proxi-
mae sulphureae, exteriores ex caeruleofuscata virides; remi-
ges*

ges plurimae extus et apice flavae, intus ex flavicanti albae; 4 corpori proximae virides; rectrices margine interiore flavicantes.

versico- 78. Ps. viridis, capite gulaque fuscis, hac fulvo undulata, alis
lor. caeruleis plica flammea, abdomine ex purpurascente di-
lute caeruleo, venis fuscis.

Perruche à gorge variée. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 259.

Perruche à gorge tachetée de Cayenne. Buff. planch. enlum.

n. 144.

Perruche Nr. 2. Fermin Surin. 2. p. 177.

Waved-breasted Parrakeet. Lath. syn. I. I. p. 245. n. 44.

Habitat in Cayenna et Surinamo, virescens aequalis.

Rostrum, pedes et unguis nigra; irides flammeae; capistrum supra schisti, subtus caeli colore; cauda linea longitudinali ex purpurascente dilute caerulea (lilac), subtus ex rubro fusca.

incarna- 79. Ps. viridis, rostro, pedibus et unguibus incarnatis, cera
tus. orbitisque albidi, gula teetricibusque alarum rubris.

Psittaca indica. Briff. av. 4. p. 341. n. 63.

Perruche à gorge rouge. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 157.

Little redwinged Parrakeet. Edw. glean. t. 236. Latham
syn. I. I. p. 246. n. 46.

Habitat in India, 8½ pollices longus.

Irides castaneae; cauda 4½ pollices longa.

murinus. 80. Ps. olivaceus, facie, gula et pectore murinis, remigibus
viridibus.

Perruche. Pernatt. it. Malouin. I. p. 312.

Perruche fouris. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 148.

Perruche à poitrine grise. Buff. planch. enl. n. 768.

Habitat in Montevideo, mansuetus et docilis, 10 pollices
longus.

Rostrum et pedes grisei; cauda 5 pollicum.

cornutus. 81. Ps. viridis, capite coccineo, pennis duabus elongatis ex-
stantibus, torque et uropygio stramineis, remigum rectri-
cumque margine exteriore caeruleo.

Horned Parrot. Lath. syn. I. I. p. 248. n. 48. t. 8.

Habitat in nova Caledonia, 11 pollices longus.

Rostrum et pedes ex atro caerulei; tempora aurantia; iri-
des aureae; pennae 2 verticis exstantes 1½ pollices longae;
rectrices alarum intus et apice obscurae; cauda subtus atra.

- aledoni- 82. Pf. olivaceus, vertice ex virescente flavo, rectricibus apice
cus. albicantibus, 4 extimis margine exteriori pallide caeruleis.
Caledonian Parrot. *Lath. syn. I. I. p. 248. n. 49.*
Habitat in nova Caledonia, 12 pollices longus.
Rostrum caerulescens, apice pallido; capistrum supra rubrum,
subtus caeruleum; corpus supra magis in viridem, subtus
magis in flavum colorem vergens; pedes ex atro caerulei;
an semina cornuti?
- novae 83. Pf. viridis, fronte purpurea, vertice badio, stria a basi ro-
Seelan- stri per oculos ducta rubra, rectricibus caerulecentibus,
diae. intermediarum duarum margine viridi, uropygio rubro.
Red rumped Parrot. *Lath. syn. I. I. p. 249. n. 50.*
Habitat in nova Seelandia, 15 pollices longus.
Rostrum profunde caeruleum apice nigrum; in cervice pen-
nae nonnullae pallide flavae, in dorso medio ex pallide fer-
ragineo fuscae; teinpora pallide viridia; abdomen ex ci-
nereo viride; remiges primariae fuscae, margine caerule-
scente, secundariae et alae spuriae obscurae margine vi-
ridi et apice pallide ferragineo; pedes nigri.
- novae 84. Pf. olivaceus, capite cristato et gula flavis, macula pone
Hollan- oculos rubra, fascia alarum obliqua alba.
diae. Crested Parrakeet. *Lath. syn. I. L. p. 250. n. 51.*
Habitat in nova Hollandia, 12 pollices longus.
Rostrum pallidum; crista pennis 6 gracilibus, quarum 2 pol-
lices 3 fere longae, reliquae breviores; pedes obscuri;
feminae caput et corpus magis in badium vergunt; uro-
pygio et cauda lineis transversis griseis pitta.
- ulieta- 85. Pf. olivaceus, capite ex atro fusco, uropygio obscure ru-
nus. bro, alis caudaque obscuris.
Society Parrot. *Lath. syn. I. I. p. 250. n. 52.*
Habitat in Ulietea, 10½ pollices longus.
Rostrum ex atro caeruleum, apice nigrum; pennae margi-
ne obscuro, subtus magis in flavum vergentes; pedes nigri.
- multico- 86. Pf. viridis, capite, gula et abdome caeruleis, pectore
lor. anteriore rubro, posteriore et cauda subtus lutea, tor-
que albo.
White collared Parrot. *Gener. of birds. p. 59. t. 2. Lath.*
syn. I. I. p. 251. n. 53.
Habitat in insulis oceanii indici; rostrum rubrum.

- aureus. 87. Ps. viridis, cera orbitisque ex caerulecente incarnatis, vertice aureo, testicibus alarum fascia obliqua caerulea.
Psittaca brasiliensis. Briss. av. 4. p. 337. n. 61.
 Perruche couronnée d'or. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 271.
 Golden-crowned Parrakeet. Edw. glean. t. 235. Latham
syn. I. I. p. 251. n. 54.
Habitat in Brasilia.
 Rostrum nigrum; irides aurantiae; gula ex flavicante viridis, rubro admisto; pedes rubicundi; unguis nigricantes.
- lineatus. 48. Ps. viridis, remigibus subtus fuscis, margine interiore pallidis.
 Magnitudo turturis; color subtus magis in flavum vergens; alae subtus lineis pallidis longitudinalibus tenuissimis; cauda corpore longior.
- pacificus. 88. Ps. viridis fronte et macula pone oculos et utrumque ad uropygium rubra, alarum margine exteriore caeruleo, cauda subtus cinerea.
 Pacific Parrakeet. Lath. *syn. I. I. p. 252. n. 56.*
β. Ps. macula ad uropygium nulla.
γ. Ps. uropygio rubro.
δ. Ps. vertice flavo.
Habitat in insulis maris pacifici, 12 pollices longus.
 Rostrum argenteum, apice nigro; pedes fusi; unguis nigri.
- palma- 89. Ps. viridis, rostro pedibusque rubris, remigum apice et
 rum. atro.
 Palm Parrot. Lath. *syn. I. I. p. 253. n. 57.*
Habitat in insula Tanna, palmas frequentans, 8 polices longus.
 Color subtus magis pallidus, in abdomine et caudae apice in flavum vergens.
- australis. 90. Ps. viridis, vertice caeruleo pennis elongatis cristato, gula et abdome medio rubris, femoribus purpureis.
 Blue crested Parrakeet. Lath. *syn. I. I. p. 254. n. 58.*
Habitat in insulis Sandwich, 6½ polices longus.
 Rostrum aurantium; frons pallide viridis; rectrices 2 intermediae virides, apice flavo; reliquae flavicantes, margine et apice viridi; pedes obscuri, unguis nigri.
- taitianus. 91. Ps. caeruleus, capitis pennis elongatis, gula juguloque albida, rostro pedibusque rubris.
 Arimanon. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 175.

Petite Perruche de l'isle de Taiti. *Buff. planch. enl. n. 455.*
f. 2.

Otaheitian blue Parrakeet. *Lath. syn. I. I. p. 255. n. 59.*

*Habitat in insula Taiti, sonorus, frequens, musae fructibus
vicitans, longitudine 5 pollices parum excedens.*

pygmae- 92. *Ps. viridis*, pennarum apice ex virescente flavo, remigibus intus obscuris.

Pygmy Parrakeet. *Lath. syn. I. I. p. 256. n. 60.*

*Habitat in insulis maris australis, 6 pollices longus.
Rostrum albicans; cera obscura; pedes plumbei.*

agilis. 20. *Ps. viridis*, tectricibus remigum primorum caerulecentium fulvis, cauda vix elongata subtus rubra, orbitis cinereis.

Psittacus cayenensis. Briff. av. 4. p. 237. n. 23.

Criq. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 228.

Criq de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 839.

Little green Parrot. Edw. av. 4. t. 168.

Agile Parrot. Lath. syn. I. I. p. 297. n. 101.

Habitat in America, 10 $\frac{1}{2}$ pollices longus, coccothraustae magnitudine.

Rostrum et pedes cinerea; irides badiae; remiges intus et apice nigrae; rectrices 2 intermediae virides; 3 proximae intus $\frac{3}{4}$ longitudinis rubrae.

* * *Brachyuri, cauda aequali.*

corona- 21. *Ps. viridis*, crista plicatili rubra apice caerulea.
tus. *Cockatoo of Guiana. Bancr. Guj. p. 160.*

Crowned Cockatoo. Lath. syn. I. I. p. 259. n. 65.

Habitat in Surinamo et Guiana, cristati magnitudine.

Frons flava; crista coccinea, apice lucide caeruleo; rectrices extimae latere exteriori caeruleae; crissum rubrum, pennarum apice caeruleo.

aterri- 93. *Ps. niger*, crista magna dilutiore, genis rubris nudis.
mus. *Kakatoës noir. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 97.*

Great black Cockatoo. Edw. glean. t. 316.

Black Cockatoo. Lath. syn. I. I. p. 260. n. 66.

Habitat in nova Hollandia, magnitudine Macao.

Rostrum obscure fuscum; pedes ex fusco nigri.

fulphu- 94. *Ps. albus*, crista plicatili acuminata, et macula infra' ocu-
reus. los sulphureis.

Cacatua luteo-cristata. Briff. av. 4. p. 206. n. 9.

Kaka-

Kakatoës à hupe jaunç. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 93. pl. enlum. n. 14.

Crested Parrot or Cockatoo. Albin. av. 3. t. 12.

Lesser white Cockatoo. Edw. glean. t. 317. Lath. syn. I. I. p. 258. n. 64.

Habitat in insulis Moluccis, $14\frac{1}{2}$ pollices longus.

Rostrum et cera nigricant; irides rubent; color subtus in sulphureum inclinans; pedes nigri.

philippi- 95. Ps. albus, crista sulphurea plicatili apice alba, orbitis ex narum. flavicante rubris, rectricibus caudae inferioribus rubris albo punctatis.

Cacatua minor. Briss. av. 4. p. 212. n. II. t. 22. f. I.

Petit Kakatoës à bec couleur de chair. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 96.

Petit Kakatoës des philippines. Buff. pl. enlum. n. 191.

Red-vented Cockatoo. Brown illustr. p. 10. t. 5. Latham syn. I. I. p. 258. n. 63.

Habitat in insulis Philippinis, $13\frac{1}{2}$ pollices longus.

Rostrum album, basi utplurimum cinereum; cera grisea; orbitae ex flavicante rubrae; cristae pennae longissimae sesquipollicares; inferiorum aliquae pallide rubrae; rectrices 2 intermediae albae, laterales intus ad medium usque sulphureae; pedes et unguis plumbei.

moluc- 96. Ps. albus in colorem dilute roseum inclinans, crista subtus cenfis. rubra, rectricibus lateralibus intus a basi ad medium usque sulphureis.

Cacatua rubro cristata. Briss. av. 4. p. 209. n. 10.

Kakatoës à hupe rouge. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 95. pl. enlum. n. 498.

Greater Cockatoo. Edw. av. 4. t. 160.

Great red-crested Cockatoo. Lath. syn. I. I. p. 257. n. 62.

Habitat in insulis moluccis, $17\frac{1}{4}$ pollices longus.

Rostrum ex caeruleo nigrum; cera et unguis nigra; orbitae griseae; irides rubrae; crista $6\frac{1}{2}$ pollices longa; pedes plumbei.

cristatus. 22. Ps. albus, crista plicatili flava.

Cacatua. Briss. av. 4. p. 204. n. 8. t. 21.

Psittacus albus cristatus. Aldrov. orn. L. II. c. 4. Raj. av. p. 30. n. I.

Kakatoës à hupe blanche. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 92.

Kakatoës des Moluques. Buff. pl. enlum. n. 263.

White

White crested Parrot of Aldrovandus. *Albin. av. 3. p. 12.*

t. 12. Will. orn. p. 112. t. 15.

Great white Cockatoo. *Lath. syn. I. 1. p. 256. n. 61.*

Habitat in insulis Moluccis, 18 pollices longus.

Rostrum, cera, irides, pedes et ungues nigra; orbitae nudae et albae; remiges et laterales rectrices a basi ad medium intus sulphureae; cervicis pennae laxae et fluctuantes; crista 5 pollices longa, uti 92-96 upupae plicatilis, tegens verticis calvitudinem pennis dupli serie, sed alternatim connivente imbricatis, quas erigit affectu quovis exicitatus.

erythro- 23. *Ps. cinereus, uropygio, rectricibus remigibusque coccineis.*
leucus. *Psittacus erythroleucus. Aldrov. orn. I. p. 675. Raj. av.*

p. 31. n. 7.

Cacatua alis et cauda rubris. Briff. av. 4. p. 214. n. 12.

Kakatoës à ailes et queue rouges. Buff. hist. nat. des oif. 6. p. 96.

Red and white Parrot. *Will. orn. p. 114. n. 8. Lath. syn. I. 1. p. 260. n. 67.*

Magnitudo gallinae; longitudo 17 pollicum; rostrum et unguis nigrae; dorsi pars inferior punicea; pedes nigricantes.

eritha- 24. *Ps. canus, temporibus nudis albis, cauda coccinea. Mus.*
cus. *Ad. Frid. I. p. 14. Scop. ann. I. p. 31. n. 30.*

Psittacus guineensis cinereus. Briff. av. 4. p. 310. n. 49.

Psittacus cinereus s. subcaeruleus. Aldr. orn. I. p. 675. t. 676.
Raj. av. p. 31. n. 8.

Perroquet cendré ou Jaco. Buff. hist. nat. des oif. 6. p. 100.
pl. enlum. n. 311.

Ash-coloured Parrot. *Will. orn. p. 114. n. 7. Albin. av. I.*
t. 12. Lath. syn. I. 1. p. 261. n. 68.

Grauer Papagay mit rothem Schwanz. *Frisch. av. t. 51.*

β. *Psittacus alis rubris. Briff. av. 4. p. 313. n. 49. A.*

γ. *Psittacus rubro-varius. Briff. av. 4. p. 313. n. 49. B.*

Ash-coloured and red Parrot. *Edw. av. 4. t. 163.*

δ. *Psittacus ruber, capite cinereo, genis nudis, remigibus primariis ex cinereo fuscis. Scopol. ann. I. p. 32. n. 31.*

Habitat in Africa occidentali, 20 pollices longus, loquax varias modulatur gutture voces, scurrili strepitu, quicquid et audit, ait.

Rostrum nigrum; cera alba; irides ex flavicante albæ; pedes cinerei; unguis nigricantes.

- cinereus. 97. Ps. totus ex caerulecente cinereus.
Psittacus brasiliensis cinereus. Briss. av. 4. p. 313. n. 50.
Maracana. Will. orn. p. 112. n. 5.
Maracana Brasiliensibus, prima Maregravii. Raj. av. p. 29.
n. 4.
Cinereous Parrot. Lath. syn. I. I. p. 263. n. 69.
Habitat in Guinea, erithaco major.
- meridio- 98. Ps. supra ex virescente cinereus, subtus spadiceus, orbitis,
 nalis. vertice, occipite et cervice cinereis, pennarum apice fusco.
Southern brown Parrot. Lath. syn. I. I. p. 264. n. 70.
Habitat in nova Seelandia, 16 pollices longus.
Rostrum ex caeruleo nigrum; pedes nigri.
- masca- 49. Ps. cinereus capistro subtus nigro, orbitis nudis rubicun-
 rinus. dis, rectricibus lateralibus basi albicantibus. *Mantiss.*
1771. p. 524. Briss. av. 4. p. 315. n. 52.
Mascarin. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 120. t. 5. pl. enlum.
n. 35.
Mascarine Parrot. Lath. syn. I. I. p. 265. n. 72.
Habitat in Mascarin, 13½ pollices longus.
Rostrum, cera et pedes rubicunda; vertex et cervix pallidiores; unguis grisei.
- fuscus. 99. Ps. totus ex cinereo fuscus. *Briss. av. 4. p. 314. n. 51.*
Brown Parrot. Lath. syn. I. I. p. 266. n. 73.
Longitudo 13½ pollicum.
- garrulus. 25. Ps. ruber, orbitis cinereis, genis alisque viridibus, re-
 Ettricibus medietate postica caeruleis. *Mus. Ad. Frid. 2.*
p. 14.
*Psittacus ruber, remigibus rectricibusque introrsum purpu-
 reis. It. wgoth. 137.*
Lorius ceramensis. Briss. av. 4. p. 215. n. 13.
Lory. Raj. av. p. 151. n. 5.
Purple Parrot. Charlet. exerc. p. 75. n. 16.
Scarlet Parrakeeto with green and black Wings. Will. orn.
p. 117.
Lory de Ceram. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 129. var. 2.
Ceram Lory. Lath. syn. I. I. p. 269. n. 76.
Ganz rother Papagay. Frisch. av. t. 45.
- aurorae. β. Ps. coccineus alis viridibus nigrisque, rectricibus flavis, me-
 dietate postica virescentibus. *Syst. nat. 10. n. 22.*
Psittacus coccineus orientalis, alis ex viridi et nigro variis.
Raj. av. p. 31. n. 9.
Noira variété. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 129. n. 1.
γ. Pfit-

moluc- γ. Psittacus humeris luteo · maculatis. Briff. av. 4. p. 219. n. 14.
cenfis. t. 23. f. I.

Lori Noira. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 127.

Lori des Moluques. Buff. pl. enlum. n. 216.

Scarlet Lori. Edw. av. 4. t. 172. Lath. syn. I. I. p. 270.
n. 76. B.

δ. Psittacus teetrichibus alarum plurimis caeruleo punctatis.

Habitat in insulis Moluccis, 10 $\frac{1}{4}$ pollices longus.

Rostrum aurantium; cera cinerea; irides flavae; pedes fuscii,
in β. nigri; unguis nigri; teetriches alarum minores et
inferiores ex flavo et viridi variae; β. virides; γ. primo
flavae, tum virides, dein virides flavo punctatae; alae
spuriae violaceae; remiges majores obscure virides intus
coccineae, apice cinereae; in β. nigrae, extrorsum viri-
des subtus obscure; in γ. obscure virides, in caeruleum
vergentes. Rectrices 2 intermediae basi virides, tum ru-
brae punctis viridibus, proximae $\frac{2}{3}$ longitudinis rubrae,
tum virides, reliquae basi coccineae, tum violaceae pun-
ctis obscure viridibus; in β. exterior pars caudae flava,
apex ex flavo viridis; in γ. rectrices omnes subtus ex ru-
bro flavae.

domicel- 26. Ps. ruber, pileo violaceo, alis viridibus, humeris genibus-
la. que caeruleis, orbitis fuscis.

Lorius orientalis indicus. Briff. av. 4. p. 22. n. 15. t. 24. f. I.

Lory des Indes orientales. Buff. pl. enlum. n. 84.

Lori à collier. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 130.

Second black-cap Lory. Edw. av. 4. t. 171.

Purple-capped Lory. Lath. syn. I. I. p. 271. n. 77.

β. Psittacus pileo caeruleo.

Lorius torquatus indicus. Briff. av. 4. p. 130. n. 18.

Lori à collier. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 131.

Lori mâle des Indes orientales. Buff. pl. enlum. n. 119.

Laurey from the Brafils. Albin. av. I. t. 13.

Habitat in insulis Moluccis et nova Guinea, docilis, disin-
te loquens, 11 fere pollices longus.

Rostrum rubrum, in β. flavicans; cera cinerea; orbitae
β. nigrae; irides flavae; lunula ad pectus, β. torque
flavus, β. dorso, uropygio et abdomine ex albo et roseo mi-
stis; β. cauda purpurea, teetrichibus ejus ex albo et rubro
variis; β. remiges caeruleae, minores cum teetrichibus ex
flavicante virides; pedes subatri; unguis nigri.

- n.14. Lory. 27. *Ps. purpureus*, pileo violaceo, alis viridibus, pectore, genibus caudaque caeruleis, orbitis subincarnatis.
Lori philippensis. *Briss. av. 4. p. 225. n. 16. t. 23. f. 2.*
Lori tricolor. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 132.*
Lory des Philippines. *Buff. pl. enlum. n. 168.*
First black cap Lory. *Edw. av. 4. t. 170.*
Black-capped Lory. *Lath. syn. I. 1. p. 273. n. 78.*
Habitat in insula Yolo et reliquis Philippinis, 10 $\frac{3}{4}$ pollices longus.
Rostrum et irides aurantia; cera cinerea; rectrices partim rubrae, partim virides, exteriores margine extremo violaceae; pedes nigricantes.
- puniceus. 100. *Ps. saturate coccineus, subtus violaceus, teetrichibus alarum minoribus et inferioribus, remigibusque intus et subtus ex nigricante fuscis.*
Lori amboinensis. *Briss. av. 4. p. 231. n. 19.*
Lory d'Amboine. *Buff. pl. enlum. n. 518.*
Lori Cramoisi. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 133.*
Blue breasted Parrot. *Brown's illustr. t. 6.*
Crimson Lory. *Lath. syn. I. 1. p. 273. n. 79.*
Habitat in Amboina, 11 $\frac{1}{2}$ pollices longus.
Rostrum rubrum, aliquando nigrum; cera orbitaeque nigricantes; irides aurantiae; rectrices apice sordide rubrae aut aurantiae; pedes fusti; unguis nigri.
- ruber. 101. *Ps. ruber, area oculorum remigibusque nigris, alarum macula et teetrichibus caudae inferioribus cyaneis, caudae apice badio.*
Lori de Gilolo. *Sonner. it. p. 177. t. 112.*
Lori rouge. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 134.*
Lori de la Chine. *Buff. pl. enlum. n. 519.*
Molucca Lory. *Lath. syn. I. 1. p. 274. n. 80.*
β. *Ps. humeris, abdomine, crisco, remigum secundiarum et teetrichum alarum majorum apicibus caeruleis.*
Habitat in Moluccis insulis et nova Guinea, 9-10 pollices longus.
- grandis. 102. *Ps. ruber, subtus ex rubro, caeruleo, violaceo et viridi mixtus, nucha violacea, alis cyaneis, caudae apice flavo.*
Purpur-roode Lori. *Vosmaer Monogr. 1769. p. 10. t. 7.*
Lori de la nouvelle Guinée. *Buff. pl. enlum. n. 683.*
Grand Lori. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 135. Lath. syn. I. 1. p. 275. n. 81.*

β. Psit.

β. Psittacus corpore supra ex fusco et viridi vario, subtus caeruleo, alarum margine et tectricibus alarum inferioribus caeruleis, cauda badia.

Habitat in Zeylona, 13 pollices longus. Rostrum nigrum.

guineen- 103. Ps. capite colloque coccineis, superciliis et pectore flavescentibus, alis ex luteo virentibus apice caeruleis, abdome, uropygio caudaque subtus canis, apice coccineis.

Miller illustr. t. XXIX.

Yellow-breasted Lory. Lath. syn. I. 1. p. 276. n. 82.

Habitat in Guinea, 10 pollices longus.

Rostrum nigrum; cera, gula, et orbitae albae; unguis nigri.

paragua- 104. Ps. coccineus, capite, cervice, crisco, cauda, humeris alisnus.

Lorius brasiliensis. Briss. av. 4. p. 229. n. 17.

Paragua. Raj. av. p. 33. n. 4. Will. orn. p. 115. n. 9. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 248.

Paraguan Lory. Lath. syn. I. 1. p. 277. n. 83.

Habitat in Brasilia? Rostrum cinereum; irides rubrae.

niger. 29. Ps. cauda elongata aequali, corpore caerulecente nigro, rostro orbitisque albidis.

Psittacus madagascariensis niger. Briss. av. 4. p. 317. n. 53.

Vaia ou Perroquet noir. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 119.

t. 4.

Perroquet noir de Madagascar. Buff. pl. enlum. n. 500.

Black Parrot of Madagascar. Edw. av. 1. t. 5.

Black Parrot. Lath. syn. I. 1. p. 264. n. 71.

Habitat in Madagascar, 13½ pollices longus.

Rostrum rubicundum; irides fuscae; pedes carnei; unguis nigri.

caeruleo- 28. Ps. caeruleus, ventre, uropygio caudaque viridibus, vertex flavo, remigibus rectricibusque rubris.

Psittacus gujanensis caeruleus. Briss. av. 4. p. 304. n. 46.

Psittacus versicolor f. erythrocyanus. Aldr. orn. I. p. 675.

Raj. av. p. 31. n. 6.

Crik rouge et bleu. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 226.

Red and blue Parrot. Will. orn. p. 114. n. 6. Lath. syn. I. 1. p. 277. n. 84.

Habitat in Guiana, 9 pollices longus.

Rostrum nigricans; orbitae nudae, albidae; irides flavae;

pedes ex rubro grisei.

104. Pl.

- varius. 105. Ps. ex fusco et cyaneo varius, genis, gula juguloque albicantibus, remigibus reétricibusque obscure fuscis, latere exteriore cyaneis. Maerter phys. Arb. der eintr. Fr. zu Wien. I. 2. p. 48.
Habitat in America australi, parum ultra 5 pollices longus; rostro pedibusque flavescens, unguibus nigris.
- violaceus. 106. Ps. violaceus viridi et nigro admisto varius, dorso ex fuso viridi, remigibus majoribus nigris, reliquis ex luteo, viridi et rubro variis, teétricum macula rosea.
Psittacus aquarum Lupiarum insulae. Briss. av. 4. p. 302. n. 44.
Crick à tête violette. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 233.
Perroquet de la Guadeloupe. du Tertre antill. 2. p. 250. fig. p. 246.
Ruff-necked Parrot. Lath. syn. I. 1. p. 268. n. 75.
Habitat in insula aquarum Lupiarum.
Rostrum et orbitae incarnata.
- fringilla- 107. Ps. viridis, capite cyaneo, genis, gula, jugulo, maculatus abdominis ex lacteo sanguineis, abdomine violaceo.
Maerter phys. Arb. der eintr. Fr. zu Wien. I. 2. p. 47.
Habitat in America australi, fringillae magnitudine, 6 pollices longitudine superans. Reétrices latere interiori et apice, rostrum et pedes pallide lutea; unguis subfuscus.
- choracus. 108. Ps. viridis, subtus cinereus, orbitis incarnatis. Molina hist. nat. Chil. p. 228.
Habitat in Chili, moribus et victu cum Jaquilma conveniens.
- finensis. 109. Ps. viridis, alarum teétricibus inferioribus rubris, majoribus nonnullis et margine caeruleis, cauda subtus fusca.
Psittacus finensis. Briss. av. 4. p. 291. n. 39.
Perroquet de la Chine. Buff. pl. enlum. n. 514.
Perroquet vert. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 116.
Grand perroquet vert de la nouvelle Guinée. Sonner. it. p. 174. t. 108.
Green and red Parrot from China. Edw. glean. t. 231. Lath. syn. I. 1. p. 278. n. 85.
Habitat in Sina australi, Amboina, nova Guinea, gallinae magnitudine.
Cera nulla; orbitae non nudae; mandibula inferior nigra, superior rubra, apice flavicans; irides aurantiae; pedes et unguis nigri.

macro- 110. Ps. viridis subtus in flavum vergens, alis ex cyaneo et
rhychos. viridi misticis, tectricibus nigris.

Perroquet à bec couleur de sang. Buff. hist. nat. des ois. 6.
p. 122.

Perroquet de la nouvelle Guinée. Buff. pl. enlum. n. 713.

Great billed Parrot. Lath. syn. I. I. p. 278. n. 86.

Habitat in nova Guinea, 14 pollices longus.

Rostrum magnum, sanguineum.

grami- III. Ps. viridis, subtus olivaceus, fronte et vertice caeruleis,
neus. cauda subtus flava.

Grand Perroquet vert à tête bleue. Buff. hist. nat. des ois. 6.
p. 122.

Perroquet d'Amboine. Buff. pl. enlum. n. 862.

Amboina Parrot. Lath. syn. I. I. p. 279. n. 87.

Habitat in Amboina, 16 pollices longus. Pedes plumbei.

leucoce- 30. Ps. viridis, remigibus caeruleis, fronte alba, orbitis niveis.
phalus. Psittacus martinicanus. Briss. av. 4. p. 242. n. 26.

Amazone à tête blanche. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 212.
t. 9.

Perroquet à front blanc du Senegal. Buff. pl. enlum. n. 335.
White-headed Parrot. Edw. av. 4. t. 166.

White-fronted Parrot. Lath. syn. I. I. p. 279. n. 88.

β . Psittacus martinicanus gutture rubro. Briss. av. 4. p. 244.
n. 27.

Psittacus leucocephalus. Aldr. orn. I. p. 670. Raj. av. p. 31.
n. 5. p. 181. n. 7.

Amazone à tête blanche. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 212. var.

Perroquet de la Martinique. Buff. pl. enlum. n. 549.

White-headed Parrot. Will. orn. p. 113. n. 5. Lath. syn.
I. I. p. 280. n. 88. A.

γ . Psittacus capite a fronte ad verticem albo, ceterum pallide
caeruleo.

White crowned Parrot. Lath. syn. I. I. p. 281. n. 88. B.

δ . Psittacus martinicanus cyanocephalus. Briss. av. 4. p. 251.
n. 29.

Papagai à ventre pourpre. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 242.
Papagai à ventre pourpre de la Martinique. Buff. pl. enlum.
n. 548.

Ash crowned Parrot. Latham syn. I. I. p. 281. n. 88. C.

Habitat in insula Martinica, β . etiam in Jamaica, et in no-
va Hispania.

Corpus magnitudine columbae, viride, pennarum margine
fusco aut rubro; caput supra et ad latera caeruleum, in
 β . po-

$\beta.$ postice viride; gula tota rubra, in $\gamma.$ et $\delta.$ viridis; remiges nigrae latere exteriore denudato caeruleae; rectrices aequales virides, basi rubrae, apice flavescentes; at \mathbf{I}, \mathbf{I} latere exteriore caeruleo, $6, 6$ unicolores; abdomen postice non raro ferrugineum.

ochroce- 112. *Ps. viridis*, vertice flavo, tectricibus alarum rubris, remigibus ex viridi, nigro, violaceo et rubro variis, rectricibus duabus extimis basi intus rubris.

Psittacus amazonicus brasiliensis. *Briss. av. 4. p. 272. n. 35. t. 26. f. 1.*

Amazone à tête jaune. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 208.*

Yellow-headed Amazons Parrot. *Latham syn. I. I. p. 282. n. 89.*

$\beta.$ Amazone à tête jaune, var. I. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 209.*
Perroquet vert et rouge de Cayenne. *Buff. planch. enlum. n. 312.*

$\gamma.$ *Psittacus poikilorhynchos Aldrovandi.* *Raj. av. p. 30. n. 3.*
Psittacus amazonicus poikilorhynchos. *Briss. av. 4. p. 270. n. 34.*

Amazone à tête jaune, var. 2. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 210.*
Aldrovandus his Parrot, with a parti-coloured bill. *Will. orn. p. 113.*

Habitat in America australi, $\gamma.$ ad 18 pollices longus.

Rostrum cinereum, basi rubrum; in $\beta.$ rubens; in $\gamma.$ mandibula superior supra ex caerulecente viridis, lateribus ochracea, apice macula alba, inferior plumbea, medio flava; irides flavae; vertex in $\beta.$ macula tantum flava; pedes plumbei; unguis nigri.

barba- 113. *Ps. viridis*, orbitis et fronte cinereis, vertice, genis, gu- densis. la, jugulo, alarumque tectricibus minoribus flavis, ma- joribus caeruleis, remigibus primariis multis extus violaceis, reliquis a basi ad medium rubris, cetera caeruleis.

Ashfronted Parrot. *Lath. syn. I. I. p. 284. n. 90.*

Habitat in Barbados, columbae magnitudine.

Rostrum cornuum; pedes cinerei; unguis nigri.

lucionen- 31. *Ps. viridis*, occipite uropygioque caeruleis, alis nigro, cae- sis. ruleo rubroque notatis.

Psittacus lucionensis. *Briss. av. 4. p. 295. n. 41. t. 22. f. 2.*
Manilla Green Parrot. *Lath. syn. I. I. p. 296. n. 98.*

Habitat in insula Luzonia, columbae magnitudine, 12½ pollices longus.

Rostrum coccineum, apice album; cera rubens; pedes cinerei; unguis nigricantes.

aestivus. 32. *Ps. viridis luteo-submaculatus*, fronte caerulea, humeris fanguineis, orbitis incarnatis.

Psittacus amazonicus. Briss. av. 4. p. 256. n. 31.

Ajuru-curau. Raj. av. p. 32. n. 1. Marcgr. bras. 205.

Aouron-couraou. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 215.

Perroquet Amazone. Buff. planch. enlum. n. 547.

Maregravius middle-sized Parrot, 1st species. Will. orn. p. 115.

Common Amazons Parrot. Lath. syn. I. 1. p. 284. n. 91.

β. *Psittacus jamaicensis icterocephalus.* Briss. av. 4. p. 233. n. 20.

Psittacus viridis melanorhynchos. Aldrov. av. l. II. c. 7.

Raj. av. p. 30. n. 4.

Aourou-couraou, var. 1. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 216.

Black-billed green Parrot of Aldrovandus. Will. orn. p. 113.

n. 4.

Jamaica-Parrot. Brown. jam. p. 473. Lath. syn. I. 1. p. 285. n. 91. A.

γ. *Psittacus amazonicus jamaicensis.* Briss. av. 4. p. 276. n. 36.

Psittacus viridis alarum costa superne rubente. Raj. av. p. 30. n. 2. p. 181. n. 6.

Aourou-couraou, var. 2. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 217.

Common green Parrot with the ridge of the wing red. Will. orn. p. 113. n. 2.

Main Parrot. Brown. jam. p. 472. Lath. syn. I. 1. p. 285. n. 91. B.

δ. *Psittacus brasiliensis cyanocephalus.* Briss. av. 4. p. 234. n. 21.

Aourou-couraou, var. 3. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 219.

Ajuru-curuca. Raj. av. p. 33. n. 3. Will. orn. p. 115. f. 9.

Blue-topped Parrot. Lath. syn. I. 1. p. 286. n. 91. C.

ε. *Psittacus amazonicus varius.* Briss. av. 4. p. 281. n. 37. t. 26. f. 2.

Ajurucurau 2. Marcgr. bras. 205.

Aourou-couraou, var. 4. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 219.

Psittacus major, seu mediae magnitudinis, Marcgr. 2. species. Raj. av. p. 33. n. 2.

Second species of Maregrave. Will. orn. p. 115. f. 9.

Great green Parrot from the Westindies. Edw. av. 4. t. 162. Habi-

Habitat in America australi.
Corpus magnitudine columbae, dorso adsperso pennis fulvis;
facies flava; frons caerulea; vertex albidus, in ♂. caeruleus,
macula flava; rectrices apice pallidiores; 1, 2, 3, basi
inferiori rubrae; at 1 latere etiam exteriore caerulea;
humeri fulvi vel sanguinei; remiges primores nigrae api-
ce caeruleentes latere interiore nigrae, exteriore virides;
secundariae anteriores latere exteriore versus basin rubrae;
rostrum, saltum apice nigrum, &c. cinereum.

- amazo- 33. Ps. subvirescens, fronte flava, temporibus fulvis.
 nius. *Psittacus amazonicus fronte lutea. Briss. av. 4. p. 261. n. 32.*
Aourou-couraou, var. 5. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 221.
Brazilian yellow-fronted Parrot. Latham syn. I. I. p. 287.
n. 91. E.

Habitat in Brasilia et Amazonum terra, aestivo valde affi-
nis, forte varietas, sed duplo major. Remiges exteriore
caeruleae, medio rubrae; rectrices extimae medio ex-
teriori caeruleae; laterales interiori latere rubrae.

- Iuteus. 114. Ps. viridis, vertice cyaneo, humeris flavis, tectricibus
 alarum majoribus macula aurantia.
Yellow shouldered Parrot. Lath. syn. I. I. p. 288. n. 92.
Habitat in America meridionali, 13 pollices longus.

- ochro- 115. Ps. viridis, fronte orbitisque albidi, vertice, genis,
 pterus. gula, jugulo, tectricibusque alarum remotioribus flavis.
Psittacus amazonicus, gutture luteo. Briss. av. 4. p. 287.
n. 38.
Crick à tête et gorge jaune. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 222.
Yellow-headed Creature. Bancr. Gujan. p. 159.
Yellow-winged Parrot. Lath. syn. I. I. p. 289. n. 93.
Habitat in America australi, 13 pollices longus, minus
docilis.
Rostrum albidum; pennae corporis superiores margine nigro;
rectrices alarum minores corpori proximae rubrae, mar-
gine flavo; remiges nigrae, nonnullae margine caeruleo
et viridi; mediae 4 basi intus rubrae; rectrices 4 inter-
mediae apice flavicantes; proximae tres basi ad medium
usque rubrae; extimae margine exteriori caeruleae; pe-
des cinerei.

- pulveru- 116. Ps. viridis et supra quasi farina conspersus, capitis macu-
 lentus. la flava, alarum rubra.
Meunier ou Crick poudré. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 225.

Meunier de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 861.*

Meally green Parrot. *Lath. syn. I. I. p. 291. n. 94.*

Habitat in Cayenna, distincte garriens, americanorum maximus.

Rostrum ex albido cornuum; pennae faciei margine obsoleto fuso; remiges extrorsum nigrae.

havanen- 117. *Ps. viridis, fronte, gula et jugulo ex cinereo caeruleis, sis.*

pectoris macula magna rubra, orbitis cinereis.
Psittacus amazonicus gutture caeruleo. Briss. av. 4. p. 266.

n. 33. t. 25. f. I.

Crick à face bleue. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 227.*

Perroquet de la Havane. *Buff. pl. enlum. n. 360.*

Blue-fronted Parrot. *Lath. syn. I. I. p. 291. n. 95.*

Habitat Havanae, 12 pollices longus.

Pennae supra apice nigro, subtus caerulecentes; remiges maiores nigrae; pedes grisei.

paradisi. 34. *Ps. luteus, gula, ventre, rectricumque basi rubris.*

Psittacus luteus insulae Cubae. Briss. av. 4. p. 308. n. 48.

Papagai de Paradis. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 237.*

Perroquet de Cuba. *Buff. pl. enlum. n. 336.*

Cuba Parrot. *Brown. jam. p. 473.*

Parrot of Paradise of Cuba. *Catesb. carol. I. t. 10.*

Paradis Parrot. *Lath. syn. I. I. p. 300. n. 105.*

Habitat in Cuba, 12 $\frac{1}{2}$ pollices circiter longus.

Rostrum, pedes nudaque orbitae alba; irides rubrae; remiges majores albae; rectrices 2 intermediae totae, reliquae extrema tertia parte flavae, ceterum rubrae.

aurora. 50. *Ps. flavus, axillis, alarum marginibus, remigibusque majoribus extrorsum in medio rubris. Mant. 1771. p. 524.*

Psittacus luteus. Briss. av. 4. p. 306. n. 47.

Perroquet jaune. *Salern. orn. p. 69. n. 9. t. 7. f. 2. Buff. pl. enlum. n. 13.*

Amazone jaune. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 214. t. 10.*

Aurora-Parrot. *Lath. syn. I. I. p. 301. n. 106.*

Habitat in Brasilia, aestivo aequalis, 12 pollices longus.

Rostrum, cera, pedes et unguis alba; palpebrae et irides rubrae; cauda rotundata; rectrices 4 extimae a basi ad medium intus rubrae.

passeri- 47. *Ps. luteo-virens, macula alarum alisque subtus caeruleis.*

Mus. Ad. Frid. I. p. 14. 2. p. 16.

Psittacula brasiliensis. Briss. av. 4. p. 384. n. 81.

Tuiete.

Tuiete. Raj. av. p. 34. n. 6. Will. orn. p. 116. c. 14. n. 6.

Eté ou Toui-été. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 283.

Least green and blue Parrakeet. Edw. glean. t. 235.

Short tailed yellowish green Parroquet. Bancr. Gujan.

p. 162.

Little blue and green Parrakeet. Latham syn. I. I. p. 319.

n. 127.

Habitat in Brasilia et Guiana, passeris magnitudine, 4 pollices longus.

Rostrum, cera, orbitae, pedes et unguis aurantia; remiges subtus, et tectrices alarum primariae caeruleae.

cyanoly. 118. Ps. luteo-virens, collari caeruleo, uropygio rubro. Molin. hist. nat. Chil. p. 227.

feos. Habitat in regno Chilensi, columba paulo major, segetibus valde infesta, in abyssis praecipitibus nidificans, et ova plerumque bina alba, columbinis aequalia ponens, docilis et mansuetus; caro esculenta, junioris sapidissima.

48. fordidus. 40. Ps. subfuscus, gula caerulea, alis caudaque viridibus, rostro crisoque rubris.

Psittacus novae Hispaniae. Briff. av. 4. p. 303. n. 45.

Papagai brun. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 246.

Dusky Parrot. Edw. av. 4. t. 167. Lath. syn. I. I. p. 304.

n. 110.

Habitat in nova Hispania, collari magnitudine.

Cera nigricans; orbitae nudae, pallide cinereae; irides badiæ; tempora, occiput, uropygium, et cauda supra viscentia; tectrices caudae inferiores rubrae; pedes plumbei; unguis nigri.

domini- 119. Ps. viridis, frontis fascia rubra, cervicis dorsique lunulis cencis. nigris, remigibus caeruleis.

Papagai à bandeau rouge. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 241.

Perroquet de S. Domingue. Buff. pl. entom. n. 792.

Red banded Parrot. Lath. syn. I. I. p. 300. n. 104.

Habitat in insula S. Dominici, 9 $\frac{1}{2}$ pollices longus.

Rostrum pallide incarnatum; pedes cinerei.

erythro- 120. Ps. viridis, orbitis nigricantibus, dorso medio nigro, in- pterus. feriore parte caerulea, tectricibus alarum rubris.

Crimson winged Parrot. Lath. syn. I. I. p. 299. n. 103.

Longitudo 10 pollicum; rostrum rubrum; cera et pedes sor- dida; cauda paulo longior.

festivus. 35. *Ps. viridis*, fronte purpurascente, superciliis gulaque caeruleis, dorso sanguineo.

Tavoua. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 240.*

Perroquet tahué de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 840.*

Festive Parrot. *Lath. syn. I. I. p. 298. n. 102.*

Habitat in Guiana, agilissimus, sed ferox et ingratus, columbae magnitudine, 11 pollices longus.

Rostrum plumbeum, apice nigro; cera ex griseo nigra; irides croceae; pedes cinerei; unguis nigri.

robustus. 121. *Ps. viridis*, capite cinerascente, alarum teetricibus fodi-
de nigris margine viridibus, remigibus rectricibusque fus-
cis, alarum macula rubra.

Robust Parrot. *Lath. syn. I. I. p. 296. n. 100.*

*Magnitudo columbae; longitudo 12 pollicum; rostrum ma-
gnum, album; capistrum supra nigricans; verticis pennae
per medium fardide striatae; pedes fardidi.*

magnus. 122. *Ps. viridis*, remigibus majoribus caeruleis, minoribus
subtus rubris.

Grand Perroquet vert de la nouvelle Guinée. *Sonner. it.
p. 74. t. 108.*

New-Guinea Green Parrot. *Lath. syn. I. I. p. 296. n. 99.*

Habitat in nova Guinea, aestivi magnitudine.

*Mandibula superior colore auripigmenti; inferior nigra;
irides flammeae; Vireo graminea.*

Taraba. 123. *Ps. viridis*, capite, gula, jugulo, pectori et teetricibus
alarum minoribus rubris.

*Psittacus brasiliensis erythrocephalus. Briff. av. 4. p. 240.
n. 24.*

Tarabe. *Raj. av. p. 33. n. 5. Will. orn. p. 114. n. 9.*

Tarabé ou Amazone à tête rouge. *Buff. hist. nat. des ois. 6.
p. 211.*

Habitat in Brasilia.

Rostrum pedesque cinerea; unguis nigri.

brasiliensis. 36. *Ps. viridis*, facie rubra, temporibus caeruleis, orbitis ci-
nereis.

Psittacus brasiliensis, fronte rubra. Briff. av. 4. p. 254. n. 30.

Crick à tête bleue. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 232. var. 3.*

Brazilian green Parrot. *Edw. av. 4. t. 161. Bancr. Guj.
p. 160. Lath. syn. I. I. p. 294. n. 96. C.*

*Habitat in Brasilia, columbae magnitudine; an varietas au-
tumnalis?*

Color viridis flavo contaminatus; ruber infra flexuram alae
et in exteriore latere rectricum 2, 2; caeruleus in latere
exteriore remigum rectricumque primorum.

autumna- 37. Ps. viridis, fronte remigumque macula coccineis, vertice
lis, remigibusque primoribus caeruleis.

Psittacus americanus. Briss. av. 4. p. 293. n. 40.

Crick à tête bleue. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 232. var. 2.

Lesser green Parrot. Edw. av. 4. t. 164. Bancr. Guj. p. 160.

Autumnal Parrot. Lath. syn. I. I. p. 293. n. 96. B.

β. Psittacus fronte gulaque caeruleis.

Crick à tête bleue. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 230.

Blue faced green Parrot. Edw. glean. t. 230. Lath. syn.

I. I. p. 293. n. 96.

Blue headed Creature. Bancr. Gujan. p. 158.

γ. Psittacus capite ex rubro et albido vario.

Crick à tête bleue. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 231. var. 1.

Cocco. Fernand. hist. nov. Hisp. p. 38.

Habitat in Guiana.

Magnitudo columbae; oculorum regio caerulea; alarum te-
ctrices primores caeruleae basi rubrae; remiges posteriores
virides; rectrices supra virides, apice flavescentes, exti-
mo latere exteriore caeruleo; subtus flavae, basi rufef-
centes, medio macula viridi.

accipitri- 38. Ps. viridis, capite griseo, collo pectoreque subviolaceo va-
nus. remigibus rectricibusque apice caeruleis.

Psittacus varius indicus. Briss. av. 4. p. 300. n. 43.

Psittacus elegans. Clus. exot. 365. Raj. av. p. 32. n. 11.

Perroquet varié. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 117.

Hawk-headed Parrot. Edw. av. 4. t. 165. Lath. syn. I. I.
p. 266. n. 74.

β. Psittacus capitis pennis albis longis angustis nigro striatis.

Papagai maillé. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 239. t. 12.

Perroquet maillé. Buff. pl. enlum. n. 526.

Habitat in India, β. nunc in Guiana domesticus; irritatus
pennas capitis erigit.

Magnitudo columbae; longitudo $12\frac{1}{2}$ pollicum; rostrum cum
cera nigricans; orbitae nudae nigricantes; irides ex fla-
vo badiæ; pedes cum unguibus plumbei.

men- 39. Ps. viridis, capite caerulecente, crisco rubro. Scop. ann. I.
struus. p. 33.

Psittacus gujanensis cyanocephalus. Briss. av. 4. p. 247. n. 28.

Papagai à tête et gorge bleue. *Buff. hist. nat. des ois. 6.*

p. 243.

Perroquet à tête bleue de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 384.*

Blue-headed Parrot. *Edw. glean. t. 314. Lath. syn. I. I.*

p. 301. n. 107.

Habitat in Guiana, parum docilis, voce monedulae. D. Bierchen.

Corpus magnitudine turturis; caput collumque caerulescens pennis fuscis apice caeruleis; dorsum et alae virides; rectrices alarum ex flavescente virides; remiges virides, interiori margine fuscae; abdomen virens, pennarum apice caerulecente; rectrices virides apice caerulecentes, sed 1, 2, 3 interiore latere a basi ad medium sanguineae, exteriori latere totae caeruleae; crissum rubrum, apice pennarum ex flavescente caeruleo; rostrum corneum, mandibula superiore lateribus fulva; oculi nigri; orbitae ex caeruleo canescentes.

purpureus. 124. Ps. supra ex atro fuscus, subtus purpureus, vertice genisque nigris, orbitis caeruleis, torque fordide punctato, remigibus rectricibusque caeruleis.

Perroquet violet. *Barrer. Fr. équin. p. 144.*

Papagai violet. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 244.*

Perroquet varié de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 408.*

Little dusky Parrot. *Edw. glean. t. 315. Lath. syn. I. I.*
p. 302. n. 108.

Habitat in Surinamo, columbae domesticae magnitudine, parum docilis.

Rostrum Fordidum, macula ad utrumque latus aurantia; rectrices laterales latere interiore rubicundae, apice caeruleae; pedes Fordidi.

melanocephalus. 41. Ps. viridis subtus luteus, pileo nigro, pectore albo, orbitis incarnatis. *Muf. Ad. Frid. 2. p. 15.*

Psittacus mexicanus, pectore albo. *Briff. av. 4. p. 297. n. 42.*

Psittacus atricapillus. *I. Fr. Miller illustr. t. 4. A.*

Maïpouri. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 250.*

Petite perruche Maïpouri de Cayenne. *Buff. planch. enlum.*
n. 527.

White breasted Parrot. *Edw. av. 4. p. 169. Lath. syn. I. I.*
p. 305. n. 112.

Habitat in nova Hispania, Guiana et Caraccas in silvis, turritis magnitudine, indocilis, et nisi pullus vix cicurandus; volando parvis gregibus sibilans, crassior et brevior reliquis speciebus.

Rostrum

pilea

ludo
cian

coll

sen
lu

Rostrum et cera incarnata; genae flavae; cervix aurantia; remiges majores exteriore latere caeruleae, interiori et subtus nigrae, minorum primae virides, margine flavo, reliquae virides; cauda rotundata; pedes ex cinereo fuscis; unguis nigricans.

pileatus. 125. *Ps. viridis, capite nigro, orbitis albis, humerorum macula cyanea, caudae apice caeruleo.*

Caïca. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 253.*

Perruche à tête noire de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 744.*

Hooded Parrot. *Lath. syn. I. I. p. 306. n. 113.*

Habitat in Cayenna, 8½ pollices longus, reliquis speciebus crassior, migratorius.

Rostrum et pedes rubri; gula flavicans; rectrices 2 intermediae totae virides.

ludovi- 126. *Ps. thalassinus, capite fulvo, versus rostrum in ruborem cianus. vergente.*

Papagai à tête aurore. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 247. du Praz it. 2. p. 128.*

Orange-headed Parrot. *Lath. syn. I. I. p. 304. n. 111.*

Habitat in Louisiana, bromeliae, liriodendri seminibus vietans, magnis gregibus volans, ferus, valde sonorus; cicuratus parum, parumque docilis.

collarius. 42. *Ps. viridis, gula rubente.*

Psittacus minor, collo miniaceo. Raj. av. p. 181. n. 8.

Psittacus jamaicensis, gutture rubro. Briff. av. p. 241. n. 25.

Xaxabes. *Ovied. I. 4. c. 4.*

Sassebé. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 245.*

Common Parrot of Jamaica. *Sloan. jam. p. 297. n. 9.*

Red-throated Parrot. *Lath. syn. I. I. p. 303. n. 109.*

Habitat in Jamaica, columbae magnitudine.

Jugulum rubrum; remiges nigrae, margine viridi.

senega- 43. *Ps. viridis subtus luteus, capite cinereo, orbitis nigris nudis.*

Psittacula senegalensis. Briff. av. 4. p. 400. n. 92. t. 24. f. 2.

Perroquet à tête grise. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 123. pl. enlum. n. 288.*

Senegal Parrot. *Lath. syn. I. I. p. 307. n. 114.*

Habitat frequens ad Senegal fluvii littora arenosa, voce ingrata et acuta; quini senive volant, in arborum cacuminibus quiescentes.

Longitudo 8½ pollicum; rostrum cinereum; cera nigricans; irides flavae; remiges et alae spuriæ cinereæ, margine exte-

exteriore viridi; rectrices cinereae, margine et apice virides; pedes ex rubicundo cinerei.

Tuipara. 127. Ps. pallide viridis, frontis lunula rubra, alarum macula media flava.

Tuipara Tupinambis. *Raj. av. p. 35. n. 7. Will. orn. p. 117. Psittacula brasiliensis erythrocephalos. Briss. av. 4. p. 383. n. 82.*

Red-fronted Parrot. *Lath. syn. I. 1. p. 308. n. 115.*

Habitat in Brasilia, alaudae magnitudine.

Rostrum incarnatum; cauda brevissima; pedes et unguis grisei.

chrysopterous. 44. Ps. viridis, alis macula caerulea fulva, orbitis nudis albis.

Psittacula alis deauratis. Briss. av. app. p. 130. n. 97.

Perruche aux ailes d'or. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 170.

Golden-winged Parrakeet. Edw. glean. t. 293. f. 2. Lath. syn. I. 1. p. 309. n. 116.

Habitat in India, alauda vix major.

Rostrum album; remiges primores & margine exteriori caeruleae, interiori fuscae; reliquae supra aurantiae, subtus luteae.

pullarius. 45. Ps. viridis, fronte rubra, cauda fulva, fascia nigra, orbitis cinereis. *Mus. Ad. Fr. 2. p. 15. Scop. ann. I. p. 33. n. 34.*

Psittacus minimus. Clus. exot. 365.

Psittacus pusillus viridis aethiopicus Clusii. Raj. av. p. 31. n. 10.

Psittacus minor versicolor. Seb. mus. 2. p. 40. t. 40. f. 1.

Psittacula guineensis. Briss. av. 4. p. 387. n. 85.

Perruche à tête rouge, ou moineau de Guinée. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 165. t. 7.

Petite perruche mâle de Guinée. Buff. planch. enlum. n. 60.

Little red-headed Parrakeet, or Guinea Sparrow. Albin. av. 3. t. 15. Edw. glean. t. 237.

Red-headed Guinea-Parrakeet. Latham syn. I. 1. p. 309. n. 117.

Kleinster grüner Papagay mit rother Stirn und Kehle. Frisch. av. t. 54.

Habitat in Guinea frequens, in Aethiopia, India, et insula Java, morum alienorum, non perinde vocis dexterimus imitator, suae speciei amantissimus; alaudae magnitudine, 5 $\frac{1}{2}$ pollices longus.

Rostrum

*Rostrum rubrum; cera cinerea; irides caerulentes; gula rubra; uropygium caeruleum; rectrices 2 intermediae tao-
tae, reliquae apice virides; pedes et unguis grisei.*

indicus. 128. *Ps. viridis, orbitis pallide incarnatis, vertice rubro vel aurantio, uropygii parte postica rubra, remigibus intus, cauda subtus ex caeruleente viridibus.*

Psittacula indica. Briss. av. 4. p. 390. n. 86.

Smallest red and green Indian Parrot. Edw. av. I. t. 6.

Red and green Indian Parrot. Lath. syn. I. I. p. 311. n. 118.

Habitat in India, alaudae magnitudine.

*Rostrum aurantium; rectrices caudae superiores rubrae; pe-
des et unguis incarnati.*

galgulus. 46. *Ps. viridis, uropygio pectoreque coccineis, vertice (maris) caeruleo. Amoen. ac. 4. p. 236. Mus. Ad. Frid. 16.
Osb. it. 101.*

Avicula cechini. Aldr. orn. l. 20. p. 560.

Psittacula malaccensis. Briss. av. 4. p. 386. n. 84?

Perruche à tête bleue. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 163.

Petite perruche de Pérou. Buff. pl. enlum. n. 190. f. 2.

*Petite perruche de l'isle de Luçon. Sonner. it. p. 76. t. 33.
fig. inf.*

*Sapphire-crowned Parrakeet. Edw. glean. t. 293. f. 2. Lath.
syn. I. I. p. 312. n. 119. A.*

β. Psittacula Philippensis. Briss. av. 4. p. 392. n. 87. t. 30. f. 1.

Perruche des Philippines. Buff. pl. enlum. n. 520. f. 1. 2.

Coulacissi. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 169.

Philippine Parrakeet. Lath. syn. I. I. p. 311. n. 119.

*Habitat in insulis Philippinis, forsan etiam aliis oceani in-
dici, 5 modo pollices longus, et adhuc minor. Pede al-
tero suspensus dormit; cocos succo recenti se delectans.*

*Remiges subtus caeruleae, excepto margine exteriore; rectri-
ces subtus caerulentes; jugulum sanguineum, qui ta-
men color, prouti caeruleus verticis, in femina deest.*

*β. Rostrum rubrum; caput ex flavo viride; occipitis fascia
transversa aurantia; rectrices caudae rubrae; remiges
nigricantes margine profunde viridi; cauda rotundata;
pedes et unguis rubri.*

Anaca. 129. *Ps. viridis, subtus ex rufo fusca, vertice badio, dorsi ma-
cula caudaque pallide fusca, alarum margine rubro.*

Psittacula brasiliensis fusca. Briss. av. 4. p. 403. n. 93.

*Anaca Brasiliensis. Raj. av. p. 35. n. 8. Will. orn. p. 117.
c. 4. n. 8.*

Anaca.

Anaca. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 260.*

Chestnut-crowned Parrakeet. *Lath. syn. I. I. p. 314. n. 120.*

Habitat in Brasilia et Guiana, alaudae magnitudine.

*Rostrum et orbitae fusca; tectrices caudae inferiores ex rufa
fusca; remiges majores apice thalassinae; pedes et unguis
nigricantes.*

purpura- 130. *Pf. viridis, vertice et cervice cinereis, uropygio alarum
tus. margine spuriarumque apice caeruleis, cauda purpurea
nigro-marginata.*

Purple tailed Parrakeet. *Lath. syn. I. I. p. 315. n. 121.*

Habitat in Cayenna, 8 pollices longus.

*Rostrum flavescens; dorsi pars inferior caerulea; humeri fusi-
ci; cauda vix rotundata; tectrices caudae praelongae;
rectrices 2 intermediae virides, nigro-punctatae; pedes
cinerei; unguis flavidus.*

canus. 131. *Pf. viridis, capite, gula, juguloque ex viridi griseis, cau-
dae rotundatae fascia lata nigra.*

*Psittacula madagascariensis. Briff. av. 4. p. 394. n. 88. t. 30.
f. 2.*

Perruche à tête grise. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 171.*

Petite perruche de Madagascar. *Buff. pl. enlum. n. 791. f. 2.*

Grey-headed Parrakeet. *Lath. syn. I. I. p. 315. n. 122.*

*Habitat in insulis Madagascar et S. Mauritii, 5 $\frac{3}{4}$ pollices
longus.*

*Rostrum griseum; pedes et unguis cani; feminae caput vi-
ride.*

melano- 132. *Pf. pallide viridis, dorso, tectricibus alarum, caudae fal-
pterus. cia remigibusque primariis nigris, secundariis flavescen-
tibus caeruleo-punctatis.*

Perruche aux ailes variées. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 172.*

Petite perruche de Batavia. *Buff. pl. enlum. n. 791. f. 1.*

Petite perruche de l'isle de Luçon. *Sonner. it. p. 78. t. 41.*

Black-winged Parrakeet. *Brown illustr. t. 8. Latham syn.
I. I. p. 316. n. 123.*

Habitat in Java et Luzonia, 6 pollices longus.

*Rostrum et pedes sordidi; color subtus in caerulecentem
vergens; caudae pars superior purpurascens; rectrices 2
intermediae unicolores; tectrices caudae inferiores rectri-
cibus aequales.*

capen- 133. *Pf. viridis, remigibus nonnullis caeruleis, rostro pedibus-
sis. que rubentibus.*

Perru-

Perruche aux ailes bleues. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 173.*
Petite perruche au cap de bonne esperance. *Buff. pl. enlum. n. 455. f. 1.*

Blue-winged Parrakeet. *Lath. syn. I. I. p. 317. n. 124.*
Habitat in capite bonaë spei.

torqua-
tus. 134. *Ps. viridis, occipitis fascia flava transversim nigro striata.*
Petite perruche à collier de l'isle de Luçon. *Sonner. it. p. 77.*

t. 39.

Perruche à collier. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 173.*

Collared Parrakeet. *Lath. syn. I. I. p. 317. n. 125.*

Habitat in insulis Philippinis, loqui nescius.

Rostrum, irides et pedes ex nigricante grisea. Feminae oc-
ciput cyaneum, striis transversis nigris.

minor. 135. *Ps. viridis, vertice coccineo, pectore caeruleo, remigi-*
bus majoribus nigris.

Perruche à ailes noires. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 174.*

Petites perruches de l'isle de Luçon. *Sonner. it. p. 77. t. 4.*

Luzonian Parrakeet. *Lath. syn. I. I. p. 318. n. 126.*

Habitat in insula Luzonia; pede altero suspensus dormit,
succum recentem ex coco promanantem liguriens.

Rostrum, irides et pedes flava; abdominis color in flavican-
tem vergens; tectrices caudae superiores rubrae; feminae
capitulum et pectus rubrum; cervix macula flava.

Tovi. 136. *Ps. viridis, juguli macula pallide aurantia, alarum fascia*
lata castanea cum splendore aureo viridi.

Psittacula gutture luteo. Briff. av. 4. p. 396. n. 89. t. 30. f. 3.

Tovi à gorge jaune. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 280.*

Petite perruche à gorge jaune d'Amerique. *Buff. pl. enlum. n. 190. f. 1.*

Magnitudo alaudae cristatae; longitudo 6 $\frac{3}{4}$ pollicum; pedes
grisei.

Tirica. 137. *Ps. viridis, rostro incarnato, pedibus et unguibus caeru-*
lescentibus.

Psittacula brasiliensis. Briff. av. 4. p. 382. n. 81.

Tui-Tirica. *Raj. av. p. 34. n. 3. Will. orn. p. 116. t. 4.*
f. 4. n. 3.

Tirica. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 281.*

Petite Jaseufe. *Buff. pl. enlum. n. 837.*

Green Parrakeet. *Brown. jam. p. 473. Latham syn. I. I.*
p. 320. n. 129.

138. *Ps.*

Sofove. 138. Ps. viridis, alarum et tectricum caudae macula dilute flava.
 Sofové. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 280.
 Petite perruche de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 456. f. 2.
 Cayenne Parrakeet. Lath. syn. I. 1. p. 320. n. 130.
Habitat in Guiana, facile cicurandus, et eximie garrulus.
Rostrum et pedes grisea.

Tui. 139. Ps. viridis, fronte aurantia, orbitis flavis.
 Psittacula brasiliensis icterocephalos. Briss. av. 4. p. 398. n. 90.
 Tui species 4. Raj. av. p. 34.
 Tovi à tête d'or. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 284.
 Petite perruche de l'isle de S. Thomas. Buff. planch. enlum. n. 456. f. 1.
 Tui of the Brasiliens, 4th species. Will. orn. p. 116. f. 4.
 Gold-headed Parrakeet. Lath. syn. I. 1. p. 321. n. 131.
Habitat in Brasilia, surni magnitudine.
Rostrum nigrum; oculi magni et nigricantes.

erythro- chlorus. 140. Ps. viridis, capite cristato, alis caudaque rubris.
 Psittacula cristata. Briss. av. 4. p. 404. n. 94.
 Psittacus erythrocchoros cristatus Aldrovandi. Raj. av. p. 34. n. 4.
 Crested red and green Parrot of Aldrovandus. Will. ornith. p. 116. f. 3.
 Crested red and green Parrakeet. Latham syn. I. 1. p. 321. n. 132.
Irides rubrae; crista pro arbitrio mobilis, pennis sex conflans, tribus majoribus.

mexica- nus. 141. Ps. viridis, fronte cristata, tectricibus alarum et cauda purpureis, orbitis caeruleis, gula flava, cervice rubra.
 Psittacula mexicana cristata. Briss. av. 4. p. 405. n. 95.
 Avis de cocho, psittaci species mexicana vario colore. Seb. mis. I. p. 94. t. 39. f. 2.
 Crested mexican Parrakeet. Lath. syn. I. 1. p. 322. n. 133.
Habitat in nova Hispania, 7 pollices longus.
Rostrum flavum; remigum margo albus; pedes et unguis cinerei.

46. RAMPHASTOS. *Rostrum maximum, inane, convexum, extrorsum ferratum: mandibula utraque apice incurva.*

Nares pone rostri basin, longae, angustae.

Lingua pennacea.

Pedes scansorii (plerisque).

viridis. 1. *R. viridis abdomine flavo, uropygio rubro.*

Tucana cayennensis viridis. Briss. av. 4. p. 423. n. 8. t. 33.

f. 2.

Toucan verd de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 727. 728.

Green Toucan. Lath. syn. I. I. p. 331. n. 9.

Habitat in Cayenna, 14 pollices longus.

Mandibularum dentes albi; inferior nigra, basi et circa narres rubra; superior supra flava, ad latera rubra, linea media nigra; orbitae nudae iridesque flavae; pedes plumbei; unguis nigri; cauda cuneata, subtus in cinereum vergens; caput, gula et jugulum mari nigra, feminae badius, fascia nigra angusta transversa terminata.

pavoninus. 9. *R. viridis, pennis rubris et pavoninis hinc inde interspersis.*

Tucana mexicana viridis. Briss. av. 4. p. 423. n. 7.

Xochitenacatl. Fern. hist. n. Hisp. p. 51. c. 187.

Hochicat. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 125.

Pavonine Toucan. Lath. syn. I. I. p. 331. n. 8.

Habitat in novae Hispaniae calidioribus maritimis, piscibus viettare fertur, dicolori magnitudine.

Rostrum ex flavo et nigro varium; pedes et unguis nigri.

piperivorus. 2. *R. viridis, antice niger, crasso femoribusque rubris.*

Tucana cayennensis torquata. Briss. av. 4. p. 429. n. 10.

t. 32. f. 2.

Koulik. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 128.

Toucan

Genus hoc in sola America australi intra tropicos obvium, frigoris impatiens, fructibus praeferit palmarum vicitat, facile cicuratur; in patria parvis gregibus, numero octono vel denario volitat, in arborum cavis a picis relictis nidificat, bina ova ponens, numerosum.

Toucan à collier de Cayenne, et Toucan à ventre gris de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 577. et 729.*

Green Toucan. *Edw. glean. t. 330.*

Piperine Toucan. *Lath. syn. I. I. p. 334. n. II.*

Habitat in Cayenna, 13 pollices longus.

Rostrum nigrum, basi rubrum; orbitae incarnatae aut cærulentes; tempora macula aurantia; cervicis lunula aurantia; remiges fuscae, margine viridi; cauda cuneiformis, subtus fusca, apice badia; testrices caudae inferiores rubrae; pedes plumbei; unguis nigri. Femina subtus grisea, cervice fusca.

Aracari. 3. *R. viridis, fascia abdominali, crasso uropygioque rubris, abdomine flavo.*

Ramphastos rostro nigro, mandibula superiore lateribus alba, basi triloba. Syst. nat. I. p. 104.

Tucana brasiliensis viridis. Briss. av. 4. p. 426. n. 9. t. 33. f. 2.

Aracari. *Maregr. bras. 217. Raj. av. p. 44. n. 2. Will. orn. p. 140. t. 22. Lath. syn. I. I. p. 332. n. 10.*

Grigri. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 126.*

Toucan verd du Brésil. *Buff. pl. enlum. n. 166.*

Habitat in Brasilia, Surinamo, Cayenna, ultra 16 pollices longus.

Rostrum mandibula superior dorso et apice nigra, lateribus albicans, basi triloba ad nares, arcu albo ad radicem; inferior nigra. Caput, alae et cauda nigra; pectus et abdomen flava coccineaque, cum macula nigra subrotunda in medio pectore, similisque macula transversalis ad initium ventris. Uropygium coccineum; femora rufa. Jacquin.

torqua- 10. *R. supra niger, subtus albicans, abdomine viridi, postice tus. rubro, torque rubro.*

Tucana mexicana torquata. Briss. av. 4. p. 421. n. 6.

Cochiténacatl. Fern. hist. nov. Hisp. p. 46. c. I. 60.

Cochicat. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 124.

Collared Toucan. Lath. syn. I. I. p. 330. n. 7.

Habitat in novae Hispaniae maritimis, 18 pollices longus; piscibus vicitare fertur.

Rostrum mandibula superior albicans, inferior nigra; irides ex rubicundo flavae; caput collumque nigra; testrices caudae inferiores rubrae; femora purpurea; pedes ex vivente cinerei; unguis nigri.

- piscivo- 4. R. nigricans, fascia abdominali crissoque rubris, uropygio
rus. albo.
Tucana brasiliensis gutture albo. *Briff. av. 4. p. 413. n. 3.*
Picus americanus. Hern. mex. 697.
Xochitenacatl tertia. Raj. av. p. 178. n. 6.
Toucan à gorge blanche de Cayenne, appellée Tocan. *Buff. pl. enlum. 262.*
Toucan or brasiliian Pye. *Edw. av. 2. t. 64. Bancr. Guj. p. 163.*
Brazilian Toucan. *Lath. syn. I. 1. p. 327. n. 4.*
Habitat in America australi, 21 pollices longus.
Rostrum luteum, apicis macula coccinea, mandibula inferior caerulea; pedes caerulei; nigra pileus, dorsum, alae, cauda, venter, femora; albida tempora, gula, pectus, uropygium; rubra fascia pectoralis et crissum.
- erythro- II. R. nigricans, genis, gula, et jugulo albis, testicibus caudae superioribus sulphureis, inferioribus et pectoris lunula rubris.
rhynchos. Tucana cayennensis gutture albo. *Briff. av. 4. p. 416. n. 4. t. 31. f. 2.*
Red-beaked Toucan. *Edw. glean. t. 238. Lath. syn. I. 1. p. 328. n. 5.*
Habitat in America australi, praecedentis magnitudine.
Rostrum basi dorsoque flavum, mandibulae superioris apice inferiorisque fundo rubris, naribus nigro-marginatis; orbitae caerulecentes; pedes plumbei; unguis nigri.
- Tucanus. 5. R. nigricans, fascia abdominali, crisso uropygioque flavis. Ramphastos rostro rubro, carina obtusa albida. *Syst. nat. I. p. 103.*
Tucana. *Marcgr. bras. 217.*
Tucana brasiliensis gutture luteo. *Briff. av. 4. p. 419. n. 5. t. 32. f. 1.*
Toucan surinamensis niger ex albo, flavo, rubro mixtus. *Pet. gaz. t. 44. f. 13.*
Toucan à gorge jaune du Brésil. *Buff. pl. enlum. n. 307.*
Yellow-breasted Tucan. *Edw. glean. t. 329. Latham syn. I. 1. p. 326. n. 3.*
Habitat in America australi, 19 pollices longus.
Genae, gula et cervix aurantiae; fascia abdominalis et crissum in rubrum colorem vergunt; uropygium sulphureum; rostrum nigrum, basi griseum; pedes et unguis plumbei.

picatus. 6. R. nigricans, pectore luteo, crisco recticunque apicibus rubris, uropygio nigro.

Ramphastos rostro rubro apice nigro, carina compressa. *Syst. nat.* I. p. 103.

Tucana. *Briss. av.* 4. p. 408. n. 1.
Pica brasiliensis. *Gesn. av.* 800. *Aldr. orn.* I. p. 801. *Raj.*

av. p. 44. n. 1.

Brasilian Pyg or Toucan. *Albin. av.* 2. t. 25. *Will. orn.* p. 128. t. 20.

Toucan à ventre rouge. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 122.

Preacher Toucan. *Lath. syn.* I. I. p. 329. n. 6.

Habitat in Guiana et Brasilia, 8½ pollicibus pedem longitudine excedens.

Rostrum ex flavicanti viride, apice rubicundum; abdomen rubrum; cauda apice rubro-punctata.

dicolos. 7. R. nigricans, pectore, abdomine, crisco uropygioque rubris, gula lutea.

Tucana cayennensis, gutture luteo. *Briss. av.* 4. p. 411. n. 2. t. 31. f. I.

Toucan à gorge jaune. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 118.

Toucan à gorge jaune de Cayenne. *Buff. pl. enlum.* n. 269. Yellow-throated Toucan. *Lath. syn.* I. I. p. 325. n. 2.

Habitat in Cayenna, 17 pollices longus.

Rostrum olivaceum, basi nigrum, mandibularum margine rubro; genae sulphureae; jugulum aurantium, margine sulphureo.

Toco. 12. R. nigricans, gula, jugulo et uropygio albis, orbitis, pectoris circulo criscoque rubris.

Toucan de Cayenne, appellé Toco. *Buff. pl. enlum.* n. 82.

Toco. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 117. *Lath. syn.* I. I. p. 325. n. I. t. 9.

Habitat in Cayenna, 9-10 polices longus.

Rostrum ex rubicundo flavum basi nigrum, mandibulae superioris apice nigro.

luteus. 13. R. ex flavicante albus, striis colli lateralibus duabus nigris, cauda et alis ex albo et nigro variis, tectricibus alarum minoribus flavis.

Tucana lutea. *Briss. av.* 4. p. 432. n. II.

Alia Xochitenacatl. *Nieremb. hist. nat.* p. 207. *Johnst. av.* p. 119.

Aracari à bec noir. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 130.

An

An other sort of Xochitenacatl, Toucan or Brasilian Pye.

Will. orn. p. 386.

Blackbilled Toucan. *Lath. syn. I. I. p. 335. n. 12.*

Habitat in nova Hispania, columbae magnitudine.

Rostrum nigrum; irides flavae; pedes fusi; unguis flavi-
cantes.

caeruleus. 14. R. caeruleus, cinereo admisto.

Tucana caerulea. *Briss. av. 4. p. 433. n. 12.*

Xochitenacatl. *Nieremb. hist. nat. p. 209. Fern. hist. p. 47.*

c. 146. Johnst. av. p. 126. 157. t. 56.

Blue Toucan. *Lath. syn. I. I. p. 335. n. 13.*

Habitat in novae Hispaniae maritimis, columbae magnitu-
dine.

Rostrum corpore ipso longius; oculi nigri; irides fulvae.

dubius. 15. R. gula caerulea.

Blue throated Toucan. *Lath. syn. I. I. p. 336. n. 14.*

albus. 16. R. totus albus.

White Toucan. *Lath. syn. I. I. p. 336. n. 15.*

Momota. 8. R. pedibus gressoriis.

Momot. *Will. orn. p. 386. t. 24. Raj. av. p. 164. Briss.*
av. 4. p. 465. t. 35. f. 3.

Guira Guainumbi. *Marcgr. bras. 193. Raj. av. p. 49. n. 4.*

Houtou ou Momot. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 430. t. 20.*

Momot du Brésil. *Buff. pl. enlum. n. 370.*

Brazilian sawbilled Roller. *Edw. glean. t. 328.*

Brazilian Motmot. *Lath. syn. I. I. p. 338. n. 1. t. 10.*

β. Momotus varius. *Briss. av. 4. p. 469. n. 2.*

Yayaquitotl. *Raj. av. p. 167. n. 19.*

Yayaquitotl or longtailed Bird. *Will. orn. p. 386.*

Variegated Motmot. *Lath. syn. I. I. p. 340. n. 1. A.*

Habitat in Americae australis densis silvis, solitarius, in
terra, aut fovea a Dasypode relicta nidum struens ex gra-
mine secco, et bina ova ponens; vicitans insectis, et car-
ne cruda, cuius frustula in aqua macerat, rostro prehen-
sa violentis iecibus verberat. Vox rauca, tremula, debi-
lis. Jacquin.

Corpus magnitudine merulæ sesquipedale, splendide oliva-

ceum, subtus ferrugineum, in β. ex viridi, fulvo, cae-

ruleo, et cinereo mixtum. Caput majuscum vertice cae-

ruleo medio nigro; mystaces ad angulos oris longiores mo-

biles; remiges caeruleæ; cauda cuneiformis, $11\frac{1}{2}$ pollices

longa, tectricibus 2 intermediis longioribus in medio non-nunquam nudis; rostrum mediocre, vix 2 pollices longum, atrum; pedes nigri, digito uno postico; unguis aduncus. Differt a praecedentibus rostro minore, pedibusque non scandens; an ideo generis distincti? Vtare videntur lingua pennacea, rostrique ferrae.

47. BUCEROS. *Rostrum convexum, curvatum, cultratum, magnum, extrorsum serratum: Frontis calvaria nuda, osseo-gibbosa.*

Nares pone rostri basin.

Lingua acuta, brevis.

Pedes gressorii.

bicornis. **I.** B. fronte ossea plana antrorum bicorni. *Antoen. acad. 4. p. 237.*

Hydrocorax philippensis. Briss. av. 4. p. 568. n. 2.

Rhinoceros avis prima varietas. Will. orn. t. 17. f. 1.

Calao. *Pet. gaz. 43. t. 28. f. 6. et t. 31. f. 1. Edw. av. 2. p. 151. t. 281. f. D.*

Philippine Hornbill. Lath. syn. I. I. p. 345. n. 3.

β. *Calao vel Cayao. Att. angl. vol. 23. p. 1394.*

Habitat in insulis Philippinis magnitudine gallinae niger, subtus albus; remigum macula alba; cauda longiuscula nigra; rectrices 10, extimae 4 utrinque albæ; pedes viventes.

β. *rostro cinnabarino, abdomine nigro, dorso et uropygio ex fusco cinereis, voce porci aut vituli, Indis adoratus, fructibus vivitat, quos integros deglutit, et exterioribus partibus concoctis, nucleos illæcos eructat.*

abyssini- **5.** B. niger, fronte ossea prominentia antrorum semicirculari, cus. orbitis, gula jugulique parte nudis ex violaceo fuscis, remigibus majoribus albis.

Calao d'Abyssinie. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 155.

Grand Calao d'Abyssinie. Buff. pl. enlum. n. 779.

Abyssinian Hornbill. Lath. syn. I. I. p. 347. n. 4.

Habi-

Aves hujus generis in antiquo orbe easdem regiones occupant, quam superioris in America, viëtu quoque, uti quidem videtur, iis similes.

Habitat in Abyssinia, corvo similis, duobus pollicibus pedes tres longitudine superans. Rostrum 9 pollicum.

africanus. 6. *B. niger, rostro unicorni, cornu rectiusculo acuminato.*

Hydrocorax africanus. Briss. av. 4. p. 570. n. 3.

Rhinoceros avis secunda varietas. Will. orn. t. 17. Mus.

Besler. t. 9. n. 7.

Brac ou Calao d'Afrique. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 154.

Trompette de Brac ou oiseau trompette. Labat Afr. occid. 4.

p. 160. 161.

African Hornbill. Lath. syn. I. 1. p. 348. n. 5.

Habitat in Africa, gallopavonis magnitudine.

Rostrum partim rubrum, partim flavum, margine mandibularum nigro.

malaba. 7. *B. niger subtus albus, prominentia frontis supra rotundata frontem versus acuta, pone oculos protensa.*

ricus. Beaks of curious Birds. Edw. glean. t. 281. f. D.

Calao de Malabar. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 149. t. 8.

pl. enlum. n. 873?

Pied Hornbill. Lath. syn. I. 1. p. 349. n. 6. t. 11.

Habitat in India, 2 pedes et 6 polices ad 3 pedes usque longus, picae ad instar ambulans, laetucam, carnem crudam, nuces, aviculas devorans.

Rostri mandibula utraque deorsum incurvata, apice acuta; prominentia superioris $4\frac{1}{2}$ pollices longa, plurimam partem nigra, medio et prominentiae et rostri sordide ex flavicanti albo; crissum, remiges, rectricesque exteriores apice alba.

Hydrocorax. 2. *B. fronte ossea plana antrorsum mutica, abdomine fulvo.*

Hydrocorax. Briss. av. 4. p. 556. n. 1. t. 45.

Corvi marini genus. Clus. exot. 106.

Corvus indicus. Bont. jav. 62. Will. orn. 86. t. 17. Raj.

av. p. 40. n. 7.

Corbeau indien. Salern. ornith. p. 91. n. 8. t. 9. f. 3.

Calao des Moluques. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 41. 7.

p. 147. pl. enlum. n. 283.

Bontius's Indian Raven. Will. orn. p. 126. n. 7.

Indian Hornbill. Lath. syn. I. 1. p. 351. n. 7.

Habitat in Moluccis; frequenter cicuratus et occidens muribus et ratis adhibitus; silvestris nuce myristica vescitur; hinc caro deliciosa aromatica.

Longitudo 2 pedum et 4 pollicum. Prominentia rostri cinerea, posterius albicans; vertex nigricans; genae et gula nigrae;

nigrae; haec arcu sordide griseo terminata; occiput et
cervix pallide castanea; dorsum, humeri, uropygium,
pectoralis alarum caudaeque fusca; pectus et abdomen ni-
gricantia, hoc postice flavicans; cauda ex cinereo sordide
alba; pedes ex griseo fuscii; unguis nigri.

- Rhinoce- 3. B. cornu mandibulari frontis recurvato.
ros. Hydrocorax indicus. *Briff. av. 4. p. 571. n. 4.*
Rhinoceros. *Bont. jav. 63. t. 64. Olear. mus. t. 15. f. 4.*
Worm. mus. 293. Aldr. orn. I. p. 84. Besler. mus. t. 20.
Lath. syn. I. I. p. 342. n. 1.
Corvus indicus cornutus seu Rhinoceros avis Bontii. *Raj.*
av. p. 40. n. 8.
Horned Indian Raven or Rhinoceros-Bird. *Will. orn. p. 127.*
t. 17. Edw. glean. t. 281. f. B.
Calao Rhinoceros. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 161.*
Bec de l'oiseau Rhinoceros. *Buff. pl. enlum. 934.*
Habitat in India, insulisque oceani Indici, tripedalis, rassis,
muribus, carne, cadaveribus viettans, venatores conco-
mitans, exempta intestina ingurgitatura, gallopavonis fe-
re magnitudine.
Rostrum 10 pollices longum ex albicante flavum; mandibula
superior basi rubra, inferior nigra; cornu 8 pollices lon-
gum, ex albo et nigro varium; corpus nigrum, subtus
et postice sordide album; cauda 12 pollices longa; teetri-
ces inferiores albae et nigrae; rectrices basi et apice albae,
in medio nigrae; pedes et unguis obscure grisei.
- galcatus. 8. B. rostro rectiusculo, prominentia fere quadrata, posterius
rotundata, anterius plana.
Calao à casque rond. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 159. pl.*
enlum. n. 933.
Helmet Hornbill. *Lath. syn. I. I. p. 343. n. 2. Edw. glean.*
t. 281. f. C.
Rostrum 8 pollices longum, plurimam partem rubrum.
- panayen- 9. B. ex virescente niger, subtus ex rubro fuscus, prominen-
tia mandibulae superioris supra acuta, et ad latera plana.
Calao à bec ciselé de l'isle de Panay. *Sonner. it. p. 122.*
t. 82. 83.
Calao de l'isle de Panay. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 145.*
pl. enlum. n. 780. 781.
Panayan Hornbill. *Lath. syn. I. I. p. 353. n. 8.*
Habitat in insula Panay, coracis magnitudine.

Rostrum

Rostrum longissimum, arcuatum, fuscum, lateribus transversim rugosum, sulcis aurantiis; orbitae nudae fuscae; irides albidae, caput collumque feminae alba, macula magna triangulari ex virescenti nigra; rectrices 10, a basi ultra medium ex rufo lutea, apice nigra; pedes plumbei.

- manil- 10. B. supra ex nigricante fuscus, subtus sordide albus, rostro
lensi- non ferrato: prominentia exigua.

Calao de Manille. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 144. planch. enlum. n. 891.*

Manilla Hornbill. *Lath. syn. I. I. p. 354. n. 9.*

Habitat in insula Manilla.

Rostrum minus curvatum, apice magis acuto; caput collumque alba, fusco-undulata; temporum macula nigra; caudae fascia media rufa.

- nasutus. 4. E. fronte laevi, rectricibus basi apiceque albis.

Crotophaga. *Forskal Faun. arab. p. 2. n. 4.*

Hydrocorax senegalensis melanorhynchos. *Briff. av. 4. p. 573. n. 5. t. 46. f. 1.*

Tock. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 141.*

Calao à bec noir du Sénégal. *Buff. pl. enlum. n. 890.*

Blackbilled Hornbill. *Lath. syn. I. I. p. 355. n. 10.*

B. Hydrocorax senegalensis erythrorhynchos. *Briff. av. 4. p. 575. t. 46. f. 2.*

Calao à bec rouge de Senegal. *Buff. pl. enlum. n. 260.*

Habitat ad fluviū Senegal, et in aliis calidioribus antiqui orbis; fructibus viētitans, junior facile cicurandus, magnitudine picae.

Rostrum deorsum curvatum cum pedibus nigrum, adultiore rubrum; corpus supra sordide griseum, pennarum apice albido, subtus sordide album; genarum stria similiter sordide alba; rectrices 2 intermediae sordide griseae; reliquae 10 ad medium usque et apice albae, ceterum nigricantes; unguis nigri.

- albus. 11. B. niveus, rostro pedibusque nigris.

White Toucan. *Hawkesw. it. I. p. 123.*

White Hornbill. *Lath. syn. I. I. p. 357. n. 11.*

Captus inter insulas Tinian et Pulotimoen, anseris magnitudine.

Rostrum angustum, et pedem longum.

- obscu- 12. B. rostri prominentia supra rotundata septem- vel octoloba.
rus. Wreathed Hornbill. *Latb. syn. I. 1. p. 358. n. 12.*
Indian Raven. *Will. orn. t. 78.*
Rostrum 5 - 6 pollices longum, prominentia pollicem alta;
mandibularum margo non ferratus.

48. BUPHAGA. *Rostrum rectum subquadrangulare:*
mandibulis gibbis integris, extorsum gibbosioribus.
Pedes ambulatorii.

- africana. 1. Buphaga. *Briss. av. 2. p. 457. n. 1. t. 42. f. 2.*
Pic-boeuf. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 175. t. 14. planch.*
enlum. n. 293.
African Beef-eater. *Latb. syn. I. 1. p. 359. n. 1. t. 12.*
Habitat ad fluvium Senegal; dorso boum insidens extrahit
oestrorum larvas; alaudae cristatae magnitudine, 8½ pol-
lices longa.
Corpus supra ex griseo fuscum, subtus et uropygio flavicans;
rostrum nunc flavicans apice rubro, nunc nigrum, 10 li-
neas longum; cauda cuneiformis; rectrices 12 acutae, ex
griseo fuscae, lateralibus interius rufis; pedes et unguis
fusci.

49. CROTOPHAGA. *Rostrum compressum, semio-
vatum, arcuatum, dorsa-
to-carinatum: mandibula
superiore margine utrin-
que angulata.*

Nares perviae.

- Ani. 1. Cr. minor, pedibus scandentiis.
Crotaphagus. *Briss. av. 4. p. 177. t. 18. f. 2.*
Crotaphagus ater, rostro breviore compresso arcuato-cul-
trato. *Brown. jam. 474.*
Monedula tota nigra major garrula, mandibula superiore ar-
cuata. *Sloan. jam. 2. p. 298. t. 256. f. 1.*
Ani. Marcgr. bras. 193. *Will. orn. p. 120.* *Raj. av. p. 35.*
n. 10. et p. 185. n. 129.
Cacalototl. *Raj. av. p. 168. n. 27.*

Ani

Ani des savanes. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 420.*

Petit bout de petun. *Buff. pl. enlum. n. 102. f. 2.*

Razor-billed Blackbird. *Catesb. car. app. t. 3.*

Lesser Ani. *Lath. syn. I. I. p. 360. n. I. t. 13.*

Habitat in America australi, insulisque Americanam spectantibus gregaria; nidificant in eodem nido amplissimo saepe 50; singulae feminae sibi propinquae suis ovis, quae bis in anno pariunt, marini coloris, versus utrumque finem maculata, incubant, quae foliis tegunt. Vicitur frumentis, seminibus, vermis, insectis, potissimum gryllis, in primis vero acaris riciinis in bobus copiosissimis, ideoque accendentibus hinc boves se prosternere feruntur, ut ricos evallant, qui alias nimium multiplicarentur.

Longitudo $13\frac{1}{2}$ pollicum; corpus nigrum; cauda longa, cuneiformis, rectricibus 10 constans; mandibula superior apice incurvata; nares ovatae; lingua carnosa, integra; pedes nigri.

major. 3. Cr. major, pedibus scandoriis.

Crotophagus major. Briff. av. 4. p. 180. t. 18. f. 2.

Grand Bout de Petun. *Buff. pl. enlum. n. 102. f. 1.*

Ani des palétuviers. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 423. t. 19.*

Salern. orn. p. 73. n. 10.

Greater Ani. *Lath. syn. I. I. p. 362. n. 2.*

Habitat in Cayenna, facile circundata, et psittaci more docilis; 18 pollices longa, ceterum praecedenti similis.

ambula- 2. Cr. pedibus ambulatoriis.

toria. Walking Ani. *Lath. syn. I. I. p. 363. n. 3.*

Habitat in Surinamo, praecedenti, si pedes excipias, simillima; rectrices 10.

GLAUCOPIS. Rostrum incurvatum, fornicatum, mandibula inferiore breviore subtus ad basin carunculata.

Nares depressae, membrana subcartilaginea semitecta.

Lingua subcartilaginea apice incisa et ciliata.

Pedes ambulatorii.

cinerea. 1. Glaukopis.

Cinereous Wattle-bird. *Latham syn. I. I. p. 364. n. 1.*

f. 14.

Habi-

Habitat in nova Seelandia, picae magnitudine, 15 pollices longa; in terra ambulans, rarius arboribus insidens, bacis, insectis, aviculis quoque viicitans, sibilans et murmurans. Caro sapidissima. Forster.

Rostrum nigrum, prouti totum corpus una cum pedibus; canula primo caerulea, post aurantia; irides egregie caeruleae; cauda longa, cuneiformis, rectricibus 12 constans; pedes longi; unguis posterior reliquis longior.

50. CORVUS. Rostrum convexum, cultratum.

Nares pennis setaceis recumbentibus obtectae.

Lingua cartilaginea bifida.

Pedes ambulatorii.

hotten- 1. C. virescenti-ater, cauda aequali, mystacibus longissimis.
tottus. Monedula capitis bonae spei. Briss. av. 2. p. 33. n. 10. t. 2.
f. 2.

Choucas moustache. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 79.

Choucas du cap de bonne esperance. Buff. pl. enlum. n. 226.

Habitat ad caput bonae spei, 11 $\frac{1}{4}$ pollices longus.

Supra nares mystaces nigrae tres pollices longae, breviores et rigidæ in angulis oris; pennæ cervicis angustiores et longiores reliquis, laxæ, et quasi fluitantes.

Corax. 2. C. ater, dorso atro-caerulecente, cauda subrotundata.
Faun. groenl. p. 62. n. 38.

Corvus maximus. Scop. ann. I. p. 34. n. 45.

Corvus. Gesn. av. 334. Aldrov. orn. I. p. 684. t. 685.

Jonst. av. 38. t. 16. Raj. av. p. 39. n. 1. Briss. av. 2. p. 8. n. 1.

Corbeau. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 13. t. 2. pl. enlum. n. 495.

Raven. Arct. zool. 2. p. 245. n. 134. Brit. zool. I. p. 218.

n. 74. Alb. av. 2. p. 19. t. 20. Will. orn. p. 121. t. 18.

Lath. syn. I. I. p. 367. n. 1.

Rabe. Frisch. av. t. 63.

β. Corvus varius. Briss. av. 2. p. 12. n. 1. A.

Cacalotl. Fernand. hist. nov. Hisp. p. 48.

γ. Corvus albus. Briss. av. 2. p. 12. n. 1. B. Sckwenckf. av.

Silef. p. 245.

δ. Corvus feroensis ex albo et nigro mixtus. Brünnich ornith. bor. p. 8.

Habi-

Habitat in omni Europa, Sibiria, Camtschatea, America boreali ad novam usque Hispaniam, duos ut plurimum pedes duosque pollices longus, viicitat cadaveribus, aviculis vivis, agnis infirmis, famelicus adeo pellibus siccis et excrementis, ovis, piscibus, testaceis, baccis, feris, in regionibus potissimum magis borealibus, convivalis, furto deditus, clamitans, loqui addiscit; nidificat in altis arboribus aut rupibus; coit Martio, parit Aprili 5-6 ova, ex caerulecente viridia fusco-maculata, quibus mas interdiu, femina noctu incubat; longaevis, olfactu acerri- mo praeditus. Caro Groenlandis edulis, pellis in vestimentis adhibita, alae scopulis, remiges fijae pescatui.

Rostrum paulisper curvatum, dente utrinque exiguo.

clericus. 20. C. totus niger, mento albo, rostri basi cinerea. Sparrmann mus. Carlsson. t. 2.

Habitat in Suecia, rarissimus, an vere distincta a corace species?

*Color in maxima corporis parte fuliginosus; remigum et re-
ctricum supra in violaceum vergens.*

australis. 21. C. totus niger, menti pennis laxioribus, remigibus ex fu-
cescenti nigris.

South-sea Raven. Lath. syn. I. 1. p. 369. n. 2.

*Habitat in insulis amicis maris australis, 19 pollices longus.
Cauda 8 pollices longa.*

Corone. 3. C. atro-caerulescens totus, cauda rotundata, rectricibus acutis. Fn. suec. 86. Scop. ann. I. p. 35. n. 36.

*Cornix. Gesn. av. 320. t. 321. Aldr. orn. I. p. 734. t. 736.
Raj. av. p. 39. n. 2. Briss. av. 2. p. 12. n. 2.*

*Corneille. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 45. t. 3. pl. enlum.
n. 483.*

*Carrion Crow. Brit. zool. I. n. 75. t. 34. Arct. zool. 2.
p. 246. n. 135. Albin. av. 2. t. 21. Will. orn. p. 122.
t. 18. Lath. syn. I. 1. p. 370. n. 3.*

β . Cornix varia. Briss. av. 2. p. 15. n. 2. A.

Corvus varius. Brünn. orn. bor. p. 8. n. 8.

Bunte Krache, schekige Kraehe. Frisch. av. t. 66.

γ . Cornix alba. Briss. av. 2. p. 15. n. 2. B.

*Habitat in Europa, Sibiria, boreali America, insulis Phi-
lippinis, nova Guinea, nova Hollandia, nova Caledonia,
Madera, corace minor, 18 pollices longa; cadaveribus et
vivis adeo animalibus minoribus et debilioribus viicitans,
sed fructibus etiam, seminibusque, hinc segetibus aliquan-
do*

do infesta; in silvarum arboribus nidificat, et 5 - 6 ova parit, coracinis similia.

Tota ex atro caerulescens, coracis modo dorsum; femina minus splendida; fances, prouti etiam thoracis, nigræ; trachea propriis musculis instructa, subtus ad dichotomiam antice 4, postice 2.

frugilegus. 4. C. ater, fronte cinerascente, cauda subrotundata. Faun. suec. 87. It. oel. 67.

Cornix frugilega. Aldrov. orn. I. p. 751. t. 753. Raj. av. p. 39. n. A. 3. Briss. av. 2. p. 16. n. 3.

Freux ou Frayonne. Buff. hist. nat. des oif. 3. p. 55. planch. enlum. n. 484.

Rook. Brit. zool. I. n. 76. Arct. zool. 2. p. 250. n. A. Albin. av. 2. p. 21. t. 22. Will. orn. p. 123. t. 18. Lath. syn. I. I. p. 372. n. 4.

Schwarze Kraeh. Frisch. av. t. 64.

Habitat in Europa et occidentali Sibiria, magnis gregibus mane potissimum et vespere volitans; plures pernoctant in arbore, unde facile capiuntur, valde sonori; vermis, larvis, potissimum scarabaeorum, sed seminibus etiam vivit, hinc agris infesti; Martio jam nidificare incipiunt, ovaque pariunt cornicinis similia. Juniorum caro sapida. Nigredini intermixtus splendor purpureus; caudæ supra viridis; rostrum magis rectum, gracilis, debilius, quam praecedenti, $2\frac{1}{2}$ pollices longum, basi albicans, naribus nudatis.

Cornix. 5. C. cinerascents, capite, jugulo, alis caudaque nigris. Fn. suec. 88. Scop. ann. I. p. 35. n. 37.

Cornix cinerea. Briss. av. 2. p. 19. n. 4.

Cornix cinerea frugilega. Gesn. av. 332. Aldrov. orn. I. p. 754. t. 755. Raj. av. p. 39. n. A. 4.

Corneille mantelée. Buff. hist. nat. des oif. 3. p. 61. t. 4. pl. enlum. n. 76.

Roylton Crow. Albin. av. 2. p. 22. t. 23. Will. orn. p. 124. t. 77.

Hooded Crow. Brit. zool. I. n. 77. Arct. zool. 2. p. 251. n. B. Flor. scot. I. p. 20. t. 2. Lath. syn. I. I. p. 374. n. 5.

Nebel-

Plurimae corvi species in omni climate obviae, perquam sonoræ, in arboribus nidificant, et 6 ova pariunt; vietus plurimis ex animali et vegetabili mistus.

Nebelkraehe. Frisch. av. t. 65.

Graue Krau, Krauveitl. Kram. elench. p. 333.

Habitat in Europa et Asia, Alberto magno jam dicta, Octo-
bri ex subalpinis in planities descendens, gregaria, cada-
veribus, quisquiliis, vivis quoque animalibus minoribus, avi-
bus, testaceis, ranis, cochleis, insectis horumque larvis,
rarius baccis seminibusque visitans; in Suecia relegata,
at injuste, quum purget prata a larvis phalaenae calamiti-
tosae graminumque radicibus subjacentibus tipularum lar-
vis; ventis adversa confidet; lepide capitur cucullo papy-
raceo in nive.

Magnitudo frugilegi; longitudo 22 pollicum.

dauricus. 22. C. ater, vertice ex caeruleo atro, cervice, jugulo et ab-
domine albis. Pall. it. 3. p. 694. n. 8.

Corneille du Sénégal. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 67. pl.
enlum. n. 327.

Chinese black Raven with white neck. Osb. it. 1. p. 377.

White-breasted Crow. Fryer it. p. 21. Latham syn. I. 1.
p. 376. n. 6. t. 15.

β. Corvus totus niger, cervice juguloque fuscis.

Habitat in Sina, Mongolia, Persia, ad lacum Bajkal, flu-
viumque Lena, in insula Ivanna, et ad fluvium Senegal,
gregaria, monedulae facie et magnitudine, 12 pollices et
ultra longus; insectis fructibusque visitans.

Cauda et alae nitore virescente.

caledoni- 23. C. cinereus, rostro, palpebris, cauda pedibusque nigris.
cus. New caledonian Crow. Latham syn. I. 1. p. 377. n. 7.

Habitat in nova Caledonia, 15 circiter pollices longus.

Cauda 5 pollices, rostrum 14 lineas longum; irides flaves-
centes.

jamai- 24. C. totus niger.

cornix jamaicensis. Briss. av. 2. p. 22. n. 5.

Corneille de la Jamaique. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 67.

Chattering Crow or Cacao Walk. Raj. av. p. 181. Sloan.
jamaic. 2. p. 298. Lath. syn. I. 1. p. 377. n. 8.

Habitat in Jamaicæ montanis, perpetuo garrulus, baccis et
scarabaeis visitans, 18 pollices longus.

Monedu- 6. C. fuscus, occipite incano, fronte, alis caudaque nigris.

Ia. Fn. suec. 89. Scop. ann. I. p. 36. n. 38.

Graeculus f. monedula. Gesn. av. p. 520. t. 521.

Mone-

- Monedula f. Lopus. *Aldr. orn.* I. p. 770. t. 771. *Raj. av.*
p. 40. A. 5. Briss. av. 2. p. 24. n. 6. *Günther Nest. u.*
Eyer t. 11. f. inf.
- Choucas. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 69. *pl. enlum.* n. 523.
- Jackdaw. *Brit. zool.* I. n. 81. t. 34. *Arct. zool.* 2. p. 251. C.
Alb. av. I. t. 14. *Will. orn.* p. 125. t. 19. *Lath. syn.*
I. I. p. 378. t. 9.
- Dohle, graue Dohle. *Frisch. av.* t. 67. *Kram. clench.* p. 334.
- β. Monedula torquata. *Briss. av.* 2. p. 27. n. 6. A.
- Helvetian Daw. *Charlet. ex.* p. 75. n. 7. *onom.* p. 68. n. 7.
Johnst. av. t. 16.
- γ. Monedula candida. *Briss. av.* 2. p. 27. n. 6. B. *Schwenckf.*
av. Sil. p. 305. *Rzacz. aust. hist. Pol.* p. 396.
- δ. Monedula nigra. *Briss. av.* 2. p. 28. n. 7.
 Choucas noir. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 69. *pl. enlum.*
n. 522.
- Chough. *Charlet. ex. et onom.* p. 67. n. 3. *Sibbald Scot. ill.*
p. 2. l. 3. p. 15.
- Schwarze Dohle. *Frisch. av.* t. 68.
- ε. Monedula nigerrima, rostro pedibusque miniatis. *S. G.*
Gmelin it. 3. p. 365. t. 39.
- ζ. Monedula alis albis, rostro subcurvo.
- η. Monedula rostro forficato.
- θ. Monedula fulcescens, humeris albis.
Habitat in Europae, et occidentalis Sibiriae, s. in Persiac
agris, hieme in turribus antiquis summis gregaria, furto
pariter dedita, facile cicuranda, ova parit pallidiora,
minora, minusque maculata, quam cornices.
Longitudo 13 circiter pollicum; irides albae.

- glanda-
rius. 7. C. teetribus alarum caeruleis, lineis transversis albis ni-
 grisque, corpore ferrugineo variegato. *Faun. suec.* 90.
Scop. ann. I. p. 36. n. 39.
- Garrulus. *Briss. av.* 2. p. 47. n. 1. *Nozeman nederl. Vo-*
gel. t. 1.
- Pica glandaria. *Gesn. av.* 700. *Aldr. orn.* I. p. 788. t. 789.
Raj. av. p. 41. A. 2.
- Ghiandaja. *Olin. uccell.* p. 35.
- Jeay. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 107. t. 8. *planch. enlum.*
n. 481.
- Jay. *Brit. zool.* I. n. 79. *Arct. zool.* 2. p. 252. E. *Albin.*
av. I. p. 16. t. 16. *Will. orn.* p. 130. t. 19. *Lath. syn.*
I. I. p. 37. n. 19. Hayes brit. birds t. 7.

Holz-

Holzschreyer, Eichenheher, Nussheher. *Frisch. av. t. 55.*
Kram. el. p. 335. Günth. Nest. u. Eyer, t. 38.

β. *Garrulus albus. Briss. av. 2. p. 51. n. 1. A.*

Habitat in Europa, et ad montes Uralenses Sibiriae, in silvis, inquietus, facile cicurandus et docilis, nidum ex bacillis, radicum fibris, tenerioribusque ramis struens, et ova pariens columbinis aequalia, ex cinereo-olivacea, maculis pallide fuscis; colligit nubes, glandes, alias fructus, superfluos defodit seritque, vicitat etiam segete, aviculis, ovis.

Longitudo 13 pollicum; macula utrinque ad os nigra; capitis pennae paelongae.

argyro- 25. *C. niger, pectore cyaneo, oculis argenteis, cauda apice plithal- alba, rostro pedibusque nigris. Jacquin Beytr. zur Gesch. mus.*

Habitat Carthaginæ in America, glandarii magnitudine, in silvis densissimis, vocem claram, sibilantem, non ingratam edens, insestis, fructibus et seminibus vicitans, cicuratus quoque carne cruda et cocta.

Alae extrinsecus, et macula utrinque supra infraque oculos cyanea.

dubius. 26. *C. fusco-ferrugineus, vertice temporibusque nigris, collo et abdome flavecentibus, rostro, oculis pedibusque nigris. Jacquin Beytr. zur Gesch. der Voegel, p. 2.*

Habitat Carthaginæ in America.

Lineae 2 albae a basi rostri trans oculos ad occiput, ubi convergunt.

cristatus. 8. *C. teetricibus alarum lineis transversis nigris, corpore cæruleo, collari nigro.*

Garrulus canadensis caeruleus. Briss. av. 2. p. 54. n. 2. t. 4. f. 2.

Pica glandaria caerulea cristata. Robert ic. 1676. t. 14.

Geay bleu de Canada. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 120. pl. enlum. n. 529.

Blue Jay. Arct. zool. 2. p. 249. n. 138. Catesb. car. I. p. 15. t. 15. Edw. glean. 60. t. 239. f. 1. Latham syn. I. I. p. 386. n. 20.

Habitat in America septentrionali, glandario similis, sed multo minor, 11 polices longus, gregarius, in uliginosis nidificans, cantu gratissimo; vicitat famelicus vermis et serpentibus, alias nucibus castaneis, potissimum zæae

seminibus, hinc agris, bac confitis infestissimus. Major parit ova olivacea, maculis ferrugineis.

Capitis crista caerulea, stria nigra a rostro ultra oculos producta; genae cum gula et abdome albae; pectus ex crinaceo rubrum; dorsum pallide purpureum; tectrices alarum, et remiges secundariae caeruleae, haec etiam una cum tectricum ordine albo-punctatae; cauda longa cuneiformis nigro et caeruleo lineata apice alba; pedes nigri.

Stelleri. 27. C. corpore supra nigro, subtus, alis, caudaque longa cuneiformi caeruleis, capite cristato.

Steller's Crow. *Arct. zool. 2. p. 249. n. 139. Lath. syn. I. I. p. 387. n. 21.*

Habitat in sinu Natka Americae borealis, 15 pollices longus. Tectrices alarum minores remigesque primariae intus sordidae; remiges secundariae rectricesque intermediae nigro lineatae.

cayanus. 9. C. subviolaceus subtus candidus, jugulo fronteque nigris, cauda apice alba.

Garrulus cayanensis, tribus utrinque maculis in capite albis.

Briss. av. p. 52. n. 2. t. 4. f. 1.

Geay de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 373.*

Blanche-coëffe ou Geay de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 118.*

Cayenne Jay. *Lath. syn. I. I. p. 389. n. 22.*

Habitat in Cayenna, 13 pollices longus.

Rostrum, pedes et ungues grisea; capistrum, genae et nucha nigra; cauda rotundata violacea.

Caryoca- 10. C. fuscus alboque punctatus, alis caudaque nigris: rectricibus apice albis: intermediis apice detritis. *Fn. suec. 91. Scop. ann. I. p. 37. n. 40.*

Corvus cinereus, cauda alisque nigris. *Fn. suec. I. n. 75.*

Caryocatactes. *Gesn. av. 245. Will. orn. 90. t. 20. Raj. av. p. 42. Nozem. nederl. Vogel. t. 3.*

Merula faxatilis. *Aldr. ornith. 2. p. 630.*

Nucifraga. *Briss. av. 2. p. 59. n. 1. t. 1. f. 1.*

Casse-noix. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 122. t. 9. planch. enlum. n. 50.*

Nut-cracker. *Brit. zool. 2. app. p. 625. t. 3. Arct. zool. 2. p. 252. D.*

Waldstarl, Steinheher. *Kram. el. p. 334.*

Tannenheher. *Frisch. av. t. 56.*

Nuskraehe. *Schrantz Naturf. XVIII, p. 67.*

Habi-

Habitat in Europa et Sibiria ad Camtschateam usque, in pinetis potissimum, colligit editque insecta, baccas, nuces, praesertim pini pineae; in cavis arborum nidificans, moribus picae similis, 13 pollices longus.

Corpus maculis triangularibus albis; crissum album; vertex caudaeque tectrices non maculatae. Pennae narium aliquando deficientes; lingua bicuspidata.

- Balicasius. 11. C. virescenti ater, cauda forficata.
*Corvus splendide nigro-viridans. Briss. av. 2. p. 31. n. 9.
 t. 2. f. 1.*
*Choucas des Philippines. Buff. pl. enlum. n. 603.
 Balicasse des Philippines. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 83.
 Habitat in insulis Philippinis, eximie cantans.
 Rostrum, pedes et unguis nigra; cauda fere 4 pollices longa.*
- Guineae. 28. C. fronte, capistro, caudaque nigris, capite, collo, dorso et pectoris parte superiore obscure cinereis, inferiore, abdomine, crissu et uropygio albis transversim nigro-striatis.
*Choucas de la nouvelle Guinée. Buff. hist. nat. des ois. 3.
 p. 80. pl. enlum. n. 629.
 New Guinea Crow. Lath. syn. I. 1. p. 381. n. 13.
 Habitat in nova Guinea, pedem longus.
 Rostrum nigricans; stria nigra per et pone oculos ducta; pedes breves, sordidi.*
- papuensis. 29. C. cinereus, abdomine albo, remigibus ex nigricante fulcis.
*Choucas de la nouvelle Guinée. Buff. hist. nat. des ois. 3.
 p. 81. pl. enlum. n. 630.
 Papuan Crow. Lath. syn. I. 1. p. 382. n. 14.
 Habitat in nova Guinea, 11 pollices longus.
 Rostrum fere policare, flavicans, dorso mandibulae superiores angulato; pedes parvi cinerei; unguis brevis.*
- nudus. 30. C. niger, pileo ex mollioribus plumis contexto, collo rarius plumis contexto.
*Colnud de Cayenne. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 82. planch.
 enlum. n. 609.
 Bare-necked Crow. Lath. syn. I. 1. p. 382. n. 15.
 Habitat in Cayenna, monedulae magnitudine.
 Rostrum basi latum, sordide caeruleum; alarum pennae non-nullae dilute griseae.*

- calvus. 31. C. ex ferrugineo fuscus, fronte et vertice calvis.
Choucas chauve. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 80. pl. enlum. n. 521.
Bald Crow. *Latham syn.* I. I. p. 383. n. 16.
Habitat in Cayenna, 13 pollices longus.
Rostrum paulisper curvatum, sordide nigrum; pedes sordidi; color subtus et in tectricibus caudae superioribus diutior.
- pacificus. 32. C. cinereus, subtus in spadiceum vergens, occipite, cere, alis caudaque nigris, alarum caudaeque apice albo.
Pacific Crow. *Lath. syn.* I. I. p. 383. n. 17.
Habitat in insulis maris australis, 10 $\frac{1}{2}$ pollices longus.
Rostrum, pedes et ungues nigra; frons et gula pallida; rectrices 2 intermediae totae nigrae.
- tropicus. 33. C. niger, cristo punctis sordide albis, cauda rotundata.
Tropic Crow. *Lath. syn.* I. I. p. 384. n. 18.
Habitat in insula O-why-hee maris australis 12 $\frac{1}{2}$ pollices longus.
Rostrum 1 $\frac{1}{2}$ pollicem longum, basi latum; color supra splendidus, alarum et caudae in virecentem vergens; pedes et ungues nigri.
- erythro- 34. C. corpore supra fusco subtus albicante, cauda cuneiformi,
 rhynchos. remigibus basi dilute violaceis, medio nigris, apice albis.
Geay de la Chine à bec rouge. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 115. pl. enlum. n. 622.
Red-billed Jay. *Lath. syn.* I. I. p. 390. n. 24.
Habitat in Sina, glandario major.
Rostrum pedesque rubri; frons, jugulum et pectus aterrima; occiput et cervix dilute grisea; ungues albicantes, longi, aduncii, apice nigri.
- sinensis. 35. C. supra ex rufo rubens, vertice fusco, superciliis albis,
 cauda fusca cuneiformi taenia versus apicem nigra, maculisque ad apicem rectricum sordide albis subrotundis.
Chinese Jay. *Latham syn.* I. I. p. 390. n. 35.
Habitat in Sina, glandarii magnitudine et habitu.
Rostrum pedesque plumbi; linea trans et pone oculos ducta nigra; macula ex caerulecente et albo mixta circulo nigro inclusa ad aures; mentum album; remiges secundariae fuscae.

sibiricus. 36. C. supra cinereus, subtus ex ferrugineo aurantius, remigibus rectricibus 2 intermediis cinereis, reliquis rectricibus aurantiis.

Geay de Siberie. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 118. pl. enlum. n. 608.*

Siberian Jay. *Lath. syn. I. 1. p. 391. n. 26.*

Habitat in Sibiria, 10 pollices longus.

Rostrum sordidum; frons, genae, mentum, et jugulum pallida; vertex ex subfusca niger, subcristatus; uropygium ex ferrugineo aurantium; pedes cinerei.

peruviana. 37. C. supra dilute vitidis, subtus dilute flavus, vertice albo, fasciculo gulæ jugulique nigro, rectricibus tribus utrinque exterioribus flavis.

Geay du Perou. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 116. n. 2. pl. enlum. n. 625.*

Peruvian Jay. *Lath. syn. I. 1. p. 391. n. 27.*

Habitat in Peru.

Rostrum sordidum, basi linea caerulea circumscriptum; cauda cuneiformis.

flavus. 38. C. supra ex virescente fuscus, subtus flavus, mento et superciliis albis, alis caudaque ex rubescente fuscis.

Garlu ou Geay à ventre jaune de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 119. pl. enlum. n. 249.*

Yellow-bellied Jay. *Lath. syn. I. 1. p. 392. n. 28.*

Habitat in Cayenna, 9 pollices longus.

Rostrum nigrum; vertex stria media, longitudinali aurea; pedes graciles, breves, plumbei.

afer. 12. C. violaceo-niger, cauda cuneiformi.

Habitat in Africa; nonne idem cum senegalensi?

cyanus. 39. C. cinereus, vertice splendide atro, alis caudaque cyaneis, rectricibus longissimis, intermediis apice albis. *Pall. it. 3. p. 694. n. 7.*

Blue Crow. *Lath. syn. I. 1. p. 394. n. 30.*

Habitat in Dauuria, in quam gregarius adventat Aprili, timidissimus, astutus, clamofus, in arbustis et salicetis nidificans, habitu moribusque picae similis, magnitudine lanii infastis. Corpus subtus magis albidum.

Pica. 13. C. albo nigroque varius, cauda cuneiformi. *Fn. suec. 92. Scop. ann. I. p. 38. n. 41.*

Pica. *Nozeman nederl. Vogel. t. 2.*

Pica varia f. caudata. *Gesn. av. 695. Aldr. orn. I. p. 784.
t. 785. Jonst. av. 44. t. 17. Briss. av. 2. p. 35. n. 1.
Pie. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 85. t. 7. pl. enlum. 488.
Magpye or Piapet. Brit. zool. I. n. 18. Arct. zool. 2. p. 247.
n. 136. Hayes brit. birds. t. 8. Raj. av. p. 41. t. 1.
Will. orn. p. 127. t. 19. Albin. av. I. t. 15.*

B. Pica candida. *Briss. av. 2. p. 39. n. 1. A. t. 3. f. 1.*

*Habitat in Europa et boreali America atque Asia ad Japon
usque, in Madera insula, ad pagos, in turribus, inter
boscos offensos, sylvarum osor, junior facile cicerandus, et
tum perquam docilis; victimus animalis et vegetabilis, quis-
quiliae, ova, pulli gallinarum anserumque; nidus artifi-
ciosus, introitu unico; ova virentia, maculis creberri-
mis nigris. Migrat.*

*Longitudo 18 pollicum; nigro colori splendor viridis et pur-
pureus; cauda valde longa.*

- senega- 14. C. nigro-violaceus, cauda cuneiformi, artubus nigris.
lenfis.** *Pica senegalensis. Briss. av. 2. p. 40. n. 2. t. 3. f. 2.
Pie du Senegal. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 97. pl. enlum.
n. 538.
African Crow. Lath. syn. I. I. p. 394. n. 31.
Habitat ad fluvium Senegal, picae magnitudine, 14 pollices
longus.
Color subtus sordide niger; rostrum nigrum; remiges rectri-
cesque fuscae, margine ex violaceo nigrō.*

- caribae- 40. C. supra ferrugineus, subtus albus, capite, collo, cauda-
us.** *que cuneiformi albo-striata caeruleis, torque maculaque
occipitali albis.
Galgulus antillarum. Briss. av. 2. p. 8. n. 6.
Pica Antillarum, et Pica persica Aldrovandi? Raj. av. p. 152.
et p. 4. n. 6.
Pie des Antilles. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 101. 129.
Habitat in insulis Antillis, picae magnitudine.
Rostrum pedesque rubri; macula occipitis (in mare) lineis
transversis nigris; uropygium tectricesque caudae superio-
res flavae; remiges ex caeruleo virides, tectrices alarum
minores castaneae, mediae virides, majores caeruleae, (in
femina virides) scapis marginibusque albidis.*

- africa- 41. C. supra fuscus, subtus sordide cinerascens, capite subcri-
nus.** *stato colloque purpureis, cauda cuneiformi apice alba.
African Crow. Lath. syn. I. I. p. 396. n. 33.*

Habi-

p. 784.
n. 1.
488.
p. 247.
I. t. I.

Japon
s, inter
ndus, et
is, quis-
s artifi-
reberri-

et pur-

igris.

enlum.

pollices

s rectri-

cauda-
culaque

. p. 152.

29.

) lineis
superio-
alarum
ae, (in

subcri-
alba.

Habi-

Habitat in Africa, pedem et 10 pollices longus.
*Rostrum pedesque rubri; occipitis pennae apice griseo; remi-
ges exteriori margine caerulecentes.*

- mexica- 42. C. totus ex caeruleo ater.
nus. Pica mexicana major. *Briss. av. 2. p. 43. n. 4.*
Hoitzanatl. *Raj. av. p. 162.*
Criard. *Pernett. it. mal. I. p. 185.*
Hocifana. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 103.*
Mexican Crow. *Lath. syn. I. I. p. 396. n. 34.*
*Habitat in nova Hispania, ad oppida, perpetim sonorus, mo-
nedulae magnitudine.*
Rostrum, pedes et ungues nigri.
- surina- 43. C. viridis, occipite remigumque primiarum apice cya-
mensis. neis, macula cervicis et pone aures pallide viridibus, cau-
da ferdida.
Surinam Daw. *Brown. illustr. t. 10.*
Surinam Crow. *Lath. syn. I. I. p. 397. n. 35.*
Habitat in Surinamo, corones magnitudine.
Color profundus variabilis; rostrum remigesque primariae
furdida; pedes incarnati.
- Zanoc. 44. C. nigricans, capite colloque subfulvis, cauda longa.
Pica mexicana minor. *Briss. av. 2. p. 44. n. 5.*
Tzanahoei, seu Pica mexicana Hernand. *Raj. av. p. 162.*
Zanoc. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 106.*
Lesser mexican Crow. *Lath. syn. I. I. p. 397. n. 36.*
*Habitat in nova Hispania, picae magnitudine, eique moribus,
astutia, garrulitate, docilitate similis.*
Rostrum, pedes et ungues nigra.
- brachyu- 15. C. viridis, subtus lineisque capitatis fulvescentibus, alis ma-
rus. cula alba.
Merula viridis moluccensis. *Briss. av. 2. p. 316. n. 56. t. 32.*
f. I.
Pica indica vulgaris. *Raj. av. p. 195. t. I. f. 10.*
Breve de Bengale. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 414.*
Merle de Bengale. *Buff. planch. enlum. n. 258.*
Short-tailed Crow. *Lath. syn. I. I. p. 398. n. 37.*
- β. Corvus philippensis.
Merula viridis moluccensis. *Briss. av. 2. p. 319. n. 57. t. 32.*
f. 2.
Breve des Philippines. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 413. n. 1.*
Merle des Philippines. *Buff. pl. enlum. n. 89.*

*γ. Corvus bengalensis.*Breve. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 413. n. 2.Madras Jay. *Raj. av.* p. 195.Bengal Quail. *Alb. av.* I. t. 31.Short-tailed Pye. *Edw. glean.* t. 324.*δ. Corvus madagascariensis.*Breve de Madagascar. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 414. n. 4.Merle des Moluques. *Buff. pl. enlum.* n. 257.*Habitat in insulis oceani indici, 6-7 pollices longus.*Rostrum fuscum; caput nigrum, in γ. taenius nigris, albis
et ex aurantio fuscis alternantibus; anguli oris aurantii;
irides albidae; gula, remiges et cauda nigrae, haec apice
viridi; pedes aurantii; unguis sordide rubri.*canaden-* 16. *C. fuscus*, fronte flavicante subtus rectricumque apicibus
albus.*Garrulus canadensis fuscus.* *Briff. av.* 2. p. 54. n. 3. t. 4. f. 2.
Geay brun de Canada. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 117. *pl.*
enlum. n. 530.*Cinereous Crow.* *Arct. zool.* 2. p. 248. n. 137. *Lath. syn.*
I. I. p. 389. n. 23.*Habitat in America boreali, et occidentalis potissimum ejus
partis silvis, hieme ad habitacula hominum, audax, furto
deditus, per paria volitans, vix ciecurandus, penum pro
hieme colligens, algis, vermis, carne viettans, nidi-
ficans primo vere in pinibus, ovaque caerulea pariens,
incolis detestatus, ad 11 pollices longus.*Rostrum robustum nigrum; nares fasciculo pennarum albi-
darum tectae; genae ex rufescente sordide albae; verti-
cis pennae longae et nigrae; alae, cauda longa, cuneiformis,
et pedes nigrae.*Pyrrho-* 17. *C. nigricans*, rostro luteo, pedibus nigris.*corax.* *Pyrrhocorax.* *Gejn. av.* 527. *Aldrov. av.* I. p. 769. t. 16.
Briff. av. 2. p. 30. n. 8. t. I. f. 2.*Choucas des Alpes.* *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 76. t. 6. *pl.*
enlum. n. 531.*Alpine Crow.* *Lath. syn.* I. I. p. 183. n. 11.*Choagh.* *Hayes brit. Birds.* t. 6.*Habitat in alpibus Helveticis, 15 pollices longus; voce aucta
ingrata; seminibus viettans, hinc segetibus infestus; ca-
ro sapida.**Ungues nigri, pedes aliquando flavi; rostrum, prouti tri-
bus insequentibus, subulatum curvum, longius.*

18. C.

- Graculus. 18. *C. violaceo-nigricans*, rostro pedibusque rubris. S. G.
Gmelin it. 3. t. 39.
Gracula pyrrhocorax. *Scop. ann.* I. p. 42. n. 46.
Monedula Pyrrhocorax. *Hasselq. it.* p. 238. n. 19.
Coracias. *Aldr. orn.* I. p. 766. t. 368. *Briss. av.* 2. p. 3.
n. 1. t. 1. f. 1. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 1. t. 1. pl.
enlum. n. 255.
Coracias f. Pyrrhocorax. *Raj. av.* p. 40. n. 6.
Graculi tertium genus. *Gesn. av.* 522.
Cornish Chough. *Alb. av.* 2. t. 24. *Borlas. Cornw.* p. 249.
t. 24. *Will. ornith.* p. 126. t. 19.
Red-legged Crow. *Brit. zool.* I. n. 80. *Latham syn.* I. I.
p. 401. n. 39.
Habitat in alpibus Helveticis et Noricis, Anglia, Scotia,
Aegypto, Candia, Persia, inquietus, clamitans, vorax,
intimidus, furto deditus, moribus monedulae, gregarius,
in circulo volans, in rupibus nidificans, ova pariens
4-5 alba, maculis flavis, vinctans baccis juniperi, lo-
custis, blattis.
Magnitudo monedulae; longitudo 16 pollicum; iridum cir-
culus exterior rubens; interior griseus; palpebrae rubrae;
ungues magni, adunci, nigri.
- australis. 45. *C. supra niger, subtus cinereus, rostro rubro, teetribus*
alarum albo maculatis, cauda rotundata.
Cayenne red-billed Crow. *Lath. syn.* I. I. p. 403. n. 40.
Habitat in Cayenna, turdi viscivori magnitudine, 11 polli-
ces longus.
Rostrum Jesquipollicare; setae narium nigrae; pedes sordidi;
ungues nigri.
- Eremita. 19. *C. virescens, capite flavescente, occipite suberistato, ro-*
stro pedibusque rubris.
Upupa Eremita. *Syst. nat.* X. I. p. 118. n. 3.
Coracias cristata. *Briss. av.* 2. p. 6. n. 2.
Corvus sylvaticus. *Gesn. av.* 351. *Aldr. orn.* 3. p. 267. 270.
Coracias hupé ou Sonneur. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 9.
Gesner's Wood Crow. *Will. orn.* p. 396.
Wood Crow from Switzerland. *Albin. av.* 3. t. 16.
Hermit Crow. *Lath. syn.* I. I. p. 403. n. 41.
Habitat in alpibus Helveticis, Apenninis, Noricis, gallinae
magnitudine, altissime volans, gregarius, migratorius,

*in rupibus, turribus, et antiquis aedificiis nidificans, 2-3
ova pariens, junior facillime cicurandus. Caro sapida.
Color niger, cum splendore viridi; caput striis rubris;
cauda brevis.*

51. CORACIAS. *Rostrum cultratum apice incurvatum, basi pennis denudatum.
Lingua cartilaginea bifida.
Pedes ambulatorii.*

Garrula. 1. *C. caerulea*, dorso rubro, remigibus nigris. *Fn. suec.* 94.
Scop. ann. I. p. 40. n. 44.

Cornix caerulea. *Gesn. av.* 335. *Aldr. ornith.* I. p. 790.
t. 791. 792. *Günth. Nest. u. Eyer.* t. 14.

Galgulus. *Briss. av.* 2. p. 64. n. 1. t. 5. f. 2.

Garrulus argentoratensis. *Raj. av.* p. 41. n. 3.

Rollier. *Buff. planch. enlum.* n. 486.

Rollier d'Europe. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 135. t. 70.

Koller. *Brit. zool. app.* p. 624. t. 2. *Arct. zool.* 2. p. 253. G.

Raj. av. p. 42. *Will. orn.* p. 131. t. 20. *Edw. av.* t. 109.

Blauer Räker, Birkheher. *Frisch. av.* t. 57.

Habitat in Africa, Syria, Sibiria et Europa, gregaria, sonora, migratoria, timida, in arboribus, praesertim betula, rarius in argilla nidificans, ova pariens dilute virentia, maculis innumeris obscuris, viellitans scarabaeis, vermis, ranis, glandibus, frugibus; caro multis deliciosa.
Magnitudo corvi glandarii.

Pone aures macula utrinque calva; remiges primariae subtus caeruleae; rectrices intermediae sordide virides, ceterae caeruleae, exteriori margine nigro-punctatae; pedes flavicantes.

indica. 2. *C. caerulea* antice testacea, pileo viridi.

Blue Jay from the East-indies. *Edw. glean.* t. 326.

Indian Roller. *Lath. syn.* I. I. p. 412. n. 7.

Habitat in Zeylon, garrulae similis, 11 polices longa.

Rostrum nigrum, sesquipollicare; vertex ex caeruleo viridis; cervix dorsique pars superior testaceae; tempora et gula albo-striata; alae ex viridi et caeruleo mixtae; rectrices exteriore media sui parte thalassinae.

3. C.

Coraciae genus per omnem terrarum orbem dispersum; pedibus brevibus ab affinibus distinctum,

- caffra. 3. C. caerulea, remigibus margine exteriore luteis.
 Cape-Roller. *Lath. syn. I. 1. p. 412. n. 8.*
Habitat in Aethiopia. I. Burmann.
Femina ex caerulecente nigra.
- abyssini- 7. C. viridis, genis albis, humeris, uropygio et remigibus ma-
 ca. joribus caeruleis, dorso remigibusque secundariis ex au-
 rantio fuscis.
 Rollier d'Abyssinie. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 143. planch.*
enlum. n. 626.
 Abyssinian Roller. *Lath. syn. I. 1. p. 408. n. 2.*
Habitat in Abyssinia.
- senega- 8. C. supra ex rubente fusca, subtus, capite, cauda, alarum-
 lensis. que parte superiore ex caerulecente thalassinis, facie al-
 ba, humeris remigibusque caeruleis.
 Rollier du Sénégal. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 143. planch.*
enlum. n. 326.
 Swallow-tailed Indian Roller. *Edw. glean. t. 327.*
 Senegal Roller. *Lath. syn. I. 1. p. 408. n. 3.*
Habitat ad fluvium Senegal, et in Zeylon, corvi glandarii
magnitudine.
Rostrum nigrum; cauda furcata; pedes ex rubente incarnati.
- madagas- 9. C. ex ferrugineo purpurascente fusca, uropygio, cracco et
 cariensis. cauda ex caeruleo viridibus, hac versus apicem fascia pur-
 purascente, apice ipso, remigibusque supra ex atro cae-
 ruleis.
 Rollier de Madagascar. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 148.*
 Rolle de Madagascar. *Buff. pl. enlum. n. 501.*
 Madagascar Roller. *Lath. syn. I. 1. p. 413. n. 11.*
Habitat in Madagascar, cyaneae magnitudine.
Rostrum breve, flavum; oculi magni; remiges interiori
margine nigrae; pedes ex rubente fusi.
- orienta- 4. C. viridis, jugulo caeruleo striato, rectricibus apice nigris.
 lis. *Galgulus indicus. Briss. av. 2. p. 75. n. 4. t. 7. f. 2.*
Rollier des Indes. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 147. planch.
enlum. n. 619.
 Oriental Roller. *Lath. syn. I. 1. p. 411. n. 6.*
*Habitat in India, corvi glandarii magnitudine, $10\frac{1}{2}$ polli-
 ces longa.*
Rostrum flavicans, basi latius, apice magis aduncum, quam
reliquis speciebus; corpus supra ex viridi in fuscum, sub-
tus ex caeruleo in viridem vergens; caput et cervix fusca;
remi-

remiges ex caeruleo et nigro mistae, macula in medio magna pallide caerulea; rectrices basi virides, 2 intermediae nigrae, reliquae caeruleae; pedes flavicantes; unguis nigri.

bengalensis. 5. C. subfulva, subtus caerulescens, collo subtus violaceo pallido striato, cauda integra.

Corvus bengalensis. Syst. nat. X. I. p. 106. n. 6.

Galgulus mindanoensis. Briss. av. 2. p. 69. n. 2. t. 6. f. I.

Cuit ou Rollier de Mindanao. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 144. pl. enlum. n. 285.

Bengal Pye. Albin. av. I. t. 17.

Bengal Roller. Latham syn. I. I. p. 410. n. 5.

Habitat in Bengala, et insula Mindanao, 12½ pollices longa.

Rostrum unguisque nigricans; vertex viridis; colori fulvo violaceus admixtus; dorsi pars inferior cum uropygio caerulea; pectus rufum, in violaceum colorem vergens; rectrices alarum minores, caudaeque superiores ex atro caerulea; alarum majores remotioresque ex caeruleo virides, mediae ex caeruleo et viridi mistae, proximae virides; remiges 5 primariae ex atro caerulea; rectrices 2 intermediae obscure virides, reliquae ex caeruleo virides, basi et apice caerulea; pedes grisei.

caudata. 6. C. subfulva, subtus caerulescens, collo subtus violaceo pallido striato, rectricibus extimis longissimis.

Galgulus angolenis. Briss. av. 2. p. 72. n. 3. t. 7. f. I.

Rollier d'Angola. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 144. planch. enlum. n. 88.

Long-tailed Roller. Lath. syn. I. I. p. 409. n. 4.

Habitat in Angola, corvi glandarii magnitudine, 15½ pollices longa.

Rostrum et unguis nigricant; occiput et cervix virent; dorsi pars inferior, cum uropygio et rectricibus alarum caerulea; rectrices caudae superiores ex caeruleo virides; abdomen, femora, rectrices alarum et caudae inferiores, et ad medium usque remiges thalassina; rectrices 2 intermediae obscure virides, reliquae ex caeruleo virides, pars extimarum supra ceteras produeta ex atro caerulea; pedes grisei.

caerulea. 10. C. supra ex caeruleo pallide viridis, subtus ferruginea, alarum apice nigro.

Blue Roller. Lath. syn. I. I. p. 412. n. 9.

Longitudo 8 pollicum; rostrum sordidum.

- io ma-
niediae
nigri.
o pal-
f. i.
3. p.

longa.
ri ful-
pygio
rgens;
c atro
eo vi-
ae vi-
trices
viri-

o pal-
t.
lanch.

 $\frac{1}{2}$ pol-
rent;
arum
rides;
iores,
inter-
pars
; pe-
alas-

1. C.

cyanæ. 11. C. tota splendide cyanea.
Ultramarine Roller. *Lath. syn. I. I. p. 413. n. 10.*
Longitudo 8 pollicum; rostrum sordidum.
- cayen- 12. C. ex fuscescente viridis, subtus sordide alba, superciliis
nen sis. albis, gulæ stria utrinque nigra, cauda cuneiformi.
Griverd ou Rolle de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois. 3.*
p. 134. pl. enlum. n. 616.
Cayenne Roller. *Lath. syn. I. I. p. 415. n. 15.*
Habitat in Cayenna, 9 pollices longa.
Rostrum robustum, rubens, versus apicem paulisper curva-
tum; pedes pallide grisei, longiores, quam in reliquis
speciebus.
- mexica- 13. C. ex rufo grisea, subtus et alis dilute griseis, flammeo
na. adminto.
Galculus mexicanus. *Briss. av. 2. p. 83. n. 8.*
Merula mexicana. *Seb. mus. I. t. 64. f. 5.*
Rollier du Mexique. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 148.*
Mexican Roller. *Lath. syn. I. I. p. 413. n. 12.*
Habitat in nova Hispania, turdo multo major.
- striata. 14. C. ex caeruleo atra, striis ex virescente caeruleis, rostro;
cauda pedibusque nigris.
Blue striped Roller. *Lath. syn. I. I. p. 414. n. 13. t. 16.*
Habitat in nova Caledonia, 8 pollices longa.
Irides rubrae; femina non striata ex cinereo grisea; remigi-
bus teetribusque alarum nigris, margine cinereo.
- varia. 15. C. nigra, subtus, dorsi parte inferiore, uropygio et teetri-
cibus caudæ superioribus alba, cauda aequali nigra api-
ce alba.
Cassican de la nouvelle Guinée. *Buff. hist. nat. des ois. 7.*
p. 134. t. 7. pl. enlum. n. 628.
Pied Roller. *Lath. syn. I. I. p. 415. n. 16.*
Habitat in nova Guinea? 13 polices longa, dubii generis.
Rostrum $2\frac{1}{2}$ pollicum, caerulescens; teetrices alarum ex albo
et nigro variae; secundariarum aliae nigrae, aliae albae;
remiges majores alarumunque margo exterior nigra; rectri-
ces 2 intermediae totae nigrae; pedes plumbei; unguis
robusti, acuti, nigri.
- finensis. 16. C. viridis, subtus ex flavicante alba, cauda cuneiformi,
apice alba.
Galgulus finensis. *Briss. av. 2. p. 77. n. 5. t. 6. f. 2.*

Rolle

Rolle de la Chine. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 132.

Rollier de la Chine. *Buff. pl. enlum.* n. 620.

Chinese Roller. *Lath. syn.* I. 1. p. 414. n. 14.

Habitat in Sina, rarer, corvi glandarii magnitudine, 11½ pollices longa.

Rostrum, irides, pedes et unguis rubent; stria nigra per oculos ducta; femora grisea; tectrices alarum, remigesque olivaceae; harum nonnullae apice albo.

docilis. 17. C. alba cum rubicundo intersperso, subtus badia pedibus luteis, rectricibus nigris, apice albis. *S. G. Gmelin it.* 3. p. 378. t. 42.

Habitat in Asia australi, monedulae magnetudine, docilis, imitabunda.

Rostrum luteum; remiges 9 priores ad medium usque albae, reliqua parte nigrae, ceterae totae nigrae; unguis incarnati.

52. ORIOLUS. *Rostrum conicum, convexum, acutissimum rectum: mandibula superiore paulo longiore, obsolete emarginata.*

Lingua bifida acuta.

Pedes ambulatorii.

Galbula. 1. O. luteus, loris artibusque nigris, rectricibus exterioribus postice flavis. *Aet. Stockh.* 1750. p. 127. t. 3. f. 5.

Coracias Oriolus. *Fn. suec.* 95. *Scop. ann.* I. p. 41. n. 45. *Forsk. Fn. arab.* p. 7.

Oriolus. *Gesn. av.* 713. *Briss. av.* 2. p. 320. n. 58. *Nozeman nederl. Vogel.* t. 11.

Chlorion. *Gesn. av.* 261.

Galbula f. *Picus nidum suspendens.* *Raj. av.* p. 58. n. 5.

Loriot. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 254. t. 17. *pl. enlum.* n. 26.

Yellow Bird from Bengal. *Albin. av.* 3. t. 19.

Witwall. *Will. orn.* p. 198.

Golden Thrush. *Edw. av.* t. 185.

Oriole. *Brit. zool. app.* n. 4. t. 4.

Golden Oriole. *Lath. syn.* I. 2. p. 449. n. 43.

Kirschvogel. *Günth. Nest. u. Eyer,* t. 47.

β. Icterus maderaspatanus naevius. *Briss. av.* 2. p. 91. n. 5.

Mottled Jay. *Raj. av.* p. 195. n. 9. t. 1. f. 7.

Yellow

chine
fisi.

mela
cepha

Aves

Yellow Starling from Bengal. *Albin. av. 2. t. 41.*

Yellow Indian Starling. *Edw. av. t. 186.*

γ. *Oriolus indicus. Briss. av. 2. p. 328. n. 60.*

Chloris indicus. Aldr. av. 1. fig. p. 862. Johnst. av. t. 41.

Loriot des Indes. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 264.

Habitat in Europa, Asia, Africa, migratorius, vicitans cerasis, uvis, ficubus, insectis; nidus e foliis urceolatus in ramificationibus arborum; ova 4-5 sordide alba; maculis exiguis obscure fuscis; caro sapida; vox acuta.

Longitudo 9 $\frac{1}{2}$ pollicum; rostrum et irides rubent; in β. corpus maculis nigris conspersum; lora artusque in femina ex virecente fusca; alae hinc inde maculis flavis, magna que in medio, feminae sordidae, in γ. maculis caerulecentibus insignitae; in β. teetrices alarum remigesque nigricantes; rectrices 2 intermediae apice demum, reliquae a medio inde flavae; feminae cauda sordide viridis, rectribus 2 intermediis ex flavicante albis, in β. nigricans, in γ. taenia in medio caerulecente; pedes plumbei; unguis nigri; in β. caput collumque nigra; teetrices caudae nigro-maculatae.

- chinensis. 2. *O. luteus, artibus nigris apice luteis, fascia occipitis nigra.*
Oriolus cochinensis. Briss. av. 2. p. 326. n. 59. t. 33. f. 1.
Coulavan. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 262.
Couliavan de la Cochinchine. Buff. pl. enlum. n. 570.
Habitat in Cochinchina, nonne varietas Galbulae?
Rostrum flavum; pedes nigri; fascia occipitis ab oculo per occiput ad oculum ducta.

- melanocephalus. 3. *O. luteus, capite, remigibus, apicibusque rectricum intermedianarum nigris.*
Sturnus luteolus. Syst. nat. X. 1. p. 167.
Oriolus bengalensis. Briss. av. 2. p. 329. n. 61.
Pica maderaspatana sturni instar maculata. Raj. av. p. 175.
t. 1. f. 7.
Loriot de la Chine. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 262. planch.
enlum. n. 79.
Black headed Indian Icterus. Edw. av. t. 77. Alb. av. 2.
p. 41. t. 41.

Habi-

Aves hujus generis gregariae, sonorae, voraces, frugivores, numerosae, potissimum in America habitant, nidis saepe pendulis.

Habitat in regione Maderaspatana, 8 $\frac{1}{2}$ pollices longa, Galbulae varietas.

Irides badiæ; gula et pedes nigri; alae striis longitudinalibus flavis insignitæ.

radiatus. 21. *O. fulvus, capite, gula juguloque nigris albo punctatis, alarum tectricibus remigibusque nigris margine albo.*

Oriolus capite striato. Briff. av. 2. p. 332. n. 62.

Merula bicolor Aldrovandi. Raj. av. p. 67. n. 11.

Loriot à tête rayée. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 265.

Aldrovandus brasiliæ Merula. Will. orn. p. 193. §. 5.

Striped-headed Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 453. n. 44.

Corpus subtus pallidius; pedes flavi; unguis rubicundi.

Picus. 22. *O. rufus, capite, collo et pectori albo maculatis, cauda rotundata.*

Talapiot. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 82. pl. enlum. n. 605.

Climbing Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 453. n. 45.

Habitat in Gujanæ arboribus, quas pici instar conscendit, insectaque pone corticem latentia extrahit, 7 pollices longus.

Rostrum ex flavicante griseum; abdominis color in fuscum vergens; pedes nigritantes.

Icterus. 4. *O. fulvus, capite, jugulo, dorso, remigibus tectricibusque nigris, macula alarum alba. Scop. ann. I. p. 39. n. 40.*

Oriolus. Briff. av. 2. p. 86. n. 1. t. 8. f. I.

Coracias Xanthornus. Scop. ann. I. p. 39. n. 42.

Guira-Tangiuma. Marcgr. bras. 192. Raj. av. p. 45. n. 6. Will. orn. p. 141.

Troupiale. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 203. t. 16. planch. enlum. n. 532.

Banana Bird from Jamaica. Alb. av. 2. t. 40.

Large Banana Bird from Jamaica. Brown. jam. p. 447.

Yellow and black Pie. Raj. av. p. 181. n. 10. Sloan. jam. p. 301. t. 259. f. 4. Catesb. carol. app. t. 5.

Icteric Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 424. n. 6.

Habitat in America calidiore, insulisque Caribæis, agilis et audax, chrysalides potissimum persequitur, nidum struit cylindricum, ab extremo arboris ramo pendulum, in America frequenter ad necanda insecta domesticus, tum perquam docilis, 9 $\frac{1}{2}$ pollices longus.

Rostrum ut plurimum nigrum, basi fusca; orbitæ nudæ caerulecentes; irides flavicantes; alarum fasciae duæ oblique albae; pedes altis nigri, aliis plumbei, aliis ex griseo albi.

- novae Hispaniac. 23. O. flavus, capite, gula, remigibus caudaque nigris, tectricibus alarum majoribus apice flavo, minoribus totis nigris.
Icterus mexicanus. Briss. av. 2. p. 88. n. 2.
Avis americana de Acolchichi nigro-lutea. Seb. mus. I. t. 54. f. 4.
Acolchi de Seba. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 206.
Mexican Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 425. n. 8.
Habitat in nova Hispania, Icteri magnitudine.
Rostrum longum, flavum.
- annulatus. 24. O. flavus, capite colloque nigris, tectricibus alarum majoribus remigibusque nigricantibus flavicante marginatis, cauda nigricante annulata.
Icterus cauda annulata. Briss. av. 2. p. 89. n. 3.
Avis Ocotzinitzan, columbae magnitudine. Seb. mus. I. p. 97. t. 63. f. 3.
Arc-en-queue. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 207.
Habitat in America, columbae magnitudine.
Rostrum flavum; pedes grisei.
- brasiliensis. 25. O. flavus, pectore maculato, capite dorsoque dilute fuscis maculatis, abdomine albo, cauda aliquo fuscis, his apice albidis.
Icterus brasiliensis. Briss. av. 2. p. 93. n. 8.
Small yellow and brown Bird. Sloan. jam. p. 309. n. 43.
Brasilian Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 426. n. 9.
Habitat in Jamaicæ dumetis, 4 pollices longus.
Rostrum $\frac{1}{2}$ pollicem longum; orbitae flavae; pedes fusi; unguis flavi.
- Japacani. 26. O. ex nigro et dilute fusco, subtus ex albo et flavo varius, lineis transversis nigris, capite caudaque nigricantibus.
Japacani. Raj. av. p. 84. n. 12. Will. orn. p. 240. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 208. Lath. syn. I. 2. p. 426. n. 10.
Brasiliano duplo major; rostrum nigrum; irides aureae; pedes sordidi; unguis acuti et nigri.
- Costototl. 27. O. niger, subtus caudaque ex croceo et nigro varius.
Icterus novae Hispaniae. Briss. av. 2. p. 95. n. 10.
Xochilol et Costototl. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 210.
New Spain Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 427. n. 11.
Habitat in nova Hispania, sturni magnitudine.
Alae subtus cinereae; junior avis tota flava, exceptis alarum apicibus nigris.

griseus. 28. O. ex nigro et flavo varius, dorso, femoribus et abdome
ne cinereis.

Icterus cinereus novae Hispaniae. Briss. av. 2. p. 96. n. 11.

Tocolin. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 213.

Grey Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 427. n. 12.

Habitat in novae Hispaniae silvis, sturni magnitudine, non
canorus; caro sapida.

phoeni- 5. O. niger, alarum teetribus fulvis.
ceus. Icterus pterophoeniceus. Briss. av. 2. p. 97. n. 12.
Pterophoenicus Indiarum. Nieremb. nat. 225.
Acolchichi. Hern. mex. 14. Raj. av. p. 166. n. 6.
Commandeur. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 214.
Troupiale à ailes rouges. Buff. pl. enlum. n. 402.
Scarlet-feathered Indian Bird. Will. orn. p. 391.
Red-winged Starling. Catesb. Carol. I. t. 13. Alb. av. I.
t. 13.

Red-winged Oriole. Arct. zool. 2. p. 255. n. 140. Lath.
syn. I. 2. p. 428. n. 13.

Habitat gregibus numerosissimis in America a Novboraco
ad novam Hispaniam usque, sturni magnitudine, 8-9
pollices longus, oryzae segetes devastans, insectis ceterum
victans, et vermis, qui ea ave exstirpata tanto lae-
tius vivunt et multiplicantur. Nidum fructum pen-
dulum inter arundines ea altitudine, ut fluctus avellere
non possint; ova parit alba striis raris et irregularibus
nigris.

Tota avis nigra, exceptis iridibus albis, alarumque teetri-
cibus fulvis vel rubris.

america- 29. O. niger, mento, jugulo, pectore alarumque angulo su-
periore rubris.
nus.

Merula indica, pectore cinnabarinus, an Jacapu Maregr.?
Raj. av. p. 67. n. 10.

Troupiale de Cayenne. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 218. pl.
enlum. p. 236. f. 2.

Red-breasted Indian Blackbird. Will. orn. p. 194. n. 7.

Mocking bird of Guiana. Bancr. Guj. p. 177.

Red-breasted Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 430. n. 14.

Habitat in Guiana et Cayenna, 7 pollices longus, grata ca-
norus, imitabundus, nudo cylindrico longo pendulo.

oryzivo- 30. O. niger, capitis, colli pectorisque splendore purpureo.
rus. Rice Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 423. n. 5.

Habitat in Cayenna, 9 pollices longus.

Rostrum sesquipollicare, basi convexum et protuberans.

31. O.

- ludovi- 31. O. ex nigro et albo varius, capite, collo, abdomine et
cianus. uropygio albis, alis caudaque cuneiformi violaceis mar-
gine albo.
Cassique de la Louisiane. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 242.
pl. enlum. n. 646.
White-headed Oriole. *Arct. zool.* 2. p. 260. n. 148. *Lath.*
syn. I. 2. p. 422. n. 4.
Habitat in America boreali, potissimum Louisiana, 10 polli-
ces longus.
Rostrum nigrum, pollicare; pedes plumbei.
- hudso- 32. O. sordidus, capite, gula, teetricibus alarum nonnullis
nius. inferioribus, remigibus primoribus, femoribus, pectoris-
que striis albis.
Hudsonian white-headed Oriole. *Arct. zool.* 2. p. 260. n. 148.
Habitat in sinu Hudsonis, 8½ pollices longus, rarius.
- cristatus. 33. O. aterrimus, vertice pennis aliquot elongatis suberistato.
Xanthornus maximus. *Pall. spicil. zool.* 6. p. 3. t. 1.
Cassique huppé de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 241.
pl. enlum. 344.
Crested Oriole. *Latham syn. I. 2. p. 421. n. 3.*
β. Xanthornus olivaceus, subtus badius. *Lath. syn. I. 2. p. 421.*
n. 3. A.
γ. Cassique vert de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 240.
pl. enlum. n. 328.
Grüner Citronvogel. *Naturf.* IV. p. 1. t. 1.
Habitat in Surinamo et Cayenna, 18, β. 20, γ. 14 polli-
ces longus.
Rostrum majusculem sordide flavum, in β. apice aurantium,
in γ. totum rubrum, basi versus frontem denudata, gib-
bosa, rotundata et convexa; nares laterales subrotundae,
parvulae in sulco obsoleto, ante tophum plumaceum horri-
dulum lateraliter in rostrum excurrentem positae denu-
datae; lingua angusta canaliculata, profunde in 2 laci-
nias acute fissa; pili ad oris angulos vel tenerrimi, vel
nulli; cauda rotundata, teetricibus 2 intermediis nigris,
in β. badiis, reliquis citrinis; in γ. corpus antice cum
teetricibus alarum viride, postice badium; remiges pedes-
que nigra.
- haemor- 6. O. niger, uropygio coccineo. *Briff. av.* 2. p. 98. n. 13. t. 8.
rhou. f. 2.
Cassique rouge de Brésil ou Jupuba. *Buff. hist. nat. des ois.*
3. p. 238. *pl. enlum.* n. 482.

- Red-rumped Oriole. *Lath. syn. I. 2. p. 420. n. 2.*
β. Cassique brun. Ornith. de Salern. p. 112.
Habitat in Brasilia, Cayenna, β. in Guiana, 11 pollices longus.
Rostrum sulphureum; in β. corpus ex atro fuscum, uropygium vinaceum.
- persicus. 7. *O. niger, dorso postico, maculaque tectricum alarum basi- que rectricum luteis.*
Cassicus luteus. Briff. av. 2. p. 100. n. 14. t. 9. f. 1.
Cassique jaune du Brésil. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 235. pl. enlum. n. 184.
Pica persica. Bell. ex. 292. Aldr. orn. I. p. 793. t. 795.
Will. orn. 90. Raj. av. 42.
β. Jupujuba. Marcgr. bras. 193.
Jupujuba s. Japu. Raj. av. p. 46. n. 7.
Brazilian Jupujuba, or Japu of Maregrave. Will. orn. p. 142.
γ. Black and yellow Daw of Brasil. Edw. av. p. 319.
Habitat in calidioribus Americae australis; nidus alembici forma prope pagos ex arboris extremis ramis pendens (ex una nonnunquam 400) ex stramine, setis, pilis, totlandia usneoidae contextus, ter non raro per annum pariens.
Rostrum flavescens; lingua β. caerulea; irides caeruleae; pedes et ungues nigri; in γ. nigredini purpureus splendor affulget; in β. rectrices subtus flavae, altera parte nigrae, supra nigrae, extimae basi flavae.
- mexicanus. 8. *O. nigricans, subtus capiteque luteus.*
Icterus fuscus novae Hispaniae. Briff. av. 2. p. 105. n. 17.
Troupiale à calotte noire. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 222.
Troupiale jaune à calotte noire de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 533.
Black-crowned Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 431. n. 17.
Habitat in nova Hispania et Cayenna, 19 fere pollices longus.
Rostrum, pedes et ungues flavicant; collum flavum; vertex ex atro fuscus; cauda et alae nigrae.
- ruber. 34. *O. miniatus, alis, abdomine et cauda nigerrimis.*
Troupiale rouge d'Antigue. Sonner. it. p. 113. t. 68.
Red Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 431. n. 16.
Habitat in Antigua insulae Panay.
Rostrum pedesque nigricant.
- gujanensis. 9. *O. nigricans, marginibus pennarum griseis, pectore collo- que subtus rubris.*

Icterus

Icterus gujanensis. Briss. av. 2. p. 107. n. 18. t. 11. f. 1.
 Troupiale de la Gujane. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 218.
 pl. enlum. n. 536.
 Gujana Oriole. Latham syn. I. 2. p. 430. n. 15.
Habitat in Gujana, ultra 7 pollices longus.
 Pennarum margo, caudaeque striae grisea; corpus a mento
 ad abdomen rubrum; pedes et ungues fuscii.

flavus. 35. O. aureus, dorso postico, alis, caudaque nigris.
 Troupiale jaune d'Antigue. Sonner. it. p. 113. t. 69.
 Antiguan yellow Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 432. n. 18.
Habitat in Antigua insulae Panay, et America australi.
 Rostrum et pedes nigricant; irides rubent.

Baltimo- 10. O. nigricans, subtus fasciaque alarum fulvus.
 re. Icterus minor. Briss. av. 2. p. 109. n. 19. t. 12. f. 1.
 Baltimore. Arct. zool. 2. p. 257. n. 142. t. 12. Catesb. Ca-
 rol. I. t. 48. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 231. pl. enlum.
 n. 506. f. 1. Lath. syn. I. 2. p. 433. n. 19.
*Habitat in America boreali, ante biemem discedens, 7 polli-
 ces longus; nidum struit marsupii forma apice patulum
 foramine laterali hiantem ex bifurcatura ramorum lirio-
 dendri, platani etc. pendulum.*
 Rostrum plumbeum; tectrices alarum majores nigrae apice
 albo; remiges primores sordidae, margine albo; rectrices
 2 intermediae nigrae, reliquae parte inferiori nigrae, re-
 liqua aurantiae.
 Feminae caput et dorsum olivaceum subfusco marginatum;
 corpus subtus, caudaeque tectrices flavae; cauda ipsa for-
 dida, margine flavo.

spurius. 11. O. niger, subtus fulvus, fascia alarum alba.
 Icterus minor spurius. Briss. av. 2. p. 111. n. 20. t. 10. f. 3.
 Baltimore Bastard. Arct. zool. 2. p. 258. n. 143. Buff. hist.
 nat. des ois. 3. p. 233. pl. enlum. n. 506. f. 2. Latham
 syn. I. 2. p. 433. n. 20. Catesb. Carol. I. t. 49.
*Habitat in America boreali, praecedentis magnitudine, pau-
 lo tamen brevior; nido ex arbore malo pendulo; ovis 5.*
 Dorsi pars inferior tectricesque caudae flavae; alarum mi-
 nores dilute badiae, majores nigrae, margine sordide al-
 bo; remiges sordidae margine albo; cauda nigra cunei-
 formis.
 Feminae caput cervixque olivacea, gula nigra; tectrices ala-
 rum remigesque sordidae margine albo; corpus subtus ex
 virescente flavum; cauda sordida, margine flavo.

- textor. 36. O. flavus, capite fusco cum splendore aureo, remigibus
rectricibusque nigricantibus margine aurantio.
Cap-more. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 226.
Troupiale mâle et femelle du Sénégal. *Buff. planch. enlum.*
n. 375. 376.
Weever-Oriole. *Lath. syn.* I. 2. p. 435. *n.* 21.
Habitat ad fluviū Senegal, voce acuta, galbulae magni-
tudine; uterque sexus nidum struit.
Rostrum cornuum; caput aliquando per biemem flavum; cer-
vix nonnunquam fusca, alac caudaque sordidae flavo mar-
ginatae, et abdomen cum femoribus albicans; irides au-
rantiae; pedes rubescentes.
- Bonana. 12. O. fulvus, capite pectoreque castaneis, dorso, remigibus
rectricibusque nigris.
Icterus minor nidum suspendens. *Sloane jam.* 2. p. 299.
t. 257. *f.* 1.
Xanthornus. *Briff. av.* 2. p. 115. *n.* 22. *t.* 12. *f.* 2.
Xochitotoli. *Herr. mex.* 40. *Raj. av.* p. 167. *n.* 12.
Carouge. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 243. *planch. enlum.*
n. 535. *f.* 1.
Bonana Bird. *Brown. jam.* p. 477. *Lath. syn.* I. 2. p. 436.
n. 22.
Habitat in insulis Americae meridionali obversis, 7 pollices
longus; nidus intertextus e foliorum fibrillis quartam glo-
bi partem efformans sub folio musae, quod parietem ejus
constituit.
Rostrum, dorsi pars superior, remiges et cauda nigra; col-
lum castaneum; uropygium punctis castaneis insignitum;
pedes et unguis grisei.
- nidipen- 37. O. capistro et torque nigris, vertice, collo, dorso cauda-
dulus. que ex rubicundo fuiscis, pectore et abdomine ex fusco
flavis.
Icterus minor, nidum suspendens, watchy Picket, spanish
Nightingale, american Hangnest. *Raj. av.* p. 184. *Sloan.*
jam. p. 300. *n.* 17. *t.* 258. *f.* 3.
Hangnest Oriole. *Lath. syn.* I. 2. p. 437. *n.* 23.
Habitat in Jamaicæ silvis, voce suavi, nido ex arborum
altarum extremis ramis pendulo.
Rostrum album; alac obscurius fuscae, albo intermisso.
- varius. 38. O. niger, subtus, uropygio, et rectricibus alarum mino-
ribus ferrugineus.
Carouge de Cayenne. *Buff. pl. enlum.* *n.* 607. *f.* 1.
Bastard

Bastard Baltimore female. *Catesb. carol.* I. t. 49. f. inf.
 Chesnat and black Baltimore. *Lath. syn.* I. 2. p. 437. n. 24.
Habitat in Cayenna, 6 pollices longus.
Rostrum et pedes ex caeruleo atra; remigum secundaria-
rum margo exterior sordide albus.

Xanthor- 13. O. luteus, gula remigibus rectricibusque nigris.
 nus. *Xanthornus mexicanus.* *Briff. av.* 2. p. 118. n. 23. t. 11. f. 2.
Avis Ayoquantotl. *Hern. mex.* 54. *Seb. mus.* 2. p. 102.
 t. 96. f. 5. *Raj. av.* p. 171.
Carouge du Mexique. *Buff. pl. enlum.* n. 5. f. 1.
Petit Cul- jaune de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 247.
Lesser Bonana Bird. *Edw. glean.* t. 243. *Lath. syn.* I. 2.
 p. 439. n. 25.
Habitat in Jamaica et nova Hispania, 7½ pollices longus.
Rostrum nigricans; rectrices alarum nigrae, plurimae mar-
gine, remiges intus, basin versus albae; pedes et unguis
nigri.

domini- 14. O. niger, corpore postico, rectricibus alarum maculaque
 cens. luteis.
Xanthornus dominicensis. *Briff. av.* 2. p. 121. n. 25. t. 12.
 f. 3.
Carouge de S. Domingue. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 247.
pl. enlum. n. 5. f. 2.
S. Domingo Oriole. *Lath. syn.* I. 2. p. 439. n. 26.
Habitat in nova Hispania, insulisque Jamaica et S. Domini-
ci, 8 pollices longus; cantus galbulae; nidus ab extremis
ramis arborum ad aquas plantatarum positus perae forma
multilocularis. Utrum femina Xanthorni, an cum aya-
nensti et chrysocephalo in unam speciem conjungendus?

Jamacaii. 39. O. flavus, capite, jugulo, humeri macula, alis, cauda-
 que nigris.
Xanthornus brasiliensis. *Briff. av.* p. 120. n. 24.
 Jamacaii. *Raj. av.* p. 75. *Will. orn.* p. 137. t. 42. *Salern.*
orn. p. 221. n. 4. t. 16. f. 5.
Brasilian Oriole. *Lath. syn.* I. 2. p. 439. n. 27.
Habitat in Brasilia, nidum filis affigens musae folio, 10 fere
pollices longus.
Rostrum nigrum, basi caeruleum; rectrices alarum macula
media alba; pedes fusi.

cayanen- 15. O. niger, macula alarum lutea.
 sis. *Xanthornus cayanensis.* *Briff. av.* 2. p. 123. n. 26. t. 9. f. 2.
 Bb 4 Carou-

Carouge de l'isle de S. Thoma. *Buff. hist. nat. des ois. 3.*

p. 248. pl. enlum. n. 535. f. 2.

Yellow-winged Pye. *Edw. glean. t. 322.*

Yellow-winged Oriole. *Lath. syn. I. 2. p. 440. n. 28.*

*Habitat in Cayenna et insula S. Thomae, 8 pollices longus.
Rostrum nigrum; cauda rotundata.*

Ieucopte- 40. O. niger, macula alarum alba.

rus. White-winged Oriole. Lath. syn. I. 1. p. 440. n. 29.

β. White-backed Oriole. Arct. zool. 2. p. 257. n. 141.

White backed Maik-thieves. Kalm it. 2. p. 274.

Habitat in Cayenna, β. ad Noveboracum usque, cayanensis magnitudine.

Rostrum pedesque nigra.

icteroce- 16. O. niger, capite colloque luteis.

*phalus. Xanthornus icterocephalus cayanensis. Briff. av. 2. p. 124.
n. 27. t. 12. f. 4.*

*Cornix atra, capite collo pectoreque flavis. Nov. Comm.
Petr. II. p. 435. t. 15. f. 7.*

Coiffes jaunes. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 217. 250.

Carouge de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 343.

Yellow-headed Starling. Edw. glean. t. 323.

Yellow-headed Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 441. n. 30.

Habitat in Cayenna, 7 pollices longus.

Rostrum nigricans; pedes et unguis fusci.

melan- 17. O. griseus nigro-punctatus, fascia oculorum atra.

cholicus. Fringilla melanolica. Synt. nat. X. 1. p. 180. n. 7.

Xanthornus naevius. Briff. av. 2. p. 126. n. 29.

Shomburger. Edw. av. t. 85. Lath. syn. I. 2. p. 441. n. 31.

*β. Troupiale tacheté de Cayenne. Buff. hist. nat. des ois. 3.
p. 223. pl. enlum. n. 448. f. 1. 2.*

Habitat in nova Hispania, β. in Cayenna, alaudae magnitudine, 6 pollices longus.

Rostrum cum pedibus incarnatum; irides badiae, β. aurantiae; pennae singulae macula media nigricante; remiges et cauda nigricantes margine ex rufo fusco; genae et gula nigra, haec in β. alba.

capensis. 18. O. fusco-olivaceus subtus luteus.

Xanthornus capitis bonae spei. Briff. av. 2. p. 128. n. 30.

*Carouge du Cap de bonne esperance. Buff. planch. enlum.
n. 607. f. 2.*

Carouge

Carouge olive de la Louisiane. *Buff. hist. nat. des ois. 3.*

p. 251.

Olive Oriole. *Arct. zool. 2. p. 260. n. 149. Latham syn.*

I. 2. p. 444. n. 35.

Habitat ad caput bonae speci, et in Louisiana, 7 pollices longus.

Rostrum, pedes et ungues fusca, verticis color in griseum, gulæ jugulique in aurantium vergens, tectrices alarum fuscae, margine et apice olivaceis, remiges fuscae marginé olivaceo.

caeru- 41. O. niger aut cinereus, capite, alis caudaque caeruleis.

leus. *Xanthornus caeruleus. Briss. av. 2. p. 125. n. 28.*

Small blue Jay. Raj. av. p. 95. n. II. t. I. f. II.

Blue Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 444. n. 36.

Habitat in regione Maderaspatana. Rostrum rufum.

viridis. 42. O. viridis, superciliis, genis, gulaque flavis, tectricum alarum nonnullarum apice albo.

Yellow-throated Oriole. Arct. zool. 2. p. 261. n. 150.

Habitat in sinu Hudsonis, 9 pollices longus.

ferrugi- 43. O. niger, pennarum margine ferrugineo, capite et cervi- neus. *ce ex nigricante purpuralcentibus, abdomine sordido.*

Rusty Oriole. Arct. zool. 2. p. 260. n. 146.

Habitat in Noveboraco, 7-8 polices longus.

Rostrum et pedes sordidi; area oculorum nigra; alarum caudaeque splendor virescens.

fusca. 44. O. niger, capite ex ferrugineo fusco, cauda sordida.

Brown headed Oriole. Arct. zool. 2. p. 259. n. 145.

Habitat in Noveboraco, gregarius.

niger. 45. O. totus niger.

Icterus niger. Briss. av. 2. p. 103. n. 15. t. 10. f. 1.

Troupiale noir. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 320. pl. enlum. n. 534.

Black Oriole. Arct. zool. 2. p. 259. n. 144. Latham syn.

I. 2. p. 445. n. 37.

Habitat in America boreali, 10 fere pollices longus, gregarius, vermis et scarabæis viellans, incubationis tempore suavissime cantans; nidum in arboribus struit, 8 circiter pedibus supra terram elatum, et ova 5 parit obscuri coloris, maculis nigris notata.

Femina coloris ex virescente fuscæ; subtus et capite in cinereum colorem vergens.

- minor. 46. O. niger, capitis nigredini caeruleo colore intermixto.
 Petit Troupiale noir. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 221.
 Troupiale de la Caroline. *Buff. pl. enlum.* n. 606. f. 1.
 Lesser black Oriole. *Lath. syn. I. 2.* p. 446. n. 38.
Habitat in America, 6 pollices longus, facile curandus.
Feminæ etiam in alis et cauda color caeruleus intermixtus.
- oliva- 47. O. olivaceus, capite, gula, jugulo, et pectori fuscis, alis
 ceus. nigris.
 Troupiale olive de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 225.
pl. enlum. n. 606. f. 2.
 Cayenne Olive Oriole. *Lath. syn. I. 2.* p. 447. n. 39.
Habitat in Cayenna.
Rostrum et pedes nigra.
- Auna- 48. O. fuscus, macula suboculari mentoque albis, jugulo et
 lischken- pectori ex ferrugineo fuscis.
 sis. Aoonalaschken Oriole. *Lath. syn. I. 2.* p. 447. n. 40.
Habitat in Aunalaschea, 8 pollices longus.
Rostrum et pedes fusca.
- caudacu- 49. O. varius, rectricibus angustis acuminatis.
 tus. Sharp-tailed Oriole. *Arct. zool. 2.* p. 261. n. 151. *Lath.*
syn. I. 2. p. 448. n. 41. t. 17.
Habitat in Noveboraco, alaudae magnitudine.
Rostrum obscurum; vertex fuscus et cinereus; genae fuscae;
pectus, femora et crissum pallide flavescens, maculis fuscis;
abdomen album; dorsum ex cinereo, nigro et albo
varitum; remiges tectricesque alarum fuscae, haec margi-
ne ferrugineo; cauda obscure olivacea, fasciis obsoletis;
pedes pallide fuscus.
- sinensis. 50. O. albus, capite, collo, pectori, et superiore dorsi parte
 cinereis, remigibus chalybeis, cauda rotundata ex chaly-
 beo et albo mixta.
 Kink. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 253. *Latham syn. I. 2.*
p. 448. n. 42.
 Kinck de la Chine. *Buff. pl. enlum.* n. 617.
Habitat in Sina.
Rostrum ex rubicundo fuscum; pedes incarnati.
- aureus. 19. O. flavo-fulvus, capistro, gula, rectricibus primariis re-
 etricumque extremitate nigris.
 Icterus indicus. *Briß. av. app.* p. 37. n. 31.
 Paradisea flavo-fulva. *Muf. Ad. Frid.* 1. p. 15.

Rollier de Paradis. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 149.*
 Golden Bird of Paradise. *Edw. av. t. 112. Lath. syn. I. 2.*
p. 483. n. 8.
Habitat in India, 8 pollices longus.
Rostrum fuscum.

viridis. 51. O. olivaceus, subtus in viridem vergens, alarum apice et tectricibus inferioribus flavis, superioribus et majoribus fuscis flavo marginatis, cauda rotundata.
Icterus minor viridis. Briss. av. 2. p. 113. n. 21. t. 2. f. 2.
Troupiale de S. Domingue, appellé le Sîteur. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 230. pl. enlum. n. 236. f. 1.
Whittler-Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 443. n. 34.
Habitat in insula S. Dominici, 7 fere pollices longus.
Rostrum corneum; pedes et unguis grisei.

furcatus. 52. O. niger, dorso, uropygio, remigibus, caudaque furcata in caeruleum vergentibus, tectricibus caudae inferioribus albis.
Icterus cauda bifida. Briss. av. 2. p. 105. n. 16.
Fork-tailed Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 443. n. 33.
Habitat in nova Hispania.
Rostrum flavum; cauda longa; pedes cum unguibus nigri.

chrysocephalus. 20. O. niger, pileo tectricibus alarum caudaeque luteis.
 phalus. Xanthornus icterocephalus americanus. *Briss. av. app. p. 38.*
t. 2. f. 2.
Goldköpfige gelbschulterichte Atzel. Merrem Beytr. I.
p. 14. t. 3.
Habitat in America, ultra 8 pollices longus, alaudae magnitudine.
Occiput et femora aurea; rostrum nigrum; pedes cum unguibus ex nigro fusi.

53. GRACULA. *Rostrum convexo-cultratum, basi nudiusculum.*
Lingua integra, auctiuscula, carnosæ.
Pedes ambulatorii.

religiosa. 1. Gr. nigro-violacea, macula alarum alba, fascia occipitis nuda flava.
Mainatus. Briss. av. 2. p. 305. n. 49. t. 28. f. 2.
Corvus javanensis. Osb. it. 102.

Sturnus indicus. Bont. jav. 67. Raj. av. p. 68. n. 2.

Mainate. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 416. t. 25.

Mainate des Indes orientales. Buff. pl. enlum. n. 268.

Eontius indian Stare. Will. orn. p. 145. t. 38.

Minor from the Eastindies. Albin. av. 2. p. 35. t. 38.

Lesser Minor or Mino. Edw. av. I. t. 17.

Minor Grakle. Lath. syn. I. 2. p. 455. n. 1.

β. Mainatus major. Briff. av. 2. p. 308. n. 50.

Grand Mainate. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 419.

Greater Minor or Mino. Edw. av. I. t. 17.

Habitat in India, insulisque oceanii indici, $10\frac{1}{2}$ pollices longa, β. major, mansueta, fructibus, cerasis, uvis etc. viettans, in aedibus loquacissima, praestantior psittaco; egregie sibilans.

Rostrum rubrum apice flavum; pedes fulvi; pennae capitidis (exceptis intermeditis) brevissimae, holosericeae; fascia nuda infra oculos fere ad nucham; remiges 2-8 fascia alba.

calva.

2. Gr. subcinerea, capite utrinque nudo.

Merula calva. Briff. av. 2. p. 280. n. 36. t. 26. f. 2.

Merle chauve des Philippines. Buff. pl. enlum. n. 200.

Goulin. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 420.

Iting, Tabaduru, vel Gulin (Palalacae species). Camel. Aet. angl. 23. p. 1397. n. 43.

Bald Grakle. Lath. syn. I. 2. p. 497. n. 2.

Habitat in Philippinis, vorax, viettans fructibus, in cavis arborum, potissimum cocos nidificans.

Rostrum pedesque fusca; latera capitidis, dum irascitur avis, coccinea; linea verticis plumosa nigra.

foetida. **3.** Gr. nigra, remigibus extus caerulecentibus, fascia collari nuda.

Fetid Grakle. Lath. syn. I. 2. p. 460. n. 4.

Habitat in America. Rolander.

Magnitudo picae; caput plumis erectis brevissimis quasi holosericeum; rostrum fere cuculi; nares ovatae nudae; lingua acuta; alae compositis remigibus extus caerulecentes absque alba macula; rectrices aequales.

Barita. **4.** Gr. subgrisea, humeris caeruleis, remigibus extus viridibus.

Monedula tota nigra. Sloan. jam. 2. p. 299. t. 257. f. 2.

Raj. av. p. 185. n. 28.

Boat-

Graculæ omnes extra Europam habitant, rostro crasso, ad latera compresso; ad basim ejus nares exiles; unguis aduncus, acutus; digitorum anteriorum medius basi cum exterioro connexus.

Boat-tailed Grackle. *Arct. zool.* 2. p. 264. n. 154. *Lath.*

syn. I. 2. p. 460. n. 5. t. 18.

Habitat in insulis Antillis, et calidiori Americae borealis parte, hic insectis et zea, ibi musarum fructibus vicitans, quos devastat. Rolander.

Rostrum breviusculum, cultratum, nigricans, basi nudum, subtus albicans; alae complicatis remigibus virides; explicatae remiges intus nigrae; cauda rotundata, viridis dum complicata, et supra concava.

crista-
tella.

5. Gr. nigra, remigibus primoribus basi rectricibusque apice albis, rostro flavo.

Merula sinensis cristata. *Briss. av.* 2. p. 253. n. 21.

Merle huppé de la Chine. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 367. *pl. enlum. 507.*

Chinese Starling or Blackbird. *Edw. av.* 1. t. 19.

Crested Grackle. *Lath. syn. I. 2. p. 464. n. 7.*

*Habitat in Sina, oryza, vermbus, insectis vicitans, egre-
gie loquax et sibilans, 8½ pollices longa.*

*Color nigricans, in caeruleum vergens; irides aurantiae;
frontis pennae elongatae, cristae in modum erigendae; re-
miges majores a basi ad medium usque albae, ceterum ex
atro caeruleae; pedes flavi.*

Saularis. 6. Gr. nigro-caerulecens, abdomine, macula alarum, rectri-
cibusque lateralibus albis.

Lanius bengalensis niger. *Briss. av.* 2. p. 184. *et suppl. p. 41.
n. 19.*

Saularis maderaspatanus. *Raj. av.* p. 197. t. 2. f. 19. 20.

Pie-griesche noire de Bengale. *Buff. hist. nat. des ois.* 1.
p. 299.

Bengal Magpie or Dial-bird. *Alb. av.* 3. p. 17. t. 17. 18.

Little Indian Pie. *Edw. av.* t. 181.

Dial Grackle. *Lath. syn. I. 2. p. 465. n. 8.*

Habitat in Bengala, turdi viscidiori magnitudine.

Femina supra quidem nigra, jugulo tamen et pectore fusca.

Quiscal. 7. Gr. nigro-violacea, cauda rotundata.

Pica jamaicensis. *Briss. av.* 2. p. 41. n. 3.

Pie de la Jamaique. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 97. n. 2.

Purple Jackdaw. *Catesb. carol.* I. p. 12. t. 12.

Barbado's Blackbird. *Brown. jam.* p. 476.

Purple Grackle. *Arct. zool.* 2. p. 263. n. 153. *Lath. syn. I. 2.
p. 462. n. 6.*

Tequix-

Tequixquiacatzanatl. *Fern. Mex.* 21.

Maisdieb. *Kalm it.* 3. p. 33.

Habitat in America septentrionali ad novam Hispaniam et Jamaicam usque, migratoria, suaviter cantans, in arboribus abditarum ut plurimum regionum nidificans, ova pariens 5-6, caerulecentia, maculis striisque nigris insignita, famelica quidem oryza, hordeo, avena, tritico viettans, lubentius tamen zizania aquatica et zea mays, qua consitos agros devastat, hinc Virginianis invisa avis, aqua et igne interdicta, sed injuste, destruit enim bruchos pisii, et prata infestantes vermes, ita ut ea fere extirpata omne gramen comestum viderent 1750. Pensylvaniæ incolae, Caro parum sapida.

Longitudo $13\frac{1}{2}$, feminae $11\frac{1}{2}$ pollicum. Rostrum et pedes nigra; irides argenteæ; cauda longa, cuneiformis, una cum alis purpurea; femina tota, præcipue dorso, alis, caudaque obscura.

Atthis. 8. Gr. viridi-caerulea, abdomine ferrugineo, pedibus sanguineis.

Corvus (aegyptius) viridi-maculatus, dorso medio caeruleo. Hasselq. it. 140. n. 20.

Egyptian Grackle. *Lath. syn. I. 2. p. 466. n. 9.*

Habitat in Aegypto, infestis viettans, alaudae magnitudine, 4 pollices longa.

longiro- 9. Gr. brunnea, subtus ochroleuca, capite et collo atris, fascia collari nuda rugosa, alarum area alba, cauda cuneiformi nigra, tectricibus ferrugineis. *Pall. spicil. 6. p. 5. t. 2. f. 2.*

Longbilled Grackle. *Lath. syn. I. 2. p. 466. n. 10.*

β. Oriolus nobilis, edle Atzel. *Merrem Beytr. I. p. 8. t. 2.*

Habitat in America australi, β. in insulis Sandwich ultra 8 pollices longa.

Rostrum nigrum, longius, quam reliquis speciebus, naribus in medio positis; lingua profunde bifida, marginibus lacertis; irides obscurae; remiges primariae basi oblique albae; pedes longi robusti nigri; habitus gracilis.

β. *Sturni magnitudine; rostri basi nullis setis cincta; naribus semilunaribus; colore splendide nigro, pennarum quorundam bumeralium, et tectricum caudae inferiorum flavo, rectricum extimarum albo, basi extus lutea differt.*

10. Gr.

- sturnina. 10. Gr. cana, verticis macula, dorsoque inter alas violaceo-atro, caudae alarumque nitore viridi, harum striga gemina alba. Pall. it. 3. p. 695.
Habitat in Dauriae australioris salicetis circa Ononem et Argunum, speciosa, habitu, nido, ovorumque colore sturni aemula.
Femina decolor, sordide cinerea, dorso fusco, alis caudaque sine splendore atris.
- cayen-nensis. 11. Gr. striata, supra rufa, subtus flavicans, capite et gula ex rufo et albo variis, cauda cuneiformi acuminata alisque rufis unicoloribus.
Picucule de Cayenne. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 82. pl. enlum. n. 621.
Climbing Grackle. Lath. syn. I. 2. p. 467. n. II.
Habitat in Gujanæ interioribus, pici instar arbores adscendens, 10 pollices longa.
Rostrum nigrum, 2 fere pollicum, paulisper incurvatum; pedes 1½ pollicem longi, cum unguibus nigri.
- caruncu-lata. 12. Gr. cinerea, cauda remigibusque atris, vertice mentoque carunculatis.
Tringa carunculata capensis. Walch Naturf. II. p. 9. t. 2. 17. p. 14.
Cockscomb Stare. Lath. syn. II. 1. p. 9. n. 7.
Habitat ad caput bonaæ spei? 6 pollices longa.

54. PARADISEA. *Rostrum capistro plumis tomentosis tectum.*

Pennae hypochondriorum longiores.

Rectrices duae superiores singulares denudatae.

- apoda. 1. P. pennis hypochondriorum corpore longioribus, rectricibus duabus intermediis longis setaceis.
Manucodiata. Briss. av. 2. p. 130. n. 1. t. 13. f. 1. Raj. av. p. 20. n. 1. p. 21. n. 3. 5. 6. 7. p. 22. n. 8. 9. Marcgr. brasili. 201.
Paradisea lutea, cauda, pectore abdomineque brunneis, gula azurea. It. Wgoth. 139. Mus. Ad. Frid. 1. p. 15.
Oiseau de Paradis. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 151. t. 12. pl. enlum. n. 254.

Para-

Paradisea avis. *Clus. exot.* 360. *Olear. mus.* 24. t. 13. f. 1.

Seb. mus. I. p. 24. t. 13. f. 1. *Hern. mex.* 317. t. 318.

Worm. mus. 294. f. 294. *Bradl. nat.* t. 12. f. 1. 2. *Calceol. mus.* 669. t. 673. *Besl. mus.* 92. t. 9. f. 1.

Birds of Paradise. *Will. orn.* p. 91. n. 1. p. 92. n. 3. 5. 6. 7. p. 93. n. 8. 9. t. II.

Greater Bird of Paradise. *Albin. av.* 3. t. 9. *Edw. av.* t. 110. *Lath. syn.* I. 2. p. 471. n. 1.

Great Bird of Paradise from Aroo. *Forr. it.* p. 135.

β. Smaller Bird of Paradise from Papua. *Forr. it.* p. 137.

Habitat in insulis Moluccis, et reliquis novae Guineae viciniis, anni tempore humido in novam Guineam revertens; gregatim volat, duce praeante, sturnorum in morem clamitans, audax, ornamenti et mercaturae in India matries, apoda perperam dicta veteribus.

Femina rectricibus modo 2 intermediis brevioribus; sunt haec apice attenuatae, nudae, rectae; cauda perperam dicta sunt pennae elongatae dorsi et hypochondriorum.

β. minor, in arboribus altis nidificat, maris collo et rostro longioribus.

regia. 2. P. rectricibus duabus intermediis filiformibus, apice lunato-pennaceis. *Mus. Ad. Fr.* I. p. 15.

Rex avium paradisaearum. *Pet. gaz.* I. t. 53. f. 2. *Clus. exot.* 362. t. 362. *Olear. mus.* 24. t. 13. f. 2. *Raj. av.* p. 22. n. 10. *Seb. mus.* I. t. 38. f. 5.

Manucodiata minor. *Briff. av.* 2. p. 136. n. 2. t. 13. f. 2.

Manucode. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 163. t. 13. pl. enlum. n. 496.

Roi des oiseaux de Paradis. *Sommer. it.* p. 156. t. 95.

Supposed King of the greater birds of Paradise. *Will. orn.* p. 96. t. 77. *Edw. av.* t. III.

King's Bird. *Forr. it.* p. 141. n. 7.

King Paradise Bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 475. n. 2.

Habitat in Aroo reliquisque oceani indici insulis, humido anni tempore novam Guineam repetens, alaudae magnitudine,

Aves hujus generis in nova Guinea potissimum habitant, ex hac sicco anni tempore in vicinas insulas migrantes, paucos modo gradus ab aequatore distantes; ficas (Seb. mus. I. t. 60. f. 1. 2. 3.) e psittacis aliisque vendidit saepe museis astus Sinensium. Nares exiguae, pennis rectae; cauda rectricibus 10, 2 intermediae basi et apice modo barbatae; pedes magui robusti, digitorum anteriorum medius primo articulo exteriori connexus.

tudine, 5 pollices circiter longa, praecedente rarior, solitaria, baccas rubras appetens.
Purpurea, pectorali caerulecente; cirrhi caudae longissimi; pennae sub alis reliquis longiores, quamvis cauda breviores et truncatae.

- tristis. 3. P. area nuda pone oculos triangulari, capite colloque fuscis. Merula philippensis. Briss. av. 2. p. 278. n. 35. t. 26. f. 1. Martin. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 423. pl. enlum. n. 219. Paradise Grakle. Lath. syn. I. 2. p. 458. n. 3.
Habitat in insulis Philippinis, omnivora, vorax, oestris boum dorso infixis, gryllis, aliis insectis, bis deficientibus ipsis columbarum pullis, rattis, fructibus, dactylis, uvis, frumento vietitans, bis in anno nidum in bifurcationibus palmarum struens, ova 4 pariens, junior facile cicuranda, docilis et imitabunda.
Magnitudo monedulae; longitudo $9\frac{1}{2}$ pollicum; rostrum et pedes flavi; corpus subfuscum; remiges primores a basi ad medium albae; rectrices, exceptis intermediis, apice albae. Ob rostri basin plumis tomentosis tectam huic generi, ceterum graculis magis affinis.
- magnifi- 4. P. supra spadiceus, gula viridi lunulis aureis, cervicis fasciculo pennarum flavarum.
ca. Magnifique de la nouvelle Guinée, ou Manucode à Bouquets. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 166.
Oiseau de Paradis, surnommé le Magnifique. Buff. planch. enlum. n. 631. Sonner. it. p. 163. t. 98.
Magnificent Paradise Bird. Latham syn. I. 2. p. 477. n. 3. t. 19.
Habitat in nova Guinea, monedulae magnitudine, 9 pollices longa.
Remiges primores fuscae; secundariae profunde flavae; remiges intermediae longissimae, barba brevissima; pedes et rostrum flava; hoc apice et basi nigrum.
- nigra. 5. P. nigra, subtus obsolete viridis, occipite, nucha, cervice, et media abdominis fascia laetius viridibus aureo-lunulatis, arcu aureo cum lunulis rubris ab angulo oris ad gulari protenso.
Goget Paradise Bird. Lath. syn. I. 2. p. 478. n. 4. t. 20.
Habitat in insulis oceanii indici, monedulae magnitudine. Rectrices 12 inaequales; 2 intermediae 22, extimae 5 mode pollices longae.

- superba. 6. *P. subcristata viridi aurea*, subtus laete viridis, gula violacea, alis nigris, caudae splendore caerulecente.
Manucode noir de la nouvelle Guinée, dit le Superbe. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 169. pl. enlum. n. 632.*
Oiseau de Paradis à gorge violet, surnommé le Superbe. *Sonner. it. p. 157. t. 96.*
Superb Paradise Bird. *Lath. syn. I. 2. p. 479. n. 5.*
Habitat in nova Guinea.
Rostrum nigrum; pedes fuscii; sub alis fasciculus plumarum nigrarum tomentosarum in dorso conspicuus.
- aurea. 7. *P. cristata nigra*, verticis, genarum et gulæ nitore violaceo, jugulo, pectori, maculaque cervicis viridi-aureis.
Sifilet ou Manucode à six filets. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 171. pl. enlum. n. 633.*
Oiseau Paradis à gorge dorée. *Sonner. it. p. 158. t. 97.*
Gold-breasted Paradise Bird. *Lath. syn. I. 2. p. 481. n. 6.*
Habitat in nova Guinea, turturis magnitudine.
Rostrum et pedes nigricant; irides flavent; crista pene erecta, pennis aliquot dimidia parte albis, reliquis totis nigris; ad utrumque capitis latus tres pennae praeter apicem imberbes, adeo longae, ut primam caudae cuneiformis quartam partem attingant.
- viridis. 8. *P. thalassina*, dorso, abdomine, uropygio caudaque chalybeis.
Calybé de la nouvelle Guinée. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 173. pl. enlum. n. 634.*
Oiseau de Paradis verd. *Sonner. it. p. 164. t. 99.*
Blue green Paradise Bird. *Lath. syn. I. 2. p. 482. n. 7.*
Habitat in nova Guinea, 16 pollices longa.
Rostrum crassum, nigrum; pluinae capitis tomentosae.
- alba. 9. *P. tota alba*. *Penn. ind. zool. n. 5.*
 $\beta.$ *Paradisea anterius nigra, posterius alba*. *Penn. ind. zool. n. 5. $\beta.$*
Habitat rarissima in insulis Papuanis.

55. TROGON. *Rostrum capite brevius, cultratum, aduncum, margine mandibularum ferratum.*

Pedes scandorii.

- frigilatus. 1. *Tr. cinereus*, alis strigis albis.
Trogon cayanensis cinereus. *Briff. av. 4. p. 165. n. 1. t. 16.*
f. 1. Ger. orn. 2. p. 53. t. 188.

Courou-

Couroucou de la Guiane. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 293.*
pl. enlum. n. 765.
 Cinereous Curucui. *Lath. syn. I. 2. p. 489. n. 3.*
Habitat in Guiana, Cayenna, monedula paulo major, 12 $\frac{1}{2}$
pollices longus.
Rostrum, pedes et ungues obscure cinerea; abdomen, et
rectrices caudae inferiores aurantia; cauda nigricans.

- Curucui. 2. Tr. viridi-aureus, subtus fulvus, gula nigra.
Trogon brasiliensis viridis. Briss. av. 4. p. 173. n. 4.
 Picis congener Curucui. *Klein av. p. 28.*
Curucui Brasiliensis. Marcgr. bras. p. 211. Will. orn.
p. 296. t. 22. Raj. av. p. 45. n. 4. Jonst. av. p. 216. t. 60.
Tzinitzean. Fern. nov. Hisp. c. 43. p. 23. Nieremb. hist.
nat. 230. Will. orn. 303. Raj. av. 163.
 Couroucou à ventre rouge. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 207.*
t. 14.
 Couroucou à ventre rouge de Cayenne. *Buff. pl. enl. n. 452.*
 Red-bellied Curucui. *Lath. syn. I. 2. p. 485. n. 1.*
 Rothbauchichter Kuruku. *Merrem Beytr. 2. p. 37. t. 9.*
 $\beta.$ Tr. rectricibus alarum fuscis, area nuda infra oculos nulla.
Avis anonyma tertia. Marcgr. bras. p. 219.
 $\gamma.$ Tr. abdomine flavo.
Psittacus flammeus viridis et cinereus, rostro serrato. Feuill.
suit. de journ. p. 20.
 Green yellow-bellied Cuckow. *Edw. glean. t. 331.*
 Grüner Kuckuk mit dem gelben Bauch. *Seligm. ausl. Voe-*
gel. 9. t. 21.
 $\delta.$ Tr. cinereus intermisto viridi-aureo, cauda longa.
 Couroucou gris à longue queue de Cayenne. *Buff. hist. nat.*
des ois. 6. p. 288. pl. enlum. n. 737.
Habitat in nova Hispania, Brasilia, Peru, $\delta.$ in Cayenna,
solitarius in densissimis silvis, non cicurandus; in cavis
arboribus bis in anno 3-4 ova alba, columbinis aequalia
pariens, pullosque prodeentes vermicibus et insectis nutriens;
pica paulo minor, 10 $\frac{1}{2}$ pollices longus.
Rectrices laterales fasciis albis nigrisque; intermediae apice
nigrae.

Cc 2

3. Tr.

Aves hujus generis in calidiori modo climate obviae solitariae degunt in densarum hu-
 midarumque silvarum arboribus, barumque ramis inferioribus; brevissime volant,
 insectisque videntur; corpus prodiculum, pedes breves; canda longissima, ex 12
 rectricibus constans.

a viola-
 . Buff.
 uperbe.
 marum
 e viola-
 ureis.
 ois. 3.
 97.
 n. 6.
 erecta,
 nigris;
 cem im-
 is quar-
 ue cha-
 s ois. 3.
 7.
 ae.
 ad. zool.
 ratum,
 libula-
 i. t. 16.
 Courou-

- viridis. 3. Tr. viridi-aureus, subtus luteus, gula nigra, fascia pedo-
rali viridi-aurea.
Trogon cayanensis viridis. Briss. av. 4. p. 168. n. 2. t. 17.
f. 1.
Couroucou à ventre jaune. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 291.
Couroucou de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 195.
Yellow-bellied Curucui. Lath. syn. I. 2. p. 488. n. 2.
β. Trogon cayennensis viridis, ventre candido. Briss. av. 4.
p. 170. n. 3.
Couroucou verd à ventre blanc de Cayenne. Buff. hist. nat.
des ois. 6. p. 293.
Habitat in Cayenna, $11\frac{1}{2}$ pollices longus.
- rufus. 4. Tr. rufus, abdomine, crisco, femoribusque flavis, tecibus alarum nigro et griseo striatis, remigibus reétricum-
que medianarum apicibus nigris.
Couroucou à queue rousse de Cayenne. Buff. hist. nat. des
ois. 6. p. 293. pl. enlum. n. 736.
Rufous Curucui. Lath. syn. I. 2. p. 490. n. 4. t. 21.
Habitat in Cayenna, 9 pollices longus.
Remigum margo obscurus; rectrices utrinque 3 exteriore
striis transversis nigris et albis, apice albo; abdomen pe-
desque obscura.
- viola-
ceus. 5. Tr. violaceus, superciliis flavis, dorso uropygioque viridi-
aureis, alis fuscis, rectricibus intermediis ex caerulecenti
viridibus apice nigris.
Lanius capite, collo pectoreque e violaceo nigricantibus,
digitis duobus anticis totidemque posticis. Koelreuter nov.
act. Petrop. II. p. 436. n. 7. t. 16. f. 8.
Couroucou à chaperon violet. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 294.
Violet-headed Curucui. Lath. syn. I. 2. p. 491. n. 5.
Longitudo $9\frac{1}{2}$ pollicum; rostrum plumbeum, apice albidum,
versus frontem nigricans; rectrices caudae superiores vi-
ridi-aureae; rectrices 2, 2, partim ex caerulecenti viri-
des, partim nigrae, tres extimae nigrae, lineis et apici-
bus albis.
- macula-
tus. 6. Tr. fuscescens, lineis obscuris, vertice viridi, alarum mar-
ginibus, caudaeque obscurae lineis, remigum secunda-
riarum et tecium alarum apicibus albis.
Spotted Curucui. Brown. illustr. t. 13. Lath. syn. I. 2. p.
491. n. 6.
Habitat in Zeylon.
Rostrum fuscum.

- fasciatus. 7. Tr. fascia pectorali alba.
 Fasciated Curucui. *Ind. zool. t. 5.* *Lath. syn. I. 2.* p. 492.
 n. 7.
Trogon ceylonensis. *Briff. av. 4.* n. 7.?
Band-Kuruku. *Walch Naturf. 17.* p. 17.
Habitat in Zeylonae arboribus emortuis, in altis arboribus
nidificans.
Rostrum nigrum, crassum, paulisper arcuatum, basi setis
circumseptum; orbitae nudae, caeruleae; irides flavae;
caput collumque nigra; abdomen ex rubente aurantium;
dorsum lomentaceum; tectrices caudae griseae; tectrices
alarum cum humeris albo et nigro undulatae; remiges et
pedes obscuri; cauda praelonga, inaequalis, apice nigra.

56. BUCCO. *Rostrum cultratum, lateraliter compres-*
sum, apice utrinque emarginato, in-
curvato, rectu infra oculos protenso.
Nares pennis recumbentibus obtectae.
Pedes scansorii.

- Tamatia. 2. B. ex rufo fuscus, subtus ex rufo albus, nigro maculatus,
 gula aurantia, torque dimidiato.
 Tamatia. *Raj. av. p. 65.* n. 6. *Will. ornith. p. 190.* t. 59.
Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 94.
 Barbu à ventre tacheté de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 746.*
 Spotted bellied Barbet. *Lath. syn. I. 2.* p. 494. n. 1.
Habitat in Cayenna et Brasilia solitarius, in locis abditis,
in primis silvis, vicitans insectis, carne insipida; 6½ pol-
lices longus.
Caput praegrande; rostrum nigrum; vertex et frons rufes-
cunt; pone oculos area magna nigra; pedes nigri.

- cayen- 3. B. niger, subtus ochroleucus, fronte gulaque rubris.
 nensis. *Bucco Cayennensis.* *Briff. av. 4.* p. 95. n. 2. t. 7. f. 1.
Tamatia à tête et gorge rouges. *Buff. hist. nat. des ois. 7.*
 p. 96.
 Barbu de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 206.* f. 1.
 Cayenne Barbet. *Lath. syn. I. 2.* p. 495. n. 2.
 3. *Bucco Cayanensis naevius.* *Briff. av. 4.* p. 97. n. 3. t. 7. f. 4.
 Barbu de S. Domingue. *Buff. pl. enlum. n. 746.* f. 2.
 Yellow Woodpecker with black spots. *Edw. glean. t. 333.*

*Habitat in Cayenna, Guiana, insula S. Dominici, alaudae cristatae magnitudine 7 pollices longa.
β. subtus flavus, maculis nigris.*

- capensis. 1. B. rufus fascia humerali fulva, pectorali nigra.
Bucco. Briff. av. 4. p. 92. n. I. t. 6. f. 2.
Tamatia à collier. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 97. t. 4.
Barbu à collier de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 395.
Collared Barbet. Lath. syn. I. 2. p. 497. n. 3.
*Habitat in Guiana, ravior, 7½ pollices longus.
Rostrum corneum; pedes et unguis cinerei.*
- elegans. 4. B. viridis, capite gulaque rubris caeruleo marginatis, remigibus fuscis, jugulo et pectore flavo, hoc rubro-maculato, abdomine ochroleuco viridi-maculato.
Bucco Maynanensis. Briff. av. 4. p. 102. n. 5. t. 7. f. 3.
Beau Tamatia. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 98.
Barbu des Maynas. Buff. pl. enlum. n. 330.
Beautiful Barbet. Lath. syn. I. 2. p. 498. n. 4.
*Habitat in provincia Maynas ad Amazonum fluvium, reliquis speciebus agilior, passeris magnitudine, 6 fere pollices longus.
Rostrum, pedes et unguis cinerei; illius apex ochroleucus; ab angulo oris stria utrinque caerulea; cauda cuneiformis, rectricibus 10; remigum margo viridis.*
- macro- 5. B. niger, fronte, rectricum apice subtusque albus, fascia pectorali nigra.
rhynchos. Tamatia noir et blanc. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 99.
Le plus grand Barbu à gros bec de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 689.
Greater pied Barbet. Lath. syn. I. 2. p. 498. n. 5.
*Habitat in Cayenna, 7 pollices longus.
Rostrum prae grande; pedes obscuri.*
- melano- 6. B. niger, humerorum macula, stria pone oculos, caudae apice et subtus albus, fascia pectorali nigra.
leucos. Tamatia noir et blanc. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 99.
Le plus petit Barbu à poitrine noire de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 688.
Lesser pied Barbet. Lath. syn. I. 2. p. 499. n. 6.

Habi-

Aves hujus generis, in Africa, potissimum in Asia et America calidiori inquilinae, stupidae; rostrum robustum, rediunculum, setis fere penitus obtectum; rectrices plurimque 10 debiles.

Habitat in Cayenna, 5 pollices longus.

Rostrum magnum, apice bifidum; fronti candor intermixtus; gula et colli latera alba; hypochondriis nigredo adspersa; pedes obscuri.

philippi- 7. B. viridis, vertice (maris) fasciaque pectorali rubris, area
nensis. oculorum, gula, jugulo subtusque flavus.

Bucco philippensis. Briss. av. 4. p. 99. n. 4. t. 7. f. 2.

Barbu à gorge jaune. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 102. t. 5.

Barbu des Philippines. Buff. pl. enlum. n. 331.

Yellow-throated Barbet. Lath. syn. I. 2. p. 500. n. 7.

Habitat in insulis Philippinis, passeris magnitudine, 5½ pollices longus.

Rostrum et unguis fusca; color subtus sordide flavus, striis longitudinalibus obscure viridibus; pedes flavicantes. Feminae area oculorum, jugulum et pectus ex flavicante alba; neque in pectore neque in capite rubor ullus.

niger. 8. B. niger, subtus albus, stria supraoculari flava utrinque ad collum producta, torque albo.

Barbu de l' isle de Luçon. Sonner. it. p. 68. t. 34.

Barbu à gorge noire. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 103.

Black threatened Barbet. Lath. syn. I. 2. p. 501. n. 8.

β. Bucco capitinis bonae speci.

Barbu à plastron noir. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 104.

Barbu du cap de bonne esperance. Buff. pl. enlum. n. 688.

f. I.

Habitat in insulis philippinis, β. in capite bonae speci.

Pennae laterales colli dorsoque macula flava; tectrices alarum 4 fimbria alba, 1 fimbria flava; reliquae infra hanc ad apicem flavo-maculatae; remiges nigrae, margine flavo; rectrices praeter 4 intermedias fimbria flava; pedes rostrumque nigra.

β. supra ex fusco et flavo mixtus; uropygium splendide flavescens; cauda fusca, margine flavo.

parvus. 9. B. ex nigricante fusca, subtus albus fusco-maculatus, gula flava.

Petit Barbu. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 105.

Barbu du Sénégal. Buff. pl. enlum. n. 746. f. 2.

Little Barbet. Lath. syn. I. 2. p. 503. n. 9.

Habitat ad fluviem Senegal, 4 pollices longus.

Rostrum fuscum; stria alba ab angulis oris infra oculos; pedes incarnati; color supra nitore fulvo, in alis caudaque viridi.

- grandis. 10. B. viridis, tectricibus caudae inferioribus rubris.
 Grand Barbu. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 106.
 Grand Barbu de la Chine. *Buff. pl. enlum.* n. 871.
 Grand Barbet. *Latham syn.* I. 2. p. 503. n. 10.
Habitat in Sina, 11 pollices longus.
Rostrum albicans, apice nigrum; color capitidis et juguli in
caeruleum, cervicis et dorfi in badium vergens; pedes
obscure flavi.
- viridis. 11. B. viridis, capite et collo ex griseo fuscis, area oculorum
 alba.
 Barbu vert. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 107.
 Barbu de Mahé. *Buff. pl. enlum.* n. 870.
 Green Barbet. *Lath. syn.* I. 2. p. 504. n. 11.
Habitat in India, 6½ pollices longus.
Rostrum albicans; remiges majores fuscae; pedes obscuri.
- Lathami. 12. B. olivaceus, remigibus caudaque obscuris, facie mento-
 que ex subfusco rufescente.
 Buff faced Barbet. *Lath. syn.* I. 2. p. 504. n. 12. t. 22.
*Longitudo 6 pollicum, rostrum pallidum; pedes cum ungu-
 bus flavi.*
- fuscus. 13. B. fuscus, macula pectoris magna trianguli alba.
 White breasted Barbet. *Lath. syn.* I. 2. p. 505. n. 13.
Habitat in Cayenna, alaudae magnitudine, 7 pollices longus.
Rostrum ex subfusco atrum, basi flavum; cauda cuneiformis.
- rubrica-
 pillus. 14. B. vertice gulaque coccineis, dorso, tectricibus alarum, et
 cauda viridibus, abdomine albo, pectore flavo stria trans-
 versa nigra, altera rubra.
 Red-crowned Barbet. *Brown's Illustr.* p. 30. t. 14. *Lath.*
syn. I. 2. p. 505. n. 14.
Habitat in insula Zeylon, 5½ pollices longus.
Rostrum obscurum; linea nigra supra utrumque oculum ad
genas; supra humeros utrinque area magna albicans; re-
ctrices exteriores obscurae; pedes rubricundi.
- Zeylan-i-
 cus. 15. B. viridis, genis nudis flavis, capite colloque pallide fuscis.
 Yellow-cheeked Barbet. *Brown's illustr.* p. 34. t. 15. *Lath.*
syn. I. 2. p. 506. n. 15.
Habitat in insula Zeylon, praecedentis magnitudine.
Rostrum rubrum; pedes pallide flavi.

dubius. 16. B. niger, subtus ruber, fascia pectorali crissaque nigris.

Barbican. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 132.

Barbican des côtes de Barbarie. *Buff. pl. enlum.* n. 602.

Doubtfull Barbet. *Lath. syn.* I. 2. p. 506. n. 16.

Habitat in maritimis Barbariae, 9 pollices longus, inter Ramphastum et Buccanem ambiguus, huic tamen patria, lingua carnosa, setisque basin rostri obsidentibus propior. Rostrum rubens; pedes breves, ex rubente fuscum.

cinereus. 17. B. niger, subtus cinereus, rostro miniato, cauda rotunda.

Wax billed Barbet. *Lath. syn.* I. 2. p. 507. n. 17.

Habitat in Cayenna, 11½ pollices longus.

Tectrices alarum corpori proximae ex nigro et albo variae; pedes obscuri.

57. CUCULUS. *Rostrum teretiusculum.*

Nares margine prominulae.

Lingua sagittata, plana, integra.

Pedes scandorii.

canorus. I. C. cauda rotundata nigricante albo-punctata. *Fn. suec.* 96.

Scop. ann. I. p. 44. n. 48. *Nozem. nederl. Vogel,* t. 61.

Cuculus. *Gesn. av.* 363. *Aldrov. ornith.* I. p. 409. 415. t. 414. 416. *Bell. av.* 22. *Briff. av.* 4. p. 105. n. I.

Cuculo. *Olin. uccell.* p. 38.

Coucou. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 305. *pl. enlum.* n. 811.

Cuckow. *Brit. zool.* I. n. 82. t. 36. *Arct. zool.* 2. p. 266. n. A. *Raj. av.* p. 23. *Will. orn.* p. 97. t. 10. 77. *Albin. av.* I. t. 8. *Hayes brit. Birds* t. 17. 18. *Latham syn.* I. 2. p. 509. n. I.

Kuckuk. *Frisch av.* t. 40. 41. *Kram. el.* p. 337. *Bloch Besch. der berl. Naturf.* 4. p. 582. t. XVIII. f. I.

β. Cuculus rufus. *Briff. av.* 4. p. 110. n. I. A.

γ. Cuculus griseo-undulatus, rectricibus intermediis ordine punctorum alborum dupli notatus, rostro, orbitis pedibusque sulphureis. *Beseke Schr. der berl. naturf.* Ges. 7. p. 452.

Habitat in Europa et septentrionali Asia, 14 pollices longus, passeribus et insectis corumque larvis viettans, non raro migratorius; more aliarum avium ventriculum ante intestina positum habens.

Incubare ipse impotens, ova sordide alba, maculis chalybeis et ferrugineis notata hina vel unum in alienis nidis parit, in primis in motacillarum, quae incubant, et nutriunt enim pullum mensibus aestatis pulcherrimis frondescientiae, florescentiae, grossificationis, dum cuculus aridis insidens arborum ramis famelicus semper cuculans advocat nutricem.

capensis. 23. *C. virente fusca, subtus albus nigro lineatus, genis, gu- la, jugulo, cauda et tectricibus alarum superioribus ru- fis, rectricum apice albo.*

Coucou du cap de bonne esperance. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 353. pl. enlum. n. 390.

Cape Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 513. n. 2.

Habitat in capite bonaee spei, canoro minor.

Rostrum et pedes fusca; irides flavae.

orienta- 2. C. cauda rotundata, corpore nigro-virente nitente, rostro lis. fusco.

Cuculus indicus niger. Briff. av. 4. p. 142. n. 18. t. 10. f. 1.

Coucou noir des Indes. Buff. pl. enlum. n. 274. f. 1.

Coukeel. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 383. n. 1.

Eastern black Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 518. n. 10.

β. C. corpore nigro-caerulecente, rostro nigro.

Coukeel. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 383. n. 2.

Habitat in India, 16, β. 14 pollices longus.

Pedes ex griseo fusci; unguis nigri.

minda- 3. C. cauda rotundata, corpore viridi aureo fusco albo macu- nensis. lato, subtus albo nigricanteque undulato.

Cuculus mindanensis naevius. Briff. av. 4. p. 130. n. 12. t. 12. f. 1.

Coucou varié de Mindanao. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 373. pl. enlum. n. 277.

Mindanao Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 515. n. 5.

Habitat in insulis Philippinis, praesertim Mindanao, 14½ pollices longus.

Gula jugulumque fusca, maculis albis; remiges fuscae, barba exteriore maculis rufis, interiore albis notata; cauda fusco-aurea, fasciis transversis rufis; rectricum quarun- dam apex albus. Pedes cum unguibus grisei.

Vetula. 4. C. cauda cuneiformi, corpore subfuscō: subtus testaceo, ci- liis rubris.

Cuculus jamaicensis longirostris. Briff. av. 4. p. 116. n. 5. t. 17. f. 2.

Cucu-

Cuculus cinereus rostro longiore. Feuillée per. p. 416.
Picus major leucophaeus s. canescens, pluviae avis et senex
dictus. Raj. av. p. 182. n. 13.
Cacco. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 402.
Coucou à long bec de la Jamaïque. Buff. pl. enlum. n. 772.
Other sort of Old man or Rain-Bird. Sloan. jam. p. 313.
n. 53. t. 258. f. 2.
Long billed Rain Cuckow. Latham syn. I. 2. p. 535. n. 32.
Habitat in Jamaicæ silvis et dumetis, mansuetus, pluvia
instante clamitans, breviter volans, picae instar ince-
dens, seminibus, vermicibus, scarabaeis, serpentibus mi-
noribus, ranis, lacertis, aviculis, rassis viettans, 15
pollices longus.
Rostrum sesquipollice longius, mandibula superiore nigra,
inferiore albicante; vertex fuscus; palpebrae punctis coc-
cineis; gula jugulumque albida; rectrices 2 intermediae
ex cinereo olivaceæ; reliquæ nigræ, apice albo; pedes
ex caeruleo atri.

- pluvialis. 24. C. ex cinereo olivaceus, subtus rufus, gula juguloque*
albis.
Cuculus jamaicensis. Briff. av. 4. p. 114. n. 4.
Coucou dit le Vieillard ou l'oiseau de pluie. Buff. hist. nat.
des ois. 6. p. 398.
Old man or Rainbird. Raj. av. p. 182. n. 12. Sloan. jam.
p. 312. n. 52. t. 258. f. 1. Brown. jam. p. 476.
Rain Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 536. n. 33.
Habitat in Jamaica, vetulæ affinis, 16–17 pollices longus.
Rectrices extimæ margine albo.
- minor. 25. C. ex cinereo olivaceus, subtus rufescens, mento albo.*
Petit vieillard. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 401.
Coucou des Paletuviers de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 813.
Mangrove Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 537. n. 34.
Habitat in Cayenna, 12 pollices longus, infectis potissimum
coleopteris viettans, ceterum pluviali similis.

- glanda-*
rius. 5. C. cauda cuneiformi, capite suberistato, fascia oculari nigra.
Cuculus Andalusiae. Briff. av. 4. p. 126. n. 10.
Grand Coucou tacheté. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 361.
Great spotted Cuckow. Edw. av. t. 57. Latham syn. I. 2.
p. 513. n. 3.
Habitat in Andalusia, picae magnitudine.
Rostrum nigrum; crista ex caerulecente cinerea; humeri,
rectrices alarum superiores et caudae fusca, maculis exi-
guis

guis albis et pallide cinereis; remiges fuscae; cauda nigricans, apice albo.

ferratus. 26. *C. niger*, speculo alarum albo. *Sparrmann mus. Carlson.*
n. 3.

*Habitat ad caput bonae spei, ex virescente et caerulecentे
splendide niger.*

*Macula alarum superne et infra ferrata; cauda corpore
longior.*

tahitius. 27. *C. fuscus*, subtus albus fusco striatus, superciliis albis, remigibus ferrugineo maculatis.

Coucou brun varié de noir. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 376.
Ara Wereroa. *Cook it.* 4. p. 272.

Society Cuckow. *Lath. syn.* I. 2. p. 514. n. 4.

Habitat in insulis Societatis, picae magnitudine, 19 pollices longus.

*Rostrum mandibula superior nigricans, inferior pallida; irides
pallide flavae; crissum album; cauda cuneiformis, lineis
transversis ex ferrugineo fuscis, apicibus albis; pedes vi-
rescentes.*

*senega-
lenfis.* 6. *C. cauda cuneiformi*, corpore griseo subtus albo, pileo re-
ctricibusque nigricantibus.

Cuculus senegalensis. *Briff. av.* 4. p. 120. n. 7. t. 8. f. 1.

Coucou du Sénégal. *Buff. pl. enlum.* n. 332.

Rufalbin. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 370.

Strait-heeled Cuckow. *Lath. syn.* I. 2. p. 525. n. 18.

*Habitat ad fluvium Senegal; canoro major, 15 $\frac{1}{4}$ pollices
longus.*

*Rostrum nigrum; uropygium et rectrices caudae superiores
fuscæ, striis profundioribus; remiges rufæ, apice sub-
fuscæ; pedes et unguis grisei; posteriorum internus rectus,
longior.*

*benga-
lenfis.* 28. *C. ferrugineus* albo lineatus, subtus ex flavicante fuscus,
cauda cuneiformi.

Lark-heeled Cuckow. *Brown. illustr.* p. 26. t. 13. *Lath.*
syn. I. 2. p. 525. n. 19.

Habitat in Bengala, alauda major.

*Rostrum obscurum; remiges ex rubente fuscæ, et praeter 1
et 2 nigro lineatae; rectrices exteriore obscure apice fuscæ,
reliquæ lineis nigris et angustioribus fuscis notatae;
pedes nigri; unguis posteriorum interior longus rectus.*

- honora- 7. C. cauda cuneiformi, corpore nigricante albo maculato,
tus. subtus albo cinereoque fasciato.
Cuculus malabaricus naevius. *Briss. av. 4. p. 136. n. 15.*
t. 11. A. f. 2.
Cuil. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 375.*
Coucou tacheté de Malabar. *Buff. pl. enlum. n. 294.*
Sacred Cuckow. *Latham syn. I. 2. p. 526. n. 20.*
Habitat in Malabaria, reptilibus viettans, hinc forte inco-
lis sacratus, canoro minor, 11½ pollices longus.
Remiges et cauda cinereae, transversim albo maculatae; pe-
des et unguis pallide cinerei.
- puncta- 8. C. cauda cuneiformi, corpore nigricante rufo-punctato,
tus. subtus rufo strigis nigris, rectricibus rufo-fasciatis.
Cuculus indicus naevius. *Briss. av. 4. p. 134. n. 14. t. 10.*
f. 2.
Coucou brun piqueté de roux. *Buff. hist. nat. des ois. 6.*
p. 377.
Coucou tacheté des Indes orientales. *Buff. pl. enlum. n. 771.*
Rufous spotted Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 517. n. 8.*
Habitat in India et insulis Philippinis, canoro major, 16½
pollices longus.
Rostrum cornuum; a basi ejus ad aures infra oculos fascia
rufa; pedes ex griseo fuscii; unguis nigricans.
- panaya- 29. C. ex atro fuscus, maculis ex rufo flavis, subtus rufus, striis
nus. transversis nigris, gula nigra, cauda aequali.
Coucou tacheté de l'isle de Panay. *Sonner. it. p. 120. t. 78.*
Panayan Spotted Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 517. n. 9.*
Habitat in insula Panay, punctato satis similis, canoro major.
Rostrum nigrum; irides flavae; maculae capitidis, collis, dorfi,
gulae, teccicum alarum ex rufo flavae oblongae, remi-
gium transversae flavicantes, nigris admixta; cauda ex
rufo flava, nigro cancellata; pedes plumbi.
- naevius. 9. C. cauda cuneiformi, corpore fusco ferrugineoque, jugulo
strigis fuscis, rectricibus apice rufescens.
Cuculus cayanensis naevius. *Briss. av. 4. p. 128. n. 11. t. 9.*
f. 1.
Coucou brun varié de roux. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 411.*
Coucou tacheté de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 812.*
Spotted Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 539. n. 38.*
β. Cuculus gula grisea, rectricibus lateralibus apice, et abdo-
mine albis.

Habi-

Habitat in Cayenna, β. etiam in Guiana, coturnices venans, 12 fere pollices longus.

Mandibula superior dorso nigra, lateribus rufa, inferior tota rufa; corpus subtus ex rufo album; verticis pennae longae, fuscae, apice rufae; cervix ex rufo grisea; remiges ex griseo fuscae, margine et apice rufae; pedes cinerei; unguis ex griseo fuscus.

- punctu- 30. *C. cauda cuneiformi, corpore fusco pennarum apice rufescente, subtus sordide albo.*

Punctated Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 541. n. 39.

Habitat in Cayenna, 9 pollices longus.

Rostrum nigrum, pollicem longum; pedes satis longi.

- ridibun- 31. *C. fulvus, gula, jugulo, et pectore cinereis, ab domine, dus. femoribus et tectricibus caudae inferioribus nigris.*

Cuculus mexicanus. Briff. av. 4. p. 119. n. 6.

Quapactol ou Rieur. Buff. hist. nat. des ois. 4. p. 408. n. 4.

Laughing Bird or Quapactotol. Raj. av. p. 174. Will. orn. p. 387.

Laughing Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 539. n. 37.

Habitat in nova Hispania; vox hominis ridentis, incolas terrens.

Longitudo 16 pollicum; rostrum ex caerulecente atrum; irides albae; cauda dimidia corporis longitudine.

- Guira. 32. *C. cristatus ex flavicante albus, cauda aliquo fusca, capite in medio fusco ad latera flavicante, collo in medio flavicante, ad latera fusco.*

Cuculus cristatus brasiliensis. Briff. av. 4. p. 144. n. 19.

Guira cantara. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 407.

Guira acantagara. Raj. av. p. 45. n. 5. Will. orn. 140. n. 9. t. 22.

Habitat in Brasiliæ silvis, valde clamoris, picae magnitudine, 14½ pollices longus.

Rostrum obscure flavum, pollicem longum; irides fuscae; cauda apice alba; pedes thalassini.

- america- 10. *C. cauda cuneiformi, corpore supra cinereo subtus albo, nus. mandibula inferiore lutea.*

Cuculus carolinianus. Briff. av. 4. p. 112. n. 5.

Vieillard à ailes rousses. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 400.

Coucou de la Caroline. Buff. pl. entom. n. 816.

Caroline Cuckow. Arct. zool. 2. p. 265. n. 155. Catesb. Carol. I. t. 9. Lath. syn. I. 2. p. 537. n. 35.

Habi-

Habitat in America septentrionali, migratorius, Mayo adveniens, auctummo discedens; nidum ut plurimum in malis ex baculis radicibusque struens, et 4 ova ex caeruleofcente alba pariens, 12 pollices longus.

Remiges primariae extrinsecus fuscae interius aurantiae; remiges, exceptis 2 intermediis, apice albæ; pedes obscuri.

scolopaceus. 11. C. cauda cuneiformi, corpore undique griseo fuscoque nebuloso.

Cuculus bengalensis naevius. Briss. av. 4. p. 132. n. 13.

Boutfallick. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 372.

Brown and spotted Indian Cuckow. Edw. av. t. 59.

Indian spotted Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 516. n. 6.

Habitat in Bengala, turdo vix major, 14 pollices longus.

Rostrum et pedes ex luteo sordide virent; remiges et humeri striis transversis fuscis et rufis; cauda rufescens, tenuis obliquis fuscis.

maculatus. 33. C. cauda cuneiformi, corpore supra ex virescente griseo maculis albis, subtus ex fusco alboque vario.

Coucou tacheté de la Chine. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 378. pl. entum. n. 764.

Chinese spotted Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 516. n. 7.

Habitat in Sina, 14 pollices longus.

Rostrum supra nigricans, subtus flavum; caput collumque nigricantia, maculis circa oculos albis; nitor supra fusco-aureus; pedes flavicantes.

niger. 12. C. cauda cuneiformi, corpore nigro nitido, rostro flavo.

Cuculus bengalensis niger. Briss. av. 4. p. 141. n. 17.

Couckeel. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 384. n. 3.

Black Indian Cuckow. Edw. av. t. 58.

Habitat in Bengala, 9 pollices longus; an mera orientalis varietas?

Nitor viridis et violaceus; pedes ex rubicundo fusi; unguis nigricantes.

ater. 34. C. cauda cuneiformi, corpore splendide nigro, capite pennis elongatis cristato, remigum quinque primarum basi alba.

Crested black Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 519. n. 11.

Habitat in promontorio bonae spei; an forte idem cum serrato?

melano- 35. *C. niger*, subtus albus, cauda cuneiformi, apice alba, macula alarum alba, capite subcristato.

Jacobin huppé de Coromandel. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 380. pl. enlum. n. 872.

Coromandel Crested Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 520. n. 12. Habitat in Coromandel, 11 pollices longus.

Pedes fuscii.

pisanus. 36. *C. cauda cuneiformi, corpore supra ex albo et nigro vario, subtus albo, capite nigro cristato, gula et pectore rufis.*

Cuculus ex albo et nigro mixtus. Orn. ital. p. 81. t. 1.

Coucou huppé noir et blanc. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 362.

Pisan Cuckow. Latham syn. I. 2. p. 520. n. 13.

Habitat Pisis, semel tantum deprehensus, ova 4 pariens, canoro paulo major.

Rostrum ex virescente fuscum; rectrices caudae inferiores rufae; remiges rufae, rectrices nigrae, utraeque apice albæ; pedes virides.

madagaf- 37. *C. olivaceus fusco undulatus, subtus fulvus, gula olivacea flavo temperata.*

Coucou verdâtre de Madagascar. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 364. pl. enlum. n. 815.

Great Madagascar Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 521. n. 14.

β. Cuculus area capitis caerulecente sulcata circulo nigro cincta.

Habitat in Madagascar, 21½ pollices longus.

Rostrum nigrum; irides aurantiae; abdominis pars posterior, et caudae rectrices inferiores fuscae; femora cinerea; cauda 10 polices longa; rectricum lateralium aliquae apice albo; pedes ex flavicante fusi.

domini- 13. *C. cauda cuneiformi, corpore griseo fusco subtus exalbido, rectricibus lateralibus tribus apice albis.*

Cuculus dominicensis. Briss. av. 4. p. 110. n. 2. t. 9. f. 2.

Cendrillard. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 413.

St. Domingo Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 541. n. 40.

β. Cuculus subtus candidus.

Habitat in Guiana, insula S. Dominici et Louisiana, turdi magnitudine, 10½ pollices longus.

Remiges rufae, apice et margine ex griseo fusco; rectrices praeter 2 intermedias nigrae apice albo, extimae margine quoque albo; rostrum, pedes et unguis ex griseo fusco.

- cayanus. 14. C. cauda cuneiformi, corpore castaneo purpurascente subtus cinereo, rectricibus omnibus apice albis.
Cuculus cayanensis. Briss. av. 4. p. 122. n. 8. t. 8. f. 2.
Coucou piaye. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 414.
Coucou de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 211.
Cayenne Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 542. n. 41.
 $\beta.$ *Cuculus cayanensis minor.* Briss. av. 4. p. 124. n. 9. t. 16. f. 2.
γ. *Cuculus rostro rubro, capite cinereo, gula et pectore rufis, abdomine ex cinereo nigro.*
Habitat in Cayenna, ad ripas, mansuetus, vicitans insectis, 16 fere, $\beta.$ 10 $\frac{1}{2}$ pollices longus.
Rostrum, pedes et ungues ex griseo fusca; remiges apice fuscae; rectrices castaneae, versus apicem nigrae, apice albae; cauda 10 pollices longa.
- tranquil- 38. C. niger, subtus in cinereum vergens, cauda cuneiformi, lus. teetrum alarum superiorum margine albo.
Coucou noir de Cayenne. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 416. pl. enlum. n. 512.
Cayenne black Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 543. n. 42.
Habitat in Cayenna, solitarius, reliquis speciebus minus inquietus, 11 pollices longus.
Rostrum et irides rubent.
- tenebro- 39. C. niger, abdomine et femoribus ferrugineis, uropygio sus. crissoque albis, cauda aequali. Pall. n. nord. Beytr. 3. p. 3. t. I. f. I.
Petit Coucou noir de Cayenne. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 417. pl. enlum. n. 505.
White-rumped black Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 544. n. 43.
Habitat in Cayennae arborum ad aquas crescentium ramis solitarius, immotus, vicitans insectis; nidificat in cavis arborum aut terrae, 8 $\frac{1}{4}$ pollices longus.
Rostrum obscurum subulatum; nares setis circiter 10 cinetae, rictus setis circiter 8; fascia inter pectus et abdomen aurantia; pedes flavi, breves; trogoni affinis.
- pyrrho- 40. C. niger, subtus albus, vertice genarumque parte coccineis circulo albo cinctis, caudae praelongae apice albo. cephalus. Red-headed Cuckow. Ind. zool. t. 6. Lath. syn. I. 2. p. 544. n. 44.
Habitat in Zeylon, fructibus vicitans, 16 pollices longus.
Rostrum arcuatum, ex virescente flavum; caput collumque maculis exilibus albis; pedes caerulefentes.

- caeruleus. 15. *C. cauda rotundata, corpore caeruleo.*
Cuculus madagascariensis caeruleus. Briss. av. 4. p. 157. n. 26.
t. 13. f. 1.
Tait.-son. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 191. t. 18.
Coucou bleu de Madagascar. Buff. pl. enlum. n. 295. f. 2.
Blue Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 531. n. 29.
Habitat in Madagascar, canori magnitudine, 17 pollices longus.
Rostrum, pedes et ungues nigra; remiges et cauda nitore viridi et violaceo.
- finensis. 16. *C. cauda cuneiformi longa, corpore caeruleo subtus albo, rectricum apicibus macula alba.*
Cuculus finensis caeruleus. Briss. av. 4. p. 157. n. 27. t. 14.
A. f. 2.
San-hia de la Chine. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 389.
Chinese Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 530. n. 28.
Habitat in Sina, 13 pollices longus.
Rostrum, irides, pedes et ungues rubent; vertex albus, punctis caeruleis; reliquum caput et gula nigricans; area alba rotunda ad genas.
- afer. 41. *C. viridi-aeneus, subtus splendide griseus, capite colloque cinereis, vertice nigricanti-aeneo, cauda aequali viridi-aurea, subtus nigra.*
Cuculus madagascariensis major. Briss. av. 4. p. 160. n. 28.
t. 15. f. 1.
Grand Coucou de Madagascar. Buff. pl. enlum. n. 587.
Vaurou-driou. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 395.
African Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 532. n. 30.
β. Cuculus fuscus subtus rufescens, capitis collique striis transversis fuscis rufisque.
Grand Coucou de Madagascar. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 396.
Habitat in Madagascar, columbae majoris magnitudine, 15 pollices longus.
Rostrum rectum, 2 polices longum, nigricans; ab eo ad oculum utrinque linea nigra; remiges majores nigricantes, minores obsolete virides; pedes rubicundi; unguis nigri.
- indica- 42. *C. ex ferrugineo griseus, subtus albus, palpebris nudis nigris, humerorum macula flava, cauda cuneiformi ferruginea. Mill. illustr. t. XXIV. f. A.*
Coucou indicateur. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 392. n. 22.
Honey

Honey Guide. Sparrmann aet. angl. 67. p. 38. t. I.

Honey Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 533. n. 31.

Habitat in interiore Africa, mellis causa apium sylvestrium alvearia exquirens, et voce sua hominibus indicans, nudum lagenae forma, ex gracilibus corticis filamentis struit, incolis magni aestimatus, ut trucidare nefas sit, & pollices longus.

Rostrum basi fuscum, apice luteum, setis basin cingentibus; femorum pennae albae, stria longitudinali nigra; remiges supra fuscae, subtus ex griseo fuscae; rectrices I, I angustissimae, ferrugineae, 2, 2 fuliginosae margine interiori albidæ, 3, 3 albae, apice fuscae, macula nigra ad interiore rhachin notatae; reliquæ similes, macula tamen nigra sensim dispente.

Persa.

17. *C. cauda aequali, capite cristato, corpore viridi-caerulecente, remigibus sanguineis.*

Cuculus guineensis cristatus viridis. Briss. av. 4. p. 152.

n. 24.

Crown Bird from Mexico. Albin. av. 2. p. 19. t. 19.

Touraco. Edw. av. I. t. 7. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 300.

t. 15. Lath. syn. I. 2. p. 545. n. 46.

Touraco de Guinée. Buff. pl. enlum. n. 601.

Habitat in variis Africæ partibus, vegetabilibus, potissimum fructibus vivitans, picae magnitudine, trogoni per quam affinis.

Rostrum obscure rubrum, breve, subconicum, margine, mandibulæ præsertim superioris, serratum; lingua cartilaginea, plana, acuta; nares pennis recumbentibus testæ; irides badiæ; palpebrae carunculis rubris cinetæ; crista mobilis apice rubens fere conica; pennæ molles, quasi sericeæ; fascia ocularis nigra; linea alba supra et infra oculos; humeri, dorsi pars inferior, uropygium, cauda, rectrices caudæ superiores alarumque majores ex caerulecente purpurea; abdominis pars infima et latera, femora, rectricesque caudæ inferiores nigrant; pedes cum unguibus cinerei, posticorum digitorum exterior vix retroversus cum anteriore plica cutanea cohaerens.

brasiliens.

18. *C. cauda subaequali, capite cristato, corpore rubro, remigibus flavescensibus.*

Cuculus brasiliensis cristatus ruber. Briss. av. 4. p. 154. n. 25.

Cuculus brasiliensis venustissime pictus. Seb. mus. I. p. 102. t. 66. f. 2.

Couroucoucou. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 298.*

Red-crested Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 545. n. 45.*

Habitat in Brasilia, pyrrhocephalo paulo minor, 10 pollices longus.

Rostrum dilute rubrum; crista nigro-varia; abdominis rubori flavedo intermisita; remiges et cauda flavae cum tintura nigra.

cristatus. 19. *C. cauda rotundata, capite cristato, corpore cinereo-virescente nitente.*

Cuculus madagascariensis cristatus. Briss. av. 4. p. 149. n. 22. t. 12. f. 2.

Coucou huppé de Madagascar. *Buff. pl. enlum. n. 589.*

Coua. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 365. n. 4. t. 16.*

Madagascar crested Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 522. n. 15.*

Habitat in Madagascar, corvi glandarii magnitudine, 14 pollices longus.

Rostrum et pedes nigra; irides aurantiae; pectus vinaceum; abdomen albidum cum tintura rufa; remiges et cauda virescentes, subtus cinereae; rectrices exteriores apice albo.

aegyptius. 43. *C. fuscus, subtus ex rufo albus, capite et cervice obscure, cauda cuneiformi splendide viridi, remigibus rufis.*

Houhou d'Egypte. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 367.*

Egyptian Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 522. n. 16.*

β. *Cuculus splendide niger, alis rufis.*

Coucou des Philippines. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 369. pl. enlum. n. 824.

γ. *Cuculus alis spadiceis.*

Coucou vert d'Antigue. Sonner. it. p. 181. t. 80.

Habitat in Aegypto β. in insulis Philippinis, γ. in Antigas solitarius, aut geminus in dumetis ad aquas positis, victimans locustis, 14-15 pollices longus.

Rostrum nigrum; irides splendide rubrae, in γ. nigrae; caput et cervix, in β. quoque gula, jugulum, pectus et abdomen obscure viridia, in hoc in atrum vergentia; rectrices alarum superiores rufae in viridem vergentes; remiges 3 ultimae totae rufae, reliquae apice splendide viridi; pedes nigricantes.

radiatus. 44. *C. ex fusco ater, subtus flavus nigro-lineatus, gula genisque vinaceis, vertice ex nigricante griseo.*

Coucou brun et jaune à ventre rayé. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 379.

Coucou

Coucou à ventre rayé de l'isle de Panay. *Sonner. it. p. 120.*

t. 79.

Panayan Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 527. n. 21.*

Habitat in insula Panay, canori magnitudine.

Rostrum nigrum; irides aurantiae; remigum pars inferior albo-maculata; cauda nigra lineis et apice albis, aqualis; pedes rubicundi.

flavus. 45. *C. testaceus, subtus flavescens, vertice gulaque dilute griseis, cauda cuneiformi nigra albo-lineata.*

Petit coucou à tête grise et ventre jaune. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 382. n. 15.

Coucou petit de l'isle de Panay. Buff. planch. enlum. n. 814. Sonner. it. p. 122. t. 81.

Yellow bellied Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 527. n. 22.*

Habitat in insula Panay, ultra 8 pollices longus.

Rostrum pedesque flavescunt, apice illius nigro; irides flavae.

auratus. 46. *C. cauda cuneiformi, corpore supra viridi-aureo, subtus albo, capitis strigis quinque, teëtricum alarum, remigum secundariarum rectricumque apicibus albis.*

Coucou vert doré et blanc. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 385.

Coucou vert du cap de bonne esperance. Buff. pl. enlum. n. 657.

Gilded Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 527. n. 23.

Habitat ad caput bonaë spei, 7 pollices longus.

Rostrum ex virescente fuscum; pedes grisei.

lucidus. 47. *C. supra viridis, subtus albus, utrinque viridi-aureo-lunulatus, remigibus caudaque fuscis.*

Shining Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 528. n. 24. t. 23.

Habitat in nova Seelandia, praecedenti affinis, 7 pollices longus.

Rostrum pedesque caerulecentes; irides badiae; teëtrices caudae inferiores albae.

coronatus. 20. *C. cauda cuneiformi, corpore nigro subtus albo, torque candido.*

Cuculus coromandelanensis cristatus. Briss. av. 4. p. 147. n. 21. t. II. A. f. I.

Coucou huppé de Coromandel. Buff. pl. enlum. n. 274.

Coucou huppé à collier. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 388.

Collared Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 529. n. 26.

Habitat in Coromandel, 12½ pollices longus.

- 58
- Rostrum et pedes *cinerea*; irides *flavantes*; caput *cristatum*, macula ad utrumque latus parva rotunda *grisea*; gula et femora *nigricantia*; remiges primariae *rufae*; secundariae *nigricantes*, margine *rufo*; cauda *nigricans*.
- cornu- 21. C. cauda cuneiformi, capite crista bifida, corpore fuliginoso.
 tus. Cuculus brasiliensis cornutus. *Briff. av.* 4. p. 145. n. 20.
 Atingacu camucu. *Marcgr. bras.* p. 256. *Will. orn.* p. 146.
 t. 38. *Raj. av.* p. 165. n. 5.
 Atingacu du Brésil. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. p. 409.
 Horned Cuckow. *Latham syn.* I. 2. p. 530. n. 27.
 Habitat in Brasilia, 12 pollices longus.
 Rostrum ex vidente *flavum*; irides *sanguineae*; crista *cornuta* aemula *mobilis*; corpus *subtus cum pedibus et unguibus cinereum*; cauda apice *alba*.
- paradi- 22. C. caudae rectricibus extimis binis longissimis apice dilata-
 scus. tis, capite cristato, corpore viridi.
 Cuculus siamensis cristatus viridis. *Briff. av.* 4. p. 141. n. 23.
 t. 14. A. f. 1.
 Coucou à longs brins. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 387.
 Paradise Cuckow. *Lath. syn.* I. 2. p. 529. n. 25.
 Habitat in Siam, carvi glandarii magnitudine, 17 pollices longus.
 Rostrum *nigricans*; irides *caeruleae*; pedes et ungues *grisei*.
- Tolu. 48. C. nigricans, uropygio et abdome ex virescente nigris,
 humeri remigibusque castaneis, cauda cuneiformi atro-
 viridi, subtus nigra.
 Cuculus madagascariensis. *Briff. av.* 4. p. 138. n. 16. t. 13.
 f. 2.
 Coucou de Madagascar. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 369.
 t. 17.
 Coucou de Madagascar, appellé Toulou. *Buff. pl. enlum.*
 n. 295. f. 1.
 Long-heeled Cuckow. *Latham syn.* I. 2. p. 524. n. 17.
 Habitat in Madagascar 14½ pollices longus, aegyptio valde affinis.
 Rostrum *fuscum*; pennae superiores *longiusculae, angustae, rigidae*, stria per longitudinem ex *rufo* alba *notatae*; tectrices alarum *castaneae*, scapis *purpurascensibus*; remiges apice *fusco*; pedes et unguis *nigri*; digitorum posteriorum interior altero *longior*.

58. YUNX. *Rostrum teretiusculum acuminatum, debilius paulisper incurvum.*
Nares concavae denudatae.
Lingua teres lumbriciformis longissima apice mucronata.
Rectrices decem flexiles.
Pedes scandorii.

- Torquil. 1. *Y. ex albo, griseo, nigro, et ferrugineo varia.* Fn. suec. la. 97. t. I. f. 97. Bell. av. 76. a. Gesn. av. 573. Aldr. orn. I. p. 863. t. 866. Johnst. av. t. 42. Raj. av. p. 44. A. 8. Rudb. lapp. 66. t. 66. Briss. av. 4. p. 4. n. I. t. I. f. I. Scop. ann. I. n. 50.
Cuculus subgriseus maculatus, rectricibus nigris fasciis undulatis. Fn. suec. I. p. 78. t. I. f. 78.
 Torcol. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 84. t. 3. planch. enlum. n. 698.
 Wryneck. Brit. zool. n. 83. Arct. zool. 2. p. 267. Albin. av. I. t. 21. Will. orn. p. 138. t. 22. Lath. syn. I. 2. p. 548. t. 24. Hayes brit. birds t. X.
 Drehhals. Frisch av. t. 38.
 2. *Yunx supra maculis transversis, subtus striis longitudinalibus flavis.*
 Jyngi congener. Aldr. orn. I. p. 868. t. 869. Will. orn. t. 22.
 Torquilla striata. Briss. av. 4. p. 7.
Habitat in Europae et Sibiriae, Persiae et Indiae truncis arborum putrescentibus, ex quibus larvas extrahit, bis formicisque potissimum viicitans, migratoria; collum con torqueo circumspiciens; ova parit eburnei candoris 8 - 10.
Magnitudo alaudae; longitudo 7 pollicum; corpus supra ex griseo, nigro, albo et ferrugineo varium; cauda grisea, maculis nigris, fasciis 4 latis nigris.

- minutissim. 2. *Y. supra ex atro cinerea, subtus sordide alba.*
 Picus minutissimus. Pallas n. nord. Beytr. 3. p. 5. t. I. f. 2.
 Picus cayennensis minor. Briss. av. 4. p. 83. n. 32.
 Petit pic de Cayenne. Ferm. Surin. 2. p. 170. Buff. planch. enlum. n. 786. f. I.
 Très petit pic de Cayenne. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 37.
 Minute Woodpecker. Lath. syn. I. 2. p. 596. n. 48.

Habitat in Cayenna, 3½ pollices circiter longus, certhiae familiaris magnitudine.

Rostrum nigricans, basi flavum; caput nigrum albo-guttatum; mari ad frontem area miniata; genae ex nigricante cinereae; alae extus nigricantes, intus cinereae; rectrices 1, 1 rachi interna albae, margine angusto subfuscō; 2, 2 totae nigrae; reliquae ad apicem fere fascia obliqua alba; pedes nigri, robusti.

59. PICUS. *Rostrum polyedrum, rectum, apice cuneato.*

Nares pennis setaceis recumbentibus obtectae.

Lingua teres, lumbriciformis, longissima, ossea, missilis, mucronata, apice retrorsum aculeata setis.

Rectrices 10 durae rigidae acuminatae.

Pedes scandorii.

*martius. 1. P. niger, pileo coccineo. Fn. suec. 98. Scop. ann. I. p. 46.
n. 51.*

Picus niger. Briss. av. 4. p. 21. n. 6.

*Picus niger maximus. Gesn. av. 708. Aldr. orn. I. p. 843.
t. 844. Raj. av. p. 42. n. 1.*

*Pic noir. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 41. t. 2. pl. enlum.
n. 596. orn. de Salern. t. 10. f. 2.*

*Greatest black Woodpecker. Arct. zool. 2. p. 276. A. Will.
orn. p. 135. t. 21. Albin. av. 2. t. 27. Lath. syn. I. 2.
p. 552. n. 1.*

Schwarzspecht. Frisch. av. t. 34.

Habitat in Europae, Sibiriae et regni Chilensis populis, nidos magnos et profundos struens, ovaque pariens 2 - 3 candida; 17 - 18 pollices longus, formicis aliisque insectis, eorumque larvis vicitans.

Femina occipite modo rubra.

lignarius. 22. P. pileo coccineo, corpore albo caeruleoque vittato. Molina hist. nat. Chil. p. 209.

Habitat in regni Chilensis arboribus, quas tum emortuas tum vegetas rostro robusto perforat adeo, ut nidum in fossis foraminibus struat; hinc arboribus pomiferis infestus.

2. P.

principa- 2. *P. niger*, crista coccinea, linea utrinque collari, remigibus-
lis. que secundariis albis.

Picus niger carolinensis. Briss. av. 4. p. 26. n. 9.

Picus imbrifactus. Nieremb. nat. p. 223. Will. orn. 301.

Quatotomomi. Raj. av. p. 162. Will. orn. p. 390.

Grand pic noir à bec blanc. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 46.

Pic noir hupé de la Caroline. Buff. pl. enlum. n. 690.

Largest white-billed Woodpecker. Catesb. car. I. t. 16.

White-billed Woodpecker. Arct. zool. 2. p. 268. n. 156.

Lath. syn. I. 2. p. 553. n. 2.

Habitat in America a nova Jersey ad Brasiliam usque, cor-
noris magnitudine, 16 pollices longus; foramina spiralia
excavat.

Rostrum eburneum, 9 pollices longum; irides flavae; crista
occipitis conica; dorsi pars inferior alba.

pileatus. 3. *P. niger*, crista rubra, temporibus aliquo maculis albis.

Picus virginianus pileatus. Briss. av. 4. p. 29. n. 10.

Pic noir à hupe rouge. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 48.

Pic noir hupé de la Louisiane. Buff. pl. enlum. 718.

Larger red-crested Woodpecker. Catesb. car. I. p. 17. t. 17.

Pileated Woodpecker. Arct. zool. 2. p. 269. n. 157. Lath.

syn. I. 2. p. 554. n. 3.

Habitat in Americae septentrionalis silvis, zae spicas rostro
destruens, 6 ova pariens, ex quibus Junio exeunt pulli.

Longitudo 18 pollicum; rostrum 2 pollices longum, mandi-
bula superiore obscura, inferiore albida; irides aureae;
crista linea fuscescente cineta; taenia nigra ab oculis ad
occiput ducta; infra hanc linea fuscescens ab ortu rostri
per collum ad alarum initium; mentum et gula alba; pe-
des obscuri. Feminae frons fusca.

lineatus. 4. *P. niger*, crista coccinea, linea a rostro utrinque collari ad
medium dorsum alba.

Picus niger cayanensis cristatus. Briss. av. 4. p. 31. n. 11.
t. I. f. 2.

Ipecu. Maregr. bras. 207.

Picus varius brasiliensis, Ipecu dictus. Raj. av. p. 43. n. 7.

Dd 5

Ouan-

Pici, Alberto M. jam satis noti, et memorati, arbores, potissimum aegrotantes et emor-
tuas, aliquando tamen etiam sanas considunt, infella larvasque insectorum, li-
gnum intus rodentes, arboremque destructuras, rostro secante, sono stridulo terre-
faciente, auditu percipiente, lingua acuta hastata intrante extrahunt (act. angl.
350, p. 509.) injuste proscripti et silvis expulsi.

Quantou ou pic noir hupé de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 50. pl. enlum. n. 717.*

Pic noir ou charpentier. *Fermin Surin. 2. p. 170.*

Brasilian Woodpecker, called Ipecu. *Will. orn. p. 138. t. 22.*

Lineated Woodpecker. *Lath. syn. I. 2. p. 556. n. 4.*

Habitat in Cayenna, magnitudine viridis, 14 fere pollices longus.

Rostrum sesquipollicare, corneum; mandibula inferior stria coccinea; caput coccineum; genae cinerascentes; gula, abdomen, et crissum ex rufo alba, striis transversis nigris; cauda cuneiformis; pedes et ungues grisei.

rubicol- 23. *P. fuscus, subtus fulvus, capite cristato colloque sanguineis. lis.*

Pic à cou rouge. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 53.*

Grand pic hupé à tête rouge de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 612.*

Red-necked Woodpecker. *Lath. syn. I. 2. p. 558. n. 5.*

Habitat in Cayenna, 16 pollices longus.

Rostrum pallidum; crista occipitalis; pedes plumbei.

melano- 24. *P. niger, subtus, linea collari utrinque, nucha et uropygio albus, crista posterius ex luteo fuscescente.*

Buff- crested Woodpecker. Lath. syn. I. 2. p. 558. n. 6. t. 25.

Habitat in Surinamo, 12½ pollices longus.

Pectus et abdomen sordide album, lineis transversis nigris.

hirundi- 5. *P. niger, occipite coccineo, humeris albido punctatis.*

Picus niger novae Angliae. Briss. av. 4. p. 24. n. 7.

Petit pic noir, var. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 54.*

Lesser black Woodpecker. *Albin. av. 3. t. 23. Lath. syn.*

I. 2. p. 559. n. 7.

β. P. pectoris area rubra, abdomine ex nigro et griseo vario.

Petit pic noir. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 54.*

Petit pic noir de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 694. f. 2.*

γ. Picus verticis area rubra, oculorum alba, occipite aureo.

Habitat in America septentrionali, β. et γ. in Cayenna, hirundinis circiter magnitudine.

Rostrum fuscum; irides albidae; alarum anguli, et abdominis postrema pars alba; pedes flavicaentes; in β. supra oculos intermissus candor; dorsi pars inferior, et uropygium alba; femina neque rubri, neque flavi aliquid monstrat; in γ. universum pectus area sanguinea; crissum albo et nigro lineatum; remiges nonnullae secundariae apice albo-punctatae.

6. P.

- passeri- 6. *P. olivaceo-flavicans*, subtus fusco candicanteque fasciatus.
nus. *Picus dominicensis minor*. *Briff. av. 4. p. 75. n. 29. t. 4.*
f. 2.
Petit pic olive de S. Domingue. *Buff. hist. nat. des ois. 7.*
p. 29.
- Passerine Woodpecker. *Lath. syn. I. 2. p. 588. n. 37.*
Habitat in insula S. Dominici, alaudae magnitudine, 6 pol-
lices longus.
Rostrum, pedes et unguis grisei; vertex ruber; tempora ex
rufo grisea; tectrices alarum majores plurimae maculae
ochroleuca; remigium majorum margo interior fuscus, al-
bido dentatus.
- striatus. 25. *P. niger*, olivaceo striatus, subtus olivaceus, fronte, ge-
nis, gula, jugulo, et pectori griseis, vertice, occipite,
uropygio et tectricibus caudae superioribus rubris.
Picus dominicensis striatus. *Briff. av. 4. p. 65. n. 25. t. 4.*
f. 1.
Pic rayé de S. Domingue. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 27.*
pl. enlum. n. 281.
Rayed Woodpecker. *Lath. syn. I. 2. p. 587. n. 36.*
- β. *Picus vertice nigro*.
Picus dominicensis striatus minor. *Briff. av. 4. p. 67. n. 26.*
t. 3. f. 2.
Pic rayé à tête noire de S. Domingue. *Buff. planch. enlum.*
n. 614.
Habitat in insula S. Dominici, 9 fere pollices longus.
Rostrum corneum; remiges nigricantes, rhachi exteriore
flavo, interiori albido-maculatae, pedes et unguis ni-
gricantes.
- mela- 26. *P. ex nigro et flavo varius*, crista aurea, cauda nigra.
nochlo- *Picus varius americanus cristatus*. *Briff. av. 4. p. 34. n. 12.*
ros. Grand pic rayé de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 30.*
pl. enlum. n. 719.
Gold-crested Woodpecker. *Lath. syn. I. 2. p. 589. n. 38.*
Habitat in Cayenna, magnitudine viridis.
Rostrum obscurum; genae rubicundae; inter basin rostri et
oculos area purpurea; corpus nigro et flavo undulatum,
striatum, et potissimum subtus maculatum.
- flave- 27. *P. niger*, crista, genis, cervice, gula, tectricibus caudae
cens. superioribus et alarum interioribus, strigisque alarum et
dorsi transversis flavis.

Yellow-

Yellow-crested Woodpecker. Brown. Illust. t. 12. Lath.
Syn. I. 2. p. 589. n. 39.
Habitat in Bralilia, monedulae magnitudine.
Crista longa, laxa, pendula; pedes obscure virides.

cayen- 28. P. olivaceus, pennis versus apicem macula nigra notatis,
nenfis. vertice, gula, caudae nigris, occipite rubro, genis al-
bidis, abdomine flavicante.

Picus striatus cayennensis. Briss. av. 4. p. 69. n. 27.
Petit pic rayé de Cayenne. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 31.
Pic rayé de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 613.
Cayenne Woodpecker. Lath. syn. I. 2. p. 590. n. 40.
Habitat in Cayenna, $7\frac{1}{2}$ pollices longus.
Rostrum nigricans; gula albo-maculata; femora et tectrices
caudae inferiores maculis rarioribus nigris; humeri te-
ctricesque alarum striis transversis nigrieantibus; remiges
nigricantes, scapis flavis; rectrices 2 extimae scapis fla-
vis, lineis nigris et rufis; pedes grisei.

exalbi- 29. P. exalbidus cristatus, taenia mandibulae inferioris longitu-
dinus. dinali rubra, alis fuscis rufisque, cauda nigra.

Picus cayenensis albus. Briss. av. 4. p. 81. n. 31.
Charpentier jaune. Fermin Surin. 2. p. 171.
Pic jaune de Cayenne. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 32. pl.
enlum. n. 509.
Yellow Woodpecker. Lath. syn. I. 2. p. 591. n. 41.
Habitat in Cayenna, viridi minor, 9 pollices longus, 3 ova
alba fere globosa pariens, ex quibus Aprili exeunt pulli.
Rostrum ochroleucum; occiput cristatum; color sordide al-
bus, nonnunquam flavescentia; taenia rubra feminae nulla;
tectrices alarum fuscae, margine flavicante; pedes et un-
guis grisei.

cinnamo- 30. P. cinnamomeus, maculis rarioribus ochroleucis, crista et
meus. dorsi parte inferiore obscure flavicante, gula utrinque
macula lata sanguinea, rostro, cauda pedibusque nigris.

Pic mordoré. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 34.
Pic jaune tacheté de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 524.
Ferruginous Woodpecker. Arct. zool. 2. p. 271. n. 159. t. 13.
Lath. syn. I. 2. p. 592. n. 42.
Habitat in Cayenna, Guiana, Carolina australi, viridis
magnitudine, 11 pollices longus.
Feminac rubor nullus.

Lath.
multico- 31. *P. cristatus rufus*, subtus pallide ferrugineus, capite, gula
lor. et cervice aurantiis, nucha, jugulo, pectore alarumque
maculis nigris.

Pic à cravate noire. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 35.

Pic à cravate noire de Cayenne. *Buff. pl. enlum.* n. 863.

Black-breasted Woodpecker. *Lath. syn.* I. 2. p. 593. n. 43.

Habitat in Cayenna et Guiana, viridis magnitudine.

*Rostrum pallidum; caudae apex maculaeque nigra; pedes
plumbei.*

p. 31.
erythro- 7. *P. capite toto rubro, alis caudaque nigris, abdomine albo.*
cephalus. *Mus. Ad. Fr.* 2. p. 21.

Picus erythrocephalus virginianus. *Briss. av.* 4. p. 53. n. 19.
t. 3. f. I.

Picus capite toto rubro. *Kalm it.* 3. p. 43.

Pic noir à domino rouge. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 55.

Pic de Virginie. *Buff. pl. enlum.* n. 117.

Red-headed Woodpecker. *Arct. zool.* 2. p. 271. n. 160. *Ca-*
tesb. Car. I. t. 20. *Latham syn.* I. 2. p. 561. n. 8.

Habitat in America septentrionali, migratorius, glandibus,
zea, pomisque victitans, hinc perquam infestus, ideo olim
lege, nunc tamen abrogata proscriptus; prius et altius re-
liquis speciebus nidificans, 9½ pollices longus.

Rostrum plumbeum; dorsum nigrum; remiges secundariae
albae, fasciis duabus nigris transversis; pedes nigri; fe-
mina caput fuscum.

3 ova
nulli.
de al-
nulla;
et un-
ruber. 31. *P. capite, collo et pectore rubris, dorso alisque nigris,*
abdomine ochroleuco.

Red breasted Woodpecker. *Lath. syn.* I. 2. p. 562. n. 9.

Habitat in Cayenna, erythrocephalo paulo minor.

Rostrum corneum; a naribus ad vel infra oculos linea fus-
cens; tectrices alarum minores complures albo puncta-
tæ, majores nonnullæ exteriori rachi albae, inferiores
ex albo et nigro variae; remiges nigrae albo maculatae.

ista et
inque
nigra.
. t. 13.
iridis
31. P.
obscurus. 32. *P. obscurus, exalbido striatus et undulatus, subtus albus,*
remigibus primoribus nigris, secundariis albis versus api-
cem nigro fasciatis.

White-rumped Woodpecker. *Latham syn.* I. 2. p. 563. n. 10.

Habitat in insula longa (Long Island), 9 pollices longus.

Rostrum corneum; tectrices alarum majores nigrae; pedes
nigri; uropygium album.

fasciatus. 33. *P. niger*, facie, vertice et fascia mandibulae inferioris rubris, orbitis albis, temporibus et abdomine albo et nigro striatis. Striped bellied Woodpecker. *Lath. syn. I. 2. p. 563. n. 11.*

auran-
tius. 8. *P. supra aurantius*, nucha, uropygio rectricibusque nigris. *Picus capitidis bonae spei.* *Briff. av. 4. p. 78. n. 10. t. 6. f. 1.* Orange Woodpecker. *Lath. syn. I. 2. p. 585. n. 32.* *Habitat ad caput bonaee spei, 10½ pollices longus.* Rostrum, pedes et ungues plumbei; vertex et occiput nigra; pone oculos utrinque ad occiput, et a naribus infra oculos ad utrumque colli latus stria alba; genae, gula jugulumque sordide grisea; dorsi pars inferior nigricans; pectus et abdomen sordide alba; remiges fuscae, nonnullae albo maculatae.

senega-
lenius. 34. *P. supra aureus*, subtus griseo et exalbido undulatus, vertice rubro, fronte temporibusque fuscis, rectricibus alarum et uropygio virecentibus, rectricibus nigris, exterioribus flavo maculatis. Petit pic rayé du Sénégâl. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 25.* Petit pic du Sénégâl. *Buff. pl. enlum. n. 345. f. 2.* Gold backed Woodpecker. *Lath. syn. I. 2. p. 586. n. 33.* *Habitat ad fluvium Senegal, passere non major.* Rostrum pedesque obscuri.

capensis. 35. *P. griseus*, dorso, collo et pectore olivaceis, remigibus obscuris, uropygio et rectricibus caudae superioribus rubris, rectricibus nigris. Pic à tête grise du cap de bonne esperance. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 26. pl. enlum. n. 786. f. 2.* Cape Woodpecker. *Lath. syn. I. 2. p. 786. n. 34.* *Habitat ad caput bonaee spei, alauda minor.* Rostrum et pedes plumbea.

auratus. 9. *P. griseo nigroque transversim striatus*, gula pectoreque nigra, nucha rubra, uropygio albo. *Forster act. angl. V. 62. p. 387.* *Picus canadensis striatus.* *Briff. av. 4. p. 70. n. 28.* *Cuculus auratus.* *Syst. nat. X. I. p. 112.* *Picus major alis aureis.* *Kalm. it. 3. p. 42.* *Pic rayé de Canada.* *Buff. pl. enlum. n. 693.* *Pic aux ailes dorées.* *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 39.* *Gold-winged Woodpecker,* *Arct. zool. 2. p. 270. n. 158.* *Catesb. Car. I. f. 18.* *Lath. syn. I. 2. p. 597. n. 49.* *Habi-*

Habitat in America septentrionali, viridi vix minor, 11 pollices longus, in sinu Hudsonis migratorius, heic in arboribus cavis ova 4-6 parvus et vermis infectisque viettans; alias in terra nidificans, neque arbores descendens, infectis, horum tamen defectu baccis etiam ipsoque gramine viettans, carne sapida.

Rostrum cuculi nigrum; vertex cinereus; occiput et genae rubra; pectoris pars superior lunula nigra notatum; reliquum pectus cum abdomine albidum, nigro-maculatum; dorsum cum rectricibus alarum pallide fuscum, lineis nigris; remiges primores cinereae, scapis et infra aureae; uropygium album, nigro-maculatum; cauda nigra, margine albo, scapis aureis; pedes obscuri; feminae gula cinerea.

- cafer. 36. P. supra fuscus, subtus vittaceus nigro-guttatus, alis subtus, scapisque remigum et rectricum iniatis.

Habitat ad caput bonaeris, aurato multum similis, sed minor.

Rostrum fuscum, ad utrumque latus stria rubra notatum; cauda acuta, rectricibus apice bifurcata.

- olivaceus. 37. P. olivaceus, collo subtus, pectore et uropygio pallide rubris, gula jugulo, remigibus et crasso obscure fuscis, cauda supra nigra.

Crimson-breasted Woodpecker. *Lath. syn. I. 2. p. 599. n. 50.*

Habitat ad caput bonaeris, 10½ pollices longus.

Rostrum aurati, nigrum; scapi remigum rectricumque flavicantes; rectrices subtus ex olivaceo flavae, apice bifurcae; pedes nigri.

- carolinus. 10. P. pileo nuchaque rubris, dorso fasciis nigris, rectricibus mediis albis nigro-punctatis.

Picus varius jamaicensis. *Briß. av. 4. p. 59. n. 23.*

Picus ventre rubro. *Kalm. it. 3. p. 43.*

Epeiche ou Pic varié de la Jamaïque. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 72.*

Pic varié femelle de la Jamaïque. *Buff. pl. enlum. n. 597.*

Jamaica Woodpecker. *Sloan. Jam. p. 299. n. 15. t. 255.*

n. 2. Edw. glean. 5. t. 244.

Red bellied Woodpecker. *Catesb. Carol. I. t. 19. f. 2.*

Carolina Woodpecker. *Arct. zool. 2. p. 272. n. 161.*

- β. Picus fronte genisque pallide fuscescentibus, ventre pallido ex flavicante fuso.

γ. Picus

*y. Picus maculis gulae et subocularibus rubris.
Epeiche ou Pic rayé de la Louisiane. Buff. hist. nat. des ois.*

7. p. 73. pl. enlum. n. 692.

*Habitat in America septentrionali, et Antillis majoribus,
majore major, 10½ pollices longus.*

*Rostrum, cauda, pedes et unguis nigra; irides badiæ; ver-
tex in femina ex rufo albus; genae ochroleucae; gula et
jugulum olivacea, colore versus abdomen sensim in ru-
brum abeunte; pars abdominis inferior lineis transversis
fuscis notata.*

undatus. 11. P. testaceus nigro-undulatus, temporibus sanguineis.

Red-cheeked Woodpecker. Edw. glean. t. 332. Lath. syn.

I. 2. p. 594. n. 44.

Habitat in Guiana et Surinamo, 9 pollices longus.

Rostrum fuscescens; pedes obscuri.

rufus. 38. P. rufus nigro undulatus.

Pic roux. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 36.

Pic roux de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 694. f. I.

Rufous Woodpecker. Lath. syn. I. 2. p. 594. n. 45.

Habitat in Cayenna et Guiana, vix torquillæ magnitudine.

*Rostrum pallidum; alae et cauda obscuriores; dorsum palli-
dius; pedes plumbei.*

*chloroce- 39. P. olivaceus subtus albo-maculatus, collo et capite sub-
phalus.*

Petit pic à gorge jaune. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 37.

Pic à gorge jaune de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 784.

Yellow headed Woodpecker. Lath. syn. I. 2. p. 595. n. 46.

Habitat in Guiana, torquillæ magnitudine.

Rostrum et pedes plumbei; ad angulos oris stria rubra.

*minia- 40. P. cristatus ruber, subtus albus, jugulo roseo, rostro cau-
tus.*

daque caeruleis, teſtricibus caudæ viridibus.

Red-winged Woodpecker. Ind. zool. t. 4. Lath. syn. I. 2.

p. 595. n. 47.

Habitat in Java, 9 pollices longus.

*Menti macula flava; remiges nigrae, maculis magnis albis;
pedes obscuri.*

*Pitius. 41. P. fuscus, albo guttatus, cauda brevi. Molina hist. nat.
Chil. p. 209.*

*Habitat in Chili, columbae habitu, non in cavis arboribus,
sed ad ripas, montiumque declivia nidificans, ova plerum-
que 4 pariens; caro incolis aestimata.*

12. P.

- des ois.
oribus,
ue; ver-
gula et
in ru-
nsverfis
eis.
uth. syn.
itudine.
um palli-
site sub-
o. 37.
784.
5. n. 46.
ibra.
ostro cau-
syn. I. 2.
nis albis;
bift. nat.
arboribus,
a plerum
12. P.
- viridis.** 12. *P. viridis*, vertice coccineo. *Fn. succ.* 99. *Scop. ann.* 1.
p. 47. n. 52.
Picus viridis. *Gesn. av.* 710. *Aldr. orn.* 1. *p. 848. t. 849.*
Raj. av. p. 42. A. 2. Briff. av. 4. p. 9. n. 1. Nozem.
nederl. Vogel. *t. 23.*
Pic verd. *Buff. bift. nat. des ois.* 7. *p. 7. t. 1. pl. enlum.*
n. 371. 879.
Woodspite, Rainfowl, Highhoe, Hewhole. *Will. orn.* *p. 135.*
t. 21.
Green Woodpecker. *Brit. zool.* *n. 84.* *Arct. zool.* 2. *p. 277. B.* *Albin. av.* 1. *t. 18.* *Latham syn.* 1. 2. *p. 577.*
n. 25. *Hayes brit. Birds* *t. X.*
Grünspecht. *Frisch av.* *t. 35.* *Günth. Nest.* *u. Eyer.* *t. 5.*
f. inf.
β. Pic verd. *Fermin Surin.* 2. *p. 169.*
Habitat in Europa, 13 polices longus, foraminibus exactissime rotundis arborem pertundens ad partem emortuam usque, ova 5–6 virescentia nigro-maculata parions, apibus in silvis delegetur.
Rostrum obscurum, 2 pollices longum; iridum circulus interior rubicundus, exterior albus; tempora nigricantia; remiges obscurae, maculis albidis; cauda obscuro et virescente cancellata, apice nigra; pedes ex virescente cinerei.
- bengalensis.** 13. *P. viridis*, crista rubra, nucha nigra, subtus anticeque albus nigro-maculatus.
Picus viridis bengalensis. *Briff. av.* 4. *p. 14. n. 2.*
Pic verd de Bengale. *Buff. bift. nat. des ois.* 7. *p. 23. planch.*
enlum. *n. 695.*
Bengal Woodpecker. *Alb. av.* 3. *p. 21. t. 22.* *Lath. syn.*
I. 2. p. 580. n. 26.
Spotted Indian Woodpecker. *Edw. av.* 4. *t. 182.*
β. Zeylonischer Specht. *Naturf.* 13. *p. 14. t. 1. 17. p. 16.*
γ. Pic grivelé ou grand pic de l'isle de Luçon. *Sonner. it.* *p. 73.*
t. 37.
Palala ou pic vert tacheté des Philippines. *Buff. bift. nat.*
des ois. 7. *p. 21.*
Pic verd des Philippines. *Buff. pl. enlum.* *n. 691.*
Habitat in Bengala, β. in Zeylon, γ. in insula Luzonia,
viridi minor, γ. aequalis.
Rostrum pedesque nigricant; irides γ. rubent; vertex niger.
maculis albis, in β. numerosioribus; in γ. caput cum
crista et collo, dorso et alis splendide fuscum viridi inter-
misto;

misto; gula et jugulum ex nigro alboque varia; pectus abdominisque pars superior alba, pennarum margine fuscō; inferior cum crissō alba; in ♂. gula et pectus fuscā, maculis anomalis albīs; in ♀. gula, jugulum, pectus et abdomen alba, pennarum margine nigro; dorſi pars superior flava, in ♂. nigra; inferior viridis, in ♂. una cum teētricibus alarum rubra; alae virides dilutius maculatae, teētricibus inferioribus et minoribus superioribus fuscis albo maculatis; in ♂. remiges majores fuscæ, albo maculatae; alias nigræ frigis albīs; cauda ex virente nigra, in ♂. fuscā, in ♀. ex atro fuscā, fascia alba, teētricibus superioribus rubris.

- goensis. 42. P. viridis, subtus albidus, vertice et occipite cristiato rubris, cauda taeniale ab oculis ad alas ducta nigris, aliis aureis.

Pic vert de Goa. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 22. pl. enlum. n. 696.*

Goa Woodpecker. *Lath. syn. I. 2. p. 582. n. 27.*

Habitat in Goa, bengalensi affinis, viridi minor.

Rostrum nigrum; occiput linea alba circumscriptum; teētrices alarum minores nigræ; remiges minores ex nigro et albo variae; pennae subtus nigro marginatae; pedes plumbei.

- manil- 43. P. fordide viridis, vertice griseo-maculato, remigibus lensis. caudaque nigricantibus, teētricibus caudæ superioribus rubris.

Pic verd de l'isle de Luçon. *Sonner. it. p. 73. t. 36.*

Manilla green Woodpecker. *Lath. syn. I. 2. p. 583. n. 28.*

Habitat in insula Luzonia, goensi minor.

Rostrum pedesque nigricant.

- Goertan. 44. P. supra ex griseo-fuscus, subtus ex flavicante griseus, alarum maculis fordide albīs, vertice et uropygio rubris.

Goertan ou pic vert du Sénégal. *Buff. hist. nat. des ois. 7.*

p. 25.

Pic appellé Goertan du Sénégal. *Buff. pl. enlum. n. 320.*

Crimson-rumped Woodpecker. *Latham syn. I. 2. p. 583.*

n. 29.

Habitat ad fluvium Senegal, viridi multo minor.

Rostrum cum pedibus plumbeum.

- canus. 45. P. cinereus fronte obsoleta rubro maculata, dorso, humeris et teētricibus alarum et caudæ viridibus, uropygio flavo, remigibus caudaque fuscis, gula albida.

Picus

Picus viridis norwegicus. Briss. av. 4. p. 18. n. 4.
Grey-headed green Woodpecker. Edw. av. 2. p. 65. Lath.
syn. I. 2. p. 583. n. 30.
Habitat in Norwegia, Russia, Sibiria et Helvetia, magnitu-
dine viridis, Tungusis edulis.
Roltrum basi flavicans; remiges maculis flavicantibus, cauda
lineis obscuris notata; pedes et ungues nigri.

persicus. 46. P. luteus, supra, remigum apicibus et oculorum areis fer-
rugineus.

Picus luteus persicus. Briss. av. 4. p. 20. n. 5.

Picus luteus cyanopus persicus. Raj. av. p. 44. n. 9.

Persian Woodpecker. Will. orn. p. 141. Lath. syn. I. 2.
p. 584. n. 31.

Habitat in Persia, viridis circiter magnitudine, capite tamen
colloque crassioribus, rostro longiore, ferrugineo; pedes
caerulentes; ungues nigri.

semiro- 14. *P. maxilla superiore breviore. Mus. Ad. Fr. I. p. 16.*
stris. *Halfbilled Woodpecker. Lath. syn. I. 2. p. 586. n. 35.*

Habitat in India, rostro forsan tisu naturae mutilato, Mar-
tii magnitudine.

Roltrum pallidum; caput fuscum, singulis pennis apice fla-
vicantibus; corpus supra fuscum in cinereum vergens, sub-
tus album; cauda alaeque fuscae; remigum margo exte-
rior albo-maculatus.

pubes- 15. *P. dorso longitudinali villoso, rectrice extima alba macu-*
cens. *lis quatuor nigris.*

Picus varius virginianus minor. Briss. av. 4. p. 50. n. 18.

Epeiche ou pic varié de Virginie. Buff. hist. nat. des ois. 7.
p. 76.

Smallest Woodpecker. Catesb. Carol. I. p. 21. t. 21. f. 1.

Downy Woodpecker. Arct. zool. 2. p. 264. n. 165.

Little Woodpecker. Lath. syn. I. 2. p. 573. n. 19.

Habitat in America septentrionali, numerosissimus, audax
gregatim invadit arbores, quas innumeris foraminibus per-
tundit, et trucidat, hinc, pomariis potissimum, infestissi-
mus, passeris magnitudine, villoso cetera multum similis,
sed minor.

Mas occipite rubro.

villoso. 16. *P. dorso longitudinali subvilloso, rectricibus extimis totis*
albis. Kalm. it. 3. p. 43.

Picus varius virginianus. Briss. av. 4. p. 48. n. 17.

Epeiche ou Pic chevelu de Virginie. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 75.

Pic varié mâle de Virginie. *Buff. pl. enlum. n. 754.*
Hairy Woodpecker. Arct. zool. 2. p. 263. n. 164. Catesb.
Car. I. t. 19. f. 2. Lath. syn. I. 2. p. 572. n. 18.

Habitat in America septentrionali a sinu Hudsonis ad Caro-
linam frequentissimus, pomariis similiter infestissimus, a
9-12 fere pollices longus.

Rostrum corneum; caput nigrum, occipitis fascia, in mare,
transversa rubra, genae lineis duabus albis, totidemque
nigris; corpus subtus album; dorsum nigrum; alae ni-
grae, maculis albis in series dispositis; rectrices 2 inter-
mediae totae nigrae, 2 extimae totae albae, reliquae ni-
grae striis albis decussantibus.

major. 17. *P. albo nigroque varius, crisco occipiteque rubro. Fn.*
suec. 100. Scop. ann. I. p. 47. n. 53. Kram. el. p. 335.
n. 3.

Picus albo nigroque varius, rectricibus tribus lateralibus
utrinque albescens. Fn. suec. I. n. 81.

Picus albo-nigroque varius major. Nozem. nederl. Vogel.
t. 22.

Picus varius major. Raj. av. p. 43. A. 4. Briff. av. 4. p. 34.
n. 13.

Epeiche ou pic varié. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 57. pl.*
enlum. n. 196. et 595.

Greater spotted Woodpecker or Witwall. *Brit. zool. n. 85.*
t. E. Arct. zool. 2. p. 272. n. 162. Albin. av. I. t. 19.
Will. orn. p. 137. t. 21. Hayes brit. birds t. 9. Lath.
syn. I. 2. p. 564. n. 12.

Buntspecht. *Frisch av. t. 36.*

Habitat in Europa, septentrionali America et Siberia orientali, 9 pollices longus.

Frons ex rufescente lutescens; vertex niger; occiput feminae
pariter nigrum; dorsum nigrum; humeri albi; alae et
cauda lineis nigris et albis; pectus et abdomen alba, in
flavicanter colorem vergentia.

medius. 18. *P. albo nigroque varius, crisco pileoque rubris. Fn. suec.*
101. Scop. ann. I. p. 48. n. 34.

Picus albo nigroque varius, rectricibus tribus lateralibus
apice albo variegatis. Fn. suec. I. n. 82.

Picus major. Aldr. orn. I. p. 845. t. 846.

Picus varius ex albo et nigro. Gesn. av. 709.

Picus

Picus varius minor. Raj. av. p. 43. Briss. av. 4. p. 38. n. 14.

t. 2. f. 1.

Pic varié à tête rouge. Buff. pl. enlum. n. 611.

Middle spotted Woodpecker. Brit. zool. n. 86. t. 37. Arct. zool. 2. p. 278. D. Lath. syn. I. 2. p. 565. n. 13.

Habitat in Europa, majori satis similis, sed minor, et 8½ pollices longus.

minor. 19. P. albo nigroque varius, vertice rubro, crisco testaceo.

Fn. suec. 102. Scop. ann. I. 49. n. 55.

Picus albo nigroque varius, rectricibus tribus lateralibus scutinis minigris. Fn. suec. 83. Hasselq. it. 242.

Picus varius tertius. Raj. av. p. 43. n. 6.

Picus alias minor s. graminis. Gesn. av. 709.

Picus varius minor. Aldr. orn. I. p. 847. Raj. av. p. 43. n. 5. Briss. av. 4. p. 41. n. 15.

Petit Epeiche. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 62. pl. enlum. n. 598.

Lesser spotted Woodpecker. Brit. zool. n. 89. t. 37. Brit. zool. 2. p. 278. E. Will. orn. 138. t. 31. Albin. av. I. t. 20. Lath. syn. I. 2. p. 566. n. 14.

Kleiner Buntspecht. Frisch av. t. 37.

Habitat in Europa et Asia, ipsa adeo australi, hujus generis minimus, ut 5½ modo pollices longitudine aequet, certum medio satis similis.

Dorsum lineis albis et nigris; alae areis latis albis.

tricolor. 47. P. niger striis transversis albis, pectore et abdome rubris.

Picus varius mexicanus major, et Picus varius mexicanus minor. Briss. av. 4. p. 57. et 59. n. 21. 22.

Quauchochopitli, seu avicula ligna excavans. Fern. hist. n. hisp. c. 94. Raj. av. p. 163.

Epeiche du Mexique. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 70.

Varied Woodpecker. Lath. syn. I. 2. p. 568. n. 15.

Habitat in nova Hispania, magnitudine medii.

canaden- sis. 48. P. albus, vertice, dorso, humeris et rectricibus duabus intermediis nigris, reliquis et alis ex albo et nigro variis.

Picus varius canadensis. Briss. av. 4. p. 45. n. 16. t. 2. f. 2.

Quauhtotopotli alter. Fern. hist. n. Hisp. c. 165. p. 47. Raj. av. p. 162.

Epeiche du Canada, première espece. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 69.

Pic du Canada. Buff. pl. enlum. n. 345. f. 1.

- Canada spotted Woodpecker.** *Arct. zool. 2. p. 273. n. 163.*
Lath. syn. I. 2. p. 569. n. 16.
Habitat in Canada, majoris magnitudine.
Taenia alba caput circumscribens; altera nigra albo marginata ab oculis per cervicem; humeralibus intermixtae paucae pennae albae.
- varius.** 20. *P. albo nigroque varius, vertice rubro, crisco albo fusco-fasciato.*
Picus varius carolinus. Briss. av. 4. p. 62. n. 24.
Pic varié de la Caroline. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 77. pl. enlum. n. 785.
Yellow-bellied Woodpecker. *Arct. zool. 2. p. 275. n. 166.*
Catesb. Carol. I. t. 21. f. 2. Lath. syn. I. 2. p. 574. n. 20.
Habitat in America septentrionali numerosissimus, et fructibus infestissimus, 9 pollices longus.
Feminae rubor nullus; maris vertex linea nigra circumseptus; mentum rubrum; pectus et abdomen flavicans; illud nigro-maculatum; tectrices alarum nigrae, lineis duabus transversis albis; remiges primariae ex albo et nigro variae; cauda nigra.
- flavipes.** 49. *P. niger subtus albus, pedibus flavis.*
Yellow-legged Woodpecker. Arct. zool. 2. p. 275. n. 167.
Magnitudo p. minoris; occiput nigrum; alarum margo superior albus.
- bicolor.** 50. *P. ex griseo et albo varius, capitis cristati lateribus albis, remigibus fuscis albo maculatis.*
Epeiche ou Pic varié de la Encénada. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 74. pl. enlum. n. 748. f. 1.
Encenada Woodpecker. Lath. syn. I. 2. p. 575. n. 21.
Pico minore paulo major; rostrum plumbeum, uti et pedes; irides albae; corpus supra transversim, subtus perpendiculariter varium; femina tota fusca, crista carens.
- Cardinalis.** 51. *P. niger, subtus albus nigro-maculatus, vertice et occipite rubris.*
Pic Cardinal de l' isle de Luçon. Sonner. it. p. 72. t. 35.
Grand pic varié de l' isle de Luçon. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 67.
Cardinal Woodpecker. Lath. syn. I. 2. p. 576. n. 22.
Habitat in insula Luzonia, viridis magnitudine.
Pedes et rostrum nigrant; mandibulæ superioris basis pennis griseis cincta; ad utrumque capitis latus pone oculos per

per collum ad alas stria alba; pennae colli inferiores, dorsique superiores albo-marginatae; alae maculis albis; remigum rectricumque scapi flavi.

nubicus. 52. P. ex albo, rufo et fusco varius, vertice nigro albo-maculato, occipite rubro suberistato, pectore albido nigroguttato, cauda rufo fuscoque lineata.

Epeiche de Nubie ondé et tacheté. *Buff. hist. nat. des ois.* 7.

p. 66.

Pic tacheté de Nubie. *Buff. pl. enlum. n.* 667.

Habitat in Nubia, majore minor, 7½ pollices longus.

Rostrum nigrum; irides pallide fuscae; frons subfuscata; mentum et crissum albidum; pedes glauci.

moluc- 53. P. fusco-ater albo-undulatus, subtus albidus fusco sagit-
censis. tatus, remigibus rectricibusque fuscis albo-maculatis.

Petit epeiche brun des Moluques. *Buff. hist. nat. des ois.* 7.

p. 68.

Petit pic des Moluques. *Buff. pl. enlum. n.* 748. f. 2.

Brown Woodpecker. *Latham syn. I.* 2. p. 577. n. 24.

Habitat in insulis Moluccis, minoris magnitudine.

Rostrum et pedes obscura; genae albae; infra oculos macula fusca.

tridacty- 21. P. albo nigroque varius, pedibus tridactylis. *Fn. suec.* 103.
lus. *Aet. Stockh.* 1740. p. 222. *Scop. ann.* 1. p. 49. n. 56.

Forster aet. angl. 62. p. 388.

Picus tridactylus anomalos. *Mus. petrop.* 368.

Threetoed Woodpecker. *Aret. zool.* 2. p. 275. n. 168. *Edw.*
av. 3. t. 114. *Latham syn. I.* 2. p. 600. n. 51.

β. *Picus varius cayanensis.* *Briss. av.* 4. p. 54. n. 20.

Epeiche ou pic varié ondé. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 78.

Pic tacheté de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n.* 553.

Woodpecker with three toes. *Bancr. Guj.* p. 164.

*Habitat in America, Europa et Sibiria, rarius in australi,
11 pollices longus.*

*Vertex europaeo aureus, americano ruber; irides glaucae;
genae lineis longitudinalibus 3 nigris, 2 albis; occiput
dorsumque nigra; hoc superius albo maculatum; alae cau-
daque nigrae; remiges primariae et rectrices extimae ma-
culis albis; corpus subtus album; pedes obscuri.*

60. SITTA. *Rostrum subulatum teretiusculum, rectum, porrectum, integerrimum, mandibula superiore paulo longiore, apice compresso.*

Lingua emarginato-lacera, brevis, apice cornea.

*Nares exiguae vibrissis testae.
Pedes ambulatorii.*

euro-
paea.

1. *S. rectricibus nigris, lateralibus quatuor infra apicem albis.*
Fn. suec. 104. Scop. ann. I. p. 50. n. 57. Kram. elench.
p. 362.

*Sitta s. Picus cinereus. Gesn. av. 711. Aldr. orn. I. p. 852.
t. 853. Raj. av. p. 47. A. 4. Briss. av. 3. p. 588. n. 1.
t. 29. f. 3.*

*Sittelle ou Torcheapot. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 460. t.
20. pl. enlum. n. 623. f. 1.*

Woodcracher. Plot Oxfordsb. p. 175.

Nutbreaker. Albin. av. 2. t. 28.

Nuthatch or Nutjobber. Brit. zool. I. n. 89. t. 38.

European Nuthatch. Lath. syn. I. 2. p. 648. n. 1.

Blauspecht. Frisch av. t. 39.

2. *Sitta minor. Briss. av. 3. p. 592.*

Petit torcheapot. Belon ois. p. 305.

Petite Sittelle. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 470.

3. *Sitta carolinensis. Briss. av. 3. p. 596. n. 4.*

Sittelle à tête noire. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 473. var. 5.

Smaller Loggerhead. Brown jam. p. 475.

Nuthatch. Catesb. Carol. I. t. 22.

Blackheaded Nuthatch. Arét. zool. 2. p. 281. n. 171.

4. *Sitta carolinensis minor. Briss. av. 3. p. 598. n. 4.*

*Petite Sittelle à tête brune. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 474.
var. 6.*

Loggerhead. Sloane jam. p. 301. t. 259. f. 2.

Small Nuthatch. Catesb. Carol. I. t. 22.

Lefs Nuthatch. Arét. zool. 2. p. 282. n. 172.

5. *Sitta subtilis alba, capite colloque fuliginoso, dorso nigro.*

Beseke Schr. der naturf. Berl. Ges. 7. p. 455.

Habitat in Europae, Russiae asiaticae, y. et d. Americae septentrionalis temperatoris arborum truncis, bieme habitaculis hortisque appropinquans, caudam motacillae inflata-
moti-

motitans, solitarius, moribus ceterum picis multum similiis, coleoptera et larvas insectorum sub cortice arborum latentes effodiens, nuces rostro perforans et comedens, nudum struens reperto congruo foramine arboris, aliquando a pico reliquo, illudque limo obliniens pro capacitatem introitus; ova pariens 6-7 sordide alba rufo maculata, fidissima mater; junioris caro sapida; noctu cantillans.

Longitudo 6 fere pollicum; feminae paulo minor; corpus ex cano caerulescens, subtus album; linea atra per oculos et aures; hypochondria et femora ferruginea; uropygium ex albo et ferrugineo varium; rectrix 1 fascia alba, 2 macula alba, 3 et 4 apice albo, 5 dorso concolor.
β. minor, per paria conspicua, pugnax; γ. capite colloque nigris, δ. fuscis potissimum distinctae.

canaden- 2. *S. superciliis albis.*

Sitta canadensis. Briss. av. 3. p. 592. n. 2. t. 29. f. 4.

Sittelle du Canada. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 471.

Torchepot du Canada. Buff. pl. enlum. n. 623. f. 2.

Canada Nuthatch. Arct. zool. 2. p. 281. n. 170. Latham syn. I. 2. p. 651. n. 2.

Habitat in America, Asia, Europa septentrionali, non migrans, europaea magnitudine, cuius forsan varietas.

Vertex, cervix et humeri nigra; dorsum et uropygium glauca; genae, pectus et abdomen alba; remiges primariae obscurae, margine griseo; rectrices duae intermediae griseae; reliquae nigrae, macula ad apicem alba; crissum ferrugineum.

jamai- 3. *S. pileo nigro.*

Sitta jamaicensis. Briss. av. 3. p. 394. n. 3.

Sitta major, capite nigro. Raj. av. p. 185. n. 33.

Sitta f. Picus cinereus major capite nigro. Sloan. jam. 2. p. 300. t. 259. f. 1.

Sittelle à huppe noire. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 472.

Loggerhead. Brown. jam. p. 475.

Jamaica Nuthatch. Lath. syn. I. 2. p. 652. n. 3.

β. Sitta jamaicensis minor. Briss. av. 3. p. 596.

Petite Sittelle à huppe noire. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 473.

Least Loggerhead. Brown. jam. p. 475.

Habitat in Jamaiae dumetis, stupida, 5½ pollices longa, β. minor.

Corpus supra cinereum, subtus album; remiges nigricantes, margine cinereo; cauda nigricans, lineis transversis albis; rostrum, pedes et ungues nigra.

- major. 4. *S. subtilis albida*, capite dorsoque griseis, gula alba, remigibus caudaque nigris margine aurantiis.
Sitta f. picus cinereus major, rostro curvo. *Raj. av. p. 186.*
n. 34.
 Grande Sittelle à bec crochu. *Buff. hist. nat. des ois. 5.*
p. 475.
 An other sort of Loggerhead. *Sloane jam. p. 301. n. 19.*
 Great Nuthatch. *Lath. syn. I. 2. p. 653. n. 4.*
Habitat in Jamaica, vermicibus, cimicibus e. c. viellitans,
7½ pollices longa.
Rostrum medio crassius, apice aduncum.
- maevia. 5. *S. supra plumbea*, subtilis glauca, gula alba, tectricibus alarum supra albo-punctatis.
Sittelle grivelée. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 476.
Wall-creeper of Surinam. Edw. glean. t. 346.
Spotted Nuthatch. Lath. syn. I. 2. p. 654. n. 5.
Habitat in Surinamo, 6 pollices longa.
Caput ex caerulecente plumbeum; tectrices alarum interiores obscurae albo-marginatae; pennae inferiores linea media longitudinali alba in punctum terminata; pedes obscure fuscii.
- surinamensis. 6. *S. subtilis ferruginea*, capite colloque ex rufo castaneis, dorso medio albo, alis caudaque nigris, tectricum alarum rectricumque apicibus, et remigum secundiarum margine albis.
Surinam Nuthatch. Latham syn. I. 2. p. 654. n. 6. t. 28.
Habitat in Surinamo, hujus generis minima, 3½ pollices longa.
Rostrum paulisper incurvum, obscure fuscum; occiput et cervix maculis oblongis nigris notata.
- caffra. 7. *S. corpore subtilis flavo*, superne flavo nigroque vario, pedibus nigris. *Sparrm. mus. Carlson. t. 4.*
Habitat ad caput bonae spei.
Rostrum rectiusculum, subdepressum, mandibula superiore convexiuscula, subtriquetra; color subtilis lutescens; rectrices supra nigricantes, subtilis olivaceae, apice flavicanentes; unguis lutescens.
- finensis. 8. *S. palpebra inferiore purpurea*. *Osb. it. 2. p. 12.*
Chinele Nuthatch. Lath. syn. I. 2. p. 655. n. 7.
Habitat in Sina, saepius cicuratus, oryzae seminibus viellitans.

Caput

Caput cum rostro nigrum cristatum; dorsum obscure ferrugineum, glauco colore internitente; abdomen et pectus alba, gula versus nigra; prope oculos macula exigua coccinea, et proxima huic area magna nivea; a temporibus ad gulum linea nigra; mentum et gula alba, limitibus nigris; uropygium flavum; rectrices alarum ferrugineae; rectrices nigrantes, apice albae.

61. TODUS. *Rostrum* subulatum depresso sculum,
obtusum, rectum, basi setis patulis.

Lingua — —
Pedes gressorii.

viridis. 1. *T. viridis*, pectore rubro.

Todus. Briss. av. 4. p. 528. n. 1. t. 41. f. 2.

Rubecula viridis elegantissima. Sloane jam. 2. p. 306. t. 263.
f. 1. Raj. av. p. 187. n. 40.

Todier de l'Amerique septentrionale. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 225. t. 11.

Todier de S. Domingue. Buff. pl. enlum. n. 585. f. 1. 2.

Green Sparrow or green Hummingbird. Brown. jam. p. 476.
Edw. av. 3. t. 121.

Green Tody. Gen. of birds p. 61. t. 6. f. 1.

Habitat in calidiori America, insulisque vicinis, solitarius, stupidus, mollioribus insectis viettans, 4 pollices longus.

Mandibula superior fusca, inferior aurantia; irides castaneae; corpus subtus ochroleucum; gulae macula rubra; pedes et ungues grisei. Mari corpus supra caerulescens, abdomen album, pectus roseum.

cinereus. 2. *T. cinereus* subtilis luteus.

Todus cinereus. Briss. av. app. p. 134. Pall. spic. 6. t. 3. A.

Tie-tie ou Todier de l'Amerique meridionale. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 223.

Todier de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 585. f. 3.

Grey and yellow Fly-catcher. Edw. glean. t. 262.

Cinereous Tody. Lath. syn. I. 2. p. 658. n. 2.

Habitat in Surinami et Gujanæ locis apertis, insectis viettans, viridi paulo major.

Rostrum

Todi genus in calidiori praesertim America habitat, muscicapæ satis affine, cui ramen anteriorum digitorum medius ab ortu inde discretus.

Rostrum obscurum, basi rubens; frons atra; tectrices alarum superiores et remiges ex atro fuscae margine luteo; cauda subcuneata; rectrices 2 intermediae nigrae, reliquae fuscae, apice (in mare) albo; pedes incarnati.

fuscus. 3. *T. ferrugineus subitus olivaceus albo-maculatus, tectricibus alarum fascia obscura notatis.*

Brown Tody. *Gener. of Birds*, p. 62. t. 6. f. 2. *Lath. syn. I. 2. p. 659. n. 3.*
Habitat in calidiori America, viridi minor.

caeruleus. 4. *T. caeruleus, gula alba, temporibus, gula et abdome aurantiis.*

Todier bleu à ventre orangé. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 229.*

Todier de Juda. *Buff. planch. enlum. n. 783. Salern. orn. p. 126. n. 16.*

Blue Tody. *Lath. syn. I. 2. p. 659. n. 4.*
Habitat in America, viridis magnitudine, 3½ pollices longus. Rostrum et pedes incarnata; infra oculum area purpurascens.

varius. 5. *T. ex caeruleo, nigro et viridi varius, rostro, capite, gula, cervice, pedibus, unguibus et cauda nigris, caudae margine et tectricibus alarum superioribus viridibus.*

Todus varius. *Briss. av. 4. p. 531. n. 2.*

Ispida indica. *Aldrov. av. 3. p. 520.*

Todier varié. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 229.*
Habitat in India, reguli magnitudine.

leucocephalus. 6. *T. ater, capite subcristato gulaque lacteis. Pall. spicil. 6. p. 19. t. 3. f. 2.*

White-headed Tody. *Lath. syn. I. 2. p. 660. n. 6. t. XXIX.*
Habitat in America, phoenicuri magnitudine.

Rostrum nigricans; mandibula inferior alba, apice nigricans; alae breves; remiges interius et subtus, apicibus que obsoletae, fuscescentes; cauda brevis, aequalis.

brachyurus. 7. *T. niveus, vertice, cervice, dorso caudaque brevi nigris. Pall. spic. 6. p. 18. 19.*

Short-tailed Tody. *Lath. syn. I. 2. p. 660. n. 7.*

Habitat in America, praecedentis habitu et magnitudine.

plumbeus. 8. *T. supra ex plumbeo canus, subtus lacteus, remigibus rectricibusque nigris. Pall. spicil. 6. p. 17.*

Plumbeous Tody. *Lath. syn. I. 2. p. 661. n. 8.*

Habi-

*Habitat in Surinamo, reguli magnitudine, cinerei rostro.
Remigum et testiculum secundiarum, rectricumque latera-
lium margo albus; color verticem versus sensim nigricans.*

- obscu- 9. T. supra ex fusco niger, subtus sordidissime albus.
rus. Dusky Tody. *Arct. zool.* 2. p. 283. n. 173. *Lath. syn.* I. 2.
p. 661. n. 9.
*Habitat in insula Rhode, lusciniae magnitudine, insectis
vicitans, arbores emortuas frequentans, cantu suavi.
Remiges et testrices margine griseae; cauda aequalis.*
- regius. 10. T. ex atro fuscus, subtus rufescens, crista spadicea apice
nigro - maculata, mento, superciliis et pectore albis.
Roi des Gobe - mouches. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. p. 552.
Tyran hupé de Cayenne. *Buff. pl. enlum.* n. 289.
King Tody. *Latham syn.* I. 2. p. 662. n. 10.
*Habitat in Cayenna, 7 pollices longus.
Rostrum obscure fuscum; crista verticis transversa, 4-5 or-
dinibus pennarum apice rotundatarum constans; testrices
alarum ex rubicundo fuscae; remiges obscurae; pectus
lineis transversis nigricantibus; pedes incarnati.*
- paradi- 11. T. capite cristato nigro, corpore albo, cauda cuneata, re-
facus. tricibus intermediis longissimis.
Muscicapa paradisi. Syst. nat. XII. I. p. 324. n. 1.
Corvus paradisi. Syst. nat. X. I. p. 107.
*Pica Papoensis, Icterus maderaspaturum cristatus, et Musci-
capa cristata alba capitis bonae spei. Briff. av.* 2. p. 45.
n. 6. p. 92. n. 7. p. 414. n. 20. t. 41. f. 2.
Manucoditota cristata ex albo nigroque varia. Raj. av. 195.
t. 2. f. 13.
Avis paradisi. Seb. mus. I. p. 85. t. 52. f. 3.
*Verdiole, et Moucherolle hupé à tête couleur d'acier poli.
Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 105., 4. p. 558.
*Gobe - mouche blanc hupé du Cap de bonne esperance. Buff.
pl. enlum.* t. 234. f. 2.
Pied bird of paradise. Edw. av. t. 113.
Paradise Fly - catcher. Lath. syn. II. I. p. 345. n. 44.
- β. Todus alis caudaque helvolis.
Muscicapa cristata capitis bonae spei. Briff. av. 2. p. 418.
n. 31. t. 41. f. 1.
- γ. Todus subtus albus, pectore ex caerulecente cinereo.
Crested long - tailed Pie. Edw. glean. t. 325.

δ. To-

8. Todus cristatus brasilianus.

*Muscicapa brasiliensis cristata. Briss. av. 2. p. 416. n. 30.
Avis paradisiaca brasiliensis, seu Curiri Acamaky cristata.
Seb. mus. 2. t. 87. f. 2.*

*Habitat in Africa et insula Madagascar, muscis vicitans,
alaudae magnitudine, 7 plerumque pollices longitudine
superans.*

*Caput azureum, crista declinata; corpus album, rachi pen-
narum nigra; remiges nigrae utroque margine albae; re-
ctrices niveae, rachi et margine exteriore nigrae.*

ferrugi- 12. T. ex ferrugineo niger, subtus ferrugineus, cauda fusca,
neus. temporibus obscuro et albo variis.

Ferruginous bellied Tody. Lath. syn. I. 2. p. 662. n. 11.

Habitat in Cayenna, 7½ pollices longus.

*Rostrum nigrum; nares ovatae; supercilia pallida; remiges
cum pedibus obscurae.*

novus. 13. T. fuscus, subtus albus, jugulo et pectore fuso macula-
tis, unguibus flavis.

White-chinned Tody. Lath. syn. I. 2. p. 663. n. 12.

*Longitudo 9 pollicum; nares ovales; cauda rotundata; pe-
des fusi.*

platy- 14. T. ex fuso lutescens, subtus luteus, gula albicante, ver-
rhynchos. tice plumbeo, alis caudaque fuscis, rostro maximo. Pall.
spicil. 6. p. 19. t. 3. C.

Broad-billed Tody. Lath. syn. I. 2. p. 664. n. 13.

*Magnitudo Lusciniae; rostrum semiovale, acutum, pla-
num; naribus late excavatis albicantibus; pedes cum un-
guibus flavescentes.*

macro- 15. T. niger, mento, genarum lateribus, abdomine, criso,
rhyhnchos. uropygique rubris.

Great-billed Tody. Lath. syn. I. 2. p. 664. n. 14. t. 30.

*Magnitudo praecedentis, longitudo 8 pollicum; rostrum basi
latum, ceterum praecedentis, ex atro caeruleum, apice
mandibularumque marginibus albidis; tectrices caudae su-
periores rubrae; scapularium pennarum sex albae, acu-
minatae, supra alas pendulae.*

cristatus. 16. T. crista coccinea, corpore fuso albo-maculato. *Naturf.*

17. p. 21. n. 5. t. 1.

Habitat in Guinea,

Pen-

Pennae cristae apice nigro-mARGINatae; rostrum depresso,
tenue, lanceolatum, obtusum; nares exiguae, parum te-
tae; corpus supra obscurum ex griseo fuscum; tectrices
alarum adperso albo, remiges nigricantes; gula ex albi-
do cinerea; pectus et abdomen fuscum et obscure cinereo un-
dulata; rectrices fuscae, subtus dilutius, 2 intermediae
nigricantes.

62. ALCEDO. Rostrum trigonum, crassum, rectum,
longum, acuminatum.

Lingua carnosa, brevissima, plana,
acuta.

Pedes gressorii plerisque.

cristata. I. A. brachyura subcristata caerulea, subtus rufa, crista nigro-
undulata.

Alcedo amboinensis cristata. Seb. mus. I. t. 63. f. 4.

Ispida philippensis cristata. Briff. av. 4. p. 483. n. 6. t. 37.
f. 3.

Petit Martin - pêcheur hupé des Philippines. Buff. pl. enlum.
n. 756. f. 1.

Vinthi. Buff. hist. nat. des oif. 7. p. 205.

Crested Kingsfisher. Lath. syn. I. 2. p. 632. n. 22.

β. Ispida indica cristata. Briff. av. 4. p. 506. n. 17.

Alcedo cristata orientalis elegantissime picta. Seb. mus. I. p.
104. t. 67. f. 4.

Habitat in Amboina et insulis Philippinis, 5 pollices circiter
longa.

Rostrum nigrum; crista virens; ad utrumque colli latus stria
caerulea ab oculo incipiens; humeri, tectrices alarum su-
periores, remigum minorum, rectricumque margines, et
rectrices 2 intermediae totae violacea; genae rufae; gula
ex rufo alba; remiges fuscae; pedes cum unguibus rubi-
cundi. In Germania visam referunt Sander et Goeze
Naturf. I 3. p. 182. et I 5. p. 157.

orienta- 16. A. viridis subtus rufa, vertice, gula, fascia oculari, remi-
lis. gibusque caeruleis.

Ispida indica. Briff. av. 4. p. 479. n. 4. t. 37. f. 1. A.

Eastern Kingsfisher. Latham syn. I. 2. p. 633. n. 23.

Habitat in India, 4½ polices longa.

Rostrum rubrum; supra oculos stria alba; infra area rufa;
rectricum margo exterior viridis; pedes et unguis nigri.

2. A.

inda. 2. A. brachyura virens subtus fulva, fascia pectorali nebulosa.

Spotted Kingfisher. *Edw. glean.* t. 335. *Lath. syn.* I. 2.

p. 642. n. 32.

Habitat in Guiana, 7 pollices longa.

*Rostrum nigrum; linea supra infraque oculos fulva; alae
albo punctatae; pedes rubri.*

surina- 17. A. brachyura caerulea, subtus albicans, pectore rufo, ver-
mensis. tice ex virescente atro: maculis transversis viridibus.

Martin - pêcheur. *Ferm. surin.* 2. p. 181.

Surinam Kingfisher. *Lath. syn.* I. 2. p. 642. n. 33.

*Habitat in Guiana, in foveis prope aquas nidificans, 5-6
ova pariens, et piscibus vivitans.*

*Rostrum nigrum; rihtus croceus; dorsum lineis obsoletis ni-
gris; menti mediique abdominis candori admixtus rubor;
pennarum pectoris apex dilute caeruleus.*

Ispida. 3. A. brachyura supra cyanea, subtus fulva, loris rufis. *Scop.*
ann. I. p. 55. n. 64.

Ispida supra caerulea subtus ferruginea. *Muf. Ad. Fr.* I.
p. 16.

Ispida. *Gesn. av.* 571. *Raj. av.* p. 48. n. A. I. *Olin. av.*
39. *Aldr. orn.* 3. p. 518. t. 520. *Briff. av.* 4. p. 471.
n. I.

Alcyon. *Gesn. av.* 85. *Aldr. orn.* 3. p. 497.

Martin - pêcheur ou Alcyon. *Buff. hist. nat. des oif.* 7. p. 64.
pl. enlum. n. 77.

European Kingfisher. *Brit. zool.* I. p. 246. t. 38. *Arct.*
zool. 2. p. 284. A.

Common Kingfisher. *Lath. syn.* I. 2. p. 626. n. 16.

Kingfisher. *Albin. av.* I. t. 54. *Will. orn.* p. 146. t. 24.

B. Ispida senegalensis. *Briff. av.* 4. p. 485. n. 7. t. 39. f. I.

Baboucard. *Buff. hist. nat. des oif.* 7. p. 193.

*Habitat in Africa, Asia et Europa, frigoris patientissima,
ova 7 aut plura in fovea ad aquam posita pariens, pisces
integros devorans, quorum reliquias indigestas glomera-
tim evomit; gentium borealium philtrum; 7 pollices longa.*

*Rostrum nigrum; vertex tectricesque alarum virides, ma-
culis caeruleis; cauda elegantissime caerulea; pedes rubri.*

4. A.

Genus hoc per omnem terrarum orbem dispersum, ad aquas potissimum habitat, pisci-
bus vivitans, quos mira arte capit, integros deglutit, et partim indigestarum
glomeris evomit; alis, quamvis plerumque brevibus, celeriter volat; color caeruleus
cum varietatibus dominans; nares exiguæ, in plurimis speciebus tectae.

- ebulosa.
n. I. 2.
- a; alae*
- fo, ver-*
us.
- , 5-6
- letis ni-*
rubor;
- . Scop.
- . Fr. I.
- lin. av.
p. 471.
7. p. 64.
- Arct.
- t. 24.
f. I.
- tifflsma,*
piscs
lomera-
es longa.
es, ma-
es rubri.
4. A.
- it, pisci-*
ligestiarum
or caerule-
iae.
- Eritha- 4. A. brachyura, dorso caeruleo, abdomine luteo, capite uro-
ca. pygoque purpureis; gula nuchaque albis.
Ispida bengalenfis torquata. Briss. av. 4. p. 503. n. 15.
Martin-pêcheur à front jaune. Buff. hist. nat. des ois. 7.
p. 195.
Bengal Kingfisher. Alb. av. 3. p. 28. t. 29.
Red-headed Kingfisher. Lath. syn. I. 2. p. 629. n. 17.
- β. Alcedo minor, capite et cervice ex aurantio rubris.
Red-headed Kingsfisher. Gener. of birds, p. 61. t. 5.
Habitat in Bengala, ispidae magnitudine, ultra 6 pollices
longa.
Rostrum pedesque rubri.
- purpu- 18. A. subitus rufescente-aurea, capite, uropygio caudaque ru-
rea. fo-aureis, dorso telectricibusque alarum ex caeruleo atris,
remigibus nigris, gula alba.
Martin-pêcheur pourpré. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 199.
Martin-pêcheur de Pondichery. Buff. pl. enlum. n. 778. f. 2.
Purple Kingsfisher. Lath. syn. I. 2. p. 630. n. 18.
Habitat in India, erithacae magnitudine.
Rostrum pedesque rubri; pone oculos versus dorsum proce-
dens linea purpurea, caeruleo terminata.
- madagaf- 5. A. subbrachyura rufa, gula alba, remigibus nigricantibus.
cariensis. Ispida madagascariensis. Briss. av. 4. p. 508. n. 18. t. 38. f. 1.
Martin-pêcheur de Madagascar. Buff. hist. nat. des ois. 7.
p. 199.
Martin-pêcheur roux. Buff. pl. enlum. n. 778. f. 1.
Rufous Kingsfisher. Lath. syn. I. 2. p. 630. n. 19.
Habitat in Madagascar, $5\frac{1}{4}$ polices longa.
Rostrum pedesque rubri; corpus subitus ex rufo album; cau-
da nigricans, rectricum margo exterior, et 2 intermediae
totae rufae.
- caeruleo- 19. A. caerulea, subitus rufa, gula alba, remigibus nigrican-
cephala. tibus.
Martin-pêcheur à tête bleue. Buff. hist. nat. des ois. 7.
p. 198.
Petit Martin-pêcheur du Sénégal. Buff. pl. enlum. n. 356.
f. inf.
Blue headed Kingsfisher. Lath. syn. I. 2. p. 631. n. 20.
Habitat in Madagascar, 4 polices longa.
Rostrum pedesque rubri; vertex splendide caeruleus, dilu-
tius undulatus.

benga- 20. A. ex caeruleo viridis, subtus rufa, cauda remigibusque
lenfis. fuscis, capite striis transversis caeruleis notato.

Ispida bengalensis. Briff. av. 4. p. 475. n. 2.

Martin-pêcheur de Bengale. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 201.*

Little Indian Kingfisher. *Edw. av. 1. t. II. f. inf.*

Indian Kingfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 631. n. 21.*

β. *Ispida bengalensis minor. Briff. av. 4. p. 477. n. 3.*

Little Indian Kingfisher. *Edw. av. 1. t. II. f. sup.*

Habitat in Bengal, 4½ pollices longa, β. minor.

*Rostrum nigrum, mandibulae inferioris basi incarnata; fas-
cia ocularis rufa; bujus loco in β. maculae duae rufae,
altera ad basin mandibulae superioris, altera pone aures;
teétrices alarum superiores ex caeruleo virides, apice cae-
ruleae; remigum caudaeque margo ex caeruleo viridis,
in β. concolor.*

superci- 6. A. submacroura viridis, subtus alba, fascia viridi, superci-
liosa. liis fulvis.

Ispida americanā viridis. Briff. av. 4. p. 490. n. 9.

Martin-pêcheur vert et orange. *Buff. hist. nat. des ois. 7.
p. 218.*

Martin-pêcheur petit verd de Cayenne. *Buff. planch. enlum.
n. 756. f. 2. 3.*

Little green and orange Kingfisher. *Edw. glean. t. 245.*

Supercilious Kingfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 643. n. 34.*

Habitat in America, 6 pollices longa.

*Rostrum nigricans, mandibulae superioris basi rubicunda;
gula, jugulum, teétrices alarum interiores et hypochon-
dria aurantia; remiges ex atro fuscae utrinque fulvo-
maculatae; reétrices 2 intermediae totae virides, reliquae
intus albo maculatae; pedes incarnati.*

leuco- 21. A. ex caeruleo viridis, subtus flavescens, capite et cervice
rhyncha. spadiceis, remigibus cinereis, cauda supra caerulea, sub-
tus cinerea.

Ispida americana caerulea. Briff. av. 4. p. 505. n. 16.

Alcedo americana s. Apiastra. Seb. mus. I. t. 53. f. 3.

Martin-pêcheur à bec blanc. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 200.*

White-billed Kingfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 644. n. 35.*

Habitat in America, vix 5 pollices longa.

*Rostrum albidum; teétrices alarum a corpore remotissimae
cinereae.*

brasiliens. 22. A. ex rufo, badio, fusco et albo varia, subtus alba, remi-
gis. gibus majoribus caudaeque rufis: maculis transversis albis.

Ispi-

Ispida brasiliensis. *Briss. av. 4. p. 510. n. 19.*
 Gip-gip. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 217.*
 Brasiliian Kingsfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 641. n. 31.*
Habitat in Brasilia, ispidae magnitudine.
Rostrum oculique nigri; fascia ocularis, pedes et unguis fuscus.

america- 23. A. ex nigricante viridis, subtus alba, viridi maculata, pectoris jugulique area rufa.
 na.

Martin-pêcheur vert et blanc de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 216. pl. enlum. n. 591. f. 1. 2.*
 White and green Kingsfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 641. n. 30.*
Habitat in Cayenna, 6 pollices longa.
Rostrum nigrum; ab ejus basi linea alba infra oculos ad occiput produeta; alae maculis nonnullis albis; pedes rubri; feminae nulla area rufa.

bicolor. 24. A. viridis, subtus ex rufo aurea, fascia pectoris nigro et albo undulata, alis caudaque albo maculatis.

Martin-pêcheur vert et roux. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 215.*
 Martin-pêcheur vert et roux de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 592. f. 1. 2.*
 Rufous and green Kingsfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 640. n. 29.*
Habitat in Cayenna, ispidae magnitudine, 8 pollices longa.
Rostrum nigrum; a naribus ad oculos stria rufa, torquis dimidiatus rufus, feminae nullus, nec fascia pectoralis; pedes rubicundi.

macu- 25. A. fusca flavescens-maculata, subtus alba fusco-maculata, lata. gula flava.

Ispida brasiliensis naevia. *Briss. av. 4. p. 524. n. 25.*
 Matuiti. *Raj. av. p. 165. n. 3. Will. orn. p. 199. t. 38.*
Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 212.
 Brasiliian spotted Kingsfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 640. n. 28.*
Habitat in Brasilia, sturni magnitudine.
Rostrum rubrum, mandibula superiore paulisper longiore; pedes et unguis cinerei.

Aleyon. 7. A. macroura cristata caerulescens, abdomine albo, pectore ferrugineo, macula alba ante oculos.

Ispida cristata carolinensis. *Briss. av. 4. p. 512. n. 21.*
 Aleyon. *Raj. av. p. 184. n. 14.*
 Kingfisher. *Catesb. carol. I. t. 69.*
 Belted Kingsfisher. *Arct. zool. 2. p. 279. n. 169. Latham syn. I. 2. p. 637. n. 27.*

β . Ispida ludoviciana.

Martin-pêcheur de la Louisiane. *Buff. pl. enlum. n. 715.*

Crab catcher. *Sloan. jam. 2. p. 313. n. 54. t. 55. f. 3.*

γ . Ispida dominicensis cristata. *Briss. av. 4. p. 415. n. 22.*

Martin-pêcheur hupé de S. Domingue. *Buff. pl. enlum. n. 593.*

Jaguacati. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 210.*

American Kingfisher. *Edw. av. 3. t. 115.*

δ . Ispida brasiliensis cristata. *Briss. av. 4. p. 511. n. 20.*

Jaguacati guacu. *Marcgr. bras. 194. Raj. av. p. 49. n. 2. Will. orn. p. 147. n. 2. t. 24.*

Habitat in America a sinu Hudsonis ad novam Hispaniam usque, β . in Louisiana et Jamaica, γ . in insula S. Domingi, vere versus sinum Hudsonis migrans, δ . in Guiana et Brasilia, piscibus, aliquando etiam lacertis vivitans, ad ripas altiores nidificans, foramine profundo horizontali, ova 4 alba pariens, ex quibus Junio prodeunt pulli; caro rancida; longitudo 13 pollicum.

Rostrum nigrum, in β . ex atro fuscum; in γ . mandibulae inferioris basi rubicunda; caput in β . plumbeum, in γ . cum superiore corporis parte splendide ferrugineum; torquis albus; in β . mentum, gula jugulunque alba; pectoris fascia transversa ferruginea, in γ . punctata; rectrices alarum, remiges rectricesque apice albæ; in β . remiges secundariae cum rectricibus, in γ . et δ . remiges omnes albo maculatae; remiges primariae nigrae, maculis transversis albis; in δ . remiges rectricesque nigrae; pedes et unguis fuscus; in β . pedes rubri, abdomine ferrugineo; in γ . pedes rubri, unguis nigri; in δ . pedes et unguis nigri.

torquata. 8. A. macroura subcristata cano-caerulescens, torque albo, alis caudaque albo-maculatis.

Ispida mexicana cristata. *Briss. av. 4. p. 518. n. 23. t. 41. f. 1.*

Achalalactli s. Piscium vorax. *Hernand. mex. 13. Will. orn. p. 390. Raj. av. p. 126.*

Alatli. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 208.*

Martin-pêcheur hupé du Mexique. *Buff. pl. enlum. n. 284.*

Cinereous Kingfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 636. n. 26.*

Habitat in Martinica et Mexico, picae magnitudine, 15 $\frac{1}{2}$ pollices longa.

Rostrum ex atro fuscum basi rubens. Pedes rubri.

cayennensis. 26. A. caerulea subtus alba, fascia infra occiput transversa nigra. Ispida cayennensis. *Briss. av. 4. p. 492. n. 10.*

Tapa-

Taparara. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 207.*
 Cayenne Kingsfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 635. n. 25.*
Habitat in Cayenna et Guiana, numerosa, solitaria, in riparum antris ova pariens, sturno vix minor, 9½ pollices longa.
Mandibula superior nigra, inferior rubra; uropygium cyanum; remigum caudaeque margo caeruleus; pedes rubri.

- atrica- 27. A. ex violaceo caerulea, subtus alba, capite, cervice, humeris, alarumque apicibus nigris, abdomine rufescente.
 pilla. Martin - pêcheur à coëffe noire. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 189.*
 Martin - pêcheur de la Chine. *Buff. planch. enlum. n. 673.*
 Black-capped Kingsfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 624. n. 15.*
- β. *Alcedo luzonica.*
 Martin - pêcheur de l'isle de Luçon. *Sonner. it. p. 65. t. 31.*
Alcedo australis, supra nigra, subtus alba, abdomine ferrugineo.
Habitat in Sina, β. in insula Luzonia, 10 pollices longa.
Rostrum pedesque rubri.
- tuta. 28. A. macroura, supra olivacea, subtus alba, superciliis albis, torque ex virescente nigro.
 Respected Kingsfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 624. n. 14.*
Habitat in insula Tahiti, incolis sacra, 8½ pollices longa.
Rostrum nigrum, mandibula inferiore alba; pedes nigri.
- venerata. 29. A. fusca, subtus pallida, cauda rotundata, remigum, tectricum, rectricumque margine viridi.
 Venerated Kingsfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 623. n. 13.*
Habitat in insula amica, Apye, incolis sacra, 9 pollices longa.
Rostrum nigrum, mandibulae inferioris basi alba; remigum rectricumque scapi badii; pedes obscuri.
- facra. 30. A. ex dilute caeruleo viridis, subtus alba, superciliis pallide ferrugineis, remigibus caudaeque nigricantibus.
 Sacred Kingsfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 621. n. 12.*
- β. *Alcedo superciliis albis.*
 γ. *Alcedo vertice ex virescente nigro, subtus et nucha pallide ferruginea.* *Lath. syn. I. 2. t. 27.*
- δ. *Alcedo capite nigro, vertice caeruleo, superciliis, cervice et abdomine lutescentibus, alis caudaeque caeruleis.*
- ε. *Alcedo torque albo.*
 Martin - pêcheur à collier blanc des philippines. *Sonner. it. p. 67. t. 33.* *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 192.*

Habitat in insulis Societatis, ♂. in nova Seelandia, ♀. in insulis Philippinis, incolis sacra, ispida major, 9 $\frac{1}{2}$ pollices longa.

Rostrum plumbeum, in ♀. nigrum, mandibula inferiore subtus alba, in ♂. basi flavicante; infra oculos striga angusta ex aurantio ferruginea, infraque hanc in nucha altera caerulea, in ♂. et ♀. nigra; colli laterumque pectoris pennae albae in ♂. cinereo, in ♀. obscuro marginatae; mentum in ♀. album; in ♂. gula collumque alba; crissum in ♂. nigrum; remigum caudaeque margo exterior caeruleus; uropygium in ♀. pallide cyaneum; pedes nigri, in ♀. obscuri, in ♂. fuscii, in ♀. nigricantes.

chloroce- 31. *A. viridis, collo albo, torque nigro, alis caudaque thalassinis.*

Martin-pêcheur à tête verte. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 190.*
Martin-pêcheur à tête verte du cap de bonne esperance. *Buff. pl. enlum. n. 783.*

Green-headed Kingsfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 620. n. 11.*

Habitat in insula Molucca Bouro, 9 pollices longa.

Rostrum, cauda subtus, pedesque nigricant.

caerulea. 32. *A. caerulea, subtus rufa, superciliis et torque albis.*

Ispida indica torquata. Briff. av. 4. p. 481. n. 5. t. 37.f. 2.A.
White collared Kingsfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 620. n. 10.*
Habitat in India, ispida major, 7 fere pollices longa.

Rostrum griseum, apicem versus nigricans; sub oculo macula rufa; gula pallide rufescens; uropygium caudaeque teatrices superiores egregie virent; pedes grisei; unguis nigricans.

fusca. 33. *A. cristata olivacea subtus exalbida obscure striata, temporebus et occipite fordiste albis, cauda rotundata ferrugineo et chalybeo lineata apice alba.*

Le plus grand Martin-pêcheur. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 181.*

Grand martin-pêcheur de la nouvelle Guinée. *Buff. pl. enl. n. 663. Sonner. it. p. 171. t. 106.*

Great brown Kingsfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 609. n. 1.*

Habitat in nova Guinea, hujus generis maxima, 18 pollices longa.

Rostrum mandibula superior nigra, inferior alba, basi nigra; crista feminae nulla, maris constans pennis angustis fuscis dilutius striatis; feminae vertex, utriusque Jexus genae collique latera ex atro fusca; feminae torques albus, et dorium

dorsum integrum olivaceum; mari hujus pars inferior cum uropygio pallide thalassina; ejusdem coloris macula in teccicum alarum media; remiges in femina ex vidente fuscae, in mare margine exteriore caeruleae, intus et apice nigrae, basi in nonnullis alba; pedes flavi, feminae ex atro fusi; unguis nigri.

capensis. 9. A. macroura cinereo-caerulea, subtus fulva, pectore testaceo, rostro rubro.

Ispida capitis bona spec. Briss. av. 4. p. 488. n. 8. t. 36. f. 3.
Martin - pêcheur du cap de bonne esperance. Buff. pl. enlum. n. 590.

Martin - pêcheur à gros bec. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 184.
Habitat ad caput bona speci, 14 pollicés longa.

Rostrum apice nigricans; caput cinereum in fulvum vergens; corpus supra ex caeruleo viride, dorso parte superiore in cinereum vergente; pedes et unguis rubri.

maxima. 34. A. suberistata ex plumbeo nigra albo-punctata, gula alba, jugulo nigro, pectore et abdomen sanguineis. Pall. spicil. 6. p. 15.

Oiseau. Bosman it. guin. p. 273. f. n. 13.

Great african Kingsfisher. Lath. syn. I. 2. p. 611. n. 3.

β. Alcedo ex nigricante grisea albo-maculata, subtus rufa, postice alba.

Martin - pêcheur hupé. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 188. pl. enlum. n. 679.

Habitat in Africa, cornicis magnitudine.

Rostrum atrum, naribus linearibus; verticis nuchaeque plume in cristam elongatae; latera colli litura porosissimum alba notata; feminae pars colli et jugulum ex testaceo ferruginea; pectus et abdomen alba, lineolis transversis nigris, lacerti alarum albi guttis raris nigris notati; remiges nigrae apice punctisque in seriem dispositis albis; rectrices nigrae apice albo, geminaque gutterum albarum serie; pedes nigerrimi.

senegalensis. 10. A. macroura cyanea subtus alba, capite cano, teccicibus alarum nigris.

Ispida senegalensis major. Briss. av. 4. p. 494. n. 11. t. 40. f. 1.

Alcedo semicaerulea. Forsk. Fn. arab. p. 2. n. 5.

Martin - pêcheur à tête grise. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 194.

Martin - pêcheur à tête grise du Sénégal. Buff. pl. enlum.

n. 594.

β. Alcedo ex caeruleo viridis, subtus ex fulvescente flava.

Ff 4

Martin-

Martin - pêcheur Crabier. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 183.*
pl. enlum. n. 334.

Crab - eating Kingsfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 618. n. 9.*

γ. Alcedo capite colloque obscure albis.

δ. Alcedo supra caerulea, subtus ex rufo flava, gula alba.

Martin - pêcheur bleu et noir du Sénégal. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 194.*

Martin - pêcheur du Sénégal. *Buff. pl. enlum. n. 356. f. 1.*

Habitat in Africa et Arabia, potissimum ad fluvium Senegal,

γ. in S. Jago et Abyssinia, 9, β. 12, δ. 7 pollices longa.

Rostri mandibula superior rubra, inferior nigra, in β. utra-
que ferruginea, in γ. rubra, in δ. rufa; caput collum-
que cana, genarum macula nigra, in δ. caerulea; in β.
pone utrumque oculum stria et in alarum tecliticibus area
nigra; remiges nigrae, basi intus albae, margine exte-
riore ex caeruleo virides; in γ. alae nigrae fascia trans-
versa media caerulea, intus ferruginea albidae et obscu-
rae; pectus et abdomen in γ. ferruginea; rectrices nigrae,
margine exteriore ex caeruleo virides, in β. totae ex cae-
ruleo virides, in δ. caeruleae, in γ. supra caeruleae, sub-
tus obscurae; pedes nigri, in β. ferruginei, in γ. et δ. rubri.

Ieucoce- 35. A. ex caeruleo viridis, capite, collo et subtus alba, remi-
phala. gibus fuscis.

Martin - pêcheur à tête et cou couleur de paille. *Buff. hist.*
nat. des ois. 7. p. 190.

Martin - pêcheur de Java. *Buff. pl. enlum. n. 757.*

White - headed Kingsfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 617. n. 8.*

Habitat in Java, 12 pollices longa.

Candor in stramineum colorem vergens; vertex striis nigris;
dorsum ex caeruleo viride; cauda et alae ex viridi pro-
funde caeruleae; remigum margo caeruleus.

flavicans. 36. A. subtus flavicans, capite dorsoque viridibus, rostro ru-
bro, cauda caerulea.

Habitat in insula Celebes, Ten - rou - joulon incolis dicta.

smyr- II. A. macroura ferruginea, alis, cauda, dorsoque viridibus.
nensis. *Scop. ann. I. p. 55. n. 65.*

Ispida smyrnenis. Briff. av. 4. p. 499. n. 13.

Smyrna Kingsfisher. Albin. av. 3. t. 37. Lath. syn. I. 2.
p. 615. n. 7.

β. Ispida madagascariensis caerulea. *Briff. av. 4. p. 496. n. 12.*
t. 38. f. 2.

Martin - pêcheur bleu et roux. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 182.*
Grand-

183. Grand-Martin-pêcheur de Madagascar. *Buff. pl. enl. n. 232.*
 Great Gambia Kingfisher. *Edw. av. I. t. 8.*
9. γ. *Ispida major bengalensis. Briss. av. 4. p. 501. n. 14.*
 Martin-pêcheur de la côte de Malabar. *Buff. pl. enl. n. 894.*
 Great Bengal Kingfisher. *Albin. av. 3. t. 28.*
Habitat circa Smyrnam, β. ad Gambiam et in Madagascar,
γ. in Bengala, 8½, β. 10, γ. 10½ pollices longa.
- f. 1. Rostrum rubrum; irides albidae, in γ. flavae; gula alba,
 in β. ochroleuca; fascia pectoralis, in γ. jugulum quoque,
 pectus et abdominis anterior pars alba; testrices alarum
 corpori proximae in β. violaceae, exteriore, remiges 10
 primariae media parte extus, reliquae barba tota extero-
 re, et cauda supra thalassina, haec subtus nigra; in γ.
 testrices alarum partim caeruleae, partim ferrugineae;
 remiges primariae intus et subtus nigricantes; pedes ru-
 bri, in γ. cum unguibus aurantii; alias unguis nigrican-
 tes, in β. fuscī.
- novae 37. A. nigra, albo-maculata.
 Guineae. Martin-pêcheur de la nouvelle Guinée. *Sonner. it. p. 171.*
t. 107.
 New Guinea Kingsfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 614. n. 6.*
Habitat in nova Guinea.
- Rostrum, irides, pedesque nigricant; maculae irregulares,
 in capite, dorso, alis, et cauda rotundae; in collo et ab-
 domine oblongae; ad utrumque colli latus binae ampliae.
- aegyptia. 38. A. fusca maculis ferrugineis, subtus albida maculis cine-
 reis. *Hasselq. it. p. 245. n. 23.*
 Egyptian Kingsfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 613. n. 5.*
*Habitat in Aegypto, in sycomoro et phoenice nidificans, ra-
 nis, piscibus, insectis vicitans.*
- Rostrum nigricans; gula ex ferrugineo alba; testrices cau-
 dae superiores totae albae; cauda aequalis cinerascens;
 pedes virescentes; unguis nigricantes.
- semicae- 41. A. brachyura, dorso postico, cauda medioque alarum cae-
 rulea. rulea, humeris nigris, capite pectoraque cinereo, ven-
 tre ferrugineo. *Forsk. Fn. arab. p. 2.*
*Habitat circa Yemen Arabiae, pici minoris magnitudine, spi-
 tham circiter longa.*
 Rostrum pedesque miniati.
- rudis. 12. A. macroura nigra albido varia, subtus alba.
 Ispida ex albo et atro varia. *Briss. av. 4. p. 520. n. 24. t. 39.*
f. 2.

Martin - pêcheur pie. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 185.*

Martin - pêcheur hupé du cap de bonne esperance. *Buff. pl. enlum. n. 716.*

Black and white Kingsfisher. *Edw. av. I. t. 9. Lath. syn.*

I. 2. p. 612. n. 4.

Habitat in Asia et Africa, 11 pollices longa.

Rostrum et pedes cum unguibus nigri; supercilia alba; penae capitis et cervicis nigrae albo-marginatae; remiges majores apice nigrae; cauda alba, fascia versus apicem nigra; rectrices 2 extimae maculis 2 semicircularibus nigris.

Dea.

13. A. rectricibus duabus longissimis medio attenuatis, corpore nigro-caerulecente, alis virecentibus.

Ispida ternatana. Briff. av. 4. p. 525. n. 26. t. 40. f. 2.

Avis paradisiaca ternatana. Seb. mis. I. p. 74. t. 46. f. 3.

Martin - pêcheur des Moluques. *Salern. orn. p. 126. n. 10.*

Martin - pêcheur de Ternate. *Buff. pl. enlum. n. 116.*

Martin - pêcheur à longs brins. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 196.*

Ternate Kingsfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 634. n. 24.*

Habitat in insula Ternate, sturni magnitudine, ultra 13 pollices longa.

Rostrum aurantium; caput, cervix et alae splendide caerulea; dorsum et humeri fusca, margine caeruleo; uropygium corpusque subtus album in roseum vergens; rectrices intermediae caeruleae, basi et apice roseae, reliquae ex roseo albae, exteriori margine fusco; pedes et unguis rubicundi.

paradi-
sea.

14. A. rectricibus intermediis duabus longissimis, corpore vi-

ridi-aureo, pedibus scansoriis.

Galbula longicauda. Briff. av. 4. p. 89. n. 2. t. 5. f. 2.

Jacamar à longue queue. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 22. pl. enlum. n. 271.

Swallow-tailed Kingsfisher. *Edw. av. I. t. 10.*

Paradise Jacamar. *Lath. syn. I. 2. p. 605. n. 3.*

Habitat in Surinamo, insectis vivitans, per paria volans, alaudae magnitudine, 11½ pollices longa.

Rostrum quadrangulare, acuminatum, cum pedibus ad digitos usque plumos nigrum; caput ex violaceo fuscum; gula, jugulum, tectricesque alarum inferiores alba; rectrices 2 intermediae 6, reliquae unum pollicem longae.

grandis. 39. A. cupreo-aurea, subtus ferruginea, capite artubusque vi-

ridi aureis, pedibus scansoriis. *Pall. spicil. 6. p. 10.*

Great

Great Jacamar. *Lath. syn. I. 2. p. 605. n. 2.*

Magnitudo pici viridis; rostrum tetraëdrum, planilaterum, naribus nudis; digitæ anteriores fissæ; cauda cuneiformis, corpore longior.

Galbula. 15. A. cauda cuneiformi, corpore viridi-aureo, subtus rufo, pedibus scanforiis.

Galbula. *Briss. av. 4. p. 86. n. 1. t. 5. f. 1.*

Jacamaciri. *Marcgr. bras. 202. Raj. av. p. 44. n. 3. Will. orn. p. 139. t. 22. Edw. glean. t. 334.*

Jacamar. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 220. t. 10. pl. enlum. n. 238.*

Cupreous Jacamar. *Gener. of birds, p. 60. t. 3.*

Green Jacamar. *Lath. syn. I. 2. p. 603. n. 1.*

β. Galbula cauda longiore. *Lath. syn. I. 2. t. 26.*

Habitat in Gujanæ et Brasiliæ silvis humidis densioribus frequens, et solitaria, viicitans insectis, velociter, sed breviter volans, voce brevi, suavi, edulis, alaudæ fere magnitudine, et vix 9 pollices longa.

Rostrum quadrangulare, 2 pollicum, acuminatum, nigrum, naribus ad basin ovatis; irides glaucae; mentum album, nonnunquam flavicans; corpus subtus in β. dilute ferrugineum; pedes breves, debiles, plumosi, ex virecente flavi, unguibus nigris.

tridactyl. 40. A. pedibus tridactylis. *Mantiss. 1771. p. 524. Pall. spic. 6. p. 10. t. 2. f. 1. Vosm. monogr. Amstel. 1768. t. 1.*

Martin-pêcheur de l'isle de Luçon. *Sonner. it. p. 66. t. 32.*

Three-toed Kingsfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 645. n. 36.*

Habitat in Surinamo et India, insulisque oceani indici, ispidæ magnitudine, 4 circiter pollices longa.

Rostrum tetraëdrum cum pedibus ochroleucum; corpus subtus album; in aliis vertex ferrugineus, cinctu violaceo; macula temporum azurea, infra hanc alia longitudinalis alba; genae ochroleucae; gula nivea; remiges ex ferrugineo nigrae, margine interiore ferrugineæ, apice azureæ; cauda ferruginea; in aliis corpus supra ex rufu ferrugineum, vertice tamen, uropygio et pennarum dorsaliuum nonnullarum apice violae in modum tintis; pectus ferrugineum; in aliis caput et corpus supra colore florum syringæ; alae ex caeruleo atrae, remigum margine caeruleo; pedes rubicundi.

63. MEROPS. *Rostrum curvatum, tetraëdrum, compressum, carinatum, acutum.*
Nares exiguae ad basin rostri.
Lingua gracilis apice (plerumque) laciniata.
Pedes gressorii.

Apiaster. I. M. dorso ferrugineo, abdomine caudaque viridi-caerulefcente, rectricibus duabus longioribus, gula lutea. *Mus. Ad. Fr. 2. p. 21. Scop. ann. I. p. 54. n. 63.*

Merops. *Bell. av. 16. Gesu. av. 599. Aldr. orn. I. p. 871. t. 872. et 873. Charl. onom. 87. t. 87. Raj. av. p. 49. n. 3.*

Merops galilaeus. *Hasselq. it. 247. n. 24. Forsk. Fn. arab. p. I. n. 3.*

Apiaster. *Briss. av. 4. p. 532. n. 1.*

Ispida cauda molli. *Kram. el. p. 337.*

Guêpier. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 480. t. 23. pl. enlum. n. 938.*

Bee-eater. *Alb. av. 2. t. 44. Will. orn. p. 147. t. 24.*

Common Bee-eater. *Latham syn. I. 2. p. 667. n. 1.*

β. Schaeghaghi. *Forsk. Fn. arab. p. I.*

Habitat in Europa et Asia, cicadis, culicibus, muscis, apibus praesertim, insectorum defectu seminibus visitans, gregaria, nidum struit in cavernis subterraneis ad aquas ex muscis, et 5-7 ova alba parit, 10 pollices longa.

Rostrum nigrum; irides rubrae; frons ex caeruleo virens; vertex, occiput et cervix badia; a rostro ad occiput stria nigra; cauda cuneiformis, thalassina, rectricum margine intus cinereo; pedes spadicei, unguibus ex rubicundo nigris.

viridis. 2. M. virens, fascia pectorali nigra, gula caudaque caeruleis, rectricibus duabus elongatis.

Merops viridis supra ferruginea. *Amoen. acad. 4. p. 237.*

Ispida viridis supra ferruginea. *Osb. it. p. 96.*

Apiaster madagascariensis torquatus. *Briss. av. 4. p. 549. n. 8. t. 42. f. 2.*

Guespier à collier de Madagascar. *Buff. pl. enlum. n. 740.*

Guêpier vert à gorge bleue. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 497.*

Indian Bee-eater. *Gen. of birds p. 60. t. 7. Edw. av. 4. t. 183. Lath. syn. I. 2. p. 670. n. 2.*

β. Apiaster bengalensis torquatus. *Briss. av. 4. p. 552. n. 9.*

Bengal Bee-eater. *Albin. av. 3. t. 30.*

γ. Mc-

γ . Merops aegyptius. *Forsk. Fn. arab. p. I. n. 2.*

δ . Apiaster philippensis minor. *Briss. av. 4. p. 555. n. 10. t. 43. f. 2.*

Habitat in Bengala et Java, γ . in Aegypto, δ . in insulis Philippinis, passeris magnitudine, fere 10 pollices longus. β . ultra 11 pollices, δ . 7 $\frac{1}{2}$.

Rostrum nigrum; gula in γ . flava, caudaque aequalis; fascia pectoralis in δ . caerulea, et cauda pariter aequalis; pedes fuscii, in γ . incarnati.

conge- 3. M. flavescens, uropygio virescente, remigibus apice rubris, n. restringibus basi luteis.

Merops alter. *Gesn. av. 601. t. 602. Aldr. orn. I. p. 875. t. 876. Raj. av. p. 49. n. 4.*

Apiaster icterocephalus. *Briss. av. 4. p. 537. n. 2.*

Guêpier à tête jaune. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 510.*

Other Bee-eater of Aldrovandus. *Will. orn. p. 148.*

Yellow-headed Bee-eater. *Lath. syn. I. 2. p. 672. n. 3.*

Habitat in Europa australi, apiastro paulo minor.

Taenia ocularis nigra; dorsum et humeri badia; testrices alarum minores caerulecentes, majores flavae; remiges nigrae; pedes flavi.

super- 4. M. viridis, linea frontis supra infraque oculos alba, gula ci- liosus. flavicante, restringibus duabus elongatis.

Apiaster madagascariensis. *Briss. av. 4. p. 546. n. 7. t. 42. f. I.*

Guêpier de Madagascar. *Buff. pl. enlum. n. 259.*

Patirich. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 495.*

Supercilious Bee-eater. *Lath. syn. I. 2. p. 673. n. 4.*

β . Merops persica. *Pall. it. 2. p. 708. n. 16. t. D.*

Habitat in Madagascar, β . migratorius ad mare caspium, ultra 11 pollices longus, β . apiastri magnitudine.

Rostrum et oculorum area nigra; vertex ex virescente badius; pedes fuscii; unguis nigri; in β . frons cyanea, lora nigra; area sub collo magna ex sanguineo rufa.

philippi- 5. M. viridis, subtus flavescens, uropygio caeruleo, cauda ae- nus. quali.

Apiaster philippensis major. *Briss. av. 4. p. 560. n. 12. t. 43. f. I.*

Grand guêpier des Philippines. *Buff. pl. enlum. n. 57.*

Guêpier vert à queue d'azur. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 404.*

Philippine Bee-eater. *Lath. syn. I. 2. p. 674. n. 5.*

Habitat in insulis Philippinis, apiastro minor, ultra 8 $\frac{1}{2}$ pollices longus.

Rostrum nigrum; linea ocularis nigra; pedes et unguis fuscii.

6. M.

cinereus. 6. M. rubro flavoque variegatus, subtus flavo-rubescens, rectricibus duabus longissimis rubris.

Apiaster mexicanus. *Briß. av.* 4. p. 541.

Avicula de Quauhcilui. *Seb. mus.* I. p. 50. t. 31. f. 10.

Guêpier à tête grise. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 491.

Cinereous Bee-eater. *Latham syn.* I. 2. p. 675. n. 6.

Habitat in nova Hispania, alaudae magnitudine, 9 $\frac{1}{4}$ pollices longus.

Rorlrum viride; caput, remiges et rectrices exteriores cinerea.

cafer. 7. M. griseus, crasso flavo, cauda longissima.

Merops fuscus, ani regione flava. *Koelreuter n. comm. ac.*

Petrop. II. p. 429. t. 14. f. 1.

Guêpier gris d'Ethiopie. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 492.

Habitat in Aethiopia.

Inter pulchre delineatas icones animalium ultra 150, quas misit amicissimus I. Burmannus, visa est haec avis. An idem cum promerope?

flavicans. 8. M. albido, capite albo et fulvo vario, pectore rubicundo, dorso flavo, uropygio, alis, caudaque rufis, rectricibus 2 intermediis longissimis.

Apiaster flavicans. *Briß. av.* 4. p. 539. n. 3.

Manucodiata secunda Aldrovandi. *Raj. av.* p. 21. n. 2.

Guêpier à tête jaune et blanche. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 490.

Aldrovandus's second bird of Paradise. *Will. orn.* p. 91. t. 11.

Yellow Bee-eater. *Lath. syn.* I. 2. p. 676. n. 7.

Apiastro major, 20 pollices longus; rorlrum breve, ex flavicante virens; lingua longa, acuta; oculi flavi; palpebrae rubrae; rectrices 2 intermediae 8 pollicibus reliquis longiores.

brasiliensis. 9. M. rutilus, supra ex fusco et nigro varius, cauda remigibusque pallide caeruleis.

Apiaster brasiliensis. *Briß. av.* 4. p. 540. n. 4.

Pica brasiliensis. *Seb. mus.* I. t. 66. f. 1.

Merops rouge et bleu. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 479.

Brazilian Bee-eater. *Latham syn.* I. 2. p. 676. n. 8.

Habitat in Brasilia, apiastri magnitudine, 9 pollices longus.

Rorlrum, alae subtus et pedes cum unguibus flavi; tectrices alarum minores obscure rubrae.

badius. 10. M. ex caeruleo viridis, capite, cervice, humerisque badiis, rectricibus supra caeruleis, subtus ex griseo fulcis, intermediis duabus longioribus acuminatis.

Apiaster

*Apiaster ex Franciae insula. Briff. av. 4. p. 543. n. 6. t. 44.
f. 2.*

Guêpier de l'isle de France. Buff. pl. enlum. n. 252.

Guêpier maron et bleu. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 493.

Chestnut Bee-eater. Lath. syn. I. 2. p. 677. n. 9.

β. Merops alis caudaque badii.

*Guêpier maron et bleu du Sénégal. Buff. hist. nat. des ois. 6.
p. 494.*

Guêpier à longue queue du Sénégal. Buff. pl. enlum. n. 314.

*Habitat in Franciae Insula, β. ad fluvium Senegal, 10-12
pollices longus.*

*Fascia infraocularis fusca; teétrices alarum superiores virides, subtus fulvae, in β. badiæ; remiges subtus griseæ,
4 intimæ totæ virides, 13 medianarum apice nigrae; re-
étrices margine interiori griseæ; 2 intermediae 2 pollici-
bus et ultra longiores, in β. nigrae; rostrum nigrum;
pedes rubicundi; ungues nigricantes.*

*chrysoce- 11. M. viridi-aureus, subtus ex caeruleo-viridis, capite et cer-
phalus, fulvis, gula flava, reétricibus duabus intermediis lon-
gioribus.*

*Grand guêpier vert et bleu à gorge jaune. Buff. hist. nat. des
ois. 6. p. 502.*

*Yellow-throated Bee-eater. Lath. syn. I. 2. p. 678. n. 10.
Longitudo 10 pollicum; frons et supercilia ex caeruleo viri-
dia; teétrices caudae superiores virides.*

*angolen- 12. M. viridis aureo-nitens, fascia oculari cinerea nigro ma-
culata, alis caudaque cuneiformi subtus cinereis, gula fla-
va, jugulo badio.*

*Apiaster angolensis. Briff. av. 4. p. 558. n. 11. t. 44. f. 1. A.
Petit Guêpier vert et bleu à queue étagée. Buff. hist. nat. des
ois. 6. p. 503.*

Angola Bee-eater. Lath. syn. I. 2. p. 679. n. 11.

Habitat in Angola, 5½ pollices longus.

*Rostrum et unguis nigri; pedes cinerei; color subtus in cae-
ruleum vergens.*

*erythro- 13. M. viridis, subtus flavicans, capite et cervice rubris, gula
cephalus. flava, alis caudaque aequali subtus cinereis.*

*Apiaster indicus erythrocephalus. Briff. av. 4. p. 563. n. 13.
t. 44. f. 3. A.*

Guêpier à tête rouge. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 508.

Red-headed Bee-eater. Lath. syn. I. 2. p. 679. n. 12.

Habi-

- Habitat in India, 6 pollices longus.
Rostrum nigrum; irides rubrae; fascia oocularis nigra; re-
ctrices 2 intermediae remigesque margine cinereae; pedes
cinerei; unguis nigricans.*
- nubicus. 14. M. ex caeruleo viridis subtus ruber, dorso, alis caudaque
furcata lateritiis.
Guêpier rouge à tête bleue. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 506.
Guêpier de Nubie. *Buff. pl. enlum.* n. 649.
Blue headed Bee-eater. *Lath. syn.* I. 2. p. 680. n. 13.
*Habitat in Nubia, apiastro vix minor, 10 pollices longus.
Rostrum nigrum; remiges majores apice ex caerulecente ci-
nereae, secundariae ex atro fuscae; pedes dilute cinerei.*
- erythro- 15. M. olivaceus subtus exalbidus, gula flava, alis caudaque
pterus. rubris apice nigris.
Guêpier rouge et vert du Sénégal. *Buff. hist. nat. des ois.* 6.
p. 507.
Petit guêpier du Sénégal. *Buff. pl. enlum.* n. 318.
Redwinged Bee-eater. *Lath. syn.* I. 2. p. 681. n. 14. t. 31.
*Habitat ad fluvium Senegal, 6 pollices longus.
Rostrum pedesque nigri.*
- cayen- 16. M. viridis, alis caudaque apice nigra rufis.
nensis. Guêpier vert à ailes et queue rousses. *Buff. hist. nat. des
ois.* 6. p. 509.
Guêpier à queue et ailes rousses de Cayenne. *Buff. pl. enl.*
n. 454.
Cayenne Bee-eater. *Lath. syn.* I. 2. p. 681. n. 15.
*Habitat in Cayenna.
Rostrum nigrum; remiges basi albae, et prouti rectrices, ad
latera nigrae; pedes ex flavesciente solito longiores.*
- surina- 17. M. varius, occipite rubente, cervice ex virente flavo, re-
mensis. migibus virentibus, nigro et caeruleo variis.
Guêpier. *Ferm. surin.* 2. p. 184.
Surinam Bee-eater. *Lath. syn.* I. 2. p. 682. n. 16.
*Habitat in Surinamo.
Irides spadiceae; unguis nigri.*
- novae 18. M. ex virescente splendide niger, teetribus alarum ma-
Seelan- ribus et fasciculo pennarum crisparum ad utrumque colli-
dia. latus albis, teetribus caudae aequalis caeruleis.
New Zealand Creeper. *Brown. zool. illustr.* p. 18. t. 9. Cook
it. I. p. 48.
Poë Bee-eater. *Lath. syn.* I. 2. p. 682. n. 17.

Habi-

Habitat in nova Seelandia, 11 pollices longus, incolis sacer, egregie cantans, carne delicata.

Pedes et ungues nigri; os interius cum lingua flavum; haec apice nigra, setis horrida; pennae colli laxae, longae, aliquantum crispatae, stria per medium scapi longitudinem alba.

- niger. 19. M. niger, fasciculo plumarum magno pone alas, crissaque flavis, cauda cuneiformi, rectricibus duabus extimis extus et apice albis.

Yellow-tufted Bee-eater. *Lath. syn. I. 2. p. 683. n. 18.*

Habitat in insula Owhyhi et vicinis, alaudae magnitudine, 14 pollices longus, frequens; flavae pennae ornamenti loco inserviunt incolis.

Nares membrana tectae; lingua apice filamentosa; pennae capitis gulaeque breves, rectricesque acuminatae; duas intermediae 7, extimae 2 pollices longae.

- rufus. 20. M. rufus, remigibus fuscis exteriore margine rufis.

Fournier. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 476.*

Fournier des Buenos Ayres. *Buff. pl. entom. n. 739.*

Rufous Bee-eater. *Lath. syn. I. 2. p. 683. n. 19.*

Habitat in Bonariis, 8½ pollices longus.

Corpus subtus in flavum vergens; cauda 3 pollicum; digitus pedum ab ortu inde separati, uti promeropis; unguis digiti posterioris reliquis major.

- moluccensis. 21. M. griseus, orbitis nudis, genis nigris, cauda subaequali.

Polochion. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 477.*

Molucca Bee-eater. *Lath. syn. I. 2. p. 684. n. 20.*

Habitat in insula Bouro, ex Moluccis una, cuculi canori circiter magnitudine, 14 pollices longus.

Rostrum nigricans, 2 pollicum, naribus in ejus medio per viis, postice membrana tectis; lingua rostri longitudine, penicillo pilorum terminata; occipiti candor admistus; gulae pennae nonnullae apice argenteae; rectrices 5½ pollices longae, extimis paulo brevioribus; pedes obscuri; digitus exterior basi cum medio connexus; posterioris unguis reliquis multo major.

64. UPU-

Meropes in America rariores, insectis, nonnulli apibus vespisque potissimum visitant, alcedines imitantur struendo nidum, voce plerique ingrata. Upupa a promero. pe vix differt, nisi cristata.

64. UPUPA. *Rostrum arcuatum, longum, gracile, convexum, subcompressum, obtusifuscum.*

Nares exiles ad basin rostri.

Lingua obtusa, integerrima, triquetra, brevissima.

Pedes ambulatorii.

Erops. 1. U. cristata variegata. *Fn. suec.* 105. *Scop. ann.* I. p. 53.
n. 62.

Upupa. *Bell. av.* 72. a. *Gesn. av.* 776. *Aldrov. orn.* 2.
p. 702. *Jonst. av.* t. 42. *Raj. av. p.* 48. A. 6. *Kram.*
el. p. 337. *Charl. onom.* 63. t. 63. *Briss. av.* 2. p. 455.
n. 1. t. 43. f. 1. *Nozem. nederl. Vog.* t. 66.

Hupe ou Puput. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 439. *pl. enlum.*
n. 52.

Bubbola. *Olin. ucc.* p. 36.

Ter-choous or Messenger-bird. *Pocock it.* I. p. 209.

Hoop or Hoopoe. *Brit. zool.* I. n. 90. *Arct. zool.* 2. p.
283. A. *Will. ornith.* p. 145. *Albin. av.* 2. t. 42. 43.
Edw. glean. t. 345.

Wiedhopf. *Frisch av.* t. 43. *Günth. Nest. u. Eyer,* t. 27.
Habitat in Europa, Asia et Africa, solitaria, migratoria,
victitans insectis, putroris amans, in cavis arborum, vel
murorum, ipsa tellure, bis vel ter per annum ova pariens
2-7 cinerea, perdricis ovis paulo minora, sed longiora;
non nisi terrefacta cristam erigit, 12 pollices longa.

Crista pallide aurantia, apice nigra; dorsum et alae lineis
nigris albisque; collum ex rubente fuscum; pectus et ab-
domen alba; rectrices 10 nigrae, lunula in medio alba;
pedes nigri.

capensis. 4. U. cristata fusca, subtus alba, alarum macula alba.

Huppe noire et blanche du cap de bonne esperance. *Buff.*
hist. nat. des ois. 6. p. 463.

Huppe du cap de bonne esperance. *Buff. pl. enlum.* n. 697.
Madagascar Hoopoe. *Lath. syn.* I. 2. p. 690. n. 2.

Habitat in insularum Madagascari et Bourbon, nec non ca-
pitis bonae spei densis silvis, 16 pollices longa.

Rostrum flavicans; lingua apice filamentosa; palatum tuber-
culis plenum; crista minor, quam epopi, acuminata, al-
ba; rectrices 12, 2 intermediae reliquis paululum brevio-
res;

res; pedes et unguis flavicantes; posterioris digitus unguis magnus, valde uncinatus.

- Prome- 2. U. rectricibus sex, intermediis longissimis. *Mill. illusfr. t.*
rops. VI. A.
Promerops superne fuscus, inferne albus, pectore rufescente.
Briff. av. 2. p. 461. n. 1. t. 43. f. 2.
Promerops gris à ventre tâcheté. *Buff. hist. nat. des ois. 6.*
p. 469.
Promerops du cap de bonne esperance. *Buff. pl. enl. n. 637.*
Cape promerops. *Lath. syn. I. 2. p. 692. n. 5.*
Habitat frequens ad caput bonae îpcii, alaudae circiter ma-
gnitudine, 17 pollices longa.
Rostrum, pedes et unguis nigra; uropygium et rectrices cau-
dae superiores olivaceae, inferiores flavae; gula alba;
jugulum et pectus rufescens; abdomen album, in mare
una cum pectore maculatum; rectrices 12, intermediae 6
 $12\frac{1}{4}$ pollices, extimae 2 tantum longae.
- mexica- 5. U. grisea, thalassino et purpurascente admisto, subtus flava,
na. remigibus majoribus caeruleis, rectricibus quatuor inter-
mediis longioribus.
Promerops mexicanus. *Briff. av. 2. p. 463. n. 2.*
Avis Ani mexicana cauda longissima. *Seb. mus. I. p. 73. t. 45.*
f. 3.
Promerops à ailes bleues. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 467.*
Mexican Promerops. *Latham syn. I. 2. p. 691. n. 4.*
Habitat in novae Hispaniae montibus altioribus, muscis,
apibus, aliis insectis larvisque viellitans, 18 $\frac{3}{4}$ pollices longa.
Rostrum nigricans, ad latera flavicans; supra oculos macu-
la flava; cauda $12\frac{1}{4}$ pollices longa ex nigricante grisea,
viridi et purpureo tinelu intermisso.
- paradi- 3. U. castanea cristata, rectricibus duabus longissimis.
fea. Promerops indicus cristatus. *Briff. av. 2. p. 464. n. 3.*
Avis paradisiaca cristata orientalis rarissima. *Seb. mus. I.*
p. 48. t. 30. f. 5.
Promerupe. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 465.*
Crested Promerops. *Lath. syn. I. 2. p. 691. n. 3.*
Habitat in India, rario, sturni magnitudine, 19 polices
longa.
Rostrum, pedes et unguis plumbei; caput et collum egregie
nigra; verticis pennae 2 pollicum in cristam elongatae;
dorsum, uropygium, humeri, alae et cauda pallide badia;

pectus, abdomen et rectrices caudae inferiores pallide cinerea; rectrices 2 intermediae 14, reliquae 3 pollices longae.

fusca. 6. U. fusca, subtus grisea albo nigroque striata, vertice chalybeo, gula juguloque nigris, rectricibus duabus intermediis longissimis.

Promerops brun de la nouvelle Guinée. Sonner. it. p. 164. t. 100.

Promerops brun à ventre rayé. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 471. t. 22.

Promerops de la nouvelle Guinée. Buff. pl. enlum. n. 638. New Guinea brown Promerops. Lath. syn. I. 2. p. 694. n. 6. Habitat in nova Guinea, 22 pollices longa.

Rostrum, irides et pedes nigra; feminae caput collumque fusca, occipiti, dorso, aliquo viror admixta; rectrices 12, intermediae duas 13, extimae brevissimae 4 pollices longae.

magna. 7. U. nigra, capite, cervice et pectore, pennarumque humeralium, subalarium et ad caudae latus positarum falcatarum parte exteriore viridi-aureis, cauda longissima.

Grand Promerops de la nouvelle Guinée. Sonn. it. p. 166. t. 101. Buff. planch. enlum. n. 639.

Grand Promerops à paremens frisés. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 472.

Grand Promerops. Lath. syn. I. 2. p. 695. n. 7. t. 32.

Habitat in nova Guinea, 4 fere pedes longa.

Rostrum 3 pollicum, et pedes nigri; nigredini supra violaceus, ad alas caeruleus tinetus adspersus; rectrices 12, binae intermediae 21 pollices, extimae 5 modo longae.

aurantia. 8. U. fulva, capite colloque aureis, cauda aequali.

Promerops barbadensis. Briff. av. 2. p. 466. n. 4.

Avis paradisiaca americana elegantissima. Seb. mus. I. p. 102. t. 66. f. 3.

Promerops orangé. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 474.

Orange Promerops. Latham syn. I. 2. p. 697. n. 8.

β. Promerops mexicanus luteus. Briff. av. 2. p. 467. n. 5.

Cochitlolotl. Fern. hist. n. Hisp. c. 161. Raj. av. p. 168.

Promerops orangé (fem.). Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 472.

Habitat in Barbados, β. in novae Hispaniae calidioribus, vermis et seminibus vicitans, sturni magnitudine, 9½ pollices longa.

Rostrum

Rostrum aureum, basi plumis rubris cinctum, in β. nigrum; remiges majores ex rubro aurantiae; in β. alae, collum et caput ex cinereo nigroque varia; pedes flavi, in β. cinerei, unguibus nigris.

65. CERTHIA. *Rostrum arcuatum, tenue, subtrigonum, acutum.*

Lingua acuta.

Pedes ambulatorii.

familia- 1. *C. grisea*, subtus alba, remigibus fuscis: decem macula
ris. alba. *Fn. succ. 106. Scop. ann. I. p. 52. n. 59.*

*Certhia. Gesn. av. 251. Aldrov. orn. I. p. 869. t. 870.
Bell. av. 98. a. Raj. av. p. 47. n. 5. Briff. av. 3. p. 603.
n. I. Nozem. nederl. Vogel, t. 30. Günth. Nest. u.
Eyer, t. II. f. sup.*

Ispida cauda rigida. Kram. el. p. 337. n. 2.

*Grimpereau. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 481. t. 21. f. I.
pl. enlum. n. 681. f. I.*

*Creper. Brit. zool. n. 91. t. 39. Arct. zool. 2. p. 285.
n. 174. Will. orn. p. 144. t. 23. Albin. av. 3. t. 25.
Lath. syn. I. 2. p. 701. n. I.*

β. *Certhia major.*

Grand Grimpereau. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 486.

Grauspecht. Frisch av. t. 39.

*Habitat in Europae et septentrionalis Asiae atque Americae
arboribus reptans, ex rimis corticis muscisque adhaeren-
tibus insecta, eorumque ova et larvas exquirens, quibus
vicitat; primo vere nidificat, et 20 ova parit.*

*Caput collumque fuscum, striis nigris; uropygium muste-
linum; testrices alarum ex fusco et nigro variae; remi-
ges obscurae, marge albo, lineis ferrugineis, 4 - 14
macula alba notatae; pectus et abdomen argentea; cauda
praelonga mustelina; rectrices acuminatae.*

viridis. 26. *C. supra virens, subtus pallide luteo viridique varia, remi-
gum fuscarum margine exteriore viridi. Scop. ann. I. p.
52. n. 60.*

*Certhiac genus per omnem tellurem dispersum, insectis potissimum vicitat; naribus
exquis, rectricibus 12, pedibus majoribus, digito posteriore magno, unguibus un-
cinatis et longis conspicuum; plurimis speciebus lingua acuta, aliis apice compla-
nata, aliis ciliata, paucis tubulosa.*

Green Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 702. n. 2.*

Statura familiaris; stria caerulea a basi rostrum utrinque descendens; gulae macula rufa; pedes nigri.

pacifica. 27. *C. nigra*, subtus obscura, humeris, dorso inferiore, uropygio crissaque flavis, tectricibus alarum inferioribus niveis.

Great hook-billed Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 703. n. 3.*

Habitat in insulis amicis maris australis, 8 pollices longa; rostrum valde curvatum fuscum, basi pallidius; tectrices caudae superiores et nonnullae alarum interiores flavae; alae spuriae ochroleucae; pedes ex atro fusi.

obscura. 28. *C. olivacea*, remigibus caudaque aequali viridi-marginata obscuris.

Hookbilled green Creeper. *Latham syn. I. 2. p. 703. n. 4. t. 33. f. 1.*

Habitat in insulis Sandwich, ab incolis ad vestimenta eorum plumosa adhibita, 7 pollices longa.

Rostrum ex fuso atrum, semicirculi ad instar curvatum; nares membrana tectae; inter oculos naresque stria fuscata; abdominis color in flavum paulisper vergens; pedes obscure fusi, genubus albis; digitus posterioris unguis praelongatus.

coccinea. 29. *C. coccinea*, alis candaque nigris. *Forster Goett. Magaz. I. 6. p. 346. Blumenb. Naturg. ed. 2. p. 190.*

Hookbilled red Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 704. n. 5.*

Carmosinother Honiglauger. *Merrem Beytr. I. p. 16. t. 4.*

Habitat in insulis Sandwich, ab incolis similiter ad vestimenta plumosa adhibita, longitudine vix 6 pollices adaequans; magnitudine passeris.

Rostrum capite longius, acinicis modo curvatum, albidum; pedes cum unguibus longis albicantes; rectrices breves, acuminatae; alarum margo et pennarum gularium radix alba.

falcata. 30. *C. viridis*, subtus caudaque violacea, remigibus, ab domine et crissu pallide fulcis.

Sickle billed Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 705. n. 6.*

Longitudo 5½ pollicum; rostrum obscurum, falcatum; capitis nitor violaceus; tectrices alarum majores pedesque pallide fuscata; unguis nigri,

- Sovi- 31. *C. viridis subtus flavescens, uropygio olivaceo, pectore
manga. fuso: fasciis duabus transversis altera caerulea, altera ba-
dia, cauda nigra.*
*Certhia madagascariensis violacea. Briff. av. 3. p. 638. n. 18.
t. 32. f. 2. 3.*
Sovi- *Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 494.*
manga. *Violet Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 705. n. 7.*
*Habitat in Madagascar, reguli magnitudine, 4 pollices longa.
Rostrum, cum pedibus et unguibus nigrum, lingua apice
bifida paulo brevius; femina subtus flava, supra olivacea;
mari tectrices alarum subtus ochroleucae; dorsum infe-
rius caudaeque tectrices superiores olivacea, inferiores cum
macula humerorum flavae; rectrices margine virides.*
- manil- 32. *C. viridis, caeruleo et violaceo nitens, subtus ex olivaceo
lensis. grisea, collo ex viridi, caeruleo, violaceo, flavo fascia-
tim vario remigibus fuscis.*
*Habitat in Manilla, 4 pollicibus brevior.
Inter humeros duas maculae flavae; tectrices alarum sup-
riores fuscae.*
- burboni- 33. *C. ex vidente fusca, subtus griseo varia, uropygio flavo,
ca. remigibus caudaeque nigricantibus.*
*Sovi- *Buff. hist. nat. des ois. 5.
manga de l'isle de Bourbon. p. 516.**
*Grimpereau de l'isle de Bourbon. Buff. pl. enlum. n. 681.
f. 2.*
*Yellow-rumped Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 736. n. 41.
Habitat in insula Bourbon, 5 pollices circiter longa.
Rostrum et pedes nigri; hypochondria rufa.*
- fannio. 34. *C. olivacea, vertice subviolaceo, genarum macula alba,
remigibus caudaeque subfurcata fuscis.*
*Mocking Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 735. n. 39.
Habitat in nova Seelandia, 7½ pollices longa, voce grata va-
ria, imitabunda; capite a purpurco antherali polline flo-
rum, quibus immiscet avis, nonnunquam purpureo.
Rostrum obscurum; nares magnae, membrana tectae; irides
fuscæ; corpus supra magis in viridem, subtus in flavum
colorem vergens; remigum secundiarum rectricumque
margo olivaceus; pedes obscure glauci, unguibus nigris,
posteriore longiore.*

aurantia. 35. **C. viridis** subtus flavicans, jugulo aurantio, remigibus caudaque nigris.

Orange breasted Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 734. n. 38.*

Habitat in Africa, 4 pollices longa. Smeathman.

Rostrum nigrum; pedes obscuri;

flavipes. 36. **C. viridis** subtus caerulea, alis caudaque nigris.

Blue-throated Creeper. *Latham syn. I. 2. p. 734. n. 37.*

Habitat in Cayenna, 4½ pollices longa.

Rostrum et ungues nigri; abdomen pallidius caeruleum; lateribus colli intermissus color ochroleucus; pedes flavi.

ochro-chlora. 37. **C. viridis**, genis, gula et abdomine flavis, pectore et hypochondriis ex flavicante viridibus caerulefcente-maculatis.

Yellow-cheeked Creeper. *Gen. of birds p. 60. t. 3. f. 2.*

Lath. syn. I. 2. p. 734. n. 36.

Habitat in Surinamo, familiaris dimidio minor.

Cardinalis. 38. **C. niger**, capite, collo, pectore et linea per medianam dorsi longitudinem rubris, cauda aequali.

Cardinal Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 733. n. 35. t. 33. f. 2.*

Habitat frequens in cultis insulae Tannae, neclarque e floribus Jugere fertur; familiaris magnitudine.

Rostrum nigrum, basi albicans; lingua longa, extensilis, altera media parte ciliata; stria nigra a rostro ad oculos; irides spadiceae; pedes plumbei; ungues nigri.

carunculata. 39. **C. olivacea**, mento gulaque aurantiis, pectore ferrugineo, abdomine cinerascente, caruncula ad basin mandibulae inferioris flavicante.

Wattled Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 732. n. 34.*

Habitat in insula maris australis Tonga Tabu, 7½ pollices longa.

Lingua rostro longior, in quatuor quasi filamenta partita; caruncula fasciculo plumarum flavarum cincta; irides cinereae; pedes ex glauco atri; ungues nigri.

fusca. 40. **C. fusca**, gula et pectore fusco alboque lineatis.

Brown Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 732. n. 33.*

Habitat in terra maris australis, 6 pollices longa.

Rostrum medium macula pallide aurantia; pennae ad colli latera margine albo; abdomen pallidius; cauda aequalis; pedes nigri; ungues nigri, longi, adunci.

gibus
8.
7.
; las
vi.
t hy-
nacu-
f. 2.
dorsi
f. 2.
flo-
filis,
ulos;
neo,
oulae
llices
tita;
es ci-
i la-
alis;
e. C.

muraria. 2. *C. cinerea*, macula alarum fulva. *S. G. Gmelin it. 3. t. 19.*
f. 2. Scop. ann. 1. p. 51. n. 58.

Certhia muralis. Briss. av. 3. p. 607. n. 2. t. 30. f. 1.

Picus murarius. Gesn. av. 712. Aldr. orn. 1. p. 851. t. 852.

Raj. av. p. 46. n. 1. Kram. elench. p. 336. n. 6.

Grimpereau de muraille. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 487.
t. 22. pl. enlum. n. 372. f. 1. 2.

Wallcreeper or Spider catcher. Will. ornith. p. 143. t. 23.
Edw. glean. t. 361. Latham syn. I. 2. p. 730. n. 32.

Mauerspecht. Goetz Naturf. 17. p. 40.

Habitat in Europae australioris turribus, arcibus, muris,
reptans, solitaria, autumno migrans, viettans insectis
potissimum araneis, volatu vago et incerto, voce acuta;
nidificat aliquando in craniis; moribus familiariter affinis,
passeris magnitudine, $6\frac{1}{2}$ pollices longa.

Rostrum subulatum, cultratum, capite longius; collum sub-
tus albidum; remiges nigrae: 1, 2 latere tenuiore macu-
lis duabus albis; macula alarum rosea e rectricibus et re-
migum latere interiore; rectrices albicantes; unguis va-
lidi praesertim posterior. Feminae gula jugulumque alba.

pusilla. 3. *C. fusca*, subtus alba, superciliis candidis, rectricibus ful-
 cis: extimus apice albis.

Certhia indica. Briss. av. 3. p. 621. n. 9.

Sovi-manga brun et blanc. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 498.

Little brown and white Creeper. Edw. av. 1. t. 26.

Habitat in India, familiariter dimidio minor, $3\frac{1}{2}$ pollices lon-
ga; an speratae varietas?

A rostro ad oculum utrinque stria nigra; remigum margo
aeneus.

capensis. 4. *C. fusca*, rectricibus nigricantibus: extima exterius albo
 fimbriata.

Certhia capitis bonae speci. Briss. av. 3. p. 618. n. 7.

melanura. 5. *C. capite dorsoque violaceis, pectore et abdomine virescen-*
 tibus, alis fuscis, cauda nigra subbifida, tibiis digitisque
 atris. Sparrmann mus. carls. t. 5.

Habitat ad caput bonae speci, reguli magnitudine, 4 polli-
cibus longior.

Rostrum, cauda et pedes nigricant.

olivacea. 5. *C. olivacea*, subtus fusca, orbitis albicantibus.

Certhia olivacea madagascariensis. Briss. av. 3. p. 625. n. 11.

Sovi-manga olive à gorge pourpre. Buff. hist. nat. des ois. 5.
p. 507.

Grimpereau olive de Madagascar. *Buff. pl. enlum. n. 375.*

f. 1.

Olive creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 713. n. 14.*

Habitat in Madagascar, familiari minor, 4 pollices longa.

Rostrum nigrum; rectrices extimae apice albae; reliquae cum remigibus fuscae, tinctu olivaceo; pedes pallide fusi.

carruca- 6. *C. olivacea subtus flavescens, rectricibus aequalibus.*
ria. *Certhia philippensis. Briss. av. 3. p. 615. n. 5. t. 30. f. 3.*

*Grimpereau gris des Philippines. Buff. hist. nat. des ois. 5.
p. 508. pl. enlum. n. 576. f. 2.*

Grey Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 714. n. 15.*

Habitat in insulis Philippinis, 4½ pollices longa.

Rostrum validius, quam congeneribus, cum pedibus unguibusque nigrum; lingua apice bifeta; stria a mento ad pectus, rectricesque alarum superiores violaceae; remiges fuscae; rectrices nigrae, margine chalybeo, apice albido.

jugula- 7. *C. subgrisea, subtus lutea, gula violacea, rectricibus duabus extimis apice flavis.*

*Certhia philippensis minor. Briss. av. 3. p. 616. n. 6. t. 33.
f. 5.*

Petit grimpereau des Philippines. *Buff. hist. nat. des ois. 5.
p. 509. pl. enlum. n. 576. f. 3.*

Habitat in insulis Philippinis, praecedente minor, 3½ pollices longa; an varietas praecedentis?

Rostrum, pedes et ungues nigricantes.

caerulea- 8. *C. caerulea, fascia oculari, gula, remigibus rectricibusque nigris. Mus. Ad. Fr. 2. p. 22. Scop. ann. I. p. 53. n. 61.*

*Certhia cayanensis caerulea. Briss. av. 3. p. 626. n. 12. t. 31.
f. 4.*

Avis Hoitzillin, papilio vocata. *Seb. mus. I. t. 61. f. 5.*

Variété de Guitguit noir et bleu. *Buff. hist. nat. des ois. 5.
p. 531.*

Certhia of Guiana. *Baner. guj. p. 164.*

Blue Creeper. *Edw. av. I. t. 21. f. 1. Lath. syn. I. 2. p. 725.
n. 27.*

Habitat in Cayenna, nidum retortae forma ex culmis grammum struens, et subtus biantem ex debilium ramuscum apice suspendens; 4 pollices longa.

brasilia- 41. *C. nigra, vertice viridi-aureo, uropygio, gula, juguloque violaceis, pectore ex purpureo badio.*

Certhia

Certhia brasiliensis violacea. *Briff. av. 3. p. 661. n. 30. t. 32.*
f. 4.

Guit-guit noir et violet. *Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 541.*

Black and violet Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 730. n. 31.*

Habitat in Brasilia, reguli cristati magnitudine, 3½ pollices longa.

Dorsum inferius, tectrices alarum minores, et caudae superiores, margo caudae violacea; femora badia.

variegata. 42. C. caeruleo, nigro, flavo et albo undulata, subtus crocea, vertice rubro, occipite caeruleo.

Certhia americana varia. *Briff. av. 3. p. 665. n. 32.*

Avicula americana, variis coloribus picta. *Seb. mus. 2. t. 3.*
f. 3.

Guit-guit varié. *Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 540.*

Variegated Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 729. n. 30.*

Habitat in America, 5 pollices longa.

Genae et area infraocularis ex caeruleo et albo mixta.

cayana. 9. C. viridis nitida, subtus albo-striata, rectricibus viridibus: lateralibus interius nigricantibus.

Certhia viridis cayennensis. *Briff. av. 3. p. 636. n. 17. t. 33.*
f. 2.

Certhia corpore supino viridi, gula lutea. *Nov. comm. Petrop. 2. p. 430. t. 14. f. 2.*

Guit-guit vert tacheté. *Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 538.*

Grimpereau vert tacheté de Cayenne. *Buff. planch. enlum. n. 682. f. 2.*

Cayenne Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 728. t. 29.*

Habitat in Cayenna, familiaris magnitudine, ultra 4 pollices longa.

Rostrum nigrum; mandibulae inferioris linea utrinque; genae albae; macula prope oculos et gula (mari) rufae; tectrices caudae inferiores flavicantes, remiges nigricantes, margine exteriore viridi, interiore griseo; pedes cum ungibus cinerei.

chalybea. 10. C. viridis nitens, pectore rubro: fascia antica chalybea.

Certhia torquata capitis bonae spei. *Briff. av. 3. p. 643.*
n. 20. t. 32. f. 1.

Sovi-manga à collier. *Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 502.*

Grimpereau du cap de bonne esperance. *Buff. pl. enlum. n. 246. f. 3.*

Purple indian Creeper. *Edw. glean. t. 265.*

Collared Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 709. n. 10.*

Habi-

Habitat ad caput bonae spei, egregie cantans, insectis et florum nectare vicitans, 4½ pollices longa; an mas capensis?

Rostrum, pedes et unguis nigri; tectrices caudae superiores viridi-aureae; inferiores cum abdomine cinereae; remiges griseae; rectrices nigricantes apice griseae, 10 mediae margine exteriore viridi-aeneae, interiore cinereae.

africana. **II.** *C. viridis, abdomine albo, pectoro rubro, uropygio cæruleo.*

Sovi-manga vert à gorge rouge. *Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 514.*

Red-breasted green Creeper. *Edw. glean. t. 347.*
African Creeper. *Latham syn. I. 2. p. 717. n. 18.*

β. *C. abdomine cinereo, fasciculo plumarum flavarum subalari, lingua apice bifida.*

γ. *C. mento, gutture et pectoro ex purpureo caeruleis, fascia pectorali rubra.*

Habitat ad caput bonae spei, cantu lusciniae, 4½ pollices longa.

Rostrum obscurum; corporis nitor aureo-aeneus; remiges majores et cauda obscure fuscae; pedes nigri.

Spiza. **12.** *C. viridis, capite remigibusque nigricantibus.*

Motacilla Spiza. *Syst. nat. X. 1. p. 188. n. 27.*

Certhia americana viridis atricapilla. *Briss. av. 3. p. 634. n. 16.*

Avicula americana altera. *Seb. mus. 2. t. 3. f. 4.*

Guit-guit vert et bleu à tête noire. *Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 534.*

Black-headed Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 726. n. 28.*

β. *Certhia brasiliensis viridis atricapilla. Briss. av. 3. p. 633. n. 15.*

Guitguit vert et bleu à tête noire, var. I. *Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 535.*

Grimpereau à tête noire du Brésil. *Buff. pl. enlum. n. 578. f. 2.*

Green black-cap Flycatcher. *Bancr. Guj. p. 182. Edw. av. 1. t. 25. f. 1.*

Schwarzplattige Spielart des hochbeinigten Bienenfressers. *Merr. Beytr. I. t. 5.*

γ. *Certhia brasiliensis viridis. Briss. av. 3. p. 631. n. 14.*

Grimpereau verd du Brésil. *Buff. pl. enlum. n. 578. f. 1.*

Guit-

Guit-guit vert et bleu à gorge blanche. *Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 536.*

Blue headed green Fly-catcher. *Edw. av. I. t. 25. f. 2.*

♂. C. tota viridis.

Guit-guit tout vert. *Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 527.*

Grimpereau vert de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 682. f. 1.*

Allgreen Creeper. *Edw. glean. t. 348.*

Habitat in America meridionali, 5½ pollices longa, rostro, naribus, pedibus meropi affinis.

Caput et gula nigra; in β. gula viridis; in γ. vertex caeruleus, gula alba; δ. tota viridis.

sperata. 13. C. purpurea subtus coccinea, capite, gula, uropygioque purpureis.

Certhia philippensis purpurea. *Briff. av. 3. p. 655. n. 27. t. 31. f. 2. 3.*

Sovi-manga marron-pourpré à poitrine rouge. *Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 497.*

Grimpereaux des Philippines. *Buff. pl. enl. n. 246. f. 1. 2.*

Red-breasted Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 706. n. 8.*

β. C. gula violacea.

Grimpereau troisième de l'isle de Luçon. *Sonner. it. p. 63. t. 30. D.*

Sovi-manga à gorge violette et poitrine rouge. *Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 499.*

Habitat in insulis philippinis, 4 pollices longa, cantu luscinae.

Rostrum nigrum, basi albicans, lingua furcata brevius; abdominis pars posterior ex flavicante olivacea; teetrices alarum minores violaceae et viridi-aureae, mediae fuscae apice badiae, majores cum remigibus fuscae margine rufae; cauda nigra, nitore chalybeo, margine exteriore violaceo aureo-nitente; pedes cum unguibus fusci; femina supra et infra olivacea.

In β. caput pallide virens; dorsum cum teetribus alarum spadiceum; uropygium cum cauda chalybeum; caudae teetrices inferiores virides.

senega-lensis. 14. C. nigro-violacea, vertice gulaque viridi-aureis, pectore coccineo.

Certhia senegalensis violacea. *Briff. av. 3. p. 660. n. 29. t. 34. f. 2.*

Sovi-manga violet à poitrine rouge. *Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 500.*

Senegal Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 709. n. 9.*

Habi-

Habitat ad fluvium Senegal, 5 pollices longa.

Rostrum nigrum; juguli, pectorisque pennae basi nigrae, medio viridi-aureae, apice coccineae; alae et cauda fusca; pedes cum unguibus nigricantes.

purpu-
rea.

43. C. tota purpurea.

Certhia virginiana purpurea. Briss. av. 3. p. 654. n. 26.

*Avis virginiana phoenicea de Atototl dicta. Seb. mus. I.
t. 72. f. 7.*

*Oiseau pourpré à bec de grimpereau. Buff. hist. nat. des ois.
5. p. 526.*

Purple Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 723. n. 25.

Habitat in Virginia, 4½ pollices longa, egregie cantans.

guttura-
lis.

15. C. nigricans, gutture viridi-nitente, pectoro purpureo.

*Certhia brasiliensis nigricans. Briss. av. 3. p. 659. n. 28. t.
23. f. 3.*

Grimpereau brun du Brésil. Buff. pl. enlum. n. 578. f. 3.

*Oiseau brun à bec de grimpereau. Buff. hist. nat. des ois. 5.
p. 525.*

Green-faced Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 723. n. 24.

Habitat in Brasilia, ultra 5 pollices longa.

*Rostrum pedesque nigri; frons viridi-aurea; pectoris pen-
nae basi ex atro fuscae, medio ex violaceo virides, apice
rubrae; rectrices alarum minores purpureae.*

Pinus.

16. C. flava supra olivacea, alis caeruleis fasciis duabus albis.

Parus americanus. Briss. av. 3. p. 576. n. 15.

Figuier des sapins. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 296.

*Pine-Warbler. Arct. zool. 2. p. 412. n. 318. Latham syn.
II. 2. p. 483. n. 107.*

*Pine-creeper. Catesb. carol. I. p. 46. t. 46. Edw. glean.
t. 277. f. 2.*

*Habitat aestate in Americae septentrionalis, Carolinae prae-
sertim et Pensilvaniae pinetis, 4½ pollices longa.*

*Lora nigra; pedes cum rostro fuscis; abdomen et crissum al-
bum; rectrices fuscae, extimae extus albae. Femina to-
ta fusca.*

eruenta-
ta.

17. C. nigro-caeruleo-scapularis, subtus alba, vertice, cervice, dor-
so uropygoque rubris.

Certhia bengalensis. Briss. av. 3. p. 663. n. 31.

*Sovi-manga rouge, noir et blanc. Buff. hist. nat. des ois. 5.
p. 514.*

Black,

Black, white and red Indian Creeper. *Edw. av. 2. t. 81.*

Red-spotted Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 736. n. 40.*

Habitat in Bengala, 3½ pollices longa.

Rostrum pedesque nigri.

flaveola. 18. *C. nigra subtus lutea, superciliis exalbidis, rectricibus extimis apice albis.*

Certhia f. saccharivora jamaicensis. Briff. av. 6. app. p. 117. n. 33.

Suerier. *Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 542.*

Black and yellow Creeper. *Edw. av. 3. t. 122. Lath. syn. I. 2. p. 737. n. 42.*

β. *Certhia martinicana f. saccharivora. Briff. av. 3. p. 611. n. 3. t. 34. f. 5.*

Luscinia f. Philomela e fusco et luteo varia. Sloan. jam. 2. p. 307. t. 259. Raj. av. p. 187. n. 45.

Yellow bellied Creeper. *Edw. glean. t. 362. f. 3.*

γ. *Certhia bahamensis. Briff. av. 3. p. 620. n. 8.*

Bahama Titmouse. *Catesb. Car. I. t. 59.*

Bahama Creeper. *Arct. zool. 2. p. 285. n. 175.*

Habitat in insulis Americae mediae vicinis, reguli circiter magnitudine, insectis vicitans, succunque ex sacchari cannis fugens.

sanguinea. 44. *C. sanguinea, remigibus caudaque nigris, abdomine obscuro, criffo albo.*

Crimson Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 739. n. 43.*

Habitat in insulis Sandwich, 5 pollices longa.

Rostrum obscurum; remigum secundiarum margo badius; rectrices acuminatae, scapis albis; pedes nigri.

virens. 45. *C. olivacea, remigum rectricumque margine flavo.*

Olive-green Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 740. n. 44.*

Habitat in insulis Sandwich, 5 pollices longa; an femina sanguineae?

Rostrum pedesque obscuri.

rubra. 46. *C. rubra, alis caudaque nigris, criffo albo.*

Scarlet Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 740. n. 45.*

Habitat in insula maris australis, vix 4 pollices longa.

Rostro, pedibus et unguibus nigris, abdominis parte inferiore alba distincta a coccinea; an satis?

- cinna- 47. *C. cinnamomea subtus alba.*
momea. *Cinnamom Creeper. Latham syn. I. 2. p. 740. n. 46.*
Rostrum nigrum; cauda c. familiaris; pedes obscuri; longitudo 5 pollicum.
- macassa- 48. *C. viridi-aurea, subtus ex nigricante fusca.*
riensis. *Polytmus indicus. Briff. av. 3. p. 675. n. 6.*
Avis Tsioei indica orientalis. Seb. mus. I. p. 100. t. 63. f. 3.
Macassar Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 741. n. 47.
Habitat in insulis Bally et Macassar, 4½ pollices longa.
Rostrum albidum; cauda viridi-aurea; pedes cum unguibus nigri.
- indica. 49. *C. caerulea, gutture albido,*
Polytmus caeruleus indicus. Briff. av. 3. p. 682. n. 10.
Avis colubri orientalis. Seb. mus. 2. p. 20. t. 19. f. 2.
Indian Creeper. Latham syn. I. 2. p. 741. n. 48.
Habitat in India, 4½ pollices longa.
Rostrum pedesque nigri.
- amboi- 50. *C. cinerea, subtus viridis, capite colloque flavis, pectore
nensis. rubro, alis nigris.*
Polytmus amboinensis. Briff. av. 3. p. 685. n. 12.
*Avis amboinensis, Tsioei vel Kakopit dicta. Seb. mus. 2. p.
62. t. 62. f. 2.*
Amboinan Creeper. Latham syn. I. 2. p. 741. n. 49.
Habitat in Amboina, 2¾ pollices longa.
Rostrum flavicans.
- mexica- 51. *C. rubra, gutture viridi, remigum apice caerulecente.*
na. *Trochilus coccineus. Syst. nat. VI. p. 29. n. 76. 3.*
Certhia rubra mexicana. Briff. av. 3. p. 651. n. 24.
Avicula mexicana f. Hoitzillin. Seb. mus. I. p. 70. n. 6.
*Oiseau rouge à bec de grimpereau. Buff. hist. nat. des ois. 5.
p. 522.*
Red Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 721. n. 23.
β. *Certhia mexicana rubra atricapilla. Briff. av. 3. p. 653.
n. 25.*
*Avicula de tatac ex nova Hispania. Seb. mus. I. p. 74. t. 70.
f. 8.*
Colius. Moehring gen. av. 16. p. 36.
*Grimpereau rouge à tête noire du Mexique. Buff. hist. nat.
des ois. 5. p. 524.*
Habitat in nova Hispania, 4½ pollices longa.

Rostrum

Rostrum, femora, pedes et unguis flava; in β. caput nigrum; tectrices alarum superiores aureae.

cinerea. 52. C. cinerea, uropygio et tectricibus alarum viridibus, remigibus fuscis, abdomine flavicante, crissō albo, cauda nigra.

Cinereous Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 721. n. 22.*

Habitat ad caput bonae spei, 9 pollices longa.

Rostrum linguae aequale, et pedes nigri; mandibulae inferior utrinque stria flavicante; dorsi pars inferior viridis; pectoris et abdominis medio viror admixtus; cauda cuneiformis; rectrices 2 intermediae 2½ pollicibus reliquis longiores.

pulchella. 19. C. rectricibus duabus intermediis longissimis, corpore viridi-nitente, pectore rubro.

Certhia longicauda senegalensis. *Briff. av. 3. p. 645. n. 21. t. 34. f. 3.*

Avicula amboinensis discolor. *Seb. mus. 2. t. 7. f. 2.*

Sovi-manga vert doré changeant à longue queue. *Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 519.*

Grimpereau à longue queue du Sénégal. *Buff. pl. enlum. n. 670. f. 1.*

Beautiful Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 715. n. 20.*

Habitat ad Senegal fluvium, 7½ pollices longa.

Rostrum, pedes et rectrices nigricantes, hae margine aureae; 2 intermediae 2½ pollicibus reliquis apice rotundatis longiores; abdomini candor admixtus; remiges cum tectricibus alarum majoribus fuscae.

famosa. 20. C. rectricibus intermediis 2 longissimis, corpore viridi-nitente, axillis luteis, loris nigris.

Certhia longicauda capitis bonae spei. *Briff. av. 3. p. 647. n. 22. t. 34. f. 1.*

Trochilus afer. *Syst. nat. X. 1. p. 119. n. 2.*

Grand Sovi-manga vert à longue queue. *Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 521.*

Grimpereau à longue queue du cap de bonne esperance. *Buff. pl. enlum. n. 83. f. 1.*

Famous Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 720. n. 21.*

Habitat ad caput bonae spei, 9 pollices longa.

Rostrum, pedes cum unguibus, et cauda nigra; rectrices 2 intermediae 2½ pollicibus longiores, et utrinque, reliquae margine tantum exteriore viridi-aureae; tectrices alarum majores, remigesque nigricantes, margine virides.

des. Femina ex virente fusca, subtus flavicans, uropygio viridi, alis caudaque ex atro fuscis.

philippi. 21. *C. rectricibus intermediis 2 longissimis, corpore subgriseo virescente, subtus albo-flavescens.*

Certhia philippensis. Briss. av. 3. p. 613. n. 4. t. 30. f. 2.

Grimpereau des Philippines. Buff. pl. enl. n. 576. f. 1.

Grimpereau second de l'isle de Luçon. Sonner. it. t. 30. B.

Philippine Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 711. n. 12.

Habitat in insulis Philippinis, 4 $\frac{3}{4}$ pollices longa.

Rostrum et pedes cum unguis nigri; lingua tubulosa, furcata; remiges fuscae, margine pallidior; rectrices 2 intermediae nigrae aureo-nitentes; ceterae nigricantes apice albae.

violacea. 22. *C. rectricibus intermediis 2 longissimis, corpore violaceo nitente, pectore abdomineque luteis.*

Certhia longicauda minor capitidis bonae spei. Briss. av. 3. p. 649. n. 23. t. 33. f. 6.

Sovi-manga à longue queue et à capuchon violet. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 517.

Petit grimpereau à longue queue du cap de bonne esperance. Buff. planch. enlum. n. 670. f. 2.

Violet-headed Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 718. n. 19.

Habitat ad caput bonae spei, ultra 6 pollices longa; nidum struens artificiosum laxum ex materiis sericeis, currucariae affinis, at rostro longiori.

Rostrum, pedes et unguis nigricantes; dorsum inferius, uropygium et rectrices caudae superiores olivacea; alarum inferiores griseae, superiores majores cum remigibus fuscae; cauda cuneiformis ex atro fusca.

zeylo- 23. *C. pileo viridi, dorso ferrugineo, abdomine flavo, gula nica.*

uropygioque azureis. Certhia philippensis olivacea. Briss. av. 3. p. 623. n. 10. t. 34. f. 4.

Grimpereau olive des Philippines. Buff. pl. enl. n. 576. f. 4.

Sovi-manga olive à gorge pourpre. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 506.

Grimpereau premier de l'isle de Luçon. Sonner. it. t. 30. A.

β. C. viridis subtus alba, mento, gula, pectore, dorso alisque fuscis, cauda nigra.

Habitat in insulis Philippinis, 4, β. 4 $\frac{1}{2}$ pollices longa.

Rostrum subulatum, nigrum, longitudine capitidis; dorsum ex ferrugineo-olivaceum; remiges fuscae, apicis margine palli-

pallido; rectrices aequales, nigricantes: extimus 1, 2 apicis margine albido; pedes nigri.

cyanea. 24. *C. caerulea, fascia oculari, humeris, alis caudaque nigris, pedibus fuscis.*

*Certhia brasiliensis caerulea. Briss. av. 3. p. 628. n. 13. t. 31. f. 5.
Avicula de Guit-guit ex insula Cuba. Seb. mus. 1. p. 96.
t. 60. f. 5.*

*Guiracoereba. Marcgr. bras. 212. Raj. av. p. 83. n. 11.
Will. orn. p. 239. c. 20.*

*Guit-guit noir et bleu. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 529.
Grimpereau du Brésil. Buff. planch. entom. n. 83. f. 2.
Black and blue Creeper. Edw. glean. t. 264. f. 1. Lath.
syn. I. 2. p. 724. n. 26.*

Habitat in Brasilia et Cayenna, 4½ pollices longa.

*Rostrum, occiput et unguis nigra; lingua rostri longitudo
ne, ciliata; vertex beryllinus; remigum latus interius et
rectrices alarum inferiores sulphurea; feminae alae subtus
ex flavicante cinereae.*

Lotenia. 25. *C. caerulea, fascia pectorali rubro-aurea, loris atris.*

*Certhia madagascariensis viridis. Briss. av. 3. p. 641. n. 19.
t. 33. f. 4. 5.*

Angala-dian. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 510.

Grimpereau verd de Madagascar. Buff. pl. ent. u. 575. f. 2. 3.

Loten's Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 715. n. 16.

*Habitat in Madagascar et Zeylon. I.G. LOTEN p. m. Guber-
nator Zeylon. qui hortum botanicum primus in India con-
didit, et tot raris avibus me aliquosque dotavit.*

*Nidum struit forma calycis ex lanugine plantarum, 5-6
ova pariens, ab araneae specie aliquando expulsa, 5½ pol-
lices longa, colore varians.*

*Rostrum subulatum nigrum, capite duplo longius; lingua
apice compressa; caput, collum, dorsum, uropygium,
rectrices caudae superiores alias caeruleo-nitentia, alias viri-
di-aurea; pectus, abdomen et crissum splendide nigra,
in femina sordide alba, nigro maculata, rarius abdomen
fuscum; fascia pectoralis ignita vel violacea; rectrices ae-
quales, remigesque nigrae; rectrices alarum minores vi-
olaceae, mediae viridi-aureae, majores nigrae, margine
exteriori viridi-aureae.*

omnico- 53. *C. viridis, omnis generis coloribus intermixta.*

lor. Avis zeylonica omnicolor. Seb. mus. 1. t. 69. f. 5.

*Falcinellus omnicolor zeylanicus. Klein ord. av. p. 107. n. 8.
Greengold Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 716. n. 17.*

Habitat in Zeylon, 8 fere pollices longa, ab araneae majori specie infestata.

Nitor aureus; rostrum 1½, cauda 2⅓ pollices longa.

caffra. 54. C. fusca, pectore abdomineque pallidis, rectricibus intermediis longioribus. *Mantiss. pl. alt. p. 525.*

Habitat ad caput bonae spei, turdi magnitudine, et rostro duplo longiori.

Rostrum nigrum, parum compressum, nonnihil incurvum; gula pallida, pennis nigris hirsuta; uropygium ex flavescente virescens; crissum flavissimum; cauda nigra, cuneata, longitudine corporis; rectricibus quatuor mediis triplo longioribus, intermediis 2 longissimis; remiges nigrae.

66. TROCHILUS. *Rostrum subulato-filiforme, apice tubulato, capite longius: mandibula superior vaginans inferiorem.*

Lingua filiformis, filis duobus coalitis tubulosa.

Pedes ambulatorii.

* *curvirostres.*

paradi- 1. Tr. ruber, alis caeruleis, capite cristato, rectricibus interfeus. mediis longissimis.

Polytmus mexicanus longicaudus ruber cristatus. Briff. av. 3. p. 692. n. 16.

Mellivora avis cristata cum duobus pennis longis in cauda. Seb. mus. I. p. 97. t. 61. f. 4.

Colibri huppé. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 54.

Paradise Humming Bird. Lath. syn. I. 2. p. 745. n. 1.

Habitat in nova Hispania, 8½ pollices longa.

Rostrum pedesque nigri; remiges tecricesque alarum caeruleae.

galeri- 23. Tr. viridi-aureus, remigibus rectricibusque fuscis, crista tus. purpurea. *Mol. hist. nat. Chil. p. 219.*

Habitat in regno Chilensi.

Corpus subtus colore aurorae; collum dorsumque viridia; tota avis auri nitore resplendet.

exilis, 24. Tr. ex virescente fuscus, coccineo nitens, remigibus caudaque nigris, crista basi viridi apice aurea.

Hummingbird of a black colour. Bancr. Guj. p. 166.

Little

Little Hummingbird. *Lath. syn. I. 2. p. 764. n. 29.*
Habitat in Guiana, 1½ pollices longa, et vix 50 grana pondere aequans.

Rostrum nigrum.

Pella. 2. Tr. ruber, rectricibus intermediis longissimis, capite fusco,
gula aurata uropygoque viridi.

Polytmus surinamensis longicaudus ruber. Briss. av. 3. p. 690. n. 15.

Grand Colibri. *Fermin Surin. 2. p. 195.*

Colibri topaze. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 46.*

Colibri de Cayenne, dit le Topaz. *Buff. pl. enlum. n. 599. f. 1.*

Long-tailed red Hummingbird. *Edw. av. I. t. 32.*

Topaz Hummingbird. *Lath. syn. I. 2. p. 746. n. 2.*

Habitat in Surinamo, 6 pollices circiter longus.

Rostrum, caput et cervix nigra; pectus roseum; dorsum testicularesque alarum ex aurantio rubent; remiges et intermediae rectrices purpureae; reliquae aurantiae; femina fere tota viridi-aurea.

superciliosus. 3. Tr. fuscus nitens, rectricibus intermediis longis, ab domine subincarnato, superciliis albis.

Polytmus cayanensis longicaudus. Briss. av. 3. p. 686. n. 13. t. 35. f. 5.

Brin blanc. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 49.*

Colibri à longue queue de Cayenne. *Buff. pl. enl. n. 600. f. 3.*

Supercilious Hummingbird. *Lath. syn. I. 2. p. 747. n. 3.*

Habitat in Cayenna, 6 pollices non adsequens.

Rectrices 2 intermediae pollice reliquis longiores media parte fuso nitentes, altera albae; reliquae basi fuscae, altera parte nigrae, apice nigro, albo marginato; pedes et unguis fusi.

cyanurus. 25. Tr. viridis, subtus cinereus, fronte, gutture, rectricibus que duabus intermediis longioribus caeruleis.

Hh 3

Polyt-

Trochili, aviculae omnium minima, in sola America, et si duas excipias, quae versus septentrionalem migrant, sola meridionali obviae, pedibus rostroque debilibus, naribus minutis, lingua emissili, rectricibus caudae 10, coloribus nitidissimis conspicuae; andaces et pugnaces, volando velocissimae, suspensae in aere vietum capiunt, nectar e floribus fugentes, insecta quoque deglutiunt, quorum quippe reliquias in ventriculo invenit Cl. Brandis; alarum motu magis sonorae, quam vox, gregariae, nidum hemisphaericum ex lanagine thapsi eleganter struunt, et ab arborum ramis inter folia latentem suspendunt; ova 2 alba, pisces magnitudine parvunt, quibus mas et semina alternatum incubant; juniores ab araneis infestatae, ab Americae incolis picturis adhibitae; aqua e siphone explosa humectatae capiuntur; hybernare traduntur.

Polytmus mexicanus longicaudus. Briss. av. 3. p. 688. n. 14.
Avis Yayaquitototl. Seb. myf. I. p. 84. t. 51. f. 7.
Blue tailed Hummingbird. Lath. syn. I. 2. p. 749. n. 5.
Brin bleu. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 51.
Habitat in nova Hispania, ficedulae magnitudine, 8 $\frac{1}{4}$ pollices longus.

Rostrum flavicans; rectrices, quo exteriores, eo breviores; intermediae extimis ultra 2 pollices longiores; pedes flavi.

Polyt-
mus.

4. *Tr. virescens, rectricibus lateralibus longissimis, pileo rectricibusque fuscis.*

Polytmus viridans, aureo varie splendens, pennis binis uropygii longissimis. Brown. jam. 475.

Mellifuga jamaicensis atricapilla, cauda bifurca. Briss. av. 3. p. 729. n. 19.

Oiseau-mouche à longue queue noire. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 39.

Longtailed Hummingbird. Alb. av. 3. t. 49.

Longtailed black cap Hummingbird. Edw. av. I. t. 34. Bancr. Guj. p. 169.

Black capped Hummingbird. Lath. syn. I. 2. p. 748. n. 4.

Habitat in Jamaica et America australi, 9 $\frac{1}{2}$ pollices longa.

Rostrum flavum, apice nigrum; irides flavae; cervix nigra; alarum margo albus; rectrices alarum, remigesque ex violaceo fuscae; cauda bifurca, rectricibus inaequalibus, nigricantibus; pedes nigri.

forfica-
tus.

5. *Tr. viridis, rectricibus lateralibus longissimis, pileo rectricibusque caeruleis.*

Polytmus major nigricans aureo varie splendens, pennis binis uropygii longissimis. Brown. jam. p. 475.

Mellifuga jamaicensis, cauda bifurca. Briss. av. 3. p. 728. n. 18.

Oiseau-mouche à longue queue, or, vert et bleu. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 38.

Long tailed green Hummingbird. Edw. av. I. t. 33.

Forktailed Hummingbird. Lath. syn. I. 2. p. 750. n. 6.

Habitat in Jamaica, ultra 7 pollices longus.

Rostrum, pedesque nigri; corpus subtus album; remiges ex violaceo fuscae, 3 corpori proximae viridi-aureae; rectrices extimae 3 pollicibus longiores, reliquae, quo interiores, eo breviores.

furcatus. 26. *Tr. viridi aureus, rectricibus extimis longioribus, dorso superiore, pectore et rectricibus alarum minoribus splendide violaceis, alis caudaque nigris.*

Melli-

Mellisuga jamaicensis violacea cauda bifurca. Briss. av. 3.
p. 732. n. 20. t. 37. f. 6.

Oiseau-mouche violet à queue fourchue. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 37.

Lesser fork-tailed Hummingbird. Lath. syn. I. 2. p. 751. n. 7.
Habitat in Jamaica, Brasilia et Cayenna, 4 pollices longus.
Rostrum nigrum; rectrices extimae $1\frac{1}{2}$ pollices longae; pedes cum unguibus nigricantes.

macrou- 27. Tr. viridi-aureus, capite et gutture violaceis, abdominis
rus. area alba, cauda bifurca chalybea.

Mellisuga cayenensis, cauda bifurca. Briss. av. 3. p. 726.
n. 17. t. 36. f. 9.

Mellivora avis maxima. Sloan. jam. 2. p. 309. t. 264. f. 4.
Raj. av. p. 83. n. 3.

Guainumbi. Marcgr. bras. 197. Raj. av. p. 187. n. 41.
Will, orn. p. 231. n. 3.

Oiseau-mouche à longue queue couleur d'acier bruni. Buff.
hist. nat. des ois. 6. p. 36.

Cayenne forktailed Hummingbird. Lath. syn. I. 2. p. 751. n. 8.
Habitat in Jamaica, 6 pollices longus.

Rostrum pedesque nigri; rectrices extimae $3\frac{3}{4}$, intermediae
 $1\frac{3}{4}$ pollices longae.

purpura- 28. Tr. viridis, vertice, alis caudaque bifurca purpureis, tor-
tus. que caeruleo.

Purple-crowned Honeyfucker. Gen. of birds, p. 63. t. 8. f. 2.
Purple crowned Hummingbird. Lath. syn. I. 2. p. 764. n. 27.

auratus. 29. Tr. viridi-aureus, mento, gutture et pectore rubro-aureis,
abdomine nigro.

Garnet-throated Hummingbird. Latham syn. I. 2. p. 752.
n. 9. t. 34.

β. Tr. genis nucha gulaque rubro-aureis, capite et corpore
nigris viridi-nitentibus.

Grenat. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 48.
Longitudo $4\frac{1}{4}$, in β. 5 pollicum; rostrum pedesque nigri;
feminae mentum, guttur et pectus viridi-aurea.

leucurus. 6. Tr. viridi-aureus, rectricibus aequalibus albis, collari rubro.
Polytmus surinamensis. Briss. av. 3. p. 674. n. 5.

Collier rouge. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 59.
Colibri à collier de Surinam. Buff. pl. enl. n. 600. f. 4.

White-tailed Hummingbird. Edw. glean. t. 256. Latham
syn. I. 2. p. 757. n. 17.

Habitat in Surinam, 4½ pollices longa.

Rostrum et pedes nigri; corpus subtus ex griseo album; alae obscure purpureae; rectrices 8 exteriores albae, extimae 2 apice nigricantes.

grami-
neus.

30. Tr. viridi aureus, subtus albus, gutture smaragdino, pe-
ctore nigro, cauda purpurea.

Hausse col vert. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 58.*

Black-breasted Hummingbird. *Lath. syn. I. 2. p. 756. n. 16.*

Feminae in pectore areae duae albæ.

viola-
ceus.

31. Tr. violaceus, alis caudaque viridi-aureis.

*Polytmus cayennensis violaceus. Briss. av. 3. p. 683. n. 11.
t. 35. f. 3.*

Colibri violet. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 57.*

Colibri violet de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 600. f. 2.*

Violet Hummingbird. *Lath. syn. I. 2. p. 756. n. 15.*

Habitat in Cayenna, 4½ pollices longus.

Rostrum pedesque nigri.

macula-
tus.

32. Tr. viridi-aureus, subtus albus, colli lateribus rufis, ma-
culis colli viridi, pectoris nigra, caudæ subtus violaceis,
albis et fuscis.

Colibri à cravate verte. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 56.*

Colibri à gorge verte de Cayenne. *Buff. pl. enl. 671. f. 1.*

Green-throated Humming bird. *Lath. syn. I. 2. p. 755. n. 14.*

Magnitudo punctulati.

punctu-
latus.

33. Tr. viridi-aureus, gutture et tectricibus alarum albo-ma-
culatis, remigibus ex violaceo fuscis, cauda ex virescente
fusca apice alba.

Polytmus punctulatus. Briss. av. 3. p. 669. n. 2.

Hoizitziltototl. *Fern. hist. mex. p. 705.*

Zitzil ou' colibri piqueté. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 50.*

Spotted Hummingbird. *Lath. syn. I. 2. p. 755. n. 13.*

Habitat in nova Hispania, 5½-6 pollices longus.

Rostrum et pedes cum unguibus nigri.

albus.

34. Tr. viridi-aureus, subtus, ad latera colli, et rectricum 6
exteriorum apices albus, cauda violacea.

Colibri à queue violette. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 55.*

Colibri à queue violette de Cayenne. *Buff. planch. enlum.
n. 671. f. 2.*

Violet tailed Hummingbird. *Lath. syn. I. 2. p. 754. n. 11.*

Habitat in Cayenna, 6 pollices longus.

Remiges ex violaceo fuscae; pedes obscuri.

- jugula- 7. Tr. caerulescens, rectricibus aequalibus, collo subtus san-
ris. guineo.
Colibri à gorge carmin. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 56.*
Red-breasted Humming-bird. *Edw. glean. t. 266. f. 1.*
Lath. syn. I. 2. p. 753. n. 10.
Habitat in Surinamo, 4½ pollices longus.
Rostrum, vertex, occiput, abdomen, femora, cauda nigra;
pennarum margine caeruleo; tempora splendide rubra;
alae virides nitore aureo; uropygium caeruleum; pedes
breves nigricantes.
- auran- 35. Tr. fuscus, capite aurantio, gula et pectore flavis, alis
tius. purpureis, cauda ferruginea.
Orange-headed Honey-fucker. *Gen. of birds p. 63. t. 8. f. 3.*
Orange headed Humming-bird. *Lath. syn. I. 2. p. 764. n. 28.*
- flavi- 36. Tr. viridis fronte flava remigibus primariis caudaque nigris.
frons. Yellow fronted Honey-fucker. *Gen. of birds, p. 62. t. 8. f. 1.*
Yellow-fronted Humming-bird. *Latham syn. I. 2. p. 763.*
n. 26.
- Thau- 8. Tr. viridis nitens, rectricibus aequalibus albo-fimbriatis:
mantias. extima exterius alba.
Polytmus. *Briff. av. 2. p. 667. n. 1.*
Avicula americana, Colubris. *Seb. mus. I. t. 59. f. 5.*
Guainumbi 6 species. *Marcgr. bras. 197. Raj. av. p. 83.*
n. 6. Will. orn. p. 232. n. 6.
Colibri. *Buff. pl. entom. n. 600. f. 1.*
Petit Colibri. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 64.*
Admirable Humming-bird. *Lath. syn. I. 2. p. 763. n. 25.*
Habitat in America meridionali, parum ultra 2½ pollices
longus.
Rostrum mandibula superior cum pedibus et unguibus nigra;
inferior alba; alae fuscae; in abdome inferiore macula
alba; rectrices 2 intermediae totae viridi-aureae.
- domini- 9. Tr. viridis nitens, subtus subcinereus, rectricibus medio
eus. ferrugineis, apice albis.
Polytmus dominicensis. *Briff. av. 3. p. 672. n. 4. t. 35. f. 4.*
Vert perlé. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 62.*
St. Domingo Humming-bird. *Lath. syn. I. 2. p. 762. n. 24.*
Habitat in insula S. Domingi, vix ultra 4 pollices longus.
Rostrum pedesque fusci; color subtus margaritaceus; alae
fuscae, tincta violaceo admisto; cauda subtus colore char-
lybis politi.

- venustif- 37. Tr. ruber, dorso caeruleo, alis nigris.
simus. *Polytmus mexicanus cyaneus.* Briff. av. 3. p. 681. n. 9.
Avicula mexicana cyaneo colore venustissima. Seb. mus. I.
p. 102. t. 65. f. 3.
Gros Colibri. du Tertre antill. 2. p. 263.
Colibri bleu. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 61.
Crimson-headed blue Humming-bird. Latham syn. I. 2.
p. 762. n. 23.
Habitat in nova Hispania, regulo dimidio minor.
- margari- 38. Tr. viridi-aureus, subtus margaritaceus, cauda basi chalybea, medio ex purpureo fusca, apice alba: fascia ex atro fusca.
Plastron blanc. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 61.
Colibri de St. Domingue. Buff. pl. entom. n. 680. f. 1.
Grey-necked Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 761. n. 22.
Habitat in insula S. Dominici, 4 pollices longus.
- hirsutus. 39. Tr. viridi-aureus, subtus ex rufo albus, remigibus ex violaceo fuscis, cauda nigricante apice alba, pedibus hirsutis.
Polytmus brasiliensis. Briff. av. 3. p. 670. n. 3.
Guainumbi 4ta species. Marcgr. bras. p. 197.
Guainumbi minor, rostro incurvo. Raj. av. p. 83. n. 4.
Will. orn. p. 232. n. 4.
Colibri à ventre roussâtre. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 63.
Rufous-bellied Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 760. n. 21.
β. *Trochilus subtus rufus, rectricibus obscuris, exterioribus altera parte rufis.*
Habitat in Brasilia, 3½-4 pollices longus.
Rostrum mandibula superior nigra, inferior flava apice nigra; pedes ad digitos usque pennati ochroleuci; digitii nigri.
- multico- 40. Tr. fuscus subtus miniatus, vertice, mento, pectore et
lor. dorsi medio viridibus, fascia oculari caerulea, cauda acquali.
Harlequin Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 760. n. 20.
Longitudo 4½ pollicum; fascia a rostro per oculos ad nucham usque, parte inferiore nigro marginata.
- cinereus. 41. Tr. viridis nitens subtus cinereus, remigibus fuscis, caudae rotundatae rectricibus 2 intermediis totis viridibus, proximis duabus nigris, reliquis altera parte chalybeis, altera albis.
Ash bellied Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 759. n. 19.
Longitudo 6 pollicum; rostrum pedesque nigri.

10. Tr.

Mango. 10. Tr. viridis nitens, rectricibus subaequalibus ferrugineis, abdomine atro.

Polytmus jamaicensis. Briss. av. 3. p. 679. n. 8. t. 35. f. 1.

Guainumbi 5 species. Maregr. bras. 197.

Guainumbi minor, rostro nigro. Raj. av. p. 83. n. 5. Will. orn. p. 252. n. 5.

Plastron noir. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 59.

Colibri de la Jamaïque et Colibri du Mexique. Buff. planch. enlum. n. 680. f. 3. 2.

Mango Humming-bird. *Alb. av. 3. t. 49. b. Lath. syn. I. 2. p. 758. n. 18.*

β. *Mellivora avis maxima. Raj. av. p. 187. n. 43. Sloan. jam. 2. p. 308. t. 264. f. 3.*

Habitat in nova Hispania, Brasilia, insulisque S. Dominici et Jamaica, 4 pollices et ultra longus, nidum ex gossypio struens.

Corpus subtus nigrum, colore hoc per intermedium lineam caeruleam a vireline separato; crissum album; remiges ex violaceo fuscae, rectrices 2 intermediae, pedesque nigri: Aliquando guttura album.

In β. corpus supra ex nigricante virens, pennis ad apicem aeneo-marginatis; mentum, guttura et pectus splendide purpurea, stria media nigra; abdomen obscurum; crissum utrinque fasciculo pennarum albarum stipatum; rectrices 2 intermediae obscure virides; reliquae purpureae, apice nigrae.

holoseri- 11. Tr. viridis, rectricibus aequalibus supra nigris, fascia pettorali caerulea, abdomine nigro.

Polytmus mexicanus. Briss. av. 3. p. 676. n. 7. t. 35. f. 2.

Avis auricoma mexicana. Seb. mus. I. t. 99. f. 4.

Colibri vert et noir. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 53.

Black-bellied green Humming-bird. Edw. av. I. t. 36.

Black-bellied american Humming-bird. Bancroft Guj. p. 169.

Black-bellied Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 754. n. 12.

Habitat in nova Hispania et Guiana, 4½ pollices longus.

Rostrum, cauda, pedesque nigri; caput, collum, et supra corpus viridi-aurea; abdominis fascia alba, aut utrinque areae duae albae.

gularis. 42. Tr. flavescens, gula uropygioque caeruleis, abdomine albo, alis caudaque nigris. *Miller illustr. t. 20. A.*
Habitat in India?

fulvus. 43. Tr. fulvus, remigibus rectricibusque atris subtus fusco-scentibus. Maerter phys. Arb. der eintr. Fr. zu Wien. I. I. p. 76.

Habitat in America meridionali, crassitie fringillae, ultra 5 polices longus.

Rostrum pedesque corniei; cauda 2 circiter polices longa, rectricibus 12 constans, an ideo cum sequente ad certhiae forsan genus spectat?

varius. 44. Tr. viridi-aureus, subtus ex fusco albicans, fascia pectoris dupli ex viridi cyanea et sanguinea. Maerter phys. Arb. der eintr. Fr. zu Wien, I. I. p. 75.

Habitat in America meridionali, pollicis humani crassitie, $4\frac{1}{2}$ polices circiter longus.

Rostrum pedesque nigri; remiges pallide fuscae; rectrices caudae superiores ex viridi cyaneae; rectrices 12, $1\frac{1}{2}$ pollices longae, fuscae viridi adumbratae, omnium, exceptis intermediis, apice albido.

* * rectirostres.

capensis. 66. Tr. viridis, rectricibus intermediis longis, rectricibus alarum caeruleis. Mantiss. pl. alt. 2. p. 525.

Habitat ad caput bonaे spei, hirundinis rusticæ magnitudine, sericeo nitens.

Remiges rectricesque nigrae; hæ aequales, præter intermedias triplo longiores, margine baseos sericeo-viridi; crissum nigrum cyaneo maculatum.

Colubris. 12. Tr. viridi-aureus, rectricibus nigris: lateralibus tribus ferrugineis apice albis, gula flammæa.

Mellisuga carolinensis, gutture rubro. Briss. av. 3. p. 716. n. 13. t. 36. f. 6. 5.

Tomincio mariana virescens, gutture flammæo. Pet. gaz. t. 3. f. 8.

Passer muscatus. Gesn. av. 655.

Guainumbi I. Marcgr. bras. 196. Will. orn. 165. Raj. av. p. 82. n. 1.

Rubis. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 13.

Humming-bird. Catesb. Carol. I. p. 65. t. 65.

Red-throated Humming-bird. Edw. av. I. t. 38. Lath. syn. I. 2. p. 769. n. 35.

Red-throated Honey-sucker. Arct. zool. 2. p. 286. n. 176.

Tomineo. β. Tr. rectricibus subaequalibus basi ferrugineis apice albis, corpore supra fusco subtus albido. Mus. Ad. Fr. 2. p. 23. Ourissia I. Tomineo. Clus. exot. 96.

Habi-

- Habitat in America, etiam septentrionali, ad Canadam usque, hieme tamen appropinquante in meridionalem redux, 3½ pollices longus.*
- Rostrum nigrum, ¾ pollices longum; mentum et gula coccinea, cum nitore vivacissimo aureo, in femina alba.*
- fimbria- 45. Tr. viridi-aureus, subtus griseus, cauda chalybea apice grisea, pectoris pennis albo fimbriatis.
 tus. *Mellisuga cayenensis gutture naevio. Briss. av. 3. p. 706.*
n. 7. t. 36. f. 2.
 Oiseau-mouche à gorge tachetée. *Buff. hist. nat. des ois. 6.*
p. 31.
 Oiseau-mouche tacheté de Cayenne. *Buff. planch. enlum.*
n. 276. f. 2.
 Spotted-necked Humming-bird. *Lath. syn. I. 2. p. 772. n. 36.*
- β. Tr. subtus albus, pectoris pennis griseo-marginatis, cauda tota ex virescente nigra.
Habitat in Cayenna, 4 pollices longus.
Rostrum mandibula superior nigra, inferior albicans, apice nigra; rectrices 2 intermediae splendore aeneo; pedes cum unguibus nigri.
- rubineus. 46. Tr. viridi-aureus, gula rubro-aurea, alis caudae rufis.
 Oiseau-mouche à gorge rouge du Brésil. *Buff. pl. enlum.*
n. 276. f. 4.
 Rubis emeraude. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 31.*
Mellisuga brasiliensis gutture rubro. Briss. av. 3. p. 720. n.
14. t. 37. f. 4.
 Ruby-throated Humming-bird. *Lath. syn. I. 2. p. 768. n. 34.*
Habitat in Brasilia et Guiana, 4⅓ pollices longus.
Rostrum, pedes et unguis nigri; rectrices alarum majores, remigesque margine ex violaceo fuscae; rectrices margine ex viridi-aureo fuscae, intermediae reliquis breviores.
- auritus. 47. Tr. viridi-aureus subtus albus, fascia infraoculari nigra, fasciculis (in mare) utrinque infra aures duobus pennarum violacearum, pedibus hirsutis.
Mellisuga cayenensis major. Briss. av. 3. p. 722. n. 15. t. 37.
f. 3.
 Oiseau-mouche à oreilles. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 32.*
 Violet-eared Humming-bird. *Lath. syn. I. 2. p. 767. n. 33.*
 β. Tr. fascia infraoculari purpurea, prope aures terminata area magna, infra quam macula alia ex viridi caerulea.
Habitat in Cayenna, 4½ fere pollices longus.
Rostrum pedesque nigri; femora fusca; rectrices 4 intermediae nigrae, in caeruleum vergentes, reliquae aliae; pennae

pennae fasciculorum 5 - 6, reliquis molliores et duplo longiores.

Ourissia. 13. Tr. viridi-auratus, rectricibus subaequalibus fusco-aureis, remigibus nigris, abdomine caeruleo.

Mellisuga surinamensis, pectore caeruleo. Briff. av. 3. p. 711. n. 10.

'Eméraude-amethyste. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 27.

Oiseau-mouche à poitrine bleue de Surinam. Buff. pl. enl. n. 227. f. 3.

Green and blue Humming-bird. Edw. av. I. t. 35. f. 2. Lath. syn. I. 2. p. 767. n. 32.

β. Tr. viridis, subtus caeruleus, menti macula aurantia, remigibus caudaque obscuris.

Habitat in Surinamo, vix 4 pollices longus.

Rostrum, pedes et unguis nigri; pectus, dorsum et abdominis pars superior caerulea; abdominis pars inferior, alae et cauda fuscae.

moschi- 14. Tr. viridi-aureus, rectricibus aequalibus ferrugineis: extimus apice fusca, remigibus nigris. Syft. nat. X. I. p. 120. n. 8. 12. Mus. Ad. Fr. 2. p. 24.

Mellisuga brasiliensis, gutture topazino. Briff. av. 3. p. 699. n. 3. t. 37. f. 1.

Avis Colubri Thaumantias. Seb. mus. I. p. 61. t. 37. f. 4.

Guainumbi 8 species. Marcgr. bras. 197. Will. orn. p. 232. n. 8. Raj. av. p. 83. n. 8.

Colibri Nr. 3. Fermin Surin. 2. p. 196.

Rubis-topaze. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 19.

Oiseau-mouche à gorge topaze du Brésil. Buff. pl. enlum. n. 227. f. 2.

Trochilus with a ferruginous tail. Bancr. Guj. p. 168.

Ruby-necked Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 779. n. 46.

Habitat in Guiana, Brasilia, Surinamo, Curacao, 4 lineas ultra 3 pollices longus.

Rostrum, pedes et unguis nigricans; vertex et occiput colore rubini; guttur topazii; corpus subtus fuscum, qui tinctus etiam supra admisitus; femina subtus ex griseo albicans, area ad pectus et jugulum aurea.

mellisu- 15. Tr. viridi-aureus, rectricibus aequalibus caeruleis, remigibus atro-caerulecentibus, tibiis pennatis. Mus. Ad. Fr. 2. p. 23.

Mellisuga cayanensis. Briff. av. 3. p. 704. n. 6. t. 36. f. 3.

Colubri s. Florisuga. Seb. mus. 2. p. 42. t. 41. f. 2. 4.

Guai-

Guainumbi 9 species. *Marcgr. bras.* 197. *Will. orn.* p. 232.
n. 9. *Raj. av.* p. 83. n. 9.

Vert-doré. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 29.

Oiseau-mouche de Cayenne. *Buff. pl. enlum.* n. 276. f. 3.
Habitat in Cayenna, 2 pollices et 10 lineas longus.

Rostrum, digiti et unguis nigri; rectrices caudae inferiores
et crura ex griseo fusca; tibiae fuscae.

Pegasus. 16. Tr. rectricibus basi virescentibus, corpore virescente au-
reo, subtus subgriseo, tibiis pennatis.

Mellisuga cayanensis, ventre griseo. *Briff. av.* 3. p. 709.
n. 9. t. 36. f. 4.

Grey-bellied Humming-bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 778. n. 44.
Habitat in Cayenna; an varietas leucogastr?

Rostrum, digiti et unguis nigri; rectrices aequales nigro-
purpureae, lateralium apice griseo.

leucoga- 48. Tr. viridi-aureus, subtus albus, cruribus fuscis, cauda nigra.
ster. *Mellisuga cayanensis* ventre albo. *Briff. av.* 3. p. 707. n. 8.
t. 36. f. 7.

Guainumbi 1 species. *Marcgr. bras.* 197. *Raj. av.* p. 82.
n. 1. et p. 187. n. 49. *Will. orn.* p. 231. n. 1.

Cravate dorée. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 25.

Oiseau-mouche à cravate dorée de Cayenne. *Buff. planch.*
enlum. n. 672. f. 3.

Gold-throated Humming-bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 777. n. 43.
Longitudo 3½ pollicum; rostri mandibula superior nigra, in-
terior alba, apice nigra; cauda nitore chalybis; pedes et
ungues nigri.

striatus. 49. Tr. fuscus, subtus albus: stria longitudinali viridi-aurea,
pileo fusco, remigibus nigris, caudae basi cinnamomea,
apice obscuro.

Brown-crowned Humming-bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 776.
n. 42.

Habitat in insula Tobago, 3-4 pollices longus.
Rostrum et pedes nigri; nonnunquam stria longitudinalis
fusca aut obscura; rectrices duae intermediae ex caeruleo
atrae; reliquae rufae, extrema tertia parte atrae, apice
supra albae.

obscurus. 50. Tr. caeruleus, vertice obscuro, mento et gutture viridi-
nitentibus, dorsi medio virescente, uropygio, alis cauda-
que purpureis.

Dusky-crowned Humming-bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 776.
n. 41.

Longi.

Longitudo $4\frac{1}{4}$ pollicum; rostrum obscurum; tectrices alarum ex purpurascente caeruleae; dorsi pars inferior obscure purpurea; pedes nigri.

- bicolor. 51. Tr. simaragdino-aureus, capite gulaque cyaneis.
Colibri Nr. 2. Fermin surin. 2. p. 195.
Saphir-émeraude. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 26.
Sapphire-and Emerald-Humming-bird. Latham syn. I. 2. p. 775. n. 40.
Habitat in Guadeloupe, mediae magnitudinis.
- sapphiri- 52. Tr. viridi-aureus, jugulo et pectore sapphirinis, alis et
nus. tectricibus caudae superioribus fuscis, inferioribus, cauda
ipla et gula rufis.
Saphir. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 26.
Sapphire Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 775. n. 39.
- β . Tr. pectore sapphirino, ventre albo, cauda ex caeruleo atra.
Habitat in Guiana.
Rostrum album, apice nigrum; abdominis pars inferior alba.
- niger. 17. Tr. rectricibus subaequalibus, corpore nigro subtus aura-
to, crasso albo, tibiis pennatis. Mus. Ad. Fr. I. p. 18.
Mellifuga dominicensis. Briff. av. 3. p. 702. n. 5. t. 36. f. 8.
Black Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 774. n. 38.
*Habitat in insula S. Dominici, 2 $\frac{1}{4}$ pollices longus, an femi-
na mellifugi?*
Rostrum, digitus et unguis nigri; corpus subtus ex albicante
griseum; gula maculis minutis fuscis; cauda chalybea.
- cianoce- 53. Tr. viridi-aureus, capite, remigibus rectricibusque caeru-
phalus. leis, abdomine rubro. Molin. hist. nat. Chil. p. 218.
Habitat in Chili, nucis juglandis magnitudine.
Rostrum albidum; alis caudaeque corpore triplo longiori ad-
mista purpura.
- amethy- 54. Tr. viridi-aureus, subtus ex cinerascente et fusco varius,
stinus. gutture amethystino, cauda furcata.
Petit oiseau-mouche à queue fourchue de Cayenne. Buff.
pl. enlum. n. 672. f. 1.
Amethyste. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 16.
Amethystine Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 787. n. 59.
Habitat in Cayenna, colubris magnitudine.
Alae breves.
- viridissi- 55. Tr. viridi-aureus, abdomine albo, cauda chalybea.
mus. Or-vert. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 17.

- alarum
obscure*
- yn. I. 2.*
- alis et
, cauda*
- . 39.
eo atra.*
- or alba.*
- us aura-*
- . 18.*
- 36. f. 8.*
- 3.
n femi-*
- lbicante
ybea.*
- e caeru-*
- 218. di*
- iiori ad-*
- o varius,*
- . Buff.*
- 7. n. 59.*
- a.*
- All-*
- All-green Humming-bird. *Edw. glean. t. 360. f. 1. Lath.*
syn. I. 2. p. 786. n. 58.
Habitat in insula Tobago, 2 pollices longus.
- glaucopis. 56. Tr. viridi-aureus, fronte caerulea, crisso albo, remigibus ex violaceo fuscis, pedibus pennatis, cauda chalybea subfurcata.
*Mellisuga brasiliensis cauda bifurca. Briff. av. 3. p. 724.
n. 16. t. 36. f. 5.*
Guainumbi major. Raj. av. p. 82. n. 2.
Maregrave's second Humming-bird. Will. orn. p. 231. n. 2.
Blue-fronted Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 786. n. 57.
Habitat in Brasilia, 4½ pollices longus.
Roltrum nigrum; crura, tibiae, et digitii fusca.
- rufus. 57. Tr. rufus subtus exalbidus, vertice viridi-aureo, gutture et pectore coccineo-aureis, remigibus ex purpuralcenti fuscis.
Ruffed Honey-sucker. Arct. zool. 2. p. 290. n. 177.
*Ruffnecked Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 785. n. 56.
t. 35.*
Habitat in sinu Americae Natka, 3⅔ pollices longus.
Roltrum pedesque nigri; colli pennae laterales nonnullae elongatae mobiles; rectrices alarum obscure virentes; rectrices splendide rufae acuminatae: linea media longitudinali et apice nigra; cauda cuneata.
Feminae corpus supra viridi-aureum; gula maculis modo coccineis.
- ornatus. 58. Tr. viridi-aureus, subtus nitente-fuscus, fascia uropygii alba, crista (in mare) verticis et fasciculo pennarum infra aures utrinque rufo.
Hupecol. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 18.
*Oiseau-mouche, dit Hupecol de Cayenne. Buff. pl. enlum.
n. 640. f. 3.*
Tufted-necked Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 784. n. 55.
Habitat in Cayenna, colubri potius minor.
Abdomen inferius album; guttur viridi-aureum; crista capitae longa; pennae fasciculorum angustae, mobiles, inaequales, ultra dimidium pollicem non longae, ad apicem macula viridi nitente notatae.
- puniceus. 59. Tr. pallide fuscus, crista caerulea.
Crested brown Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 784. n. 54.
Magnitudo cristati; alae et cauda obscuriores.

cristatus. 18. Tr. viridis, alis fuscis, abdomine fusco cinereo, crista caerulecente, tibiis pennatis.

Mellifuga cristata. Briss. av. 3. p. 714. n. 12. t. 37. f. 2.

Oiseau - mouche hupé. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 22.

Oiseau - mouche hupé de Cayenne. Buff. pl. entom. n. 227. f. 1.

Green strait - billed Humming - bird. Bancr. Guj. p. 168.

Crested Humming - bird. Edw. av. 1. t. 37.

Crested green Humming - bird. Lath. syn. I. 2. p. 783. n. 53.

Habitat in Cayenna, 3 pollices longus.

Rostrum et digitus nigri; cauda ex violaceo nigra.

longi- 60. Tr. viridi - aureus, gula smaragdina, alis rectricibusque fuscis, intermediis duabus longissimis.

Oiseau - mouche à raquettes. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 23.

Racket - tailed Humming - bird. Latham syn. I. 2. p. 782. n. 52.

Longitudo 2 $\frac{1}{2}$ pollicum; rectrices 2 intermediae 10 lineis longiores, parte eminente nuda, apice demum barbata.

Carbun- 61. Tr. niger, capite, collo et pectore rubris, alis fuscis, cau- culus.

Escarboucle. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 28.

Carbuncle Humming - bird. Lath. syn. I. 2. p. 782. n. 51.

Habitat in Cayenna, rarus, paulo major.

Rostrum ad medium usque pennis tectum.

cyano- 62. Tr. ex albo et caeruleo varius, gula et pectore rubris.

melas. Black and blue Humming - bird. Bancr. Guj. p. 167. Lath.

syn. I. 2. p. 782. n. 50.

Habitat in Terra firma et insulis Caribaeis, exili duplo major.

Remiges rectricesque magnae, splendide nigrae.

gujanen- 63. Tr. viridis, crista capitis et pectore rubris, remigibus re- fisis.

Small green and crimson Humming - bird. Bancr. Guj. p. 168.

Gujana Humming - bird. Lath. syn. I. 2. p. 781. n. 49.

Habitat frequens in Guiana, 2 pollices longus.

Rostrum oculique splendidi nigri.

Tobaci. 64. Tr. viridi - nitens, fascia abdominalis femoribusque albis, criso pallide fuscō, remigibus caudaque subfurcata ex caeruleo atris.

Toba-

- Tobago - Humming - bird. *Lath. syn. I. 2. p. 781. n. 48.*
Habitat in insula Tobago, 4 pollices longus.
Rostrum obscurum, mandibula inferiore flava; pedes fuscii.
- elatus.** 19. Tr. virescente - aureus, rectricibus aequalibus ferrugineis
 apice nigris, pileo rubro crista.
Mellisuga americana, gutture topazino. Briss. av. 3. p. 697.
n. 2.
Oiseau - mouche à gorge topaze de Cayenne. Buff. pl. ent.
n. 640. f. 1.
Ruby - crested Humming - bird. Edw. glean. t. 344. Lath.
syn. I. 2. p. 780. n. 47.
Habitat in Terra firma, Guiana, Cayenna, Tobago.
Rostrum pedesque nigra; caput nigrum, pilei pennis in cri-
stam sanguineam elongatis; corpus olivaceum, subtus ru-
fum, linea longitudinali alba; gula viridi - aurea; remi-
ges purpurascens; cauda rufa, terminata fascia nigra.
- mellivo-** 20. Tr. rectricibus nigris: lateralibus albis, capite caeruleo,
 dorso viridi, abdome albo.
Mellisuga surinamensis torquata. Briss. av. 3. p. 713. n. 11.
Oiseau - mouche à collier, dit la Jacobine. Buff. hist. nat. des
ois. 6. p. 34.
Oiseau - mouche, dit la Jacobine de Cayenne. Buff. planch.
entum. n. 640. f. 2.
White - bellied Humming - bird. Edw. av. I. t. 35. f. 1.
Latham syn. I. 2. p. 765. n. 31.
Habitat in Surinamo, ultra 4 pollices longus.
Rostrum et pedes cum unguibus nigri; collum caeruleo - ni-
tens; cervicis annulus albus; remiges ex violaceo fuscae;
cauda subfurcata; rectrices omnes apice nigrae.
- campy-** 65. Tr. viridi - aureus subtus griseus, rectricibus lateralibus
 fuscis apice albis, remigum 3 - 4 scapis medio incurvis.
Oiseau - mouche à larges tuyaux. Buff. hist. nat. des ois. 6.
p. 35.
Oiseau - mouche à larges tuyaux de Cayenne. Buff. pl. ent.
n. 672. f. 2.
Brond - shafted Humming - bird. Latham syn. I. 2. p. 765.
n. 30.
Habitat in Cayenna, rario, 4½ pollices longus.
Alae acinacis more curvae.
- ruber.** 21. Tr. rectricibus lateralibus violaceis, corpore testaceo fusco
 submaculato.

Mellisuga surinamensis. Briss. av. 3. p. 701. n. 4.

Oiseau - mouche pourpre. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 24.

Little brown Humming - bird. Edw. av. I. t. 32. Bancr.

Guj. p. 168. Lath. syn. I. 2. p. 778. n. 45.

Habitat in Surinamo et Guiana, ultra 3 pollices longus.

Corpus subtus pallide badium, maculis ad pectus nigrican-
tibus; temporum fascia longitudinalis fusca; pedes cum
unguis, rostrum mandibula superior nigra, inferior
carnea, apice nigra.

mini-
mus.

22. Tr. rectricibus lateralibus margine exteriore albis, corpo-
re viridi - nitente subtus albido.

Mellisuga. Briss. av. 3. p. 695. n. 1. t. 36. f. 1.

Guainumbi 7 species. Marcgr. bras. 197. Raj. av. p. 187.
n. 44. Will. orn. 132.

Guainumbi minor, corpore toto cinereo. Raj. av. p. 83.
n. 7.

Le plus petit oiseau - mouche. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 11.
t. 1.

Le plus petit oiseau - mouche de l'Amerique. Buff. pl. entom.
n. 276. f. 1.

Least Humming - bird. Sloan. jam. 2. p. 307. n. 38. t. 264.
f. 1. Edw. av. 105. t. 105. f. inf. Brown jam. p. 475.
Latham syn. I. 2. p. 788. n. 60.

Habitat in America meridionali, insulisque vicinis, omni-
um notarum avis minima, ut longitudine $\frac{1}{4}$ pollicem,
pondere 20 - 45 grana aequet; exempli 6 granorum men-
tionem facit Beireis.

Rostrum nigrum; alae ex violaceo fuscae; rectrices ex cae-
rulecente atrae, nitentes; 1, 1 totae griseae; 2, 2 a me-
dio ad apicem griseae; pedes cum unguibus fusi. Fe-
mina supra sordide fusca cum splendore viridi, subtus sor-
dide alba.

les grās

Mānij

Louj

drent.

Dymthrah

Hēan

Gātwhel.

24.
Bancr.

s.
merican-
s cum
ferior

corpo-

p. 187.

p. 83.

p. II.

ntum.

. 264.

. 475.

omni-
llicem,
t men-

x cae-
a me-
Fe-
us for-

Tib
Roma
Suec.
Portu
(Imperio
Dens
Unio
Imp. Rom.
Gothoy
Itali
Jaffna
Clement
Tunis
Armenia
Tunis
Bogaz
I. Polonia
I. Otho
I. Niret
III. Farnes
IV. Campan
V. Denece
VI. Spacio
VII. Soden
VIII. Exha
IX. Fr