

## CLASSIS I.

## MONANDRIA.

## MONOGYNIA.

† Corollatae.

\* *Scutamineae, inferae: fructu, loculari, infero.*

1350. RENEALMIA. *Corolla* 3fida: nectario oblongo. *Calix* 1phyl-  
lus. *Bacca* carnosa.
2. AMOMUM. *Cor.* 3partita: labio ovato.
6. CURCUMA. *Cor.* 3fida. *Nectarium* 4phyllum ovato-acumi-  
natum. *Stam.* 4 sterilia.
8. THALIA. *Cor.* 5petala. *Drupa* 4locularis.
5. MARANTA. *Cor.* 5fida, *ringens*: labio 2partito magno.
1351. MYROSMA. *Cor.* 5partita irregularis. *Cal.* duplex.
7. KAEMPFERIA. *Cor.* 6partita: labio 2partito plano.
1. CANNA. *Cor.* 6partita: labio 2partito revoluto. *Cal.*  
3phyllus.
4. ALPINIA. *Cor.* quali duplicata: utraque 3fida, interior  
brevior ventricosa: lobis lateralibus 2  
emarginatis.
3. COSTUS. *Cor.* *ringens*: labio 3fido: media lacinia emar-  
ginata.
- PHILYDRUM. *Cor.* 4petala. *Cal.* o. *Antherae* geminae.
- SPHAEROCARPUS. *Cor.* tubulosa: limbo 5partito. *Caps.* glo-  
bosa polysperma.
- HEDYCHIUM. *Cor.* tubo filiformi infra faucem perforatam  
subinflato, *limbo* duplici: utroque tri-  
partito.
- TSIANA. *Cor.* subcampanulata: *fauce* pilis densis clausa.

† Vale-

---

Circumscissa capsula dicitur illa, quae maturo fructu horizontaliter discedit.

Superus flos s. calix, cui germen sub receptaculo, vel cuius calix abit in fructum, secundum Tournefortii.

Inferus flos, cui germen supra receptaculum, vel cuius pistillum abit in fructum ex mente Tournefortii.

Ergo fructus inferus et flos superus idem sunt, ut ex opposito fructus.

Superus et flos inferus.

† *Valeriana rubra*, *Calcitrapa*. *Tradescantia monandra*.  
\*\* floribus monoicis.

1427. PHYLLACHNE. *Cor.* infundibuliformis. *Cal.* 3phyllus, superus. *Caps.* polysperma.  
1036. ELATERIUM. *Cal.* 0. *Cor.* hypocrateriformis. *Caps.* infera, pulpofa.

† Apetalae.  
\* floribus divicis.

1096. PANDANUS. ♂. *Cal.* 0. *Anthera* sessilis, ramificationibus thyrsi inserta. *Filam.* 0.  
♀. *Cal.* 0. *Cor.* 0. *Stigmata* 2. *Fruclus* compositus.  
BROSIMUM. *Amentum* globosum undique tectum squamis orbiculatis peltatis. *Cor.* 0.  
♂. *Filamenta* solitaria inter squamas.  
♀. *Stilus* bifidus. *Bacca* 1sperma.  
ASCARINA. *Amentum* filiforme. *Cor.* 0.  
♂. *Anthera* 4sulca.  
♀. *Stil.* 0. *Stigma* subtrilobum. *Pericarp.* 1spermum.

\*\* floribus monoicis.

- NIPA. *Spatha.* *Cor.* mar. 6petala. *Drupae* angulatae.  
1428. CASUARINA. ♂. *Cal.* amenti, *squamulis* bipartitis *corollam* mentientibus.  
♀. *Cal.* amenti. *Stil.* bifidus. *Strobilus.*  
1399. MYRISTICA. *Cal.* 3fidus. *Stil.* brevissimus: *stigma* duplex acutum.  
1426. ARTOCARPUS. ♂. *Cal.* bivalvis.  
♀. *Cal.* 0. *Stil.* 1. *Drupa* multilocularis.  
1033. CYNOMORIUM. *Cal.* amenti. *Stil.* 1. *Sem.* 1. subrotundum.  
BALANOPHORA. *Cal.* 0.  
♂. pauci, *Cor.* 4petala.  
♀. innumeri, *Cor.* 0.  
1203. CHARA. ♂. *Cal.* 0.  
♀. *Cal.* 4phyllus. *Stigma* 3fidum. *Sem.* 1.

\*\*\* floribus hermaphroditis.

9. BOERHAAVIA. *Cal.* 0. *Cor.* 1petala, campanulata.  
11. HIPPURIS. *Cal.* 0. *Cor.* 0.  
10. SALICORNIA. *Cal.* 1phyllus, 4gonus, truncatus, ventricolus. *Cor.* 0.

MONANDRIA.

3

- APHANES. *Cal.* 1phyllus, tubulatus: ore plano 4-8 fido. *Cor.* o.
- NECKERIA. *Cal.* 1phyllus, 5dentatus. *Cor.* o. *Sem.* I. *Rec.* squamae baccatae fructus includentes.
- TAMBURISSA. *Cal.* commun. 4fidus, persistens. *Cor.* o. *fructus* depresso globosus: nucleis tunica aurantia vestitis.
- CUCULLARIA. *Cor.* 4petala inaequalis: *petalum* superius basi desinens in *nectarium* corniculatum longum.  
*Anther.* 2locularis. *Pericarpium* 3loculare, polyspermum.
- QUALEA. *Cor.* 2petala, inaequalis: *Petalum* superius basi desinens, in *nectarium* corniculatum breve. *Anthera* fuleata.
- MONODYNAMIS. *Cal.* 4fidus: lacinia unica maxima. *Cor.* infundibuliformis 4fida. *Capsf.* 2sperma: *Semina* arillata.  
*Scirpus polytrichoides, atropurpureus, aestivalis, anomalus.*  
*Cyperus nitens, flavidus, leucocephalus.*

DIGYNIA.

\* floribus hermaphroditis.

† Plantae.

12. CORISPERMUM. *Cal.* o. *Cor.* 2petala. *Sem.* I.
13. CALLITRICHE. *Cal.* o. *Cor.* 2petala. *Capsf.* bilocularis.
14. BLITUM. *Cal.* 3fidus baccatus. *Cor.* o. *Sem.* I.
1352. MNIARUM. *Cal.* 4partitus superus. *Cor.* o. *Sem.* I.
- LACISTEMA. *Cal.* Amenti squama. *Cor.* 4partita. *Filum* 2fidum. *Bacca* pedicellata, 1sperma.

†† Gramineae.

*Leersia monandra. Cinna.*

\*\* floribus monoicis.

1035. CERATOCARPUS. *Cal.* 2partitus. *Cor.* o. *Sem.* I. inferum.

## MONANDRIA.

## TRIGYNIA.

\* *floribus divicis.*

1096. NAIAS. ♂. Cal. 2fidus. Cor. 4fida. Filam. 9.  
 ♀. Cal. 0. Cor. 0. Caps.ilocularis.  
*Salix monandra.*

\*\* *floribus monoicis.*

1429. AEGOPRICON. ♂. Amentum. Cal. 3fidus. Cor. 9.  
 ♀. Flores solitarii. Bacca 3cocca.

## TETRAGYNIA.

1034. ZANNICHELLIA. ♂. Cal. 0. Cor. 0.  
 ♀. Cal. Iphyllus. Cor. 0. Sem. 4.

## MONOGYNIA.

**I. CANNA.** *Corolla* 6partita erecta: labio bipartito revoluto. *Stilus* lanceolatus corollae adnatus. *Calix* triphyllus. *Capsula* 3locularis.

- indica.* 1. *C.* foliis ovatis utrinque acuminatis nervosis. *Ic. ap. Miller illustr. of sex. syst.*  
*angustifolia.* 2. *C.* foliis lanceolatis petiolatis nervosis. *Sp. pl. p. 1675. Pis. bras. 213.*  
*glauca.* 3. *C.* foliis lanceolatis petiolatis enervis. *Dill. eph. t. 59. f. 64. Habitat in aquosis.*  
*juncea.* 4. *C.* foliis linearibus nervosis sessilibus. *Retz. obs. bot. 1. p. 9. n. 1. Habitat in Sina.*

**1350. RENEALMIA.** *Cor.* 3fida: nectario oblongo. *Cal.* monophyllus. *Suppl.* p. 7.

*exaltata.* 1. **RENEALMIA.** *Suppl. p. 79. Rumpf. amb. 6. t. 62. 63.*

**2. AMOMUM.** *Cor.* 3-6fida: lacinia prima patente. *Caps.* baccata, infera, 3locularis.

*Zingiber.* 1. *A.* scapo nudo, spica ovata. *Jacq. Hort. Vind. t. 75. Corollae limbus trifidus s. bilabiatus, labio superiori integro, inferiori diviso, intra quem nectarium trilobum.*

*Zerumbet.* 2. *A.* scapo nudo, spica oblonga obtusa. *Jacq. Hort. Vind. 3. t. 54. Murray Corum. Goett. 1775. p. 26. t. 2. Corolla A. Zingiberis.*

*Cardamum.* 3. *A.* scapo simplicissimo brevissimo: bracteis alternis laxis. *Rumpf amb. 5. t. 65. f. 1. Planck pt. med. t. 3.*

*Granum Paradisi.* 4. *A.* scapo ramofo brevissimo. *Planta etiamnum obscura. Rhees h. mal. II. t. 6.*

*Curcuma.* 5. *A.* scapo spathis laxis ex centro foliorum. *Jacquin Hort. Vind. 3. t. 4. Corollae limbus sexfidus.*

- Mioga. 6. *A.* scapo brevissimo, capsula ovata, foliis ensiformibus acutis. *Thunb. fl. jap. p. 14.* Corollae limbus 4partitus: lacinia interna dissimili.
- repens. 7. *A.* scapis procumbentibus, floribus racemosis spathae in basis, foliis lanceolatis utrinque acuminatis. *Sonnerat. it. 2. p. 248. t. 136.* Corollae limbus 4fidus, lacinia quarta majore subspatulata, capsula obtusa trigona.
- angustifolium. 8. *A.* scapo brevissimo: bracteis alternis sursum majoribus, floribus dense spiratis: corolla labiata; labio trifido. *Sonnerat. it. 2. p. 242. t. 137.* Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 12. f. 1.
- Globba. 9. *A.* caulibus solitariis scapis brevissimis, spathis ovatis, foliis alternis petiolatis bifariis oblongis acuminatis. *Koenig apud Retz. obs. bot. fasc. 3 p. 60. Rumpfamb. 6. t. 61.*
- montanum. 10. *A.* scapis erectis longioribus, spicae bracteis imbricata, foliis petiolatis ovatis acutis. *Koenig apud Retz. obs. bot. 3. p. 51.*
- littorale. 11. *A.* scapis brevissimis squamosis, spathis ovatis, caulibus plurimis, foliis apices nutantibus. *Koenig apud Retz. obs. bot. 5. p. 52.*
- Koenigii. 12. *A.* scapis brevibus, spathis cordatis, foliis apice elongatis tortuosis. *Koenig apud Retz. obs. bot. fasc. 3. p. 52.*
- uliginosum. 13. *A.* scapis erecto-curvatis, spathis ovatis, floribus singulis bibracteatis, foliis sessilibus. *Koenig apud Retz. obs. bot. 3. p. 56.*
- spurium. 14. *A.* scapis solitariis squamatis, spicis ovatis: bracteis imbricatis, foliis subpetiolatis oblongis. *Koenig apud Retz. obs. bot. 3. p. 59.*  
 β) Lampujeng vel Thumung? *Koenig apud Retz. obs. bot. 3. p. 62.*
- scyphiferum. 15. *A.* spicis subsessilibus erectis oblongis: bracteis imbricatis, foliis sessilibus. *Koenig apud Retz. obs. bot. 3. p. 68.*
- Leonurus. 16. *A.* scapis brevibus, spicis erectis oblongis: bracteis appressis, foliis petiolatis. *Koenig apud Retz. obs. bot. 3. p. 70.*
- sylvestre. 17. *A.* scapo nudo, spica elongata: bracteis oblongis ventricosis, foliis lato-lanceolatis. *Sloane hist. jam. 1. t. 105. f. 2.* Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 12. f. 1.
- nigrum. 18. *A.* bacca ovato-globosa subuniloculari, corollae basi infundibuliformi coronata. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 12. f. 1.*

medium. 19. A. capsula oblonga triquetro-pyramidata coriacea, tri-  
valvi. *Gaertn. de fr. et Sem. cent. I. t. 12. f. 1. Blank.*  
*herb. t. 584. f. 14-21.*

minus. 20. A. capsula subglobosa trifurca coriacea evalvi. *Gaertn. de*  
*fr. et sem. cent. I. t. 12. f. 1. Blanckw. herb. t. 385. f.*  
*1-3. et t. 584. f. 2-7.*

3. COSTUS. Cor. o. interior inflata ringens: labio  
inferiore trifido.

arabicus. 1. C. foliis subtus sericis. *Regn. bot. t. 304.*

β) Costus malaccensis. *Koenig apud Retz. obs. bot. 3. p. 71.*

glabratus. 2. C. foliis utrinque glabris. *Merian. sur. t. 36.*

1351. MYROSMA. Cor. 5partita, irregularis. Cal.  
duplex: exterior 3phyllus;  
interior tripartitus. *Suppl.*  
p. 8.

cannaefo- 1. MYROSMA. *Suppl. p. 80. Rheed. H. mal. II. p. 67. t. 34?*  
lium.

4. ALPINIA. Cor. 1petala irregularis: limbo du-  
plici: Caps. baccata, infera, ilo-  
cularis, evalvis.

racemosa. 1. A. racemo terminali. *Rottböll. coll. havn. 2. p. 245. t. 1.*

β) *Koenig apud Retz. obs. bot. 3. p. 62?* Alpinia sessilis.

γ) Alpinia multicaulis. *Aubl. pl. guj. 1.*

occiden- 2. A. racemo radicali composito. *Swartz nov. gen. et sp. pl.*  
talis. p. 11.

spicata. 3. A. floribus spicatis. *Jacq. stirp. amer. pict. p. 7. t. 1. an*  
*hujus generis?*

Languas. 4. A. floribus paniculatis terminalibus. *Koenig apud Retz. obs.*  
*bot. 3. p. 64.*

β) Languas chinensis. *Koenig apud Retz. obs. bot. 3. p. 65.*

γ) Languas aquaticum. *Koenig apud Retz. obs. bot. 3. p. 67.*

A 4

5. A.

Amomi, Alpiniae, Curcumae, Thaliae character varius adhuc, neque Koenigii  
industria laudabili satis adhuc illustratus.

jamaicena- 5. A. capsula ovata subtrigona chartacea, corollae tubo corollae.  
 nata. *Gaertn. de fr. et sem. cent. I. t. 12. f. 2.*

5. MARANTA. *Cor.* ringens 5fida: laciniis 2alter-  
 nis patentibus.

arundinea- 1. M. culmo ramoso. *Mart. cent. t. 39.*  
 cea.

Galanga. 2. M. culmo simplici, foliis lanceolatis sessilibus. *Rumpf amb.*  
*5. t. 63. Planck pl. med. t. 6.*

comosa. 3. M. coma foliolis reflexis. *Suppl. p. 80.*

Allovia. 4. M. foliis ovato rotundatis, scapo nudo, capitulo folioso.  
*Rheed. b. mal. II. p. 67. t. 34.*

spicata. 5. M. foliis ovato-oblongis, subfalcatis, scapo nudo, flori-  
 bus spicatis. *Aubl. pl. guj. I. p. 4. n. 6.*

Arcuma. 6. M. caule inferne nudo. *Aubl. pl. guj. I.*

malaccena- 7. M. caule simplici, foliis petiolatis ovatis. *Burm. ind.*  
 fis.

humilis. 8. M. caule ramoso foliis brevioribus, radicibus tuberosis. *Aubl.*  
*pl. guj. I.*

Tonxat. 9. M. radice nodoso. *Rumpf amb. 4. t. 7.*

lutea. 10. M. folio amplissimo. *Aubl. pl. guj. I.*

6. CURCUMA. *Stamina* 4sterilia, quinto fertili in-  
 tra nectarium.

rotunda. 1. C. foliis lanceolato-ovatis: nervis lateralibus rarissimis.  
*Rumpf amb. 5. t. 67.*

longa. 2. C. foliis lanceolatis: nervis lateribus numerosissimis. *Regn.*  
*bot. t. 346.*

7. KAEMPFERIA. *Cor.* 6partita: laciniis 3majori-  
 bus patulis; unica bipartita.  
*Stigma* bilamellatum.

Galanga. 1. K. foliis ovatis sessilibus. *Petiv. gaz. t. 19. f. 2.*

rotunda. 2. K. foliis lanceolatis petiolatis, *Rheed. b. mal. II. t. 9.*  
*Planck pl. med. t. 5.*

3. K.



purpurea. 3. K. foliis ovatis petiolatis. *Koenig apud Retz. fasc. obj. bot.*  
3. p. 57.

**SPHAEROCARPOS.** Cor. irregularis 5partita. Caps.  
globosa, sulcato-rugosa  
polyperma-

Hura. I. SPHAEROCARPOS. *Koenig apud Retz. fasc. obj. bot.* 3. p. 49.

**HEDYCHIUM.** Cor. tubo filiformi infra faucem per-  
foratam subinflato, limbo 6par-  
tito.

coronari- I. HEDYCHIUM. *Koenig apud Retz. obj. bot.* 3. p. 73. *Rumpf*  
um. *amb.* 5. t. 69. f. 3.

**TSIANA.** Cor. tubo campanulato subanguloso, lim-  
bo interiore cucullato-campanulata,  
fauce pilis densis clausa. Caps. oblon-  
ga triquetra.

speciosa. I. TSIANA. *Rheed. h. Mal.* II. t. 8. *Koenig apud Retz. obj.*  
*bot.* 3. p. 75. *Banksea speciosa. Rumpf amb.* 6. t. 64.  
f. 2. *Herba spiralis.*

8. **THALIA.** Cor. 5petala undulata. *Drupa* ilocu-  
laris.

geniculata. I. Th. corollis pentapetalis. *Kottböll. coll. havn.* 2. p. 249. t. 2.

cannaeformis. 2. Th. corollis hexapetalis: nectario bifido erecto. *Forst. fl.*  
*austr.* p. 1.

**PHILYDRUM.** Cor. 4petala: petalis 2 exterioribus  
ovatis; interioribus minoribus  
lanceolatis. Cal. o. Spatha 1phyl-  
la. *Antherae geminae.* Caps.  
supera, 3ocularis.

lanuginosum. I. PHILYDRUM. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* I. t. 16. f. 10.

**CUCULLARIA.** *Cor.* 4petala inaequalis. *Petalum* superius adscendens, basi desinens in *nectarium* corniculatum longum *Filum* apice cucullatum: *Anthera* loculis 2 discretis. *Peric.* 3loculare polyspermum.

Vochy. I. CUCULLARIA. *Aubl. pl. guj. I. p. 18. t. 6.*

**QUALEA.** *Cor.* 2petala inaequalis: *Petalum* superius erectum basi desinens in *nectarium* corniculatum breve. *Filum* adscendens: *Anthera* sulcata. *Peric.* 1loculare polyspermum.

rosea. I. Q. petiolis longis, petali superioris ungue nullo. *Aubl. pl. guj. I. p. 5. t. 1.*

caerulea. 2. Q. petiolis brevibus, petalo utroque ungue instructo. *Aubl. pl. guj. I. p. 7. t. 2.*

**MONODYNAMIS.** *Cal.* 4fidus: lacinia unica maxima. *Cor.* 4fida, infundibuliformis. *Caps.* 2sperma: *Sem.* arillata.

Herti. I. MONODYNAMIS. *Willden Schr. berl. Naturf. 10. p. 51. t. 2.*

1399. **MYRISTICA.** ♂. *Cal.* 3fidus. *Stam.* 1. superius anthera cinctum.  
♀. *Cal.* 3fidus, *germen* includens. *Stil.* brevissimus. *Stigma* duplex acutum. *Bacca* carnosae 1 sperma, membrana sicca reticulari inter baccam et semen.

tomento. I. M. foliis ovatis, fructu tomentoso. *Sonnerat. it. n. Guin. fa. t. 116-118.*

2. M.

- moschata. 2. *M. foliis lanceolatis, fructu glabro.* *Rumpf amb. 2. t. 5.*  
*Thunb. nov. act. Stockb. 1782. t. 1. f. 1.*
- sebifera. 3. *M. foliis cordatis oblongis subtus fructibusque tomentosis.*  
*Aubl. pl. guj. p. 904. t. 345.*
- fatua. 4. *M. foliis oblongo-lanceolatis subtus pubescentibus, calicibus fructibusque villosis.* *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 96.*  
*Gaertn. d. fr. et sem. cent. 3. t. 41. f. 3. 4?*
- dactyloides. 5. *M. bacca ovato-oblonga: arillo ingrato.* *Gaertn. fr. et sem. cent. 3. t. 41. f. 2. an distincta species?*

1427. PHYLLACHNE. ♂. *Cal.* 3phyllus, superus. *Cor.* infundibuliformis.

♀. *Cal.* 3phyllus, superus. *Cor.* infundibuliformis. *Stigma* tetragonum. *Caps.* polysperma.

uliginosa. I. PHYLLACHNE. *Forst. char. gen. pl. t. 58.*

1036. ELATERIUM. ♂. *Cal.* 0. *Cor.* hypocrateriformis.

♀. *Cal.* 0. *Cor.* hypocrateriformis. *Caps.* infera, 10-ocularis, 2valvis.

carthagenense. I. *E. foliis cordatis angulatis.* *Jacq. stirp. amer. t. 232.*

trifoliatum. 2. *E. foliis ternatis incis.* *Maqt. p. 123.*

1096. PANDANUS. ♂. Cal. o. Anthera sessilis, ramificationibus thyrsi inserta.

♀. Cal. o. Stigmata 2. Fructus compositus.

odoratif. I. PANDANUS. Rumpf amb. 4. t. 74-81. Keura Thunb. nov. sima. plant. gener. p. 26. Odoris praestantissimi ergo culta.

BROSIMUM. Flores divici. Amentum globosum undique tectum squamis orbiculatis peltatis. Cor. o.

♂. Filamenta solitaria, inter squamas erumpentia.

♀. Stilus bifidus. Bacca 1 sperma.

Alicaf. I. Br. foliis ovato-lanceolatis perennibus, amentis solitariis, frum. fructu corticoso. Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 12.

spurium. 2. Br. foliis lanceolato-ovatis acuminatis, amentis ovatis geminis, fracta molli. Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 12.

ASCARINA. Flores divici. Amentum filiforme. Cor. o.

♂. Anthera recurva, 4sulca.

♀. Stil. o. Stigma subtrilobum, Pericarp. ispermum.

polysta. I. ASCARINA. Forst. char. gen. pl. p. 59. t. 59. chya.

NIPA. ♂. Spatha. Cor. 6petala.

♀. Spatha. Cor. o. Drupae angulatae.

fruticans. I. NIPA. Thunb. nov. act. Stockh. 1782. 3. n. 6.

1428. CASUARINA. ♂. *Cal.* amenti. *Squamulae*  
bipartitae corollam refe-  
rentes.

♀. *Cal.* amenti. *Cor.* 0. *Sti-*  
*lus* bifidus. *Strobilus.*

equifeti- 1. *C. monoica*, ramulellis flaccidis, strobilorum squamis laevi-  
folia. bus villosis, paginis masculis septempartitis, ciliatis ap-  
proximatis. *Rumpf amb.* 3. t. 57.

striata. 2. *C. divica*, ramulellis erectis, strobilorum squamis laevibus,  
glabriusculis, vaginis masculis multifidis glabris. *Act.*  
*hort. Kew.* 3. p. 320.

torulosa. 3. *C. divica*, ramulellis flaccidis, strobilorum squamis villosis  
tuberculatis, vaginis masculis quadrifidis. *Act. hort. kew.*  
3. p. 320.

nodiflora. 4. *C. verticillis* staminum remotis. *Thunb. nov. pl. gen. p.* 54.

BALANOPHORA. *Flores* monoici capitati. *Cal.* 0.  
♂. magni pauci ad basin capi-  
tali. *Cor.* 4petala.

♀. innumeri parvi. *Cor.* 0.

fungosa. 1. BALANOPHORA. *Juss. char. gen. pl. p.* 50. t. 50.

1033. CYNOMORIUM. ♂. *Cal.* Amentum imbri-  
catum.

♀. *Cal.* in eodem amento.  
*Sem.* 1. subrotundum.

coccine- 1. *C. stipite* squamoso, amento cylindrico. *Amoen. acad.* 4.  
um. t. 2. *Planta tota unicum amentum.*

jamaicen- 2. *C. stipite* squamoso, amento elongato. *Swartz nov. pl. gen.*  
se. p. 12.

cayanen- 3. *C. stipite* nudo, amento subgloboso. *Swartz nov. pl. gen.*  
se. p. 12.

1426. ARTOCARPUS. *Amentum* cylindricum sensim incrassatum, floribus tectum. Cor. o.  
 ♂. Cal. 2valvis.  
 ♀. Cal. o. *Bacca* composita: universalis maxima polyedro - muricata; partiales numerosissimaeiloculares, 1spermae.

- incisa. 1. A. foliis incisis.  
 α) fructu apyreno. *Forst. v. Brodbaum. t. 1. 2.*  
 β) fructu seminifero. *Sennerat. it. nov. Guin. p. 99. t. 57-60.*  
 integrifolia. 2. A. foliis integris. *Rumpf amb. 1. t. 30. 31. Gaertn. de fr. et Sem. cent. 5. t. 71. 72.*

1203. CHARA. ♂. Cal. o. *Anthera* germini subjecta.  
 ♀. Cal. 4phyllus. *Stigma* 3fidum.  
*Sem. 1.*

- tomentosa. 1. Ch. aculeis caulinis ovatis. *Morif. hist. pl. 3. t. 4. f. 9.*  
 vulgaris. 2. Ch. caulibus laevibus, frondibus interne dentatis. *Vaill. act. paris. 1719. t. 3. f. 1. Baccae oblongae polyspermae. Weis.*  
 hispida. 3. Ch. aculeis caulinis capillaribus confertis. *Fl. dan. t. 154.*  
 flexilis. 4. Ch. caulium articulis inermibus diaphanis superne latioribus. *Dill. eph. N. C. cent. 6. app. t. 13. f. 2.*

9. BOERHAAVIA. Cal. o. Cor. 1petala, campanulata, plicata. (*Stam. interdum 2.*) *Sem. 1. nudum, calici indurato inclusum.*

- erecta. 1. B. caule erecto glabro, floribus diandris. *Jacq. Hort. Vind. 1. t. 5. 6.*

- diffusa. 2. B. caule laevi diffuso, foliis ovatis. *Rheed. h. mal. 7. t. 56.*  
 hirsuta. 3. B. caule diffuso pubescente, foliis ovatis repandis. *Jacq. Hort. Vind. 1. t. 7.*  
 scandens. 4. B. caule erecto, floribus diandris, foliis cordatis acutis. *Jacq. Hort. Vind. 1. t. 4.*  
 repens. 5. B. caule repente, floribus monandris.  
 angustifolia. 6. B. foliis linearibus acutis.  
 tetrandra. 7. B. caule repente, floribus tetrandris. *Forst. fl. austr. p. 2.*

166. APHANES. *Cal.* tubulatus: ore plano 4 vel 5fid. *Cor.* o. *Sem.* 1. ovatum, acuminatum.

- arvensis. 1. Aph. foliis trilobis. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 73. f. 2.*  
 Swartzii. 2. Aph. foliis tripartito-trifidis hirsutis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 38.*

10. SALICORNIA. *Cal.* ventriculosus, integer. (*Stam.* in nonn. 2.) *Sem.* 1.

- herbacea. 1. S. herbacea patula, articulis apice compressis emarginato-bifidis. *Flor. dan. t. 303.*  
 fruticosa. 2. S. caule erecto fruticoso, articulis subaequalibus obtusis: internodiis approximatis.  
 virginica. 3. S. herbacea erecta, ramis simplicissimis. *Stamina interdum 2.*  
 arabica. 4. S. foliis alternis vaginalibus obtusis hinc dehiscentibus. *Pallas it. 1. t. A. f. 13. Suppl. p. 81.*  
 caspica. 5. S. fruticosa, articulis cylindricis, spicis filiformibus. *Pall. it. 1. t. A. f. 2.*  
 foliata. 6. S. foliis linearibus alternis amplexicauli-decurrentibus. *Suppl. p. 81. Pall. it. 1. t. C. f. 1. 2.*  
 strobilacea. 7. S. caulibus prostratis, flagellis longissimis, furculis erectis ramosis. *Pall. it. 1. p. 481. t. B. f. 1. 2.*  
 cruciata. 8. S. fruticosa, pedunculorum articulis cruciatis, caulis globosis. *Habitat in Arabia. Forskål fl. aeg. ar. p. 2.*

perfolia- 9. S. fruticosa, foliis carnosis urceolato-orbicularibus caule  
ta. perfoliatis. *Habitat in Arabiae littore. Forskäl fl. aeg.  
ar. p. 3.*

**TAMBURISSA.** *Cor.* 0. *Cal.* communis, 4partitus,  
semiclausus femina includens.  
*Fructus* depresso-globosus:  
nucleis arillatis.

quadrifida. 1. **TAMBURISSA.** *Sonner. it. 2. p. 237. t. 134.*

**NECKERIA.** *Cal.* 1-phyllus, 5dentatus. *Cor.* 0.  
*Sem.* 1. *Rec.* squamae baccatae,  
*fem.* includentes.

campestris. 1. **NECKERIA.** *Aiton hort. Kew. 1. p. 5.*

**II. HIPPURIS.** *Cal.* 0. *Stigma* simplex. *Sem.* 1.

vulgaris. 1. H. foliis octonis subulatis. *Suppl. p. 81. Fl. dan. t. 87.*

tetraphyl- 2. H. foliis quaternis oblongis obtusis. *Suppl. p. 81.*  
la.

lanceola- 3. H. foliis lanceolatis: inferioribus quaternis superioribus qui-  
ta. nis. *Retz. obs. bot. fasc. 3. t. 1.*

## DIGYNIA.

**LACISTEMA.** *Cal.* amenti squama. *Cor.* 4partita.  
*Filamentum* 2fidum. *Bacca* pe-  
dicellata, 1 sperma.

myricoi- 1. **LACISTEMA.** *Berg. act. Helv. 7. t. X.*  
des.

**12. CORISPERMUM.** *Cal.* 2phyllus. *Cor.* 0. *Sem.* 1.  
ovale, nudum, erectum,  
plano-convexum, alatum.

hyssopi- 1. C. floribus lateralibus. *Buxb. cent. 3. t. 55. Gaertn. de fr.*  
folium. *et sem. cent. 5. t. 75. f. 7.*



squarrosus. 2. *C. spicis squarrosis.* Buxbaum cent. 3. t. 56.

13. CALLITRICHE. Cal. o. Petala 2. Sem. 4nuda, hinc membranaceo marginata.

verna. 1. *C. foliis superioribus ovalibus, apice integris.* Col. ecphr.

1. ic. p. 316. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 68. f. 4.

β) *C. foliis omnibus lanceolato-ovatis obtusis.*

auctumnalis. 2. *C. foliis omnibus linearibus apice bifidis, floribus hermaphroditis.* Loef. fl. pruss. t. 38. *Alfina aquatica minor s. fluitans.* C. Baub. pin. 257.

dubia. 3. *C. foliis superioribus ovalibus: caulinis linearibus apice bifidis.* Hoffm. obs. bot. n. 1.

brutia. 4. *C. foliis linearibus oppositis connatis, internodiis distantibus.* Petagn. inst. bot. 2. p. 10.

14. BLITUM. Cal. 3fidus baccans. Petala o. Sem. 1. feminudum.

capitatum. 1. *Bl. capitellis spicatis terminalibus.* Knorr del. hort. 1. t. E. 3.

virgatum. 2. *Bl. capitellis sparsis lateralibus.* Ic. in Mill. illustr. of sex. syst.

chenopodioides. 3. *Bl. capitellis verticillatis exsuccis.* Mant. p. 170.

1359. MNIARUM. Cal. 4partitus, superus. Cor. o. Sem. 1.

biflorum. 1. MNIARUM. Suppl. p. 81. Forster char. gen. pl. t. 1.

1035. CERATOCARPUS. ♂. Cal. 4partitus. Cor. o. Filamentum longum.

♀. Cal. 2phyllus, germini adnatus. Cor. o. Stili

2. Sem. 2corne, compressum.

arenarius. 1. CERATOCARPUS. Buxb. act. Petrop. 1. t. 9.

## TRIGYNIA.

1096. NAJAS. ♂. Cal. cylindricus, 2fidus. Cor.  
4fida. Filamentum o.  
♀. Cal. o. Cor. o. Capsula ovata, 1 lo-  
cularis.

marina. I. NAJAS. *Vaill. act. par. 1719. t. 1. f. 2.*

1429. AEGOPRICON. ♂. Amentum. Cal. 3fidus.  
Cor. o.  
♀. Flores solitarii. Cal. 3fidus.  
Cor. o. Bacca 3cocca.

betulinum. I. AEGOPRICON. *Suppl. p. 413.*

## TETRAGYNIA.

1034. ZANNICHELLIA. Flores monoici, apetalii.  
♂. Cal. o.  
♀. Cal. 1phyllus, cam-  
panulatus. Sem.  
circ. 4.

palustris. I. ZANNICHELLIA. *Flor. dan. t. 167. Gaertn. de fr. et sem.  
cent. 1, t. 19. f. 6.*