

CLASSIS II.

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

† *floribus hermaphroditis.** *staminibus a pistillo paulisper remotis.*→ *floribus inferis.*† *monopetalis.*‡ *regularibus.*

20. OLEA. *Cor. 4fida infundibuliformis. Drupa.*
 CERANTHUS. *Cor. 4partita: laciniis ovatis corniculo longissimo terminatis. Bacca 1locularis, 1sperma.*
21. CHIONANTHUS. *Cor. 4fida: laciniis longissimis. Drupa.*
 19. PHILLYREA. *Cor. 4fida: laciniis ovatis. Bacca 1sperma.*
 13. LIGUSTRUM. *Cor. 4fida. Bacca 4sperma.*
 22. SYRINGA. *Cor. 4fida: laciniis linearibus. Capsula 2locularis.*
- HEBE. *Cor. 4loba: tubo brevi. Cal. 4fidus. Caps. 2valvis, 2locularis.*
 TUBIFLORA. *Cor. tubulosa: limbo 4partito. Cal. 6phylus. Caps. 2locularis, polysperma.*
 COOKIA. *Cor. 4partita: laciniis ovalibus. Cal. 0. Caps. 1locularis, 1sperma.*
23. ERANTHEMUM. *Cor. 5fida: laciniis obovatis, planis. Capsula.*
 17. JASMINUM. *Cor. 5fida. Bacca 2cocca.*
 16. NYCTANTHES. *Cor. 8fida. Bacca 2cocca.*
 MAYTENUS. *Cor. campanulata. Caps. rotunda, 1sperma.*

‡ *irregularibus.*† *seminibus capsulae inclusis.*

- GLOBIFERA. *Cor. 4fida. Cal. 4partitus persistens. Anth. globosae. Caps. globosa, 1locularis 4valvis.*
26. PAEDEROTA. *Cor. 4fida. Cal. 5partitus.*
 25. VERONICA. *Cor. limbo 4partito: lacinia inferiore angustiore. Caps. obovata.*
 29. GRATIOLA. *Cor. 4fida. Stamina 4, quorum 2 sterilia.*

DIÁNDRIA.

1233. SCHWENKIA.

Cor. subaequalis: ore plicato, stellato glanduloso. *Stamina* 3 sterilia.

27. JUSTICIA.

Cor. ringens. *Capsula* ungue elastico. *Anthera* unica in singulis filamentis.

28. DIANTHERA.

Cor. ringens. *Antherae* 2 in singulis filamentis.

1228. CALCEOLARIA.

Cor. ringens inflata. *Cal.* 4fidus.

30. PINGUICULA.

Cor. ringens calcarata. *Cal.* 5fidus.

31. UTRICULARIA.

Cor. ringens calcarata. *Cal.* 2phyllus.

WULFENIA.

Cor. ringens, calcarata, femihians, ad faucem barbata.

FAGELIA.

Cor. tubulosa, in ventrem globosum desinens. *Filamenta* brachiis incurvis instructa. *Bignonia Catalpa.* *Bartsia Gymnandre.* *Martynia annua.*

KYRTANDRA.

Nectarium urceolatum. *Filamenta* 4 brevia, 2 sterilia.

GHINIA.

Cor. 2labiata 2 fertilia spiralia. *Filamenta* 4, 2 breviora antherae loculo altero sterili.†† *feminibus nudis.*

32. VERBENA.

Cor. subinaequalis. *Cal.* lacinia suprema breviora.

33. LYCOPUS.

Cor. subaequalis. *Stam.* distantia.

34. AMETHYSTEA.

Cor. subaequalis: lacinia infima concava.

36. ZIZIPHORA.

Cor. ringens: galea reflexa. *Cal.* filiformis.

37. MONARDA.

Cor. ringens: galea lineari obvolvante genitalia.

38. ROSMARINUS.

Cor. ringens: galea falcata. *Stamina* curva.

39. SALVIA.

Cor. ringens. *Filamenta* transverse pedicellata.

35. CUNILA.

Cor. ringens: galea plana. *Stamina* 4: 2 rudimenta.

40. COLLINSONIA.

Cor. subringens: labio capillari multifido.††† *floribus tripetalis.*

LITHOPHILA.

Cal. 3phyllus. *Nectarium* 2phyllum.†††† *floribus tetrapetalis.*

1353. THOUINIA.

Cal. tetrapetalis dentatus.††††† *pentapetalis.*PENTAGLOSSUM. *Cor.* 4-5petala, calicis labio inserta. *Cal.* 4-5dentatus.

→ Ho-

- *Holosteum diandrum. Viola diandra.*
Cal. 0.
1240. DIALIUM. → → *floribus superis.*
41. MORINA. *Cal. fructus dentato-aristatus, floris bifidus.*
 42. CIRCAEA. *Cal. 2phyllus. Cor. 2petala obcordata.*
 1287. GLOBBA. *Cal. 3fidus. Cor. 3fida. Capsf. 3locularis.*
 1354. ANCISTRUM. *Cal. 4aristatus: aristis terminatis glochidibus
 cruciatis. Cor. 4fida. Stigma penicil-
 latum.*
- ARUNA. *Cal. 5partitus deciduus. Cor. 0. Bacca ovata,
 altero latere fulcata; 1locularis, 1-2-
 sperma.*
- SCIURIS. *Cal. 5dentatus. Cor. 2labiata. Capsf. 5coa-
 litae, 2valvas, 1loculares, 1spermae.*

* *Valeriana Cornucopiae.*
Boerhaavia hirsuta, scandens, erecta.
Salicornia virginica.
Salix hermaphrodita.
Commelina vaginata, nudiflora.
Schoenus cladium, effusus, setaceus.

** *staminibus ad pistillum insertis Orchideae.*

1009. ORCHIS. *Nectarium corniculatum.*
 1010. SATYRIUM. *Nectarium scrotiforme.*
 1011. OPHRYS. *Nectarium subcarinatum.*
 MALAXIS. *Nectarium 1phyllum, concavum, cordatum,
 posterius acuminatum, anterius 2fidum,
 genitalia in medio fovens.*
1012. SERAPIAS. *Nectarium ovatum, subtus gibbum.*
 1013. LIMODORUM. *Nectarium pedicellatum.*
 1015. CYPRIPIEDUM. *Nectarium inflato-ventricosum.*
 1016. EPIDENDRUM. *Nectarium turbinatum.*
 1014. ARETHUSA. *Nectarium connatum cum corolla ringente.*
 1423. DISA. *Spatha 1 valvis. Petala 3, tertium minus,
 bipartitum basi gibbum.*
1424. FORSTERA. *Cal. duplex: exterior 3phyllus; interior su-
 perus 6fidus. Cor. tubulosa.*

†† *floribus dichinis.*

* *monoicis.*

1037. ANGURIA. *Cal. 5fidus. Cor. 5petala.*

DIANDRIA.

1038. LEMNA. ♀. *Pomum* 2loculare, polyspermum.
Cal. 1phyllus. *Cor.* 0.
 OMPHALEA. ♀. *Caps.* 1locularis.
Flores monoici. *Cor.* 0.
 ♂. *Antherae* apice columnae insidentes. *Cal.*
 4phyllus.
 ♀. *Cal.* 5phyllus. *Stigm.* 3fidum. *Caps.* car-
 nosa, 3locularis.
 COSARIA. *Cal.* communis flores confertos in *receptaculo*
 plano includens. *Carex diandra acuti.*
 ** *dioicis.*
 1099. GECROPIA. *Spath.* recept. comm. *Cor.* 0.
 ♀. *Bacca* 1sperma.
 1098. SALIX. *Squama* amenti. *Cor.* 0.
 ♀. *Stigm.* 2. *Caps.* 2valvis. *Sem.* papposa.
 *** *floribus polygamis.*
 1160. FRAXINUS. *Cal.* 0. f. 4partitus. *Cor.* 0. f. 4petala. *Sem.*
 1. lanceolatum.

DIGYNIA.

- * *Ophioxylum.*
 42. ANTHOXANTHUM. *Cal.* Gluma 1flora oblonga. *Cor.* Gluma
 aristata.
 1272. GUNNERA. Amenti *Cal.* 0. *Cor.* 0. *Stamina* ad pistilla
 inferta. *Sem.* 1.
 MISANDRA. *Flores* dioici, in racemis terminalibus. *Cal.*
 0. *Cor.* 0.
 ♂. *Anther.* 4gonae.
 ♀. *Germen* apice marginatum. *Caps.* sub-
 baccata, 2valvis, 1sperma.

TRIGYNIA.

- * *Cinna Bufonia.*
Saccharum Thunbergii, Koenigii.
Agrostis diandra.
Holius odoratus.
 43. PIPER. *Cal.* 0. *Cor.* 0. *Bacca* 1sperma. *Amaran-*
thus polygamus.
 1097. VALLISNERIA. ♂. *Spatha* multiflora. *Cor.* 3partita.
 ♀. *Spatha* 1flora. *Cal.* 3part. *Cor.* 3pet.
Caps. 1locul.

MONO.

MONOGYNIA.

16. NYCTANTHES. Cor. 8fida. Cal. 8fidus. *Perricarpium* dicoccum.

- Arbor tristis. 1. N. caule tetragono, foliis ovatis acuminatis, capsulis membranaceis compressis. *Rbeede h. malab. 1. t. 21. Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 51. f. 1.*
- Sambac. 2. N. foliis inferioribus cordatis obtusis: superioribus ovatis acutis. *Rumpf amb. 5. t. 30.*
- undulata. 3. N. foliis ovatis acuminatis undulatis, ramis teretibus. *Rbeede h. malab. 6. t. 55.*
- hirsuta. 4. N. petiolis pedunculisque villosis. *Rbeede h. malab. 4. t. 48.*
- angustifolia. 5. N. foliis obtusis lanceolatis ovatisque. *Rbeede h. malab. 6. t. 53.*
- elongata. 6. N. foliis cordatis lanceolatis acutis elongatis minoribusque, ramis teretibus. *Berg. act. angl. 1772. t. 11.*
- glauca. 7. N. glauca, caule tereti, foliis lanceolatis acutis trinerviis, pedunculis trifidis. *Suppl. p. 82. an hujus generis?*
- viminea. 8. N. ramis teretibus elongatis, foliis ovatis acuminatis, pedunculis axillaribus unifloris: terminalibus trifloris. *Koenig apud Retz. obs. bot. 5. p. 9.*
- pubescens. 9. N. ramis teretibus hirsutis, foliis cordatis utrinque pubescentibus. *Koenig apud Retz. obs. bot. 5. p. 9.*
- scandens. 10. N. glabra, ramis teretibus elongatis scandentibus, foliis oblongo-cordatis, paniculis brachiatis axillaribus. *Koenig apud Retz. obs. bot. 5. p. 9.*
- acuminata. 11. N. foliis lanceolato-acuminatis, pedunculis bigeminis. *Burm. thes. zegl. t. 59.*
- triflora. 12. N. foliis ovatis alternis: ramulorum oppositis, pedunculis terminalibus ternis unifloris. *Burm. ind. t. 2.*
- multiflora. 13. N. foliis ovatis, pedunculis terminalibus multifloris. *Burm. ind. t. 3. f. 1.*

17. JASMINUM. Cor. 5fida. Antherae intra tubum.
Antrum duplicatumiloculare baccas includens.

- officinale. 1. J. foliis oppositis: foliolis distinctis. *Besl. H. Eystett. 2. p. 2. Plenck pl. med. t. 9.*
- grandiflorum. 2. J. foliis oppositis pinnatis: foliolis extimis confluentibus. *Merian. surin. t. 46.*
- azoricum. 3. J. foliis oppositis ternatis. *Commelin. b. Amstel. 1. t. 82.*
- fruticans. 4. J. foliis alternis ternatis simplicibusque, ramis angulatis. *Mill. hort. angl. t. 6. Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 42. f. 1.*
- humile. 5. J. foliis alternis acutiusculis ternatis pinnatisque, ramis angulatis. *Knorr del. hort. 1. t. 1.*
- odoratissimum. 6. J. foliis alternis obtusis ternatis pinnatisque, ramis teretibus. *Barr. ic. 62.*
- simplicifolium. 7. J. foliis oppositis ovato-lanceolatis simplicibus. *Forst. fl. austr. p. 3.*
- didymum. 8. J. foliis oppositis ternatis: foliolis ovato-lanceolatis acuminatis integerrimis. *Forst. fl. austr. p. 3.*
- oblongum. 9. J. foliis oppositis simplicibus, pedunculis alternis axillaribus, unifloris. *Burm. ind. t. 3. f. 2.*

COOKIA. Cor. 4partita: laciniis ovalibus aequalibus.
Cal. o. Nux, locularis, corticata, supera.

- Gnidia. 1. C. foliis subpetiolatis lanceolatis rigidis. *Forster clar. gen. pl. t. 4. nov. act. Ups. 3. p. 173. Banksia Gnidia, in nova Seelandia.*
- pilosa. 2. C. foliis subpetiolatis oblongis flaccidis pilosis. *Forster nov. act. Ups. 3. p. 174. Banksia pilosa, in nova Seelandia.*
- prostrata. 3. C. foliis serptibus ovato-oblongis carnosis. *Forst. nov. act. Ups. 3. p. 175. Banksia prostrata. Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 39. f. 1.*

18. LI.

An Nyctanthes, Jasmine, Phillyria et Chionanthus cum Olea conjungenda?

18. LIGUSTRUM. Cor. 4fida. Antrum duplicatum
2loculare 4spermum.

- vulgare. 1. L. foliis ovatis obtusis panicula simpliciter trichotoma.
Blackw. herb. t. 142.
α) foliis deciduis.
β) foliis sempervirentibus, italiicum.
- japonicum. 2. L. foliis ovatis acuminatis, panicula decomposite trichotoma.
Thunb. fl. jap. p. 17. nov. act. Ups. 3. p. 207.

19. PHILLYREA. Cor. 4fida. Bacca 1sperma.

- media. 1. Ph. foliis ovato-lanceolatis subintegerrimis.
- angustifolia. 2. Ph. foliis lineari-lanceolatis integerrimis; *an varietas mediae?*
- latifolia. 3. Ph. foliis ovato-cordatis ferratis.
β) Ph. latifolia laevis. *C. Baub. pin. 476.*

MAYTENUS. Cor. campanulata, integra. Cal.
hemisphaericus persistens. Caps.
1sperma.

- Boaria. 1. MAYTENUS. *Molin. nat. Chil. p. 152.*

20. OLEA. Cor. 4fida: laciniis subovatis. Drupa
1sperma.

- europaea. 1. O. foliis lanceolatis. *Lehr. ol. europ. ic. Regnault bot. t. 1.*
- capensis. 2. O. foliis ovatis. *Dillen. h. Elth. t. 170. f. 194.*
- americana. 3. O. foliis lanceolato-ellipticis. *Mant. p. 24. Catesb. car. t. 1. t. 61.*
- fragrans. 4. O. foliis lanceolatis ferratis, pedunculis lateralibus aggregatis unifloris. *Thunberg fl. jap. p. 18.*
- cajetana. 5. O. foliis ovato-lanceolatis, floribus racemosis. *Petagn. inst. brit. 2. p. 19.*
- excelsa. 6. O. foliis ellipticis integerrimis, racemis angustatis: bracteis perfoliatis. *Act. hort. Kew. 1. p. 14.*

21. CHIONANTHUS. Cor. 4fida: laciniis longissimis. *Drupa* baccata, supera: putamine striato 1loculari.

virginica. 1. Ch. pedunculis trifidis trifloris. *Catesb. Car. 1. t. 68. Drupa purpurascens.*

zeylanica. 2. Ch. pedunculis paniculatis multifloris. *Pluckn. alm. t. 241. f. 4. Gaertn. 2. de fr. et sem. cent. 3. t. 39. f. 6.*

compacta. 3. Ch. paniculis trichotomis: ultimis floribus subcapitatis: antheris acuminatis, calicibus villosis, foliis lanceolato-oblongis. *Swartz n. pl. gen. et sp. p. 13.*

incrassata. 4. Ch. paniculae ramis decussatis fastigiatisve: ultimis trifloris, corollis tetragonis: laciniis erectis incrassatis, foliis oblongis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 13. an hujus generis?*

Ghaeri. 5. Ch. drupa angulato-fulcata: putamine sphaerico. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 39. f. 6.*

caribaea. 6. Ch. foliis utrinque glabris longe acuminatis. *Jacq. Collect. 2. p. 110. t. 6. f. 1.*

CERANTHUS. Cor. 4partita: laciniis ovatis corniculo longissimo terminatis. *Bacca* oblonga apice compressa 1locularis, 1 sperma.

Schreberi. 1. CERANTHUS. *Schreb. gen. pl. Linn. 1. p. 14.*

22. SYRINGA. Cor. 4fida. *Caps.* bilocularis; 3valvis, supera.

vulgaris. 1. S. foliis ovato-cordatis integris. *Knorr del. hort. 2. t. 5-11.*

perfica. 2. S. foliis lanceolatis integris. *Mill. dict. t. 164. f. 1.*

suspensa. 3. S. foliis ovatis ferratis ternatisque. *Thunb. fl. jap. p. 19. nov. act. Ups. 3. p. 209. Ligultrum suspensum.*

capitata. 4. S. foliis saepius fasciculatis: inferioribus pinnatis; superioribus ternatis simplicibusque. *S. G. Gmelin it. 3. t. 32. f. 1.*

HEBE.

HEBE. Cor. 4loba: tubo brevi. Cal. 4fidus. Caps.
ovata, 2valvis, 2ocularis.

magella- I. HEBE. *Fussieu gen. plant. p. 105.*
nica.

TUBIFLORA. Cor. tubulosa: limbo 4partito. Cal.
6phyllus, inaequalis. Caps.
ovata, 2ocularis, polysperma.

carolini- I. TUBIFLORA. *Walt. flor. carol. p. 61. Anonymus.*
ensis.

1240. DIALIUM. Cor. 5petala. Cal. 0. Stamina
ad latus superius.

indum. I. DIALIUM. *Mant. p. 24. Rumpf amb. 3. t. 137.*

23. ERANTHEMUM. Cor. 5fida: tubo filiformi.
Antherae extra tubum.
Stigma simplex.

capense. I. E. foliis lanceolato-ovatis petiolatis.

angustifo- 2. E. foliis linearibus remotis patulis. *Burm. dec. afr. t. 47.*
lium. *f. 3. Sp. plant. p. 877. Selago dubia.*

parvifoli- 3. E. foliis ovato-linearibus imbricatis. *Mant. p. 171. Com-*
um. *mol. h. Amstel. 2. t. 60.*

falsoloi- 4. E. foliis carnosis teretiusculis linearibus glaberrimis, race-
des. mis axillaribus calycibusque pubescentibus, tubo recurvo.
Suppl. p. 82.

24. CIRCAEA. Cor. dipetala. Cal. diphyllus, su-
perus. Caps. infera 2ocula-
ris, hispida. Sem. solitaria.

lutetiana. I. C. caule erecto, foliis ovatis subserratis hirsutis. *Fl. dan.*
t. 256. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 24. f. 6.

alpina. 2. C. caule ramosissimo depresso, foliis cordatis dentatis pilidis.
Fl. dan. t. 210.

25. VERONICA. Cor. limbo 4partito: laciniis infima angustiore. Caps. 2locularis, apice emarginata,

* *Spicatae.*

- fibrica. 1. V. spicis terminalibus, foliis septenis verticillatis, caule subhirsuto. *Ann. stirp. 1. rub. t. 4.*
- virginica. 2. V. spicis terminalibus, foliis quaternis quinisque. *Jungh. ic. pl. 1. t. 13.*
- spuria. 3. V. spicis terminalibus, foliis ternis aequaliter ferratis. *S. G. Gmelin it. 1. t. 39. Jungh. plant. ic. 2.*
- maritima. 4. V. spicis terminalibus, foliis ternis inaequaliter ferratis. *Fl. dan. t. 374.*
- longifolia. 5. V. spicis terminalibus, foliis oppositis lanceolatis ferratis acuminatis in petiolum desinentibus. *Sabbat h. rom. 2. t. 48.*
- incana. 6. V. spicis terminalibus, foliis oppositis crenatis obtusis, caule erecto tomentoso. *Kniphof bot. orig. cent. 7. n. 98.*
- incisa. 47. V. spicis terminalibus, foliis glabris lanceolatis inciso-pinnatifidis. *Act. hort. Kew. 1. p. 19.*
- spicata. 7. V. spica terminali, foliis oppositis crenatis obtusis, caule ascendente simplicissimo. *Flor. dan. t. 52.*
- hybrida. 8. V. spicis terminalibus, foliis oppositis obtuse ferratis scabris, caule erecto. *Raj. angl. 3. t. 11. f. 1.*
- pinnata. 9. V. spica terminali, foliis linearibus dentato pinnatis, caulibus prostratis. *Mant. p. 24. Laxmann Act. petrop. 1770. t. 29. f. 1.*
- officinalis. 10. V. spicis lateralibus pedunculatis, foliis oppositis, caule procumbente. *Fl. dan. t. 248. Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. t. 54. f. 7. β) Allion. spec. 1. t. 4. f. 3. Veronica repens.*
- laciniata. 48. V. racemo subspicato terminali, foliis pinnatifidis laciniatis. *Act. hort. Kew. 1. p. 19.*

** *Corymboso-racemosae.*

- aphylla. 11. V. corymbo terminali paucifloro, foliis radicalibus ovatis scapoque nudo hirsutis. *Seg. pl. veron. t. 3. f. 2.*

- camtscha- 12. *V. hirta*, racemo trifloro elongato laterali aphylo, foliis ovatis f. oblongis ferratis hirtis: pilis articulatis. *Suppl. p. 83.*
- bellidiodes. 13. *V. hirsuta*, racemo terminali subcorymbofo, caule ascendente simplicissimo, foliis obtusis oppositis crenatis. *Mant. p. 316. Hall. hist. stirp. Helv. t. 15. f. 1.*
- fruticulo- 14. *V. corymbo terminali*, foliis lanceolatis obtusiusculis crenatis, caulibus fruticulosus. *Mant. p. 316. Fl. dan. p. 342.*
- carnea. 49. *V. corymbo terminali*, caulibus procumbentibus, foliis lanceolatis, calicibus hirsutis. *Hall. hist. stirp. Helv. t. 1.*
- pumila. 50. *V. corymbo terminali*, caule simplici, foliis ovatis acutis dentatis. *Allion fl. pedem. t. 22. f. 5.*
- alpina. 15. *V. corymbo terminali*, foliis oppositis, calicibus hispidis. *Fl. dan. t. 16.*
- saxatilis. 16. *V. racemo terminali subcorymbofo*, foliis oppositis subovatis crenulatis glabriusculis, pedunculis folia floralia superantibus, caulibus calicibusque tomentosis. *Suppl. p. 83. Flor. dan. t. 342.*
 β) *Scop. ann. hist. nat. 2. p. 42?* Veronica frutescens.
- tenella. 51. *V. caule repente*, foliis laevibus crenulatis, racemis brevibus confertis erectis. *Allion. flor. pedem. t. 22. f. 1.*
- serpyllifolia. 17. *V. racemo terminali subspicato*, foliis ovatis glabris crenatis. *Fl. dan. t. 492.*
- catarractae. 42. *V. racemis terminalibus flexuosis*, caule suffruticoso, foliis lanceolatis ferratis. *Forst. fl. austr. p. 3.*
- elliptica. 43. *V. racemis lateralibus*, caule fruticoso, foliis ellipticis integerrimis. *Forst. fl. austr. p. 3.*
- falicifolia. 44. *V. racemis lateralibus nutantibus*, caule fruticoso, foliis longo-lanceolatis integerrimis. *Forst. fl. austr. p. 3.*
- Baccabunga. 18. *V. racemis lateralibus foliis ovatis planis*, caule repente. *Fl. dan. t. 511.*
- Anagallis. 19. *V. racemis lateralibus*, foliis lanceolatis ferratis, caule erecto. *Rivin. t. 100.*
- scutellata. 20. *V. racemis lateralibus laxis divaricatis alternis: pedicellis pendulis*, foliis linearibus integerrimis. *Fl. dan. t. 209.*
- Teucrium. 21. *V. racemis lateralibus longissimis*, foliis ovatis rugosis dentatis obtusiusculis, caulibus procumbentibus. *Rivin. t. 95. Plenck pl. med. t. 13.*

- pilosa. 22. V. racemis subspicatis, foliis ovatis obtusis plicatis, caule prostrato piloso. *Spec. pl.* 1663.
 prostrata. 23. V. racemis lateralibus, foliis oblongo-ovatis ferratis, caulibus prostratis. *Moench fl. Hass. I. t. I.*
 pectinata. 24. V. racemis lateralibus foliatis, foliis oblongis pectinato-ferratis, caulibus prostratis. *Mant. p. 24. Buxb. cent. I. t. 39.*
 montana. 25. V. racemis lateralibus paucifloris, calicibus hirsutis, foliis ovatis rugosis crenatis petiolatis, caule debili. *Suppl. p. 83. Jacquin fl. austr. 2. t. 109.*
 Chamaedrys. 26. V. racemis lateribus, foliis ovatis sessilibus rugosis dentatis, caule bifariam piloso. *Fl. dan. t. 448.*
 austriaca. 27. V. racemis lateribus, foliis lineari-lanceolatis pinnato-dentatis. *Morif. hist. pl. 2. t. 23. f. 17.*
 multifida. 28. V. racemis lateribus foliis multipartitis laciniatis, caulibus erectis. *Jacq. fl. austr. 4. t. 329.*
 urticaefolia. 29. V. racemis lateribus, foliis ovato-lanceolatis hirtis argute ferratis, caule erecto. *Suppl. p. 83. Jacq. fl. austr. t. 59.*
 latifolia. 30. V. racemis lateralibus, foliis cordatis rugosis dentatis, caule stricto. *Jacq. fl. austr. I. t. 60. Veronica Pseudochamaedrys.*
 paniculata. 31. V. racemis lateralibus longissimis, foliis lanceolatis ternis ferratis, caule ascendente. *Calic. 4 fidi.*
- *** *Pedunculis unifloris.*
- biloba. 32. V. racemis lateralibus, foliis oblongis dentatis, capsulis bipartitis. *Buxb. cent. I. t. 36.*
 decussata. 33. V. floribus racemosis axillaribus, foliis ovalibus decussatis integerrimis. *Moench Weissenstein p. 137.*
 agrestis. 34. V. floribus solitariis, foliis cordatis petiolatis pedunculo brevioribus. *It. dan. t. 449.*
 arvensis. 35. V. floribus solitariis, foliis cordatis sessilibus pedunculo longioribus. *Fl. dan. t. 515.*
 hederacfolia. 36. V. floribus solitariis, foliis cordatis planis quinquelobis. *Fl. dan. t. 423.*
 Lappago. 45. V. floribus solitariis, foliis subcuneiformibus 3-5angulis: angulis obtusis. *Schranck baierisch. Flor. I. p. 218.*
 triphyllos. 37. V. floribus solitariis, foliis digitato-partitis, pedunculis calice longioribus. *Fl. dan. t. 627.*

- caule verna. 38. V. floribus solitariis, foliis digitato-partitis, pedunculis calice brevioribus. *Fl. dan. t. 252.*
- cau- succulenta. 52. V. caule erecto, foliis succulentis: caulinis pinnato-dentatis; floralibus integerrimis. *Allion flor. ped. t. 22. f. 4.*
- nato- romana. 39. V. floribus solitariis subsessilibus, foliis oblongis subtus dentatis, caule erecto. *Mant p. 317.*
- nt. I. carolini- 46. V. floribus solitariis subsessilibus foliis oblongis subincisis: enfis. caulinis obtusis oppositis, caule suberecto. *Walt. flor. carol. p. 61.*
- , fo- acinifolia. 40. V. floribus solitariis pedunculatis, foliis ovatis glabris cre- suppl. natis, caule erecto subpiloso. *Bocon. mus. 2. t. 102.*
- enta- peregrina. 41. V. floribus solitariis sessilibus, foliis lanceolato-linearibus den- glabris obtusis integerrimis, caule erecto. *Fl. dan. t. 407.*
- cauli- marilandica. 42. V. floribus solitariis sessilibus, foliis linearibus, caulibus diffusis. *Murr. comm. Goett. 1782. t. 3.*
- egute numularia. 53. V. floribus solitariis subsessilibus, foliis suborbiculatis in- t. 59. tegerrimis, caule prostrato-fruticoso. *Gouan. illustr. t. 1. f. 2.*
- caule Bellardi. 54. V. hirsuta, caule erecto simplici, foliis linearibus fructu drys. subsessili: brevioribus. *Allion. flor. pedem. t. 85. f. 1.*
- ternis

26. PAEDEROTA. Cor. 4fida. Cal. 5partitus. Caps. bilocularis.

- is bi- bonae 1. P. foliis pinnatis. *Pluckn. phyt. 320. f. 5.*
- ffatis Ageria. 2. P. foliis serratis: inferioribus alternis. *Mant. p. 171. Jacq. H. Vindob. 2. t. 121.*
- culo Bonarota. 3. P. foliis serratis oppositis. *Jacq. fl. austr. 5. app. t. 39.*
- culo caerulea. 4. P. corollarum labio superiore indiviso. *Suppl. p. 84.*
- lobis. lutea. 5. P. corollarum labio superiore bifido.
- gulis: minima. 6. P. foliis oblongis integris oppositis, floribus axillaribus op- ppositis, calicum dentibus intus hirsutis. *Koenig apud Retz obs. bot. 5. p. 10.*
- culis

GLOBIFERA. *Cor.* tubulosa, 4fida, inaequalis.
Cal. 4partitus, inaequalis, per-
 sistens. *Anth.* globosae.
Capsf. globosa,ilocularis, 4valvis,
 polysperma.

Umbros. I. GLOBIFERA. *Walt. flor. carol. p. 63.*

27. JUSTICIA. *Cor.* ringens. *Capsf.* 2locularis: femi-
 num retinaculis 2valvis: valvis
 longitudinalibus unciculatis.
Stamina anthera solitaria.

* *fruticosae.*

- Adhaeto- 1. *J. arborea*, foliis lanceolato-ovatis, bracteis ovatis persistentibus, corollarum galeo concava. *Pluckn. alm. 9. t. 173. f. 3.*
- Ecbolium. 2. *J. fruticosa* foliis lanceolato-ovatis, spicis tetragonis, bracteis ovatis ciliatis, corollarum galea reflexa. *Burm. fl. zeyl. t. 4. f. 1.*
- pulcherri- 3. *J. fruticosa*, foliis ovatis utrinque acuminatis petiolatis, spicis terminalibus tetragonis erectis: bracteis ovatis. *Suppl. p. 84. Jacq. stirp. amer. pict. t. 259. f. 1. coll. 3. p. 252.*
- Betonica. 4. *J. fruticosa*, foliis lanceolato-ovatis, bracteis ovatis acuminatis venoso reticulatis coloratis. *Rheed. hort. malab. 2. t. 21.*
- scorpioi- 5. *J. fruticosa*, foliis lanceolato-ovatis hirsutis sessilibus, spicis recurvatis.
- picta. 6. *J. fruticosa*, foliis lanceolato-ovatis pictis, corollis fauce inflatis. *Rumpf amb. 4. t. 30. Caul. striat. Fol. mac. med. lucida.*
- infundi- 7. *J. fruticosa* foliis lanceolato-ovatis quaternis, bracteis lan-
 buliformis. *Rheed. h. mal. 9. t. 62.*
- spinosa. 8. *J. fruticosa*, spinis axillaribus, pedunculis lateralibus. *Sp. pl. p. 1663. Jacq. stirp. amer. pict. t. 2.*
 β) *Forsk. fl. aeg. arab. p. 6. Justicia bispinosa.*
 γ) *Forsk. fl. aeg. arab. p. 6. Justicia appressa.*
- trispino- 9. *J. foliis lanceolato-ovatis, spicis terminalibus imbricatis,*
 ia. *galea brevi. Forsk. fl. aeg. arab. p. 6.*

10. *J.*

- lanceata. 10. J. foliis inermibus; spinis stipularibus bracteisque margine spinosis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 6.*
 fastuosa. 11. J. fruticosa, foliis ellipticis, thyrsis terminalibus. *Mant. p. 172. Pluckn. phyt. 193. f. 3.*
 orchioi- 12. J. fruticosa, foliis ovatis sessilibus, floribus axillaribus solitariis pedunculatis. *Suppl. p. 85.*
 des.
 Gandarus- 13. J. fruticosa glabra, foliis lanceolatis elongatis, spicis verticillatis. *Suppl. p. 85.*
 fa.
 hyssopifo- 14. J. fruticosa, foliis lanceolatis integerrimis; pedunculis trifloris ancipitibus; bracteis calice brevioribus. *Mill. dict. ic. 13.*
 lia.
 bracteola- 45. J. fruticosa glabra, ramis junioribus tetragonis tuberculatis, foliis lanceolatis subintegerrimis, racemo terminali erecto. *Jacq. collect. 3. p. 253.*
 ta.
 tranque- 15. J. suffruticosa, caule tereti, foliis orbiculatis, spicis terminalibus, floribus solitariis, bracteis obcordatis. *Suppl. p. 85.*
 barenfis.
 verticilla- 16. J. villosa, foliis ovatis integris, floribus axillaribus verticillatis integris. *Suppl. p. 85.*
 ris.
 caerulea. 17. J. foliis ovato-oblongis ciliatis, floribus ternis verticillatis sessilibus. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 5.*
 nitida. 36. J. foliis ellipticis acuminatis, racemis spicaeformibus verticillatis: bracteis minutis, pedicellis calicibusque glabris. *Swartz nov. pl. gen. p. 13.*
 armata. 37. J. aculeata, foliis oblongis emarginatis coriaceis nitidis. *Swartz n. pl. gen. et sp. p. 13.*
 acicularis. 38. J. diffusa spinosa: spinis setaceis, floribus pedunculatis axillaribus solitariis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 13.*
 repanda. 39. J. foliis ovatis repandis, pedunculis axillaribus trifidis. *Forst. fl. austr. p. 3.*
 longifolia. 41. J. suffruticosa, foliis linearibus sinuatis, pedunculis axillaribus trifidis. *Forst. fl. austr. p. 4.*
 variegata. 40. J. foliis ovatis integerrimis, spicis terminalibus verticillatis: verticillis quadrifloris. *Aublet pl. guj. 1. p. 12. t. 4.*
 45. J.

An distincta species Juslicia Forskæhlii foetida, odorem quippe alliaceum spirans?

maduren- 45. J. foliis ovalibus obtusis dentatis, floribus axillaribus foli-
fis. *Burm. ind. t. 4. f. 3.*

** *herbaceae.*

acaulis. 18. J. acaulis. *Suppl. p. 84.*

ciliaris. 19. J. herbacea foliis lanceolatis, floribus oppositis sessilibus,
bracteis calicibusque setaceis hispidis flore longioribus.
Jacq. b. Vindob. 2. t. 104.

procum- 20. J. foliis lanceolatis integerrimis, spicis terminalibus late-
bens. ralibusque alternis, bracteis setaceis, caule procumbente.
Pluckn. alm. t. 56. f. 3. et t. 393. f. 4.

pectinata. 21. J. diffusa, spicis axillaribus sessilibus tomentosis secundis
dorlo imbricatis: bracteis semilanceolatis.

repens. 22. J. foliis ovatis subrenatis, spicis terminalibus: bracteis
lanceolatis, caule repente. *Burm. th. zeyl. t. 3. f. 2. Fol.
interdum lanceol. sessil.*

viridis. 23. J. foliis oblongis integris, spicis terminalibus imbricatis:
bracteis ovato-lanceolatis, galea lineari reflexa bidentata.
Forsk. fl. aeg. arab. p. 5.

triflora. 24. J. pedunculis axillaribus folio longioribus apice trifloris.
Forsk. fl. aeg. arab. p. 4.

sinensis. 25. J. foliis ovatis, floribus lateralibus, pedunculis trifloris
brevibus, bracteis ovalibus. *Burm. ind. 8. t. 4. f. 1.*

panicula- 26. J. paniculis axillaribus petiolo longioribus, foliis ovato-
ta. lanceolatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 4.*

echioides. 27. J. foliis lanceolato-linearibus obtusis sessilibus, racemis
adscendente-secundis: bracteis setaceis. *Herm. lugdb.
t. 669.*

sexangu- 28. J. foliis ovatis integerrimis, bracteis cuneiformibus, ramis
laris. sexangularibus. *Pluckn. alm. t. 279. f. 6. an eadem cum
echioide?*

carthagi- 29. J. foliis lanceolato-ovalibus, floribus spicatis, bracteis ob-
nenfis. longo-cuneatis. *Sp. pl. p. 1663. Jacq. stirp. amer. pict.
t. 7.*

affurgens. 30. J. foliis ovatis integerrimis, bracteis subulatis, ramis hexa-
gonis. *Brown. jam. t. 2. f. 1.*

nasuta. 31. J. foliis lanceolato-ovatis integerrimis, pedunculis dicto-
tomis. *Rheed. h. malab. 9. t. 69. Corollae carnae.*

- bivalvis. 32. J. foliis lanceolato-ovatis, pedunculis sexfloris: pedicellis lateralibus bifloris, bracteis ovatis parallelis. *Rheed. b. mal. 9. t. 43.*
- purpurea. 33. J. foliis ovatis utrinque mucronatis integerrimis glabris, caule geniculato, spicis secundis. *Rumpf amb. 6. t. 22. f. 1. Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. t. 54. f. 4. Caulis radicans.*
- gangetica. 34. J. foliis ovatis, racemis simplicibus longis, floribus alternis secundis, bracteis obsoletis. *Rheed. b. mal. 9. t. 56.*
- japonica. 35. J. foliis ovatis ferratis, spicis terminalibus: bracteis setaceis, caule patulo. *Thunb. fl. jap. p. 20.*
- parviflora. 42. J. diffusa, foliis ovatis integris, spicis secundis: bracteis lanceolatis; anterioribus alatis. *Koenig apud Retz. obs. bot. 5. p. 9.*
- nemorosa. 43. J. caule tetragono cretiusculo, foliis ovato-lanceolatis, spicis ovatis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 14.*
- coccinea. 44. J. foliis ovatis glabris integerrimis, spicis terminalibus verticillatis: floribus sessilibus. *Aubl. pl. guj. 1. p. 10. t. 3.*
- nutans. 46. J. foliis lanceolatis denticulatis, pedunculis terminalibus cernuis, bracteis setaceis. *Burm. ind. t. 5. f. 1.*
- moretiana. 47. J. foliis lanceolatis integerrimis, floribus axillaribus solitariis. *Rumpf amb. 6. t. 23.*

28. DIANTHERA. *Cor. ringens. Stamen utrumque antheris binis alternis. Caps. 2locularis, 2valvis, ungue elastico diffiliens.*

† *fruticosae.*

- sessilis. 1. D. fruticosa, floribus axillaribus sessilibus. *Syst. veget. ed. 14. p. 62. Justicia sessilis. Jacq. stirp. amer. pict. t. 3.*
- nitida. 21. D. foliis lanceolato-acuminatis, floribus subspicatis, bracteis setaceis, caule laevi. *Jacq. stirp. am. p. 4.*
- hirsuta. 22. D. foliis lanceolato-acuminatis, floribus subspicatis: bracteis setaceis, caule hirsuto. *Jacq. stirp. am. p. 4.*

* herbaceae.

- odora. 2. D. floribus axillaribus solitariis sessilibus. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 8.*
- trifulca. 3. D. floribus axillaribus solitariis pedunculatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 7.*
 β) *Retz. act. Stockb. 1775. 4. n. 2. Stamin. 4. an hujus generis?*
- japonica. 4. D. pedunculo axillari solitario subquadrifloro, bracteis oblongis ciliatis. *Thunb. fl. jap. p. 21.*
- martini- 5. D. foliis ovato-acuminatis, pedunculis trifloris, bracteis
 censis. ovatis calice longioribus. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 6.*
- eustachia- 6. D. foliis lanceolato-oblongis, pedunculis multifloris, bra-
 na. cteis linearibus apice latiusculis acuminatis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 5.*
- pectoralis. 7. D. caule ascendente, foliis lanceolato-linearibus, panícula
 dichotoma terminali. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 4.*
- panicula- 8. D. paniculis axillaribus oppositis dichotomis. *Forsk. fl.
 ta. aeg. arab. p. 7.*
- malabari- 9. D. floribus paniculatis: pedicellis bi-vel trifidis, floribus
 ca. bicaliculatis: lacinia dorsali majore. *Suppl. p. 85. Retz. act. Stockb. 1775. t. 9. Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 51. f. 8.*
- debilis. 10. D. spicis axillaribus imbricatis: bracteis late ovatis ciliatis
 quaternis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 9.*
- america- 11. D. spicis solitariis alternis. *Pluckn. alm. t. 423. f. 5.*
 na.
- comata. 12. D. spicis filiformibus verticillatis: inferioribus umbellatis.
Sloan. hist. jam. 1. t. 103. f. 2.
- verticilla- 13. D. floribus verticillatis: verticillis capitatis. *Forsk. fl.
 ta. aeg. arab. p. 9.*
- reptans. 14. D. caule repente, foliis obtusis, spica terminali indivisa.
Swartz n. pl. gen. et sp. p. 13.
- humifusa. 15. D. caule decumbente, foliis ovatis cordatisque, spicis um-
 bellatis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 14.*
- caerulea. 16. D. umbella fascicula sessili simplicissima. *Forst. pl. austr. p. 4.*
- clavata. 17. D. panícula subumbellata composita: pedunculis apice di-
 latatis. *Forst. fl. austr. p. 4.*

- ovata. 18. D. foliis subovatis, spicis solitariis alternis filiformibus, folio duplo longioribus. *Walt. flor. carol. p. 63.*
- eg. ensiformis. 19. D. foliis ensiformibus, spicis subcapitatis: pedunculo solitario elongato. *Walt. flor. carol. p. 63.*
- eg. hyssopifolia. 20. D. floribus terminalibus pedunculatis, foliis lanceolatis scabris. *Burm. ind. t. 5. f. 2.*

KYRTANDRA. *Nectarium* arculatum brevissimum.
Filamenta 4brevia, 2sterilia.
Stigma clavatum. *Bacca* 2locularis.

- biflora. 1. K. involucris bifloris. *Forster char. gen. pl. p. 3. t. 3.*
- cymosa. 2. K. pedunculis nudis. *Forster char. gen. pl. p. 3.*

GHINIA. *Cor.* 2labiata: labio inferiori 3partito. *Filament.* 4, quorum 2longiora; *anth.* loculi terminales in brevioribus filamentis steriles. *Drupa* turbinata, angulata: *Nux* 4-5locularis; loculis 1spermis.

Tamonea. I. GHINIA. *Aubl. pl. guj. 2. p. 660. t. 268.*

29. GRATIOLA. *Cor.* irregularis, resupinata. *Cal.* 5partitus: foliolis 2 exterioribus accessoriis. *Stam.* 2sterilia. *Caps.* 2locularis.

- officina- 1. Gr. foliis lanceolatis ferratis, floribus pedunculatis. *Fl. dan. t. 363.*
- vis. Monnic- 2. Gr. foliis ovali-oblongis, pedunculis unifloris, caule repente. *Jacq. obs. bot. 4. t. 1. Stamina singula 4antherifera.*
- um- rotundi- 3. Gr. foliis ovatis trinerviis. *Mant. p. 174. Rheed. h. mal. 9. t. 57.*
- p. 4. e di- hyssopioi- 4. Gr. foliis lanceolatis subserratis, articulo caulino ut plurimum brevioribus, capsulis ovatis. *Mant. p. 174. Pluckn. alm. t. 193. f. 1. Folia inferiora saepius ovata.*

- virginica. 5. Gr. foliis lanceolatis obtusis subdentatis. *Pluckn. alm. t. 193. f. 2. Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. t. 53. f. 11.*
- peruviana. 6. Gr. floribus subsessilibus. *Feuill. peruv. 3. t. 47.*
- lobeliodes. 7. Gr. caule subnudo stipulato, foliis oblongis integerrimis, panicula dichotoma, capsulis subglobosis. *Koenig apud Retz. obs. bot. fasc. 4. p. 7.*
- grandiflora. 8. Gr. caulibus decumbentibus, foliis ovatis ferratis, pedunculis oppositis, capsulis subulatis. *Koenig apud Retz. obs. bot. 4. p. 8.*
- veronicifolia. 9. Gr. caule repente, foliis ovato-lanceolatis acute ferratis, floribus terminalibus oppositis. *Koenig apud Retz. obs. bot. 4. p. 8.*
- oppositifolia. 10. Gr. caule ascendente, foliis lanceolatis ferratis, pedunculis oppositifoliis. *Koenig apud Retz. obs. bot. 4. p. 8.*
- repens. 11. Gr. foliis ovatis, caule repente, calice pentaphyllo, stilo bifido. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 14.*
- ramosa. 12. Gr. caule subramoso, foliis oppositis ternisque acuminatis subdentatis, pedunculis alternis; calicibus aequalibus. *Walt. flor. carol. p. 61.*
- acuminata. 13. Gr. foliis ovato-lanceolatis ferratis, pedunculis unifloris solitariis axillaribus folio longioribus, corollis subaequalibus. *Walt. flor. carol. p. 61.*
- inaequalis. 14. Gr. foliis oblongis obtusis subdentatis, floribus pedicellatis: galea suberecta. *Walt. flor. carol. p. 61.*

1233. SCHWENKIA. Cor. subaequalis: fauce plicata glandulosa. *Stam.* 3 sterilia. *Caps.* 2locularis polysperma.

americana. I. SCHWENKIA. *Schwenk. hort. med. Hag. 1766. t. 1. Brownallii affinis.*

BAEA. Cor. ringens: galea globa; labio 2partito. *Cal.* 5partitus. *Stamina* filamentis crassis arcuatis, antheris conniventibus. *Caps.* corniculata, contorta, 4valvis.

indica. I. BAEA. *Jussieu gen. plant. p. 121.*

1288. CALCEOLARIA. *Cor.* ringens, inflata. *Cal.*
4partitus, aequalis. *Capsf.* 2locularis, 2-
valvis, polysperma.

- pinnata. 1. *C.* foliis pinnatis. *Mant. p. 171. act. Stockb. 1770. t. 8.*
Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. t. 62. f. 4.
- integrifolia. 2. *C.* foliis ovatis indivisis ferratis caule ramoso. *Mat. amer.*
1. t. 2. Smith. plant. ic. ined. 1. t. 3?
- nana. 3. *C.* foliis ovatis integerrimis, scapis unifloris. *Smith plant.*
ic. ined. 1. t. 1.
- plantaginea. 4. *C.* foliis rhombeis ferratis, scapis paucifloris. *Smith. pl.*
ic. ined. 1. t. 2.
- Fothergillii. 5. *C.* foliis spatulatis integerrimis, pedunculis scapiformibus
unifloris. *Ait. hort. kew. 1. p. 30. t. 1.*
- perfoliata. 6. *C.* foliis perfoliatis spatulato-fagittatis. *Mutis amer. 1. t. 3.*

30. PINGUICULA. *Cor.* ringens calcarata. *Cal.*
2labiatus, 5fidus: *Capsf.*
1locularis.

- lusitanica. 1. *P.* nectario apice incrassato.
- vulgaris. 2. *P.* nectario cylindrico longitudine petali. *Fl. dan. t. 93.*
- alpina. 3. *P.* nectario conico petalo brevior. *Fl. dan. t. 453.*
- caerulea. 4. *P.* corollae tubo ventricoso. *Walt. flor. carol. p. 63.*
- lutea. 5. *P.* corolla campanulata. *Walt. flor. carol. p. 63.*
- villosa. 6. *P.* scapo subvillosa. *Fl. lapp. t. 12. f. 2. vulgari omnibus*
partibus sextuplo minor.

31. UTRICULARIA. *Cor.* ringens, calcarata. *Cal.*
2phyllus, aequalis. *Capsf.*
1locularis.

- alpina. 1. *U.* nectario subulato, foliis ovatis integerrimis. *Jacq. stirp.*
amer. pict. t. 8.
- foliosa. 2. *U.* nectario conico, fructibus cernuis, radicibus utriculo
destitutis. *Plum. spec. 6. ic. 165. f. 2.*

- vulgaris. 3. U. nectario conico, scapo paucifloro. *Fl. dan. t. 138.*
 inflata. 4. U. nectario obtuso, scapo sexfloro foliis inflatis. *Walt. flor. carol. p. 64.*
 fibrosa. 5. U. nectario obtuso, scapo bifloro, [foliis fibrosis. *Walt. flor. carol. p. 64.*
 pumila. 6. U. scapo subtrifloro, floribus parvis luteis, foliis fibrosis. *Walt. flor. carol. p. 64.*
 purpurea. 7. U. scapo subtrifloro, floribus parvis purpureis, foliis fibrosis. *Walt. flor. carol. p. 64.*
 minor. 8. U. nectario carinato. *Fl. dan. t. 128.*
 subulata. 9. U. nectario subulato. *Fol. capillacea. Cor. alba.*
 gibba. 10. U. nectario gibboso.
 bifida. 11. U. scapo nudo bifido. *Osborn. it. t. 3. f. 2.*
 caerulea. 12. U. scapo nudo; squamis alternis vagis subulatis. *Rheed. h. malab. 9. t. 70.*
 stellaris. 13. U. verticillo utriculario bractearum ciliari. *Suppl. p. 86.*
 inflexa. 14. U. foliis dichotomis, pedunculo racemoso basi utriculis verticillato, nectariis inflexis truncatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 9.*
 obtusa. 15. U. nectario inflexo obtuso subemarginato. *Swartz. nov. pl. gen. et sp. p. 14.*

WULFENIA. *Cor. ringens ecalcarata femihians ad faucem barbata.*

carinthia- I. WULFENIA. *Jacq. miscell. austr. 2. p. 60. t. 8. f. 1.*
 ca.

FAGELIA. *Cor. retortaeformis. Cal. 4partitus, planus, persistens. Stam. brachiis incurvatis instructa. Caps. 4-5valvis, apice elastice dehiscens, polysperma.*

flavicans. I. FAGELIA. *Schwenck. act. Roterod. I. 1774. p. 473. t. 13.*

32. VERBENA. Cor. infundibuliformis subaequalis. Cal. dente truncato. Semina 2-4nuda: cortice dorfi crassiore.

* Diandrae.

- orubica. 1. V. spicis longissimis foliosis. *Ebret ic. pl. sel. t. 5. f. 1.*
 indica. 2. V. spicis longissimis carnosis nudis, foliis lanceolato-ovatis oblique dentatis, caule laevi. *Jacq. obs. bot. 4. t. 86.*
 jamaicensis. 3. V. spicis longissimis carnosis nudis, foliis spatulato-ovatis ferratis, caule hirto. *Jacq. obs. bot. 4. t. 85. In hac et indica receptaculum induratione lignosum.*
 mutabilis. 4. V. spicis longissimis carnosis aphyllis foliis ovatis acutis subtus tomentosis decurrentibus, caule fruticoso tomentoso. *Jacq. coll. 2. p. 334.*
 prismatica. 5. V. spicis laxis, calicibus alternis prismaticis truncatis aristatis, foliis ovatis obtusis. *Jacq. pl. rar. ic. cent. 2. fasc. 2. t. 26.*
 mexicana. 10. V. spicis laxis, calicibus fructus reflexis rotundato-didymis hispidis. *Dill. b. Elth. t. 302. f. 389. Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. t. 56. f. 1; in hac et nodiflora calix induratus includit pericarpium, nonne distincti generis?*
 curassavica. 6. V. spicis longis, calicibus aristatis, foliis ovatis ferratis; an ad *Tamonea amandanda?*
 stoechadi-folia. 7. V. spicis ovatis, foliis lanceolatis ferrato-plicatis, caule fruticoso. *Plum. spec. 6. ic. 162. f. 1.*

** tetrandrae.

- lappulacea. 8. V. calicibus subrotundis erectiusculis, feminibus echinatis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 9.*
 Aubletia. 9. V. spicis solitariis, corollis fasciculatis, foliis cordatis inciso ferratis. *Jacq. b. Vind. 2. t. 176. Syst. veg. ed. 13. p. 478. Buchnera canadensis.*
 nodiflora. 11. V. spicis capitato-conicis foliis ferratis, caule repente. *Burm. ind. t. 6. f. 2. Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. t. 56. f. 1.*
 bonariensis. 12. V. spicis fasciculatis, foliis lanceolatis amplexicaulis. *Dill. b. Elth. t. 300. f. 387. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 66. f. 1.*

- hastata*. 13. *V. spicis longis acuminatis, foliis hastatis. Herm. parad. t. 242.*
caroliniana. 14. *V. spicis filiformibus, foliis indivisis lanceolatis ferratis obtusiusculis subfessilibus. Dill. b. Elth. t. 301. f. 388.*
urticifolia. 15. *V. spicis filiformibus paniculatis, foliis indivisis ovatis serratis acutis petiolatis. Sabb. b. rom. 3. t. 55.*
spuria. 16. *V. spicis filiformibus, foliis multifido-laciniatis, caulibus numerosis.*
officinalis. 17. *V. spicis filiformibus paniculatis, foliis multifido-laciniatis, caule solitario. Fl. dan. t. 628.*
supina. 18. *V. spicis filiformibus solitariis, foliis bipinnatifidis. Kniph. bot. orig. cent. 12. n. 99.*
procumbens. 19. *V. spicis filiformibus, foliis multifido-laciniatis, caule procumbente. Forsk. fl. aeg. arab. p. 10. n. 27. an distincta vere ab officinali species?*
triphylla. 21. *V. floribus paniculatis, foliis ternis, caule fruticoso. Herit. stirp. nov. 2. p. 21. t. 11.*
globiflora. 20. *V. floribus capitatis, caule fruticoso. Herit. stirp. nov. 2. p. 23. t. 12.*

† *incertae tribus.*

- capitata*. 22. *V. foliis ferratis, floribus capitato-globosis, calice glutato. Forsk. fl. aeg. arab. p. 10. an eadem cum nodiflora?*

23. **LYCOPUS.** *Cor. 4fida: lacinia unica emarginata. Stamina distantia. Semina 4retusa.*

- europaeus*. 1. *L. foliis sinuato-ferratis. Sabb. b. rom. 3. t. 53.*
virginicus. 2. *L. foliis aequaliter ferratis.*
exaltatus. 3. *L. foliis basi pinnatifido-ferratis.*

34. AMETHYSTEA. Cor. 5fida: lacinia infima
 patentiore. Stam. ap-
 proximata. Cal. sub-
 campanulatus. Sem.
 4gibba.

caerulea. 1. AMETHYSTEA. *Haller. comm. Goett. 1751. p. 209. t. 10.*
Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 66. f. 2.

35. CUNILA. Cor. ringens: labio superiore erecto
 plano. Filamenta castrata 2.
 Semina 4.

mariana. 1. C. foliis ovatis ferratis, corymbis terminalibus dichotomis.
Pluckn. mant. t. 344. f. 1.

putegioi- 2. C. foliis oblongis bidentatis, floribus verticillatis. *Fungh.*
 des. *pl. ic. cent. 1. 31.*

thymoi- 3. C. foliis ovalibus integerrimis, floribus verticillatis, caule
 des. tetragono. *Morif. hist. 3. t. 19. f. 6.*

capitata. 4. C. foliis ovatis, floribus terminalibus, umbella subrotunda.
Suppl. p. 87.

36. ZIZIPHORA. Cor. ringens: labio superiore re-
 flexo. Cal. teretiufculus. Sem.
 4ovata, mucilaginosi.

capitata. 1. Z. fasciculis terminalibus, foliis ovatis. *Mant. p. 317.*
Pluckn. alm. t. 164. f. 4. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5.
t. 66. f. 3.

hispanica. 2. Z. floribus racemoso-spicatis, bracteis obovatis nervosis
 acutis, foliis ovatis.

tenuior. 3. Z. floribus lateralibus, foliis lanceolatis. *Morif. hist. pl.*
3. t. 19. f. 3. 4.

acinoides. 4. Z. floribus lateralibus, foliis ovatis.

37. MONARDA. *Cor.* ringens: labio superiore lineari integro filamenta involvente. *Semina* 4.

- fistulosa. 1. *M.* capitulis terminalibus, caule obtusangulo. *Corn. canad.* t. 14. *Gaertn. de fr. et sem.* 1. cent. 5. t. 66. f. 6.
- didyma. 2. *M.* floribus capitatis subdidynamis, caule acutangulo. *Trew. tab. Ebrēt.* t. 36.
- rugosa. 3. *M.* foliis ovato-lanceolatis cordatis glabris rugosis. *Ait. hort. kew.* 1. p. 36.
- oblongata. 4. *M.* foliis oblongo-lanceolatis basi rotundato attenuatis villosis planis. *Ait. hort. kew.* 1. p. 36.
- clinopodia. 5. *M.* floribus capitatis, foliis laevissimis ferratis.
- punctata. 6. *M.* floribus verticillatis, corollis punctatis, bracteis coloratis. *Mant. p.* 317. *Morif. hist. pl.* 3. t. 8. f. 8.
- ciliata. 7. *M.* floribus verticillatis, corollis involucro longioribus. *Morif. hist. pl.* 3. t. 8. f. 6.

38. ROSMARINUS. *Cor.* inaequalis: labio superiore 2partito. *Filamenta* longa, curva, simplicia cum dente.

- officinalis. 1. *R.* foliis sessilibus. *Blackw. herbar.* t. 159. *Regnault bot.* t. 5.
- chilensis. 2. *R.* foliis petiolatis. *Molina hist. nat. Chil.* p. 134.

39. SALVIA. *Cor.* ringens. *Filamenta* transverse pedicello affixa. *Sem.* 4 saepe mucilaginosae.

- aegyptiaca. 1. *S.* foliis lanceolatis denticulatis, floribus pedunculatis. *Jacq. b. Vindob.* 2. t. 108.
- dentata. 61. *S.* foliis lineari-oblongis dentato-pinnatifidis, verticillis bifloris: calicis laciniis obtusis. *Ait. hort. Kew.* 1. p. 37.
- cretica. 2. *S.* foliis lanceolatis, calicibus diphyllis. *Pluckn. phyt.* t. 57. f. 1.

3. *S.*

- lyrata. 3. S. foliis radicalibus lyratis dentatis, corollarum galea brevissima. *Morif. hist. 3. t. 13. f. 27.*
 β) *Sp. pl. p. 832.* Horminum virginicum.
- officina- 4. S. foliis lanceolato-ovatis integris crenulatis, floribus interrupto-subverticillatis: calicum [dentibus aristatis. *Knorr. del. hort. 2. t. S. 14. Regnault bot. t. 6.*
 lis. β) *Mill. dict. 3.* Salvia auriculata.
- pomifera. 5. S. foliis lanceolato-ovatis integris crenulatis, floribus spicatis, calicibus obtusis. *Tournef. it. 1. p. 92. t. 92.*
- urticifolia. 6. S. foliis ovato-oblongis duplicato-ferratis, calicibus tridentatis: lacinia summa tridentata. *Morif. hist. pl. 3. t. 13. f. 31.*
- ferotina. 7. S. foliis cordatis ferratis mollibus, floribus racemoso-spicatis, corollis calicem vix excedentibus. *Mant. p. 25. Arduin. sp. 1. t. 1.*
- viridis. 8. S. foliis oblongis crenatis, corollarum galea semiorbiculata, calicibus fructiferis reflexis. *Jacq. plant. rar. fasc. 2. ic. 42.*
- viscosa. 9. S. foliis oblongis obtusis suberosis crenatis viscidis, floribus verticillatis, bracteis cordatis acutis. *Jacq. ic. rar. fasc. 1. t. 14.*
- Horminum. 10. S. foliis obtusis crenatis, bracteis summis sterilibus majoribus coloratis. *Gesn. fasc. 17. t. 11. f. 21. Plenck pl. med. t. 20.*
- sylvestris. 11. S. foliis cordato-lanceolatis undulatis biferratis maculatis acutis, bracteis coloratis flore brevioribus. *Jacq. fl. austr. t. 212.*
- nemorosa. 12. S. foliis cordato-lanceolatis ferratis planis, bracteis coloratis, flore longioribus corollae labio infimo reflexo.
- fyriaca. 13. S. foliis cordatis dentatis: inferioribus repandis, bracteis cordatis brevibus acutis, calicibus tomentosis. *Bauh. prodr. 114. t. 114.*
- haemato- 14. S. foliis cordato-ovatis rugosis tomentosis, calicibus hispides. radice tuberosa. *Barr. rar. pl. ic. t. 185.*
- austrica. 15. S. foliis cordato-ovatis crenatis ad oras incisus vel lobatis supra nudis, caule, calicibus bracteisque hirsutissimis. *Jacq. fl. austr. t. 112.*
- pratensis. 16. S. foliis cordato-oblongis crenatis: summis amplexi-caulibus, verticillis subnudis, corollis galea glutinosis. *Blackw. herb. t. 258.*

- indica. 17. *S. foliis cordatis : lateralibus lobatis , summis sessilibus, verticillis subnudis remotissimis. Mant. p. 318. Jacq. b. Vindob. t. 78.*
- dominica. 18. *S. foliis cordatis obtusis crenatis subtomentosis , corollis calice angustioribus.*
- verbena- 19. *S. foliis ferratis sinuatis laeviusculis , corollis calice angustioribus. Barr. ic. pl. rar. 208.*
- ca. 19. *S. foliis sinuatis angulatis crenato-dentatis , calicum dentibus spinosis : angulis margineque faucis ciliatis. Jacq. hort. Vindob. 3. t. 92.*
- nilotica. 20. *S. foliis sinuatis angulatis crenato-dentatis , calicum dentibus spinosis : angulis margineque faucis ciliatis. Jacq. hort. Vindob. 3. t. 92.*
- nubia. 21. *S. foliis lanceolato-ovatis duplicato crenatis , tubo corollae incurvato. Murray comm. Goett. 1778. t. 3.*
- clandestina. 22. *S. foliis ferratis pinnatifidis rugosissimis , spica obtusa , corollis calice angustioribus. Barr. ic. pl. rar. 220.*
- pyrenai- 23. *S. foliis obtusis crenatis , staminibus corolla duplo longioribus. Herm. parad. t. 187.*
- ca. 23. *S. foliis obtusis crenatis , staminibus corolla duplo longioribus. Herm. parad. t. 187.*
- difermas. 24. *S. foliis cordato-oblongis crenatis , staminibus corollam aequantibus. Ard. spec. 1. p. 9. t. 1.*
24. *S. foliis cordato-oblongis crenatis , staminibus corollam aequantibus. Ard. spec. 1. p. 9. t. 1.*
- rugosa. 62. *S. foliis cordatis oblongo-lanceolatis crenatis rugosis pilosiusculis , staminibus corolla brevioribus. Ait. hort. Kew. 1. p. 42.*
62. *S. foliis cordatis oblongo-lanceolatis crenatis rugosis pilosiusculis , staminibus corolla brevioribus. Ait. hort. Kew. 1. p. 42.*
- mexicana. 25. *S. calicis labio superiore integerrimo , stilo hirsuto , racemo verticillato , foliis ovatis utrinque acuminatis ferratis. Dill. b. Elth. t. 254. f. 330.*
25. *S. calicis labio superiore integerrimo , stilo hirsuto , racemo verticillato , foliis ovatis utrinque acuminatis ferratis. Dill. b. Elth. t. 254. f. 330.*
- hispanica. 26. *S. calicis labio superiore integerrimo , stilo barba unilaterali , spica imbricata cernua , foliis ovatis utrinque mucronatis. Ard. spec. 10. t. 2. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 66. f. 4.*
26. *S. calicis labio superiore integerrimo , stilo barba unilaterali , spica imbricata cernua , foliis ovatis utrinque mucronatis. Ard. spec. 10. t. 2. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 66. f. 4.*
- leonuroi- 27. *S. calicis labio superiore integerrimo , stilo bifariam barbato , floribus axillaribus interrupte verticillatis , foliis cordato-ovatis crenatis , caule frutescente. Gloxin obs. bot. p. 15. t. 2. Herit. stirp. nov. 3. p. 41. t. 21.*
- des. 27. *S. calicis labio superiore integerrimo , stilo bifariam barbato , floribus axillaribus interrupte verticillatis , foliis cordato-ovatis crenatis , caule frutescente. Gloxin obs. bot. p. 15. t. 2. Herit. stirp. nov. 3. p. 41. t. 21.*
- verticilla- 28. *S. foliis cordatis crenato-dentatis , verticillis subnudis , stilo corollae labio inferiori incumbente. Kniph. bot. orig. 6. t. 79.*
- ta. 28. *S. foliis cordatis crenato-dentatis , verticillis subnudis , stilo corollae labio inferiori incumbente. Kniph. bot. orig. 6. t. 79.*
- napifolia. 29. *S. foliis cordatis crenato-dentatis , verticillis subnudis , corollae labio superiori cordato-emarginato. Jacq. b. Vindob. t. 152.*
29. *S. foliis cordatis crenato-dentatis , verticillis subnudis , corollae labio superiori cordato-emarginato. Jacq. b. Vindob. t. 152.*

- virgata. 30. S. foliis cordatis crenatis erosis rugosis, verticillis in ramis virgatis longissimis. *Jacquin b. Vindob. t. 37.*
- glutinosa. 31. S. foliis cordato sagittatis ferratis acutis. *Mant. p. 319. Sabb. h. rom. 3. t. 21.*
- canariensis. 32. S. foliis hastato-triangularibus oblongis crenatis obtusis. *Mant. p. 319. Morif. hist. 3. t. 13. f. 17.*
- africana. 33. S. foliis subrotundis ferratis: basi truncatis dentatis. *Commel. h. Amstel. 2. t. 91.*
- aurea. 34. S. foliis subrotundis integerrimis: basi truncatis dentatis. *Commel. h. Amstel. 2. t. 92.*
- colorata. 35. S. foliis ellipticis subintegerrimis tomentosis, calicis limbo membranaceo colorato.
- paniculata. 36. S. foliis obovato-cuneiformibus denticulatis nudis, caule frutescente. *Mant. p. 25. Maarburgh. ic. t. 3.*
- collinea. 37. S. foliis cordatis acutis ferratis subtus mollissime tomentosis, racemo terminali verticillato. *Suppl. p. 88. Murray comm. Goett. 1778. t. 1.*
- acetabulosa. 38. S. foliis obovatis dentatis, calicibus campanulatis patentibus pilosis, caule fruticuloso. *Mant. p. 25.*
- spinosa. 39. S. foliis oblongis spinosis, calicibus spinosis, bracteis cordatis mucronatis concavis. *Mant. p. 26. et 511. Morif. hist. pl. 3. t. 16. f. 2.*
- Sclarea. 40. S. foliis rugosis cordatis oblongis villosis, ferratis, bracteis coloratis calice longioribus concavis acuminatis. *Regnault bot. t. 8.*
- ceratophylla. 41. S. foliis rugosis pinnatifidis lanatis, verticillis summis sterilibus. *Morif. hist. pl. 3. t. 13. f. 6.*
- Aethiops. 42. S. foliis oblongis erosis lanatis, verticillis lanatis, corollae labio crenato, bracteis recurvatis subspinosis. *Jacq. fl. austr. t. 211.*
- pinnata. 43. S. foliis lyrato-pinnatis. *Boerb. ind. h. Lugdb. 1. tab. p. 167.*
- argentea. 44. S. foliis oblongis dentato-angulatis lanatis, verticillis summis sterilibus: bracteis concavis.
- ceratophylloides. 45. S. foliis pinnatifidis rugosis villosis, caule paniculato ramossissimo. *Mant. p. 26. Ard. spec. 2. t. 2.*
- Forskåhlii. 46. S. foliis lyrato-auriculatis, caule subaphyllo, corollae galea semibifida. *Mant. p. 26.*

- Merjama. 47. S. floribus verticillatis sessilibus, caule subnudo, foliis oblongis rugosis subcrenatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 10.*
- nutans. 48. S. foliis cordatis inaequaliter basi excisis, caule nudo, spicis ante florescentiam cernuis. *Murr. comm. Goett. 1751. t. 11.*
- abyssinica. 49. S. foliis cordato-ovatis rugosis erosis, bracteis integerrimis laevibus. *Suppl. p. 88. an distincta vere a nubia?*
- triloba. 50. S. tomentosa, foliis petiolatis rugosissimis trilobis: lobo intermedio producto oblongo; lateralibus ovatis obtusis. *Suppl. p. 88.*
- aurita. 51. S. villosa, foliis ovatis dentatis auriculatis, floribus verticillato-spicatis. *Suppl. p. 88.*
- scabra. 52. S. scabra, foliis lyratis dentatis rugosis, caule paniculato ramoso. *Suppl. p. 89.*
- runcinata. 53. S. scabra, foliis runcinato-pinnatifidis dentatis, floribus spicatis verticillatis. *Suppl. p. 89.*
- japonica. 54. S. foliis bipinnatis glabris. *Thunb. fl. jap. p. 22.*
- occidentalis. 55. S. foliis ovatis ferratis, spicis laxis: bracteis cordatis subtrifloris. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 14.*
- Pseudo-coccinea. 56. S. foliis ovatis acutis ferratis oppositis villosis, racemo terminali verticillato. *Jacq. coll. 2. p. 301. pl. var. ic. cent. 2. t. 27.*
- tenella. 57. S. foliis cordatis, caule filiformi repente, spicis adscendentibus. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 14.*
- Spielmanni. 58. S. caule ramisque verticillo terminatis: flore medio erecto, ceteris horizontaliter patentibus. *Scop. del. inf. 3. p. 31. t. 15.*
- rosaefolia. 60. S. foliis incanis pinnatis: pinnis ferratis, calicibus ringentibus. *Smith pl. ic. ined. 1. t. 5.*

40. COLLINSONIA. Cor. ringens labio inferiori multifido capillari. Sem. I. maturum saepius (vel potius caps. isperma.)

- praecox. I. C. glabra floribus lateralibus terminalibusque. *Hort. Cliff. t. 5. Planck pl. med. t. 24.*

scabriuscula. 2. C. caule foliisque subpilosis, floribus lateralibus terminalibusque. *Ait. hort. Kew. I. p. 47.*

ferotina. 3. C. panicula terminali ramosissima. *Walt. flor. carol. p. 65.*

41. MORINA. Cor. inaequalis. Cal. fructus 1 phyllus dentatus, floris bifidus. Sem. 1. sub calice floris.

perfica. 1. MORINA. *Tournef. it. 3. t. p. 132.*

SCIURIS. Cor. 2labiata. Cal. 5dentatus. Filamenta 5, quorum 3 sterilia. Caps. 5 coalitae, 2valves, 1loculares, 1spermae.

aromatica. 1. SCIURIS. *Aubl. pl. guj. 2. p. 670. t. 272.*

1287. GLOBBA. Cor. aequalis, trifida. Cal. superus, trifidus. Caps. 3locularis. Sem. plurima.

maranti- 1. Gl. spica terminali erecta. *Mant. p. 170.*
na.

nutans. 2. Gl. spica terminali pendula. *Mant. p. 170.*

uniformis. 3. Gl. spica laterali. *Rumpf amb. 6. t. 69. f. 2.*

japonica. 4. Gl. racemo terminali cernuo, foliis ensiformibus integris. *Thunb. fl. jap. p. 23.*

LITHOPHILA. Cal. 3phyllus. Cor. 3petala. Nectarium 2phyllum.

muscoides. 1. LITHOPHILA.

1353. THOUINIA. Cor. 4petala. Cal. 4partitus. Antherae sessiles.

nutans. 1. Th. foliis ellipticis, paniculis axillaribus, floribus nutantibus. *Suppl. p. 89. an Chionanthus zeylanica.*

ligustrina. 2. Th. foliis lanceolatis, paniculis terminalibus, floribus erectis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 15.*

PENTAGLOSSUM. *Cor.* 4-5petala, calicis labio inferta. *Cal.* 1 phyllus, infundibuliformis, 4-5gonus: dentibus 4-5 filiformibus. *Caps.* calici inclusa, cylindrica, 1ocularis, polysperma.

linifolium. **I.** PENTAGLOSSUM. *Fol. lanceolato-lineararia. Forsk. fl. aeg. arab. p. 11.*

1354. ANCISTRUM. *Cal.* 4aristatus: aristis terminatis glochidibus cruciatis. *Cor.* 4petala. *Stigma* penicillatum.

Sanguiforbae. **I.** A. capitulo globofo foliis subtus canis. *Suppl. p. 39. Forst. char. gen. pl. t. 2.*

latebrosum. **2.** A. floribus spicatis, foliis utrinque sericeis. *Retz. obs. bot. 5. p. 2. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 32. f. 5.*

ARUNA. *Cal.* 5partitus, reflexus, deciduus. *Cor.* 0. *Bacca* ovata, subcompressa, altero latere sulcata, 1ocularis, 1-2sperma.

gujanensis. **I.** ARUNA. *Aubl. pl. guj. 1. p. 16. t. 5.*

1009. ORCHIS. *Nectarium* cornu referens pone florem. *Cor.* ringens.

* *corollae galea calcarata.*

bicornis. **I.** O. corollarum galea bicalcarata, labio quinque partito. *Buxb. cent. 3. t. 6. Bulbi indivisi.*

carnea. **65.** O. corollae galea bicalcarata, bracteis erectis, bullis indivisis. *Ait. hort. Kew. 3. p. 294.*

biflora. **2.** O. corollarum galea unicalcarata, alis patentibus, labio lanceolato acuminato. *Bulbi indivisi.*

3. O.

- cornuta. 3. O. corollarum galea unicalcarata, alis patentibus, labio lanceolato acuminato. *Bulbi indivisi.*
- spatulata. 4. O. corollae galea calcarata, labio cordato longissime pedicellato. *Suppl. p. 398. Bulbi indivisi.*
- flexicaulis. 5. O. scapo flexuoso, corollae galea calcarata, petalis duobus lineatis furcatis. *Suppl. p. 398. Radix tuberosa.*
- tripetaloides. 6. O. foliis lanceolatis, corollae galea fornicata obtusa calcarata, nectario lanceolato minimo. *Suppl. p. 398.*
- sagittalis. 7. O. corollae galea calcarata biaurita, labio lanceolato. *Suppl. p. 399.*
- barbata. 8. O. corollae galea erecta calcarata, nectario subtrifido ciliato. *Suppl. p. 399. Bulbi indivisi.*
- draconis. 9. O. corollae galea calcarata, nectario lineari apice ovato. *Suppl. p. 400. Bulbi indivisi.*
- tenella. 10. O. corollae galea calcarata, basi conica, nectario lineari. *Suppl. p. 400.*
- calcarata. 62. O. nectarii labio septemcalcarato (?): cornu longissimo. *Walt. flor. carol. p. 220.*

** corollae galea ecalcarata.

† bulbis indivisis.

- Sufannae. 11. O. nectariis alis amplioribus ciliatis. *Rumpf amb. 5. t. 287. f. 2.*
- ciliaris. 12. O. nectarii labio lanceolato ciliato: cornu longissimo.
- bifolia. 13. O. nectarii labio lanceolato integerrimo, cornu longissimo, petalis patentibus. *Mant. p. 485. Fl. dan. t. 235.*
- Ornithis. 14. O. nectarii labio subrotundo, cornu germine duplo longiori, petalis tribus exterioribus conniventibus, reliquis patentissimis. *Jacq. fl. austr. 2. t. 138.*
- flexuosa. 15. O. nectarii labio imbricato, petalis duobus occultatis filiformibus, scapo flexuoso.
- lata. 63. O. nectarii labio integro lato revoluto, cornu sublongo tenui. *Walter flor. carol. p. 220.*
- ophioglossoides. 64. O. nectarii labio lanceolato integro, cornu brevi, floribus paniculatis. *Walt. flor. carol. p. 220.*

D 2

16. O.

Vix distincta videtur hujus generis species Orchis nigra, a Scopoli in alpibus tyrolensibus inventa, et ann. hist. nat. 2. p. 64. notata floribus suavescentibus ex atro rubris in spicam densam ovatam congestis dignoscenda.

- cucullata. 16. O. nectarii labio trifido, petalis confluentibus, caule nudo. *Gmel. fl. sib. 1. t. 3. f. 2.*
- globosa. 17. O. nectarii labio resupinato trifido: media emarginata, cornu brevi, petalis apice subulatis. *Mant. p. 484. Jacq. fl. austr. 3. t. 265.*
- pyramidalis. 18. O. nectarii labio bicorni trifido aequali integerrimo, cornu longo, petalis sublanccolatis. *Jacq. fl. austr. 3. t. 226.*
- coriophora. 19. O. nectarii labio trifido reflexo crenato, cornu brevi, petalis conniventibus. *Jacq. fl. austr. 2. t. 122.*
- cubitalis. 20. O. nectarii labio filiformi trifido: intermedia ovata, cornu germinibus brevior.
- Morio. 21. O. nectarii labio quadrifido crenulato, cornu obtuso ascendente, petalis obtusis conniventibus. *Fl. dan. t. 253.*
- mascula. 22. O. nectarii labio quadrilobo crenulato, cornu obtuso, petalis dorsalibus reflexis. *Flor. dan. t. 457.*
- ustulata. 23. O. nectarii labio quadrifido punctis scabro, cornu obtuso, petalis distinctis. *Mant. p. 485. Fl. dan. t. 103.*
- militaris. 24. O. nectarii labio quinquefido punctis scabro, cornu obtuso, petalis confluentibus. *Hall. hist. stirp. Helv. t. 28. 31.*
- fusca. 25. O. nectarii labio quadrifido: laciniis oblongis, cornu brevi, petalis confluentibus. *Jacq. fl. austr. 4. t. 307.*
- variegata. 26. O. nectarii labio breviter quadrifido: lacinia media dilatata dentata, petalis erectis, spica brevissima. *Jacq. pl. rar. ic. cent. 2. fasc. 1. t. 21. coll. 2. p. 267.*
- moravica. 27. O. nectarii labio trifido: lacinia media subrotunda emarginata amplissima, petalis erectis conniventibus. *Jacq. ic. plant. rar. t. 73.*
- papilionacea. 28. O. nectarii labio indiviso crenato emarginato ampliato, cornu subulato, petalis conniventibus.
- rubra. 29. O. nectarii labio indiviso crenulato integro rotundato, cornu subulato, petalis patulis. *Jacq. ic. pl. rar. t. 74.*
- pallens. 30. O. nectarii labio trifido integerrimo, cornu obtuso mediocri, petalis patentibus. *Jacq. fl. austr. 1. t. 45.*
- palustris. 31. O. nectarii labio trifido: laciniis lateralibus rotundatis; intermedia media emarginata petalis erectis. *Jacq. coll. 1. p. 75.*
- hispidula. 32. O. culmo aphylo, foliis reniformibus. *Suppl. p. 401.*

speciosa. 33. O. scapo folioso, foliis latis ovatis, labello quinquepartito: laciniis flexuosis. *Suppl. p. 401.*

longicornis. 60. O. nectarii labio trifido subcrenulato, cornu longo obtuso ascendente, petalis conniventibus. *Poir. voy. en Barb. 2. p. 247.*

elata. 61. O. nectarii labio obcordato denticulato, cornu longo pendulo. *Poir. voy. en Barb. 2. p. 248.*

†† *bulbis fibrosis.*

habenaria. 34. O. nectarii labio tripartito: lateralibus setaceis, cornu filiformi petalis decuplo longiore.

varia. 35. O. nectarii labio magno bilobe subrotundo. *Burm. amer. p. 178. t. 183. f. 2.*

††† *bulbis palmatis.*

latifolia. 36. O. bulbis subpalmatis rectis, nectarii cornu conico, labio trilobo; lateralibus reflexis, bracteis flore longioribus. *Fl. dan. t. 266.*

cruenta. 40. O. nectarii cornu germine brevior, labio indiviso subcordato crenato, petalis dorsalibus patulis. *Flor. dan. t. 876.*

sambucina. 37. O. bulbis subpalmatis erectis, nectarii cornu conico, labio ovato subtrilobo, bracteis longitudine florum. *Jacq. fl. austr. 2. t. 108.*

incarnata. 38. O. nectarii cornu conico, labio obscure trilobo ferrato, petalis dorsalibus reflexis. *Seg. pl. verm. t. 8. f. 5.*

maculata. 39. O. bulbis patentibus, nectarii cornu germinibus brevior, labio plano, petalis dorsalibus erectis. *Mant. 487. Reignaut bot. t. 353.*

odoratissima. 41. O. nectarii cornu recurvo brevior, labio trilobo, foliis linearibus. *Mant. p. 487. Jacq. fl. austr. 3. t. 264.*

conopsea. 42. O. nectarii cornu setaceo germinibus longior, labio trifido, petalis duobus patentissimis. *Fl. dan. t. 224.*

flava. 43. O. nectarii cornu filiformi longitudine germinis, labio trifido integerrimo.

suaveolens. 44. O. spica ovata, floribus semisupinatis, nectarii labio femiovato bidentato, foliis linearibus. *Villars. fl. delph. 2. p. 38. t. 1. f. 1.*

++++ *bulbis fasciculatis.*

- fufcescens. 45. O. nectarii cornu longitudine germinis, labio ovato basi dentato. *Gmel. fl. sib. 1. t. 4. f. 2.*
- strateumatica. 46. O. nectarii labio bilobo integerrimo, cornu longitudine germinis.
- hyperboorea. 47. O. nectarii cornu longitudine germinis, labio lineari integerrimo truncato. *Mant. p. 121. Retz. obs. bot. 4. t. 3.*
- fimbriata. 66. O. nectarii cornu germinibus longiori: labio tripartito ciliari, petalis patentibus, foliis oblongis. *Ait. hort. Kew. 3. p. 297.*
- abortiva. 48. O. bulbis filiformibus, nectarii labio ovato integerrimo, caule aphylo. *Jacq. fl. austr. 2. t. 193.*

+++++ *bulbo solitario indiviso.*

- monorhiza. 49. O. nectarii labio tripartito: lateralibus setaceis, cornu lineari compresso germinis longitudine. *Swartz nov. gen. pl. p. 118.*

++++++ *bulbo nondum cognito.*

- sancta. 50. O. nectarii labio lanceolato quinquedentato, cornu incurvo, petalis conniventibus.
- psycodes. 51. O. nectarii cornu setaceo longitudine germinis, labio tripartito ciliari.
- specabilis. 52. O. nectarii cornu longitudine germinis, labio ovali emarginato, caule aphylo, foliis ovalibus.
- filicornis. 53. O. corollae nectario bifido, cornu capillari. *Suppl. p. 400.*
- tipuloides. 54. O. nectarii labio tripartito lineari subaequali, cornu filiformi longissimo. *Suppl. p. 401.*
- japonica. 55. O. nectarii cornu recurvo, labio subulato integro. *Thunb. fl. jap. p. 26.*
- falcata. 56. O. cornu filiformi longissimo, foliis ensiformi-canaliculatis falcatis. *Thunb. fl. jap. p. 26.*
- aphylla. 57. O. foliis nullis floribus racemosis secundis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 156.*
- viridis. 58. O. scapo ramoso, floribus viridibus: nectarii labio intus papilloso. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 156.*

batrachites. 59. O. nectarii cornu brevissimo, labio trifido: intermedia brevissima, lateralibus longis linearibus, bracteis flore paulo longioribus. *Schranck bair. Reif. p. 86. Radin. dichotom. an distincta hujus generis species?*

1010. SATYRIUM. *Nectarium* scrotiforme f. inflato-didymum pone florem.

- hircinum. 1. S. bulbis indivisis, foliis lanceolatis, nectarii labio trifido: intermedia lineari obliqua praemorfa. *Jac. fl. austr. 4. t. 367.*
- triste. 2. S. bulbis indivisis, galea unicalcarata, labello integro. *Suppl. p. 402.*
- tabulare. 3. S. bulbis rotundis, caule folioso, labello trifido: lacinia media emarginata. *Suppl. p. 402.*
- giganteum. 4. S. bulbis rotundis, caule nudo, labello sagittato. *Suppl. p. 402.*
- aculeatum. 5. S. bulbis rotundis, caule folioso, labello integro inermi aculeato. *Suppl. p. 402.*
- viride. 6. S. bulbis palmatis, foliis oblongis obtusis, nectarii labio lineari trifido: intermedia obsoleta. *Flor. dan. t. 77.*
- nigrum. 7. S. bulbis palmatis, foliis linearibus, nectarii labio resupinato indiviso. *Mant. p. 488. Jacq. fl. austr. 4. t. 368.*
- albidum. 8. S. bulbis fasciculatis, foliis lanceolatis, nectarii labio trifido acuto: intermedia obtusa. *Flor. dan. t. 115.*
- Epipogonum. 9. S. bulbis compressis dentatis, caule vaginato, nectarii labio resupinato indiviso. *Jacq. fl. austr. 1. t. 84.*
- plantagineum. 10. S. bulbis filiformibus, caule glaberrimo, foliis ovatis petiolatis vaginantibus, nectarii cornu incrassato, labio bilobo medio acuminato. *Jacq. stirp. amer. pict. 2. t. 108.*
- repens. 11. S. bulbis fibrosis, foliis ovatis radicalibus, floribus secundis. *Jacq. fl. austr. 4. t. 369.*
- capense. 12. S. nectarii labio latiore obtuso emarginato utrinque undulato.
- hians. 13. S. corollae galea calcarata hiante, nectario ovato, foliis linearibus radicalibus. *Suppl. p. 401.*
- orobanchoides. 14. S. corollae galea posterior biloba subbicornuta, foliis bifariis. *Suppl. p. 402.*

- pedicella- 15. S. scapo subnudo, racemo pedicellis filiformibus laxis.
tum. *Suppl. p. 402.*
- hirtel- 16. S. bulbis filiformibus, caule hirsuto, foliis ovatis triner-
lum. viis petiolatis vaginantibus, nectario cornuto: labio trilobo.
Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 118.
- adnatum. 17. S. bulbis fasciculatis, foliis radicalibus oblongis: petiolis
longissimis, scapo vaginato, nectario cornuto adnato: la-
bio deflexo bilobo emarginato. *Swartz nov. pl. gen. et
sp. p. 118.*
- orchioi- 18. S. bulbis fasciculatis oblongis, foliis lato-lanceolatis, sca-
des. po vaginato, nectario cornuto: labio lanceolato acumi-
nato. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 118.*
- spirale. 19. S. bulbis fasciculatis oblongis, foliis linearibus, scapo va-
ginato, floribus spirali-secundis: labio trilobo; medio
majori crenulato. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 118.*
- elatum. 20. S. bulbis fasciculatis crassis tomentosis, foliis radicalibus
ovatis petiolatis, caule subnudo, nectario subtrilobo.
Plum. ic. 190.

ICOI. OPHRYS. *Nectarium* subtus subcarinatum.

* *bulbis ramosis.*

- Nidus 1. O. bulbis fibroso-fasciculatis, caule vaginato aphylo, ne-
avis. ctarii labio bifido. *Mant. p. 448. Fl. dan. t. 181.*
- Corallo- 2. O. bulbis ramosis flexuosis, caule vaginato aphylo, necta-
rhiza. rii labio trifido. *Flor. dan. t. 451.*
- spiralis. 3. O. bulbis aggregatis oblongis, caule subfoliofo, floribus
spirali-secundis: nectarii labio indiviso crenulato. *Flor.
dan. t. 387.*
- cernua. 4. O. bulbis fasciculatis, caule foliofo, floribus cernuis: ne-
ctarii labio oblongo integro acuto.
- squamata. 5. O. bulbis fasciculatis, scapo elongato aphylo subspicato,
foliis radicalibus imbricatis oblongis acutis carinatis, ne-
ctarii labio trifido barbato deflexo. *Forst. fl. austr. p. 59.
an hujus generis?*
- ovata. 6. O. bulbo fibroso, caule bifolio, foliis ovatis, nectarii labio
bifido. *Flor. dan. t. 137. Curt. flor. Lond. t. 177.*
- cordata. 7. O. bulbo fibroso, caule bifolio, foliis cordatis. *Haller hist.
stirp. Helv. t. 22. f. 4.*

- catholica. 8. O. bulbis fibrosis, floribus tripetalis: galea ventricosa magna, labio cruciata, scapo folioso. *Buxb. cent. 3. t. 21.*
- peruviana. 10. O. bulbis filiformibus, foliis caulinis ovatis petiolatis vaginatis, nectarii labio integro. *Burm. amer. p. 178. t. 183. f. 1.*
- gujanensis. 11. O. bulbis filiformibus, petalis ternis majoribus reniformibus bilobis undatis. *Burm. amer. p. 177. t. 182. f. 2.*
- trifolia. 34. O. bulbis fasciculatis, foliis radicalibus ovatis, nectarii labio integro lato subtriangulari. *Walt. flor. carol. p. 221.*
- fimbriata. 35. O. bulbis fibrosis, caule folioso, nectarii labio indiviso fimbriato. *Walt. flor. carol. p. 221.*

** bulbis indivisis.

- lilifolia. 12. O. bulbo subrotundo, scapo nudo, foliis lanceolatis, nectarii labio integro, petalis dorsalibus linearibus. *Ehretz act. angl. 1764. t. 4.*
- Loefelii. 13. O. bulbo subrotundo, scapo nudo trigono, nectarii labio ovato. *Loef. fl. pruss. t. 58.*
- paludosa. 14. O. bulbo subrotundo, scapo subnudo pentagono, foliis apice scabris, nectarii labio integro. *Flor. dan. 877.*
- monophyllos. 15. O. bulbo rotundo, scapo nudo, folio ovato, nectario integro. *Hall. hist. stirp. Helv. t. 36.*
- alata. 16. O. bulbis rotundis, caule folioso, foliis lanceolatis, labello trifido: lacinia media brevissima. *Suppl. p. 404.*
- myodes. 17. O. bulbis subrotundis, scapo folioso, nectarii labio oblongo quadripartito: laciniis duabus mediis elongatis lanceolatis. *Jacq. ic. rar. t. 71. β) Curt. flor. Lond. t. 13.*
- arachnites. 18. O. bulbis subrotundis, scapo folioso, nectarii labio lato emarginato appendiculato. *Hall. hist. stirp. Helv. t. 24.*
- Monorchis. 19. O. bulbo globoso, scapo nudo, nectarii labio trifido cruciata. *Flor. dan. t. 102.*
- anthropophora. 20. O. bulbis subrotundis, scapo folioso, nectarii labio lineari tripartito, medio elongato bifido. *Hall. hist. stirp. Helv. t. 23.*
- crucigera. 21. O. bulbis subrotundis, scapo folioso, nectarii labio indiviso convexo cruce insignito. *Jacq. ic. pl. rar. t. 72.*
- Volucris. 22. O. bulbis subrotundis, labro triangulari sagittato. *Suppl. p. 403.*

- bracteata. 23. O. bulbis subrotundis, spica bracteis longioribus mixta, labio trilobo. *Suppl. p. 403.*
- unifolia. 24. O. bulbo ovato, scapo tereti vaginato, folio tereti fistuloso reflexo, medio pertuso. *Forst. fl. austr. p. 59.*
- alpina. 25. O. bulbis ovatis, scapo nudo, foliis subulatis, nectarii labio indiviso obtuso utrinque unidentato. *Flor. dan. t. 452.*
- circumflexa. 26. O. floribus tripetalis: alis emarginatis, labio trifido; lateralibus circumflexis. *Buxb. cent. 3. t. 13.*
- barbata. 36. O. petalis ovatis, nectarii labio indiviso: apice dilatato truncato, supra ad medium barba colorata. *Walt. flor. carol. p. 221.*

*** *bulbis incognitis.*

- camtschatea. 27. O. scapo filiformi vaginato, racemo laxo, nectarii labio lineari bifido. *Amoen. acad. t. 4. f. 24.*
- atrata. 28. O. florum cucullo staminifero bicorni. *Mant. p. 121.*
- castra. 29. O. nectarii labio reniformi latissimo emarginato.
- bivalvata. 30. O. floribus fasciculatis, labio lanceolato. *Suppl. p. 403.*
- alaris. 31. O. nectarii labio integro undato. *Suppl. p. 404.*
- patens. 32. O. foliis subulatis, nectarii labio brevissimo capillari. *Suppl. p. 404.*
- nervosa. 33. O. scapo nudo angulato, foliis ovatis nervosis, nectarii labio integro reflexo. *Thunb. fl. jap. p. 27.*

MALAXIS. *Nectarium* iphyllum, concavum, cordatum, posterius acuminatum, anterius 2fidum, *genitalia* in medio fovens.

- spicata. 1. M. scapo quadrangulari, floribus spicatis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 119.*
- umbelliflora. 2. M. scapo quinquangulari, floribus umbellatis. *Swartz nov. pl. gen. et spec. p. 119.*

1012. SERAPIAS. Cor. patens 6petala. Nectarium ovatum gibbum: labio ovato. Caps. infera,ilocularis, 3valvis, fenestrata.

* *bulbis fibrosis.*

- latifolia. 1. S. foliis ovatis amplexicaulibus, floribus pendulis. *Fl. dan. t. 811.*
- longifolia. 2. S. foliis ensiformibus sessilibus, floribus pendulis. *Hall. stirp. Helv. hist. t. 39.*
- ensifolia. 3. S. foliis ensiformibus distichis, bracteis minutissimis, floribus erectis: nectarii labio obtuso, petalis brevioribus. *Suppl. p. 404. Flor. dan. t. 506.*
- lanceifolia. 4. S. foliis ovato-lanceolatis, bracteis longitudine capsulae, floribus erectis, nectarii labio obtuso petalis brevioribus. *Suppl. p. 404. Ehrh. phytoph. n. 57. Lonchophyllum.*
- rubra. 5. S. foliis ensiformibus, floribus erectis: nectarii labio acuto. *Flor. dan. t. 345.*
- polystachya. 6. S. caule subdiviso geniculato, foliis oblongo-lanceolatis, racemo composito terminali, nectarii labio ovato recurvato. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 119.*
- flava. 7. S. caule subdiviso geniculato, foliis oblongo-lanceolatis, racemis compositis axillaribus, nectarii labio erecto acuminato. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 119.*
- regularis. 8. S. bulbis ovatis, foliis vaginantibus ensiformibus carinatis, scapo erecto spicato: corollis hexapetalis. *G. Forst. fl. austr. p. 59. F. R. Forst. char. gen. pl. t. 49.*
- Caravata. 9. S. caule simplici erecto, foliis lanceolatis pilosis nervosis, spicis terminalibus. *Aubl. pl. guj. 2. p. 816. t. 320.*
- Neottia. 10. S. foliis lanceolatis, floribus sessilibus secundis: nectarii labio emarginato subrotundo erecto. *Plum. ic. t. 190.*
- speciosa. 11. S. foliis lanceolatis undulatis, floribus subsessilibus erectis: nectarii labio lanceolato acuminato indiviso. *Jacq. collect. 3. p. 174.*

** *bulbis subrotundis.*

- Lingua. 12. S. nectarii labio trifido acuminato glabro petalis longiore. *Column. ephr. 2. t. 322.*

13. S.

cordigera. 13. *S. nectarii* labio trifido acuminato maximo basi barbato; *Rudb. chys. 2. p. 204. f. 20.*

*** *bulbis incognitis.*

capensis. 14. *S. foliis* conduplicato-ensiformibus, caule superne nudiusculo, vaginis spathaceis. *Mant. p. 293.*

erecta. 15. *S. foliis* ovatis amplexicaulibus, floribus erectis. *Thunb. fl. jap. p. 27.*

falcata. 16. *S. foliis* ensiformibus convolutis falcatis, floribus erectis. *Thunb. fl. jap. p. 28.*

1013. LIMODORUM. *Nectarium* monophyllum, concavum, pedicellatum, intra petalum infimum.

tuberosum. 1. *L. floribus* sessilibus, scapis subsimplicibus. *Mart. cent. t. 50.*

altum. 2. *L. floribus* pedunculatis, scapis paniculatis. *Plum. ic. 189.*

striatum. 3. *L. scapo* angulato glabro, foliis ensiformibus nervosis, petalis lanceolatis: labio oblongo plano. *Thunb. fl. jap. p. 28.*

ensatum. 4. *L. scapo* tereti laevi, foliis ensiformibus striatis, petalis lanceolatis glabris: labio recurvo latiore. *Thunb. fl. jap. p. 29. Syst. nat. XII. 3. p. 596. n. 26. Epidendrum ensifolium.*

utriculatum. 5. *L. radice* tuberosa, foliis radicalibus geminis vaginatis: vagina radicali inflata, scapo vaginato, floribus sessilibus. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 119.*

grandiflorum. 6. *L. radice* tuberosa, foliis subquaternis, floribus terminalibus subternis amplissimis. *Aubl. pl. guj. 2. p. 818. t. 321.*

gentianoides. 7. *L. aphyllum*, radice tuberosa, caule vaginato, floribus pedunculatis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 119. an hujus generis?*

Tancarvilleca. 8. *L. floribus* racemosis imperbibus. *Ait. hort. Kew. 3. p. 307. t. 12.*

pendulum. 9. *L. radice* fibrosa, caulibus simplicibus longissimis, foliis amplexicaulibus, floribus axillaribus solitariis. *Aubl. pl. guj. 2. p. 819. t. 322.*

10. *L.*

- praecox. 10. L. radicibus fibrosis, foliis ensiformibus spica florum serie simplici spirali, nectario sessili. *Walt. flor. carol. p. 221.*
 autumnale. 11. L. caule folioso bracteisque pubescentibus, spica florum serie duplici spirali. *Walter flor. carol. p. 221.*

1014. ARETHUSA. *Nectarium* tubulosum intra corollae fundum: labio inferiori stilo adnato.

- bulbosa. 1. A. radice globosa, scapo vaginato, spatha diphylla. *Pluckn. mant. t. 348. f. 7.*
 ophioglossoides. 2. A. radice fibrosa, scapi folio ovali, foliolo spathaceo lanceolato. *Pluckn. alm. t. 93. f. 2.*
 divaricata. 3. A. radice subpalmata, scapi folio folioloque spathaceo lanceolatis, petalis exterioribus adscendentibus. *Catesb. Car. 1. t. 58.*
 capensis. 4. A. bulbo rotundo, caule diphylo simplici unifloro. *Suppl. p. 405.*
 villosa. 5. A. pubescens, bulbo rotundo, foliis ovatis ciliatis. *Suppl. p. 405.*
 ciliaris. 6. A. radice carnosa, folio reniformi orbiculato, labio ciliari. *Suppl. p. 405. Syst. nat. XII. 3. p. 590. n. 20. Orchis burmanniana.*
 biplumata. 7. A. scapo vaginato, spatha cucullata, petalis duobus inferioribus elongatis superiore latere barbato. *Suppl. p. 405. Smith pl. ic. ined. 1. t. 23.*
 racemosa. 8. A. radice tuberosa bipartita, foliis radicalibus ovatis nervosis, scapo subnudo, floribus racemosis alternis pedicellatis. *Walt. flor. carol. p. 222.*
 spicata. 9. A. radice tuberosa, scapo aphylo, floribus sessilibus alternis spicatis. *Walt. flor. carol. p. 222.*
 foliosa. 10. A. radice bulbosa, caule folioso unifloro, foliis alternis nervosis, capsula sexangulari. *Walt. flor. carol. p. 223.*

CRANICHIS. *Nectarium* galeatum.

- aphylla. 1. Cr. bulbis fasciculatis teretibus acutis, scapo subnudo, petalis conniventibus. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 120.*

2. Cr.

- oligantha. 2. Cr. bulbis fasciculatis clavatis, foliis petiolatis oblongis acuminatis nitidis, scapo subnudo, spica filiformi: petalis conniventibus. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 120.*
- diphylla. 3. Cr. bulbis fasciculatis filiformibus nudis, foliis petiolatis cordatis acuminatis geminis, scapo subnudo. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 120.*
- stachyodes. 4. Cr. bulbis fasciculatis teretibus obtusis, foliis petiolatis ovatis acuminatis, scapo vaginato, spica tereti: petalis revolutis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 120.*
- muscosa. 5. Cr. bulbis filiformibus fasciculatis tomentosis, foliis radicalibus petiolatis ovatis, caulinis vaginatis, nectario intus punctato. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 120.*

1423. DISA. *Spatha* 2valvis. Petala 3: tertium minus bipartitum, basi gibbosum.

- grandiflora. 1. D. cornu petalis brevior, caule subbifloro. *Suppl. p. 406. Berg. cap. t. 4. f. 7.*
- racemosa. 2. D. cornu petalis brevior, floribus racemosis. *Suppl. p. 406.*
- longicornis. 3. D. cornu petalis longior, scapo unifloro. *Suppl. p. 406.*
- maculata. 4. D. cornu conico brevissimo, scapo unifloro. *Suppl. p. 407.*

1015. CYPRIPEDIUM. *Nectarium* ventricosum, inflatum, cavum.

- Calceolus. 1. C. radicibus fibrosis, foliis ovato-lanceolatis caulinis alternis. *Mill. ic. t. 242.*
- album. 2. C. radicibus fibrosis, caule multifloro, foliis caulinis ovato lanceolatis, petalis obtusis. *Pluckn. mant. t. 418. f. 3.*
- acaule. 3. C. radicibus fibrosis, foliis oblongis radicalibus. *Pluckn. mant. t. 418. f. 1.*
- bulbosum. 4. C. bulbo subrotundo, folio subrotundo radicali. *Flor. lapp. t. 1. f. 5.*
- japonicum. 5. C. foliis caulinis subrotundis suboppositis nervosis. *Thunb. fl. jap. p. 30.*

1016. EPIDENDRUM. Cor. 6petala. Nectarium
 turbinatum, obliquum
 reflexum. Caps. infera,
 ilocularis, 3valvis, fe-
 nestrata.

* caule scandente.

- Vanilla. 1. E. foliis ovato-oblongis nervosis sessilibus caulinis, cirris
 spiralibus. *Catesb. Car. 3. t. 7.*
- Flos aëris. 2. E. caule terete subramoso, foliis lanceolatis, petalis linea-
 ribus obtusis. *Kaempf. amoen. ex. t. 869. f. 1.*
- clavicula- 32. E. caule tereti ramoso, foliis sessilibus femiamplexicauli-
 tum. bus acutis concavis recurvis rigidis. *Sloan. hist. jam. 1.
 t. 224. f. 3. 4.*

** caule erecto.

- tenuifoli- 3. E. foliis caulinis subulatis canaliculatis. *Rheed. b. mal. 12.
 t. 5.*
- spatula- 4. E. foliis caulinis oblongis alternis obtusis aveniis, nectarii
 tum. labio bifido divaricato. *Plum. ic. t. 180. f. 2.*
- furvum. 5. E. foliis imbricatis lanceolatis, racemis axillaribus. *Rumpf
 amb. 6. t. 46. f. 1.*
- coccine- 6. E. foliis caulinis ensiformibus obtusis, pedunculis unifloris
 um. axillaribus confertis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 205.*
- secun- 7. E. foliis caulinis oblongis, spicis secundis, nectarii tubo
 dum. longitudine corollae. *Jacq. stirp. am. pict. t. 209.*
- lineare. 8. E. foliis caulinis linearibus obtusis emarginatis, caule sim-
 plici. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 201.*
- puncta- 9. E. foliis lanceolatis nervosis; vaginis imbricatis, scapo pa-
 tum. niculato corollisque punctatis. *Plum. ic. 187.*
- caudatum. 10. E. foliis lanceolatis nervosis, scapo paniculato, petalis ma-
 culatis caudatis: duobus longissimis. *Plum. ic. 177.*
- ovatum. 11. E. foliis caulinis ovatis acutis amplexicaulibus nervosis,
 scapis paniculatis. *Rumpf amb. 6. t. 51. f. 2.*
- ramosum. 33. E. caule ramosissimo suffrutescenti, foliis linearibus emar-
 ginatis, racemis terminalibus compressis. *Jacq. stirp.
 amer. t. 132.*

34. E.

- nutans. 34. E. caule simplici, foliis ovato-lanceolatis enerviis amplexicaulibus, spica terminali nutante: labio nectarii trilobo; intermedio tridentato. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 121.*
- graminoides. 35. E. caule compresso multifloro, foliis undique imbricatis distichis remotis linearibus, pedunculis longioribus. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 125.*
- vomeriforme. 36. E. foliis bulbo innatis ovato-acuminatis convexis canaliculatis subtus triquetris, pedunculis axillaribus. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 124.*
- vestitum. 37. E. caule aphylo undique vaginis imbricato teretiusculo bulbifero, folio bulbis innato, floribus confertis e vaginis caulinis. *Swartz nov. plant. gen. et sp. p. 124.*
- proliferum. 38. E. foliis distichis subimbricatis ovatis, bulbis e vaginis foliorum, diphyllis, floribus axillaribus sessilibus. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 124.*
- glacocum. 39. E. caule compresso erectiusculo multifloro, foliis undique imbricatis distichis lato-lanceolatis glaberrimis subtus glaucis, capsulis nudis. *Swartz nov. pl. gen. et spec. p. 124.*
- triste. 76. E. foliis teretibus cylindricis inanibus, pedunculis oppositifoliis corymbosis, nectarii labio integro spatulato-cordato. *Forst. fl. austr. p. 60.*
- crispatum. 77. E. foliis caulinis teretibus filiformibus subincurvis inanibus sessilibus, racemo simplicissimo, nectarii labio lacinia media revoluta undulato crenata. *Forst. fl. austr. p. 60.*
- equitans. 78. E. foliis ensiformibus compressis carinatis equitantibus acuminatis, scapo nudo, racemo spicato nutante filiformi. *Forst. fl. austr. p. 60.*
- Myosuros. 79. E. foliis basi vaginantibus oblique divaricatis linearibus obtusis canaliculatis, scapo nudo, racemo spicato nutante filiformi. *Forst. fl. austr. p. 60.*
- biflorum. 80. E. foliis distichis lineari-lanceolatis acutis, pedunculis bifloris solitariis, nectarii labio trifido acuminato. *Forst. fl. austr. p. 60.*
- auctumnale. 81. E. foliis caulinis lanceolatis nervosis confertis vaginantibus, pedunculis terminalibus squamatis paniculatis, nectarii labio erecto retuso. *Forst. fl. austr. p. 60.*
- resupinatum. 82. E. foliis caulinis petiolatis ovatis acuminatis integerrimis plicato-carinatis, racemo simplici spicato; floribus resupinatis; nectarii labio dentato. *Rheede h. mal. 12. t. 27.*

- plexi-
trilobo;
p. 121.
- abricatis
Swartz
- analicu-
Swartz
- culo bul-
inis cau-
- ginis fo-
Swartz
- undique
tus glau-
p. 124.
- is oppo-
to - cor-
- inibus
inia me-
p. 60.
- bus acu-
iliformi.
- ibus ob-
nutante
- culis bi-
Forst.
- antibus,
ctarii la-
- gerrimis
ous resu-
2. t. 27.
12. E.
- ciliare. 12. E. foliis oblongis aveniis, nectarii labio tripartito ciliato: intermedia lineari, caule bifolio. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 209.*
- noctur-
num. 13. E. foliis oblongis aveniis, nectarii labio tripartito integerrimo: intermedia lineari, caule multifolio. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 210.*
- cuculla-
tum. 14. E. foliis subulatis, scapo unifloro, nectarii labio ovato ciliato acuminato, petalis elongatis. *Plum. ic. 179. f. 1.*
- umbelli-
ferum. 40. E. caule simplici, foliis ovatis emarginatis amplexicaulibus aveniis, floribus terminalibus umbellatis. *Jacq. stirp. amer. t. 136?*
- anceps. 41. E. foliis cordato-lanceolatis amplexicaulibus horizontalibus, racemo terminali compresso ancipiti subflexuoso: floribus distichis; petalis interioribus capillaribus, labio trilobo. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 121.*
- rigidum. 42. E. foliis oblongis obtusis vaginantibus, racemo compresso terminali ancipiti: floribus distichis spathas superantibus; labio integro cordato-ovato acuto. *Jacq. stirp. am. t. 134.*
- diffusum. 43. E. foliis oblongis amplexicaulibus, caule ancipiti, panícula terminali ramosissima diffusa: labio integro acuminato. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 121.*
- monta-
num. 44. E. foliis lanceolatis planis recurvis patentibus submembranaceis, racemo terminali simplici: floribus secundis; labio trifido. *Swartz nov. pl. gen. et spec. p. 121.*
- ferrula-
tum. 45. E. caulibus aggregatis subdiphyllis, foliis lanceolatis carinatis ferrulatis, racemo terminali: floribus distichis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 121.*
- teretifoli-
um. 46. E. foliis semiteretibus, caule unifloro, labio apice triquetrum. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 121.*
- globosum. 47. E. foliis teretibus canaliculatis, floribus terminalibus subfolitariis: labio ovato acuto, capsulis globosis. *Jacq. stirp. am. t. 133. f. 1.*
- *** caule repente.
- teres. 15. E. caule vaginato decumbente, foliis teretibus. *Thunb. fl. jap. p. 30.*
- fertulari-
oides. 48. E. caule filiformi articulado, foliis lanceolatis, pedunculis unifloris e vaginis radicalibus. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 122.*

- testaeo- 49. E. foliis incumben-
lium. 49. E. foliis incumben-
tibus, floribus sub foliis sessilibus. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 122.*
- polybul- 50. E. caule bulbifero, bulbis diphyllis unifloris, flore pedun-
bon. 50. E. caule bulbifero, bulbis diphyllis unifloris, flore pedun-
culato: labio cordato. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 124.*
- echinocar- 51. E. caule compresso decumbente unifloro, foliis undique
pon. 51. E. caule compresso decumbente unifloro, foliis undique
imbricatis distichis ovatis, capsulis muricatis. *Swartz
nov. pl. gen. et sp. p. 124.*
- trichocar- 52. E. caule compresso tereti radicante, foliis undique imbri-
pon. 52. E. caule compresso tereti radicante, foliis undique imbri-
catis distichis linearibus, capsulis tomentosis. *Swartz.
nov. pl. gen. et sp. p. 124.*
- umbella- 83. E. stolonibus repentibus, foliis ovalibus carnosissimis petiolatis;
tum. 83. E. stolonibus repentibus, foliis ovalibus carnosissimis petiolatis;
petiolis infixis apophysibus ovato-angulosis, scapo radia-
to, umbella simplici unilaterali: petalis infimis elongatis.
Forst. fl. austr. p. 61.
- elonga- 91. E. caulibus teretibus erectis foliosis, foliis integerrimis pa-
tum. 91. E. caulibus teretibus erectis foliosis, foliis integerrimis pa-
tentissimis, floribus spicatis terminalibus sessilibus. *Jacq.
collect. 3. p. 260.*

**** scapo nudo, foliis radicalibus.

- nodosum. 16. E. folio unico subradicali, spadice subquadriflora. *Jacq.
stirp. amer. pict. t. 213.*
- angustifo- 53. E. folio lineari bulbo innato, scapo paniculato. *Swartz
lium. 53. E. folio lineari bulbo innato, scapo paniculato. Swartz
nov. pl. gen. et sp. p. 123.*
- fragrans. 54. E. folio lato-lanceolato nervi bulbo innato, scapo mul-
tifloro abbreviato, labio cordato. *Swartz nov. pl. gen. et
sp. p. 123.*
- Clypeo- 84. E. folio radicali subrotundo-cordato basi cucullato apice
lus. 84. E. folio radicali subrotundo-cordato basi cucullato apice
reflexo acuto, scapo erectiusculo racemoso, nectarii labio
orbiculato emarginato maximo. *Forst. fl. austr. p. 61.*
- Fasciola. 85. E. foliis radican-
tibus parasiticis fasciculatis linearibus undu-
latis, scapis pluribus racemosis, nectarii labio calceiformi
calcarato. *Forst. fl. austr. p. 60.*
- sanguine- 55. E. foliis geminis oblongis bulbo innatis scapo multifloro
um. 55. E. foliis geminis oblongis bulbo innatis scapo multifloro
subflexuoso, labio subrotundo undulato emarginato, cornu
adnato. *Sloan. hist. jam. 1. p. 121. f. 2.*
- palmifoli- 56. E. foliis lato-lanceolatis nervosis membranaceis bulbo innatis,
um. 56. E. foliis lato-lanceolatis nervosis membranaceis bulbo innatis,
pedunculis radicalibus vaginatis multifloris, nectario cym-
biformi integro reflexo. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 123.*

57. E.

- altissi- 57. E. foliis lanceolatis bulbis innatis, scapo ramosissimo far-
mum. mentoso, petalis oblongo-lanceolatis acutis, labio obcor-
dato longioribus. *Jacq. stirp. am. t. 141.*
- labiatum. 58. E. foliis oblongis, bulbo medio solitario monophyllo, sca-
pis paucifloris, labio oblongo corpusculo carnosio superne
adnato. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 124.*
- undula- 59. E. foliis ellipticis acutis, scapo farmentoso ramosissimo,
tum. petalis ovatis unguiculatis obtusis, labio dilatato emargi-
nato undulato. *Plum. ic. 178. f. 3. Jacq. stirp. am. t. 133. f. 4?*
- variega- 60. E. foliis lanceolatis carinatis canaliculatis margine cartila-
tum. gineo-ferratis: vaginis imbricatis, racemo simplici, la-
bio cruciatio bilobo. *Jacq. am. stirp. t. 132?*
- utricula- 61. E. foliis lanceolatis lineatis planis, scapo paniculato, la-
rioides. bio magno cordato, cornu brevissimo. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 122.*
- trique- 62. E. foliis triquetris cultratis apice compressis lanceolatis acu-
trum. tis, scapo simplici, labio cordato-ovato: lateribus emar-
ginatis. *Swarts n. gen. et sp. pl. p. 122.*
- fessile. 63. E. foliis basi compressis superne latioribus lanceolato-li-
nearibus obtusis aveniis, pedunculis radicalibus brevissi-
mis unifloris. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 122.*
- strobilifor- 64. E. foliis basi compressis superne dilatatis ovato-lanceolatis
me. acutis planis nervosis, pedunculis unifloris elongatis.
Swarts n. pl. gen. et sp. p. 123.
- subula- 65. E. foliis subulatis fulcatis, pedunculis vaginatis radicalibus
tum. multifloris. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 123.*
- fatyrioi- 62. E. foliis subulato-teretibus, scapo paucifloro, corollis an-
des. terius basi ventricosus. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 123.*
- tribuloi- 63. E. foliis petiolatis lanceolatis obtusis emarginatis, pedun-
des. culis brevissimis, capsulis globosis echinatis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 123.*
- cornicula- 64. E. foliis petiolatis cuneatis oblongis, pedunculis radicali-
tum. bus unifloris, corollis acuminatis curvis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 123.*
- Lanceola. 65. E. foliis petiolatis lanceolatis, pedunculis ex vaginis radi-
calibus bifloris. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 123.*
- tetrapeta- 86. E. foliis subulatis carinatis, racemo simplici: corollis sub-
lum. tetrapetalis. *Jacq. stirp. amer. p. 280. t. 142.*

- minutum. 87. E. foliis lanceolatis trinerviis, racemo composito, floribus minutis. *Burm. amer. p. 180. t. 185. f. 1.*
 bifidum. 88. E. foliis lanceolatis aveniis, petalis oblongis, nectarii labio reniformi bifido. *Burm. amer. p. 181. t. 186. f. 1.*
 maculatum. 89. E. foliis lanceolatis carinatis, petalis reniformibus undatis maculatis, nectarii labio glabro. *Burm. amer. p. 173. t. 178. f. 2.*
 minimum. 90. E. foliis lanceolatis scapum aequantibus. *Sloan. hist. jam. 1. p. 251. t. 148. f. 3.*
 carinatum. 17. E. foliis oblongis obtusis compressis articulatis. *Pet. gaz. t. 44. f. 10.*
 aloifolium. 18. E. foliis radicalibus oblongis obtusis superne latioribus. *Rheed. b. malab. 12. t. 8.*
 guttatum. 19. E. foliis radicalibus lanceolatis canaliculatis, petalis eunciformibus retusis. *Sloan. hist. jam. 1. t. 148. f. 2.*
 juncifolium. 20. E. foliis subulatis fulcatis, scapo petalisque punctatis, labio immaculato dilatato. *Plum. ic. 184. f. 2.*
 scriptum. 21. E. foliis ovato-oblongis, trinerviis, floribus racemosis maculatis. *Rumpf amb. 6. t. 42.*
 retusum. 22. E. foliis radicalibus linearibus apice bifariam retusis, floribus racemosis maculatis. *Rheed. b. mal. 12. t. 1.*
 amabile. 23. E. foliis radicalibus lato-lanceolatis aveniis, petalis lateralibus orbiculatis. *Rumpf amb. 6. t. 43.*
 cochleatum. 24. E. foliis oblongis geminis glabris striatis bulbo innatis, scapo multifloro, nectario cordato. *Catesb. car. 2. t. 88. Jacq. collect. 3. p. 214.*
 tuberosum. 25. E. foliis lato-lanceolatis nervosis membranaceis bulbo innatis, scapo vaginato, nectario cymbiformi bifido. *Plum. ic. 186. f. 2.*
 pusillum. 26. E. foliis ensiformibus subcarnosis, scapo paucifloro. *Mant. p. 491.*
 capense. 27. E. foliis imbricatis bifariis linearibus obtusis, floribus secundis: cornu longissimo. *Suppl. p. 407.*
 moniliforme. 28. E. caule tereti articulo striato moniliformi nudo simplicissimo, foliis linearibus acutis. *Kaempf. amoen. ex. t. 864.*

***** caule unifolio.

- ophioglo- 29. E. folio oblongo, floribus racemosis secundis trigonis.
foides. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 211.*
- ruscifoli- 30. E. floribus in sinu folii aggregatis. *Jacq. stirp. amer.
um. pict. t. 212.*
- gramini- 31. E. caule unifolio, floribus e sinu folii geminis. *Plum. ic.
folium. 176. f. 1.*
- micran- 66. E. folio lato-lanceolato, racemo longissimo filiformi, flo-
thum. ribus secundis subrotundis hexagonis. *Swartz nov. pl.
gen. et sp. p. 125.*
- racemiflo- 67. E. folio ovato, racemo foliis longiore, floribus secundis:
rum. petalis interioribus ovatis. *Swartz nov. pl. et sp. p. 125.*
- alpestre! 68. E. folio ovato-lanceolato, racemis laxis, capsularum ca-
rinis muricatis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 125.*
- laxum. 69. E. folio oblongo, racemo longitudine foliorum, petalis
interioribus subulatis, labio ovato, capsulis nudis. *Swartz
nov. pl. gen. et sp. p. 125.*
- ovale. 70. E. folio ovato-acuminato, racemo adpresso multifloro,
petalis subrotundis: interioribus anterieus basi remotis,
capsulis pedicellatis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 125.*
- pulchel- 71. E. folio subrotundo-acuto, racemo laxo paucifloro, pet-
lum. alis acuminatis ciliatis: interioris apice decussatis. *Swartz
nov. pl. gen. et sp. p. 125.*
- tridenta- 72. E. folio ovato-acuto apice tridentato, racemo multifloro,
tum. floribus triquetris acuminatis, petalis nectarii erectis in-
curvis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 125.*
- cochleari- 73. E. folio orbiculato convexo concavo, racemo paucifloro-
folium. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 126.*

***** Aphylla.

- funale. 74. E. filiforme radicans pedunculo bifloro, labio bilobo, cor-
nu longissimo subulato. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 126.*
- filiforme, 75. E. filiforme radicans, pedunculis subtrifloris, labio ovato,
cornu brevissimo apice capitato. *Swartz nov. pl. gen. et
sp. p. 126.*

1424. FORSTERA. *Cal.* duplex: *exterior* inferus
3phyllus, *interior* superus
6fidus. *Cor.* tubulosa. *Bac-*
ca infera,ilocularis, 1sperma.

pedifolia. 1. FORSTERA. *Suppl. p.* 407. *Forster n. act. Ups.* 3. t. 9.
Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 28. f. 6.

1037. ANGURIA. ♂. *Cal.* 5fidus. *Cor.* 5petala.
♀. *Cal.* 5fidus. *Cor.* 5petala.
Pomum inferum 2locula-
re, polyspermum.

trilobata. 1. A. foliis trilobis. *Jacq. stirp. amer. pict.* t. 234.

pedata. 2. A. foliis pedatis ferratis. *Jacq. stirp. amer. pict.* t. 233.

trifoliata. 3. A. foliis ternatis integerrimis. *Plum. amer.* t. 99.

1038. LEMNA. ♂. *Cal.* 1phyllus. *Cor.* 0.
♀. *Cal.* 1phyllus. *Cor.* 0. *Stilus*
1. *Caps.* 1-2locularis, 1-2-
sperma.

trifulea. 1. L. foliis petiolatis lanceolatis. *Mich. n. plant. gen.* 16. t.
11. f. 5.

minor. 2. L. foliis sessilibus utrinque planiusculis, radicibus solitariis.
Blackw. herb. t. 380. *nonne cum reliquis speciebus ad cry-*
ptogamos releganda, quibus quippe omnibus vere semina
desse videntur?

gibba. 3. L. foliis sessilibus subtus hemisphaericis, radicibus solitariis.
Mich. n. pl. gen. 16. t. 11. f. 2.

polyrhi- 4. L. foliis sessilibus, radicibus confertis. *Mich. n. gen. pl.* 16.
za. t. 11. f. 1.

arhiza. 5. L. foliis geminis eradicatis. *Mant.* 294. *Mich. n. pl. gen.*
16. t. 11. f. 4. *an merum polyrhizae rudimentum?*

COSARIA. *Cal.* communis iphyllus, carnosus rosidus.
Receptaculum planum. *Flores* con-
ferti.

♂. *Cor.* conico-truncata. *Filam.* corolla
longiora.

♀. *Cor.* conico-truncata clausa. *Stigma*
acutum. *Bacca.* *Sem.* ovato-tri-
gona.

Forskählii. I. COSARIA. *Forsk. fl. aeg. arab. p.* 164.

1099. CECROPIA. ♂. *Spatha* caduca. *Amenta* im-
bricata squamis turbinatis
subtetragonis. *Cor.* o.

♀. *Germina* imbricata. *Stilus* 1.
Stigma lacerum. *Bacca*
1 sperma. *Reliqua* ut in ♂.

peltata. I. CECROPIA. *Mant.* 499. *Jac. stirp. amer. pict. t.* 262. *f.* 66.

OMPHALEA. *Flores* monoici. *Cor.* o.

♂. *Cal.* 4phyllus. *Anther.* apice co-
lunnae insidentes.

♀. *Cal.* 5phyllus. *Stigm.* 3fidum.
Caps. carnosae, 3locularis.

axillaris. I. O. racemis axillaribus, foliis distichis acuminatis nitidis: pe-
tiolis brevissimis, stipulis mucronatis, caule fruticoso.
Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 95.

cauliflo- 2. O. racemis caulinis basi squamosis, foliis distichis oblongis
ra. acutis nitidis, caule arborecente. *Swartz nov. pl. gen. et*
sp. p. 95.

cordata. 3. O. racemis compositis foliosis terminalibus, foliis sparsis cor-
datis subtus villosis basi biglandulosis, caule scandente.
Syst. nat. XII. 3. *p.* 619. O. diandra. *Aubl. pl. guj. 2.*
t. 328.

nucifera. 4. O. racemis compositis foliosis terminalibus, foliis sparsis oblongis glaberrimis basi biglandulosis, caule arboreo. *Syst. nat.* XII. 3. p. 619. *Omphalea triandra.* *Brown jam. t.* 22. f. 4.

1098. SALIX. *Amenti squamæ floræ. Cor. o.*
♂. Glandula baseos nectarifera.
♀. Stilus 2fidus. Caps. 1ocularis,
2valvis. Sem. papposa.

* *foliis glabris.*

† *serratis.*

- monandra. 1. S. foliis lineari-lanceolatis: superioribus obliquis, amentis tomentosis, floribus monandris. *Hoffmann salic.* I. p. 18. t. I. f. 1. 2. et t. 5. f. 1. *Syst. nat.* XII. 3. p. 648. n. 10. et 11. *Salix purpurea* et *Helix.*
- hermaphrodita. 2. S. floribus hermaphroditis diandris.
- triandra. 3. S. *Salix* foliis oblongo-lanceolatis, floribus triandris. *Hoffm. salic.* I. t. 9. 10. f. 1-4.
- pentandra. 4. S. foliis ovatis acutis, floribus pentandris. *Gmel. fl. sib.* I. t. 34. f. 1.
- antifebril. 40. S. foliis lineari lanceolatis subpetiolatis. *Schoepf mat. med. amer.* p. 47.
- phylitifolia. 5. S. foliis lanceolatis: crenis undatis. *Fl. lapp. t.* 8. f. C. D.
- japonica. 6. S. foliis lanceolatis subtus glaucis, junioribus villosis. *Thunb. fl. jap.* p. 24.
- vitellina. 7. S. foliis ovato-lanceolatis acutis supra glabris: ferraturis cartilagineis. *Hoffm. sal.* I. t. 11. 12. f. 1-3.
- amygdalina. 8. S. foliis lanceolatis petiolatis, stipulis trapeziformibus.
- hastata. 9. S. foliis subovatis acutis sessilibus, stipulis subcordatis. *Fl. lapp. t.* 8. f. G.
- ægyptiaca. 10. S. foliis subserratis lanceolato-ovatis nudis venosis: petiolis simplicibus extipulatis. *Prosp. Alp. ægypt.* t. 62.
- fragilis. 11. S. foliis ovato-lanceolatis: petiolis dentato-glandulosis. *Fl. lapp. t.* 8. f. B.

- babyloni- 12. S. foliis lineari-lanceolatis, ramis pendulis. *S. G. Gmel.*
ca. *it. 3. t. 34. f. 2.*
- myrsini- 13. S. foliis ovatis subdiaphanis. *Hoffm. sal. I. t. 17-19. f.*
tes. *1-5. t. 24. f. 2.*
- Arbuscu- 14. S. foliis subserratis subdiaphanis subtus glaucis, caule suf-
la. fruticoso. *Jacq. fl. austr. 5. t. 405.*
- herbacea. 15. S. foliis orbiculatis. *Fl. dan. t. 117. Hoffm. sal. I. t. 20.*
f. 1-4.
- retusa. 16. S. foliis subserratis obovatis obtusissimis. *Bocc. mus. 2. t. 1.*

†† *integerrimis.*

- reticulata. 17. S. foliis ovatis obtusis. *Flor. dan. t. 212.*
- myrtilloi- 18. S. foliis integris ovatis acutis. *Fl. lapp. t. 8. f. K.*
des.
- integra. 19. S. foliis integris lineari-oblongis obtusis. *Thunb. fl. japp.*
p. 24.
- glauca. 22. S. foliis subtus tenuissime villosis ovato-oblongis. *Fl. lapp.*
t. 7. f. 5. et t. 8. f. P.
- fissa. 20. S. foliis integris oblongo-lanceolatis acuminatis. *Hoffm.*
salic. I. t. 13. 14. f. 1-4.
- chilensis. 21. S. foliis integerrimis lanceolatis acuminatis. *Molin. hist.*
nat. Chil. p. 145. vanniifera.

** *villosis.*† *integerrimis.*

- aurita. 23. S. foliis utrinque villosis obovatis appendiculatis. *Hoffm.*
salic. I. p. 30. t. 4. f. 1. 2. et t. 5. f. 3.
- lanata. 24. S. foliis utrinque lanatis subrotundis acutis. *Fl. lapp. t. 7.*
f. 7. et t. 8. f. N. et X.
- lappo- 25. S. foliis hirsutis lanceolatis. *Fl. lapp. t. 8. f. T.*
num.
- arenaria. 26. S. foliis integris ovatis acutis supra subvillosis, subtus to-
mentosis. *Flor. dan. t. 197.*
- incuba- 27. S. foliis lanceolatis: subtus villosis nitidis, stipulis ova-
cea. tis acutis.
- depressa. 28. S. foliis ovato-oblongis supra glabris subtus sericeis.
Hoffm. sal. I. t. 15. 16. f. 1-4. Syst. nat. XII. 3. p. 649.
n. 25? *Salix repens.*

- fusca. 29. S. foliis ovatis subtus pubescentibus. *Jacquin fl. austr. 5. t. 409. an forsan cum 3 mox praecedentibus mera ejusdem speciei varietas?*
- rosmarinifolia. 30. S. procumbens foliis lanceolato-linearibus strictis subsessilibus subtus tomentosis. *Lobel. ic. 2. p. 137.*
- nitida. 31. S. foliis integris ovatis obtusis mucronatis utrinque subvillosis. *S. G. Gmel. it. 3. t. 28. nonne eadem cum aegyptiaca?*
- ferotina. 32. S. foliis ovato-lanceolatis subtus venosissimis incanis. *Pall. it. 3. p. 759. t. N.*

†† *subferratis.*

- acuminata. 33. S. foliis ovato-oblongis subtus tomentosis: superioribus integris: inferioribus crenatis. *Hoffm. salic. 1. t. 6. f. 1. 2.*
- Caprea. 34. S. foliis ovatis rugosis subtus tomentosis undatis superne denticulatis. *Hoffm. sal. 1. p. 25. t. 3. f. 1. 2. et t. 5. f. 4.*
- viminalis. 35. S. foliis lanceolato-linearibus longissimis acutis subtus sericeis, ramis virgatis. *Hoffm. sal. 1. t. 2. f. 1. 2. et t. 5. f. 2.*
- cinerea. 36. S. foliis oblongo-ovatis subtus subvillosis, stipulis dimidiato-cordatis.
- alba. 37. S. foliis lanceolatis acuminatis ferratis utrinque pubescentibus: ferraturis infimis glandulosis. *Blackw. herb. t. 327. Hoffm. sal. 1. t. 7. 8. f. 1. 2.*
- excelsa. 38. S. foliis sessilibus ovato-oblongis acuminatis subtus villosis: inferioribus integris. *S. G. Gmelin it. 3. t. 34. f. 1.*
- berberifolia. 39. S. foliis ovatis rigidis reticulato venosis ferrato dentatis. *Pall. it. 3. p. 759. t. Kk. f. 7.*
- flava. 41. S. foliis lanceolatis acutis petiolatis supra pubescentibus subtus tomentosis glaucis. *Schoepf mat. med. amer. p. 147.*
- tristis. 42. S. exstipulata, foliis lineari-lanceolatis petiolatis rugosis, subtus tomentosis. *Ait. hort. Kew. 3. p. 393.*

1160. FRAXINUS. Cal. o. f. 4partitus. Cor. o. f. 4petala.

♀. Sem. 1. lanceolatum.

♀. Pist. 1. lanceolatum. Caps. 2locularis, superne foliaceo-compressa. Semina pauca pendula.

- excelsior. 1. Fr. foliolis ferratis, floribus apetalis. *Regnault bot. t. 324.*
- Ornus. 2. Fr. foliolis ferratis, floribus corollatis. *Mill. illustr. ic. Regn. bot. t. 418.*
- rotundi- 3. Fr. foliolis ovalibus crenatis undulatis. *Moench Weissenst. p. 42.*
folia.
- integri- 4. Fr. foliolis integerrimis ovatis acuminatis. *Moench Weis-
senst. p. 43.*
folia.
- america- 5. Fr. foliolis integerrimis: petiolis teretibus. *Catesb. Car. I.
na. t. 80.*
- novae An- 6. Fr. foliolis ovato-oblongis acuminatis anteriorius crenatis.
gliae. *Moench Weissenst. p. 43.*
- pubes- 7. Fr. foliolis ovato-lanceolatis apicem versus obtuse crenatis
cens. subtus pubescentibus, floribus apetalis. *Walt. flor. carol.
p. 254.*

DIGYNIA.

42. ANTHOXANTHUM. Cal. Gluma 2valvis, iflo-
ra. Cor. Gluma
2valvis, acumina-
ta. Sem. 1.

- aculea- 1. A. spicis subglobosis: involuero foliaceo brevi mucronato.
tum. *Suppl. p. 89. Syst. nat. XII. 3. p. 80. n. 2. Schoenus acu-
leatus. Jacq. fl. austr. I. t. 7. Phleum schoenoides,
an distincti generis?*
- odora- 2. A. spica oblonga ovata: flosculis subpedunculatis arista lon-
tum gioribus. *Flor. dan. t. 666.*

- indicum. 3. A. spica lineari: flosculis sessilibus arista brevioribus; *an potius agrestis?*
- avenaceum. 4. A. spica secunda: calicibus pilosis flosculique arista longa torta geniculata. *Retz. obs. bot. 3. p. 8. n. 5.*
- crinitum. 5. A. panicula spicaeformi cylindrica aristata: aristis longis patentibus laxis. *Suppl. p. 90.*
- paniculatum. 6. A. floribus paniculatis. *Rudb. elys. 1. f. 14. β) Anthoxanthum giganteum. Walter flor. carol. p. 65.*

1272. GUNNERA. *Amentum squamis 1floris. Cal. o. Cor. o. Germen 2dentatum. Sem. 1.*

perpensa. 1. GUNNERA. *Mant. p. 121. Pluckn. alm. t. 18. f. 2.*

MISANDRA. *Flores dioici in scapis racemosis terminales. Cal. o. Cor. o.*
 ♂. *Anth. 4gonae, 2bracteatae.*
 ♀. *Gemini. Germ. apice marginat. Caps. subbaccata, 2valvis, 2sperma.*

magellanica. 1. MISANDRA. *Jussieu gen. plant. p. 405.*

TRIGYNIA.

43. PIPER. *Cal. o. Cor. o. Bacca 1sperma.*

- nigrum. 1. P. foliis ovatis subseptemnerviis glabris: petiolis simplicissimis. *Mill. illustr. ic.*
- Betel. 2. P. foliis oblongiusculis acuminatis septemnerviis: petiolis bidentatis. *Burm. fl. zeyl. t. 82. f. 2.*
- Malamiri. 3. P. foliis ovatis acutiusculis subtus scabris: nervis quinque subtus elevatis. *Rumpf amb. 5. t. 116. f. 2.*
- Amalago. 4. P. foliis lanceolato-ovatis quinquenerviis rugosis. *Rumpf amb. 5. t. 116. f. 1.*
- Siriboa. 5. P. foliis inaequaliter cordatis subseptemnerviis venosis. *Rumpf amb. 5. t. 117. f. 2.*

6. P.

- longum. 6. P. foliis cordatis petiolatis sessilibusque. *Blackw. herb. t. 356.*
- decumanum. 7. P. foliis cordatis novemnerviis reticulatis. *Rumpf amb. 5. t. 27.*
- medium. 8. P. foliis ovato acuminatis subquinenerviis integerrimis glabris petiolatis, spicis solitariis pedunculatis oppositifoliis. *Jacq. coll. 1. p. 141.*
- reticulatum. 9. P. foliis cordatis septemnerviis reticulatis. *Plum. amer. t. 75.*
- aduncum. 10. P. foliis ovato-lanceolatis: nervis alternis, spicis uncinatis. *Plum. amer. t. 77.*
- pellucidum. 11. P. foliis cordatis petiolatis, caule herbaceo. *Plum. amer. t. 72.*
- acuminatum. 12. P. foliis lanceolato-ovatis nervosis carnosis. *Plum. amer. t. 71.*
- Cubeba. 13. P. foliis oblique ovatis s. oblongis venosis acutis, spica solitaria pedunculata oppositifolia, fructibus pedicellatis. *Suppl. p. 90. Inde Cubebae officinarum.*
- capense. 14. P. foliis ovatis nervosis acuminatis: nervis villosis. *Suppl. p. 90.*
- blandum. 48. P. foliis lanceolatis integerrimis subtrinerviis, spicis filiformibus erectiusculis: axillaribus solitariis. *Jacq. coll. 3. p. 211.*
- magnoliaefolium. 49. P. foliis obovatis petiolatis nitentibus, pedunculis terminalibus cauleque fruticoso ramosis. *Jacq. coll. 3. p. 210.*
- clusiaefolium. 50. P. foliis obovatis integerrimis subsessilibus, spica terminali erecta solitaria. *Jacq. coll. 3. p. 209.*
- retusum. 15. P. foliis obovatis retusis. *Suppl. p. 91.*
- latifolium. 16. P. foliis cordatis multinerviis petiolatis, spicis axillaribus pedunculatis plurimis. *Suppl. p. 91.*
- obtusifolium. 17. P. foliis ovatis enerviis, spicis terminalibus sessilibus. *Plum. amer. t. 70.*
- rotundifolium. 18. P. foliis orbiculatis solitariis carnosis. *Plum. amer. t. 69.*
- maculosum. 19. P. foliis peltatis ovatis. *Plum. amer. t. 66.*

20. P.

Piperis species, imprimis Saufuri Plumieri, in solo notali examinandae, ut appareat, utrum differant a reliquis in partibus fructificationis.

- peltatum. 20. P. foliis peltatis orbiculato-cordatis obtusis repandis, spicis umbellatis. *Plum. amer. t. 74.*
- distachyon. 21. P. foliis ovatis, spicis conjugatis. *Plum. amer. t. 67.*
- umbellatum. 22. P. foliis cordatis subrotundis acutis venosis, spicis umbellatis. *Plum. amer. t. 73.*
- trifolium. 23. P. foliis ternis subrotundis. *Plum. amer. t. 68.*
- quadrifolium. 24. P. foliis quaternis cuneiformibus sessilibus. *Plum. ic. t. 242. f. 2.*
- reflexum. 25. P. foliis quaternis ovatis obtusis reflexis, caule fulcato. *Suppl. p. 91.*
- pulchellum. 51. P. foliis quaternis subsessilibus oblongis enerviis integerrimis, spicis terminalibus. *Ait. hort. Kew. I. p. 50.*
- verticillatum. 26. P. foliis verticillatis ovatis trinerviis.
- methyllum. 27. P. foliis cordatis multinerviis petiolatis, spicis axillaribus pedunculatis plurimis. *Suppl. p. 91. Banks t. 2.*
- discolor. 28. P. foliis lato-ovatis quinquenerviis glaberrimis posterioribus discoloribus, spicis laxioribus: floribus remotioribus. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 15.*
- macrophyllum. 29. P. foliis oblongis acuminatis obliquis multinerviis glabris: petiolis appendiculatis caule laevi. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 15.*
- geniculatum. 30. P. foliis oblongis acuminatis obliquis multinerviis glabris, caule ramisque geniculatis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 15.*
- verrucosum. 31. P. arborecens, foliis oblongis acuminatis obliquis multinerviis glabris coriaceis, caule ramisque verrucosis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 15.*
- hispidum. 32. P. foliis ovatis acuminatis obliquis hirsutis rugosis: nervis alternis, spicis erectis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 15.*
- nitidum. 33. P. foliis lanceolato-ovatis basi obliquis glabris nitidis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 15.*
- alpinum. 34. P. herbaceum, caule erecto simpliciusculo, foliis ovato-subrotundis acutis, subtus aveniis, spicis axillaribus. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 15.*

- hispidu- 35. P. herbaceum erectiusculum, foliis subrotundis petiolatis
 lum. tenuissimis superne hirtis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 15.*
 tenellum. 36. P. herbaceum simplex decumbens, foliis distichis ovatis
 aveniis margine ciliatis, spica adscendente. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 16.*
 amplexi- 37. P. subherbaceum, foliis lanceolato-ovatis amplexicaulibus
 caule. nervosis carnosis, caule erecto simplici. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 16.*
 glabel- 38. P. herbaceum, foliis ovatis acuminatis, caule herbaceo ra-
 lum. dicante ramosissima. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 16.*
 scandens. 39. P. herbaceum, foliis ovatis acutis, caule radicante simpli-
 ci adscendente. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 16.*
 serpens. 40. P. herbaceum, foliis subrotundo-acutis planis discolori-
 bus, caule repente. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 16.*
 cordifoli- 41. P. herbaceum, foliis obverse cordatis petiolatis plano-con-
 um. vexis carnosis, caule repente. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 16.*
 numulari- 42. P. herbaceum, foliis orbiculatis convexo-concavis, caule
 folium. filiformi repente radicante. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 16.*
 filiforme. 43. P. herbaceum, foliis linearibus obtusis: summis verticilla-
 tis, caule filiformi repente. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 16.*
 stellatum. 44. P. herbaceum, foliis verticillatis oblongis acuminatis tri-
 nerviis glabris, caule erecto. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 16.*
 excelsum. 45. P. foliis orbiculato-cordatis subseptemnerviis, peduncu-
 lis terminalibus solitariis bifidis, caule arboreo. *Forst. fl. austr. p. 5.*
 pallidum. 46. P. foliis alternis obovatis subtrinerviis, spicis solitariis sub-
 terminalibus. *Forst. fl. austr. p. 5.*
 tetraphyl- 47. P. foliis quaternis rhombeis sessilibus carnosis. *Forst. fl. austr. p. 5. an vere distinctum a quadrifolio.*
 lum.

1097. VALLISNERIA. ♂. *Spatha* 2partita. *Spadix* tectus flosculis. *Cor.* 3partitae.

♀. *Spatha* 2fida, 1 flora. *Cal.* 3partitus superus. *Cor.* 3petala. *Caps.* 1-ocularis, polysperma.

spiralis. I. VALLISNERIA. *Michel. nov. pl. gen. 12. t. 10. f. 1. 2.*