

CLASSIS III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

\* Flores superi.

HERITIERA.	Cor. 3fida. Caps. 3quetrailocularis, polyisperma.
44. VALERIANA.	Cor. 5fida, basi gibba. Sem. 1.
50. MELOTHRIA.	Cor. 5fida, rotata. Bacca 3locularis.
1089. TRICHOSANTHES.	Flores monoici. Cor. 5partita, ciliata. ♀. Stil. 3fidus. Pomum oblongum.
CERATOLANTHES.	Flores monoici. Cor. 5partita: laciniis 2cornibus. ♀. Stil. 3fidus. Pomum oblongum.
1090. MOMORDICA.	Flores monoici. Cor. 5partita. ♀. Stil. 3fidus. Pomum elastia dissiliens.
1091. CUCURBITA.	Flores monoici. Cor. 5fida. ♀. Pistill. 5fidum. Pomi semina margine tumida.
1092. CUCUMIS.	Flores monoici. Cor. 5partita. ♀. Pistill. 3fidum. Pomi semina arguta.
1093. BRYONIA.	Flores diclini. Cor. 5partita. ♀. Stil. 4fidus. Bacca subglobosa, polyisperma.
1094. SICYOS.	Flores monoici. Cor. 5partita. ♀. Stil. 3fidus. Drupa 1isperma.
1139. RUSCUS.	Flores ut plurimum dioici. Cor. 0. Nectar. centrale, ovatum, apice perforatum.
51. CROCUS.	Cor. 6petaloidea, erecto-patula. Stigmata convoluta colorata.
59. IRIS.	Cor. 6partita: laciniis 3exterioribus reflexis. Stigmata petaloidea.
60. MORAEA.	Cor. 6petala: petalis omnibus patulis.
1017. SISYRINCHIUM.	Cor. 6petala: petalis omnibus planis.
1018. FERRARIA.	Cor. 6petala: petalis undulato-crispatis.
TAPEINIA.	Cor. tubulosa: limbo profunde 6partito. Stigma 3fidum.
VOGELIA.	Cor. 6fida persistens. Cal. 0. Caps. 3locularis apice truncata, 3punctata.

58. ANTHOLYZA. *Cor.* 6fida tubulosa, recurvata.  
 57. GLADIOLUS. *Cor.* 1petala: tubo cylindrico curvo; limbo 6partito.  
 WITSENIA. *Cor.* 6partita, cylindrica. *Stigma* emarginatum.  
 56. IXIA. *Cor.* 1petala, tubulosa: tubo recto filiformi, limbo 6partito aequali.  
 1355. DILATRIS. *Cor.* 6petala, hirsuta. *Filamentum tertium* reliquis minus. *Stigma* simplex.  
 MARICA. *Cor.* 6partita: laciniis 3interioribus minoribus. *Caps.* oblonga, angulata, 3locularis, polysperma.

\* *Narcissus triandrus.*

\*\* *Flores inferi.*

- XIPHIDIUM. *Cor.* 6petala, aequalis. *Cal.* o. *Caps.* 3locularis.  
 61. WACHENDORFIA. *Cor.* 6petaloidea, patens. *Cal.* o.  
 1273. STILAGO. *Cal.* 1phyllus subtrilobus. *Cor.* o. *Bacca* globosa.  
 62. COMMELINA. *Cor.* 6petala: petalis 3-4 caliciformibus. *Nectaria* cruciata, petiolata.  
 GLOCHIDION. *Flores* monoici. *Cor.* 6petala. *Cal.* o. ♂. *Antherae* connexae. ♀. *Capsula* 6locularis, 6valvis.  
 1326. SALACIA. *Cor.* 5petala. *Cal.* 5partitus. *Antherae* germinis apici infidentes.  
 TONSELLA. *Cor.* 5petala. *Cal.* 5partitus. *Nectar.* arceolatum. *Bacca* sphaerica 1locularis, 4sperma.  
 54. HIPPOCRATEA. *Cor.* 5petala. *Cal.* 5partitus. *Caps.* 3. 2valves.  
 52. LOEFLINGIA. *Cor.* 5petala. *Cal.* 5phyllus. *Caps.* 1locularis.  
 CHELIDURUS. *Cor.* 5petala; petalis inaequalibus. *Cal.* 4phyllus. *Germen* pedicellatum.  
 1337. WILLICHIA. *Cor.* 4fida. *Cal.* 4fidus. *Caps.* 2locularis.  
 FISSILIA. *Cor.* fissilis in 3petala conniventia. *Cal.* integer. *Stamina* 5sterilia. *Nux* 1sperma, calici inclusa.  
 46. TAMARINDUS. *Cor.* 3petala. *Cal.* 4partitus. *Legumen* succulentum.

1226. ELATE. *Flor. monoici. Cor. 3petala. Drupa alata acuminata.*
1048. TRAGIA. *Flor. monoici. Cor. o. ♂. Cal. 3partitus. ♀. Cal. 5partitus. Stilus 3fidus. Caps: 3cocca, 3locularis. Sem. solitaria.*
1049. HERNANDIA. *Flores monoici. ♂. Cal. 3partitus. Cor. 3petala. ♀. Cal. truncatus, integerrimus. Cor. 6petala. Drupa cava, ore aperto: nucleo mobili. Flores dioici. Cal. 3partitus. Cor 3petala. Drupa ovata.*
1224. PHOENIX. *Flores dioici. Cal. 3fidus. Cor. o. ♀. Stil. o. Stigma subrotundum. Drupa 1locularis.*
1101. OSYRIS. *Flores dioici. Cal. 3fidus. Cor. 3fida. Drupa 2locularis.*
1431. MABA. *Flores masculi et feminei. Cor. o. receptaculo communi, turbinato, carnoso, conniventi inclusi. ♂. Cal. 3partitus. ♀. Cal. 5partitus. Sem. 1. Cor. 3petala. Cal. 3phyllus. Capsf. 2locularis.*
1168. FICUS. *Cor. 3petala. Cal. 3phyllus. Capsf. 1locularis.*
63. CALLISIA. *Cor. 3petala. Cal. 3fidus. Drupa nucleo 3loculari.*
- SYENA. *Cor. 3petala. Cal. 3dentatus. Bacca 3cocca.*
47. RUMPFIA. *Cor. 3petala. Cal. 2valvis. Capsf. 3locularis.*
48. CNEORUM. *Cor. 3partita. Cal. 3partitus. Stil. o. Drupa. Cor. 3fida. Cal. integerrimus. Glans. Cor. 5petala, inaequalis. Cal. duplex. Filam. 4, quorum 1sterile. Legumen ovatum, 1loculare, 1spermum.*
64. XYRIS. *Cor. 5petala, inaequalis. Cal. simplex, campanulatus, 5partitus. Germ. turbinatum, tomentosum. Stigm. 3revoluta.*
49. COMOCLADIA. *Cor. o. Cal. 3dentatus. Capsf. 3locularis.*
45. OLAX. *Cor. o. Cal. 5phyllus. Capsf. 1locularis.*
- MACROLOBIUM. *F 2*
- ROHRIA. *53. PO-*
1289. ROTALA.
51. ORTEGIA.

53. POLYCNEMUM. *Cor.* o. *Cal.* persistens 5phyllus: foliolis ovatis rectis. *Caps.* ovata, evalvis, 1sperma.
- ALTERNANTHERA. *Cal.* 5phyllus. *Cor.* o. *Stamina* 6, alterna sterilia. *Stigm.* 2fidum. *Sem.* folitaria.
1330. AGYNEJA. *Flores* monoici. *Cal.* 6phyllus. *Cor.* o. *Germen* perforatum, *stilo* et *stigm.* o. *Amaranthi triandri.* *Antiderma.* *Fagera emarginata, spinosa, acuminata.* *Tradonantia multiflora.* *Pontederia limosa.* *Laurus triandra.*
- \* *Boehmeria ramiflora* *Omphalea triandra.* *Hirtella americana.*
- \*\*\* *Flores* graminei valvulis glumae calicinae. — hermaphroditi.
1356. KYLLINGIA. *Amentum* ovatum 1oblongum, imbricatum. *Cal.* et *Cor.* bivalves.
1357. FUIRENA. *Amentum* imbricatum: squamis aristatis. *Cal.* o. *Cor.* glumis 3petaliformibus, obcordatis cirro terminatis.
1358. POMMEREULLA. *Cal.* turbinatus, 2valvis: valvulis 4fidis; dorso aristato.
70. LYGEUM. *Cor.* 2valves. *Cal.* spatha. *Sem.* 2loculare.
- SPARTINA. *Cor.* 2valvis. *Cal.* 1florus 2valvis: valvis macularibus inaequalibus. *Nectarium* o.
69. NARDUS. *Cor.* 2valvis. *Cal.* o. *Sem.* testum.
68. ERIOPHORUM. *Cor.* o. *Cal.* paleis imbricatis. *Sem.* lanigerum.
67. SCIRPUS. *Cor.* o. *Cal.* paleis imbricatis. *Sem.* nudum vel villosum 3quetrum.
66. CYPERUS. *Cor.* o. *Cal.* paleis distichis. *Sem.* nudum.
65. SCHOENUS. *Cor.* o. *Cal.* paleis fasciculatis. *Sem.* subrotundum.

— — monoici.

1046. CAREX.

*Amentum* spicatum, imbricatum glumis. *Cal.* 1phyllus. *Cor.* o. ♀. *Nectarium* inflatum, 3dentatum. *Stigmata*

1040. TYPHA. *Stigmata* 3, rarius 2. *Sem.* 1. intra nectarium.  
*Amentum* cylindricum. *Cor.* 0.  
♂. *Cal.* obsoletus 3phyllus.  
♀. *Amentum* infra masculos. *Cal.* capillo villoso. *Sem.* 1. infidens pap-  
po capillari.
1041. SPARGANIUM. *Amentum* subrotundum. *Cal.* 3phyllus.  
*Cor.* 0.  
♀. *Stigm.* 2fidum. *Drupa* ex succa, 1-  
2isperma.
1042. ZEA. ♂. *in* spicis distinctis. *Cal.* Gluma 2flo-  
ra, mutica. *Cor.* Gluma mutica.  
♀. *Cal.* et *Cor.* Gluma 2valvis. *Stil.* fili-  
formis, pendulus. *Sem.* solitaria,  
receptaculo oblongo immersa.  
*Cal.* Gluma communis 2valvis: flosculo  
femineo sessili, masculis peduncu-  
latis.
1147. APLUDA. ♂. *Cal.* 0. *Cor.* 2valvis.  
♀. *Cal.* 0. *Cor.* 2valvis. *Sem.* 1. tectum.  
*Cal.* et *Cor.* Gluma 2valvis. *Cal.* 1flor.
1045. OLYRA. ♂. *Cal.* Gluma aristata. *Cor.* Gluma mutica.  
♀. *Cal.* Gluma patula, ovata. *Stilus*  
2fidus. *Sem.* cartilagineum.
1043. COIX. *Cal.* Gluma 2flora, mutica. *Cor.* Glu-  
ma mutica.  
♂. spicae remotae.  
♀. *Stil.* 2partitus. *Sem.* calice ossificato  
tectum.

*Juncus conglomeratus, effusus.*

— — — alii hermaphroditi, alii in eadem planta masculi.

- THEMEDA. *Cal.* 1valvis muticus. *Cor.* 2valvis, ♀.  
sessilis, cor. aristata. ♂. pedicell.  
cor. mutica.
1334. MANISURIS. *Cal.* Gluma 2valvis, valvula exteriori la-  
teribus et apice emarginata. *Cor.*  
calice minor. *Stil.* 2fidus.
1149. CENCHRUS. *Involucr.* laciniatum, echinatum, 2flo-  
rum. *Cal.* Glum. 2flora. *Cor.*  
mutica.  
♀. *Stil.* 0. 2fid. *Sem.* 1.

## DIGYNIA.

\* Flores apetalis monoici.

1047. AXYRIS. ♂. Cal. 3partitus.  
 PLANERA. ♀. Cal. 2phyllus. Sem. 1.  
 Cal. 4phyllus.  
 ♀. Sem. 1ovatum, squarrosum.

\*\* Flores graminei.

† uniflori vagi.

71. BOBARTIA. Cal. multivalvis imbricatus.  
 76. PANICUM. Cal. 2valvis 2florus: flosculo altero her-  
 maphrodito, altero masculino.  
 1145. ANDROPOGON. Cal. 1valvis basi pilosa. Cor. 2valvis:  
 altera valva basi aristata. Sem. 1.  
 Flosculi plures mere masculi.  
 CHLORIS: Cal. Gluma communis 2valvis, 2flora,  
 flosculis aristatis, cal. 0.  
 ♀. sessilis, cor. gluma 2valvi: arista ter-  
 minali.  
 ♂. Cor. Gluma 1valvis.  
 72. CORNUCOPIAE. Cal. 2valvis. Cor. 1valvis. Involucr.  
 commune 1phyllum, multiflo-  
 rum.  
 94. ARISTIDA. Cal. 2valvis. Cor. 2valvis: valva exte-  
 riori apice acistis 3.  
 78. ALOPECURUS. Cal. 2valvis. Cor. 1valvis: apice simpli-  
 ci. Nectarium 0.  
 77. PHLEUM. Cal. 2valvis truncatus mucronatus, sessilis.  
 74. PHALARIS. Cal. 2plex, uterque 2valvis: valvis exte-  
 rioris carinatis, aequalibus, co-  
 rollam includentibus.  
 73. PASPALUM. Cal. 2valvis: valvis subrotundis aequali-  
 bus figura corollae.  
 SYNTHESISMA. Cal. 2valvis: valvis planis; interiore mi-  
 nore. Cor. 2valvis plana lateribus  
 subamplexans.  
 79. MILIUM. Cal. 2valvis: valvis ventricosis, corolla  
 majoribus subaequalibus.  
 CALAMAGROSTIS. Cal. 2valvis subaequalis. Cor. basi pilis  
 cincta.  
 80. AGROSTIS. Cal. 2valvis: valvis acutis corolla brevioribus.

86. DACTYLIS. *Cal.* 2valvis: valvis concavis carinatis.  
 90. STIPA. *Cal.* 2valvis. *Cor.* arista terminali inarticulata longissima.  
 92. LAGURUS. *Cal.* 2valvis villosus. *Cor.* aristas 2 terminalibus et 1 dorsali.  
 MUHLENBERGIA. *Cal.* 1valvis minimus. *Cor.* 2valvis aequalis: valva exteriori aristata; interiori mucronata. *Nectarium* 2phyllum.  
 93. SACCHARUM. *Cal.* 2valvis, basi lanugine extus vestitus.

*Cinna.*

— — Flores biflori vagi.

1146. HOLCUS. *Flores* hermaphroditi et masculi. *Cal.* Glum. subbiflora 2valvis.  
 ♀. *Cor.* aristata. *Sem.* 1.  
 ♂. *Cor.* 0.  
 81. AIRA. *Flosculi* omnes hermaphroditi sine rudimento tertii. *Cal.* 2valvis.  
 82. MELICA. *Flosculi* omnes hermaphroditi. *Cal.* 2valvis. *Nectar.* 1phyllum, carnosum.  
 TRISETARIA. *Flosculi* omnes hermaphroditi. *Cal.* 2valvis. *Cor.* 2valvis: valva exteriori arista apice bipartita aliaque dorsali simplici.  
 1333. SPINIFEX. *Flosculi* hermaphroditi et masculi. *Cal.* Gluma 2valvis: valvis rachi parallelis. *Cor.* 2valvis, mutica.  
 1148. ISCHAEMUM. *Flosculi* hermaphroditi et masculi. *Cor.* 2valvis. *Stigm.* barbata. *Sem.* 1.  
 SEHIMA. *Flosculi* (interni) hermaphroditi et masculi. *Cal.* Glum. 2valvis, calice longior: valva interiori aristata. *Cor.* 2valvis.  
 ♀. *Cor.* aristata.  
 ♂. *Cor.* mutica.  
 1150. AEGILOPS. *Flosculi* hermaphroditi et masculi. *Cal.* Gluma cartilaginea subtriflora. *Cor.* Gluma terminata triplici arista. *Sem.* 1.

— — — Flores quadriflori vagi.

1044. TRIPSACUM. *Flores* monoici.

F 4

♂. *Cal.*

♂. *Cal.* Gluma 4flora. *Cor.* Gluma membranacea.

♀. *Cal.* Gluma sinub. perforat. *Cor.* Gluma 2valvis. *Sem.* 1.

— — — — — *Flores multiflori vagi.*

85. UNIOLA.

*Cal.* multivalvis, carinatus.

84. BRIZA.

*Cal.* 2valvis. *Cor.* cordata: valvis ventricosis, obtusis.

SAVASTANA.

*Cal.* 2valvis, 3flora: valvis subcarinatis subaequalibus.

83. POA.

*Cal.* 2valvis. *Cor.* ovata: valvis acutiusculis.

88. FESTUCA.

*Cal.* 2valvis. *Cor.* oblonga: valvis mucronatis.

89. BROMUS.

*Cal.* 2valvis. *Cor.* oblonga: valva exteriore sub apice aristata.

91. AVENA.

*Cal.* 2valvis. *Cor.* oblonga: valvis dorso aristata geniculata.

93. ARUNDO.

*Cal.* 2valvis. *Cor.* mutica, basi lanata.

\* *Dactylis glomerata.*

1359. ANTHISTIRIA.

*Cal.* aequaliter ad basin fissus in laciniis 4 aequales.

— — — — — *Flores spicati: receptaculo subulato.*

97. SECALE.

*Cal.* 2florus.

99. TRITICUM.

*Cal.* multiflorus.

98. HORDEUM.

*Involucr.* 6phyllum, 3florum. *Flos* simplex.

1360. ROTTBÖLLIA.

*Cal.* ovato-lanceolatus, planus, simplex f. 2partitus. *Floscul.* alterni in rachide flexuosa.

96. ELYMUS.

*Involucr.* 4phyllum, 2florum. *Flos* compositus.

95. LOLIUM.

*Involucr.* 1phyllum, 1florum. *Flos* compositus.

96. CYNOSURUS.

*Cal.* multiflorus, 2valvis: valvis linearibus acuminatis aequalibus. *Nectar.* 2phyllum.



TRIGYNIA.

\* Flores graminei, dioici.

1331. RESTIO. Cal. spica ovata, squamis imbricata. Cor. 6petala.  
♀. Stilus tubul. persistent. Caps. 3locularis, subrotunda, 6plicata.

\*\* Flores apetalis, diclini.

1280. CATURUS. ♂. Cal. o. Cor. 3fida.  
♀. Cal. 3partitus. aut. o. Cor. o. Caps. 3coeca.  
1102. EXCAECARIA. Amentum nudum. Cal. o.  
♀. Caps. 3coeca.  
1050. PHYLLANTHUS. Cal. 6partitus, campanulatus.  
♀. Stil. bifidi. Caps. 3locularis. Sem. solitaria.  
1060. AMARANTHUS. Cal. 3-5phyllus. Cor. o.  
♀. Caps. 1locularis, circumscissa. Sem. 1.

— — hermaphroditi.  
T superi.

102. PROSERPINACA. Cal. 3partitus. Sem. 1. 3loculare.

TT inferi.

- MEROREA. Cal. 6partitus persistens. Caps. obtuse 3gona, 6valvis, 6locularis: loculis 1spermis.  
1241. KOENIGIA. Cal. 3phyllus. Sem. 1. ovatum.  
108. QUERIA. Cal. 5phyllus. Caps. 1sperma.  
107. MINUARTIA. Cal. 5phyllus. Caps. 1locularis, polysperma.  
106. MOLLUGO. Cal. 5phyllus. Caps. 3locularis,

Tillaea.  
\*\*\* Flores corollati non glumacei.

101. MONTIA. Cor. 1petala. Cal. 2phyllus.  
100. ERIOCAULON. Cor. 3petala. Cal. compositus. Sem. 1. coronatum corolla.  
109. LECHEA. Cor. 3petala. Cal. 3phyllus. Caps. 3coeca.  
105. POLYCARPON. Cor. 5petala. Cal. 5phyllus. Caps. 3valvis.

104. HOLOSTEUM.

*Cor.* 5petala. *Cal.* 5phyllus. *Caps.* apice dehiscentes.*Moraea gladiata.*

## ENNEAGYNIA.

1100. EMPETRUM

*Flor.* dioici. *Cal.* 3partitus. *Cor.* 3petala.  
♂. *Stam.* longa.  
♀. *Bacca* 9sperma.

---

*Meryta.* *Forst. char. gen. pl. 60.*

---

MONO-

MONOGYNIA.

44. VALERIANA. Cal. 0. Cor. 1petala, basi hinc gibba, supera. Sem. 1. vel Capsula 3locularis.

\* floribus monandris.

- rubra. 1. V. floribus caudatis, foliis lanceolatis integerrimis. *Morif. hist. pl. 3. t. 14. f. 15.*  
 β) Valeriana angustifolia. *Pluckn. alm. t. 232. f. 3.*  
 Calcitrapa. 2. V. foliis pinnatifidis. *Morif. hist. pl. 3. t. 14. f. 7.*

\*\* floribus diandris.

- Cornucopia. 3. V. floribus ringentibus, foliis ovatis sessilibus. *Sabbat. h. rom. 2. t. 19.*  
 β?) Valeriana Saljunca. *Allion. fl. pedem. t. 70. f. 1.*

\*\*\* floribus triandris.

- dioica. 4. V. floribus dioicis, foliis pinnatis integerrimis. *Fl. dan. t. 687. Florem pro mare habitum Landini Gothorum semina matura tulisse refert Retzius. Obs. bot. fasc. 1. et Scopoli fl. carn. ed. 2. n. 40.*  
 officinalis. 5. V. foliis omnibus pinnatis dentatis. *Fl. dan. t. 570.*  
 Phu. 6. V. foliis caulinis pinnatis, radicalibus indivisis. *Regnault. bot. t. 9.*  
 tripteris. 7. V. foliis dentatis: radicalibus cordatis, caulinis ternatis ovato-oblongis. *Jacq. fl. austr. 3. t. 268.*  
 montana. 8. V. foliis ovato-oblongis subdentatis, caule simplici. *Jacq. fl. austr. 3. t. 269.*  
 celtica. 9. V. foliis ovato-oblongis obtusis integerrimis. *Planck. pl. med. t. 29. Flores interdum dioici.*  
 tuberosa. 10. V. foliis radicalibus lanceolatis integerrimis: reliquis pinnatifidis.

II. V.

Valeriana fructificatione omnium maxime differt, sexu staminumque numero, corolla regulari vel irregulari, fructu 1spermo vel (16. 17.) dispermo, nudo, coronato, papposo &c. an monandriae et diandriae Boerhaaviae generi accensendae?

- saxatilis. II. V. foliis subdentatis: radicalibus ovatis; caulinis lineari-lanceolatis. *Jacq. fl. austr. 3. p. 267. Flores dioices enunciat Retzius.*
- elongata. 12. V. foliis radicalibus ovatis, caulinis cordatis sessilibus inciso-subhastatis. *Jacq. fl. austr. 3. t. 219.*
- pyrenaica. 13. V. foliis caulinis cordatis dentatis petiolatis: summis ternatis. *Buxb. cent. 2. t. II.*
- scandens. 14. V. foliis ternatis, caule scandente.
- finensis. 15. V. foliis omnibus cordatis repando-lobatis. *Burm. ind. t. 6. f. 3.*
- Locusta. 16. V. caule dichotomo, foliis linearibus integerrimis. *Flor. dan. t. 738.*
- dentata. 17. V. caule dichotomo, foliis oblongis dentatis.
- vesicaria. α) V. calicibus inflatis: dentibus 6inflexis, involucellis pentaphyllis trifloris. *Boerb. ind. h. lugdb. 1. t. 75.*
- coronata. β) V. fructu sexdentato. *Col. ephr. 1. t. 209.*
- discoides. γ) V. fructu hypocrateriformi 12dentato: dentibus retrorsum uncinatis. *Morif. hist. plant. 3. t. 16. f. 29.*
- tridentata. δ) V. feminis corona tridentata. *Riv. mon. 6.*
- radiata. ε) V. involucro flores cingente.
- pumila. ζ) V. foliis imis dentatis: summis linearibus multifidis. *Lob. ic. 716.*
- mixta. 18. V. caule quadrifido, foliis imis dentatis, feminum pappo plumoso.
- echinata. 19. V. floribus regularibus, foliis dentatis, fructu lineari tridentato: extimo majore recurvato. *Col. ephr. 1. t. 206.*
- \*\*\*\* floribus tetrandris.
- supina. 20. V. involucellis hexaphyllis trifloris, foliis integris. *Mant. p. 27. Ard. spec. 2. t. 3.*
- fibrica. 21. V. floribus aequalibus, foliis pinnatifidis, feminibus paleae ovali adnatis. *Hall. comm. Goetting. 1751. t. 9.*
- villosa. 22. V. floribus aequalibus, foliis inferioribus auriculatis: superioribus dentatis villosis. *Thunb. fl. jap. p. 32.*

**FISSILIA.** *Cor.* fissilis in 3petala conniventia *Cal.* urceolatus integer. *Stam.* 5 sterilia. *Nux* isperma, calice tecta.

*psittacorum.* 1. FISSILIA. *Jussieu gen. plant. p. 260.*

45. **OLAX.** *Cal.* integer. *Cor.* infundibuliformis, 3fida. *Nectario* 4phylo.

*zeylanica.* 1. OLAX.

**MACROLOBIUM.** *Cal.* 2plex. *Cor.* 5petala, inaequalis. *Filamenta* 4, quorum 1 sterile. *Legumen* ovatum, compressum,iloculare, ispermum.

*Vuapa.* 1. M. foliis binatis, legumine altero latere acuto bialato. *Aubl. pl. guj. 1. p. 25. t. 7.*

*Simira.* 2. M. foliis binatis, legumine margine undique rotundato. *Aubl. pl. guj. 1. p. 27. t. 8. an satis distinctum a Vuapa?*

*Utea.* 3. M. foliis bijugis. *Aubl. pl. guj. 1. p. 28. t. 9.*

**ROHRIA.** *Cal.* campanulatus, 5partitus: laciniis ciliatis. *Cor.* 5petala: *Petala* 2 superiora majora; lamina inflexo-cucullata. *Filamenta* introrsum lanata. *Germen* tomentosum. *Stigm.* 3 revoluta.

*Schreberi.* 1. R. floribus triandris. *Schreb. gen. pl. Linn. p. 30.*

*Tapura.* 2. R. filamentis quinque, duobus brevioribus sub sterilibus. *Aubl. pl. guj. 1. p. 126. t. 48. an hujus generis?*

46. TAMARINDUS. *Cal.* 4partitus. *Petala* 3.  
*Nectarium* setis 2 brevioribus sub filamentis. *Legumen* pulposum.

indica I. TAMARINDUS. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 13.*

1226. ELATE. *Flores* monoici. *Cor.* 3petala.  
 ♀. *Drupa* ovata, acuminata.

sylvestris. I. E. frondibus pinnatis: foliolis oppositis. *Thunb. nov. act. Stockb. 1782. p. 285. Rheed. b. mal. 3. t. 22-25.*

1048. TRAGIA. *Flores* monoici. *Cor.* 0.  
 ♂. *Cal.* 3partitus.  
 ♀. *Cal.* 5partitus. *Stil.* 3fidus.  
*Caps.* 3cocca, 3ocularis. *Sem.* solitaria.

volubilis. I. Tr. foliis cordato-oblongis, caule volubili. *Rumpf amb. 5. t. 9.*

involucrata. 2. Tr. bracteis femineis pentaphyllis pinnatifidis. *Jacq. ic. pl. rar. t. 56. Caps. plures 2valves, receptaculo communi affixae.*

Mercurialis. 3. Tr. foliis ovatis. *Plum. ic. t. 172. f. 2.*

urens. 4. Tr. foliis lanceolatis obtusis subdentatis urentibus. *Pluckn. alm. t. 107. f. 5.*

innocua. 5. Tr. foliis lanceolatis subdentatis pilosis, spica terminali. *Walt. flor. carol. p. 229.*

Chamaelea. 6. Tr. foliis lanceolatis obtusis integerrimis. *Burm. fl. zeyl. t. 52.*

cannabina. 7. Tr. foliis tripartitis. *Suppl. p. 415. Syst. nat. XII. 3. p. 635. n. 18. 21. Croton hastatum et urens. Pluckn. phyt. 120. f. 6.*

1049. HERNANDIA. Flores monoici.

♂. Cal. 3partitus. Cor. 3petala.

♀. Cal. truncatus integerrimus, persistens inflatus. Cor. 6petala. Nux supera, calice inflato vestita. Semen globosum.

sonora. 1. H. foliis peltatis. Jacq. stirp. amer. pict. 120.

ovigera. 2. H. foliis ovatis basi petiolatis. Rumpf amb. 3. t. 123. Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 40. f. 3.

gujanensis. 3. H. foliis plicatis ovato-acuminatis. Aubl. pl. guj. 2. p. 848. t. 329.

1224. PHOENIX. Flores dioici. Cal. 6phyllus. Cor. o.

♀. Drupa ovata, supera, mollis: putamine membranaceo.

dactylifera. 1. Ph. frondibus pinnatis: foliolis complicatis ensiformibus, putamine fibroso. Thunb. nov. act. Stockh. 1782. p. 286. Kaempfer. amoen. exot. t. 1. 2. f. 1. 2. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 9. f. 2.

pufilla. 2. Ph. fructu minore: putamine tenuissimo. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. p. 24. t. 9. f. 2.

1101. OSYRIS. Flores subdioici. Cor. o. Cal. 3fidus.

♀. Stil. o. Stigm. subrotundum. Drupa 1ocularis.

alba. 1. O. foliis linearibus. Label. ic. 432.

japonica. 2. O. foliis ovatis florigeris. Thunb. fl. jap. p. 31.

1431. MABA. Flores dioici. Cal. et Cor. 3fida.

♀. Drupa supera, 2ocularis.

elliptica. 1. MABA. Suppl. p. 426.

1168. FICUS. *Receptaculum* commune, turbina-  
tum, carnosum, connivens, oc-  
cultans flosculos aperalos vel in  
eodem vel in distincto.

♂. *Cal.* 3partitus.

♀. *Cal.* 5partitus. *Sem.* 1.

- Carica. 1. F. foliis trilobis subtus scabris, receptaculis laevibus turbina-  
tis umbilicatis. *Knorr del. hort. 1. t. F.*
- Sycomo- 2. F. foliis cordatis subrotundis integerrimis subtus tomentosis.  
rus. *Pluckn. phyt. t. 173. f. 3.*
- nymphae- 3. F. foliis cordatis subrotundis mucronatis integerrimis gla-  
ifolia. bris subtus glaucis. *Mant. p. 305.*
- religiosa. 4. F. foliis cordatis oblongis integerrimis acuminatissimis.  
4. *Mant. p. 504. Rheed. h. mal. 1. t. 27.*
- benjami- 5. F. foliis ellipticis obtusis glabris, receptaculis acutis sessilibus.  
na. *Mant. p. 129. Rheed. h. mal. 1. t. 26.*
- bengha- 6. F. foliis ovatis cordatis integerrimis glabris obtusiusculis,  
lensis. basi quinquenerviis, ramis deflexis. *Trew Euret t. 50.*
- peduncu- 44. F. foliis ovato-oblongis cordatis integerrimis acutis gla-  
lata. bris, fructibus globosis pedunculis geminis elongatis. *Ait. hort. Kew. 3. p. 450. Pluckn. alm. t. 178. f. 4.*
- lucida. 45. F. foliis ovatis cordatis integerrimis glabris obtusis basi  
45. trinerviis, ramis erectis. *Ait. hort. Kew. 3. p. 451.*
- indica. 7. F. foliis oblongis cuspidatis glabris integerrimis, peduncu-  
7. lis aggregatis, caule arborea: fructibus subglobosis ramis  
radicantibus reflexis. *Rheed. h. malab. 3. t. 57.*
- β) *Ficus citrifolia. Catesb. car. 3. t. 18.*
- virens. 46. F. foliis oblongis acuminatis, integerrimis laevibus basi  
46. angustato-rotundatis. *Ait. hort. Kew. 3. p. 451. Sloan. jam. 2. t. 223.*
- venosa. 47. F. foliis ovatis subcordatis acutis integerrimis laevibus su-  
47. pra punctato-impresis. *Rheed. h. malab. 3. t. 64.*
- costata. 48. F. foliis ovatis cordatis, sinu profundo angustis; integerrimis  
48. glabris acutis utrinque viridibus. *Ait. hort. Kew. 3. p. 452.*
49. F.

*An huic ficus generi accensendae quoque Perebea Aubl. pl. guj. 2. p. 952. t. 361.  
et Cassipoa Aubl. pl. guj. 2. p. 955. t. 362?*



- coriacea. 49. F. foliis oblongis laevibus basi attenuatis cordatis coriaceis: venis immerfis. *Ait. hort. Kew. 3. p. 453.*
- racemosa. 8. F. foliis elliptico-oblongis acutis glabris subtus pallidis, caule arboreo, ramis erectis, receptaculis pedunculatis. *Rheed. h. mal. 1. t. 25.*
- pertusa. 9. F. foliis oblongis cuspidatis glabris, receptaculis globosis pedunculatis umbilicatis. *Suppl. p. 442. Plum. ic. 132. f. 2.*
- retusa. 10. F. foliis obovatis oblongis obtusissimis, ramis angulatis, fructibus sessilibus. *Mant. p. 129.*
- pumila. 11. F. foliis oblongo ovatis obtusis glabris subtus reticulatis, caule decumbente, fructibus pedunculatis. *Rumpf amb. 3. t. 85.*
- toxicaria. 12. F. foliis cordatis sinuatis subtus tomentosis, receptaculis tomentosis. *Mant. p. 305. pro venenatissima habetur.*
- maculata. 13. F. foliis oblongis acuminatis ferratis. *Plum. ic. 131. f. 1. an cum hispida conjungenda?*
- trigona. 14. F. foliis ovatis obtusis glabris, caule erecto, receptaculis umbilico triangulari. *Suppl. p. 441. Plum. ic. 132. f. 1.*
- hispida. 15. F. foliis oblongis cuspidatis pilosis ferratis, receptaculis pedunculatis strigoso hispida. *Suppl. p. 442.*
- heterophylla. 16. F. foliis oblongis indivisis incisisque oblongis acutis scabris, caule hispido, fructu pedunculato glabro. *Suppl. p. 442.*
- microcarpa. 17. F. foliis oblongis breviter petiolatis trinerviis venosis glaberrimis, fructu globoso parvo sessili. *Suppl. p. 442. nonne varietas benjaminæ?*
- vasta. 18. F. foliis cordato-ovatis obtusis integris glabris nitidis coriaceis. *Forsk. flor. aeg. arab. p. 179.*
- morifolia. 19. F. foliis cordato-ovatis acutis ferratis utrinque scabris petiolo longioribus alternis. *Forsk. fl. aeg. ar. p. 179.*
- palmata. 20. F. foliis cordato-lanceolatis palmatis ferratis scabris flexilibus. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 179.*
- ferrata. 21. F. foliis ovato-lanceolatis palmatis scabris crenato repandis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 179.*
- Sur. 22. F. foliis lanceolatis repandis glaberrimis basi subcordatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 180.*
- Chanas. 23. F. foliis cordatis integerrimis scabris. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 219.*

- Toka. 24. F. foliis distichis scabris ovato-lanceolatis integris alternis petiolatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 219.*
- Taab. 25. F. foliis ovatis integris petiolatis conjugatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 219.*
- aspera. 26. F. foliis oblique cordatis sinuato-dentatis utrinque asperis, fructibus turbinatis, calicis margine obsoleto adnato. *G. Forster pl. escul. austr. p. 36.*
- Granatum. 27. F. foliis ovatis integerrimis, pedunculis terminalibus geminis horizontaliter divergentibus, fructibus caliculatis globosis. *Forst. pl. esc. austr. p. 37.*
- americana. 28. F. foliis ovatis oblongis venosis integerrimis, baccis axillaribus pedunculatis confertis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 127.*
- scabra. 29. F. foliis cordato-ovatis obliquis integris subtus scabris, fructibus turbinatis caliculatis. *Forst. fl. austr. p. 76.*
- septica. 30. F. foliis obliquis oblongo-ovatis acuminatis, pedunculis geminis apice caliculatis, fructibus verrucosis. *Forst. fl. austr. p. 76.*
- obliqua. 31. F. foliis lanceolatis glaberrimis margine cartilagineis, pedunculis geminis brevissimis; calicibus caducis longitudine fructus. *Forst. fl. austr. p. 77.*
- prolixa. 32. F. foliis lanceolato-oblongis acuminatis subtus punctatis, pedunculis geminis apice caliculatis. *Forst. fl. austr. p. 77.*
- cordata. 33. F. foliis subcordatis ovatis acutis glabris coriaceis, caule fruticoso erecto. *Thunb. fic. n. 6.*
- stipulata. 34. F. foliis oblique cordatis obtusis glabris, caule decumbente squamoso. *Thunb. fic. gen. n. 7.*
- falcata. 35. F. foliis oblongis falcatis glabris, caule filiformi radicante. *Thunb. fic. gen. n. 8.*
- punctata. 36. F. foliis oblongis emarginatis glabris subtus punctatis, caule flexuoso radicante. *Thunb. fic. gen. n. 9.*
- erecta. 37. F. foliis oblongis acutis glabris subtus reticulatis, caule decumbente: ramis erectis, fructibus pedunculatis. *Thunb. fic. gen. n. 11.*
- nitida. 38. F. foliis ellipticis acutis glabris, receptaculis retuso-umbilicatis sessilibus. *Thunb. fic. n. 14.*
- reflexa. 39. F. foliis ellipticis obtusis glabris, ramis recurvis, receptaculis globosis sessilibus. *Thunb. fic. n. 16.*

- drupacea. 40. F. foliis obovatis cuspidatis glabris, receptaculis ovatis rugosis sessilibus. *Thunb. fic. n. 19.*  
 reticulata. 41. F. foliis ellipticis subangulatis cuspidatis glabris subtus reticulatis, receptaculis solitariis globosis pedunculatis. *Thunb. fic. n. 21.*  
 sinuata. 42. F. foliis ellipticis sinuato-dentatis cuspidatis glabris, receptaculis globosis aggregatis pedunculatis. *Thunb. fic. n. 22.*  
 capensis. 43. F. foliis ovatis acutis glabris ferratis, receptaculis pedunculatis glabris. *Thunb. fic. n. 23.*

47. RUMPFIA. *Cal.* 3fidus. *Petala* 3. *Drupa* 3locularis.

amboinensis. I. RUMPFIA. *Rheed. b. malab. 4. t. II.*

48. CNEORUM. *Cal.* 3dentatus. *Petala* 3aequalia. *Drupa* 3congregata, 2locularis. *Sem.* solitario.

triccoccon. I. CNEORUM. *Kniph. bot. orig. cent. 2. n. 17. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 70. f. 4.*

49. COMOCLADIA. *Cal.* 3partitus. *Cor.* 3partita. *Drupa* oblonga: nucleo bilobo.

integrifolia. I. C. foliolis integris. *Sloan. hist. jam. 2. t. 222. f. 1. Lignum durissimum.*

dentata. 2. C. foliolis spinoso-dentatis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 259. f. 2. Stercus olens, succo nigro vix eluendo.*

ilicifolia. 3. C. foliolis angulato spinosis. *Syst. nat. XII. 3. p. 130. Ilex Dodonaea. Plum. ic. 118. f. 1.*

50. MELOTHRIA. *Cal.* 5fidus. *Cor.* campanulata, 1petala. *Bacca* 3locularis, polysperma.

pendula. I. MELOTHRIA. *Plum. ic. 66. f. 2. Flores variis mere masculi.*

1092. CUCUMIS. Flores monoici. Cal. 5dentatus.  
 Cor. 5partita.  
 ♂. Antherae infra connexae.  
 ♀. Pistill. 3fidum. Pomi femina  
 arguta.

- Colocyn- 1. C. foliis multifidis, pomis globosis glabris. *Blackw. herb.*  
 this. t. 441.
- propheta- 2. C. foliis cordatis quinquelobis denticulatis obtusis, pomis  
 rum. globosis spinoso-muricatis. *Jacq. b. Vind. 1. t. 9.*
- Anguria. 3. C. foliis palmato-sinuatis, pomis globosis echinatis. *Gilci  
 e Xvarez obs. filol. 1. t. 9.*
- africanus. 4. C. foliis palmato-sinuatis, caule angulato, pomis ovalibus  
 echinatis. *Suppl. p. 423. Herm. parad. bat. t. 134.*
- acutangu- 5. C. foliis rotundato-angulatis, pomis angulis decem acutis,  
 lus. *Jacq. b. Vind. 3. t. 73.*
- Melo. 6. C. foliorum angulis rotundatis, pomis torulosis. *Blackw.  
 herb. t. 329.*
- Dudaim. 7. C. foliorum angulis rotundatis, pomis sphaericis: umbilico  
 retuso. *Dill. elth. t. 77. f. 218.*
- Chate. 8. C. hirsutus, foliorum angulis integris rotundatis, pomis fu-  
 siformibus utrinque attenuatis hirtis. *Pr. Alp. aeg. t. 116.*
- fativus. 9. C. foliorum angulis rectis, pomis oblongis scabris. *Blackw.  
 herb. t. 4.*
- anguinus. 10. C. foliis lobatis, pomis cylindricis longissimis laevibus con-  
 tortuplicatis. *Rumpf. amb. 5. t. 148.*
- flexuosus. 11. C. foliis angulato-sublobatis, pomis cylindricis fulcatis  
 curvatis.
- Cono- 12. C. foliis angulato-sublobatis dentatis, pomis fusiformibus  
 mon. decemfulcatis glabris. *Thunb. fl. jap. p. 324.*
- madera- 13. C. foliis cordatis integris denticulatis, pomis globosis gla-  
 spatatus. bris. *Pluckn. alm. t. 170. f. 2.*
- glaber. 14. C. caule laevi, foliis cordato-angulatis. *Walt. flor. carol.  
 p. 240.*

1091. CUCURBITA. Flores monoici. Cor. 5fida.  
Cal. 5fidus.

♂. Antherae basi connexae.

♀. Pistill. 5fidum. Pomi se-  
mina margine tumida.

lagenaria. 1. C. foliis subangulatis tomentosis basi subtus biglandulosis,  
pomis lignosis. *Blackw. herb. t. 522. a. b.*

hispida. 2. C. foliis angulatis: petiolis cauleque hispidis. *Thunb. fl.  
jap. p. 322.*

ovifera. 3. C. foliis lobatis, cirrhis septeno-digitatis, pomis obovatis.

Pepo. 4. C. foliis lobatis, pomis laevibus.

verrucosa. 5. C. foliis lobatis, pomis nodoso-verrucosis.

Melopepo. 6. C. foliis lobatis, caule erecto, pomis depressis nodosis.

Citrullus. 7. C. foliis multipartitis, pomis oblongis. *Blackw. herb. t. 157.*

mammo- 8. C. foliis multipartitis, pomis sphaeroideis mammillaribus.  
fa. *Molin. hist. nat. Chil. p. 111.*

siceraria. 9. C. foliis angulato-sublobatis tomentosis, pomis lignosis glo-  
bosis. *Molin. hist. nat. Chil. p. 110.*

1090. MOMORDICA. Flores monoici. Cor. 5par-  
tita. Cal. 5fidus.

♂. Antherae basi connexae.

♀. Stil. 3fidus. Pomum ela-  
stice diffiliens.

Balsami- 1. M. pomis angulatis tuberculatis, foliis glabris patenti-pal-  
na. matis. *Knorr del. hort. 1. t. B. 3.*

Charan- 2. M. pomis angulatis tuberculatis, foliis villosis longitudinali-  
tia. ter palmatis. *Mill. illustr. ic.*

opercula- 3. M. pomis angulis tuberculatis apice deciduo operculatis, fo-  
ta. liis lobatis. *Comm. rar. t. 22.*

Luffa. 4. M. pomis oblongis: sulcis catenulatis, foliis incis. *Rumpf  
amb. 5. t. 148.*

cylindrica. 5. M. pomis cylindricis longissimis, foliorum angulis acutis.

- trifoliata. 6. M. pomis ovatis muricatis, foliis ternatis dentatis. *Rumpf amb. 5. t. 152. f. 2.*
- pedata. 7. M. pomis friatis, foliis pedatis ferratis. *Feuill. per. I. t. 41.*
- Elaterium. 8. M. pomis hispidis, cirrhis nullis. *Regn. bot. t. 280.*

**CERATOSANTHES.** *Flores* monoici. *Cal.* 5dentatus. *Cor.* 5partita: laciniis 2 cornibus.

♂. *Antherae* basi connexae.

♀. *Stigm.* 3. *Pomum* oblongum, 4loculare, polyspermum.

tuberosa. I. **CERATOSANTHES.** *Jussieu gen. plant. p. 396.*

1089. **TRICHOSANTHES.** *Flores* monoici. *Cal.* 5dentatus. *Cor.* 5partita, ciliata.

♂. *Antherae* basi connexae.

♀. *Stil.* 3fidus. *Pomum* oblongum.

- Anguina. 1. Tr. pomis teretibus oblongis incurvis. *Mant. p. 497. Sabb. h. rom. 1. t. 71.*
- nervifolia. 2. Tr. pomis ovatis acutis, foliis cordatis oblongis trinerviis dentatis. *Rheed. h. mal. 8. t. 17.*
- cucumerina. 3. Tr. pomis ovatis acutis, foliis cordatis angulatis. *Rheed. h. malab. 8. t. 15.*
- amara. 4. Tr. pomis turbinato-ovatis. *Plum. amer. t. 101.*
- foetidissima. 5. Tr. pomis hirsutis ex basi subrotunda subulatis. *Jacq. coll. 2. p. 341.*

1093. BRYONIA. Flores diclini. Cal. 5dentatus.

Cor. 5partita.

♂. Antherae basi connexae.

♀. Stil. 4fidus. Bacca subglobosa, ut plurimum isperma.

\* floribus dioicis.

dioica. 1. Br. foliis palmatis utrinque calloso-scabris. *Jacq. fl. austr. t. 199.*

\*\* floribus monoicis.

alba. 2. Br. foliis palmatis utrinque calloso-scabris. *Flor. dan. t. 813. Flores interdum sandri.*

palmata. 3. Br. foliis palmatis laevibus quinquepartitis: laciniis lanceolatis repando-ferratis.

grandis. 4. Br. foliis cordatis angulatis basi subtus glandulosis. *Mant. p. 126. Burm. fl. zeyl. t. 19. f. 2.*

cordifolia. 5. Br. foliis cordatis oblongis quinquelobis dentatis scabris: petiolis bidentatis.

laciniosa. 6. Br. foliis palmatis: laciniis lanceolatis ferratis: petiolis muricatis.

africana. 7. Br. foliis palmatis quinquepartitis utrinque laevibus: laciniis pinnatifidis. *Herm. parad. bat. t. 108.*

cretica. 8. Br. foliis palmatis supra calloso-punctatis.

latebrosa. 9. Br. foliis subtrilobis pilosis basi attenuatis. *Ait. hort. Kew. 3. p. 384.*

verrucosa. 10. Br. foliis cordatis angulatis supra ramisque subtus calloso-scabris: callis remotis, cirrhis simplicibus, baccis globosis. *Ait. hort. Kew. 3. p. 385.*

scabra. 11. Br. foliis cordatis angulatis dentatis supra calloso-punctatis, infra pilosis, utrinque scabris, floribus umbellatis. *Suppl. p. 423.*

scabrella. 12. Br. foliis cordatis quinquangulatis dentatis scaberrimis eglandulatis. *Suppl. p. 124.*

japonica. 13. Br. foliis cordatis indivisis angulatisque dentatis inermi-hispidis. *Thunb. fl. jap. p. 325.*

racemosa. 14. Br. foliis cordatis trilobis: superioribus ovatis scabriusculis, floribus racemosis, baccis nutantibus ovalibus. *Plum. fil. t. 97.*

1094. SICYOS. Flores monoici. Cal. 5dentatus.  
Cor. 5partita.  
♂. Antherae basi connexae.  
♀. Stil. 3fidus. Drupa isperma.

angulata. 1. S. foliis angulatis. *Dill. b. Elth. t. 51. f. 59.*

laciniata. 3. S. foliis laciniatis. *Plum. ic. 243.*

Garcini. 4. S. foliis quinquepartitis eroso-dentatis, fructibus ciliatis. *Mant. p. 297. Burm. fl. ind. t. 57. f. 3.*

edulis. 2. S. foliis angulatis basi cordatis lobatis, fructu oblongo echinato. *Jacq. stirp. amer. t. 163.*

GLOCHIDION. Flores monoici. Cal. o.  
♂. Cor. 6petala patens. Antherae  
basi connexae.  
♀. Cor. 6partita, infera. Stil. o.  
Stigm. 6-8. Caps. 6locularis,  
dehiscens. Sem. solitaria.

ramiflorum. 1. GLOCHIDION. *Forst. char. gen. p. 57. t. 57.*

1139. RUSCUS. Flores ut plurimum dioici. Cor. o.  
Cal. 6phyllus. Nectarium  
centrale, ovatum, apice perforatum.  
♂. Antherae connexae.  
♀. Bacca 3locularis. Sem. ut plurimum 2.

aculeatus. 1. R. foliis supra floriferis nudis. *Mill. illustr. ic.*

Hypophyllum. 2. R. foliis subtus floriferis nudis. *Blackw. herb. t. 194.*



- Hypoglossum. 3. R. foliis subtus floriferis sub foliolo. *Blackw. herb. t. 128.*  
 androgynus. 4. R. foliis margine floriferis. *Dill. b. Elth. t. 250. f. 332.*  
 racemosus. 5. R. racemo terminali hermaphroditico. *Morif. hist. pl. 3. t. 5. f. 14.*

1289. ROTALA. Cal. 3dentatus. Cor. o. Caps. 3  
 locularis, polysperma.

verticillaris. I. ROTALA. *Mant. p. 175. Rheed. b. malab. 9. t. 81.*

51. ORTEGIA. Cal. 5phyllus. Cor. o. Caps. 1o-  
 cularis. Sem. plurima.

hispanica. I. O. floribus subverticillatis, caule simplici. *Mant. p. 325.*  
 dichotoma. 2. O. floribus solitariis axillaribus, caule dichotomo. *Allion. alip. t. 4. f. 1. Syst. nat. XII. 3. p. 74. Ortega hispanica.*

CHELIDURUS. Cal. 4phyllus. Cor. 5petala: petalis  
 inaequalibus; superioribus 2  
 maximis. Germen pedicellatum.  
 Fructus.

ignotus. I. CHELIDURUS. *Willdener ap. Cothen. dispos. plant. meth. p. 4.*

52. LOEFLINGIA. Cal. 5phyllus. Cor. 5petala mi-  
 nima. Caps. 1ocularis,  
 3valvis.

hispanica. I. L. ramis pubescentibus viscidis. *Aët. Stockb. 1758. t. 1. f. 1.*  
 caspica. 2. L. tota laevis. *S. G. Gmelin it. 3. p. 310. t. 35. f. 1.*  
 indica. 3. L. caulibus depressis foliis subtetragonis lanceolatis, stipulis  
 scariosis, pedunculis dichotomis. *Koen. apud Retz, obs. bot. 4. p. 8. Mant. p. 562. Pharnaceum depressum.*

53. POLYCNEMUM. Cal. 5phyllus. Cor. o. Caps.  
ovata, stilo coronato, eval-  
vis, isperma.

arvense. 1. P. foliis cartilagineis prismaticis. *Jacq. fl. austr. 4. t. 365.*

scle- 2. P. foliis carnosis teretibus. *Pall. it. 3. p. 725. t. M. f. 2. Ec.*  
spermum. *an hujus generis?*

oppositi- 3. P. foliis carnosis semicylindricis, floribus pentandris. *Pallas*  
folium. *it. 1. p. 484. t. E. f. 2. an hujus generis?*

monan- 4. P. foliis linearibus acutis, floribus monandris. *Pall. it. 1.*  
drum. *p. 483. t. D. f. 1. an hujus generis?*

ALTERNANTHERA. Cal. 5phyllus. Cor. o. Fi-  
lamenta 6, alterna ste-  
rilia. Stigma 2fidum.  
Sem. solitaria.

repens. 1. ALTERNANTHERA. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 28.*

1320. AGYNEJA. Flores monoici. Cal. 6phyllus.  
Cor. o.

♂. Antherae pistilli rudimento  
adnatae.

♀. Germen apice perforatum sine  
stilo et stigmate.

impubes. 1. A. foliis utrinque glabris. *Mant. p. 296.*

puber. 2. A. foliis subtus tomentosis. *Mant. p. 296.*

TONSELLA. Cal. persistens, 5partitus. Cor. 5pe-  
tala, persistens. Bacca sphae-  
rica,ilocularis, 4sperma.

scandens. 1. TONSELLA. *Aubl. pl. guj. 1. p. 31. t. 10.*

54. HIPPOCRATEA. Cal. 5partitus. Petala 5.  
Caps. 3. obcordatae.

volubilis. I. H. racemis corymbosis, foliis ovato-lanceolatis ferratis.  
*Jacq. stirp. amer. pict. t. 12.*

comosa. 2. H. paniculis comosis: pedunculis multifidis capillaribus, fo-  
liis ovatis acuminatis integerrimis. *Swartz nov. pl. gen.  
et sp. p. 17.*

1273. STILAGO. Cal. 1phyllus subtrilobus. Cor. o.  
Filamenta germini vicina.  
Bacca globosa.

Bunius. I. STILAGO. *Mant. p. 122. Rumpf amb. 3. t. 131.*

1326. SALACIA. Cal. 5partitus. Cor. 5petala. An-  
therae germinis apici insi-  
dentes.

finensis. I. SALACIA. *Mant. p. 293.*

VOGELIA. Cor. 3fida, medio coarctata. Spath.  
ivalvis. Stigm. 3patula. Caps. 3qua-  
tra, ilocularis, polysperma.

capitata. I. VOGELIA. *Walt. flor. carol. p. 69.*

55. CROCUS. Cor. 6partita, aequalis. Stigmata  
convoluta.

fativus. I. Cr. spatha univalvi radicali, corollae tubo longissimo.

officina-  
lis. α. Cr. autumnalis, foliis angustioribus margine revolutis.  
*Blackw. herb. t. 144. f. 1.*

vernus. β. Cr. vernalis, foliis latioribus margine patulis. *Jacq. fl.  
austr. 5. app. t. 36.*

WITSENIA. Cor. 6partita, cylindrica. Stigma  
emarginatum.

maura. I. WITSENIA. *Thunb. nov. pl. gen. 2. p. 34. ic. Mant. pl.  
p. 175. Antholyza maura.*

TAPEI-

**TAPEINIA.** Cor. tubulosa: limbo profunde 6partito. Stigma 3fidum.

magellanica. I. TAPEINIA. *Jussieu gen. plant. p. 59.*

**56. IXIA.** Cor. 1petala tubulosa: tubo recto filiformi; limbo 6partito, campanulato aequali. Stigm. 3 simplicia.

\* caule ramisque foliosis.

fruticosa. I. I. caule ramoso, foliis imbricatis tecto. *Thunberg de ixia. p. 1. n. 1. cum ic.*

\*\* scapo foliis brevior.

minuta. 2. I. scapis unifloris, foliis laevibus. *Thunberg de ixia. n. 2. cum ic.*

Bulbocodium. 3. I. scapo ramoso, floribus solitariis, foliis sulcatis reflexis. *Mant. p. 320. Mill. ic. 240. Jacq. call. 3. p. 265.*  
β) *Ixia rosea. Syst. nat. XII. 3. p. 75. n. 12.*

humilis. 4. I. scapo ramoso, floribus secundis, foliis sulcatis erectis. *Thunb. de ixia. n. 4.*

rubro-cyanea. 24. I. scapo subquinquefloro, foliis ensiformibus villosis, corollae limbo patentissimo. *Jacq. coll. 3. p. 268.*

\*\*\* scapo foliis longiore.

— hirsutae.

pilosa. 5. I. foliis linearibus pilosis, floribus alternis. *Thunb. de ixia. n. 5.*

villosa. 30. I. foliis oblongo-lanceolatis acutis villosis subplicatis distichis, corollae tubo spathae aequali. *Ait. hort. Kew. 1. p. 58.*

hirta. 6. I. foliis ensiformibus hirtis, floribus secundis. *Thunb. de ixia. n. 6.*

Lapeiron-sia. 34. I. foliis ensiformibus nervosis margine subspinosis, corollae infundibuliformi: tubo longissimo. *Pourret act. Toulous. 3. t. 6.*

secunda. 7. I. foliis elliptico-ensiformibus, scapo villoso-scabro. *Thunb. de ixia. n. 7. Syst. nat. XII. 3. p. 75. n. 5? Ixia flexuosa. Mill. ic. 156. f. 2?*

— gla-

— glabrae.

† foliis crispis.

crispa. 8. I. foliis linearibus, floribus alternis. *Thunb. de ixia. n. 8. c. ic.*

cinnamo-9. I. foliis lanceolatis, floribus alternis. *Thunb. de ixia. n. mea. 9. c. ic.*

corymbo-10. I. foliis lanceolatis, scapo ancipiti. *Flores caerulei. fa.*

†† foliis aequalibus.

linearis. 11. I. foliis linearibus, scapo simplici erecto. *Thunb. de ixia. n. 11.*

capillaris. 12. I. foliis linearibus, scapo polystachyo, bracteis scariosis. *Thunb. de ixia. n. 12. cum ic.*

setacea. 13. I. foliis linearibus, scapo flexuoso glabro. *Thunb. de ixia. n. 13.*

scillaris. 14. I. foliis linearibus, floribus secundis, rachide flexuosa. *Thunb. de ixia. n. 14.*

aristata. 15. I. foliis linearibus, bracteis aristato-dentatis. *Thunb. de ixia. n. 15.*

squalida. 31. I. foliis lineari-lanceolatis, floribus alternis sessilibus: tubo bracteis longiore, laminis ovato-oblongis. *Ait. hort. Kew. I. p. 61.*

deusta. 32. I. foliis lanceolatis nervosis, foliis alternis sessilibus: tubo bracteis brevioris, laminis obtusis. *Ait. hort. Kew. I. p. 60.*

patens. 33. I. foliis subeniformibus, racemo terminali: corollis campanulatis patulis. *Ait. hort. Kew. I. p. 59.*

pendula. 16. I. foliis lineari-ensiformibus, scapo polystachyo; spicis pendulis. *Thunb. de ixia. n. 16.*

bulbifera. 17. I. foliis ensiformibus, bracteis membranaceis setaceo-laceris. *Mill. ic. 236. f. 2.*

anlica. 29. I. foliis ensiformibus planis nervosis, floribus racemosis: bracteis integris. *Ait. hort. Kew. I. p. 57.*

erecta. 18. I. foliis ensiformibus, scapo polystachyo, floribus alternis immaculatis. *Syst. nat. XII. 3. p. 75. n. 6. Ixia polystachya. Mill. ic. 155. f. 2.*

maculata. 19. I. foliis ensiformibus, scapo polystachyo, floribus alternis: corollis basi maculatis. *Mill. ic. 156. f. 1.*

- crocata. 20. I. foliis ensiformibus, floribus secundis: corollis basi hyalino-fenestratis. *Mill. ic. 239. f. 2.*
- Lencea. 21. I. foliis ensiformibus, floribus secundis, scapo simplici flexuoso. *Thunb. de ixia. n. 21.*
- pentandra. 22. I. foliis ensiformibus, floribus pentandris. *Thunb. de ixia. n. 22. Syst. nat. XII. 3. p. 75. n. 7. Ixia scillaris.*
- falcata. 23. I. foliis ensiformibus reflexo-falcatis. *Thunb. de ixia. n. 23. c. ic.*
- polystachya. 25. I. foliis ensiformibus rigidulis, spicis terminali axillaribusque secundis. *Jacq. coll. 3. p. 269.*
- fenestrata. 26. I. foliis ensiformibus distichis, caule subsimplicissimo, floribus terminalibus spicatis sessilibus remotis secundis. *Jacq. coll. 3. p. 270.*
- excisa. 24. I. foliis ovatis, floribus secundis, scapo flexuoso. *Thunb. de ixia. n. 24. c. ic.*

\*\*\*\* scapo foliis aequali.

- villosula. 27. I. foliis ensiformibus villosis, floribus secundis. *Jacq. coll. 3. p. 267.*
- purpurea. 28. I. foliis ensiformibus villosis, floribus sparsis. *Jacq. coll. 3. p. 268.*

57. GLADIOLUS. Cor. 6partita, tubulosa ringens.  
Stamina adscendentia.

- communis. 1. Gl. foliis ensiformibus, floribus distantibus. *Knorr del. hort. 1. t. A. 5.*
- imbricatus. 2. Gl. foliis ensiformibus, floribus imbricatis.
- alatus. 3. Gl. foliis ensiformibus, laciniis corollae lateralibus latissimis.
- plicatus. 4. Gl. foliis ensiformibus plicatis villosis, scapo laterali, corollis regularibus. *Mill. ic. 155. f. 1.*
- viridis. 5. Gl. foliis ensiformibus glabris, scapo triquetro alato, limbo corollae patenti-reflexo. *Ait. hort. Kem. 3. p. 481.*
- undulatus. 6. Gl. foliis ensiformibus, laciniis corollae subaequalibus lanceolatis undulatis. *Mant. p. 27. Jacq. Collect. 3. p. 256.*
- recurvus. 7. Gl. foliis ensiformibus, laciniis corollae subaequalibus lanceolatis recurvatis. *Mant. p. 28. Mill. ic. 235. f. 2.*

8. Gl.

- earneus. 8. Gl. foliis ensiformibus, scapo terminali paucifloro laxo, corollae laciniis lanceolatis: suprema maxima; infima angustissima. *de la Roch. diff. p. 30. t. 4.*
- montanus. 9. Gl. foliis ensiformibus nervosis glabris, floribus spicatis, corolla ringente. *Suppl. p. 95. Pluckn. phyt. 224. f. 8.*
- anceps. 10. Gl. foliis ensiformibus undulatis, caule ramofo ancipite divaricato. *Suppl. p. 94. Cor. infundibuliform. Stigm. 3. Nonne distincti generis?*
- flavus. 11. Gl. foliis lanceolato-ensiformibus planis, galeae laminis tribus unguiformibus perpendicularibus, bracteis acuminatis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 65.*
- securiger. 12. Gl. foliis lineari-ensiformibus planis, galeae laminis tribus unguiformibus perpendicularibus, bracteis acuminatis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 65.*
- tristis. 13. Gl. foliis lineari-cruciatis, corollis campanulatis. *Mill. ic. 235. f. 1.*
- spicatus. 14. Gl. foliis linearibus, caule simplicissimo, floribus spicatis.
- alopeuroides. 15. Gl. foliis linearibus, spica disticha imbricata.
- angustus. 16. Gl. foliis linearibus, floribus distantibus, corollarum tubo limbis longiore. *Mill. ic. 142. f. 2.*
- ramosus. 17. Gl. caule ramofo, foliis linearibus.
- flexuosus. 18. Gl. foliis linearibus, caule simplici flexuoso, floribus spicatis ringentibus: tubo longo. *Suppl. p. 96.*
- longiflorus. 19. Gl. caule tereti, tubo longissimo, spathis foliisque linearibus glabris. *Suppl. p. 96.*
- carinatus. 20. Gl. foliis linearibus utrinque carinatis glabris, corollae tubo spathis limbisque brevioribus: stigmatibus indivisis complicatis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 64.*
- sulphureus. 21. Gl. scapo villoso, foliis lanceolato-linearibus, floribus sessilibus alternis secundis infundibuliformi-campanulatis. *Jacq. collect. 3. p. 258.*
- Watsonius. 22. Gl. caule glabro vaginato erecto foliis lanceolato-linearibus brevioribus, floribus paucis alternis infundibuliformibus. *Jacq. collect. 3. p. 257.*
- blandus. 23. Gl. foliis lineari-lanceolatis nervosis glabris, floribus spicatis: lacinia suprema reflexa; stigmatibus subbilobis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 64.*

24. Gl.

- strictus. 24. Gl. foliis lineari-lanceolatis villosis plicatis, corollae tubo spatham aequante. *Ait. hort. Kew. 1. p. 63.*
- crispus. 25. Gl. foliis lanceolatis crenatis undulatis, floribus secundis, spicis duabus tubo filiformi longo. *Suppl. p. 94.*
- juncus. 26. Gl. foliis lato-lanceolatis, culmo ramofo, floribus secundis, stilo sexpartito. *Suppl. p. 94.*
- marginatus. 27. Gl. foliis cartilagineo-marginatis glabris multinerviis, spica elongata, floribus alternis nutantibus. *Suppl. p. 95.*
- latifolius. 28. Gl. caule ramofo, corolla ringente, folio infimo filiformi-setaceo. *Suppl. p. 96.*
- falcatus. 29. Gl. caule simplici, foliis falcatis, floribus alternis, stilo trifido. *Suppl. p. 95.*
- tenellus. 30. Gl. caule subflexuoso ad folia geniculato bifloro. *Jacq. coll. 3. p. 255.*
- gramineus. 31. Gl. petalis lanceolatis setaceo-acuminatis. *Suppl. p. 95. Mill. ic. 56.*
- capitatus. 32. Gl. caule ramofo capitulis pedunculatis, radice tuberosa. *Thunb. diff. de moraea p. 112. 17. t. 2. nonne potius moraeae species?*
- spathaceus. 33. Gl. caule ramofo, floribus spicato-imbricatis, spathis membranaceis aristatis, foliis plicatis. *Suppl. p. 96.*
- tubiflorus. 34. Gl. caule tereti, tubo longissimo, spathis foliisque hirsutis. *Suppl. p. 96. Thunb. diff. t. 2.*
- Lomenia. 35. Gl. corolla subcampanulata stigmatibus quinque. *Pourret act. Tolos. 3. t. 5. an distincti generis?*

58. ANTHOLYZA. Cor. tubulosa, irregularis, recurvata. Caps. infera, 3locularis, 3valvis.

- ringens. 1. A. corollae labiis divaricatis, fauce compressa. *Commel. b. Amst. 1. t. 41.*
- plicata. 2. A. foliis plicatis, caule ramofo hirsuto, corolla ringente staminibus breviora. *Suppl. p. 96.*
- Cunonia. 3. A. corollis subpapilionaceis: labii lobis duobus externis latioribus ascendentibus. *Mair. p. 323. Mill. a var. subj. t. 1. f. 1. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 11. f. 4.*



- aethiopi- 4. A. corollis incurvatis: labii quinquepartiti lobis duobus al-  
ca. ternis patulis majoribus lanceolatis. *Mill. on. var. subj.*  
*t. 9.*
- Meriana. 5. A. corollis infundibuliformibus, foliis ensiformibus. *Mill.*  
*ic. 276.*
- Merianel- 6. A. corollis infundibuliformibus, foliis linearibus. *Mill.*  
la. *ic. 297.*
- Lucidor. 7. A. foliis radicalibus basi filiformi apice dilatato - subulatis sul-  
catis, caule simplici foliolo spicato. *Suppl. p. 96.*

HERITIERA, Cor. 6fida, ventricoso-tubulosa, per-  
sistens, staminibus brevior. Cal.  
o. *Stigma simplex. Caps. 3locu-*  
*laris apice truncata, 3punctata.*

tinctorum. I. HERITIERA. *Walt. flor. carol. p. 66.*

59. IRIS, Cor. 6partita, inaequalis: laciniis alternis  
geniculato-patentibus. *Stigmata pe-*  
*taliformia cucullato-bilabiata.*

\* *Barbatae*, (quarum lacinae patulae pilis vestiuntur.)  
I *foliis ensiformibus.*

- ciliata. I. I. foliis ciliatis. *Thunberg de iride Ups. 1782. n. 1.*
- minuta. 2. I. foliis glabris, caule unifloro, laciniis corollae oblongis  
acutis. *Thunb. de irid. n. 2.*
- pumila. 3. I. foliis glabris, caule unifloro, laciniis corollae oblongis ob-  
tusis. *Jacq. fl. austr. t. 1.*
- fusiana. 4. I. foliis glabris, caule unifloro, laciniis corollae rotunda-  
tis. *Knorr. del. hort. I. t. L. 6.*
- cristata. 53. I. foliis glabris caulem subuniflorum aequantibus, germi-  
nibus trigonis, corollae laciniis subaequalibus: barba cri-  
stata. *Ait. hort. Kew. I. p. 70.*
- florenti- 5. I. foliis glabris brevioribus caule subbifloro. *Knorr. del.*  
na. *hort. I. t. L. 7.*
- biflora. 6. I. foliis glabris brevioribus caule subtrifloro. *Kniph. bot.*  
*orig. cent. 8. n. 54.*

- aphylla. 7. I. foliis glabris aequantibus caulem multiflorum subnudum.  
 variegata. 8. I. foliis glabris aequantibus caulem multiflorum subfoliosum.  
*Jacq. fl. austr. t. 5.*
- germani- 9. I. foliis glabris falcatis brevioribus caule multifloro. *Blackw.*  
 ca. *herb. t. 69.*
- lucida. 54. I. foliis glabris caule multifloro brevioribus, corollae laci-  
 niis exterioribus revolutis: interioribus erecto-inflexis  
 subundulatis submarginatis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 68.*
- sambuci- 10. I. foliis glabris erectis brevioribus caule multifloro, laci-  
 na. niis corollae deflexis planis. *Jacq. b. Vind. t. 2.*
- squalens. 11. I. foliis glabris erectis brevioribus caule multifloro, laciniis  
 corollae deflexis replicatis.
- compres- 12. I. foliis glabris, caule paniculato compresso. *Thunb. de*  
 sa. *iride n. 12.*
- dichoto- 13. I. foliis glabris, caule paniculato tereti. *Pallas it. 3. t.*  
 ma. *A. f. 2.*
- hexagona. 52. I. caule tereti capsulae trigonae angulis sulco profundo bi-  
 fidis. *Walt. flor. carol. p. 66.*

— foliis linearibus.

- tripetala. 14. I. folio longiori caule unifloro, petalis alternis subulatis.  
*Thunb. de iride n. 14. Jacq. coll. 3. p. 272.*
- tricuspis. 15. I. folio longiori caule subbifloro, petalis alternis trifidis.  
*Thunb. de irid. n. 15.*
- flexuosa. 16. I. foliis flexuosis brevioribus caule crasso fistuloso trifloro.  
*Murr. Comm. Goett. 1776. t. 4.*
- flavissima. 46. I. foliis sublinearibus caule bifloro longioribus. *Gmel. fl.*  
*sibir. 1. p. 31. t. 5. f. 2.*
- plumaria. 17. I. caule multifloro, stigmatibus setaceo-multifidis. *Syfl.*  
*nat. XII. 3. p. 78. n. 2. Moraea juncea. Gaertn. de fr.*  
*et sem. cent. 1. t. 13. f. 2.*
- β) *Mill. ic. 238. n. 1. 2. Moraea vegeta.*

\* Imberbes.

— foliis ensiformibus.

- Xiphium. 18. I. foliis canaliculato-subulatis brevioribus, caule bifloro.  
*Knorr. del. hort. 1. t. L. 9.*

β) Iris

- β) Iris variabilis. *Jacq. coll. 2. p. 321. Theca baccata cum sepimento.*
- Pseudacorus. 19. I. corollae laciniis alternis stigmatibus minoribus. *Flor. dan. t. 494.*
- foetida. 20. I. caule unangulato. *Blackw. herb. t. 158.*
- virginica. 21. I. caule ancipiti.
- versicolor. 22. I. caule tereti flexuoso, germinibus subtrigonis. *Ehr. pl. sel. t. 6. f. 2.*
- ochroleuca. 23. I. caule subtereti, germinibus hexagonis.
- Guldenstaedtii. 24. I. foliis erectis brevioribus caule tereti bifloro, germinibus hexagonis. *Lepech. act. Petrop. ad 1781. I. p. 292. t. 8.*
- spathacea. 25. I. foliis rigidis, caule tereti bifloro, spathis longissimis. *Thunb. de irid. n. 23.*
- alata. 47. I. tubo corollae filiformi: laciniis interioribus minimis. *Poiret voyag. en Barbar. 2. p. 86.*
- unguicularis. 48. I. tubo corollae filiformi longissimo, petalis omnibus erectis subaequalibus. *Poiret voyag. en Barb. 2. p. 86.*
- ventricosa. 49. I. foliis subensiformibus, caulem simplicem vaginantibus, spatha ventricosa biflora. *Pall. it. 1. 3. p. 712. t. B. f. 1.*
- halophila. 50. I. caule folioso subtrifloro, folia excedente. *Pall. it. 3. p. 713. t. B. f. 2.*
- ramosa. 26. I. caule paniculato multifloro. *Thunb. de irid. n. 24.*
- † † foliis linearibus.
- Sisyrinchium. 27. I. foliis undulatis reflexis, caule unifloro.
- verna. 28. I. foliis planis, caule unifloro, corollae laciniis alternis aequantibus. *Pluckn. alm. t. 196. f. 6.*
- persica. 29. I. foliis planis, caule unifloro, foliis alternis brevioribus. *Rudb. elyf. 2. p. 10. f. 9. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 13. f. 1.*
- angusta. 30. I. folio filiformi erecto glabro, caule glabro subunifloro, spathis obtusis. *Thunb. de irid. n. 28.*
- setacea. 31. I. folio filiformi erecto glabro, caule glabro unifloro, spathis acutis membranaceis. *Thunb. de irid. n. 29. t. 1.*

- tenuifolia. 32. I. foliis filiformibus, caule bifloro. *Pall. it. 3. p. 714. t. C. f. 2.*
- juncea. 51. I. foliis filiformibus scapo unifloro, spathis mucronatis. *Poir. voy. en Barb. 2. p. 85.*
- graminea. 33. I. caule subbifloro ancipiti, germinibus hexagonis. *Jacq. fl. austr. t. 2. Theca baccata cum sepimento.*
- spuria. 34. I. caule subtrifloro tereti, germinibus hexagonis. *Fl. dan. t. 734. Jacq. fl. austr. t. 4.*  
 β) *Pall. it. 3. app. p. 713. t. C. f. 1.*  
 γ) *Iris lactea. Pall. it. 3. p. 713.*
- fibrica. 35. I. caule subtrifloro tereti germinibus trigonis. *Jacq. fl. austr. 1. t. 3. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 13. f. 1.*
- martini- 36. I. corolla basi foveolis glandulosis, germinibus trigonis, *Jacq. stirp. amer. pict. t. 10.*  
 censis.
- pavonia. 37. I. folio glabro, caule subunifloro. *Thunb. de irid. n. 35. t. 1.*
- crispa. 38. I. foliis crispis. *Thunb. de iride n. 36. t. 1.*
- papilion- 39. I. foliis reflexis hirtis. *Thunb. de irid. n. 37. t. 2.*  
 cea.
- edulis. 40. I. folio pendulo glabro, caule glabro multifloro. *Thunb. de irid. n. 38.*
- tristis. 41. I. foliis glabris, caule hirto ramofo. *Thunb. de irid. n. 39.*
- polysta- 42. I. foliis planis, caule glabro ramofo. *Thunb. de irid. n. 40.*  
 chya.
- viscaria. 43. I. foliis planis, caule viscoso. *Thunb. de irid. n. 41.*
- bitumino- 44. I. foliis spiralibus, caule viscoso. *Thunb. de irid. n. 42.*  
 fa. t. 2.

— — — foliis tetragonis.

tuberosa. 45. I. *Regn. bot. t. 406.*

60. MORAEA. Cor. submonopetala 6partita inaequalis: laciniis erectis. Stigmata 3petaliformia.

polyan- 1. M. caule ramosissimo, foliis subulatis glabris, petalis alter-  
 thor. nis minoribus, stigmatibus bifidis. *Suppl. p. 99.*

2. M.

714.  
natis.  
Jacq.  
dan.  
icq. fl.  
f. I.  
gonis.  
5. t. I.  
Thunb.  
l. n. 39.  
l. n. 40.  
I.  
n. 42.  
inae-  
Stig-  
lis alter-  
2. M.
- spathacea. 2. M. scapo tereti, foliis teretibus dependentibus longis, floribus aggregatis capitatis. *Suppl. p. 99. Thunb. diff. de moraea p. 9. t. 1.*
- lugens. 3. M. caule ancipiti subbifloro, foliis ensiformibus, infimis subfalcatis, floribus terminalibus. *Suppl. p. 99. Thunb. de moraea p. 5. t. 1.*
- spiralis. 4. M. caule compresso articulato multifloro, foliis ensiformibus erectis, floribus axillaribus. *Suppl. p. 99.*
- sinensis. 5. M. scapo tereti, foliis distichis ensiformibus, floribus umbellatis. *Syst. nat. XII. 3. p. 75. n. 9. Ixia chinensis. Trew. ebret. t. 52. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 13. f. 3. Theca baccata receptaculo libero.*
- aphylla. 6. M. scapo compresso nudo glaberrimo, spatha longissima subulata, floribus capitatis. *Suppl. p. 99. Thunb. diff. de moraea p. 9. t. 2.*
- gladiata. 7. M. scapo compresso, spatharum squamis muticis, stilibus. *Suppl. p. 93. Ixia gladiata.*
- filiformis. 8. M. scapo foliisque filiformibus, floribus terminalibus foliariis. *Suppl. p. 100. Thunb. de moraea. p. 9. t. 1.*
- flexuosa. 9. M. caule tereti articulato subramoso, foliis planis laxis revolutis, spica flexuosa: pedunculis aggregatis. *Suppl. p. 101. Jacq. b. Vind. 3. t. 90. Ixia longifolia.*
- virgata. 10. M. caule tereti ramoso, foliis planis linearibus, pedunculis solitariis. *Jacq. coll. 3. p. 194.*
- africana. 11. M. floribus capitatis: spathis laceris. *Syst. nat. XII. 3. p. 75. n. 2. Ixia africana. Burm. afr. t. 70. f. 2. nonne distincti generis?*
- iridioides. 12. M. scapo tereti, foliis distichis linearibus, flore subsolitario terminali. *Mant. p. 28. Giseck. ic. 1. t. 3. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 13. f. 2. Theca baccata cum sepimento.*
- fugax. 13. M. foliis gramineis tandem convolutis, stigmatate petaloido, petalis imberbibus. *Jacq. b. Vind. 3. t. 20.*
- pufilla. 14. M. scapo ancipiti, foliis distichis, flore subsolitario. *Thunb. diff. de moraea p. 7.*

- ixioides. 15. M. scapo compresso, foliis distichis nervosis, umbellis pedunculatis. *Thunb. de moraea p. 8.*
- collina. 16. M. scapo tereti, folio dependente, laciniis corollae subaequalibus. *Thunb. de moraea n. 13. p. 11. an potius Sisyrynchium?*
- umbellata. 17. M. scapo tereti, florum spicis umbellato-paniculatis, involucris binis longissimis. *Thunb. de moraea p. 13. n. 16.*
- crispa. 18. M. scapo tereti articulato, folio reflexo undulato crispo. *Thunb. diss. de moraea p. 13. n. 17.*

**MARICA.** Cor. 6partita: laciniis 3 interioribus minoribus. *Spath.* 2valves. *Caps.* oblonga, angulata, 3ocularis, polysperma.

Cipura. I. MARICA. *Aubl. pl. guj. 1. p. 38. t. 13.*

**1017. SISYRINCHIUM.** *Spatha* 2phylla. *Petala* 6plana. *Caps.* 3ocularis, infera, 3valvis.

- Bermudiana. 1. S. caulibus ancipitibus ramosis foliosis. *Cavanill. diss. bot. 6. t. 192. f. 1.*
- micranthum. 2. S. caule ancipiti ramoso: foliis alternis canaliculatis, floribus minimis. *Cavanill. diss. bot. 6. p. 345. t. 191. f. 2.*
- anceps. 3. S. caule ancipiti simplici. *Cavanill. diss. bot. 6. p. 345. n. 507. t. 190. f. 2.*
- grandiflora. 4. S. caule tereti simplici foliis striatis. *Cavanill. diss. bot. 6. p. 346. n. 509. t. 192. f. 2.*
- narcissoides. 5. S. caule tereti, foliorum vaginis inflatis, corolla infundibuliformi. *Cavanill. diss. bot. 6. p. 347. n. 511. t. 191. f. 3.*
- palmaefolium. 6. S. caule tereti, foliis ensiformibus nervosis planis petiolatis. *Cavanill. diss. bot. 6. t. 191. f. 1. Plum. ic. t. 46. f. 2. Vog. Suppl. pl. chr. sel. t. CIII. Mant. p. 122.*
- latifolium. 7. S. foliis ensiformibus nervosis plicatis. *Plum. ic. t. 46. f. 2.*

ixioides. 8. S. foliis ensiformibus conduplicatis longissimis, panicula trichotoma, petalis exterioribus dimidio minoribus. *Forst. fl. austr. p. 61.*

1018. FERRARIA. *Spathae* iflorae. *Petala* 6, undulato-crispata. *Stamina* cucullata. *Caps.* 3locularis, infera.

undulata. 1. F. caule multifloro. *Jacq. b. Vind. t. 63. an totum genus cum sisyrrinchio monadelphis accensendum?*

pavonia. 2. F. scapo unifloro. *Suppl. p. 407. Mutis amer. I. t. 15. Cavanill. diff. bot. 6. t. 190. f. 1.*

ARISTEA. *Cor.* 6petala. *Stil.* declinatus. *Stigm.* infundibulif. hians. *Capsula* infera, polysperma.

cyanea. 1. ARISTEA. *Aiton. hort. Kew. 1.*

1355. DILATRIS. *Cal.* 0. *Cor.* 6petala. *Filamentum* tertium reliquis minus. *Stigma* simplex.

umbellata. 1. D. petalis ovatis, corymbo fastigiato hirsuto. *Syst. nat. XII. 3. p. 76. n. 10. Ixia hirsuta. Suppl. p. 101. Berg. fl. cap. t. 3. f. 5.*

viscosa. 2. D. petalis linearibus, corymbo fastigiato villoso viscoso. *Suppl. p. 101. Thunb. Schr. berl. Naturf. 4. p. 48. n. 2.*

paniculata. 3. D. petalis lanceolatis, panicula oblonga villosa viscosa. *Suppl. p. 101. Thunb. Schr. berl. Naturf. 4. p. 51. n. 3.*

XIPHIDIUM. *Cal.* 0. *Cor.* 6petala, aequalis infera. *Capsula* 3ocularis, polysperma.

floribundum. 1. XIPHIDIUM. *Aublet. pl. guj. p. 33. t. 11.*

61. WACHENDORFIA. Cor. 6petala inaequalis, infera. Caps. 3locularis, supera, 3quetra.

- thyrsiflo- 1. W. scapo simplici. *Burm. n. act. ac. Caes. N. C. I. obs. 50.*  
ra. t. 2. f. 1. *Gaertn. de fr. et sem. cent. I. t. 15. f. 4.*
- panicula- 2. W. scapo polystachyo. *Burm. n. act. ac. Caes. N. C. I. obs.*  
ta. I. t. 2. f. 10.
- gramini- 3. W. caule polystachyo hirsuto, foliis ensiformibus canalicu-  
folia. latis glabris. *Suppl. p. 101.*

62. COMMELINA. Cor. 6petala. Nectaria 3cruciata, pedicellis propriis inserta. Caps. supera 2-3locularis.

\* *Dipetalae i. e. petalis duobus majoribus.*

- commu- 1. C. corollis inaequalibus, foliis ovato-lanceolatis acutis, cau-  
ms. le repente glabro. *Dill. b. Elth. t. 78. f. 89. Gaertn. de fr. et sem. cent. I. t. 15. f. 1.*
- africana. 2. C. corollis inaequalibus, foliis lanceolatis glabris, caule decumbente. *Kniph. bot. orig. cent. 8. n. 30. Gaertn. de fr. et sem. cent. I. t. 15. f. 1.*
- bengha- 3. C. corollis inaequalibus, foliis ovatis obtusis, caule repen-  
lensis. te. *Murray Comm. Goett. 1779. t. 5.*  
β) *Commelina cucullata. Burm. ind. t. 7. f. 3.*
- erecta. 4. C. corollis inaequalibus, foliis ovato-lanceolatis, caule erecto subhirsuto simplicissimo. *Dill. b. Elth. t. 77. f. 88.*
- commeli- 5. C. foliis ovato-lanceolatis, floribus paniculatis: paniculae  
noides, ramis spicatis lateralibus, arista calicis corolla longiore. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 12. n. 35. an distincta vere species hujus generis et tribus?*
- mollis. 6. C. corollis inaequalibus, foliis ovatis integerrimis villosulis, caulibus geniculatis radicanibus ramosissimis. *Jacq. collect. 3. p. 235.*
- longicau- 7. C. corollis inaequalibus, foliis lineari-lanceolatis integerrimis subhirtis, caulibus longissimis geniculatis. *Jacq. collect. 3. p. 234.*

\*\* Tri-



\*\* *Tripetalae i. e. petalis tribus majoribus, Zanoniae.*

- virginica. 8. C. corollis subaequalibus, foliis lanceolatis subpetiolatis ore barbatis, caulibus erectis. *Pluckn. alm. t. 174. f. 4.*
- tuberosa. 9. C. corollis aequalibus, foliis sessilibus ovato-lanceolatis subciliatis. *Dill. h. Elth. t. 79. f. 90. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 15. f. 1.*
- Zanonia. 10. C. corollis aequalibus, pedunculis incrassatis, foliis lanceolatis: vaginis tumidis margine hirsutis, bracteis geminis. *Sloan. hist. jam. 1. t. 147. f. 1. an tradescantiae potius species?*
- vaginata. 11. C. corollis aequalibus, foliis linearibus, floribus diandris involucreo vaginatis. *Mant. p. 177.*
- nudiflora. 12. C. corollis aequalibus, pedunculis capillaribus, foliis linearibus, involucreo nullo, floribus diandris. *Mant. p. 177.*
- spirata. 13. C. corollis aequalibus, foliis lanceolatis, floribus paniculatis. *Mant. p. 176.*
- nudicaulis. 14. C. corollis aequalibus scapo indiviso, foliis lanceolatis radicalibus. *Burm. ind. t. 8. f. 1.*
- diffusa. 15. C. corollis aequalibus, pedunculis capillaribus, foliis crato-oblongis, involucreo nullo. *Burm. ind. t. 7. f. 3.*
- papilionacea. 16. C. involucris triphyllis alterum recipientibus, caule repente, foliis lanceolato-linearibus. *Burm. ind. t. 7. f. 31.*
- hexandra. 17. C. foliis ovatis alternis subpetiolatis, floribus racemosis terminalibus hexandris. *Aubl. pl. guj. t. 12. an hujus generis?*
- caroliniana. 18. C. corollis inaequalibus, floribus binis oppositifoliis, foliis ovato-lanceolatis, caule ramoso repente. *Walt. flor. carol. p. 68. an nectaria potius filamenta, et hexandris accensendum genus?*

63. CALLISIA. Cal. 3phyllus. Petala 3. Antherae geminae. Caps. 2locularis.

repens. I. CALLISIA. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 14. Hapalenthus repens.*

SYENA. Cal. 3phyllus. Petal. 3. Caps. globosa, stilo coronata, ilocularis, 3valvis, 6sperma.

Mayaca. I. SYENA. *Aubl. pl. guj. 1. p. 42. t. 15.*

64. XYRIS. *Cor.* 3petala, aequalis, crenata. *Glumae* 3valves cartilagineae in capitulum. *Capsula* supera,ilocularis.

indica. 1. X. foliis gladiatis. *Rheed. b. malab.* 9. t. 7. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 1. t. 15. f. 3.

americana. 2. X. foliis fetaceis. *Aubl. pl. guj.* 1. p. 40. t. 14.

1356. KYLLINGA. *Amentum* ovatum s. oblongum imbricatum. *Flores* calice corollaque 2valvi.

monocephala. 1. K. culmo filiformi triquetro, capitulo globoso sessili: involucro triphylo longissimo. *Syst. nat.* XII. 3. p. 80. n. 8. *Schoenus coloratus.* *Suppl.* p. 104. *Rottböll. descr. et ic. pl.* 1. t. 4. f. 4.

triceps. 2. K. capitulis terminalibus subternis glomeratis sessilibus. *Suppl.* p. 104. *Jacq. b. Vind.* t. 97.

punica. 3. K. umbella terminali: spicis sessilibus pedunculatisque cylindricis imbricatis, involucro universali subtetraphyllo, partiali nullo. *Suppl.* p. 105. *Rottb. descr. et ic. pl.* 1. t. 4. f. 1. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 1. t. 2. f. 5.

umbellata. 4. K. umbella terminali: spicis sessilibus pedunculatisque squarrosis, involucro universali polyphylo, partiali triphylo. *Suppl.* p. 105. *Rottb. descr. et ic. plant.* 1. t. 4. f. 2.

sumatrensis. 5. K. umbella terminali: spicis sessilibus pedunculatisque cylindricis squarrosis, involucro universali polyphylo, partiali nullo. *Koenig apud Retz. obs. bot.* p. 13. *Mant.* p. 181. *Scirpus cyperoides.*

filiformis. 6. K. umbella terminali simplici: spicis sessilibus pedunculatisque ovatis; spiculis ovatis acutis, involucro triphylo, partiali nullo. *Swartz nov. pl. gen. et sp.* p. 20.

1357.

*An distincta genera* *Remirea* *Aubl. pl. guj.* 1. p. 44. t. 16. et *Mapania* p. 47. t. 17?

1357. FUIRENA. *Amentum* imbricatum squamis aristatis. *Cal.* o. *Cor.* glumis tribus petaliformibus obcordatis cirro terminatis.

panicula- I. FUIRENA. *Suppl.* p. 105. *Rottb. descr. et ic. pl. 1. t. 19.*  
ta. f. 3.

1358. POMMEREULLA. *Cal.* turbinatus, 2valvis: *valvis* 4fidis dorso aristatis.

Cornuco- I. P. flosculis omnibus hermaphroditis. *Suppl.* p. 105.  
piae.

monoica. 2. P. flosculis masculis feminisque in unam spiram compactis.  
*Koenig Naturf. 23. p. 209.*

70. LYGEUM. *Spatha* 1phylla. *Corollae* binae supra idem germen. *Nux* 2locularis.

Spartum. LYGEUM. *Loefl. it. t. 2.*

69. NARDUS. *Cal.* o. *Cor.* 2valvis. *Nectar.* o.

thomaea. 1. N. spica subulato-plana culmo longiore, foliis fasciculatis erectis convolutis. *Suppl.* p. 105. *nonne potius Rottböl- lae species?*

striata. 2. N. spica setacea recta secunda. *Schreber. gram. 65. t. 7.*

gangitis. 3. N. spica recurva. *Morif. hist. pl. 3. t. 13. f. ult. an for- san varietas aristatae?*

aristata. 4. N. calicibus aristatis. *Bocc. mus. 2. t. 57.*

ciliaris. 5. N. spica incurva ciliata.

indica. 6. N. spica setacea secunda subincurvata. *Suppl.* p. 105. *an hujus generis?*

SPARTINA. *Cal.* 1florus, 2valvis, semen includens. *Cor.* 2valvis. *Nect.* o.

Schreberi. I. SPARTINA. *Schreb. gen. plant. Linn. 1. p. 43.*

68. ERIO-

68. ERIOPHORUM. *Glumae paleaceae undique imbricatae. Cor. o. Sem. i. lana longissima cinctum.*

- vaginat- 1. E. culmis vaginatis teretibus, spica scariosa. *Curt. flor.*  
tum. *Lond. t. 219.*
- polysta- 2. E. culmis teretibus, foliis planis, spicis pedunculatis. *Curt.*  
chyon. *flor. Lond. t. 217. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 2. f. 4.*
- virgini- 3. E. culmis foliosis teretibus, foliis planis, spica erecta.  
cum. *Morif. hist. pl. 3. t. 9. f. 2.*
- cyperi- 4. E. culmis teretibus foliosis, panicula supradecomposita pro-  
num. lifera: spiculis subternis. *Pluckn. mant. t. 419. f. 3.*
- alpinum. 5. E. culmis nudis triquetris, spica pappo brevior. *Fl. dan.*  
*t. 620.*

67. SCIRPUS. *Glumae paleaceae undique imbricatae. Cor. o. Sem. i. imberbe, 3quetrum, saepe villosum.*

\* *spica unica.*

- mutatus. 1. Sc. culmo triquetro nudo, spica cylindrica terminali.
- annuus. 61. Sc. culmo triquetro nudo, involucreo diphylo, peduncu-  
lis nudis, spicis solitariis. *Allion. fl. pedem.*
- trigynus. 2. Sc. culmo tereti nudo, spica cylindrica: squamis lanceola-  
tis basi laterali membranaceis. *Mant. p. 180.*
- palustris. 3. Sc. culmo tereti nudo, spica subovata terminali. *Fl. dan.*  
*t. 273*
- β?) Scirpus minimus. *Scheuchz. gram. t. 7. f. 1.*
- articula- 4. Sc. culmo tereti nudiusculo semigeniculato, capitulo glo-  
tus. merato laterali. *Rheed. mal. 12. t. 71.*
- genicula- 5. Sc. culmo tereti nudo, spica oblonga terminali. *Sloan.*  
tus. *hist. jam. 1. t. 75. f. 2. et t. 81. f. 3.*
- plantagi- 6. Sc. culmis teretibus geniculatis nudis, spica terminali cylin-  
neus. drica nuda. *Rothb. descr. et ic. pl. 1. t. 15. f. 2. an sa-  
tis distinctus a geniculato?*
- capitatus. 7. Sc. culmo tereti nudo fetiformi, spica subglobosa terminali.

8. Sc.

- acicularis. 8. Sc. culmo tereti nudo fetiformi, spica ovata bivalvi, feminibus nudis. *Mant. p. 321. Flor. dan. t. 287. An Cyperi potius species?*  
 β?) Scirpus quinqueflorus. *Scheuchz. gram. t. 7. f. 19.*
- cespitosus. 9. Sc. culmo striato nudo, spica bivalvi terminali longitudine calicis, radicibus squamula interstinctis. *Flor. dan. t. 167.*
- Bacothryon. 10. Sc. culmo tereti striato nudo basi vaginato, spica terminali pauciflora bivalvi: valvis ovatis spica brevioribus margine fereiosis. *Suppl. p. 103. Ehrh. phytoph. n. 31.*
- junceus. 61. Sc. culmo teretiufculo filiformi nudo, spica ovata terminali involucrium aequante. *Forst. fl. austr. p. 6.*
- fistulosus. 11. Sc. culmo subulato nudo basi vaginato, capitulo laterali. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 14. n. 45.*
- Schoenoides. 12. Sc. culmo fetaceo compresso striato, spica ovata: involucrio monophyllo brevi membranaceo, feminibus turbinate-compressis. *Koenig apud Retz. obs. bot. p. 14.*
- nutans. 13. Sc. culmo compresso subtetragono nudo, spica ovata solitaria terminali nutante. *Koenig apud Retz. obs. bot. 4. p. 12.*
- polytrichoides. 14. Sc. culmis compressis fetaceis, spicis terminalibus solitariis subnutantibus monandris. *Koenig apud Retz. obs. bot. 4. p. 11. Rumpf amb. 6.*
- atropurpureus. 15. Sc. culmis fetaceis teretibus fasciculatis, spicis terminalibus ovatis solitariis, floribus monandris. *Koenig apud Retz. obs. bot. 5. p. 14. caribaeo affinis.*
- caribaeus. 16. Sc. culmis fasciculatis fetaceis fulcatis, spica minima ovata terminali. *Fr. Rottböll. descr. et ic. pl. 1. t. 15. f. 3.*
- fluitans. 17. Sc. culmis teretibus nudis alternis, caule folioso flaccido. *Morif. hist. pl. 3. t. 10. f. 31.*
- \*\* spicis pluribus.  
 † culmo tereti.
- lacustris. 18. Sc. culmo tereti nudo, spicis ovatis pluribus pedunculatis terminalibus. *Lob. ic. 25.*
- Holoschoenus. 19. Sc. culmo tereti nudo, spicis subglobosis glomeratis pedunculatis: involucrio diphylo inaequali mucronato. *Flor. dan. t. 454.*
- australis. 20. Sc. culmo tereti nudo, capitulo laterali: bractea reflexa, foliis canaliculatis.

21. Sc.

- romanus. 21. Sc. caule tereti, nudo, capitulo laterali conglobato: bractea reflexa. *Jacq. fl. austr. 5. t. 448.*
- ellyphnia-60. Sc. culmo tereti nudo, spicis globosis quaternis. *Molina hist. nat. Chil. p. 129.*
- Halleri. 62. Sc. culmo tereti nudo, folio gramineo, capitulis lateralibus ternis ovatis. *Hall. hist. stirp. Helv.*
- supinus. 22. Sc. culmo tereti nudo, spicis sessilibus in medio culmo glomeratis.
- globiferus. 23. Sc. culmo tereti nudo, umbella terminali composita: capitulis globosis ex spiculis pluribus arte congestis. *Suppl. p. 104.*
- prolifer. 63. Sc. culmo tereti nudo compresso, capitulis glomeratis nudis tandem proliferis. *Rottb. descr. et ic. pl. 1. t. 17. f. 2.*
- glomeratus. 24. Sc. culmo nudo teretiufculo, umbella glomerata: involuero diphylo brevi, floribus diandris. *Koenig ap. Retz. obs. bot. 4. p. 11.*
- dipfaceus. 64. Sc. culmis setaceis, umbella simplici, capitulis oblongis squamosis, flosculis subulatis recurvis diandris, germine echinato. *Rottb. descr. et ic. pl. 1. t. 12. f. 1.*
- monander. 65. Sc. culmo setaceo, involuero longo triphylo, capitulo sessili glomerato: flosculis monandris. *Rottb. descr. et ic. pl. 1. t. 14. f. 3.*
- setaceus. 25. Sc. culmo nudo setaceo, spicis lateralibus subfolitariis sessilibus pedunculatisque, terminali sessili. *Flor. dan. t. 311. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 2. f. 3.*
- tristachyos. 26. Sc. culmo nudo setaceo: spicis ternis sessilibus: involuero diphylo setaceo. *Suppl. p. 103. Rottb. descr. et ic. pl. 1. t. 13. f. 4.*
- β) *Haller hist. stirp. Helv. 2. p. 180. n. 1344.*
- capillaris. 27. Sc. culmo nudo capillari, spicis pedunculatis: intermedia sessili. *Burm. fl. zeyl. t. 47. f. 2.*
- auctumnalis. 28. Sc. culmo ancipiti nudo, umbella decomposita: spiculis ovatis. *Mant. p. 180.*
- complanatus. 29. Sc. culmo compresso ancipiti, umbella supradecomposita, involuero diphylo longiore. *Koenig apud Retz. obs. bot. 5. p. 14.*
- niloticus. 30. Sc. culmo compresso striato basi vaginato, spicis pedunculatis terminalibus bis umbellatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 15.*

- trispica- 31. Sc. culmo fulcato nudo, spicis terminalibus ternis sessilibus nudis. *Suppl. p. 103.*
- Molina Kali. 32. Sc. culmo tereti folioso, spiculis terminalibus confertis sessilibus: involucris longitudine foliorum. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 15.*
- lateralis- diphyllus. 33. Sc. culmis semicylindricis striatis diphyllis, umbella composita involucro diphylo longiore. *Koenig apud Retz. obs. bot. 5. p. 15.*
- no glo- arvensis. 34. Sc. culmis compressis striatis, umbellis simplicibus: involucro monophyllo brevi. *Koenig apud Retz. obs. bot. 4. p. 11.*
- ta: ca- nodosus. 66. Sc. culmo compresso-nodoso, capitulo glomerato mucronato. *Rottb. descr. et ic. pl. 1. t. 8. f. 3.*
- Suppl. *†† culmo triquetro.*  
*† spicis paniculatis.*  
*‡ panicula nuda.*
- oblongis- triqueter. 35. Sc. culmo triquetro nudo, spicis lateralibus ovatis obtusis subsessilibus pedunculatisque, mucrone erecto. *Mant. p. 29. Pluckn. alm. t. 48. f. 2.*
- germine- mucrona- 36. Sc. culmo triangulo nudo acuminato, spicis lateralibus obtusis longis conglomeratis sessilibus, mucrone erecto. *Scheuchz. gram. t. 9. f. 14.*
- tulo sess- lateriflorus. 37. Sc. culmis triquetris nudis, spicis subternis lateralibus: involucro monophyllo brevi. *Koenig apud Retz. obs. bot. 4. p. 12.*
- r. et ic. lateralis. 38. Sc. spicis ovatis lateralibus sessilibus pedunculatisque. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 15. an distincta species?*
- ariis sess- ferrugineus. 39. Sc. culmo triquetro subnudo, involucris longitudine paniculae ciliatis. *Sloan. hist. jam. 1. t. 77. f. 2.*
- t. t. 311. spadiceus. 40. Sc. culmo triquetro nudo, umbella subnuda: spicis oblongis sessilibus terminalibusque. *Sloan. hist. jam. 1. t. 76. f. 2.*
- involucro- echinatus. 41. Sc. culmo triquetro nudo, umbella simplici: spicis ovatis. *Pluckn. alm. t. 91. f. 4.*
- ic. pl. 1. retrofractus. 42. Sc. culmo triquetro, umbella simplici: spicarum flosculis retrofractis. *Pluckn. phyt. 415. f. 4. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 2. f. 5.*

- aestivalis. 43. Sc. culmis depressis triquetris nudis, umbellis compositis involucreatis, floribus monandris. *Koenig apud Retz. obs. bot. 4. p. 12.*
- dichotomus. 44. Sc. culmo triquetro nudo, umbella decomposita: spicis dichotomiae sessilibus. *Rottb. descr. et ic. pl. 1. t. 13. f. 1.*  
 β) Scirpus monoicus, spiculis femineis demum post marcescentiam masculorum evolutis. *Koenig ap. Naturf. 24. p. 202.*
- grossus. 45. Sc. culmo triquetro nudo, umbella supradecomposita: spicis pedicellatis, involucreo triphylo lanceolato subulato longissimo. *Suppl. p. 104.*
- || panicula foliacea.
- miliaceus. 46. Sc. culmo triquetro nudo, umbella supradecomposita: spicis intermediis sessilibus, involucreo setaceo. *Burm. fl. ind. t. 9. f. 2.*
- Luzulae. 47. Sc. culmo triquetro nudo, umbella foliosa prolifera: spiculis subrotundis. *Pluckn. mant. t. 4. f. 3.*
- sylvaticus. 48. Sc. culmo triquetro folioso, umbella foliacea: pedunculis nudis supradecompositis, spicis confertis. *Flor. dan. t. 307.*
- intricatus. 49. Sc. culmo triquetro nudo, umbella foliosa simplici: squamis calicinis subulatis recurvis. *Mant. p. 182. an forsan Kyllingae species?*
- cyperoides. 50. Sc. culmo triquetro nudo, umbella simplici: spiculis oblongis; flosculis subulatis unifloris reflexis. *Mant. p. 181. Rottb. descr. et ic. pl. 1. t. 4. f. 2. an ad Kyllingam relegandus?*
- ciliaris. 51. Sc. culmo triquetro folioso, umbellis sparsis: squamis calicinis aristis ciliatis. *Mant. p. 182.*
- corymbosus. 52. Sc. culmo triquetro folioso, corymbis lateralibus simplicibus, terminali prolifero: spicis subulatis. *Rheed. b. malab. 19. t. 43.*
- anomalus. 53. Sc. culmo triquetro folioso, panicula terminali brevi: spiculis ovatis; floribus corollatis infimis monandris, superioribus triandris. *Retz. obs. bot. 5. p. 15.*
- maritimus. 54. Sc. culmo triquetro, panicula conglobata foliacea: spicularum squamis trifidis; intermedia subulata. *Curt. flor. Lond. t. 284.*
- squarrosus. 55. Sc. culmo triquetro nudo setaceo, spicis ternis sessilibus ovatis squarrosis. *Mant. p. 181. Rottb. descr. et ic. pl. 1. f. 17. f. 5.*



Michelia- 56. Sc. culmo triquetro, capitulo globoso: involuero poly-  
nus. phyllo longo. *Till. b. pisan. t. 20. f. 5.*

†† *capitulo terminali.*

hotten- 57. Sc. culmo triquetro folioso, capitulo globoso: squamis ca-  
tottus. licinis lanceolatis hirtis. *Mant. p. 182.*

antarcti- 58. Sc. culmo triquetro nudo, capitulo globoso: involuero  
cus. monophyllo. *Mant. p. 181.*

cephalo- 59. Sc. culmo triquetro nudo, capitulo ovato squarroso: invo-  
tes. luero triphyllo longo. *Jacq. hort. Vindob. I. t. 97.*

barbatus. 67. Sc. culmo triquetro: vaginis suboppositis supra barbatis,  
capitulo terminali subrotundo polystachyo. *Rottb. descr. et ic. pl. I. t. 17. f. 4.*

argenteus. 68. Sc. culmis triquetris fetaceis, involucri longissimis tetra-  
phyllis spicis plurimis cylindricis in capitulum glomeratis. *Rottb. descr. et ic. pl. I. t. 17. f. 6.*

66. CYPERUS. *Glumae paleaceae, distiche imbricatae. Cor. o. Sem. I. nudum.*

\* *culmo tereti.*

articula- 1. C. culmo nudo articulato. *Sloan. hist. of jam. I. t. 81. f. 1.*

minimus. 2. C. culmo nudo, spicis sub apice. *Sloan. hist. jam. I. t. 79. f. 3.*

aegyptia- 3. C. culmo nudo apice spiculis multis compactis: involuero  
cus. maximo foliisque recurvis. *Gloxin obs. bot. p. 20. t. 3.*

niloticus. 4. C. culmo nudo aequali, umbella composita: spicis globo-  
sis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 13.*

muero- 5. C. culmo nudo, spicis lateralibus sessilibus involuero mo-  
natus. nophyllo. *Koenig apud Retz. obs. bot. p. 10.*

lateralis. 6. C. culmo teretiufculo nudo, spica laterali sessili. *Suppl. p. 102.*

β) *Forsk. fl. aeg. arab. p. 13. Cyperus lateralis.*

tenellus. 7. C. culmo nudo fetaceo, spicis solitariis geminisque sessili-  
bus. *Suppl. p. 103.*

fetaceus. 8. C. culmis fetaceis striato-angulosis nudis, spica terminali  
subquadriflora nuda. *Koenig apud Retz. obs. bot. 5. p. 10.*

- Monti. 9. *C. umbella* supradecomposita, foliis carina laevibus. *Suppl.*  
*p.* 102. *Monti gram. t.* 1. *f.* 2.
- minutus. 10. *C. foliis* planis semiteretibus canaliculatis recurvis, capi-  
tulo terminali: involucrio triphylo. *Forsk. fl. aeg. arab.*  
*p.* 202.
- compa- 11. *C. culmo* folioso, umbella decomposita: involucrio penta-  
ctus. phyllo, spiculis congestis subspiralibus. *Osbeck apud*  
*Retz. obs. bot.* 5. *p.* 10.
- pygmae- 12. *C. umbella* composita involucrata: spicis lanceolatis; glu-  
us. mis mucronatis. *Koenig apud Retz. obs. bot.* 4. *p.* 9.
- effusus. 63. *C. culmo* ligneo, umbella rara; spicis conglomeratis, in-  
volucrio subulato triphylo. *Rottb. descr. et ic. pl.* 1. *t.*  
12. *f.* 3.
- hirsutus. 64. *C. culmo* folioso, spicis ovatis lobato-conglomeratis ter-  
minalibus: glumis mucronatis ciliatis. *Buxb. cent.* 3. *t.* 33.
- arenarius. 13. *C. culmo* compresso nudo, spicis capituli glomeratis sessili-  
bus: involucrio submonophyllo. *Koenig apud Retz. obs.*  
*bot.* 4. *p.* 9.
- capita- 14. *C. culmo* subanguloso striato medio folioso, capitulo ter-  
tus. minali triphylo: spicis sessilibus. *Koenig apud Retz. obs.*  
*bot.* 4. *p.* 9.
- gradatus. 15. *C. culmo* subangulato ad basin foliato, bracteis ad apicem  
pedunculis duplo longioribus spiraliter remotis. *Forsk.*  
*fl. aeg. arab.* 10. *p.* 13.
- \* *culmo triquetro.*  
† *vestito.*
- diphyl- 16. *C. culmo* subtriquetro diphylo, umbella supradecompo-  
lus. sita: spiculis teretiusculis subpinnatis. *Koenig apud Retz.*  
*obs. bot.* 5. *p.* 11.
- Hafpan. 17. *C. culmo* folioso, umbella supradecomposita: spiculis um-  
bellato-sessilibus. *Rottb. descr. et ic. pl.* 1. *t.* 6. *f.* 2.
- longus. 18. *C. culmo* folioso, umbella foliosa supradecomposita: pe-  
dunculis nudis spicis alternis. *Regn. bot. t.* 1387. *Jacq.*  
*coll.* 3. *p.* 191.
- cinnamo- 19. *C. culmo* folioso, umbella spiculis capitatis pedunculatis  
meus. sessilibusque: involucrio pentaphyllo serrulato-scabro.  
*Retz. obs. bot.* 4. *p.* 10.

- Pangorei. 20. C. culmo basi folioso, involucro triphylo, umbella univertali decomposita: partialibus subtrifidis. *Rottb. descr. et ic. pl. 1. t. 7. f. 3.*
- nitens. 21. C. culmis basi foliosis umbellis subsimplicibus: involucro triphylo, floribus monandris. *Koenig apud Retz. obs. bot. 5. p. 13.*
- globosus. 22. C. culmo basi folioso, spicis conglomeratis subglobosis: spiculis convexis viridibus nitidis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 13.*
- fastigiatus. 23. C. culmo basi folioso, umbella foliosa composita: spicis cylindricis; spiculis utrinque convexis flavidis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 14.*
- complanatus. 24. C. culmo basi folioso, umbella foliosa: spicis subrotundis; spiculis compressis planissimis ovato-oblongis brunneis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 14.*
- ferrugineus. 25. C. culmo basi folioso, umbella foliosa: spiculis compresso-convexis linearibus fasciculatis ferrugineis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 14.*
- tuberosus. 65. C. culmo basi folioso, involucris triphyllis, umbella composita: spicis lanceolatis teretiusculis. *Rottb. descr. et ic. pl. 1. t. 7. f. 1.*
- tenuiflorus. 66. C. culmo basi folioso, foliis linearibus, umbella decomposita: spiculis linearibus angustissimis acutis. *Rottb. descr. et ic. pl. 1. t. 14. f. 1.*
- alopecuroides. 67. C. culmo basi folioso, umbella supradecomposita: spicis digitatis oblongis, spiculis confertissimis erectis imbricatis. *Rottb. descr. et ic. pl. 1. t. 8. f. 2.*
- polystachyos. 68. C. culmo basi folioso, involucro polyphylo, panicula terminali subsessili ramosissima: spicis lineari-lanceolatis confertissimis complanatis. *Rottb. descr. et ic. pl. 1. t. 11. f. 1.*
- paniculatus. 69. C. culmo basi folioso involucro subaequali hexaphyllo, panicula terminali sessili compacta: spicis compressis lineari-lanceolatis paucifloris. *Rottb. descr. et ic. pl. 1. Pluckn. phyt. t. 91. f. 1.*
- Santonici. 70. C. culmo basi folioso, paniculis sessilibus pedunculatisque: spicis linearibus; stoculis alternis remotis obtusissimis. *Rottb. descr. et ic. pl. 1. t. 9. f. 1.*
- alternifolius. 26. C. culmo apice alternatim folioso, pedunculis lateralibus proliferis. *Mant. p. 28. Morif. hist. pl. 3. t. 3. f. 17.*

- spathaceus. 27. C. culmo vaginis foliorum vestito, pedunculis pinnatis lateralibus. *Sp. plant.* 2. p. 44. *Cyperus ferrugineus.* et *Sp. pl.* 2. p. 63. *Schoenus spathaceus.*
- Iria. 28. C. culmo feminudo, umbella foliosa decomposita: spiculis alternis, granis distinctis. *Rheed. b. malab.* 12. t. 56.
- Jemineus. 29. C. culmo feminudo basi bulboso, involuero diphylo, umbella subsimplici: spiculis linearibus. *Rottb. descr. et ic. pl.* 1. t. 8. f. 1.
- denudatus. 30. C. culmo medio vaginato, involuero subnullo. *Suppl.* p. 102.
- exaltatus. 31. C. culmo basi monophyllo, umbella supradecomposita polyphylla: spiculis linearibus pedunculatis. *Koenig apud Retz. obs. bot.* 5. p. 11.  
 β) *Rottb. descr. et ic. pl.* 1. t. 7. f. 2? *Cyperus fastigiatus.*
- pannonicus. 32. C. culmo basi monophyllo, spicis sessilibus: glumis lateralibus sphacelatis. *Suppl.* p. 103. *Jacq. hort. austr. app.* t. 6.
- cruentus. 33. C. culmo basi monophyllo, umbella terminali diphylla simplicissima. *Koenig apud Retz. obs. bot.* 5. p. 13.
- flavidus. 34. C. culmo striato monophyllo, umbella composita triphylla: spicis lanceolatis; squamulis monandris. *Koenig apud Retz. obs. bot.* 5. p. 13.
- rotundus. 35. C. culmo subnudo, umbella decomposita: spicis alternis linearibus. *Rottb. descr. et ic. pl.* 1. t. 14. f. 2.

TT culmo nudo.

- ligularis. 36. C. umbellae spiculis capitatis oblongis sessilibus: involucri longissimis ferrato-asperis. *Rottb. descr. et ic. pl.* 1. t. 11. f. 2.
- monostachyos. 37. C. spica simplici ovata terminali: squamis mucronatis. *Mant.* p. 180. *Rottb. descr. et ic. pl.* 1. t. 13. f. 3.
- laevigatus. 38. C. capitulo diphylo, floribus laevigatis. *Mant.* p. 179. *Rottb. descr. et ic. pl.* 1. t. 16. f. 1.
- esculentus. 39. C. umbella foliosa, radicum tuberibus ovatis: zonis imbricatis. *Morif. hist. pl.* 3. t. 11. f. 10.
- squarrosus. 40. C. umbella foliosa glomerata: spicis striatis squarrosis. *Rottb. descr. et ic. pl.* 1. t. 6. f. 3.

- diffortais. 41. C. umbella diphylla simplici trifida: spicis cuspidatis; intermedia sessili. *Rottb. descr. et ic. pl. 1. t. 9. f. 2.*
- elatus. 42. C. umbella foliosa supradecomposita: spicis digitalibus imbricatis; spiculis subulatis.
- glomeratus. 43. C. umbella triphylla supradecomposita: spicis glomerato-rotundatis; spiculis subulatis. *Monti gram. t. 1. f. 1.*
- glaber. 44. C. culmo laevi, umbella triphylla: floribus glomeratis; inferioribus brachiatis, foliis glabris. *Mant. p. 179. Seg. pl. ver. suppl. t. 2. f. 1.*
- elegans. 45. C. umbella foliosa: pedunculis nudis proliferis, spicis confertis: mucronibus patulis. *Rottb. descr. et ic. pl. 1. t. 6. f. 4.*
- odoratus. 46. C. umbella decomposita simpliciter foliosa: pedicellis distiche spicatis. *Sloan. hist. jam. 1. t. 8. f. 1. et t. 74. f. 1.*
- compressus. 47. C. umbella universali triphylla: glumis mucronatis; lateribus membranaceis. *Jacq. b. Vind. 3. t. 12.*  
 β) *Krock. fl. filef. p. 64. t. 12.*
- flavescens. 48. C. umbella triphylla: pedunculis simplicibus inaequalibus; spicis confertis lanceolatis. *Morif. hist. pl. 3. t. 11. f. 37.*
- fuscus. 49. C. umbella trifida: pedunculis simplicibus inaequalibus; spicis confertis linearibus. *Flor. dan. t. 179.*
- pumilus. 50. C. umbella diphylla composita: spiculis alterno-digitatis lanceolatis; glumis mucronatis. *Pluckn. alm. t. 191. f. 8.*  
*Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 2. f. 2.*
- triflorus. 51. C. umbella tristachya: intermedia sessili; spiculis laevigatis. *Mant. p. 180.*
- frigosus. 52. C. umbella simplici: spiculis linearibus confertissimis horizontalibus. *Sloan. hist. jam. 1. t. 74. f. 2. 3. au forsant Kyllingae species?*
- Papyrus. 53. C. umbella involucris longiore: involucellis triphyllis fetaceis longioribus, spiculis ternis. *Scheuchz. gram. t. 8. f. 14. Bruce trav. in Eg. Arab. Abyss. ard. Nub. 5. app. p. 1. ic.*
- distans. 54. C. umbella foliosa supradecomposita: spicis alternis filiformibus; flosculis distantibus. *Suppl. p. 103. Rottb. descr. et ic. pl. 1. t. 10. Jacq. coll. 3. p. 189.*

- niveus. 55. C. culmo filiformi, umbella terminali sessili diphylla: spicis compressis lanceolatis. *Koenig apud Retz. obs. bot. 5. p. 12.*
- imbricatus. 56. C. umbella decomposita: umbellularum radii imbricatis, involucri hexaphylli foliis tribus longissimis, tribus brevissimis. *Koenig apud Retz. obs. bot. 5. p. 12.*
- leucocephalus. 57. C. capitulo sessili: involuero tetraphyllo patentissimo floribus monandris. *Koenig apud Retz. obs. bot. 5. p. 11.*
- stoloniferus. 58. C. umbella composita involucreta: spiculis lanceolatis. *Koenig apud Retz. obs. bot. 4. p. 10.*
- viscosus. 59. C. foliis convoluto-teretibus, umbella foliosa decomposita: spicis confertis; spiculis compressis ovatis patentibus. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 20.*
- tenuis. 60. C. umbella simplici: spiculis subulatis confertis horizontali-reflexis, foliis involucri lineari-setaceis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 20.*
- filiformi. 61. C. culmo filiformi, foliis setaceis, spicis terminalibus sessilibus confertis tereti-subulatis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 20.*
- confertus. 62. C. umbella simplici foliosa: spiculis ovatis conglomeratis, glumis apice recurvis acuminatis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 20.*
- β) *Cyperus tenuiflorus. Rottb. descr. et ic. pl. t. 14. f. 1.*
- dubius. 71. C. culmo setaceo, capitulo terminali: involucri longissimis tetraphyllis. *Rottb. descr. et ic. pl. 1. n. 22.*
- conglomeratus. 72. C. capitulo terminali paniculato triphylo, foliis fasciculatis strictissimis canaliculatis. *Rottb. descr. et ic. pl. 1. t. 13. f. 7.*
- sphacellatus. 73. C. umbella simplicissima: spicis alternis linearibus compressis; flosculis margine sphacellatis. *Rottb. descr. et ic. pl. 1. n. 32.*
- fastigiatus. 74. C. umbella decomposita: pedunculis longissimis filiformibus subquinquefidis; spicis linearibus sparsis. *Rottb. descr. et ic. pl. 1. n. 41.*
- surinamensis. 75. C. umbella decomposita: spicis oblongo-ovatis glomeratis: mucronibus incumbentibus. *Rottb. descr. et ic. pl. 1. t. 6. f. 5.*

- corymbo- 76. C. umbella supradecomposita: pedunculis filiformibus stri-  
 fus. atis corymbosis, involucro polyphyllo. *Rottb. descr. et  
 ic. pl. 1. t. 7. f. 4.*
- flabelli- 77. C. culmo fulcato contorto, involucris alternis, pedunculis  
 formis. folitariis axillaribus terminalibusque umbellatis corymbi-  
 feris. *Rottb. descr. et ic. pl. 1. t. 12. f. 2.*
- globulo- 78. C. umbella foliosa: spicis compactis subrotundis flavicanti-  
 fus. bus. *Sloan. jamaic. 1. t. 79. f. 1.*
- umbella- 79. C. umbella diphylla: pedunculis longissimis spicatis. *Burm.  
 ind. t. 9. f. 6.*

65. SCHOENUS. *Glumae paleaceae, ivalves, con-*  
*gestae. Cor. o. Sem. 1, sub-*  
*rotundum inter glumas.*

\* *culmo tereti.*

- Mariscus, 1. Sch. foliis margine dorsique carina aculeatis, culmo laevi.  
*Scheuchz. gram. t. 8. f. 7-11.*
- fuscus. 2. Sch. culmo folioso, foliis filiformibus canaliculatis, spicis  
 gemellis obesis. *Morif. hist. pl. 3. t. 11. f. 40.*
- ustulatus. 3. Sch. culmo folioso, spicis pedunculatis pendulis oblongis  
 aristatis. *Mant. p. 178.*
- mucrona- 4. Sch. culmo nudo, spiculis ovatis fasciculatis: involucro sub-  
 tus. hexaphyllo, foliis canaliculatis. *Barr. pl. rar. ic. 203.  
 f. 1. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 2. f. 5.*
- nigricans. 5. Sch. culmo nudo, capitulo ovato; involucris diphylli val-  
 vula altera subulata longa. *Scheuchz. gram. t. 7. f. 13-15.*
- ferrugi- 6. Sch. culmo nudo, spica duplici: involucris valvula majore  
 neus. spicam aequante. *Morif. hist. pl. 3. t. 12. f. 40.*
- compar. 7. Sch. culmo nudo, spica composita: spiculis geminatis.  
*Mant. p. 177. Rottb. descr. et ic. pl. 1. t. 18. f. 4.*
- cuspidata- 28. Sch. culmis subnudis, panicula tenuissima lineari: bracteis  
 tus. annularibus obliquis brevissimis cuspidatis. *Rottb. descr.  
 et ic. pl. t. 18. f. 3.*
- deustus. 29. Sch. culmo nudo folia aequante, capitulis oblongis: glu-  
 mis calicinis subaequalibus mucronatis spicam involventi-  
 bus. *Berg. fl. cap. an satis distinctus a nigricante?*

- fasciatus. 30. Sch. culmis foliisque setaceis longissimis, floribus tenuissimis aristatis. *Rottb. descr. et ic. pl. 1. t. 19. f. 5.*
- radiatus. 8. Sch. culmo teretiusculo, capitulo subrotundo: involuero octophyllo longissimo. *Suppl. p. 101.*
- Fabri. 31. Sch. culmo compresso, capitulo solitario: involuero maximo; squamis exterioribus folio longissimo terminatis. *Rottb. descr. et ic. pl. 1. t. 19. f. 2. an distincti generis?*
- Bobartiae. 9. Sch. culmo compresso, capitulo terminali: involuero pentaphyllo. *Koenig apud Retz. obs. bot. 4. p. 9.*
- cyperoides. 10. Sch. culmo compresso semitereti nudo, spicis sessilibus lanceolatis tortis: infima involucreta. *Koenig apud Retz. obs. bot. 4. p. 8.*
- restioides. 11. Sch. culmo inferne compresso-ancipiti glaberrimo, floribus paniculatis, vaginis apice lanceolatis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 19.*
- compressus. 27. Sch. culmo teretiusculo subtriquetro nudo, spica secunda disticha: involuero monophyllo; stoculis uniglumis. *Leers fl. herb. t. 1. f. 1. an potius sciopi species?*
- incanus. 12. Sch. caule, foliis calicibusque villosis-tomentosis aculeatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 12. utrum hujus, an sequentis tribus?*
- odoratus. 32. Sch. spica compacta subrotunda viridi. *Sloan. jam. 1. t. 78. f. 2. an hujus tribus?*

\*\* culmo triquetro.

- bulbosus. 13. Sch. culmis nudis, florum glomerulis alternis, foliis linearifiliformibus. *Mant. p. 178. Rottb. descr. et ic. pl. 1. t. 16. f. 3.*
- glomeratus. 14. Sch. culmo folioso, foliis planis, floribus fasciculatis: pedunculis lateralibus geminis.
- thermalis. 15. Sch. culmo folioso, capitulis lateralibus compositis subsessilibus, foliis ensiformibus carinatis. *Rottb. descr. et ic. pl. 1. t. 18. f. 2.*
- albus. 16. Sch. culmo subtriquetro folioso, foliis setaceis, floribus fasciculatis. *Flor. dan. t. 320.*
- stellatus. 17. Sch. culmo subtriquetro, spiculis conglomeratis: involuero foliaceo basi colorato. *Sloan. hist. jam. 1. t. 78. f. 1.*

18. Sch.



- Cladium. 18. Sch. culmo obtuse triquetro folioso laevi, foliis antrorsum aculeatis, paniculis diffusis: spiculis unifloris sessilibus diandris. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 19.*
- effusus. 19. Sch. culmo obtuse triquetro folioso laevi, foliis antrorsum aculeatis, paniculis erectioribus: spiculis bifloris sessilibus diandris. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 19.*
- furina- 20. Sch. culmo folioso, pedunculis corymbosis: inferioribus  
mensis. alternis distantibus, superioribus confertis. *Rottb. descr. et ic. pl. t. 21. f. 1.*
- cyperoi- 21. Sch. culmo folioso, umbella terminali: spiculis glomera-  
des. tis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 19.*
- gracilis. 22. Sch. culmo folioso longissimo filiformi, spicis lateralibus  
pedunculatis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 19.*
- setaceus. 23. Sch. culmo subnudo, foliis setaceis, spiculis aggregatis,  
flosculis diandris. *Rottb. descr. et ic. pl. t. 21. f. 2.*
- pufillus. 24. Sch. culmo nudo filiformi, spiculis terminalibus subfasci-  
culatis sessilibus. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 20.*
- capillaris. 25. Sch. culmo nudo foliisque capillaribus, spiculis fasciculatis  
reflexis involucreatis: involucreo diphylo. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 20.*
- umbella- 26. Sch. culmo inferne folioso, umbella terminali: capitulo  
tus. medio sessili. *Jacq. collect. 1. p. 113. Walt. flor. carol. p. 70?*
- tubero- 33. Sch. capitulis ternis sessilibus: involucreo longissimo viridi,  
sus. radice tuberosa. *Rheed. hort. malab. 12. t. 12.*
- panicula- 34. Sch. culmo folioso, panicula colorata: calicibus aristatis,  
tus. feminibus globosi laevibus. *Rumpf amb. 6. t. 8. f. 1.*

1046. CAREX. *Amentum imbricatum. Cal. 1-phyllus. Cor. 0.*

♀. *in eadem cum ♂. planta. Nectarium inflatum 3-dentatum. Stigm. 3. vel 1-3fidum. Sem. 3 quetrum intra nectarium.*

\* *semine globoso albo nitido, lubosseo. Scleriae Bergii et Retzii.*

lithosper- 1. C. culmo triquetro erecto, foliis margine scabris. *Morif. ma. hist. pl. 3. t. 11. f. 16.*

- mitis. 2. *C. culmo triquetro scandente foliisque laevibus. Bergiur aët. Stockb. 1765. p. 145. t. 5.*
- Flagellum. 104. *C. culmo triquetro scandente scaberrimo, foliis trifariam retrorsum aculeatis. Berg. aët. Stockb. 1765. p. 144. t. 4. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 2. f. 7.*
- latifolia. 105. *C. culmo triquetro erecto laevi, foliis nervosis. Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 18.*
- subulata. 106. *C. culmo simplici filiformi, laevi, foliis subulatis. Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 19.*
- hirtella. 107. *C. culmo simplici filiformi pubescente, foliis linearibus. Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 79.*
- laevis. 3. *C. culmo folioso, foliis inermibus, paniculae ramis divisis involucrentis, spicis masculis sessilibus pedunculatisque. Retz. obs. bot. 5. p. 13.*
- tenuis. 4. *C. culmo folioso, foliis inermibus, panicula capillari: floribus sessilibus; exteriore masculino, inferiore femineo. Koenig apud Retz. obs. bot. 5. p. 13.*
- Boaeformis. 5. *C. culmo aphylo, paniculae contractae ramis flexuosis: spiculis sessilibus bifloris; feminis axillaribus. Koenig apud Retz. obs. bot. 5. p. 13.*

\*\* *femine ex ovato triquetro.*

† *spica unica simplici.*

- dioica. 1. *C. spica dioica. Flor. dan. t. 369. Stigma 2fidum.*
- capitata. 2. *C. spica androgyna ovata superne mascula, capsulis imbricatis patulis. Flor. dan. t. 372.*
- pulicaris. 3. *C. spica androgyna superne mascula, capsulis reflexis: feminibus teretibus. Suppl. p. 413. Flor. dan. t. 166. Stigma 2fidum.*
- squarrosa. 5. *C. spica androgyna cylindrica inferne mascula, capsulis imbricatis horizontalibus.*
- Halleri. 6. *C. spica ovata androgyna superne et inferne mascula, capsulis rotundis hirsutis. Hall. hist. stirp. Helv. 2. p. 183. n. 1352.*
- uncinata. 7. *C. spica androgyna lineari superne mascula: aristis feminarum uncinatis, masculis muticis. Suppl. p. 413. Swartz nov. pl. gen. Carex hamata.*

- Leuco- 4. C. spica androgyna superne mascula, capsulis reflexis, femi-  
gloch. nibus triquetris. *Suppl. p. 413. Stigma 3fidum. Ehrh. phytoph. n. 8.*
- cyperoi- 8. C. capitulo terminali subrotundo: floribus simplicissimis sub-  
des. ulatis, involucre longo. *Schreber gram. t. 28. f. 3. Carex bohemica.*
- herma- 9. C. spica lineari hermaphrodita, seminibus denudatis, foliis  
phrodita. culmoque setaceis *Villars fl. delph. 2. p. 194. t. 6. an vera hujus generis species?*
- †† spicis pluribus.  
— androgynis.
- baldensis. 10. C. spicis ternis congestis sessilibus ovatis triquetris: in-  
volucre diphylo. *C. Baub. prodr. th. bot. t. 13.*
- arenaria. 11. C. spica composita: spiculis inferioribus remotioribus fo-  
liolo longiori instructis, culmo triquetro. *Fl. dan. t. 425. Stigm. 2fidum.*
- uliginosa. 12. C. spica composita: spiculis inferioribus remotioribus fo-  
liolo longiori instructis, culmo tereti. *Mant. p. 494.*  
β) *Syst. nat. XII. 3. p. 80. n. 10. Schoenus compressus. Krock. fl. siles. t. 11.*
- leporina. 13. C. spica composita: spiculis ovatis sessilibus approximatis  
alternis nudis. *Scheuchz. gram. t. 10. f. 15. Stigma bifidum.*
- vulpina. 14. C. spica supradecomposita inferne laxiore: spiculis ovatis  
glomeratis superne masculis. *Flor. dan. t. 308. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 2. f. 6. Stigma bifidum.*
- spicata. 109. C. spiculis subrotundis androgynis contiguis, capsulis ova-  
tis acutis. *Huds. flor. angl. 405. Mich. nov. pl. gen. t. 33. f. 14.*
- brizoides. 15. C. spica composita disticha nuda: spiculis oblongis conti-  
guis, culmo nudo. *Michel. n. pl. gen. t. 33. f. 17.*
- Chordo- 16. C. spica composita: spiculis approximatis superne mascu-  
rhiza. lis, capsulis compressis, radice repente filiformi. *Suppl. p. 414. Ehrh. phytoph. n. 77.*
- Heleona- 17. C. spica composita: spiculis approximatis superne femineis,  
stes. capsulis imbricatis lateribus integerrimis. *Suppl. p. 414. Ehrh. phytoph. n. 28.*

- disticha. 18. C. composita subdisticha: spiculis ovatis subimbricatis folio longiori instructis, culmo triquetro. *Leyf. fl. Hal. n. 937.*
- praecox. 19. C. spica composita disticha nudiuscula: spiculis contiguis teretibus rectis, culmo superne nudo. *Schreb. fl. lipf. spic. p. 63. Jacq. fl. austr. t. 446.*
- curvula. 20. C. spica composita: spiculis approximatis; glumis aristatis, capsulis conicis apice bifidis. *Haller hist. stirp. Helv. 2. n. 1353. Stigma 2fidum.*
- foetida. 21. C. spica composita pentagono-conica: spiculis approximatis, capsulis semiconicis. *Hall. hist. stirp. helv. 2. n. 1355. Scheuchz. it. alp. 6. f. 18.*
- lobata. 22. C. spica composita: spicis ternis, capsulis ventricosis mucronatis. *Haller. hist. stirp. Helv. 2. n. 1356. Allion pedem. t. 92. f. 5.*
- Poireti. 112. C. spica composita brevissima: spiculis ovatis congestis sessilibus pubescentibus. *Poir. voy. en Barbar. 2. p. 254.*
- microstachya. 23. C. spicis approximatis oblongis inferne masculis, lateralibus subfemineis, intermediis minimis paucifloris, terminali maxima, capsulis appressis. *Erb. Hann. Mag. 1784. p. 132.*  
 $\beta$ ) *Hall. hist. stirp. Helv. 2. n. 1367.*
- indica. 24. C. spicis cylindricis paniculatis pinnatis: flosculis aliquot infimis femineis. *Mant. p. 574.*
- brunnea. 25. C. spicis pedunculatis linearibus superne masculis. *Thunb. fl. jap. p. 38.*
- echinata. 26. C. spiculis sessilibus subovatis remotis inferne masculis, capsulis acutis mucronatis. *Roth. fl. germ. 1. p. 395.*
- muricata. 27. C. spiculis subovatis sessilibus remotis superne masculis, capsulis acutis bicuspidatis. *Fl. dan. t. 284. Stigma bifidum.*
- loliacea. 28. C. spiculis subovatis sessilibus remotis, capsulis ovatis teretiufculis muticis divaricatis. *Michel. n. pl. gen. t. 33. f. 10. Stigma 2fidum.*
- remota. 29. C. spicis ovatis subsessilibus remotis: bracteis culmum aequantibus. *Flor. dan. t. 370. Stigma 2fidum.*  
 $\beta$ ) *Carex axillaris. Sp. plant. 1384. Mich. n. pl. gen. t. 33. f. 16.*
- elongata. 30. C. spiculis oblongis sessilibus remotis, capsulis ovatis acutis. *Leers fl. herb. t. 14. f. 7. Stigma 2fidum.*

- canescens. 31. C. spiculis subrotundis remotis sessilibus obtusis, capsulis ovatis obtusiusculis. *Flor. dan. t. 285. Stigma 2fidum.*
- paniculata. 32. C. racemo composito; spiculis androgynis. *Leers fl. herb. t. 14. f. 4. Stigma 2fidum.*
- diandra. 33. C. racemo simplici arcto: spiculis androgynis; flosculis masculis diandris. *Roth fl. germ. 1. p. 396.*
- — spicis sexu distinctis.  
 † una planta.  
 † spica mascula unica.  
 † femineis sessilibus.
- flava. 34. C. spicis confertis subsessilibus subrotundis: mascula linearis, capsulis acutis recurvis. *Leers fl. herb. t. 15. f. 6. Stigma 3fidum.*
- pedata. 35. C. spicis femineis oblongis: inferiore axillari, foliis subfiliformibus. *Mich. n. pl. gen. t. 32. f. 14.*
- digitata. 36. C. spicis linearibus erectis: mascula breviora inferioreque bracteis aphyllis, capsulis distantibus. *Leers fl. herb. t. 16. f. 4. Stigma 2fidum.*
- montana. 37. C. spicis femineis subsolitariis ovatis masculae approximatis, culmo nudo, capsulis pubescentibus. *Flor. dan. t. 444? Stigma 3fidum.*  
 β) *Hall. hist. stirp. Helv. n. 1373.*
- tomentosa. 38. C. spicis femineis subpedunculatis, capsulis subglobosis tomentosis. *Mant. p. 123. Mich. n. pl. gen. t. 132. f. 13?*
- glomerata. 39. C. spica mascula oblonga, feminea sessili ovata, folio florali breviori approximata.
- filiformis. 40. C. spicis oblongis: feminea inferiore foliolo proprio breviora. *Leers fl. herb. t. 16. f. 5.*
- pilulifera. 41. C. spicis terminalibus confertis subrotundis: mascula oblonga, culmo nudo. *Pluckn. alm. t. 91. f. 8.*
- saxatilis. 42. C. spicis tribus ovatis sessilibus alternis: mascula oblonga. *Flor. dan. t. 159.*
- tristachya. 43. C. spicis tribus sessilibus linearibus: mascula longiora. *Thunb. fl. jap. p. 38.*
- aspera. 44. C. spica mascula solitaria longe pedunculata lineari: femineis remotis subternatis oblongis, capsulis squamis majoribus, culmo retrorsum hispido. *Willd. pr. fl. Berol. n. 102.*

- splendida. 45. C. spicis remotis: mascula subfolitaria lineari; femineis geminatis ovatis, capsulis bifidis lana splendida tectis, bracteis longissimis. *Willd. pr. fl. Berol. n. 103.*
- globularis. 46. C. spicis ternis approximatis: mascula filiformi; femineis subrotundis superne echinatis. *Villar. pl. Delph. 2. p. 211. n. 27.*
- prostrata. 47. C. culmo fenescente prostrato, spicis femineis adpressis: glumis maximis, capsulis subdispermis. *Hall. b. stirp. Helv. n. 1379. Scheuchz. agrostogr. t. 10. f. 1. 2.*
- caryophyllacea. 48. C. culmo triquetro subnudo, spicis approximatis ovatis. *Hall. hist. fl. Helv. n. 1371. Scheuchz. agrostogr. t. 10. f. 10. et t. 11. f. 12.*
- juncifolia. 49. C. culmo superne nudo, spicis approximatis brevissimis; mascula paulisper longiore, glumis lanceolatis mucronatis. *Hall. hist. stirp. Helv. 2. n. 1374.*
- tenuifolia. 113. C. spica mascula oblonga, femineis sessilibus minoribus. *Poir. voy. en Barbar. 2. p. 254. an satis distincta?*
- triceps. 114. C. spica mascula ovata terminali majore, femineis contiguis: squamis obtusis. *Scheuchz. agrostogr. t. 10. f. 8. 9.*
- ericetorum. 115. C. spica mascula oblongo-ovata, femineis approximatis, brevibus ovatis: squamis rotundatis margine membranaceis, stigmatibus trifido, capsulis subtomentosis. *Schranck baier. Flor. 1. p. 287.*

## 11 femineis pedunculatis.

- limosa. 50. C. spicis ovatis pendulis: mascula longiore erectiore, radice repente. *Flor. dan. t. 646.*
- capillaris. 51. C. spica mascula erecta, femineis pendulis oblongis distinctis, capsulis nudis acuminatis. *Flor. dan. t. 168.*
- pallefcens. 52. C. spica mascula erecta: femineis pendulis ovatis imbricatis, capsulis confertis obtusis. *Leers fl. herb. t. 15. f. 4.*
- panicca. 53. C. spicis pedunculatis erectis remotis; femineis linearibus, capsulis obtusiusculis inflatis. *Flor. dan. t. 261.*
- folliculata. 54. C. spicis terminalibus pedunculatis: mascula femineaque, capsulis subulatis longitudine spicae. *Pluckn. mant. t. 419. f. 1.*
- cespitosa. 55. C. spicis erectis cylindricis ternis subsessilibus: mascula terminali, culmo triquetro. *Scheuchz. agrostogr. t. 10. f. 11.*  
 β) *Hall. hist. stirp. Helv. 2. n. 1383.*

- distans. 56. C. spicis remotissimis subsessilibus: bractea vaginali, capsulis angulatis mucronatis. *Morif. hist. pl. 3. t. 12. f. 18.*
- japonica. 57. C. spicis erectis: femineis ovatis, mascula terminali lineari pedunculata. *Thunb. fl. jap. p. 38.*
- leptastachys. 58. C. spicis femineis remotis pendulis filiformibus, capsulis remotis apice integris. *Suppl. p. 414. Ehrh. phytoph. n. 48. Stigma 3fidum.*
- humilis. 59. C. spica mascula oblonga: femineis serioribus remotis subpedunculatis paucifloris, culmo foliis brevioribus. *Leyser fl. Hal. 845. Scheuchz. agrostogr. t. 10. f. 1. Stigma 3fidum.*
- ferruginea. 60. C. spicis erectis lanceolatis: mascula terminali pedunculata; femineis remotis tenuioribus. *Roth. fl. germ. 1. p. 400. n. 40.*
- elegans. 61. C. spica mascula erecta lineari, femineis (aut feminea) geminatis pendulis, capsulis distichis acuminatis squama minoribus. *Willd. pr. fl. Berol. n. 104.*
- mutabilis. 62. C. spicis cylindricis: mascula nutante longissima, capsulis squamis longioribus. *Willd. pr. fl. Berol. n. 109.*
- silvatica. 63. C. spica mascula erecta: femineis pendulis filiformibus laxis pedunculo brevioribus, capsulis ovatis aristatis furcatis. *Leyf. fl. hal. n. 962. Ehrh. phytoph. n. 58. Drymeja.*
- pendula. 110. C. spicis subsessilibus pendulis: mascula erecta, femineis cylindricis longissimis, capsulis subrotundis acuminatis. *Curt. flor. Londin. t. 180.*
- argentea. 64. C. spicis teretibus laxis acutis: glumis bractea pellucida latiore acutis, foliis erectis. *Hall. hist. stirp. helv. 2. n. 1377. Scheuchz. agr. t. 10. f. 3-5.*
- alpina. 65. C. spicis erectis subsessilibus: inferioribus axillaribus; mascula tereti elongata, capsulis ovatis breviter mucronatis. *Hall. hist. stirp. 2. n. 1378.*
- nemorensis. 66. C. spica mascula obtusa: femineis erectis tenuissimis laxis: glumis alternis remotis. *Haller. hist. stirp. Helv. 2. n. 1379.*
- verna. 67. C. foliis cespitosis brevibus, spicis confertis erectis subpetiolatis brevibus, capsulis ovato-triquetris. *Hall. hist. stirp. Helv. 2. n. 1381.*

is ge.  
bra-

nineis  
2. p.

ressis:  
stirp.

ovatis.  
10. f.

timis;  
crona-

ribus.

conti-  
f. 8. 9.

imatis,  
brana-  
branck

, radi-

is disti-  
3.

imbrí-  
15. f. 4.

aribus,

neaque,  
tant. t.

mascula  
0. f. 11.

56. C.

- diffimilis. 68. C. spicis femineis sessilibus: ima pedunculata, glumis per-  
angustis. *Haller. hist. stirp. Helv. 2. n. 1384.*
- rhizantha. 69. C. spicis minutis paucifloris: feminea superiore sessili; in-  
feriore pedunculata radicali, capsulis triquetris elongatis.  
*Hall. hist. stirp. Helv. 2. n. 1385.*
- gynoba- 70. C. spicis paucifloris: feminea inferiore pedunculata radi-  
fis. cali; superiore sessili, capsulis ovatis. *Haller. hist. stirp.  
Helv. 2. n. 1386.*
- spadicea. 71. C. spica mascula ovata obtusa: femineis minoribus pauci-  
floris; suprema approximata minima sessili, reliquis axil-  
laribus, capsulis bifidis. *Haller. hist. stirp. Helv. 2. n. 1388.*
- Scheuch- 72. C. culmo folioso, foliis retrorsum hispidis, spicis gracili-  
zeri. bus: femineis minoribus. *Scheuchz. agr. p. 413. t. 10. f. 6.*
- patula. 73. C. culmo folioso, foliis retrorsum hispidis, spicis gracili-  
bus: femineis pendulis laxis praelongis, capsulis rostra-  
tis bifidis. *Flor. dan. t. 404.*
- sempervi- 74. C. foliis duris perennibus, spicis atro-fuscis: mascula ob-  
rens. longa; femineis binis brevioribus laxis. *Villars pl. delph.  
2. p. 214. n. 31.*
- finensis. 75. C. spicis erectis: femineis quaternis, capsulis acuminatis.  
*Bladh. apud Retz. obs. bot. 3. p. 42.*

TT *Spicis masculis pluribus.*

- acuta. 76. C. spicis femineis subsessilibus, capsulis obtusiusculis.  
α) nigra. *Curtis flor. Lond. t. 281.*  
β) rufa. *Curtis flor. Lond. t. 280.*
- gracilis. 111. C. spicis masculis femineisque pluribus subfiliformibus,  
floribus digynis. *Curt. flor. Lond. t. 282.*
- miliacea. 116. C. spicis masculis terminalibus cylindricis, femineis ova-  
tis: inferioribus subnutantibus, superioribus subsessilibus.  
*Gmel. flor. sibir. 1. t. 30. f. 1.*
- vesicaria. 77. C. spicis femineis pedunculatis, capsulis inflatis acuminatis.  
*Fl. dan. t. 647.*
- hirta. 78. C. spicis remotis: femineis subpedunculatis erectis, capsu-  
lis hirtis. *Flor. dan. t. 379.*
- pumila. 79. C. spicis masculis duabus terminalibus sessilibus, femineis  
duabus pedunculatis oblongis erectis. *Thunb. fl. jap. p. 39.*



- Agastachys, 80. C. spicis femineis pedunculatis remotis, pendulis longissimis, capsulis numerosissimis maxime approximatis laxis acuminatis. *Suppl. p. 414. Ehrh. phytoph. n. 19. Stigma 3fidum.*
- laefiocarpa. 81. C. spicis remotis: masculis femineisque duabus cylindricis erectis subsessilibus, bracteis brevioribus, capsulis ovatis hirsutis apice divisis. *Erb. Hannoev. Mag. 1784. p. 132.*
- flacca. 82. C. spicis masculis erectis: femineis pendulis, capsulis ovatis obtusis bractea brevioribus. *Schreb. sp. fl. Lips. app. Barrel. ic. 113. f. 11.*
- glauca. 83. C. spicis femineis pendulis, capsulis ovato-triquetris confertis. *Leyf. fl. bal. n. 960. Mich. n. pl. gen. t. 32. f. 12. β) Hall. hist. stirp. Helv. 2. n. 1407.*
- hordeifoliosus. 84. C. foliis cespitosis triangularibus culmo longioribus, spicis masculis linearibus: femineis sessilibus; inferioribus subterraneis. *Villars fl. Delph. 2. p. 221. n. 43. t. 6.*
- palustris. 85. C. spicis femineis sessilibus, capsulis ovatis brevissime mucronatis. *Hall. hist. stirp. Helv. 2. n. 1400.*
- torfacea. 86. C. spicis femineis teretibus pendulis, capsulis conicis rostratis bicornibus. *Hall. hist. stirp. Helv. 2. n. 1409.*
- ternaria. 87. C. spicis tumis erectis: masculis duabus; terminali sessili, altera subpedunculata, feminea pedunculata. *Flor. tub. p. 288. 289.*
- bifurca. 117. C. culmo triquetro, spicis gracilibus aequalibus: femineis erectis, capsulis rostro bicorni. *Schranck baier. flor. I. p. 304.*
- — — spicis androgynis et masculis.
- polygama. 88. C. spicis masculis terminalibus; androgynis superne masculis axillaribus pendulis. *Flor. tub. p. 286.*
- erecta. 89. C. spicis masculis terminalibus approximatis erectis, androgynis superne masculis pedunculatis axillaribus erectis. *Flor. tub. p. 289.*
- paradoxa. 90. C. spicis duabus supremis masculis oblongis gracilibus simplicibus: reliquis compositis spiculis inferioribus confertis masculis; terminali androgyna superius mascula. *Flor. tub. p. 290.*

— — — — spicis androgynis et femineis.

- atrata. 91. C. spicis androgynis inferne masculis terminalibus pedunculatis: florentibus erectis; fructiferis pendulis. *Flor. dan. t. 158.*
- Pseudo-cyperus. 92. C. spicis pendulis: pedunculis geminatis: unica androgyna inferne mascula. *Morif. hist. pl. 3. t. 12. f. 5.*
- frigida. 93. C. spicis pedunculatis: terminali androgyna superne mascula, reliquis femineis distichis, capsulis longe mucronatis. *Hall. hist. stirp. Helv. 2. n. 1391.*

— — — — spicis masculis, androgynis, et femineis.

- brachystachys. 94. C. spica terminali mascula, media androgyna superne mascula, inferioribus femineis sessilibus, capsulis ovato-triquetris. *Hall. hist. stirp. Helv. 2. n. 1387.*
- eernua. 95. C. spicis praelongis: androgynis femineisque subsessilibus pendulis, capsulis mucronatis ovatis. *Haller hist. stirp. Helv. 2. n. 1396. Morif. hist. pl. 3. t. 12. f. 4.*
- mixta. 96. C. spica terminali mascula, altera androgyna superne mascula, reliquis femineis sessilibus, capsulis breviter bifurcatis. *Hall. hist. stirp. Helv. 2. n. 1398.*
- fusca. 97. C. spicis masculis androgynisque pluribus, femineis sessilibus, capsulis ellipticis subbifidis. *Hall. hist. stirp. Helv. 2. n. 1399.*
- marcida. 98. C. foliis retrorsum asperis, spicis masculis androgynisque marcidis: femineis gracillimis; suprema sessili, reliquis longissime petiolatis. *Hall. hist. stirp. Helv. 2. n. 1402.*
- oblonga. 99. C. spicis oblongis: mascula terminali sessili; androgyna femineaque pedunculatis erectis. *Flor. tub. p. 286.*
- nutans. 100. C. spicis oblongis; masculis sessilibus; femineis nutantibus androgynaque media suberecta pedunculatis axillariibus. *Flor. tub. p. 286.*
- ferax. 101. C. spica terminali mascula sessili, reliquis masculis cum androgynis superne masculis et femineis pedunculatis erectis, capsulis inflatis acuminatis. *Flor. Tubing. p. 288.*
- inaequalis. 102. C. spica mascula sessili, androgyna media inferne mascula erecta femineaque subnutante pedunculatis. *Flor. tub. p. 289.*
- quinata. 103. C. spicis masculis terminalibus androgynaque media inferne mascula sessilibus, femineis pedunculatis erectis. *Flor. tub. p. 289.*

11 in diversis plantis.

105. C. floribus femineis calice corollaque destitutis. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 2. f. 8.

1040. TYPHA. *Amentum cylindricum. Cor. o.*  
 ♂. Cal. obsoletus, 3phyllus.  
 ♀. Flores in eadem planta infra  
 ♂. Cal. capillo villoso. Sem.  
 1. insidens pappo capillari.

latifolia. 1. T. foliis subensiformibus, spica mascula femineaque approximatis. Curt. flor. Lond. t. 171. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 2. f. 1.

angustifolia. 2. T. foliis femicylindricis, spica mascula femineaque remotis. Curt. flor. Lond. t. 169.

1041. SPARGANIUM. *Flores conglobati monoici. Cor. o.*

♂. Cal. 3phyllus.

♀. Cal. 6phyllus. Stigma 2fidum.

*Drupa exsucca, supera,ilocularis, 1-2sperma.*

erectum. 1. Sp. foliis erectis lineari-lanceolatis: nervo elevato. Mant. p. 494. Dod. pempt. 601. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 19. f. 4.

nutans. 2. Sp. foliis decumbentibus linearibus obtusis. Mant. p. 494. Fl. dan. t. 260.

simplex. 3. Sp. foliis basi triangularibus: lateribus planis, pedunculis simplicibus. Curt. flor. Londin.

1042. ZEA. ♂. in distinctis spicis. Cal. Gluma 2-flora mutica. Cor. Gluma mutica.  
♀. Cal. Gluma 2valvis. Cor. Gluma 2valvis. Stilus filiformis, pendulus. Sem. solitaria receptaculo oblongo immerfa.

Mays. 1. Z. foliis integerrimis. *Blackw. herb. t. 547. a. b. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 1. f. 9.*

Curagua. 2. Z. foliis ferratis. *Molin. hist. nat. Chil. p. 107.*

1147. APLUDA. Cal. Gluma communis bivalvis: flosculo femineo sessili, masculisque pedunculatis, utrinque cal. o. cor. bivalvi.  
♀. Sem. 1. tectum.

mutica. 1. A. foliis lanceolatis, flosculis omnibus muticis.

aristata. 2. A. foliis lanceolatis flosculis masculis muticis, sessili arista terminali.

Zeagiter. 3. A. foliis ovatis, flosculis masculis muticis, sessili arista terminali. *Brown. jam. t. 4. f. 3.*

digitata. 4. A. spicis digitatis secundis. *Suppl. p. 434.*

scirpoides. 5. A. foliis longis lanceolatis, culmo ramoso paniculato, flosculis muticis. *Walt. flor. carol. p. 250.*

1045. OLYRA. ♂. Cal. Gluma iflora, aristata. Cor. Gluma mutica.  
♀. Cal. Gluma iflora, patula, ovata. Stilus 2fidus. Sem. cartilagineum.

latifolia. 1. O. panicula terminali. *Sloan. hist. jam. 1. t. 64. f. 2.*

pauciflora. 2. O. floribus axillaribus. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 21.*

1043. COIX. *Cal.* Gluma 2flora, mutica. *Cor.* Gluma mutica.

♂. o. in spicis remotis.

♀. *Stilus* 2partitus. *Sem.* receptaculo indurato nuciformi tectum, ovatum.

Lacryma. I. COIX. *Regn. bot. t. 272. Gaertn. de fr. et sem. cent. I. t. I. f. 10.*

β) Coix gigantea. *Koenig Naturf. 23. p. 211.*

THEMEDA. ♂. pedicellati mutici. *Cal.* ivalvis, iflorus. *Cor.* 2valvis.

♀. sessilis interior. *Cal.* ivalvis. *Cor.* 2valvis. *Arista* ex receptaculo longissima.

polygama. I. THEMEDA. *Forsk. Fl. aeg. arab. p. 178.*

1334. MANISURIS. *Cal.* Gluma 2valvis, iflora: valva exteriori lateribus apiceque emarginata. *Cor.* calice minor.

♀. *Stilus* 2fidus.

♂. lateris inferioris ejusdem spicae magis exstantes.

myuros. I. MANISURIS. *Manz. p. 300.*

1149. CENCHRUS. *Involucrum* laciniatum echinatum 2florum. *Cal.* gluma 2flora: altero flosculo masculino, altero hermaphrodito. *Cor.* Gluma mutica.

♀. *Sem.* I.

- racemosus. I. *C. panicula* spicata, glumis muricatis fetis ciliaribus. *Schreb. gram.* 45. t. 4. *an distincti generis?*
- lappaceus. 2. *C. paniculae* ramis simplicissimis, corollis retrorsum hispidis, calicibus trivalvibus.
- muricatus. 3. *C. spica* muricata: squamis variis mucronatis. *Schreb. gram.* 2. p. 69. t. 34.
- capitatus. 4. *C. spica* ovata simplici. *Col. ecephr.* I. t. 338. f. I.
- echinatus. 5. *C. spica* oblonga conglomerata. *Schreb. gram.* 9. t. 23. f. I.
- tribuloides. 6. *C. spica* glomerata: glumis femineis globosis muricato-spinosis hirsutis. *Sloan. hist. jam.* I. t. 65. f. I.
- carolinianus. 7. *C. spica* glomerata, glumis globosis muricato-spinosis lacvibus. *Walt. flor. carol.* p. 79.
- ciliaris. 8. *C. spica* involucellis fetaceis ciliatis quadrifloris. *Mant. p.* 302. *Giseck ic.* I. t. 23.
- granularis. 9. *C. racemis* geminis, fructibus globosis rugoso-reticulatis. *Mant. p.* 575. *An ad genus praecedens amandandus?*
- frutescens. 10. *C. capitulis* lateralibus sessilibus, foliis mucronatis, caule fruticoso. *Pr. alp. exot.* t. 104.
- setosus. 11. *C. spica* lineari-oblonga: involucris setosis; fetis inermibus, interioribus basi villosis; villis ciliatis, glumis lacvibus. *Swartz nov. pl. gen. et sp.* p. 26.

## DIGYNIA.

PLANERA. *Flores* monoici. *Cor.* o. *Cal.* 4phyllus, ♀. *Stil.* reflexi. *Nux* hinc carinata, inde obtusa, squamosa, ilocularis.

aquatica. I. PLANERA, *Walt. flor. carol.* p. 230.

1047. **AXYRIS.** Flores monoici. Cor. o.  
 ♂. Cal. 3partitus.  
 ♀. Cal. 2phyllus. Caps.ilocularis.

- ceratoi- 1. A. foliis lanceolatis tomentosis, floribus femineis lanatis.  
 des. Jacq. ic. pl. rar. 1. t. 36.  
 amaran- 2. A. foliis ovatis, caule erecto, spicis simplicibus. Gmel.  
 thoides. fl. sib. 3. t. 3. Loculi circulares.  
 hybrida. 3. A. foliis ovatis, caule erecto, spicis conglomeratis. Gmel.  
 fl. sib. 3. t. 4. f. 1.  
 prostrata. 4. A. foliis obovatis, caule subdiviso, floribus capitatis.  
 Gmel. fl. sib. 3. t. 4. f. 2.

71. **BOBARTIA.** Cal. imbricatus. Cor. gluma 2-  
 valvi, supera.

indica. 1. BOBARTIA. Pluckn. mant. t. 300. f. 7.

72. **CORNUCOPIAE.** Involucrum 1phyllum, in-  
 fundibuliforme multi-  
 florum. Cal. 2valvis.  
 Cor. ivalvis.

- cuculla- 1. C. spica mutica cucullo crenato. Pet. gaz. t. 73. f. 5.  
 tum.  
 alopecu- 2. C. spica aristata, cucullo hemisphaerico recepta. Mant.  
 roides. p. 29. Alopecuro pratensi valde affinis.  
 altissi- 3. C. panicula coarctata, culmo erecto duro. Walt. flor.  
 mum. carol. p. 74.  
 peren- 4. C. panicula elongata diffusa: ramis trichotomis verticilla-  
 nans. tis, culmis subdecumbentibus. Walt. flor. carol. p. 74.  
 hyemale. 5. C. panicula diffusa verticillata, foliis teretiuseculis, culmo  
 erecto. Walt. flor. carol. p. 73.

73. SACCHARUM. Cal. 2valvis, 1florus, basi lanugine longa cinctus, (interdum o.) Cor. 2valvis. Nectar. 2phyllum, minimum.

- spontaneum. 1. S. foliis convolutis, panicula effusa: spicis capillaribus simplicibus; floribus remotis involueratis geminatis, altero pedunculato. *Suppl. p. 106. Mant. p. 183. Rheed. h. malab. 12. t. 46.*
- officinorum. 2. S. floribus paniculatis, foliis planis. *Planck. pl. med. ic. 40.*
- Ravennae. 3. S. panicula laxa: rachi lanata, floribus aristatis. *Spec. pl. p. 1481. Andropogon Ravennae. Morif. hist. pl. 3. t. 8. f. 32.*
- Teneriffae. 4. S. foliis subulatis planis, floribus paniculatis muticis, involucre piloso nullo, calice villosissimo. *Suppl. p. 106.*
- polystachyon. 5. S. floribus paniculatis: spicis filiformibus longissimis fastigiatis, flosculis remotiusculis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 21.*
- arundinaecum. 6. S. paniculae confertae pedunculis divisis: flosculis geminis sessili pedicellatoque; corollis trivalvibus polygamis *Koenig apud Retz. obs. bot. 4. p. 14. An satis distinctum a sequente?*
- bengalense. 7. S. paniculae confertae pedunculis divisis: flosculis geminis sessili pedicellatoque, corollis bivalvibus hermaphroditis. *Koenig apud Retz. obs. bot. 5. p. 16. n. 27.*
- biflorum. 8. S. panicula secunda: calicibus unifloris geminatis extus lanatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 16. n. 50.*
- Thunbergii. 9. S. panicula spicata: floribus diandris, culmi geniculis nudis, foliis convolutis. *Thunb. apud Retz. obs. bot. 5. p. 17. n. 29.*
- Koenigii. 10. S. panicula spicata: floribus diandris, culmi geniculis barbatis, foliis planis. *Koenig Naturf. 23. p. 203. et Retz. obs. bot. p. 16. n. 28. An vere constanterque distinctum a spicato?*
- spicatum. 11. S. floribus spicatis, foliis undatis. Cal. o. Cor. valva utraque aristata. *Rheed. h. malab. 12. t. 62. an potius distincti generis?*



hirsutum. 12. S. spica hirsuta: spiculis geminis; altera sessili, altera pedicellata. *Forsk. fl. aeg. ar. p. 16. n. 51.*

74. PHALARIS. *Cal.* 2plex, iflorus, uterque 2valvis, carinatus longitudine aequalis, corollam includens, *Nect.* 2phyllum.

canariensis. 1. Ph. panicula subovata spiciformi: glumis carinatis pilosis: nectariis binis. *Schreb. gram. t. 10. f. 2. Plenck. pl. med. ic. 41.*

minor. 2. Ph. panicula spiciformi cylindrica: calicibus carinatis nudis, nectario solitario. *Retz. obs. bot. 3. p. 8.*

bulbosa. 3. Ph. panicula cylindrica: glumis carinatis.

nodosa. 4. Ph. panicula oblonga, foliis ringentibus. *Mant. p. 557.*

aquatica. 5. Ph. panicula spiciformi ovato-oblonga: glumis carinatis lanceolatis. *Barr. pl. rar. ic. 700. f. 1.*

phleoides. 6. Ph. panicula cylindrica spiciformi glabra passim vivipara. *Flor. dan. t. 531.*

utriculata. 7. Ph. panicula spicata: petalis arista articulata, vagina supremi folii spathiformi. *Scop. del. insubr. 1. t. 12.*

alpina. 8. Ph. panicula spicata cylindrica hirsuta: glumis calicinis lanceolatis aristatis carina ciliato-hirsutis. *Barr. pl. rar. ic. 21. n. 2.*

paradoxa. 9. Ph. panicula cylindrica: flosculis mucronatis; neutris plurimis, infimis praemorsis. *Linn. fil. dec. 35. t. 18. Schreb. gram. t. 12.*

arundinea. 10. Ph. panicula oblonga ventricosa ampla. *Flor. dan. 259. Leers fl. herb. t. 7. f. 3.*

erucaeformis. 11. Ph. panicula secunda lineari, calicibus bifloris. *Gmel. fl. sib. 1. t. 29.*

zizanioides. 12. Ph. panicula simplicissima: floribus muricatis: altero sessili. *Mant. p. 183.*

oryzoides. 13. Ph. panicula effusa: glumarum carinis ciliatis, calice nullo. *Schreb. gram. t. 22. utrum Leersiae species, an distincti penitus generis?*

aspera. 14. Ph. panicula spicata tereti: calicibus obcordatis mucronatis. *Retz. obs. bot. 4. p. 14.*

- femiverti- 15. Ph. paniculae ramis femiverticillatis patentibus: spiculis  
cillata. muticis ciliatis, foliis glabris. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 17.*
- disticha. 16. Ph. panicula mutica ovata, foliis distichis involutis, culmo  
ramoso repente. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 17.*
- cristata. 17. Ph. panicula spiciformi oblonga: valva calicina utrinque  
crista calice duplo longiore. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 17.*
- velutina. 18. Ph. spicis alternis filiformibus, culmo foliisque villosissi-  
mis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 17.*
- dentata. 19. Ph. spica cylindrica: glumis muticis carinatis, carina den-  
tata dentibus apice globosis. *Suppl. p. 106.*
- hispida. 20. Ph. spicis digitatis: glumis scabris, foliis ovatis. *Thunb.  
fl. jap. p. 44.*
- setacea. 21. Ph. spicata: spiculis solitariis; involucris setaceis flore ses-  
quilongioribus. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 17.*
- vaginiflo- 22. Ph. culmis repentibus, spicis capitatis sessilibus axillaribus:  
ra. calice inaequali corolla angustiori. *Forsk. fl. aeg. arab.  
p. 18. Vix hujus generis.*
- muricata. 23. Ph. spica cylindrica: floribus geminatis, calice fructifero  
aculeato. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 202.*
- carolinia- 24. Ph. panicula spicata ovata, petalis aristatis, calicibus stria-  
na. tis. *Walt. flor. carol. p. 74.*

SYNTHERISMA. *Cal.* 1florus, 2valvis: valvis pla-  
nis: exteriore majore coroll.  
2valvem aequalem lateribus  
subamplexante.

- praecox. 1. S. culmo decumbente, spica composita: spiculis secundis;  
dentibus bifloris. *Walt. flor. carol. p. 76.*
- feroti- 2. S. culmo decumbente, spica composita: spiculis secundis;  
mum. dentibus trifloris. *Walt. flor. carol. p. 76.*
- villosum. 3. S. culmo erecto, panicula terminali: spiculis secundis; den-  
tibus bifloris. *Walt. flor. carol. p. 77.*

75. PASPALUM. Cal. 2valvis, orbiculatus. Cor.  
ejusdem magnitudinis. Stig-  
mata penicilliformia.

- dissectum. 1. P. spicis alternis: rhachi membranacea; floribus alternis apice pilosis. *Pluckn. mant. t. 350. f. 2.*
- serobicu- 2. P. spicis alternis: rhachi membranacea, floribus alternis; latum, calicibus multinerviis serobiculatis. *Mant. p. 29.*
- villosum. 3. P. spicis alternis secundis: rhachi hirsuta, floribus duplici ordine alternis secundis. *Thunb. fl. jap. p. 45.*
- hirsutum. 4. P. spicis alternis subbinis: rhachi membranacea, calicibus multinerviis laevibus, foliis pedicellisque hirsutis. *Retz. obs. bot. 2. p. 7.*
- distichon. 5. P. spicis duabus: altera sessili; floribus acuminatis.
- conjuga- 6. P. spicis duabus horizontalibus conjugatis: spiculis ovatis, tum, culmo erecto, foliis involutis. *Berg. act. helv. 7. t. 8.*
- vagina- 7. P. spicis duabus: spiculis bifariis acuminatis, culmo ramo- tum, so geniculato: geniculis vaginatis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 21.*
- longiflo- 8. P. spica gemina: flosculis ovali-oblongis. *Koenig apud Retz. obs. bot. 4. p. 15.*
- filiforme. 9. P. spica subsolitaria lineari secunda: spiculis alternis ovatis compressis, culmo foliisque filiformibus. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 22.*
- decum- 10. P. spica unica secunda: pedunculis longissimis, spiculis al- ternis orbiculato-acuminatis glabris, culmo procumbente. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 22.*
- orbicula- 11. P. spicis alternis: rhachi membranacea, floribus bifariam re, secundis orbiculatis laevibus. *Forst. fl. austr. p. 7.*
- panicula- 12. P. spicis paniculatis verticillato-aggregatis. *Sloan. hist. jam. 1. t. 72. f. 2.*
- virgatum. 13. P. spiculis paniculatis alternis basi villosis: floribus geminis. *Sloan. hist. jam. 1. t. 69. f. 2.*
- membra- 14. P. culmo ramofo procumbente, spica composita laevi: spi- naceum, culis secundis alternis distichis. *Walt. flor. carol. p. 75.*
- praecox. 15. P. spica composita: spiculis alternis trifariam positis; me- diis sessilibus. *Walt. flor. carol. p. 75.*

76. PANICUM. Cal. 2valvis, 2florus: flosculo altero hermaphrodito, altero masculo vel neutro.

\* *spicata.*

- polysta- 1. P. spicis teretibus: involucellis unifloris fasciculato-fetosis, chyon. culmis erectis superne ramosis. *Mant. p. 322. Rumpf amb. 6. t. 7. f. 2. B.*
- sericeum. 94. P. spica tereti: involucris fetaceis villosis unifloris flosculos aequantibus, foliis planis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 88.*
- verticilla- 2. P. spica tereti: involucellis unifloris bifetis, retrorsum scabris. tum. *Curt. flor. Lond. t. 260.*
- helvolum. 3. P. spica tereti: involucellis unifloris fasciculato-fetosis, feminibus nervosis. *Suppl. p. 107. nonne idem cum glauco?*
- glaucum. 4. P. spica tereti: involucellis unifloris fasciculato-pilosis. *Schreb. gram. t. 25. Gaertn. de fruct. et sem. cent. 1. t. 1. f. 3.*
- viride. 5. P. spica tereti: involucellis unifloris trifetis inermibus. *Curt. flor. Lond. t. 262.*  
 β) Panicum rubinatum. *Villars pl. Delph. 2. p. 64.*
- alopecu- 90. P. spica tereti: involucris fetaceis basi ciliatis fasciculatis roides. unifloris, flosculo quadruplo longioribus. *Walt. flor. carol. p. 72.*
- adhae- 6. P. spica terete: involucellis unifloris retrorsum aculeatis. rens. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 20.*
- divisum. 7. P. culmo ramosissimo dichotomo, spicis hirsutis: spiculis geminatis sessilibus. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 20. an distinctum a dichotomo?*
- fetige- 8. P. spicis remotis: flosculis secundis, rhacheos dentibus feti- rum. geris. *Bladh. apud Retz. obs. bot. 4. p. 15.*
- flavidum. 9. P. culmo folioso compresso, spiculis remotis sessilibus appressis secundis paucifloris. *Koenig apud Retz. obs. bot. 4. p. 15.*
- indicum. 10. P. spica simplicis nuda: pedicellis geminis, culmo adscendente basi ramoso. *Koenig apud Retz. obs. bot. 3. p. 9. an vere distinctum a conglomerato?*
- germani- 11. P. spica simplici cernua: fetis brevibus, pedunculo hirsuto. cum. *Roth. fl. germ. 1. p. 27. an mera varietas?*

- italicum. 12. P. spica composita: spiculis glomeratis fetis immixtis, pedunculis hirsutis. *Rumpf amb. 5. t. 75. f. 2.*
- hirtellum. 13. P. spica composita: spiculis adpressis alternis; calicibus geminis: valvulis omnibus aristatis, extima longissima. *Arduin. spec. 2. t. 4.*
- compositum. 14. P. spica composita: spiculis linearibus secundis; flosculis geminis remotis, calicibus aristatis.
- oryzinum. 95. P. spica composita nutante: spiculis secundis aristatis; rhachi trigona. *Arduin. spec. 2. t. 5.*
- piliferum. 86. P. spiculis linearibus secundis pilosis minutim aristatis. *Koenig Naturf. 23. p. 205.*
- elatius. 15. P. spica composita: spiculis oblongis sparsis adpressis: flosculis confertis; calicibus mucronato-aristatis. *Suppl. p. 107.*
- anomalum. 91. P. spica composita, spiculis secundis horizontalibus, culmo decumbente. *Walt. flor. carol. p. 72.*
- fetosum. 16. P. spica composita: spiculis paniculato-fasciculatis, fetis flosculis immixtis longissimis, pedunculis subglabris. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 22.*
- conglomeratum. 17. P. spica secunda subovata: flosculis obtusis. *Mant. p. 324. Mant. p. 184. Panicum indicum. Syst. nat. XII. 3. p. 91. Aira indica.*
- colonum. 18. P. spicis alternis secundis muticis ovatis scabris, rhachi teretiuscula. *Ehret. ic. pl. t. 3. f. 3.*
- muticum. 19. P. spicis alternis secundis: spiculis remotis geminatis muticis, altera pedicellata, rhachi trigona flexuosa. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 20. Colono affine.*
- Crus corvi. 20. P. spicis alternis secundis: spiculis subdivisis: glumis subdivisis aristatis hispidis, rhachi trigona.
- Crus galli. P. spicis alternis conjugatisque: spiculis subdivisis; glumis aristatis hispidis, rhachi quinquangulati. *Flor. dan. t. 852.*
- tumidum. 87. P. spiculis turgidis culmo repente. *Koenig Naturf. 23. p. 205.*
- stagninum. 21. P. spicis alternis secundis: calicibus bifloris aristatis hispidis. *Koenig apud Retz. obs. bot. 5. p. 17.*  
 β) Panicum pictum. *Koenig Naturf. 23. p. 204.*
- hispidum. 22. P. spicis alternis subdivisis secundis: floribus geminatis alternis secundis hispidis. *Forst. fl. austr. p. 7.*

- tetrafl- 23. P. spicis alternis secundis quadrifariam imbricatis: floscu-  
chon. lis secundis villosis muticis hinc planis inde gibbis. *Forsk.*  
*fl. aeg. p. 19.*
- brizoides. 24. P. spicis alternis sessilibus secundis adpressis oblongis, cul-  
mo suberecto. *Mant. p. 184. Pluckn. alm. t. 191. f. 1.*  
β) *Koenig Naturf. 23. p. 206.*
- lanceola- 25. P. spicis alternis: calicum valva extima ciliata aristata, fo-  
tum. liis lanceolatis. *Koenig apud Retz. obs. bot. 5. p. 17.*
- fluitans. 26. P. spicis alternis sessilibus interstitiis duplo longioribus:  
flosculis alternis sessilibus imbricatis secundis, culmo de-  
cumbente. *Koenig apud Retz. obs. bot. 3. p. 8.*
- gemma- 27. P. spicis alternis linearibus appressis: spiculis bifariam im-  
tum. bricatis muticis bifloris, altero flosculo masculino. *Forsk.*  
*fl. aeg. p. 18.*
- longiflo- 28. P. spica gemina: flosculis ovali-oblongis. *Koenig apud*  
rum. *Retz. obs. bot. 4. p. 15.*
- distachy- 29. P. spicis geminis secundis laevibus. *Mant. p. 183. Spicae*  
on. *interdum tres.*
- squarro- 30. P. spicis geminis horizontalibus: involucris squarrosis, cul-  
sum. mis decumbentibus. *Koenig apud Retz. obs. bot. 4. p. 15.*  
*5. t. 1. an idem cum cenbro muricato?*
- hispidu- 31. P. spicis binatis ternatisque erectis; calicibus hispidis bia-  
lum. ristatis. *Koenig apud Retz. obs. bot. 5. p. 18.*
- umbro- 32. P. spicis subquaternis remotis: flosculis geminis inaequali-  
sum. ter pedicellatis, culmo repente flaccido. *Koenig apud*  
*Retz. obs. bot. 4. p. 16.*
- Burman- 33. P. spicis subquaternis remotis secundis simplicibus, florum  
ni. glumis binis exterioribus aristatis. *Burm. fl. ind. t. 12.*  
*f. 1. an vere distinctum ab hirtello?*
- ciliare. 34. P. spicis subdigitatis approximatis erectis linearibus, rha-  
chi flexuosa, dentibus bifloris, calicibus ciliatis. *Wenner-*  
*berg apud Retz. obs. bot. 4. p. 16. Koenig Naturf. 23.*  
*p. 207.*

35. P.

*An distincta species Panicum muricatum et appressum culmo ramoso, antheris purpu-  
reis? Forsk. fl. aeg. arab. p. 20. an hoc an idem cum colorato?*

- floscu- 35. P. spicis subdigitatis linearibus: rhachi membranacea fle-  
Forsk. cum. xuosa, flosculis alternis geminis pedicellatis. *Retz. obs. bot. 3. p. 8.*
- cul- 36. P. spicis subdigitatis approximatis erectis linearibus: rhachi  
f. 1. flexuosa; dentibus bifloris altero sessili. *Jacq. obs. bot. 3. t. 70.*
- fo- 37. P. spicis digitatis basi interiore nodosis: flosculis geminis  
le. muticis, vaginis foliorum punctatis. *Flor. dan. t. 388. Schreb. gram. t. 16.*
- ibus: 38. P. spicis digitatis patentibus basi interiore villosis: floribus  
o de- solitariis, sarmentis repentibus. *Regnault bot. t. 14.*
- n im- 39. P. spicis digitatis subquaternis linearibus: flosculis solitariis  
Forsk. secundis muticis. *Sloan. hist. jam. 1. t. 70. f. 3.*
- apud 40. P. spicis digitatis secundis compressis: spiculis solitariis bi-  
sum, fariam imbricatis bifloris; flosculo altero masculino. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 18. utrum cum geminato, turgido, tetra-  
trasticho, grossario, polygamo, diviso, ischaemoide, anti-  
didoto? quorsum spectat aliginosum Koenigii? hujus, an alterutrius sequentis generis species?*
- Spicae 41. P. spicis paniculatis alternis secundis: spiculis geminis acu-  
s, cul- minatis laevibus; altera minore, rhachi compressa pilosa,  
p. 15. culmo divaricato geniculato. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 22.*
- s bia- 42. P. spicis paniculatis alternis secundis patentibus: spiculis  
tibus approximatis pedicellatis secundis muticis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 22.*
- quali- 43. P. spicis paniculatis alternis erectis subfastigiatis: spiculis  
apud secundis subrotundis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 22.*
- orum 44. P. spicis paniculatis foliis brevioribus: spiculis secundis  
t. 12. ovatis acutis, culmo prostrato geniculato ramosissimo, va-  
ginis pubescentibus. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 22.*

\*\* *Paniculata.*

- nemoro- 45. P. panicula simplici: ramis distantibus erectis, floribus re-  
sum. motis sparsis ovatis acuminatis, culmo decumbente geni-  
culato, vaginis pilosis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 22.*
5. P. 46. P. paniculis simplicibus foliis brevioribus: ramis capillari-  
tum. bus diffusis; spiculis remotis obovatis, culmo decumbente  
geniculato ramoso, foliis erectis vaginisque villosis. *Swartz  
nov. pl. gen. et sp. p. 23.*

- rigens. 47. *P. panicula* simplici rigida patente, culmo ramoso decumbente, foliis horizontalibus scabris. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 23.*
- fuscum. 48. *P. panicula* simplici: ramis erectis, flosculis secundis geminis: altero brevius pedicellato, culmo erecto subdiviso, foliis lato-lanceolatis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 23.*
- laxum. 49. *P. panicula* simplici nutante: ramis capillaribus, spiculis approximatis: alternis appressis, culmo simplici filiformi flaccido, foliis lineari-lanceolatis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 23.*
- flaves- 50. *P. panicula* simplici erecta stricta: ramis subfastigiatis; infimis oppositis, spiculis approximatis secundis: pedicellis bifloris. *Swartz nov. gen. et sp. pl. p. 23.*
- dichotomum. 51. *P. panicula* simplici, culmo ramoso dichotomo.
- diffusum. 52. *P. panicula* simpliciuscula capillari patente: spiculis distantibus, culmo decumbente simplici, foliis linearibus collo pilosis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 23.*
- oryzoides. 53. *P. panicula* subsimplici: ramis erectis, flosculis remotiusculis ovatis acutis, culmo erecto indiviso, foliis basi rotundatis, vaginis laevibus. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 23.*
- ramosum. 54. *P. panicula* ramis simplicibus: floribus subternis; inferiore subsessili, culmo ramoso. *Mant. p. 29.*
- grossarium. 55. *P. panicula* ramis simplicibus: floribus geminis; pedicello altero brevissimo, altero longitudine floris. *Burm. fl. ind. t. 11. f. 1.*
- latifolium. 56. *P. panicula* racemis lateralibus simplicibus, foliis ovato-lanceolatis collo pilosis. *Morif. hist. pl. 3. t. 5. f. 3.*
- turgidum. 57. *P. paniculae* spiculis obesis bifloris polygamis, foliorum vaginis longis ad dichotomias ventricosas, caule fruticoso. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 18.*
- cimicinum. 58. *P. panicula* umbellata: racemis subquaternis, gluma calicina altera ciliata. *Mant. p. 184.* Miliun cimicinum.
- aristatum. 59. *P. culmo* repente radicante, paniculae ramis indivisis, flosculis binis sessilibus aristatis. *Wennerberg apud Retz. obs. bot. 4. p. 17.*
- coloratum. 60. *P. panicula* patente: staminibus pistillisque coloratis, culmo ramoso. *Mant. p. 30. Jacq. pl. rar. ic. 1. t. 58.*



- flexuo- 61. P. panicula capillari patente: pedunculis flexuosis, calici-  
sum. bus ovatis, geniculorum barba reflexa. *Koenig apud Retz. obs. bot. 3. p. 9.*
- capillare. 62. P. panicula capillari erecta patente, pedunculis strictis fo-  
liorum vaginis hirtissimis. *Kniph. bot. orig. cent. 12. n. 72.*
- patens. 63. P. panicula oblonga flexuosa capillari patente: calicibus  
bifloris, foliis lineari-lanceolatis, culmo radicante. *Burm. fl. ind. t. 10. f. 3.*
- murica- 64. P. panicula patente: floribus solitariis muricatis, culmo  
tum. radicante ascendente. *Koenig apud Retz. obs. bot. 4. p. 18.*
- notatum. 65. P. panicula patente: axillis notatis, foliis lanceolatis cilia-  
tis. *Wennerb. apud Retz. obs. bot. 4. p. 18.*
- remotum. 66. P. paniculae ramis triquetris: flosculis subgeminatis; al-  
tero pedicellato, culmo ramoso tetragono-compresso. *Koenig apud Retz. obs. bot. 4. p. 17.*
- antido- 67. P. panicula nutante: calicibus bifloris polygamis acutis,  
ton. culmo erecto ramosissimo. *Koenig apud Retz. obs. bot. 4. p. 17.*
- miliace- 68. P. panicula laxa flaccida, foliorum vaginis hirtis, glumis  
um. mucronatis nervosis. *Regn. bot. t. 381.*  
*β) Moris. hist. pl. 3. t. 5. f. 2.*
- repens. 69. P. panicula virgata; foliis divaricatis.
- virgatum. 70. P. panicula virgata, glumis acuminatis laevibus: extima  
dehilcente.
- curvatum. 71. P. panicula racemosa, glumis curvatis obtusis nervosis.
- divarica- 72. P. paniculis brevibus muticis: pedicellis bifloris; altero  
tum. brevior, culmo ramosissimo divaricatissimo.
- trigonum. 73. P. panicula erecta: pedunculis bifloris, calicibus obtusis  
hilpidis unifloris, seminibus trigonis. *Koenig apud Retz. obs. bot. 3. p. 9.*
- ischae- 74. P. panicula erecta rara contracta: calicibus bifloris polyga-  
moides. mis acutis, culmo simplici, foliis distichis rigidis. *Koenig apud Retz. obs. bot. 4. p. 17. et Naturf. 23. p. 209.*
- clandestini- 75. P. racemis occultatis intra foliorum vaginas. *Sloan. hist. jam. 1. t. 80.*
- pallens. 76. P. panicula composita ovata: ramis confertis erectis, spicu-  
lis ovatis subulatis, culmo subdiviso geniculato, vaginis  
collo margineque ciliatis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 23.*

- lunatum. 77. P. panicula composita erecta glabra: spiculis ovatis, culmo  
ramoso, foliis pubescentibus, vaginis lanuginosis. *Swartz  
nov. pl. gen. et sp. p. 24.*
- arundina- 78. P. panicula composita patente: ramis ramulisque strictis  
ceum. papillaribus, spiculis subrotundis, culmo subdiviso geni-  
culato, foliis rigidis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 24.*
- polyga- 79. P. panicula composita capillari patente; flosculis polyga-  
mum. mis, culmi articulis hirsutis. *Swartz nov. pl. gen. et sp.  
p. 24.*
- glutino- 80. P. panicula composita patente: ramis flexuosis; spiculis  
sum. pedicellatis distantibus glutinosis, culmo erecto simplici.  
*Sloan. hist. jam. 1. t. 71. f. 3.*
- brevifoli- 81. P. panicula ramosissima patente: ramis ramulisque subdi-  
um. visis capillaribus, culmo declinato geniculato, foliis gla-  
berrimis: vaginis longitudinaliter ciliatis. *Sloan. hist. jam.  
1. t. 72. f. 3.*
- arbores- 82. P. paniculatum ramosissimum procumbens, foliis ovato-ob-  
cens. longis acuminatis, spiculis subglobosis. *Koenig Naturf.  
23. p. 208.*
- radicans. 83. P. paniculatum, culmo ramoso radicante, foliorum basi  
vaginisque longitudinaliter ciliatis. *Wennerb. apud Retz.  
obs. bot. 4. p. 18.*
- caffro- 84. P. panicula verticillatim ramosa, corollis nullis, nectariis  
rum. villosis-laceris. *Retz. obs. bot. 2. p. 7.*
- maxi- 85. P. panicula terminali erecta longa: racemis lateralibus pa-  
mum. tentibus verticillatis alternisque, culmo erecto simplici  
compresso glabro. *Jacq. collect. 1. p. 76.*
- palmae- 88. P. foliis sulcatis, culmo erecto. *Koenig Naturf. 23.  
folium. p. 208.*
- fugax. 89. P. culmo decumbente, paniculis celerrime marcidis. *Koe-  
nig Naturf. 23. p. 209.*
- specio- 92. P. panicula elongata erecta geniculata: ramis verticillatis  
ium. simplicibus brevibus; floribus solitariis subsessilibus. *Walt.  
flor. carol. p. 73.*
- nudum. 93. P. culmo geniculato erecto nudo, floribus solitariis remo-  
tis verticillatis: pedunculis longissimis. *Walt. flor. ca-  
rol. p. 73.*

\*\*\* tribus incertae.

- falcatum. 96. *P. latifolium*, foliis lyratis. *Aubl. pl. guj.*  
 maculatum. 97. *P. scandens*, caule arundinaceo. *Aubl. pl. guj.*

**CHLORIS.** *Cal. Gluma communis* 2valvis, 2flora,  
*flosculis* apetalis aristatis.

♂. *Cal. Gluma* ivalvis.

♀. *fessilis. Cal. Gluma* 2valvis.

- cruciata. 1. *Chl. spicis* subquaternis cruciatis: *flosculis* acuminatis. *Syst. nat. XII. 3. p. 91. n. 15. Agrostis* cruciata. *Sloan. hist. jam. I. t. 69. f. 1.*
- ciliata. 2. *Chl. spicis* digitatis subquinis: *glumis* margine ciliatis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 25.*
- petraea. 3. *Chl. spicis* quaternis strictis erectiusculis: *spiculis* confertis glabris muticis, culmo compresso. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 25.*
- polydactyla. 4. *Chl. spicis* plurimis fasciculatis laxis: *glumis* margine ciliato-villosis. *Syst. nat. XII. 3. p. 669. n. 18. Andropogon* polydactylon. *Sloan. hist. jam. I. t. 65. f. 2.*
- radiata. 5. *Chl. spicis* plurimis fasciculatis erectiusculis: *flosculis* subulatis glabris. *Syst. nat. XII. 3. p. 669. n. 17. Andropogon* fasciculatum. *Sloane hist. jam. I. t. 69. f. 2.*  
 β) *Agrostis* radiata. *Syst. nat. XII. 2. p. 91. n. 14. Sloan. hist. jam. I. t. 68. f. 3.*

**1145. ANDROPOGON.** *Flores* polygami. *Cal.*  
*Gluma* iflora. *Cor.*  
*Gluma* basi aristata.

♀. *Sem.* 1.

- caricosus. 1. *A. spica* solitaria imbricata, *feminibus* hirsutis, *aristis* nudis contortis. *Rumpf amb. 5. t. 7. f. 2. A.*
- contortus. 2. *A. spica* solitaria: *flosculis* hinc masculis muticis, inde femineis longissimis unito contortoque aristatis. *Suppl. p. 432. Morif. hist. pl. 3. t. 4. f. ult.*
- crinitus. 3. *A. spica* solitaria hirsuta: *aristis* nudis geniculatis longissimis. *Thunb. fl. jap. p. 40.*

L 2

4. A.

- divarica- 4. A. spica oblonga: floribus lanatis remotis divaricatis; arista  
tus. flexuosa nuda.
- ferratus. 5. A. spica simplici imbricata: seriebus binis florum aristatis  
sessilium, binis muticis pedicellatorum, calicibus unival-  
vibus. *Koenig apud Retz. obs. bot. 5. p. 21.*
- brevifo- 6. A. spicis lateralibus solitariis: flosculis alternis remotis, cul-  
lius. mo geniculato compresso. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 26.*
- distachy- 7. A. spicis binis terminalibus, culmo indiviso. *Ger. fl. prov.*  
os. *t. 3. f. 2.*
- binatus. 8. A. spicis geminis lanatis: calicium valva altera acuminata,  
altera truncata tridentata, petalo majore aristato. *Koenig  
apud Retz. obs. bot. 5. p. 21.*
- ramosus. 9. A. spicis terminalibus conjugatis: spiculis geminis; mascula  
mutica pedicellata, culmo ramofo. *Forsk. fl. aeg. arab.  
p. 173.*
- annula- 10. A. spicis ad apicem culmi confertis alternis: floribus ap-  
tus. pressis geminatis; masculo mutico pedicellato, culmo ere-  
cto ramofo. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 173.*
- barbatus. 11. A. spicis digitatis, calicibus persistentibus, corollis cilia-  
tis. *Mant. p. 302. 588.*
- muticus. 12. A. spicis digitatis subternis: flosculis alternis sessilibus mu-  
ticis.
- Ishae- 13. A. spicis digitatis plurimis: flosculis sessilibus aristato mu-  
mum. ticoque; pedicellis lanatis. *Jacq. fl. austr. 4. t. 384.  
Schreb. gram. t. 33.*
- incurva- 14. A. spicis filiformibus subdigitatis: floribus geminatis; fe-  
tus. mineo pedicellato aristato, masculo sessili mutico, calici-  
bus univalvibus. *Koenig apud Retz. obs. bot. 5. p. 21.*
- Bladhii. 15. A. spicis suboctonis: flosculo hermaphrodito sessili aristato;  
neutro pedunculato ciliato mutico. *Bladh. apud Retz.  
obs. bot. 2. p. 27.*
- provin- 16. A. spicis fasciculatis laevibus: flosculis alternis subsessilibus  
cialis. fecundis aristatis. *Retz. obs. bot. 3. p. 43.*
- Schoen- 17. A. paniculae spicis conjugatis ovato-oblongis, rhachi pu-  
anthus. bescente, flosculis sessilibus; arista tortuosa. *Rumpf amb.  
5. t. 72.*
- virgini- 18. A. paniculae spicis conjugatis: pedunculis simplicibus, rha-  
cus. chi lanata, flosculis muticis; masculo tabescente. *Sloan.  
hist. jam. 1. t. 68. f. 2.*

- arista  
 istatis  
 nival-  
 , cul-  
 p. 26.  
 prov.  
 inata,  
 Koenig  
 afeula  
 arab.  
 us ap-  
 o ere-  
 cilia-  
 is mu-  
 o mu-  
 384.  
 s; fe-  
 calici-  
 21.  
 istato;  
 Retz.  
 ilibus  
 chi pu-  
 f amb.  
 s, rha-  
 Sloan.  
 19. A.
- bicornis. 19. A. paniculae spicis conjugatis: pedunculis ramosissimis, rhachi lanata, flosculis arista caduca; masculo tabescente. *Sloan. hist. jam. 1. t. 15.*
- hirtus. 20. A. paniculae spicis conjugatis: calicibus hirsutis. *Pluckn. alm. t. 92. f. 1.*
- fastigia-  
 tus. 21. A. paniculae spicis solitariis: pedunculis elongatis subfastigiatis, rhachi lanata, flosculis aristatis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 26.*
- saccharoi-  
 des. 22. A. paniculae ramis simplicibus: flosculis geminis; hermaphrodito aristato sessili, altero mutico pedicellato tabescente, rhachi pedicellisque lanatis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 26.*
- glaucus. 23. A. panicula foliacea: involucellis calicibusque bifloris, florum sessilium calicibus trivalvibus, pedicellatarum bivalvibus. *Koenig apud Retz. obs. bot. 5. p. 20.*
- aciculatus. 24. A. panicula contracta erecta: pedunculis trifloris: flosculis masculis binis pedicellatis acuminatis, femineo sessili aristato. *Rumpf amb. 6. t. 5. f. 1.*
- muricatus. 25. A. panicula contracta: spicis verticillatis; calicibus muticis muricatis. *Koenig apud Retz. obs. bot. 3. p. 43.*
- squarrosus. 26. A. panicula conferta: glumis subulatis scabris. *Suppl. p. 433.*
- Gryllus. 27. A. paniculae pedunculis simplicissimis trifloris: flosculo hermaphrodito sessili aristato ciliato basi barbato. *Baub. th. bot. p. 149. ic.*
- nutans. 28. A. panicula nutante: aristas tortuosas laevibus, glumis calicinis hirsutis.
- ciliatus. 29. A. panicula cernua: calice exteriori multifloro ciliato; aristas contortis pilosis. *Thunberg fl. jap. p. 40.*
- ferratus. 30. A. panicula laxa: flosculo altero sessili, altero pedicellato: pedicellis hirsutis. *Thunb. fl. jap. p. 41.*
- cotuliferus. 31. A. panicula patula villosa: arista tortili nuda; pedicellis incrassatis. *Thunb. fl. jap. p. 41.*
- cymbarius. 32. A. panicula sparsa: bracteis cymbiformibus, floribus transversis aristatis ternis. *Mant. p. 302.*
- alopeuroides. 33. A. panicula laxa: rhachi lanata; flosculo utroque arista flexuosa. *Sloan. hist. jam. 1. t. 70. f. 1.*

- infularis. 34. A. panicula laxa glabra: flosculis geminis muticis; pedicello altero brevior, calicibus lanatis. *Rottb. act. litter. Hafn. 1. t. 1. f. 2.* Panicum lanatum. *An hujus aut milii species?*
- Nardus. 35. A. paniculae ramis supradecompositis proliferis. *Rumpf amb. 4. t. 6?*
- prostratus. 36. A. pedunculis umbellato-quinquefloris ecaliculatis: flosculo hermaphrodito aristato. *Mant. p. 304.*
- undatus. 37. A. panicula erecta ramosa: spicis alternis subternis; flosculis ternis, masculo inferiore seriore. *Jacq. collect. 3. p. 238.*
- afer. 38. A. spicis subternis terminalibus: flosculis omnibus aristatis. *Bruce trav. in Eg. Ar. Ab. and. Nub. 5. app. p. 47. ic. an hujus generis?*

77. PHLEUM. *Cal.* 2valvis, sessilis, linearis, truncatus: apice bicuspidato. *Cor.* inclusa.

- pratense. 1. Phl. spica cylindrica longissima ciliata, culmo erecto. *Schreb. gram. t. 14.*
- nodosum. 2. Phl. spica cylindrica, culmo adscendente, foliis obliquis, radice bulbosa. *Flor. dan. t. 380. Gaertn. de fruct. et sem. pl. cent. 1. t. 1. f. 1.*
- alpinum. 3. Phl. spica ovato-cylindrica. *Flor. dan. t. 213.*
- arenarium. 4. Phl. spica ovata ciliata, culmo ramoso. *Pluckn. alm. t. 33. f. 8.*
- schoenoides. 5. Phl. spicis ovatis obvolutis, foliis brevissimis mucronatis amplexicaulibus; *an idem cum anthoxantho aculeato?*
- Bellardi. 9. Phl. spica subovata: glumis ciliatis, culmo geniculato. *Belard. ap. Vitmann sum. plant. 1. p. 176.*
- Gerardi. 10. Phl. spica subrotunda: glumis ciliatis, caule simplici, foliorum vaginis ventricosis. *Allion. flor. pedem.*
- viride. 11. Phl. spica cylindrica laevi, culmo erecto. *Allion. flor. pedem.*
- Michellii. 12. Phl. spicis cylindricis paniculatis hirsutis: calicibus lanceolatis. *Barr. ic. 21. f. 2.*
- alopecuroides. 6. Phl. spicis cylindricis solitariis: glumis subvillosis, culmo adscendente. *Pill. et Mitterp. it. flavon. p. 147. t. 16. An distincta hujus generis species?*

7. Phl.

- asperum. 7. Phl. panicula erecta spicata densa glabra: glumis mucronatis dorso subserratis. *Jacq. collect. I. p. 110.*  
 paniculatum. 8. Phl. panicula cylindrica spicaeformi: glumis nudis, culmo subramoso. *Huds. flor. angl. 26.*

78. ALOPECURUS. Cal. 2valvis. Cor. 1valvis.  
 Nectar. 0.

- indicus. 1. A. spica tereti: involucellis setaceis fasciculatis bifloris, pedunculis villosis. *Pluckn. alm. t. 92. f. 5.*  
 bulbosus. 2. A. culmo erecto, spica cylindrica, radice bulbosa. *Raj. syn. angl. 3. t. 20. f. 2.*  
 β) Alopecurus sericeus. *Gaertn. de fruct. et sem. cent. I. t. I. f. 2.*  
 pratensis. 3. A. culmo spicato erecto: glumis villosis, corollis muticis. *Schreb. gram. t. 19. f. 1.*  
 agrestis. 4. A. culmo spicato erecto: glumis laevibus. *Fl. dan. t. 697. Schreb. gram. t. 19. f. 2.*  
 ciliatus. 11. A. culmo spicato erecto, glumis ciliatis. *Allion. flor. pedem.*  
 geniculatus. 5. A. culmo spicato infracto, corollis muticis. *Leers fl. herb. t. 2. f. 7.*  
 carolinianus. 6. A. culmo radicante, panicula subspicata, glumis laevibus, corollis aristatis. *Walt. flor. carol. p. 74.*  
 typhoides. 12. A. racemo simplici: flosculis muticis. *Pluckn. alm. t. 32. f. 4.*  
 hordeiformis. 7. A. racemo simplici: flosculis aristis circumvallatis. *Pluckn. alm. t. 119. f. 1.*  
 monspeliensis. 8. A. panicula subspicata: calicibus scabris, corollis aristatis. *Schreb. gram. t. 20. f. 3.*  
 panicus. 9. A. panicula subspicata: glumis villosis, corollis aristatis. *Flor. dan. t. 861.*  
 caudatus. 10. A. panicula spicata caudata: flosculis aristis circumvallatis. *Thunb. nov. act. Ups. 3. p. 208.*  
 ovata. 18. A. panicula ovata coarctata spicae aemula: petalo exteriori ante apicem aristato. *Forst. fl. austr. p. 8.*

79. MILIUM. Cal. 2valvis, 1florus: valvis subaequalibus. Cor. brevissima. Stigm. penicilliformia.

- capense. 1. M. panicula capillari: calicibus acuminatis, corollis arista terminali curva. *Mant. p. 185.*
- punctatum. 2. M. paniculae ramis simplicissimis: floribus alternis geminis secundis.
- lendigerum. 3. M. panicula subspicata: floribus aristatis. *Schreb. gram. t. 23. f. 3.*
- effusum. 4. M. floribus paniculatis disperfis muticis. *Curt. flor. Lond. fasc. 43.*
- confertum. 5. M. floribus paniculatis confertis.
- paradoxum. 6. M. floribus paniculatis aristatis. *Schreb. gram. t. 23. f. 2.*
- globosum. 7. M. panicula patula: glumis muticis, pedicellis cingulo luteo. *Thunb. fl. jap. p. 49.*
- compressum. 8. M. spicis subternis: flosculis alternis muticis rhachi adpressis, culmo medio articulato-compresso, pedunculis longissimis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 24.*
- panicum. 9. M. spicis subdigitatis alternis approximatis filiformibus: flosculis secundis muticis adpressis trigonis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 24.*
- digitatum. 10. M. spicis digitatis subquaternis subsessilibus: flosculis muticis adpressis secundis, foliis margine cartilagineo-ferratis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 24.*

80. AGROSTIS. Cal. 2valvis, 1florus, corolla paulo minor. Petalum exterius glabrum. Stigmata longitudinaliter hispida.

\* *Aristatae.*

- Spica venti. 1. Agr. petalis integris: exteriori arista recta stricta longissima, panicula patula. *Flor. dan. t. 853.*
2. Agr.

*Medium inter alopecurum et cornucopiae genus, corolla pariter 1valvi, at neque involucratum neque aristatum, in Chirokesium terra nuper inventum, egregie passis inserviens, nondum satis notum.*



- interru- 2. Agr. petalis bifidis: exteriore aristato, panicula attenuata  
pta. coarctata interrupta. *Vaill. bot. pur. t. 71. f. 4.*
- miliacea. 3. Agr. petalo exteriore arista terminali recta stricta mediocri.
- bromoi- 4. Agr. panicula simplici angustata: corolla pubescente: arista  
des. recta calice longiore. *Gouan ill. et obs. bot. 3. t. 1. f. 3.*
- australis. 5. Agr. panicula subspicata, seminibus ovatis pubescentibus:  
arista longitudine calicis. *Mant. p. 30.*
- alpina. 6. Agr. foliis setaceis, panicula coarctata, calicibus hispidius-  
culis coloratis: petalo exteriore arista dorsali geniculata.  
*Flor. dan. t. 161.*
- vinealis. 7. Agr. calicibus coloratis, petalorum arista dorsali longitudi-  
ne fere calicis, culmis ascenduntibus. *Schreb. spic. fl.  
Lips. p. 47.*
23. ferotina. 8. Agr. panicula flosculis oblongis mucronatis, culmo obtecto  
foliis brevissimis. *Mant. p. 30.*
- o lu- rubra. 9. Agr. paniculae parte inferiore prius florente patentissima:  
arista terminali tortili recurva.
- i ad- spicifor- 10. Agr. panicula spicae aemula, flosculis biaristatis: corollis  
culis mis. hirtis; arista altera receptaculo inserta geniculata longiori,  
altera infra apicem corollae recta. *Suppl. p. 108.*
- flos- hirsuta. 11. Agr. panicula subspicata, caule foliisque hirsutis, petalis  
v. pl. dorso aristatis apice bifidis. *Suppl. p. 108.*
- mu- Matrella. 12. Agr. floribus racemosis: calicis valva exteriore incurva ca-  
terra- rinae apice tantum dehiscente. *Mant. p. 185.*
- Lacrfii. 13. Agr. calicibus elongatis, petalorum arista dorsali recurva,  
culmis prostratis subramosis. *Leers fl. herb. t. 4. f. 2.*
- ulo gigantea. 14. Agr. paniculae parte superiore prius florente patentissima,  
glabro: dorso superne  
glabro: dorso superne  
subaristato, culmo erecto. *Roth. fl. germ. 1. p. 31.*
- adi- dubia. 15. Agr. calicibus aequalibus laevibus, corollis infra apicem  
mucronatis, foliis setaceis. *Leers fl. herb. n. 56.*
- festa- festucoides. 16. Agr. foliis setaceis, panicula patula, petalis basi arista in-  
flexa calicibus duplo longiore. *Hall. hist. stirp. belv. 2.  
n. 1478.*
- Agr. filiformis. 17. Agr. foliis culmisque filiformibus, panicula approximata:  
flosculis basi aristatis glabris. *Villars pl. delph. 2. p. 78.*

- Cinna. 18. Agr. petalo exteriori subaristato, nectarii foliolis minimis obtusiusculis, panicula oblonga attenuata secunda. *Syst. nat.* XII. 3. p. 52. Cinna arundinacea. *Flosculi 1-3 andri.*
- \*\* Muticae.
- verticilla. 19. Agr. panicula recta verticillis radiatis rigidis interrupta.  
ta. *Villars pl. delph. 2. p. 74.*
- stricta. 43. Agr. panicula stricta pauciflora, culmo erecto. *Hall. hist. stirp. Helv. 2. n. 1476.*
- linearis. 20. Agr. spicis subquaternis digitatis: flosculis unilateralibus alternis adpressis. *Koenig apud Retz. obs. bot. 4. p. 19. an hujus generis?*
- procera. 21. Agr. paniculae pedunculis racemosis erectiusculis: floribus hirsutis lanceolatis. *Koenig apud Retz. obs. bot. 4. p. 19.*
- coroman- 22. Agr. panicula ovata patente: pedunculis simplicibus; flori-  
deliana. bus secundis; calicibus aequalibus acutis nitidis. *Koenig apud Retz. obs. bot. 4. p. 19.*
- diandra. 23. Agr. panicula elongata contracta: floribus subulatis dian-  
driis, foliis convolutis. *Koenig apud Retz. obs. bot. 5. p. 19.*
- purpuraf- 24. Agr. panicula contracta elongata: ramis adpressis erectis;  
cens, flosculis inaequalibus acuminatis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 25.*
- stolonife- 25. Agr. paniculae ramulis patentibus, culmo repente, calici-  
ra. bus aequalibus. *Flor. dan. t. 564. An cum capillari, alba, virginica, sylvatica et pumila ejusdem speciei varietas, ex soli discrimine nata?*
- capillaris. 26. Agr. panicula capillari patente: calicibus aequalibus subu-  
latis hispidiusculis coloratis. *Flor. dan. t. 163. an alopecuri species?*
- sylvatica. 27. Agr. panicula coarctata mutica, calicibus aequalibus: vir-  
gineis corolla brevioribus, foecundatis duplo longioribus.
- alba. 28. Agr. panicula laxa: calicibus muticis aequalibus, culmo repente.
- pumila. 29. Agr. panicula mutica secunda, culmis fasciculatis erectis.  
*Mant. p. 31. an mera stolonifera, ustilagine referta?*
- minima. 30. Agr. panicula filiformi. *Morif. hist. pl. 3. t. 2. f. 10.*
- tenacissi- 31. Agr. panicula contracta filiformi: floribus linearibus: val-  
ma. vis parallelis. *Suppl. p. 107.*

- virginica. 32. Agr. panicula contracta mutica, foliis involuto-subulatis rigidis exstantibus.
- mexicana. 33. Agr. panicula oblonga congesta: calicibus corollisque acuminatis subaequalibus. *Mant. p. 31.*
- indica. 34. Agr. panicula contracta mutica: racemis lateralibus erectis alternis.
- aspera. 35. Agr. panicula contracta: racemis lateralibus alternis strictis, foliis asperis. *Weber suppl. flor. holf. p. 4.*
- pungens. 36. Agr. panicula contracta, foliis convolutis subpungentibus, culmo repente prolifero. *La Mark. dict. bot. n. 23.*
- ciliata. 37. Agr. panicula mutica: gluma calicina angulata ciliata. *Thunb. fl. jap. p. 49.*
- avenacea. 38. Agr. panicula erecta tenuissima: aristis calice duplo longioribus. *Forst. fl. austr. p. 9.* Avena filiformis.
- glomerata. 39. Agr. spicis bifidis glomeratis terminalibus, bracteis clavatis plumosis. *Walt. flor. carol. p. 59.*
- lateralis. 40. Agr. spicis bifidis lateralibus solitariis, bracteis clavatis plumosis. *Walt. flor. carol. p. 59.*
- lenta. 41. Agr. spicis subternis umbellatis: flosculis oblongis acutis; valvis subaequalibus, foliis vaginisque glabris. *Ait. hort. Kew. 1. p. 96.*

**MUHLENBERGIA.** Cal. 1valvis, minimus, lateralis,  
Cor. 2valvis, semen includens. Nectar. 2phyllum.

Schreberi. I. MUHLENBERGIA. *Schreb. gen. plant. Linn. 1. p. 44. n. 103.*

**CALAMAGROSTIS.** Cal. Gluma 2valvis, iflora:  
Corolla basi pilosa.

\* *Aristatae.*

- villosa. 1. C. panicula oblonga: petalo exteriori aristato villis obsito. *Villars pl. Delph. 2. p. 79.*
- Arundo. 2. C. panicula incrassata: petalo exteriori piloso dorso aristato, culmo ramoso. *Syst. nat. XII. 3. p. 90.* Agrostis Calamagrostis.

3. C.

Agr.

- arundina-3. C. panicula oblonga: petalo interiore basi piloso; exteriore  
cea. glabro, arista e basi torta calice longiore. *Syst. nat.* XII.  
3. p. 90. Agrostis arundinacea.
- lanceola-4. C. panicula lanceolata contracta spicae aemula: corollis li-  
ta. nearibus basi pilosis; arista dorsali recta brevi, culmo ra-  
moso. *Syst. nat.* XII. 3. p. 100. Arundo Calamagrostis.  
*Fl. dan. t.* 280.
- conspicua. 5. C. panicula laxa erecta patente: petali exterioris arista re-  
flexa longissima. *Forst. fl. austr. p.* 9.

## \*\* Muticae.

- Epigeios. 6. C. panicula stricta; corollis exiguis basi pilosis, foliis sub-  
tus planis. *Syst. nat.* XII. 3. p. 100. Arundo epigeios.
- arenaria. 7. C. panicula spicata; corollis basi pilosis, foliis involutis mu-  
cronato-pungentibus. *Syst. nat.* XII. 3. p. 100. Arundo  
arenaria.
- Karka. 8. C. panicula secunda nutante: calicibus nudis corolla subu-  
lata intus lanata multo brevioribus. *Koenig apud Retz.*  
*obs. bot. 4. p.* 21.
- canescens. 9. C. panicula laxissima, gluma subaequali: valvis mucrona-  
to-aristatis. *Wiggers fl. hols. p.* 10.
- bicolor. 10. C. panicula angusta erecta, foliis glabris convolutis. *Poir.*  
*voy. en Barb. 2. p.* 104.
- Plinii. 11. C. calicibus utrinque glabris margine introrsum scabris.  
*Zanon. hist. t.* 19. f. 2.
- farcta. 12. C. tenuis scandens. *Aubl. pl. guj. an hujus generis?*

1146. HOLCUS. ♂. Cal. Gluma 1, 2-3flora. Cor.  
Gluma aristata. Sem. 1.  
♂. Cal. Gluma 2valvis. Cor. 0.

- latifoli- 1. H. glumis trifloris: flosculo primo inermi; duobus margi-  
us. ne aculeatis, foliis subovatis.
- odoratus. 2. H. glumis trifloris muticis acuminatis: flosculo hermaphro-  
dito diandro. *Loef. fl. pruss. t.* 26.
- biarista- 3. H. glumis subtrifloris: flosculis pedicellatis apice aristatis.  
tus. *Leers fl. herbon. p.* 41. t. 9. f. 3. Avena dubia.

- riore XII. Dochma. 4. H. paniculae ramis subternato-verticillatis patentibus: rudimentis florum sessilibus infra flores fertiles aristatos. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 174.*
- lis li- o ra- oltis. exiguus. 5. H. panicula coarctata: ramis alternis, rudimentis florum pedicellatis infra flores fertiles aristatos. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 174.*
- a re- ceus. 6. H. glumis bifloris: arista floris masculi dorsali refracta. *Syst. nat. XII. 3. p. 99. Avena elatior. Flor. dan. t. 165. Schreb. gram. t. 1.*
- ferratus. 7. H. glumis bifloris pubescentibus muticis, foliis ferratis. *Suppl. p. 433.*
- sub- geios. striatus. 8. H. glumis bifloris striatis muticis acuminatis, panicula conferta oblonga.
- mu- unda. laxus. 9. H. glumis bifloris glabris muticis acuminatis, panicula filiformi debili.
- sub- Retz. lanatus. 10. H. glumis bifloris villosis: flosculo hermaphrodito mutico; masculo arista recurva. *Schreb. gram. t. 20. f. 1. Curt. flor. Lond. t. 228.*
- ona- mollis. 11. H. glumis bifloris nudiusculis: flosculo hermaphrodito mutico; masculo arista geniculata. *Schreb. gram. t. 20. f. 2.*
- Poir. spicatus. 12. H. glumis bifloris muticis, floribus geminis penicillo involucratis, spica ovato-oblonga. *Arduin Sagg. dell' acad. di Padov. 1. p. 124. t. 2.*
- bris. pertusus. 13. H. spicis digitatis: glumis valva pertusa. *Mant. p. 301.*
- halepen- 14. H. glumis glabris, floribus hermaphroditis muticis: femineo aristato. *Schreb. gram. t. 18.*
- Cor. bicolor. 15. H. glumis glabris nigris, feminibus globosis albis aristatis. *Mant. p. 301. Mieg. act. helv. 8. t. 4. f. 4.*
- . O. Soryhum. 16. H. glumis villosis, feminibus compressis aristatis; panicula ovata. *Mieg. act. helv. 8. t. 4. f. 3.*
- argi- tus. 17. H. glumis villosis, feminibus omnibus aristatis, paniculae racemis patentissimis. *Rampf amb. 5. t. 75.*
- phro- Duna. 18. H. panicula ovata: spiculis sessilibus subvillosis alternatim appendiculatis; flosculo uno alterove vacuo sessili. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 174.*
- latis. racemo- 19. H. spica cylindrica: spiculis ternatis pedicellatis, involu-  
sius. cris setaceis longissimis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 175.*

- cafer. 20. H. panicula subumbellata ramosa: glumis villosis, subtrifloris feminibus globosis subnudis. *Arduin. fagg. dell' acad. di Pad. 1. p. 119. t. 1. f. 1.*
- Arduini. 21. H. panicula erecta densa ovata, glumis apice villosis, feminibus rufis. *Arduin. fagg. di Padov. 1. p. 133. t. 4. f. 4.*
- niger. 22. H. panicula rara pyramidalis: ramis pendulis, glumis nigris lucidis. *Ard. fagg. di Padov. 1. p. 135. t. 5. f. 1. an huc spectat Teff? Bruce trav. in Eg. Ar. Ab. and. Nub. 5. app. p. 76. ic.*

81. AIRA. Cal. 2valvis, 2florus. Flosculi absque interjecto rudimento.

\* *Muticae.*

- arundina- 1. A. panicula secunda oblonga mutica imbricata, foliis planis.  
cea.
- minuta. 2. A. panicula laxa subfastigiata ramosissima. *Schreb. gram. t. 20. f. 2.*
- aquatica. 3. A. panicula patente, floribus laevibus calice longioribus, foliis planis. *Flor. dan. t. 381. calicibus interdum 5floris, an potius Poa?*
- capensis. 4. A. culmo ramoso, floribus racemosis: corollis pilosis. *Suppl. p. 108.*
- Koenigii. 5. A. panicula densa; calicibus glabris, culmo ascendente. *Retz. obs. bot. 5. p. 19. Poa biflora.*
- bengalen- 6. A. panicula erecta: pedicellis trifloris; petalis intus lanatis.  
sis. *Koenig apud Retz. obs. bot. 5. p. 20. Arundo bengalensis.*
- miliacea. 7. A. panicula numerosissima: flosculis ternis obtusis distinctis, foliis glabris striatis. *Villars fl. Delph. 2. p. 81.*
- aegilop- 23. A. spicis secundis, corollae valva altera ovata acuminata,  
foides. altera columnari obtusa. *Walt. flor. carol. p. 78.*

\*\* *Aristatae.*

- paludosa. 8. A. foliis planis, panicula patente: flosculis basi hirsutis; arista brevi inflexa. *Roth. fl. germ. 1. p. 35.*
- cespitosa. 9. A. foliis planis, panicula patente: petalis basi villosis aristatisque; arista recta brevi. *Flor. dan. t. 240.*

- subspicata. 10. A. foliis planis, panicula spicata: flosculis medio aristatis; arista reflexa laxiore. *Flor. dan. t. 228.*
- antarctica. 11. A. foliis planis, panicula composita patente: calicibus trifloris; flosculis medio aristatis arista elongata rectiuscula. *Forst. fl. austr. p. 8. an hujus generis?*
- festuroides. 12. A. foliis filiformibus, panicula erecta: floribus coloratis ultra medium aristatis. *Villars pl. Delph. 2. p. 85.*
- juncea. 13. A. foliis subulatis, panicula patente obtusissima, arista e basi longitudine calicis. *Villars fl. Delph. 2. p. 86.*
- alpina. 14. A. foliis subulatis, panicula densa: flosculis basi pilosis aristatis; arista brevi.
- villosa. 15. A. foliis subulatis, panicula elongata angustata: flosculis sesquialteris hirtis aristatis: arista recta brevi. *Suppl. p. 109.*
- finensis. 16. A. foliis setaceis, panicula erecta: flosculis villosis. *Bladh. apud Retz. obs. bot. 3. p. 10.*
- setacea. 17. A. foliis setaceis, panicula diffusa: flosculis basi pilosis; inferiore mutico, superiore arista brevi. *Retz. obs. bot. 3. p. 10. an vere distincta species?*
- flexuosa. 18. A. foliis setaceis, culmis subnudis, panicula divaricata: pedunculis flexuosis. *Flor. dan. t. 157. Schreb. gram. t. 30. an tantum aetate proveciore a montana distincta, et cum 4 insequentibus ob aristam tortilem ad avenas releganda?*
- montana. 19. A. foliis setaceis, panicula angustata: flosculis basi pilosis aristatis; arista tortili longiore. *Stillingfl. gram. t. 4.*
- media. 25. A. foliis setaceis, panicula laxa: flosculis basi pilosis; arista subterminali breviori. *Gouan. illustr.*
- canescens. 20. A. foliis setaceis: vaginis scabris, floribus paniculatis: aristis calicem non excedentibus. *Morif. hist. pl. 3. t. 3. f. 10. Gaertn. de fr. et sem. pl. cent. 1. t. 1. f. 7.*
- praecox. 21. A. foliis setaceis: vaginis glabris fulcato-angulatis, floribus paniculato-spicatis: aristis calicem superantibus. *Flor. dan. t. 383.*
- caryophyllea. 22. A. foliis setaceis: vaginis glabris fulcatis, panicula divaricata: aristis calicem superantibus. *Flor. dan. t. 382.*
- purpurea. 24. A. foliis subulato-setaceis, panicula sparsa: corollae valva altera integra plumosa, culmo erecto. *Walt. flor. carol. p. 78.*

33. MELICA. Cal. 2valvis, 2florus. Corpusculum  
pedicellatum inter flosculos. Ne-  
ctar. 1phyllum, Stamina basi  
dilatata.

- ciliata. 1. M. spica cylindrica flosculi inferioris petalo exteriori cilia-  
to. *Scheuchz. gram. t. 3. f. 16. G. I. K.*
- ramosa. 2. M. culmo ramoso, panicula patula, foliis involutis, floscu-  
li inferioris petalo exteriori ciliato. *Gmel. fl. sib. I. t. 19. f. 1. an satis distincta a ciliata?*
- nutans. 3. M. petalis imberbibus, panicula nutante simplici. *Schreb. gram. t. 6. an cum reliquis speciebus bifloris a iris jungenda?*
- Lobellii. 4. M. panicula ramosa, foliorum vagina acuminata oppositifolia, radice repente, petalis imberbibus. *Villars pl. Delph. 2. p. 89. t. 3.*
- minuta. 5. M. culmo ramoso, foliis setaceis, petalis imberbibus. *Mant. p. 32.*
- caerulea. 6. M. panicula coarctata: floribus cylindricis, culmo enodi. *Syst. nat. XII. 3. p. 91. Aira caerulea. Flor. dan. t. 239.*
- papilionacea. 7. M. calicis valva inferiore maxima colorata, petalo exteriori subciliato. *Mant. p. 31. Sloan. hist. jam. I. t. 64. f. 1.*
- altissima. 8. M. petalis imberbibus, panicula ramosissima. *Gmel. fl. sib. I. t. 20.*
- Falx. 9. M. spica secunda compressa imbricata. *Suppl. p. 109.*
- uniflora. 10. M. panicula rara: calicibus bifloris; flosculo altero hermaphrodito, altero neutro. *Retz. obs. bot. I. p. 10.*
- nodosa. 11. M. panicula coarctata, culmo nodoso. *Pill. et Mitterp. it. slav. p. 143. t. 14. an satis distincta a caerulea?*
- pyramidalis. 12. M. petalis imberbibus, panicula pyramidalis laxa, foliis involuto-junceis. *Poir. voy. en Barb. 2. p. 93. Morif. hist. pl. f. 8. t. 7. f. 51.*
- mutica. 13. M. petalis imberbibus, panicula laxa pauciflora, glumis muticis obtusis. *Walt. flor. carol. p. 78.*
- arundinacea. 14. M. brachiis paniculae villosis, *Schranck baierisch. Flor. I. p. 336.*



**SAVASTANA.** *Cal.* 3florus, 2valvis: valvis subcarinatis subaequalibus. *Flosc.* 2masculi, 1femineus.

hirta. I. SAVASTANA. *Sekranck bairisch. Flora. I. p. 337.*

**TRISETARIA.** *Cal.* 2valvis, 2florus. *Cor.* 2valvis: valva utraque aristata; arista exterioris terminali 2partita, interioris dorsali simplici.

Forskäh- I. TRISETARIA. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 27.*  
lii.

**1333. SPINIFEX.** *Flores* polygami. *Cal.* Gluma 2valvis, 2flora: valvis rhamchi parallelis. *Cor.* 2valvis mutica.

sqvarro- I. SPINIFEX. *Mant. p. 300. Suppl. p. 432. Syst. nat. XII.*  
fus. 3. p. 98. *Stipa Spinifex. Moris. hist. pl. 3. t. 8. f. 11.*

**1148. ISCHAEMUM.** *Flores* polygami. *Cal.* Gluma 2flora. *Cor.* 2valvis.  
♀. *Sem.* 1.

muticum. 1. I. feminibus muticis. *Rheed. b. mal. 12. t. 49.*

aristatum. 2. I. feminibus aristatis, calicibus muticis.

murinum. 3. I. calice feminibusque aristatis. *Forst. nov. act. Ups. 3. t. 185.*

involutum. 4. I. spica secunda mutica quadriflora: involuta receptaculo foliaceo concavo. *Forst. fl. austr. p. 73.*

secundatum. 5. I. spicis subsecundis, floribus receptaculo innidulantibus. *Walt. flor. carol. p. 249.*

scariosum. 6. I. spicis filiformibus, floribus acuminatis exstantibus laevibus. *Walt. flor. carol. p. 249.*

glabrum. 7. I. spicis teretibus glabris nitidis, floribus subreconditis, feminibus magnis. *Walt. flor. carol. p. 249.*

**SEHIMA.** *Cal.* Gluma 2valvis, 2flora: *Flosculi cor.* 2valvi, *nunc uterque* masculus, *nunc* exterior masculus, interior hermaphroditus, aristatus. *Stil.* plumosi.

*ifchaemo- I. SEHIMA.* *Forsk. fl. aeg. arab. p. 178.*  
ides.

**1150. AEGILOPS.** *Flores* polygami. *Cal.* Gluma subtriflora, cartilaginea. *Cor.* Gluma terminata triplici arista.  
♂. *Sem.* 1.

- ovata. 1. *Ae.* calicibus omnibus triaristatis. *Aristae interdum 2 aut 4.*  
caudata. 2. *Ae.* calicibus omnibus biaristatis.  
triuncia- 3. *Ae.* calicibus inferioribus biaristatis. *Mant. p. 501. Schreb.*  
lis. *gram. t. 10.*  
squarrosa. 4. *Ae.* spica subulata aristis longiore. *Schreb. gram. t. 27. f. 2.*  
aromati- 5. *Ae.* spica secunda, culmis erectis, glumis quadrifloris.  
ca. *Walt. flor. carol. p. 249.*  
facchari- 6. *Ae.* spica secunda, culmis decumbentibus, glumis trifloris.  
na. *Walt. flor. carol. p. 249.*

**1044. TRIPSACUM.** *Flores* (saepe) monoici.  
♂. *Cal.* Gluma 4flora. *Cor.* Gluma membranacea.  
♀. *Cal.* Gluma sinibus perforatis. *Cor.* Gluma 2valvis. *Sem.* 1.

- dactyloi- 1. *Tr.* spicis androgynis. *Mill. illustr. ic.*  
des.  
her- 2. *Tr.* spica hermaphrodita. *Linn. fil. dec. 17. t. 9. Gaertn.*  
maphro- *de fr. et sem. cent. 1. t. 1. f. 4.*  
ditum.

83. POA. Cal. 2valvis, multiflorus. Spiculae ovatae: valvis margine scariosis acutiusculis.

- aquatica. 1. P. panicula diffusa: spiculis sexfloris linearibus. *Leers. fl. herb. t. 5. f. 5. calices 5-10flori.*
- alpina. 2. P. panicula diffusa ramosissima: spiculis sexfloris cordatis. *Hall. app. ad Scheuchz. gram. 1. t. 3.*  
 β) *Poa vivipara. Flor. dan. t. 807.*
- subnuda. 54. P. panicula laxa: spiculis bifloris; flosculis calice duplo longioribus glaberrimis. *Hall. hist. stirp. Helv. 2. n. 1470. an hujus generis?*
- Gerardi. 55. P. culmo recto, spiculis trifloris glaberrimis, calicibus aristatis. *Gerard fl. provinc. t. 2. an hujus generis?*
- simplex. 56. P. panicula diffusa: spiculis remotis trifloris: calicibus inferioribus unifloris, culmo erecto angulato. *Walt. flor. carol. p. 79.*
- trivialis. 3. P. panicula subdiffusa: spiculis trifloris basi pubescentibus, foliis planis: vaginis glabris; ligula brevi truncata. *Curt. flor. Lond. t. 90.*
- nitens. 4. P. panicula diffusa, calicibus trifloris glaberrimis, flosculis majoribus. *Weber suppl. flor. hols. p. 2.*
- angustifolia. 5. P. panicula diffusa: spiculis quadrifloris pubescentibus, foliis radicalibus convolutis filiformibus: vaginis glabris; ligula brevi truncata. *Leers fl. herb. t. 6. f. 3.*
- pratensis. 6. P. panicula diffusa: spiculis subquinquefloris, foliis planis: vaginis scabris; ligula oblonga acuta. *Curt. flor. Lond. t. 841.*
- annua. 7. P. panicula diffusa patentissima: spiculis subquinquefloris, foliis planis: vaginis glabris; ligula brevi acuminata. *Curt. flor. Lond. t. 8.*
- flava. 8. P. panicula diffusa: spiculis ovato-oblongis nitidis. *Pet. mus. 239.*
- pilosa. 9. P. panicula patente stricta: ramificationibus primariis pilosis.
- palustris. 10. P. panicula diffusa: spiculis subtrifloris pubescentibus, foliis subtus scabris. *Flor. dan. t. 750.*
- salina. 11. P. panicula diffusa: spiculis septemfloris linearibus: glutinis omnibus obtusissimis, culmo basi subrepente. *Leyf. fl. Hal. n. 93.*

- sylvatica. 12. P. panicula diffusa: spiculis subquinquefloris; glumis acutissimis. *Pollich fl. palat. n. 87.*
- plumosa. 13. P. panicula diffusa: calicibus sexfloris: valvis corollarum interioribus linearibus recurvis dorso ciliatis. *Koenig ap. Retz. obs. bot. 4. p. 20.*
- anceps. 14. P. panicula diffusa: spiculis quinquefloris acutis basi pubescentibus, culmo ancipiti. *Forst. fl. austr. p. 8.*
- prolifera. 15. P. panicula patente stricta: spiculis subvigintifloris culmo ramolissimo nodoso ad nodos prolifero. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 27.*
- glutinosa. 16. P. panicula patente stricta: spiculis subnovemfloris hirsutiusculis glutinosis, culmo simplici, foliis subpilosis. *Sloan. hist. jam. 1. t. 71. f. 2.*
- viscosa. 17. P. panicula oblonga patente: spiculis inferioribus trifloris; superioribus duodecimfloris, culmis rigidis demum viscosis. *Koenig apud Retz. obs. bot. 4. p. 20.*
- punctata. 18. P. panicula diffusa: spiculis duodecimfloris; floribus diaphanis laevibus puncto intus fusco. *Suppl. p. 109.*
- amabilis. 19. P. panicula patente: spiculis octodecimfloris linearibus.
- hirta. 20. P. panicula patula: vaginis foliorum punctato-ciliatis. *Thunb. fl. jap. p. 49.*
- ferruginea. 21. P. panicula patula capillari: spiculis quinquefloris oblongis; glumis glabris. *Thunb. fl. jap. p. 50.*
- barbata. 22. P. panicula patula capillari: spiculis sexfloris oblongis; glumis carinatis glabris. *Thunb. fl. jap. p. 50.*
- japonica. 23. P. panicula patula capillari: spiculis septemfloris foliisque glabris, culmo ramoso. *Thunb. fl. jap. p. 51.*
- abyssinica. 24. P. panicula patula: spiculis oblongis subquinquefloris, culmo geniculato inferne procumbente ramoso. *Jacq. pl. rar. ic. t. 43.*
- Eragrostis. 25. P. panicula patente: pedicellis flexuosis: spiculis ferratis decemfloris, glumis trinerviis. *Schreb. gram. t. 38.*
- capillaris. 26. P. panicula laxa patentissima capillari, foliis pilosis, culmo ramolissimo. *Morif. hist. pl. 3. t. 6. f. 33.*
- Phoenix. 58. P. panicula laxa: spiculis tereti-compressis pendulis octofloris. *Scop. flor. carn.*

- expensa. 59. P. panicula divaricata: ramis geminatis; spiculis subquadrifloris. *Gouan. illustr. t. 2. f. 1.*
- cilianensis. 60. P. panicula longissima ramosa: ramis erectis flexuosis, spiculis distichis quadrifloris. *Allion. flor. pedem. t. 91. f. 2.*
- aspera. 27. P. panicula ramosissima patentissima: pedunculis asperis: spiculis decemfloris, vaginis foliorum anterieus hirsutis. *Jacquin b. Vindob. 3. t. 56.*
- divaricata. 28. P. panicula divaricata: spiculis sexfloris acuminatis, foliis planis striatis. *Villars pl. delph. 2. p. 127.*
- brizoides. 29. P. panicula racemosa: spiculis ovatis compressis subnovemfloris, culmo compresso. *Suppl. p. 110.*
- nemorosa. 30. P. panicula attenuata florente patula: spiculis subbifloris mucronatis scabris, culmo debili. *Flor. dan. t. 749.*
- bohemicana. 31. P. panicula inflexa: spiculis alternis quadrifloris; glumarum linea dorsali scabra, culmo tereti glabro subprotrato. *Meyer phys. Anb. der Fr. zu Wien I. 1. p. 22. t. 1.*
- bulbosa. 32. P. panicula secunda patentiuscula: spiculis quadrifloris. *Krocker fl. siles. 1. t. 25.*
- distans. 33. P. panicula ramis subdivisis: spiculis quinquefloris; flosculis distantibus obtusis. *Mant. p. 32.*
- malabarica. 34. P. paniculae ramis simplicissimis: floribus sessilibus, seminibus distantibus, culmo repente. *Burm. fl. ind. t. 11. f. 2.*
- sinensis. 35. P. paniculae ramis simplicissimis: floribus sessilibus, seminibus imbricatis, culmo erecto. *Burm. fl. ind. t. 11. f. 3.*
- β) Poa panicea. *Retz. obs. bot. 3. p. 11. et 5. p. 19.*
- tenella. 36. P. panicula oblonga capillari subverticillata: spiculis sexfloris minutissimis nutantibus. *Burm. fl. zeyl. t. 47. f. 3.*
- rigida. 37. P. panicula lanceolata subramosa secunda: ramulis alternis secundis. *Curt. flor. Lond. t. 142.*
- montana. 61. P. panicula stricta: spiculis bifloris; flosculis basi villosis. *Hall. hist. stirp. Helv. 2. n. 1468.*
- dura. 38. P. panicula secunda: spiculis alternis sessilibus obtusis adpressis. *Syst. nat. XII. 2. p. 95. Cynofurus durus. Pollich fl. pal. t. 1. f. 1.*
- maritima. 39. P. panicula subspicata: spiculis secundis coarctatis, foliis convolutis, sarmentis repentibus. *Flor. dan. t. 251.*

- contracta. 38. P. panicula contracta: spiculis lanceolatis trifloris nudis sessilibus, foliis filiformibus. *Koenig apud Retz. obs. bot. 3. p. 11.*
- nutans. 39. P. panicula contracta apice nutante: spiculis decemfloris; valvis reversis. *Koenig apud Retz. obs. bot. 4. p. 19.*
- spicata. 40. P. panicula spicata: spiculis subulatis; flosculis remotis. *Mant. p. 32.*
- cristata. 41. P. panicula spicata: calicibus subpilosis subquadrifloris pedunculo longioribus, petalis aristatis. *Leers fl. herb. t. 5. f. 6.*
- cynosuroides. 42. P. panicula striata pyramidali: pedunculis patentissimis; spiculis pendulis distichis. *Koenig apud Retz. obs. bot. 4. p. 20.*
- unioloides. 43. P. panicula erectiuscula: spiculis subdecemfloris ovatis, calicibus inferioribus multivalvibus. *Koenig apud Retz. obs. bot. p. 19.*
- decumbens. 44. panicula contracta: petalo exteriori margine piloso, culmo decumbente. *Syst. nat. XII. 2. p. 97. Festuca decumbens. Flor. dan. t. 162.*
- peruviana. 45. P. panicula contracta terminali: spiculis subsessilibus densis; glumis suboctofloris. *Jacq. collect. 1. p. 107.*
- compressa. 46. P. panicula coarctata secunda, culmo obliquo compresso. *Flor. dan. t. 742.*
- glomerata. 57. P. panicula coarctata elongata, spiculis suboctofloris glomeratis, culmo erecto. *Walt. flor. carol. p. 80.*
- amboinensis. 47. P. panicula coarctata secunda, culmo tereti. *Mant. p. 557. Rumpf amb. 6. t. 7. f. 3.*
- ciliaris. 48. P. panicula contracta: glumarum valvis interioribus piloso-ciliatis. *Sloan. jam. 1. t. 73. f. 1.*
- Villarisi. 49. P. panicula contracta: spiculis teretibus quadrifloris muticis. *Villars. pl. delph. 2. p. 126.*
- planiculmis. 50. P. panicula coarctata, calicibus subquadrifloris, glumis floralibus dorso pubescentibus, culmo compresso. *Weber suppl. flor. hols. p. 3.*
- multiflora. 50. P. culmis simplicibus erectis, spiculis linearibus subnovemfloris. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 21. an distincta species?*

51. P.

---

*Qualis est Poa filicina Forskältii fl. aeg. arab. p. XIII?*

- cinerea. 51. P. spiculis paniculatis trifloris acutis basi ciliatis, foliis caulinis erectis involutis. *Villars pl. Delph. 2. p. 126.*  
 disticha. 52. P. spica disticha terminali hinc convexiuscula illinc plana. *Jacq. pl. rar. ic. misc. austr. 2. p. 74.*  
 ficula. 53. P. spica disticha compresso-plana: spiculis alternis sessilibus acutis. *Jacq. obs. bot. 2. p. 22. t. 43. pl. rar. ic. cent. 2. t. 28.*

84. BRIZA. Cal. 2valvis, multiflorus. Spicula disticha: valvis cordatis obtusis; inferiore minuta.

- monspesulana. 8. Br. spica nutante simplici: spiculis ovatis alternis subfoliariis pedunculatis quinquefloris. *Allion. flor. pedem.*  
 minor. 1. Br. spiculis triangulis: calice flosculis longiore. *Scheuchz. gram. t. 4. f. 9.*  
 virens. 2. Br. spiculis ovatis: calice flosculis aequali.  
 media. 3. Br. spiculis ovatis: calice flosculis brevior. *Flor. dan. t. 258.*  
 maxima. 4. Br. spiculis cordatis: flosculis septendecim. *Jacq. obs. bot. 3. t. 60. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 1. f. 6.*  
 Eragrostis. 5. Br. spiculis lanceolatis: flosculis viginti. *Schreb. gram. t. 39.*  
 cynosuroides. 6. Br. spiculis lanceolatis, culmo erecto simplici striato. *Scop. del. 2. p. 21. t. 11.*  
 caroliniana. 7. Br. panicula decomposita: partialibus ramosis; spiculis cordato-lanceolatis, flosculis quindecim. *Walt. flor. carol. p. 79.*

85. UNIOLA. Cal. multivalvis. Spicula ovata carinata.

- paniculata. 1. U. paniculata, spiculis ovatis. *Catesb. Car. 1. t. 32.*  
 bipinnata. 2. U. panicula subspicata: racemis pinnatis subtus imbricatis, mucronata.  
 3. U. spica disticha: spiculis ovatis; calicibus subaristatis.  
 spicata. 4. U. subspicata, foliis involutis rigidis.

86. DACTYLIS. *Cal.* 2valvis, multiflorus: *valvis* altero latere latioribus. *Cor.* 2valvis, fermen includens. *Nect.* 2. culmo erecto.

- cynosu- 1. *D. spicis* sparsis secundis scabris numerosis. *Linn. fasc. I.*  
roides. t. 9.
- patens. 2. *D. spicis* sparsis secundis paucis, culmo decumbente. *Ait. hort. Kew. I. p. 108.*
- glomera- 3. *D. panicula* secunda glomerata. *Fl. dan. t. 743. Schreb. gram. t. 8. f. 1.*
- ciliaris. 4. *D. spica* capitata secunda: calicibus trifloris, caule repente. *Mant. p. 185.*
- lagopoi- 5. *D. spicis* subrotundis pubescentibus, culmo prostrato ramo-  
des. so. *Mant. p. 33. 557. Burm. fl. ind. t. 10. f. 1.*
- capitata. 6. *D. spicis* capitatis laevibus, culmo prostrato ramofo. *Suppl. p. 110.*
- genicula- 7. *D. spicis* ternis distichis, culmo geniculato, foliis linearibus  
ta. plicatis mucronatis. *Burm. ind. t. 12. f. 3.*

87. CYNOSURUS. *Cal.* 2valvis, multiflorus aequalis. *Cor.* 2valvis: valva altera concava longiore. *Nect.* 2phyllum.

- cristatus. 1. *C. bracteis* pinnatifidis. *Flor. dan. t. 238. Schreb. gram. t. 8. f. 2.*
- echinatus. 2. *C. bracteis* pinnato-paleaceis aristatis. *Scheuchz. gram. t. 2. f. 3. Gaertn. de fr. et sem. cent. I. t. 1. f. 8.*
- Lima. 3. *C. spica* secunda: calicis gluma interiore spiculis subiecta.
- Sphaero- 4. *C. bracteis* integris, spicis globosis. *Jacq. misc. austr. 2. p. 71.*  
cephalus.
- caeruleus. 5. *C. bracteis* integris, spicis subovatis. *Arduin. spec. 2. t. 6. f. 3-5. Sesleria.*
- multibra- 6. *C. bracteis* pectinatis ad spiculas pluribus, spica secunda sub-  
ctatus, incurva. *Poirer voy. en Barbar. 2. p. 97.*



- Uniolae. 7. C. ebracteatus, spica secunda: spiculis bifariis alternantibus adpressis ovatis carinatis obliquis. *Suppl. p. 110.*
- coracanus. 8. C. spicis digitatis incurvatis, culmo compresso erecto, foliis suboppositis. *Schreb. gram. t. 35. Gaertn. de sem. cent. I. t. I. f. II.*
- aegyptius. 9. C. spicis digitatis quaternis obtusis patentissimis mucronatis: calicibus mucronatis caule repente, foliis oppositis. *Pluckn. alm. t. 300. f. 8.*
- indicus. 10. C. spicis digitatis linearibus, culmo compresso declinato basi nodoso, foliis alternis. *Burm. fl. zeyl. t. 47. f. I.*
- virgatus. 11. C. panicula ramis simplicibus: spiculis sessilibus sexfloris; ultimo sterili, infimis subaristatis. *Sloan. hist. jam. I. t. 70. f. 2.*
- danigen- 12. C. panicula ramis simplicibus: spiculis subsessilibus sexfloris; floribus omnibus aristatis. *Jacq. pl. rar. ic. 67.*
- aureus. 13. C. paniculae spiculis sterilibus pendulis ternatis: floribus aristatis. *Shaw. afr. ic. p. 232.*
- ternatus. 14. C. spiculis ternatis quaternisve patentissimis lanceolatis muticis quadrifloris. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 21.*
- floccifolius. 15. C. spicis linearibus: inferioribus alternis, supremis geminis; spiculis bifariam secundis muticis trifloris, foliis alternis margine alterne flocciferis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 21.*
- uniflorus. 16. C. spicis digitatis quaternis patulis secundis, calicibus acutis alternis sessilibus unifloris sessilibus, culmo geniculato repente laevi. *Walt. flor. carol. p. 82.*
- lagopoides. 17. C. spicis conicis: pedunculis solitariis villosis, culmo folioso. *Pluken. amalb. t. 357. f. 4.*
- ficulus. 18. C. spica disticha compresso-plana: spiculis alternis sessilibus acutis. *Jacq. obs. bot. t. 43.*

88. FESTUCA. Cal. 2valvis. Spicula oblonga, teretiuscula: glumis acuminatis.

\* Panicula secunda.

- bromoides. 1. F. spiculis erectis: calicis valva altera integra, altera acuminata. *Pluckn. alm. t. 33. f. 10.*
- ovina. 2. F. panicula coarctata aristata, culmo tetragono nudiusculo, foliis setaceis. *Stillingfl. misc. t. 8.*

- β) vivipara. *Scheuchz. gram. t. 1.*  
 γ) glauca.
- rubra. 3. F. panicula scabra: spiculis sexfloris aristatis; flosculo ultimo mutico, culmo semitereti. *Leers fl. herb. t. 8. f. 9.*
- amethy- 4. F. panicula flexuosa: spiculis secundis inclinatis submuticis, stina. foliis setaceis.
- reptatrix. 5. F. paniculae ramis simplicibus: spiculis subsessilibus.
- duriuscu- 6. F. panicula oblonga: spiculis oblongis laevibus, foliis seta- la. ceis. *Flor. dan. t. 848.*
- dumeto- 7. F. panicula spicaeformi pubescente, foliis filiformibus. rum. *Flor. dan. t. 700.*
- elatior. 8. F. panicula erecta: spiculis subaristatis; exterioribus teretibus. *Schreb. gram. t. 2.*
- β) Festuca arundinacea. *Schreb. spic. fl. Lips. p. 57.*
- myuros. 9. F. panicula spicata: calicibus minutissimis muticis, floribus scabris: aristis longis. *Leers fl. herb. t. 3. f. 5.*
- spadicea. 10. F. calicibus quinquefloris: flosculo ultimo sterili, foliis laevibus.
- phoeni- 11. F. racemo indiviso: spiculis alternis subsessilibus teretibus, coides. foliis involutis mucronato-pungentibus. *Mant. p. 33. Ger. fl. prov. t. 2. f. 2.*
- nemorum. 12. F. panicula nutante: spiculis quinquefloris glabris aristatis, foliis radicalibus setaceis: caulinis planis longissimis scabriusculis. *Leys. fl. hal. n. 102.*
- sciuroi- 13. F. panicula racemosa: calicibus abbreviatis; floribus dia- des. phanis scabris: aristis longis. *Roth bot. Abb. u. Beob. p. 43.*
- fascicula- 14. F. panicula fasciculata: spiculis quadrifloris; calicis valva ta. exteriore longe aristata, altera minuta mutica. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 22.*
- cinerea. 15. F. panicula subsecunda: spiculis subhirsutis aristatis quin- quefloris, foliis subulatis recurvis. *Villars pl. Delph. 2. p. 98. n. 8.*
- pumila. 16. F. panicula collecta: spiculis teretibus subquadrifloris sub- aristatis, foliis setaceis duriusculis. *Villars pl. delph. 2. p. 102. n. 12.*
- Halleri. 17. F. panicula stricta: spiculis teretibus hirsutis longius arista- tis, foliis perangustis. *Hall. hist. stirp. Helv. 2. n. 1441.*
18. F.

- sylvatica. 18. F. panicula divaricata: spiculis quadrifloris distantibus acutis subaristatis, foliis planis acutis. *Villars pl. Delph. 1. p. 271. 2. p. 105. t. 3.*
- hetero- 19. F. foliis laxis: radicalibus setaceis; caulinis planis latiori-  
phylla. bus, panicula rara: spiculis subsexfloris lanceolatis glabris aristatis. *Hall. hist. stirp. helv. 2. n. 1438.*
- arundina- 20. F. panicula rigida: spiculis compressis aristatis subsexflo-  
cea. ris. *Villars pl. Delph. 2. p. 106. Scheuchz. gram. t. 5. f. 18.*

\*\* *Panicula aequali.*

- varia. 21. F. panicula subaequali striata pauciflora: spiculis quadri-  
floris teretibus glabris subaristatis, foliis setaceis. *Hall. hist. stirp. Helv. 2. n. 1439.*
- picta. 22. F. glumarum marginibus roseis. *Koenig Naturf. 23. p. 211. an distincta species?*
- fusca. 23. F. panicula erecta ramosa: spiculis sessilibus carinatis mu-  
ticis.
- pauciflo- 24. F. panicula effusa: spiculis subquadrifloris aristatis scabris,  
ra. foliis villosis. *Thunb. fl. jap. p. 52.*
- fluitans. 25. F. panicula ramosa erecta: spiculis subsessilibus teretibus  
muticis. *Flor. dan. t. 237. Schreb. gram. t. 3.*
- speciosa. 26. F. panicula erecta: spiculis subteretibus subulatis nudis  
submuticis. *Schreb. gram. t. 13.*
- indica. 27. F. panicula erecta contracta: spiculis compressis subaristatis  
subsexfloris. *Rheed. h. malab. 12. t. 45.*
- triflora. 28. F. panicula erecta contracta: spiculis trifloris muticis, fo-  
liis glaucis rigidis. *Ger. fl. prov. t. 2. f. 1.*
- calicina. 29. F. panicula contracta: spiculis linearibus; calice stoculis  
longiore, foliis basi barbatis.
- mifera. 30. F. panicula coarctata glumisque aristatis scabris, culmo  
geniculato infracto. *Thunb. fl. jap. p. 52.*
- muerona- 31. F. panicula glomerata: spiculis multifloris; flore glanduli-  
ta. fero. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 22. an hujus generis?*
- cristata. 32. F. panicula spicata lobata: spiculis ovatis latis sexfloris  
hirsutis.
- dichoto- 33. F. panicula dichotoma: spiculis sessilibus patentissimis linea-  
ma. ribus trifloris muticis. *Forsk. fl. aeg. ar. p. 22.*

34. F.

- lanceola. 34. F. spiculis septemfloris muticis lanceolatis, caule decumbente. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 22.*
- spinosa. 35. F. frutescens, ramis ramulisque spinosis, pedicellis aculeatis. *Suppl. p. 111.*
- monosta. 36. F. spicula terminali unica: aristis longis, foliis ciliatis. *La Marck dict. bot. n. 13.*
- quadriflora. 37. F. panicula subcoarctata: spiculis quadrifloris; floribus seta longa terminatis. *Walt. flor. carol. p. 81.*
- octoflora. 38. F. panicula erecta, spiculis octofloris acuminatis. *Walt. flor. carol. p. 81.*
- multiflora. 39. F. repens, paniculis erectis ovatis: spiculis octo ad quadragintafloris acutis. *Walt. flor. carol. p. 81.*

89. BROMUS. *Cal. 2valvis. Spicula oblonga, teres, disticha; arista infra apicem.*

- fecalinus. 1. Br. panicula patente: spiculis ovatis, compressis; glumis nudis distinctis: aristis subulatis brevioribus subflexuosis. *Leers fl. herb. t. 11. f. 2.*
- multiflorus. 2. Br. panicula patente: spiculis lanceolatis compressis, glumis nudis marginatis imbricatis: aristis capillaribus aequalibus rectis. *Weigel obs. bot. t. 1. f. 1.*
- japonicus. 3. Br. panicula patente ramosa: spiculis oblongis glabris; aristis divaricatis. *Thunb. fl. jap. p. 52.*
- triflorus. 4. Br. panicula patente: spiculis subtrifloris. *Flor. dan. t. 440.*
- polystachyos. 5. Br. panicula patente: ramis spicatis; spiculis alternis adpressis linearibus brevissime aristatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 23.*
- sterilis. 6. Br. panicula patula: spiculis oblongis distichis; glumis subulato-aristatis. *Curt. flor. Lond. t. 24. an idem cum bromo teetorum?*
- madri- 7. Br. panicula rariore patulo-erecta: spiculis linearibus; intermediis geminis, pedicellis superne incrassatis. *Barr. pl. rar. ic. 76. f. 1.*
- strictus. 44. Br. panicula laxa: racemis paucifloris; spiculis subtrifloris. *Scop. flor. carniol.*
- bifidus. 8. Br. panicula erecta ramosa: spiculis ovatis subtrifloris; glumis bifido-setaceis: arista divaricata. *Thunb. fl. jap. p. 53.*

9. Br.

- decum- genicula- 9. Br. panicula erecta: spiculis distantibus; pedunculis angu-  
tus. latis, culmo genu procumbente. *Mant. p. 33. Schreb. gram. t. 31.*
- is acu- erectus. 10. Br. panicula erecta subtruncata: spiculis oblongis hirsutis  
ciliatis. aristatis subquinquefloris, culmis rectis, foliis duris. *Scheuchz. gram. t. 5. f. 13.*
- loribus incrassa- 38. Br. panicula erecta ovato-pyramidata: spiculis glabris sub-  
tus. quadrifloris; pedicellis superne incrassatis. *La Marck dict. bot. n. 16.*
- Walt. dilatatus. 39. Br. panicula erecta: spiculis subsexflores superne dilatatis;  
aristis longis divaricatis. *La Marck dict. bot. n. 13.*
- ad qua- alopecu- 40. Br. panicula erecta conferta: spiculis oblongis subsessili-  
ros. bus; aristis inferne spiraliter contortis. *Poiret voy. en Barbar. 2. p. 100.*
- teres, mollis. 11. Br. panicula erectiuscula: spiculis ovatis pubescentibus;  
aristis rectis, foliis mollissime villosis. *Schreb. gram. t. 6. Curt. flor. Lond. t. 15.*
- glumis stipoides. 12. Br. panicula erectiuscula: pedunculis ensiformibus. *Mant. p. 557.*
- exuosis. angustifo- 42. Br. panicula erecta: spiculis linearibus 3-7 floris, aristis  
lius. brevibus, foliis linearibus. *Hall. hist. stirp. Helv. indig. n. 1507.*
- s, glu- ambigu- 43. Br. panicula erecta: aristis divaricatis, culmo basi genicu-  
s aqua- us. lato. *Cyrill. plant. rar. Neap. fasc. 1. t. 2.*
- is; ari- t. 440. aquaticus. 44. Br. panicula suberecta: ramis binis, spiculis glabris oblongo-  
nis ad- ovatis; aristis longioribus. *Hall. hist. plant. helv. n. 1510.*
- g. arab. grandiflo- 45. Br. panicula nutante diffusa: spiculis compressis sexfloris,  
rus. glumis lanceolatis; aristis longioribus. *Schranck baier. Flora 1. p. 362.*
- ois sub- squarro- 13. Br. panicula nutante: spiculis ovatis; aristis divaricatis,  
um bro- sus. *Scheuchz. gram. t. 5. f. 11.*
- us; in- purgans. 14. Br. panicula nutante crispa: glumis villosis, foliis utrin-  
Barr. que nudis: vaginis pilosis. *Fewill. peruv. t. 1?*
- abtriflo- asper. 15. Br. panicula nutante scabra: spiculis villosis aristatis, foliis  
scabris. *Morif. hist. pl. 3. t. 7. f. 27.*
- s; glu- ciliatus. 16. Br. panicula nutante: glumis ciliatis, foliis utrinque vagi-  
p. 53. nisque subpilosis.
9. Br. arvensis. 17. Br. panicula nutante: spiculis ovato-oblongis. *Flor. dan. t. 293.*  
18. Br.

- teflorum. 18. Br. panicula nutante: spiculis linearibus; pedunculis pilosis. *Leers fl. herbom. t. 10. f. 2.*
- gigante- 19. Br. panicula nutante: spiculis quadrifloris; aristis brevioribus. *Schreb. gram. t. 11.*
- us. 20. Br. panicula nutante: spiculis quadrifloris; aristis longioribus. *Villars pl. Delph. 2. p. 118. n. 8.*
- jubatus. 21. Br. panicula nutante: spiculis subsexfloris; aristis longioribus. *Pollich fl. palat. n. 116.*
- montanus. 22. Br. panicula nutante scabra: spiculis teretibus sublinearibus decemfloris; aristis rectis, vaginis foliorum hirsutis. *Huds. flor. angl. 51.*
- hirsutus. 23. Br. panicula fasciculata: spiculis subsessilibus villosis, aristis erectis.
- rubens. 24. Br. panicula fasciculata: spiculis subsessilibus glabris, aristis patentibus.
- scoparius. 27. Br. panicula spicata: spiculis subsessilibus erectis pubescentibus subquadrifloris. *Mant. p. 33.*
- rigens. 28. Br. panicula spicata: calicibus subtrifloris dorso ciliatis. *Villars pl. Delph. 1. p. 249. 2. p. 95.*
- phleoides. 29. Br. panicula spicata: spiculis octofloris teretibus compressis pendulis. *Buxb. cent. 5. t. 15.*
- Phoenix. 25. Br. panicula fasciculata: spiculis sexfloris glabris linearibus pedicellatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 23.*
- villosus. 26. Br. panicula spicata ovato-oblonga: spiculis compressis horizontalibus quinquefloris. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 23.*
- poiformis. 30. Br. racemo simplicissimo: pedunculis unifloris; spiculis sexfloris laevibus aristatis.
- racemosus. 31. Br. racemo simplicissimo nutante: spiculis alternis sessilibus remotis teretibus subulatis glabris aristatis. *Leyf. fl. hal. n. 116.*
- gracilis. 32. Br. culmo ramosissimo, spiculis sessilibus, foliis involuto-subulatis. *Mant. p. 34. Curt. flor. Lond. t. 105.*
- ramosus. 33. Br. culmo indiviso, spiculis alternis subsessilibus teretibus subaristatis. *Leers flor. herb. t. 10. f. 3. an potius ad triticum spectat?*  
*β?) Hall. hist. stirp. Helv. 2. n. 1432.*
- pinnatus. 34. Br. spiculis alternis subdistichis sessilibus aristatis. *Flor. dan. t. 164. an satis distinctus a pinuato?*
- silvaticus. 35. Br.

- massilien- 35. Br. spiculis compressis: glumis interioribus ciliatis, foliis  
 fis. utrinque inferioribusque vaginis pubescentibus, superioribus glabris. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 203. an distincta  
 satio species?*
- cristatus. 36. Br. spiculis distiche imbricatis sessilibus depressis. *Schreb.  
 gram. t. 23. f. 2.*
- triticeus. 45. Br. spica composita, receptaculo villoso. *Hall. hist. stirp.  
 Helv. 2. n. 1423.*
- Plukenc- 46. Br. spicis binis terminalibus, foliis convolutis pungenti-  
 tii. bus. *Pluken. phytogr. t. 33. f. 1.*
- distachyos. 37. Br. spicis subbinis compressis multifloris. *Gouan. hort. 48.*
- pauper. 41. Br. spica brachiata: spiculis remotis appressis lanceolatis  
 compressis erectis; glumis lanceolatis aristam aequantibus. *Weigel obs. bot. p. 17. t. 1. f. 8.*

90. STIPA. Cal. 2valvis, uniflorus. Cor. valva ex-  
 teriore arista terminali: basi arti-  
 culata.

- pennata. 1. St. aristis lanatis.
- juncia. 2. St. aristis nudis, rectis, calicibus semine longioribus, foliis  
 intus laevibus.
- capillata. 3. St. aristis nudis curvatis, calicibus semine longioribus, fo-  
 liis intus pubescentibus.
- Aristella. 4. St. aristis nudis rectis calice vix duplo longioribus. *Syst.  
 nat. XII. 4. p. 229.*
- tenacissi- 5. St. aristis basi pilosis, panicula spicata, foliis filiformibus.  
 ma.
- avenacea. 6. St. aristis nudis, calicibus semen aequantibus.
- membra- 7. St. pedicellis dilatatis membranaceis. *Mant. p. 326.*  
 nacea.
- arguens. 8. St. aristis nudis, bracteis basi barbatis, flosculis sessili fas-  
 ciculatis. *Rumpf amb. 6. t. 6. f. 1.*
- spicata. 9. St. aristis seminudis, floribus spicatis. *Suppl. p. III.*
- paleacea. 10. St. aristis contortis tomentosis, calicem superantibus, glu-  
 mis subfasciculatis. *Poir. voy. en Barb. 2. p. 101.*

## 91. AVENA. Cal. 2valvis, multiflorus: arista dorsali contorta.

- sibirica. 1. A. paniculata, calicibus unifloris, feminibus hirsutis, aristis calice triplo longioribus. *Gmel. fl. sib. 1. t. 22. nonne potius agrostidis species?*
- stipiformis. 2. A. paniculata, calicibus bifloris, aristas femine duplo longioribus, culmo ramoso. *Mant. p. 34. an forsan cum 4 sequentibus aerae adjungenda?*
- pen-sylva-nica. 3. A. panicula attenuata, calicibus bifloris, feminibus villosis, aristas calice duplo longioribus.
- lutea. 4. A. panicula patente: calicibus bifloris subulatis, corollis nudis triaristatis: arista intermedia flexuosa. *Suppl. p. 112.*
- purpurea. 5. A. panicula coarctata: calicibus bifloris ovatis, corollis villosis: gluma exteriori bifida, arista terminali inflexa, *Suppl. p. 112.*
- Loeflingiana. 6. A. panicula contracta: flosculis binis hirsutis; altero pedunculato apice biaristato: arista intermedia longiori. *Suppl. p. 112.*
- strigosa. 7. A. panicula oblonga contracta secunda: flosculis geminis apice biaristatis; dorso arista geniculata. *Schreb. spic. fl. Lips. p. 52.*
- fativa. 8. A. paniculata, calicibus dispermis, feminibus laevibus; altero aristato. *Blackw. herb. t. 422. Regnault bot. t. 15.*
- pubescens. 9. A. subspicata, calicibus subtrifloris basi pilosis, foliis planis pubescentibus. *Mant. p. 327. Leers fl. herb. t. 9. f. 2.*
- montana. 10. A. panicula erecta: spiculis pedunculatis subtrifloris, foliis planis subhirsutis rigidis. *Monti prodr. gram. t. 65.*
- sesquiter-tia. 11. A. paniculata, calicibus subtrifloris: flosculis omnibus aristatis; receptaculis barbatis. *Mant. p. 34. Schenckz-gram. t. 4. f. 17.*
- dubia. 12. A. paniculata, calicibus subtrifloris: flosculo infimo terminali arista recta; reliquis apice biaristatis, dorsali arista reflexa. *Leers fl. herb. n. 89. Villars pl. Detph. 2. t. 4.*
- brevis. 13. A. paniculata, calicibus subtrifloris, feminibus brevibus obtulis apice bidentatis, arista dorsali scabra. *Rothe fl. germ. 1. p. 40.*



- nuda. 14. *A. paniculata*, calicibus trifloris receptaculo brevioribus, petalis dorso aristatis: flosculo tertio mutico. *Hall. n. comm. Goett. 6. t. 2. 4.*
- fatua. 15. *A. paniculata*, calicibus trifloris: flosculis omnibus aristatis basi pilosis. *Schreb. gram. t. 15.*
- flaves- 16. *A. panicula laxa*: calicibus trifloris brevibus: flosculis cens. omnibus aristatis. *Mant. p. 326. Schreb. gram. t. 9. Curt. flor. Lond. t. 212.*
- hispida. 17. *A. paniculata*, calicibus trifloris pilosis. *Suppl. p. 111.*
- aurata. 31. *A. panicula stricta*: spiculis elongatis, flosculis basi villosis, foliis setaceis. *Hall. hist. stirp. Helv. 2. n. 1488.*
- capensis. 18. *A. panicula coarctata*: calicibus trifloris subulatis, corolla pubescente: arista intermedia tortili curva. *Suppl. p. 112.*
- lupulina. 19. *A. panicula coarctata ovata*: calicibus trifloris lanceolatis, corollis villosis: gluma exteriori bimucronata; arista intermedia reflexa. *Suppl. p. 113.*
- disticho- 20. *A. paniculata*, spiculis binatis trifloris, foliis fasciculatis phylla. distiche patentibus, culinis basi ramosis. *Villars pl. Delph. 2. p. 144. t. 4.*
- setacea. 21. *A. panicula purpurascens*: spiculis trifloris; aristas nigris recurvis, foliis setaceis. *Villars pl. Delph. 2. p. 144. t. 5.*
- sempervi- 22. *A. paniculata*, calicibus trifloris basi lanatis, foliis rigidis rens. acutis involutis sempervirentibus. *Villars pl. Delph. 2. p. 140. t. 5.*
- fragilis. 23. *A. spicata*, calicibus quadrifloris flosculo longioribus. *Mant. p. 326. Schreb. gram. t. 24. f. 3.*
- pratensis. 24. *A. subspicata*, calicibus quinquefloris. *Mant. p. 327. Leers fl. herb. t. 9. f. 1.*
- sterilis. 25. *A. paniculata*, calicibus quinquefloris: exterioribus flosculis aristisque basi pilosis; interioribus muticis. *Pet. gaz. t. 38. f. 7.*
- calicina. 26. *A. panicula simplicis*: spiculis quinquefloris calicis longitudine, foliis planis basi pilosis. *Villars pl. Delph. 2. p. 148. t. 2.*
- Scheuch- 32. *A. panicula angusta*: pedunculis ramosis; spiculis teretibus quinquefloris basi pubescentibus. *Scheuchz. it. alp. 6. t. 19.*
- zeri.

- verfico- 27. A. panicula spicata flavescente: spiculis sexfloris distinctis  
lor. pedunculi longitudine, rhachi hirsuta. *Villars pl. Delph.*  
2. p. 142. t. 4.
- carolinia- 28. A. panicula attenuata. *Walt. flor. carol. p. 81. an distin-*  
na. *cta species?*
- spicata. 29. A. spicata, calicibus sexfloris longioribus, petalo exteriori  
apice aristato furcatoque.
- bromoi- 30. A. subspicata, spiculis binatis: altera pedunculata, aristis  
des. divaricatis, calicibus octofloris. *Scheuchz. gram. t. 4.*  
*f. 21. 22.*
- rupestris. 33. A. hirta, foliis angustis, aristis recurvis. *Hall. hist. stirp.*  
*Helv. 2. n. 1478.*

1359. ANTHISTIRIA. Cal. aequaliter ad basin fissus in lacinias 4 aequales.

- ciliata. 1. A. foliis superioribus basi involucrisque ciliatis. *Suppl. p.*  
*113. Syst. nat. XII. 3. p. 668. Mant. p. 303. Andropo-*  
*gon nutans.*
- imberbis. 2. A. foliis involucrisque nudis. *Acharius apud Koenig obs.*  
*bot. 3. p. 11.*

92. LAGURUS. Cal. 2valvis: arista villosa. Cor. petalo exteriori aristis 2 terminalibus: tertia dorsali re-torta.

- ovatus. 1. L. spica ovata aristata. *Schreb. gram. t. 19. f. 3. Gaertn.*  
*de fr. et sem. cent. 1. t. 1. f. 5.*
- cylindri- 2. L. spica cylindrica mutica. *Barr. pl. rar. ic. 11.*  
cus.

93. ARUNDO. Cal. 2valvis, multiflorus. Flosculi lana cincti.

- gigantea. 1. A. calicibus quinque-ad decemfloris, panicula laxa, foliis  
fauce fetosis. *Walt. flor. carol. p. 81.*
- Donax. 2. A. calicibus quinquefloris, panicula diffusa, culmo fruticoso.  
*Morif. hist. pl. 3. t. 8. f. 9.*

- phragmites. 3. A. calicibus quinquefloris, panicula laxa. *Leers fl. herb. t. 7. f. 1.*
- bifaria. 4. A. culmo erecto folioso, foliis bifariis, panicula coarctata: calicibus trifloris. *Koenig apud Retz. obs. bot. 4. p. 21.*
- Rugi. 5. A. calicibus trifloris, foliis subulatis glabris. *Molin. hist. nat. Chil. p. 130.*
- Quila. 6. A. calicibus trifloris, foliis ensiformibus ferratis. *Molin. hist. nat. Chil. p. 130.*
- Valdivia. 7. A. calicibus trifloris, foliis subulatis pubescentibus. *Molin. hist. nat. Chil. p. 131.*
- mauritana. 8. A. calicibus trifloris panicula elongata, foliis angustis involutis. *Poir. voy. en Barbar. 2. p. 104.*
- tecta. 9. A. culmis tectis stipulis intermedia superantibus, foliis fauce fetosis. *Walt. flor. carol. p. 81.*

64. ARISTIDA. Cal. 2valvis 1florus. Cor. 2valvis: valva exteriori aristis 3terminalibus; interiori brevissima Nectar. 2phyllum.

- adscensio- 1. A. panicula ramosa: spicis sparsis. *Sloan. hist. jam. 1. t. 2. nis. f. 56.*
- america- 2. A. paniculae ramis simplicissimis: spicis alternis. na.
- plumosa. 3. A. paniculata, arista intermedia longiore lanata, culmis villosis. *Sp. pl. p. 1666.*
- arundina- 4. A. paniculata, arista intermedia longiore laevi. *Mant. p. 186. cea.*
- gigantea. 5. A. panicula elongata effusa secunda: calicibus unifloris, aristis corollae subaequalibus rectis. *Suppl. p. 113.*
- Hystrix. 6. A. panicula divaricata patentissima: flosculis simplicissimis glabris; aristis rectis divaricatis. *Suppl. p. 113.*
- fetacea. 7. A. culmo erecto, aristis scabriusculis. *Koenig apud Retz. obs. bot. 4. p. 22.*

N 2

8. A.

---

*Arundo villosissima Forsk fl. aeg. arab. p. XIX. utrum distincta hujus, an calamagrostidis species?*

3. A.

- depressa. 8. A. culmis trifido-ramosis decumbentibus, aristis scabriusculis. *Koenig apud Retz obs. bot. 4. p. 22.*
- lanata. 9. A. panicula ramosa, arista intermedia lanata. *Forsk. fl. aeg. ar. p. 25.*
- paniculata. 10. A. spiculis linearibus oblongis: aristis glabris. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 25.*

95. LOLIUM. Cal. iphyllus, fixus, multiflorus.  
Spiculae alternae.

- perenne. 1. L. spica mutica: spiculis compressis multifloris. *Flor. dan. t. 740. Schreb. gram. t. 37.*
- tenue. 2. L. spica mutica tereti: spiculis trifloris.
- tumulentum. 3. L. spica aristata: spiculis compressis multifloris. *Flor. dan. t. 160. Schreb. gram. t. 36.*
- remotum. 4. L. spiculis remotis: aristis brevissimis. *Schranck. baier. Flor. 1. p. 382.*
- distachyon. 5. L. spica binata: calicibus unifloris, corollis lanatis. *Mant. p. 187. an hujus generis?*

1360. ROTTBOELLIA. *Rhachis* articulata, flexuosa teretiuscula, saepe filiformis: *flosculis* alternis. Cal. ovato-lanceolatus, compressus, simplex vel 2partitus.

- incurvata. 1. R. spica tereti subulata: gluma calicina subulata adpressa bipartita. *Suppl. p. 114. Syst. nat. XII. 3. p. 671. Aegilops incurvata. Gill. pl. rar. Neap. fasc. 1. t. VI. H.*
- compressa. 2. R. spica compressa subulata: gluma calicina lanceolata plana indivisa. *Suppl. p. 114.*
- dimidiata. 3. R. spica dimidiata compressa lineari; latere exteriori aggregato flosculoso; interiori laevi nudo. *Suppl. p. 114. Syst. nat. XII. 3. p. 87. Panicum dimidiatum. Burm. fl. ind. t. 8. f. 3.*

- exaltata. 4. R. spica tereti filiformi undique flosculosa: glumis ovatis obtusis, vaginis punctato-hirsutis. *Suppl. p. 114.*
- corymbosa. 5. R. spicis aggregatis lateralibus filiformibus: flosculis bifariis patentibus, foliis basi ciliatis. *Suppl. p. 114. Syst. nat. XII. 3. p. 671. Aegilops exaltata.*
- laevis. 6. R. spica flosculis binatis lateralibus: pedunculis longissimis, calicibus ovatis impunctatis laevibus. *Koenig apud Retz. obs. bot. 3. p. 11.*
- Tranchellii. 7. R. spicis compressis pluribus fasciculatis pedunculatis: calicibus acutis. *Tranchell. apud Retz. obs. bot. 3. p. 12. an satis distincta a compressa?*
- punctata. 8. R. spicis teretibus pluribus fasciculatis subsessilibus: flosculis solitariis alternis; calicibus punctatis. *Retz. obs. bot. 3. p. 12. n. 28.*
- muricata. 9. R. spicis teretibus pluribus longe pedunculatis: calicibus ciliato-aculeatis; neutris bifidis. *Retz. obs. bot. 2. n. 98. et 3. p. 12. n. 29.*
- sanguinea. 10. R. paniculae spicis aristatis alternis simplicibus pedunculatis: florum bractea laterali ciliata. *Bladb. apud Retz. obs. bot. 3. p. 25.*
- coelorhachis. 11. R. spica tereti unilaterali: flosculis geminis; altero pedicellato, calice bivalvi. *Forst. fl. austr. p. 9.*
- repens. 12. R. spica tereti subulata: gluma calicina univalvi indivisa. *Forst. fl. austr. p. 9.*
- altissima. 13. R. spicis tereti-subulatis subfasciculatis. *Poir. voy. en Barb. 2. p. 105.*

96. ELYMUS. Cal. lateralis, 2valvis, aggregatus, multiflorus.

- arenarius. 1. E. spica erecta arcta: calicibus tomentosis flosculo longioribus. *Schreb. gram. t. 40.*
- sibiricus. 2. E. spica pendula arcta: spiculis binatis calice longioribus. *Schreb. gram. t. 21. f. 1.*
- philadelphicus. 3. E. spica pendula patula: spiculis sexfloris; inferioribus ternatis.
- canadensis. 4. E. spica nutante patula: spiculis inferioribus ternatis; superioribus binatis. *Morif. hist. pl. 3. t. 10. f. 2.*

- caninus. 5. E. spica nutante arcta: spiculis rectis involucre destitutis: infimis geminis. *Leers fl. herb. t. 12. f. 4.*
- tener. 6. E. spica pendula: flosculis geminis. *Suppl. p. 1114.*
- virginicus. 7. E. spica erecta: spiculis trifloris, involucre striato.
- europaeus. 8. E. spica erecta: spiculis bifloris, involucre aequalibus. *Scheuchz. gram. prodr. t. 1. f. 1.*
- carolinianus. 9. E. spica erecta laevi; spiculis involucre aequalibus trifloris; floreo intermedio pedicellato sterili, aristis longitudine florum. *Walt. flor. carol. p. 82.*
- Caput Medusae. 10. E. spiculis bifloris: involucre setaceis patentissimis. *Schreb. gram. t. 24. f. 2.*
- Hyltrix. 11. E. spica erecta: spiculis involucre destitutis simplicibus; *nonne distincti generis?*
- subulatus. 12. E. spica subulata: spiculis unifloris distichis alternis adpressis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 26. an huius generis?*

97. SECALE. Cal. oppositus, 2valvis, 2florus, folitarius.

- cereale. 1. S. glumarum ciliis scabris. *Blackw. herb. t. 424.*
- villosum. 2. S. glumarum ciliis villosis, squamis calicinis cuneiformibus. *Buxb. cent. 5. t. 41.*
- orientale. 3. S. glumis hirsutis, squamis calicinis subulatis.
- creticum. 4. S. glumis extrorsum ciliatis.
- prostratum. 5. S. glumis subtrifloris: squamis calicinis carinatis. *Pall. it. 1. p. 485.*

98. HORDEUM. Cal. lateralis, 2valvis, 1florus, ternus.

- vulgare. 1. H. flosculis omnibus hermaphroditis aristatis: ordinibus duobus erectioribus. *Haller. nov. comm. Goett. 6. t. 2. Regn. bot. t. 364.*
- hexastichon. 2. H. flosculis omnibus hermaphroditis aristatis, feminibus sexfariam aequaliter positis.
- distichon. 3. H. flosculis lateralibus masculis muticis, feminibus angularibus imbricatis. *Haller. nov. comm. Goett. 6. t. 3.*

- Zeocri- 4. H. flosculis lateralibus masculis muticis, feminibus angula-  
thon. ribus patentibus corticatis. *Schreb. gram. t. 17.*
- bulbo- 5. H. flosculis omnibus ternis fertilibus aristatis: involucris se-  
sum. taceis ciliatis. *Morif. hist. pl. 3. t. 6. f. 7.*
- nodosum, 6. H. flosculis lateralibus masculis muticis: involucellis seta-  
ceis laevibus. *Raj. syn. angl. 3. t. 20. f. 2.*
- perver- 7. H. flosculo medio masculo aristato. *Forsk. fl. aeg. arab.*  
sum. p. XIX.
- imrinum. 8. H. flosculo medio hermaphrodito aristato: aristis longis, la-  
teralibus masculis muticis. *Forsk. fl. aeg. ar. p. XIX. an  
distincta species?*
- murinum. 9. H. flosculis lateralibus masculis aristatis dorso glabris: invo-  
lucris intermediis ciliatis. *Flor. dan. t. 629.*
- secalinum. 10. H. flosculis lateralibus masculis filiformibus aristatis dorso  
glabris: involucris setaceis scabris. *Schreb. spic. fl. lipf.  
p. 148.*
- mariti- 11. H. flosculis lateralibus masculis aristatis dorso hirsutissimis:  
mum. involucris scabris. *Flor. dan. t. 630.*
- pratense. 12. H. flosculis lateralibus masculis muticis: involucris seta-  
ceis scabris. *Huds. flor. angl. 56.*
- jubatum. 13. H. aristis involucrisque setaceis longissimis. *Schreb. gram.  
t. 24. f. 3.*
- monta- 14. H. flosculis lateralibus masculis, medii arista longissima.  
num. *Scheuchz. agrostogr. prodr. t. 1.*
- genicula- 15. H. culmo decumbente foliis obteſto: summo spathaceo,  
tum. supremo nodo incurvato. *Allion. fl. pedem. t. 91. f. 3.*

99. TRITICUM. Cal. 2valvis, solitarius, subtriflo-  
rus. Flos obtusiusculus.

\* Annuum.

- aestivum. 1. Tr. calicibus quadrifloris ventricosus glabris imbricatis ari-  
statis. *Hall. nov. comm. Goett. 5. t. 1. f. 1. Blackw.  
herb. t. 40. f. 4. 5.*
- hiber- 2. Tr. calicibus quadrifloris ventricosus laevibus imbricatis sub-  
num. muticis. *Hall. n. Comm. Goett. 5. t. 1. f. 2. Blackw.  
herb. t. 40. f. 1-3.*

- compositum. 3. Tr. spica composita: spiculis confertis aristatis. *Suppl. p. 115.*
- turgidum. 4. Tr. calicibus quadrifloris ventricosus villosus imbricatus obtusis. *Morif. hist. pl. 3. t. 1. f. 14.*
- polonicum. 5. Tr. calicibus bifloris nudis: flosculis longissime aristatis, rhacheos dentibus barbatis. *Hall. n. comm. Goett. 5. t. 1. f. 16.*
- Spelta. 6. Tr. calicibus quadrifloris truncatis: flosculis aristatis hermaphroditis: intermedio neutro. *Morif. hist. pl. 3. t. 6. f. 1. 3.*
- monococcum. 7. Tr. calicibus subtrifloris: primo aristato; intermedio neutro. *Haller nov. comm. Goett. 5. t. 1. f. 17.*
- prostratum. 8. Tr. spica disticha ovata: calicibus multifloris; flosculis imbricatis aristato-mucronatis. *Suppl. p. 114. Jacq. h. Vind. 3. t. 44.*
- pumilum. 9. Tr. spica ovata: glumis subaristatis; calicinis bifurcatis. *Suppl. p. 114.*
- bicorne. 10. Tr. calicibus striatis bicornibus trifloris: flosculis lateralibus fertilibus aristatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 26.*
- \*\* Perennia.
- junceum. 11. Tr. calicibus quinquefloris truncatis, foliis involutis. *Morif. hist. pl. 3. t. 1. f. 5.*
- repens. 12. Tr. calicibus quadrifloris subulatis acuminatis, foliis planis. *Flor. dan. t. 748. Schreb. gram. t. 26.*
- maritimum. 13. Tr. panicula coarctata secunda rigida, spiculis subsessilibus unilateralibus multifloris: foliis planis submucronatis. *Morif. hist. pl. 3. t. 2. f. 6.*
- tenellum. 14. Tr. calicibus subquadrifloris: flosculis muticis acutis, foliis setaceis. *Morif. hist. pl. 3. t. 2. f. 3.*
- unilateralis. 15. Tr. calicibus unilateralibus alternis muticis. *Mant. p. 35. Pluckn. phyt. 32. f. 7.*
- bromoides. 16. Tr. spiculis teretibus remotis. *Wiggers fl. holf. p. 11.*

TRI-

*An distincta species hujus generis Triticum aegilopoides a Forskählio fl. aeg. arab. p. 26. memoratum,*



TRIGYNIA.

1331. RESTIO. Flores dioici. Amentum imbricatum: squamis unifloris. Cor. 6petala.

♀. Stil. persistentes. Caps. 3locularis, plicata, polysperma.

- paniculatus. 1. R. culmo dichotomo folioso, ramis compressis, spicis sessilibus alternis erectis. *Fr. Rottb. pl. descr. et ic. t. 2. f. 3.*
- verticillaris. 2. R. ramis verticillatis articulatis, panicula composita coarctata. *Suppl. p. 425. Thunb. de rest. p. 19. n. 22. cum ic.*
- dichotomus. 3. R. culmis dichotomis, dichotomis decumbentibus, ramis teretibus spicis solitariis. *Fr. Rottb. pl. descr. et ic. t. 2. f. 1.*
- vimineus. 4. R. culmis simplicibus, spicis corymbosis. *Fr. Rottb. pl. descr. et ic. t. 1. f. 1. an idem cum dichotomo?*
- triflorus. 5. R. culmis simplicibus foliosis, spicis alternis sessilibus simplicibus. *Fr. Rottb. pl. descr. et ic. p. 3.*
- simplex. 6. R. culmis simplicibus subfoliosis, spicis alternis subaggregatis: squamis ovatis. *Fr. Rottb. pl. descr. et ic. t. 2. f. 5.*
- Elegia. 7. R. culmis simplicibus, spica glomerata: spathis partialibus vagis simplicibus. *Mant. p. 297. Elegia juncea. Rottb. pl. descr. et ic. t. 3. f. 4.*
- cernuus. 8. R. culmo simplici aphylo, spicis turbinatis pendulis. *Suppl. p. 425. Thunb. de restion. p. 10. n. 4. cum. ic.*
- tectorum. 9. R. culmo simplici aphylo, racemo composito erecto subsecundo. *Suppl. p. 425.*
- imbricatus. 13. R. culmo simplici aphylo, spica oblonga compressa. *Thunb. de restion. p. 6. n. 1. cum. ic.*
- vaginatus. 14. R. culmo simplici aphylo, spicis alternis erectis, squamis acuminatis. *Thunb. de restion. p. 7. n. 2.*
- aristatus. 15. R. culmo simplici aphylo, spicis terminalibus obovatis erectis, squamis aristatis. *Thunb. de restion. p. 7. n. 3.*
- umbellatus. 16. R. culmo simplici aphylo, spicis umbellatis ovatis, squamis oblongis obtusis. *Thunb. diss. de rest. p. 11. n. 5. cum ic.*
- spiciger. 17. R. culmo simplici aphylo, spicis oblongis hexagonis, squamis lanceolatis apice patulis. *Thunb. de rest. p. 11. n. 6. cum ic.*

- acumina- 18. R. culmo simplici aphylo, panicula erecta, squamis aristatis.  
tus. *Thunb. de rest. p. 13. n. 8. Rottb. gram. t. 3. f. 32.*
- parviflo- 19. R. culmo simplici aphylo, panicula erecta, squamis rotun-  
rus. datis membranaceis. *Thunb. de restion. p. 13. n. 9.*
- erectus. 20. R. culmo simplici aphylo, panicula erecta involucrata,  
spathis imbricatis lanceolatis. *Thunb. de rest. p. 14. n. 10.*
- argenteus. 21. R. culmo simplici aphylo, panicula erecta, squamis lan-  
ceolatis scariosis. *Thunb. de restion. p. 14. n. 11.*
- scariosus. 22. R. culmo simplici folioso, spicarum squamis lanceolatis  
scariosis. *Thunb. de restion. p. 15. n. 12.*
- thamno- 23. R. culmo simplici folioso, panicula patente, squamis lan-  
chortus. ceolatis margine scariosis. *Thunb. de rest. p. 15. n. 13.*  
*Fr. Rottb. gram. p. 2. t. 1. f. 1.*
- frutico- 24. R. culmo simplici folioso, panicula composita, squamis  
sus. scariosis laceris. *Thunb. de rest. p. 16. n. 14.*
- tetrago- 25. R. culmo ramisque tetragonis, spicis alternis. *Thunb. de  
nus. restion. p. 17. n. 17.*
- triticeus. 26. R. culmo dichotomo aphylo erecto, ramis teretibus, spi-  
cis alternis. *Thunb. de rest. p. 17. n. 18. Fr. Rottb.  
gram. t. 3. f. 1.*
- glomera- 27. R. culmo dichotomo aphylo laevi, panicula glomerata.  
tus. *Thunb. de rest. p. 18. n. 19.*
- incurva- 28. R. culmo dichotomo aphylo stricto, spicis imbricato-ag-  
tus. gregatis. *Thunb. de rest. p. 18. n. 20.*
- digitatus. 29. R. culmo dichotomo aphylo, ramis teretibus, spicis ternis  
oblongis. *Thunb. de restion. p. 18. n. 21.*
- Scopa. 30. R. culmo dichotomo folioso, ramis compressis, paniculae  
spicis glomeratis. *Thunb. de restion. p. 19. n. 23.*
- virgatus. 31. R. culmo dichotomo folioso, ramis compressis, spicis pa-  
niculatis pendulis. *Thunb. de restion. p. 20. n. 24.*

1280, CATURUS. *Flores dioici.*  
♂. Cor. 3fida. Cal. o.  
♀. Cal. 3partitus. Cor. o. Caps.  
3cocca.

spiciflorus. I. CATURUS. *Mant. p. 127. Burm. fl. ind. t. 61. f. 1.*

1102. EXCAECARIA. Flores dioici. Amentum nudum. Cal. o. Cor. o.

Agallocha. I. EXCAECARIA. Rumpf amb. 2. t. 79. 80.

1050. PHYLLANTHUS. Flores monoici. Cal. 6-partitus campanulatus. Cor. o.

♀. Stili bifidi. Caps. 3locularis. Sem. solitaria.

grandifolius. I. Ph. foliis ovatis obtusis integerrimis, caule arboreo.

nutans. 2. Ph. fruticosus, foliis alternis ovalibus, subtus glaucis, racemis terminalibus foliosis nutantibus. Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 27. Sloan. hist. of jam. 1. t. 158. f. 3.

mimosoides. 3. Ph. fruticosus, ramis virgatis, foliis pinnatis floriferis. Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 27.

Conami. 4. Ph. caule fruticoso ramosissimo, foliis petiolatis subrotundis apice attenuatis obtusiusculis, pedunculis fasciculatis axillaribus. Aubl. pl. guj. 3. t. 354.

Niruri. 5. Ph. foliolis pinnatis floriferis, floribus pedunculatis, caule herbaceo erecto. Rheed. h. malab. 10. t. 15.

Urinaria. 6. Ph. foliolis pinnatis floriferis, floribus sessilibus, caule herbaceo procumbente. Rheed. h. malab. 10. t. 16.

baccifor- 7. Ph. foliis pinnatis: foliolis senis, flore femineo terminali. mis. Mant. p. 294.

racemo- 8. Ph. foliis pinnatis apice racemoso-floriferis, fructu baccato sus. exsucco, caule suffruticoso. Suppl. p. 415.

Emblica. 9. Ph. foliis pinnatis floriferis, caule arboreo, fructu baccato. Blackw. herb. t. 400.

speciosus. 10. Ph. caule arboreo simplicissimo, foliis pinnatis: pinnis lanceolatis ad crenas floriferis: pedunculo unifloro. Jacq. collect. 2. p. 360.

madera- 11. Ph. foliolis alternis cuneiformibus mucronatis. spatensis.

12. Ph.

- Arbuseu- 12. Ph. foliis lanceolatis acuminatis subcrenatis coriaceis, flo-  
la. ribus pedunculatis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 28.*
- falcatus. 15. Ph. foliis sparsis lineari-lanceolatis subfalcatis crenatis, flo-  
ribus subsessilibus. *Pluckn. phyt. 247. f. 4.*
- rhamnoi- 13. Ph. foliis alternis ovatis floriferis, pedunculis inferiori-  
des. bus geminis masculis: superioribus solitariis femineis,  
caule suffruticoso. *Koenig apud Retz. obs. bot. 5. p. 30.*
- stellatus. 16. Ph. foliis simplicibus alternis lanceolatis, umbellis sessili-  
bus axillaribus. *Koenig apud Retz. obs. bot. 5. p. 29.*
- carolinia- 19. Ph. caule herbaceo erecto ramoso, foliis alternis petiolatis  
nus. ovatis glabris integris, floribus axillaribus pendulis. *Walt.  
flor. carol. p. 228.*
- simplex. 17. Ph. foliis lanceolatis decurrentibus ramisque simplicibus.  
*Koenig apud Retz. obs. bot. 5. p. 29.*
- Hameur. 14. Ph. foliis alternis pinnatis: foliolis obovato-oblongis alter-  
nis, stipulis duabus lanceolatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 159.*
- virgatus. 18. Ph. foliis simplicibus alternis linearibus mucronatis, pedun-  
culis axillaribus solitariis unifloris, caule fruticoso. *Forst.  
fl. austr. p. 65.*

1060. AMARANTHUS. Flores monoici. Cor. 0.  
Cal. 3-5phyllus.  
♂. Stam. 2-5.  
♀. Caps. 1ocularis, cir-  
cumscissa, 1sperma.

## \* diandri.

- polyga- 1. A. glomerulis subspicatis ovatis, floribus hermaphroditis  
mus. femineisque, foliis lanceolatis.

## \*\* triandri.

- graeci- 2. A. glomerulis axillaribus bipartitis, foliis lanceolatis repa-  
zans. dis obtusis.
- melan- 3. A. glomerulis axillaribus subrotundis sessilibus, foliis lan-  
cholicus. ceolatis acuminatis.
- tricolor. 4. A. glomerulis axillaribus subrotundis amplexicaulibus, fo-  
liis lanceolato-ovatis coloratis. *Knorr del. hort. 2. t. A.  
3. 4. 5.*

5. A.

- albus. 5. A. glomerulis axillaribus bipartitis: bracteis subulatis, foliis ovatis emarginatis lineatis striatis. *Kniph. bot. orig. cent. 11. n. 2.*
- polygono- 6. A. glomerulis axillaribus, foliis ovatis emarginatis, floribus noides. femineis infundibuliformibus obtusis. *Sloan. jam. 1. t. 92. f. 2.*
- mangostanus. 7. A. glomerulis subspicatis rotundatis, foliis rhombeis.
- tristis. 8. A. glomerulis subspicatis rotundatis, foliis ovato-cordatis emarginatis petiolo brevioribus. *Rumpf amb. 5. t. 82. f. 2.*
- lividus. 9. A. glomerulis subspicatis rotundatis, foliis rotundato-ovatis retusis.
- gangeticus. 10. A. glomerulis subspicatis ovatis, foliis lanceolato-ovatis emarginatis.
- Blitum. 11. A. glomerulis lateralibus, floribus trifidis, foliis ovatis retusis, caule diffuso. *Pluckn. phyt. 212. f. 2.*
- viridis. 12. A. floribus glomeratis: masculis trifidis, foliis ovatis emarginatis, caule erecto. *Sloan. hist. jam. 1. t. 92. f. 1.*
- deflexus. 13. A. spicis frutescentibus nutantibus carnosis, caule diffuso. *Mant. p. 295.*
- scandens. 14. A. spicis interruptis compositis: spiculis inflexis, foliis ovatis, caule debili. *Suppl. p. 419.*
- oleraceus. 15. A. glomerulis triandris pentandrisque, foliis ovatis obtusissimis emarginatis rugosis.
- \*\*\* Pentandri.
- paniculatus. 16. A. racemis supradecompositis: partialibus patentibus.
- hybridus. 17. A. racemis decompositis congestis nudis: spiculis conjugatis. *Barr. ic. 648.*
- cruentus. 18. A. racemis decompositis remotis patulo-nutantibus, foliis lanceolato-ovatis. *Mant. cent. t. 6.*
- caudatus. 19. A. racemis decompositis cylindricis pendulis longissimis.
- flavus. 20. A. racemis compositis: summo infimisque nutantibus, foliis obovatis mucronatis.
- hypochondriacus. 21. A. racemis compositis confertis erectis, foliis ovatis mucronatis.

- sanguine- 22. A. racemis compositis erectis: lateralibus patentissimis, fo-  
us. liis ovato-oblongis. *Mill. ic. t. 22.*
- retrofle- 23. A. racemis lateralibus terminalibusque, caule flexuoso vil-  
xus. lofo, ramis recurvatis.
- spinofus. 24. A. racemis cylindricis erectis, axillis spinosis. *Rumpf  
amb. 5. t. 83.*

100. ERIOCAULON. *Cal.* communis, capitulum  
imbricatum. *Petala* 3  
aequalia. *Stamina* su-  
pra germen.

- triangula 1. E. culmo triangulari, foliis ensiformibus, capitulo ovato.  
re. *Morif. hist. pl. 3. t. 16. f. 17.*
- quinquan- 2. E. culmo quinquangularem, foliis ensiformibus. *Pluckn.  
gularem. alm. t. 221. f. 7.*
- plexi- 3. E. culmo quinquangularem repente, foliis confertis canalicu-  
caule. latis femiamplexicaulibus, capitulis difformibus. *Fr. Rottb.  
act. litt. Hafn. 1. p. 272. t. 1. f. 1.*
- sexangu- 4. E. culmo sexangularem, foliis ensiformibus. *Burm. fl. ind.  
lare. t. 9. f. 4.*
- setaceum. 5. E. culmo sexangularem, foliis setaceis. *Petiv. gaz. t. 33. f. 10.*
- decangu- 6. E. culmo decangularem, foliis ensiformibus. *Pet. gaz. t. 6.  
lare. f. 2.*
- fascicula- 7. E. culmo tereti simplicissimo, foliis confertis ciliatis, pe-  
tum. dunculis fasciculatis terminalibus. *Fr. Rottb. act. litt.  
Hafn. 1. p. 271. t. 2. f. 1.*
- anceps. 8. E. culmo compresso bifulco foliisque pilosis. *Walt. flor.  
carol. p. 83.*
- feroti- 9. E. culmo decangularem, foliis longis laevibus erectis. *Walt.  
num. flor. carol. p. 83.*

101. MONTIA. *Cal.* 2phyllus. *Cor.* 1petala, irre-  
gularis. *Caps.*ilocularis, 2valvis.

fontana. 1. MONTIA. *Flor. dan. t. 131.*

102. PROSERPINACA. Cal. 3partitus, superus.  
Cor. o. Drupa exsucca,  
infera 3locularis,  
3sperma.

palustris. I. PROSERPINACA. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 24. f. 8.

104. HOLOSTEUM. Cal. 5phyllus. Petala 5.  
Caps.ilocularis, subcylindrica,  
apice dehiscens.

cordatum. 1. H. foliis subcordatis. Mant. p. 327. Herm. par. bot. t. 11.

fucculentum. 2. H. foliis ellipticis carnosis.

hirsutum. 3. H. foliis orbiculatis hirsutis.

umbellatum. 4. H. floribus umbellatis. Morif. hist. pl. 2. t. 22. f. 46.

dianthum. 5. H. foliis subrotundis, floribus diandris. Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 27.

1241. KOENIGIA. Cal. 3phyllus. Cor. o. Sem. 1.  
ovatum, nudum.

islandica. I. KOENIGIA. Mant. p. 35. Flor. dan. t. 418.

MEBOREA. Cal. 6partitus persistens. Filament.  
stilis adnata. Caps. obtuse 3gona,  
6valvis, 6locularis, loculis 1sper-  
mis.

gujanensis. I. MEBOREA. Aubl. pl. guj. 2. p. 825. t. 323.

105. POLYCARPON. Cal. 5phyllus. Petala 5 mi-  
nima, ovata. Caps. ilo-  
cularis, 3valvis.

magellanicum. I. P. caulibus simplicissimis, foliis linearibus sparsis imbrica-  
tis. Suppl. p. 415. Forst. char. gen. pl. t. 5. Donatia.  
Corolla tamen 8-10 petala.

2. P.

- tetraphyl- 2. P. caule ramoso prostrato, foliis quaternis orbiculari-ova-  
lum. tis. *Suppl. p. 116. Barrel. pl. rar. ic. 534.*
- uniflo- 3. P. foliis ellipticis, pedunculis lateralibus unifloris. *Walt.*  
rum. *flor. carol. p. 83.*

106. MOLLUGO. *Cal.* 5phyllus. *Cor.* o. *Capsf.*  
3locularis, 3valvis.

- oppositi- 1. M. foliis oppositis lanceolatis, ramis alternis, pedunculis  
folia. lateralibus confertis unifloris. *Pluckn. alm. t. 75. f. 6.*
- triphylla. 5. M. foliis ternis obovatis: medio maximo, pedunculis ver-  
ticillatis unifloris. *Pluken. amalth. t. 257. f. 1.*
- stricta. 2. M. foliis subquaternis lanceolatis, floribus paniculatis nu-  
tantibus, caule erecto angulato. *Burm. fl. zeyl. t. 5. f. 3.*
- penta- 3. M. foliis quinis obovatis aequalibus, floribus paniculatis.  
phylla. *Burm. fl. zeyl. t. 8. f. 12.*
- panicula- 6. M. foliis quinis obovatis, pedunculis terminalibus. *Burm.*  
ta. *th. zeyl. t. 6. f. 2.*
- verticilla- 4. M. foliis verticillatis cuneiformibus acutis, caule subdiviso  
ta. decumbente, pedunculis unifloris. *Mill. illustr. ic.*

107. MINUARTIA. *Cal.* 5phyllus. *Cor.* o. *Capsf.*  
1locularis, 3valvis. *Sem.*  
nonnulla.

- dichoto- 1. M. floribus confertis dichotomis. *Aët. Stockb. 1758. t. 1.*  
ma. *f. 4.*
- campe- 2. M. floribus terminalibus alternis bractea longioribus. *Aët.*  
stris. *Stockb. 1758. t. 1. f. 3.*
- montana. 3. M. floribus lateralibus alternis bractea brevioribus. *Mant.*  
*p. 328. Loest. it. t. 1. f. 4.*

108. QUERIA. *Cal.* 5phyllus. *Cor.* o. *Capsf.* 1lo-  
cularis, 3valvis. *Sem.* 1.

- hispanica. 1. Q. floribus confertis.
- canaden- 2. Q. floribus solitariis, caule dichotomo.  
sis.



109. LECHEA, *Cal.* 3phyllus aut 0. *Petala* 3 linearia. *Caps.* 3locularis, 3valvis: valvis totidem interioribus. *Sem.* 1.

minor. 1. L. foliis lineari-lanceolatis, floribus paniculatis. *Amoen. ac. 3. t. 1. f. 4.*

major. 2. L. foliis ovato-lanceolatis, floribus lateralibus vagis. *Stam. 4.*

juncifolia. 3. L. foliis radicalibus teretibus; floribus nudis. *Walt. flor. carol. p. 83.*

ENNEAGYNIA.

1100. EMPETRUM. *Flores* dioici. *Cal.* 3partitus.  
*Cor.* 3petala.

♂. *Stam.* longa.

♀. *Bacca* 9sperma.

album. 1. E. erectum.

nigrum. 2. E. procumbens. *Mill. illustr. ic.*

pinna- 3. E. calice quinquedentato. *la Marck encycl. 1. p. 567. utrum*  
tum. *hujus, an potius distincti generis?*