

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

* Flores monopetali.

† inferi.

— monospermi.

242. MIRABILIS. *Nucula* infra corollam. *Cor.* infundibuliformis. *Stigma* globosum.
1057. AMBROSIA. *Flores* monoici. *Cal.* communis, 1phyllus.
♂. *Cor.* 1petalae, 3fidae, infundibulif.
Recept. nudum.
♀. *Cal.* integer, ventre 5dentato, 1florus.
Cor. o. Nux e calice indurato, 1perma.
1058. PARTHENIUM. *Flores* monoici, compositi. *Cal.* communis, 5phyllus.
♂. *Cor.* disci 1petalae.
♀. *Cor.* radiis, singulae 2masculae: intermedia feminea supera. *Sem.* nudum.
Stilus e basi germinis. Stigma peltatum.
Cor. infundibulif.
- WEIGELA.
213. PLUMBAGO. *Stamina* nectarii valvis inserta. *Cor.* infundibulif. *Stigma* 5fidum.

— tetraspermi, Asperifoliae.

186. GERINTHE. *Cor.* fauce nuda, ventricosa. *Sem.* 2ossea, 2locularia.
1245. MESSERSCHMIDIA. *Cor.* fauce nuda, infundib. *Bacca* suberosa, 2partibilis, utroque 2spermo.
191. ECHIUM. *Cor.* fauce nuda, irregularis, campanulata.
179. HELIOTROPIUM. *Cor.* fauce nuda, hypocrateriformis: lobis dente interjectis.
184. PULMONARIA. *Cor.* fauce nuda, infundibulif. *Cal.* prismaticus.
181. LITHOSPERMUM. *Cor.* fauce nuda, infundibulif. *Cal.* 5partitus.
187. ONOSMA. *Cor.* fauce nuda, ventricosa.
185. SYMPHYTUM. *Cor.* fauce dentata, ventricosa.
188. BORAGO. *Cor.* fauce dentata, rotata.

190. LYCOPSIS. *Cor.* fauce fornicata, infundibulif. tubo curvato. 20
189. ASPERUGO. *Cor.* fauce fornicata, infundibulif. *Fruflus* compressus. 20
183. CYNOGLOSSUM. *Cor.* fauce fornicata, infundibulif. *Sem.* depressa, latere affixa. 20
182. ANCHUSA. *Cor.* fauce fornicata, infundibulif. tubo basi prismatico. 129
180. MYOSOTIS. *Cor.* fauce fornicata, hypocraterif. lobis emarginatis. 20
- BATSCHIA. *Cor.* hypocrateriformis: tubo lanuginoso basi prismatico. *Sem.* arcuata acuminata. 136
- ARNEBIA. *Cor.* fauce nuda, infundibulif. tubo toto cylindrico. 20

- - - pentaspermi.

193. NOLANA. *Sem.* baccata, 2-4locularia.

- - - - angiospermi.

243. CORIS. *Caps.* 1locularis, 5valvis. *Cor.* irregularis. *Stigma* capitatum. 136
204. HYDROPHYLLUM. *Caps.* 1locularis, 2valvis. *Cor.* nectariis 5exarata. *Stigma* 2fidum. 20
276. GALAX. *Caps.* 1locularis 2valvis. *Cor.* hypocraterif. *Stigma* subrotundum. 21
198. CORTUSA. *Caps.* 1locularis, oblonga. *Cor.* rotata. *Stigma* subcapitatum. 21
206. ANAGALLIS. *Caps.* 1locularis, circumscissa. *Cor.* rotata. *Stigma* capitatum.
205. LYSIMACHIA. *Caps.* 1locularis, 10valvis. *Cor.* rotata. *Stigma* obtusum. 124
201. CYCLAMEN. *Caps.* 1locularis intus pulposa. *Cor.* reflexa. *Stigma* acutum. 20
200. DODECATHEON. *Caps.* 1locularis, oblonga. *Cor.* reflexa. *Stigma* obtusum. 124
199. SOLDANELLA. *Caps.* 1locularis. *Cor.* lacera. *Stigma* simplex. 24
197. PRIMULA. *Caps.* 1locularis. *Cor.* infundibulif. fauce pervia. *Stigma* globosum. 24
196. ANDROSACE. *Caps.* 1locularis. *Cor.* hypocraterif. fauce coarctata. *Stigma* globosum. 24
195. ARETIA. *Caps.* 1locularis. *Cor.* hypocraterif. *Stigma* depresso-capitatum. 24

203. HOTTONIA. *Capsf.* 1locularis. *Cor.* tubus infra stamina. *Stigma* globosum.
- BACOPA. *Capsf.* 1locularis. *Cor.* tubus brevis. *Stigma* capitatum.
202. MENYANTHES. *Capsf.* 1locularis. *Cor.* villosa. *Stigma* 2fidum.
- DORAENA. *Capsf.* 1locularis. *Cor.* 5fida. *Stigma* emarginatum.
1295. ALLAMANDA. *Capsf.* 1locularis, lentiformis, 2valvis: valvis cymbiformibus. *Sem.* imbricata.
- VOYRIA. *Capsf.* 1locularis, 2valvis, polysperma. *Cor.* hypocrateriformis. *Stigma* capitatum.
207. THEOPHRASTA. *Capsf.* 1locularis, maxima. *Cor.* campanulata. *Stigma* acutum.
1367. SHEFFIELDIA. *Capsf.* 1locularis, 5valvis. *Cor.* campanulata. *Filamenta* 10, alterna sterilia.
- ENDRACHIUM. *Capsf.* 2locularis, bacciformis. *Cor.* urceolata: limbo 5plicato. *Stamina* exserta.
- ANASSER. *Capsf.* 2locularis, 2valvis. *Cor.* urceolata, 5loba. *Stigma* 2dymum.
1368. RETZIA. *Capsf.* 2locularis. *Cor.* cylindrica, extus villosa. *Stigma* 2fidum.
209. SPIGELIA. *Capsf.* 2locularis, didyma. *Cor.* infundibulif. *Stigma* simplex.
210. OPHIORHIZA. *Capsf.* 2locularis, 2loba. *Cor.* infundibulif. *Stigmata* 2.
215. CONVULVULUS. *Capsf.* 2locularis, 2sperma. *Cor.* campanulata. *Stigma* 2fidum.
- PHACELIA. *Capsf.* 2locularis, 2valvis, 4sperma. *Cor.* subcampanulata. *Stamina* exserta. *Stigm.* 2.
1248. LISIANTHUS. *Capsf.* 2locularis, polysperma. *Cor.* infundibulif. ventricosa. *Stilus* persistens.
208. PATAGONULA. *Capsf.* 2locularis. *Cor.* rotata. *Stilus* dichotomus.
1246. NIGRINA. *Capsf.* 2locularis. *Cor.* infundibulif. *Cal.* inflatus.
246. DATURA. *Capsf.* 2locularis, 4valvis. *Cor.* infundibulif. *Cal.* deciduus.
247. HYOSCYAMUS. *Capsf.* 2locularis opereulata. *Cor.* infundibulif. *Stigma* capitatum.
248. NICOTIANA. *Capsf.* 2locularis. *Cor.* infundibulif. *Stigma* emarginatum.

245. VERBASCUM. *Capsf.* 2locularis. *Cor.* rotata. *Stam.* declinata. *Stigma* obtusum.
255. CHIRONIA. *Capsf.* 2locularis. *Cor.* tubo urceolato. *Antherae* defloratae spirales.
1006. LOBELIA. *Capsf.* 1-3locularis. *Cor.* irregularis. *Cal.* 5fidus.
- MURUCOA. *Capsf.* 2-3locularis. *Cor.* infundibuliformis. *Cal.* 5partitus. *Stigm.* 2lamellatum.
194. DIAPENSIA. *Capsf.* 3locularis. *Cor.* hypocraterif. *Cal.* 8phyllus.
214. PHLOX. *Capsf.* 3locularis. *Cor.* hypocraterif. tubo curvo. *Stigma* 3fidum.
217. POLEMONIUM. *Capsf.* 3locularis. *Cor.* 5partita. *Stamina* valvis imposita.
- CANTUA. *Capsf.* 3locularis. *Cor.* infundibuliformis. *Cal.* urceolatus. *Stigm.* 3.
- HOITZIA. *Capsf.* 3locularis. *Cor.* infundibuliformis. *Cal.* tubulosus. *Stigm.* 3.
216. IPOMOEA. *Cal.* 3locularis. *Cor.* infundibulif. *Stigma* capitatum.
1229. BROSSAEA. *Capsf.* 5locularis. *Cor.* truncata. *Cal.* carnosus.
212. AZALEA. *Capsf.* 5locularis. *Cor.* campanulata. *Stigma* obtusum.
1369. EPACRIS. *Capsf.* 5locularis, 5valvis. *Cor.* infundibuliformis, villosa. *Squamae* nectariferae germi adnatae.
302. CEROPEGIA. *Folliculi* 2. *Cor.* limbo connivente. *Sem.* papposa.
297. NERIUM. *Folliculi* 2 erecti. *Cor.* fauce coronata. *Sem.* papposa.
299. ECHITES. *Folliculi* 2 recti. *Cor.* infundibuliformis, fauce nuda. *Sem.* papposa.
- AMSONIA. *Folliculi* 2 erecti. *Cor.* infundibuliformis, fauce clauso. *Sem.* teretia oblique truncata.
398. PLUMIERIA. *Folliculi* 2 refracti. *Cor.* infundibuliformis. *Sem.* alata.
300. CAMERARIA. *Folliculi* 2 lobati. *Cor.* hypocraterif. *Sem.* alata.
301. TABERNAEMONTANA. *Follic.* 2pulposi. *Cor.* hypocraterif. *Sem.* simplicia.
295. VINCA. *Folliculi* 2 erecti. *Cor.* hypocraterif. *Sem.* simplicia.

- de- OCHROSTA. *Folliculi 2 drupacei divaricati. Cor. infundibuliformis. Sem. inaequalia plana.*
- An- 1370. IGNATIA. *Drupa 1locularis polysperma. Cal. 5dentatus. Cor. infundibulif. longissima.*
- Cal. 293. RAUWOLFIA. *Drupa 1locularis. Nuc. 2. 2loculares.*
- rmis. SMITHIA. *Drupa globosa. Cor. campanulata, exterius hispida.*
- tum. ARDISIA. *Drupa 1sperma. Cal. 5phyllus. Cor. reflexa. Stigma simplex.*
- Cal. BUMELIA. *Drupa 1sperma. Cor. 5fida. Nectarium 5phyllum.*
- tubo GYNOPOGON. *Bacca subglobosa: nucleo subbiloculari, Cor. 5partita. Cal. persistens, inferus. Stigma globosum didymum.*
- mina ANGUILLARIA. *Bacca 1sperma. Cal. 5partitus, persistens, corolla 5fida duplo brevior.*
- rmis. TRIGUERA. *Bacca 2-4locularis subglobosa. Filamenta nectarii dentaculis exterius inserta. Cor. campanulata.*
- rmis. JABOROSA. *Bacca Filam. plana summo tubo inserta. Stigma capitatum. Cor. calice longior, tubulosa 5fida.*
- stigma 1251. CARISSA. *Baccae 2 polyspermae.*
- car- 254. JACQUINIA. *Bacca 1sperma. Cor. 10fida.*
- stigma 259. LAUGIERIA. *Bacca 1sperma: nuce 5loculari. Stigma capitatum.*
- adibu- 258. VARRONIA. *Bacca 1sperma: nuce 4loculari. Stigma 4plex.*
- ectari- 256. CORDIA. *Bacca 1sperma: nuce 4loculari. Stigma dichotomum. Calix baccae accretus.*
- Sem. 269. MYRSINE. *Bacca 1sperma. Stigma lanigerum, pro-pendens.*
- Sem. BLADHIA. *Bacca 1sperma. Sem. arillatum.*
- rmis, PLOTEA. *Bacca 1sperma. Cal. 5dentatus. Cor. rosacea 5fida.*
- rmis, oblique ANTURA. *Bacca 2sperma. Cor. tubus calice 4plo longior. Stigma simplex.*
- rmis. 1252. PAEDERIA. *Bacca 2sperma, inflata, fragilis.*
- Sem. 294. CERBERA. *Bacca 2sperma: Nuces compressae, retusae.*
- Sem. 1250. ARDUINA. *Bacca 2sperma: Semin. oblonga. Cor. curvata. Stigma 2fidum.*
- Sem. 257. EHRETIA. *Bacca 4sperma: nuc. 2locul. Stigma emarginatum.*
- Sem. 192. TOURNEFORTIA. *Bacca 4sperma apice pertusa. Sem. 2locularia.*

264. SIDEROXYLON. *Bacca* 5sperma. *Cor.* 10fida: laciniis interioribus conniventibus.
263. CHRYSOPHYLLUM. *Bacca* 10sperma. *Cor.* 10fida: laciniis exterioribus patentissimis.
261. COSTRUM.
WILLUGHBEJA. *Bacca* 1locularis. *Filamenta* dente notata. *Bacca* 1-2locularis, ovata. *Stil.* 4gonus. *Stigma* ovato-capitatum, 2cuspidatum, orbiculo plano insidens.
- SIMIRA. *Bacca* 2locularis, 2sperma. *Cal.* 5dentatus. *Cor.* tubulosa, 5fida. *Stilus* apice 2partit.
- TOCOYENA. *Bacca* 2locularis, polysperma. *Cor.* hypocraterif.: tubo longissimo. *Stigma* 2lobum.
211. RANDIA. *Bacca* 2locularis, corticosa. *Cal.* ovatus 4-5dentatus.
- FAGRAEA. *Bacca* 2locularis carnosâ: *Sem.* globosa. *Stigma* peltatum.
253. STRYCHNOS.
252. CAPSICUM. *Bacca* 2locularis, corticosa. *Stigma* capitatum. *Bacca* 2locularis, exsucca. *Antherae* conniventes.
251. SOLANUM.
250. PHYSALIS. *Bacca* 2locularis. *Antherae* 2 perforatae. *Bacca* 2locularis, calice inflato. *Antherae* approximatae.
249. ATROPA. *Bacca* 2locularis. *Stamina* distantia, incurvata.
244. ELLISIA. *Bacca* 2locularis: *Sem.* 2; altero superiori.
262. LYCIUM. *Bacca* 2locularis. *Stam.* basi villo claudentia.
- CRYPTOSTOMUM. *Bacca* 3locularis. *Antherae* sub singulis nectarii denticulis insertae.
- PLOCAMA. *Bacca* 3locularis: *Sem.* solitaria. *Cor.* 5fida. *Cal.* 5dentatus.
234. MENAIS.
SWARTSIA. *Bacca* 4locularis. *Cal.* 3phyllus. *Stigmata* 2. *Bacca* 4locularis polysperma. *Cal.* rumpens. *Stam.* inclinata.
- MANGLILLA. *Drupa* globosa, 1locularis, 1sperma. *Cor.* rotata, 5partita. *Stilus* 0.
- CAMAX. *Bacca* 4locularis villosa, ovata. *Cor.* rotata. *Stigm.* 3-4.
- BASSOVIA. *Bacca* ovata, nodulosa. *Cor.* 5fida: tubo brevissimo.
- URCEOLARIA. *Bacca?* *Cal.* campanulatus, integerrimus. *Cor.* hypocrateriformis, 5fida. *Stigm.* 2clavatum.
- MARIPA. *Pericarpium* 2loculare, 2spermum. *Cor.* tubulosa, 5fida. *Stigma* peltatum.

- MEISTERIA. *Pericarp. - - Cal. 5dentatus. Cor. 5partita: laciniis membrana distinctis. Stigm. 3ovata.*
- VALLARIS. *Pericarp. - - Cal. 5partitus. Cor. hypocrateriformis, 5fida. Anther. glanduliferae. Stigm. clavata.*
- * *Achras Linum monogynum. Mimosae nonnullae: Gentiana tentareum, pulchella.*
- †† *superi.*
222. SAMOLUS. *Caps. 1locularis, apice 5valvis. Cor. hypocraterif. Stigma capitat.*
226. BELLONIA. *Caps. 1locularis, umbilico rostrato. Cor. rotata. Stigma acutum.*
1366. VIRECTA. *Caps. 1locularis. Cor. infundibulif. Stigma 2partitum. Cal. 5phyllus, dentibus interjectus.*
225. MACROCNEMUM. *Caps. 2locularis, turbinata: Sem. imbricata. Cor. campanulata. Stigma 2lobum.*
- DENTECLA. *Caps. globosa, 2locularis, polysperma. Cor. tubulosa, 5fida: laciniis 3dentatis. Stigma 2.*
224. RONDELETIA. *Caps. 3locularis, subglobosa. Cor. infundibulif. Stigma obtusum.*
228. CINCHONA. *Caps. 2locularis, intus dehiscens. Cor. hirsuta. Stigma simplex.*
227. PORTLANDIA. *Caps. 2locularis, coronata. Cor. ventricosa. Stigma simplex. Sem. imbricata.*
- CHIMARRHIS. *Caps. 2locularis, 2valvis: valvis, apice 2fidis, Cor. infundibuliformis. Stigma 2fidum.*
219. ROELLA. *Caps. subbilocularis, coronata. Cor. infundibuliformis. Stigmata 2.*
- FORGESTA. *Caps. 2locularis, polysperma, semiinfera. Cor. intus furfuracea. Stigma 2lobum.*
220. PHYTEUMA. *Caps. 2-3locularis, perforata. Cor. 5partita. Stigma 2-3fidum.*
221. TRACHELIUM. *Caps. 3locularis, perforata. Cor. infundibulif. Stigma globosum.*
218. CAMPANULA. *Caps. 3-5locularis, perforata. Cor. campanulata. Stigma 3fidum.*
1294. SCAEVOLA. *Drupa 1sperma. Cor. irregulari-flabelliformis: fissura longitudinali.*

1329. CLIBADIUM. *Drupa umbilicata. Flores compositi, monoici; cal. commun. imbricatus.*
♂. Cor. disci 5fidae.
♀. Cor. radii femineae 3-4.
231. MATTHIOLA. *Bacca 1sperma. Cor. infundibulif. indivisa. Stigma obtusum.*
- RAPANEA. *Bacca 1locularis, sphaerica 1sperma. Cor. 5-6fida. Filam. 5-6.*
235. MORINDA. *Bacca 1sperma, aggregata. Cor. infundibulif. Stigma 2fidum.*
- CALLICOCCA. *Bacca 1locularis, angulata, 2sperma. Flores aggregati: involuacro subtetraphyllo. Stil. 2fidus.*
- CEPHAELIS. *Bacca 2sperma. Flores capitati, involucreti. Receptac. paleaceum. Cor. tubulosa. Stigma 2partitum.*
229. PSYCHOTHRIA. *Bacca 2sperma. Sem. fulcata. Cor. infundibulif. Stigma emarginatum.*
230. COFFEA. *Bacca 2sperma, Sem. arillata. Cor. hypocraterif. Stigma 2partitum.*
231. CHIOCOCCA. *Bacca 2sperma. Cor. infundibulif. Stigma simplex.*
- MAESA. *Bacca 1locularis, polysperma, globosa. Cor. campanulata. Stigma truncatum.*
- BAEOBOTRYS. *Bacca 1locularis, globosa, polysperma, calici adnata. Cor. tubulosa, 5fida. Cal. duplex.*
- RONABEA. *Bacca 1locularis, 2pyrena: officulis 1spermis. Cal. 5dentatus. Cor. tubulosa, 5fida. Stigma 2lamellatum.*
- WILLDENOVIA. *Bacca 2locularis. Cor. hypocrateriformis coriacea 5partita. Stigma 2fidum.*
- BERTIERA. *Bacca globosa, 2locularis, polysperma. Cor. 5fida: tubo brevi; ore villosa. Stigma 2lamellatum.*
240. GENIPA. *Bacca 2locularis, subrotunda. Cor. rotata. Stigma clavatum.*
233. LONICERA. *Bacca 2locularis subrotunda. Cor. inaequalis. Stigma capitatum.*
- CYRTANTHUS. *Bacca ovata 1locularis. Cor. 5partita: tubo recurvo. Stigma 3fidum.*
296. GARDENIA. *Bacca 4locularis, polysperma. Antherae in tubo corollae sessiles.*

234. TRIOSTEUM. *Bacca* 3locularis, coriacea. *Cor.* inaequalis. *Stigma* oblongum.
- SCHOEPFIA. *Bacca* 3locularis. *Cor.* campanulata. *Stigm.* capitatum, 3fidum.
241. MUSSAENDA. *Bacca* 4locularis, oblonga. *Cor.* infundibulif. *Stigma* 2partitum.
- PATIMA. *Bacca* 4-6locularis, polysperma. *Cal.* subquinquefidus. *Cor.* - - -
232. HAMELLIA. *Bacca* 5locularis, polysperma. *Cor.* tubo longo. *Stigma* lineare.
- VANGUERIA. *Bacca* 5locularis, 5sperma. *Cor.* campanulato-globosa, 5fida, intus hirta. *Cal.* 5dentatus, patens. *Antherae* vix exsertae.
- SABICEA. *Bacca* 5locularis, polysperma. *Cor.* infundibulif. *Involucr.* 4fidum. *Stigma* 5partitum.
- ORIBASIA. *Bacca* globosa 5locularis. *Cor.* tubulosa 5fida. *Stil.* 2fidus.
238. ERITHALIS. *Bacca* 10locularis, subglobosa. *Cor.* rotata. *Stigma* acutum.
1003. SERIPHIMUM. *Sem.* 1. oblongum. *Cor.* regularis. *Cal.* imbricatus. *Antherae* connexae.
1004. CORYMBIUM. *Sem.* 1. lanatum. *Cor.* regularis. *Cal.* 2phyllus, prismaticus. *Antherae* connexae.
- SHAWIA. *Sem.* 1. oblongum, pappo coronatum. *Cor.* infundibulif. *Cal.* imbricatus. *Antherae* connexae.
1142. OPHIOXYLUM. *Cor.* infundibulif. 5fida. *Cal.* 5fidus. *Flores* mere masculi in eadem planta interfiti *nectar.* cylindr. *Stam.* 2.
1276. LEEA. *Flores* monoici. *Cal.* 5fidus, *Cor.* 5fida, cum *nect.* cylindr. tubi.
- ♀. *Pericarp.* 6locul. *Sem.* solitaria.
- STEPHANIMUM. *Pericarp.* 2loculare, 2spermum. *Cor.* infundibuliformis. *Stigm.* 2.
- UNCARIA. *Pericarp.* 2loculare, polyspermum. *Cor.* hypocrateriformis. *Stigma* 2stell.
- PORAQUEIBA. *Pericarpium* - - - *Cal.* 5dentatus. *Cor.* 5partita. *Anth.* 2loculares, 4gonae, coadunatae. *Stigm.* 3.
- MAPURIA. *Pericarpium* - - - *Cal.* 5dentatus. *Cor.* 5fida: tubo brevi. *Stigma* 2lamellatum.

- TAPURA. *Pericarpium* - - *Cal.* 6partitus. *Cor.* 2labiata. Filamentum 5tum longissimum. *Germen* 3gonum. *Stigma* 3lobum. 129
28
- * *Ixia pentandra.*
Rubia.
Crucianella.
Prinos. 132
- ** *Flores dipetali.*
Musa.
- *** *Flores tripetali.*
1281. CANARIUM. *Flores* dioici. *Cal.* 2phyllus. 27
♀. *Stigma* sessile. *Drupa* nuce trigona *Bursera.* 137
- MEESIA. *Drupae* 5 1loculares, 1spermae. *Cor.* patens, calice staminibusque longior.
- XYSTRIS. *Drupa* globosa: nuce 1loculari. *Cor.* 5partita. *Stil.* 2 inferne coaliti.
- DIGERA. *Drupa* globosa, calice corollaque clausa: nuce 1loculari, 1sperma. 27
268
- **** *Flores tetrapetali.*
- CADALA. *Caps.* 1locularis, cylindrica, 2valvis. *Cal.* 4phyllus. 27
- * *Oldenlandia pentandra.*
- ***** *Flores pentapetali.*
† *inferi.*
280. HIRTELLA. *Bacca* 1sperma. *Stilus* lateralis. *Stamina* persistentia, spiralia.
265. RHAMNUS. *Bacca* 3locularis, rotunda. *Cal.* tubulosus, corollifer. *Squamae* oris 5convergentes.
- CARPODETUS. *Cal.* 5dentatus, germine adnatus. *Cor.* 5petala. *Stigma* capitat. depressum. *Bacca* globosa 5locularis.
267. CEANOTHUS. *Bacca* 3cocca. *Cal.* tubulosus corollifer. *Petala* fornicata.
270. CELASTRUS. *Bacca* 3cocca. *Cal.* planus. *Sem.* arillata.
RUYSCHIA. *Bacca* capsular. polysperma. *Cal.* 5phyllus, bractea clavata subiecta. *Cor.* reflexa. *Stil.* o. 100
271. EUONYMUS. *Bacca* capsularis lobata. *Cal.* patens. *Sem.* baccato-arillata.

1296. AQUILICIA. *Bacca sperma. Cor. nectario arceolato.*
 284. VITIS. *Bacca sperma. Cor. saepe emarcido-con-*
nata. Stil. o.
 1327. GLUTA. *Bacca? pedicellata. Petala inferne aggluti-*
nata, filamenta receptaculi apici in-
ferta, germen infidens. Cal. campu-
latus, deciduus.
 BRASILIUM. *Drupa ovalis: nuce 1loculari. Cal. perfi-*
stens 5partitus. Stil. o. Stigma 2lobum.
 RUBENTIA. *Drupa ovata; Nux 2locularis, 2sperma.*
Cal. 5partitus. Petala 5patentia.
 ELAEODENDRON. *Drupa ovata, nuce 2loculari.*
 278. MANGIFERA. *Drupa reniformis: nucleo lanuginoso. Pe-*
tala lanceolata.
 1373. CORYNOCARPUS. *Nux clavata. Nectaria 5petaliformia, cum*
petalis alternantia, basi glandulifera.
 HYPERANTHERA. *Legumen teres subarticulatum, sexangula-*
re. Stamina 9, quorum 4sterilia.
 272. DIOSMA. *Caps. 5plex. Nectar. germen coronans.*
Sem. arillata.
 268. BÜTTNERA. *Caps. 5coeca. Petala auriculata. Stamina*
nectario annexa.
 CALODENDRUM. *Caps. 5locularis. Nectarium 5phyllum.*
 277. CEDRELA. *Caps. 5locularis basi dehiscens. Cor. recep-*
taculo unita. Sem. alata.
 POLYCARDIA. *Caps. 5locularis, 5valvis, coriacea. Cal.*
5lobus. Stigm. lobatum.
 MELHANIA. *Caps. 5locularis, 5valvis, globosa, 4sper-*
ma. Sem. cuneat. punctata.
 HYENIA. *Caps. 5locularis. Petala connata in stellam*
unguibus longis. Antherae germini
proximae sub stella. Cal. 5phyllus.
 GERUMA. *Caps. 4locularis, 4valvis, 2sperma. Semi-*
na ovata pulpa albae innidulans 4.
 CATHA. *Caps. 3locularis cylindrica. Sem. solitaria.*
Nectarium cyathiforme.
 HOVENIA. *Caps. 3locularis, 3valvis. Petala convolu-*
ta. Stigma trifidum.
 FITTOSPORUM. *Caps. 3locularis: loculis refina liquida ple-*
nis. Petala unguibus conniventia lami-
nis patula. Cal. 5phyllus deciduus.
 1008. IMPATIENS. *Caps. 1locularis, 5valvis. Cor. irregularis.*
Nectarium 1phyllum cucullatum. Sta-
mina cohaerentia. Cal. 2phyllus.

1007. VIOLA. *Capsf.* 1locularis, 3valvis. *Cor.* irregularis: petalo inferiori cornuto. *Antherae* cohaerentes. *Cal.* 5phyllus.
1234. RORIDULA. *Capsf.* 1locularis, 3valvis. *Nectarium* antherae scrotiforme.
275. ITEA. *Capsf.* 1locularis, 2valvis. *Cor.* corollifer. *Stigma* obtusum.
286. SAUVAGESIA. *Capsf.* 1locularis. *Nectar.* 5phyllum. *Petala* fimbriata.
- LOGANIA. *Pericarp.* 5loculare. *Cal.* coriaceus 5-6phyllus. *Cor.* carnosa, reflexa. *Filamenta* basi dilatata. *Stigmata* 5radiata.
- CAROXYLON. *Sem.* tunica vestitum. *Nectarium* 5phyllum connivens, corollae insertum.
274. BRUNIA. *Sem.* 1-6 vel bacca corticata 2locularis. *Recept. commune* villosum. *Stamina* unguibus petalorum aut fundo calicis inserta.
237. KUHNIA. *Sem.* 1 papposum. *Recept. commune* nudum.
- CANEPHORA. *Fructus* 2spermus. *Flores* squamulis distincti.
223. NAUCLEA. *Capsf.* 2cocca. *Recept. commune* globosum subvillosum.
- CONOHORIA. *Pericarp.* - - - *Cal.* 5partitus. *Petala* incumbentia, ad basin foliolo concavo acuta. *Stil.* flexuosus. *Stigma* capitatum.

* *Caesalpinia pentandra.* *Tribulus pentandrus.* *Bombax pentandrum.* *Quassia excelsa.* *Cassia nictitans.* *Serpens pilosa.*

†† *superi.*

- MELICYTUS. *Bacca* 1locularis, polysperma. *Cal.* 5dentatus. *Nectar.* e squam. 5. *Flores* dioici.
281. RIBES. *Bacca* polysperma. *Cal.* corollifer. *Stilus* 2fidus.
1372. ESCALLONIA. *Bacca* polysperma, 2locularis. *Petala* distantia lingulata. *Stigma* capitatum.
283. HEDERA. *Bacca* 5sperma, calice cincta. *Stigma* simplex.
1249. PLECTRONIA. *Bacca* 2sperma. *Cal.* unguibus clausus. *Antherae* inclusae, geminatae.
1002. STRUMPFIA. *Bacca* 1sperma. *Antherae* cohaerentes. *Cal.* 5dentatus.
266. PHYLICA. *Bacca* 3cocca. *Cal.* tubulosus corollifer squamis 5 convergentibus.

TURIA.

- TURIA. *Pomum*, calice stilo staminumque rudimentis coronatum. *Flores* monoici. *Cal.* 5partitus.
1297. HELICONIA. *Caps.* 3cocca. *Cor.* irregularis. *Cal.* 0.
1374. ARGOPHYLLUM. *Caps.* 3locularis. *Nectarium* pyramidale, 5angulare, longitudine corollae.
1005. JASIONE. *Caps.* 2locularis. *Cor.* regularis. *Antherae* cohaerentes. *Cal.* communis 10phyllus.
- LIGNONIA. *Pericarp.* 2loculare. *Cal.* 5dentatus. *Petal.* 1reliquis majus emarginatum. *Anther.* cohaerentes. *Stigma* 2lobum.
- CYPHIA. *Pericarp.* - - - *Cal.* 5fidus. *Petala* linearia. *Filamenta* pilosa. *Stigma* cernuum, gibbosum.
1247. CYRILLA. *Caps.* 2locularis, polysperma. *Stilus* 2fidus. *Petala* acuminata.
282. GRONOVIA. *Caps.* 1sperma colorata. *Cal.* coloratus. *Petala* minuta.
- MOLLIA. *Caps.* matura 1locularis, coriacea, evalvis, apice amplo foramine dehiscens. *Cal.* 5dentatus. *Stigma* globosum.
285. LAGOECIA. *Sem.* 2 nuda. *Cal.* pinnato-pectinatus. *Petala* 2cornia.
236. CONOCARPUS. *Sem.* 1. nudum. *Cal.* campanulatus. *Petala* conniventia.
- PAYPAYROLA. *Peric.* 2loculare. *Cal.* 5partitus. *Petala* in tubum conjuncta. *Stigma* 2lobum.
- ***** *Flores* penta-dodecapetali.
 ***** *Flores* incompleti.
 † *inferi.*
- EUPAREA. *Cal.* 5phyllus, corolla brevior. *Petala* oblonga, angusta. *Bacca* exsucca, supera, 1locularis, polysperma.
- RINOREA. *Cal.* 5partitus. *Petali* 10. *Anther.* 2loculares, 2valves.
288. ACHYRANTHES. *Sem.* 1. oblongum. *Cal.* exterior, 3phyllus nudus.
1167. CERATONIA. *Arbores* mere masculae et mere femineae hermaphroditis intermistae. *Legumen* coriaceum, polyspermum. *Stil.* filiformis. *Cal.* 5partitus.
1162. PISONIA. *Flores* praeter hermaphroditos et masculi et feminei in eadem aut distincta planta.

290. ILLECEBRUM,
CHENOLEA. *Caps.* 1sperma, 5valvis. *Cor.* campanulata, 5fida. *Cal.* o.
289. CELOSIA. *Caps.* 1sperma, 1valvis. *Cal.* 5fidus.
291. GLAUX. *Caps.* 3sperma. *Cal.* exterior, 3phyllus, coloratus.
- COLLETIA. *Caps.* 5sperma, 5valvis. *Cal.* simplex, rudior, campanulatus.
- XIII. ANTIDESMA. *Caps.* 3cocca, 3sperma. *Cal.* urceolatus, 5fidus: intus plicis 5squamiformibus. *Bacca* cylindrica, 1sperma. *Flores* dioici. *Cal.* 5phyllus.
- PENNANTIA. ♀. *Stigm.* 5. *Cal.* o. *Cor.* 5petala, patens. *Stil.* o. *Stigma* peltat. subtrilobum. *Flores* mere masculi in distincta planta.
- HEDYCREA. *Cor.* o. *Cal.* hemisphaericus, 5dentatus. *Drupa* ovalisilocularis: *Nux* ovata, 1locularis.
- AMANOA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* o. *Germen* 3 angulare. *Stigma* 3gonum fimbriatum.

* *Salix pentandra.*

* *Polygonum amphibium, lapathifolium, virginianum.*

†† *Superi.*

292. THESIUM. *Sem.* 1. coronatum. *Cal.* staminifer.
- GYMNOCARPOS. *Sem.* 1. nudum. *Stamina* 5 sterilia, 5 fertilia.
- PAPULARIA. *Germen* cylindric. *Cor.* calicina. *Cal.* o.
1157. GOUANIA. *Fructus* 3partibilis. *Cal.* 5partitus. *Antherae* sub calyptra tectae. *Stil.* 3fidus. *Flores* mere masculi in eadem planta.
1163. NYSSA. *Drupa.* *Cal.* 5partitus. *Flores* masculi in distincta planta *stamin.* 10.
- BREYNIA. *Bacca* 3locularis. *Sem.* bina. *Antherae* stilo proximae sessiles. *Cal.* 6partitus, fructus patentissimus. *Flores* masculi et feminei singuli in distincta ab hermaphroditis planta.

* *Loranthus Trianthema monogyna.*

Aristolochia pentandra. Laurus Borbonia.

* *an distincti generis nova illa planta, a Peterson journey into Caffraria &c. p. 124. memorata et depicta?*

DIGY-

DIGYNIA.

* Flores incompleti.

- MICROTEA. *Drupa sicca, echinata. Cal. 5phyllus, patens.*
- CELTIS. *Drupa 1sperma. Flores alii hermaphroditi, alii in eadem planta masculi.*
 ♀. *Cal. 5partitus.*
 ♂. *Cal. 6partitus. Stam. 6.*
1108. PISTACIA. *Drupa 1sperma. Flores amentacei masculi et feminei in distincta planta.*
 ♂. *Cal. 5fidus.*
 ♀. *Cal. 3fidus.*
1115. CANNABIS. *Nux 2valvis intra calicem clausum. Flores masculi et feminei in distincta planta.*
 ♂. *Cal. 5partitus.*
 ♀. *Cal. integer, latere hians.*
1059. IVA. *Flores compositi monoici. Cal. communis 3phyllus.*
 ♂. *Cor. disci 1petalae, 5fidae. Receptac. pilis distinctum.*
 ♀. *Flosc. radii 5. Cor. o. Stil. longi. Sem. nudum, obtusum.*
1056. XANTHIUM. *Flor. compositi monoici.*
 ♂. *Cal. commun. imbricatus. Cor. 1petalae, 5fidae, infundibuliform. Receptac. paleaceum.*
 ♀. *Cal. involucr. 2phyllum, 2florum. Cor. o. Drupa sicca, muricata, 2fida: nucleo 2loculari.*
1277. NEPHELIUM. *Flores monoici.*
 ♂. *Cal. 5dentatus.*
 ♀. *Cal. 4fidus. Drupae 2siccae, muricatae, 1spermae.*
316. ULMUS. *Bacca exsucca, compressa. Cal. 1phyllus, emarcescens.*
315. BOSEA. *Bacca 1sperma. Cal. 5phyllus.*
314. GOMPHRENA. *Caps. 1sperma, circumscissa. Cal. 2phyllus, compressus, coloratus.*
- ROCAMA. *Caps. 2locularis, 2sperma. Cal. 1phyllus, corniculatus.*
1116. HUMULUS. *Sem. 1 intra calicem foliatum. Flores dioici.*
 ♂. *Cal.*

1153. ATRIPLEX. ♂. Cal. 5phyllus.
♀. Cal. 1phyllus, oblique patens, integer.
Sem. 1 compressum. Flores mere feminei
in eadem planta.
309. CHENOPODIUM. ♀. Cal. 5phyllus.
♀. Cal. 2phyllus.
Sem. 1. lenticulare. Cal. 5partitus: laciniis
concavis.
310. BETA. Sem. 1. reniforme. Cal. 5partitus, basi
capsulamilocularem fovens.
308. HERNIARIA. Sem. 1. ovatum tectum. Cal. 5partitus.
Filam. 5 sterilia.
311. SALSOLA. Sem. 1. cochleatum, capsulae inclusum,
calice tectum. Cal. 5partitus.
- ANREDERA. Sem. 1 tectum calice compresso membra-
naceo 2alato. Cal. 2partitus: laciniis
dorso carinatis.

* *Rhamnus Zizyphus. Polygonum virginianum.*
Amphibium lapathifolium, filiforme.
Trianthema pentandrum. Celosia procumbens. Brunia
nodiflora.
Staphylea pinnata. Quercus. Scloranthus annuus.

** *Flores monopetali, omnes inferi.*

1253. PERGULARIA. Folliculi 2. Cor. hypocrateriformis, Ne-
ctaria 5 semifagittata.
307. STAPELIA. Folliculi 2. Cor. rotata: nectariis stellatis.
304. CYNANCHUM. Folliculi 2. Cor. rotata: nectario cylindri-
co plicato-angulato.
303. PERIPLOCA. Folliculi 2. Cor. rotata: nectariis 5 fili-
formibus.
- CYNOCTONUM. Folliculi 2 erecti basi ventricosi. Cor. ven-
triosa, clausa.
305. APOCYNUM. Folliculi 2. Cor. campanulata: nectariis
glandulosis 5, fetis 5.
306. ASCLEPIAS. Folliculi 2. Cor. plana vel reflexa: necta-
riis quinque cucullatis unguiculatis.
- MATELEA. Folliculus 1. Cor. 5fida, tubo brevissimo.
Germen alterum abortiens.
- VILLARSIA. Caps.ilocularis, polysperma. Cor. cam-
panulata.
321. SWERTIA. Caps.ilocularis, 2valvis. Cor. rotata: po-
ris 5 nectariferis.

322. GENTIANA. *Caps.* 1locularis, 2valvis. *Cor.* tubulosa.
Receptac. 2.
313. CRESSA. *Caps.* 1sperma, 2valvis. *Cor.* hypocrate-
rifformis: limbo reflexo.
- DICHONDRA. *Caps.* 2. *Cor.* rotata, 5partita. *Cal.* 5par-
titus.
318. HYDROLEA. *Caps.* 2locularis, 2valvis. *Cor.* rotato-
campanulata.
- DEMIDOFIA. *Nuces* 2. *Cor.* tubulosa.
1339. PORANA. *Fructus* 2valvis, calice acuto. *Stil.* elon-
gatus, semibifidus.
319. SCHREBERA. *Fructus* 2locularis. *Cor.* infundibulif. *Ne-*
ctarii squama filam. singulis adnata.
- ROCHEFORTIA. *Fructus* 2locularis, polyspermus. *Cor.* in-
fundibulif. fauce pervia. *Cal.* 5partitus.
1254. STERIS. *Bacca* polysperma. *Cor.* rotata.
1375. MELODINUS. *Bacca* 2locularis, polysperma. *Faux co-*
rollae coronata.

*** *Flores tetrapetali.*

* *Oldenlandia digyna.*

**** *Flores pentapetali.*

† *inferi.*

447. VELEZIA. *Caps.* 1locularis, 1valvis. *Cal.* tubulosus.
317. NAMA. *Caps.* 2locularis, 2valvis. *Cor.* minor, ro-
tato-hypocrateriformis.
1293. LINCONIA. *Caps.* 2locularis. *Petalis* lacuna. *Cal.*
4phyllus.
320. HEUCHERA.
BUMALDA. *Caps.* 2locularis, 2rostris. *Cor.* calici inserta.
1113. IRESINE. *Caps.* 2locularis, 2rostris. *Stili* villosi.
- Caps.* feminibus tomentosis. *Flores* dioici.
Cal. 2phyllus.
- ♂. *Nectaria* 7.
♀. *Stigmat.* sessilia.
312. ANABASIS. *Bacca* 1sperma. *Cor.* 5petala, minima.

* *Staphylea pinnata.*

†† *superi, plurimi ut plurimum dispermi, Umbellatae.*

↳ *involucro universali partialique.*

- VAHLIA. *Flores* caliculati, sparsi *Capsula.*
323. PHYLLIS. *Flores* dispersi. *Stigmata* hispida.
1377. COPROSMA. *Flores* mere masculi et feminei hermaphro-
ditis intermixti. *Cal.* 5partitus. *Bacca*
2sperma. *Semina* planiuscula.

1166. PANAX. Flores alii masculi, alii hermaphroditi in
distincta planta. 34
- ♂. Cal. integer. 33
- ♀. Cal. 5dentatus. Bacca 2sperma.
1165. ARCTOPUS. Umbellae aliae compositae mere masculae,
aliae simplices ex flosculis masculis fe- 33
mineisque conflatae. 33
- ♂. Involucr. 5phylla. Pist. 2. abortientia.
Androg. Involucr. 4partitum, spinosum,
maximum, flosculis masculis in disco 32
plurimis, femineis in radio 4. 34
- ♀. Sem. 1. 2loculare.
1132. HERMAS. Umbellae aliae terminales hermaphroditae,
aliae laterales masculae. 33
- ♂. Umbellulae multiflorae. 35
- ♀. Umbellulae radiis truncatis, centrali
florifero. Stam. sterilia. Sem. 2 sub-
orbiculata. 34
324. ERYNGIUM. Flores capitati. Receptaculum paleaceum. 34
325. HYDROCOTYLE. Flores subumbellati fertiles. Semina com- 34
pressa.
326. SANICULA. Flores subumbellati abortivi. Sem. muricata.
327. ASTRANTIA. Flores umbellati abortivi. Involucra colo-
rata. Sem. rugosa.
345. HERACLEUM. Flores radiati, abortivi. Invol. deciduum.
Sem. membranacea. 35
352. OENANTHE. Flores radiati, radio abortivi. Invol. sim-
plex. Sem. coronata, fessilia. 34
329. ECHINOPHORA. Flores radiati abortivi. Invol. simplex.
Sem. fessilia. 34
331. CAUCALIS. Flores radiati, abortivi. Invol. simplex.
Sem. muricata. 34
332. ARTEDIA. Flores radiati, abortivi. Invol. pinnatum.
Sem. margine crenis foliaceis. 34
333. DAUCUS. Flores radiati, abortivi. Invol. pinnatum.
Sem. hispida.
330. TORDYLIUM. Flores radiati, fertiles. Invol. simplex.
Sem. margine crenata. 35
344. LASERPITIUM. Flores flosculosi, abortivi. Petala cordata.
Sem. 4alata. 35
339. PEUCEDANUM. Flores flosculosi, abortivi. Invol. simplex.
Sem. depressa, striata. 35
334. AMMI. Flores flosculosi, fertiles. Invol. pinna-
tum. Sem. gibba, laevia. 35

341. HASSELQUISTIA. Flores flosculosi, fertiles. *Petal.* cordata.
Sem. radii plana, disci urceolata.
336. CONIUM. Flores flosculosi, fertiles. *Involucell.* dimidiata. *Petal.* cordata. *Sem.* gibba, costato-fulcata.
335. BUNIUM. Flores flosculosi, fertiles. *Involuc.* setacea. *Petala* cordata.
338. ATHAMANTA. Flores flosculosi, fertiles. *Petal.* cordata. *Sem.* convexa, striata.
328. BUPLEURUM. Flores flosculosi, fertiles. *Involuc.* petaliform. *Petal.* involuta.
348. SIUM. Flores flosculosi, fertiles. *Petal.* cordata. *Sem.* subovata, striata.
337. SELINUM. Flores flosculosi, fertiles. *Petal.* cordata. *Sem.* depressa, striata.
351. CUMINUM. Flores flosculosi, fertiles. *Umb.* 4fida. *Involuc.* setaceis, longissimis. *Petal.* cordata.
343. FERULA. Flores flosculosi, fertiles. *Petal.* cordata. *Sem.* plana.
340. CRITHMUM. Flores flosculosi, fertiles. *Invol.* horizontale. *Petal.* planiuscula.
- SPANANTHE. Flores flosculosi, fertiles. *Inv.* subheptaphyllum. *Petala* lanceolata patentissima.
350. BUBON. Flores flosculosi, fertiles. *Inv.* 5phyllum. *Petal.* planiuscula.
342. CACHRYS. Flores flosculosi, fertiles. *Petal.* planiuscula. *Sem.* cortice suberoso.
346. LIGUSTICUM. Flores flosculosi, fertiles. *Involucr.* membranacea. *Petala* involuta.
347. ANGELICA. Flores flosculosi, fertiles. *Umbellul.* globosae. *Petala* planiuscula.
349. SISON. Flores flosculosi, fertiles. *Umbella* depauperata. *Petal.* planiuscula.
- — involucris partialibus, universali nullo.
356. CORIANDRUM. Flores radiati abortivi. *Fr.* subglobosi.
357. SCANDIX. Flores radiati, abortivi. *Fr.* oblongi.
355. AETHUSA. Flores subradiati, fertiles. *Involucell.* dimidiata.
353. PHELLANDRIUM. Flores flosculosi, fertiles. *Fr.* coronati.
359. IMPERATORIA. Flores flosculosi, fertiles. *Umbella* expanso-plana.

360. SESELI. *Flores flosculosi, fertiles. Umbella rigidula.*
 354. CICUTA. *Flores flosculosi, fertiles. Petala planiuscula.*
 358. CHAEROPHYLLUM. *Flores flosculosi, abortivi. Involuc. 5phylla.*
 * *Bupleurum rotundifolium. Apium Petroselinum.*
Pimpinella. Anisum.

— — — involucro plane nullo.

- CHAMITIS. *Petala ovato-oblonga obtusa, integerrima.*
Cal. superus, 5dentatus persistens.
Fructus subglobosus, striatus, 2partibilis.
 363. SMYRNIUM. *Flores flosculosi abortivi. Sem. reniformia, angulata.*
 364. CARUM. *Flores flosculosi abortivi. Sem. gibba, striata.*
 361. THAPSIA. *Flores flosculosi fertiles. Sem. membranaceo-alata, emarginata.*
 362. PASTINACA. *Flores flosculosi, fertiles. Sem. depressoplane.*
 364. ANETHUM. *Flores flosculosi, fertiles. Sem. marginata, striata.*
 368. AEGOPODIUM. *Flores flosculosi, fertiles. Sem. gibba, striata. Petala cordata.*
 367. APIUM. *Flores flosculosi, fertiles. Petala inflexa. Sem. minuta, striata.*
 366. PIMPINELLA. *Flores flosculosi fertiles. Umbellae ante florescentiam nutantes. Petala cordata.*
 1378. CUSSONIA. *Petala 3gona. Receptaculum margine dilatatum in calicem 5dentatum.*

TRIGYNIA.

• *Flores superi.*

- GRISELINA. *Cal. 5dentatus. Germen oblongum, 1spermum.*
 370. VIBURNUM. *Cor. 5fida. Bacca 1sperma.*
 372. SAMBUCUS. *Cor. 5fida. Bacca 3sperma.*
 1117. ZANONIA. *Flores dioici. Cor. 5partita. Cal. 3phyllus. Bacca 3locularis. Sem. 2.*
 1118. FEUILLEA. *Flores dioici. Cor. 5fida. Cal. 5fidus.*
 ♂. *Nectar. filam. 5 conniventia.*
 ♀. *Pomum durum 3loculare, corticosum.*

?QUIN-

- ?QUINCHAMALIUM. *Cal.* 5fidus. *Cor.* 5fida. *Caps.* 3locular.
poly sperma.
- CURTISIA. *Cal.* 5fidus. *Cor.* 5petala. *Nectar.* glandulofum, annulare. *Caps.* 3 approximatae, subglobosae, 1loculares, 2spermae.
- †† flores inferi.
1021. PASSIFLORA. *Cal.* 5phyllus. *Cor.* 5petala. *Nectarium* Corona. *Stam.* germini proxima. *Bacca* pedicellata.
1111. ASTRONIUM. *Flores* dioici. *Cor.* 5petala. *Cal.* 5phyllus
Sem. 1.
- SUAEDA. *Cor.* 0. *Cal.* carnos. 5fidus. *Sem.* 1.
382. BASELLA. *Cor.* 0. *Cal.* 6fidus. *Sem.* 1. globosum, calice baccato inclusum.
378. CORRIGIOLA. *Cor.* 5petala. *Cal.* 5partitus. *Sem.* 1. triquetrum.
1379. SEMECARPUS. *Cor.* 5petala. *Drupa* cordata, cellulosa, 1sperma.
369. RHUS. *Cor.* 5petala. *Bacca* 1sperma.
371. CASSINE. *Cor.* 5petala. *Bacca* 3sperma.
- ARUBA. *Cor.* 5-6petala. *Filamenta* 5-8. *Germina* 3-6. *Caps.* 3-6 1loculares, 1spermae.
1299. XYLOPHYLLA. *Caps.* 3cocca: seminibus binis. *Cal.* 5partitus.
- REICHELIA. *Caps.* subtrigona, 3locularis, polysperma circumscissa. *Cor.* campanulata. *Cal.* 5partitus.
- SALMASIA. *Caps.* 3gona, 3locularis, 3valvis. *Cor.* 5petala. *Cal.* 5partitus. *Stil.* 0.
379. PHARNACEUM. *Caps.* 3locularis. *Cor.* 0. *Cal.* 5phyllus.
373. SPATHELIA. *Caps.* 3locularis, 3gona, 1sperma. *Cor.* 5petala. *Filamenta* basi dentata.
374. STAPHYLEA. *Caps.* 2-3fida, inflata. *Cor.* 5petala.
375. TAMARIX. *Caps.* 1locularis. *Sem.* papposa. *Cor.* 5petala.
381. DRYPIS. *Caps.* 1sperma, circumscissa. *Cor.* 5petala, coronata.
376. TURNERA. *Caps.* 1locularis. *Cor.* 5petala. *Cal.* 1phyllus, corollifer.
383. SAROTHRA. *Caps.* 1locularis, colorata. *Cor.* 5petala. *Cal.* 1phyllus.
380. ALSINE. *Caps.* 1locularis. *Cor.* 5petala: petalis 2fidis. *Cal.* 5phyllus.

377. TELEPHIUM. Caps.ilocularis triquetra. Cor. 5petala.
Cal. 5phyllus.
1095. ANDRACHNE. Flores monoici. Cal. 5phyllus.
♂. Cor. 5petala. Stam. filii rudimento in-
ferta.
♀. Cor. o. Caps. 3locularis. Sem. 2.
1140. CLUTIA. Flores dioici. Cal. 5phyllus. Cor. 5petala.
♀. Caps. 3locularis. Sem. 1.

* *Rhamnus Paliurus*, ellipticus, *Celastrus*. *Salsola Kali*, al-
tissima, *salsa*. *Celosia trigyna*, *baccata*. *Amaran-*
chi pentandri; *Hydrolea trigyna*. *Quercus*. *Polygonum*
ocreatum.

TETRAGYNIA.

384. PARNASSIA. Cor. 5petala. Nectar. 5ciliato-glandulosa.
Caps. 4valvis.
385. EVOLVULUS. Cor. 1petala. Caps. 4locularis.
1112. SPINACIA. Flor. dioici. Cor. o.
♂. Cal. 4partitus.
♀. Cal. 4fidus. Sem. 1. intra calicem in-
duratum.

* *Ilex Aquifolium*. *Quercus*.

PENTAGYNIA.

* *Flores superi*.

386. ARALIA. Cor. 5petala. Bacca 5sperma.
- GLOSSOPETALUM. Petala 5ligula truncata acuta. Bacca ilo-
cularis, 5sulcata, 5sperma.

** *Flores inferi*.

1109. XANTHOXYLUM. Flores nunc hermaphroditi, nunc dioici.
Cor. o. Cal. 5partitus. Caps. 5. 1spermae.
392. CRASSULA. Cor. 5partita. Caps. 5. polyspermae.
1340. GIESECKIA. Cor. o. Cal. 5phyllus. Caps. 5. rotundae,
5spermae.
- SCHRANCKIA. Cal. 1phyllus. Cor. 5petala. Filam. 1. Caps.
5ftriatae, 5valves.
- WISENIA. Cal. 5fidus. Cor. 5petala. Caps. 5. ilocu-
lares.

389. LINUM. *Cor.* 5petala. *Capsf.* 1olocularis, 2sperma.
 390. ALDROVANDA. *Cor.* 5petala. *Capsf.* 1loocularis, 10sperma.
 BURCARDIA. *Cor.* 5petala. *Capsf.* 1olocularis, 7-8sperma.
 QUAPOYA. *Flores* dioici. *Cor.* 5-6petala. *Cal.* 5-6partitus.
 ♀. *Capsf.* globosa, 5striata, 5valvis, polysperma.
 391. DROSERA. *Cor.* 5petala. *Capsf.* 1olocularis, apice dehiscentes.
 1255. MAHERNIA. *Cor.* 5petala. *Capsf.* 5locularis.
 1380. COMMERSONIA. *Cor.* 5petala. *Nectar.* 5partitum. *Cal.* 1-phyllus, corollifer. *Capsf.* 5locularis.
 393. SIBBALDIA. *Cor.* 5petala. *Cal.* 1ofidus. *Sem.* 5.
 1114. ACNIDA. *Flores* dioici. *Cor.* 0.
 ♂. *Cal.* 5phyllus.
 ♀. *Cal.* 2phyllus. *Sem.* 1. calice succulentotectum.
 388. STATICE. *Cor.* 5partita. *Sem.* 1. calice infundibuliformi vestitum.

* *Cerastium pentandrum*, *semidecandrum*. *Spergula pentandra*. *Crania pentandra*. *Quercus*. *Heliotheifer pentandra*.

HEXAGYNIA.

- ERACLISSA. *Cal.* 5phyllus. *Cor.* 0. *Capsf.* 3locularis, 6valvis, 2sperma.

POLYGYNIA.

394. MYOSURUS. *Cal.* 5phyllus. *Nectar.* 5lingulata. *Sem.* numerosa.
 SCHEFFLERA. *Cor.* 5petala decidua. *Capsf.* 8-10locularis calice 5dentato coronato.

* *Ranunculus hederaceus*.

MONO-

MONOGYNIA.

179. HELIOTROPIUM. Cor. hypocrateriformis, 5fida interjectis plicis fauce clausa squamis fornicatis. Nuces 4 imperforatae.

- peruvia- 1. H. foliis lanceolato-ovatis, caule frutescente, spicis nume-
num. rosis aggregato-corymbosis. *Mill. ic. t. 143.*
- indicum. 2. H. foliis cordato-ovatis acutis scabriusculis, spicis solitariis,
fructibus bifidis. *Pluckn. phyt. 245. f. 4.*
- coroman- 3. H. foliis obovatis villosis integris, spicis simplicibus conjuga-
delianum. tisque, feminibus punctatis. *Koenig ap. Retz. obs. bot. 2. p. 9.*
- malabari- 4. H. foliis ovatis plicatis strigosis integerrimis, spicis subsolitariis.
cum. *Retz. obs. bot. 4. p. 24. Burm. fl. ind. t. 16. f. 1.*
- parviflo- 5. H. foliis ovatis rugosis scabris oppositis alternisque, spicis
rum. conjugatis. *Dill. elth. t. 146. f. 175.*
- europae- 6. H. foliis ovatis integerrimis tomentosis rugosis, spicis conju-
um. gatis. *Jacq. fl. austr. 3. t. 207.*
- supinum. 7. H. foliis ovatis integerrimis tomentosis plicatis, spicis foli-
tariis. *Gouan. fl. monsp. p. 17. ic.*
- ovaliflo- 8. H. foliis oblongo-ovalibus integris petiolatis, caulibus de-
lium. cumbentibus. *Forsk. fl. aeg. ar. p. 38.*
- baccife- 9. H. foliis oblongis hispidis margine reflexis, caule frutescen-
rum. te prostrato. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 38.*
- inunda- 10. H. foliis oblongis obtusis hirsutis, spicis quaternis erectis,
tum. caule frutescente. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 40.*
- scabrum. 11. H. foliis lanceolatis strigosis, caule ramoso diffuso, flori-
bus congestis. *Koenig apud Retz. obs. bot. 2. p. 8.*
- marifoli- 12. H. foliis lanceolatis hispidis, caulibus procumbentibus fruti-
um. culosis, spicis simplicibus alternis. *Koenig apud Retz. obs. bot. 4. p. 8.*
- frutico- 13. H. foliis lineari-lanceolatis pilosis, spicis solitariis sessili-
sum. bus. *Sloan. hist. jam. 1. t. 132. f. 4.*
- curassavi- 14. H. foliis lanceolato-linearibus glabris aveniis, spicis con-
cum. jugatis. *Mant. p. 333. Burm. fl. ind. t. 16. f. 2.*

- orientale. 15. H. foliis linearibus glabris aveniis, floribus sparsis lateralibus.
 gnaphalodes. 16. H. foliis linearibus obtusis tomentosis, pedunculis dichotomis, spicarum floribus quaternis, caule frutescente. *Jacq. stirp. am. pict. t. 264. f. 97. Morif. hist. pl. 3. t. 28. f. 6.*

BATSCHIA. *Cor.* hypocrateriformis: tubo basi lanoso. *Stigma* capitatum. *Nuces?*
 4 imperforatae, subovatae, arcuatae, acuminatae.

carolinensis. I. BATSCHIA. *Walt. flor. Carol. p. 91.*

180. MYOSOTIS. *Cor.* hypocrateriformis, 5fida, emarginata: fauce clausa, squamulis fornicatis. *Nuces* 4 imperforatae.

- palustris. I. M. feminibus laevibus calicibus obovalibus obtusis glabris, corollae tubum aequantibus, foliis lanceolatis. *Knorr del. hort. 1. t. H. 1.*
 arvensis. 2. M. feminibus laevibus calicibus ovalibus acuminatis hirtissimis tubo corollae longioribus, foliis ovato-lanceolatis. *Flor. dan. t. 58.*
 fruticosa. 3. M. feminibus laevibus, caule fruticoso laevi. *Mant. p. 201.*
 apula. 4. M. feminibus nudis, foliis hispida, racemis foliosis. *Pluckn. phyt. 16. f. 5.*
 Tergloviensis. 13. M. foliis integerrimis planis hispida ovatis spatulatisque. *Hacq. pl. alp. Carn. t. 2. f. 6.*
 spatulata. 5. M. feminibus laevibus, foliis spatulatis hispida, pedunculis axillaribus solitariis unifloris. *Forst. fl. austr. p. 12.*
 rupestris. 6. M. feminibus laevibus, foliis oblongo linearibus pilosis ciliatis, racemis terminalibus ante florescentiam revolutis brevissimis. *Pallas it. 3. p. 716. t. E. f. 3.*
 virginiana. 7. M. feminibus aculeis glochidibus, foliis ovato-oblongis, ramis divaricatis. *Morif. hist. 3. t. 30. f. 9.*
 Lappula. 8. M. feminibus aculeis glochidibus, foliis lanceolatis pilosis. *Flor. dan. t. 692. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 68. f. 1.*

9. M.

- squarrosa. 9. M. feminum angulis fetoso uncinatis, foliis lanceolatis pilosis apice callosis. *Retz. obs. bot. 2. p. 9. Pall. it. 3. p. 717? t. Ii. f. I. A.*
 nana. 10. M. feminum marginibus ferratis conjunctis, foliis lanceolatis tomentosis. *Vill. pl. delph. 2. p. 459.*
 pectinata. 11. M. feminibus supra pectine spinarum setacearum coronatis, foliis ovato lanceolatis pilosis, racemis terminalibus. *Pallas it. 3. p. 717. t. E. f. 4.*
 echinophora. 12. M. feminibus oblongis: disci margine exterius spinis setaceis cincto, apice uncinulis radiato, foliis linearibus subtus marginaeque pilosis. *Pallas it. 3. p. 717. t. Ii. f. I. A.*

181. LITHOSPERMUM. Cor. infundibuliformis: tubo longo gracili fauce perforata nuda. Cal. 5partitus. Noces 4 lapideae, imperforatae.

- officinale. 1. L. feminibus laevibus, corollis vix calicem superantibus, foliis lanceolatis. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 67. f. 8. Regn. bot. t. 350.*
 arvense. 2. L. feminibus rugosis, corollis vix calicem superantibus. *Flor. dan. t. 456.*
 virginicum. 3. L. foliis subovalibus nervosis, corollis acuminatis. *Morif. hist. pl. 3. t. 28. f. 3.*
 orientale. 4. L. ramis floriferis lateralibus bracteis cordatis amplexicaulis. *Murray comm. Goett. 1776. t. 2.*
 purpureo-caeruleum. 5. L. feminibus laevibus, corollis calicem multoties superantibus. *Jacq. fl. austr. t. 14.*
 fruticosum. 6. L. fruticosum, foliis linearibus hispidis, staminibus corollam aequantibus. *Barr. ic. 1168.*
 tenuiflorum. 7. L. foliis lineari-lanceolatis strigosis, corollis filiformibus. *Suppl. p. 130.*
 dispersum. 8. L. feminibus duobus, calicibus patentibus. *Linn. dec. 1. t. 7.*

- retortum. 9. L. femine unico, calicibus pilosissimis secundis: fructiferis pendulis. *Pall. it. 3. p. 718. t. 11. f. 2. B.*
- digynum. 10. L. foliis ovatis margine reflexis, seminibus villosis, *Forsk. fl. aeg. arab. p. 40.*
- angustifo- 11. L. seminibus laevibus, corollis calice triplo longioribus, lium. caule diffuso, foliis lanceolatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 39.*
- ciliatum. 12. L. foliis ovato-lanceolatis tomentosissimis aculeato-ciliatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 39.*
- heliotro- 13. L. caule procumbente, foliis petiolatis ovalibus subrepandoides. dis, spicis terminalibus lateralibusque. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 39.*
- hispidum. 14. L. caule procumbente, foliis lanceolatis sessilibus undato-dentatis, spicis terminalibus secundis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 38.*
- incanum. 15. L. seminibus asperis, spicis terminalibus compositis coarctatis, foliis linearibus villosis. *Forsk. fl. austr. p. 12.*

182. ANCHUSA. *Cor.* infundibuliformis: fauce clausa squamulis fornicatis. *Nuces* 4iloculares, basi perforatae.

- officinalis. 1. A. foliis lanceolatis, spicis imbricatis secundis. *Flor. dan. t. 572.*
- panicula- 2. A. foliis lanceolatis strigosis integerrimis, panicula dichotoma divaricata. *Ait. hort. Kew. 1. p. 177.*
- angustifo- 3. A. racemis subnudis conjugatis. *Morif. hist. pl. 3. t. 26. lia. f. 4.*
- italica. 4. A. foliis lanceolatis undulatis: summis acuminatis: squamulis faucis penicilliformibus. *Trew pl. rar. dec. 2. t. 28.*
- undulata. 5. A. strigosa, foliis lanceolatis dentatis, pedicellis bractea minoribus, calicibus fructiferis inflatis. *Bocc. mus. t. 77.*
- tinctoria. 6. A. tomentosa, foliis lanceolatis obtusis, staminibus corolla brevioribus. *Regn. bot. t. 34.*
- Barrelieri. 16. A. foliis ovato-lanceolatis, caule erecto, floribus axillaribus secundis racemosis. *Barrel. ic. 333.*
- virginica. 7. A. floribus sparsis, caule glabro. *Morif. hist. plant. 3. t. 28. f. 4.*

- lanata. 8. A. foliis villosis, calicibus hirsutis, staminibus corolla longioribus.
- sempervirens. 9. A. pedunculis diphyllis capitatis, foliis ovatis acutis: floralibus ferrato-undulatis. *Sabb. h. rom. 2. t. 23. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 67. f. 2.*
- tuberculata. 10. A. nucibus tuberculatis. *Forsk. fl. aeg. ar. p. 41.*
- echinocarpos. 11. A. nucibus muricatis, antheris singulis fornice testis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 41.*
- flava. 12. A. nucibus rugosis, caulibus procumbentibus, pedunculis axillaribus decurrentibus. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 40.*
- hispida. 13. A. nucibus laevibus pedunculis axillaribus brevibus, caule retrorsum hispido, foliis inferioribus petiolatis. *Forsk. fl. aeg. ar. p. 40.*
- saxatilis. 14. A. foliis oblongo-linearibus utrinque pilosis: floralibus lanceolatis floribus secundis sparsis axillaribus subsessilibus. *Pall. it. 3. p. 718. t. F. f. 1.*
- amoena. 15. A. foliis undulatis, nucibus triquetris. *Morif. hist. pl. 3. t. 28. f. 2. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 67. f. 2.*

183. CYNOGLOSSUM. Cor. (plurimis) infundibuliformis: fauce clausa squamis fornicatis. Noces 4 depressae interiore tantum latere stilo affixa, imperforatae.

- officinale. 1. C. staminibus corolla brevioribus, foliis lato-lanceolatis tomentosis sessilibus. *Blackw. herb. t. 249.*
- lanceolatum. 2. C. staminibus corolla brevioribus, foliis lanceolatis basi attenuatis pubescentibus scabris. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 41.*
- silvaticum. 3. C. staminibus corolla brevioribus, foliis lanceolatis asperis planis subsessilibus remotis. *Col. ecphr. p. 174. ic.*
- creticum. 4. C. staminibus corolla striata brevioribus, foliis incanis obtusis obliquis. *Vill. pl. Delph. 2. p. 457. n. 3.*
- Dioscoridis. 5. C. staminibus corolla brevioribus, foliis oblongis aveniis hispida. *Vill. pl. Delph. 2. p. 457. n. 2.*

- virginicum. 6. C. foliis spatulato-lanceolatis lucidis, basi trinerviis, bractea pedunculorum amplexicauli. *Morif. hist. pl. 3. t. 30. f. 9.*
- cheirifolium. 7. C. corollis calice duplo longioribus patentissimis, foliis lanceolatis incano-villosis.
- apenninum. 8. C. staminibus corollam aequantibus. *Sabb. h. rom. 2. t. 36. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 67. f. 4.*
- laevigatum. 9. C. foliis lanceolato-ovatis glabriusculis, calycibus tomentosis, feminibus laevibus. *Pallas it. 1. t. 1. f. 1. 2. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 67. f. 4.*
- lusitanicum. 10. C. foliis lineari-lanceolatis glabris.
- linifolium. 11. C. foliis lineari-lanceolatis scabris. *Morif. hist. pl. 3. t. 30. f. 11. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 67. f. 4.*
- japonicum. 12. C. foliis oblongis villosis, caulibus prostratis. *Thunb. fl. jap. p. 81.*
- omphalodes. 13. C. repens, foliis radicalibus cordatis. *Knorr del. hort. 2. t. C. 7.*
- scorpioides. 14. C. caule prostrato, foliis lanceolatis scabris, pedunculis axillaribus unifloris, feminibus umbilicatis glabris. *Haënn. ap. Jacq. collect. 2. p. 3.*
- picatum. 15. C. corollis calici subaequalibus: laciniis subrotundo-dilatatis, foliis tomentosis lanceolatis: superioribus basi cordatis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 179.*

184. PULMONARIA. Cor. infundibuliformis: fauce pervia. Cal. prismatico 5gonus.

* calice tubum corollae aequante.

- angustifolia. 1. P. foliis radicalibus lanceolatis. *Flor. dan. t. 483.*
- officinalis. 2. P. foliis radicalibus ovato-cordatis scabris. *Flor. dan. t. 482.*
- suffruticosa. 3. P. foliis linearibus scabris, calycibus subulatis quinquepartitis. *Pluckn. phyt. 42. f. 7.*

** calicibus tubo corollae dimidio brevioribus.

- virginica. 4. P. foliis lanceolatis obtusiusculis. *Trew Ehret. II. t. 12. 5. P.*

sibirica. 5. P. foliis radicalibus cordatis. *Gmel. fl. sib. 4. t. 39.*
maritima. 6. P. foliis ovatis, caule ramoso procumbente. *Flor. dan. t. 25.*

ARNEBIA. *Coroll.* patula: fauce pervia. *Antherae*
2 reliquis breviores. *Stigma* 4fidum.
Semina glabra.

tinctoria. I. ARNEBIA. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 62. an distincti generis?*

185. SYMPHYTUM. *Corolla* infundibuliformis, su-
perne ventricosa, fauce
clausa radiis fistulosis
extus sub limbo fora-
mine hiantibus. *Nu-*
culae 4 perforatae.

officinale. I. S. foliis ovato-lanceolatis decurrentibus. *Flor. dan. t. 664.*
Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 67. f. 5.

tubero- 2. S. foliis semidecurrentibus: summis oppositis. *Jacq. fl.*
sum. *austr. 3. t. 225.*

fecun- 3. S. foliis semiamplexicaulibus lanceolatis lanatis, floribus ra-
dum. cemosis. *S. G. Gmelin it. 3. p. 363. t. 36. f. 2.*

regium. 4. S. foliis lanceolatis sessilibus lanatis, floribus comosis. *S.*
G. Gmelin it. 3. p. 363. t. 36. f. 1.

orientale. 5. S. foliis ovatis subpetiolatis. *Buxb. cent. 5. t. 68.*

186. CERINTHE. *Corolla* cylindrico-campanulata,
5dentata: fauce pervia. *Nu-*
ces 2 2loculares, basi clausae.

major. I. C. foliis amplexicaulibus, corollis obtusiusculis patulis.
Sabb. h. rom. 1. t. 12. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t.
67. f. 1.

minor. 2. C. foliis amplexicaulibus, corollis acutis clausis. *Jacq. fl.*
austr. 2. t. 124.

187. ONOSMA. *Cor.* infundibuliformis superne ventricosa: fauce pervia. *Nuces* 4 lapideae, nitidissimae, imperforatae.

- simplicif- 1. O. foliis confertis lanceolato-linearibus pilosis. *Gmelin fl.*
 fimum. *fib. 4. t. 40. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 67. f. 6.*
 orientale. 2. O. foliis lanceolatis hispida, fructibus pendulis.
 echioides. 3. O. foliis lanceolatis hispida, fructibus erectis. *Jacq. fl.*
austr. 3. t. 295.
 micran- 4. O. foliis ovato-lanceolatis subtus pilosis, paniculis rariori-
 thon. bus subdichotomis. *Pall. it. 2. p. 734. t. L.*

188. BORAGO. *Cor.* rotata: fauce radiis clausa, *Nuces* 4 clausae.

- officina- 1. B. foliis omnibus alternis, calicibus patentibus. *Knorr*
 lis. *del. hort. 1. t. B. 1.*
 verrucosa. 2. B. foliis verrucosis: verrucarum fetis rigidis pungentibus.
Forsk. fl. aeg. arab. p. 41. an vere distincta?
 indica. 3. B. foliis ramificationum oppositis amplexicaulibus peduncu-
 lis unifloris. *Pluckn. alm. t. 76. f. 3.*
 africana. 4. B. foliis oppositis petiolatis ovatis, pedunculis multifloris.
Isnard. act. Paris. 1718. t. 11. an cum praecedente di-
stincti generis?
 zeylanica. 5. B. foliis rameis alternis sessilibus, pedunculis unifloris in-
 auritis. *Mant. p. 202. Burm. ind. t. 14. f. 2.*
 orienta- 6. B. calicibus tubo corollae brevioribus, foliis cordatis. *Sabb.*
 lis. *b. rom. 2. t. 22.*
 longifo- 7. B. foliis lineari-lanceolatis sessilibus alternis, calicibus basi
 lia. hirsutissimis. *Poil. voy. en Barb. 2. p. 119.*

189. ASPERUGO. *Cal.* fructus lamellis plano-parallelis, sinuatis.

- procum- 1. A. calicibus fructus compressis. *Flor. dan. t. 552.*
 bens.
 aegyptia- 2. A. calicibus fructus ventricosus. *Mant. p. 334. Jacq. b.*
 ca. *Vind. 3. t. 21.*

190. LYCOPSIS. *Corolla* tubo incurvato: fauce clausa squamis. *Nuces* 4 perforatae.

- vesicaria. 1. L. foliis integerrimis, caule prostrato, calicibus fructescentibus inflatis pendulis. *Morif. hist. 3. t. 26. f. 11. una cum pulla tubo rato et fauce aperta a reliquis speciebus distincta.*
- pulla. 2. L. foliis integerrimis, caule erecto, calicibus fructescentibus inflatis pendulis. *Jacq. fl. austr. 2. t. 188. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 67. f. 9.*
- aegyptia. 3. L. foliis integerrimis scabris, caulibus adscendentibus, calicibus fructescentibus inflatis pendulis. *Jacq. misc. austr. 3.*
- orientalis. 4. L. foliis integerrimis ovatis scabris, calicibus erectis.
- virginica. 5. L. foliis lineari-lanceolatis confertis tomentosis mollibus, caule erecto.
- arvensis. 6. L. foliis lanceolatis hispidis, calicibus florentibus erectis. *Blackw. herb. t. 234.*
- bullata. 7. L. foliis lanceolato-ovatis hispidis bullatis, caule procumbente. *Cyrill. pl. var. fasc. 1. t. XI. f. 3.*
- variegata. 8. L. foliis repandis dentatis callosis, caule decumbente, corollis cernuis. *Morif. hist. pl. 3. t. 26. f. 10.*

191. ECHIUM. *Cor.* irregularis: fauce nuda. *Nuces* 4 giganteoideae, scabrae, imperforatae.

* caule fruticoso.

- fruticosum. 1. E. ramis foliisque pilosis. *Pluckn. mant. t. 341. f. 7.*
- candicans. 2. E. hirsutum albicans, foliis lanceolatis utrinque acuminatis venosis, panicula terminali, pedicellis spicatis. *Suppl. p. 131. Jacq. pl. var. ic. 1. t. 92?*
- giganteum. 3. E. ramis canis glabris, foliis lineari-lanceolatis scabriusculis sessilibus, thyrso terminali: spicis simplicissimis. *Suppl. p. 131.*
- strictum. 4. E. foliis petiolatis ellipticis hispidis scabris, caule reverse hispido, pedunculis axillaribus spicato-capitatis. *Suppl. p. 131.*

5. E.

glauco- 5. E. foliis sessilibus sparsis lanceolatis glaucis glaberrimis spi-
phyllum. nulose-ciliatis, caule glabro, pedunculis solitariis. *Jacq.*
coll. 2. p. 325. pl. rar. ic. cent. 2. t. 51.

** caule herbaceo.

spicatum. 6. E. caulibus adscendentibus simplicissimis, floribus spicatis.
Suppl. p. 132.

argente- 7. E. foliis linearibus albido-hirsutis apice patulis. *Mant.*
um. *p. 202.*

capita- 8. E. caule piloso, foliis hispidis, floribus capitato-corymbo-
tum. sis aequalibus: staminibus corolla longioribus. *Mant. p. 42.*

plantagi- 9. E. foliis radicalibus ovatis lineatis petiolatis. *Mant. p. 202.*
neum. *Barr. rar. pl. ic. 145. f. 1026. β) Jacq. b. Vind. 1. t. 45.*

laeviga- 10. E. caule laevi, foliis lanceolatis nudis margine apiceque
tum. scabris, corollis aequalibus. *β)? Echium pyrenaicum.*
Mant. p. 334.

italicum. 11. E. caule erecto piloso, spicis hirsutis: corollis subaequa-
libus, staminibus longissimis. *β) Echium altissimum?*
Jacq. fl. austr. 5. app. t. 66.

rubrum. 12. E. caule ex racemulis brevibus longe spicato, corollis sub-
aequalibus, foliis hispidis. *Jacq. fl. austr. 5. app. t. 3.*

vulgare. 13. E. caule tuberculato-hispido, foliis caulinis lanceolatis hi-
spidis, floribus spicatis lateralibus. *Flor. dan. t. 445.*

violace- 14. E. caule flaccido hispido corollis stamina aequantibus stria-
um. tis pilosis: tubo calice brevior, filamentis stiloque gla-
bris. *Mant. p. 42.*

creticum. 15. E. caule procumbente hispido, calicibus frutescentibus
distantibus, corollis, filamentis stiloque pilosis. *Kniph.*
bot. orig. cent. 10. n. 39. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5.
t. 67. f. 7.

orientale. 16. E. caule ramofo, foliis caulinis ovatis, floribus solitariis
lateralibus. *Tourn. it. 2. p. 107. f. 107.*

Iusitani- 17. E. staminibus corolla brevioribus.
cum.

russicum. 18. E. caule erecto piloso punctato, foliis lanceolatis pilosis,
spica terminali: corolla inaequali staminibus brevior:
tubo calicem superante. *S. G. Gmelin it. 1. p. 119.*

1245. MESSERSCHMIDIA. Cor. infundibuliformis:
fauce nuda. Bacca
suberosa, 2partibilis:
singulis 2spermis.

fruticosa. 1. M. caule fruticoso, foliis petiolatis, corollis hypocrateri-
formibus. *Suppl. p. 132.*

Arguzia. 2. M. caule herbaceo, foliis sessilibus, corollis infundibulifor-
mibus. *Mant. p. 42. 334. Suppl. p. 132. Act. Petrop.*
1763. t. II.

192. TOURNEFORTIA. Bacca pulpofa, 2-4py-
rena: officulis 2sper-
mis. Semina erecta.

ferrata. 1. T. foliis ovatis ferratis: petiolis spinescentibus, spicis termi-
nalibus recurvis. *Plum. ic. 228. f. 1.*

hirsutissi- 2. T. foliis ovatis petiolatis, caule hirsuto, spicis ramosis
ma. terminalibus. *Plum. ic. 209.*

volubilis. 3. T. foliis ovatis acuminatis glabris: petiolis reflexis, caule
volubili. *Sloan. hist. jam. 1. t. 143. f. 2. Gaertn. de fr.*
et sem. cent. 5. t. 76. f. 2. Drupa succulenta polypyrena.

bicolor. 4. T. foliis ovatis acuminatis glabris, superne rugosiusculis,
spicis cymosis erectis recurvis. *Swartz nov. pl. gen. et*
sp. p. 40.

argentea. 5. T. foliis ovatis obtusis tomentoso-sericeis, spicis terminali-
bus compositis. *Suppl. p. 133. Rumpf amb. 4. t. 55.*

cymosa. 6. T. foliis ovatis integerrimis nudis, spicis cymosis. *Sloan.*
hist. jam. 2. t. 212. f. 2.

maculata. 10. T. foliis ovatis utrinque glabris, spicis ramosis pen-
dulis. *Jacq. stirp. amer.*

foetidissi- 7. T. foliis ovato-lanceolatis hirtis, pedunculis ramosis, spicis
ma. pendulis. *Sloan. hist. jam. 2. t. 212. f. 1.*

humilis. 8. T. foliis lanceolatis sessilibus, spicis simplicibus recurvis la-
teralibus. *Plum. ic. 227. f. 2.*

suffrutico- 9. T. foliis sublanceolatis incanis, caule suffruticoso. *Sloan.*
sa. *hist. jam. 2. t. 162. f. 4.*

glabra. 11. T. caule ramosissimo, bacis niveis. *Aubl. pl. guj.*

193. NOLANA. *Cor.* campanulata. *Stilus* intergermina. *Drupae* congregatae multiloculares.

prostrata. 1. NOLANA. *Mant.* p. 334. *Linn. dec.* 1. t. 2.

194. DIAPENSIA. *Cor.* hypocrateriformis. *Cal.* 5phyllus, imbricatus foliolis 3. *Stamina* tubo corollae imposita. *Caps.* 3locularis.

Japponica. 1. *D.* floribus pedunculatis. *Flor. dan.* 2. 47.

195. ARETIA. *Cor.* hypocrateriformis; 5fida: tubo ovato. *Stigma* depresso-capitatum. *Caps.* ilocularis, globosa, subpentasperma.

helvetica. 1. *A.* foliis imbricatis, floribus subsessilibus. *Mant.* p. 335. *Haller stirp. helv.* n. 617. t. 11.

alpina. 2. *A.* foliis linearibus patentibus, floribus pedunculatis. *Mant.* p. 335. *Jacq. fl. austr.* 5. t. 18.

Vitaliana. 3. *A.* foliis linearibus recurvatis, floribus subsessilibus. *Syst. nat.* XII. 3. p. 151. *Primula Vitaliana.* *Pluckn. alm.* t. 108. f. 6.

196. ANDROSACE. *Involucrum* umbellulae. *Corollae* tubus ovatus: ore glanduloso. *Caps.* ilocularis, globosa, apice 5-fariam dehiscens, polysperma.

maxima. 1. *A.* perianthiis fructuum maximis. *Jacq. fl. austr.* 4. t. 331.

elongata. 2. *A.* foliis lanceolatis dentatis, umbella fructifera elongata, corollis calice angulato brevioribus. *Jacq. fl. austr.* 4. t. 330.

- septen- 3. A. foliis lanceolatis dentatis glabris, perianthiis angulatis
trionalis. corolla brevioribus. *Flor. dan. t. 7. Gaertn. de fr. et
sem. cent. 3. t. 50. f. 8.*
- villosa. 4. A. foliis pilosis, perianthiis hirsutis. *Jacq. fl. austr. 4.
t. 332.*
- lactea. 5. A. foliis lanceolatis glabris, umbella involucris multoties
longiore. *Jacq. fl. austr. 4. t. 333.*
- carnea. 6. A. foliis subulatis glabris, umbella involucra aequante.
Pluckn. alm. t. 108. f. 5.
- filiformis. 7. A. foliis ovatis dentatis petiolatis, umbellae radiis capilla-
ribus, corollis calicem campanulatum excedentibus. *Gmel.
fib. 4. p. 81.*
- brevifo- 8. A. foliis lanceolatis petiolatis hispidis, pedunculis involuero
lia. quadruplo longioribus. *Vill. pl. Delph. 2. p. 480. t. 15.*
- obtusifo- 9. A. foliis glabris lanceolatis, calicibus angulatis pubescenti-
lia. bus corolla minoribus, involucri foliolis brevissimis. *Al-
lion. flor. pedem. 1. p. 90. t. 46. f. 1.*
- odoratissi- 10. A. foliis triquetris ciliatis, perianthiis hirsutis. *Schreb.
ma. dec. 1. t. 4.*
- pauciflo- 11. A. foliis fetaceo-linearibus glabris, pedunculis binis lon-
ra. gitudine scapi, segmentis corollae emarginatis. *Vill. pl.
Delph. 2. p. 477. t. 15.*

197. PRIMULA. *Involucrum* umbellulae. Cor. tu-
bus cylindricus: ore patulo.
*Caps.*ilocularis, teres, denti-
bus 10 dehiscens, polysperma.

- officina- 1. Pr. foliis dentatis rugosis, scapis multifloris, floribus omni-
lis. bus nutantibus, corollarum limbo concavo. *Flor. dan.
t. 433. Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 50. f. 10.*
- elatiior. 2. Pr. foliis dentatis rugosis, scapis multifloris: floribus exte-
rioribus nutantibus, corollarum limbo plano. *Flor. dan.
t. 434.*
- acaulis. 3. Pr. foliis dentatis rugosis, pedunculis radicalibus unifloris.
Flor. dan. t. 194.
- calycan- 4. Pr. foliis rugosis crenatis mollibus, calicibus hypocrateri-
tha. formibus coloratis. *Retz. obs. bot. 2. p. 10.*

5. Pr.

- farinosa. 5. Pr. foliis crenatis glabris, florum limbo plano. *Flor. dan.* t. 125.
- Auricula. 6. Pr. foliis ferratis glabris, corollae tubo breviori. *Jacq. fl. austr. t. 415.*
- longiflora. 7. Pr. foliis ferratis glabris, umbella nutante, corollae tubo longissimo. *Jacq. fl. austr. app. t. 46.*
- villosa. 8. Pr. foliis ferrulatis planis hirsutis. *Jacq. fl. austr. app. t. 27.* β) pubescens. *Jacq. misc. austr. 1. t. 18. f. 2.*
- glutinosa. 9. Pr. foliis serrulatis lanceolatis glutinosis, involuero longitudine florum sessilium. *Suppl. p. 133. Jacq. fl. austr. app. t. 26.* β) *Primula viscosa. Vill. pl. Delph. 2. p. 467?*
- verticillata. 10. Pr. foliis ferratis lanceolato-ovatis petiolatis, subtus farinosis, floribus verticillatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 42.*
- Palinuri. 11. Pr. foliis spatulatis ferratis glabris, scapo laterali, umbella nutante involucri foliolis magnis. *Petagn. inst. bot. 2. p. 332. Column. phytob. 18. t. 17.*
- nivalis. 12. Pr. foliis oblongis dentatis glaberrimis. *Pall. it. 3. p. 723. t. G. f. 2.*
- hirsuta. 13. Pr. foliis cuneato-oblongis subdentatis, tubo corollae longiore. *Vill. pl. Delph. 2. p. 469.*
- minima. 14. Pr. foliis dentatis cuneiformibus nitidis hirsutis, scapis subunifloris. *Jacq. fl. austr. t. 273.*
- cortusifoides. 15. Pr. foliis petiolatis cordatis sublobatis crenatis. *Gmel. fl. sibir. 4. t. 45.*
- lutea. 16. Pr. foliis spatulato-subrotundis integerrimis, tubo corollae calice angustiore. *Vill. pl. Delph. 2. p. 469.*
- integerrima. 17. Pr. foliis integerrimis glabris oblongis, calicibus tubulosis obtusis. *Jacq. fl. austr. t. 327.*
- carniolica. 18. Pr. foliis integerrimis ellipticis, umbella erecta, calicibus acutis brevissimis. *Jacq. fl. austr. 5. app. t. 4.*
- viscosa. 19. Pr. foliis integerrimis sinuatis viscosis odoratis linguiformibus. *Allion. flor. pedem. t. 5. f. 1.*

198. CORTUSA. *Corolla* infundibuliformis: tubo sensim ampliato in limbum 5fidum aequalem: fauce nuda. *Caps.*ilocularis, ovalis 2valvis, polysperma.

Matthioli. 1. *C.* calicibus corolla brevioribus. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 50. f. 7.*

Gmelini. 2. *C.* calicibus corollam excedentibus. *Gmel. fl. sib. 4. t. 43. f. 1. Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 50. f. 7.*

199. SOLDANELLA. *Cor.* campanulata, lacero-multifida. *Caps.*ilocularis, apice multidentata.

alpina. 1. SOLDANELLA. *Jacq. fl. austr. t. 13.*

200. DODECATHEON. *Cor.* rotata, reflexa: fauce nuda. *Stamina* tubo infidentia. *Caps.*ilocularis, oblonga, apice 5fariam dehiscens, polysperma.

Meadia. 1. DODECATHEON. *Trew Ehret. t. 12. Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 50. f. 9.*

201. CYCLAMEN. *Cor.* rotata, reflexo: tubo brevissimo; fauce prominente. *Receptaculum* carnosum baccas portans, thecae inclusum.

europaeum. 1. *C.* corolla retroflexa, foliis orbiculatis crenatis. *Jacq. fl. austr. 5. t. 401.*

cozum. 2. *C.* corolla retroflexa, foliis orbiculatis integerrimis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 195.*

3. *C.*

perficum. 3. C. corolla retroflexa, foliis oblongo-ovatis crenatis. *Ait. hort. Kew. I. p. 196.*

hederae- 4. C. corolla retroflexa, foliis angulatis denticulatis. *Ait. hort. folium. Kew. I. p. 196.*

indicum. 5. C. corolla limbo nutante.

202. MENYANTHES. *Cor. hirsuta. Nectar. 5 ad basin germinis. Stigma 2lobum. Caps.ilocularis.*

nymphoi- 1. M. foliis cordatis integerrimis, corollae laciniis margine al- des. tis inciso-dentatis. *Fl. dan. t. 339.*

indica. 2. M. foliis cordatis suberenatis, petiolis floriferis, corollis interne pilosis. *Rumpf amb. 6. t. 72.*

ovata. 3. M. foliis ovatis petiolatis, caule paniculato. *Suppl. p. 133.*

trifoliata. 4. M. foliis ternatis, corollae laciniis margine integris, super- ne barbatis. *Flor. dan. t. 541.*

DORAENA. *Cor. 5fida. Stigma emarginatum. Caps.ilocularis.*

japonica. 1. DORAENA. *Thunb. fl. jap. p. 84.*

203. HOTTONIA. *Cor. hypocrateriformis. Stami- na tubo corollae imposita. Stigma globosum. Caps.ilocularis.*

palustris. 1. H. pedunculis verticillato-multifloris. *Flor. dan. t. 487. Curt. flor. Lond. t. 21.*

indica. 2. H? pedunculis axillaribus unifloris. *Burm. fl. zeyl. t. 55. f. 1.*

BACOPA. *Cor. tubo brevi sursum ampliato. Stam. tubo corollae inferta. Stigma capi- tatum. Caps.ilocularis.*

aquatica. BACOPA. *Anbl. pl. guj. I, p. 128. t. 49.*

TOCOYENA. *Cor.* hypocrateriformis: tubo longifimo. *Anther.* cuspidatae. *Stigma* 2lobum. *Bacca* 2ocularis, polysperma.

longiflora. I. TOCOYENA. *Aubl. pl. guj. I. p. 151. t. 50.*

204. HYDROPHYLLUM. *Cor.* campanulata: interne striis 5 melliferis longitudinalibus. *Stigma* 2fidum. *Caps.* globosa, 2valvis.

virginicum. I. H. foliis pinnatifidis. *Sabb. h. rom. I. t. 15.*

canadense. 2. H. foliis lobato-angulatis.

PHACELIA. *Caps.* 2ocularis, 2valvis, 4sperma. *Cor.* subcampanulata, basi intus 5sulcata. *Stamina* exserta. *Stigm.* 2.

secunda. I. PHACELIA. *Jussieu gen. plant. p. 129.*

244. ELLISIA. *Cor.* infundibuliformis; angusta. *Bacca* sicca, 2ocularis, 2valvis. *Sem.* 2 punctata; altero supra alterum.

Nyctelea. I. ELLISIA. *Nov. act. Upf. I. t. 5. f. 5.*

RAPANEA. *Cor.* 5-6fida: tubo brevissimo. *Bacca* sphaerica, 1ocularis, 1sperma.

gujancensis. I. RAPANEA. *Aubl. pl. guj. I. p. 121. t. 46.*

PORAQUEIBA. *Cor.* 5partita : laciniis subtus convexis supra concavis ; membrana media transversa. *Anth.* 4gonae, conjunctae. *Stigm.* 3.

gujanensis. I. PORAQUEIBA. *Aubl. pl. guj.* I. p. 123. t. 47.

205. LYSIMACHIA. *Cor.* rotata. *Caps.* globosa, mucronata,ilocularis, 5valvis, polysperma.

* *Pedunculis multifloris.*

- vulgaris. 1. *L. paniculata* : racemis terminalibus. *Flor. dan.* t. 689.
 stricta. 2. *L. racemis terminalibus*, foliis sessilibus corollaeque segmentis lanceolatis. *Ait. hort. Kew.* I. p. 199.
 decurrens. 3. *L. racemis simplicibus terminalibus*, corollae segmentis obtusis, staminibus corolla longioribus. *Forst. fl. austr.* p. 12.
 Ephem. 4. *L. racemis simplicibus terminalibus*, corollae segmentis obtusis, staminibus corolla brevioribus. *Murray comm. Goett.* 1782. t. 2.
 atropurpurea. 5. *L. spicis terminalibus*, corollae segmentis lanceolatis, staminibus corolla longioribus. *Murray comm. Goett.* 1782. t. 1.
 thyrsiflora. 6. *L. racemis lateralibus pedunculatis.* *Flor. dan.* t. 517.

** *pedunculis unifloris.*

- quadrifolia. 7. *L. foliis quaternis petiolo ciliatis*, pedunculis quaternis unifloris. *Pluckn. mant.* t. 333. f. 1. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 3. t. 50. f. 4.
 punctata. 8. *L. foliis subquaternis subsessilibus*, pedunculis verticillatis unifloris. *Jacq. fl. austr.* 4. t. 366.
 ciliata. 9. *L. foliis quaternis binisque* : petiolis canaliculatis ciliatis elongatis ; petalis integris. *Walt. flor. carol.* p. 92.
 lanceolata. 10. *L. foliis lanceolatis subsessilibus*, petalis acuminatis. *Walt. flor. carol.* p. 92.
 Linum stellatum. 11. *L. calicibus corollam superantibus*, caule erecto ramosissimo. *Magn. fl. monsp.* t. 162. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 3. t. 50. f. 4.

- nemorum. 12. L. foliis ovatis acutis, floribus solitariis, caule procumbente. *Flor. dan. t. 174.*
- Nummularia. 13. L. foliis subcordatis, floribus solitariis, caule repente. *Flor. dan. t. 493.*
- japonica. 14. L. foliis subcordatis, floribus axillaribus, pedunculis folio brevioribus. *Thunb. fl. jap. p. 83.*

EUPAREA. Cal. 5phyllus. Petala 5-12 oblonga, angusta patula, calice majora. Bacca supera,ilocularis, exsucca, polysperma.

amoena. I. EUPAREA. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 50. f. 5.*

TAPURA. Cal. 6partitus. Cor. 2labiata. Filam. 5longissimum. Stigma 3lobum.

gujanensis. I. TAPURA. *Aubl. pl. guj. I. p. 126. t. 48.*

206. ANAGALLIS. Cor. rotata. Caps. circumscissa,ilocularis, polysperma.

arvensis. I. A. foliis ovato-lanceolatis, caule procumbente, calicis segmentis lanceolatis. *Flor. dan. t. 88. Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 50. f. 6.*

caerulea. 2. A. foliis ovato-lanceolatis, caule procumbente, calicis segmentis subulatis. *Schreb. spic. fl. lips. p. 5.*

Monelli. 3. A. foliis lanceolatis, caule erecto.

pumila. 4. A. foliis subrotundis acutis sessilibus, caule erecto. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 40.*

latifolia. 5. A. foliis cordatis amplexicaulibus, caule compresso. *Barv. pl. rar. ic. 584.*

linifolia. 6. A. foliis linearibus, caule erecto.

tenella. 7. A. foliis ovatis acutiusculis, caule repente. *Syst. nat. XII. 3. p. 153. Lyfimachia tenella. Curt. flor. Lond. t. 187.*

verticillata. 8. A. foliis caulinis verticillatis, caule erecto, floribus axillaribus. *Allion. fl. pedem. t. 85. f. 4.*

207. THEOPHRASTA. *Cor.* campanulata: laciniis et divisuris obtusis. *Capsf.*ilocularis, globosa, maxima, polysperma.

americana. I. THEOPHRASTA. *Plum. ic.* 126.

ANASSER. *Cor.* urceolata, globa, intus villosa. *Stigma* 2dymum. *Capsf.* oblonga, 2valvis, 2locularis.

Borboniac. I. ANASSER. *Jussieu gen. plant.* p. 150.

1386. RETZIA. *Cor.* cylindrica, extus villosa. *Stigma* 2fidum. *Capsf.* 2locularis.

spicata. I. RETZIA. *Thunb. act. Lund.* I. t. I. f. 2.

209. SPIGELIA. *Cor.* infundibuliformis. *Capsf.* didyma, 2locularis, polysperma.

Anthelmia. I. Sp. caule herbaceo, foliis summis quaternis. *Plenck pl. med. ic.* t. 88.

marilandica. 2. Sp. caule tetragono, foliis omnibus oppositis. *Syst. nat.* XII. 3. p. 166. *Lonicera marilandica.* *Catesb. Car.* 2. t. 78.

210. OPHIORRIZA. *Cor.* infundibuliformis. *Stigm.* 2. *Capsf.* 2loba. *Semina* minima, angulata.

Mungos. I. O. foliis lanceolato-ovatis. *Plenck pl. med. ic.* t. 90. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 4. t. 55. f. 10.

Mitreola. 2. O. foliis ovatis.

lanceolata. 3. O. foliis lanceolatis. *Forsk. fl. aeg. arab.* p. 42.

subumbellata. 4. O. caule fruticoso, foliis lanceolatis acutis, umbellis axillaribus trifidis. *Forst. fl. austr.* p. 12.

1142. OPHIOXYLUM. *Cor.* 5fida, infundibuliformis. *Cal.* 5fidus.
Flores multi mere masculi
 in eadem planta *cal.* 2-
 phyllo. *Nectar.* cylindric. *Stamin.* 2.

serpenti- I. OPHIOXYLUM. *Rumpf amb.* 7. t. 16.
 num.

1366. VIRECTA. *Cal.* 5phyllus: dentibus interjectis. *Cor.* infundibuliformis. *Stigma* 2partitum.
*Caps.*ilocularis.

biflora. I. VIRECTA. *Suppl. p.* 134. *Aubl. pl. guj.* 1. p. 147. t. 56.

VOYRIA. *Cor.* hypocrateriformis 5fida: tubo longo basi et apice ventricoso. *Cal.* turbinnatus, 5dentatus. *Stigma* capitatum, concavum. *Caps.* oblonga,ilocularis, 2valvis, polysperma.

rosea. I. V. corollae laciniis acutis. *Aubl. pl. guj.* 1. p. 209. t. 83.
 f. 1.

caerulea. 2. V. corollae laciniis rotundatis. *Aubl. pl. guj.* 1. p. 211.
 t. 83. f. 2.

1248. LISIANTHUS. *Cor.* tubo ventricoso: laciniis recurvatis. *Cal.* carinatus. *Stigma* 2lamellatum. *Caps.* 2locularis, 2valvis: valvarum marginibus intortis.

longifolius. I. L. foliis lanceolatis caule fruticoso. *Mant. p.* 43. *Brown*
jam. t. 9. f. 1.

caeruleo- 2. L. foliis lanceolatis, caule herbaceo. *Aubl. pl. guj.* 1. p.
 cens. 201. t. 82.

3. L.

- cordifolius. 3. L. foliis cordatis. *Mant. p. 43.*
- clelonoides. 4. L. glaber, foliis oppositis subconnatis oblongis, panicula terminali dichotoma racemosa. *Suppl. p. 134.*
- grandiflorus. 5. L. foliis connatis ovato-oblongis acutis, caule inferne tetragono, superne tereti. *Aubl. pl. guj. I. p. 205. t. 81.*
- alatus. 6. L. foliis ovato-oblongis acutis sessilibus, caule tetragono angulis membranaceis.
- purpurascens. 7. L. foliis ovatis acutis integerrimis. *Aubl. pl. guj. I. p. 201. t. 79.*
- frigidus. 8. L. foliis ovatis acuminatis coriaceis, panicula terminali trichotoma: corollae laciniis subrotundis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 40.*
- glaber. 9. L. glaber, foliis ovatis petiolatis, corymbis terminalibus. *Suppl. p. 134.*
- umbellatus. 10. L. foliis elongatis obovatis, floribus terminalibus pedunculatis umbellatis, corollae laciniis brevissimis obtusis erectis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 40.*
- exsertus. 11. L. foliis ovato-lanceolatis, pedunculis trichotomis, genitalibus longissimis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 40.*
- latifolius. 12. L. foliis lanceolato-ellipticis acuminatis, pedunculis trichotomis, corollae laciniis erectis, genitalibus inclusis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 40.*
- glaucifolius. 13. L. foliis glabris glaucis oblongis acutiusculis integerrimis, pedunculis unifloris. *Jacq. collect. I. p. 64.*

211. RANDIA. *Cal.* iphyllus. *Cor.* hypocrateriformis. *Antrum* interum, 2-loculare baccas includens.

- mitis. 1. R. subinermis. *An cum aculeata ad Gardeniae genus referenda?*
- aculeata. 2. R. ramis bispinosis. *Brown jam. t. 8. f. 1. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 26. f. 6.*

FAGRAEA. *Cal.* campanulatus. *Cor.* infundibuliformis. *Stigma* peltatum. *Bacca* 2locularis, carnosâ. *Sem.* globosâ.

zeylanica. I. FAGRAEA. *Thunb. nov. act. Stockh. 1782. p. 132. t. 4.*

1367. SHEFFIELDIA. *Cor.* campanulata. *Filamenta* 10: alterna sterilia. *Caps.* 1locularis, 5valvis.

repens. I. SHEFFIELDIA. *Suppl. p. 135. Forster char. gen. pl. t. 9.*

212. AZALEA. *Cor.* campanulata. *Stamina* receptaculo inserta. *Caps.* 2-5locularis, polysperma.

pontica. I. A. foliis nitidis lanceolatis utrinque glabris, racemis terminalibus. *Buxb. cent. 5. t. 69.*

indica. 2. A. floribus subsolitariis: calicibus pilosis. *Herm. parad. lugdb. t. 153.*

rosmarinifolia. 7. A. floribus solitariis, foliis lanceolatis quaternis. *Burm. ind. t. 3. f. 3.*

nudiflora. 3. A. foliis ovatis, corollis pilosis, staminibus longissimis. *Trew. Ebrat. 48.*

viscosa. 4. A. foliis margine scabris, corollis piloso-glutinosi. *Catesb. Car. I. t. 57.*

japonica. 5. A. foliis adspersis punctis excavatis.

procumbens. 6. A. ramis diffuso-procumbentibus. *Flor. dan. t. 9. Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. t. 63. f. 1.*

1369. EPACRIS. *Cor.* infundibuliformis, villosa. *Squamae* nectariferæ germini adnatae. *Caps. vel Bacca* 5locularis, 5valvis.

Capsula.

longifolia. I. E. arborea, foliis subulatis vaginantibus, ramis erectis, floribus oppositis. *Suppl. p. 138. Forst. char. gen. t. 10. f. i-m.* 2. E.

- rosmari- 2. *E. fruticosa*, foliis linearibus obtusis rigidis vaginantibus,
nifolia. floribus solitariis lateralibus. *Forst. fl. austr. p. 13.*
pumila. 3. *E. herbacea* foliis ovato-oblongis imbricatis, floribus sessi-
libus subsolitariis terminalibus. *Suppl. p. 138. Forst. char. gen. t. 10. f. a-h.*

Bacca.

- juniperi- 4. *E. arborea*, foliis sparsis linearibus cuspidatis ferrulatis, flo-
na. ribus sessilibus solitariis terminalibus. *Forst. char. gen. t. 10. f. n.*
fascicula- 5. *E. arborea*, foliis confertis linearibus acuminatis, racemis
ta. spicatis lateralibus cernuis. *Suppl. p. 138. Epacris juni- perina.*

WEIGELA. *Cor.* infundibuliformis. *Stigma* pelta-
tum. *Stilus* e basi germinis.

japonica. I. WEIGELA. *Thunb. nov. act. Stockh. 1780. p. 137. t. 5.*

TECTONA. *Cor.* infundibuliformis. *Stigma* denta-
tum. *Drupa* sicca, hirta intra ca-
licem inflatum. *Putamen* 3locula-
re. *Semina* solitaria.

grandis. I. TECTONA. *Suppl. p. 151. Rheed. h. malab. 4. t. 27. Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. t. 57. f. 6.*

213. **PLUMBAGO.** *Cor.* infundibuliformis. *Stami- num* filamenta basi dilatata, fornicata. *Stigma* 5fidum. *Caps.* supera,ilocularis, 1-
sperma.

europaea. I. *Pl.* foliis amplexicaulibus lanceolatis scabris. *Plenck. pl. med. ic. ic. t. 95.*

zeylanica. 2. *Pl.* foliis petiolatis ovatis glabris, caulibus filiformibus. *Con- mel. h. amst. 2. t. 85.*

rosea. 3. *Pl.* foliis petiolatis ovatis glabris subdenticulatis, caule ge-
niculis gibbosis. *Rumpf amb. 5. t. 168. Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 50. f. 11.*

X

4. *Pl.*

scandens. 4. Pl. foliis petiolatis ovatis glabris, caule flexuoso scandente. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 23.*

TRIGUERA. Cor. campanulata: limbo ventricoso. Filamenta brevissima singulis netarii denticulis inserta. Bacca 2-4ocularis: Semina bina.

baccata. I. TRIGUERA.

214. PHLOX. Cor. infundibuliformis. Cal. prismaticus. Filamenta inaequalia. Stigma 3plex. Caps. 3ocularis, Sem. solitaria.

- paniculata. 1. Phl. foliis lanceolatis margine scabris planis, corymbis paniculatis. *Dill. b. Elth. t. 166. f. 203.*
- undulata. 2. Phl. foliis oblongo-lanceolatis subundulatis margine scabris, caule laevi, corymbis paniculatis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 205.*
- suaveolens. 3. Phl. foliis ovato-lanceolatis undique laevibus, caule glaberrimo; racemo paniculato. *Ait. hort. Kew. 1. p. 206.*
- maculata. 4. Phl. foliis lanceolatis laevibus, racemo opposite corymbofo. *Mant. p. 335. Jacq. b. Vindob. 2. t. 127. Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. t. 62. f. 9.*
- pilosa. 5. Phl. foliis lanceolatis villosis, caule erecto, corymbo terminali. *Pluckn. alm. t. 98. f. 1.*
- carolina. 6. Phl. foliis lanceolatis laevibus, caule scabro, corymbis subfastigiatis. *Mant. cent. t. 10.*
- glaberrima. 7. Phl. foliis lineari-lanceolatis glabris, caule erecto, corymbo terminali. *Dill. b. Elth. t. 166. f. 202.*
- divaricata. 8. Phl. foliis lato-lanceolatis: superioribus alternis, caule bifido, pedunculis geminis. *Mill. ic. f. 1.*
- ovata. 9. Phl. foliis ovatis, floribus solitariis. *Pluckn. mant. t. 348. f. 4.*
- subulata. 10. Phl. foliis subulatis hirsutis, floribus oppositis. *Pluckn. alm. t. 89. f. 2.*
- sibirica. 11. Phl. foliis linearibus villosis, pedunculis ternis. *Gmel. fl. sib. 4. t. 46. f. 2.*

12. Phl.

setacea. 12. Phl. foliis setaceis glabris, floribus solitariis. *Pluckn. alm.*
t. 98. f. 3.

1339. PORANA. *Cor.* campanulata: *Cal.* 5fidus, in
fructu major. *Stilus* semibifi-
dus, longior, persistens. *Stig-*
mata globosa. *Pericarp.* 2-
valve.

volubilis. I. PORANA. *Mant.* p. 560. *Burm. ind. t.* 21. f. 1.

ENDRACHIUM. *Cor.* urceolata: limbo subintegro
5plicato. *Cal.* coriaceus. *Sta-*
mina exserta. *Capsf.* baccae-
formis ovata, basi umbilica-
ta, 2locularis: loculis 2spermis.

madagaf- I. ENDRACHIUM. *Jussieu gen. plant.* 1. p. 133. an forsan hu-
cariense. *jus generis. Wanzey Bruce trav. in Eg. Ar. Ab. and Nub.*
5. app. p. 54. ic.

215. CONVOLVULUS. *Cor.* campanulata plicata.
Nectarium Corona
germen basi ambiens.
Stigmata 2. *Capsf.* 2-
3locularis: loculis 2-
spermis.

* caule volubili.

Herman- I. C. foliis subhastatis posterius obtusis corollis apice pilosis, pe-
niae. dunculis bifloris. *Herit. stirp. nov.* 4. p. 67. t. 33.

arvensis. 2. C. foliis sagittatis utrinque acutis, pedunculis subunifloris,
Flor. dan. t. 459.

sepium. 3. C. foliis sagittatis posterius truncatis, pedunculis tetragonis
unifloris. *Curt. flor. Lond.* t. 32. *Capsula* 1locularis.

Jatiauca. 78. C. foliis sagittatis posterius truncatis alternis petiolatis. *Pis.*
ind. ic.

- Scammo- 4. C. foliis sagittatis posterius truncatis, pedunculis teretibus
nea. subtrifloris. *Regn. bot. t. 44.*
- tugurio- 5. C. foliis cordato-sagittatis acutis, caule anguloso, pedun-
rum. culis tetragonis unifloris. *Forster fl. austr. p. 14. n. 74.*
- caelestis. 6. C. foliis cordatis acuminatissimis pubescentibus, pedunculis
elongatis umbellato-trifidis. *Forst. fl. austr. p. 14. n. 77.*
- fibiricus. 7. C. foliis cordatis acuminatis laevibus, pedunculis unifloris.
Mant. p. 203. Pall. it. 3. p. 723. t. K.
- farinosus. 8. C. foliis cordatis acuminatis repandis, pedunculis trifloris,
caule farinoso. *Mant. p. 203. Jacq. b. Vind. 1. t. 35.*
- pandura- 9. C. foliis cordatis integris panduriformibus, calicibus laevi-
tus. bus. *Dill. b. Elth. t. 85. f. 99.*
- carolinus. 10. C. foliis cordatis integris trilobisque villosis, calicibus lae-
vibus, capsulis hirsutis, pedunculis subbifloris. *Dill. b. Elth. t. 84. f. 98.*
- hedera- 11. C. foliis cordatis integris trilobisque, corollis indivisis, fru-
ceus. ctibus erectis. *Knorr del. hort. 1. t. W. 5.*
- Nil. 12. C. foliis cordatis trilobis, corollis femiquinquefidis, pe-
dunculis petiolo brevioribus. *Dill. b. Elth. t. 80. f. 91. 92.*
- purpure- 13. C. foliis cordatis indivisis, fructibus cernuis, pedicellis in-
us. crassatis. *Knorr del. hort. 1. t. W. 2. et W. 4.*
- angularis. 14. C. foliis cordatis quinquangularibus integerrimis villosis,
pedunculis multifloris. *Mant. p. 203. Burm. ind. t. 19. f. 2.*
- obscurus. 15. C. foliis cordatis indivisis, caule subpubescente, peduncu-
lis incrassatis unifloris, calicibus glabris. *Dill. b. Elth. t. 83. f. 95.*
- biflorus. 16. C. foliis cordatis pubescentibus, pedunculis geminis, co-
rollis lobis trifidis.
- gemellus. 79. C. foliis cordatis indivisis glabris, pedunculis bifloris.
Burm. ind. t. 21. f. 1.
- nervosus. 80. C. foliis cordatis indivisis nervosis subtus tomentosis, pe-
dunculis umbellatis multifloris. *Burm. ind. t. 20. f. 1.*
- verticilla- 17. C. foliis cordatis oblongis nudis, pedunculis umbellatis
tus. bifidis multifloris. *Plum. ic. 94. f. 2.*
- umbella- 18. C. foliis cordatis, pedunculis umbellatis. *Pluckn. alm. t. 167. f. 1.*
- tus.

- malabari- 19. C. foliis cordatis glabris, caule perenni villoso. *Rheedeb. malab. II. t. 51.*
- canariensis. 20. C. foliis cordatis pubescentibus, caule perenni villoso, pedunculis multifloris. *Commel. h. amst. 2. t. 51.*
- muricatus. 21. C. foliis cordatis, pedunculis inersatis calicibusque laevibus, caule muricato. *Mant. p. 44.*
- anceps. 22. C. foliis cordatis, caule utrinque carinato. *Mant. p. 43.*
- Turpethum 23. C. foliis cordatis angulatis, caule membranaceo quadrangulari, pedunculis multifloris. *Blackw. herb. t. 397.*
- grandiflorus. 24. C. foliis cordatis ovatis obtusiusculis integerrimis, pedunculis subbifloris, calicibus coriaceis, caule petiolisque pubescentibus. *Suppl. p. 136. Jacq. b. Vind. 3. t. 69.*
- maximus. 25. C. foliis cordatis ovatis acuminatis integerrimis glaberrimis, caule petiolisque glaberrimis. *Suppl. p. 137. Rheed. b. malab. II. t. 53.*
- speciosus. 26. C. foliis cordatis ovatis acutis supra hirtis subtus argenteo sericeis, petiolis teretibus. *Suppl. p. 137.*
- althaeoides. 27. C. foliis cordatis sinuatis sericeis: lobis repandis, pedunculis bifloris. *Barr. rar. pl. ic. t. 312.*
- trinerviis. 28. C. foliis cordatis oblongis glabris trinerviis, caule terete, pedunculis unifloris. *Thunb. fl. jap. p. 85.*
- crenatus. 29. C. foliis oblongo-cordatis obtusis, caule calicibusque hispidis, corollis crenatis. *Jacq. coll. I. p. 277. pl. rar. ic. cent. 2. fasc. I. t. 1.*
- Batatus. 30. C. foliis cordatis hastatis quinquenerviis, caule tuberifero hispido. *Catesb. Car. 1. t. 60.*
- hastatus. 31. C. foliis hastatis basi infra unidentatis, pedunculis geminis bifidis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 203.*
- japonicus. 32. C. foliis hastatis lanceolatis: lateralibus unidentatis, pedunculis unifloris. *Thunb. fl. jap. p. 85.*
- minimus. 81. C. foliis lanceolatis villosis. *Aubl. pl. guj.*
- havenensis. 82. C. foliis oblongis nitidis, pedunculis unifloris. *Jacq. stirp. amer. ed. 2. t. 264. f. 97.*
- uniflorus. 83. C. foliis lineari-lanceolatis, pedunculis unifloris: bracteis binis ovatis. *Burm. ind. t. 21. f. 2.*
- Medium. 33. C. foliis linearibus hastato-acuminatis: auriculis dentatis, pedunculis unifloris, calicibus sagittatis. *Rheed. b. mal. II. t. 55.*

- martini- 34. C. foliis ellipticis, caule repente subvolubili. *Jacq. stirp.*
 cenfis. *amer. pict. t. 24.*
- gujanen- 35. C. foliis ovatis tomentosis integerrimis, floribus capitatis
 fis. axillaribus pedunculatis, caulibus tomentosis. *Aubl. pl.*
guj. I. p. 136. t. 52.
- sericeus. 36. C. foliis lanceolato-ellipticis subtus tomentoso-sericeis,
 pedunculis subumbellatis, calicibus pilosis. *Mant. p. 43.*
Burm. ind. t. 17. f. 1.
- peltatus. 37. C. foliis peltatis, pedunculis multifloris. *Rumpf. amb. 5.*
t. 157.
- Jalapa. 38. C. foliis difformibus, cordatis angulatis oblongis lanceo-
 latisque, pedunculis unifloris. *Mant. p. 43.*
- tomento- 39. C. foliis trilobis tomentosis, caule lanuginoso. *Sloan. hist.*
 fus. *jam. I. t. 98. f. 2.*
- glaber. 40. C. foliis digitatis quinque lanceolatis glabris integerrimis.
Aubl. pl. guj. I. p. 138. t. 53.
- quinque- 41. C. foliis digitatis glabris dentatis, pedunculis laevibus.
 folius. *Pluckn. alm. t. 167. f. 6.*
- macrorhi- 42. C. foliis digitatis septenis integerrimis, caule glabro, pe-
 zos. dunculis trifloris. *Plum. ic. 90. f. 1.*
- copticus. 43. C. foliis pedatis ferratis, pedunculis ensiformibus bifloris,
 calicibus muricatis. *Mant. p. 559. Baub. prodr. th. bot.*
p. 134. ic.
- macrocar- 44. C. foliis palmato-pedatis quinquepartitis, pedunculis uni-
 pus. floris. *Plum. ic. 91. f. 1.*
- mucrona- 45. C. foliis palmato-pedatis: lobis ciliatis apice mucronatis,
 tus. pedunculis unifloris. *Forster. fl. austr. p. 14. n. 79.*
- panicula- 46. C. foliis palmatis: lobis septem ovatis integerrimis, pe-
 tus. dunculis paniculatis. *Rheed. h. malab. II. t. 49. β) Rheed.*
h. malab. 8. t. 20.
- difsectus. 47. C. foliis palmatis septempartitis dentato-finuatis glabris,
 caule piloso, pedunculis unifloris. *Jacq. h. Vind. 2. t. 159.*
- vitifolius. 48. C. foliis palmatis quinquelobis glabris dentatis, caule pi-
 loso, pedunculis multifloris. *Mant. p. 203. Burm. ind.*
t. 18. f. 1.
- Cairicus. 49. C. foliis pinnato-palmatis ferratis, pedunculis filiformi-
 bus paniculatis, calicibus laevibus.

** caule non volubili.

† fruticoso.

- spinosus. 50. C. caule erecto, foliis lanceolatis sericeis, ramulis floriferis spinosis. *Suppl. p. 137. Pall. it. 2. t. M.*
- oenothe- 51. C. caule erecto, foliis linearibus canescentibus, pedunculis axillaribus erectis solitariis bracteatis, calicibus lanceolatis glabris. *Suppl. p. 137.*
- scoparius. 52. C. caule erecto glabro, ramis virgatis, foliis sessilibus linearibus, racemo terminali, pedunculis subtrifloris. *Suppl. p. 135.*
- floridus. 53. C. caule prostrato cano, foliis lineari-lanceolatis glabris, thyrso terminali pyramidali composito. *Suppl. p. 136.*
- Doryo- 54. C. caule fruticoso paniculato, foliis sublinearibus sericeis, calicibus nudiusculis obtusis.

†† caule herbaceo.

- Soldanel- 55. C. foliis reniformibus, pedunculis unifloris. *Regn. bot. t. 402.*
- perficus. 56. C. foliis ovalibus tomentosis, pedunculis unifloris. *S. G. Gmel. it. 3. t. 7.*
- ficulus. 57. C. foliis cordato-ovatis, pedunculis unifloris: bracteis lanceolatis, floribus sessilibus. *Morif. hist. pl. 2. t. 7. f. 5.*
- corymbo- 58. C. foliis cordatis, pedunculis umbellatis, caule repente. *Plum. ic. 89. f. 2.*
- spitha- 59. C. foliis cordatis pubescentibus, caule recto, pedunculis unifloris.
- maeus.
- edulis. 60. C. foliis cordatis integris trilobisque glabris, caule repente angulato. *Thunb. fl. jap. p. 84.*
- hirtus. 61. C. foliis cordatis subhastatisque villosis, caule petiolisque pilosis, pedunculis multifloris.
- disanthus. 62. C. foliis posterius truncato-rotundatis, pedunculis subbifloris. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 203. an distincta species?*
- formosus. 75. C. foliis sagittatis, caule prostrato floribus involucre destitutis. *Walt. flor. carol. p. 93. an distincta species?*
- repens. 63. C. foliis sagittatis posterius obtusis, caule repente, pedunculis unifloris. *Rheede h. malab. II. t. 52.*
- reptans. 64. C. foliis hastato-lanceolatis: auriculis rotundatis, caule repente, pedunculis unifloris. *Rumpf amb. 5. t. 155. f. 1.*

- pentata- 65. C. foliis lanceolatis obtusis nudis lineatis, ramis declina-
loides. tis, floribus solitariis semiquinquedidis.
- lineatus. 66. C. foliis lanceolatis sericeis lineatis petiolatis, pedunculis
bifloris, calicibus sericeis tubfoliaceis. *Barr. rar. pl. ic.*
t. 1132.
- Cneorum. 67. C. foliis lanceolatis tomentosis floribus umbellatis, calici-
bus hirsutis, caule erecto. *Barr. pl. rar. ic. t. 460.*
- tricolor. 68. C. foliis lanceolato-ovatis glabris, caule declinato, flori-
bus solitariis. *Morif. hist. pl. 2. t. 4. f. 4.*
- Cantabri- 69. C. foliis lineari-lanceolatis, caule ramoso erectiusculo,
ca. pedunculis subbifloris, calicibus pilosis. *Jacq. fl. austr.*
3. t. 296.
- prostratus. 70. C. caule prostrato, foliis sessilibus lineari-cuneatis pilosis,
pedunculis axillaribus unifloris bibracteatis. *Forsk. fl.*
aeg. arab. p. 203.
- Pes 71. C. foliis bilobis, pedunculis unifloris. *Herm. parad. lugdb.*
caprae. *t. 525.*
- brasilien- 72. C. foliis emarginatis basi biglandulosis, pedunculis triflo-
fis. *Plum. amer. t. 104.*
- humifra- 76. C. caule tereti prostrato piloso, foliis oblongo-ovatis utrin-
tus. que emarginatis, pedunculis axillaribus trifidis, stilo bi-
fido. *Walt. flor. carol. p. 94.*
- aquaticus. 77. C. caule prostrato tereti, foliis oblongis pubescentibus al-
ternis, pedunculis axillaribus unifloris, stilo bipartito.
Walt. flor. carol. p. 94.
- subloba- 73. C. foliis superioribus apice dentato-repandis, caule pro-
tus. cumbente, floribus capitatis. *Suppl. p. 135.*
- littoralis. 74. C. foliis oblongis lobato-palmatis, pedunculis unifloris,
caule repente. *Plum. ic. 90. f. 2.*

MURUCOA. Cor. infundibuliformis. Stigma 2lamel-
latum. Caps. 2-3locularis: loculis
ispermis.

violacea. I. MURUCOA. *Abbl. pl. guj. 1. p. 141. t. 54.*

216. IPOMOEAE. Cor. infundibuliformis. Stigma capitato-globosum. Capsula 3locularis.

* foliis simplicibus.

† floribus distinctis.

- Quamo-clit. 1. I. foliis pinnatifidis linearibus, floribus subsolitariis. *Mill. ic. t. 214.*
- rubra. 2. I. foliis pinnatifidis linearibus, floribus racemosis pendulis. *Syst. nat. XII. 3. p. 159. Polemonium rubrum. Dill. h. Elth. t. 241. f. 312. an Cantuae species?*
- umbellata. 3. I. foliis digitatis septenis, pedunculis umbellatis brevissimis. *Plum. ic. 92. f. 2.*
- carolina. 4. I. foliis digitatis: foliolis petiolatis, pedunculis unifloris. *Catesb. car. 2. t. 19.*
- tuberosa. 5. I. foliis palmatis: lobis septenis lanceolatis acutis integerrimis, pedunculis trifloris. *Sloan. hist. jam. 1. t. 96. f. 2.*
- digitata. 6. I. foliis palmatis: lobis septenis lanceolatis obtusis, pedunculis trifloris. *Plum. ic. 92. f. 1.*
- palmata. 7. I. foliis palmatis: lobis quinque lanceolatis; extimis bifidis, pedunculis dichotomis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 43.*
- scabra. 8. I. foliis quinquelobis calicibusque scabris, floribus axillaribus solitariis, caule volubili. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 44.*
- triloba. 9. I. foliis trilobis cordatis, pedunculis trifloris. *Sloan. hist. jam. 1. t. 97. f. 1.*
- hederifolia. 10. I. foliis trilobis cordatis, pedunculis multifloris racemosis. *Plum. spec. t. 93. f. 2.*
- biloba. 11. I. foliis subrotundo-bilobis integris, pedunculis subunifloris, caule volubili. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 44.*
- stolonifera. 34. I. caulibus stoloniformibus, foliis inferioribus bilobis: superioribus hastatis. *Cyrill. pl. rar. Neap. fasc. 1. t. 5.*
- aquatica. 12. I. foliis cordatis acuminatis basi subdentatis, pedunculis bifloris, caule repente. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 44.*
- triflora. 13. I. foliis cordatis acuminatis glabris, pedunculis axillaribus solitariis trifloris. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 44.*
- leucantha. 14. I. foliis cordatis acuminatis integerrimis, pedunculis axillaribus solitariis unifloris. *Jacq. coll. 2. p. 280. pl. rar. cent. 2. fasc. 1. t. 2.*

- coccineus. 15. I. foliis cordatis acuminatis basi angulatis, pedunculis multifloris. *Plum. amer. t. 103.*
- lacunosa. 16. I. foliis cordatis acuminatis serobiculatis basi angulatis, pedunculis subunifloris flore brevioribus. *Dill. b. Elth. t. 87. f. 102.*
- folianifolia. 17. I. foliis cordatis acutis integerrimis, floribus solitariis. *Plum. ic. 94. f. 1.*
- Bona nox. 18. I. foliis cordatis acutis integerrimis, caule aculeato, floribus ternis, corollis indivisis. *Sloan. hist. jam. 1. t. 96. f. 1.*
- campanulata. 19. I. foliis cordatis, pedunculis multifloris, perianthio exteriori orbiculari, corollis campanulatis lobatis. *Rheed. h. malab. 11. t. 56.*
- violacea. 20. I. foliis cordatis integerrimis, floribus confertis, corollis indivisis. *Sloane hist. jam. 1. t. 98. f. 1.*
- carnea. 21. I. foliis cordatis glabris, pedunculis multifloris, corollis marginatis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 25.*
- repanda. 22. I. foliis cordatis oblongis repandis, pedunculis ramosis cymosis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 27.*
- filiformis. 23. I. foliis cordatis obtusis cum acumine integerrimis, pedunculis racemosis filiformibus. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 26.*
- hederaea. 24. I. foliis cordatis longe petiolatis utrinque pilosis semitrilobis, lobo medio ovato acuto, pedunculis axillaribus unifloris solitariis. *Jacq. Collect. 1. p. 124.*
- luteola. 25. I. foliis cordatis petiolatis glabris, pedunculis axillaribus subquadrifloris. *Jacq. coll. 2. p. 266.*
- glaucifolia. 26. I. foliis sagittatis posterioribus truncatis, pedunculis bifloris. *Dill. b. Elth. t. 87. f. 101.*
- hastata. 27. I. foliis sagittato-hastatis, pedunculis bifloris. *Mant. p. 204. Burm. ind. t. 18. f. 2.*
- paniculata. 34. I. foliis ovatis acuminatis, pedunculis paniculatis. *Burm. ind. t. 21. f. 3.*
- verticillata. 28. I. villosa, floribus ternis axillaribus, capsula quadriloculari. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 44. An hujus generis?*
- angustifolia. 29. I. caule erectiusculo, foliis linearibus subintegerrimis. *Jacq. coll. 2. p. 367. pl. rar. ic. cent. 2. t. 52.*
- TT floribus aggregatis.
- hepaticifolia. 30. I. foliis trilobis. *Burm. ind. t. 20. f. 2.*
 β) Ipomoea Eustachiana. *Jacq. obs. bot. 2. t. 36.*

tamnifo- 31. I. foliis cordatis acuminatis pilosis. *Dill. b. Elth. t. 318.*
lia. f. 414.

Pes tigri- 32. I. foliis palmatis. *Dill. b. Elth. t. 318. f. 411.*
dis.

** foliis quinatis.

penta- 33. I. foliis quinatis lanceolatis, pedunculis subquadrifloris.
phylla. *Jacq. pl. rar. ic. cent. 2. t. 29. Syst. pl. XII. 3. p. 157.*
Convolvulus pentaphyllos.

CANTUA. Cor. 5loba, infundibuliformis. Cal. ar-
ceolatus. Filam. aequalia. Caps.
3locularis. Semina apice alata.

peruviana. I. CANTUA. *Jussieu gen. plant. p. 136.*

HOITZIA. Cor. 5loba, infundibuliformis. Cal. tubu-
losus, bracteis conniventibus obsef-
sus. Filam. aequalia. Germen 3go-
num. Stigma 3plex.

mexicana. I. HOITZIA. *Jussieu gen. plant. p. 136.*

217. POLEMONIUM. Cor. 5partita rotata. Fila-
menta basi dilatata,
membranacea. Stig-
ma 3plex. Caps. 3locu-
laris, ivalvis supera.
Sem. angulata.

caerule- 1. P. foliis pinnatis, floribus erectis, calicibus tubo corollae
um. longioribus. *Flor. dan. t. 255. Gaertn. de fr. et sem.*
cent. 4. t. 62. f. 10.

reptans. 2. P. foliis pinnatis septenis, floribus terminalibus nutantibus.

dubium. 3. P. foliis inferioribus hastatis, superioribus lanceolatis.

roelloi- 4. P. caule filiformi erecto, foliis lanceolatis ciliatis, panicula
des. pauciflora pedunculata nuda. *Suppl. p. 139.*

campanu- 5. P. erectum glabrum, foliis lineari-lanceolatis integris cre-
loides. ctis, floribus terminalibus solitariis. *Suppl. p. 139.*

218. CAMPANULA. Cor. campanulata. Filamentata basi dilatata fornicata. Stigma 3plex. Caps. infera, poris lateralibus dehiscens, 3ocularis.

* capsula pyramidalis.

† foliis laevioribus ut plurimum angustioribus.

- genifolia. 1. C. caulibus unifloris, foliis ovatis glabris integerrimis subciliatis. *Allion. pedem. t. 5. f. 1.*
- vesicula. 81. C. caule unifloro subnudo, foliis ovalibus dentatis calicibusque glabris. *Allion. flor. pedem. t. 7. f. 1.*
- Bellardi. 82. C. caule nudo unifloro, foliis petiolatis elliptico-lanceolatis dentatis. *Allion. flor. pedem. t. 85. f. 5.*
- uniflora. 2. C. caule unifloro, calice corollam aequante. *Flor. lapp. t. 9. f. 5. 6.*
- pulla. 3. C. cauliculis unifloris, foliis caulinis ovatis crenatis, calicibus cernuis. *Jacq. fl. austr. 3. t. 285.*
- rotundifolia. 4. C. foliis radicalibus reniformibus, caulinis linearibus integerrimis. *Curt. flor. Lond. t. 226.*
- pufilla. 5. C. foliis omnibus ferratis: radicalibus cordato-ovatis firmis nitidis; caulinis linearibus alternis remotis. *Scheuchz. it. 4. p. 454. f. 4.*
- cespitosa. 6. C. caule angulato, foliis imis ovatis ferratis glabris, gemminibus decagonis. *Flor. dan. t. 189.*
- Bocconi. 7. C. radice crassa multicauli, foliis radicalibus ferratis acutis, caulinis linearibus. *Gmel. fl. sibir. 3. t. 33.*
- Scheuchzeri. 8. C. foliis lanceolato-linearibus subfalcatis, flore pendulo. *Villars pl. delph. 2. t. 10.*
- patula. 9. C. foliis strictis: radicalibus lanceolato-ovalibus, panicula patula. *Flor. dan. t. 373.*
- Rapunculus. 10. C. foliis undulatis: radicalibus lanceolato-ovalibus, panicula coarctata. *Fl. dan. t. 855. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 31. f. 2.*
- perficifolia. 11. C. foliis radicalibus obovatis, caulinis lanceolato-linearibus subserratis sessilibus remotis. *Bulliard. herb. Franc. t. 367.*

- pyrami- 12. C. foliis laevibus ferratis cordatis: caulinis lanceolatis,
dalis. caulibus junceis simplicibus, umbellis sessilibus laterali-
bus. *Kniph. bot. orig. cent. 6. n. 20.*
- america- 13. C. foliis cordatis lanceolatisque: petiolis ciliatis, floribus
na. secundis, corollis quinquepartitis, planis. *Mant. p. 337.*
Dodart. mem. t. III.
- lilifolia. 14. C. foliis lanceolatis: caulinis acute ferratis, floribus pani-
culatis nutantibus. *Gmel. fl. sib. 3. t. 26.*
- rhomboi- 15. C. foliis rhomboidibus ferratis, spica secunda, calicibus
dea. dentatis. *Bocc. mus. t. 61.*
- unidenta- 16. C. erecta glabra, foliis lanceolatis acutis utrinque uniden-
ta. tatis, panicula divaricata foliosa. *Suppl. p. 139.*
- capilla- 17. C. herbacea erecta, foliis filiformibus glabris, panicula
cea. terminali: floribus alternis. *Suppl. p. 139.*
- linearis. 18. C. herbacea erecta, foliis linearibus integris glabris, flo-
ribus cernuis, capsulis hispidis. *Suppl. p. 140.*
- lobelioi- 19. C. glaberrima ramosissima, foliis lanceolatis ferratis sessili-
des. bus, paniculis terminalibus secundis, corolla infundibu-
liformi. *Suppl. p. 140.*
- carpatica. 20. C. foliis glabris cordatis ferratis petiolatis, pedunculis elon-
gatis, calice reflexo glutinoso, corolla patula. *Suppl. p.*
140. Jacq. b. Vind. 1. t. 57.
- grandiflo- 21. C. foliis ternis oblongis ferratis, caule unifloro, flore pa-
ra. tulo. *Suppl. p. 140. Jacq. b. Vind. 3. t. 2.*
- aurea. 22. C. capsulis quinquelocularibus, stigmatibus quinquefidis,
caule paniculato, foliis duplicato-ferratis. *Suppl. p. 141.*
- tenella. 23. C. caulibus diffusis filiformibus, foliis ovatis subunidenta-
tis reflexis, floribus solitariis terminalibus. *Suppl. p. 141.*
an eadem cum lobelia tenella?
- porosa. 24. C. foliis lanceolatis laevibus, caule erecto sursum punctis
poroso. *Suppl. p. 142.*
- undulata. 25. C. foliis lanceolatis dentatis undulatis, floribus subsolita-
riis pedunculatis. *Suppl. p. 142.*
- Zoyfii. 26. C. caulibus subtrifloris, foliis radicalibus ovatis longe pe-
tiolatis; caulinis oblongo-obovatis sessilibus. *Wulf. ap.*
Jacq. coll. 2. p. 122. pl. rar. ic. cent. 2. t. 55.

— — — foliis scabris ut plurimum latioribus.

- latifolia. 27. C. foliis ovato-lanceolatis, caule simplicissimo tereti, floribus solitariis pedunculatis, floribus cernuis. *Flor. dan. t. 782.*
- rapunculoidea. 28. C. foliis cordato-lanceolatis, caule ramoso, floribus secundis sparsis, calicibus reflexis. *Morif. hist. pl. 2. t. 3. f. 32.*
- bononiensis. 29. C. foliis ovato-lanceolatis subtus scabris sessilibus, caule paniculato. *Mant. p. 337. Morif. hist. pl. 2. t. 4. f. 38.*
- graminifolia. 30. C. foliis lineari-subulatis, capitulo terminali. *Barr. pl. rar. ic. 332.*
- cinerea. 31. C. erecta tomentosa, foliis subulatis integris erectis approximatis, floribus solitariis terminalibus. *Suppl. p. 139.*
- hispidula. 32. C. hispida, floribus erectis, calicibus longitudine corollae. *Suppl. p. 142. Commel. b. Amstel. 2. t. 37.*
- Trachelium. 33. C. caule angulato, foliis petiolatis, calicibus ciliatis, pedunculis trifidis. *Bulliard herb. Franc. t. 319.*
- glomerata. 34. C. caule angulato simplici, floribus sessilibus, capitulo terminali. *Herm. parad. bot. t. 235.*
- urticaefolia. 34. C. caule erectiusculo, foliis superioribus sessilibus, spica secunda: pedunculis unifloris, calicibus glabris. *Tumegiern. di Venez. t. 1.*
- Cervicaria. 35. C. hispida, floribus sessilibus, capitulo terminali, foliis lanceolato-linearibus undulatis. *Flor. dan. t. 787.*
- thyrsoides. 36. C. hispida, racemo ovato-oblongo terminali, caule simplicissimo, foliis lanceolato-linearibus. *Jacq. fl. austr. 5. t. 411.*
- petraea. 37. C. caule angulato simplici, floribus sessilibus capitato-glomeratis, foliis subtus tomentosis. *Pluckn. phyt. 152. f. 1.*

— — — capsulis obtectis calicis sinibus reflexis.

- edulis. 38. C. caule hispido ramoso, foliis ovato-acutis serratis sessilibus. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 44.*
- dichotoma. 39. C. capsulis quinquelocularibus, caule dichotomo, floribus cernuis. *Morif. hist. pl. 2. t. 3. f. 26. an mera mollis varietas?*
- Medium. 40. C. capsulis quinquelocularibus, caule indiviso erecto folioso, floribus erectis. *Knorr del. hort. 1. t. S. 2. Stigma 5fidum.*

- barbata. 41. C. capsulis quinquelocularibus, caule simplicissimo subuni-
folio, foliis lanceolatis, corollis barbatis. *Allion. pedem.*
t. 6. f. 2.
- alpestris. 42. C. foliis obovatis ciliato-scabris radicalibus, caule nudo
unifloro, radice repente. *Allion. pedem. p. 36. t. 6. f. 3.*
- valdensis. 83. C. hirsuta, foliis elliptico-lanceolatis subdenticulatis, caule
unifloro. *Allion. flor. pedem. t. 6. f. 1.*
- spicata. 43. C. hispida, spica laxa: floribus alternis, foliis linearibus
integerrimis. *Pluckn. alm. t. 153. f. 3.*
- alpina. 44. C. caule simplici, pedunculis unifloris axillaribus diphyl-
lis. *Jacq. fl. austr. 2. t. 118. β) Campanula cespitosa.*
Scop. flor. carn. 2. t. 4.
- mollis. 45. C. capsulis quinquelocularibus pedunculatis, caule prostra-
to, foliis suborbiculatis. *Barr. pl. rar. ic. 759.*
- faxatilis. 46. C. capsulis quinquecarinatis, floribus alternis nutantibus,
foliis obovatis crenatis. *Barr. pl. rar. ic. t. 813.*
- sibirica. 47. C. capsulis trilocularibus, caule paniculato. *Jacq. fl. austr.*
2. t. 200.
- tridenta- 48. C. capsula quinqueloculari, caule unifloro, foliis radicali-
ta. bus tridentatis. *Mant. p. 44. Schreb. rar. pl. dec. 3. t. 2.*
- laciniata. 49. C. capsulis pedunculatis, foliis ferratis: radicalibus lyra-
tis; caulinis lanceolatis. *Tournef. it. 1. t. 99.*
- stricta. 50. C. foliis hirtis: caulinis lanceolatis ferratis, caule simpli-
cissimo, floribus sessilibus.
- peregrina. 51. C. foliis ovatis rugosis: petiolis marginato-dilatatis ferra-
tisque, caule simplici hispido, corollis patulis. *Mant.*
p. 204.
- limonifo- 52. C. ramis patentibus indivisis, foliis radicalibus ellipticis
lia. laevibus integerrimis, floribus sessilibus ternis.
- capensis. 53. C. foliis lanceolatis dentatis hispidis, pedunculis longissi-
mis, capsulis strigosis. *Commel. h. Amstel. 2. t. 35.*
- perfoliata. 54. C. caule simplici, foliis cordatis dentatis amplexicaulibus,
floribus sessilibus aggregatis. *Morif. hist. pl. 2. t. 2. f. 23.*
- Elatines. 55. C. foliis cordatis dentatis pubescentibus petiolatis, cauli-
bus prostratis, pedunculis capillaribus multifloris.
- hedera- 56. C. foliis cordatis quinquelobis petiolatis glabris, caule laxo.
cea. *Flor. dan. t. 330.*

- erinoides. 57. *C. caulibus diffusis, foliis lanceolatis subferratis decurrentibus linea scabra, floribus pedunculatis solitariis.* *Mant. p. 44.*
- heterophylla. 58. *C. foliis subovatis glabris integerrimis, caulibus diffusis.* *Tournef. it. 1. p. 243. ic.*
- Erinus. 59. *C. caule dichotomo, foliis sessilibus: superioribus oppositis tridentatis.* *Column. phytob. t. 28.*
- ** *capsulis prismaticis, Prismaticoculpi.*
- interrupta. 60. *C. foliis subulatis ciliatis, ramis floriferis superne interrupte aphyllis.* *Herit. fert. angl. p. 2.*
- pedunculata. 61. *C. foliis subulatis subciliatis, paniculis longius pedunculatis.* *Herit. fert. angl. p. 2.*
- altiflora. 62. *C. foliis subulatis subciliatis confertissimis, pedunculo longissimo aphylo, germinibus tomentosis.* *Herit. fert. angl. p. 2.*
- crispa. 63. *C. foliis linearibus undulatis, caule florifero laxo ramoso, germinibus longissimis.* *Herit. fert. angl. p. 2.*
- nitida. 64. *C. foliis lanceolatis glaberrimis, floribus terminalibus sessilibus, corollis calice duplo longioribus.* *Herit. fert. angl. p. 2. t. 3.*
- fruticosa. 65. *C. capsulis columnaribus quinquelocularibus, caule fruticoso, foliis lineari-subulatis, pedunculis longissimis.*
- Speculum. 66. *C. caule ramosissimo diffuso, foliis oblongis subcrenatis, floribus solitariis.* *Kniph. bot. orig. cent. 8. n. 22.*
- hybrida. 67. *C. caule basi subramoso stricto, foliis oblongis crenatis, calicibus aggregatis corolla longioribus.* *Morif. hist. pl. t. 2. f. 22.*
- pentagonia. 68. *C. caule subdiviso ramosissimo, foliis linearibus acuminatis.*

*** *incertae tribus.*

- gracilis. 69. *C. foliis lineari-lanceolatis obsolete serratis, caule dichotomo, floribus solitariis terminalibus.* *Forst. fl. austr. p. 15.*
- procumbens. 70. *C. caule dichotomo diffuso, foliis ovatis crenatis obtusis, floribus solitariis erectis.* *Suppl. p. 141.*
- sessiliflora. 71. *C. prostrata, foliis lineari-subulatis integris, floribus axillaribus solitariis sessilibus.* *Suppl. p. 139.*

- fascicula- 72. C. fruticosa erecta, foliis subunidentatis recurvis, floribus
ta. glomeratis terminalibus. *Suppl. p. 139.*
- adpressa. 73. C. herbacea erecta, foliis lanceolatis dentatis recurvis basi
ciliatis, adpressis, panicula decomposita. *Suppl. p. 140.*
- panicula- 74. C. herbacea, caule paniculato: ramis divaricatis, foliis
ta. lanceolatis integris, floribus terminalibus solitariis. *Suppl.
p. 139.*
- verticilla- 75. C. foliis floribusque verticillatis. *Suppl. p. 141. Pall. it.
3. p. 719. t. G*.*
- triphylla. 76. C. foliis ternis linearibus, floribus verticillato-ternis.
Thunb. fl. jap. p. 87.
- tetraphyl- 77. C. foliis quaternis oblongis ferratis. *Thunb. fl. jap.
p. 87.*
- glauc. 78. C. foliis sessilibus ovatis ferratis subtus glaucis, caule an-
gularato paniculato, pedunculis unifloris. *Thunb. fl. jap.
p. 88.*
- margina- 79. C. foliis lanceolatis undulatis ferratis marginatis, ramis de-
ta. bilibus, floribus terminalibus solitariis. *Thunb. fl. jap.
p. 89.*
- fragilis. 80. C. caulibus procumbentibus: ramis secundis multifloris,
foliis radicalibus reniformibus. *Cyrill. pl. rar. Neap. 1.
t. XI. f. 2.*

FORGESIA. *Cor.* profunde 5partita intus furfuracea. *Stigma* 2lobum. *Caps.* semiinfera, 2ocularis, polysperma, apice 2valvis, stilo coronata.

racemosa. I. **FORGESIA.** *Jussieu gen. plant. p. 164.*

219. **ROELLA.** *Cor.* infundibuliformis. *Filamenta* basi dilatata in squamas concavas persistentes. *Stigma* 2fidum. *Caps.* 1ocularis, apice patena infera.

ciliata. I. R. foliis strictis ciliatis: mucrone recto. *Seb. mus. 1. t. 16. f. 5. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 31. f. 3.*

- reticulata. 2. R. foliis strictis ciliatis: mucrone reflexo. *Pet. musf. 21. f. 157.*
- sqvarrosa. 3. R. herbacea diffusa, foliis ovatis recurvatis dentatis, floribus terminalibus aggregatis. *Suppl. p. 143.*
- muscosa. 4. R. herbacea diffusa, foliis ovatis dentatis reflexis, floribus terminalibus solitariis. *Suppl. p. 143.*
- decurrens. 5. R. herbacea, foliis lanceolatis ciliatis decurrentibus. *Herit. fert. angl. p. 4. t. 6.*
- spicata. 6. R. fruticosa erecta, foliis lanceolatis integris ciliatis, floribus terminalibus subspicatis. *Suppl. p. 143.*

220. *PHYTEUMA*. *Cor.* rotata, 5partita: laciniis linearibus. *Stigma* 2-3fidum. *Capsf.* infera 2-3locularis: foramine laterali.

- pauciflorum. 1. Ph. capitulo subfoliofo, foliis omnibus lanceolatis.
- hemisphaericum. 2. Ph. capitulo hemisphaerico, bracteis cordato-lanceolatis, foliis lanceolato-linearibus, stigmate trifido. *Thal. fl. berr. t. 3.*
- comosum. 3. Ph. fasciculo terminali sessili, foliis dentatis: radicalibus cordatis. *Jacq. fl. austr. 5. app. t. 50. β. γ. δ. cordifolium, lanceolatum, ellipticifolium. Villars pl. Delph. 2. p. 517. t. 11.*
- orbiculare. 4. Ph. capitulo subrotundo: bracteis lanceolato-linearibus maxime ciliatis. *Jacq. fl. austr. 5. t. 437.*
- Charmelii. 5. Ph. capitulo subgloboso, foliis radicalibus cordatis subdentatis, caulinis linearibus integerrimis. *Vill. pl. Delph. 2. p. 516. t. 11.*
- betonicaefolium. 6. Ph. spica oblonga, foliis cordatis oblongis crenatis. *Vill. pl. Delph. 2. p. 518. t. 12.*
- scorzonerifolium. 7. Ph. spica oblonga, foliis omnibus oblongis leviter crenatis: supremis linearibus. *Vill. pl. Delph. 2. p. 519. t. 12.*
- spicatum. 8. Ph. spica conica, bracteis linearibus longissimis, capsulis bilocularibus. *Flor. dan. t. 362. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 30. f. 6.*

9. Ph.

americana- 9. Ph. floribus axillaribus, foliis lanceolatis.
num.

pinnatum. 10. Ph. floribus sparsis, foliis pinnatis.

1006. LOBELIA. *Cal.* 5fidus. *Cor.* 1petala, irregularis, dorso superne longitudinaliter divisa. *Antherae* subcoalitae. *Caps.* 2-5-ocularis, infera.

* *foliis integerrimis.*

simplex. 1. L. caule erecto, foliis linearibus, pedunculis solitariis.
Mant. p. 291.

pinifolia. 2. L. fruticosa, foliis linearibus confertis. *Burm. afr. t.* 41. *f.* 2.

Dortman- 3. L. foliis linearibus bilocularibus, caule subnudo. *Flor.*
na. *dan. t.* 39.

Tupa. 4. L. foliis lanceolatis, racemo spicato. *Feuill. per. t.* 29.

Kalmii. 5. L. caule erecto, foliis lanceolato-linearibus obtusiusculis
alternis, racemo terminali.

panicula- 6. L. foliis linearibus, panicula dichotoma. *Burm. afr. t.* 38.
ta. *f.* 3.

grandis. 7. L. foliis oblongis glabris, corymbis bracteatis, corollis hispidis. *Suppl. p.* 394.

cornuta. 8. L. foliis ovatis petiolatis, staminibus longissimis.

depressa. 9. L. foliis lanceolatis, caule carnosoprotrato. *Suppl. p.* 395.

anceps. 10. L. foliis lanceolatis decurrentibus subdentatis. *Suppl. p.* 395.

* *foliis incis.*

† *caule volubili.*

volubilis. 11. L. *Suppl. p.* 396.

†† *caule erecto.*

arborea. 12. L. caule arboreo, foliis petiolatis ovato-oblongis serratis,
pedunculis axillaribus solitariis unifloris. *Forsl. fl. austr.*
p. 58.

acumina- 13. L. caule suffruticoso, foliis lanceolatis attenuatis ferrula-
ta. tis, racemo terminali multifloro. *Sloan. hist. jam. t.* 95.

- stricta. 14. L. caule suffruticoso, foliis inferioribus ovato-lanceolatis glabris, margine denticulato-aculeatis, racemo terminali spicato. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 117.*
- surinamaensis. 15. L. caule suffruticoso, foliis oblongis glabris ferratis, floribus axillaribus pedunculatis.
- Phyteuma. 16. L. caule subnudo spicato, foliis ovato-oblongis crenatis, antheris hirsutis distinctis.
- Columneae. 17. L. foliis oblongis obtusis revolutis rugosissimis supra lucidis, subtus tomentoso-albis, caule corollisque pulverulentis. *Suppl. p. 393. Smith pl. ic. ined. 1. t. 22.*
- bellidiflora. 18. L. caule paniculato, foliis obovatis crenatis. *Suppl. p. 396.*
- bulbosa. 19. L. foliis inferioribus pedatis. *Burm. afr. t. 38. f. 1.*
- triquetra. 20. L. foliis lanceolatis dentatis, racemo terminali aphyllis. *Mant. p. 120. β) Lobelia comosa. Spec. pl. p. 1323.*
- longiflora. 21. L. foliis lanceolatis dentatis, pedunculis brevissimis lateralibus, tubo corollae filiformi longissimo. *Mant. p. 482. Jacq. b. Vind. 1. t. 27.*
- tomentosa. 22. L. tomentosa, foliis linearibus dentatis, pedunculis terminalibus longissimis subbifloris. *Suppl. p. 394.*
- glandulosa. 48. L. subpilosa, foliis oblongis subdentatis, floribus axillaribus solitariis subsessilibus: bracteis duabus glandula terminatis. *Walt. flor. carol. p. 218.*
- secunda. 23. L. glabra, foliis infimis oblongis dentatis: superioribus lanceolatis integris, pedunculis racemosis secundis. *Suppl. p. 395.*
- patula. 24. L. herbacea diffusa virgata glabra, foliis ovatis dentatis, pedunculis lateralibus. *Suppl. p. 395.*
- assurgens. 25. L. foliis lanceolatis ferratis inferne dentatis, racemis compositis terminalibus.
- Cardinalis. 26. L. foliis lato-lanceolatis ferratis, racemo terminali secundo. *Mill. illustr. ic.*
- laevigata. 27. L. foliis ellipticis ferratis glabris, capsulis grossis globosis, calicibus subulatis, corollis glaberrimis. *Suppl. p. 392.*
- ferruginea. 28. L. caule villoso, foliis lanceolatis ferratis acutis: anastomosibus venarum utrinque tomentoso-ferrugineis, genitalibus elongatis. *Suppl. p. 394.*

- debilis. 29. L. foliis lanceolatis ferratis glabris, pedunculis lateralibus folio longioribus. *Suppl. p. 395.*
- siphylitica. 30. L. foliis ovato-lanceolatis subserratis, calicium sinibus reflexis. *Mant. p. 482. Jungh. pl. offic. ic. t. 8. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 30. f. 9.*
- inflata. 31. L. foliis ovatis subserratis pedunculo longioribus, capsulis inflatis. *Act. upf. 1741. t. 1.*
- Cliffortiana. 32. L. foliis cordatis laevibus obsolete dentatis petiolatis, corymbo terminali. *Hort. Cliff. t. 26.*
- Cyphia. 33. L. herbacea, foliis digitatis: laciniis linearibus pinnatifidis. *Suppl. p. 396.*
- urens. 34. L. caule erectiusculo, foliis inferioribus subrotundis crenatis, superioribus lanceolatis ferratis, floribus racemosis. *Mant. p. 482. Balliard herb. Franc. t. 9.*
- minuta. 35. L. foliis radicalibus ovatis, scapis capillaribus. *Mant. p. 292.*
- ††† caule prostrato.
- angulata. 36. L. caule simplicissimo, foliis subrotundis repando-dentatis, pedunculis axillaribus solitariis unifloris. *Forst. fl. austr. p. 58.*
- Laurentia. 37. L. caule ramoso, foliis lanceolato-ovalibus crenatis, pedunculis solitariis unifloris longissimis. *Mich. n. pl. gen. t. 14.*
- Erinus. 38. L. caule patulo, foliis lanceolatis subdentatis, pedunculis longissimis. *Mant. p. 483. Herm. par. lugdb. t. III.*
- erinoides. 39. L. caulibus filiformibus, foliis petiolatis oblongis dentatis. *Mant. p. 291. Herm. parad. lugdb. t. 100.*
- zeylanica. 40. L. foliis ovatis ferratis acutis: inferioribus obtusis, pedunculis unifloris, capsulis subvillosis. *Seb. mus. 1. t. 22. f. 12? β) Lobelia hirta. Sp. pl. 1. p. 935.*
- lutea. 41. L. foliis lanceolatis ferratis, floribus sessilibus subspicatis. *Mant. p. 483. Burm. afr. t. 39. f. 1.*
- hirsuta. 42. L. foliis ovalibus crenatis lanatis, floribus lateralibus solitariis. *Burm. afr. t. 40. f. 2.*
- coronopifolia. 43. L. foliis lanceolatis dentatis, pedunculis longissimis. *Mant. p. 483. Burm. afr. t. 38. f. 1.*
- comosa. 44. L. foliis linearibus dentatis, spica terminali foliosa.

- tenella. 45. *L. caulibus filiformibus fruticulosis, foliis ovato-lanceolatis glabris utrinque bidentatis. Mant. p. 120. Herit. fert. angl. p. 4 t. 4. an distincti generis?*
- subulata. 46. *L. foliis subulatis petalis linearibus. Herit. fert. angl. p. 4 t. 5.*
- pubescens. 47. *L. caulicibus angulatis foliisque lanceolatis dentatis hirtis, pedunculis axillaribus unifloris. Ait. hort. Kew. 3. p. 498.*
- fruticosa. 48. *L. fruticosa hirsuta, foliis ovatis dentatis, pedunculis lateralibus longissimis subtrifloris. Suppl. p. 395.*

221. TRACHELIUM. *Cor. infundibuliformis, tubo gracili. Stigma globosum. Caps. 3locularis, infera, basi foraminibus dehiscens.*

- diffusum. 1. *Tr. ramosissimum diffusum, ramis divaricatis. Suppl. p. 143.*
- caeruleum. 2. *Tr. ramosum erectum, foliis ovatis serratis planis. Suppl. p. 143. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 31. f. 4.*
- tenuifolium. 3. *Tr. erectiusculum, foliis linearibus ciliatis hispidis. Suppl. p. 143.*

222. SAMOLUS. *Cor. hypocrateriformis. Stamina munita squamulis corollae. Caps. 1locularis, infera, apice 5valvis.*

- Valerandi. 1. SAMOLUS. *Flor. dan. t. 198. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 30. f. 1.*

223. NAUCLEA. *Cor. tubo filiformi. Caps. infera, calice corticata, 2cocca, 2locularis polysperma.*

- orientalis. 1. NAUCLEA. *Rheed. h. malab. 3. t. 33. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 30. f. 8.*

224. RONDELETIA. Cor. infundibuliformis. Caps.
2locularis, infera, saepe
polysperma, subrotunda,
coronata.

- americana. 1. R. foliis sessilibus, panícula dichotoma. *Plum. ic. 142. f. 1.*
hirta. 2. R. foliis ellipticis acuminatis hirtis nervosis subtus pilosis
rigidis, pedunculis axillaribus tripartitis erectis, femini-
bus subsolitariis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 41.*
hirsuta. 3. R. foliis ovatis acutis floribusque hirsutis, pedunculis axil-
laribus trichotomis laxis, feminibus subsolitariis. *Swartz
nov. pl. gen. et sp. p. 41.*
tomento- 4. R. foliis ovatis acuminatis tomentosus, pedunculis tripartitis
sa. axillaribus brevibus, feminibus subsolitariis. *Swartz n. pl.
gen. et sp. p. 41.*
incana. 5. R. foliis ovato-lanceolatis subtus incanis scabris, pedunculis
axillaribus simplicibus trifloris, feminibus subsolitariis.
Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 41.
umbellu- 6. R. foliis lanceolato-ovatis subhirsutis, pedunculis axillari-
lata. bus solitariis apice trichotomis, floribus confertis, femi-
nibus subsolitariis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 41.*
thyrsoida. 7. R. foliis oblongis membranaceis subtus pubescentibus, thyrsi-
fide lateralibus, feminibus subsolitariis. *Swartz nov. pl.
gen. et sp. p. 41.*
asiatica. 8. R. foliis petiolatis oblongis acutis. *Rheed. b. malab. 2. t. 23.*
pilosa. 9. R. foliis petiolatis ovatis utrinque pilosis, pedunculis axilla-
ribus, foliis brevioribus trifidis, floribus tetrandris.
Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 41.
biflora. 10. R. foliis petiolatis ovatis hirsutis, pedunculis bifloris, caule
filiformi repente. *Fr. Rottb. act. litt. un. Havn. 1. p. 276.
t. 2. f. 2.*
obovata. 11. R. foliis petiolatis subovatis obtusis. *Jacq. stirp. am. pict. t. 61.*
virgata. 12. R. foliis petiolatis cordatis subrotundis, ramis lateralibus
filiformibus patentibus floriferis apice trifidis, floribus
confertis tetrandris. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 41.*
disperma. 13. R. foliis petiolatis ovalibus obtusis. *Jacq. stirp. amer.
ed. 2. t. 259. f. 18.*
trifoliata. 14. R. foliis ternis. *Jacq. stirp. am. pict. t. 62.*

225. MACROCNEUMUM. *Cor.* campanulata. *Capsf.* infera, 2locularis. *Sem.* imbricata.

jamaicense. I. MACROCNEUMUM.

226. BELLONIA. *Cor.* rotata. *Capsf.* 1locularis, infera, polysperma, calice rostrata.

aspera. 1. B. foliis ovatis ferratis, floribus corymbosis terminalibus. *Plum. ic.* 47.

spinosa. 2. B. spinosa, foliis ovato-angulatis dentato-ferratis, pedunculis axillaribus unifloris. *Swartz n. pl. gen. et sp. p.* 42.

227. PORTLANDIA. *Cor.* clavato-infundibuliformis. *Antherae* 4-6-longitudinales. *Capsf.* 5gona, 2valvis retusa, 2locularis, polysperma, coronata calice 5phyllo.

tetrandra. 1. P. floribus tetrandris, stipulis latis, foliis oblongis obtusis. *Suppl. p.* 143.

grandiflora. 2. P. floribus pentandris, foliis ovatis. *Jacq. stirp. amer. pict.* t. 64.

coccinea. 3. P. floribus pentandris, foliis ellipticis coriaceis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p.* 42.

hexandra. 4. P. floribus hexandris. *Mant. p.* 45. *Jacq. stirp. am. pict.* t. 65.

SWARTSIA. *Cor.* infundibuliformis, maxima. *Cal.* rumpens. *Stam.* inclinata. *Bacca* 4locularis, polysperma, superba.

grandiflora. 1. SWARTSIA. *Swartz nov. act. Stockh.* 1787. 4. p. 300. t. 11. Solandra,

1294. SCAEVOLA, Cor. 1petala: tubo longitudinaliter fisso; limbo 5fido laterali. *Drupa* baccata, infera, 2ocularis. *Semina* folitaria.

Lobelia. I. SCAEVOLA. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 199. Spec. pl. p. 1317.*
Lobelia Plumieri. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 25. f. 5.*

228. CINCHONA. Cor. infundibuliformis apice lanata. *Caps.* infera, 2ocularis, 2partibilis. *Semina* bracteata, sursum imbricata.

officina- I. C. foliis ellipticis subtus pubescentibus, floribus paniculatis: corollae limbo lanato. *Suppl. p. 144. Commenc. litter. noric. 1744. t. 1. f. 3. Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 33. f. 4.*

floribun- 2. C. foliis ellipticis acuminatis glabris, floribus paniculatis glabris, capsulis turbinatis laevibus. *Davidson act. angl. 74. p. 2.*

brachy- 3. C. foliis ellipticis obtusis glabris, floribus paniculatis glabris, capsulis ovatis costatis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 42.*

corymbi- 4. C. foliis oblongo-lanceolatis, corymbis axillaribus. *Suppl. p. 144.*

angustifo- 5. C. foliis lineari-lanceolatis pubescentibus, floribus paniculatis glabris, capsulis oblongis pentagonis. *Swartz nov. act. Stockh. 1787. 2. p. 117. t. 3.*

caribaea. 6. C. pedunculis unifloris, floribus pentandris. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 63. Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 33. f. 4.*

spinosa. 7. C. pedunculis unifloris, floribus tetrandris. *Vavasseur journ. de phys. 1790. Oct. p. 243. t. 2.*

montana. 8. C. foliis ovatis utrinque glabris, stipulis basi connato-vaginantibus, corymbo terminali, corollis glabris. *Badier. journ. de phys. 1789. Febr. p. 129. t. 1.*

KYRTANTHUS. *Cor.* tubo longissimo recurvo: ore pilis cincto. *Bacca* ovata, infera,ilocularis. *Sem.* angulata, circiter 12.

longiflorus. I. KYRTANTHUS. *Aubl. pl. guj. 1. p. 133. t. 51.*

WILLDENOVIA. *Cor.* hypocrateriformis, coriacea: tubi ore annulo crenulato. *Bacca* infera, 2locularis, polysperma.

Schreberi. I. WILLDENOVIA. *Schreb. gen. pl. Linn. 1. p. 122.*

BERTIERA. *Cor.* tubo brevi: ore villoso. *Bacca* globosa, infera, 2locularis polysperma.

gujanensis. I. BERTIERA. *Aubl. pl. guj. 1. p. 180. t. 69.*

229. **PSYCHOTRIA.** *Cal.* 5dentatus, coronans. *Cor.* tubulosa. *Bacca* infera per maturitatem exsucca, coriacea, 2partibilis, 2locularis. *Semina* solitaria, fulcata.

* caule arboreo.

speciosa. I. Pf. foliis oblongo-lanceolatis, involucre terminali subtrifloro. *Forst. fl. austr. p. 16. n. 89.*

** caule fruticoso.

corymbosa. 2. Pf. foliis ovato-lanceolatis consistentibus nitidis, stipulis geminis erectis, pedunculis coloratis, floribus erectis cylindricis corymbosis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 44.*

pedunculata. 3. Pf. foliis ovato-lanceolatis rugosis, stipulis bidentatis, floribus cymosis, pedunculis elongatis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 44.*

4. Pf.

- pubef- 4. Pf. foliis ovato-lanceolatis pubescentibus, stipulis geminis
cens. subulatis, paniculis erectis, corollis cylindricis. *Swartz*
nov. pl. gen. et sp. p. 44.
- laurifolia. 5. Pf. foliis ovato-lanceolatis crassiusculis glabris, stipulis ova-
tis, acuminatis deciduis, paniculis erectis. *Swartz nov.*
pl. gen. et sp. p. 43.
- hirsuta. 6. Pf. foliis ovato-lanceolatis hirsutis, stipulis lanceolatis in-
tegris deciduis, caule hirsutissimo, panicula patente.
Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 42.
- nutans. 7. Pf. foliis lanceolatis acutis nervosis, stipulis geminis subula-
tis, floribus cymosis, baccis nutantibus. *Swartz nov. pl.*
gen. et sp. p. 43.
- margina- 8. Pf. foliis lanceolato-ovatis, margine cartilagineo-setosis sti-
ta. pulis integris acuminatis, paniculis laxis. *Swartz nov.*
pl. gen. et sp. p. 43.
- foetens. 9. Pf. foliis lanceolato-ovatis glabris, stipulis acuminatis inte-
gris deciduis, panicula patentissima, pedunculis reflexis
filiformibus. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 43.*
- asiatica. 10. Pf. foliis lanceolato-ovatis, stipulis emarginatis. *Jacq.*
stirp. amer. pict. t. 260. f. 19. Gaertn. de fr. et sem. cent.
2. t. 25. f. 6.
- Myrsi- 11. Pf. exstipulata, foliis lanceolato-ovatis integris nitidis ri-
phyllum. gidis, ramis secundis, floribus paniculatis. *Sloan. hist.*
jam. 2. t. 209. f. 2.
- horizon- 12. Pf. foliis lanceolato-ovatis acutis ramisque horizontalibus,
talis. stipulis ovatis, ramis paniculatis. *Swartz nov. pl. gen. et*
sp. p. 44.
- crocea. 13. Pf. foliis ovatis nervosis, stipulis geminis subulatis, pani-
cula erecta terminali crocea, pedunculis coloratis. *Brown*
jam. p. 160. t. 13. f. 2. I.
- nervosa. 14. Pf. foliis ovatis acuminatis nervosis subundulatis, stipulis
ovatis emarginatis deciduis, paniculis erectis. *Swartz*
nov. pl. gen. et sp. p. 43. an distincta satis ab asiatica?
- glabrata. 15. Pf. foliis ovatis glaberrimis nitidis, stipulis indivisis deci-
duis, floribus paniculatis erectis. *Swartz nov. pl. gen. et*
sp. p. 43.
- citrifolia. 16. Pf. foliis ellipticis acuminatis glaberrimis subcoriaceis, sti-
pulis ovatis persistentibus, panicula foliis breviora, baccis
oblongis costatis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 43.*

- parasitica. 17. Pf. foliis ellipticis coriaceo-subsucculentis, stipulis amplexicaulibus integris, cymis pedunculatis trichotomis, foliorum longitudine. *Jacq. stirp. amer. t. 51. f. 1.*
- tenuifolia. 18. Pf. foliis oblongis acutis tenuioribus glabris, stipulis ovatis deciduis apice bifidis, paniculis erectis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 43.*
- alpina. 19. Pf. foliis membranaceis multinerviis, stipulis truncatis bidentatis, panicula erecta, corollis cylindricis elongatis diaphanis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 44.*
- brachiata. 20. Pf. stipulis ovatis bifidis, racemis brachiatis, floribus terminalibus aggregatis sessilibus. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 45.*
- Pavetta. 21. Pf. stipulis subulatis deciduis, ramis paniculae brachiatis trichotomis, corollis tubo longiori: laciniis patentibus. *Sloan. hist. jam. 2. t. 189. f. 4.*
- grandis. 22. Pf. caule angulato suffrutescente, foliis cuneiformibus obovatis, stipulis triangularibus revolutis apice convolutis subulatis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 43.*

*** caule herbaceo.

- uliginosa. 23. Pf. caule subherbaceo erecto, foliis lanceolato-ovatis, stipulis connatis acutis convexis, seminibus compressis cristatis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 43.*
- violacea. 24. Pf. repens, ramis radicanibus, foliis cordatis petiolatis, cymis terminalibus. *Aubl. pl. guj. 1. p. 145. t. 55.*
- serpens. 25. Pf. caule subherbaceo repente, foliis ovatis utrinque acutis. *Mant. p. 204.*
- herbacea. 26. Pf. caule repente, foliis cordatis petiolatis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 67.*
- emetifca. 27. Pf. procumbens, foliis lanceolatis glabris, stipulis extrafoliaceis subulatis, capitulis axillaribus pedunculatis paucifloris. *Suppl. p. 144. an ex hac ipecacuanha?*

230. COFFEA. Cor. infundibuliformis. Stamina supra tubum. Bacca infera, 1-2locularis. Sem. arillata, solitaria, rima ad alterum latus excisa.

- arabica. 1. C. foliis oblongo-ovatis, floribus quinquefidis, baccis dispermis. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 25. f. 3. Regu. bot. t. 303.*
- occidentalis. 2. C. foliis oblongo-ovatis, floribus quadrifidis, baccis monotalis. *Jacq. stirp. am. pict. t. 68.*
- odorata. 3. C. foliis ovatis acutis, cymis corymbosis axillaribus. *Forst. fl. austr. p. 16.*
- opulina. 4. C. foliis ovato-lanceolatis, cymis coarctatis globosis terminalibus. *Forst. fl. austr. p. 16.*
- triflora. 5. C. foliis ovato lanceolatis acuminatis, pedunculis terminalibus ternis unifloris. *Forst. fl. austr. p. 16.*
- gujanensis. 6. C. foliis ovato-oblongis acutis, floribus quadrifidis fasciculatis sessilibus axillaribus. *Aubl. pl. guj. 1. p. 150. t. 57.*
- paniculata. 7. C. foliis ovato-oblongis acutis, floribus quadrifidis paniculatis terminalibus. *Aubl. pl. guj. 1. p. 152. t. 58.*
- sambucina. 8. C. foliis oblongo-lanceolatis acutis, cymis corymbosis terminalibus. *Forst. fl. austr. p. 16.*

RONABEA. Cor. 5fida: tubo longo ad faucem ventricoso. Antherae intra faucem reconditae. Stigma 2lamellatum. Bacca 1locularis, 2pyrena: officulis 1spermis.

- latifolia. 1. RONABEA. *Aubl. pl. guj. 1. p. 154. t. 59.* β) Ronabea erecta. *Aubl. pl. guj. 1. p. 156.*

231. CHIOCOCCA. *Cor.* infundibuliformis, regularis. *Bacca* compressa 2locularis, infera. *Sem.* solitaria, pendula.

- panicula- I. *Ch.* erecta, foliis ovatis, floribus terminalibus paniculatis, ta. dentibus stipularibus binis. *Suppl. p.* 145.
 barbata. 2. *Ch.* erecta, foliis ovatis, pedunculis axillaribus unifloris, corollis fauce barbatis. *Forst. fl. austr. p.* 16.
 racemosa. 3. *Ch.* scandens, foliis lato-lanceolatis, floribus lateralibus paniculato-racemosis, dente stipulari unica. *Suppl. p.* 145. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 69. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 2, t.* 26. *f.* 3.

232. HAMELLIA. *Cor.* 4fida. *Bacca* 5locularis, infera, polysperma.

- patens. I. *H.* racemis terminalibus coloratis, foliis ternatis villosopubescentibus. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 72.
 ventricosa. 2. *H.* racemis terminalibus axillaribusque, corollis campanulatis ventricosis, foliis ternatis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p.* 46. *Herit. fert. angl. t.* 7?
 chrysantha. 3. *H.* racemis terminalibus, foliis lanceolatis integerrimis glaberrimis, floribus pedicellatis. *Brown. jam. t.* 14. *f.* 1.
 grandiflora. 4. *H.* floribus terminalibus pedunculatis, foliis lanceolatis integerrimis petiolatis. *Herit. fert. angl. t.* 7.
 axillaris. 5. *H.* subherbacea, racemis axillaribus, floribus subssecundis sessilibus, foliis ovato-lanceolatis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p.* 46.

PATIMA. *Cal.* subquinquefinuatus. *Cor.* - - *Bacca* subrotunda 4-6locularis, polysperma.

- gujanensis. I. PATIMA. *Aubl. pl. guj. I. p.* 197. *t.* 77.

VANGUERIA. *Cal.* 5dentatus, patens. *Cor.* campanulato-globosa 5fida intus hirta. *Antherae* vix exsertae. *Bacca* umbilicata, 5locularis, 5sperma.

madagaf. I. **VANGUERIA.** *Jussieu gen. plant. p. 206.*
carientis.

SABICEA. *Involucr.* 5fidum. *Cor.* infundibuliformis. *Stigma* 5partitum. *Bacca* 5locularis, polysperma.

hirta. 1. *S.* foliis ovato-lanceolatis acutis hirsutis, floribus pedunculatis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 46.*

cinerea. 2. *S.* foliis ellipticis acutis tomentosis subtus incanis, floribus subsessilibus. *Aubl. pl. guj. p. 192. t. 75.*

aspera. 3. *S.* foliis ovatis acutis asperis, subtus villosis, caule volubili. *Aubl. pl. guj. I. p. 194. t. 76.*

ORIBASIA. *Cor.* ipetala, tubulosa. *Bacca* infera, globosa, 10sulcata, 5locularis: loculis ispermis.

officina- 1. *O.* calicibus involucratis: involuero trifido, foliis ovatis acuminatis. *Aubl. pl. guj. I. p. 183. t. 70. f. 1.*

racemosa. 2. *O.* calicibus involucratis: involuero tetraphyllo, foliis ovatis acuminatis petiolatis. *Aubl. pl. guj. I. p. 186. t. 72.*

violacea. 3. *O.* calicibus involucratis: involuero tetraphyllo, foliis amplis ovatis subsessilibus. *Aubl. pl. guj. I. p. 188. t. 73.*

lutea. 4. *O.* calicibus nudis corollae tubo longissimo, floribus racemosis, foliis ovatis. *Aubl. pl. guj. I. p. 190. t. 74.*

paniculata. 5. *O.* calicibus nudis floribus paniculatis: intermedio sessili. *Aubl. pl. guj. I. p. 184. t. 70. f. 2.*

longiflora. 6. *O.* calicibus nudis, corollae tubo longo, foliis lanceolatis. *Aubl. pl. guj. I. p. 185. t. 71.*

STEPHANIMUM. Cor. infundibuliformis: tubo incurvo superne ventricoso. Pericarp. 2loculare, 2spermum.

gujanense. I. STEPHANIMUM. *Aubl. pl. guj. I. p. 172. t. 66.*

233. LONICERA. Cor. 1petala, tubulosa, irregularis. Bacca polysperma 1-3locularis, infera.

* caule volubili, Periclymena.

- Caprifolium. I. L. floribus verticillatis terminalibus ringentibus sessilibus, foliis deciduis; summis connato-perfoliatis. *Jacq. fl. austr. 4. t. 357.*
- sempervirens. 2. L. verticillis aphyllis terminalibus, foliis summis connato-perfoliatis, corollis subaequalibus. *Knorr del. hort. I. t. G. 4.*
- media. 3. L. capitulis verticillatis aphyllis terminalibus, corolla brevi; gibbo baseos didymo, foliis summis connato-perfoliatis. *Murray Comment. goett. 1776. p. 28. t. 3. an eadem cum dioica?*
- dioica. 4. L. verticillis aphyllis terminalibus, foliis deciduis omnibus connato-perfoliatis.
- grata. 5. L. floribus verticillatis terminalibus ringentibus, foliis perennibus obovatis, summis connato-subperfoliatis. *Ait. hort. Kew. I. p. 231.*
- implexa. 6. L. floribus verticillatis terminalibus ringentibus, foliis perennantibus oblongis: superioribus connato-perfoliatis; summis dilatatis. *Ait. hort. Kew. I. p. 231.*
- Periclymenum. 7. L. capitulis ovatis imbricatis terminalibus, foliis deciduis omnibus distinctis, corollis ringentibus. *Curt. flor. Lond. t. I.*
- japonica. 8. L. floribus binis terminalibus sessilibus, foliis omnibus distinctis. *Thunb. fl. jap. p. 89.*
- nigra. 9. L. baccis distinctis, foliis ellipticis integerrimis. *Jacq. fl. austr. t. 314.*

** pedunculis bifloris, Chamaecerasa.

- tatarica. 10. L. baccis distinctis, foliis cordatis obtusis. *Jacq. pl. rar. ic. t. 46. Pall. flor. ross. t. 36.*
- Xylosteum. 11. L. baccis distinctis, foliis integerrimis pubescentibus. *Flor. dan. t. 808. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 27. f. 6.*
- pyrenai- 12. L. baccis distinctis, foliis oblongis glabris. *Du Ham. ca. arbr. 2. t. 110.*
- alpigena. 13. L. baccis coadunatis didymis, foliis ovali-lanceolatis. *Jacq. fl. austr. 3. t. 274. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 27. f. 6.*
- caucasica. 14. L. baccis coadunato-didymis, foliis ovato-lanceolatis integerrimis. *Pallas flor. ross. 1. p. 57.*
- caerulea. 15. L. baccis coadunatis globosis, stilibus indivisis. *Jacq. fl. austr. 5. app. t. 17. Pallas fl. ross. t. 37.*
- *** pedunculis multifloris, caule erecto.
- Symphoricarpos. 16. L. capitulis lateralibus pedunculatis, foliis petiolatis. *Du Hamel. arb. 2. t. 82.*
- bubalina. 17. L. capitulis terminalibus pedunculatis, foliis oblongis integerrimis glabris. *Suppl. p. 146.*
- Diervilla. 18. L. racemis terminalibus, foliis ferratis. *Du Hamel arb. 1. t. 87.*
- mongolica. 19. L. racemis terminalibus compositis laxis umbellatis, foliis ferratis. *Gmel. fl. sib. 3. p. 135. t. 25. Pall. flor. ross. t. 38.*
- corymbosa. 20. L. corymbis terminalibus, foliis ovatis acutis. *Feuill. peruv. 1. t. 45.*

234. TRIOSTEUM. Cor. 5-petala, subaequalis. Cal. longitudine corollae. Baccæilocularis: 3-sperma, infera.

- perfoliatum. 1. Tr. floribus verticillatis sessilibus. *Dill. h. Elth. t. 293. f. 378.*
- angustifolium. 2. Tr. floribus oppositis pedunculatis. *Pluckn. alm. t. 104. f. 2.*

BAEOBOTRYS. *Cor.* tubulosa: limbo 5fido. *Cal.* duplex; exterior 2phyllus, interior 1phyllus campanulatus. *Bacca* globosa, 1ocularis, calici adnata, polysperma.

nemoralis. I. **BAEOBOTRYS.** *Forst. char. gen. p. 11. t. 11. an Maesae jungenda?*

CHIMARRHIS. *Cor.* infundibuliformis: tubo brevifimo. *Caps.* infera, obtusa, 2ocularis, 2sperma, 2valvis: valvis apice 2fidis.

cymosa. I. **CHIMARRHIS.** *Jacq. stirp. amer. p. 61.*

CYPHIUM. *Cor.* 5petala supera: petalis linearibus. *Cal.* 5fidus. *Filam.* pilosa. *Stigma* cernuum, gibbum.

capense. I. **CYPHIUM.** *Berg. flor. cap. p. 172.*

DENTELLA. *Cor.* tubulosa 5fida: laciniis 3dentatis. *Cal.* 5partitus. *Stigm.* 2. *Caps.* globosa, infera, 2ocularis, polysperma.

repens. I. **DENTELLA.** *Forst. char. gen. p. 13. t. 13.*

UNCARIA. *Cor.* hypocrateriformis. *Germen* glandula coronatum. *Stigma* 2sulcum. *Pericarp.* 2loculare, polyspermum.

gujanensis. I. **UNCARIA.** *Aubl. pl. guj. 1. p. 177. t. 68.*

SIMIRA. Cor. 1petala, tubulosa, 5fida. Cal. turbinatus, 5dentatus. Stil. 2partitus. Bacca infera, ovata, 2ocularis: loculis 1spermis.

finctoria. 1. SIMIRA. *Aubl. pl. guj. I. p. 170. t. 65.*

MAPURIA. Cor. 5fida: tubo brevi. Cal. turbinatus 5dentatus. Stigma 2lamellatum. Pericarpium.

gujanensis. 1. MAPURIA. *Aubl. pl. guj. I. p. 175. t. 67.*

235. MORINDA. Flores aggregati 1petali. Stigma 2fidum. Drupae aggregatae, inferae, angulatae, 4loculares.

umbellata. 1. M. erecta, foliis lanceolato-ovatis, pedunculis confertis. *Rumpf. amb. 3. t. 98. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 29. f. 1.*

citrifolia. 2. M. arborea, pedunculis solitariis. *Rumpf. amb. 2. t. 99. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 29. f. 1.*

muscosa. 4. M. arborea, capitulis terminalibus sessilibus. *Jacq. stirp. amer. ed. 2. t. 66.*

Royoc. 3. M. procumbens. *Jacq. h. Vindob. I. t. 16.*

CALLICOCCA. Flores aggregati: involuro subtetraphyllo, receptaculo paleaceo. Bacca 1ocularis angulata, 2sperma. Stil. 2fidus.

tomentosa. 1. C. caule erecto, foliis petiolatis ovatis, capitulis terminalibus: involuro monophyllo amplo villosa patulo. *Aubl. pl. guj. I. p. 160. t. 61.*

purpurea. 2. C. caule repente, foliis lanceolatis subtus hirsutis, capitulis terminalibus: involuro pentaphyllo. *Aubl. pl. guj. I. p. 162. t. 62. f. 3.*

alba. 3. C. caule decumbente, foliis ovatis subtus incanis, capitulis terminalibus: involuro pentaphyllo. *Aubl. pl. guj. I. p. 164. t. 62. f. 4.*

- glabra. 4. *C.* caule erecto, foliis ovatis glabris petiolatis, capitulis terminalibus pedunculatis. *Aubl. pl. guj. I. p. 165. t. 63.*
- gujanensis. 5. *C.* caule ascendente, capitulis terminalibus pedunculatis: involucreo tetraphyllo. *Aubl. pl. guj. I. p. 167. t. 64.*
An Evcae, et Cephaelidis potissimum genus cum hoc genere conjungendum?

CEPHAELIS. Flores capitati, involucrati tubulosi.
Stigma 2partitum. Bacca 2sperma. Receptac. paleaceum.

- violacea. 1. *C.* capitulis globosis terminalibus, involucreo pentaphyllo. *Aubl. pl. guj. p. 157. t. 60.* Tapogomea violacea.
- alata. 2. *C.* capitulis globosis terminalibus, involucreo diphylo. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 45.*
- muscosa. 3. *C.* capitulis subrotundis subsessilibus terminalibus, paleis dentatis. *Jacq. stirp. am. p. 65. t. 45.*
- axillaris. 4. *C.* capitulis axillaribus sessilibus. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 45.*

CANEPHORA. Perianth. com. 3-6florum, subquinquefidum. Cal. propr. 5-6fidus. Cor. campanulata, 5loba. Antherae 5-6sessiles. Stigm. 2fidum. Fruct. 2spermus.

- madagascariensis. 1. CANEPHORA. *Jussieu gen. pl. p. 208.*

236. CONOCARPUS. Flores (plerisque) aggregati. Cor. 5petala aut 0. Cal. campanulatus. Semina nuda, solitaria, infera.

- erecta. 1. *C.* erecta, foliis lanceolatis, floribus apetalis. *Jacq. stirp. am. pict. t. 78.*
- procumbens. 2. *C.* procumbens, foliis obovatis, floribus apetalis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 260. f. 22.*

3. *C.*

racemosa. 3. C. foliis lanceolato-ovatis obtusiusculis, floribus pentapetalis remotis decandris. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 79.*

1005. JASIONE. *Cal. communis* 10phyllus, proprius 5dentatus. *Cor.* 5petala, regularis. *Antherae* cohaerentes. *Capsula* infera, 2locularis, polysperma, calice coronata, apice pervia.

montana. 1. I. foliis linearibus integerrimis. *Flor. dan. t. 319. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 30. f. 5.*

β) perennis. *Suppl. p. 392.*

capensis. 2. I. foliis lineari-lanceolatis ferratis: ferraturis spinosis. *Bergius nov. act. Ups. 3. p. 187. t. 10.*

LIGNONIA. *Cal.* 5dentatus. *Cor.* 5petala: petalo unico majori emarginato. *Anther.* cohaerentes. *Stigma* 2lobum. *Pericarp.* 2loculare.

monody- I. LIGNONIA. *Scopol. introd. gen. 1334.*
nama.

1002. STRUMPFIA. *Cal.* 5dentatus, superus. *Cor.* 5petala. *Antherae* cohaerentes. *Bacca* 1sperma.

maritima. I. STRUMPFIA. *Sloan. hist. jam. 2. t. 189. f. 1. 2.*

1004. CORYMBIUM. *Cal.* prismaticus, 2phyllus, 1florus. *Cor.* 1petala, regularis. *Antherae* cohaerentes. *Sem.* 1 infra corollul. lanatum.

scabrum. I. C. foliis lanceolatis canaliculatis nervosis recurvatis glabris caule brevioribus. *Mant. p. 120. Suppl. p. 392. Burm. afr. t. 70. f. 1.*

- glabrum. 2. C. glaberrimum, foliis ensiformibus planis nervosis. *Suppl.* p. 392. *Pluckn. alm. t. 272. f. 4.*
- filiforme. 3. C. foliis filiformibus glaberrimis erectis caule brevioribus. *Suppl. p. 392.*
- villosum. 4. C. villoso-lanatum, foliis caulinis amplexicaulibus subulatis rectis planis. *Suppl. p. 392.*

1003. SERIPHIMUM. *Cal.* imbricatus. *Cor.* 5petala, regularis. *Antherae* cohaerentes. *Sem.* 1. oblongum, infra corollam.

- cinereum. 1. S. floribus verticillato-spicatis unifloris, foliis patentibus. *Mant. p. 481. Pluckn. mant. t. 297. f. 1.*
- plumosum. 2. S. floribus spicatis sexfloris, foliis granulato-ovatis. *Mant. p. 481. Petiv. gaz. t. 5. f. 4.*
- fuscum. 3. S. floribus capitatis unifloris, foliis imbricatis. *Mant. p. 481. Petiv. gaz. t. 5. f. 2.*
- ambiguum. 4. S. floribus spicatis trifloris, foliis linearibus. *Syst. nat. XII. 3. p. 543. Artemisia? ambigua.*

1057. AMBROSIA. *Flores* compositi, monoici.
♂. *Cal.* communis 1phyllus. *Cor.* 5petala, 3fida, infundibuliformis. *Receptac.* nudum.
♀. *Cal.* 1phyllus, 1florus, integer, ventre 5dentato. *Cor.* 5. *Nux* e calice indurato, 1sperma.

- trifida. 1. A. foliis trilobis ferratis. *Morif. hist. pl. 3. t. 1. f. 4.*
- elatior. 2. A. foliis bipinnatifidis, racemis paniculatis terminalibus glabris.
- artemisiafolia. 3. A. foliis bipinnatifidis: primoribus ramulorum integerrimis. *Pluckn. alm. t. 10. f. 5.*
- maritima. 4. A. foliis multifidis, spicis solitariis pilosis subsessilibus. *Kniph. bot. orig. cent. 2. n. 3.*

simplici- 5. A. foliis simplicibus lanceolatis, floribus axillaribus subfoli-
folia. tariis. *Walt. flor. carol. p. 231.*

237. KUHNIA. Flores compositi flosculosi. Sem. fo-
litaria: pappo plumoso. *Rece-
ptac. nudum.*

cupato- 1. K. foliis simplicibus. *Linn. fil. dec. 21. t. 11.*
rioides.

pinnata. 2. K. foliis pinnatis. *Walt. flor. carol. p. 103.*

1058. PARTHENIUM. Flores compositi, monoici.
Cal. commun. 5phyllus.
♂. Cor. disci 1petalae. *An-
therae approximatae.*
♀. Cor. radii 5, singulae 2
masculae, intermedia
feminea supera. Sem.
nudum.

Hyltero- 1. P. foliis composito multifidis. *Nils. act. parif. 1711. t. 13.*
phorus. f. 2.

integrifo- 2. P. foliis ovatis crenatis. *Mill. illustr. ic.*
lium.

1329. CLIBADIUM. Flores compositi, monoici.
Cal. communis imbricatus.
♂. Cor. disci 5fidae. *Antherae*
approximatae.
♀. Cor. radii feminei 3-4. Sem.
Drupa umbilicata.

furina- 1. CLIBADIUM. *Mant. p. 294.*
menfe.

SCHOEFFIA. Cor. campanulata: basi 10sulcata; limbo 5fido. Cal. turbinato-angulatus 5dentatus. Stigma capitatum, 3fidum. Bacca 3locularis.

Schreberl. I. SCHOEFFIA. Schreb. gen. pl. Linn. I. p. 129.

238. ERITHALIS. Cor. 5partita: laciniis recurvis. Cal. urceolatus. Bacca infera, 10sperma.

fruticosa. 1. E. corymbis compositis. Jacq. stirp. am. pict. t. 260. f. 20. Plum. ic. t. 249. f. 2.

polygama. 2. E. floribus axillaribus; masculis cymosis, hermaphroditis solitariis. Forst. fl. austr. p. 17.

inodora. 3. E. fruticosa procumbens. Jacq. stirp. amer. p. 72.

239. MENAIS. Cor. hypocrateriformis. Cal. 3phyllus. Bacca 4locularis. Sem. solitaria.

topiaria. 1. MENAIS.

241. MUSSAENDA. Cor. infundibuliformis. Stigm. 2. crassiuscula. Bacca 2locularis, oblonga infera. Sem. 4fariam disposita.

frondosa. 1. M. panicula foliis coloratis. Mant. p. 338. Burm. zeyl. t. 76. an cum spinosa Gardeniae generi inserenda?

spinosa. 2. M. spinosa, floribus sessilibus aggregatis. Mant. p. 45. Jacq. stirp. amer. pict. t. 71.

1231. MATTHIOLA. Cor. tubulosa, supera, indivisa. Cal. integer. Drupa nucleo globoso.

scabra. 1. MATTHIOLA. Plum. ic. 173. f. 2.

242. MIRABILIS. *Cor.* infundibuliformis, *supera.*
Cal. inferus. *Nectarium* glo-
bosum, germen includens.

dichoto- I. *M.* floribus solitariis axillaribus erectis sessilibus. *Mant.*
ma. *cent.* 1. t. 1.

Jalapa. 2. *M.* floribus congestis terminalibus erectis. *Knorr del. hort.*
1. t. 3. *Regn. bot.* t. 47.

longiflo- 3. *M.* floribus congestis longissimis subnutantibus terminalibus,
ra. foliis subvillois. *Act. Stockb.* 1756. t. 6. f. 1

243. CORIS. *Cor.* 5petala, irregularis. *Cal.* spinosus.
Caps. 5valvis *supera.*

monspe- I. CORIS. *Kniph. bot. orig. cent.* 9. n. 27.
liensis.

GENIOSTOMA. *Cor.* 5partita: fauce barbata. *Cal.*
5fidus, persistens. *Stigma* sul-
catum. *Caps.*? *supera*, 2lo-
cularis, polysperma.

rupestre. GENIOSTOMA. *Forst. char. gen.* p. 12. t. 12.

1229. BROSSAEA. *Cor.* truncata. *Cal.* carnosus.
Caps. 5locularis, polysper-
ma.

coccinea. I. BROSSAEA. *Plum. ic.* 64. f. 2.

245. VERBASCUM. *Cor.* rotata, subaequalis. *Caps.*
2locularis, 2valvis, po-
lysperma.

Thapsus. I. *V.* foliis decurrentibus utrinque tomentosis, caule simplici,
stigmatate globofo. *Flor. dan.* t. 361.

bicolle. 2. *V.* foliis decurrentibus utrinque tomentosis, caule simplici,
stigmatate didymo. *Schranck bairisch. Flor.* 1. p. 465.

thapsoi- 3. *V.* foliis decurrentibus, caule ramofo. *An vere distinctum*
des. a thapso?

- Boerha- 4. V. foliis sublyratis, floribus sessilibus. *Mant. p. 45. Till.*
vii. *b. pif. t. 50?*
- phlomo- 5. V. foliis ovatis utrinque tomentosus: inferioribus petiolatis.
des. *Moench. fl. bass. t. 4.*
- pulveru- 6. V. caule ramoso, calicibus farinosis fasciculatis, corollis lu-
lentum. *Vill. pl. delph. 2. p. 490.*
- Lychnitis. 7. V. foliis cuneiformi-oblongis. *Flor. dan. t. 586.*
- Chaixi. 8. V. caule ramoso, foliis nudis cordatis petiolatis basi lyratis.
Kill. pl. delph. 2. p. 491. t. 13.
- nigrum. 9. V. foliis cordato-oblongis petiolatis. *Zorn pl. med. ic. 1. t. 25.*
- haemor- 10. V. foliis tomentosus ovato-oblongis basi attenuatis obsolete
rhoidale. *crenulatis, racemis spiciformibus elongatis. Ait. hort. Kew. 1. p. 236.*
- ferrugi- 11. V. foliis subvillosis rugosis: caulinis aequaliter; radicalibus
neum. *duplicato-crenatis oblongis cordatis. Ait. hort. Kew. 1. p. 237.*
- phoeni- 12. V. foliis ovatis nudis crenatis radicalibus, caule subnudo
ceum. *racemoso. Jacq. fl. austr. 2. t. 125. Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. t. 55. f. 8.*
- Blattaria. 13. V. foliis amplexicaulibus oblongis glabris, pedunculis so-
litariis. *Sabb. h. rom. 2. t. 56.*
- sinuatum. 14. V. foliis radicalibus pinnatifido-repandis tomentosus: cau-
linis amplexicaulibus nudiusculis, rameis primis oppositis.
Tournef. it. 1. p. 335. ic.
- Osbeckii. 15. V. foliis incisus nudis caule folioso, pedunculis bifloris,
calicibus lanatis. *Tournef. it. 2. p. 83. ic.*
- spinofum. 16. V. caule folioso spinoso frutescente. *Pr. Alp. exot. t. 36.*
- Myconi. 17. V. foliis lanatis radicalibus, scapo nudo. *Trew. Ehret. t. 57.*

246. DATURA. Cor. infundibuliformis, plicata.
Calix tubulosus, angulosus,
cum corolla deciduus. Caps.
4valvis.

* pericarpis spinosis.

ferox. I. D. pericarpis erectis ovatis: spinis summis maximis con-
vergentibus. *Morif. hist. pl. 3. t. 2. f. 4.*

2. D.

framoni- 2. D. pericarpis erectis ovatis, foliis ovatis glabris. *Flor.*
um. *dan. t. 436.*

Tatula. 3. D. pericarpis erectis ovatis, foliis cordatis glabris dentatis.

Metel. 4. D. pericarpis nutantibus globosis, foliis cordatis subinte-
gris pubescentibus. *Rumpf. amb. 5. t. 87.*

** *pericarpis tuberculatis.*

fastuosa. 5. D. pericarpis nutantibus globosis, foliis ovatis angulatis.
Rumpf. amb. 5. t. 243. f. 2.

*** *pericarpis glabris inermibus.*

arborea. 6. D. pericarpis nutantibus, caule arboreo. *Feuill. per. 2. t. 46.*

laevis. 7. D. pericarpis ovatis erectis, caule herbaceo. *Suppl. p. 146.*
Jacq. h. Vind. 3. t. 82.

247. HYOSCYAMUS. *Cor.* infundibuliformis, ob-
tusa, irregularis. *Sta-*
min. inclinata. *Caps.*
operculata, 2ocularis.
Sem. plurima, renifor-
mia.

niger. 1. H. foliis amplexicaulibus sinuatis, floribus sessilibus. *Blackw.*
herb. t. 550.

reticula- 2. H. foliis caulinis petiolatis cordatis sinuatis acutis; florali-
tus. bus integerrimis, corollis ventricosi. *Camer. hort. t. 22.*

albus. 3. H. foliis petiolatis sinuatis obtusis, floribus sessilibus. *Blackw.*
herb. t. III. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 76. f. 8.

aureus. 4. H. foliis petiolatis dentatis acutis, floribus pedunculatis,
fructibus pendulis. *Bulliard herb. Franc. t. 20.*

muticus. 5. H. foliis petiolatis ovatis acutangulis, calicibus muticis, bra-
cteis indivisis. *Mant. p. 45.*

Datora. 6. H. foliis petiolatis, ovato-lanceolatis subdentatis, floribus
spicatis subsessilibus, caule villosis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 45.*

pufillus. 7. H. foliis lanceolatis dentatis: floralibus inferioribus binis,
calicibus spinosis. *Mant. p. 339. Pluckn. alm. t. 37. f. 5.*

physaloi- 8. H. foliis ovatis integerrimis, calicibus inflatis subglobosis.
des. *Amoen. ac. 7. t. 6. f. 1.*

9. H.

Scopolia. 9. H. foliis ovatis integris, calicibus inflatis campanulatis lac-
vibus. *Mant. p. 46. 339. Jacq. obs. bot. 1. t. 20.*

248. NICOTIANA. Cor. infundibuliformis: lim-
bo plicato. Stam. incli-
nata. Caps. 2valvis, 2lo-
cularis. Sem. parva, sub-
reniformia.

Tabacum. 1. N. foliis lanceolato-ovatis sessilibus decurrentibus, floribus
acutis. *Knorr del. hort. 1. t. T. II. Gaertn. de fr. et
sem. c. 4. f. 55. f. II.*

fruticosa. 2. N. foliis lanceolatis subpetiolatis amplexicaulibus, floribus
acutis, caule frutescente.

rustica. 3. N. foliis petiolatis ovatis integerrimis, floribus obtusis.
Blackw. herb. t. 437.

panicula- 4. N. foliis petiolatis cordatis integerrimis, floribus panicu-
ta. latis obtusis clavatis. *Feuill. per. 1. t. 10.*

urens. 5. N. foliis cordatis crenatis, racemis recurvatis, caule hispi-
do pruriginoso. *Plum. ic. 211.*

glutino- 6. N. foliis petiolatis cordatis integerrimis, floribus racemo-
sa. sis fecundis subringentibus. *Aët. Stockh. 1753. t. 2.*

pufilla. 7. N. foliis oblongo-ovalibus radicalibus, floribus racemo-
sis acutis. *Mill. ic. 185. f. 2.*

minima. 8. N. foliis sessilibus ovatis, floribus obtusis. *Molin. hist. nat.
Chil. p. 129.*

JABOROSA. Cor. tubulosa, calice 5fido longior:
limbo 5fido. Filamenta plana sum-
mo tubo inserta. Stigma capitatum.

bonarien- 1. JABOROSA. *Jussieu gen. plant. p. 125.*
fis.

249. ATROPA. Cor. campanulata. Stam. distantia.
Bacca globosa, 2ocularis.

Mandra- 1. A. acaulis, scapis unifloris. *Bulliard herb. Franc. t. 145. 146.*
gora,

- Belladonna. 2. A. caule herbaceo, foliis ovatis integris. *Jacq. fl. austr.* 4. t. 309.
- physaloides. 3. A. caule herbaceo, foliis sinuato-angulatis, calicibus clausis acutangulis. *Mant. p.* 339. *Jacq. obs. bot.* 4. t. 98. *nonne distincti generis?*
- solanacea. 4. A. caule fruticoso, pedunculis solitariis, foliis subovatis. *Mant. p.* 205. *Syst. nat.* XII. 3. p. 173. *Solanum guineense. Commel. b. amstel.* 2. t. 96.
- arborescens. 5. A. caule frutescente, pedunculis confertis, corollis revolutis, foliis oblongis. *Plum. ic.* 46. f. 1.
- frutescens. 6. A. caule fruticoso, pedunculis confertis, foliis cordato-ovatis obtusis. *Barr. pl. rar. ic.* 1173.

250. PHYSALIS. Cor. rotata. Stam. conniventia.
 Bacca intra calicem inflatum,
 2locularis.

* perennes.

- somnifera. 1. Ph. caule fruticoso, ramis rectis, floribus confertis.
- flexuosa. 2. Ph. caule fruticoso, ramis flexuosis, floribus confertis. *Rheed. b. mal.* 4. t. 55.
- aristata. 3. Ph. caule fruticoso, ramis pedunculis petiolisque lanuginosis, foliis glabris, calicis denticulis aristatis. *Ait. hort. Kew.* I. p. 244.
- arborescens. 4. Ph. caule fruticoso, foliis ovatis pilosis, floribus solitariis: corollis revolutis. *Mill. dict.* t. 206. f. 2.
- curassavica. 5. Ph. caule fruticoso, foliis ovatis tomentosis. *Pluckn. alm.* t. III. f. 5.
- prostrata. 6. Ph. caule procumbente tereti hirsuto ramosissimo, foliis subcarnosis. *Herit. stirp. nov.* 3. p. 43. t. 22.
- viscosa. 7. Ph. foliis geminis repandis obtusis subtomentosis, caule herbaceo superne paniculato. *Jacq. b. Vind.* 2. t. 136.
- pensylvanica. 8. Ph. foliis ovatis subrepandis obtusis nudiusculis, floribus geminis, caule herbaceo.
- Alkekenigi. 9. Ph. foliis geminis integris acutis, caule herbaceo infero subramoso. *Knorr del. hort.* I. t. I. 4.
- peruviana. 10. Ph. pubescens, foliis ovatis integerrimis,

- tomento- II. Ph. caule arborecente ramis erectis, foliis cordato-acu-
fa. minatis sinuato-repandis, inferne alternis, summis geminis. *Medic. act. palat. 4. phys. p. 184. t. 4.*
- lutea. 12. Ph. calicibus fructiferis pyriformibus clausis fertis, corollis
immaculatis. *Medic. act. palat. 4. phys. p. 186. Visonfae proxima.*

** *annuae.*

- angulata. 13. Ph. ramosissima, ramis angulatis glabris, foliis ovatis den-
tatis. *Dill. h. Elth. t. 12. f. 12.*
- pubes- 14. Ph. ramosissima, foliis villosis-viscosis, floribus pendulis.
cens. *Feuill. per. t. 1.*
- minima. 15. Ph. ramosissima, pedunculis fructiferis folio villosis longio-
ribus. *Sabb. h. rom. 2. t. 64.*
- pruinosa. 16. Ph. ramosissima, foliis subvillosis, pedunculis strictis, ca-
licibusque fructiferis longissimis. *Dill. h. Elth. t. 9. f. 9.*
- barbaden- 17. Ph. ramosissima, foliis cordatis villosis, calicibus fructif-
fis. centibus pendulis ovatis acutis pentagonis. *Jacq. plant. rar. ic. cent. 1. t. 70.*
- ramosa. 18. Ph. foliis simplicibus geminisque late ovatis acutis sinuato-
dentatis subvillosis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 204.*
- dubia. 19. Ph. ramosissima, pedunculis calicibusque fructiferis brevif-
simis. *Medic. act. palat. 4. phys. p. 188. t. 5. f. 1.*
- limensis. 20. Ph. foliis ovatis repandis pilosis, calicibus florum inflatis
scariosis. *Retz. obs. bot. 5. p. 22.*
- nutans. 21. Ph. foliis alternis ovatis cauleque subangulatis tomentosis,
floribus solitariis nutantibus. *Walt. flor. carol. p. 99.*

251. SOLANUM. Cor. rotata. *Antherae* subcoali-
tae: poro gemino dehiscen-
tes. *Bacca* 2ocularis.

* *Inermia.*

- laurifoli- I. S. caule arboreo, foliis petiolatis ovato-oblongis subtus to-
um. mentosis, panicula terminali dichotoma divaricata. *Suppl. p. 148.*
- verbasci- 2. S. caule fruticoso, foliis ovatis tomentosis integerrimis, um-
folium. bellis compositis. *Jacq. h. Vind. 1. t. 13.*

3. S.

- Pseudo- 3. S. caule fruticoso, foliis lanceolatis repandis, umbellis sessi-
capicum. libus. *Kuiph. bot. orig. cent. 6. n. 87.*
- diphyl- 4. S. caule fruticoso, foliis geminis: altero minore, floribus
lum. cymosis. *Jacq. pl. rar. ic. cent. 2. t. 53.*
- bonarien- 5. S. caule subinermi fruticoso, foliis ovato-oblongis sinuato-
fe. repandis scabris. *Mant. p. 205. Dill. h. Elth. t. 270. f. 351.*
- aviculare. 6. S. caule fruticoso, foliis sinuato-pinnatifidis, corymbis ter-
minalibus. *Forst. fl. austr. p. 18.*
- nodiflo- 7. S. caule fruticoso debili, ramis ad divisiones incrassatis, fo-
rum. liis petiolatis ovatis integerrimis, pedunculis umbellatis.
Jacq. coll. 2. p. 288. pl. rar. ic. cent. 2. t. 54.
- Tagore. 8. S. caule fruticoso, foliis inferioribus profunde sinuatis: su-
perioribus cordatis. *Aubl. pl. guj. 1. p. 212. t. 83.*
- subiner- 67. S. caule frutescente subinermi, foliis lanceolato-ovatis in-
me. tegerrimis. *Jacq. stirp. amer. ed. 2. t. 259. f. 15.*
- bomben- 68. S. caule frutescente, foliis ovalibus integerrimis, racemis
fe. corymbosis. *Jacq. stirp. amer.*
- Dulcama- 9. S. caule frutescente flexuoso, foliis superioribus hastatis, ra-
ra. cemis cymosis. *Curt. flor. Lond. t. 4.*
- havanen- 10. S. caule frutescente, foliis lanceolatis nitidis integerrimis,
fe. pedunculis subbifloris. *Mant. p. 47. Jacq. stirp. amer. pict. t. 48.*
- triste. 11. S. caule frutescente, foliis lanceolato-oblongis subrepan-
dis glabris, racemis subcymosis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 49.*
- racemo- 12. S. caule frutescente, foliis lanceolatis repandis undulatis,
sum. racemis longis erectis. *Mant. p. 47. Jacq. stirp. amer. pict. t. 50.*
- termina- 13. S. caule frutescente, foliis ovalibus acutis, umbellis termi-
le. nalibus. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 45.*
- mauritia- 14. S. caule frutescente: ramis superioribus lanatis, foliis ob-
num. longis tomentosis integris, racemis terminalibus glandulosis.
Scop. delic. inf. 3. p. 16. t. 8.
- macrocar- 15. S. caule suffruticoso, foliis cuneatis repandis glabris. *Mant.*
pon. *p. 205. Mill. ic. 294.*
- corymbo- 16. S. caule suffruticoso, foliis ovatis integris subtrilobisque,
sum. floribus cymosis. *Thouin apud Retz. obs. bot. 5. p. 22.*

- rubrum. 17. S. caule subperennante, foliis geminis ovatis integerrimis, pedunculis tubumbellatis.
- repan- 18. S. caule subherbaceo flexuoso laevi, foliis ovatis repandis
dum. tomentosis, pedunculis axillaribus cymosis. *Forst. fl. austr.*
p. 18.
- quercifo- 19. S. caule subherbaceo flexuoso angulato scabro, foliis pin-
lium. natifidis, racemis cymosis. *Feuill. peruv. t. 15.*
- radicans. 20. S. caule herbaceo laevi teretiufculo prostrato radicante, fo-
liis pinnatifidis, racemis cymosis. *Linn. fil. dec. 1. t. 10.*
- Cari. 21. S. caule herbaceo, foliis pinnatis integris, nectario cam-
panulato petala subaequante. *Molin. hist. nat. Chil. p. 109.*
an hujus generis?
- tubero- 22. S. caule herbaceo, foliis pinnatis integerrimis, pedunculis
fum. subdivisis. *Knorr del. hort. 2. t. 5. 9. 10.*
- pimpinell- 23. S. caule herbaceo, foliis pinnatis integerrimis, racemis
lifolium. simplicibus.
- Lycoper- 24. S. caule herbaceo, foliis pinnatis incisiss, racemis bipartitis
ficon. aphyllis, fructibus glabris. *Regn. bot. t. 58.*
- spurium. 25. S. caule herbaceo, foliis pinnatis incisiss, racemis simplici-
bus, fructibus subvillosis. *Jacq. b. Vind. 1. t. 11.*
- peruvia- 26. S. caule herbaceo, foliis pinnatis incisiss tomentosis, race-
num. mis bipartitis foliosis, baccis pilosis. *Jacq. pl. rar. ic.*
cent. 2. t. 3.
- monta- 27. T. caule herbaceo, foliis subcordatis repandis. *Feuill.*
num. *peruv. t. 46.*
- nigrum. 28. S. caule herbaceo, foliis ovatis dentato-angulatis, racemis
distichis nutantibus. *Flor. dan. t. 460.*
- quadran- 29. S. caule herbaceo tetragono scabro, foliis rhombeis denta-
gulare. tis integrisque. *Suppl. p. 147.*
- aethiopi- 30. S. caule herbaceo, foliis ovatis repando-angulatis, pedun-
cum. culis fertilibus unifloris cernuis. *Jacq. b. Vind. 1. t. 12.*
- Melonge- 31. S. caule herbaceo, foliis ovatis tomentosis, pedunculis
na. pendulis incrassatis, calicibus incrinibus. *Regn. bot. t. 60.*
- corymbi- 32. S. caule ramoso herbaceo infra ramoso, foliis ovatis inte-
ferum. gerrimis glabris. *Jacq. collect. 1. p. 78.*
- lyratum. 33. S. caule herbaceo erecto, foliis lyrato-hastatis tomentosis.
Thuub. fl. jap. p. 92.

- scandens. 34. S. caule volubili, foliis cordatis ovatis dependentibus subtus mollissimis, paniculis terminalibus. *Suppl. p. 147.*
- aegyptiacum. 35. S. foliis glabris subangulatis, baccis rubris. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 46. an distincta species?*
- memphiticum. 36. S. foliis integris villosissimis, baccis nigris. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 46. an distincta species?*
- villosum. 37. S. foliis villosis ovalibus basi obliquis margine repandis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 47.*
- ** aculeata.
- coagulans. 38. S. caule subaculeato, foliis ovato-oblongis obtusis sinuatis; costa petioloque calicibusque aculeatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 47.*
- incanum. 39. S. pedunculis, petiolis costisque foliorum aculeatis, floribus racemosis: calicibus subinermibus. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 46.*
- armatum. 40. S. caule procumbente, foliis oblongis dentato-sinuatis glabris aculeatis, pedunculis racemosis oppositifoliis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 47.*
- lanceaefolium. 41. S. caule petiolisque aculeatis, foliis lanceolatis integerrimis. *Jacq. coll. 2. p. 286. pl. rar. ic. cent. 2. fasc. 1. t. 6.*
- paniculatum. 42. S. caule petiolisque aculeatis, foliis sinuato-angulatis supra glabris, floribus paniculatis.
- virginianum. 43. S. caule angulato, foliis pinnatifidis undique aculeatis: lacinii sinuatis obtusis, calicibus aculeatis. *Jacq. pl. rar. ic. cent. 2. t. 5.*
- campechiense. 44. S. caule hirto, foliis cordato-oblongis quinquelobis: sinibus obtusis elevatis. *Mant. p. 340. Dill. h. Elth. t. 268. f. 347.*
- carolinense. 45. S. caule annuo, foliis hastato-angulatis: aculeis utrinque rectis, racemis laxis. *Dill. h. Elth. t. 269. f. 348. β) Jacq. pl. rar. ic. cent. 2. t. 4.*
- mammosum. 46. S. caule herbaceo, foliis cordatis angulato-lobatis: utrinque villosis aculeatis. *Merian. surin. t. 27.*
- ferox. 47. S. caule herbaceo, foliis cordatis angulatis tomentosus aculeatis, baccis hirtis calice obtectis.
- infantum. 48. S. caule herbaceo, foliis ovatis tomentosus, pedunculis pendulis incrassatis, calicibus aculeatis. *Knorr del. hort. 1. t. T. 10.*

- cordatum. 49. S. caule subaculeato fruticoso, foliis cordato-subrotundis integris inermibus, pedunculis lateralibus solitariis unifloris. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 47.*
- aculeatifolium. 50. S. caule suffruticoso foliisque cordatis lobatis dentatis aculeatissimis. *Jacq. coll. I. p. 100.*
- volubile. 51. S. caule fruticoso scandente, foliis angulatis: petiolis, rachibus calicibusque aculeatis, racemis laxis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 47.*
- indicum. 52. S. caule fruticoso, foliis cuneiformibus angulatis subvillosis integerrimis: aculeis utrinque rectis. *Burm. zeyl. t. 102.*
- trifoliatum. 69. S. caule fruticoso, foliis ternatis ovatis integerrimis. *Burm. ind. t. 22. f. 3.*
- fuscatum. 53. S. caule fruticoso, foliis ovatis obtuse lobatis: aculeis utrinque rectis; superioribus coloratis. *an mera campechiensis varietas? Jacq. pl. rar. ic. I. t. 77.*
- sodomeum. 54. S. caule fruticoso-tereti, foliis pinnatifido-sinuatis sparse aculeatis multis, calicibus aculeatis. *Herm. parad. lugdb. t. 575.*
- sanctum. 55. S. caule fruticoso: aculeis tomentosis foliisque oblique ovatis repandis. *Jacq. pl. rar. ic. cent. I. t. 76.*
- hybridum. 56. S. caule fruticoso, foliis ovatis subinermibus acutis repandis tenellis: dorso et oras violacco-pulverulentis. *Jacq. b. Vind. 2. t. 113.*
- coccineum. 57. S. caule fruticoso, foliis ovatis subrepandis uno alterove aculeo armatis subtomentosis. *Jacq. pl. rar. ic. cent. I. t. 24.*
- tomentosum. 58. S. caule fruticoso: aculeis acerosis, foliis cordatis inermibus subrepandis: tenellis purpureo-pulverulentis. *Bocc. sic. t. 8. f. 5.*
- bahamense. 59. S. caule fruticoso, foliis lanceolatis repandis obtusis margine reflexis, racemis simplicibus. *Sloan. hist. jam. I. t. 11. f. 3.*
- igneum. 60. S. caule fruticoso, foliis lanceolatis acuminatis basi utrinque revolutis, racemis simplicibus. *Jacq. b. Vind. t. 14.*
- trilobatum. 61. S. caule fruticoso, foliis cuneiformibus subtrilobis glabris obtusis inermibus. *Burm. ind. t. 22. f. 2.*
- marginatum. 62. S. caule fruticoso, foliis sinuato-angulatis, subtus omnino, superne margine tomentosis, calicibus tripartitis. *Murray comm. Goett. 1783. t. 4.*

- capense. 63. S. caule fruticoso tereti, foliis sinuato-pinnatifidis aculeatis nudis: laciniis alternis integris obtulis. *Suppl. p. 147.*
 zeylanicum. 64. S. caule fruticoso, foliis sinuatis: pedunculis calicibusque aculeatis. *Scopol. del. insubr. 1. p. 1. t. 1. an distincta satis species?*

*** spinosa.

- lycioides. 65. S. caule fruticoso, foliis ellipticis. *Mant. p. 46.*
 stellatum. 66. S. caule fruticoso, foliis lanceolatis integerrimis, pedunculis axillaribus unifloris subgeminis. *Jacq. collect. 3. p. 254.*

252. CAPSICUM. Cor. rotata. Antrum corticosum semibiloculare.

- annuum. 1. C. caule herbaceo, pedunculis solitariis. *Knorr del. hort. 2. t. C. 6.*
 grossum. 2. C. caule suffrutescente, fructibus incrassatis variis. *Mant. p. 47. Besl. b. Eysl. aut. 2. t. 2. f. 1.*
 sinense. 3. C. caule fruticoso, floribus fructibusque pendulis. *Jacq. b. Vind. 3. t. 67.*
 baccatum. 4. C. caule fruticoso laevi, pedunculis geminis. *Sloan, hist. jam. 1. t. 146. f. 2.*
 frutescens. 5. C. caule fruticoso scabriusculo, pedunculis solitariis. *Rumpf amb. 5. t. 88. f. 1. 3. 4.*

253. STRYCHNOS. Cor. 5fida. Bacca ilocularis: cortice lignoso.

- Nux Vomica. 1. Str. foliis ovatis, caule inermi, cymis terminalibus. *Blackw. herb. t. 395.*
 Colubrina. 2. Str. foliis ovatis acutis, cirrhis simplicibus. *Blackw. herb. t. 403. an vere distincta a nuce vomica? Suppl. p. 149.*
 potato-rum. 3. Str. inermis, foliis oppositis ovatis acutis petiolatis, paniculis verticillatis. *Suppl. p. 148.*
 Telankotta. 4. Str. foliis ovato-lanceolatis, umbellis sessilibus. *Retz. obs. bot. 2. p. 22.*

240. GENIPA. *Cor.* rotata. *Stigma* clavatum. *Bacca* 2locularis. *Sem.* nidulantia, cordata.

americana. I. GENIPA. *Plum. ic.* 136. *an ad Gardeniae genus referenda?*

1370. IGNATIA. *Cor.* infundibuliformis longissima. *Cal.* 5dentatus. *Drupa* 10ocularis, polysperma.

amara. I. IGNATIA. *Suppl. p.* 149.

SMITHIA. *Cor.* campanulata, infera, exterius hispida. *Cal.* persistens. *Stil.* simplex. *Drupa* globosa.

Thouinia. I. SMITHIA. *Smith pl. ic. ined.* 1. t. 7.

291. CESTRUM. *Cor.* infundibuliformis. *Stamina* denticulo in medio. *Bacca* 10ocularis polysperma.

- laurifolium. I. C. filamentis denticulatis nudisve, foliis ellipticis coriaceis nitidissimis, pedunculis petiolo brevioribus. *Herit. stirp. nov. 4. p. 69. t. 34.*
- nocturnum. 2. C. filamentis dentatis, pedunculis subracemosis folio aequalibus. *Sloan. hist. jam. 2. t. 204. f. 2. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 77. f. 9.*
- auriculatum. 3. C. filamentis edentulis, stipulis lunatis. *Herit. stirp. nov. 4. p. 71. t. 35.*
- vespertinum. 4. C. filamentis edentulis, corollae tubo filiformi, pedunculis brevissimis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 16.*
- diurnum. 5. C. filamentis edentulis, corollae laciniis subrotundis reflexis, foliis lanceolatis. *Dill. h. Elth. t. 154. f. 186.*
- Parqui. 6. C. filamentis dentatis nudisve, caule florifero paniculato, stipulis linearibus. *Herit. stirp. nov. 4. p. 73. t. 36.*
- tomentosum. 7. C. floribus confertis sessilibus terminalibus: calicibus, foliis ramisque tomentosis. *Suppl. p. 150.*

- hirtum. 8. C. floribus subspicatis axillaribus, foliis subcordatis ovatis acutis: subtus ramulisque hirtis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 49.*
- foetidum. 9. C. corymbo sessili folioso ramulum terminante. *Medic. act. palat. 4. phys. p. 192.*
- * *Jungenda etiam huic generi videtur arbor toxicaria macassaricensis.*

262. LYCIUM. Cor. tubulosa: fauce clausa filamentorum barba. Bacca 2locularis, polysperma.

* *inermia.*

- japonicum. 1. L. foliis ovatis nervosis planis, floribus sessilibus. *Thunb. fl. jap. p. 93.*
- barbatum. 2. L. foliis oblongis glabris, stipulis barbatis, floribus aggregatis pedunculatis. *Suppl. p. 150.*

** *spinosa.*

- afrum. 3. L. foliis fasciculatis linearibus, ramis strictis. *Nissol. act. paris. 1711. t. 12.*
- ruthenicum. 4. L. foliis fasciculatis linearibus, ramis dependentibus. *Murray comm. Goett. 1779. p. 2. t. 2. Pallas fl. ross. t. 49.*
- foetidum. 5. L. foliis oppositis ovato-lanceolatis, stipulis interfoliaceis fetaceo-spinoscentibus, floribus axillaribus sessilibus. *Suppl. p. 150. nonne distincti generis?*
- tetrandrum. 6. L. foliis ovatis obtusis carnosissimis, ramis angulatis glabris, floribus quadrifidis tetrandris. *Suppl. p. 150.*
- heterophyllum. 7. L. foliis ovatis flexuosis glaucis, ramis horizontalibus, spinis gemmaceis. *Murray comm. Goett. 1783. t. 2.*
- barbatum. 8. L. foliis lanceolatis solitariis, ramis dependentibus. *Trem. Ebret. 33. t. 68.*
- europaeum. 9. L. foliis obliquis, ramis flexuosis teretibus. *Mant. p. 47. Mich. nov. pl. gen. t. 105. f. 1.*
- capsulare. 10. L. foliis lanceolatis tenuibus glabris, pedunculis calicibusque pubescentibus, pericarpis capsularibus.

CRYPTOSTOMUM. *Cor.* infundibuliformis: ne-
ctario fornicato, 5denta-
to, orificium claudente.
Bacca globosa 3ocularis.
Semina solitaria.

gujanense. 1. **CRYPTOSTOMUM.** *Aubl. pl. guj. 2. p. 679. t. 274.*

PLACOMA. *Cor.* 5fida. *Cal.* 5dentatus, superus.
Bacca 3ocularis. *Sem.* solitaria,

pendulum. 1. **PLACOMA.** *Ait. hort. Kew. 1.*

254. **JACQUINIA.** *Cor.* 10fida. *Stamina* recepta-
culo inserta. *Bacca* isperma.

armillaris. 1. *J.* foliis obtusis cum acumine. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 56.*

ruscifolia. 2. *J.* foliis lanceolatis acuminatis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 57.*

linearis. 3. *J.* foliis linearibus acuminatis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 58.*

venosa. 4. *J.* foliis ovato-lanceolatis venosis submembranaceis. *Swartz
nov. pl. gen. et sp. p. 47.*

XYSTRIS. *Cor.* 5partita patens: tubo brevissimo.
Filamenta apice divergentia. *Stil.*
2 inferne coaliti. *Drupa* globosa:
basi villosa. *Nux* globosa, 1ocularis.

Schreberi. 1. **XYSTRIS.** *Schreb. gen. pl. Linn. 1. p. 138.*

BASSOVIA. *Cor.* 5fida patens: tubo brevissimo.
Bacca ovata nodulosa, polysperma.

sylvatica. 1. **BASSOVIA.** *Aubl. pl. guj. 1. p. 217. t. 85.*

URCEOLARIA. *Cal.* campanulatus, integerrimus.
Cor. hypoc crateriformis, 5fida.
Stigm. 2clavatum. *Bacca?*

exotica. 1. **URCEOLARIA.** *Willden. op. Cothen. meth. pl. disp. p. 10.*

VALLARIS. *Cal.* 5partitus. *Cor.* hypocrateriformis, 5fida. *Anther.* glanduliferae. *Stigma* crassa. *Pericarpium* - -

indica. I. VALLARIS. *Burm. ind. p.* 51.

MEISTERIA. *Cal.* 5dentatus, *Cor.* 5partita: laciniis concavis, membrana distinctis. *Stigm.* 3ovata. *Pericarpium* - -

anonyma. I. MEISTERIA. *Scopol. introd. g.* 868.

255. CHIRONIA. *Cor.* rotata. *Pistillum* declinatum. *Stamina* tubo corollae infidentia. *Antherae* demum spirales. *Pericarpium* 2loculare.

* *herbaceae.*

- trinervia. I. Ch. foliolis calicinis membranaceo-carinatis. *Burm. zeyl. t.* 67.
- jasminoi- 2. Ch. caule tetragono, foliis lanceolatis.
des.
- lychnoi- 3. Ch. caule simplici, foliis lineari-lanceolatis. *Mant. p.* 207.
des.
- campanu- 4. Ch. foliis sublinearibus, calicibus longitudine corollae.
lata.
- angularis. 5. Ch. caule acutangulo, foliis ovatis amplexicaulibus.
- linoides. 6. Ch. foliis linearibus, calicibus semiquinquefidis obtusis.
Breyn. cent. 175. *t.* 90.
- nudicaul- 7. Ch. caulibus subdiphyllis simplicissimis unifloris, foliis ob-
lis. longis obtusiusculis, calicibus dentibus setaceis. *Suppl. p.* 151.
- dichoto- 8. Ch. caule subtereti dichotomo, foliis sessilibus ovato-lan-
ma. ceolatis, pedunculis elongatis solitariis unifloris. *Walt. flor. carol. p.* 95.
- lanceola- 9. Ch. caule subangulati, foliis lanceolatis remotis, floribus
ta. corymbosis. *Walt. flor. carol. p.* 95.

- dodecan- 10. Ch. caule flexuoso, foliis cuneiformi-oblongis, floribus
dra. subdecemfidis. *Walt. flor. carol. p. 95.*
- decandra. 11. Ch. caule erecto rigido, foliis linearibus, floribus decem-
fidis. *Walt. flor. carol. p. 95.*

** fruticosae.

- baccifera. 12. Ch. caule tetragono, pericarpis baccatis. *Commel. rar.*
9. t. 9.
- frutes- 13. Ch. foliis lanceolatis subtomentosis, calicibus campanula-
cens. tis. *Burm. afr. t. 74. f. 1.*
- tetrago- 14. Ch. foliis ovatis trinerviis obtusiusculis, foliolis calicinis
na. obtusiusculis carinatis. *Suppl. p. 151.*

256. CORDIA. *Cor.* infundibuliformis. *Stilus* di-
chotomus. *Drupa*ilocularis:
nucleo 2-4loculari.

- Gerafcan- 1. C. foliis lanceolato-ovatis scabris, panicula terminali, cali-
thes. cibus decemstriatis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 259. f. 12.*
Brown jam. t. 29. f. 3.
- uglandi- 15. C. foliis oblongis scabris, integerrimis. *Jacq. stirp. amer.*
folia. *pict. t. 44.*
- Sebestena. 2. C. foliis oblongo-ovatis repandis scabris. *Jacq. stirp. amer.*
pict. t. 44.
- dichoto- 3. C. foliis oblongo-ovatis vix crenatis, corymbis dichotomis,
ma. *Forst. fl. austr. p. 18.*
- flaves- 4. C. foliis ovato-oblongis acuminatis integerrimis, racemis
cens. axillaribus. *Aubl. pl. guj. 1. p. 226. t. 89.*
- tetraphyl- 5. C. foliis ovatis quaternis verticillatis, pedunculis corymbi-
la. feris. *Aubl. pl. guj. 1. p. 224. t. 88.*
- aspera. 6. C. foliis ovatis acuminatis asperis, floribus cymosis rugosis.
Forst. fl. austr. p. 18.
- spines- 7. C. foliis ovatis acutis ferratis scabris, petiolis subspinescen-
cens. tibus. *Mant. p. 206.*
- Myxa. 8. C. foliis ovatis supra glabris, corymbis lateralibus, calici-
bus decemstriatis. *Blackw. herb. t. 398. Gaertn. de fr.*
et sem. cent. 5. t. 76. f. 1.

- tetrandra. 9. C. foliis ovatis supra glabris subtus asperis, floribus corym-
bosis tetrandris. *Aubl. pl. guj. I. p. 222. t. 87.*
- macro- 10. C. foliis ovatis villosis sesquipedalibus. *Sloan. hist. jam. 2.*
phylla. *t. 221. f. 1.*
- mieran- 11. C. foliis ellipticis lanceolatis integerrimis membranaceis
tha. venosis, racemis compositis laxis. *Swartz nov. pl. gen.
et sp. p. 47.*
- elliptica. 12. C. foliis ellipticis acuminatis integris coriaceis, racemis
compositis diffusis, drupis acuminatis. *Swartz nov. pl.
gen. et sp. p. 47.*
- Callococ- 13. C. foliis cordato-ovatis integerrimis, floribus corymbosis,
ca. calicibus interne tomentosis. *Sloan. jam. 2. t. 203. f. 2.*
- Toquevé. 14. C. foliis cordatis acuminatis subtus tomentosis, floribus
racemosis. *Aubl. pl. guj. I. p. 228. t. 90.*

MARIPA. Cor. 5fida: tubo longo; fauce patula ven-
tricosa. Cal. 5partitus. Stigma pel-
tatum. Pericarp. 2loculare: loculis
2spermis.

scandens. I. MARIPA. *Aubl. pl. guj. I. p. 230. t. 91.*

208. PATAGONULA. Cor. rotata. Stil. dichoto-
mus. Cal. fructiferus
maximus.

americana. I. PATAGONULA. *Dill. h. Elth. t. 226. f. 293. an distincti a
Cordiis generis?*

257. EHRETIA. Bacca 2locularis. Sem. solitaria,
2locularia. Stigma emarginatum.

spinosa. 1. E. spinosa, foliis oblongis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 259.
f. 14.*

halimifo- 2. E. spinosa, foliis subrotundis glaucis. *Herit. stirp. nov. 3.
lia. p. 45. t. 23. Suppl. p. 150.*

virgata. 3. E. foliis oblongis integris superne scabris, ramis filiformi-
bus, floribus terminalibus sparsis, calicibus hirtutis. *Swartz
nov. pl. gen. et sp. p. 47.*

- dubia. 8. E. foliis oblongo-lanceolatis integerrimis, pedunculis unifloris aggregatis. *Jacq. obs. bot. 1. p. 19.*
- tinifolia. 4. E. foliis oblongo-ovatis integerrimis [glabris, floribus paniculatis. *Trew Ehret. t. 24.*
- Beurreria. 5. E. foliis ovatis integerrimis laevibus, floribus subcorymbosis; calicibus glabris. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 45.*
- interno- 6. E. foliis ovatis integris, floribus paniculatis lateralibus; dis. *Herit. stirp. nov. 3. p. 47. t. 24.*
- Lycium boerhaaviaefolium.
- exsucca. 7. E. foliis cuneiformi-lanceolatis margine reflexis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 259. f. 13.*

258. VARRONIA. Cor. 5fida. Drupa nucleo 4loculari.

- lineata. 1. V. foliis lanceolatis lineatis, pedunculis lateralibus petiolo adnatis, spicis globosis. *Pluckn. alm. t. 328. f. 5.*
- curassavica. 2. V. foliis lanceolatis, spicis oblongis.
- macrosta- 8. V. foliis lanceolato-oblongis, spicis oblongis. *Jacq. stirp. amer.*
- humilis. 9. V. foliis lanceolato-oblongis, spicis subrotundis, nucleo biloculari. *Brown jam. t. 13. f. 2.*
- globosa. 3. V. foliis lanceolato-oblongis, caule dichotomo, pedunculis axillaribus elongatis nudis, spicis globosis.
- bullata. 4. V. foliis ovatis venoso-rugosis, spicis globosis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 43.*
- mirabil- 5. V. foliis ovatis rugosis ferratis, floribus racemosis secundis, loides. corollis hypocrateriformibus. *Swartz n. pl. gen. et sp. p. 48.*
- martini- 6. V. foliis ovatis acuminatis, spicis oblongis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 42.*
- alba. 7. V. foliis cordatis, floribus cymosis. *Commel. h. amstel. 1. t. 80.*

ARDISIA. Cal. 5phyllus. Cor. reflexa 5partita. Anth. magnae, erectae. Stigm. simplex. Drupa isperma, supera.

- tinifolia. 1. A. floribus paniculatis, foliis ellipticis integris nervosis, caule arboreo. *Sloan. hist. jam. 2. t. 205.*

- coriacea. 2. A. floribus paniculatis, foliis oblongis integris aveniis coriaceis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 48.*
- ferrulata. 3. A. floribus paniculatis, foliis ovato-lanceolatis acuminatis rugosis, caule fruticoso pubescente. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 48.*
- lateriflora. 4. A. racemis lateralibus axillaribusve compositis umbellatis, foliis oblongis acuminatis integerrimis, caule fruticoso. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 48.*
- parasitica. 5. A. racemis axillaribus simplicibus, foliis sessilibus lanceolato-ovatis lineatis, caule fruticoso. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 48.*
- excelsa. 6. A. racemis axillaribus, foliis obovatis margine cartilagineo-ferratis. *Ait. hort. Kew. I. p. 261.*

259. LAUGERIA. Cor. 5fida. Drupa nucleo 2-vel 5loculari.

- odorata. 1. L. caule subspinoso, foliis subovatis acutis glabris, racemis paniculatis, nucleis quinquelocularibus. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 259. f. 16.*
- tomentosa. 2. L. foliis ovatis acutis integris subtus tomentosis, racemis dichotomis, nucleo biloculari. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 48.*
- lucida. 3. L. foliis oblongis obtusis integris membranaceis nitidis, racemis dichotomis, nucibus bilocularibus. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 48.*

263. CHRYSOPHYLLUM. Cor. campanulata, 10fida: laciniis alternis patulis. Bacca 10sperma, rarius 1sperma.

- Cainito. 1. Chr. foliis ovatis parallele striatis subtus tomentoso-nitidis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 51.*
 β) Chr. foliis subtus ferrugineis, superne glabris. γ) *Brown jam. t. 14. f. 2.* δ) *Jacq. stirp. amer. pict. t. 52.* ε) *Jacq. stirp. amer. pict. t. 53.*
- monopyrenum. 2. Chr. foliis ellipticis acuminatis subtus tomentoso-aureis, fructu ovato monospermo. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 49.* 3. Chr.

- microcar- 3. Chr. foliis ovatis glabris subtus pubescentibus, baccis ob-
pum. longis obliquis monospermis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 49.*
- argente- 4. Chr. foliis falcato-ovatis subtus tomentoso-nitidis. *Jacq.*
um. *stirp. amer. pict. t. 54.*
- rugosum. 5. Chr. foliis oblongis acuminatis utrinque glabris, fructu acu-
minato rugoso. *Swartz. nov. pl. gen. et sp. p. 49.*
- glabrum. 6. Chr. foliis utrinque glaberrimis. *Jacq. stirp. amer. pict.*
t. 55.
- Macucu. 7. Chr. foliis utrinque glabris ovato-oblongis acuminatis.
Aubl. pl. guj. 1. p. 233. t. 92.

RINOREA. *Petala* 10: interiora minora. *Cal.* 5partitus. *Anther.* 2valves. *Germen et stilius* villosus. *Stigma* obtusum.

gujanensis. I. RINOREA. *Aubl. pl. guj. 1. p. 235. t. 93.*

RIANA. *Petala* 10ovata. *Cal.* 5partitus. *Germen* villosum. *Stilus* carnosus. *Stigm.* capitatum.

gujanensis. I. RIANA. *Aubl. pl. guj. 1. p. 237. t. 94.*

CONOHORIA. *Petala* 5 incumbentia et tubum slobum referentia. *Cal.* 5partitus. *Stilus* flexuosus. *Stigma* capitatum.

flavescens. I. CONOHORIA. *Aubl. pl. guj. 1. p. 239.*

264. SIDEROXYLON. *Cor.* 5fida: *Nectarium* (plurimis) squamis 5. *Stigma* simplex. *Bacca* 5perma.

* *inermia.*

mite. I. S. floribus sessilibus corollae nectario nullo. *Mill. ic. t. 299.*
Commel. h. Amstel. 2. t. 100.

2. S.

- ob-
i. es
facq.
acu-
piet.
natis.
par-
fli-
- inermis. 2. *S. foliis perennantibus obovatis, pedunculis teretibus. Dill. b. Elth. t. 265. f. 344.*
- melano-
phleum. 3. *S. foliis perennantibus lanceolatis, pedunculis angulatis, nectario nullo. Jacq. b. Vind. 1. t. 71. Mant. p. 48.*
- Masticho-
dendron. 4. *S. foliis perennantibus lanceolatis, pedunculis unifloris, floribus nectario instructis. Catesb. Carol. 2. p. 75. t. 75.*
- foetidissi-
mum. 5. *S. foliis suboppositis, floribus patentissimis. Mant. p. 49.*
β) Sideroxylum pauciflorum. Jacq. st. am. p. 55.
- cymo-
sum. 6. *S. foliis oppositis petiolatis, cymis compositis et decompositis. Suppl. p. 152.*
- sericeum. 7. *S. foliis obovato-lanceolatis subtus sericeo-tomentosis, baecis ovalibus. Walt. flor. carol. p. 100.*

** spinosa.

- vil-
api-
decan-
drum.
spinosum.
laeve.
- tenax. 8. *S. subinermis, foliis deciduis lanceolatis subtus tomentosis, pedunculis filiformibus. Mant. p. 48. Jacq. obs. bot. 3. t. 54.*
- lycioides. 9. *S. foliis deciduis lanceolatis utrinque lucidis. Du Hamel arb. 2. t. 68.*
10. *S. foliis deciduis ellipticis. Mant. p. 48.*
11. *S. foliis perennantibus. Comuel. b. Amstel. 1. t. 83.*
12. *S. foliis ellipticis laevibus subperennantibus: spinis foliiferis, pedunculis unifloris. Walt. flor. Carol. p. 100.*

BUMELIA. Cor. 5fida. Nectarium 5phyllum. Drupa isperma.

- plu-
tig-
ucca
299.
2. S.
- nigra. 1. *B. ramis virgatis patentibus, foliis terminalibus oblongo lanceolatis glabris margine undulatis, ramulis floriferis. Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 49.*
- pallida. 2. *B. ramis erectis, foliis terminalibus ellipticis obtusis, floribus confertis lateralibus. Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 49.*
- retusa. 3. *B. foliis oppositis cuneato-ovatis retusis rigidis, floribus confertis axillaribus. Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 49.*
- montana. 4. *B. foliis sparsis alternis oblongis apice obtusis, floribus axillaribus pedunculatis. Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 49.*

5. B.

- rotundi- 5. B. foliis suborbiculatis marginatis venosis coriaceis utrinque
folia. glabris. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 50.*
- falicifo- 6. B. foliis lanceolato-ovatis acuminatis, floribus confertis
lia. axillaribus lateralibusque. *Syst. nat. XII. 3. p. 251.* *Achras*
falicifolia.
- pentago- 7. B. foliis lanceolatis acuminatis nitidis, floribus axillaribus,
na. drupis pentagonis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 50.*

MANGLILLA. Cor. rotata, 5partita. Cal. mini-
nimus, 5partitus. Stil. o. Dru-
pa globosailocularis, isperma.

peruviana. I. MANGLILLA. *Jussieu gen. plant. p. 151.*

265. **RHAMNUS.** Cal. tubulosus: squamis stamina
munientibus. Cor. o. Drupa.

* *Spinosi.*

- catharti- 1. Rh. spinis terminalibus, floribus quadrifidis dioicis, foliis
cus. ovatis, caule erecto. *Regn. bot. t. 315.*
- buxifo- 44. Rh. spinis terminalibus, foliis ovatis integerrimis. *Poir.*
lius. *voy. en Barb. 2. p. 127.*
- infecto- 2. Rh. spinis annotinis terminalibus, floribus quadrifidis dioi-
rius. cis, caulibus procumbentibus, foliis ovato-lanceolatis re-
pando-ferrulatis. *Mant. p. 49.* *Arduin. mem. I. t. 14.*
- lycioides. 3. Rh. spinis terminalibus, foliis linearibus.
- oleoides. 4. Rh. spinis terminalibus, foliis oblongis integerrimis.
- crenula- 41. Rh. ramulis spiniscentibus, floribus dioicis quadrifidis tri-
tus. fidisve, foliis oblongis obtuse ferratis sempervirentibus.
Ait. hort. Kew. I. p. 263.
- saxatilis. 5. Rh. spinis terminalibus, floribus quadrifidis nunc herma-
phroditis nunc monoicis. *Jacq. fl. austr. I. t. 53.*
- theezans. 6. Rh. spinis terminalibus, foliis ovatis ferrulatis, ramis diva-
ricatis. *Mant. p. 207.*
- penta- 7. Rh. spinis lateralibus, foliis solitariis quinatisque. *Syst. nat.*
phyllus. XII. 4. p. 229. *Rhamnus ficulus.* *Bocc. sic. t. 21.*

** *Inermes.*

- Sarcom- 8. Rh. foliis ovalibus coriaceis integerrimis emarginatis.
phalus. 45. Rh.

- hydrien- 45. Rh. foliis ovalibus subdentatis glabris subtus albidis. *Hacq. pl. carn. alp. t. 2. f. 2.*
- myrtinus. 46. Rh. foliis ovato-oblongis integerrimis subtus lucidis. *Burm. ind.*
- volubilis. 9. Rh. caule volubili, foliis integerrimis ovatis striatis. *Suppl. p. 152.*
- scandens. 39. Rh. caule volubili, foliis subovatis undulato-ferratis, floribus dioicis. *Walt. flor. carol. p. 101.*
- carolinia- 40. Rh. caule erecto, foliis laevibus oblongo-ovatis ferrulatis nus. subperennantibus, floribus hermaphroditis. *Walt. flor. carol. p. 101.*
- tetrago- 10. Rh. foliis ovatis integris glabris sessilibus, ramis tetrago- nus. *Suppl. p. 153.*
- Micran- 11. Rh. foliis ovato lanceolatis obliquis pubescentibus, stipu- thus. lis lanceolatis acuminatis deciduis. *Brown. jam. t. 12. f. 2. an Celtis species?*
- cubensis. 12. Rh. floribus hermaphroditis, capsulis trilocularibus, foliis rugosis integerrimis tomentosis. *Jacq. b. Vind. 3. t. 49.*
- ellipticus. 13. Rh. floribus hermaphroditis, subtrigynis axillaribus um- bellatis, fructibus trilocularibus, foliis ellipticis integris. *Brown. jam. p. 172. n. 1. t. 29. f. 2.*
- myrtaci- 42. Rh. floribus hermaphroditis trigynis, foliis cordatis, ra- nus. mis cirrhiferis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 266.*
- glandulo- 43. Rh. floribus hermaphroditis racemosis, foliis ovatis obtuse fus. serratis glabris basi glandulosis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 265.*
- Sphaero- 14. Rh. floribus hermaphroditis racemulosis, baccis subrotun- spermos. dis trilocularibus pellucidis, foliis oblongis serratis gla- bris. *Swartz n. pl. gen. et. sp. p. 50.*
- colubri- 15. Rh. floribus monogynis hermaphroditis erectis, capsulis nus. tricoccis, petiolis ferrugineo-tomentosis. *Jacq. b. Vind. 3. t. 50.*
- alpinus. 16. Rh. floribus quadrifidis dioicis, foliis ovato-lanceolatis glanduloso-crenatis. *Hall. hist. stirp. Helv. t. 40.*
- pumilus. 17. Rh. repens, floribus nunc dioicis, nunc hermaphroditis, foliis ferratis. *Mant. p. 49. Wulf. ap. Jacq. coll. 2. p. 141. t. 11.*
- Frangula. 18. Rh. floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerrimis. *Flor. dan. t. 278. Drupa clausa officulis 4.*

19. Rh.

- lineatus. 19. Rh. floribus hermaphroditis, foliis ovatis lineatis repandis
subtus reticulatis. *Burm. zeyl. t. 88.*
- Alater- 20. Rh. floribus dioicis stigmate triplici, foliis ferratis. *Kniph.*
nus. *bot. orig. cent. 7. n. 75. Drupa clausa: officulis pluribus.*
- rupestris. 21. Rh. floribus dioicis, caule humilimo, foliis subrotundo-
acutis integerrimis. *Vill. pl. delph. 2. p. 531.*
- danuri- 22. Rh. floribus dioicis, foliis ovato-acuminatis argute ferrula-
cus. *tis. Pall. it. 3. p. 721. Ann. ruth. p. 200. t. 33.*
- Erythro- 23. Rh. floribus dioicis, foliis lanceolato-linearibus subtiliter
xylon. *ferratis. Pall. it. 3. p. 722. t. 1. f. 1.*
- furina- 24. Rh. foliis perennantibus ellipticis argute dentatis nitidis
mensis. *glabris. Scop. del. inf. 3. p. 10. t. 5.*
- hybridus. 25. Rh. floribus androgynis, foliis oblongis acuminatis ferra-
tis vix perennantibus. *Herit. fert. angl. p. 5.*
- alnifolius. 26. Rh. floribus hermaphroditis, foliis ovalibus acuminatis fer-
ratis subtus reticulatis. *Herit. fert. angl. p. 5.*
- latifolius. 27. Rh. floribus monogynis hermaphroditis: calicibus villosis,
foliis ellipticis integerrimis. *Herit. fert. angl. p. 5. t. 8.*
- prinoides. 28. Rh. floribus polygamis, stilo subtriplici, foliis ovatis ferra-
tis. *Herit. fert. angl. p. 6. t. 9.*

*** *Aculeati.*

- Paliurus. 29. Rh. aculeis geminatis: inferiore reflexo, floribus trigynis.
Beol. b. Eyst. aest. 3. t. 9. f. 1. Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 43. f. 5. Drupa corticosa 3locularis.
- Lotus. 30. Rh. aculeis geminatis: altero recurvo, foliis ovato-oblon-
gis. *Shaw. afr. p. 631. ic.*
- Zizyphus. 31. Rh. aculeis geminatis: altero recurvo, floribus digynis,
foliis ovato-oblongis. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 43. f. 4. Regn. bot. t. 63. Drupa 2locularis, 1pyrena.*
- iguaneus. 32. Rh. aculeis geminatis: altero patente, racemis axillaribus
monoicis, foliis nudis. *Commel. b. Amstel. 1. t. 73. an Celtis species?*
- Spina 33. Rh. aculeis geminatis rectis, foliis ovatis. *Pluckn. alm.*
Christi. *t. 197. f. 3.*
- heteroge- 47. Rh. aculeis geminis simplicibus recurvis, foliis ovatis fer-
neus. *rulatis trinerviis lucidis, pedunculis solitariis unifloris. Burm. ind.*

- Napeca. 34. Rh. aculeis subgeminatis recurvis, pedunculis corymbosis, floribus semidigynis, foliis ferratis utrinque laevibus. *Rumpf amb. 2. t. 42.*
- Jujuba. 35. Rh. aculeis solitariis recurvis, pedunculis aggregatis, floribus semidigynis, foliis retusis subtus tomentosis. *Rumpf. amb. 2. t. 36. Gaertn. de fr. et sem. cent. 43. t. 4.*
- Oenoplia. 36. Rh. aculeis solitariis recurvis, floribus aggregatis subsessilibus, foliis semicordatis subtus tomentosis. *Burm. zeyl. t. 61.*
- circum- 37. Rh. aculeis solitariis recurvis oppositifoliis, foliis oppositis
sessus. bifariis obovatis. *Suppl. p. 152.*
- Numula- 48. Rh. aculeis solitariis geminisque recurvis, foliis ovatis in-
ria. tegerrimis, pedunculis corymbosis. *Pluckn. alm. t. 197.*
- Xylopy- 38. Rh. aculeis recurvis, foliis ovatis subtus tomentosis, flori-
rus. bus corymbosis. *Retz. obs. bot. 2. p. 21.*

266. PHYLICA. *Perianth. 5partitum turbinatum. Petala 0. Squamae 5 stamina munientes. Caps. 3cocca, infera, coronata.*

- ericoides. 1. Ph. foliis linearibus verticillatis. *Commel. b. Amst. 2. t. 1. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 24. f. 7.*
- pubes- 2. Ph. foliis linearibus acutis pilosis subtus tomentosis, flori-
cens. bus spicatis: bracteis villosis filiformibus. *Ait. hort. Kew. 1. p. 268.*
- eriphos- 3. Ph. foliis linearibus subpilosis subtus tomentosis margine re-
ros. volutis, capitulis terminalibus tomentosis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 268.*
- bicolor. 4. Ph. foliis linearibus pubescentibus, calicibus communibus
corolla brevioribus. *Mant. p. 208.*
- imberbis. 5. Ph. foliis linearibus obtusis scabris, floribus terminalibus.
Seb. mus. 2. t. 49. f. 5.
- stipularis. 6. Ph. foliis linearibus stipulatis, floribus quinquecornibus.
Burm. afr. t. 43. f. 2.
- strigosa. 16. Ph. foliis lineari-lanceolatis: ramorum glabriusculis; ra-
mulorum hirsuto-substrigosis, capitulis terminalibus so-
litariis sessilibus strigosis. *Berg. fl. cap.*

- plumosa. 7. Ph. foliis lineari-subulatis: summis hirsutis. *Seb. musf. I. t. 23. f. 4. 5. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 24. f. 7.*
- parviflora. 8. Ph. foliis subulatis acutis scabris subpilosis, ramis paniculato-multifloris. *Mant. p. 209.*
- pinifolia. 9. Ph. foliis acerosis utrinque planis glaberrimis, floribus paniculato-racemosis. *Suppl. p. 153.*
- spicata. 10. Ph. foliis cordato-sagittatis subtus tomentosis supra glaberrimis acuminatis pungentibus, spicis lanatis. *Suppl. p. 153.*
- callosa. 11. Ph. foliis cordatis lanceolatis subtus tomentosis supra papillofis apice pungentibus, floribus capitatis villosis. *Suppl. p. 153.*
- dioica. 12. Ph. foliis cordatis, floribus dioicis. *Mant. p. 342.*
- cordata. 13. Ph. foliis cordato-ovatis patentibus, caule proliifero. *Commel. rar. t. 12.*
- buxifolia. 14. Ph. foliis ovatis sparsis ternisque subtus tomentosis. *Burm. afr. t. 44. f. 1.*
- racemosa. 15. Ph. foliis ovatis glabris, floribus simplicibus paniculato-racemosis.

CARPODETUS. *Cal.* 5dentatus, germine adnatus.
Cor. 5petala. *Stigma* capitato-depressum. *Bacca* globosa 5locularis.

ferratus. I. CARPODETUS. *Forst. char. gen. p. 17. t. 17.*

267. **CEANOTHUS.** *Petala* 5faccata, fornicata.
Bacca sicca, 3locularis, 3sperma.

americana- I. C. foliis trinerviis. *Commel. h. amst. I. t. 86.*
nus.

reclinatus. 2. C. foliis ovatis integris multinerviis, ramis dependentibus. *Brown. jam. p. 172. t. 29. f. 2.*

asiaticus. 3. C. foliis ovatis enerviis. *Burm. zeyl. t. 48.*

africanus. 4. C. foliis lanceolatis enerviis, stipulis subrotundis. *Mant. p. 342. Pluckn. phyt. 126. f. 1.*

5. C.

- capfula- 5. C. foliis ovato-cordatis acuminatis ferratis, capsulis trival-
ris. vibus dehiscentibus. *Forsk. fl. austr. p. 18.*

TURIA. *Flores monoici. Pomum rotundatum, iosul-
catum, calice patente, stilo, stigmati-
bus, staminumque rudimentis corona-
tum.*

- cylindri- 1. T. pomis cylindricis utrinque attenuatis villosis, caule vo-
ca. lubili quinquangulati scabro, foliis palmatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 165.*

- Leloja. 2. T. pomis conicis glabris, caule volubili, foliis trilobis.
Forsk. fl. aeg. ar. b. p. 165.

- cordata. 3. T. foliis cordato-angulatis ciliatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 166.*

- Gijef. 4. T. pomis ovatis glabris, caule volubili scabro, sexangulati,
foliis trilobis denticulatis utrinque scabris. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 166.*

- Moghadd. 5. T. pomis ovali-oblongis glaberrimis, caule terete laevi,
foliis trilobis: lateralibus subtrilobis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 166.*

MAESA. *Perianth. duplex: exterius inferum, 2phyl-
lum, persistens, inferius germini ad-
nat. 1phyllum, 5dentatum. Cor. cam-
panulata, 5fida. Bacca infera, globo-
sailocularis, polysperma.*

- arabica. 1. MAESA. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 66.*

1250. ARDUINA. *Cor. 1petala. Stigma 2fidum.
Bacca 2locularis. Sem. soli-
taria.*

- bispinosa. 1. ARDUINA. *Mant. p. 52. Mill. ic. t. 300.*

CAMAX. *Cor. 1petala, rotata. Stigma 3-4. Bacca ova-
ta, villosa, 4locularis, polysperma.*

- gujanensis. 1. CAMAX. *Aubl. pl. guj. 1. p. 198. t. 78.*

268. BÜTTNERA. Cor. 5petala. Filamenta apice peralis connata. Caps. 5cocca muricata.

- scabra. 1. B. foliis lanceolatis: costa petiolisque aculeatis. *Aubl. pl. guj. 1. t. 96.*
- carthagenensis. 2. B. foliis ovatis: costa petiolisque aculeatis. *Jacq. stirp. amer. pict. p. 41. Cavanill. diff. 5. t. 149. f. 2?*
- microphylla. 3. B. ramis flexuosis laevibus, foliis inermibus. *Mant. p. 107. Jacq. b. Vind. 1. t. 29.*
- cordata. 4. B. foliis cordatis acuminatis ferratis subtus pubescentibus: petiolis inermibus. *Cavanill. diff. 5. p. 291. t. 150.*
- ovata. 5. B. foliis ovatis ferratis: petiolis inermibus, ramis quinqueangularibus aculeatis caule erecto. *Cavanill. diff. 5. p. 291. t. 149. f. 1. an totum genus monadelphis potius accensendum?*

269. MYRSINE. Cor. semiquinquefida, connivens. Germen corollam replens. Baccailocularis, ovulis immaturis 5, semine maturo 1. aut 2.

- africana. 1. M. baccis glabris, foliis acutis. *Commel. h. amst. 1. t. 64. Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. t. 59. f. 1.*
- retusa. 2. M. baccis glabris, foliis obtusis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 271.*
- scabra. 3. M. baccis tuberculatis. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. p. 282. t. 59. f. 1.*

BLADHIA. Cor. rotata, decidua. Baccaisperma. Sem. arillatum.

- japonica. 1. Bl. foliis ferratis glabris. *Thunb. nov. pl. gen. 1. p. 7. ic.*
- villosa. 2. Bl. foliis ferratis villosis. *Thunb. fl. jap. p. 96.*
- crispa. 3. Bl. foliis oblongis crispis glabris. *Thunb. fl. jap. p. 97.*

PLOTEA. Cal. 5dentatus. Cor. rosacea, 5fida. Baccaisperma.

- Adansoni. 1. PLOTEA. *Scopol. introd. gen. 868.*

ANTURA. *Cal.* 5partitus persistens. *Cor.* 1petala,
5partita. *Bacca* supera, ovalis,
2locularis: loculis 2spermis.

Hadensis. I. ANTURA. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 63.*

1276, LEEA. *Flores* monoici. *Cal.* 5fidus. *Cor.*
5fida: *nectarium* tubi cylindri-
cum.

♀. *Pericarp.* 6locular. *Sem.* solitaria.

aequata. I. L. caule tereti pubescente. *Mant. p. 124.*

crispa. 2. L. caule angulato fimbriato. *Mant. p. 124.*

1281, CANARIUM. *Flores* dioici. *Cal.* 2phyllus.
Cor. 3petala.

♀. *Stigm.* sessile. *Drupa* nu-
ce trigona.

commune. I. CANARIUM. *Rumpf amb. 2. t. 47.*

CADABA. *Cal.* 4phyllus, deciduus. *Cor.* 4petala.
Nectar. tubulosum. *Caps.* pedicel-
lata, cylindrica, 1locularis, 2valvis,
poly sperma.

rotundi- I. C. foliis orbiculatis glabris. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 68.*
folia.

farinosa. 2. C. foliis ovatis oblongis farinosis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 68.*

glandulo- 3. C. ramis; foliis, calice pistilloque glandulosis villosis.
sa. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 68.*

270, CELASTRUS. *Cor.* 5petala, patens. *Caps.*
3angularis, 3locularis.
Sem. calyptata.

* *inermes.*

scandens. I. C. caule volubili, *Du Hamel arbr. 1. t. 95. Theca antrorsa.*

- punctatus. 2. *C. ramis scandentibus punctatis, foliis ovatis ferratis. Thunb. fl. jap. p. 97.*
- procumbens. 3. *C. procumbens, foliis ovatis ferratis, floribus axillaribus subfoliariis. Suppl. p. 153.*
- friatus. 4. *C. ramulis erectis striatis, foliis ovatis acuminatis ferratis, pedunculis sparsis unifloris. Thunb. fl. jap. p. 98.*
- acuminatus. 5. *C. foliis ovatis acuminatis ferratis, pedunculis axillaribus unifloris, caule erecto laxo. Suppl. p. 154.*
- myrtifolius. 6. *C. foliis ovatis ferrulatis, floribus racemosis, caule erecto. Sloan. hist. jam. 2. t. 193. f. 1.*
- crenatus. 7. *C. foliis ovatis crenulatis, cymis axillaribus. Forst. fl. austr. p. 19.*
- microphyllus. 8. *C. foliis ovatis obtusis integris, cymis terminalibus dichotomis. Suppl. p. 154.*
- bullatus. 9. *C. foliis ovatis integerrimis. Pluckn. alm. t. 28. f. 5.*
- castinoides. 10. *C. foliis ovatis utrinque acutis laxe dentatis perennantibus, floribus axillaribus. Herit. fert. angl. p. 6. t. 10.*
- lucidus. 11. *C. foliis ovalibus nitidis integerrimis marginatis. Mant. p. 49. Herit. stirp. nov. 3. t. 25.*
- octogonatus. 12. *C. foliis ellipticis angulatis subnerviis perennantibus, capsulis bivalvibus monospermis. Herit. fert. angl. p. 7.*
- undulatus. 13. *C. foliis lanceolatis suboppositis undulatis, capsulis bivalvibus polyspermis. Herit. fert. angl. p. 7.*
- orbiculatus. 15. *C. foliis rotundatis acuminatis ferratis, pedunculis axillaribus subtrifidis. Thunb. fl. jap. p. 97.*
- filiformis. 16. *C. foliis lanceolatis integris, ramis filiformibus, pedunculis axillaribus unifloris. Suppl. p. 153.*
- alatus. 17. *C. ramis alatis. Thunb. fl. jap. p. 98.*

** *spinosi*.

- pyracanthus. 18. *C. spinis nudis, ramis teretibus, foliis acutis. Pluckn. phyt. t. 126. f. 2. 3.*
- buxifolius. 19. *C. spinis foliosis, ramis angulatis, foliis obtusis. Pluckn. phyt. t. 202. f. 3.*
- integrifolius. 20. *C. spinis foliosis, foliis ovatis obtusis integerrimis, cymis lateralibus. Suppl. p. 153.*
- linearis. 21. *C. spinis foliosis, foliis linearibus integris. Suppl. p. 153.*

RUYSCHIA. *Cal.* 5phyllus, bractea clavata subje-
cta. *Cor.* reflexa. *Stil.* o. *Fruct.*
polypermus.

clusiaefo- 1. R. foliis obovatis integris aveniis, floribus bractea solitaria.
lia. *Jacq. stirp. amer. t. 51. f. 2.*

Surubea. 2. R. foliis obovatis emarginatis apice denticulatis venosis, flo-
ribus bracteis tripartitis. *Aubl. pl. guj. p. 244. t. 97.*

271. EUONYMUS. *Cor.* 5petala. *Capf.* colorata,
5gona, 5locularis, 5val-
vis. *Theca* antrofa. *Sem.*
calyptrata.

america- 1. E. floribus omnibus quinquefidis, foliis sessilibus integer-
nus. rimis. *Commel. b. amst. 1. t. 81.*

Tobira. 2. E. floribus quinquefidis, foliis oblongis retusis integris.
Thunb. fl. jap. p. 99. Kaempf. amoen. exot. 5. p. 797. ic.

inermis. 3. E. floribus quinquefidis, foliis alternis ovatis ferrulatis.
Forsk. fl. aeg. arab. p. 204.

latifolius. 4. E. floribus plurimis quinquefidis, capsulis alato-angulatis:
pedunculis foliis longioribus. *Jacq. fl. austr. 3. t. 289.*

europae- 5. E. floribus plurimis quadrifidis, foliis sessilibus. *Bulliard.*
us. *herb. Franc. t. 135.*

verruco- 6. E. floribus omnibus quadrifidis, ramis verrucosis. *Suppl. p.*
sus. *154. Jacq. fl. austr. 1. t. 49.*

atropur- 7. E. floribus omnibus quadrifidis, ramis glabris, foliis petio-
pureus. latis acutis. *Jacq. b. Vind. 2. t. 120.*

japonicus. 8. E. floribus quadrifidis, foliis ovatis obtusis ferratis. *Suppl.*
p. 154.

POLYCARDIA. *Cor.* 5petala. *Capf.* coriacea, 5lo-
cularis, 5valvis. *Semina* pau-
ca ad hilum femiarillata: aril-
lo laciniato.

madagaf- 1. POLYCARDIA. *Jussieu gen. plant. p. 377.*
cariensis.

COLLETIA. *Cor.* 0. *Cal.* urceolatus, 5fidus, basi
intus plicis 5. *Germen* 3gonum.
Stigm. 3lobum. *Capsf.* 3cocca, 3-
sperma.

spinosissi- I. COLLETIA. *Jussieu gen. plant. p. 380.*
ma.

RUBENTIA. *Cor.* 5petala, patens. *Cal.* 5partitus.
Drupa ovata: *Nux* 2ocularis, 2-
sperma.

olivina. I. RUBENTIA. *Jussieu gen. plant. p. 378.*

HYPERANTHERA. *Cor.* 5petala: petalo uno ma-
jore superiore. *Cal.* 5par-
titus. *Filamenta* 9, 5tan-
tum fertilia, quorum 1
reliquis superius. *Legu-*
men 6carinatum, torulo-
sum.

arborea. I. HYPERANTHERA. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 67. an forsan cas-*
siae species anomala?

DIGERA. *Cor.* 3petala. *Nectar.* breve. *Cal.* 5phyl-
lus. *Drupa* globosa, calice corolla-
que clausa, apice 2dentata: *Nux* 1o-
cularis, 1sperma.

arvensis. I. DIGERA. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 65. an Achyranthae species?*

272. **DIOSMA.** *Cor.* 5petala. *Nectararia* 5supra ger-
men. *Capsf.* 3-5coalitae. *Sem.*
calyptrata.

fucculen- 22. D. foliis oppositis carnosis supra canaliculatis: inferioribus
tum, femiteretibus; superioribus triangularibus aculeato-cilia-
tis. *Berg. fl. cap.*

- oppositi- 1. D. foliis subulatis acutis oppositis. *Seb. mus. 2. t. 40. f. 5.*
 folium. *Nectarium 5plicatum.*
 hirsutum. 2. D. foliis linearibus hirsutis. *Commel. rar. 3. t. 3.*
 rubrum. 3. D. foliis linearibus mucronatis glabris carinatis subtus bifariam punctatis. *Commel. rar. 2. t. 2.*
 capense. 4. D. foliis linearibus triquetris subtus punctatis. *Syst. nat. XII 3. p. 625.* *Hartogia capensis.*
 capitatum. 5. D. foliis linearibus imbricatis scabris ciliatis, floribus capitato-spicatis. *Mant. p. 210.*
 ericoides. 6. D. foliis lineari-lanceolatis subtus convexis bifariam imbricatis. *Pluckn. amalb. t. 279. f. 5.*
 unicapsum. 7. D. foliis lineari-lanceolatis, capsulis unilocularibus. *Suppl. p. 155.*
 corymbosum. 8. D. foliis ovato-lanceolatis carnosissimis integerrimis. *Montin. act. Lundin. I. 2. n. 11. ic.*
 ciliatum. 9. D. foliis lanceolatis ciliatis rugosis. *Syst. nat. XII. 3. p. 625.* *Hartogia ciliaris. Seb. mus. 2. t. 17. f. 5.*
 bifidum. 21. D. foliis lanceolatis imbricatis, pedunculis aggregatis terminalibus, petalis bifidis. *Jacq. coll. 3. p. 278. t. 20. f. 1.*
 crenatum. 10. D. foliis lanceolato-ovalibus oppositis glandulosis crenatis, floribus solitariis. *Berg. cap. 67.*
 lanceolatum. 11. D. foliis ellipticis obtusis glabris. *Syst. nat. XII. 3. p. 625.* *Hartogia lanceolata.*
 odoratissimum. 12. D. foliis ovatis glandulosis crenatis, floribus geminis axillaribus, nectariis petaloideis. *Montin. act. Lundin. I. 2. n. 11. ic. an satis distinctum a pulchello?*
 pulchellum. 13. D. foliis ovatis obtusis glanduloso-crenatis, floribus geminis axillaribus. *Syst. nat. XII. 3. p. 625.* *Hartogia pulchella.*
 imbricatum. 14. D. foliis ovatis mucronatis imbricatis ciliatis. *Mant. p. 124.* *Syst. nat. XII. 3. p. 625.* *Hartogia imbricata. Magaz. für die Botan. 7. t. 3.*
 cupressinum. 15. D. foliis ovatis triquetris imbricatis, floribus solitariis terminalibus sessilibus. *Mant. p. 50.*
 latifolium. 16. D. foliis ovatis crenatis, pedunculis axillaribus solitariis, caule villosis. *Suppl. p. 154.*
 uniflorum. 17. D. foliis ovato-oblongis, floribus solitariis terminalibus. *Pluckn. mant. t. 342. f. 5.*

- villosum. 23. D. foliis ovato-oblongis acutiusculis subsessilibus villosis, floribus terminalibus angustis. *Berg. fl. cap.*
- marginatum. 18. D. foliis cordato-attenuatis membranaceo-marginatis, *Suppl. p. 155.*
- barbigerum. 19. D. foliis cordatis amplexicaulibus, petalis barbatis. *Suppl. p. 155.*
- tetragonum. 20. D. foliis cordatis retusis complicato-carinatis ciliatis, ramis unifloris. *Suppl. p. 155.*

HOVENIA. *Petala 5 convoluta. Stigma 3fidum. Caps. 2locularis, 3valvis.*

- dulcis. I. HOVENIA. *Thunb. fl. jap. p. 101. Kaempf. amoen. ex. 5. p. 808. ic. p. 809.*

274. BRUNIA. *Flores aggregati. Filamenta unguibus petalorum inserta. Stigma 2fidum. Drupa sicca, infera, 2locularis. Sem. pauca, compressa.*

- nodiflora. I. Br. foliis imbricatis triquetris acutis. *Mant. p. 343. Pluckn. mant. t. 346. f. 4. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 31. f. 10.*
- paleacea. 2. Br. foliis quinquefariam imbricatis appressis, corymbo terminali, paleis capitulorum exsertis. *Mant. p. 559.*
- lanuginosa. 3. Br. foliis linearibus patulis apice callosis. *Pluckn. alm. t. 318. f. 4.*
- radiata. 4. Br. foliis linearibus triquetris, calice radiante: foliolis intimis coloratis. *Syst. nat. XII. 3. p. 180. Phylica radiata.*
- glutinosa. 5. Br. foliis linearibus triquetris, calice radiante foliolis omnibus coloratis. *Mant. p. 210.*
- verticillata. 6. Br. foliis triquetris, ramulis verticillatis fastigiatis, capitulis terminalibus glabris. *Suppl. p. 156.*
- abrotanoides. 7. Br. foliis lineari-lanceolatis patentibus triquetris apice callosis. *Burm. afr. t. 100. f. 1.*
- ciliata. 8. Br. foliis ovatis acuminatis ciliatis.

1247. CYRILLA. *Petala* acuta, receptaculo inserta.
Stilus 2fidus, persistens.
Caps. 2locularis.

racemiflo- I. CYRILLA. *Mant.* p. 50. *an cum Itea in unum genus con-*
ra. jungenda?

275. ITEA. *Petala* longa, calici inserta. *Caps.* 1lo-
 cularis, 2valvis.

virginica. I. ITEA. *Du Hamel arb.* I. t. 126.

GERUMA. *Cal.* 5phyllus, 5dentatus, persistens. *Cor.*
 5petala, calice longior. *Stigma* 3.
Caps. supera, ovalis, 4locularis, 4-
 valvis, 2sperma.

alba. I. GERUMA. *Eorsk. fl. aeg. arab.* p. 62.

CATHA. *Cal.* 5phyllus, 5dentatus, corolla brevior.
Cor. 5petala, infera. *Nectar.* cya-
 thiforme. *Caps.* oblongo-cylindri-
 ca, 3locularis: loculis 1spermis.

inermis. I. C. foliis ovato-lanceolatis. *Forsk. fl. aeg. arab.* p. 62.

spinosa. 2. C. foliis ovatis. *Forsk. fl. aeg. arab.* p. 64.

PITTOSPORUM. *Cal.* 5phyllus, inferus deciduus.
Petala 5 unguibus in tubum
 urceolatum conniventibus: la-
 minis patulis. *Stil.* filiformis.
Caps. 3locularis: loculis resina
 liquida planis.

tenuifo- I. P. capsulis rugosis. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 4. t. 59. f. 7.
 lium.

umbella- 2. P. capsulis punctis elevatis scabris. *Gaertn. de fr. et sem.*
 tum. *cent.* 4. t. 59. f. 7.

3. P.

coriaceum. 3. P. capsulis bivalvibus, foliis coriaceis. *Ait. hort. Kew.* 3. p. 488.

1007. VIOLA. *Cal.* 5phyllus, supra basin corollae adhaerens. *Cor.* 5petala, irregularis, posterius cornuta. *Antherae* cohaerentes. *Caps.* 3valvis,ilocularis.

* *acaules.*

palmata. 1. V. foliis palmatis quinquelobis dentatis indivisisque. *Pluckn. amalb. t.* 447. f. 1.

pedata. 2. V. foliis pedatis septempartitis. *Pluckn. alm. t.* 114. f. 7.

pinnata. 3. V. foliis pinnatifidis. *Gmel. sib. 4. t.* 49. f. 4.

lanceolata. 4. V. foliis lanceolatis arenatis. *Gmel. sib. 4. t.* 49. f. 2.

primulifolia. 5. V. foliis oblongis subcordatis: petiolis membranaceis,

sagittata. 40. V. foliis oblongis acutis cordato-sagittatis serratis basi incisifis, floribus inversis. *Ait. hort. Kew.* 3. p. 287.

cucullata. 41. V. foliis cordatis acutiuseculis glabris basi cucullatis, floribus inversis: petalis oblique flexis. *Ait. hort. Kew.* 3. p. 288.

obliqua. 42. V. foliis cordatis acutis subplanis glabris, floribus erectis; petalis oblique flexis. *Ait. hort. Kew.* 3. p. 288.

hirta. 6. V. foliis cordatis piloso-hispidis. *Mant. p.* 483. *Flor. dan. t.* 618.

odorata. 7. V. foliis cordatis, stolonibus reptantibus. *Mant. p.* 483. *Flor. dan. t.* 309.

cordata. 8. V. foliis cordatis serratis laevibus. *Walt. flor. carol. p.* 219.

villosa. 9. V. foliis villosis cordato-ovatis. *Walt. flor. carol. p.* 101.

palustris. 10. V. foliis reniformibus. *Flor. dan. t.* 83.

* *caulescentes.*

— *floribus resupinatis.*

† *stipulis indivisis.*

Krokeri. 11. V. foliis cordato-reniformibus, floribus corollatis. *Kroker. flor. silf. 2. 2. p.* 512.

- canina. 12. V. caule adultiore adscendente, foliis oblongo-cordatis, floribus caulinis apetalis. *Mant. p. 484. Curt. flor. Lond. t. 108.*
- montana. 13. V. caulibus erectis, foliis cordato-lanceolatis, floribus superioribus apetalis. *Morif. hist. pl. 2. t. 7, f. 7.*
- pumila. 14. V. caule erecto, foliis ovato-ellipticis crenatis glabris, stipulis ferratis. *Villars pl. Delph. 2. p. 666.*
- cenifia. 15. V. caulibus filiformibus indivisis prorepentibus, foliis ovatis integerrimis glabris. *Allion. pedem. t. 3. f. 4.*
- canaden- 16. V. caule erecto teretiufculo, foliis cordatis acuminatis glabris, stipulis integris.
- stricta. 43. V. caule erecto semitereti, foliis ovatis cordatis acutis serratis, stipulis lanceolatis ferrato-ciliatis. *Ait. hort. Kew. 3. p. 290.*
- pubes- 44. V. caule erecto villoso tereti, foliis cordatis acutis pubescentibus, stipulis oblongis apice ferrulatis. *Ait. hort. Kew. 3. p. 290.*
- mirabilis. 17. V. caule triquetro, foliis reniformi-cordatis, floribus caulinis apetalis. *Jacq. fl. austr. t. 19.*
- riphaea. 18. V. foliis inferioribus orbiculatis: superioribus lanceolatis ferratis, pedunculis axillaribus. *Krock. flor. siles. 2. 2. p. 517.*
- biflora. 19. V. caule bifloro, foliis reniformibus serratis. *Flor. dan. t. 46.*
- numulari- 20. V. caule brevi bifloro, foliis subrotundis obiter crenatis, folia. stipulis lanceolatis ferratis. *Allion. fl. ped. t. 9. f. 4.*
- uniflora. 21. V. caule unifloro, foliis ovatis dentatis. *Gmel. sib. 4. t. 48. f. 5.*
- procum- 22. V. procumbens, foliis linearibus confertis. *Suppl. p. 397.*
bens.
- †† stipulis pinnatifidis, stigmate urceolato.
- decum- 23. V. caule decumbente brevissimo, foliis lanceolatis obtusis, obsoleto ferratis. *Krocker flor. siles. 2. 2. p. 520.*
bens.
- tricolor. 24. V. foliis ovatis dentatis, corollis calice glabro duplo majoribus. *Flor. dan. t. 623.*
- arvensis. 25. V. foliis ovato-oblongis dentatis, corollis calici hirsuto aequalibus.

- grandiflo- 26. V. caule triquetro simplici, foliis oblongiusculis. *Barrel.*
ra. *ic.* 691. 692.
- calcarata. 27. V. caule abbreviato, foliis subovatis, nectariis calice lon-
gioribus. *Hall. stirp. helv. n.* 666. *t.* 17?
- cornuta. 28. V. caule elongato, foliis oblongo-ovatis, nectariis subula-
tis corolla longioribus.
- arboref- 29. V. caule fruticoso, foliis lanceolatis integerrimis. *Barrel.*
cens. *ic.* 568.

— — floribus erectis.

- stipularis. 30. V. caule simplici reptante, foliis ovato-lanceolatis: crena-
tis glabris, stipulis ciliatis, pedunculis solitariis termina-
libus. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p.* 117.
- parviflora. 31. V. caulibus diffusis debilibus polyphyllis, foliis ovatis pe-
tiolatis ferratis, floribus axillaribus solitariis. *Suppl. p.* 396.
- ennea- 32. V. caule basi ramosissimo, foliis lanceolato-linearibus in-
sperma. tegerrimis distantibus, calicibus posterius aequalibus.
Burm. zeyl. t. 85.
- suffruti- 33. V. caule procumbente, foliis lanceolatis subserratis confer-
cosa. tis, calicibus posterius aequalibus.
- Calceola- 34. V. caule simplici hirsuto herbaceo, foliis lanceolatis pilosis,
via. floribus solitariis.
- oppositi- 35. V. caule suffruticoso brachiato, foliis oppositis, floribus
folia. racemosis.
- Hylean- 36. V. arborefcens scandens aculeata, foliis oblongis obtusis
thus. glabris. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 260. *f.* 21.
- Ipecacu- 37. V. foliis ovalibus margine subtusque pilosis. *Vandell.*
anha. *fasc.* 1771.
- Itubu, 38. V. foliis ovatis acutis denticulatis caulibusque ramosis to-
mentosis. *Aubl. pl. guj. 2. p.* 358. *t.* 318.
- diandra. 39. V. caule serpente herbaceo, foliis oblongis, pedunculis
unifloris.

1008. IMPATIENS. Cal. 2phyllus. Cor. 5petala, irregularis, nectario cucullato. Stamina coherentia. Caps. supera,ilocularis, in valvas 5 spiritaliter diffiliens.

* *pedunculis unifloris.*

- sinensis. 1. I. pedunculis solitariis, foliis oppositis ovatis, nectariis arcuatis.
- latifolia. 2. I. pedunculis solitariis, foliis ovatis: ferraturis lanceolatis, nectariis flore longioribus. *Rheed. h. malab. 9. t. 48.*
- rosmarinifolia. 3. I. pedunculis solitariis, foliis oppositis linearibus. *Koenig apud Retz. obs. bot. 5. p. 29.*
- oppositifolia. 4. I. pedunculis aggregatis, foliis oppositis linearibus. *Rheed. h. malab. 9. t. 31.*
- cornuta. 5. I. pedunculis aggregatis, foliis lanceolatis, nectariis flore longioribus. *Burm. zeyl. t. 16. f. 1.*
- Balsamina. 6. I. pedunculis aggregatis, foliis lanceolatis: superioribus alternis, nectariis flore brevioribus. *Knorr del. hort. 2. t. B. 3. Regu. bot. t. 268.*

** *pedunculis multifloris.*

- biflora. 7. I. pedunculis subbifloris, foliis ovatis ferratis. *Walt. flor. carol. p. 219.*
- triflora. 8. I. pedunculis trifloris solitariis, foliis angusto-lanceolatis. *Burm. zeyl. t. 116. f. 2.*
- Noli tangere. 9. I. pedunculis multifloris solitariis, foliis ovatis, geniculis caulinis tumentibus. *Flor. dan. t. 588.*

276. GALAX. Cor. hypocrateriformis. Cal. 10phyllus. Caps.ilocularis, 2valvis, elastica.

aphylla. I. GALAX.

277. CEDRELA, *Cal.* marcescens. *Cor.* 5petala, infundibuliformis, basi ad receptaculo adnata. *Caps.* lignosa, 5locularis, 5valvis. *Semina* deorsum imbricata, ala membranacea.

odorata. 1. *C.* floribus paniculatis. *Brown jam. t. 10. f. 1.*

MELHANIA. *Cor.* 5petala, campanulata. *Cal.* duplex, persistens; exterior 3phyllus, interior 5phyllus. *Nectarii* lacinae staminibus interfertae. *Stigma* 5. *Caps.* globosa, supera, angulis in valvas dehiscens, 5locularis: loculis 4spermis.

velutina. 1. MELHANIA. *Forsk. fl. aegypt. arab. p. 64.*

1020. AYENIA. *Cal.* 5phyllus. *Petala* connata in stellam unguibus longis. *Antherae* sub stella germi proximae. *Caps.* composita, pedicellata, 5cocca. *Sem.* solitaria, inversa.

pufilla. 1. *A.* foliis cordatis glabris. *Aët. Stockb. 1756. t. 2. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 79. f. 4.*

laevigata. 2. *A.* foliis ovatis integris glaberrimis, germine pedicellato, nectario decemfido radiato. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 97.*

tomentosa. 3. *A.* foliis ovato-subrotundis tomentosis.

magna. 4. *A.* foliis cordatis pubescentibus, germine sessili; an potius integrum genus ad monadelphiam spectat?

1327. **GLUTA.** *Cal.* campanulatus deciduus. *Petal.* 5, inferne adglutinata receptaculo. *Filamenta* apici ejus inserta. *Germen* insidens.

Benghas. I. **GLUTA.**

ELAEODENDRUM. *Cor.* 5petala. *Drupa* ovata: nuce 2loculari.

orientale. I. **ELAEODENDRUM.** *Jacq. pl. var. ic. 1. t. 32. Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. t. 57. f. 5?*

MEESIA. *Cal.* 5partitus, persistens. *Cor.* 5petala patens: petalis lanceolatis. *Drupa* 5 obovato-reniformes, 1loculares, 1spermae.

ferrata. I. **MEESIA.** *Rheed. b. malab. 5. t. 48. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 70. f. 6.*

BRASILIIUM. *Flores* dioici.
♀. *Cal.* persistens, 5partitus inferus. *Petal.* 5 lanceolata. *Stil.* o. *Stigm.* 2lobum. *Drupa* ovalis. *Nux* 1locularis.

hirsutum. I. *Br.* foliis hirsutis. *de la Marck act. paris. ann. 1784 p. 345. Aubl. pl. guj. suppl. p. 37. t. 390.*

glabrum. 2. *Br.* foliis glabris. *de la Marck act. paris. 1784 p. 346. Pseudo-brasilium glabrum.*

CALODENDRUM. *Cor.* explicata, 5petala. *Ne-*
ctarium 5phyllum. *Caps.* 5locularis.

capense. I. **CALODENDRUM.** *Thunb. nov. pl. gen. p. 41. 43.*

1352. ESCALLONIA. *Petala* 5 distantia, lingulata.
Stigma capitatum.
Bacca 2locularis, poly-
 sperma.

myrtilloides. I. ESCALLONIA. *Suppl.* p. 156.

1373. CORYNOCARPUS. *Nectaria* 5petaliformia
 cum petalis alter-
 na, basi glanduli-
 fera.

laevigata. I. CORYNOCARPUS. *Suppl.* p. 156. *Forster charact. gen. t. 16.*

1374. ARGOPHYLLUM. *Cor.* 5petala. *Nectarium*
 pyramidale, angu-
 lare, corollae longi-
 tudine.

nitidum. I. ARGOPHYLLUM. *Suppl.* p. 156. *Forst. char. gen. t. 15.*

278. MANGIFERA. *Cor.* 5petala. *Drupa* reniformis.

Amba. 1. M. foliis simplicibus, stamine unico fertili. *Forsk. fl. aeg-
 arab. p. 205.*

indica. 2. M. foliis simplicibus, staminibus quinque fertilibus. *Suppl.
 p. 157. Rumpf amb. I. t. 25.*

glauca. 3. M. foliis oppositis oblongis glaucis, pedunculis oppositis di-
 varicatis dichotomis. *Fr. Rottb. nov. act. dan. 2. p. 534. t. 4.*

pinnata. 4. M. foliis pinnatis, staminibus decem. *Suppl. p. 156. nonne
 distinctum genus constituit?*

280. HIRTELLA. *Cor.* 5petala. *Filamenta* longif-
 sima, persistencia, lateralia.
Stil. lateralis. *Bacca* isperma.

americana. I. H. foliis oblongis acuminatis, racemis compositis laxis, flo-
 ribus triandris. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 11.*

2. H.

panicula- 2. H. foliis ellipticis hirsutis nitidis subcoriaceis, racemis ere-
ta. ctis. Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 51.

PAYPAYROLA. Petala 5 tubum referentia, apice reflexa, receptaculo inserta. Cal. 5partitus. Stigma 2lobum. Pericarp. 2loculare.

gujanensis. I. PAYPAYROLA. Aubl. pl. guj. I. p. 249. t. 99.

1249. PLECTRONIA. Petala 5, calicis fauci inserta. Bacca 2sperma, infera.

ventosa. I. PLECTRONIA. Mant. p. 52. Burm. afr. t. 94.

281. RIBES. Petala 5 et stamina calici inserta. Stil. 2fidus. Bacca polysperma, infera.ilocularis.

* *inermia*, Ribesia.

rubrum. I. R. racemis glabris pendulis, floribus planiusculis. Knorr del. hort. I. t. I. 5.

petraeum. 2. R. racemis florentibus erectis, frutescentibus pendulis. Jacq. pl. rar. ic. I. t. 39.

alpinum. 3. R. racemis erectis: bracteis flore longioribus. Jacq. fl. austr. I. t. 47. Flores saepissime dioici.

nigrum. 4. R. racemis pilosis, floribus oblongis. Flor. dan. t. 556.

floridum. 5. R. racemis pendulis, floribus cylindricis, bracteis flore vix brevioribus. Herit. stirp. nov. I. p. 4. t. 2. f. 2. Moench Verz. v. Weissenst. t. 7.

prostratum. 6. R. baccis hirsutis. Herit. stirp. nov. I. p. 3. t. 2. f. 1.

polycarpum. 7. R. caule procumbente, racemis pendulis, baccis maximis. Gmel. fl. sib. 3. p. 173.

** *aculeata*, Grossulariae.

diacanthum. 8. R. foliis incisif, aculeis geminis ad gemmas. Suppl. p. 157. Pallas it. 3. p. 722. t. I. f. 2.

- reclina- 9. R. ramis subaculeatis reclinatis, pedunculis bractea triphylla.
tum.
- Grossula- 10. R. ramis aculeatis, petiolorum ciliis pilosis, baccis hirsu-
ria. tis. *Knorr del. hort. 2. t. G.*
- Uva cri- 11. R. ramis aculeatis, baccis glabris, pedicellis bractea mo-
spa. nophylla. *Flor. dan. t. 546. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 28. f. 9.*
- oxyacan- 12. R. ramis undique aculeatis. *Dill. h. Elth. t. 139. f. 116.*
thoides.
- eynosba- 13. R. aculeis subaxillaribus, baccis aculeatis racemosis. *Jacq.*
ti. *h. Vind. 2. t. 123.*

282. GRONOVIA. *Petala 5 et stamina, calici campanulato inserta. Bacca sicca, isperma, infera.*

scandens. I. GRONOVIA. *Mant. p. 343. Mart. cent. 1. t. 38.*

MOLLIA. *Cal. 5dentatus. Cor. 5petala. Germ. immatur. 2loculare. Caps. matura infera,ilocularis, coriacea, evalvis, apice amplo foramine hians.*

imbricata. I. MOLLIA. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 35. f. 5. Jungia.*

1296. AQUILICIA. *Cal. 5fidus. Cor 5petala. Nectarium urceolatum squamis 15. Bacca depressa, torulosa, 5-6pyrena.*

Sambuci- I. AQUILICIA. *Mant. p. 211. Burm. ind. t. 24. f. 2. Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. t. 57. f. 7.*
na.

283. HEDERA. *Petala 5 oblonga. Bacca 5locularis, 5sperma, exsucca calice cincta.*

Helix. I. H. foliis ovatis lobatisque. *Blackw. herb. t. 188.*

quinque- 2. H. foliis quinatis ovatis serratis, *Corn. canad. t. 100.*
folia. 3. H.

- pendula. 3. H. foliis ovato-lanceolatis integris, pedunculis longissimis pendulis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 51.*
 nutans. 4. H. foliis ellipticis coriaceis, umbellis nutantibus hemisphaericis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 51.*

MELICYTUS. Flores dioici. Cal. 5dentatus.
 ♀. Nectarium squamis 5. Caps. bac-
 catailocularis, polysperma.

ramiflorus. 1. MELICYTUS. *Forst. char. gen. p. 62. t. 62.*

284. **VITIS.** Petala apice cohaerentia, emarcida.
 Bacca 5sperma, supera.

- vinifera. 1. V. foliis lobatis sinuatis nudis. *Blackw. herb. t. 154.*
 indica. 2. V. foliis cordatis dentatis subtus villosis, cirrhis racemiferis. *Plum. ic. 59. f. 2.*
 vulpina. 3. V. foliis cordatis dentato-ferratis utrinque nudis.
 Labrusca. 4. V. foliis cordatis subtrilobis dentatis subtus tomentosis. *Sloan. hist. jam. 2. t. 210. f. 4.*
 heterophylla. 5. V. foliis simplicibus inciso-trilobis quinquelobisque ferratis nudis. *Thunb. fl. jap. p. 103.*
 trifolia. 6. V. foliis ternatis: foliolis subrotundis ferratis. *Rumpf. amb. 5. t. 166. f. 2.*
 laciniosa. 7. V. foliis quinatis: foliolis multifidis. *Corn. canad. t. 183.*
 japonica. 8. V. foliis quinatis subpedatis glabris: foliolis crenatis; crenis aristatis. *Thunb. fl. jap. p. 104.*
 pentaphylla. 9. V. foliis quinatis: foliolis indivisis ferratis. *Thunb. fl. jap. p. 105.*
 heptaphylla. 10. V. foliis septenatis ovatis integerrimis. *Mant. p. 212.*
 arborea. 11. V. foliis supradecompositis: foliolis lateralibus pinnatis. *Pluckn. mant. t. 412. f. 2.*

285. LAGOECIA. *Involucrum* universale et partiale.
Petala 2cornia. *Sem.* solitaria, infera.

cuminoides. I. LAGOECIA. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 23. f. 3.*

1234. RORIDULA. *Cor.* 5petala. *Cal.* 5phyllus. *Antherae* basi glandula 2dyma.
Caps. 3valvis, 3locularis.
Sem. solitaria.

dentata. I. RORIDULA. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. t. 62. f. 8?*

286. SAUVAGESIA. *Cor.* 5petala, fimbriata. *Cal.* 5phyllus. *Nectarium* 5phyllum cum petalis alternans. *Caps.* 1locularis.

erecta. I. S. caule simplici. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 77.*

Adima. 2. S. caulibus ramosis. *Aubl. pl. guj. I. p. 251. t. 100. f. a.*

LOGANIA. *Cor.* 5petala, carnosa, reflexa. *Cal.* coriaceus, 5-6phyllus. *Filam.* basi dilatata. *Stigm.* 5 radiata. *Pericarp.* 5loculare.

pentacrina. I. LOGANIA. *Scopol. introd. g. 1476.*

CAROXYLON. *Cor.* 5petala. *Nectarium* 5phyllum, connivens, corollae insertum. *Semen* tunica vestitum.

Salsola. I. CAROXYLON. *Thunb. nov. pl. gen. 2. p. 37. 38.*

287. CLAYTONIA. *Cal.* 2valvis. *Cor.* 5petala.
Stigma 3fidum. *Caps.* 3val-
 vis,ilocularis, 3sperma.

virginica. 1. *Cl.* foliis linearibus. *Pluckn. alm. t. 102. f. 3.*

sibirica. 2. *Cl.* foliis ovatis. *Aët. Stockh. 1746. t. 5.*

portulacaria. 3. *Cl.* caule arboreo erecto. *Jacq. Collect. t. 22.*

1297. HELICONIA. *Spatha* universalis partialisque.
Cal. 0. *Cor.* 3petala. *Nectar.*
 2phyllum. *Caps.* 3cocca.

Bihai. 1. *H.* foliis nervosis reticulatis basi attenuatis, nectario diphyll-
 o hastato libero. *Mant. 211. Syst. nat. XII. 3. p. 667.*
Musa Bihai. Rumpf. amb. 5. t. 62. f. 2. an distincti generis?

strelizia. 2. *H.* foliorum nervis simplicissimis glaberrimis: basi ovato-
 rotundata nectario hastato triphylo libero. *Suppl. p. 157.*
Ait. hort. Kew. 1. p. 285. t. 2.

psittacorum. 3. *H.* foliis glaberrimis nervosis basi rotundatis, inflorescentia
 glaberrima, spadice erecto ebracteato, nectario lanceolato
 diphylo adnato. *Suppl. p. 158.*

hirsuta. 4. *H.* foliis basi rotundatis simplicissime nervosis glaberrimis,
 inflorescentia hirsuta, spadice flexuoso, nectario lanceo-
 lato diphylo adnato. *Suppl. p. 158.*

alba. 5. *H.* foliis reticulatis, nectario triphylo, pericarpio poly-
 spermo. *Ait. hort. Kew. 1. p. 284. 285.*

288. ACHYRANTHES. *Cal.* 5phyllus. *Cor.* 0.
Stigma 2fidum. *Sem.*
 folitaria.

aspera. 1. *A.* caule fruticoso erecto, calicibus reflexis spicae adpressis.
Rumpf. amb. 6. t. 12. f. 1.

lappacea. 2. *A.* caule fruticoso diffuso prostrato, spicis interruptis: flos-
 culis lateralibus utrinque fasciculo setarum uncinato.
Suppl. p. 160. Burm. zeyl. t. 18. f. 1. β) Achyrantes
echinata. Retz. obs. bot. 2. p. 12.

- muricata. 3. A. caule fruticoso patulo, foliis alternis, floribus spicatis remotis ovatis: calicibus squarrosis. *Rumpf. amb. 5. t. 83. f. 2.*
- patula. 4. A. caule fruticoso patulo pubescente, florum spicis orbiculatis echinato-uncinatis. *Suppl. p. 160.*
- prostrata. 5. A. caulibus prostratis fruticosis, spicis oblongis: flosculis binatis; utrinque fasciculo uncinato. *Rumpf. amb. 6. t. 11.*
- papposa. 6. A. caule fruticoso, foliis alternis crassiusculis lineari-cuneatis obtusis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 48.*
- dichotoma. 7. A. caulibus suffruticosis, foliis oppositis linearibus planis acutis, cyma dichotoma. *Mant. p. 51.*
- altissima. 8. A. caule suffruticoso scandente, paniculis terminalibus axillaribusque ramosis. *Sloan. hist. jam. 1. t. 91. f. 2.*
- villosa. 9. A. spicis axillaribus congestis villosis linearibus albis, foliis ovatis integris. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 48.*
- paniculata. 10. A. foliis alternis petiolatis, capitulis lateralibus paniculatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 48.*
- capitata. 11. A. foliis oppositis petiolatis ovato-oblongis, capitulis terminalibus confertis inermibus. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 48.*
- polystachya. 12. A. caule decumbente, spiculis axillaribus terminalibusque confertis brevibus. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 48.*
- decumbens. 13. A. caule decumbente, paniculis terminalibus axillaribusque. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 47.*
- corymbosa. 14. A. foliis quaternis linearibus, panicula dichotoma corymbosa. *Burm. zeyl. t. 65. f. 2.*
- nivea. 15. A. foliis verticillatis ovatis tomentosis, corymbis compactis dichotomis, floribus corollatis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 286. an hujus generis?*
- alternifolia. 16. A. caule herbaceo erecto, foliis alternis, floribus spicatis remotis: calicibus squarroso-patulis. *Mant. p. 50. 344. Suppl. p. 159.*

289. CELOSIA. *Cal.* 3phyllus, *corollae* 5petalae facie. *Stamina* basi nectario plicato conjuncta. *Caps.* horizontaliter dehiscens.

- argentea. 1. *C.* foliis lanceolatis, stipulis subfalcatis, pedunculis angulatis, spicis scariosis. *Rheed. h. malab.* 10. t. 39.
- virgata. 2. *C.* foliis lanceolatis, spicis axillaribus scariosis, stigmate trifido. *Jacq. coll.* 2. p. 279. *pl. rar. ic. cent.* 2. fasc. 1. t. 7.
- lanata. 3. *C.* foliis lanceolatis tomentosis obtusis, spicis confertis, staminibus lanatis. *Jacq. h. Vind.* 3. t. 85.
- castrensis. 4. *C.* foliis lanceolato-ovatis lineatis acuminatissimis, stipulis falcatis, spicis cristatis. *Rumpf. amb.* 5. t. 84.
- cristata. 5. *C.* foliis oblongo-ovatis, pedunculis teretibus substriatis, spicis oblongis. *Knorr del. hort.* 1. t. H. 5. 6.
- margaritacea. 6. *C.* foliis ovatis, stipulis falcatis, pedunculis angulatis, spicis scariosis. *Rheed. h. malab.* 10. t. 38. β) *Celosia marilandica.* *Retz. obs. bot.* 3. p. 27.
- gnaphaloides. 7. *C.* fruticosa lanata, foliis oppositis ovatis subtus albis, capitulo globofo pedunculato. *Suppl.* p. 161.
- coccinea. 8. *C.* foliis ovatis strictis inauriculatis, caule sulcato, spicis multiplicibus cristatis.
- paniculata. 9. *C.* foliis ovato-oblongis, caule assurgente paniculato, spicis alternis terminalibus remotis. *An eadem cum Achyranthe altissima?*
- trigyna. 10. *C.* foliis ovato-oblongis, racemo laxo, pistillo trifido. *Mant.* p. 212. *Jacq. h. Vind.* 3. t. 15.
- procumbens. 11. *C.* caulibus decumbentibus, pedunculis longissimis aphyllis, spicis ovatis approximatis, capsulis compressis cristato-alatis. *Murr. comm. goett.* 1782. t. 5. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. t. 60. *Herit. stirp. nov.* 1. t. 3.
- nodiflora. 12. *C.* foliis cuneiformi-acutiusculis, spicis globosis lateralibus. *Jacq. h. Vind.* 1. t. 98.
- corymbosa. 13. *C.* foliis linearibus, corymbo dichotomo. *Retz. obs. bot.* 2. p. 13.
- baccata. 14. *C.* floribus trigynis, fructibus baccatis. *Koenig apud Retz. obs. bot.* 5. p. 23.

pyrami- 15. C. foliis inferioribus lanceolatis undulatis : superioribus
dalis. linearibus, spicis pyramidalibus. *Burm. ind. t. 25. f. 1.*

CHENOLEA. Cal. 1phyllus, globosus, 5fidus. Caps.
1valvis, isperma.

diffusa. I. CHENOLEA. *Thunb. nov. pl. gen. p. 9. 10.*

290. **ILLECEBRUM.** Cal. 5phyllus, cartilagineus.
Cor. o. Stigma simplex.
Caps. 5valvis, isperma.

brachia- I. I. caule erecto herbaceo brachiato, foliis oppositis laevibus.
tum. *Mant. p. 50. 213. Syst. nat. XII. 3. p. 186. Achyranthes
brachiata. Pluckn. alm. t. 334. f. 5.*

fanguino- 2. I. frutescens, foliis oppositis, spicis compositis congestis.
lentum. *Syst. nat. XII. 3. p. 186. Achyranthes fanguinolenta.
Rumpf amb. 7. t. 27. f. 2.*

frutes- 3. I. caule fruticoso dichotomo, foliis oppositis pulverulentis.
cens. *Herit. stirp. nov. 4. p. 75. t. 37.*

canarien- 4. I. fruticosum, foliis ellipticis acutis, stipulis bracteisque
se. ovatis brevioribus, paniculis terminalibus dichotomis.
Suppl. p. 161.

suffruti- 5. I. floribus lateralibus solitariis, caule suffruticoso.
cofum.

lanatum. 6. I. caule subherbaceo erecto, floribus lateralibus, foliis al-
ternis. *Syst. nat. XII. 3. p. 186. Achyranthes lanata.
Burm. zeyl. t. 26. f. 1.*

javani- 7. I. caule herbaceo erecto albo tomentoso, foliis alternis.
cum. *Burm. ind. t. 65. f. 2.*

Monfo- 8. I. spicis terminalibus, caulibus prostratis, foliis subulatis.
niae. *Suppl. p. 161. Pluckn. alm. t. 334. f. 2. an potius Celosia
siae species?*

verticilla- 9. I. floribus verticillatis nudis, caulibus procumbentibus.
tum. *Flor. dan. t. 335.*

cymo- 10. I. spicis cymosis secundis, caule diffuso. *Morif. hist. pl. 2.
fum. t. 29.*

aristatum. 23. I. floribus subscaeculatis, foliis lanceolatis sericeis aristatis.
Ait. hort. Kew. 1. p. 290.

- Paronychia. 11. I. floribus bracteis nitidis obvallatis, caulibus procumbentibus, foliis laevibus. *Kniph. bot. orig. cent. 1. n. 46.* β ?) Illecebrum Kopela. *Hacq. pl. alp. carn. t. 2. f. 1.*
- capitulum. 12. I. floribus bracteis nitidis occultantibus capitula terminalia, caulibus erectiusculis, foliis ciliatis subtus villosis. *Lobel. ic. 420.*
- bengalense. 13. I. caule erecto herbaceo, foliis alternis oppositisque lanceolatis pubescentibus. *Mant. p. 213.*
- arabicum. 14. I. floribus sparsis congestis, bracteis nitidis aequantibus, caulibus procumbentibus. *Mant. p. 51.*
- Achyrantha. 15. I. caulibus repentibus pilosis, foliis ovatis mucronatis: opposito minore, capitulis subglobosis subspinosis. *Dill. h. Eth. t. 7. f. 7.*
- polygonoides. 16. I. caulibus repentibus hirtis, foliis lato-lanceolatis petiolatis, capitulis orbiculatis nudis. *Mant. p. 345. Sloan. hist. jam. 1. t. 86. f. 2.*
- ficoideum. 17. I. caulibus repentibus glabris, foliis lato-lanceolatis petiolatis, capitulis orbiculatis pubescentibus. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 90.*
- sessile. 18. I. caulibus repentibus bifarie tomentosis, foliis lanceolatis subsessilibus, capitulis oblongis glabris. *Mant. p. 345. Rumpf. amb. 6. t. 15. f. 1.*
- vermiculatum. 19. I. caulibus repentibus glabris, foliis subteretibus ramosis, capitulis oblongis glabris terminalibus. *Pluckn. alm. t. 75. f. 9.*
- polygonifolium. 20. I. caulibus prostratis, foliis laevibus, floribus lateralibus. *Vill. pl. Delph. 2. p. 557. t. 16.*
- echinatum. 21. I. caulibus ramosissimis prostratis, capitulis axillaribus sessilibus echinatis. *Poir. voy. en Barb. 2. p. 128.*
- alsinesifolium. 22. I. caulibus diffusis, foliis ovatis, floribus congestis, bracteis nitidis. *Mant. p. 51. Scop. del. inf. 3. t. 13.*

AMANOA. Cal. 5partitus. Cor. o. Germen zangulare. Stigma 3gonum, concavum, fimbriatum.

Gujanensis. I. AMANOA. *Aubl. pl. guj. 1. p. 256. t. 101.*

PLOCAMA. *Cal.* 5dentatus, superus. *Cor.* 5fida,
Bacca 3locularis. *Sem.* solitaria.

pendulum. I. PLOCAMA. *Ait. hort. Kew.* I. p. 292.

291. GLAUX. *Cal.* 1phyllus. *Cor.* 0. *Caps.* 1ocu-
laris, 5valvis, 5sperma.

maritima. I. GLAUX. *Flor. dan.* t. 548.

HEDYCREA. *Cal.* 1phyllus, hemisphaericus, 5den-
tatus. *Cor.* 0. *Drupa* ovalis:
Nux ovata fibris tecta 1ocularis:
putamine duro.

incana. I. HEDYCREA. *Aubl. pl. guj.* I. p. 119. t. 45.

292. THESIUM. *Cal.* 1phyllus, cui *stamina* inserta.
Sem. I. inferum.

Linophyl-1. Th. panicula foliacea, foliis linearibus. *Relhan. flor. can-*
lon. *tabr.* p. 99. ic.

panicula- 2. Th. totum paniculatum. *Mant.* p. 51.

bavarum. 3. Th. ramis virgatis, foliis lanceolatis trinerviis, floribus pa-
niculatis. *Schranck baier. flor.* I. p. 507.

alpinum. 4. Th. racemo foliato, foliis linearibus, floribus tetrandris.
Jacq. fl. austr. 5. t. 416.

amplexi- 5. Th. racemis terminalibus, foliis cordatis sessilibus. *Mant.*
caule. p. 213.

Frisea. 6. Th. floribus subspicatis secundis ciliato-lanatis, foliis su-
bulatis. *Mant.* p. 213.

spicatum. 7. Th. floribus spicatis laevibus, foliis subulatis brevissimis re-
motissimis. *Mant.* p. 214.

funale. 8. Th. floribus spicatis, corollis ciliatis, caule suffruticoso,
foliis subulatis brevissimis.

capita- 9. Th. floribus capitatis sessilibus terminalibus, foliis trique-
tum. tris laevibus, bracteis ovatis.

10. Th.

- scabrum. 10. Th. capitulis pedunculatis, foliis triquetris margine carinaque scaberrimis.
- strictum. 11. Th. floribus umbellatis, foliis linearibus decurrentibus. *Mant. p. 214.*
- umbellatum. 12. Th. floribus umbellatis, foliis oblongis. *Pluckn. mant. t. 342. f. 1.*
- Colpoon. 13. Th. foliis oppositis petiolatis obovatis planis integerrimis, corymbo terminali aphylo. *Suppl. p. 161. Berg. fl. cap. t. 1. f. 1.*
- euphorbioides. 14. Th. pedunculis trifloris terminalibus, foliis subovatis carinosis. *Mant. p. 214.*
- triflorum. 15. Th. foliis lanceolatis, caule angulato, pedunculis axillaribus trichotomis compositis. *Suppl. p. 162.*
- spinosum. 16. Th. foliis subulatis mucronatis, floribus axillaribus solitariis. *Suppl. p. 161.*
- lineatum. 17. Th. foliis linearibus, caule tereti angulato inferne aphylo, ramis rectis divaricatis, floribus axillaribus pedunculatis. *Suppl. p. 162.*
- squarrosum. 18. Th. foliis lineari-subulatis recurvato-reflexis, caule tereti, floribus axillaribus sessilibus. *Suppl. p. 162.*
- fragile. 19. Th. foliis ovato-triquetris carinatis decurrentibus, caule angulato, floribus axillaribus sessilibus. *Suppl. p. 162.*

GYMNOCARPOS. Cal. 5partitus, persistens, interiorius coloratus. Cor. o. Stamina 5 sterilia, praeter fertilia. Sem. 1. nudum.

decandra. I. GYMNOCARPOS. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 65.*

PAPULARIA. Cal. o. Cor. calicina 5fida; laciniis cum staminibus alternantibus. Germen superum.

cristallina. I. PAPULARIA. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 69.*

GYNOPOGON. *Cal.* persistens, femiquinquefidus, inferus. *Cor.* 5partita, tubo sub apice ventricoso; fauce coarctata. *Stigma* globosum didymum. *Bacca* pedicellata subglobosa: nucleo cartilagineo subbiloculari.

stellatus. 1. *G.* foliis lanceolatis ternis lanceolatis. *Forst. char. gen. p. 18. t. 18.*

Alyxia. 2. *G.* foliis verticillatis quinis obovatis. *Forst. fl. austr. p. 19.*

scandens. 3. *G.* foliis oppositis ovatis costatis. *Forst. fl. austr. p. 19.*

ANGUILLARIA. *Cal.* 5partitus, persistens: foliolis ovato-lanceolatisaequalibus. *Cor.* 1petala, calice duplo longior: laciniis lanceolatis. *Stil.* filiformis. *Bacca* 1ocularis, 1sperma.

bahamensis. 1. *A.* bacca supera. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 77. f. 1.*

zeylani- 2. *A.* bacca infera. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 77. f. 1.*
ca. *Burm. zeyl. t. 103.*

BREYNIA. *Flores* polygami trioici. *Cal.* 6partitus, *Cor.* 0.

♂. *Antherae* stilo proximae, sessiles. *Bacca* calice patentissimo coronata, 3lo-
cularis: *loculi* 2spermi.

difficha. 1. **BREYNIA.** *Forst. Char. gen. p. 73. t. 73.*

PENNANTIA. *Flores* mere masculi et hermaphro-
diti in distincta planta. *Cal.* 0.
Cor. 5petala patens. *Stil.* 0.
Stigma peltatum, subtrilobum.

corymbo- 1. **PENNANTIA.** *Forst. char. gen. p. 67. t. 67.*
ia.

1167. CERATONIA. Flores polygami trioici. Cal.
5partitus. Cor. o.
♂. Stil. filiformis. Legumen co-
riaceum, polyspermum.

Siliqua. 1. C. ramis inermibus. *Knorr del. hort. 2. t. S. 7.*
chilensis. 2. C. ramis spinosis. *Molin. hist. nat. Chil. p. 148.*

1162. PISONIA. Flores polygami, nunc dioici,
nunc trioici. Cor. campanu-
lata, 5fida.
♂. Stamina 5-7. Caps.ilocularis,
isperma, evalvis, supera.

aculeata. 1. P. spinis axillaribus patentissimis. *Sloan. hist. jam. 2. t. 167.*
Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 76. f. 4.

subcordata. 2. P. inermis, foliis cordato-subrotundis, fructibus siccis sub-
clavatis pentagonis: angulis apice muricatis. *Swartz nov.*
pl. gen. et sp. p. 60.

inermis. 3. P. inermis, foliis ovatis acuminatis, floribus cymosis ere-
ctis, fructibus baccatis. *Rheed. h. mal. 7. t. 17.*

buxifolia. 4. P. inermis, corollis trifidis hirsutis, foliis subsessilibus re-
ticulatis obovatis. *Fr. Rottb. n. act. dan. 2. p. 536. t.*
4. f. 2.

coccinea. 5. P. inermis, foliis lanceolato-ovatis, pedunculis terminalibus
laxis, floribus nutantibus, fructibus baccatis. *Swartz*
nov. pl. gen. et sp. p. 60.

1163. NYSSA. Flores polygami dioici. Cal. 5parti-
tus. Cor. o.
♂. Drupa infera.
♂. Stam. 10.

aquatica. 1. N. foliis dentatis, pedunculis unifloris. *Catesb. Car. 1. t. 41.*

biflora. 2. N. foliis oblongo-lanceolatis integerrimis laevibus, pedun-
culis bifloris. *Walt. flor. carol. p. 253.*

multiflo- 3. N. foliis ovatis integerrimis subtus subtomentosis, pedun-
ra. culis multifloris corymbosis. *Walt. flor. car. p. 253.*

4. N.

capitata. 4. N. foliis cordato-ovatis subtus glaucis, capitulis globosis.
Walt. flor. carol. p. 253.

1157. GOUANIA. Cal. 5fidus. Cor. o. Antherae
calyptra tectae. Stilus 3fi-
dus. Fructus inferus, 3par-
tibilis.

Flores mere masculi inter her-
maphroditos.

domin- I. GOUANIA. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 264. f. 96.*
genfis.

1110. ANTIDESMA. Flores dioici. Cal. 5phyl-
lus. Cor. o.
♂. Antherae 2fidae.
♀. Stigm. 5fessilia. Drupa
baccata,ilocularis: pu-
tamine exterius scrobi-
culato.

alexite- I. ANTIDESMA. *Rheed. h. mal. 4. t. 56. Gaertn. de fr. et*
ria. *sem. cent. 3. t. 39. f. 5. β) Ghesperubilla, l. m. c.*

293. RAUWOLFIA. Contorta. Bacca 2pyrena:
officulis 2ocularibus; fe-
minibus solitariis.

nitida. I. R. glaberrima nitidissima. *Voy. suppl. pl. Ebr. sel. t. CIX.*
Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 52. f. 4.

canescens. 2. R. subpubescens. *Jacq. stirp. am. pict. t. 259. f. 17. Sloan.*
hist. jam. 2. t. 211. f. 1. Gaertn. de fr. et sem. cent. 3.
t. 52. f. 4.

tomento- 3. R. tomentosa. *Jacq. stirp. am. pict. t. 46.*
fa.

1252. PAEDERIA. Contorta. Stil. 2fidus. Bacca
vacua, fragilis, 2sperma-

foetida. I. PAEDERIA. *Mant. p. 52. Rumpf amb. 6. t. 160.*

1251. **CARISSA.** Contorta. *Baccae* 2 polyspermae.

Curandas. 1. C. foliis ellipticis obtusis. *Mant. p. 52. Pluckn. alm. t. 305.*
 spinarum. 2. C. foliis ovatis acutis. *Mant. p. 559. Rumpf. amb. 7. t. 19. f. 1.*

294. **CERBERA.** Contorta. *Drupa* isperma.

parviflora. 1. C. foliis obovatis stellatis. *Forst. fl. austr. p. 19.*
 Ahovai. 2. C. foliis ovatis.
 Manghas. 3. C. foliis lanceolatis: nervis transversalibus. *Petiv. gaz. t. 16. f. 4.*
 Thevetia. 4. C. foliis linearibus longissimis confertis. *Jacq. stirp. ant. pict. t. 47.*

296. **GARDENIA.** Contorta. *Cor.* 1petala. *Antherae* tubo corollae sine filamentis insertae. *Drupa* baccata, 2ocularis. *Sem.* incumbentia, pulpa molli interposita.* *Inermes.*

- radicans. 1. G. corollis obtusis, calice angulato, foliis ellipticis, caule radicante. *Thunb. diss. de Gardenia. n. 1. t. 1. f. 1.*
 florida. 2. G. corollis obtusis, calice angulato, foliis ovatis obtusis. *Mant. p. 346. Suppl. p. 163. Euret. pict. t. 15.*
 Thunbergia. 3. G. corollis obtusis, calice tereti, foliis ovatis obtusis. *Suppl. p. 162. Martin act. Stockh. 1773. t. 11.*
 gummi-fera. 4. G. corollis obtusis, calice hirto, foliis oblongis obtusis. *Suppl. p. 164. Thunb. de Gardenia. t. 2. f. 3.*
 latifolia. 13. G. corollis hypocrateriformibus, calicis laciniis subulatis obtuse carinatis, foliis obovato-subrotundis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 294.*
 Mussaenda. 5. G. corollis acutis, calice hirto, foliis ovatis acutis. *Mant. p. 45. Suppl. p. 163. Syst. nat. XII. 3. p. 168. Mussaenda formosa. Jacq. stirp. amer. pict. t. 70.*

Rothman-6. *G. corollis acutis subcampanulatis, calice glabro, foliis oblongis acutis. Suppl. p. 165. Thunb. act. Stockb. 1776. t. 2.*

** *spinosae.*

spinosa. 7. *G. floribus sessilibus hirsutis. Suppl. p. 164. Thunb. de Gardenia t. 2. f. 4.*

uliginosa. 8. *G. corollis intus tubo hirsutis, ramis apice spinosis. Retz. obs. bot. 2. p. 14.*

dumetorum. 9. *G. floribus subpedunculatis utrinque hirsutis, spinis supraaxillaribus. Retz. obs. bot. 2. p. 14.*

micranthus. 10. *G. floribus sessilibus glabris. Thunb. de Gardenia. t. 1. f. 2.*

jasminoides. 11. *G. floribus pedunculatis glabris, spinis supraaxillaribus. Retz. obs. bot. 2. p. 13. 14.*

Pandacki. 12. *G. floribus pedunculatis fasciculatis axillaribus glabris, foliis oppositis lanceolatis obtusis. Sonner. it. nov. Guin. p. 49. t. 19.*

scandens. 13. *G. scandens, floribus pedunculatis. Thunb. diss. de Gardenia t. 2. f. 5.*

WILLUGHBEJA. Contorta. *Cor. hypocrateriformis. Antherae sagittatae. Stil. 4gonus. Stigma ovato-capitatum, 2cūpidatum, orbiculo plano infidens. Bacca ovata 1-2locularis, polysperma.*

acida. 1. *W. bacca biloculari. Aubl. pl. guj. 1. p. 265. t. 104.*

gujanensis. 2. *W. bacca uniloculari. Aubl. pl. guj. 1. p. 268. t. 105.*

1295. ALLAMANDA. Contorta. *Caps.* lenticularis, erecta, echinata,ilocularis, 2-valvis, polysperma. *Semina* bracteata.

cathartica. I. ALLAMANDA. *Mant.* p. 214. *Suppl.* p. 165. *Aubl. pl. guj.* 1. t. 106. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 4. t. 61. f. 4.

295. VINCA. Contorta. *Folliculi* 2 erecti. *Semina* nuda.

pufilla. I. V. caule herbaceo, floribus geminis pedunculatis. *Suppl.* p. 166. *Murray. comm. goett.* 1772. t. 2. f. 1.

minor. 2. V. caulibus procumbentibus, foliis lanceolato-ovatis, floribus pedunculatis. *Curt. flor. Lond.* t. 172.

major. 3. V. caulibus erectis, foliis ovatis, floribus pedunculatis. *Curt. flor. Lond.* t. 222. *an mera minoris varietas?*

lutea. 4. V. caule volubili, foliis oblongis. *Catesb. Car.* 2. t. 53.

rosea. 5. V. caule frutescente erecto, foliis ovato-oblongis: petiolis basi bidentatis, floribus geminis sessilibus. *Mill. dict.* t. 186.

297. NERIUM. Contorta. *Cor.* tubus terminatus corona lacera. *Folliculi* 2 erecti. *Sem.* plumosa.

Oleander. I. N. foliis lineari-lanceolatis ternis. *Knorr del. hort.* 2. t. N. 2.

coronarium. 2. N. foliis lanceolatis oppositis, ramis terminaliter oppositis. *Jacq. Coll.* 1. p. 138.

zeylanicum. 3. N. foliis lanceolatis oppositis, ramis rectis. *Burm. zeyl.* t. 12. f. 2.

divaricatum. 4. N. foliis lanceolato-ovatis, ramis divaricatis.

antidysentericum. 5. N. foliis ovatis acuminatis petiolatis. *Burm. zeyl.* t. 77.

299. ECHITES. Contorta. Cor. (ut plurimum) infundibuliformis: fauce nuda. Folliculi 2 longi, recti. Sem. papposa.

- biflora. 1. E. pedunculis bifloris. *Jacq. stirp. am. pict. t. 28. β?*
Echites numularia. *Burm. ind. t. 28. f. 1.*
- trifida. 2. E. pedunculis trifidis multifloris, foliis ovato-oblongis acuminatis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 31.*
- repens. 3. E. pedunculis multifloris divisis, foliis lanceolato-oblongis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 35.*
- circinalis. 4. E. pedunculis multifloris axillaribus articulatis, laciniis corollae undulatis, foliis ellipticis, caule volubili. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 52.*
- torulosa. 5. E. pedunculis subracemosis, foliis lanceolatis acuminatis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 34.*
- asperuginis. 6. E. pedunculis racemosis, folliculis filiformibus, foliis oblongis acutis superne asperis, caule volubili. *Plum. ic. 27.*
- domingensis. 7. E. pedunculis racemosis, foliis cordato-ovatis rigidiusculis subtus discoloribus, caule volubili. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 52.*
- agglutinata. 8. E. pedunculis racemosis, foliis ovatis emarginatis cum acumine. *Jacq. stirp. am. pict. t. 30.*
- suberecta. 9. E. pedunculis racemosis, foliis subovatis obtusis mucronatis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 33.*
- quinquangularis. 10. E. pedunculis racemosis, foliis ovatis acutis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 32.*
- femidigyna. 11. E. pedunculis opposite racemosis, foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis. *Bergius act. Vliessing. 3. p. 583. cum it.*
- corymbosa. 12. E. racemis corymbosis staminibus eminentibus, foliis lanceolato-ovatis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 37.*
- floribunda. 13. E. racemis corymbosis, foliis ovatis acuminatis: nervis parallelis, ramis erectiusculis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 52.*
- difformis. 24. E. pedunculis corymbosis, caule volubili, foliis infimis sublinearibus: superioribus subovatis. *Walt. flor. carol. p. 98.*

- siphyli- 14. E. paniculis dichotomis: floribus spicatis, foliis ovatis sub-
ca. petiolatis glaberrimis costatis. *Suppl. p. 167.*
- spicata. 15. E. spicis axillaribus brevibus, staminibus eminentibus, fo-
liis subovatis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 36.*
- scholaris. 16. E. umbellis compositis, foliis subverticillatis oblongis, fol-
liculis filiformibus longissimis. *Mant. p. 53. Rumpf amb. 2. t. 82.*
- umbella- 17. E. pedunculis umbellatis, foliis ovatis obtusis mucronatis,
ta. caule volubili. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 29.*
- costata. 18. E. pedunculis cymosis, foliis elliptico-lanceolatis acumi-
natis. *Forst. fl. austr. p. 20. Rbeede b. malab. 9. t. 14.*
- caudata. 19. E. laciniis corollae apice lineari longissimo. *Mant. p. 52. Burm. ind. t. 26.*
- annularis. 20. E. caule volubili, corollis hypocrateriformibus: tubo an-
nulo elevato. *Suppl. p. 166.*
- succulen- 21. E. aculeis binis extrafoliaceis, foliis linearibus subtus to-
ta. mentosis. *Suppl. p. 167.*
- bispinosa. 22. E. aculeis binis extrafoliaceis, foliis lanceolatis glabris, co-
rollis hypocrateriformibus. *Suppl. p. 167.*
- hetero- 23. E. pedunculis axillaribus paucifloris, foliis subpetiolatis
phylla. oppositis scabriusculis supra villosis, caule terete volubili
lignoso. *Jacq. Collect. 1. p. 73.*

298. PLUMERIA. Contorta. Folliculi 2 reflexi. Se-
mina membranae propriae
inserta.

- rubra. 1. Pl. foliis ovato-oblongis: petiolis biglandulosis. *Trew. Ebr. ret. t. 41.*
- alba. 2. Pl. foliis lanceolatis revolutis, pedunculis superne tubero-
sis. *Jacq. stirp. amer. t. 38.*
- obtusa. 3. Pl. foliis lanceolatis petiolatis obtusis. *Catesb. Carol. 2. t. 93.*
- pudica. 4. Pl. floribus limbo clausis.

300. CAMERARIA. Contorta. *Folliculi* 2 horizon-
tales. *Semina* membra-
nae propriae inserta.

- latifolia. 1. C. foliis ovatis utrinque acutis transverse striatis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 39.*
Tama- 2. C. foliis ovato-oblongis acuminatis glabris. *Aubl. pl. guj. I. p. 260. t. 102.*
quarina.
gujanen- 3. C. foliis ovatis acuminatis glabris. *Aubl. pl. guj. I. p. 262.*
fis.
angustifo- 4. C. foliis linearibus. *Plum. ic. 72. f. 2.*
lia.

301. TABERNAEMONTANA. Contorta. *Folli-*
culi 2 horizon-
tales. *Semina*
pulpaе im-
mersa.

- citrifolia. 1. T. foliis oppositis ovatis, floribus lateralibus glomerato-
umbellatis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 40.*
discolor. 2. T. foliis oppositis ovato-lanceolatis, pedunculis axillaribus
bifloris. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 52.*
laurifolia. 3. T. foliis oppositis ovalibus obtusiusculis. *Sloan. hist. jam. 2. t. 186. f. 2.*
grandiflo- 4. T. foliis oppositis, caule dichotomo, calicibus inaequalibus
ra. laxissimis. *Mant. p. 53. Jacq. stirp. amer. pict. t. 41.*
cymosa. 5. T. foliis oppositis, floribus cymosis. *Mant. p. 53. Jacq. stirp. amer. pict. t. 259. f. 10.*
echinata. 6. T. foliis oppositis, corymbis terminalibus, folliculis echi-
natis. *Aubl. pl. guj. I. p. 263. t. 103.*
amygda- 7. T. staminibus extra tubum corollae eminentibus. *Jacq. lifolia. stirp. am. pict. t. 259. f. 11.*
elliptica. 8. T. herbacea, foliis subternis lanceolatis. *Thunb. fl. jap. p. 111.*
angusti- 9. T. foliis linearibus sparsis, caule piloso herbaceo. *Ait. folia. hort. Kew. I. p. 300.*

Amsonia. 10. T. foliis alternis, caule subherbaceo. *Pluckn. phyt. t. 115. f. 3.*

alternifolia. 11. T. foliis alternis, caule arborecente. *Rheed. b. malab. I. t. 43.*

OCHROSIA. Contorta. Cor. limbus patens. Folliculi 2divaricati, drupacei, ovati: Nux 2locularis; loculis 2-3spermis.

borbonica. I. OCHROSIA. *Jussieu gen. plant. p. 145.*

AMSONIA. Contorta. Folliculi 2erec̄ti. Cor. infundibuliformis: fauce clausa. Sem. teretia nuda: apice oblique truncato.

Tabernae- I. A. foliis ovatis utrinque acutis. *Walt. flor. carol. p. 98.*
montana. *an distincta a Tabernaemontana Amsonia?*

ciliata. 2. A. foliis sublinearibus ciliatis confertis, floribus paniculatis. *Walt. flor. carol. p. 98.*

302. CEROPEGIA. Contorta. Corollae limbus connivens. Folliculi 2 divergentes erecti. Semina pappo coronata.

Candela- I. C. umbellis pendulis, floribus erectis. *Rheed. b. malab. 9.*
brum. *t. 16.*

biflora. 2. C. pedunculis bifloris.

sagittata. 3. C. umbellis sessilibus, foliis sagittatis. *Mant. p. 215.*

tenuifolia. 4. C. foliis lineari-lanceolatis. *Syst. nat. XII. 3. p. 192.* Periploca tenuifolia. *Rheed. b. malab. 10. t. 34.*

DIGYNIA.

1253. PERGULARIA. Contorta. Cor. hypocrate-
riformis. Nectarium
ambiens genitalia cuspi-
dibus 5 semi-fagittatis.

glabra. 1. P. foliis ovatis glabris. *Mant. p. 53. Rumpf amb. 5. t. 29. f. 2.*

tomento- 2. P. foliis cordatis tomentosis. *Mant. p. 53. Burm. ind. t. 27. f. 2.*

japonica. 3. P. foliis cordatis glabris. *Thunb. fl. jap. p. III.*

1375. MELODINUS. Contorta. Corollae faux co-
ronata. Nectarium in me-
dio tubi stellatum. Bac-
ca 2locularis, polysper-
ma.

scandens. 1. MELODINUS. *Suppl. p. 167. Forst. char. gen. p. 19. t. 19.*

303. PERIPLOCA. Contorta. Nectarium ambiens
genitalia, filamenta 5 exse-
rens.

graeca. 1. P. floribus interne hirsutis terminalibus. *du Hamel arb. 2. t. 11.*

Secamo- 2. P. floribus interne hirsutis paniculatis, foliis lanceolatis el-
ne. lipticis. *Mant. p. 216. Pr. Alp. aeg. p. 133. 134. ic.*

indica. 3. P. spicis imbricatis. *Burm. zeyl. t. 83. f. 1.*

africana. 4. P. caule hirsuto. *Pluckn. alm. t. 137. f. 4.*

laevigata. 5. P. cymis trichotomis, foliis oblongo-lanceolatis caule co-
rollisque glabris. *Ait. hort. Kew. 1. p. 301.*

esculen- 6. P. glabra, foliis lineari-subulatis, racemis elongatis simpli-
ta. cibus, floribus interne nudis. *Suppl. p. 168.*

capsularis. 7. P. foliis lanceolatis integerrimis oppositis, cymis axillaribus
diffusis. *Forst. fl. austr. p. 20.*

- tunicata. 8. P. floribus umbellatis, foliis cordatis. *Retz. obs. bot. 2. p. 15.*
 sylvestris. 9. P. floribus umbellatis, foliis ovatis. *Retz. obs. bot. 2. p. 15.*
 emetica. 10. P. caule fruticoso diffuso, foliis lineari-lanceolatis. *Retz. obs. bot. 2. p. 14.*

304. CYNANCHUM. Contorta. *Nectarium*, cylindricum, plicato-angulatum, 5dentatum. *Folliculi 2. receptaculo libero.*

* *caule volubili.*

- hirtum. 1. C. caule fruticoso inferne suberoso fisso, foliis ovato-cordatis. *Morif. hist. 3. t. 3. f. 61.*
 reticulatum. 2. C. caule inferne suberoso rimoso, foliis ovatis acutis. *Retz. obs. bot. 2. p. 15.*
 cordifolium. 3. C. caule hirtio, foliis cordatis utrinque glabris acutis, floribus cymosis. *Retz. obs. bot. p. 15.*
 arboreum. 4. C. foliis variantibus, corolla rotata. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 53.*
 capense. 5. C. caule undique conformi, foliis subcordato-ovatis, pedunculis multifloris. *Suppl. p. 168.*
 suberosum. 6. C. caule inferne suberoso fisso, foliis cordatis acuminatis. *Dill. b. Elth. t. 229. f. 296.*
 carolinense. 7. C. caule hispido, foliis cordato-lanceolatis, cymis axillaribus. *Jacq. coll. 2. p. 288. pl. rar. ic. 2. fasc. 1. t. 9.*
 obliquum. 8. C. foliis oblique cordatis glabris, cymis axillaribus. *Jacq. pl. rar. ic. 2. t. 8.*
 parviflorum. 9. C. caule filiformi, foliis ovatis apice subulatis, umbellis subsessilibus. *Plum. ic. 215. f. 1.*
 crispiflorum. 10. C. foliis subtus villosis oblongis cordatis: sinu clauso, petalis apice crispis. *Plum. ic. 216. f. 1.*
 undulatum. 11. C. foliis lanceolato-ovatis glabris, umbellis globosis. *Mant. p. 54. Jacq. stirp. amer. pict. t. 84.*
 maritimum. 12. C. foliis cordatis hirsutis subtus tomentosis, pedunculis aggregatis. *Mant. p. 54. Jacq. stirp. amer. pict. t. 82.*
 racemosum. 13. C. foliis cordatis glabris acutis, racemis simplicibus. *Jacq. stirp. am. pict. t. 80.*

- planifolium. 14. C. foliis cordatis glabris subtus tomentosis, pedunculis subracemosis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 81.*
- altissimum. 24. C. foliis cordatis utrinque tomentosis, floribus umbellatis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 83.*
- clausum. 25. C. foliis lanceolato-oblongis revolutis, floribus umbellatis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 87.*
- leucanthum. 26. C. foliis ovatis acuminatis planis nitidis, umbellis globosis. *Jacq. stirp. pict. t. 86.*
- longiflorum. 27. C. foliis obovatis oblongis acutis villosis, floribus umbellatis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 85.*
- viminale. 15. C. caule perenni aphylo. *Mant. p. 394. Syst. nat. XII. 3. p. 331. Euphorbia viminalis. Pr. Alp. aeg. p. 190. ic.*
- acutum. 16. C. caule herbaceo, foliis cordato-oblongis glabris.
- monspeliacum. 17. C. caule herbaceo, foliis reniformi-cordatis acutis. *Kniph. bot. orig. cent. 3. n. 35.*
- extensum. 18. C. caule herbaceo, foliis uniformi-cordatis acutis, petalis hirsutis. *Jacq. pl. rar. ic. t. 47.*
- obtusifolium. 19. C. caule herbaceo, foliis oblongis apice rotundatis cum acumine, umbellis lateralibus. *Suppl. p. 169.*
- tenellum. 20. C. caule herbaceo subvolubili, foliis ovato-oblongis. *Suppl. p. 168.*
- ** caule erecto.
- pyrotechnicum. 21. C. caule fruticoso nudo, pedunculis foliariis axillaribus tuberculatis, floribus pedicellatis capitatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 53.*
- erectum. 22. C. caule divaricato, foliis cordatis glabris. *Jacq. b. Vind. I. t. 38.*
- filiforme. 23. C. caule simplicissimo, foliis linearibus, floribus verticillatis axillaribus. *Suppl. p. 169.*

305. APOCYNUM. *Cor. campanulata. Glandulae 5 cum staminibus alternae.*

- sibiricum. 1. A. caule erecto herbaceo, foliis oblongis umbellis terminalibus. *Jacq. b. Vind. 3. t. 66.*
- androsae-mifolium. 2. A. caule rectiusculo herbaceo, foliis ovatis utrinque glabris, cymis terminalibus. *Morif. hist. pl. 3. t. 3. f. 16.*
3. A.

- cannabi- 3. A. caule rectiusculo herbaceo, foliis oblongis, paniculis ter-
num. minalibus. *Morif. hist. pl. 3. t. 3. f. 14.*
- venatum. 4. A. caule rectiusculo herbaceo, foliis ovato-lanceolatis.
- filiforme. 5. A. caule prostrato-herbaceo, foliis filiformibus, floribus
umbellatis. *Suppl. p. 169.*
- minutum. 6. A. caule prostrato, foliis hastatis. *Suppl. p. 169.*
- frutescens. 7. A. caule erecto frutescente, foliis lanceolato-ovatis, corol-
lis acutis, fauce villosis. *Fl. zeyl. t. 12. f. 1.*
- reticula- 8. A. caule volubili perenni, foliis ovatis venosis. *Rumpfamb.*
tum. *5. t. 40.*
- lineare. 9. A. caule volubili herbaceo, foliis linearibus planis, umbellis
axillaribus compositis. *Suppl. p. 169.*
- triflorum. 10. A. caule volubili herbaceo, foliis lanceolatis, umbellis
axillaribus subtrifloris. *Suppl. p. 169.*
- Acufi. 11. A. caule volubili, foliis oblongo-ovatis acuminatis. *Aubl.*
pl. guj. 1. p. 274. t. 107.
- umbella- 12. A. caule volubili, foliis ovato-acuminatis subtus tomen-
tum. tosis, corymbis terminalibus. *Aubl. pl. guj. 1. p. 275.*
t. 108.

MATELEA. Cor. 5fida: tubo brevissimo. Cal. tur-
binatus, 5partitus. Antherae in
capitulum 5gonum conjunctae.
Germen alterum abortiens. Stigm.
concava. Folliculus 5gonus. Sem.
margine crenata.

palustris. 1. MATELEA. *Aubl. pl. guj. 1. p. 278. t. 109. f. 1. β) Ma-*
telea latifolia. Aubl. pl. guj. 1. p. 278. t. 109. f. 2.

CYNOCTONUM. Contorta. Folliculi 2 ventricosi
basi coadunati. Cor. tubu-
losa: fauce villis clausa.

- sessilifo- 1. C. foliis sessilibus. *Walt. flor. carol. p. 108.*
lium.
- petiola- 2. C. foliis petiolatis. *Walt. flor. carol. p. 108.*
tum.

306. ASCLEPIAS. Contorta. *Nectaria* 5 ovata, cucullata, corniculum exferentia. *Folliculi* 2.: receptaculo libero.

* *Foliis oppositis planis.*

- viminalis. 1. A. caule suffruticoso volubili filiformi, foliis lanceolatis glabris, umbellis lateralibus multifloris. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 53.*
- asthmatica. 2. A. caule fruticoso volubili hirsuto, foliis petiolatis cordato-ovatis supra glabris integerrimis, umbellis paucifloris. *Suppl. p. 170.*
- volubilis. 3. A. caule arboreo volubili, foliis ovatis integerrimis acuminatis, umbellis erectis. *Suppl. p. 170.*
- nivalis. 4. A. caule volubili, corolla tortili: petalis linearibus. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 51. an hujus generis?*
- Daemia. 5. A. caule volubili, foliis cordato-acutis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 51. an distincta species?*
- cordata. 6. A. caule fruticoso ramoso apice volubili, foliis petiolatis cordato-reniformibus. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 49.*
- parviflora. 51. A. caule suffruticoso erecto, foliis lanceolatis acuminatis glabris, umbellis lateralibus solitariis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 307.*
- nigra. 7. A. caule superne subvolubili, foliis ovatis basi barbatis.
- glabra. 8. A. caule scandente, foliis ovato-acuminatis glaberrimis, umbellis interfoliaceis albis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 51.*
- decumbens. 9. A. caule decumbente, foliis villosis.
- incarnata. 10. A. caule superne diviso, foliis lanceolatis, umbellis erectis geminis. *Jacq. b. Vindob. 2. t. 107.*
- nivea. 11. A. caule simplici, foliis ovato-lanceolatis glabriusculis, umbellis erectis lateralibus solitariis. *Dill. b. Elth. t. 29. f. 32.*
- curassavica. 12. A. caule simplici, foliis lanceolatis glabris nitidis, umbellis erectis solitariis lateralibus. *Dill. b. Elth. t. 30. f. 33.*
- variegata. 13. A. caule simplici, foliis ovatis rugosis nudis, umbellis subsessilibus, pedicellis tomentosis. *Pluckn. alm. t. 77. f. 1.*
14. A.

- purpuraf. 14. A. caule simplici, foliis ovatis subtus villosis, umbellis
cens. erectis, nectariis resupinatis. *Dill. b. Elth. t. 28. f. 31.*
- amoena. 15. A. caule simplici, foliis ovatis subtus pilosiusculis, umbel-
lis nectariisque erectis. *Dill. b. Elth. t. 27. f. 30.*
- syriaca. 16. A. caule simplicissimo, foliis ovalibus subtus tomentosis,
umbellis nutantibus. *Regn. bot. t. 71.*
- pubes- 17. A. caule fruticoso pedunculisque villosis, foliis ovatis ve-
cens. nosis nudis. *Mant. p. 215. Morif. hist. pl. 3. t. 3. f. 35.*
- spiralis. 18. A. caule fruticoso, foliis petiolatis ovali-oblongis, floribus
solitariis axillaribus, petalis linearibus spiralis intror-
sum hirsutis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 49.*
- radians. 19. A. caule erecto, foliis petiolatis cordatis acutis undulatis,
umbellis terminalibus, corollae limbo erecto spirali. *Forsk.
fl. aeg. arab. p. 49.*
- lactifera. 20. A. caule erecto, foliis ovatis, umbellis proliferis brevissimis.
- Vinceto- 21. A. caule erecto, foliis ovatis basi barbatis, umbellis proli-
xicum. feris. *Flor. dan. t. 849.*
- gigantea. 22. A. foliis amplexicaulibus oblongo-ovatis basi pilosis. *Jacq.
stirp. amer. pict. t. 88.*
- crispa. 23. A. foliis cordato-lanceolatis undulatis scabris, umbella
terminali. *Suppl. p. 170. Commel. rar. t. 17.*
- undulata. 24. A. foliis sessilibus oblongis lanceolatis undulatis glabris,
petalis ciliatis. *Commel. rar. t. 16.*
- laniflora. 25. A. foliis lineari-lanceolatis, pedunculis axillaribus apice
umbellatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 51.*
- alexica. 26. A. caule volubili, foliis inferioribus cordatis: superiori-
bus ovatis, umbellis sessilibus. *Jacq. coll. 1. p. 101.
Rheed. h. mal. 9. t. 13.*

** foliis lateribus revolutis, oppositis. -

- repanda. 27. A. foliis revolutis repandis pilosis.
- citrifolia. 28. A. foliis ovato-lanceolatis petiolatis repando-undulatis,
Jacq. coll. 2. p. 290. pl. rar. ic. cent. 2. t. 30.
- arboref- 29. A. foliis ovatis, caule fruticoso subvillosis. *Mant. p. 216.
cens. Burm. afr. t. 13. p. 3.*
- fruticosa. 30. A. foliis lineari-lanceolatis, caule fruticoso. *Pluckn. alm.
t. 138. f. 2. β) Aselepias crassifolia.*

- fibrica. 31. *A. foliis lineari-lanceolatis oppositis ternisque, caule decumbente. Murray Comm. Goett. 1779. t. 7.*
- fetosa. 32. *A. foliis linearibus oppositis, caule erecto, umbellis lateralibus terminalibusque. Forsk. fl. aeg. arab. p. 51.*
- verticillata. 33. *A. foliis linearibus verticillatis, caule erecto. Pluckn. mant. t. 336. f. 4. β?) Asclepias quadrifolia. Jacq. obs. bot. 2. t. 33.*
- *** *foliis alternis.*
- rubra. 34. *A. foliis ovatis, umbellis ex eodem pedunculo communi pluribus.*
- tuberosa. 35. *A. foliis lanceolatis, caule divaricato piloso. Dill. b. Elth. t. 30. f. 34.*
- **** *dubiae tribus.*
- filiformis. 36. *A. foliis filiformibus, caule erecto, umbellis lateralibus elongato-pedunculatis. Suppl. p. 169.*
- grandiflora. 37. *A. foliis petiolatis oblongis pilosis, caule simplici hirsuto erecto, floribus axillaribus pedunculatis. Suppl. p. 170.*
- carnosa. 38. *A. foliis ovatis carnosiss glaberrimis. Suppl. p. 170.*
- humiflora. 39. *A. foliis sessilibus cordatis oppositis, caule prostrato, umbellis axillaribus. Walt. flor. carol. p. 105.*
- cordata. 40. *A. foliis cordato-lanceolatis subsessilibus, caule erecto dichotomo, umbellis terminalibus. Walt. flor. carol. p. 105.*
- cinerea. 41. *A. caule erecto laevi, foliis sublinearibus umbella terminali. Walt. flor. carol. p. 105.*
- lanceolata. 42. *A. foliis linearibus, caule erecto laevi, umbellis terminalibus. Walt. flor. carol. p. 105.*
- perennis. 43. *A. foliis lanceolatis glabris oppositis petiolatis, caule suffruticoso, umbellis lateralibus oppositis. Walt. flor. carol. p. 107.*
- polystachya. 44. *A. foliis lanceolatis laevibus oppositis petiolatis, caule suffruticoso, umbellis terminalibus lateralibusque. Walt. flor. carol. p. 107.*
- gonocarpos. 45. *A. caule volubili, foliis ovato-cordatis oppositis, nectario stellato, folliculis cernuis. Walt. flor. carol. p. 104.*
- acanthocarpos. 46. *A. caule volubili, foliis subpilosis, nectario stellato, folliculis cernuis mucronato-spinosis. Walt. flor. carol. p. 104.*

pedicella- 47. A. caule brevi, umbella pauciflora, nectario ecorni pedicellato. *Walt. flor. carol. p. 106.*

viridis. 48. A. caule erecto, foliis oblongis obtusis laevibus petiolatis oppositis, umbellis terminalibus, nectariis ecornibus. *Walt. flor. carol. p. 107.*

***** caule aphylo.

aphylla. 49. A. caule volubili, corymbis conjugatis globosis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 50.*

slipitacea. 50. A. caulibus fruticosis articulatis diffusis, umbellis ramulorum terminalibus. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 50.*

307. STAPELIA. Contorta. Nectarium duplici stellula 5phylla tegente genitalia.

variegata. 1. St. denticulis ramorum patentibus. *Knorr del. hort. t. F. 4.*

hirsuta. 2. St. denticulis ramorum erectis. *Roes. inf. 2. musc. t. 9.*

mammillaris. 3. St. denticulis ramorum obtusis mucronatis. *Mant. p. 216. Burm. afr. t. 11.*

pilifera. 4. St. caule tereti mammilloso-tuberculato: tuberculis apice piliferis. *Suppl. p. 171.*

articulata. 5. St. articulis ramorum teretibus reticulatim obsolete verrucosis: spinulis minutis, floribus subsessilibus. *Ait. hort. Kew. 1. p. 310.*

pulla. 6. St. subhexagona erecta, aculeis patentissimis, floribus sessilibus aggregatis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 310.*

incarnata. 7. St. quadrangularis, dentibus horizontali-truncatis callosis. *Suppl. p. 171. Burm. dec. t. 7. f. 1.*

quadrangula. 8. St. quadrangularis: angulis subdentatis, folliculis subulatis conjugatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 52. an vere nova species capensis a Paterfon journeys into Caffraria p. 60. memorata, et manu depicta?*

VILLARSIA. Cor. campanulata. Nectar. 5 stamina mentientia. Stil. o. Caps. ovata,ilocularis polysperma.

aquatica. 1. VILLARSIA. *Walt. flor. carol. p. 108.*

1208.

1208. LINCONIA. *Petala* 5 foveolae nectarii basi
insculpta. *Capsula* semini-
fera, 2locularis.

alopecu- I. LINCONIA. *Mant.* p. 216. *Herm. afr.* 7.
roidea.

308. HERNIARIA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* o. *Stam.*
5. sterilia. *Caps.* isperma.

glabra. 1. H. glabra. *Flor. dan.* t. 529.

hirsuta. 2. H. hirsuta. *Zanich. ic.* 284. *An varietas glabrae?*

fruticosa. 3. H. caulibus fruticosis, floribus quadrifidis. *Lob. ic.* 85.

lenticula- 4. H. suffruticosa, foliis ovato-oblongis pilosis. *Pluckn. alm.*
ta. t. 53. f. 3.

Payco. 5. H. foliis ferratis. *Molin. hist. nat. Chil.* p. 126.

309. CHENOPODIUM. *Cal.* 5fidus, 5costatus. *Cor.* o.
Sem. 1. lenticulare, su-
perum, horizontale, ca-
lice connivente tectum.

* *foliis angulosis.*

Bonus 1. Ch. foliis triangulari-sagittatis integerrimis, spicis compo-
Henricus. sitis aphyllis axillaribus. *Flor. dan.* t. 579.

urbicum. 2. Ch. foliis triangularibus subdentatis, racemis confertis stri-
ctissimis cauli approximatis longissimis. *Buxb. fl. bal.* t. 1.

atriplicis. 3. Ch. foliis deltoideis subtus coloratis, caule erecto. *Suppl.*
p. 172. *Jacq. b. Vind.* 3. t. 80.

triangu- 4. Ch. foliis triangularibus aequilateris posterius integris, ra-
lare. cemis decompositis subnudis axillaribus terminalibusque.
Forsk. fl. aeg. arab. p. 205.

rubrum. 5. Ch. foliis cordato-triangularibus obtusiusculis dentatis, ra-
cemis erectis compositis subfoliosis caule brevioribus. *Mor-
rif. hist. pl.* 2. t. 31. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 5. t. 75. f. 6.

punctula- 6. Ch. foliis albo-punctulatis: imis rhombeo-ovatis sinuatis:
tum. supremis ellipticis, racemis lateralibus spicatis foliosis.
Scopoli del. insubr. 1. p. 261, t. 11.

7. Ch.

- album. 7. Ch. foliis rhomboideo-triangularibus erosius posteriorius integris: tummis oblongis, racemis erectis. *Curt. flor. Lond. t. 92.*
- viride. 8. Ch. foliis rhomboideis dentato-sinuatis, racemis ramosis subfoliatis. *Curt. flor. Lond. t. 103.*
- serotinum. 9. Ch. foliis deltoideis sinuato-dentatis rugosis glabris uniformibus, racemis terminalibus. *Pet. gaz. t. 8.*
- hybridum. 10. Ch. foliis cordatis angulato-acuminatis, racemis ramosis nudis. *Curt. flor. Lond. t. 248.*
- multifidum. 11. Ch. foliis multifidis: segmentis linearibus, floribus axillaribus sessilibus. *Dill. h. Elth. t. 66. f. 77.*
- ambrosioides. 12. Ch. foliis lanceolatis dentatis, racemis foliatis simplicibus. *Regnault bot. t. 75.*
- Botrys. 13. Ch. foliis oblongis sinuatis, racemis nudis multifidis. *Blackw. herb. t. 315.*
- anthelminticum. 14. Ch. foliis ovato-oblongis dentatis, racemis aphyllis. *Dill. h. Elth. t. 66. f. 76.*
- glaucum. 15. Ch. foliis ovato-oblongis repandis, racemis nudis simplicibus glomeratis. *Tabern. Kraeuterb. ic. p. 427.*
- murale. 16. Ch. foliis ovatis nitidis dentatis acutis, racemis ramosis nudis. *J. Baub. hist. pl. 2. p. 975. ic.*
- sepium. 17. Ch. foliis ovalibus sinuatis, racemis foliosis simplicibus. *J. Mayer Abb. d. boehm. Gef. 3. p. 320.*
- guineense. 18. Ch. foliis deltoideo-ovatis sinuato-dentatis, racemis ramosis: floribus conglomeratis. *Jacq. coll. 2. p. 346. pl. rar. ic. 2. t. 56.*
- ** foliis integris.
- Vulvaria. 19. Ch. foliis integerrimis rhomboideo-ovatis, floribus conglomeratis axillaribus. *Blackw. herb. t. 100.*
- caudatum. 20. Ch. foliis integerrimis rhomboideo-ovatis, racemo terminali erecto. *Jacq. coll. 2. p. 325. pl. rar. ic. cent. 2. t. 31.*
- poly spermum. 21. Ch. foliis integerrimis ovatis, caule suberecto, cymis dichotomis, calicibus fructus patulis. *Curt. flor. Lond. t. 115.*
- Scoparia. 22. Ch. foliis lineari-lanceolatis planis integerrimis.
- aristatum. 23. Ch. foliis lanceolatis subcarnosis integerrimis, corymbis dichotomis aristatis axillaribus. *Gmel. fl. sib. 3. t. 15. f. 1.*

- laterale. 24. Ch. foliis caulinis lanceolatis obtusis: ramorum oblongis, pedunculis lateralibus solitariis unifloris. *Ait. hort. Kew.* 1. p. 313.
- oppositi- 25. Ch. foliis oppositis lanceolato-subulatis brevissimis. *Suppl.*
folium. p. 172. *Pallas it.* 2. t. O.
- fericeum. 26. Ch. foliis subulatis fericeis, florum glomerulis geminis. *Hall. hist. stirp. Helv. n.* 1575.
- mariti- 27. Ch. foliis subulatis semicylindricis. *Flor. dan.* t. 489.
mun.

1153. ATRIPLEX. Cor. o. Flores alii hermaphro-
diti, alii in eadem planta
mere feminei.
♂. Cal. 5phyllus. Sem. 1. de-
pressum; erectum.
♀. Cal. 2phyllus. Sem. 1. com-
pressum.

- coriacea. 1. A. caule fruticoso decumbente, foliis ovatis concavis, fari-
nosis coriaceis. *Forsk. fl. aeg. arab.* p. 175.
- Helimus. 2. A. caule fruticoso, foliis deltoideis integris.
- portula- 3. A. caule fruticoso, foliis obovatis.
coides.
- albicans. 17. A. caule fruticoso erecto, foliis hastatis integerrimis acu-
tis, spicis terminalibus. *Ait. hort. Kew.* 3. p. 430.
- glauc. 4. A. caule suffruticoso procumbente, foliis ovatis sessilibus in-
tegerrimis: inferioribus subdentatis. *Dill. b. Elth.* t. 40.
f. 46.
- rosea. 5. A. caule herbaceo, foliis incanis ferratis, fructibus quadran-
gularibus dentatis.
- sibirica. 6. A. caule herbaceo, foliis deltoideis angulatis, calicibus
fructus extus muricatis.
- tatarica. 7. A. caule herbaceo, foliis deltoideis sinuato-dentatis alternis.
- laciniata. 8. A. caule herbaceo, foliis deltoideis dentatis subtus argenteis.
Morif. hist. pl. 2. t. 32. f. 17.
- hastata. 9. A. caule herbaceo, calicis valvis femineis magnis deltoidi-
bus sinuatis. *Curt. flor. Lond.* t. 118.

- hortensis. 10. A. caule herbaceo erecto, foliis triangularibus. *Blackw. herb. t. 99. et 552.*
- littoralis. 11. A. caule herbaceo erecto, foliis omnibus linearibus integerrimis.
- patula. 12. A. caule herbaceo patulo, foliis subdeltoideo-lanceolatis, calicibus feminum disco dentatis. *Lob. ic. 257. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 75. f. 8.*
- virgata. 13. A. caule herbaceo: ramis elongatis rarioribus, foliis petiolatis; superioribus lanceolatis, floribus summis spicatis: calicibus feminum disco tuberculosis. *Scop. del. insubr. 2. p. 14. t. 7.*
- alba. 14. A. caule ramosissimo herbaceo, foliis ovatis, floribus axillaribus glomeratis, calicibus fructus angulatis dentatis lacvibus. *Scop. del. inf. 2. §. 16. t. 8.*
- pedunculata. 15. A. caule herbaceo divaricato, foliis lanceolatis obtusis integris, calicibus femineis pedunculatis. *Spec. pl. 1675. Flor. dan. t. 304.*
- falicina. 16. A. caule herbaceo glabro tereti, foliis lanceolatis inaequaliter ferratis; radicalibus linearibus integerrimis, spica terminali glomerata aphylla. *Pallas it. 1. p. 495. n. 113.*

1116. HUMULUS. Flores dioici. Cor. o.

♂. Cal. 5phyllus.

♀. Cal. 1phyllus, oblique patens, integer. Sem. 1. intra calicem foliatum.

Lupulus. 1. HUMULUS. *Knorr del. hort. 2. t. L. 5. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 75. f. 2.*

310. BETA. Cal. 5fidus, 5costatus, maturo semine connivens. Cor. o. Sem. reniforme, intra substantiam baseos calicis, inferum, horizontale.

vulgaris. 1. B. floribus congestis, foliis inferioribus ovatis. *Blackw. t. 235. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 75. f. 5.*patula. 2. B. floribus congestis, foliis omnibus lineari-lanceolatis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 315.*

Ff 2

3. B.

- Cicla. 3. B. floribus ternis.
maritima. 4. B. floribus geminis.

MICROTEA. Cal. 5phyllus, patens. Cor. o. Drupa
ficca, echinata.

debilis. I. MICROTEA. Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 53.

311. SALSOLA. Cal. 5fidus. Cor. o. Sem. i. infe-
rum, calice corticatum.

* caule herbaceo.

- Kali. I. S. decumbens, foliis subulatis spinosis scabris, calicibus
marginatis axillaribus. Flor. dan. t. 818. Gaertn. de fr.
et sem. cent. 5. t. 75. f. 4.
- fativa. 2. S. diffusa, foliis teretibus glabris, floribus conglomeratis.
- hirsuta. 3. S. diffusa, foliis teretibus obtusis tomentosis. Flor. dan. t. 187.
- hyssopi- 4. S. diffusa, foliis alternis planis oblongo-linearibus lanugi-
folia. nosis. Pall. it. 1. p. 492. t. H. f. 1.
- Soda. 5. S. patula, foliis inermibus. Mant. p. 347. Jacq. b. Vind.
I. t. 68.
- carolinia- 29. S. decumbens, foliis lato-subulatis spinosis laevibus, ca-
na. licibus axillaribus sessilibus. Walt. flor. carol. p. 111.
- Tragus. 6. S. erecta, foliis subulatis spinosis laevibus, calicibus ovatis;
an mera Kali varietas? an ob corticis in semine defectum,
cum Kali et rosacea distincti generis?
- altissima. 7. S. erecta ramosissima, foliis filiformibus acutiusculis, basi
pedunculiferis. Buxb. cent. 1. t. 31. f. 2.
- falsa. 8. S. erectiuscula, foliis linearibus subcarnosis muticis, calici-
bus succulentis diaphanis. Mant. p. 347. Jacq. hort.
Vind. 3. t. 83.
- rosacea. 9. S. foliis subulatis mucronatis, calicibus explanatis. Buxb.
cent. 1. t. 14 f. 2.
- monan- 10. S. erecta, floribus monandris. Pall. it. 3. p. 724. t. M.
dra. f. 1. A. B. c. D. d.

** caule lignoso.

- polyclo- 11. S. sublignosa diffusa, foliis oblongis, calicibus marginatis
nos. glomeratis coloratis. Mant. p. 54. Barr. rar. pl. ic. t. 275.
12. S.

- orientalis. 12. S. suffruticosa erecta ramosa villosa, foliis imbricatis subrotundis. *S. G. Gmelin it. 4. p. 47. t. 5.*
- laniflora. 13. S. suffruticosa erecta, foliis obtusis carnosis, antheris coloratis. *Pallas it. 2. t. P.*
- prostrata. 14. S. frutescens, foliis linearibus pilosis inermibus. *Jacq. fl. austr. 3. t. 294.*
- vermiculata. 15. S. frutescens, foliis ovatis acutis carnosis. *Barr. pl. rar. ic. t. 215.*
- arborescens. 16. S. frutescens, foliis semicylindricis: inferioribus conjugatis. *Suppl. p. 173.*
- monobrocta. 17. S. frutescens diffusa, foliis linearibus pilosis inermibus, calice seta in spinam transeunte. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 55.*
- tetrandra. 18. S. fruticosa decumbens inermis, floribus brachiatim oppositis tetrandris. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 58. an hujus generis?*
- fruticosa. 19. S. fruticosa erecta, foliis filiformibus obtusiusculis. *Mant. p. 347. Du Hamel arbr. 1. t. 62. an ob semina plana nitida cum salsa et altissima distincti generis?*
- muricata. 20. S. fruticosa patula, ramulis hirsutis, calicibus spinosis. *Mant. p. 54. 512. Pallas it. 3. t. M. f. 3.*
- arbuscula. 21. S. fruticosa diffusa ramosissima, ramulis rigido-patentibus, bracteis alternis gibbis, foliis teretibus obtusis. *Pallas it. 1. p. 487. t. G. f. 1.*
- imbricata. 22. S. fruticosa diffusa inermis, ramis villosis, ramulis imbricatis, bracteis obtusis nudis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 57.*
- mucronata. 23. S. fruticosa, ramulis mucronatis, foliis subulatis inermibus. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 56.*
- longifolia. 24. S. fruticosa prostrata, foliis inermibus, teretibus glabris farinosis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 55.*
- aphylla. 25. S. fruticosa subaphylla, ramis flosculorum rudimento coo-
pertis. *Suppl. p. 173.*
- articulata. 26. S. fruticosa decumbens aphylla, ramis floriferis articulatis, floribus oppositis ad apices articulorum. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 55.*
- inermis. 27. S. fruticosa aphylla, ramis inermibus, bracteis farinoso-
villosis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 57.*

coquimbana. 28. *S. aphylla*, calicibus succulentis diaphanis. *Molin. hist. nat. Chil. p. 136.*

ANREDERA. *Cal.* 2partitus: laciniis dorso carinatis. *Sem.* 1 tectum calice membranaceo, compresso, 2alato.

spicata. I. **ANREDERA.** *Jussieu gen. plant. p. 84.*

312. ANABASIS. *Cal.* 3phyllus. *Cor.* 5petala. *Bacca* aquosa, isperma, calice cincta.

aphylla. I. *A. aphylla*, articulis emarginatis. *Gmel. fl. sib. 3. t. 18.*
 β) *Anabasis cretacea.* *Pall. it. 1. p. 493. t. 12. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 77. f. 4.*

foliosa. 2. *A. foliis subclavatis.* *Buxb. cent. 1. t. 19. f. 1.*

tamarisci. 3. *A. foliis subulatis, pericarpis exsuccis.*
 folia.

spinosissima. 4. *A. frutescens, ramis nudis spinosissimis.* *Suppl. p. 173.*

313. CRESSA. *Cal.* 5phyllus. *Cor.* hypocrateriformis. *Filamenta* tubo infidentia. *Caps.* 2valvis, isperma.

cretica. I. *Cr. caule herbaceo.* *Pluckn. alm. t. 43. f. 6.*

arabica. 2. *Cr. caule fruticoso.* *Forsk. fl. aeg. arab. p. 54.*

1254. STERIS. *Cal.* 5partitus. *Cor.* rotata. *Bacca* ilocularis, polysperma.

javana. I. **STERIS.** *Mant. p. 54.*

314. GOMPHRENA. *Cal.* coloratus: exterior 3phyl-
 lus: foliolis 2 conniventibus
 carinatis. *Petala* 5
 rudia, villosa. *Nectar.*
 cylindricum, 5dentatum.
Stil. semibifidus. *Caps.*
 isperma.

globosa. 1. *G.* caule erecto, foliis ovato-lanceolatis, capitulis solitariis,
 pedunculis diphyllis. *Rumpf. amb. 5. t. 100.*

brasiliensis. 2. *G.* caule erecto, foliis ovato-oblongis, capitulis peduncu-
 latis globosis aphyllis. *Jacq. pl. rar. ic. cent. 2. t. 10.*

hispida. 3. *G.* caule erecto, foliis crenatis, capitulis diphyllis. *Rheed.*
b. mal. 9. t. 72.

interrupta. 4. *G.* caule erecto, spica interrupta.

ferrata. 5. *G.* caule erecto brachiato, capitulis solitariis terminalibus
 sessilibus, calicibus ferratis.

perennis. 6. *G.* foliis lanceolatis, capitulis diphyllis: flosculis perianthio
 proprio distinctis. *Dill. b. Eth. t. 20. f. 22.*

flava. 7. *G.* pedunculis oppositis bifidis tricapitatis: capitulo inter-
 medio sessili.

arborescens. 8. *G.* arborescens pilosa subvolubilis. *Suppl. p. 173.*

ROCAMA. *Cal.* 1phyllus, corniculatus. *Cor.* o.
Caps. 2locularis, 2isperma.

arabica. 1. ROCAMA. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 71.*

315. BOSEA. *Cal.* 5phyllus. *Cor.* o. *Drupa* bac-
 cata, 1locularis, 1isperma.

Yervemora. 1. BOSEA. *Sloan. hist. jam. 2. t. 158. f. 3. Gaertn. de fr. et*
sem. cent. 5. t. 77. f. 6.

316. ULMUS. Cal. 5fidus. Cor. o. Capsf. supera,
ilocularis, foliaceo-compressa.
Sem. solitarium.

- campe- 1. U. foliis duplicato-ferratis basi inaequalibus, floribus sub-
stris. sessilibus conglomeratis. *Flor. dan. t. 632. Regn. bot.*
t. 332.
- effusa. 2. U. foliis duplicato-ferratis basi inaequalibus, floribus longe
pedunculatis effusis. *Willden. prodr. fl. berol. n. 296.*
Fouge roux de Bondar. act. Paris. 1784 t. 2.
- america- 3. U. foliis aequaliter ferratis basi inaequalibus. *Gaertn. de*
na. *fr. et sem. cent. 3. t. 49. f. 5.*
- pumila. 4. U. foliis aequaliter ferratis basi aequalibus. *Pallas flor. ross.*
t. 48.
- hollandi- 5. U. foliis ovatis acuminatis rugosis inaequaliter ferratis, cor-
ca. tice fungoso. *du Roi herb. Baumz. I. p. 505.*
- pubef- 6. U. foliis basi aequalibus oblongo-cordatis setaceo-ferratis
cens. pubescentibus. *Walt. flor. carol. p. 112.*
- memora- 7. U. foliis oblongis glabriusculis aequaliter ferratis basi subae-
lis. qualibus, floribus sessilibus. *Ait. hort. Kew. I. p. 320.*

1143. CELTIS. Flores masculi in eadem planta cum
hermaphroditis. Cor. o.
♂. Cal. 5partitus. Drupa ilocula-
ris, isperma, clausa.
♂. Cal. 6partitus. Stamina 6.

- australis. 1. C. foliis ovato-lanceolatis scabris. *Lob. ic. 186. Scop. del.*
aust. 2. t. 18.
- Lima. 2. C. foliis ovato-lanceolatis acuminatis oblique cordatis ferra-
tis superne scaberrimis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 53.*
- occiden- 3. C. foliis oblique ovatis acuminatis. *du Hamel arbr. I. t. 53.*
talis.
- orienta- 4. C. foliis oblique cordatis ferratis subtus villosis. *Pluckn.*
lis. *alm. t. 221. f. 4.*

1108. PISTACIA. Flores dioici. Cor. o.
 ♂. Ament. Cal. 5fidus.
 ♀. Distincta. Cal. 3fidus. Dru-
 pa ipyrena,ilocularis, su-
 perne clausa.

- trifolia. 1. P. foliis subternatis simplicibusque. *Bocc. mus. 2. t. 93.*
 narbo- 2. P. foliis pinnatis ternatisque suborbiculatis.
 nenfis.
 vera. 3. P. foliis impari-pinnatis: foliolis subovatis recurvis. *Regn. bot. t. 282.*
 Terebin- 4. P. foliis impari-pinnatis: foliolis ovato-lanceolatis. *Regn. thus. bot. t. 412.*
 Lentif- 5. P. foliis abrupte pinnatis: foliolis lanceolatis. *Blackw. herb. cus. t. 195.*

1115. CANNABIS. Flores dioici. Cor. o.
 ♂. Cal. 5partitus.
 ♀. Cal. 1phyllus, integer, late-
 re hians. Nucula 2valvis
 intra calicem clausum.

- fativa. 1. CANNABIS. *Blackw. herb. t. 322. a. b. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 75. f. 1.*

317. NAMA. Cal. 5partitus. Cor. 5partita. Caps.
 2locularis, 2valvis, supera, po-
 lysperma.

- zeylanica. 1. N. caule erecto glabro, foliis linearibus, floribus racemosis.
Fl. zeylan. t. 2.
 jamaicen- 2. N. caule decumbente, foliis ovatis, floribus solitariis.
 fis. *Brown. jam. t. 18. f. 2. Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 44. f. 8.*

DICHONDRA. Cal. 5phyllus. Cor. rotata, 5par-
 tita. Caps. 2cocca.

- repens. 1. D. caule repente, foliis reniformibus integerrimis. *Forst. char. gen. p. 20. t. 20. Smith plant. ic. ined. t. 20.*
 FF 5 2. D.

sericea. 2. D. foliis subtus sericeis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 54.*
an distincta species?

318. HYDROLEA. Cal. 5partitus. Cor. rotata,
 campanulata. Filamenta
 basi cordata. Caps. 2locu-
 laris, 2valvis. Receptacu-
 lum maximum. Semina
 parva.

spinosa. 1. H. floribus terminalibus. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 4.*
t. 55. f. 9. Aubl. pl. guj. 1. t. 110.

trigyna. 2. H. floribus axillaribus. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 54.*

quadri- 3. H. spinis pedunculisque axillaribus. *Walt. flor. carol. p. 110.*
 valvis.

DEMIDOFIA. Cal. 5partitus. Cor. tubulosa, 5fida.
 Anth. 2dymae. Germ. globosa.
 Stigm. peltata. Nuc. 2 coaduna-
 tae iloculares.

repens. 1. DEMIDOFIA. *Walt. flor. carol. p. 110.*

319. SCHREBERA. Cal. 5partitus. Cor. infundi-
 buliformis. Filamenta in
 fauce corollae squamis toti-
 dem baseos.

Schinoi- 1. SCHREBERA. *Sp. pl. 1662. Nov. act. Ups. 1. t. 5. f. 1. an*
 des. *vere distincti generis planta?*

ROCHFORTIA. Cal. 5partitus. Cor. infundibu-
 liformis: fauce aperta. Pe-
 ricarp. 2loculare, polysper-
 mum.

cuneata. 1. R. foliis cuneiformibus obovatis integris. *Swartz nov. pl.*
gen. et sp. p. 54.

ovata. 2. R. foliis ovatis emarginatis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 54.*

320. HEUCHERA. *Petala* 5. *Caps.* infera 2rostris, 2locularis, calice corticata, inter stilos hians.

americana- I. H. scapis subnudis, thyrso elongato, foliis radicalibus longe
na. petiolatis septemlobis bis acute crenatis. *Pluckn. alm.*
t. 58. f. 3. Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 36. f. 2.

dichoto- 2. H. caule ramoso, pedunculis bifloris axillaribus, foliis li-
ma. neari-lanceolatis oppositis integris caulinis. *Murr. Comm.*
Goett. 1772. p. 64. t. 1.

447. VELEZIA. *Cor.* 5petala, parva. *Cal.* filiformis, 5dentatus. *Caps.* ilocularis. *Sem.* plurima, serie simplici.

frigida. I. VELEZIA. *Buxb. cent. 2. t. 47.*

321. SWERTIA. *Cor.* rotata: lacinae ad basin poris nectariferis. *Caps.* ilocularis, 2valvis.

* *corollis quinquefidis.*

perennis. I. Sw. foliis radicalibus ovalibus. *Jacq. fl. austr. 3. t. 243.*

difformis. 2. Sw. pedunculis longissimis, corolla terminali sexfida, foliis linearibus.

rotata. 3. Sw. foliis lanceolato-linearibus. *Gmel. fl. sib. 4. t. 53. f. 1.*

carinthia- 4. Sw. caulibus unifloris basi foliolosis. *Jacq. misc. austr. 2.*
ca. *p. 23. t. 6.*

** *corollis quadrifidis.*

cornicu- 5. Sw. corollis quadricornibus. *Gmel. flor. sibir. 4. t. 53. f. 3.*
lata.

dichoto- 6. Sw. corollis ecornibus. *Gmel. flor. sibir. 4. t. 53. f. 2.*
ma.

322. GENTIANA. Cor. ipetala. Receptacula 2 longitudinalinalia. Caps. 2valvis, 1ocularis.

* corolla decemfidis.

pyrenaica. 1. G. corolla infundibuliformi aequali: laciniis exterioribus rudioribus. *Mant. p. 55. Gouan ill. t. 2. f. 2.*

** corollis septemfidis.

campanulata. 2. G. corollis campanulatis striatis immaculatis, calicibus septemfidis. *Jacq. fl. austr. 5. app. t. 29.*

pannonica. 3. G. corollis subseptemfidis campanulatis punctatis, calicibus subsexfidis, foliis caulinis lanceolatis acuminatis. *Jacq. fl. austr. 2. t. 136.*

*** corollis subquinquefidis.

purpurea. 4. G. corollis campanulatis verticillatis, calicibus truncatis. *Flor. dan. t. 50.*

punctata. 5. G. corollis campanulatis punctatis, calicibus quinquedentatis. *Jacq. fl. austr. 5. app. t. 28. β) Gentiana albiflora? Pallas it. 3. p. 724. t. L. f. 2.*

lutea. 6. G. corollis rotatis verticillatis, calicibus spathaceis. *Sabbat. h. rom. 1. t. 13.*

campestris. 7. G. corollis fauce barbatis, calicis laciniis duabus majoribus. *Flor. dan. t. 367. β) Gentiana tenella? Flor. dan. t. 318.*

**** corollis quinquefidis.

† campanulatis.

asclepiadea. 8. G. floribus oppositis sessilibus, foliis amplexicaulibus. *Jacq. fl. austr. 4. t. 328.*

Pneumonanthe. 9. G. floribus oppositis pedunculatis, foliis linearibus. *Flor. dan. t. 269.*

Saponaria. 10. G. corollis ventricosis verticillatis, foliis trinerviis. *Catesb. Car. 1. t. 70.*

villosa. 11. G. corollis ventricosis, foliis villosis.

acaulis. 12. G. corolla caulem excedente. *Jacq. fl. austr. 2. t. 135; Flores monadelph. β) Gentiana angustifolia. Vill. pl. Delph. 2. p. 526. γ) Gentiana alpina. Vill. pl. Delph. 2. p. 526. t. 10.*

13. G.

- nana. 13. G. corolla fauce barbata, foliis caulinis ovatis. *Jacq. misc. austr. 1. t. 18. f. 3.* β?) *Hall. hist. stirp. Helv. 1. n. 652.*
- exaltata. 14. G. corollis coronatis crenatis, pedunculo longissimo dichotomo terminali. *Plum. ic. 81. f. 1.*
- decumbens. 15. G. foliis radicalibus lanceolatis longissimis, caule decumbente. *Suppl. p. 174. Gmel. fl. sibir. 4 t. 51. f. A.*
- montana. 16. G. foliis cordatis sessilibus. *Forst. fl. austr. p. 21.*
- saxosa. 17. G. foliis spatulatis. *Suppl. p. 175. Forst. act. Stockh. 1777. t. 5.*
- Catesbaei. 18. G. foliis lanceolatis remotis. *Walt. flor. carol. p. 109.*
- frigida. 19. G. floribus terminalibus sessilibus, foliis obtusis radicalibus lineari-oblongis; caulinis lanceolatis, caule subbifloro. *Laënce ap. Jacq. collect. 2. p. 13.*
- viscosa. 48. G. foliis oblongis trinerviis, paniculis trichotomis, floribus monogynis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 321.*

†† corollis infundibuliformibus.

- verra. 20. G. corolla caulem excedente, foliis radicalibus confertis majoribus. *Renealm. spec. t. 68.* β) *Gentiana brachyphylla. Vill. pl. Delph. 2. p. 528.* γ) *Gentiana terglouvenensis. Hacq. pl. alp. carn. t. 2. f. 3.*
- pumila. 21. G. corolla subserrata, foliis lanceolato-linearibus. *Jacq. fl. austr. 4. t. 302.*
- bavarica. 22. G. corolla serrata, foliis ovatis obtusis. *Jacq. obs. bot. 2. t. 71.*
- aurea. 23. G. corollis acuminatissimis: fauce imberbi muticaque, ramis oppositis. *Barrel. pl. rar. ic. 3. t. 104. f. 1.*
- nivalis. 24. G. ramis unifloris alternis axillaribus, calicibus carinato-quinquangulis. *Flor. dan. t. 17.* β) *Gentiana minima Vill. pl. Delph. 2. p. 528.*
- aquatica. 25. G. floribus terminalibus sessilibus, foliis margine membranaceis. *Gmel. fl. sibir. 4. t. 53. f. 1.*
- Centaurium. 26. G. caule dichotomo, pistillo simplici. *Flor. dan. t. 617.* β) *Gentiana ramosissima. Vill. pl. Delph. 2. p. 530.*
- pulchella. 27. G. corollae tubo elongato, stilo simplici, caule simplicissimo. *Swartz nov. act. Stockh. 1783. p. 83. t. 3. f. 8. 9.*

- maritima. 28. G. caule dichotomo paucifloro, stilibus geminis. *Mant. p. 55. Barr. pl. rar. ic. 468. 469.*
- spicata. 29. G. floribus alternis sessilibus. *C. Baub. prodr. p. 130. ic.*
- verticilla- 30. G. floribus verticillatis octonis, caule ramoso. *Suppl. ris. p. 174.*
- verticilla- 31. G. floribus verticillatis, caule simplicissimo. *Pluckn. ic. ta. 81. f. 2.*
- quinque- 32. G. caule acutangulo, foliis ovatis amplexicaulibus. β) *Flor. dan. t. 344.*
- elongata. 33. G. caule elongato filiformi subnudo unifloro: calice oblongo aequali, foliis radicalibus aggregatis. *Jacq. collect. 2. p. 88. t. 17. f. 3.*
- prostrata. 34. G. caulibus unifloris prostratis, foliis obtusis subimbricatis. *Jacq. collect. 2. p. 66. t. 17. f. 2.*
- porphy- 37. G. caule simplici, foliis linearibus. *Walt. flor. carol. rio. p. 109.*
- scilloides. 35. G. caule unifloro prostrato ramoso, foliis obovatis obtusis trinerviis, floribus bibracteatis. *Suppl. p. 175.*
- Cachanla- 36. G. ramis oppositis patulis. *Molin. hist. nat. Chil. p. 124. huan.*
- ††† corollis hypocrateriformibus.
- utriculosa. 38. G. calicibus plicato-carinatis. *Barrel. pl. rar. ic. t. 48.*
- exacoides. 39. G. calicibus membranaceo-carinatis, caule dichotomo, foliis cordatis. *Burm. afr. t. 74. f. 5.*
- aphylla. 40. G. caule aphylo. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 89.*
- Amarella. 41. G. corollis fauce barbatis. *Flor. dan. t. 328.*
- ***** corollis quadrifidis.
- tetrago- 42. G. corollis imberbibus, pedunculis tetragonis. *Flor. dan. na. t. 318.*
- ciliata. 43. G. corollis margine ciliatis. *Jacq. fl. austr. 2. t. 113. β) Gentiana detonsa. Fr. Rottb. alt. Hafn. 10. t. 1. f. 3.*
- Cruciata. 44. G. floribus verticillatis sessilibus: corollis imberbibus. *Mant. p. 349. Jacq. fl. austr. 4. t. 372.*
- sessilis. 45. G. floribus acaulibus, foliis ovatis. *Feuill. peruv. 3. t. 14.*
- filiformis. 46. G. corollis imberbibus, caule dichotomo filiformi. *Flor. dan. t. 324.*
- heterocli- 47. G. floribus irregularibus, caule brachiato. *Mant. p. 560. ta.*

VAHLIA. π) Flores caliculati, 1parfi. Capsula.

capensis. I. VAHLIA. Thunb. nov. pl. gen. p. 36. ic.

1376. RUSSELIA. Cal. 5phyllus. Petala 5, supe-
ra. Caps.ilocularis, poly-
sperma.

capensis. RUSSELIA. Suppl. p. 175.

BUMALDA. Cor. 5petala. Stili villosi. Caps. 2lo-
cularis. 2rostris.

trifolia. I. BUMALDA. Thunb. fl. jap. p. 114.

1113. IRESINE. Flores dioici. Cal. 5phyllus. Cor.
5petala.

♂. Nectaria 7.

♀. Stigmata sessilia. Caps. femini-
bus tomentosus.

Celosia. I. IRESINE. Sloan. hist. jam. I. t. 90.

1059. IVA. Flores monoici.

♂. Cal. communis, 1-3phyllus. Cor.
disci 1petalae, 5fidae. Receptac.
pilis distinctum.

♀. Cal. flosculi radii 2-5. Cor. 0. Stili
longi. Sem. nudum, obtusum.

annua. I. I. foliis lanceolato-ovatis, caule herbaceo.

frutescens. 2. I. foliis lanceolatis ferratis, caule fruticoso. Pluckn. alm.
t. 27. f. 1.

Imbrica- 3. I. foliis lanceolatis integris, calice imbricato tubuloso, flos-
ta, culis femineis binis. Walt. flor. carol. p. 232.

mono- 4. I. foliis infimis bipinnatifidis, calice monophyllo, floscu-
phylla, lis femineis apetalis. Walt. flor. carol. p. 232.

1056.

π) An distincta species Gentiana islandica, Flor. dan. t. 343.

1056. XANTHIUM. Flores monoici.

♂. Cal. communis imbricatus. Cor. 1petalae, 5fidae, infundibuliformes. Receptaculum paleaceum.

♀. Cal. involucrium 2phyllum, 2florum. Cor. o. Caps. duplicata muricata, 2fida: Nucleus 2ocularis.

strumari- 1. X. caule inermi, foliis cordatis trinervatis. *Blackw. herb. um. t. 444.*

orientale. 2. X. caule inermi, foliis cuneiformi-ovatis subtrilobis. *Linm. dec. 33. t. 17.*

echina- 3. X. caule inermi, fructu ovali aeuleato: aculeis uncinatis confertis basi echinatis. *Murray comm. Goetting. 1784. cum ic.*

spinosum. 4. X. spinis ternatis, foliis trilobis. *Pluckn. alm. t. 239. f. 1.*

frutico- 5. X. foliis pinnatifidis: laciniis incis, caule fruticoso. *Suppl. sum. p. 418. an distincti generis?*

america- 6. X. foliis cuspidatis trilobis ferratis trinerviis, paleis flores num. masculos aequantibus, involucriis trifloris. *Wait. flor. carol. p. 231.*

1277. NEPHELIUM. Flores monoici. Cor. o.

♂. Cal. 5dentatus.

♀. Cal. 4fidus. Drupae 2ficcae, muricatae, ispermae.

lappaceum. I. NEPHELIUM.

223. PHYLLIS. Fructif. sparsae. Stigmata hispida. Caps. infera, 2ocularis, 2partibilis, 2sperma.

nobla. X. PHYLLIS. *Stipulae dentatae. Dill. b. Elth. t. 299. f. 386. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 25. f. 10.*

* UMBELLATAE.

1332. HERMAS. *Umbellae* in eadem planta herma-
phroditae, terminalis et mere
masculae laterales, utraeque
involucro universali partiali-
busque.

♀. *Umbellatae* radiis truncatis: cen-
trali florifero. *Stamina* ste-
rilia. *Sem.* 2 suborbiculata.

♂. *Umbellulae* multiflorae.

depaupe- I. H. frutescens, foliis amplexicaulibus dentatis subtus villo-
rata. sis. *Syst. nat* XII, 3. p. 204. *Bupleurum villosum.* *Burm.*
af. t. 71. f. 2.

gigantea. 2. H. foliis lanceolato-ovatis supra lanuginosis subtus tomen-
tosus integris. *Suppl. p. 435.*

capitata. 3. H. caule tomentoso, foliis subcordatis ferratis, umbellis ca-
pitatis. *Suppl. p. 435.*

quinque- 4. H. caule glabro, foliis ovatis quinquedentatis subtus tomen-
dentata. tosis, umbella solitaria. *Suppl. p. 436.*

ciliata. 5. H. caule glabro, foliis ovatis ciliatis subtus tomentosis, um-
bellis pluribus. *Suppl. p. 436.*

1165. ARCTOPUS. *Umbellae* in alia planta mere
masculae, in alia ex flos-
culis masculis et femineis
conflatae.

♂. *Umbella* composita. *In-*
volucr. 5 phylla. *Pistill.*
2. abortientia.

Androg. *Umbella* simplex. *In-*
volucr. 4 partitum, spino-
sum, maximum.

♂. plurimi in disco.

♀. 4 in radio. *Sem.* 1 inferum,
2loculare.

echinatus. I. ARCTOPUS. *Burm. afr. t. 1.*

1166. PANAX. *Umbellae* in alia planta hermaphroditae, in alia mere masculae.

♂. *Cal.* integer.

♀. *Cal.* 5dentatus, superus. *Bacca* 2sperma.

simplex. 1. *P.* foliis alternis lanceolatis ferratis, umbellis compositis. *Forst. fl. austr. p. 75.*

trifolia. 2. *P.* foliis ternis ternatis. *Trew. Ebret. t. 6. f. 2.*

quinquefolia. 3. *P.* foliis ternis quinatis. *Catesb. Car. 3. t. 16.*

attenuata. 4. *P.* foliis ternatis quinatisve, foliolis ovatis attenuatis crenatis, caudice arborecente. *Swartz nov. pl. gen. et. sp. p. 54.*

spinosa. 5. *P.* foliis quinatis alternis, spinis infrarameis solitariis, umbellis lateralibus. *Suppl. p. 441.*

arborea. 6. *P.* foliis septenatis, umbellis compositis. *Suppl. p. 441.*

Morotoni. 7. *P.* foliis octonatis lanceolatis undulatis subtus ferrugineis, floribus paniculatis. *Aubl. pl. guj. 2. p. 949. t. 360.*

fruticosa. 8. *P.* folis supradecompositis dentato-ciliatis, caule fruticoso. *Rumpf amb. 4. t. 33.*

324. ERYNGIUM. *Flores* capitati. *Involucrum* universale polyphyllum. *Receptaculum* paleaceum. *Semina* squamulis flexilibus aspera.

foetidum. 1. *E.* foliis radicalibus lanceolatis ferratis: floralibus multifidis, caule dichotomo. *Sloan. hist. jam. 1. t. 156. f. 3. 4.*

aquatium. 2. *E.* foliis gladiatis ferrato-spinosis: floralibus indivisis. *Pluckn. alm. t. 175. f. 4.*

planum. 3. *E.* foliis radicalibus ovalibus planis crenatis, capitulis pedunculatis. *Jacq. fl. austr. 4. t. 391.*

pusillum. 4. *E.* foliis radicalibus oblongis incis, caule dichotomo, capitulis sessilibus.

tricuspidatum. 5. *E.* foliis radicalibus cordatis: caulinis palmatis; auriculis retroflexis, paleis tricuspidatis. *Morif. hist. pl. 3. t. 37. f. 13. 6. E.*

- mariti- 6. E. foliis radicalibus subrotundis plicatis spinosis, capitulis
mum. pedunculatis: paleis tricuspидatis. *Flor. dan. t. 875.*
- campestre. 7. E. foliis radicalibus amplexicaulibus pinnato-lanceolatis.
Jacq. fl. austr. 2. t. 155. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 20. f. 1.
- amethy- 8. E. foliis radicalibus trifidis basi subpinnatis. *Besl. h. Eyst.*
stinum. *O. II. t. 8. f. 4.*
- Bourgati. 9. E. foliis omnibus digitatis, laciniatis suborbiculatis, capi-
tulis subrotundis, paleis subulatis integris. *Ait. hort.*
Kew. 1. p. 326. Gouan. ill. t. 3.
- alpinum. 10. E. foliis caulinis digitatis, laciniatis, radicalibus cordatis,
capitulo oblongo polyphyllo: paleis setaceis trifidis. *Mant.*
p. 349. Jacq. pl. rar. ic. cent. 1. t. 94. An distincta hu-
jus generis species Eryngium albo-villosum Forsk. fl. aeg.
arab. p. XIII?
- america- 11. E. foliis integris: radicalibus rotundatis; caulinis ovato-
num. lanceolatis, summis trifidis, caule procumbente. *Walt.*
flor. carol. p. 112.

325. HYDROCOTYLE. *Umbella simplex pedicel-*
lata. Involucro 2-4-
phyllo. Petala inte-
gra. Fructus com-
pressus, gibbus, 2-
partibilis.

- vulgaris. 1. H. foliis emarginatis peltatis, umbellis quinquefloris. *Flor.*
dan. t. 90.
- natans. 17. H. foliis reniformibus repando-crenatis natantibus. *Cy-*
rill. pl. rar. Neap. fasc. 1. t. VI. B.
- umbellata. 2. H. foliis peltatis, umbellis multifloris.
- americana. 3. H. foliis reniformibus sublobatis crenatis, umbellis quin-
quefloris.
- asiatica. 4. H. foliis reniformibus dentato-crenatis. *Rheed. h. malab.*
10. t. 46. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 22. f. 5.
- hirsuta. 5. H. hirsuta, foliis reniformibus lobatis crenatis, floribus ver-
ticillatis: verticillis quadrifloris. *Swartz nov. pl. gen. et.*
sp. p. 54.
- moschata. 6. H. foliis reniformibus septemlobatis serratis villosis, umbel-
lis multifloris. *Forst. fl. austr. p. 22.*

- renifor- 15. H. foliis reniformibus dentatis erectis. *Walt. flor. carol.*
mis. p. 113.
- ranuncu- 7. H. foliis quinquepartitis incis. *Suppl. p. 177.*
loides.
- cordata. 16. H. foliis cordatis integris erectis. *Walt. flor. carol. p. 113.*
- erecta. 8. H. foliis cordatis crenatis, scapis paucifloris longitudine pe-
tiolorum. *Suppl. p. 177.*
- villosa. 9. H. tomentosa, foliis cordatis integerrimis tomentosis. *Suppl.*
p. 175. Syst. nat. XII. 3. p. 620. Centella villosa. Mant.
p. 298. Mercurialis afra.
- glabrata. 10. H. glaberrima, foliis ovatis vel lanceolatis acutis triner-
viis glaberrimis. *Syst. nat. XII. 3. p. 620. Centella gla-*
brata.
- Solandra. 11. H. tomentosa, foliis cuneiformibus ovatis retusis septem-
dentatis. *Suppl. p. 176. Syst. nat. XII. 3. p. 627. So-*
landra capensis. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 22. f. 5.
- tridenta- 12. H. tomentosa, foliis lineari-cuneiformibus apice tridenta-
ta. *Suppl. p. 176.*
- finensis. 13. H. foliis linearibus, umbellis multifloris.
- virgata. 14. H. virgata, foliis semiteretibus linearibus fulco exaratis
internodio longioribus. *Suppl. p. 176.*

326. SANICULA. *Umbellae confertae, subcapita-*
tae. Flores disci abortien-
tes. Fructus aculeis hama-
tis muricatus.

- europaea. 1. S. foliis radicalibus orbicularibus quinquelobis, flosculis
omnibus sessilibus. *Flor. dan. t. 283.*
- canadensis. 2. S. foliis radicalibus compositis: foliolis ovatis.
- marilan- 3. S. flosculis masculis pedunculatis hermaphroditis sessilibus.
dica. *Jacq. pl. rar. ic. cent. 2. t. II. Gaertn. de fr. et sem.*
cent. 1. t. 20. f. 3.

237. ASTRANTIA. *Involucra partialia lanceolata, patentia, aequalia, longiora, colorata. Flores plurimi abortientes. Caps. costis 5rotundatis transversim rugosis, ispermae, clausae.*

- major. 1. A. foliis quinquelobis: lobis trifidis. *Blackw. herb. t. 470. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 20. f. 2.*
 carnioli- 2. A. foliis quinquelobis: lobis indivisis. *Jacq. fl. austr. 5. ca. app. t. 10.*
 Epipactis. 3. A. foliis quinquepartitis obtusis serratis. *Jacq. fl. austr. 5. app. t. 11.*
 minor. 4. A. foliis digitatis serratis. *Scopol. fl. carn. ed. 2. t. 7.*

328. BUPLEURUM. *Involucra umbellulae majora 5phylla. Petala involuta. Fructus ovatus gibbus parvus, apice non coronatus.*

* herbacea.

- rotundi- 1. B. involucris universalibus nullis, foliis perfoliatis. *Blackw. folium. herb. t. 95. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 22. f. 7.*
 stellatum. 2. B. involucro universali triphylo, partialibus coadunatis. *Hall. stirp. Helv. n. 771. t. 18.*
 angulo- 3. B. involucro universali triphylo ovato: partialibus orbicu-
 fum. latis, foliis amplexicaulibus cordato-lanceolatis. β) Bupleurum Vapincense. *Vill. pl. Delph. 2. p. 574*
 odontites. 4. B. involucro universali triphylo: partialibus acutis, flosculo centrali altiore, ramis divaricatis. *Jacq. h. Vind. 3. t. 91. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 22. f. 7.*
 ranuncu- 5. B. involucro universali triphylo; partialibus lanceolatis
 loides. longioribus, foliis caulinis lanceolatis. *Mant. p. 349. Park. theat. t. 338. β) Bupleurum angulosum. Vill. pl. delph. 2. p. 574. γ) Bupleurum gramineum. Vill. pl. delph. 2. p. 575.*

- rigidum. 6. B. involuero universali triphylo: partialibus miuimis acutis, caule dichotomo subnudo.
- tenuiffimum. 7. B. involuero universali triphylo, umbellis simplicibus alternis paucifloris, foliis lineari-lanceolatis, caule prostrato. *Morif. hist. pl. 3. t. 14. f. 4. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 22. f. 7.*
- pyrenaeum. 20. B. involuero universali triphylo aurito connato, involu-cellis obovatis emarginatis inaequalibus, foliis lanceolatis. *Gouan. illustr. t. 4. f. 12.*
- junceum. 8. B. involuero universali subtriphylo; umbellis compositis, foliis linearibus, caule erecto paniculato.
- baldense. 21. B. involuero universali tetraphyllo, partialibus pentaphyllis acuminatis, ramis folisque alternis. *Turro giorn. di Venez. t. 1.*
- longifolium. 9. B. involuero universali subpentaphyllo: partialibus ovatis, foliis amplexicaulibus. *Camerar. hort. t. 38.*
- falcatum. 10. B. involuero universali subpentaphyllo: partialibus acutis, foliis lanceolatis, caule flexuoso. *Jacq. fl. austr. 2. t. 128.*
- petracum. 11. B. involuero universali pentaphyllo: partialibus coadunatis.
- Gerardi. 12. B. involuero universali pentaphyllo, foliis lanceolato-linearibus, caule erecto paniculato. *Jacq. fl. austr. 3. t. 256.*
- flavum. 13. B. involuero universali pentaphyllo, foliis radicalibus linearibus, caule subnudo dichotomo erecto. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 205.*
- semicompositum. 14. B. umbellis compositis simulque simplicibus.
- nudum. 15. B. involucris involu-cellisque lanceolato-oblongis, caule ramoso aphylo, foliis radicalibus decompositis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 331.*

** frutescentia.

- fruticosum. 16. B. foliis obovatis integerrimis.
- fruticescens. 17. B. inerme, foliis linearibus. *Sabb. h. rom. 4. t. 80.*
- spinosum. 18. B. foliis linearibus, paniculae ramis femine nudis spiniferis. *Suppl. p. 178. Gouan. bot. t. 2. f. 3.*

difforme. 19. B. foliis vernalibus decompositis planis incisis: aestivalibus filiformibus angulatis trifidis.

*** *arborescentia.*

arborescens. 20. B. foliis subsessilibus longe lanceolatis integerrimis ad oras cartilagineis. *Jacq. coll. 2. p. 343. pl. rar. ic. cent. 2. t. 57.*

329. ECHINOPHORA. *Flores* laterales masculi: centrali hermaphrodito. *Sem.* 1, involucllo immersum.

spinosa. 1. E. foliolis subulato-spinosis integerrimis. *Turr. fars. 7. tenuifolia.* 2. E. foliolis incisis inermibus. *Column. ecphr. 1. t. 101.*

1377. COPROSMA. *Flores* hermaphroditi, masculi et feminei. *Cal.* 5partitus. *Cor.* 5-7fida. *Stamin.* 5-7. *Stili* longi. *Bacca* 2sperma: *Semina* planiuscula.

lucidum. 1. C. pedunculis compositis. *Suppl. p. 178. Forster. char. gen. p. 69. t. 69. f. h-k.*

foetidissimum. 2. C. floribus solitariis. *Suppl. p. 178. Forster. char. gen. p. 69. t. 69. f. a-g.*

241. HASSELQUISTIA. *Cor.* radiatae: disci mascululae. *Sem.* ambitus geminata, margine crenata, *disci* solitaria, urceolata, hemisphaerica.

aegyptiaca. 1. H. foliis pinnatis: foliolis pinnatifidis. *Mant. p. 217. Suppl. p. 179. Jacq. h. Vind. 1. t. 87. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 21. f. 2.*

cordata. 2. H. foliis cordatis. *Suppl. p. 179. Jacq. h. Vind. 2. t. 193. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 21. f. 2.*

330. **TORDYLIUM.** *Cor.* radiatae, omnes hermaproditae. *Involucra* longa indivisa. *Semina* orbiculata, compressa, plana, margine incrassato cincta.

- fyriacum. 1. *T.* involucris umbella longioribus. *Jacq. b. Vind. 1. t. 54. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 21. f. 3.*
- officinale. 2. *T.* involucellis longitudine florum: foliolis ovatis lanceolatis.
- peregrinum. 3. *T.* involucro monophyllo subtrifido, feminibus sulcatis rugosis plicatis. *Mant. p. 55. Column. ecephr. 1. t. 124.*
- apulium. 4. *T.* umbellis remotis, foliis pinnatis: pinnis subrotundis laciniatis. *Jacq. b. Vind. 1. t. 53. an satis distinctum ab officinali?*
- maximum. 5. *T.* umbellis confertis, foliolis lanceolatis inciso-ferratis. *Jacq. fl. austr. 2. t. 142.*
- seifolium. 6. *T.* involucellis polyphyllis, involucro submonophyllo, foliolis oblongis ferratis. *Scop. flor. carn. t. 8. an hujus generis?*

331. **CAUCALIS.** *Cor.* radiatae, disci masculae. *Involucra* foliola integra. *Petala* inflexo-emarginata. *Semina* setis aut aculeis obfessa.

- grandiflora. 1. *C.* feminibus ovatis: costis dorsalibus approximatis quatuor; aculeis diffusis, petalis exterioribus maximis. *Jacq. fl. austr. 1. t. 24. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 20. f. 5.*
- daucoides. 2. *C.* involucellis dimidiatis linearibus, foliis ovato-oblongis: angulis dorsalibus quatuor distantibus hispidis, foliis glabris basi costaque pilosis. *Jacq. fl. austr. 2. t. 157. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 20. f. 5.*
- latifolia. 3. *C.* feminibus ovatis: costis dorsalibus pluribus elevatis aculeatis, foliis pinnatis ferratis. *Jacq. fl. austr. 2. t. 128. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 20. f. 5.*

- mauritanica. 4. C. involucro univetsali monophyllo; partialibus triphyllis.
- orientalis. 5. C. feminibus satis exstantibus apice viscoso-glandulosis, involuclorum foliis supradecompositis laciniatis; laciniis linearibus. *Mant. p. 351. Morif. hist. pl. 3. t. 14. f. 5.*
- helvetica. 6. C. involucro univetsali subnullo: partialibus tri- ad quinquefidis, umbella tri- ad decemfida, ramis striete divaricatis. *Jacq. h. Vind. 3. app. t. 16.*
- leptophylla. 7. C. feminibus semicylindricis: angulis dorsalibus obsoletis; aculeis diffusis scabris, foliis undique pilosis. *Mant. p. 391. Jacq. h. Vind. 2. t. 195.*
- nodosa. 8. C. feminibus ovatis: exterioribus hispidis; interioribus scabris. *Syst. nat. XII. 3. p. 205. Tordylium nodosum. Jacq. fl. austr. 5. app. t. 24. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 20. f. 6.*
- maritima. 9. C. feminibus ovatis crassis: aculeis inaequalibus flavescensibus, caule humili pubescente, foliorum laciniis obtusiusculis. *Gerard. flor. t. 10.*
- Anthriscus. 10. C. feminibus ovalibus: dorso aculeis sparsis scabris. *Syst. nat. XII. 3. p. 205. Tordylium Anthriscus. Jacq. fl. austr. 3. t. 261.*
- scandicina. 11. C. feminibus ovato-acuminatis: dorso aculeis brevibus sparsis. *Syst. nat. XII. 3. p. 214. Scandix Anthriscus. Jacq. fl. austr. 2. t. 154. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 20. f. 6.*
- virgata. 12. C. feminibus membranaceo-alatis, involucris subhexaphyllis. *Poir. voy. en Barb. 2. p. 133.*
- pumila. 13. C. villosa, foliis tripinnatis, flosculis hermaphroditis sessilibus, masculis subpedicellatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 206.*
- glabra. 14. C. glabra, foliis tripinnatis, flosculis omnibus pedicellatis, involucro tridentato. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 206.*
- angustifolia. 15. C. foliis angustis multifidis, involucro univetsali partialibusque hispidis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 206.*

332. ARTEDIA. *Involucra pinnatifida. Flosculi disci masculi. Fructus squamis hispidus.*

squamata, I. ARTEDIA. *Camer. hort. t. 16.*

Gg 5

333.

333. DAUCUS. *Cor.* subradiatae, omnes (ut plurimum) hermaphroditae. *Involucri* foliola divisa. *Semina* subrotunda.

- Carota. 1. D. feminibus ad angulos quatuor distantes hispidis, petioli subtus nervosis. *Flor. dan. t. 723.* β) *Blackw. herb. t. 546.*
- mauritanicus. 2. D. feminibus ad angulos quatuor distantes hispidis, flosculo centrali sterili carnoso, receptaculo communi hemisphaerico. *Morif. hist. pl. 3. t. 13. f. 2. 3.*
- muricatus. 3. D. feminibus triglochidi-aculeatis. *Syst. nat. XII. 3. p. 205.* *Caucalis platycarpus. Jacq. b. Vind. 3. t. 10. Gaertn. de fr. et sem. cent. II. t. 20. f. 4.*
- Gingidium. 4. D. radiis involucris planis: laciniis recurvis. *Morif. hist. pl. 3. t. 9. f. 10.*
- lucidus. 5. D. foliis lucidis, caule hirsuto, petioli laevibus. *Suppl. p. 179.*
- Vifnaga. 6. D. feminibus striatis villosis, umbella universali basi coalita. *Mant. p. 352. Jacq. b. Vind. 3. t. 26. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 21. f. 12.*
- alatus. 7. D. feminibus angulis membranaceis hispidis. *Poir. voy. en Barbar. 2. p. 135. Corolla parva, lutea.*
- divaricatus. 8. D. feminibus striatis scabris, caule dichotomo ramosissimo, umbellae radiis subtrifloris. *Walt. flor. carol. p. 114.*
- gummifer. 9. D. feminibus aculeatis, flosculo centrali sterili, caule nitido. *Bocc. mus. 2. f. 23.*
- polygamus. 10. D. feminibus hispidis, umbellulis marginalibus pluribus masculis. *Morif. hist. pl. 3. f. 9. t. 9. f. 10.*

334. AMMI. *Involucra* pinnatifida. *Cor.* radiatae, omnes hermaphroditae. *Fructus* ovato-globosus, parvus, gibbus, multistriatus.

- majus. 1. A. foliis inferioribus pinnatis lanceolatis ferratis: superioribus multifidis linearibus, feminibus laevibus. *Blackw. herb. t. 447. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 22. f. 8.*

- opticum. 2. A. foliis supradecompositis linearibus, feminibus muricatis.
Mant. p. 56. Jacq. b. Vind. 2. t. 196.
- laucifo- 3. A. foliis bipinnatis: pinnis pinnatis trifidis; primis costae
 lium. communi verticillatim adnatis. *Scop. fl. carn. t. 10.*
- glaucifo- 4. A. foliorum omnium lacinulis lanceolatis.
 lium.

335. BUNIUM. *Cor. uniformis. Umbella conferta. Stil. reflexi, decidui. Fructus subcylindrici, striati, apice crassiores.*

- Bulboca- 1. B. involucro polyphyllo. *Flor. dan. t. 220. β) Bunium*
 stanum. minus. *Gouan. ill. p. 10.*
- aromati- 2. B. involucellis triphyllis. *Mant. p. 218.*
 cum.

336. CONIUM. *Involucella dimidiata, subtriphylla. Fructus ovatus, gibbus: costis compressis ante maturitatem undulatis.*

- macula- 1. C. feminibus inermibus, caule ramosissimo, maculato gla-
 tum. bro. *Jacq. fl. austr. 2. t. 156. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 22. f. 10.*
- suffruti- 5. C. feminibus angulato-striatis, caule suffruticoso. *Berg.*
 cofum. *flor. cap.*
- rigens. 2. C. feminibus submuricatis, pedunculis fulcatis, foliolis ca-
 naliculatis obtusis. *Mant. p. 352. 512.*
- africa- 3. C. feminibus muricatis, petiolis pedunculisque laevibus.
 num. *Mant. p. 352. Jacq. b. Vind. 2. t. 194.*
- Royeni. 4. C. feminibus radiato-spinosis. *Buxb. cent. 3. t. 28.*

337. SELINUM. *Involucrum reflexum. Petala cordata, aequalia. Semen parvum, alis membranaceis 5: lateralibus maximis.*

- sylvestre. 1. S. radice fusiformi multiplici, stilibus erectis, corollis expli-
 catis. *Mant. p. 353. Suppl. p. 180. Jacq. fl. austr. 2. t. 152.*
2. S.

- palustre. 2. S. caule laevi sublaetefcente, radice simplici, foliis quadruplicato-pinnatis linearibus. *Mant. p. 353. Flor. dan. t. 257.*
- austriacum. 3. S. caule striato sulcato, foliolis ovatis incis. *Jacq. fl. austr. I. t. 71.*
- Canifolia. 4. S. caule sulcato acutangulo, foliis triplicato-pinnatis: pinnis latiusculis simplicibus trifidisque, foliolis apice mucronatis. *Mant. p. 353. Suppl. p. 180. Jacq. fl. austr. I. t. 16. Flor. dan. t. 667.*
- Chabraei. 5. S. vaginis foliorum caulinarum planis flaccidis pendulis. *Jacq. fl. austr. I. t. 72.*
- Seguieri. 6. S. involuero universali nullo, pistillis divaricatissimis. *Suppl. p. 179. Jacq. b. Vind. I. t. 61.*
- Monnieri. 7. S. umbella conferta, feminibus costis quinque membranaceis. *Jacq. hort. Vind. I. t. 62.*
- sibiricum. 8. S. involuero universali partialibusque decoloribus enneaphyllis, foliis tripinnatis. *Retz. obs. bot. 2. p. 16.*

338. ATHAMANTA. *Petal. inflexa, emarginata.*
Fructus ovato-oblongus, striatus.

- Libanotis. 1. A. foliis bipinnatis planis, umbella hemisphaerica, feminibus hirsutis. *Gaertn. de fr. et sem. cent. I. t. 21. f. 1. Jacq. fl. austr. 4. t. 392. Flor. dan. t. 754. β) Athamanta pyrenaica. Jacq. b. Vind. 2. t. 197.*
- Cervaria. 2. A. foliis duplicato-pinnatis: foliolis oblongis obtusis trilobis dentato-ferratis; ferraturis mucronatis, feminibus nudis. *Jacq. fl. austr. I. t. 69. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 21. f. 10.*
- sibirica. 3. A. foliis pinnatis inciso-angulatis. *Mant. p. 56. 353. Gmel. fl. sib. I. t. 40. f. 1. 2.*
- condensata. 4. A. foliis subbipinnatis: foliolis deorsum imbricatis; umbella lentiformi.
- Oreoselinum. 5. A. foliis triplicato-pinnatis: foliolis lanceolatis trifidis integerrimis divaricatis, feminibus nudis. *Jacq. fl. austr. I. t. 68. β) Athamanta Galatta. Jacq. pl. alp. Cam. t. 5.*
- ficula. 6. A. foliis inferioribus nitidis, umbellis primordialibus sessilibus, feminibus pilosis.

- cretenfis. 7. A. foliolis linearibus planis hirsutis, petalis bipartitis, feminibus oblongis hirsutis. *Jacq. fl. austr. 1. t. 62. B)*
Athamanta rupestris. *Scop. fl. carn. t. 9.*
- annua. 8. A. foliis multipartitis: laciniis linearibus teretiufculis acuminatis, feminibus villosis.
- finenfis. 9. A. foliis supradecompositis lacibus multifidis, feminibus membranaceo-ftriatis.
- Matthio- 10. A. foliis supradecompositis diffusis: foliolis elongato-subse-
li. taceis, feminibus acutis hirsutis. *Wulfen apud Jacq. coll. 1. p. 211.*
- daucoides. 11. A. foliis pinnatis: pinnis pinnatifidis: laciniis trifidis, umbellis densissimis. *Scop. flor. carn. ed. 2.*

339. PEUCEDANUM. *Involucra brevissima. Fructus ellipticus substriatus, lenticulari-compressus.*

- japonicum. 1. P. foliis quinquies tripartitis: foliolis cuneiformibus trifidis. *Thunb. fl. jap. p. 117.*
- officinale. 2. P. foliis quinquies tripartitis filiformibus linearibus. *Regin. bot. t. 405. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 21. f. 7.*
- alpestre. 3. P. foliolis linearibus ramosis.
- minus. 4. P. foliis pinnatis: foliolis pinnatifidis; laciniis linearibus oppositis, caule ramosissimo patulo.
- Silaus. 5. P. foliolis pinnatifidis: laciniis oppositis, involucrio univexali diphylo, stilibus deflexis. *Jacq. fl. austr. 1. t. 15.*
- alfaticum. 6. P. foliis pinnatifidis: laciniis trifidis obtusifusculis, feminibus compressis. *Jacq. fl. austr. 1. t. 70.*
- nodosum. 7. P. foliolis alternatim multifidis.
- geniculatum. 8. P. foliis subrotundo-reniformibus crenatis. *Forster fl. austr. p. 22.*
- redivivum. 9. P. foliis radicalibus bipinnatis plumosis, caule serotino aphylo ramofo, umbellis paucifloris albis. *Pallas act. Petrop. 1779. 2. p. 252. t. 8. f. 1-3.*
- aureum. 10. P. foliis tripinnatis: foliolis caulinis lineari-lanceolatis, radicalibus oblongis multifidis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 341.*

340. CRITHMUM. *Flosculi* aequales. *Fructus* ovalis, compressus.

- maritimum. 1. Cr. foliolis lanceolatis carnosis. *Mant. p. 353. Jacq. b. Vind. 2. t. 182.*
 pyrenaicum. 2. Cr. foliolis lateralibus bis trifidis. *an Athamanta Libanotis senescens?*
 latifolium. 3. Cr. foliolis sessilibus obovatis lobatis: lobis dentatis. *Suppl. p. 180.*

SPANANTHE. *Flosculi* aequales. *Fructus* ovalis: feminibus in dorso 3striatis.

- paniculata. I. SPANANTHE. *Jacq. collect. 3. p. 247.*

342. CACHRYS. *Fructus* subovatus, angulatus, suberoso-corticatus.

- Libanotis. I. C. foliis bipinnatis: foliolis linearibus acutis multifidis, feminibus sulcatis laevibus. *Morif. hist. pl. 3. t. 1. f. 5. 6.*
 ficula. 2. C. foliis bipinnatis: foliolis linearibus acutis, feminibus sulcatis hispidis. *Morif. hist. pl. 3. t. 1. f. 3.*
 odontalgica. 3. C. foliis radicalibus supradecompositis tomentoso-canis, caule nudo, feminibus laevissimis. *Suppl. p. 181. Pallas it. 3. p. 720. t. G. f. 1. 2. 3.*

343. FERULA. *Fructus* ovalis, compresso-planus: striis utrinque 3.

- communis. I. F. foliolis linearibus longissimis simplicibus.
 glauca. 2. F. foliis supradecompositis: foliolis lanceolato-linearibus planis.
 tingitana. 3. F. foliolis laciniatis: lacinulis tridentatis inaequalibus nitidis. *Scop. delic. inf. 3. t. 9. 10.*
 Ferulago. 4. F. foliis pinnatifidis: pinnis linearibus planis trifidis. *Morif. hist. pl. 3. t. 15. f. 1.*
 orientalis. 5. F. foliorum pinnis basi nudis: foliolis setaceis. *Tournef. it. 3. p. 239. ic.*
 meoides. 6. F. foliorum pinnis utrinque appendiculatis: foliolis setaceis.
 7. F.

nodiflora. 7. F. foliolis appendiculatis, umbellis sessilibus. *Jacq. fl. austr. 5. app. t. 5.*

canadensis. 8. F. lucida.

Alfa foeti. 9. F. foliis alternatim sinuatis obtusis. *Kaempf. amoen. ex. da. p. 536. ic.*

persica. 10. F. foliis multiplicato-pinnatis: foliolis confluentibus acutis. *Hope act. angl. 75. 1. 4. 5. p. 36. cum ic.*

villosa. 11. F. foliis supradecomposito-ternatis: foliolis ovatis serratis rigidis, caule pedunculisque villosis. *Walt. flor. carol. p. 115.*

344. LASERPITIUM. *Petala inflexa, emarginata, patentia. Fructus oblongus: angulis 8 membranaceis.*

latifolium. 1. L. foliolis cordatis inciso-serratis. *Jacq. fl. austr. 2. t. 146.*

trilobum. 2. L. foliolis trilobis incis. *Pluckn. phyt. 223. f. 7.*

aquilegi- 3. L. foliolis obtusis basi ovatis lobatis. *Jacq. fl. austr. 2. folium. t. 147.*

gallicum. 4. L. foliolis cuneiformibus furcatis.

filifoli- 5. L. radice multicipite, caule glabro, foliolis pinnatifidis: um. laciniis lanceolatis. *Jacq. fl. austr. 5. app. t. 44.*

angustifo- 6. L. foliolis lanceolatis integerrimis sessilibus. *Morif. hist. lium. pl. 3. t. 19. f. 9.*

pruteni- 7. L. foliolis lanceolatis integerrimis: extimis coalitis. *Jacq. cum. fl. austr. 2. t. 153.*

Halleri. 8. L. foliis triplicato-pinnatis: lobulis lanceolatis. *Hall. hist. stirp. Helv. n. 795. t. 19.*

dauri- 9. L. caule maculato, foliolis pinnatifidis acuminatis. *Jacq. cum. b. Vind. 3. t. 38.*

peuced- 10. L. foliolis lineari-lanceolatis venoso-striatis distinctis. *Jacq. noides. pl. rar. ic. cent. 2. t. 32.*

Siler. 11. L. foliolis ovali-lanceolatis integerrimis petiolatis. *Jacq. fl. austr. 2. t. 145. an, quamvis semina angulis membranaceis careant, hujus generis?*

- Chironi- 12. L. foliolis oblique cordatis: petiolis hirsutis. *Blackw. herb.*
um. z. 434.
- ferulace- 13. L. foliolis linearibus. *Tournef. it. 2. p. 121. ic.*
um.
- simplex. 14. L. scapo nudo aphylo simpliciter, umbella semiglobosa, fo-
liis pinnatis multifidis acutis linearibus. *Mant. p. 56.*
- Aciphyl- 15. L. caule vaginato, foliis digitatis linearibus elongatis mu-
la. cronatis: petiolis dilatatis. *Suppl. p. 181. Forst. char.*
gen. p. 68. t. 68.

345. HERACLEUM. *Involucrum caducum. Cor.*
difformis: petalis inflexo-
emarginatis. Semina fo-
liaceo-compressa, glabra,
marginem membranaceo,
angustissimo cincta.

- Sphondy- 1. H. foliolis pinnatifidis laevibus, floribus uniformibus.
lium. *Blackw. herb. z. 540.*
- angustifo- 2. H. foliis cruciatis-pinnatis: foliolis linearibus, corollis flos-
lium. culosis. *Mant. p. 157. Jacq. fl. austr. 2. t. 173.*
- pumilum. 3. H. foliis bipinnatis: foliolis lanceolatis glabris, caule pro-
strato. *Vill. pl. Delph. 2. p. 640. t. 14.*
- longifo- 4. H. foliorum pinnis longissimis. *Jacq. fl. austr. 2. t. 174.*
lium.
- sibiricum. 5. H. foliis pinnatis: foliolis quinque; intermediis sessilibus, cor-
rollulis uniformibus. *Mant. p. 354.*
- Panaces. 6. H. foliis pinnatis: foliolis quinque; intermediis sessilibus, flo-
ribus radiatis. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. z. 21. f. 4.*
- austria- 7. H. foliis pinnatis utrinque rugosis scabris, floribus subradia-
cum. tis. *Mant. p. 354. Jacq. fl. austr. 1. t. 61.*
- tubero- 8. H. foliolis septenis, floribus radiatis, radice tuberosa. *Mo-*
sum. *lin. hist. nat. Chil. p. 115.*
- alpinum. 9. H. foliis simplicibus, floribus radiatis. *Barrel. pl. rar. ic. 55.*

346. **LIGUSTICUM.** *Cor.* aequales: *petalis* involu-
tis, integris. *Fructus*
ovato-oblongus, utrin-
que attenuatis: costis
utrinque 5.

- Levissi- 1. L. foliis multiplicibus: foliolis superne incisis. *Blackw.*
cum. *herb. t. 275.*
- nodiflo- 2. L. foliis multitermatis; foliolis ovatis profunde serratis, ra-
rum. mis verticillatis, umbellis numerosissimis. *Vill. pl. Delph.*
2. p. 608. t. 13.
- scoticum. 3. L. foliis biternatis. *Flor. dan. t. 207.*
- Gmelini. 4. L. foliis ternatis: foliolis alterne pinnatifidis ovatis incisis
rugosis, caule fistuloso, involucri foliaceo. *Villars pl.*
Delph. 2. p. 610. t. 13.
- luteum. 5. L. foliis multiplicato-pinnatis: pinnis lineari-setaceis, in-
volucri polyphylo. *Poir. voy. en Barb. 2. p. 136. Co-*
rolla lutea.
- pelopon- 6. L. foliis multiplicato-pinnatis: foliolis pinnatim incisis.
nente. *Jacq. fl. austr. 5. app. t. 13.*
- austria- 7. L. foliis bipinnatis: foliolis confluentibus incisis integerrimis.
cum. *Jacq. fl. austr. 2. t. 151.*
- Gingidi- 8. L. foliis pinnatis: foliolis rhombico-cordatis obliquis crena-
um. tis obtusis. *Forst. char. gen. p. 21. t. 21.*
- baleari- 9. L. foliis pinnatis: foliolis infimis foliolo acutis. *Mant.*
cum. *p. 218.*
- cornubi- 10. L. foliis decompositis incisis: radicalibus ternatis lanceola-
ense. tis integerrimis. *Raj. syn. angl. 3. t. 8.*
- candi- 11. L. foliis glabris supradecompositis: foliolis cuneiformibus
cans. incisis, involucri universalis diphylo, seminum costis
membranaceis glabris. *Ait. hort. Kew. 1. p. 348.*
- pyrenae- 12. L. foliis quadruplicato-pinnatis: foliolis aristatis integris
um. multifidisque. *Gouan. illustr. t. 10. f. 2.*
- peregri- 13. L. umbellae primariae involucri subnullo: lateralium basi
num. membranaceo, radiis subramosis. *Jacq. h. Vind. 3. t. 18.*

347. ANGELICA. *Cor.* aequales: *petalis* incurvis.
Stili reflexi. *Fructus* sub-
 rotundus.

- Archangelica. 1. A. foliis supradecompositis: alatus, solidus, foliorum impari lobato, lobis lateralibus angultioribus. *Flor. dan. t. 206.*
- Razulii. 8. A. foliis bipinnatis: foliolis lanceolatis ferratis decurrentibus. *Gouan. illustr. t. 6.*
- silvestris. 2. A. foliolis aequalibus ovato-lanceolatis ferratis ellipticis. *Sabb. b. rom. 4. t. 85.*
- verticillaris. 3. A. foliis divaricatissimis: foliolis ovatis ferratis, caule pedunculis verticillato. *Mant. p. 217. 561. Jacq. b. Vind. 2. t. 130.*
- atropurpurea. 4. A. foliorum extimo pari coadunato: foliolo terminali petiolato. *Mant. p. 354. Cornut. canad. t. 199.*
- lucida. 5. A. foliolis aequalibus ovatis inciso-ferratis. *Jacq. b. Vind. 3. t. 24.*
- lobata. 6. A. foliis inferioribus biternatis: foliolis petiolatis ovatis ferratis; superioribus ternatis. *Walt. flor. carol. p. 115.*
- integrifolia. 7. A. foliolis integris petiolatis. *Walt. flor. carol. p. 115.*

348. SIUM. *Involucrum* polyphyllum. *Petala* cordata. *Stili* deflexi. *Fructus* ova-
 tus, oblongus, striatus, transversim
 crassior.

- latifolium. 1. S. foliis pinnatis: foliolis aequaliter argute ferratis ovato-lanceolatis; impari trifido, umbellis terminalibus. *Flor. dan. t. 246.*
- junifolium. 2. S. foliis pinnatis: foliolis lanceolatis aequalibus, umbellis terminalibus. *Schrank bairisch. Flor. 1. p. 556.*
- cicutae-folium. 3. S. foliis pinnatis: foliolis lineari-lanceolatis, ramis ferratis, umbellis terminalibus. *Gmel. flor. sib. 1. p. 201. t. 47.*
- Berula. 4. S. foliis pinnatis: foliolis superioribus auritis; inferioribus minutis remotis, involucre pinnatim dissecto, umbellis axillaribus, pedunculatis. *Jacq. flor. austr. 1. t. 66.*

- angustifolium. 5. S. foliis pinnatis, foliis auritis, involuero pinnatim dissecto, umbellis axillaribus pedunculatis.
- nodiflorum. 6. S. foliis pinnatis: foliolis inciso-dentatis; impari tripartito, umbellis lateralibus oppositifoliis sessilibus pedunculatisque. *Morif. hist. pl. 3. t. 5. f. 3.*
- Sisarum. 7. S. foliis pinnatis: floralibus ternatis. *Sabb. h. rom. 4. t. 76. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 23. f. 4.*
- Ninfi. 8. S. foliis pinnatis ferratis: rameis ternatis. *Blackw. herb. t. 514.*
- rigidius. 9. S. foliis pinnatis: foliolis lanceolatis subintegerrimis. *Morif. hist. pl. 3. t. 7. f. 1.*
- japonicum. 10. S. foliis pinnatis: foliolis incisis, umbellis terminalibus. *Thunb. fl. jap. p. 118.*
- Falcaria. 11. S. foliolis linearibus decurrentibus connatis. *Jacq. fl. austr. 3. t. 257. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 23. f. 4.*
- graecum. 12. S. foliis omnibus bipinnatis; an vere distinctum a decumbente?
- decumbens. 13. S. foliis bipinnatis, caule decumbente. *Thunb. fl. jap. p. 118.*
- suave. 16. S. foliis radicalibus bipinnatis sublinearibus: caulinis pinnatis; pinnis lanceolatis argute ferratis. *Walt. flor. carol. p. 115.*
- ficulum. 14. S. foliis radicalibus ternatis, caulinis bipinnatis. *Jacq. h. Vind. 2. t. 133.*
- repens. 15. S. caule repente, foliolis subrotundis dentato-angulatis. *Suppl. p. 181. Jacq. fl. austr. 3. t. 260.*

349. SISON. *Involucra subtetraphylla. Fructus ova-
tus, striatus: stilis deflexis.*

- Amomum. 1. S. foliis pinnatis, umbellis erectis. *Mant. p. 355. Jacq. h. Vind. 3. t. 17.*
- segetum. 2. S. foliis pinnatis, umbellis cernuis. *Jacq. h. Vind. 2. t. 134.*
- canadense. 3. S. foliis ternatis. *Morif. hist. pl. 3. t. 11. f. 4. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 23. f. 10.*
- Ammi. 4. S. foliis tripinnatis: radicalibus linearibus; caulinis setaceis, stipularibus longioribus. *Jacq. h. Vind. 2. t. 200.*

- inunda- 5. *S. repens*, foliis submersis capillaribus; emerfis pinnatis,
tum. umbellis bifidis. *Flor. dan. t. 89.*
- verticilla- 6. *S. foliolis verticillatis capillaribus.*
tum.
- falsum. 7. *S. foliis radicalibus compositis: foliolis subverticillato-fas-*
ciculatis lanceolatis, caule aphylo, ramis umbelliferis
dichotomis. *Suppl. p. 181.*
- crinitum. 8. *S. foliis omnibus tripinnatis capillaribus, involueris decom-*
posito-fetaceis. *Pallas act. Petrop. 1779. p. 250. t. 7.*

350. BUBON. *Fructus ovatus, striatus, villosus,*
parvus.

- macedo- 1. *B. foliolis rhombeo-ovatis crenatis, umbellis numerosissi-*
nicum. mis. *Regn. t. 84. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 23. f. 2.*
- Galba- 2. *B. foliolis rhombeis dentatis striatis glabris, umbellis pau-*
num. cis. *Mant. p. 335. Jacq. b. Vind. 3. t. 36.*
- laeviga- 3. *B. foliolis lanceolatis subcrenatis, caule frutescente, femi-*
tum. nibus glabris. *Ait. hort. Kew. 1. p. 352.*
- gummife- 4. *B. foliolis glabris: inferioribus rhombeis serratis; superiori-*
rum. bus pinnatifidis tridentatis. *Commel. h. Amst. 2. t. 58.*
- rigidius. 5. *B. foliolis linearibus. Bocc. mus. 2. t. 76.*

351. CUMINUM. *Involucra 4fida. Umbellulae 4.*
Fructus parvus, ellipticus,
multistriatus, hirsutulus.

- Cymi- 1. CUMINUM. *Morif. hist. pl. 3. t. 2. Gaertn. de fr. et sem.*
num. *cent. 2. t. 23. f. 8.*

352. OENANTHE. *Flosculi difformes, disci sessiles,*
steriles. Fructus suberoso-
corticatus, oblongus, stria-
tus, calice stisque persi-
stentibus rectis coronatus.

- fistulosa. 1. *Oe. stolonifera, foliis caulinis pinnatis filiformibus fistulosis.*
Flor. dan. t. 846. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 22. f. 6.

- erocata. 2. Oe. foliis omnibus multifidis obtusis subaequalibus. *Jacq. h. Vind. 3. t. 55. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 22. f. 6.*
- prolifera. 3. Oe. umbellarum pedunculis marginalibus longioribus ramosis masculis. *Jacq. h. Vind. 3. t. 62.*
- globulosa. 4. Oe. fructibus globosis. *Gouan. illustr. t. 9. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 22. f. 6.*
- pimpinelloides. 5. Oe. foliolis radicalibus cuneatis fissis, caulinis integris linearibus longissimis simplicibus. *Jacq. fl. austr. 4. t. 395. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 22. f. 6.*
- β) Oenanthe Rarania. *Hacq. pl. alp. carn. t. 3.*
- peucedanifolia. 6. Oe. foliis omnibus linearibus: radicalibus bipinnatis; caulinis pinnatis, involuero universali nullo, radicum napulis ovatis sessilibus. *Pollich. fl. pal. 1. n. 292. t. 3.*
- filiformis. 7. Oe. foliis omnibus simplicibus filiformibus fistulosis. *Walt. flor. carol. p. 113.*

353. PHELLANDRIUM. *Flosculi disci minores. Fructus ovatus, laevis, calice et pistillo coronatus.*

- aquaticum. 1. Ph. foliorum ramificationibus divaricatis. *Blackw. herb. t. 570.*
- Mutellina. 2. Ph. caule subnudo, foliis pinnatis. *Jacq. fl. austr. 1. t. 56. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 23. f. 6.*

354. CICUTA. *Fructus subovatus, costatus.*

- virosa. 1. C. umbellis oppositifoliis, petiolis marginatis obtusis. *Mant. p. 355. Flor. dan. t. 208.*
- bulbifera. 2. C. ramis bulbiferis.
- maculata. 3. C. foliorum serraturis mucronatis, petiolis membranaceis apice bilobis. *Pluckn. alm. t. 76. f. 1.*
- perennans. 4. C. foliis biternatis: foliolis obtusis obliquis serratis, floribus disci sterilibus. *Walt. flor. carol. p. 116.*

355. AETHUSA. *Involucella* dimidiata, 3phylla, deflexa. *Fructus* subglobosus, profunde sulcatus.

- Cynapi- 1. Ae. foliis conformibus, fructibus subglobosis. *Blackw. herb. t. 517. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 22. f. 3.*
um.
- Bunius. 2. Ae. foliis radicalibus pinnatis: caulinis multipartito-setaceis, feminibus oblongiusculis. *Syst. nat. XII. 4. p. 733. Carum Bunius. Jacq. h. Vind. 2. t. 198.*
- Meum. 3. Ae. foliis omnibus multipartito-setaceis, involuero universalis monophyllo, fructibus ovato-oblongis utrinque attenuatis. *Syst. nat. XII. 3. p. 208. Athamanta Meum. Jacq. fl. austr. 4. t. 303. Gaertn. de fr. et sem. cent. 20. t. 23. f. 6.*
- fatua. 4. Ae. foliis omnibus multipartito-setaceis, involuero universalis polyphyllo. *Ait. hort. Kew. 1. p. 355.*

356. CORIANDRUM. *Cor.* radiata: *petalis* inflexo-emarginatis. *Involucrum* universale iphyllum: *partialia* dimidiata. *Fructus* sphaericus, glaber.

- fativum. 1. C. fructibus globosis. *Blackw. herb. t. 176. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 22. f. 2.*
- testicula- 2. C. fructibus didymis. *Pluckn. alm. t. 169. f. 2.*
tum.

357. SCANDIX. *Cor.* radiata. *Flosculi* disci saepe masculi. *Petala* emarginata. *Stili* persistentes. *Fructus* subulatus.

* *feminibus* sulcatis.

- odorata. 1. Sc. feminibus angulatis. *Jacq. fl. austr. 5. app. t. 37. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 23. f. 10.*
- gilanica. 2. Sc. feminibus laevibus, caulibus ramosis striatis. *S. G. Gmel. it. 3. p. 304. t. 31. f. 2.*

** *se-*

** *feminibus laevibus superficiei aequabilis.*

- Peeten. 3. Sc. feminum rostro longissimo, foliolis multipartitis. *Jacq. fl. austr. 3. t. 263.*
- chilensis. 4. Sc. feminum rostro longissimo, foliolis integris ovato-lanceolatis. *Molin. hist. nat. Chil. p. 103.*
- Cerefo- 5. Sc. feminibus nitidis tereti-rostratis, umbellis sessilibus lateralibus. *Jacq. fl. austr. 4. t. 390. Gaertn. de sem. cent. 2. t. 23. f. 9.*
- lium.
- procum- 6. Sc. feminibus nitidis ovato-subulatis, foliis decompositis. *Morif. hist. pl. 3. t. 11. f. ult.*
- bens.
- grandiflo- 7? Sc. feminibus pedunculo villoso brevioribus.
- ra.

*** *feminibus hirsutis aut hispida.*

- tricho- 8. Sc. feminibus hirsutissimis: pilis femine duplo longioribus. *Mant. p. 57.*
- sperma.
- infecta. 9. Sc. femine exteriore hispida, umbellulis confertissimis hemisphaericis. *Jacq. fl. austr. 1. t. 46.*
- nodosa. 10. Sc. feminibus subcylindricis hispida, caule hispida: geniculis tumidis. *Mant. p. 356. Jacq. h. Vind. 3. t. 25. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 5. f. 6.*
- australis. 11. Sc. feminibus hispida, caulibus laevibus. *Col. ecphr. 1. t. 90.*

358. CHAEROPHYLLUM. *Involucrum reflexum, concavum. Petala inflexo - cordata. Fructus nitens, (ut plurimum) laevis, oblongus.*

- alpinum. 1. Ch. foliis tripinnatis: foliolis angustis distantibus, petalis planis integris, pistillis deciduis. *Villars pl. Delph. 2. p. 642.*
- sylvestre. 2. Ch. caule laevi striato: geniculis tumidiusculis. *Jacq. fl. austr. 2. t. 149.*
- bulbo- 3. Ch. caule laevi geniculis tumido basi hirto. *Jacq. fl. austr. 1. t. 63.*
- sium.

- aristatum. 4. Ch. caule laevi geniculis tumido, feminibus hirtis biaristatis. *Thunb. fl. jap. p. 119. an hujus generis?*
- temulum. 5. Ch. caule geniculis tumido maculato, foliisque scabris: foliolis incisus acutis. *Jacq. fl. austr. 1. t. 65. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 23. f. 10.*
- hirsutum. 6. Ch. caule aequali, foliolis incisus acutis, feminum rostris maxime divergentibus. *Mant. p. 356. Jacq. fl. austr. 2. t. 148.*
- aromaticum. 7. Ch. caule aequali, foliolis ferratis integris, feminibus biaristatis. *Mant. p. 356. Jacq. fl. austr. 2. t. 150.*
- coloratum. 8. Ch. caule aequali, foliis supradecompositis, involucellis coloratis. *Mant. p. 57. Jacq. h. Vind. 1. t. 51.*
- aureum. 9. Ch. caule aequali, foliolis incisus, feminibus coloratis sulcatis. *Mant. p. 356. Jacq. fl. austr. 1. t. 64. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 23. f. 10.*
- scabrum. 10. Ch. caule aequali, foliolis incisus acutis hirtis, pedunculis scabris. *Thunb. fl. jap. p. 119.*
- Cicutaria. 11. Ch. foliis bipinnatis: foliolis cordato-oblongis incisus, petalis emarginatis, caule glabro. *Vill. pl. Delph. 2. p. 644.*
- arborescens. 12. Ch. fruticosum.

359. IMPERATORIA. *Petala inflexo-emarginata. Semen compressum: margine lato membranaceo, et costis 3 dorsalibus apterygiis.*

Ostruthium. 1. IMPERATORIA. *Blackw. herb. t. 279. Gaertn. de fr. et sem. pl. cent. 2. t. 25. f. 9.*

360. SESELI. *Umbellae globosae. Involucrum foliolo uno alterove. Fructus ovoides, striatus: stilibus deflexis.*

pimpinella. 1. S. caule declinato, umbellis nubilibus nutantibus. loides.

montanum. 2. S. petiolis ramiferis membranaceis oblongis integris, foliis caulinis angustissimis. *Jacq. hort. Vind. 2. t. 129.*

3. S.

- glaucum. 3. S. petiolis ramiferis membranaceis oblongis integris, foliis singularibus binatisque canaliculatis laevibus petiolo longioribus. *Jacq. fl. austr. 2. t. 144.*
- annuum. 4. S. petiolis rameis membranaceis ventricosis emarginatis. *Jacq. fl. austr. 1. t. 55.*
- aristatum. 5. S. petiolis rameis submembranaceis laxis integerrimis, foliis supradecompositis: foliolis aristatis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 359.*
- ammoides. 6. S. foliis radicalibus: foliolis imbricatis. *Jacq. h. Vind. 1. t. 52.*
- tortuosum. 7. S. caule alto rigido, foliis linearibus fasciculatis. *Regn. bot. t. 313.*
- Turbith. 8. S. involucro universali monophyllo, feminibus villosis.
- Hippomathrum. 9. S. involucellis connato-monophyllis. *Jacq. fl. austr. 2. t. 143.*
- pyrenaeum. 10. S. foliis duplicato-pinnatis: foliolis incis acutis, involucellis fetaceis umbellula longioribus. *Gouan. illustr. t. 5.*
- saxifragum. 11. S. caule filiformi divaricato, foliis duplicato-ternatis linearibus, umbellis subsexfidis.
- alatum. 12. S. caule elongato: geniculis callosis, foliis bipinnatis: pinnis linearibus distantibus. *Mant. p. 357. Gouan. ill. t. 8.*
- multicaule. 13. S. foliis bipinnatis: foliolis linearibus integris trifidisque, involucellis subulatis. *Retz. obs. bot. 3. p. 27.*
- curvifolium. 14. S. foliis bipinnatis: laciniis decussatis linearibus, ramis erectis, feminibus laevibus. *Vill. pl. Delph. 2. p. 586.*
- fragile. 15. S. foliis articulatis fragilibus: foliolis lineari-integris binatisque, vaginis bilobis. *Gouan. illustr.*

361. THAPSIA. *Semina* oblonga: alis membranaceis 4, lateralibus maximis.

- villosa. 1. Th. foliolis dentatis villosis basi coadunatis. *Regn. bot. t. 383. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 21. f. 6.*
- foetida. 2. Th. foliolis multifidis basi angustatis. *Blackw. herb. t. 459.*
- Asclepium. 3. Th. foliis digitatis: foliolis bipinnatis fetaceo-multifidis. *Morif. hist. pl. 3. t. 18. f. 9.*

- gargani- 4. Th. foliis pinnatis: foliolis pinnatifidis; laciniis lanceolatis.
ca. *Mant. p. 57. Gouan. illustr. t. 10.*
- trifoliata. 5. Th. foliis ternatis ovatis; *an potius Smyrnii species?*

362. PASTINACA. *Petala involuta integra. Semina elliptica, foliaceo-compressa glabra: margine tenui angusto.*

- lucida. 1. P. foliis simplicibus cordatis lobatis lucidis acute crenatis.
Mant. p. 58. Jacq. b. Vind. 2. t. 199.
- fativa. 2. P. foliis simpliciter pinnatis. *Blackw. herb. t. 379. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 21. f. 5.*
- Opopanax. 3. P. foliis pinnatis: foliolis basi anteriore excisis. *Mant. p. 357. Regn. bot. t. 422.*

363. SMYRNIUM. *Petala acuminata, carinata. Fructus ovato-globosus, gibbus, angulato-costatus.*

- perfoliatum. 1. Sm. foliis caulinis amplexicaulibus.
- aegyptiacum. 2. Sm. foliis floralibus binis simplicibus cordatis integerrimis.
- nodiflorum. 6. Sm. folio florali solitario lanceolato integro. *Allion. flor. pedem. t. 72.*
- Olusatrum. 3. Sm. foliis caulinis ternatis petiolatis ferratis. *Blackw. herb. t. 408. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 22. f. 11.*
- aureum. 4. Sm. foliis pinnatis ferratis: posterioribus ternatis, flosculis omnibus fertilibus.
- integerrimum. 5. Sm. foliis caulinis duplicato-ternatis integerrimis.

CHAMITIS. *Umbella* o aut simplex. *Involucrum* o aut suboctophyllum. *Cal.* superus, 5dentatus persistens. *Petala* obtusa, integerrima. *Fructus* subglobosus, striatus, 2partibilis.

integri- 1. Ch. floribus solitariis. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 22.*
folia. f. 4.

trifurcata, 2. Ch. floribus umbellatis. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 22. f. 4.*

364. ANETHUM. *Petala* involuta, integra. *Fructus* lenticulari-compressus, parvus, striatus, marginatus.

graveo- 1. A. foliis bipinnatis: foliolis fetaceis, fructibus compressis
lens. alatis hinc convexiusculis. *Blackw. herb. t. 545. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 25. f. 11.*

segetum. 2. A. foliis caulinis tribus, fructibus ovalibus. *Mant. p. 219. Jacq. b. Vind. 2. t. 132.*

Foenicu- 3. A. foliis multipartito-capillaribus, seminibus ovato-oblon-
lum. gis utrinque attenuatis. *Blackw. herb. t. 288. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 23. f. 5.*

365. CARUM. *Involucrum* iphyllum. *Petala* connata, inflexo-emarginata. *Fructus* parvus, ellipticus, gibbus, tereti-striatus.

Carvi. 1. CARUM. *Jacq. fl. austr. 4. t. 393. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 23. f. 7.*

366. PIMPINELLA. *Petala* inflexa. *Stili* recti. *Stigmata* subglobosa. *Fructus* exigui, ovato-oblongi: striis 5 elevatis.

saxifraga. 1. P. caule striato glabro, foliis pinnatis glabris: radicalibus foliolis subrotundis argute dentatis, caulinis bipinnatis linearibus. *Jacq. fl. austr. 4. t. 395. β) Blackw. herb. t. 472.* 2. P.

- nigra. 2. *P.* caule striato piloso, foliis villosis pinnatis; radicalibus foliolis obcordatis incisus obtuse dentatis; caulinis bipinnatis: foliolis cuneiformibus dentatis. *Willden. prodr. fl. berol. n. 348.*
- magna. 3. *P.* foliis uniformibus pinnatis: foliolis omnibus lobatis, impari trilobo. *Mant. p. 219. Jacq. fl. austr. 4. t. 396. β) Pimpinella orientalis. Jacq. fl. austr. 4. t. 397.*
- hircina. 4. *P.* foliis bipinnatis: pinnulis profundissime lobatis. *Leers fl. herb. n. 225. Retz. obs. bot. 3. p. 30. t. 2? Pimpinella dissecta.*
- Tragium. 5. *P.* foliis pinnatis erectis: foliolis cuneatis incisus; summis simplicibus, feminibus hirsutis. *Vill. pl. Delph. 2. p. 605. Col. phytob. t. 17.*
- glauca. 6. *P.* foliis supradecompositis, caule angulato ramosissimo.
- peregrina. 7. *P.* foliis radicalibus pinnatis crenatis: summis cuneiformibus incisus, umbellis nubilibus nutantibus. *Jacq. b. Vind. 2. t. 131.*
- Anisum. 8. *P.* foliis radicalibus trifidis incisus. *Blackw. herb. t. 374. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 23. f. 3.*
- dichotoma. 9. *P.* pedunculis oppositifoliis, foliis floriferis bitrifidis, petiolis alato-membranaceis. *Mant. p. 58.*
- dioica. 10. *P.* pumila, umbellis numerosissimis compositis simplicibusque. *Mant. p. 357. Jacq. fl. austr. 1. t. 28.*

1378. **CUSSONIA.** *Petala* trigona. *Margo receptaculi dilatatus in calicem 5dentatum.*

- thyrsiflora. 1. *C.* foliis digitatis: foliolis sessilibus cuneiformibus truncatis tridentatis, floribus racemosis. *Suppl. p. 182. Thunb. nov. act. Ups. 3. p. 212. t. 12.*
- spicata. 2. *C.* foliis digitatis septenis: foliolis simplicibus ternatisque lanceolatis apice ferratis, floribus spicatis. *Suppl. p. 182. Thunb. nov. act. Ups. 3. p. 212. t. 13.*

367. APIUM. *Involucrum* iphyllum. *Petala* aequalia. *Fructus* parvus, gibbus costatus: *stilis* deflexis.

- Petrofelinum. 1. A. foliis caulinis linearibus, involucellis minutis. *Blackw. herb. t. 172.* 2. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 22. f. 9.*
 graveolens. 2. A. foliis caulinis cuneiformibus. *Flor. dan. t. 790. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 22. f. 9.*
 bipinnatum. 3. A. foliis caulinis bipinnatis: foliolis inciso-ferratis. *Walt. flor. carol. p. 115.*

368. AEGOPODIUM. *Fructus* ovato-oblongus, striatus, utrinque attenuatus.

- Podagra-ria. 1. AEGOPODIUM. *Flor. dan. t. 670. Folia inferiora biternata; summa ternata.*

TRIGYNIA.

QUINCHAMALIUM. *Cal.* 5fidus. *Cor.* 5fida. *Caps.* 3locularis, polysperma.

- chilense. 1. QUINCHAMALIUM. *Molin. hist. nat. Cbil. p. 127.*

GRISELINIA. *Cal.* 5dentatus. *Germen* oblongum ispermum.

- lucida. 1. GRISELINIA. *Forst. fl. austr. p. 75. charact. gen. p. 70. t. 70.*

1379. SEMECARPUS. *Cor.* 5petala. *Nux* supera cordata, isperma receptaculo grandi carnosissimo infistens.

- Anacardium. 1. SEMECARPUS. *Suppl. p. 182. Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 40. f. 1.*

369. RHUS. Cal. 5partitus. Petala 5. Bacca vel
Drupa sicca isperma.

* foliis pinnatis.

- Coriaria. 1. Rh. foliolis obtusiuscule ferratis ovalibus subtus villosis. *Regnault bot. t. 94.*
- typhinum. 2. Rh. foliolis argute ferratis lanceolatis subtus tomentosis.
- javanicum. 3. Rh. foliolis ovatis acuminatis ferratis subtus tomentosis.
- glabrum. 4. Rh. foliolis lanceolatis ferratis utrinque nudis. *Giseck. pl. ic. 1. t. 5.*
- Hypfolo- 5. Rh. foliolis lanceolatis subserratis, panicula composita.
dendron. *Moench Weissenst. p. 101.*
- Vernix. 6. Rh. foliolis integerrimis annuis opacis; petiolo integro ae-
quali, floribus dioicis. *Dill. b. Elth. t. 292. f. 377.*
Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 44. f. 2.
- succeda- 7. Rh. foliolis integerrimis perennantibus lucidis: petiolo in-
neum. tegro aequali. *Mant. p. 221. Kaempf. amoen. ex. p. 794.*
795. ic.
- copalli- 8. Rh. foliolis integerrimis: petiolo membranaceo articulato.
num. *Pluckn. alm. t. 55. f. 1. Gaertn. de fr. et sem. cent. 3.*
t. 44. f. 2.
- femiala- 9. Rh. foliolis ferratis: petioli extimis internodiis membrana-
tum. ceis. *Murray Comm. Goett. 1784. ic.*
- Metopi- 10. Rh. foliolis quinatis integerrimis subrotundis glabris. *Sloan.*
um. *hist. jam. 2. t. 199. f. 3.*
- pauciflo- 11. Rh. foliolis alternis decurrentibus cuneiformibus apice ser-
rum. ratis, panicula sessili pauciflora. *Suppl. p. 183.*
- digita- 12. Rh. foliolis oblongis integerrimis glaberrimis, caule scan-
tum. dente. *Suppl. p. 184.*

** foliis ternatis.

- radicans. 13. Rh. foliolis petiolatis ovatis nudis integerrimis, caule ra-
dicante, floribus dioicis. *du Hamel arbr. 2. t. 98.*
- Toxico- 14. Rh. foliolis petiolatis angulatis pubescentibus, caule radi-
dendron. cante, floribus dioicis monogynis. *Gaertn. de fr. et sem.*
cent. 3. t. 44. f. 5. Bulliard. herb. Franc. t. 143. Dru-
pa corticosa ilocularis.

15. Rh.

- Cominia. 15. Rh. foliolis petiolatis ovatis subtus tomentosis remotissime ferratis. *Sloan. hist. jam. 2. t. 208. f. 1. nonne potius alophylli species?*
- Cobbe. 16. Rh. foliolis ovatis acuminatis ferratis, pedunculis tomentosis.
- tomentosum. 17. Rh. foliolis subpetiolatis rhombeis angulatis subtus tomentosis. *Pluckn. alm. t. 219. f. 7.*
- angustifolium. 18. Rh. foliolis petiolatis lineari-lanceolatis integerrimis subtus tomentosis. *Burm. afr. t. 91. f. 1.*
- viminale. 31. Rh. foliolis lineari-lanceolatis integerrimis glabris basi attenuatis: intermedio subpetiolato. *Ait. hort. Kew. 1. p. 368.*
- suaveolens. 32. Rh. foliolis sessilibus cuneiformi-rhombeis inciso-ferratis glabris. *Ait. hort. Kew. 1. p. 368.*
- aromaticum. 33. Rh. foliolis sessilibus ovato-rhombeis inciso-ferratis pilosiusculis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 367.*
- elegans. 30. Rh. foliolis lanceolatis ferratis utrinque nudis, floribus dioicis. *Catesb. Carol. app. t. 4.*
- laevigatum. 19. Rh. foliolis sessilibus lanceolatis laevibus. *Sp. pl. 1672.*
- lucidum. 20. Rh. foliolis sessilibus cuneiformibus laevibus. *Burm. afr. t. 91. f. 2.*
- villosum. 21. Rh. foliolis sessilibus ovatis integris pubescente-villosis, caule pubescente. *Suppl. p. 183.*
- incisum. 22. Rh. foliolis sessilibus cuneiformibus inciso-pinnatifidis subtus tomentoso-venosis, calicibus tomentosis. *Suppl. p. 183.*
- cuneifolium. 23. Rh. foliolis sessilibus cuneiformibus glaberrimis septemdentatis: dentibus mucronatis. *Suppl. p. 183.*
- lanceum. 24. Rh. foliolis lanceolato-subulatis elongatis utrinque glaberrimis. *Suppl. p. 184.*
- cirrhiflorum. 25. Rh. foliolis integerrimis glabris, caule scandente. *Suppl. p. 184.*
- tridentatum. 26. Rh. foliolis incanis ferratis: ferraturis tribus ad quinque, caule scandente. *Suppl. p. 184.*
- *** foliis simplicibus.
- Cotinus. 27. Rh. foliis obovatis. *Jacq. fl. austr. 3. t. 210.*
- atrum. 28. Rh. foliis ovato-oblongis, floribus polygamis. *Forst. flor. austr. p. 23.*

29. Rh.

Saeneb. 29. Rh. foliis longe lanceolatis ferratis, subtus tomentosis albis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 206.*

370. VIBURNUM. Cal. 5partitus, superus. Cor. 5fida. Drupailocularis clausa ipyrena.

- Tinus. 1. V. foliis integerrimis ovatis: ramificationibus venarum subtus villoso-glandulosis. *Kniph. bot. orig. cent. 1. n. 95. Antrum corticosum, iloculare.*
- villosum. 2. V. foliis integerrimis ovatis subtus incano-villosis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 54.*
- obovatum. 21. V. foliis integerrimis obovatis nitidis. *Walt. flor. carol. p. 116.*
- tinoides. 3. V. foliis ellipticis glabris integerrimis, ramis cymisque teretibus hirsutis. *Suppl. p. 184.*
- nudum. 4. V. foliis integerrimis lanceolato-ovatis. *Mill. ic. 183. t. 274.*
- scandens. 5. V. foliis oblongis ferratis, caule scandente, cymis terminalibus: radiis terminatis flore maximo. *Suppl. p. 184.*
- virens. 6. V. foliis oblongis acuminatis apice ferratis glabris, ramis scandentibus. *Thunb. fl. jap. p. 123. an distinctum a scandente?*
- ferratum. 7. V. foliis oblongis ferratis basi integris subtus pallidis. *Thunb. fl. jap. p. 124.*
- prunifolium. 8. V. foliis subrotundis crenato-ferratis glabris. *Pluckn. alm. t. 46. f. 2.*
- dentatum. 9. V. foliis ovatis dentato-ferratis plicatis. *Jacq. b. Vind. I. t. 36.*
- Lantana. 10. V. foliis cordatis ferratis venosis subtus tomentosis. *Jacq. fl. austr. 4. t. 341.*
- acerifolium. 11. V. foliis lobatis: petiolis laevibus.
- Opulus. 12. V. foliis lobatis: petiolis glandulosis. *Fl. dan. t. 661. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 27. f. 3. Pomum iloculare.*
- Lentago. 13. V. foliis ovatis ferrulatis acuminatis glabris: petiolis marginatis undulatis. *Moench Weissenst. t. 8.*

- tomento- 14. V. foliis ovatis acuminatis ferratis venosis subtus tomen-
 tum. tosis, umbellis lateralibus. *Thunb. fl. jap. p. 123.*
 erosum. 15. V. foliis ovatis acuminatis: petiolis tomentosis. *Thunb.*
fl. jap. p. 124.
 hirtum. 16. V. foliis ovatis ferratis villosis: petiolis hirtis. *Thunb. fl.*
jap. p. 124.
 dilatatum. 17. V. foliis obovatis acuminatis inaequaliter dentatis villosis.
Thunb. fl. jap. p. 124.
 macro- 18. V. foliis obovatis acuminatis dentatis glabris. *Thunb. fl.*
 phyllum. *jap. p. 125.*
 cuspidat- 19. V. foliis ovatis cuspidatis ferratis villosis. *Thunb. fl. jap.*
 tum. *p. 125.*
 cassinoi- 20. V. foliis ovatis crenatis glabris: petiolis carinatis eglandu-
 des. latis.
 nitidum. 22. V. foliis lineari-lanceolatis subserratis supra nitidis. *Ait.*
hort. Kew. 1. p. 371.

371. CASSINE. *Cal.* 5partitus. *Petala* 5. *Bacca*
 3perma.

- capensis. 1. C. foliis petiolatis ovato-oblongis retusis crenatis. *Suppl.*
p. 184. Seb. mus. 1. t. 29. f. 5.
 Peragua. 2. C. foliis petiolatis ferratis ellipticis acutiusculis, ramulis
 ancipitibus. *Mant. p. 220. Mill. ic. t. 83. f. 1.*
 Mouroce- 3. C. foliis sessilibus integerrimis obovatis coriaceis. *Dill. h.*
 nia. *Elth. t. 121. f. 147.*

372. SAMBUCUS. *Cal.* 5dentatus. *Cor.* regularis,
 femiquinquefida. *Drupa*
 succulenta, clausa, polypy-
 rena.

- Ebulus. 1. S. cymis tripartitis, stipulis foliaceis, caule herbaceo. *Curt.*
flor. Lond. t. 213.
 japonica. 2. S. cymis tripartitis, stipulis nullis, caule fruticoso. *Thunb.*
fl. jap. p. 125.
 canadens- 3. S. cymis quinquepartitis, foliis subbipinnatis, caule frutes-
 sis. cente.

- nigra. 4. *S. cymis quinquepartitis, foliis pinnatis: foliolis subovatis ferratis, caule arboreo. Flor. dan. t. 545.*
- laciniata. 5. *S. cymis quinquepartitis, foliis bipinnatis: pinnis ternatis; foliolis lanceolatis incisis, caule arboreo. Retz. obs. bot. 3. p. 30.*
- racemosa. 6. *S. racemis compositis ovatis, caule arboreo. Jacq. pl. rar. ic. cent. 1. t. 81.*

373. SPATHELEA. *Cal. 5phyllus. Petala 5. Drupa exsucca 3gona, 2-3locularis. Semina solitaria.*

simplex. I. SPATHELEA. *Sloan. hist. jam. 2. t. 171. Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. t. 58. f. 3.*

374. STAPHYLEA. *Cal. 5partitus. Petala 5. Caps. inflatae; connatae. Semina (ut plurimum) 2globosa, cum cicatrice, unimentacea.*

trifolia. I. *St. foliis ternatis.*

pinnata. 2. *St. foliis simpliciter pinnatis. Knorr del. hort. 2. t. S. 1. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 69. f. 1.*

occidentalis. 3. *St. foliis duplicato-pinnatis, seminibus solitariis. Sloan. hist. jam. 2. t. 220. f. 1.*

CURTISIA. *Cal. 5fidus. Petala 5. Nectar. Glandula annularis subtriloba. Caps.? 3 approximatae, iloculares, 2ispermae.*

Schreberi. I. CURTISIA. *Schreb. gen. Linn. 1. p. 199.*

375. TAMARIX. *Cal. 5partitus. Petala 5. Caps. ilocularis, 3valvis. Semina crinita.*

gallica. I. *T. floribus pentandris, ramis squamatis: squamis alternis fertilibus. Mill. ic. t. 262. f. 1.*

- orientalis. 2. T. floribus pentandris, ramis ramulisque articulatis: vaginis cylindricis in squamam acuminatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 206. an vere distincta a gallica?*
- africana. 3. T. floribus pentandris confertissimis, spicis crassis brevibus. *Poir. voy. en Barb. 2. p. 139.*
- germanica. 4. T. floribus decandris. *Mill. ic. 262. f. 2. Flor. dan. t. 234.*

1292. XYLOPHYLLA. *Cal. 5partitus, coloratus. Cor. o. Stigmata lacera. Caps. 3locularis. Semina gemina.*

- longifolia. 1. X. foliis linearibus, ramis tetragonis. *Mant. p. 221. Rumpf amb. 7. t. 12.*
- montana. 2. X. foliis distichis lato-lanceolatis inciso-crenatis, ramis apice ancipitibus, floribus sessilibus. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 28.*
- latifolia. 3. X. foliis pinnatis lato-lanceolatis crenatis, floribus pedunculatis hermaphroditis hexandris femineisque mixtis. *Syst. nat. XII. 3. p. 620. Phyllanthus Epiphyllanthus. Catesb. Car. 2. t. 26. utrum potius phyllanthi species, an distincti generis?*
- angustifolia. 4. X. foliis pinnatis lineari-lanceolatis lineatis crenatis, floribus pedunculatis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 28.*

REICHELIA. *Cal. 5partitus. Cor. campanulata, 5fida. Antherae utrinque 2fidae, recurvae. Caps. supera, 3locularis, polysperma.*

- palustris. I. REICHELIA. *Aubl. pl. guj. I. p. 285. t. III.*

IIII. ASTRONIUM. *Flores dioici. Cal. 5phyllus. Cor. 5petala. ♀. Semen I.*

- gravecolens. I. ASTRONIUM. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 262. f. 65.*

SALMASIA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* 5petala. *Stil.* o.
Caps. supera, 3gona, 3ocularis,
 3valvis, polysperma.

gujanensis. f. **SALMASIA.** *Aubl. pl. guj.* 1. p. 287. t. 112.

1117. ZANONIA. *Flores* dioici. *Cal.* 3phyllus.
Cor. 5partita.

♀. *Bacca* 3ocularis, infera. *Semina* 2.

indica. **I. ZANONIA.** *Rheed. b. malab.* 8. t. 47-49.

1118. FEUILLEA. *Flores* dioici. *Cal.* 5fidus. *Cor.*
 5fida.

♂. *Nectarium* filamenta 5conniventia.

♀. *Pomum* durum, 3oculare,
 corticosum.

trilobata. **1.** *F. foliis* lobatis, subtus punctatis. *Spec. pl.* 1432. *Trichosanthes* punctata.

cordifolia. **2.** *F. foliis* cordatis angulatis. *Plum. ic.* 209. β) 210.

1021. PASSIFLORA. *Cal.* 5phyllus. *Petala* 5. *Stamina* germini vicina. *Nectarium* multiradiatum. *Antrum* pedicellatum duplicatum 1oculare.

* *foliis indivisis.*

ferratifolia. **1.** *P. foliis* ovatis ferratis. *Jacq. h. Vind.* 1. t. 10.

pallida. **2.** *P. foliis* ovatis involucrisque integerrimis: petiolis biglandulosis. *Amoen. acad.* 1. p. 218. f. 2.

laurifolia. **3.** *P. foliis* ovatis integerrimis: petiolis biglandulosis, involucris dentatis. *Jacq. h. Vind.* 2. t. 162.

- euprea. 4. P. foliis ovatis subintegerrimis; petiolis aequalibus. *Catesb. car. 2. t. 93.*
- adulterina. 5. P. foliis oblongo-ovalibus integris, floribus tubulosis. *Suppl. p. 408. Mutis amer. 1. t. 17. Smith. pl. ic. ined. 1. t. 24.*
- multiflora. 6. P. foliis oblongis integerrimis, floribus confertis. *Amoen. acad. 1. p. 221. f. 7.*
- maliformis. 7. P. foliis cordato-oblongis involucrisque integerrimis; petiolis biglandulosis. *Amoen. acad. 1. p. 220. f. 5.*
- tiliaefolia. 8. P. foliis cordatis integerrimis; petiolis aequalibus. *Amoen. acad. 1. p. 219. f. 4.*
- coccinea. 9. P. foliis cordatis ferratis petiolatis glandulosis. *Aubl. pl. guj. 2. p. 828. t. 324.*
- quadrangularis. 10. P. foliis subcordatis ovalibus glabris multinerviis; petiolis glandulosis, caule membranaceo-tetragono, stipulis ovali-lanceolatis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 218.*
- alata. 35. P. foliis ovatis subcordatis brevibus paucinerviis; petiolis glandulosis, caule membranaceo tetragono, stipulis lanceolatis ferratis. *Ait. hort. Kew. 3. p. 306.*
- angustifolia. 11. P. foliis subcordatis lanceolatis integris; petiolis biglandulosis, floribus solitariis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 97.*
- ** foliis bilobis.
- rubra. 12. P. foliis cordatis acuminatis subtus subtomentosis. *Amoen. ac. 1. p. 222. f. 9.*
- capsularis. 13. P. foliis cordatis oblongis petiolatis. *Plum. ic. 138. f. 2.*
- perfoliata. 14. P. foliis oblongis transversis amplexicaulibus petiolatis subtus tomentosis. *Amoen. acad. 1. p. 222. f. 8.*
- normalis. 15. P. foliis basi emarginatis; lobis linearibus obtusis divaricatis; intermedio obsoleto mucronato.
- Murucuja. 16. P. foliis obtusis basi indivisis, nectariis monophyllis. *Amoen. ac. 1. p. 223. f. 10.*
- Vespertilio. 17. P. foliis basi rotundatis glandulosisque subtus punctatis; lobis acutis divaricatis. *Amoen. acad. 1. p. 223. f. 11.*
- *** foliis trilobis.
- oblongata. 18. P. foliis ellipticis anterieus subtrilobis subtus punctatis; lobis acutiusculis; intermedio breviori. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 97.*

- rotundi- 19. P. foliis subtrilobis obtusis subrotundis subtus punctatis, folia. *Jacq. obs. bot. 2. t. 46. f. 1.*
- punctata. 20. P. foliis subtrilobis oblongis subtus punctatis: lobo intermedio minore. *Amoen. acad. 1. p. 224. f. 12.*
- stipulata. 21. P. foliis acuminatis integerrimis: petiolis glandulosis, stipulis latis oblongis inferne productis acutis. *Anbl. pl. guj. 2. p. 830.*
- lutea. 22. P. foliis cordatis aequalibus obtusis glabris: lobis ovatis integerrimis, petiolis eglandulosis. *Jacq. pl. rar. ic. cent. 2. t. 22.*
- glauca, 36. P. foliis cordatis glabris: lobis ovatis aequalibus: petiolis glandulosis, stipulis semiovatis. *Ait. hort. Kew. 3. p. 308.*
- foetida. 23. P. foliis cordatis pilosis, involucris multifido-capillaribus. *Giseck pl. ic. 1. t. 20. Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. t. 60. f. 5. Caps. duplicata.*
- hirsuta. 24. P. foliis villosis: lobis oblongis integerrimis; intermedio productiore, petiolis biglandulosis, floribus oppositis. *Amoen. acad. 1. p. 227. f. 16.*
- suberosa. 25. P. foliis subpeltatis, cortice suberoso. *Jacq. h. Vind. 2. t. 163.*
- incarnata. 26. P. foliis ferratis aequalibus: petiolis biglandulosis. *Morif. bist. pl. 2. t. 1. f. 9.*
- ciliata. 38. P. foliis glabris ciliato-ferratis: intermedio longissimo, petiolis eglandulosis. *Ait. hort. Kew. 3. p. 310.*
- holosericea. 27. P. foliis basi utrinque denticulo reflexo. *Amoen. ac. 1. p. 226. f. 15.*
- parviflora. 28. P. foliis glabris: lobis ovatis integris; intermedio productiore, petiolis biglandulosis, caule herbaceo. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 97.*
- aurantia. 29. P. lobis parabolicis distantibus: medio productiore. *Forst. fl. austr. p. 62.*
- minima. 30. P. foliis glabris: lobis integerrimis lanceolatis; intermedio longiore, petiolis biglandulosis, caule laevi inferne suberoso. *Jacq. h. Vind. 1. t. 20.*
- heterophylla. 37. P. foliis glabris integerrimis indivisis lineari-oblongis trilobisque: petiolis biglandulosis. *Ait. hort. Kew. 3. p. 309.*
- mixta. 31. P. foliis trifidis ferratis, floribus tubulosis. *Suppl. p. 408. Mut. amer. 1. t. 16. Smith plant. ic. ined. 1. t. 25.*

**** foliis multifidis.

- caerulea. 32. P. foliis palmatis integerrimis. *Knorr del. hort. I. t. P.*
 ferrata. 33. P. foliis palmatis ferratis. *Amoen. acad. I. p. 231. f. 21.*
 pedata. 34. P. foliis pedatis ferratis. *Amoen. acad. I. p. 233. f. 22.*

SUAEDA. Cal. carnosus 5fidus. Cor. o. Sem. 1.

- baccata. 1. S. foliis teretibus nitidis punctatis, fructu baccato. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 69.*
 hortensis. 2. S. foliis linearibus farinosis, calicibus fructus divergentibus. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 71.*
 vera. 3. S. foliis semiteretibus farinosis non punctatis, stigmatibus peltatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 69.*
 anonyma. 4. S. foliis oblongis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 69. an vere distincta?*
 vermiculata. 5. S. foliis carnosis ovato-subglobosis farinosis punctatis, stigmatibus subulatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 70.*
 fruticosa. 6. S. caule fruticoso, foliis sparsis carnosis linearibus utrinque convexis, stigmatibus subulatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 70.*
 monoica. 7. S. caule fruticoso diffuso, floribus masculis germine supra orbiculato. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 70.*

376. TURNERA. Cal. 5fidus, infundibuliformis: exterior 2phyllus. Petala 5calici inserta. Stigmata multifida. Caps.ilocularis, 3-valvis, supera, polysperma.

- ulmifolia. 1. T. floribus sessilibus petiolaribus, foliis basi biglandulosis. *Mill. illustr. ic. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 76. f. 3. β) Mill. ic. t. 268. f. 2.*
 Pumilea. 2. T. floribus sessilibus petiolaribus, foliis eglandulosis. *Sloan. hist. jam. I. t. 127. f. 6.*
 Sidojdes. 3. T. pedunculis axillaribus bifetis, foliis obovato-cuneatis ferratis. *Mant. p. 58.*
 rupestris. 4. T. pedunculis axillaribus bistipulatis, foliis linearibus ferratis. *Aubl. pl. guj. I. p. 289. t. 113. f. 1.*

- frutescens. 5. T. pedunculis axillaribus solitariis, foliis lanceolatis ferratis, *Aubl. pl. guj. I. p. 290. t. 113. f. 2.*
 cistoides. 6. T. pedunculis axillaribus aphyllis, foliis apice ferratis, *Sloan. hist. jam. I. t. 127. f. 7.*
 racemosa. 7. T. racemis elongatis terminalibus. *Jacq. b. Vind. 3. t. 94.*
 gujanen- 8. T. floribus spicatis terminalibus, foliis linearibus ferratis.
 sis. *Aubl. pl. guj. I. p. 291. t. 114.*

ARUBA. Cal. 5-6partitus. Petala 5-6. Filamenta 5-6-8. Germina 3-6connata. Capsf. 3-6iloculares, ispermae.

gujanensis. I. ARUBA. *Aubl. pl. guj. I. p. 294. t. 115.*

377. TELEPHIUM. Cal. 5phyllus. Petala 5 receptaculo inserta. Capsf. 1ocularis, 3valvis.

Imperati. 1. T. foliis alternis. *Kniph. bot. orig. cent. 2. n. 95.*

oppositi- 2. T. foliis oppositis. *Shaw. afr. p. 572. ic. folium.*

1095. ANDRACHNE. Flores monoici. Cal. 5phyllus.

♂. Cor. 5petala. Stamina stili rudimento inserta.

♀. Cor. 0. Capsf. 3ocularis. Sem. 2.

telephioi- 1. A. procumbens herbacea. *Mill. illustr. ic. des.*

fruticosa. 2. A. erecta herbacea. β) Clutia androgyna. *Mant. p. 128.*

1140. CLUTIA. Flores dioici. Cal. 5phyllus. Cor. 5petala.

♂. Capsf. 3ocularis. Sem. 1.

alaternoi- 1. Cl. foliis subsessilibus lineari-lanceolatis, floribus solitariis erectis. *Burm. afr. t. 43. f. 1. 2.*

2. Cl.

- polygono- 2. Cl. foliis lanceolatis, floribus axillaribus plurimis. *Burm.*
noides. *afr. t. 43. f. 3.*
- lanceola- 3. Cl. foliis lanceolatis eglandulosis integris subtus nudis. *Forsk.*
ta. *fl. aeg. arab. p. 170.*
- Eluteria. 4. Cl. foliis cordato-lanceolatis. *Seb. mus. 1. t. 35. f. 3. de-*
candra, nonne potius crotonis species?
- tomentosa. 5. Cl. foliis ellipticis utrinque tomentosis. *Mant. p. 299.*
- retusa. 6. Cl. foliis ovalibus retusis, floribus racemosis axillaribus,
Rbeede h. malab. 2. t. 18.
- stipularis. 7. Cl. foliis ovalibus subtus tomentosis. *Mant. p. 127.*
- pulchella. 8. Cl. foliis ovatis integerrimis, floribus lateralibus. *Mill. il-*
lustr. ic. Polygama.
- hirta. 9. Cl. foliis ovatis nudis integris, floribus lateralibus glome-
ratis hirsutis. *Suppl. p. 432.*
- acumina- 10. Cl. herbacea, foliis ovatis glabris obtusis cum acumine, flo-
ta. ribus axillaribus solitariis. *Suppl. p. 432.*

378. CORRIGIOLA. *Cal.* 5phyllus: margine mem-
branaceo albo. *Petala* 5.
Nucula parva, rotunda-
to-trigona.

- littoralis. 1. C. foliis oblongis, florum fasciculo terminali. *Flor. dan.*
t. 334. Lesk. it. t. 9. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5.
t. 75. f. 3.
- repens. 2. C. foliis ovato-lanceolatis, floribus capitatis. *Forsk. fl. aeg.*
arab. p. 207.
- albella. 3. C. foliis oppositis: stipulis hyalinis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 207.*

379. PHARNACEUM. *Cal.* 5phyllus. *Cor.* o. *Capsf.*
3locularis, polysperma.

- Cerviana. 1. Ph. pedunculis subumbellatis lateralibus folia linearia aequan-
tibus. *Gmel. fl. sib. 3. t. 20. f. 2.*
- micro- 2. Ph. tomentosum, pedunculis umbellatis, foliis ovatis tere-
phyllum. tiusculis obtusis lana intertextis. *Suppl. p. 185.*
- lineare. 3. Ph. umbellis inaequalibus, foliis linearibus, oppositionibus
remotis. *Suppl. p. 185.*

- umbellatum. 4. Ph. pedunculis umbellatis, foliis radicalibus stellatis: caulinis obovatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 58.*
- incanum. 5. Ph. pedunculis communibus longissimis, foliis linearibus, stipulis pilosis. *Mant. p. 358. Suppl. p. 186. Pluckn. phytogr. 304. f. 4?*
- albens. 6. Ph. pedunculis communibus longissimis, foliis linearibus exstipulatis. *Suppl. p. 186.*
- cordifolium. 7. Ph. racemis bipartitis terminalibus, foliis obcordatis.
- distichum. 8. Ph. racemis bipartitis flexuosis, foliis sublinearibus pubescentibus. *Mant. p. 221. Pluckn. alm. t. 130. f. 6.*
- dichotomum. 9. Ph. pedunculis axillaribus elongatis dichotomis, foliis verticillatis linearibus. *Suppl. p. 186.*
- Mollugo. 10. Ph. pedunculis unifloris lateralibus, floribus longitudine foliorum, caule depresso. *Mant. p. 358. 561. Burm. zeyl. t. 7.*
- depressum. 11. Ph. pedunculis unifloris lateralibus, foliis lanceolatis pubescentibus. *Mant. p. 562.*
- serpyllifolium. 12. Ph. pedunculis unifloris, foliis ovatis. *Suppl. p. 186.*
- glomeratum. 13. Ph. floribus glomeratis, caule flexuoso, foliis linearibus. *Suppl. p. 185. Pluckn. mant. t. 331. f. 4.*
- quadrangulare. 14. Ph. suffruticosum, foliis linearibus quadrifariam imbricatis. *Suppl. p. 185.*
- suffruticosum. 15. Ph. suffruticosum, floribus axillaribus umbellatis sessilibus. *Pallas it. 3. p. 716. t. E. f. 2.*
- occultum. 16. Ph. foliis cuneiformi-oblongis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 59. an hujus generis?*
- maritimum. 17. Ph. floribus solitariis lateralibus sessilibus, foliis subteretibus obtusis carnosis. *Walt. fl. carol. p. 117.*

380. ALSINE. Cal. 5phyllus. Petala 5 aequalia.
Caps.ilocularis, 2valvis.

- media. 1. A. petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis. *Curt. flor. Lond. t. 70.*
- segetalis. 2. A. petalis integris, foliis subulatis. *Mant. p. 359. Vaill. fl. par. t. 3. f. 3.*

- macrona- 3. A. petalis integris brevibus, foliis setaceis: calicibus arista-
ta. *Mant. p. 358. Hall. stirp. belv. t. 17.*
- prostrata. 4. A. foliis oblongis, caule prostrato dichotomo. *Forsk fl.*
aeg. arab. p. 207.
- gramini- 5. A. foliis lanceolatis rigidis hirsutis, caule erecto subtrifloro.
folia. *Arduin. sp. 2. t. 10.*

381. DRYPIS. *Cal. 5dentatus. Petala 5. Caps. cir-*
cumscissa, isperma.

- spinosa. I. DRYPIS. *Mant. p. 359. Jacq. b. Vind. 1. t. 49.*

382. BASELLA. *Cal. o. Cor. 7fida: laciniis 2oppo-*
fitis latioribus, tandem bac-
cans. Sem. 1. tectum.

- rubra. I. B. foliis planis, pedunculis simplicibus. *Rumpf amb. 5. t. 154.*
- alba. 2. B. foliis undatis ovatis, pedunculis simplicibus folio lon-
gioribus. *Pluckn. alm. t. 63. f. 1.*
- japonica. 3. B. foliis rhombico-ovatis, pedunculis simplicibus subdicho-
tomis. *Burm. ind. t. 39. f. 4.*
- lucida. 4. B. foliis subcordatis, pedunculis confertis ramosis.

383. SAROTHRA. *Cal. 5partitus. Cor. 5petala.*
Caps.ilocularis, 3valvis, co-
lorata.

- gentianoi- I. SAROTHRA. *Pluckn. mant. t. 324. f. 4.*
des.

TETRAGYNIA.

384. PARNASSIA. *Cal. 5partitus. Petala 5. Ne-*
ctaria 5 cordata, ciliata: api-
cibus globosis. Caps. 4val-
vis,ilocularis. Sem. mem-
branaceo-marginata.

- polyne- I. P. nectariis duplicatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 207.*
ctaria.

2. P.

palustris. 2. P. nectariis simplicibus. *Flor. dan. t. 584. Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. t. 60. f. 1.*

385. EVOLVULUS. Cal. 5phyllus. Cor. 5fida, rotata. Caps. 3locularis. Sem. folitaria.

- numularius. 1. E. foliis subrotundis, caule repente, floribus subsessilibus. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 260. f. 23.*
- emarginatus. 2. E. foliis reniformibus repandis. *Suppl. p. 186. Burm. ind. t. 30.*
- affinoides. 3. E. foliis obcordatis obtusis pilosis petiolatis, caule diffuso, pedunculis trifloris. *Pluckn. alm. t. 9. f. 1.*
- gangeticus. 4. E. foliis cordatis obtusis mucronatis villosis petiolatis, caule diffuso, pedunculis unifloris.
- hederaceus. 8. E. foliis cordatis repandis, pedunculis subtrifloris. *Burm. ind. t. 30. f. 2.*
- sericeus. 5. E. foliis lanceolatis sessilibus subtus sericeis, pedunculis brevibus unifloris. *Brown. jam. p. 153. n. 3. t. 10. f. 3.*
- linifolius. 6. E. foliis lanceolatis villosis sessilibus, caule erecto, pedunculis trifloris longis. *Brown. jam. t. 10. f. 2.*
- tridentatus. 7. E. foliis lineari-cuneiformibus tricuspидatis basi dilatata dentatis, pedunculis unifloris. *Burm. ind. t. 16. f. 3.*

III2. SPINACIA. Flores dioici. Cor. 0.

♂. Cal. 5partitus.

♀. Cal. 4fidus. Sem. 1. intra calicem induratum.

- oleracea. 1. Sp. fructibus sessilibus. *Blackw. herb. t. 49.*
- fera. 2. Sp. fructibus pedunculatis. *Gmel. fl. sib. 3. t. 16.*

PENTAGYNIA.

1114. ACNIDA. Flores dioici. Cor. o.
 ♂. Cal. 5phyllus.
 ♀. Cal. 2phyllus. Sem. 1. calice
 succulento tectum.

cannabina. 1. ACNIDA.

1109. XANTHOXYLUM. Flores dioici. Cor. 5-
 partitus. Cal. o.
 ♂. Caps. 5.iloculares,
 introrsum dehiscen-
 tes. Sem. solitaria,
 pendula.

Clava 1. X. foliis pinnatis. *Pluckn. phyt. t. 328. f. 6. Gaertn. de
 Herculis. fr. et sem. cent. 5. t. 68. f. 8.*

trifoliatum. 2. X. foliis ternatis.

caribae- 3. X. capsulis pedicellatis. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 5.
 um. t. 68. f. 8.*

386. ARALIA. *Involucrum* umbellulae. Cal. 5den-
 tatus superus. Cor. 5petala,
 Bacca 5perma.

* *arboreae.*

arborea. 1. A. foliis simplicibus, umbellae universalis radiis uniglandu-
 losis. *Plum. ic. 148.*

capitata. 2. A. foliis simplicibus ellipticis integerrimis, paniculis termi-
 nalibus: floribus sessilibus capitatis. *Jacq. stirp. amer.
 p. 89. n. 2. t. 61.*

spinosa. 3. A. caule foliisque aculeatis. *Commel. h. Amst. 1. t. 47.*

penta- 4. A. aculeata, foliis quinatis. *Thunb. fl. jap. p. 128.*
 phylla.

Scioda- 5. A. petiolis pedatis, foliis umbellatis terminalibus: foliolis
 phyllum, aliis centralibus, spicis longissimis nutantibus. *Brown.
 jam. p. 195. t. 19. f. 1. 2.*

** *frus*

** frutescentes.

sinensis. 6. A. caule petiolisque aculeatis, foliis inermibus villosis.
Rheede b. malab. 2. t. 26.

japonica. 7. A. foliis lobatis. *Thunb. fl. jap. p. 128.*

*** herbaceae.

racemosa. 8. A. caule folioso tereti laevi. *Morif. hist. pl. 1. t. 2. f. 9.*

nudicaulis. 9. A. caule subnudo, foliis binis ternatis. *Pluckn. alm. t. 238. f. 5.*

cordata. 10. A. caule angulato inermi, foliis simplicibus cordatis.
Thunb. fl. jap. p. 127.

GLOSSOPETALUM. *Cal.* iphyllus, 5dentatus, persistens. *Petala* 5 ad apicem, ligula truncata aucta. *Stil* 0. *Bacca* 5 sulcata,ilocularis, 5sperma.

glabrum. 1. *Gl.* foliis glabris. *Aubl. pl. guj. 1. p. 295. t. 116.*

tomentosum. 2. *Gl.* foliis hirsutis. *Aubl. pl. guj. 1. p. 296.*

1380. **COMMERSIONIA.** *Cal.* iphyllus, corollifer. *Petala* 5. *Nectarium* 5partitum. *Caps.* 5locularis, echinata.

echinata. 1. **COMMERSIONIA.** *Suppl. p. 187. Forster char. gen. p. 22. t. 22. Rumpf. amb. 3. t. 119.*

388. **STATICE.** *Cal.* iphyllus, integer, plicatus, aridus, persistens. *Petala* 5. *Caps.* ilocularis, evalvis. *Sem.* erectum.

Armeria. 1. *St.* scapo simplici capitato, foliis linearibus. *Morif. hist. pl. 3. t. 1. f. 29.*

Pseudarmeria. 2. *St.* scapo simplici capitato, foliis longe lanceolatis. *Jacq. b. Vind. 1. t. 42.*

- gramini- 28. St. scapo paniculato: ramis triquetris, foliis linearibus ca-
folia. naliculatis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 383.*
- villosis. Echinus. 3. St. scapo paniculato, foliis subulatis mucronatis. *Buxb.*
cent. 2. t. 10.
- incana. 4. St. scapo paniculato, foliis lanceolatis trinerviis subundula-
tis apice mucronatis, paniculae ramis triquetris. *Mant.*
p. 59. 513.
- f. 9. cordata. 5. St. scapo paniculato, foliis spatulatis retusis. *Barr. pl. rar.*
alm. t. ic. 805. an vere distincta species?
- ordatis. Limonium. 6. St. scapo paniculato tereti, foliis laevibus enervibus subtus
mucronatis. *Flor. dan. t. 315. Gaertn. de fr. et sem. cent.*
3. t. 44. f. 10.
- per- echioides. 7. St. scapo paniculato tereti articulato, foliis scabris. *Magn.*
fl. monsp. t. 2. f. 4.
- d api- reticulata. 8. St. scapo paniculato prostrato: ramis sterilibus retroflexis
a au- nudis, foliis cuneiformibus muticis. *Pluckn. alm. t. 42. f. 4.*
- 5 sul- tatarica. 9. St. scapo dichotomo, foliis lanceolatis mucronatis, floribus
erma. alternis distantibus. *Gmel. fl. sib. 2. t. 92.*
- speciosa. 10. St. scapo dichotomo ancipiti, foliis ovatis mucronatis, flo-
ribus aggregatis. *Gmel. fl. sib. 2. t. 91. f. 1.*
- flexuosa. 11. St. scapo ramoso flexuoso, corymbis terminalibus, foliis
nervosis. *Gmel. fl. sib. 2. t. 89. f. 1.*
- lifer. ramosissi- 12. St. scapo ramosissimo paniculato, foliis spatulato-lanceo-
rium. ma. *Poir. voy. en Barb. 2. p. 142.*
- f. 5 lo- carolinia- 27. St. scapo paniculato divaricato, foliis lanceolato-oblongis.
a. na. *Walt. flor. carol. p. 118.*
2. t. 22. aphylla. 13. St. caule ramoso articulato undulato tuberculato aphylo:
geniculis squamatis, floribus sessilibus erectis spicatis.
Forsk. fl. aeg. arab. p. 60.
- atus, lobata. 14. St. caulibus teretibus aphyllis, foliis sinuatis. *Suppl.*
p. 187.
- ala 5. sinuata. 15. St. caule herbaceo, foliis radicalibus alternatim pinnato-
Sem. sinuatis: caulinis ternis triquetris subulatis decurrentibus.
Rauw. it. p. 314. ic.
- if. hist. purpura- 16. St. caule subfoliato, foliis obovato-cuneatis trinerviis mu-
ta. cronatis. *Mant. p. 59.*
- Jacq. pruinoso. 17. St. caule flexuoso ramoso furfuraceo. *Mant. p. 59.*

- mucronata. 18. St. caule crispo, foliis ellipticis integris, spicis secundis. *Suppl. p. 187. Herit. stirp. nov. 2. p. 25. t. 13.*
- rubella. 19. St. caule suffruticoso ramoso alato nudo paniculato, foliis radicalibus mucronatis, floribus alternis distantibus. *S. G. Gmelin it. 2. p. 199. t. 34. an vere distincta a tatarica?*
- minuta. 20. St. caule suffruticoso folioso, foliis confertis cuneatis glabris muticis, scapis paucifloris. *Mant. p. 59. Pluckn. alm. t. 200. f. 5.*
- axillaris. 21. St. caule fruticoso folioso, paniculis axillaribus dichotomis: floribus erectis, confertis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 58.*
- cylindrifolia. 22. St. caule fruticoso folioso ramoso, foliis cylindricis acuminatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 59.*
- monopetalata. 23. St. caule fruticoso folioso, floribus solitariis, foliis lanceolatis vaginantibus. *Bocc. sic. t. 16. 17.*
- aurea. 24. St. caule fruticoso folioso ramoso, foliis subulatis. *Anm. ruth. t. 18. f. 2.*
- ferulacea. 25. St. caule fruticoso ramoso: ramulis imbricatis, paleis apice pilo terminatis. *Pluckn. alm. t. 28. f. 4.*
- linifolia. 26. St. caule fruticoso prostrato, floribus paniculatis secundis, foliis linearibus. *Suppl. p. 187.*

389. LINUM. Cal. 5phyllus. Petala 5. Caps. 5valvis, 1olocularis. Sem. solitaria.

* foliis alternis.

- usitatissimum. 1. L. calicibus capsulisque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis, caule subsolitario. *Knorr del. hort. 2. t. L. 9.*
- perenne. 2. L. calicibus capsulisque obtusis, foliis lanceolatis integerrimis. *Mill. dict. t. 166. f. 2.*
- viscosum. 3. L. foliis lanceolatis pilosis quinquenerviis.
- hirsutum. 4. L. calicibus hirsutis acuminatis sessilibus alternis, foliis ramis oppositis. *Jacq. fl. austr. 1. t. 31.*
- narbonense. 5. L. calicibus acuminatis, foliis lanceolatis sparsis strictis, scabris acuminatis, caule tereti basi ramoso.
- aquilinum. 6. L. foliis lanceolatis, pedunculis bifloris. *Molin. hist. nat. Chil. p. 126.*
- strictum. 7. L. calicibus subulatis, foliis lanceolatis strictis mucronatis margine scabris.

- mariti- 8. L. calicibus ovatis acutis muticis, foliis lanceolatis: inferio-
mum. ribus oppositis. *Jacq. b. Vind. 2. t. 154.*
- virginia- 9. L. calicibus acutis alternis, capsulis muticis, panicula fili-
num. formi, foliis lanceolatis: radicalibus ovatis.
- flavum. 10. L. calicibus subferrato-scabris lanceolatis subsessilibus, pa-
nicula ramis dichotomis. *Mant. p. 360. Jacq. fl. austr. 3. t. 214.*
- monogy- 11. L. foliis lineari-lanceolatis trinerviis, caule suffruticoso.
num. *Forst. fl. austr. p. 23.*
- gallicum. 12. L. calicibus subulatis acutis, foliis lineari-lanceolatis, pa-
niculae pedunculis bifloris: floribus subsessilibus. *Gerard. fl. prov. t. 15. f. 1.*
- tenuifo- 13. L. calicibus acuminatis, foliis sparsis lineari-setaceis retror-
lium. sum scabris. *Jacq. fl. austr. 3. t. 215.*
- suffruti- 14. L. foliis linearibus acutis scabris, caulibus suffruticosis.
cosum.
- austria- 15. L. calicibus rotundatis obtusis, foliis linearibus acutis re-
cum. ctiusculis. *Mant. p. 359. Jacq. fl. austr. 5. t. 418.*
- alpinum. 16. L. calicibus rotundatis obtusis, foliis linearibus acutiuscu-
lis, caulibus declinatis. *Sp. pl. 1672. Jacq. fl. austr. 4. t. 321.*
- arbore- 17. L. foliis cuneiformibus, caulibus arborecentibus. *Alp.
um. exot. t. 13.*
- campanu- 18. L. foliorum basi utrinque punctata glandulosa. *Lob. ic. 414.
latum.*
- ** foliis oppositis.
- africa- 19. L. foliis lineari-lanceolatis, floribus terminalibus pedun-
num. culatis. *Mant. p. 360. Jacq. coll. 3. p. 218.*
- nodiflo- 20. L. foliis floriferis lanceolatis, floribus alternis sessilibus,
rum. calicibus longitudine foliorum. *Morif. hist. pl. 2. t. 26. f. 11.*
- catharti- 21. L. foliis ovato-lanceolatis, caule dichotomo, corollis acu-
cum. tis. *Flor. dan. t. 851.*
- quadrifo- 22. L. foliis quaternis.
lium.
- verticilla- 23. L. foliis verticillatis. *Barr. pl. rar. ic. t. 1226.*
- tum. 24. L.

An distincta species Linum laeve a Scopolio memoratum?

friatum. 24. L. foliis alternis subovatis: nervo marginibusque decurrentibus, floribus terminalibus. *Walt. flor. carol. p. 118.*

390. ALDROVANDA. *Cal.* 5partitus. *Petala* 5. *Caps.* 5valvis, 1ocularis, 10sperma.

vesiculosa. 1. ALDROVANDA. *Mont. act. bonon. II. 3. t. 12.*

BURCARDA. *Cal.* 5phyllus. *Petala* 5. *Stili* 5-6. *Caps.* angulata, 3valvis, 1ocularis, 7-8sperma.

villosa. 1. BURCARDA. *Aubl. pl. guj. I. p. 298. t. 117.*

QUAPOYA. *Flores* dioici. *Cal.* 5-6partitus, persistens. *Cor.* 5-6petala.

♂. *Filament.* 1. sustinens *antheras* 5 in capitulum scutiforme collectas.

♀. *Antherae* 5 steriles. *Caps.* globosa, stigmatibus coronata, 5striata, 5valvis. *Semina* plurima pulpae involuta.

scandens. 1. QUAPOYA. *Aubl. pl. guj. 2. p. 897. t. 343.* β) Quapoya fructu oblongo. *Aubl. pl. guj. 2. p. 900. t. 344.*

391. DROSERA. *Cal.* 5partitus. *Petala* 5. *Caps.* 1ocularis, apice 5valvis. *Sem.* plurima, parietalia.

acaulis. 1. Dr. flore radicali exscapo solitario, foliis oblongis. *Suppl. p. 188.*

cuneifolia. 2. Dr. scapis radicatis, foliis cuneato-rotundatis. *Suppl. p. 188.*

rotundifolia. 3. Dr. scapis radicatis, foliis orbiculatis. *Blackw. herb. t. 432.*

longifolia. 4. Dr. scapis radicatis, foliis obovali-lanceolatis. *Thal. herb. t. 9. f. 2. Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. t. 61. f. 2.*

5. Dr.

- anglica. 5. Dr. scapis radicatis, foliis sublanceolatis, capsula quadrivalvi. *Berneal. nat. hist. of gr. Brit. 2. p. 103. an distincta species?*
- capensis. 6. Dr. scapis radicatis, foliis lanceolatis subtus scabris. *Mant. p. 360. Burm. afr. t. 75. f. 1.*
- lusitanica. 7. Dr. scapis radicatis, foliis subulatis subtus convexis, floribus decandris. *Mant. p. 360. Pluckn. alm. t. 117. f. 2.*
- cistiflora. 8. Dr. caule simplici folioso, foliis lanceolatis. *Burm. afr. t. 75. f. 2.*
- indica. 9. Dr. caule ramoso folioso, foliis linearibus. *Burm. zeyl. t. 94. f. 1.*

1340. GISEKIA. Cal. 5phyllus. Cor. o. Caps. 5. approximatae, subrotundae, ispermae.

- pharnacioides. I. GISEKIA. *Mant. p. 562. Murray Comm. Goett. 1772. t. 2. f. 1. Koelreutera.*

SCHRANCKIA. Cal. 1phyllus. Cor. 5petala. Caps. 5 striatae, 5 valves, polyspermae. *Semin. receptaculo columnari 5gono affixa.*

- quinquefaria. I. SCHRANCKIA. *Scop. introd. g. 1334.*

WISENIA. Cal. 5dentatus, campanulatus inferus. Cor. 5petala. Caps. 5 ispermae.

- indica. I. WISENIA. *Houttugm. Linn. Pflanzenysst. 6. p. 287. t. 46. f. 3.*

392. CRASSULA. Cal. 5phyllus. Petala 5. Squamae 5 nectariferae ad basin germinis. Caps. 5.

* frutescentes.

- coccinea. I. Cr. foliis ovatis planis cartilagineo-ciliatis basi connato-vaginantibus. *Knorr del. hort. 1. t. B. 2.*

- cymosa. 2. Cr. foliis linearibus cartilagineo-ciliatis connato-vaginantibus, cyma terminali. *Mant. p. 222.*
- alba. 3. Cr. foliis lanceolatis cartilagineo-ciliatis connato-vaginantibus, corymbis terminalibus. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 60.*
- flava. 4. Cr. foliis planis connato-perfoliatis laevibus, floribus corymbofo-paniculatis. *Mant. p. 60. Burm. afr. t. 23. f. 2.*
- scabra. 5. Cr. foliis oppositis patentibus connatis scabris ciliatis, caule retrorsum scabro. *Dill. b. Elth. t. 99. f. 117.*
- perfoliata. 6. Cr. foliis lanceolato-subulatis sessilibus connatis canaliculatis subtus convexis. *Mill. fig. t. 108. an hujus generis?*
- ramosa. 7. Cr. foliis connatis tereti-subulatis integris remotis, caule erecto ramoso, corymbo composito. *Suppl. p. 188.*
- cultrata. 8. Cr. foliis oppositis obtuse ovatis integerrimis subcultratis obliquis: paribus connatis remotis. *Dill. b. Elth. t. 97. f. 114.*
- obvallata. 9. Cr. foliis oppositis sublanceolatis cultratis approximatis. *Mant. p. 61.*
- pruinosa. 10. Cr. foliis subulatis pruinoso-scabris, floribus corymbosis. *Mant. p. 60.*
- fruticulosa. 11. Cr. foliis oppositis subulatis acutis patentibus subrecurvatis. *Mant. p. 61. β) Crassula caffra. Mant. p. 222.*
- marginalis. 59. Cr. foliis cordatis perfoliatis acuminatis planis patentibus, intra marginem punctatis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 396.*
- lactea. 60. Cr. foliis ovatis basi attenuatis connatis integerrimis, intra marginem punctatis, cymis paniculatis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 396.*
- tetragona. 12. Cr. foliis subulatis subincurvis obsolete tetragonis patentibus, caule erecto arborecente radicante. *Mant. p. 361. Bradl. succ. 5. t. 11. f. 41.*
- obliqua. 57. Cr. foliis oppositis ovatis obliquis integerrimis acutis distinctis: margine subcartilagineis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 393.*
- Cotyledon. 13. Cr. foliis subrotundis carnosissimis supra punctatis, caule arboreo. *Jacq. misc. austr. 2. p. 295. t. 19.*
- pinnata. 14. Cr. foliis pinnatis, caule arboreo. *Suppl. p. 191.*

** herbaceae.

- centauroides. 15. Cr. caule brachiato, foliis cordatis sessilibus, pedunculis unifloris. *Mant. p. 361.*

- lineolata. 54. Cr. foliis cordatis sessilibus, pedunculis subterminalibus axillaribusque subumbellatis. *Ait. hort. Kew. I. p. 391.*
- pulchella. 55. Cr. caule dichotomo, foliis ovato-oblongis reflexis, pedunculis in dichotomiis reflexis. *Ait. hort. Kew. I. p. 392.*
- imbricata. 56. Cr. foliis ovatis acutis, quadrifariam imbricatis laevibus, floribus axillaribus sessilibus. *Ait. hort. Kew. I. p. 393.*
- dichotoma. 16. Cr. caule dichotomo, foliis ovato-lanceolatis, pedunculis unifloris. *Herm. par. Lugdb. p. 553. ic.*
- glomerata. 17. Cr. caule dichotomo scabro, foliis lanceolatis, floribus ultimis fasciculatis. *Mant. p. 60.*
- strigosa. 18. Cr. caule dichotomo erecto, foliis obovatis strigosis, pedunculis unifloris.
- muscosa. 19. Cr. caule prostrato, foliis oppositis ovatis gibbis imbricatis, floribus sessilibus solitariis.
- pellucida. 20. Cr. caule flaccido repente, foliis oppositis. *Dill. b. Elth. t. 100. f. 119.*
- orbicularis. 21. Cr. sarmentis proliferis determinate foliosis, foliis patentissimis imbricatis. *Mant. p. 361. Dill. b. Elth. t. 100. f. 118.*
- nudicaulis. 22. Cr. caule nudo, foliis subulatis radicalibus. *Dill. b. Elth. t. 98. f. 115.*
- alternifolia. 23. Cr. caule simplicissimo, foliis serrato-dentatis planis alternis, floribus pendulis. *Burm. afr. t. 24. f. 1.*
- columnaris. 24. Cr. caule pollicari, foliis rotundis imbricatis, fasciculo subrotundo terminali. *Suppl. p. 191. Burm. afr. t. 9. f. 2.*
- ciliata. 25. Cr. foliis oppositis ovalibus planiusculis distinctis ciliatis, corymbis terminalibus. *Dill. b. Elth. t. 98. f. 116.*
- punctata. 26. Cr. foliis oppositis ovatis punctatis ciliatis: inferioribus oblongis.
- subulata. 27. Cr. foliis subulatis teretibus patentibus. *Mant. p. 360. Petiv. gaz. t. 89. f. 8.*
- verticillaris. 28. Cr. foliis patentibus, floribus verticillatis aristatis. *Mant. p. 361. Syst. nat. XII. 4. p. 230. Magn. fl. monsp. t. 237.*
- rubens. 29. Cr. foliis fusiformibus subdepressis, cyma quadrifida foliosa, floribus sessilibus: staminibus reflexis. *Spec. pl. 619. Sedum rubens. Flor. dan. t. 82.*

*** *incertae ad huc tribus.*

- barbata. 30. Cr. foliis connatis articulatis barbatis hemisphaericis imbricatis, caule subrotundo, floribus verticillatis. *Suppl. p. 188.*
- argentea. 31. Cr. foliis connatis ovatis integris argenteis, caule tecto, corymbo supradecomposito. *Suppl. p. 188.*
- tecta. 32. Cr. foliis connatis ovatis obtusis cinereo lamellosis, scapo nudo, capitulo terminali. *Suppl. p. 190.*
- pubescens. 33. Cr. foliis connatis ovatis acutis villosis, caule ramoso, floribus corymbosis. *Suppl. p. 190.*
- rupestris. 34. Cr. foliis connatis ovatis integris glabris, corymbo supradecomposito. *Suppl. p. 189.*
- pyramidalis. 35. Cr. foliis connatis ovatis obtusis quadrifariam incumbentibus, capitulis sessilibus. *Suppl. p. 189.*
- montana. 36. Cr. foliis connatis ovatis acutis ciliatis, caule subnudo, floribus aggregatis. *Suppl. p. 189.*
- alpestris. 37. Cr. foliis connatis ovatis acutis quadrifariam imbricatis, capitulis pedunculatis, caule folioso. *Suppl. p. 189.*
- turrita. 38. Cr. foliis connatis ovato-oblongis acutis ciliatis quadrifariam imbricatis. *Suppl. p. 189.*
- retroflexa. 39. Cr. foliis connatis oblongis remotis planis, caule simplici, cyma composita: pedicellis retrofractis. *Suppl. p. 188.*
- cotyledonoides. 40. Cr. foliis connatis oblongis tomentosis ciliatis, caule subnudo, floribus corymbosis aggregatis. *Suppl. p. 190.*
- aloooides. 58. Cr. foliis ovatis distinctis acutis ciliatis, caule simplici subpiloso, racemo composito: ramis paniculatis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 394.*
- capitella. 41. Cr. foliis connatis oblongis cartilagineo-ciliatis patulis, capitulis verticillatis. *Suppl. p. 190.*
- cephalophora. 42. Cr. foliis connatis lineari-oblongis obtusis integris, capitulis lateralibus pedunculatis. *Suppl. p. 190.*
- spicata. 43. Cr. foliis connatis lineari-subulatis, scapo subnudo, spica verticillata: verticillis inferioribus remotioribus. *Suppl. p. 189.*
- expansa. 53. Cr. foliis semicylindrico-subulatis supra canaliculatis patentibus, pedunculis axillaribus solitariis unifloris, caulibus dichotomis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 390.*

- mollis. 44. Cr. foliis connatis tereti-triquetris glabris mollibus, caule simplici erecto, corymbo trichotomo supravocomposito. *Suppl. p. 189.*
- crenula- 45. Cr. foliis connatis lanceolatis punctato-crenulatis, caule ta. folioso, corymbo decomposito. *Suppl. p. 189.*
- tomento- 46. Cr. villosa-scabra, foliis connatis lanceolatis villosis cilia- fa. tis, caule subnudo terminato, spica verticillata. *Suppl. p. 190.*
- deltoidi- 47. Cr. foliis connatis deltoidibus patulis acutis, caule tecto, dea. floribus corymbosis. *Suppl. p. 189.*
- corallina. 48. Cr. foliis connatis deltoidibus obtusis, caule tecto, flori- bus umbellatis. *Suppl. p. 188.*
- vestita. 49. Cr. foliis connatis deltoidibus obtusis, caule tecto, flori- bus terminalibus capitatis. *Suppl. p. 188.*
- thyrsiflo- 50. Cr. foliis perfoliatis ovatis ciliatis patulis, corymbo com- ra. posito attenuato. *Suppl. p. 190.*
- perforata. 51. Cr. foliis opposito-perfoliatis ovatis, caule simplici, flo- ribus pedunculato-subverticillatis. *Suppl. p. 190. β) Cras- fula perfoliata. Scop. del. inf. 3. t. 6.*
- cordata. 52. Cr. foliis petiolatis cordatis, caule folioso, floribus termi- nalibus solitariis pedunculatis. *Suppl. p. 189.*
- sparsa. 61. Cr. foliis alternis subspatulatis acutis integerrimis, racemo composito. *Ait. hort. Kew. 1. p. 395.*
- diffusa. 62. Cr. foliis oblongis basi attenuatis remote crenatis, pedun- culis oppositifoliis axillaribusque solitariis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 395.*

1255. MAHERNIA. *Cal.* 5dentatus. *Petala* 5. *Ne-*
ctaria 5 obcordata, fila-
mentis supposita. *Caps.*
5locularis.

- verticilla- 1. M. foliis verticillatis linearibus. *Mant. p. 59. Cavanill. diff. ta. bot. 6. t. 176. f. 1.*
- pinnata. 2. M. foliis tripartito-pinnatifidis. *Sp. pl. 943. Hermannia pinnata, Cavanill. diff. bot. 6. t. 176. f. 2.*

hetero- 3. M. caule fruticoso subhispido, foliis verticillatis polymor-
phylla. phis, pedunculis quadrifloris. *Cavanill. diss. bot. 6. p. 324. n. 467. t. 178. f. 1. an monadelphis jungendum totum genus?*

393. SIBBALDIA. Cal. 10fidus. Petala 5 calici in-
serta. Stili e latere germi-
nis. Sem. 5. nuda.

procum- 1. S. foliolis tridentatis. *Flor. dan. t. 32. Gaertn. de fr. et*
bens. *sem. cent. 5. t. 73. f. 5.*

erecta. 2. S. foliolis linearibus multifidis. *Ann. ruth. t. 15.*

altaica. 3. S. foliis tricuspидatis, floribus singularibus. *Suppl. p. 191. Pall. act. petrop. 1773. t. 18. f. 2.*

HEXAGYNIA.

ERACLISSA. Cal. 5phyllus. Cor. 0. Caps. 3locu-
laris, 6valvis, 2sperma.

hexagyna. 1. ERACLISSA. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 208.*

POLYGYNIA.

394. MYOSURUS. Cal. 5phyllus, basi adnatus, de-
ciduus. Nectaria 5 subula-
ta, petaliformia. Sem. nu-
merosa, corticata, pendula.

minimus. 1. MYOSURUS. *Flor. dan. t. 406. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 74. f. 5.*

SCHEFFLERA. Cor. 5petala, decidua. Caps. 8-10-
locularis, calice 5dentato con-
nata,

digitata. 1. SCHEFFLERA. *Forst. char. gen. p. 20. t. 20.*