

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

* Flores calice corollaque instructi.
 † declini.

1064. GUETTARDA. Flores monoiei. Cal. cylindricus. Cor. 7fida, infundibuliformis.
 ♀. Drupa sicca.
 1436. MAURITIA. ♂. Ament. oblongum sessile. Cor. 1petala, tubo brevi, limbo 3partito. Cal. 1phyllus, cyathiformis, integer.
 1284. ELAEIS. Flores dioici. Cal. 5phyllus.
 ♂. Cor. 6fida.
 ♀. Cor. 6petala. Stigm. 3. Drupa fibrosa; Nux 1. 3valvis.
 1223. COCOS. Flores monoici. Cor. 3petala.
 ♂. Cal. 3partitus.
 ♀. Cal. 5partitus. Stigm. 3. Drupa coriacea.

†† flores hermaphroditi masculi et feminei in diversis plantis.

1159. GLEDITSCHIA. Legumia.
 ♀. Cal. 4fidus. Cor. 4petala.
 ♂. Cal. 3phyllus. Cor. 3petala.
 ♀. Cal. 5phyllus. Cor. 5petala.

* Pometia.

††† flores hermaphroditi et masculi.

- RHAPIS. Cor. 3fida. Cal. 3fidus.
 LEAEBIA. Cal. 5phyllus. Cor. 3petala. Nectarium squamis 6.

†††† flores hermaphroditi.

1221. CORYPHA. Cor. 3petala. Cal. - - - Drupa 1sperma.
 METROXYLUM. Cor. 3petala, calice longior, lignea. Cal. 3phyllus lignosus patens. Nux subrotunda: nucleo 1 duro, utrinque sulcato.
 ISERTA. Cor. infundibuliformis, 6fida: tubo longo subincurvo. Cal. superus, 4-6dentatus.
 Kk 5

- GUAPIRA. *Cor.* tubulosa, 4-5dentata. *Cal.* 4-5-
 phyllus. *Filament.* 3 longiora, 3 bre-
 viora. *Stigm.* 5-6fidum. *Drupa* ovata
 6striata, 1perma.
- LICUALA. *Cor.* 3partita. *Cal.* 3partitus. *Nectarium*
 fertiforme. *Drupa* 1locularis.
395. BROMELIA. *Cor.* 3partita. *Cal.* 3partitus, superus:
Bacca.
- NECTRIS. *Cal.* 6partitus. *Cor.* 0. *Stil.* persistens.
Caps. 2 ovatae, 1loculares, polyspermae.
396. TILLANOSIA. *Cor.* 3petala. *Cal.* 3partitus, inferus. *Sem.*
 papposa.
- PITCARNIA. *Cor.* 3petala. *Cal.* 3partitus, subinferus.
Caps. 3gona, 3coeca, introrsum 3fa-
 riam dehiscens.
- XEROPHYTA? *Cal.* tubulosus, 6partitus. *Caps.* infera,
 scabra, 3locularis, polysperma.
- HEPETIS. *Cor.* 3petala. *Cal.* 3partitus. *Caps.* semi-
 supera, 3locularis. *Sem.* mutica.
397. BURMANNIA. *Cor.* 3petala. *Cal.* 1phyllus, inferus, tri-
 quetro-alatus, coloratus.
- LACHENALIA. *Cor.* 3petala, receptaculo inserta. *Cal.* sub-
 triphyllus, inferus, coloratus.
398. TRADESCANTIA. *Cor.* 3petala. *Cal.* 3phyllus, inferus. *Fi-*
lamenta barbata.
440. BURSERA. *Cor.* 3petala. *Cal.* 3phyllus, inferus. *Caps.*
 baccata, 1perma.
- AJOVEA. *Cor.* 3petala. *Cal.* 1phyllus, 3dentatus.
Stigm. 6fidum. *Bacca* subrotunda,
 1locularis, 1perma.
- COSSIGNIA. *Cor.* 4-5petala. *Cal.* 5partitus. *Germen*
 subtrigonum. *Caps.* 3gona, 3locula-
 ris: loculis 2-3spermis.
445. FRANKENIA. *Cor.* 5petala. *Cal.* 1phyllus, inferus. *Caps.*
 1locularis, polysperma.
443. LORANTHUS. *Cor.* 6partita. *Cal.* margo superus. *Bacca*
 1perma.
444. HILLIA. *Cor.* longissima, contorta. *Cal.* duplex:
inferus 6phyllus. *Caps.* 2locularis,
 2valvis, polysperma.
439. RICHARDIA. *Cor.* 6fida. *Cal.* 6fidus, superus. *Sem.* 3-
 nuda.

442. BERBERIS. *Cor.* 6petala. *Cal.* 6phyllus, inferus. *Bacca* 2sperma.
423. LEONTICE. *Cor.* 6petala. *Cal.* 6phyllus, inferus. *Bacca* inflata.
441. PRINOS. *Cor.* 6fida. *Cal.* 6fidus, inferus. *Bacca* 6sperma.
1284. DUROIA. *Cor.* 6partita. *Cal.* cylindricus, truncatus, superus. *Pomum* hispidum.
1301. CANARINA. *Cor.* 6fida. *Cal.* 6phyllus, superus. *Caps.* 6locularis.
- PSATHURA. *Cor.* 6loba, campanulata, intus barbata. *Cal.* 6dentatus. *Stigm.* 3-4lamellatum. *Drupa* striata, 6locularis, 6sperma.
- NANDINA.
438. ACHRAS. *Cor.* 6petala. *Cal.* polyphyllus, imbricatus. *Cor.* 12fida. *Cal.* 6phyllus, inferus. *Bacca* 12sperma.
- ADENIA.
- PEUMUS. *Cor.* 6petala. *Cal.* longissimus, 6fidus, inferus. *Cor.* 6petala. *Cal.* 6fidus, inferus. *Drupa* 1sperma.
- SILICUARIA. *Cor.* 4petala, irregularis. *Cal.* 4phyllus inferus. *Siliqua* polysperma.

* *Portlandia hexandra. Lythra nonnulla. Amyris zeylanica. Cassia glandulosa. Fumaria cucullaria. Tetradyne- miae. Portulacae.*

** *Flores spathacei s. glumacei.*

1141. MUSA. *Cor.* supera, 2petala: petalo altero erecto 5dentato, altero nectarifero. *Bacca* oblonga, triquetra.
- RAVENALA. *Cor.* supera, 4partita. *Spatha* universalis 1phylla, partialis 2phylla. *Caps.* coriacea, 3gona, 3locularis, polysperma.
400. HAEMANTHUS. *Cor.* supera, 6partita. *Involucrum* 2phyllum, maximum.
402. LEUCOIUM. *Cor.* supera, 6petala, campanulata. *Stamina* aequalia.
401. GALANTHUS. *Cor.* supera 6petala: petalis 3 interioribus brevioribus emarginatis.
403. NARCISSUS. *Cor.* supera, 6petala. *Nectarium* campanulatum, extra stamina.
404. PANCRATIUM. *Cor.* supera, 6petala. *Nectarium* campanulatum staminibus terminatum.

406. AMARYLLIS. *Cor.* supera, 6petala, campanulata. *Stamina* inaequalia.
- TIMMIA. *Cor.* 6fida, tuberosa, clavata curva: laciniis ovato-oblongis.
405. CRINUM. *Cor.* supera, 6fida, basi tubulosa. *Stamina* distantia.
399. PONTEDERIA,
MNASIUM. *Cor.* infera, 6fida, ringens.
Cor. 3partita: tubo brevissimo. *Anther.* 4gonae, foliolo acuto terminatae. *Germ.* 3lobum. *Stigm.* 3 spiralia.
407. BULBOCODIUM. *Cor.* infera, 6petala: unguibus longissimis staminiferis.
1300. TULBAGIA. *Cor.* infera, 6petala: 3 inferioribus: *Nectarium* cylindricum, extrorsum petaliferum.
409. ALLIUM. *Cor.* infera, 6petala: *Petala* ovata, sessilia.
408. APHYLLANTHES. *Cor.* infera, 6petala. *Spathae* dimidiatae, glomosae.
417. HYPOXIS. *Cor.* supera, 6petala. *Spathae* glumaceae.
1383. EHRHARTA. *Cor.* infera, glumacea, duplex. *Nectarium* pateraeforme.
- TONINA. *Flores* monoici.
♂. *Cal.* 3lobus. *Pistill.* sterile.
♀. *Cal.* 0. *Germen* 3triatum. *Stigm.* 3.
Caps. 3valvis, 1ocularis, 1sperma.
- *** *Flores nudi.*
432. ALSTROEMERIA.
ENARGEA. *Cor.* supera, 6petala: unguibus 2 tubulosis. *Petala* 6 concava, oblongo-ovata, acuta infra medium 2maculata, staminibus duplo longiora. *Bacca* 3 locularis. *Semina* pauca.
590. GETHYLLIS.
ARGOLASIA. *Cor.* supera, 6partita. *Bacca* clavata, radicalis, 1ocularis.
Cor. supera, 6fida, tubulosa. *Antherae* basi 2fidae. *Caps.* 3locularis: loculis 2-3spermis.
431. AGAVE. *Cor.* supera, 6fida: limbo erecto, filamentis brevior.
430. ALOE. *Cor.* infera, 6fida. *Filamenta* receptaculo inserta.
428. ALETRIS.
426. POLYANTHES. *Cor.* infera, 6fida, rugosa.
Cor. infera, 6fida: tubo curvato.

425. CONVALLARIA. *Cor.* infera, 6fida. *Bacca* 3sperma.
427. HYACINTHUS. *Cor.* infera, 6fida. *Germinis* ad apicem pori 3 melliferi.
- CALLIXENE. *Cor.* 6partita aequalis: laciniis alternis basi 2 glandulosis. *Stigma* 3gonum. *Bacca* 3locularis: loculis saepe 3spermis.
433. HEMEROCALLIS. *Cor.* infera, 6partita. *Stamina* declinata.
421. ASPHODELUS. *Cor.* infera, 6partita, *nectarii* valvulis 6 staminiferis.
422. ANTHERICUM. *Cor.* infera, 6petala, plana.
418. ORNITHOGALUM. *Cor.* infera, 6petala. *Filamenta* alterna basi dilatata.
419. SCILLA. *Cor.* infera, 6petala, decidua. *Filamenta* filiformia.
420. CYANELLA. *Cor.* infera, 6petala: petalis exterioribus propendentibus.
- PUYA. *Cor.* infera, 6petala: petalis 3 majoribus fornicatis. *Caps.* 3locularis.
1382. PHORMIUM. *Cor.* infera 6petala: petalis 3 exterioribus brevioribus.
1256. DRACAENA. *Cor.* infera, 6petala. *Bacca* 3sperma.
- POLLIA. *Cor.* infera, 6petala. *Bacca* polysperma.
424. ASPARAGUS. *Cor.* infera, 6petala. *Bacca* 6sperma.
413. GLOKIOSA. *Cor.* infera, 6petala, reflexa, caudata.
414. ERYTHRONIUM. *Cor.* infera 6petala, reflexa: petalis basi 2cellis.
412. UVULARIA. *Cor.* infera, 6petala, basi fovea nectarifera, erecta.
411. TRITILLARIA. *Cor.* infera, 6petala; basi fovea nectarifera, ovata.
410. LILIUM. *Cor.* infera, 6petala: petalis basi canaliculato-tubulosis.
415. TULIPA. *Cor.* infera, 6petala, campanulata. *Stilus* 0.
429. YUCCA. *Cor.* infera, 6petala, patens. *Stilus* 0.
416. ALBUCA. *Cor.* infera, 6petala. *Stamina* sterilia 3. *Stigma* cinctum cuspidibus 3.
- LINDERA. *Cor.* infera, 6petala. *Capsula*.
1381. MASSONIA. *Cor.* 6petala, *nectario* infero inserta.
1022. PISTIA. *Cor.* 1petala, lingulata, integra. *Caps.* 1locularis, in fundo corollae.

Polygonum Hydropipes. Laurus aestivalis, Persea Sassafras

**** *Flores apetalis.*

425. 1119. TAMUS. *Flores* dioici, *Cal.* 6partitus.

♀. *Stil.*

- VIROLA. ♀. *Stil.* 3fidus. *Bacca* 3ocularis infera.
Sem. 2.
Flores dioici. *Cal.* turbinatus 3dentatus.
 ♀. *Drupa* exsucca, 2valvis, 1ocularis :
Nux subrotunda fibris reticulatis tecta. 114
 435. ORONTIUM. *Spadix* multiflorus. *Folliculus* 1spermus.
 434. ACORUS. *Spadix* multiflorus. *Capsf.* 1ocularis. 112
 436. CALAMUS. *Cal.* 6phyllus. *Pericarp.* retrorsum imbricatum, 1spermum.
 THRINAX. *Cal.* 5dentatus. *Stigma* emarginatum, *Bacca* 1sperma. 112
 437. JUNCUS. *Cal.* 6phyllus. *Capsf.* 1ocularis. 112
 446. PEPLIS. *Cal.* 12fidus. *Capsf.* 2ocularis. 112

* *Pisonia Celtis.* 122

DIGYNIA. 121

- MANSANA. *Cal.* 6fidus. *Petala* 6brevissima, concava, inter lacinias calicis inserta. *Bacca* officulo 1-2spermo.
 1385. FACCKIA. *Cal.* 1phyllus. *Cor.* 1petala. *Sem.* 4. 45
 449. ATRAPHAXIS. *Cal.* 2phyllus. *Cor.* 2petala. *Sem.* 1. compressum. 45
 1386. GAHNIA. *Gluma* 2valvis irregularis. *Nectarium* 2valve, filamenta involvens. *Stigma* dichotomum. 45
 LEERSIA. *Cal.* 0. *Cor.* *Gluma* 2valvis, clausa. 45
 BAMBUS. *Cal.* 0. *Glum.* 2valvis. *Nectarium* 2phyllum. *Sem.* 1 corollae inclusum. 45
 NASTUS. *Cal.* 2valvis. *Glum.* 1flora, 6-8valvis: valvis distiche imbricatis. 45
 448. ORYZA. *Cal.* *Gluma* 1flora: *Cor.* 2glumis. *Sem.* 1. oblongum. 45
 1062. ZIZANIA. *Flores* monoici. *Cal.* 0.
 ♂. *Cor.* *Gluma* 2valvis, mutica, femineis mista.
 ♀. *Cor.* *Gluma* 1valvis, cucullata aristata.
Sem. 1. corolla plicata vestitum.
 1063. PHARUS. *Flores* monoici. *Cal.* *Gluma* 2valvis, 1flora. 45
 ♂. *Cor.* *Gluma* 2valvis.
 ♀. *Cor.* *Gluma* 1valvis, longa, involvens.
Sem. 1.

* *Soleranthus* annuus. *Celtis.* *Velezia.* *Coprosma.* *Rumex* digynus. *Quercus.* *Polygonium.* *Hydropipes.* *Persicaria.*

TRI-

TRIGYNIA.

* *Flores diolini.*

1144. VERATRUM. *Flores masculi hermaphroditis interfiti.*
♂. Cor. 6petala. Rudimentum pistilli.
♀. Caps. 3. polyspermae.
1122. DIOSCOREA. *Flores dioici. Cor. 0. Cal. 6partitus.*
♀. Caps. 3locularis, compressa. Sem. 2.
membranacea.
1121. RAJANIA. *Flores dioici. Cor. 0. Cal. 6partitus.*
♀. Fructus subrotundus, inferus: ala ob-
liqua.
1120. SMILAX. *Flores dioici. Cor. 0. Cal. 6phyllus.*
♀. Bacca 3locularis. Sem. 2.
1220. BORASSUS. *Flores dioici. Cor. 3partita. Cal. - -*
♀. Drupa 3sperma.
1219. CHAMAEROPS. *Flores masculi hermaphroditis interfiti. Cal.*
3partitus. Cor. 3petala.
♀. Drupae 3 1spermae.

** *Flores hermaphroditis.*

— *inferi.*

457. COLCHICUM. *Cal. Spatha. Cor. 6petaloidea.*
454. MELANTHIUM. *Cal. 0. Cor. 6petala: petalis staminiferis.*
455. MEDEOLA. *Cal. 0. Cor. 6petala. Bacca 3coeca.*
458. HELONIAS. *Cal. 0. Cor. 6petala. Caps. 3locularis.*
456. TRILLIUM. *Cal. 3phyllus. Cor. 3petala. Bacca 3lo-*
cularis.
453. TRIGLOCHIN. *Cal. 3phyllus. Cor. 3petala. Caps. basi*
dehiscens.
451. RUMEX. *Cal. 3phyllus. Cor. 3petala. Sem. 1. tri-*
quetrum.
452. SCHEUCHZERIA.
 WURMBEA. *Cal. 6phyllus. Cor. 0. Caps. 3 1spermae.*
Cal. 6partitus. Cor. 0. Caps. 3locularis,
polysperma.

— *superi.*

450. FLAGELLARIA. *Cal. 6phyllus. Cor. 0. Pericarpium 1sper-*
num.

* *Tamarix orientalis, Xylophylla latifolia. Polygonum*
barbatum, viviparum. Anthericum caliculatum.
Quercus.

TETRAGYNIA.

- MATTUSCHKIA. *Cal. fistuloso-ligatus. Sem. 4.*
 459. PETIVERIA. *Cal. 4phyllus. Cor. o. Sem. 1. aristis uncinatis.*

PENTAGYNIA.

- * *Quercus.*
Portulaca oleracea.

HEXAGYNIA.

1022. ARISTOLOCHIA. *Cal. o. Cor. 1petala, lingulata, integra. Caps. 6ocularis, infera.*
 * *Alisma Damasonium. Sempervivum globiferum.*

POLYGYNIA.

460. ALISMA. *Cal. 3phyllus. Cor. 3petala. Pericarpia plura.*

MONOGYNIA.

LICUALA. Cal. 3partitus. Cor. 3partita. Nectarium fertiforme. Drupailocularis.

spinosa. 1. LICUALA. Thunb. act. Stockh. 1782. p. 284. Rumpf. amb. I. t. 9.

395. BROMELIA. Cal. 3fidus, superus. Petala 3. Squama nectarifera ad basin petali. Bacca 3locularis, infera.

Ananas. 1. Br. foliis ciliato-spinosis mucronatis, spica comosa. Trew. Ehret. t. 2. 3.

Pinguin. 2. Br. foliis ciliato-spinosis mucronatis racemo terminali. Trew. Ehret. t. 51. Gaertn. de fr. et sem. cent. I. t. 11. f. 2.

Acanga. 3. Br. foliis ciliato-spinosis mucronatis recurvatis, panicula diffusa. Morif. hist. pl. 2. t. 22. f. 7.

lingulata. 4. Br. foliis serrato-spinosis obtusis, spicis alternis. Plum. ic. 64. f. 1.

bracteata. 5. Br. foliis serrato-spinosis, bracteis ovato-lanceolatis, racemo composito: racemulis subdivisis; floribus sessilibus. Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 56.

paniculata. 6. Br. foliis serrato-spinosis, bracteis lanceolatis, racemo composito: racemulis subdivisis; floribus pedunculatis. Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 56.

nudicaulis. 7. Br. foliis radicalibus dentato-spinosis: caulinis integerrimis. Plum. ic. 62.

humilis. 8. Br. subcaulis, floribus aggregatis sessilibus, axillis stoliferis. Jacq. pl. rar. ic. cent. I. t. 100.

Karetas. 9. Br. foliis erectis, floribus acaulibus sessilibus aggregatis. Jacq. stirp. amer. pict. t. 260. f. 24. h. Vind. t. 31. 32.

PITCARNIA. *Cal.* 3partitus subinferus. *Petal.* 3linearia convoluta, ad basin singulari squama nectarifera. *Stil.* 3sulcus. *Stigm.* 3fidum, spirale. *Caps.* 3gona, 3cocca introrsum 3fariam dehiscens polysperma.

- bromeli- I. P. foliis ciliato-spinosis, pedunculis germinibusque glaberrimis. *Herit. fert. angl. p. 7. t. 11.*
 aefolia.
 angustifo- 2. P. foliis ciliato-spinosis, pedunculis germinibusque tomentosis. *Ait. hort. Kew. I. p. 401.*
 lia.
 latifolia. 3. P. foliis integerrimis basi subspinosis. *Ait. hort. Kew. I. p. 401.*

XEROPHYTA. *Cal.* tubulosus, 6partitus superus. *Stigma* tumidum. *Caps.* scabra coronata, 3ocularis, polysperma.

- madagas- I. XEROPHYTA. *Jussieu gen. plant. p. 50.*
 carienfis.

396. **TILLANDSIA,** *Cal.* 3fidus, superus persistens. *Cor.* 3fida, campanulata. *Caps.* ilocularis. *Semina* papposa.

- utriculata. I. T. scapo paniculato.
 polysta- 2. T. scapo spicis imbricatis lateralibus. *Catesb. car. 2. t. 89.*
 chya.
 fascicula- 3. T. spicis imbricatis lateralibus distichis, foliis lanceolato-subulatis erectis strictis. *Swartz nov. pl. gen. et. sp. p. 56.*
 ta.
 nutans. 4. T. scapo subnudo, panicula nutante, foliis radicalibus ovato-lanceolatis membranaceis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 56.*
 flexuosa. 5. T. scapo subdiviso; spicis laxis flexuosis: spiculis distichis remotiusculis, foliis lineari-lanceolatis reclinatis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 93.*

6. T.

6. T. filiformis ramosa intorta scabra. *Sloan. hist. of jam. I. t. 122. f. 2. 3.*
7. T. foliis filiformibus integerrimis, spica simplici laxa. *Sloan. hist. jam. I. t. 122. f. 1.*
8. T. foliis subulatis scabris reclinatis, culmis unifloris, gluma biflora. *Sloan. hist. jam. I. t. 121. f. 1.*
9. T. foliis linearibus canaliculatis reclinatis, scapo simplici imbricato, spica simplici. *Plum. ic. 238. f. 1.*
10. T. foliis linearibus erectis caulem aequantibus incanis, spicis subternis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 57.*
11. T. foliis lineari-lanceolatis rectis glabris, caulem superantibus, spicis sparsis fasciculatis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 57.*
12. T. foliis lanceolato-lingulatis integerrimis basi ventricosis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 92.*
13. T. foliis ovato-lanceolatis, caule decumbente. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 72.*
14. T. foliis superne ferrato-spinosis, spica comosa. *Plum. ic. 75. f. 1.*
15. T. foliis radicalibus brevissimis, caule subnudo, ramis subdivisis adscendentibus. *Plum. ic. 237.*

HEPETIS. Cal. 3partitus. Cor. 3petala. Caps. semisupera, 3ocularis. Semina mutica.

1. HEPETIS. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 56.*

397. BURMANNIA. Cal. prismaticus, coloratus, 3fidus: angulis membranaceis. Petala 3. Caps. 3ocularis, recta. Semina minuta.

1. B. spica gemina. *Burm. zeyl. t. 20. f. 1.*

2. B. flore gemino.

LACHENALIA. Cal. 6. Cor. 6petala, receptaculo inferta.

- tricolor. 1. L. floribus cylindricis racemosis nutantibus. *Jacq. coll. 2. p. 323. pl. rar. ic. cent. 1. t. 3. Linn. suppl. p. 205. Phormium aloides.*
- pendula. 2. L. floribus cylindricis racemosis terminalibus pendulis. *Jacq. coll. 3. p. 239.*
- mediana. 3. L. floribus racemosis pedicellatis erectis. *Jacq. coll. 3. p. 242.*
- orchioi- 4. L. floribus campanulatis subsessilibus erectiusculis: summis
des. abortientibus. *Suppl. p. 204. Phormium hyacinthoides. Syst. nat. XII. 2. p. 248. Hyacinthus orchioides. Jacq. hort. Vind. 2. t. 148.*
- orthope- 5. L. floribus spicatis terminalibus numerosis erectis pedicella-
tala. tis. *Jacq. collect. 3. p. 240.*
- pustulata. 6. L. floribus spicatis terminalibus numerosis subsessilibus: su-
premis abortientibus. *Jacq. collect. 3. p. 244.*
- pallida. 7. L. floribus campanulatis subpedunculatis horizontalibus, fo-
liis lineari-oblongis, scapo longioribus. *Ait. hort. Kew. 1. p. 460.*
- eontami- 8. L. floribus campanulatis pedunculatis, foliis lineari-subula-
nata. tis canaliculatis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 460.*

398. TRADESCANTIA. Cal. 3phyllus. Petala 3.
Filamenta villis arti-
culatis. Caps. 3locu-
laris, supera.

- virginica. 1. Tr. erecta laevis, floribus congestis. *Morif. hist. pl. 3. t. 2. f. 4. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 15. f. 2.*
- malabari- 2. Tr. erecta laevis, pedunculis solitariis longissimis. *Rhede
ca. b. mal. 9. t. 63.*
- nervosa. 3. Tr. scapo unifloro. *Mant. p. 223.*
- geniculata. 4. Tr. procumbens hirsuta. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 95.*
- monan- 5. Tr. diffusa, foliis ovatis acuminatis, floribus monandris um-
dra, bellulatis, involucello tetraphyllo. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 57.*

- multiflo- 6. Tr. erecta ramosa, foliis cordatis margine vaginisque cilia-
ra. tis, pedunculis congestis, floribus umbellatis triandris.
Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 57. Jacq. coll. 3. p. 226.
- cordifo- 7. Tr. repens laevis, foliis cordatis, pedunculis elongatis mul-
lia. tifloris. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 57.*
- cristata. 8. Tr. repens laevis, spathis diphyllis imbricatis. *Sp. pl. 64.*
Commelina cristata. Jacq. h. Vind. 2. t. 137.
- papilion- 9. Tr. repens laevis, spathis triphyllis imbricatis. *Mant. p.*
cea. *61. 513. Burm. ind. t. 7. f. 11.*
- spatha- 10. Tr. acaulis, foliis sessilibus, scapis radicalibus. *Swartz*
cea. *nov. pl. gen. et sp. p. 57.*
- speciosa. 11. Tr. foliis oppositis connatis. *Suppl. p. 192.*
- axillaris. 12. Tr. caule ramoso, floribus sessilibus lateralibus. *Mant.*
p. 321. Syst. nat. XII. 3. p. 79. Commelina axillaris.
- discolor. 13. Tr. spatha triphylla compressa, floribus subexsertis, foliis
lanceolatis subtus violaceis. *Herit fert. angl. p. 8. t. 12.*
- Aubleti. 14. Tr. racemis terminalibus: corollis inaequalibus, foliis sub-
petiolatis ovatis integerrimis. *Aubl. pl. guj. I. p. 35. t. 12.*

MNASIUM. Cal. 1phyllus, 3partitus. Cor. 1petala,
3partita; tubo brevissimo. An-
therae 4gonae, foliolo ovato ter-
minatae. Germen 3lobum. Stigm.
3 spiralia.

paludosum. I. MNASIUM. *Aubl. pl. guj. I. p. 305. t. 118.*

399. PONTEDERIA. Cor. 1petala, 6fida, 2labiata.
Stamina 3 apici, 3 tubo
corollae inserta. Caps.
3locularis.

- ovata. I. P. foliis ovatis, floribus capitatis. *Rheed. h. malab. II. t. 34.*
- azurea. 2. P. foliis subrotundo-ellipticis basi incrassatis, floribus spica-
tis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 57.*
- rotundi- 3. P. foliis orbiculato-cordatis. *Suppl. p. 192.*
folia.

- vaginalis. 4. P. foliis cordatis, racemo cernuo. *Mant. p. 222. Rumpf amb. 6. t. 75. f. 1.*
- cordata. 5. P. foliis cordatis, floribus spicatis. *Pet. gaz. 1. t. 1. f. 12.*
- limosa. 6. P. foliis cordato-ovatis, spathis lateralibus unifloris, floribus triandris. *Sloan. hist. jam. 1. t. 149. f. 1.*
- hastata. 7. P. foliis hastatis, floribus umbellatis. *Rhede b. malab. 11. t. 44.*

400. HAEMANTHUS. *Involucrum* 6phyllum, multiflorum, terminale. *Cor.* 6partita, supera. *Bacca* 3locularis.

- pubescens. 1. H. foliis linguiformibus villosis. *Suppl. p. 193.*
- coccineus. 2. H. foliis linguiformibus planis laevibus. *Comm. b. amst. 2. t. 64.*
- punicus. 3. H. foliis lanceolato-ovatis undulatis erectis. *Trew. Ebret. t. 44. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 11. f. 3.*
- carinatus. 4. H. foliis linearibus carinatis.

401. GALANTHUS. *Petala* 3 concava. *Nectarium* ex petalis 3 parvis emarginatis. *Stigma* simplex.

- nivalis. 1. GALANTHUS. *Jacq. fl. austr. 4. t. 313.*

402. LEUCOIUM. *Cor.* campanulata, 6partita, apicibus incrassata. *Stigma* simplex.

- vernum. 1. L. spatha uniflora, stilo clavato. *Jacq. fl. austr. 4. t. 312.*
- aestivum. 2. L. spatha multiflora, stilo clavato. *Jacq. fl. austr. 3. t. 203.*
- auctum-nale. 3. L. spatha multiflora, stilo filiformi. *Reencalm. spec. t. 100.*

1300. TULBAGIA. Cor. infundibuliformis: limbo
6fido. Nectarium coronans
faucem, 3phyllum: foliolis
2fidis magnitudine limbi.
Caps. supera 3ocularis.

alliacea. 1. T. foliis subfiliformibus. *Suppl. p. 193. Gaertn. de fr. et
sem. cent 1. t. 16. f. 3. an vere diversa a capensi?*

cepacea. 2. T. foliis lanceolato-linearibus. *Mant. p. 223. Suppl. p.
194. Jacq. b. Vind. 2. t. 115.*

403. NARCISSUS. Cor. supera, 6petala, aequalis:
Nectario (saepe) infundibu-
liformi, 1phylo extra sta-
mina.

poëticus. 1. N. spatha uniflora, nectario rotato brevissimo scarioso cre-
nulato. *Knorr del. hort. 1. t. N. 4.*

Pseudo- 2. N. spatha uniflora, nectario campanulato erecto crispo ae-
narcissus, quante petala ovata. *Bulliard. herb. Franc. t. 399.*

bicolor. 3. N. spatha uniflora, nectario campanulato: margine patulo
crispo aequante petala. *Rudb. elyf. 2. p. 71. f. 9.*

minor. 4. N. spatha uniflora, nectario obconico erecto crispo sexfido
aequante petala lanceolata. *Rudb. elyf. 2. p. 72. f. 11.*

moscha- 5. N. spatha uniflora, nectario cylindrico truncato subrepan-
ta, do, aequante petala oblonga. *Rudb. elyf. 2. p. 69. f. 6.
et p. 73. f. 15. 16.*

Bulboco- 6. N. spatha uniflora, nectario turbinato petalis majore, geni-
dium, talibus declinatis. *Rudb. elyf. 2. p. 75. f. 5. 7.*

ferotinus. 7. N. spatha uniflora, nectario sexpartito brevissimo, foliis
subulatis. *Rudb. elyf. 2. p. 64. f. 8.*

triandrus. 8. N. spatha subuniflora, nectario campanulato crenato dimi-
dio petalis brevior, staminibus ternis. *Rudb. elyf. 2. p.
72. f. 12.*

odorus. 9. N. spatha subbiflora, nectario campanulato sexfido laevi di-
midio petalis brevior, foliis semicylindricis. *Rudb. elyf.
2. p. 60. f. 7.*

- orientalis. 10. N. spatha subbiflora, nectario campanulato trifido emarginato petalis triplo brevior. *Mant. p. 62. Rudb. elyf. 2. p. 52. f. 2. β) Rudb. elyf. 2. p. 54. f. 5. γ) Rudb. elyf. 2. p. 50. f. 1.*
- trilobus. 11. N. spatha submultiflora, nectario campanulato subtrifido integerrimo petalis dimidio brevior. *Rudb. elyf. 2. p. 61. f. 3.*
- calathinus. 12. N. spatha multiflora, nectario campanulato subaequante petala, foliis planis. *Rudb. elyf. 2. p. 60. f. 5.*
- Tazetha. 13. N. spatha multiflora, nectario campanulato plicato truncato triplo brevior petalis, foliis planis. *Knorr del. hort. 1. t. N. 3.*
- dubius. 14. N. spatha multiflora: petalis ovatis, nectario campanulato integerrimo petalis triplo brevior. *Gouan. ill. t. 51. f. 2.*
- Jonquilla. 15. N. spatha multiflora, nectario campanulato brevi, foliis subulatis. *Bulliard herb. Franc. t. 334.*
- hispanicus. 16. N. scapo ancipiti unifloro, nectario petalo sexfido: lobis dentatis. *Gouan. illustr.*

404. PANCRATIUM. *Petala 6: Nectario 12fido. Stamina nectario imposita.*

- maximum. 1. P. spatha uniflora, petalis patentibus, nectario pedali. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 72.*
- zeylanicum. 2. P. spatha uniflora; petalis reflexis. *Commel. b. amst. 1. t. 38.*
- mexicanum. 3. P. spatha biflora. *Dill. b. Elth. t. 222. f. 289.*
- caribaeum. 4. P. spatha multiflora, foliis lanceolatis. *Mart. cent. t. 27.*
- maritimum. 5. P. spatha multiflora, petalis planis, foliis lingulatis. *Mill. dict. t. 197.*
- declinatum. 6. P. spatha multiflora, scapo compresso ancipiti, corollae laciniis tubum subexcedentibus, foliis lingulatis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 102.*
- carolinianum. 7. P. spatha multiflora, foliis linearibus, staminibus nectarii longitudine, *Catesb. carol. 3. t. 5.*

- verecun- 8. P. spatha multiflora, foliis linearibus, sinibus laciniarum
dum. nectarii staminiferis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 412.*
- illyricum. 9. P. spatha multiflora, foliis ensiformibus, staminibus necta-
rio longioribus. *Trew. Ehret. t. 27.*
- littorale. 10. P. spatha multiflora, scapo compresso ancipiti, corollae
laciniis tubo duplo brevioribus, foliis ensiformibus. *Jacq.
stirp. amer pict. t. 101.*
- amboi- 11. P. spatha multiflora, foliis ovatis nervosis petiolatis. *Com-
nense. mel. b. Amst. 1. t. 39. β) Trew. Ehret. t. 28.*

1381. MASSONIA. *Nectarium inferum. Cor. 6pe-
tala, nectario inferta.*

- latifolia. 1. M. foliis orbiculatis glabris. *Suppl. p. 193. Ait. hort. Kew.
1. t. 3.*
- undulata. 2. M. foliis lanceolatis undulatis glabris. *Thunb. nov. pl.
gen. p. 41.*
- angusti- 3. M. foliis lanceolato-oblongis glabris. *Suppl. p. 193. Ait.
folia. hort. Kew. 1. t. 4.*
- echinata. 4. M. foliis ovatis muricatis pilosis. *Suppl. p. 193.*

405. GRINUM. *Cor. (saepe) infundibuliformis, 6pe-
tala, 6partita: laciniis 3alter-
nis uncinatis. Germen fundo
corollae tectum. Stamina di-
stantia.*

- latifoli- 1. Cr. foliis ovato-lanceolatis acuminatis sessilibus planis. *Rheed.
um. b. mal. 11. t. 39. an ad Amaryllidem potius spectat?*
- obliquum. 2. Cr. foliis lanceolatis obliquis, laciniis corollae alternis ex-
tus glandulosis. *Suppl. p. 195. Herit. fert. angl. t. 15.
an potius Amaryllis?*
- africa- 3. Cr. foliis sublanceolatis planis, corollis obtusis. *Knorr del.
num. hort. 1. t. L. 10. an distincti generis?*
- asiaticum. 4. Cr. foliis carinatis. *Rheed. b. malab. 11. t. 33. Gaertn. de
fr. et sem. cent. 1. t. 13. f. 5. Distincti generis.*
- zeylani- 5. Cr. foliis scabro-dentatis, scapo compressiusculo. *Sp. pl.
cum. p. 321. Amaryllis zeylanica. Trew. Ehret. t. 13. an
potius Amaryllis?*

- falcatum. 6. Cr. foliis linearibus falcatis ad oras cartilagineis scabris. *Jacq. b. Vind. 3. t. 60.*
- angustifolium. 7. Cr. foliis linearibus obtusis, corollis cylindricis: laciniis alternis interglandulosis. *Suppl. p. 195. an ad Amaryllidem amandandum?*
- lineare. 8. Cr. foliis linearibus, corollis campanulatis: laciniis duabus angustioribus. *Suppl. p. 195.*
- tenellum. 9. Cr. spatha multiflora corollis aequalibus, foliis filiformibus. *Suppl. p. 194. Ait. hort. Kew. 1. t. 5. an Amaryllidis aut Leucoji species?*
- speciosum. 10. Cr. foliis ensiformibus, corollis campanulatis: tribus laciniis alternis calloso-unguiculatis. *Suppl. p. 195. an Amaryllidi accensendum?*
- americanum. 11. Cr. corollarum apicibus introrsum uncinatis. *Dill. b. Elth. t. 161. f. 195.*
- caspium. 12. Cr. foliis radicalibus lanceolatis undulatis. *Pall. it. 2. p. 736. t. Q.*
- nervosum. 13. Cr. foliis subrotundis nervosis, filamentis basi dilatatis. *Herit. fert. angl. p. 8. Rumpf amb. 6. t. 70. f. 1.*

TIMMIA. Cor. tubulosa clavata curva, 6fida, laciniis ovato-oblongis.

- angustifolia. 1. T. foliis obtuse carinatis rectis, floribus cernuis. *Ait. hort. Kew. 1.*
- obliqua. 2. T. foliis planis obliquis, floribus pendulis. *Herit. fert. angl. t. 16. Amaryllis umbella.*

406. AMARYLLIS. Cor. 6petala, campanulata. Stigma 3fidum.

* *spatha uniflora.*

- capensis. 1. A. spatha remotissima, corolla aequali, staminibus pistilloque rectis. *Morif. hist. pl. 2. t. 23. f. 9. an eadem cum hypoxi stellata?*
- lutea. 2. A. spatha indivisa, corolla aequali sessili, stigmate simplici. *Weinm. phyt. 3. t. 652. f. C.*
- tubispatha. 3. A. spatha monophylla tubulosa bifida, pedunculo duplo brevior. *Herit. fert. angl. p. 9.*

4. A.

- Jacq.* tubiflora. 4. A. spatha diphylla corolla infundibuliformi: tubo longissimo. *Feuill. par. 3. t. 20.*
- Atama-* 5. A. corolla subaequali, genitalibus declinatis, spatha bifida. *Catesb. Car. 3. t. 12.*
- co.* maculata. 6. A. spathae diphylla lineari: flore pedunculato; genitalibus declinatis. *Herit. fert. angl. p. 10.*
- uabus* clavata. 7. A. spatha diphylla subulata: corolla clavata. *Herit. fert. angl. p. 11.*
- mibus* pumilio. 27. A. spatha diphylla, corolla infundibuliformi aequali: laciniis revolutis, staminibus inclinatissimis: alternis brevioribus. *Ait. hort. Kew. 1. p. 415.*
- yllidis* formosissima. 8. A. spatha indivisa, corolla bilabiata sexpartita: petalis inferioribus genitalibusque declinatis. *Knorr del. hort. 1. t. N.*
- ous la-* chilensis. 9. A. spatha subbiflora subdiphylla: floribus pedunculatis, foliis linearibus. *Feuill. par. 3. t. 21.*
- 5. an* reginae. 10. A. spatha subbiflora, corollis basi tubulosis campanulatis quinquepartitis; fauce tubi hirsuta. *Mill. ic. t. 24.*
- . Elth.* spiralis. 11. A. spatha diphylla pauciflora, pedunculis filiformibus longissimis, foliis subulatis. *Herit. fert. angl. p. 10. t. 13.*
- . 2. p.* reticulata. 12. A. spatha submultiflora: corollis nutantibus basi tubulosis limbo reticulatis, foliis oblongis. *Herit. fert. angl. p. 12. t. 14.*
- atatis.* vittata. 13. A. floribus subhexapetalis pedunculatis: petalis exterioribus margine liberis. *Herit. fert. angl. p. 13. t. 15.*

** *spatha multiflora.*

- lata.* Belladonna. 14. A. floribus umbellatis pedunculatis subhexapetalis, foliis canaliculatis. *Mill. illustr. ic.*
- gundo* longifolia. 15. A. floribus umbellatis pedunculatis basi tubulosis sexpartitis, foliis seapo duplo longioribus. *Ehret. pict. t. 13.*
- istillo-* revoluta. 16. A. corollis breviter pedicellatis basi tubulosis reclinatissimis: laciniis revolutis, foliis linearibus. *Herit. fert. angl. p. 14.*
- n cum* aurea. 17. A. corollis basi tubulosis sexpartitis: laciniis linearibus undulatis, genitalibus corolla brevioribus. *Herit. fert. angl. p. 14. t. 15.*
- mplici.* orientalis. 18. A. corollis longissime pedunculatis sexpartitis, geminibus cuneiformibus triangularibus, foliis ovatis. *Brunsvigia Heist. monogr. c. ic.*

- ciliaris. 19. A. corolla sexpartita reflexa, foliis ciliatis. *Suppl. p. 195. Syst. nat. XII. 3. p. 234. Haemanthus ciliaris et p. 237. Amaryllis guttata. Breyer cent. t. 39.*
- famien- 20. A. corollis revolutis, radiatis subhexapetalis linearilanceo-
sis. latis, genitalibus erectis. *Ebret. select. t. 9. f. 3.*
- radiata. 21. A. corollis subhexapetalis linearibus undulatis revolutis,
genitalibus deflexis divergentibus, corolla duplo longiori-
bus. *Herit. fert. angl. p. 16.*
- cinnamo- 22. A. corollis subhexapetalis lanceolatis undulatis, genitalibus
mea. erectis corolla brevioribus. *Herit. fert. angl. p. 16. t. 17.*
- undula- 23. A. corollis subhexapetalis: petalis linearibus canaliculatis
ta. undulatis, genitalibus deflexis, corolla brevioribus. *Jacq. b. Vind. 3. t. 13.*
- tatarica. 24. A. spatha biflora: petalis tribus apice reflexis, staminibus
tribus longioribus. *Pall. it. 3. p. 727. t. D. f. 1. an hujus
generis?*
- disticha. 25. A. corollis aequalibus, foliis distichis incumbenti-patenti-
bus. *Suppl. p. 195. Paterson journeys, into the country
of the Hottentots and Caffraria. p. 51. ic.*
- alba. 26. A. floribus declinatis, foliis linearilanceolatis. *[Forsk.
fl. aeg. arab. p. 209.]*

407. BULBOCODIUM. Cor. infundibuliformis, 6-
petala: unguibus an-
gustis staminiferis. Caps.
supera.

vernum. I. BULBOCODIUM. *Retz. obs. bot. 2. t. 1. Funghans pl. ic.
cent. 1. t. 1.*

408. APHYLLANTHES. Cor. 6petala. Glumae
calicinae ivalves im-
bricatae. Filamen-
ta fauci corollae in-
ferta. Caps. supera.

monspe- I. APHYLLANTHES. *Morif. hist. pl. 2. t. 25. f. 12.*
ensis.

409. ALLIUM. Cor. 6petala, patens. Spatha multiflora, arida. Umbrella congesta. Caps. supera, 3locularis.

* foliis caulinis.

† planis.

← umbella capsulifera.

- Ampelopratalum. 1. A. umbella globosa, staminibus tricuspидatis, petalis carinata scabris.
- lineare. 2. A. umbella globosa, staminibus tricuspидatis, corolla duplo longioribus. *Gmel. fl. sib. I. t. 13. 14. f. 1.*
- rotundum. 3. A. umbella subglobosa, floribus lateralibus nutantibus; staminibus tricuspидatis. *Gaertn. de fr. et sem. cent. I. t. 16. f. 2.*
- Pomum. 4. A. staminibus tricuspидatis radice tunicata. *Blackw. herb. t. 421.*
- Victoria-lis. 5. A. umbella rotundata, staminibus lanceolatis corolla longioribus, foliis ellipticis. *Jacq. fl. austr. 3. t. 216. Gaertn. de fr. et sem. cent. I. t. 16. f. 2.*
- subhirsutum. 6. A. staminibus subulatis, foliis inferioribus hirsutis.
- ramosum. 7. A. umbella globosa, staminibus subulatis longioribus, foliis linearibus subconvexis. *Jacq. ic. pl. rar. cent. 2. t. 21.*
- obliquum. 8. A. staminibus filiformibus flore triplo longioribus, foliis obliquis. *Gmel. fl. sib. I. t. 9.*
- magicum. 9. A. staminibus simplicibus, ramulo bulbifero.
- roseum. 10. A. umbella fastigiata, staminibus simplicibus brevissimis, petalis emarginatis. *Magnol. fl. monsp. t. 10.*
- tataricum. 11. A. umbella plana, staminibus simplicibus, foliis femicylindricis. *Suppl. p. 196.*
- caeruleum. 12. A. umbella globosa, staminibus simplicibus, foliis linearibus: vaginis spinulosis. *Pallas it. 2. p. 737. t. R.*
- suaveolens. 13. A. umbella subrotunda staminibus subulatis, foliis linearibus canaliculatis. *Jacq. coll. 2. p. 305. pl. rar. ic. cent. 2. t. 33.*

† † umbella bulbifera.

- fativum. 14. A. bulbo composito, staminibus tricuspидatis.
 Scorodoprasum. 15. A. staminibus tricuspидatis, foliis crenulatis: vaginis ancipitibus. *An in duas species dirimendum?*
 arenarium. 16. A. spatha mutica, staminibus tricuspидatis, vaginis teretibus. *Flor. dan. t. 290.*
 carinatum. 17. A. spatha longissima, staminibus subulatis. *Hall. all. t. 2. f. 2.*

†† foliis teretibus.

† umbella capsulifera.

- Pallasii. 18. A. caule subteretifolio, umbella difformi, staminibus simplicibus corollam aequantibus, stilo brevissimo. *Murray comm. Goett. 1775. t. 3.*
 parviflorum. 19. A. caule subteretifolio, umbella globosa: spatha subulata, staminibus simplicibus corolla longioribus.
 pallens. 20. A. caule subteretifolio, floribus pendulis truncatis, staminibus simplicibus corollam aequantibus. *Column. ecphr. 2. t. 7. f. 2.*
 moschatum. 21. A. umbella fastigiata subsexflora, petalis acutis, staminibus simplicibus, foliis setaceis. *Rudb. elyf. 2. p. 166. f. 14.*
 flavum. 22. A. floribus pendulis: petalis ovatis, staminibus corolla longioribus. *Mant. p. 363. Jacq. fl. austr. 2. t. 141. an mera moschati varietas?*
 desertorum. 23. A. staminibus subulatis, petalis linea media obscuriore. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 72. an distincta species?*
 paniculatum. 24. A. caule subteretifolio, pedunculis capillaribus effusis, staminibus subulatis, spatha longissima. *Haller. opusc. p. 386. ic. Gaertn. de fr. et sem. cent. I. t. 16. f. 2. an distinctum satis a pallente?*
 descendens. 25. A. caule subteretifolio, pedunculis exterioribus brevioribus, staminibus tricuspидatis. *Rudb. elyf. 2. p. 160. f. 20.*
 sphaerocephala. 26. A. staminibus tricuspидatis corolla longioribus; foliis semiteretibus. *Mich. gen. t. 24. f. 2.*

†† umbella bulbifera.

- vineale. 27. A. staminibus tricuspидatis. *Lob. ic. 156.*
 oleraceum. 28. A. staminibus simplicibus, foliis scabris semiteretibus subtus sulcatis. *Hall. all. n. 26. f. 2.*

** foliis radicalibus, scapo nudo.

- nutans. 29. A. scapo ancipiti, foliis linearibus planis, staminibus tricuspидatis. *Gmel. fl. sib. 1. t. 12.*
- senescens. 30. A. scapo ancipiti, foliis linearibus subtus convexis laevibus, umbella subrotunda, staminibus subulatis. *Gmel. fl. sib. 1. t. 11. f. 2.*
- angulolum. 31. A. scapo ancipiti, foliis linearibus canaliculatis subtus subangulatis, umbella fastigiata. *Jacq. fl. austr. 5. t. 423. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 16. f. 2.*
- neapolitanum. 50. A. scapo ancipiti, foliis lanceolatis canaliculatis, umbella sparsa. *Cyrill. pl. rar. Neap. fasc. 1. t. 4.*
- odorum. 32. A. scapo teretiusculo, foliis linearibus canaliculatis subtus angulatis, umbella fastigiata. *Mant. p. 62.*
- ascalonium. 33. A. scapo tereti, foliis subulatis, umbella globosa, staminibus tricuspидatis. *Morif. hist. pl. 2. t. 14. f. 3.*
- nigrum. 34. A. scapo tereti, foliis linearibus, umbella hemisphaerica, petalis erectis, spatha mucronata bifida. *Rudb. elyf. 2. p. 160. f. 21.*
- canadense. 35. A. scapo tereti, foliis linearibus, capitulo bulbifero.
- multibulbosum. 36. A. scapo tereti, foliis lanceolato-elongatis sessilibus, umbella fastigiata, petalis omnibus patentissimis. *Jacq. fl. austr. 1. t. 10. an idem cum nigro?*
- fistulosum. 37. A. scapo adaequante folia teretia ventricosa. *Regn. bot. t. 365.*
- Cepa. 38. A. scapo inferne ventricoso longiore foliis teretibus.
- Schoenoprasum. 39. A. scapo adaequante folia teretia subulato-filiformia. β) *Murray comm. Goett. 1775. t. 4.*
- sibiricum. 40. A. scapo tereti, foliis semicylindricis, staminibus subulatis. *Mant. p. 562.*
- narcissiflorum. 41. A. scapo tereti, umbella terminali inclinata, petalis lanceolatis, staminibus simplicibus brevioribus. *Vill. pl. Delph. 2. p. 259. t. 6.*
- monspefulanum. 42. A. scapo tereti, umbella fastigiata, petalis linearibus, staminibus subulatis, foliis lanceolatis. *Retz. obs. bot. 2. p. 15. Gouan. ill. t. 16.*
- tenuissimum. 43. A. scapo tereti inani, foliis subulatis filiformibus, capitulis laxis paucifloris. *Gmel. fl. sib. 1. t. 15. f. 2. 3.*

- altaicum. 44. A. scapo tereti inani, foliis ventricosis fursum attenuatis, capitulis parvis confertissimis. *Pall. it. 2. p. 737. t. R.*
- ornitho- 49. A. scapo tereti umbellifero paucifloro, foliis subulatis pla-
galoides. nis. *Walt. flor. carol. p. 121.*
- illyri- 50. A. scapo tereti inferne subangulato, foliis sublinearibus
cum. acutis, umbella fastigiata multiflora. *Jacq. coll. 3. p. 273.*
- gracile. 51. A. scapo tereti longissimo, foliis linearibus canaliculatis,
staminibus subulatis basi connatis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 429.*
- trico- 52. A. scapo femitereti, foliis lanceolato-oblongis planis gla-
cum. bris, umbella globosa, feminibus solitariis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 428.*
- inodo- 53. A. scapo subtriquetro, foliis linearibus planis subtus cari-
um. natis, umbella fastigiata florifera: staminibus simplicibus. *Ait. hort. Kew. 1. p. 427.*
- Moly. 45. A. scapo subcylindrico, foliis lanceolatis sessilibus, umbel-
la fastigiata. *Swert. flor. 1. t. 60. f. 2.*
- urfinum. 46. A. scapo triquetro, foliis lanceolatis petiolatis, umbella
fastigiata. *Fl. dan. t. 757.*
- trico- 47. A. scapo foliisque triquetris, staminibus simplicibus. *Sp.
trum. pl. p. 1680. Rudb. elyf. 2. p. 159. f. 16.*
- Chamae- 48. A. scapo subnullo, capsulis cernuis, foliis planis ciliatis.
moly. *Rudb. elyf. 2. p. 166. f. 15.*

410. LILIUM. Cor. 6petala, campanulata: linea longitudinali nectarifera. Caps. valvis pilo cancellato connexis.

* foliis sparsis.

- candidum. 1. L. corollis intus glabris. *Knorr del. hort. 1. t. L.*
- bulbife- 2. L. corollis erectis intus scabris. *Jacq. fl. austr. 3. t. 226.
rum.*
- pompo- 3. L. foliis subulatis, floribus reflexis: corollis revolutis. *Knorr
nium. del. hort. 1. t. T. 4.*
- chaleedo- 4. L. foliis lanceolatis, floribus reflexis: corollis revolutis.
nicum. *Jacq. fl. austr. 5. app. t. 20. β) Lilium pyrenaicum.
Gouan. illustr.*

- Super- 5. L. foliis lanceolatis, floribus reflexis ramoso-pyramidatis;
bum. corollis revolutis. *Trew. Ebrēt. 2. t. 11.*
- japoni- 6. L. foliis lanceolatis, corollis cernuis subcampanulatis.
cum. *Thunb. fl. jap. p. 133.*
- Catesbaei. 11. L. caule unifloro, petalis erectis unguiculatis. *Walt. flor. carol. p. 123.*

*** foliis verticillatis.*

- Marta- 7. L. floribus reflexis: corollis revolutis. *Jacq. fl. austr. 4. t. 351.*
gon.
- canaden- 8. L. floribus reflexis: corollis revolutis-campanulatis. *Mant. fe. p. 364. Catesb. carol. 3. t. 11.*
- camtschat- 9. L. flore erecto: corolla campanulata; petalis sessilibus.
cense.
- philadel- 10. L. floribus erectis: petalis unguiculatis. *Catesb. Car. 2. t. 58.*
phicum.

411. FRITILLARIA. Cor. 6petala, aut 6partita, campanulata, supra unguis cavitate nectarifera. Stamina longitudine corollae. Stigma 3fidum. Caps. supera, 3locularis.

** corolla 6petala.*

- imperia- 1. Fr. racemo comoso inferne nudo, foliis integerrimis. *Kuorr del. hort. 1. t. K. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 17. f. 1.*
lis.
- persica. 2. Fr. racemo nudiusculo, foliis obliquis. *Rudb. elyf. 2. p. 183. f. 1.*
- pyrenai- 3. Fr. foliis infimis oppositis, floribus nonnullis folio inter-
ca. jectis.
- Melea- 4. Fr. foliis omnibus alternis, caule unifloro. *Jacq. fl. austr. 5. app. t. 32.*
gris.

*** corolla sexpartita: Eucomis.*

- punctata. 5. Fr. maculata, scapo cylindrico elongato laxifloro, foliis ensiformibus canaliculatis. *Herit. fert. angl. p. 18. t. 18.*

- regia. 6. Fr. scapo cylindrico, coma maxima foliosa, foliis undulatis. *Dill. h. Elth. t. 93. f. 109.*
 nana. 7. Fr. scapo clavato, floribus confertissimis. *Pet. gaz. t. 85. f. 6.*

412. UVULARIA. Cor. 6petala, erecta. Nectarii fovea baseos petali. Filamenta brevissima.

- amplexifolia. 1. U. foliis amplexicaulibus mollibus, caule glabro. *Morif. hist. pl. 3. t. 4. f. 11.*
 hirta. 2. U. foliis amplexicaulibus hirtis, caule villoso. *Thunb. fl. jap. p. 136.*
 lanceolata. 3. U. foliis perfoliatis ovato-lanceolatis acuminatis. *Corn. canad. t. 41.*
 perfoliata. 4. U. foliis perfoliatis ovatis. *Morif. hist. 3. t. 4. f. 12.*
 sessilifolia. 5. U. foliis sessilibus absque cirrhis.
 cirrhosa. 6. U. foliis sessilibus cirrhosis. *Thunb. fl. jap. p. 136.*

413. GLORIOSA. Cor. 6petala undulata reflexa. Stilus obliquus. Caps. supera, composita, 3loba. Sem. baccata.

- superba. 1. Gl. foliis cirrhiferis. *Mant. p. 364. Pluckn. alm. t. 116. f. 3. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 18. f. 1.*
 simplex. 2. Gl. foliis acuminatis. *Mant. p. 62.*

414. ERYTHRONIUM. Cor. 6petala, campanulata. Nectario tuberculis 2 petalorum alternorum basi adnatis.

- Dens canis. 1. E. foliis oppositis. *Jacq. fl. austr. 5. app. t. 9.*
 carolinianum. 2. E. foliis alternis. *Walt. flor. carol. p. 122.*

415. TULIPA. Cor. 6petala, campanulata. *Stilus* o.
Capsf. supera, 3locularis.

- silvestris. 1. T. flore subnutante, foliis lanceolatis. *Flor. dan. t. 375.*
 Gesneria- 2. T. flore erecto, foliis ovato-lanceolatis. *Knorr del. hort.*
 na. 1. T. T. 1. T. 2. T. 3.
 biflora. 3. T. caule subtrifloro diphylo, foliis lineari subulatis, flori-
 bus erectis planiusculis. *Suppl. p. 196. Falcit. it. 2. t. 6.*
 Breynia- 4. T. caule multifloro polyantho, foliis linearibus. *Breyn.*
 na. *cent. t. 36.*

ENARGEA. Cor. 6petala: petalis oblongo-ovatis,
 concavis, acutis, infra medium
 maculis 2 viridibus notatis, 3 ex-
 terioribus. *Bacca* 3locularis. *Sem.*
 pauca.

marginata. 1. ENARGEA. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. t. 59. f. 3.*

416. ALBUCA. Cor. infera 6petala: petalis interiori-
 bus conniventibus, exterioribus
 patulis. *Stamina* 6: tribus in-
 terdum castratis. *Stigma* cin-
 ctum cuspidibus 3.

* *staminibus castratis tribus.*

- major. 1. A. petalis interioribus apice glandulosis inflexis, foliis li-
 neari-lanceolatis planiusculis. *Cornut. canad. p. 160. 161. ic.*
 minor. 2. A. petalis interioribus apice glandulosis inflexis, foliis line-
 ari-subulatis canaliculatis. *Herm. parad. Lugdb. p. 209. ic.*
 saltissima. 3. A. petalis interioribus apice glandulosis inflexis, foliis sub-
 ulatis canaliculato-convolutis. *Dryand. n. act. Stockh.*
 1784. p. 293.
 coarctata. 4. A. petalis interioribus apice fornicatis, foliis glabris, pe-
 dunculis longitudine bractearum. *Dryand. n. act. Stockh.*
 1784. p. 297.
 abyssini- 5. A. foliis linearibus canaliculatis glabris. *Jacq. pl. rar. ic.*
 ca. *cent. 1. t. 64.*

spiralis. 6. A. foliis spiralibus, floribus nutantibus. *Suppl. p. 196.*

** *staminibus omnibus fertilibus.*

fastigiata. 7. A. petalis interioribus apice fornicatis, foliis glabris, pedunculis longissimis. *Dryand. nov. act. Stockh. 1784. p. 297.*

viscosa. 8. A. petalis interioribus apice fornicatis, foliis piloso-glandulosis. *Suppl. p. 196.*

417. HYPOXIS. Cor. 6partita, persistens, supera. Cal. Gluma 2valvis. Caps. basi angustior, evalvis, 3locularis.

fascicularis. 1. H. tubis florum longissimis. *Russel. alap. t. 2.*

erecta. 2. H. pilosa, capsulis ovatis. *Pluckn. alm. t. 350. f. 12.*

decumbens. 3. H. pilosa, capsulis clavatis. *Mill. dict. t. 39. f. 2.*

sessilis. 4. H. pilosa acaulis fructificationibus subradicalibus. *Dill. h. Elth. t. 220. f. 287.*

spicata. 5. H. erecta, foliis ensiformibus fulcatis glabris, floribus spicatis. *Thunb. fl. jap. p. 136.*

aquatica. 6. H. foliis linearibus, scapis umbelliferis f. unifloris. *Suppl. p. 197.*

minuta. 7. H. foliis triquetris carnosis glabris, scapis bifidis. *Suppl. p. 197. Mant. p. 225. Helonies minuta.*

alba. 8. H. foliis teretibus glabris, scapis subbifidis, petalis immaculatis. *Suppl. p. 198.*

plicata. 9. H. scapo unifloro triquetro, foliis lanceolatis plicatis villosis. *Suppl. p. 197.*

stellata. 10. H. scapo unifloro, foliis linearibus striatis, petalis maculatis. *Suppl. p. 197.*

ferrata. 11. H. foliis canaliculatis glabris ciliato-ferratis, scapis unifloris. *Suppl. p. 197.*

ovata. 12. H. foliis ovato-lanceolatis integris glabris, scapis unifloris. *Suppl. p. 197.*

13. H.

- villosa. 13. H. foliis lineari-ensiformibus villosis, stigmate triplici trigono acuto. *Suppl. p. 198. Gaertn. de fr. et sem. cent. I. t. II. f. 6.*
- violacea. 14. H. floribus racemosis: pedicellis squamatis, germinibus margine sexlobis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 74. an hujus generis?*

1383. EHRHARTA. Cor. infera, glumacea, duplex. Nectarium patenteriforme.

- capensis. 1. E. floribus monogynis. *Suppl. p. 209. Thunb. act. Stockh. 1779. p. 216. t. 8.*
- panicea. 2. E. floribus digynis corollae gluma exteriori laevi. *Smith pl. ic. ined. I. t. 9.*
- Bankfii. 3. E. floribus digynis corollae gluma exteriori exterius hispida. *Smith pl. ic. ined. p. 9.*

418. ORNITHOGALUM. Cor. 6petala erecta, persistens, supra medium patens. Filamenta alterna basi dilatata. Caps. supera, 3locularis.

* staminibus omnibus integerrimis.

- uniflorum. 1. O. scapo diphylo, pedunculo unifloro. *Mant. p. 62. Laxman nov. act. Petrop. 18. t. 6. f. 3.*
- luteum. 2. O. scapo anguloso diphylo, pedunculis umbellatis simplicibus. *Flor. dan. t. 378.*
- minimum. 3. O. scapo anguloso diphylo, pedunculis umbellatis ramosis. *Flor. dan. t. 612.*
- reticulatum. 4. O. scapo nudo, floribus ternis terminalibus: involucreo tripiphylo. *Pall. it. 3. p. 727. t. D. f. 2.*
- pyrenaicum. 5. O. racemo longissimo, filamentis lanceolatis, pedunculis floriferis patentibus aequalibus, fructiferis scapo approximatis. *Jacq. fl. austr. 2. t. 103.*

- narbonen-6. O. racemo oblongo, filamentis lanceolatis membranaceis, fe. pedunculis floriferis patentibus. β) Ornithogalum lateum. *Villars pl. Delph. 2. p. 272. an varietas pyrenaici?*
- latifo-7. O. racemo longissimo, bracteis pedunculos aequantibus, lium. foliis lanceolato-ensiformibus. *Suppl. p. 200.*
- longibra-8. O. racemo longissimo, bracteis pedunculis fere duplo lon- eteatum. gioribus, foliis lanceolato-ensiformibus. *Jacq. h. Vind. 1. t. 29.*
- como-9. O. racemo brevissimo: bracteis lanceolatis longitudine flo- sum. rum, petalis obtusis, filamentis subulatis. *Rudb. elyf. 2. p. 135. f. 1.*
- pyrami-10. O. racemo conico: floribus numerosis adscendentibus. dale. *Besl. h. Eysl. vern. t. 14. f. 2. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 17. f. 3.*
- conieum.11. O. racemo conico: floribus erectis numerosis; filamentis alternis basi subauriculatis. *Jacq. coll. 3. p. 232.*
- cauda-12. O. racemo erecto patentissimo: bracteis pedunculo duplo tum, brevioribus, petalis obtusis. *Jacq. coll. 2. p. 315.*
- suaveo-13. O. racemo paucifloro, bracteis longitudine pedunculorum, lens. petalis obtusis, filamentis lanceolatis. *Jacq. coll. 2. p. 316.*
- tenellum.14. O. racemo laxo patulo, petalis lanceolatis, filamentis subulatis. *Jacq. coll. 2. p. 316.*
- niveum.34. O. racemo paucifloro, petalis lanceolatis, foliis filiformibus canaliculatis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 440.*
- macula-15. O. racemo paucifloro, petalis lanceolatis, filamentis sub- tum. ulatis, corolla duplo brevioribus. *Jacq. coll. 2. p. 368.*
- bohemi-16. O. floribus axillaribus pedunculatis erectis: staminibus cum. subulatis, caule folioso. *Zauschner Abb. Privatg. Boehm. 2. 1776. p. 121. an vere distincta species?*
- umbella-17. O. floribus corymbosis, pedunculis scapo altioribus. Jacq. tum. *fl. austr. 4. t. 343.*
- flaves-18. O. racemo corymboso multifloro: bracteis acutis pedun- cens. culis subduplo longioribus, filamentis alternis basi utrinque alatis. *Jacq. collect. 3. p. 233.*
- minia-19. O. racemis corymbosis: bracteis pedunculo duplo brevioribus, filamentis alternis basi utrinque alatis. *Jacq. coll. 3. p. 233.*

Malsonii. 35. O. racemo longissimo, foliis lanceolato-linearibus, corollis patulis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 442.*

*** staminibus alternis emarginatis.*

thyrsoides. 20. O. floribus racemosis confertissimis. *Jacq. h. Vind. 1. t. 28.*

arabicum. 21. O. floribus corymbosis, pedunculis scapo humilioribus, filamentis subemarginatis. *Besl. h. Eyst. vern. t. 12. f. 1.*

nutans. 22. O. floribus secundis pendulis, nectario stamineo campanulato. *Jacq. fl. austr. 4. t. 301.*

capense. 23. O. foliis cordato-ovatis. *Commel. h. amst. 2. t. 88.*

**** tribus incertae.*

ciliatum. 24. O. foliis ovatis acutis ciliatis, floribus racemosis. *Suppl. p. 199.*

crenulatum. 25. O. foliis oblongis obtusis ciliatis, floribus racemosis erectis. *Suppl. p. 198.*

altissimum. 26. O. foliis oblongis obtusis glabris, racemo quadrupedali. *Suppl. p. 199.*

pilosum. 27. O. foliis lineari-ensiformibus ciliatis, floribus racemosis pedunculis incurvis. *Suppl. p. 199.*

circinatum. 28. O. hirsutum, foliis linearibus recurvatis canaliculatis: radicali solitario; caulinis tribus, caule subquadrifloro. *Suppl. p. 199. Pallas it. 3. t. D. f. 2.*

flavum. 29. O. foliis linearibus plano-complicatis, floribus flavis racemosis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 209.*

rupestre. 30. O. foliis filiformibus carnosis, scapo paucifloro. *Suppl. p. 199.*

japonicum. 31. O. racemo spicato cylindrico longissimo, scapo striato. *Thunb. fl. jap. p. 137.*

bulbiferum. 32. O. bulbis axillaribus, caule polyphyllis unifloro. *Suppl. p. 199. Pallas it. 2. t. Q.*

unifolium. 33. O. folio radicali solitario carnosifolium oblongo, ciliato, scapo nudo, racemo brevi. *Retz. obs. bot. 1. p. 17.*

419. SCILLA. Cor. 6petala, patens, decidua. Filamenta filiformia.

- maritima. 1. Sc. nudiflora, bracteis refractis. *Blackw. herb. t. 591.*
 β) *Seb. mus. 1. t. 44. f. 4. 5.*
- Hylio-Hyacinthus. 2. Sc. radice squamata.
- italica. 3. Sc. racemo conico oblongo, petalis laevissimis. *Mant. p. 364. Besl. h. Eyst. vern. 42. f. 1.*
- lusitanica. 4. Sc. racemo oblongo conico, petalis lineatis. *Rudb. elyf. 2. p. 34. f. 4.*
- hyacinthoides. 5. Sc. racemo longissimo: floribus subverticillatis; pedunculis patentibus. *Suppl. p. 201.*
- auctumnalis. 6. Sc. foliis filiformibus linearibus, floribus corymbosis: pedunculis nudis adscendentibus longitudine floris.
- peruviana. 7. Sc. corymbo conferto conico. *Rudb. elyf. 1. p. 37. f. 1.*
- japonica. 8. Sc. florum umbella terminali fastigiata. *Thunb. fl. jap. p. 137.*
- tetraphylla. 9. Sc. acaulis, floribus fasciculatis, foliis quaternis ovato-lanceolatis. *Suppl. p. 200.*
- unifolia. 10. Sc. folio teretiufculo, latere subspicato.
- amoena. 11. Sc. floribus lateralibus alternis subnutantibus, scapo angulato. *Jacq. fl. austr. 3. t. 218.*
- bifolia. 12. Sc. floribus erectiusculis paucioribus. *Jacq. fl. austr. 2. t. 117.*
- Jacquini. 13. Sc. floribus nutantibus racemosis, bracteis geminis inaequalibus, petalis alternis angustioribus. *Jacq. collect. 1. p. 61.*
- obtusifolia. 14. Sc. foliis ovato-oblongis obtusis, racemo longissimo; floribus pedunculo brevioribus. *Poir. voy. en Barb. 2. p. 149.*
- antherioides. 15. Sc. racemo longo spicato, floribus pedunculos aequantibus basi bracteatis. *Poir. voy. en Barb. 2. p. 149.*
- numidica. 16. Sc. foliis linearibus planis, floribus racemosis: pedunculis flore longioribus. *Poir. voy. en Barb. 2. p. 150.*
- lingulata. 17. Sc. foliis lineari-lingulatis, floribus spicatis, bracteis pedunculo longioribus. *Poir. voy. en Barb. 2. p. 151.*

verna. 18. Sc. racemo paucifloro bracteato, corollis campanulatis, foliis radicalibus linearibus canaliculatis, bulbo tunicato. *Ait. hort. Kew. 1. p. 445.*

420. CYANELLA. Cor. 6petala: petalis 3 inferioribus propendentibus. *Stamen* infimum declinatum, longius. *Caps.* supera, 3-ocularis.

Iutea. 1. C. foliis ensiformibus, ramis erectis. *Suppl. p. 201.*

capensis. 2. C. foliis undulatis, ramis patentissimis. *Suppl. p. 201. Jacq. b. Vind. 3. t. 35. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 17. f. 7.*

alba. 3. C. foliis lineari-filiformibus. *Suppl. p. 201.*

PUYA. Cor. infera, 6petala inaequalis: petalis 3 majoribus fornicatis. *Cal.* et *Stil.* o. *Caps.* 3ocularis.

chilensis. 1. PUYA. *Molin. hist. nat. Chil. p. 136.*

421. ASPHODELUS. Cor. 6partita. *Filamenta* basi dilatata. *Theca* baccans supera, 3ocularis.

Iuteus. 1. A. caule folioso, foliis triquetris striatis. *Jacq. b. Vind. 1. t. 77.*

ramosus. 2. A. caule nudo, foliis ensiformibus carinatis laevibus. *Murray comm. Goett. 1776. p. 37. t. 7.*

fistulosus. 3. A. caule nudo, foliis strictis subulatis striatis subfistulosis. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 17. f. 6.*

altaicus. 4. A. scapo nudo simplicissimo, foliis triquetro-carinatis laevibus. *Pallas act. petrop. 1779. 2. p. 258. t. 10.*

liburnicus. 5. A. foliis setaceis. *Scop. fl. carn. t. 12.*

422. ANTHERICUM. Cor. 6petala, patens. Caps. oblonga, supera, 3locularis.

* capsula sexangulari.

ossifragum. 1. A. foliis ensiformibus, filamentis lanatis. *Flor. dan. t. 42.*

** capsula ovata.

† foliis ensiformibus, Narthecia.

caliculatum. 2. A. perianthiis trilobis, filamentis glabris, floribus trigynis. *Flor. dan. t. 36. an distincti generis?*

japonicum. 3. A. foliis convolutis glabris: scapo ramofo angulato, foliis racemosis cernuis. *Thunb. fl. jap. p. 138.*

contortum. 4. A. foliis planis, caule ramofo, floribus remotissimis. *Suppl. p. 202.*

falcatum. 5. A. foliis carnofis falcatis glabris, caule ramofo racemoso. *Suppl. p. 202.*

ciliatum. 6. A. foliis carnofo-subtriquetris ciliatis, scapo simplici, racemo longissimo. *Suppl. p. 202.*

Cauda felis. 7. A. foliis canaliculato-ensiformibus, scapo simplici, racemo oblongo. *Suppl. p. 202.*

subtrigynum. 30. A. foliis canaliculato-ensiformibus caule erecto brevioribus, floribus racemosis terminalibus erectis subtrigynis. *Jacq. coll. 3. p. 273.*

latifolium. 8. A. foliis carnofis lato-ensiformibus glabris, racemo longissimo, caule simplici. *Suppl. p. 202. Jacq. coll. 3. p. 249.*

Adenantha. 9. A. foliis lineari-ensiformibus basi connatis, glandula inter filamentum et antheram. *Forst. fl. austr. p. 24.*

†† foliis carnofis, Bulbine.

frutescens. 10. A. foliis teretibus, caule fruticoso. *Dill. h. Elth. t. 231. f. 298. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 16. f. 1.*

filiforme. 31. A. foliis filiformibus teretiufculis scabridis, filamentis glabris, petalis lanceolatis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 451.*

alooides. 11. A. foliis subulatis planiusculis. *Dill. elth. t. 232. f. 300.*

asphodeloides. 12. A. foliis subulatis semiteretibus strictis. *Jacq. b. Vind. 2. t. 181.*

13. A.

- annuum. 13. A. foliis subulatis teretiusculis, scapo subracemoso.
 flexifolium. 14. A. foliis subulatis glabris flexuosis, caule ramoso. *Suppl.*
p. 201.
 muricatum. 15. A. foliis compressis muricatis striatis. *Suppl. p. 202.*
 hispidum. 16. A. foliis compressis hispidis.

— — — foliis triquetris.

- scabrum. 17. A. foliis ferrulatis, caule ramoso scabro, pedunculis fructiferis recurvis. *Suppl. p. 202.*
 triquetrum. 18. A. foliis filiformibus scapo simplici brevioribus, racemo ovato. *Suppl. p. 202.*
 revolutum. 19. A. foliis scabris, scapo ramoso, corollis revolutis. *Commel. b. Amst. I. t. 34.*

— — — foliis planis.

† filamentis glabris.

- serotinum. 20. A. foliis planiusculis, scapo unifloro. *Mant. p. 365. Jacq. fl. austr. 5. t. 38.*
 Liliastrum. 21. A. scapo simplicissimo, corollis campanulatis, staminibus declinatis. *Kniph. bot. orig. cent. 7. n. 30.*
 Liliago. 22. A. scapo simplicissimo corollis planis, pistillo declinato. *Jacq. b. Vind. I. t. 83. Gaertn. de fr. et sem. cent. I. t. 16. f. 1.*
 graecum. 23. A. scapo simplici, floribus corymbosis. *Mant. p. 365.*
 floribundum. 32. A. foliis glabris lineari-lanceolatis acutis, scapo simplici, racemo multifloro cylindrico compacto. *Ait. hort. Kew. p. 447.*
 ramosum. 24. A. scapo ramoso, corollis planis, pistillo recto. *Jacq. fl. austr. 2. t. 161.*

†† filamentis lanatis.

- planifolium. 25. A. scapo lanato. *Mant. p. 224.*
 cirratum. 26. A. scapo paniculato, foliis lanceolatis, filamentis bicirratis. *Forst. fl. austr. p. 24.*
 squameum. 27. A. scapo squamis membranaceis tumidis imbricato, foliis radicalibus graminicis. *Suppl. p. 202.*

— — — foliis nullis.

28. A.

spirale. 28. A. scapo spirali. *Mant. p. 224.*

aphyllum. 29. A. radice bulbosa. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 209.*

423. LEONTICE. *Cor.* (ut plurimum) 6petala. *Ne-*
ctarium 6phyllum, ungui-
bus corollae insidens, lim-
bo patens. *Cal.* 6phyllus,
deciduus.

Chryso- 1. L. foliis pinnatis: petiolo communi simplici. *Morif. hist.*
gonum. *pl. 2. t. 5. f. 3.*

Leonto- 2. L. foliis decompositis: petiolo communi trifido. *Morif.*
petalon. *hist. pl. 2. t. 15. f. 6.*

thalictroi- 3. L. folio caulino triternato: florali biternato.
des.

altaica. 4. L. foliis ternis quinatis: radicalibus terno-quinatis, race-
mo laxo sessili. *Pallas act. Petrop. 1779. 2. p. 257. t.*
9. f. 1-3.

leontope- 6. L. foliis simplicibus tripartito-multifidis, corollis monope-
taloides. *Ann. act. 8. t. 113. an hujus generis?*

vesicaria. 5. L. radice tuberosa; foliis ternatis: foliolis lobatis, capsulis
inflatis. *Pallas it. 3. p. 726. t. 5. f. 3. act. Petrop. 1779.*
2. t. 9. f. 4.

POLLIA. *Cor.* 6petala: petalis 3exterioribus majori-
bus concavis, 3interioribus inflexis.
Bacca polysperma.

japonica. 1. POLLIA. *Thunb. fl. jap. p. 138.*

CALLIXENE. *Cor.* 6partita aequalis, laciniis alter-
nis basi 2glandulosis. *Stigma*
3gonum. *Bacca* 3ocularis: lo-
culis saepe 3spermis.

magella- 1. CALLIXENE. *Jussieu gen. plant. p. 41.*
nica.

424. ASPARAGUS. Cor. 6partita erecta: petalis 3-
interioribus apice reflexis.
Bacca supera 3locularis.
Semina bina.

- officina- 1. A. caule herbaceo tereti erecto, foliis setaceis, stipulis pari-
lis. bus, floribus saepius dioicis. *Flor. dan. t. 805. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 16. f. 5.*
- declinatus. 2. A. caule ineremi tereti, ramis declinatis, foliis setaceis.
- stipularis. 3. A. foliis simplicibus subulatis stipularumque basi mucronatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 72.*
- acutifo- 4. A. caule ineremi angulato fruticoso, foliis aciformibus ri-
lius. gidulis perennantibus mucronatis aequalibus.
- aphyllus. 5. A. caule ineremi angulato fruticoso, foliis subulatis striatis
inaequalibus divergentibus. *Sabbat. h. rom. 4. t. 53.*
- verticilla- 6. A. foliis verticillatis. *Buxb. cent. 5. app. t. 37.*
ris.
- albus. 7. A. aculeis solitariis, ramis angulatis flexuosis, foliis fasci-
culatis triquetris muticis deciduis.
- retrofra- 8. A. aculeis solitariis, ramis teretibus reflexis retrofractisque,
ctus. foliis setaceis fasciculatis. *Pluckn. amalb. t. 375. f. 3.*
- asiaticus. 9. A. aculeis solitariis, caule erecto, ramis filiformibus, foliis
fasciculatis setaceis. *Pluckn. alm. t. 14. f. 4.*
- aethiopi- 10. A. aculeis solitariis reversis, ramis angulatis, foliis lanceo-
cus. lato-linearibus. *Mant. p. 63.*
- falcatus. 11. A. aculeis solitariis reversis, ramis teretibus, foliis ensi-
formibus falcatis. *Burm. zeyl. t. 13. f. 2.*
- horridus. 12. A. aphyllus fruticosus pentagonus, aculeis tetragonis com-
pressis striatis.
- capensis. 13. A. spinis quaternis, ramis aggregatis teretibus, foliis se-
taceis. *Pluckn. alm. t. 78. f. 3.*
- sarmento- 14. A. foliis solitariis lineari-lanceolatis, caule flexuoso, acu-
lus. leis recurvis. *Herm. par. lugdb. t. 650.*

1256. DRACAENA. Cor. 6partita, erecta. Filamenta medio subcrassiflora. Bacca 3locularis, isperma, supera.

- Draco. 1. Dr. arborea, foliis subcarnosis apice spinosis. *Blackw. herb. t. 358.*
- ferrea. 2. Dr. arborea, foliis lanceolatis acutis. *Syst. nat. X. p. 984. Convallaria fruticosa.*
- indivisa. 3. Dr. arborea, foliis ensiformibus acutis, racemo composito. *Forster. pl. escul. p. 33. et fl. austr. p. 24.*
- australis. 4. Dr. arborea, foliis ensiformibus acutis, racemo terminali erecto supradecomposito. *Forst. fl. austr. p. 24.*
- marginata. 5. Dr. fruticosa, foliis dentato-spinosis, racemis axillaribus, baccis polyspermis. *Ait. hort. Kew. I. p. 454.*
- friata. 6. Dr. frutescens caulescens erecta, foliis lanceolatis oblique falcatis strictis, caule flexuoso. *Suppl. p. 204.*
- terminalis. 7. Dr. caulescens, foliis lanceolatis, racemo terminali decomposito. *Sp. pl. 450. Asparagus terminalis. Rumpf amb. 4. t. 34.*
- borealis. 8. Dr. herbacea subcaulescens, foliis ellipticis. *Ait. hort. Kew. I. p. 454. t. 6.*
- erecta. 9. Dr. herbacea caulescens erecta, foliis lanceolato-subulatis sessilibus. *Suppl. p. 204.*
- undulata. 10. Dr. herbacea caulescens erecta, foliis ovato-acutis multinerviis, floribus axillaribus pedunculatis. *Suppl. p. 203.*
- ensifolia. 11. Dr. herbacea subcaulescens, foliis ensiformibus. *Mant. p. 63. Rumpf amb. 5. t. 73. Gaertn. de fr. et sem. cent. I. t. 16. f. 4.*
- medeoloides. 12. Dr. herbacea volubilis, foliis ovatis nervosis. *Suppl. p. 203. an eadem cum medeola asparagoide?*
- volubilis. 13. Dr. herbacea volubilis, foliis lanceolatis. *Suppl. p. 204.*
- graminifolia. 14. Dr. herbacea acaulis, foliis linearibus. *Spec. pl. p. 450. Asparagus graminifolius.*

425. CONVALLARIA. Cor. 6fida. Bacca gloeularis supera: Semina bina.

* corollis campanulatis, Liliium convallium.

majalis. I. C. scapo nudo, floribus spicatis nutantibus. *Fl. dan. t. 854. Gaertn. de fr. et sem. cent. I. t. 16. f. 6.*

japonica. 2. C. scapo nudo ancipiti, racemo cernuo. *Suppl. p. 204. Thunb. fl. jap. p. 139.*

spicata. 3. C. scapo nudo striato, racemo spicato, floribus aggregatis. *Tunb. fl. jap. p. 141.*

** corollis infundibuliformibus, Polygonatum.

verticillata. 4. C. foliis verticillatis. *Flor. dan. t. 86.*

multiflora. 5. C. foliis alternis amplexicaulibus, caule tereti, pedunculis axillaribus multifloris. *Flor. dan. t. 152.*

Polygonata. 6. C. foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus subunisfloris. *Flor. dan. t. 377.*

latifolia. 7. C. foliis alternis amplexicaulibus acuminatis, caule angulato, pedunculis axillaribus multifloris. *Jacq. fl. austr. 3. t. 232.*

biflora. 8. C. foliis femiamplexicaulibus alternis, caule tereti, pedunculis axillaribus bifloris solitariis. *Walt. flor. carol. p. 122.*

** corollis rotatis. Smilax.

racemosa. 9. C. foliis sessilibus, racemo terminali composito. *Pluckn. alm. t. 311. f. 2.*

stellata. 10. C. foliis amplexicaulibus plurimis. *Morif. hist. pl. 3. t. 4. f. 7.*

trifolia. 11. C. foliis amplexicaulibus ternis, racemo terminali simplici. *Gmel. flor. sib. I. t. 6.*

426. POLYANTHES. Cor. infundibuliformis, incurva, aequalis. Filamenta corollae fauci inserta. Germen in fundo corollae.

tuberosa. I. POLYANTHES. *Knorr del. hort. I. t. T. 12.*

ARGO.

ARGOLASIA. Cor. supera, exterius hirsuta, 6fida, aequalis. Antherae basi 2fidae. Caps. hirsuta, 3locularis: loculis 2-3spermis.

capensis. I. ARGOLASIA. *Jussieu gen. plant. p. 60.*

427. HYACINTHUS. Cor. campanulata: Pori 3-melliferi germinis.

- non feri- I. H. corollis campanulatis sexpartitis, apice revolutis. *Bull. herb. Franc. t. 353.* tenax
ptus.
- cernuus. 2. H. corollis campanulatis sexpartitis, racemo cernuo. bulbi
rum
- revolutus. 3. H. corollis campanulatis sexpartitis revolutis, foliis oblongis undulatis. *Suppl. p. 204.* 428.
- romanus. 4. H. corollis campanulatis semifexfidis racemosis, staminibus membranaceis. *Mant. p. 224.*
- amethy- 5. H. corollis campanulatis semifexfidis basi cylindricis. *Rudb. elyf. 2. p. 27. f. 8.*
- stinus.
- viridis. 6. H. corollarum exterioribus laciniis subulatis longissimis. *Murray comm. Goett. 1781. t. 5. an Lachenaliae adscribendus?* fragra
- ferotinus. 7. H. petalis exterioribus subdistinctis: interioribus coadunatis. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 12. f. 4.* guinea
fis.
- corymbo- 8. H. corollis infundibuliformibus corymbosis erectis, scapo foliis brevioris. *Mant. p. 223. Jacq. collect. 3. t. 19. f. 2.* hyacin
thoide
- orienta- 9. H. corollis infundibuliformibus semifexfidis: basi ventricolis. *Kniph. bot. orig. cent. 1. n. 43.*
- lis.
- Muscari. 10. H. corollis ovatis: omnibus aequalibus. *Kniph. bot. orig. cent. 10. n. 52.* capenf
- convalla- 11. H. corollis ovatis pendulis, scapo capillari. *Suppl. p. 204.* farinof
- rioides.
- racemo- 12. H. corollis ovatis: summis sessilibus, foliis laxis. *Mant. p. 367. Jacq. fl. austr. 2. t. 187.* Uvaria
- lus.
- monstrosus. 13. H. corollis subovatis. *Col. ecphr. 2. t. 12.*
- botryoi- 14. H. corollis globosis uniformibus, foliis canaliculato-cylindricis strictis. *Mant. p. 366. Lob. ic. 108.* pumila
- des.
15. H.

comosus. 15. H. corollis angulato-cylindricis: summis sterilibus longius pedicellatis. *Mant. p. 366. Jacq. fl. austr. 2. t. 126.*

lanatus. 16. H. corollis lanatis caule ramofo. *utrum hujus generis? an distincti?*

1382. PHORMIUM. Cor. infundibuliformis, 6partita: tubi fundo urceolato. Caps. supera, 3locularis. Sem. bracteata.

tenax. 1. Ph. caule folioso. *Suppl. p. 204. Cook it. 2. t. 96. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 18. f. 3.*

bulbiferum. 2. Ph. scapo racemoso simplici: floribus nutantibus. *Cyrill. pl. rar. Neap. fasc. 1. t. 12.*

428. ALETRIS. Cor. infundibuliformis. Stamina inserta laciniarum basi. Bacca supera 3locularis.

* fructu baccato, Sanseverina.

fragrans. 1. A. caulescens, foliis lanceolatis laxis. *Commel. b. amst. 1. t. 49. et 2. t. 4.*

guineensis. 2. A. acaulis, foliis omnibus lanceolatis carnosis, floribus geminatis. *Jacq. b. Vind. 1. t. 84.*

** fructu capsulari.

hyacinthoides. 3. A. acaulis, foliis carnosis lanceolatis et subulatis compressis, floribus geminatis. *Commel. b. amst. 2. t. 21. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 15. f. 6.*

capensis. 4. A. acaulis, foliis lanceolatis undulatis, spica ovata, floribus nutantibus. *Murray act. Stockb. 1770. t. 5.*

farinosa. 5. A. acaulis, foliis lanceolatis membranaceis, floribus alternis. *Pluckn. amalth. t. 437. f. 2.*

Uvaria. 6. A. foliis ensiformibus canaliculatis carinatis scapo brevioribus. *Syst. nat. XII. 3. p. 249. Aloë Uvaria. Knorr. del. hort. 1. t. A. 13.*

pumila. 7. A. acaulis foliis linearibus acute carinatis scapo longioribus. *Ait. hort. Kew. 1. p. 464.*

- japonica. 8. *A. acaulis*, foliis petiolatis ovato-lanceolatis septemnerviis, floribus spicatis. *Thunb. nov. act. Ups. 3. p. 208.*
 aurea. 9. *A. Walt. flor. carol. p. 121.*

429. YUCCA. *Cor. campanulato-patens. Stilus o. Caps. 3locularis.*

- Gloriosa. 1. *Y. foliis integerrimis. Barr. pl. rar. ic. t. 1194.*
 aloifolia. 2. *Y. foliis crenulatis strictis. Dill. h. Elth. t. 323. f. 416.*
 Draconis. 3. *Y. foliis crenatis nutantibus. Dill. h. Elth. t. 324. f. 417.*
 filamen- 4. *Y. foliis ferrato-filiferis. Trew. Ebrēt. t. 37.*
 tosa.

430. ALOË. *Cor. tubulosa 6fida erecta: ore patulo, fundo nectarifero. Filamenta receptaculo inserta. Caps. supera, 3locularis.*

- perfoliata. 1. *A. caulescens, floribus racemosis reflexis cylindricis, foliis ensiformibus dentatis erectis. Rheed. b. malab. 11. t. 3. Commel. praelud. t. 17-22.*
 picta. 2. *A. caulescens, floribus racemosis reflexis cylindricis, foliis ensiformibus dentatis pictis patentibus. Commel. b. amst. 2. t. 5.*
 humilis. 3. *A. acaulis, floribus racemosis reflexis cylindricis, foliis trigonis subulatis aculeatis. Commel. praelud. t. 26.*
 maculata. 4. *A. acaulis, floribus racemosis cernuis curvatis, foliis linguiformibus glabris pictis. Thunb. diss. de aloë. Ups. 1785, p. 8.*
 variegata. 5. *A. subacaulis, floribus racemosis cylindricis, foliis trifariis pictis canaliculatis: angulis cartilagineis. Knorr del. hort. 1. t. A. 7.*
 pendens. 6. *A. pedunculis racemosis assurgentibus, racemis pendulis. Forsk. fl. aeg. arab. p. 74. an distincta species?*
 linguae- 7. *A. subacaulis, floribus racemosis erectis cylindricis, foliis formis. linguaeformibus denticulatis glabris. Suppl. p. 206.*
 disticha. 8. *A. acaulis, floribus racemosis reflexis clavatis, foliis ensiformibus acutis papillofis distichis. Knorr del. hort. 1. t. A. 12. et A. 14.*

- sinuata. 9. *A. caulescens*, floribus racemosis erectis cylindricis, foliis ensiformibus sinuato-ferratis reflexis.
- spiralis. 10. *A. subcaulescens*, floribus racemosis recurvis, foliis imbricatis octofariis ovatis. *Knorr del. hort. 1. t. A. 6.*
- retusa. 11. *A. acaulis*, floribus spicatis triquetris bilabiatis: labio inferiori revoluto, foliis quinquefariis deltoideis. *Knorr del. hort. 1. t. A. 10. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 17. f. 5.*
- viscosa. 12. *A. subcaulescens*, floribus racemosis cernuis cylindricis, foliis imbricatis trifariis ovatis. *Knorr del. hort. 1. t. A. 10.*
- pumila. 13. *A. acaulis*, floribus racemosis cernuis cylindricis, floribus trigonis cuspidatis papillofis. *Commel. h. amst. 2. t. 10. 11. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 17. f. 5.*
- arachnoidea. 14. *A. acaulis*, floribus subspicatis erectis cylindricis, foliis trigonis cuspidatis ciliatis. *Knorr del. hort. 1. t. A. 11.*
- spicata. 15. *A. caulescens*, floribus spicatis horizontalibus campanulatis, foliis planis ensiformibus dentatis. *Suppl. p. 205.*
- dichotoma. 16. *A. ramosa*, ramis dichotomis, foliis ensiformibus ferratis. *Suppl. p. 206. Paterson journeys into Caffraria, p. 56. ic.*

431. AGAVE. *Cor. erecta, supera. Filamenta corolla longiora, erecta.*

- americana. 1. *A. acaulis*, foliis dentato-spinosis, scapo ramoso.
- virginica. 2. *A. acaulis*, foliis dentato-spinosis, scapo simplicissimo. *Jacq. pl. rar. ic. cent. 2. t. 12.*
- vivipara. 3. *A. acaulis*, foliis dentatis, staminibus corollam aequantibus. *Rumpf amb. 5. t. 94.*
- lurida. 4. *A. subcaulescens*, foliis dentato-spinosis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 472.*
- cubensis. 5. *A. foliis ciliato-spinosis*, corolla hexapetala. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 260. f. 25.*
- tuberosa. 6. *A. caulescens*, foliis dentato-spinosis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 472.*
- foetida. 7. *A. caulescens*, foliis integerrimis. *Comm. h. amst. 2. t. 18.*

Binae species a Forskaehlio flor. aeg. arab. p. 74. dictae, altera foliis dentato-spinosis, altera inermibus margine subcartilagineis vix videntur distinctae hujus generis species.

432. ALSTROEMERIA. Cor. 6petala, subbilabiata:
petalis alternis minoribus,
2 inferioribus basi tubu-
lofis. Stamina declinata,

* *caule erecto.*

- peregrina. 1. A. corollis campanulatis rectis, foliis lineari-lanceolatis sessilibus. *Jacq. hort. Vind. 1. t. 50. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 13. f. 4.*
- pulchella. 2. A. corollis reflexo-patentibus acutis, foliis sessilibus, pedicellis involucri brevioribus. *Suppl. p. 206.*
- Ligita. 3. A. foliis spatulato-oblongis, pedunculis umbellae involucri longioribus, corolla bilabiata. *Suppl. p. 207. Mill. ill. en var. subj. t. 2. f. 1-5.*

** *caule volubili.*

- Salifilla. 4. A. foliis petiolatis lanceolatis acuminatis, umbella ramosa, pedunculis involucri longioribus bracteatis laxis. *Suppl. p. 206. Banks ic. t. 2.*
- multiflora. 5. A. foliis petiolatis lanceolatis acuminatis, umbella simplici, pedunculis bracteis brevioribus, petalis alternis truncatis. *Suppl. p. 207. Banks ic. t. 1.*

590. GETHYLLIS. Cor. 6partita. Cal. o. Bacca
 clavata, radicalis, ilocularis.

- villosa. 1. G. foliis filiformibus spiralibus villosis, limbi laciniis ovato-oblongis. *Suppl. p. 198. Thunb. act. Lund. 1. 2. n. 12. p. 111. Papiria villosa.*
- ciliaris. 2. G. foliis linearibus spiralibus ciliatis, limbi laciniis ovato-oblongis. *Suppl. p. 198. Thunb. act. Lund. 1. 2. p. 111. Papiria ciliaris.*
- spiralis. 3. G. foliis linearibus spiralibus glabris, limbi laciniis oblongis. *Suppl. p. 198. Syst. nat. XII. 3. p. 325. Gethyllis afra.*
- lanceolata. 4. G. foliis lanceolatis planis, limbi laciniis lanceolatis. *Suppl. p. 198. Thunb. act. Lund. 1. 2. p. 112. Papiria lanceolata.*

433. HEMEROCALLIS. Cor. campanulata: tubo cylindrico. Stamina declinata.

- flava. 1. H. foliis lineari-subulatis carinatis, corollis flavis. *Jacq. b. Vind. 2. t. 139.*
 fulva. 2. H. foliis lineari-subulatis carinatis, corollis fulvis. *Best. h. Eyst. vern. t. 6. f. 1.*
 japonica. 3. H. foliis petiolatis ovato-lanceolatis septemnerviis. *Thunb. fl. jap. p. 142.*
 cordata. 4. H. foliis cordatis venosis. *Thunb. fl. jap. p. 143.*

1023. PISTIA. Cor. lingulata, 1petala, integra. Cal. o. Antherae filamentis infidentibus. Caps.ilocularis, in fundo corollae.

Stratiotes. I. PISTIA. foliis obcordatis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 225.*

LINDERA. Cor. 6petala. Capsula.

umbellata. I. LINDERA. *Thunb. nov. pl. gen. p. 64. ic.*

ADENIA. Cor. 6petala. Cal. longissimus, 6fidus, inferus. Nectarium squamae 6lineares.

venenata. I. ADENIA. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 77. Folia palmata. Flores spicati.*

PEUMUS. Cor. 6petala. Cal. 6fidus inferus. Drupa isperma.

- rubra. 1. P. foliis alternis petiolatis ovalibus integerrimis. *Molin. hist. nat. Chil. p. 160.*
 alba. 2. P. foliis alternis petiolatis ovalibus dentatis. *Molin. hist. nat. Chil. p. 160.*
 mammosa. 3. P. foliis alternis sessilibus cordatis integerrimis. *Molin. hist. nat. Chil. p. 160.*

Eoldus. 4. P. foliis oppositis petiolatis ovalibus subtus villosis. *Molin. hist. nat. Chil. p. 160.*

SILIQVARIA. Cor. 4petala ad latus superius calicis 4phylli. *Siliqua polysperma.*

glandulosa. 1. SILIQVARIA. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 78.*

1159. **GLEDITSCHIA.** Flores polygami, dioici.
♀. Cor. 4petala. Cal. 4fidus. *Legumen.*

♂. Cor. 3petala. Cal. 3phyllus.

♀. Cor. 5petala. Cal. 5phyllus. *Legumen.*

triacantha. 1. Gl. caule spinis triplicibus axillaribus. *Du Hamel. arbr. t. 352. f. 1. β) Catesb. car. t. 43. γ) Gleditsia Meliloba. Walt. flor. carol. p. 254. δ) Gleditsia monosperma. Walt. flor. carol. p. 254.*

inermis. 2. Gl. caule inermi. *Mill. ic. t. 5. an mimosae species?*

1064. **GUETTARDA.** Flores monoici. Cal. cylindricus. Cor. 7fida, infundibuliformis.

♀. *Drupa sicco-baccata, infera.*

speciosa. 1. G. foliis cordatis lato ovatis subsericeis, floribus heptandris: tubo elongato. *Brown. jam. t. 20. f. 1. Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 36. f. 5.*

rugosa. 2. G. foliis subcordatis ovatis acutis subtus tomentosis supra scabris, floribus hexandris. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 59.*

elliptica. 3. G. foliis ellipticis pubescentibus, floribus tetrandris. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 59.*

membranacea. 4. G. foliis ovatis acuminatis membranaceis subhispidis - scabris, floribus tetrandris. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 59.*

ISERTIA. *Cal.* coloratus, 4-6dentatus. *Cor.* 6fida
infundibuliformis. *Pomum* subglo-
bosum, 6loculare, polyspermum.

coccinea. I. ISERTIA. *Aubl. pl. guj. 1. p. 317. t. 123.*

LEAEBIA. *Flores* dioici. *Cor.* 3petala. *Cal.* 5phyl-
lus. *Nectarium* squamae 6.

dubia. I. LEAEBIA. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 172.*

RAVENALA. *Spatha* communis, multiflora, 1phyl-
la. *Involucrum* parziale 2phyl-
lum. *Cor.* tripetala. *Nectar.* 2.
phyllum. *Caps.* 3gona, 3locu-
laris, polysperma.

madagaf- I. RAVENALA. *Sonner. it. ind. 2. p. 223. t. 124-126.*
caricenis.

1141. **MUSA.** *Spatha* supera. *Cor.* 2petala: petalo
altero erecto 5dentato, alte-
ro nectarifero, concavo, bre-
viori. *Filamenta* 6, quorum
nunc 1, nunc 5perfecta. *Ger-
men* in multis abortiens. *Bacca*
oblonga, 3quetra, infera, poly-
sperma.

paradisia- I. M. spadice nutante, floribus abortientibus persistentibus.
ca. *Trew. Ehret. t. 18-20. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 11.*

sapien- 2. M. spadice nutante, floribus abortientibus terminalibus de-
tum. ciduis. *Trew. Ehret. t. 21-23.*

Enfete. 3. M. spadice nutante, bracteis terminalibus. *Bruce trav. in
Eg. Ar. Ab. and Nub. 5. app. p. 36. icc.*

Troglo- 4. M. spadice erecto, spathis deciduis. *Rumpf amb. 5. t. 61.
dytarum, Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 11. f. 1. an forte Rave-
nolae species?*

humilis. 5. M. spadice subsexfloro, bacca violacea. *Aubl. pl. guj. 2.
p. 931. an distincta species?*

434. ACORUS. *Spadix* cylindricus, tectus flosculis.
Cor. 6petalae nudae. *Stilus* o.
Caps. 3locularis.

Calamus. 1. A. scapi mucrone longissimo foliaceo. *Blackw. herb. t. 466.*
 β) *Rheede b. malab. II. t. 60.*

gramineus. 2. A. scapi mucrone spadiceum vix excedente. *Ait. hort. Kew.*
 I. p. 474.

435. ORONTIUM. *Spadix* cylindricus, tectus flos-
 culis. *Cor.* 6petalae, nudae.
Stil. o. *Folliculi* ispermi.

aquaticum. 1. O. foliis lanceolato-ovatis. *Catesb. Car. I. t. 82.*

japonicum. 2. O. foliis ensiformibus venosis. *Thunb. fl. jap. p. 144.*

1436. MAURITIA. *Amentum* oblongum, sessile.
Cor. 1petala: tubo brevi;
 limbo 3partito. *Cal.* 1phyl-
 lus, cyathiformis, integer.

flexuosa. 1. MAURITIA. *Suppl. p. 454.*

RHAPIS. *Flores* hermaphroditi et masculi. *Cal.* 3-
 fidus. *Cor.* 3fida.

flabelli- 1. Rh. frondibus palmatis plicatis: plicis marginibusque acu-
 formis. leato-denticulatis. *L'Herit. stirp. nov. t. 2. t. 100.*

arundina- 2. Rh. frondibus bipartitis: lobis acutis plicatis; plicis scabri-
 cea. usculis. *Ait. hort. Kew. 3. p. 474.*

1284. ELAEIS. *Flores* dioici. *Cor.* 6fida. *Cal.* 6-
 phyllus.

♀. *Stigm.* 3. *Drupa* fibrosa. *Nux* 1
 3valvis.

guineen- 1. E. frondibus pinnatis: stipitibus dentato-spinosis divergenti-
 sis. bus: denticulis supremis recurvatis. *Mant. p. 137. Jacq.*
stirp. amer. pict. t. 257. Gaertn. de fr. et sem. cent. I.
t. 6. f. 2. β) Elaeis melanococca. Gaertn. l. m. c.

1223. COCOS. Flores monoici. Cor. o. Cal. 6-
phyllus.

♀. Germen 3loculare. Stigm. 3. Dru-
pa supera, baccata,ilocularis.

- nucifera. 1. C. inermis, frondibus pinnatis: foliolis replicatis ensiformibus, drupa utrinque umbilicata. *Jacq. stirp. amer. t. 169. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 4. 5.*
- butyra- 2. C. inermis, frondibus pinnatis: foliolis simplicibus, spadicea. cibus solitariis. *Suppl. p. 454. Pif. bras. p. 62. ic.*
- chilensis. 3. C. inermis, frondibus pinnatis: foliolis complicatis ensiformibus, spadiceibus quaternis. *Molin. hist. nat. Chil. p. 155.*
- maldioi- 4. C. inermis, foliis bipinnatis: foliolis bifidis. *Sonner. it. ca. nov. Guin. p. 4. t. 3-7.*
- guineen- 5. C. tota aculeata, frondibus distantibus, radice repente. sis. *Mant. p. 137. Jacq. stirp. amer. pict. t. 256. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 9. f. 1. vix hujus generis.*
- aculeata. 6. C. aculeato-spinosa, caudice fusiformi, frondibus pinnatis, stipitibus spathisque spinosis. *Sloan. hist. jam. 2. p. 119. t. 214.*
- lapidea. 7. C. drupa in processum mammillarem producta; basi tribus foraminibus pertusa. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 6. f. 1.*

1221. CORYPHA. Cor. o. Cal. 6phyllus. Bacca
supera isperma.

- umbracu- 1. C. frondibus pinnato-palmatis plicatis filoque interjectis, lifera. stipitibus ciliato-spinosis. *Rheed. b. mal. 1. t. 1. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 7. f. 1.*
- seribus. 2. C. foliis radiatim plicatilibus palmato-peltatis, stipitibus spinulosis. *Jussieu gen. plant. p. 39.*
- Palmetto. 3. C. frondibus medio conniventibus margine expansis. *Walt. flor. carol. p. 119.*
- minor. 4. C. frondibus palmatis flabelliformibus plicatis subtrifidis, filiis interjectis paucis, stipitibus inermibus. *Jacq. b. Vind. 3. t. 8. an eadem cum Euterpe Gaertneri? et pumila Walt. flor. carol. p. 119?*

METROXYLON. *Cal.* 3phyllus lignosus patens.
Cor. 3petala, lignosa glabra.
Nux subrotunda: nucleo
duro utrinque sulcato.

Sagu. I. METROXYLON. *Fr. Rottböll n. art. dan. 2. p. 527. t. 1.*

THRINAX. *Cal.* 6dentatus. *Cor.* o. *Stigma* emar-
ginatum. *Bacca* isperma.

parviflora. I. THRINAX. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 57.*

1119. **TAMUS.** *Flores* dioici. *Cal.* 6partitus. *Cor.* o.
♀. *Stil.* 3fidus. *Bacca* 3locularis, in-
fera. *Sem.* 2.

communis. I. T. foliis cordatis indivisis. *Blackw. herb. t. 457.*

cretica. 2. T. foliis trilobis. *An mera communis varietas?*

elephanti- 3. T. foliis reniformibus integris. *Herit. fert. angl. p. 29. t. 40.*
pes.

TONINA. *Flores* monoici. *Cor.* o.
♂. *Cal.* 3lobus. *Pistill.* sterile.
♀. *Cal.* o. *Germ.* 3striatum. *Stigm.* 3.
Capsf. 3valvis, 1locularis, isperma.

fluviatilis. I. TONINA. *Aubl. pl. guj. 2. p. 856. t. 330.*

VIROLA. *Flores* dioici. *Cor.* o. *Cal.* turbinatus,
3dentatus.
♀. *Drupa* exsucca, 2valvis, 1locularis.
Nux fibris reticulatis tecta.

setifera. I. VIROLA. *Aubl. pl. guj. 2. p. 904. t. 345.*

439. **CALAMUS.** *Cal.* 6phyllus. *Cor.* o. *Bacca*
exarida, isperma, retror-
sum imbricata.

Rotang. I. CALAMUS. *Pluckn. alm. t. 106. f. 1. 2. Rumpf. amb. 5.*
t. 51-58. f. 1.

437. JUNCUS. *Gluma* floralis 2phylla. *Cal.* 6phyl-
lus, persistens. *Cor.* o. *Caps.*
supera 3ocularis, 3valvis, po-
lysperma, aut ilocularis 3sperma.

* *culmis nudis.*

- trifidus. 1. J. foliis floribusque tribus terminalibus. *Flor. dan. t. 107.*
conglomeratus. 2. J. culmo stricto, capitulo laterali: floribus triandris ovatis obtusis. *Leers fl. herb. t. 13. f. 1.*
effusus. 3. J. culmo stricto, panicula laterali laxa, floribus triandris ovatis obtusis. *Leers fl. herb. t. 13. f. 2.*
inflexus. 4. J. culmo stricto apice incurvo submembranaceo, panicula laterali sparsa: floribus ovato-acuminatis. *Leers fl. herb. t. 13. f. 3.*
filiformis. 5. J. culmo incurvo filiformi, panicula laterali pauciflora simplici. *Leers fl. herb. t. 13. f. 4.*
gracilis. 6. J. culmo filiformi simplicissimo, foliis filiformibus femicylindricis canaliculatis, capitulo terminali, involuero subpentaphyllo. *Roth. fl. germ. I. p. 155.*
squarrosum. 7. J. culmo rigido, foliis setaceis, panicula terminali aphylla. *Flor. dan. t. 430.*
punctori- 8. J. culmo tereti, folio tereti articulato mucronato, panicula
us. glomerata. *Suppl. p. 208.*
acutus. 9. J. culmo subnudo tereti mucronato, panicula terminali: involuero diphylo spinoso. *Morif. hist. pl. 3. t. 15.*

** *culmis foliosis.*

- nodosus. 10. J. foliis nodoso-articulatis, petalis mucronatis. *Pluckn. alm. t. 92. f. 9.*
aquaticus. 11. J. culmo decumbente, foliis articulato-nodosis subcompressis linearibus, panicula terminali composita. *Leers fl. herb. t. 13. f. 6. β) Juncus viviparus. Scheuchz. gram. t. 7. f. 10.*
sylvaticus. 12. J. culmo erecto, foliis teretibus articulato-nodosis, panicula terminali supradecomposita diffusa. *Roth. fl. germ. p. 155.*
uliginosus. 13. J. culmo repente ad florum glomerulos prolifero, foliis setaceis subarticulato-nodosis. *Roth. fl. germ. p. 155.*

- alpinus. 14. J. radice repente, foliis subarticulatis, panicula terminali simplici, glumis aristatis, capsulis obtusis. *Vill. pl. Delph. 2. p. 233. n. 10.*
- bulbosus. 15. J. culmo indiviso subcompresso, foliis linearibus canaliculatis, panicula terminali bractea tua breviori, calicibus capsulisque obtusis. *Flor. dan. t. 431.*
- bufonius. 16. J. culmo dichotomo, floribus solitariis sessilibus, calicis foliolis lanceolatis mucronatis capsula ovata longioribus. *Leers fl. herb. t. 13. f. 8. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 15. f. 5.*
- Tenageia. 17. J. culmo dichotomo, floribus solitariis sessilibus, calicis foliolis ovato-lanceolatis acuminatis capsulam globosam aequantibus. *Suppl. p. 208.*
- supinus. 18. J. culmis cespitosis subdichotomis, foliis filiformibus canaliculatis, capitulis triphyllis. *Roth. fl. germ. 1. p. 156.*
- stygus. 19. J. foliis setaceis depressiusculis, pedunculis geminis terminalibus, glumis solitariis subbifloris.
- subverticillatus. 36. J. culmo subdichotomo, foliis subulato subsetaceis, floribus fasciculato-subverticillatis. *Scheuchz. agrofl. p. 330. n. 5. t. 7. f. 10.*
- grandiflorus. 20. J. folio tereti, culmo unifloro, flore erecto singulari nudo. *Suppl. p. 209.*
- Jacquini. 21. folio subulato, capitulo subquadrifloro terminali. *Mant. p. 63. Jacq. fl. austr. 3. t. 221.*
- biglumis. 22. J. folio subulato, gluma biflora terminali. *Flor. dan. t. 120.*
- triglumis. 23. J. foliis fistulosis subulatis, gluma subtriflora terminali. *Flor. dan. t. 132.*
- pilosus. 24. J. foliis planis pilosis, corymbo ramoso. *Flor. dan. t. 441. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 15. f. 5.*
- maximus. 25. J. foliis planis pilosis, panicula terminali ramosissima: floribus fasciculatis. *Roth. fl. germ. 1. p. 157.*
- luzulinus. 26. J. foliis pilosis strictis, floribus rotundis solitariis. *Vill. pl. Delph. 2. p. 235. Tabern. Kraeuterb. p. 227.*
- spadiceus. 27. J. foliis planis ex vagina pilosis, floribus minimis corymbosis solitariis subaristatis. *Allion. fl. pedem. n. 2083. Vill. pl. Delph. 2. t. 6.*
- pediflorus. 28. J. foliis plano-carinatis pilosis, floribus oblongis in spica lobata nutantibus. *Vill. pl. Delph. 2. p. 238. t. 6.*

- niveus. 29. J. foliis planis subpilosis, corymbis folio brevioribus: floribus falciculatis. *Morif. hist. pl. 3. t. 9. f. 39.*
- campestris. 30. J. foliis planis subpilosis, spicis sessilibus pedunculatisque. *Curt. flor. Lond. t. 140.*
- luteus. 31. J. foliis planis laevibus, panicula nitente, floribus obtusis. *Hall. hist. stirp. Helv. n. 1329. Vill. pl. Delph. 2. t. 6.*
- spicatus. 32. J. foliis planis, spica racemosa nutante. *Flor. dan. t. 270.*
- ferratus. 33. J. foliis ensiformibus planis ferratis subtus canis, paniculae vaginis tubulatis perfoliatis. *Suppl. p. 208.*

*** *incertae tribus.*

- tubulatus. 34. J. foliis tubulatis, paniculis terminalibus: involuero diphylo tubulato. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 75.*
- spinofus. 35. J. paniculae infimae involucri pungentibus, superioris setiferis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 75.*

439. RICHARDIA. Cal. 6-partitus. Cor. 1petala, subcylindrica. Fructus inferus 3partibilis. Sem. solitaria.

scabra. I. RICHARDIA. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 25. f. II.*

438. ACHRAS. Cal. 6phyllus. Cor. ovata, 6fida: squamis totidem alternis interioribus. Pomum 10loculare. Sem. solitaria hilo marginali apiceque unguiculato.

- difsecta. I. A. floribus solitariis, foliis cuneiformibus emarginato-retusis. *Suppl. p. 210. Rheed. b. malab. 3. t. 25.*
- mammofa. 2. A. floribus solitariis, foliis cuneiformi-lanceolatis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 59.*
- Sapota. 3. A. floribus solitariis, foliis lanceolato-ovatis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 60.*
- falicifolia. 4. A. floribus confertis, foliis lanceolato-ovatis. *Brown. jam. t. 17. f. 4.*

Balata. 5. A. foliis ovato-oblongis subtus incanis, pomo oblongo-ovato.
Aubl. pl. guj. 1. p. 308. Rheed. h. malab. 4. t. 25.

GUAPIRA. Cor. tubulosa, 4-5dentata. Cal. 4-5-
phyllus. Filament. 3 reliquis lon-
giora. Stigma 5-6fidum. Drupa
ovata, 6striata, isperma.

gujanensis. I. GUAPIRA. Aubl. pl. guj. 1. p. 308. t. 119.

AJOVEA. Cal. 1phyllus, 3dentatus. Cor. 3petala.
Filamenta glandulis 2 terminata.
Anther. foveis 2 excavatae. Stigm.
6fidum. Bacca subrotunda, ilo-
cularis, isperma.

gujanensis. I. AJOVEA. Aubl. pl. guj. 1. p. 310. t. 120. an forsan huic
quoque generi accensenda Licaria. Aubl. pl. guj. 1. p. 313.
t. 121.

441. PRINOS. Cal. 6fidus. Cor. 1petala, rotata.
Bacca 6sperma.

verticilla- 1. Pr. foliis longitudinaliter ferratis. Du Hamel arbr. 1. t. 23.
tus. Stamina 6-8. Flores interdum droici.

glaber. 2. Pr. foliis apice ferratis. Mill. dict. t. 83. f. 2.

lucidus. 3. Pr. foliis ellipticis acuminatis laevibus apice subserratis. Ait.
hort. Kew. 1. p. 478.

monta- 4. Pr. foliis ovatis ferratis, pedunculis axillaribus. Swarts
nus. nov. pl. gen. et sp. p. 58.

fideroxy- 5. Pr. foliis subrotundis integerrimis. Swarts nov. pl. gen. et
loides. sp. p. 58.

1384. DUROIA. Cal. cylindricus, truncatus. Cor.
6partita. Filamenta 10. Po-
mum hispidum.

Eriopila. I. DUROIA. Suppl. p. 209. Merian. surinam. t. 43?

440. BURSERA. *Cal.* 3phyllus. *Cor.* 3petala. *Caps.*
carnosa, 3valvis, isperma.

gummi- I. BURSERA. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 96. aliquando dioica,*
fera. *aut pentandra.*

442. BERBERIS. *Cal.* 6phyllus. *Petala* 6, ad un-
gues glandulis 2. *Stilus* 0.
Bacca supera,ilocularis, api-
ce perforata. *Sem.* 2-3.

vulgaris. I. B. pedunculis racemosis, spinis triplicibus. *Knorr del. hort.*
2. t. B. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 42. f. 6.*

cretica. 2. B. pedunculis subumbellatis, spinis triplicibus. *Alpin. exor.*
t. 20.

ilicifolia. 3. B. pedunculis cymosis elongatis, spinis palmatis. *Suppl. p. 210.*

sibirica. 4. B. pedunculis axillaribus nudis unifloris, foliis ovatis cilia-
to-spinosis, spinis subquinis. *Pall. it. 2. p. 737. t. P. f. 2.*
Murray comm. Goett. 1784. t. 6.

1302. CAPURA. *Cal.* 0. *Cor.* 6fida, infera. *Sta-*
mina intra tubum. *Stigma*
globosum. *Bacca.*

purpurata. I. CAPURA. *Mant. p. 225.*

443. LORANTHUS. *Cal.* 0. *Cor.* supera, (utplu-
rimum) 6fida revoluta.
Stamina ad apices lacinia-
rum. *Bacca* infera, 2lo-
cularis, isperma.

tetrapeta- I. L. floribus ad articulos quatuor verticillatis tetrapetalis, fo-
lus. *liis* oblongis oppositis subtessilibus. *Suppl. p. 211.*

Scurrule. 2. L. pedunculis unifloris congestis, foliis obovatis. *Petiv.*
gaz. t. 63. f. 8.

uniflorus. 3. L. racemis simplicissimis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 100.*

europae- 4. L. racemis simplicibus terminalibus, floribus dioicis. *Sp.*
us. *pl. p. 1672. Jacq. fl. anstr. 1, t. 30.*

5. L.

- americana- 5. L. racemis subramosis aequalibus, foliis ovatis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 98.*
 nus.
 emargina- 6. L. racemis axillaribus simplicibus, foliis cuneatis ovatis
 tus. emarginatis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 58.*
 occiden- 7. L. racemis simplicibus, floribus irregularibus. *Sloan. hist. jam. 2. t. 200. f. 2.*
 talis.
 Stelis. 8. L. racemis trichotomis, pedunculis trigonis, floribus aequalibus.
 parvifo- 9. L. pedunculis axillaribus trifidis: pedicellis unifloris, foliis
 lius. ovatis integris. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 58.*
 pauciflo- 10. L. pedunculis trichotomis foliis obovatis brevioribus. *Swartz
 rus. nov. pl. gen. et sp. p. 58.*
 pentan- 11. L. racemis simplicibus, floribus quinquefidis, foliis alter-
 drus. nis petiolatis. *Mant. p. 63.*
 sessilis. 15. L. racemis solitariis simplicibus: floribus ternis sessilibus.
Jacq. stirp. amer. p. 99.
 peduncu- 16. L. racemis solitariis: floribus ternis pedunculatis, ramis
 latus. radicanibus. *Jacq. stirp. amer. p. 98.*
 falcatus. 12. L. racemis paucifloris axillaribus, foliis linearibus obtusis
 lateraliter falcatis glaucis. *Suppl. p. 211.*
 spicatus. 13. L. spicis quadrangularibus. *Mant. p. 65. Jacq. stirp. amer. pict. t. 99.*
 Ioniceroi- 14. L. floribus aggregato-capitatis. *Rheed. b. malab. 7. t. 29.*
 des.

444. HILLIA. *Cal.* duplex: inferior 6phyllus. *Cor.* longissima, contorta. *Caps.* 2locularis, 2valvis, coronata. *Semina* papposa.

- longiflo- 1. H. corollis sexfidis: laciniis lanceolatis revolutis, foliis ova-
 ra. tis acutis. *Sp. pl. p. 1662. Jacq. stirp. amer. pict. t. 97.*
 tetrandra. 2. H. floribus tetrandris: corollis quadrifidis; laciniis ovatis,
 foliis obovatis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 58.*

1301. CANARINA. Cal. 6phyllus. Cor. 6fidus,
campanulata. Stigmata 6.
Caps. intera, 6ocularis,
poly sperma.

Campanu- I. CANARINA. Mant. p. 225. Syst. nat. XII. 3. p. 161. Cam-
panula canariensis. Pluckn. alm. t. 276. f. 1.

PSATHURA. Cor. globa, campanulata intus hirta.
Cal. 6dentatus. Stigma 3-4la-
mellatum. Drupa striata, 6lo-
cularis, 6sperma.

borbonica. I. PSATHURA. Jussieu gen. plant. p. 206.

NARDINA. Cal. polyphyllus, imbricatus. Cor. 6-
petala.

domestica. I. NARDINA. Thunb. fl. jap. p. 147.

COSSIGNIA. Cal. 5partitus. Cor. 4-5petala. Ger-
men subtrigonum. Caps. ovato-
trigona, 3ocularis: loculis 2-3-
spermis.

Commer- I. COSSIGNIA. Jussieu gen. plant. p. 248.
soni.

445. FRANKENIA. Cal. 5fidus, infundibuliformis.
Petala 5. Stigma 6par-
titum, Caps. 1ocularis,
3valvis.

laevis. 1. Fr. foliis linearibus confertis basi ciliatis. Bocc. mus. I. t. 11.

hirsuta. 2. Fr. caulibus hirsutis, floribus fasciculatis terminalibus.
Berg. cap. t. 1. f. 2.

pulveru- 3. Fr. foliis obovatis retusis subtus pulveratis.
lenta.

O o

4. Fr.

revoluta. 4. Fr. caule frutescente dichotomo, foliis ovatis margine re-
volutis, floribus axillaribus sessilibus: stigmate trifido.
Forsk. fl. aeg. arab. p. 75.

446. PEPLIS. *Cal.* campanulatus: ore 12fido. *Petala*
o, aut 6 calici inserta. *Capsf.* 2lo-
cularis, supera, polysperma.

Portula. 1. P. floribus saepius apetalis. *Flor. dan. t. 64. Gaertn.*
de fr. et sem. cent. 3. t. 51. f. 4.

tetrandra. 2. P. floribus tetrandris monopetalis. *Jacq. stirp. amer. pict.*
t. 103.

DIGYNIA.

1386. GAHNIA. *Cal.* Gluma 2valvis irregularis.
Nectarium 2valve, filamenta
involvens. *Stigma* dichoto-
mum.

procera. 1. G. paniculis spicatis pluribus elongatis. *Suppl. p. 211. Forst.*
char. gen. p. 26. t. 26.

Schoenoi. 2. G. culmis flexuosis, paniculis compositis spicatis rigidis sub-
des. solitariis. *Forst. fl. austr. p. 26.*

LEERSIA. *Cal.* o. *Cor.* Gluma 2valvis, clausa.

hexandra. 1. L. panicula effusa: spiculis alternis; glumis sublaevibus.
Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 21.

monan- 2. L. panicula effusa: spicis remotis laxis; spiculis secundis
dra. subrotundis monandris, glumis laevibus. *Swartz nov. pl.*
gen. et sp. p. 21.

448. ORYZA. *Cal.* Gluma 2valvis, 1flora. *Cor.* 2-
valvis, subaequalis, femini ad-
nascens.

fativa. 1. ORYZA. *Mill. illustr. ic. Regn. bot. t. 399.*

1062. ZIZANIA. Flores monoici. Cal. o.

♂. Cor. gluma 2valvis, mutica,
femineis mixta.♀. Cor. Gluma 1valvis, cucullata,
aristata. *Stilus* 2partitus. *Sem.* 1. corolla plicata
vestitum.aquatica. 1. Z. paniculata effusa. *Sloan. hist. jam. 1. t. 67.*palustris. 2. Z. panicula inferne racemosa mascula, superne spicata feminea. *Mant. p. 295. Schreb. gram. 2. t. 29.*terrestris. 3. Z. paniculata subracemosa. *Rheed. b. malab. 12. t. 60.*

1063. PHARUS. Flores monoici. Cal. Gluma 2valvis, iflora.

♂. Cor. Gluma 2valvis aut o.

♀. Cor. o. aut Gluma 1valvis, longa, involvens. *Semen 1.*latifolius. 1. Ph. floribus corollatis. *Brown. jam. t. 38. f. 3.*ciliatus. 2. Ph. panicula subramosa, calicibus apetalis ciliatis muticis. *Koenig apud Retz. obs. bot. 5. p. 23.*aristatus. 3. Ph. panicula umbellata, calicibus apetalis aristatis nudis. *Retz. obs. bot. 5. p. 23.*lappulaceus. 4. Ph. culmo ramofo, femine pilis rigidis ad apicem hirsutus. *Aubl. pl. guj. 2. p. 859.*BAMBUS. *Spicul.* subquinqueflor. bracteis ternis fultae. Cal. o. Cor. 2valvis: *valva* inferiore ventricosa; interiore ciliata. *Nect.* 2phyllum. *Sem.* 1. corolla tectum.Arundo. 1. BAMBUS. *Syst. nat. XII. 3. p. 100. Arundo Bambos. Rheed. b. mal. 1. t. 16.*

NECTRIS. *Cal.* 1phyllus, 6partitus, coloratus. *Cor.* o. *Stil.* persistentes. *Capsf.* 2 superae, ovatae,iloculares, polyspermae.

aquatica. I. NECTRIS. *Aubl. pl. guj. 1. p. 321. t. 124.*

NASTUS. *Cal.* 2valvis. *Gluma* 1flora, laevis, 6-8-valvis: valvis distiche imbricatis. *Nectarium* 2-4phyllum?

borbonicus. I. NASTUS. *Jussieu gener. plant. p. 34.*

1385. FALKIA. *Cal.* 1phyllus, *Cor.* 1petala. *Sem.* 4. repens. I. FALKIA. *Suppl. p. 211.*

449. ATRAPHAXIS. *Cal.* 2phyllus. *Petala* 2 sinuata aut o. *Stigm.* capitata. *Sem.* 1.

spinosa. I. A. ramis spinosis. *Dill. h. Elth. t. 40. f. 47.*
undulata. 2. A. inermis. *Dill. h. Elth. t. 32. f. 36.*

MANSANA. *Cal.* 6fidus. *Petala* 6 concava, brevissima, inter lacinias calicis inserta. *Bacca* officulo 1 2spermo,

arborea. I. MANSANA. *Sonner. it. nov. Guin. p. 134. t. 94.*

TRIGYNIA.

1121. RAJANIA. *Flor.* dioici. *Cor.* o. *Cal.* 6partitus. ♀. *Semen* maturum 1, germinis tunica corticatum, ialatum.

angustifolia. I. R. foliis lineari-lanceolatis basi rotundatis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 59.*

ovata. 2. R. foliis ovatis acuminatis trinerviis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 59.*

3. R,

- caroliniana. 3. R. foliis ovatis venosis petiolatis, caule volubili. *Walt. flor. carol. p. 247.*
- hastata. 4. R. foliis hastato-cordatis. *Plum. amer. t. 98.*
- cordata. 5. R. foliis cordatis septemnerviis. *Plum. ic. 155. f. 1. Gaertn. de fr. et sem. cent. I. t. 14. f. 1.*
- quinquefolia. 6. R. foliis quinque ovato-oblongis. *Plum. ic. 155. f. 2.*
- quinata. 7. R. foliis quinatis: foliolis emarginatis, floribus umbellari-
bus axillaribus. *Thunb. fl. jap. p. 148.*
- hexaphylla. 8. R. foliis senariis: foliolis oblongis acutis, floribus racemosis.
Thunb. fl. jap. p. 149.

1122. DIOSCOREA. Flores dioici. Cor. o. Cal. 6fi-
dus, campanulatus.
♀. Caps. 3ocularis, supera
compressa. Sem. bracteata.

- penta- 1. D. foliis digitatis. *Rumpf. amb. 5. t. 127. Gaertn. de fr.
phylla. et sem. cent. I. t. 17. f. 4.*
- quinata. 2. D. foliis novemnerviis peltato-cordatis: infimis quinis.
Walt. flor. carol. p. 248.
- quaterna. 3. D. foliis cordatis septemnerviis: infimis quaternis, superio-
ribus ternis binisque, summis alternis. *Walt. flor. carol.
p. 246.*
- triphylla. 4. D. foliis ternatis. *Rumpf. amb. 5. t. 128.*
- septemlo- 5. D. foliis cordatis septemlobis septemnerviis. *Thunb. fl.
ba. jap. p. 149.*
- quinque- 6. D. foliis cordatis quinquelobis novemnerviis. *Thunb. fl.
loba. jap. p. 150.*
- trifida. 7. D. foliis cordatis trifidis. *Suppl. p. 427.*
- japonica. 8. D. foliis cordatis acuminatis novemnerviis. *Thunb. fl. jap.
p. 151.*
- fativa. 9. D. foliis cordatis alternis, caule tereti. *Rheed. h. malab.
8. t. 51.*
- villosa. 10. D. foliis cordatis alternis oppositisque, caule laevi. *Pluckn.
alm. t. 375. f. 5.*

- bulbifera. 11. D. foliis cordatis, caule laevi bulbifero. *Rumpf. amb. 5. t. 124.*
 alata. 12. D. foliis cordatis, caule alato bulbifero. *Rheed. b. malab. 7. t. 38.*
 aculeata. 13. D. foliis cordatis, caule aculeato bulbifero. *Rumpf. amb. 5. t. 126.*
 oppositi- 14. D. foliis oppositis ovatis acuminatis. *Rumpf. amb. 5. t. 120.*
 folia.

1120. SMILAX, Flores dioici. Cor. o. Cal. 6phyllus.
 ♀. Bacca supera, 3locularis. Sem.
 solitaria.

* caule aculeato.

† angulato.

- aspera. 1. Sm. foliis dentato-aculeatis cordatis novemnerviis. *Pluckn. alm. t. 110. f. 3.*
 excelsa. 2. Sm. foliis inermibus cordatis novemnerviis. *S. G. Gmelin it. 2. t. 6.*
 zeilanica. 3. Sm. foliis inermibus: caulinis cordatis; ramis ovato-oblongis. *Rumpf. amb. 5. t. 161. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 16. f. 7.*
 Sarsaparil- 4. Sm. foliis inermibus ovatis retuso-mucronatis trinerviis.
 la. *Regn. bot. t. 284.*
 oblonga- 5. Sm. foliis oblongis acuminatis glabris trinerviis: nervis sub-
 ta. tus aculeatis. *Smarts nov. pl. gen. et sp. p. 59.*
 maurita- 6. Sm. foliis subinermibus cordato-lanceolatis quinquenerviis.
 nica. *Poir. voy. en Barbar. 2. p. 263.*
 variegata. 7. Sm. foliis subcordatis spinoso-ciliatis: costa subtus spinosa.
Walt. flor. carol. p. 244.
 auricula- 8. Sm. foliis quinquenerviis oblongis auriculatis obtusis spina
 ta. terminatis. *Walt. flor. carol. p. 245.*
 glauca. 9. Sm. caule subangulato, foliis oblongo-cordatis laevibus sub-
 nervosis subtus glaucis. *Walt. flor. carol. p. 245.*

†† caule tereti, foliis inermibus.

- China. 10. Sm. caule teretiusculo, foliis ovato-cordatis quinquener-
 viis. *Blackw. herb. t. 433.*

11. Sm.

- rotundi- 11. Sm. foliis cordatis acuminatis septemnerviis.
folia.
- tamnoi- 12. Sm. foliis cordatis oblongis septemnerviis. *Catesb. Car. I.*
des. t. 52.
- raduca. 13. Sm. foliis ovatis trinerviis.
- laurifolia. 14. Sm. foliis ovato-lanceolatis trinerviis. *Catesb. Car. I. t. 15.*
** caule inermi.
+ angulato.
- bona nox. 15. Sm. foliis ciliato-aculeatis. *Pluckn. alm. t. 111. f. 1. 3.*
- tetragona. 16. Sm. caule tetragono, foliis cordatis quinquenerviis acumi-
natis inermibus. *Suppl. p. 427.*
- herbacea. 17. Sm. foliis inermibus ovatis septemnerviis. *Pluckn. alm.*
t. 225. f. 4.
+ caule tereti.
- pumila. 18. Sm. caule subtereti subpiloso fruticoso, foliis petiolatis cor-
datis quinquenerviis subtus hirsutis. *Walt. flor. carol.*
p. 244.
- Pseudo- 19. Sm. foliis inermibus: caulinis cordatis; rameis ovato-ob-
China. longis quinquenerviis. *Pluckn. alm. t. 110. f. 5.*
- lanceolata. 20. Sm. foliis inermibus lanceolatis. *Catesb. Car. 2. t. 84.*
- Ripogo- 21. Sm. caule radicante, foliis ovato-lanceolatis acuminatis
num. quinquenerviis, floribus hermaphroditis. *Forst. Char.*
gen. p. 25. t. 25.
- purpura- 22. Sm. caule dichotomo, foliis cordato-ovatis acuminatis un-
ta. guiculatis integerrimis quinquenerviis, pedunculis axilla-
ribus umbelliferis. *Forst. fl. austr. p. 70.*
- inermis. 23. Sm. caule annuo infirmo, foliis inferioribus verticillatis:
superioribus solitariis cordatis subquinquenerviis. *Walt.*
flor. carol. p. 244.

1220. BORASSUS. Flores dioici. Cor. o.
♂. Cal. 3phyllus.
♀. Cal. 6phyllus. Bacca supe-
ra, 3pyrena.

stabelli- 1. B. frondibus palmatis plicatis eucullatis, stipitibus ferratis.
formis. *Rheed. h. malab. I. t. 9. 10.*

2219. CHAMAEROPS. Cal. 6phyllus. Cor. 3petala.
Baccae 3iloculares,
superae.

humilis. 1. Ch. frondibus palmatis plicatis stipiticibus spinosis. *Pont. anth. t. 8 Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 9. f. 4. β)*
Chamaerops minor. *Gaertner ibid.*

451. RUMEX. Cal. 3phyllus. Petala 3 conniventia,
Sem. 1. triquetrum in corolla
connivente.

* hermaphroditi.

† valvis granulo notatis.

‡ unica.

Patientia. 1. R. valvis integerrimis, foliis ovato-lanceolatis. *Regnauld bot. t. 103.*

sanguineus. 2. R. valvis integerrimis, foliis cordato-lanceolatis. *Blackw. herb. t. 492.*

ægyptius. 3. R. valvis trifido fetaceis. *Till. b. pis. t. 37. f. 1.*

pulcher. 4. R. valvis dentatis: subunica granifera, foliis radicalibus panduriformibus. *Till. b. pis. t. 37. f. 2.*

‡‡ omnibus.

verticillatus. 5. R. valvis integerrimis, foliis lanceolatis: vaginis cylindricis.

Britannica. 6. R. valvis integerrimis, foliis lanceolatis: vaginis obsoletis.

conglomeratus. 7. R. valvis integerrimis oblongis, foliis lanceolatis subundulatis. *Rothe fl. germ. 1. p. 160.*

crispus. 8. R. valvis integris, foliis lanceolatis undulatis acutis. *Mill. illustr. ic. Curt. flor. Lond. t. 104.*

paludosus. 38. R. valvis integris, foliis cordato-lanceolatis obtusiusculis, verticillis distinctis foliolo subjectis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 482.*

Hydro-lapathum. 39. R. valvis integerrimis, foliis lanceolatis glabris acutis integerrimis basi attenuatis. *Ait. hort. Kew. 1. p. 483.*

lachanus. 9. R. valvis integris, foliis caulinis petiolatis late lanceolatis: radicalibus spatulatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 209.*

- dentatus. 10. R. valvis setaceis, foliis lanceolato-hastatis undulatis.
Murr. comm. Goett. 1774. t. 10.
- perficari- 11. R. valvis dentatis, foliis lanceolatis.
oides.
- maritimus. 12. R. valvis dentatis, foliis linearibus. *Curt. flor. Lond. t. 163.*
- divarica- 13. R. valvis dentatis, foliis cordato-oblongis obtusis pubes-
tus. centibus.
- obtusifo- 14. R. valvis dentatis, foliis cordato-oblongis obtusiusculis
lius. crenulatis. *Curt. flor. Lond. t. 168.*
- acutus. 15. R. valvis dentatis, foliis cordato-oblongis acuminatis.
Blackw. herb. t. 491.

— — valvis granulo destitutis s. nudis.

- digynus. 16. R. floribus digynis. *Flor. dau. t. 14.*
- scutatus. 17. R. foliis cordato-hastatis, caule tereti. *Blackw. herb. t. 306.*
- glaucus. 18. R. foliis glaucis hastato-cordatis integerrimis, caulibus tere-
tibus debilibus. *Jacq. collect. 1. p. 63.*
- Lunaria. 19. R. valvis laevibus, caule arboreo, foliis cordatis. *Plucken.
alm. t. 252. f. 3.*
- aquaticus. 20. R. valvis integerrimis, foliis cordatis glabris acutis. *Blackw.
herb. t. 490.*
- arifolius. 21. R. valvis integerrimis, foliis cordato-hastatis ferrulatis acu-
tis, caule laevi suffrutescente. *Jacq. b. Vind. 3. t. 93.*
- tingita- 22. R. valvis integerrimis cordatis obtusis, foliis hastato-ova-
nus. tis. *Morif. hist. pl. 2. t. 28. f. 8.*
- aureus. 23. R. valvis integerrimis linearibus, foliis ellipticis, floribus
subdodecagynis. *Reynier act. Lausann. 2. p. 261. sq.*
- vesicarius. 24. R. floribus geminatis: valvis omnibus maximis membrana-
ceis reflexis, foliis indivisis. *Morif. hist. 2. t. 28. f. 7.*
- roseus. 25. R. floribus distinctis: valvae alterius ala maxima membra-
nacea reticulata, foliis erosis. *Shaw. afr. 5. f. 5.*
- bucepha- 26. R. valvis dentatis, pedicellis planis reflexis incrassatis. *Col.
lophorus. ecphr. 1. t. 150.*

** *diclini.*

- alpinus. 27. R. floribus hermaphroditis sterilibus femineisque: valvis in-
tegrerrimis nudis, foliis cordatis obtusis rugosis. *Blackw.
herb. t. 262.*

- spinofus. 28. R. floribus androgynis: calicibus femineis monophyllis, valvis exterioribus reflexo-uncinatis. *Receptaculum, calix et corolla induratione lignescunt: Nonne distincti generis?*
- glaber. 29. R. floribus monoicis: masculis mediis solitariis pedunculatis; femineis exterioribus majoribus sessilibus. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 76.*
- pictus. 30. R. floribus monoicis: femineis inferioribus; valvis integris granulo notatis, foliis linearibus pinnatifido-dentatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 77.*
- luxurians. 31. R. floribus dioicis, foliis cordato-hastatis, caulibus angulatis diffusis, valvis exterioribus subulatis: interioribus orbiculatis. *Mant. p. 64. Suppl. p. 212. Pluckn. phyt. 331. f. 2.*
- multifidus. 32. R. floribus dioicis, foliis hastatis: auriculis hastatis. *Bocc. mus. 2. t. 126.*
- acetosellus. 33. R. floribus dioicis, foliis lanceolato-hastatis. *Knorr del. hort. 2. t. A. 14.*
- aculeatus. 34. R. floribus dioicis, foliis lanceolatis petiolatis, fructibus reflexis: valvis ciliatis. *Baub. prodr. th. bot. t. 55.*
- tuberosus. 35. R. floribus dioicis, foliis lanceolato-sagittatis, ramis patentibus.
- acetosa. 36. R. floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis. *Knorr. del. hort. 2. t. A. 13.*
- bipinnatus. 37. R. floribus dioicis, foliis bipinnatis. *Suppl. p. 211.*

450. FLAGELLARIA. Cal. 6phyllus, coriaceus.
Cor. o. Drupa baccata, supera 3locularis.

indica. I. FLAGELLARIA. *Rumpf amb. 5. t. 59. f. 2. Gaertn. de fr. et sem. cent. I. t. 16. f. 9.*

452. SCHEUCHZERIA. Cal. 6partitus. Cor. o.
Stili o. Caps. 3inflatae, ispermae.

palustris. I. SCHEUCHZERIA. *Flor. dan. t. 76.*

WURMBEA. Cal. 6partitus. Cor. o. Caps. 3locularis, polysperma.

capensis. 1. WURMBEA. *Thunb. nov. pl. gen. ic.*

453. TRIGLOCHIN. Cal. 3phyllus. Petala 3 caliciformia. Stilus o. Caps. basi dehiscens.

palustre. 1. Tr. capsulis trilocularibus sublinearibus. *Flor. dan. t. 411.*

bulbosum. 2. Tr. radice bulbosa, fibris obtecta. *Mant. p. 226.*

maritimum. 3. Tr. capsulis sexlocularibus ovatis. *Flor. dan. t. 306.*

454. MELANTHIUM. Cor. (in plurimis) 6petala. Filamenta ex elongatis corollae unguibus.

virginicum. 1. M. floribus paniculatis: petalis unguiculatis, floribus hermaphroditis, foliis linearibus integerrimis. *Pluckn. amalth. t. 434. f. 8.*

ciliatum. 2. M. floribus spicatis: petalis unguiculatis, foliis basi cucullatis ensiformibus cartilagineo-ciliatis. *Suppl. p. 213.*

hybridum. 3. M. petalis unguiculatis plicato-undulatis, floribus masculis et femineis mixtis. *Walt. flor. carol. p. 125.*

monocum. 4. M. petalis unguiculatis planis, floribus masculis inferioribus lateralibus paniculatis: racemo terminali femineo. *Walt. flor. carol. p. 125.*

triquetrum. 5. M. floribus spicatis, foliis triquetris glabris caule longioribus. *Suppl. p. 213.*

fibiricum. 6. M. spica longissima ramosa, petalis sessilibus. *Gmel. fl. sib. 1. t. 8.*

spicatum. 7. M. spica nutante, floribus hermaphroditis: petalis sessilibus, foliis caulinis subovatis. *Walt. flor. carol. p. 125.*

myoetinum. 8. M. seapo thyrsifero, floribus hermaphroditis: petalis sessilibus. *Walt. flor. carol. p. 125.*

capense. 9. M. petalis punctatis, foliis cucullatis.

- racemo- 10. M. racemo terminali, pedunculis trifloris, floribus calicu-
sum. latis, petalis sessilibus obovatis. *Walt. flor. car. p. 126.*
Melanthium laetum. Ait. 1. p. 488?
- dioicum. 11. M. floribus dioicis, petalis sessilibus sublinearibus. *Walt.*
flor. carol. p. 126.
- indicum. 12. M. petalis lineari-lanceolatis, foliis linearibus. *Mant. p. 226.*
- viride. 13. M. pedunculis unifloris cernuis. *Suppl. p. 213.*
- monope- 14. M. corolla monopetala, foliis cucullatis lanceolatis. *Suppl.*
tatum. *p. 213.*

455. MEDEOLA. Cal. o. Cor. 6partita, revoluta.
Bacca 3sperma.

- virginica. 1. M. foliis verticillatis, ramis inermibus. *Pluckn. alm. t.*
328. f. 4.
- asparagoi- 2. M. foliis alternis ovatis. *Mant. p. 370. Herm. parad. lugdb.*
des. *t. 631.*
- angustifo- 3. M. foliis alternis ovato-lanceolatis. *Till. h. pis. t. 12. f. 2.*
lia.

456. TRILLIUM. Cal. 3phyllus. Cor. 3petala. Bac-
ca 3locularis.

- cernuum. 1. Tr. flore pedunculato cernuo.
- erectum. 2. Tr. flore pedunculato erecto. *Corn. canad. t. 167.*
- sessile. 3. Tr. flore sessili erecto. *Catesb. car. 1. t. 50.*

457. COLCHICUM. Spatha. Cor. 6partita: tubo
radicato, longissimo. Caps.
zinflatae, coadunatae in 1-
globam, superam.

- autumnale. 1. C. foliis planis lanceolatis erectis. *Knorr del. hort. 1. t. Z. 1.*
- montanum. 2. C. foliis linearibus patentissimis. *Clus. hisp. t. 267.*
- variegatum. 3. C. foliis undulatis patentibus. *Moris. hisp. pl. 2. t. 3. f. 7.*

1144. VERATRUM. Flores nonnulli steriles. Cal. o.
Cor. 6petala. Caps. 3po-
lyspermae.

- album. 1. V. racemo supradecomposito, corollis erectis. *Jacq. fl. austr. 4. t. 335. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 18. f. 4.*
viride. 2. V. racemo subradecomposito, corollis campanulatis: unguibus latere intus incrassatis. *Ait. hort. Kew. 3. p. 422.*
nigrum. 3. V. racemo composito, corollis patentissimis. *Jacq. fl. austr. 4. t. 336.*
Sabadilla. 4. V. racemo spicato simplici, floribus secundis pedunculatis subnutantibus. *Retz. obs. bot. 2. p. 31.*
luteum. 5. V. racemo simplicissimo, foliis sessilibus.

458. HELONIAS. Cal. o. Cor. 6petala. Caps. 3-
locularis.

- bullata. 1. H. foliis lanceolatis nervosis, caule ramoso. *Mill. ic. t. 272.*
asphodeloides. 2. H. foliis caulinis setaceis. *Pluckn. mant. t. 342. f. 3.*
pumila. 3. H. foliis lanceolatis integerrimis, caule simplicissimo. *Jacq. coll. 2. p. 260. pl. rar. ic. cent. 2. t. 34.*

TETRAGYNIA.

459. PETIVERIA. Cal. 4phyllus. Cor. o. Sem.
1. nudum, supra spinis re-
flexis coronatum cortice lig-
noso.

- alliacea. 1. P. floribus hexandris. *Trew. Ebrēt. t. 67.*
oetandra. 2. P. floribus oetandris. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 104.*

MATTUSCHKIA. Cal. 1phyllus, fistulosus ligula-
tus patens. Cor. o. Caps.
3-5 ispermae, acuminatae.

- aquatica. 1. MATTUSCHKIA. *Walt. flor. carol. p. 127.*

HEXAGYNIA.

1022. ARISTOLOCHIA. Cal. 0. Cor. 1 petala, lingu-
 gulata, integra. Stamina germini vicina.
 Caps. 6locularis, in-
 fera.

- trilobata. 1. A. foliis trilobis, caule volubili, floribus maximis. *Jacq. obs. bot. 1. t. 3.*
- bilobata. 2. A. foliis bilobis, caule volubili. *Plum. amer. t. 106.*
- pentan- 3. A. foliis hastato-subtrilobis cordatis, caule volubili, bra-
 dra. ctea cordata amplexante. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 224.*
- peltata. 4. A. foliis reniformibus subpeltatis, caule volubili. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 222.*
- bilabiata. 5. A. foliis ovato-oblongis trinerviis, caule volubili, corollis bilabiatis. *Plum. ic. 32. f. 1.*
- maxima. 6. A. foliis oblongis acuminatis, caule volubili, pedunculis multifloris. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 223.*
- mauro- 7. A. foliis hastatis integerrimis, caule infirmo simplici, flori-
 rum. bus solitariis recurvatis. *Morif. hist. pl. 3. t. 17. f. 11.*
- erecta. 8. A. foliis lanceolatis sessilibus subhirsutis, caule erecto, pe-
 dunculis solitariis unifloris, floribus longissimis.
- arbores- 9. A. foliis cordato-lanceolatis, caule erecto fruticoso. *Pluckn. alm. t. 78. f. 1?*
- Serpenta- 10. A. foliis cordato-oblongis planis, caulibus infirmis flexuo-
 ria. sis teretibus, floribus solitariis. *Catesb. Car. 1. t. 29.*
- sempervi- 11. A. foliis cordato-oblongis acuminatis undatis, caule infir-
 rens. mo, floribus solitariis. *Sabb. b. rom. 2. t. 82.*
- caudata. 12. A. foliis cordatis acuminatis triplinerviis, caule volubili. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 221.*
- anguici- 13. A. foliis cordatis acuminatis, caule volubili fruticoso, pe-
 da. dunculis solitariis, stipulis cordatis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 220.*
- haetica. 14. A. foliis cordatis acutiusculis, caule volubili, pedunculis subternis, petiolo longioribus. *Morif. hist. pl. 3. t. 17. f. 6.*

- indica. 15. A. foliis cordatis acutiusculis, caule volubili, pedunculis multifloris. *Rheed. b. malab. 8. t. 25. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 14. f. 4.*
- hirsuta. 16. A. foliis cordatis obtusiusculis hirtis, floribus solitariis pendulis recurvatis subtruncatis. *Tournef. it. 1. p. 147. ic.*
- barbata. 17. A. foliis cordatis petiolatis integerrimis, caulibus volubilibus, pedunculis axillaribus solitariis unifloris. *Jacq. coll. 3. p. 211.*
- longa. 18. A. foliis cordatis petiolatis integerrimis obtusiusculis, caule infirmo, floribus solitariis. *Blackw. herb. t. 257.*
- rotunda. 19. A. foliis cordatis subsessilibus obtusis, caule infirmo, floribus solitariis. *Blackw. herb. t. 256.*
- bractea- 20. A. foliis cordatis obtusis, caule infirmo, floribus solitariis, bracteis cordatis petiolatis. *Koenig apud Retz. obs. bot. 5. p. 29.*
- ta.
- obtusata. 21. A. foliis cordatis apice rotundatis trinerviis subtus reticulato-venosis tomentosis, caule volubili, pedunculis solitariis. *Plum. ic. t. 33.*
- Pistolo- 22. A. foliis cordatis crenulatis subtus reticulatis petiolatis, floribus solitariis.
- chia.
- Clemati- 23. A. foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis. *Knorr del. hort. 2. t. A. 15.*
- tis.
- odoratif- 24. A. foliis cordatis, caule volubili fruticoso, pedunculis solitariis, labio corollae majore. *Sloan. hist. jam. 1. t. 104. f. 1.*
- fima.
- Sipho. 25. A. foliis cordatis, caule volubili fruticoso, corollis siphoniformibus trifidis. *Herit. stirp. nov. 1. p. 13. t. 7. et 7. β.*
- grandiflo- 26. A. foliis lato-cordatis, caule volubili subherbaceo, pedunculis solitariis, labio corollae maximo, cauda longissima. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 126.*
- ra.

POLYGYNIA.

460. ALISMA. Cal. 3phyllus. Petala 3. Sem. plura.

Plantago. 1. A. foliis ovatis acutis, fructibus obtuse trigonis. *Flor. dan. t. 561.*flavum. 2. A. foliis ovatis acutis, pedunculis umbellatis, fructibus globosis. *Plum. ic.*

3. A.

- natans. 3. A. foliis radicalibus linearibus membranaceis, natantibus longissime petiolatis ovatis obtusis, pedunculis solitariis. *Vaill. act. par. 1719. t. 4. f. 8.*
- cordifolium. 4. A. foliis cordatis obtusis, floribus dodecandris, fructibus uncinato-mucronatis. *Plum. ic. 234. f. 2.*
- parnassifolium. 5. A. foliis cordatis acutis: petiolis articulatis. *Syst. nat. XII. 4. p. 230. Mant. p. 371. Till. b. pis. t. 46. f. 1.*
- Damafo-nium. 6. A. foliis cordato-oblongis, floribus hexagynis, capsulis subulatis. *Lob. ic. 301. 2.*
- ranunculo- loides. 7. A. foliis lineari-lanceolatis petiolatis, fructibus globoso-squarrosis. *Flor. dan. t. 122.*
- subulatum. 8. A. foliis subulatis.
- repens. 9. A. caulibus adscendentibus ad nodos inferiores radican- tibus et foliosis, foliis lanceolatis petiolatis, verticillis simplicibus. *la Mark dict. bot. n. 5. an distinctum a parnassifolio?*