

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

* Flores completi.

478. MIMUSOPS. *Cor.* 8petala. *Cal.* 8phyllus, inferus. *Drupa.*
 HAGENIA. *Cor.* 5petala. *Cal.* 5phyllus: foliolis lineari-
 ribus apice rotundatis. *Stigm.* sub-
 rotundum. 12
- HYPELATE. *Flores* polygami. *Cor.* 5petala. *Cal.* 5-
 phyllus. *Stigma* deflexum, trigonum.
Drupa 1sperma.
- EUPRORIA. *Cor.* 5petala: petalis reflexis, medio intus
 subvillosis. *Cal.* 1phyllus subquin-
 quefidus. *Germen* 2dymum. *Stig-*
mat. 2. *Fructus* geminatus globosus
 1locularis 1pyrenus. 4
- MOLINAEA. *Cor.* 5petala: unguibus subvillosis. *Cal.*
 5partitus. *Filam.* basi villosa. *Capsf.*
 3quetra, 3locularis, 3valvis, 3sperma.
- TRIGONIS. *Cor.* 5petala: petalis 3angularibus apice vil-
 losis. *Cal.* 5phyllus. *Stil.* 0. 47
279. CUPANIA. *Cor.* 5petala: petalis apice cucullatis. *Cal.*
 5phyllus. *Stil.* 3fidus. *Capsf.* 3locu-
 laris. *Sem.* solitaria. 130
- EPHIELIS. *Cor.* 5petala: petalis unguiculatis. *Cal.*
 5partitus. *Capsf.* oblonga, 2valvis,
 1locularis, 2sperma.
- TALISIA. *Cor.* 5petala, squamis 5aueta. *Cal.* 5parti-
 tus. *Stil.* brevissimus. *Peric.* 4loculare.
466. TROPAEOLUM. *Cor.* 5petala. *Cal.* 5fidus, inferus, calca-
 ratus. *Baccae* 3. 1spermae. 47
- SCYTALIA. *Cor.* 5petala. *Cal.* brevissimus, subeden-
 tulus. *Filam.* basi villosa. *Anthe-*
rae 2lobae. *Bacca* 1locularis. 46
491. BAECKEA. *Cor.* 5petala. *Cal.* 5fidus, superus. *Capsf.*
 4locularis. 46
1155. ACER. *Flores* multi mere masculi. *Cor.* 5petala.
Cal. 5fidus. *Capsf.* 2-3 1spermae, ala
 terminatae. 48

- HEINZIA. *Cor.* 5petala papilionacea. *Cal.* 3fidus :
infima minima. *Legumen* carnosum
2partibile: *Sem.* 1. testa fragili tectum.
471. EPILOBIUM. *Cor.* 4petala. *Cal.* 4partitus, superus.
Caps. 4locularis. *Sem.* papposa.
- SODADA. *Cor.* 4petala. *Cal.* 4phyllus, inaequalis,
superus. *Stamina* inclinata. *Caps.*
pedunculata.
- BINECTARIA. *Cor.* 4petala. *Cal.* 4phyllus, inferus. *Ne-*
ctarium duplex.
1257. ANTICHORUS. *Cor.* 4petala. *Cal.* 4phyllus inferus. *Caps.*
4locularis, 4valvis, polysperma.
- HONKENYA. *Cor.* 4petala. *Cal.* 4phyllus, interius co-
loratus. *Nectar.* fila staminiiform.
Caps. 5locularis, 5valvis, echinata.
Semina arillata dissepimento affixa.
476. ALOPHYLLUS. *Cor.* 4petala. *Cal.* 4phyllus, inferus. *Sti-*
lus 2fidus.
- SASSIA. *Cor.* 4petala. *Cal.* 4phyllus. *Caps.* 2lo-
cularis, 2sperma.
- HEYMASSOLI. *Cor.* 4petala. *Cal.* 4partitus. *Drupa* ova-
ta, 1locularis, 1sperma.
- MELICOPE. *Cor.* 4petala. *Cal.* 4partitus, campanula-
tus, inferus. *Nectarium* 8fidum.
Germen apice 4lobum.
472. MELICOCCA. *Cor.* 4petala, refracta. *Cal.* 4partitus. *Stig-*
ma peltatum, anceps. *Drupa* corti-
cosa.
1304. OPHIRA. *Cor.* 4petala, supera. *Involucr.* 2valve,
3florum. *Bacca* 1locularis.
- GRUBBIA. *Cor.* 4petala infera. *Involucr.* 2phyllum,
2-3florum.
- SCHOLLERA. *Cor.* 4petala, regularis. *Cal.* 4fidus, su-
perus. *Bacca* polysperma.
470. GAURA. *Cor.* 4petala. *Cal.* 4fidus, superus. *Dru-*
pa 4gona: *Nux* 1sperma.
469. OENOTHERA. *Cor.* 4petala. *Cal.* 4fidus, superus. *An-*
therae lineares. *Caps.* 4locularis.
468. RHEXIA. *Cor.* 4petala. *Cal.* 4fidus, medius. *An-*
therae arcuatae. *Caps.* 4locularis.
467. OSBECKIA. *Cor.* 4petala. *Cal.* 4fidus, medius. *An-*
therae rostratae. *Caps.* 4locularis.
482. LAWSONIA. *Cor.* 4petala. *Cal.* 4fidus, inferus. *Bac-*
ca 4locularis.

- HAGENIA. *Cor.* 4petala. *Cal.* 4dentatus. *Capsf.* 2valvis, 2locularis, 2sperma.
487. GNIDIA. *Cor.* 4petala. *Cal.* 4fidus. *Stamina* exserta. *Sem.* 1.
475. COMBRETUM. *Cor.* 4-5petala. *Cal.* 4-5dentatus, superus. *Sem.* 1 4gonum.
- BARBYLUS. *Cor.* 4-5petala. *Cal.* 4-5fidus campanulatus, inferus. *Capsf.* 3locularis: loculi 2spermi.
- CLAUSENA. *Cor.* 4petala. *Cal.* 4dentatus, inferus. *Filamenta* basi dilatata.
- QUIVISIA. *Cor.* 4-5petala. *Cal.* urceolatus, 4-5dentatus. *Stam.* 8-10. *Stigm.* capitatum. *Capsf.* coriacea, 4-5locularis: oculis 2spermis.
- PORTESIA. *Cor.* 4petala. *Cal.* 4dentatus. *Stigm.* capitatum. *Capsf.* coriacea, villosa, 2locularis, 2valvis, 2sperma.
474. GRISLEA. *Cor.* 4petala. *Cal.* 4dentatus, inferus. *Capsf.* 1locularis.
1305. GUAREA. *Cor.* 4petala: *nectario* cylindrico. *Cal.* 4dentatus inferus. *Capsf.* 4locularis, 4valvis. *Sem.* solitaria.
479. JAMBOLIFERA. *Cor.* 4petala. *Cal.* 4dentatus, inferus. *Filamenta* planiuscula.
- ICICA. *Cor.* 4petala. *Cal.* 4dentatus. *Stigma* capitatum, 4fulcatum. *Capsf.* 2-4valvis: ossiculis 2-4.
473. AMYRIS. *Cor.* 4petala. *Cal.* 4dentatus, inferus. *Bacca* 1sperma.
- XYLOCARPUS. *Cor.* 4petala: *nectario* ovato-inflato. *Cal.* clavatus, 4dentatus. *Drupa* globosa, cortice intus lignoso fibroso: *Nucce* 8 vel plures angulatae; *nucleo* fragili.
481. MEMECYLON. *Cor.* 4petala. *Cal.* integerrimus, superus.
- IMBRICARIA. *Cor.* 8partita, rotata, appendiculata. *Cal.* coriaceus. *Ponium* 8loculare, 8spermum.
- MICHAUXIA. *Cor.* 8partita rotata. *Cal.* 16partitus. *Nectar.* 8valve staminiferum. *Capsf.* 8locularis, polysperma.
1258. CHLORA. *Cor.* 8fida. *Cal.* 8phyllus, inferus. *Capsf.* 1locularis, 2valvis, polysperma.

- MINDIUM. *Cor.* 8fida. *Cal.* 8fidus. *Stigma* gradiatum. *Caps.* 8locularis, polysperma.
483. VACCINIUM. *Cor.* 8fida. *Cal.* 4dentatus, superus. *Antherae* medio aristatae. *Bacca.*
1161. DIOSPYROS. *Flores* mere masculi in diversis plantis. *Cor.* 4fida, urceolata. *Cal.* 4fidus. *Stilus* 4fidus. *Bacca* 8sperma.
- HEDWIGIA. *Cor.* 4fida. *Cal.* 4dentatus. *Stil.* o. *Caps.* 3cocca. *Sem.* Nux.
484. ERICA. *Cor.* 4fida. *Cal.* 4phyllus, inferus. *Antherae* 2fidae. *Caps.* polysperma.
1425. SCOPOLIA. *Cor.* 4fida. *Cal.* 2phyllus multiflorus. *Antherae* connexae in duplicem columnam, quarum altera supra alteram posita.
1123. POPULUS. *Flores* dioici, amentacei. *Cal.* lamina amenti lacera. *Cor.* turbinata, obliqua, integra. ♀. *Stigm.* 4fidum. *Caps.* 2locularis. *Sem.* multa, papposa.

* *Aesculus Pavia.* *Dais octandra.* *Ammanniae octandra et sanguinolenta.* *Prinos verticillatus.* *Monotropa Hypopithys.* *Fagara octandra.* *Ruta graveolens.* *Melastomata octandra.* *Mimosae.* *Jussieua erecta, inclinata, edulis, suffruticosa.* *Elais serrata.* *Portulacae.* *Schinus.* *Pometia.* *Trichilia pallida.* *Andromeda octandra.* *Capparis ferruginea, Breynia Quivisia.*

** *Flores incompleti.*

128. FUCHSIA. *Cor.* 8fida, supera. *Bacca* 4locularis, polysperma.
1303. DODONAEA. *Cal.* 4phyllus. *Caps.* 3locularis. *Sem.* bina.
- CEDROTA. *Cal.* 6partitus. *Germen* glandula cinctum.
- ATHENAEA. *Cal.* 5partitus, coloratus. *Caps.* globosa, 3valvis, 1locularis, 3-5sperma.
- VALENTINIA. *Cal.* 5partitus, coloratus, patens. *Caps.* baccata, 1locularis, 4sperma.
488. STELLERA. *Cal.* 4fidus, corollinus, aequalis. *Stamina* inclusa. *Sem.* 1.
489. PASSERINA. *Cal.* 4fidus, corollinus, aequalis. *Stamina* supra corollam.

485. DAPHNE. *Cal.* 4fidus, corollinus, aequalis. *Stamina* inclusa. *Bacca* pulposa.
490. LACHNAEA. *Cal.* 4fidus, corollinus, inaequalis. *Stamina* exserta.
- BUGINVILLIA. *Cal.* tubulosus medio coarctatus, limbo subinteger, inferus. *Stamina* inclusa.
486. DIRCA. *Cal.* elimbis, corollinus inaequalis. *Stamina* exserta.

* *Rivina octandra. Pistia. Laurus Sassafras. Samydae octandrae.*

DIGYNIA.

- TONDIN. *Cor.* 8-9petala. *Cal.* 4fidus. *Nectar.* 4. *Stamin.* 4 breviora. *Caps.* 3valvis, 3-ocularis.
- LITCHI. *Cor.* 5petala. *Cal.* 5dentatus. *Filamenta* 6-8. *Germ.* 2lobum. *Drupa.*
493. WEINMANNIA. *Cor.* 4petala. *Cal.* 4phyllus. *Caps.* 2locularis, 2rottris.
494. MOEHRINGIA. *Cor.* 4petala. *Cal.* 4phyllus. *Caps.* 1locularis.
1388. CODIA. *Cor.* 4petala. *Cal.* 4phyllus. *Receptaculum commune* involucreatum.
1259. SCHMIEDELIA. *Cor.* 4petala. *Cal.* 2phyllus. *Baccae* 2subglobosae 1spermae.
492. GALENIA. *Cor.* 0. *Cal.* 4fidus. *Caps.* 2locularis, 2sperma.
1074. CORYLUS. *Flores* monoici. *Cor.* 0.
♂. *Cal.* 1phyllus, 3fidus, squamiformis, 1florus.
♀. *Cal.* 2phyllus, lacerus. *Nux* ovata.
- LUZIOLA. *Flores* monoici. *Cor.* 0. *Cal.* 2valvis muticus.
♂. *Stam.* 8-10. *anther.* pedunculatae.
♀. *Stil.* 2. *Semen* ovat, nudum.

* *Quercus. Chrysoptenium. Polygonum pensylvanicum. Crataegus lucida, rotundifolia.*

TRIGYNIA.

497. PAULINIA. *Cor.* 4petala. *Cal.* 5phyllus. *Capsf.* 3locularis: loculis 1spermis.
498. CARDIOSPERMUM. *Cor.* 4petala. *Cal.* 4phyllus. *Capsf.* 3locularis: loculis 1spermis.
499. SAPINDUS. *Cor.* 4petala. *Cal.* 4phyllus. *Bacca* 3cocca, 1sperma.
- ORNITROPHE. *Cor.* 4petala: petalis medio barbatis. *Cal.* 4partitus. *Germen* 2dymum. *Stigma* 2fidum. *Drupa* vix pulposa: *Nux* 1sperma.
- PONAEA. *Cor.* 4petala. *Cal.* 5partitus. *Capsf.* 3alata, 3locularis: loculis 1spermis.
496. COCCOLOBA. *Cor.* 0. *Cal.* 5partitus. *Bacca* calicina, 1sperma.
495. POLYGONUM. *Cor.* 0. *Cal.* 5partitus. *Sem.* 1. nudum. *Flores* monoici. *Cor.* 0. *Cal.* 4fidus. *Capsf.* 3angularis, 3sperma.
- COLLIGUAJA.

* *Quercus.*

TETRAGYNIA.

502. ELATINE. *Cor.* 4petala. *Cal.* 4phyllus. *Capsf.* 4locularis.
500. PARIS. *Cor.* 4petala, subulata. *Cal.* 4phyllus. *Bacca* 4locularis.
1389. HALORAGIS. *Cor.* 4petala. *Cal.* 4fidus. *Drupa* sicca. *Nux* 4locularis.
501. ADOXA. *Cor.* supera, 4-5fida. *Cal.* 2phyllus. *Bacca* 4-5sperma.
1066. MYRIOPHYLLUM. *Flores* saepe monoici. *Cal.* 4phyllus. *Cor.* 0. ♀. *Stil.* 0. *Sem.* 4. nuda.
1070. QUERCUS. *Flores* monoici. *Cor.* 0. ♂. *Cal.* ut plurimum 5fidus. *Stam.* 5-10. ♀. *Cal.* 1phyllus, integerrimus, leaber. *Stil.* 2-5. *Sem.* 1. ovatum.
1124. RHODIOLA. [*Flores* dioici. *Cal.* 4partitus. ♂. *Cor.* 4petala. ♀. *Cor.* 0. *Nectaria* 4. *Capsf.* 4poly-spermae.

1433. MARGARITARIA. Flores dioici. Cor. 4petala. Cal. 4dentatus.
♀. Stil. 4-5. Bacca cartilaginea, 4-5-cocca.

* *Sedum quadrifidum, et alia. Forskåblea. Portulaca oleracea, Cotyledon deficiens, nudicaulis, lanceolata, laciniata.*

PENTAGYNIA.

XANTHORHIZA. Cal. 0. Petal. 5. Nectar. 5phyllum. Filament. 5-10. receptaculo inserta. Caps. plures ispermae.

* *Quercus Margaritaria.*

MONOGYNIA.

466. TROPAEOLUM. Cal. 1phyllus, calcaratus.
Petala 5 inaequalia.
Baccae 3 fungosae, ru-
 gosae, ispermae.

- majus. 1. Tr. foliis peltatis subquinelobis, petalis obtusis. *Knorr del. hort. 1. t. R. 18. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 79. f. 1.*
 minus. 2. Tr. foliis peltatis repandis, petalis acuminato-setaceis. *Feuill. peru. 3. t. 8.*
 hybridum. 3. Tr. foliis subpeltatis quinelobis integerrimis, petalis variantibus. *Mant. p. 64. Berg. act. Stockb. 1765. t. 1.*
 peregrinum. 4. Tr. foliis subpeltatis quinelobis dentatis, petalis ciliatolaceris. *Mant. p. 371. Feuill. peru. 2. t. 42.*

467. OSBECKIA. Cal. 4fidus: laciniis squama ciliari interstinctis. Cor. 4petala. *Antherae* rostratae. *Caps.* 4locularis, calicis tubo truncato cincto.

- sinensis. 1. O. foliis sessilibus, pedunculis axillaribus trifloris bracteatis. *Suppl. p. 215. Pluckn. alm. t. 173. f. 4.*
 zeylanica. 2. O. foliis petiolatis, pedunculis axillaribus unifloris. *Suppl. p. 215.*

468. RHEXIA. Cal. 4fidus. *Petala* 4 calici inserta. *Antherae* declinatae. *Caps.* 4locularis intra ventrem calicis.

- virginica. 1. Rh. foliis sessilibus ferratis, calicibus glabris. *Pluckn. alm. t. 202. f. 8.*
 mariana. 2. Rh. caule ramosissimo hirsuto, floribus glomeratis pedunculatis: calicibus hirsutissimis. *Fr. Rottb. act. litt. un. Havn. 1. t. 4.*
 Acifanthera. 3. Rh. floribus alternis axillaribus pedunculatis quinquefidis. *Brown. jam. t. 22. f. 1.*

4. Rh.

- jussieuoides. 4. Rh. foliis alternis costatis margine scabris. *Suppl. p. 215.*
- glutinosa. 5. Rh. foliis oppositis trinerviis laevibus, floribus thyrsoides. *Suppl. p. 216. Mutis amer. I. t. 6.*
- trichotoma. 6. Rh. caule inferius trichotomo; apicibus dichotomis filiformibus, floribus solitariis subsessilibus. *Fr. Rottb. act. litt. un. Havn. I. p. 277. t. 5.*
- bicornis. 7. Rh. antheris quatuor sessilibus basi globosis, quatuor pedunculatis basi bicornibus. *Fr. Rottb. act. litt. un. Havn. I. p. 278.*
- leucantha. 8. Rh. foliis oppositis cartilagineo-denticulatis coriaceis nitidis, ramulis tetragonis, floribus terminalibus decandris. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 61.*
- purpurea. 9. Rh. foliis oppositis denticulatis coriaceis, ramulis teretibus, floribus axillaribus decandris. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 61.*
- villosa. 10. Rh. foliis oppositis subsessilibus subrotundis denticulatis, caulibus decumbentibus ramulisque tetragonis, floribus terminalibus. *Aubl. pl. guj. I. p. 334. t. 129. f. I.*
- latifolia. 11. Rh. foliis oppositis ovatis acutis. *Aubl. pl. guj. I. p. 336. t. 129. f. 2.*
- lanceolata. 12. Rh. foliis lineari-lanceolatis ciliatis, caule piloso, antheris rostratis, capsula urceolata. *Walt. flor. carol. p. 129.*
- lutea. 13. Rh. hispida, foliis lanceolatis subundulatis trinerviis, antheris nudis. *Walt. flor. carol. p. 130.*
- Alifanus. 14. Rh. foliis subovatis cauleque erecto sublaevibus, calicibus corollisque glanduloso-pilosis. *Walt. flor. carol. p. 130.*
- septemnervia. 15. Rh. foliis acuminato-ovatis pilosis, septemnerviis margine subaculeatis, caule tetragono, antheris rostratis. *Walt. flor. carol. p. 130.*
- petiolata. 16. Rh. foliis subovatis trinerviis ciliatis petiolatis, capsulis globosis, antheris nudis. *Walt. flor. carol. p. 130.*

469. OENOTHERA. *Cal. 4fidus. Petala 4. Caps. columnaris, infera, 4locularis. Sem. nuda, angulata, fungosa.*

- biennis. 1. Oe. foliis ovato-lanceolatis planis, caule muricato-villoso. *Flor. dan. t. 446.* 2. Oe.

15. parviflo- 2. Oe. foliis ovato-lanceolatis planis, caule pilis sparsis rubris-
ra. que tuberculis obfesso. *Mill. ic. 189. f. 1.*
- ideis. muricata. 3. Oe. foliis lanceolatis planis, caule purpurascente muricato,
Murr. comm. Goett. 1775. p. 24. t. 1.
- lifor- longiflo- 4. Oe. foliis denticulatis, caulibus simplicibus pilosis, petalis
litt. ra. distantibus bilobis. *Mant. p. 227. Jacq. b. Vind. 2. t. 172.*
- edun- octoval- 5. Oe. foliis lanceolato-oblongis acuminatis planis glabris,
m. I. vis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 105.*
- nitid- molliſſima. 6. Oe. foliis lanceolatis undulatis. *Dill. b. Elth. t. 219. f. 286.*
ndris.
- hibus, nocturna. 7. Oe. foliis subvillosis lanceolatis dentato-ferratis. *Jacq.*
en. et coll. 3. p. 205.
- latis, hirta. 8. Oe. hirta, foliis supra glabris. *Plum. ic. 174. f. 2.*
ribus
336. finuata. 9. Oe. foliis dentato-finuatis, caulis apice nutante. *Mant.*
anthe- p. 228. *Murr. comm. Goett. 1774. t. 9.*
129. , an-
- fruticosa. 10. Oe. foliis lanceolatis subdentatis, capsulis pedicellatis acut-
icibus angulis, racemo pedunculato.
130. rgine
Walt.
- pumila. 11. Oe. foliis lanceolatis obtusis glabris subpetiolatis, caulibus
psulis prostratis, capsulis acutangulis.

470. GAURA. Cal. 4fidus, tubulosus. Cor. 4peta-
la, adscendens versus latus su-
perius. Drupa corticosa infera
2locularis. Nux isperma, 4-
angula.

biennis. 1. GAURA. *Giseck. ic. fasc. 1. n. 8. Jacq. pl. rar. ic. cent. 2.*
t. 35.

471. EPILOBIUM. Cal. 4phyllus deciduus. Petala 4.
Caps. infera, longissima,
4locularis. Sem. plurima,
apice crinita.

* staminibus declinatis.

angustiflo- 1. E. foliis sparsis lineari-lanceolatis, floribus inaequalibus.
lum. *Flor. dan. t. 289.*

2. E.

- Dodonaei. 2. E. foliis erectis sparsis linearibus angustissimis apice callosomucronatis, floribus inaequalibus. *Allion. flor. pedem. I. n. 1016.*
- latifolium. 3. E. foliis alternis lanceolato-ovatis, floribus inaequalibus. *Flor. dan. t. 565.*
- ** staminibus erectis, corollis regularibus, petalis bifidis.
- hirsutum. 4. E. foliis ovato-lanceolatis hirsutis semiamplexicaulibus, caule ramofissimo villoso. *Flor. dan. t. 327.*
- parviflorum. 5. E. foliis lanceolatis subpetiolatis pubescentibus, caule villoso simplicissimo. *Schreb. spic. fl. Lips. p. 146. Flor. dan. t. 347.*
- montanum. 6. E. foliis oppositis ovatis dentatis. *Curt. flor. Lond. t. 195. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 31. f. 6. β?) Epilobium trigonum.*
- roseum. 7. E. foliis oppositis alternisque ovato-lanceolatis petiolatis ferratis glabris. *Schreb. spic. fl. Lips. p. 147. Schmiedel. op. Gesn. II. 2. t. 20. f. 73. an mera montani varietas?*
- obscurum. 8. E. caule ramofissimo, foliis oppositis alternisque lanceolatis ferratis glabris basi decurrentibus. *Schreb. spic. fl. Lips. p. 147.*
- tetragonum. 9. E. foliis lanceolatis denticulatis: imis oppositis, caule tetragono. *Curt. flor. Lond. t. 131.*
- palustre. 10. E. foliis oppositis lanceolatis integerrimis, petalis emarginatis, caule erecto. *Tabernaem. Kraeuterb. p. 856.*
- alpinum. 11. E. foliis oppositis sessilibus glabris ovato-lanceolatis subintegerrimis, capsulis sessilibus, caule subtrifloro basi procumbente. *Flor. dan. t. 322.*
- glabelum. 12. E. foliis oblongis dentatis obtusis: imis oppositis, caule teretiufculo erecto. *Forst. flor. austr. p. 27.*
- rotundifolium. 13. E. foliis oppositis subrotundis denticulatis. *Forst. flor. austr. p. 27.*

HONKENYA. *Cal.* 4phyllus, interius coloratus.
Petal. 4. *Nectaria* fila stamini-
formia. *Capsf.* echinata, 5locu-
laris, 5valvis. *Sem.* arillata dif-
sepimento affixa.

Willdeno. I. HONKENYA. *Willden. ap. Cothenius meth. pl. disp. p. 19.*
vii.

HEINZIA. *Cal.* 3fidus: lacinia infima minima. *Cor.*
papilionacea 5petala. *Legum.* carno-
sum 2partibile. *Sem.* 1 testa fragili
rectum.

peregrina. I. HEINZIA. *Scopol. introd. g. 1370.*

1257. ANTICHORUS. *Cal.* 4phyllus. *Petala* 4.
Capsf. supera, subulata,
4locularis, 4valvis. *Sem.*
plurima.

depressus. I. ANTICHORUS. *Mant. p. 64.*

475. COMBRETUM. *Cal.* 4-5dentatus, campanu-
latus, superus. *Cor.* 4-5-
petala, calici inserta. *Stam.*
8-10longissima. *Sem.* 1.
4-salatum.

laxum. 1. C. spicis laxis. *Aublet pl. guj. I. t. 137. Gaertn. de fr. et*
sem. cent. 3. t. 36. f. 1.

secundum. 2. C. spicis secundis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 260. f. 26.*

decan- 3. C. floribus decandris. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 260. f. 27.*
drum.

PORTESIA. *Cal.* 4dentatus persistens, inferus. *Cor.*
4petala. *Capsf.* 2valvis, 2locula-
ris, 2sperma.

ovata. 1. P. foliis pinnatis: pinnis obovatis. *Cavanill. diff. bot. 7.*
p. 369. t. 215.

mucrona- 2. P. foliis ternatis quinatisve: foliolis ovatis mucronatis. *Clauca*.
vanill. diff. bot. 7. p. 370. t. 216.

CLAUCENA. *Cal.* 4dentatus, inferus. *Cor.* 4petala. *Filam.* basi dilatata. *Anther.* versatiles.

javenfis. I. CLAUCENA. *Jussieu gen. plant. p. 430.*

BARBYLUS. *Cal.* 4-5fidus campanulatus, inferus. *Cor.* 4-5petala. *Stamina* 8-10. *Capsf.* 3locularis: loculis 2spermis.

Brownii. I. BARBYLUS. *Jussieu gen. plant. p. 430.*

TRIGONIS. *Cal.* 5phyllus. *Cor.* 5petala: petalis 3angularibus intus hirsutis apice villosis, staminibus duplo brevioribus. *Germ.* hirsutum. *Stilus* 0. *Pericarp.*

tomentosa. I. TRIGONIS. *Jacq. stirp. amer. p. 102.*

279. **CUPANIA.** *Cal.* 5phyllus. *Cor.* 5petala. *Petalis* apice cucullatis. *Stilus* 3fidus. *Capsf.* 3locularis. *Sem.* folitaria.

americana. I. C. foliis simplicibus. *Plum. ic. 110.*

tomento- 2. C. foliis pinnatis obovatis retusis inferne ferrugineo-tomentosa.
Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 61.

glabra. 3. C. foliis pinnatis ovatis obtusis crenatis glabris. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 61.*

saponari- 4. C. foliis pinnatis oblongis integris subtus scabris. *Swartz oides.*
nov. pl. gen. et sp. p. 62.

EUPHORIA. *Cal.* subquinquefidus. *Petala* 4 reflexa, medio intus subvillosa. *Germ.* 2-dymum. *Stigm.* 2. *Fructus* gemin. tuberculatus, globosus, ilocularis, ipyrenus.

sinensis. I. EUPHORIA. *Jussieu gen. pl. p. 248.*

MOLINAEA. *Cal.* 5partitus. *Pet.* 5: ungue subvillosa. *Filam.* basi villosa. *Stil.* o. *Capsf.* 3quetra, 3valvis, 3locularis, 3sperma.

arborea. I. MOLINAEA. *Jussieu gen. plant. p. 248.*

XYLOCARPUS. *Cor.* 4petala. *Nectar.* ovato-inflatum. *Cal.* clavatus, 4dentatus, corolla duplo brevior. *Stigma* medio perforatum. *Drupa* globosa, exsucca, cortice intus lignoso fibroso. *Nuc.* 8 pluresve inaequales; nucleo fragili.

Granatum. I. XYLOCARPUS. *Koenig Naturf. 20. p. 2. Rumpf. amb. 3. t. 61.*

EPHIELIS. *Petala* 5 unguiculata, patula. *Cal.* 5partitus, patens. *Nectarium* squamae 10. *Stil.* o. *Capsf.* oblonga, 2valvis, ilocularis, 2sperma.

gujanensis. I. EPHIELIS. *Aubl. pl. guj. 1. p. 331. t. 128.*

476. **ALOPHYLLUS.** *Cal.* 4phyllus: foliolis orbiculatis; oppositis minoribus. *Petala* 4 calice minora. *Germen* didymum. *Stigma* 4fidum.

zeylanicus. I. A. foliis simplicibus inermibus.

rigidus. 2. A. foliis simplicibus denticulato-spinosis, floribus racemosis. Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 62.

racemosus. 3. A. foliis ternatis, floribus racemosis. Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 62.

474. GRISLEA. Cal. 4fidus. Petala 4 ex incisuris calicis. Filamenta longissima adscendentia. Caps. globosa, supera,ilocularis, polysperma.

secunda. I. GRISLEA.

478. MIMUSOPS. Cal. octopartitus. Cor. polypetalum. Stam. pilosa. Baccailocularis. Sem. durum, nitidum.

Elengi. I. M. foliis alternis remotis. Rumpf. amb. 3. t. 63. Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 42. f. 4.

Kanki. 2. M. foliis confertis. Rumpf. amb. 3. t. 8.

IMBRICARIA. Cal. 8partitus, coriaceus. Cor. 8partita, rotata: laciniis appendice filiformi auctis. Pomum gloclulare, 8spermum.

borbonica. I. IMBRICARIA. Jussieu gen. plant. p. 152.

SCYTALIA. Cal. brevissimus, 1phyllus, obsolete 5dentatus. Cor. 5petala. Filamenta basi villosa. Antherae 2lobae. Bacca exsucca, ilocularis. Sem. I. arillo baccato.

sinensis. I. SCYTALIA. Sennar. it. ind. 2. p. 230. t. 129.

479. JAMBOLIFERA. *Cal.* 4dentatus. *Cor.* 4petala, infundibuliformis. *Filamenta* planiuscula. *Stigma* simplex. *Germ.* immaturum 2loculare. *Bacca* matura 1locularis, isperma.

peduncu- I. JAMBOLIFERA. *Rumpf. amb. 1. 1. 24. Gaertn. de fr. et sem.*
lata. cent. 3. t. 36. f. 4.

472. MELICOCCA. *Cal.* 4partitus. *Petala* 4 reflexa intra calicem. *Stigma* subpeltatum. *Bacca* coriacea, supera, 1ocularis. *Sem.* baccatum.

bijuga. I. MELICOCCA. *Jacq. stirp. amer. 1. 72. Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 42. f. 2.*

ORNITROPHE. *Cal.* 4partitus. *Petala* 4 medio barbata. *Germen* 2dymum. *Stigm.* 2fidum. *Drupa* turbinata. *Nux* isperma.

borbonica. I. ORNITROPHE. *Jussieu gen. plant. p. 247.*

HYPELATE. *Flores* polygami. *Cal.* 5phyllus. *Cor.* 5petala. *Stigma* deflexum, 3gonum. *Drupa* isperma.

trifoliata. I. HYPELATE. *Brown. jam. p. 207. n. 1.*

HAGENIA. *Cal.* 5phyllus: foliolis linearibus apice rotundatis. *Cor.* 5petala. *Stigm.* subrotundum.

abyssinica. I. HAGENIA. *Bruce trav. in Eg. Ar. Ab. and Nub. 5. app. p. 74. ic.*

1305. GUAREA. Cal. 4dentatus. Petala 4. Nectarium cylindricum, ore antheras gerens. Caps. 4locularis, 4valvis. Sem. solitaria.

t ichilioi- I. GUAREA. *Mant. p. 22. Syst. nat. XII. 3. p. 294.* Trichilia
des. Guara. *Jacq. stirp. amer. t. 176. f. 37.*

HEDWIGIA. Cal. 4dentatus. Cor. 4fida. Stilus o. Caps. 3cocca. Sem. nux.

balsami- I. HEDWIGIA. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 62. Nicolf. doming.*
fera. p. 169. Bois cochon.

473. AMYRIS. Cal. 4-5dentatus. Petala 4-5 oblonga. Stigma tetragonum. Bacca drupacea.

gileaden- I. A. foliis ternatis integerrimis, pedunculis unifloris laterali-
fis. bus. *Mant. p. 65.*

Kataf. 2. A. foliis ternatis apice ferratis, pedunculis dichotomis.
Forsk. fl. aeg. arab. p. 80.

maritima. 3. A. foliis ternatis crenulatis obtusis.

sylvatica. 4. A. foliis ternatis crenatis acutis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 108.*

Balsamea. 5. A. foliis ternatis quinatis pinnatisque, floribus fasciculatis pentapetalis. *Gleditsch Schr. berl. Naturf. 3. p. 103.*

Elamife- 6. A. foliis ternatis, quinatis pinnatisque subtus tomentosis,
ra. floribus tetrapetalis racemosis. *Plum. ic. 100.*

Opobal- 7. A. foliis pinnatis: foliolis sessilibus. *Mant. p. 65. Bruce*
samum. *trav. in Eg. Arab. Ab. a. Nub. 5. app. p. 16? an vere distinctae omnes hae amyridis species?*

toxifera. 8. A. foliis pinnatis: foliolis petiolatis planis. *Catesb. Car. I. t. 40.*

Pectium. 9. A. foliis pinnatis: foliolis petiolatis undulatis. *Mant. p. 65. Rumpf. amb 7. t. 23. f. 1.*

ambrosia- 10. A. foliis pinnatis petiolatis, paniculis confertis axillaribus.
ca. *Suppl. p. 216. Aubl. pl. guj. I. t. 130.*

- zeylani- II. A. foliis pinnatis petiolatis glabris, racemis interruptis axil-
ca. laribus, floribus involueratis hexandris. *Koenig apud
Retz. obs. bot. 4. p. 25.*
- gujanen- 12. A. foliis pinnatis: pinnis bijugis ovato-oblongis, baccis
lis. racemosis. *Sloan. hist. jam. 2. p. 90. t. 199. f. 3.*
- balsamife- 13. A. foliis bijugis. *Sloan. hist. jam. 2. t. 168. f. 4.*
ra.

SODADA. Cal. 4phyllus, coloratus, inaequalis.
Cor. 4petala, inaequalis. Caps. pe-
dunculata.

decidua. I. SODADA. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 81.*

BINECTARIA. Cal. 4phyllus. Cor. 4petala. *Ne-
ctarium duplex in tubum cylin-
dricum definens, alterum extra,
alterum intra stamina.*

peregrina. I. BINECTARIA. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 82.*

470. **XIMENIA.** Cal. 4fidus. Petala 4 pilosa, re-
voluta. Drupa isperma.

america- I. X. foliis oblongis, pedunculis multifloris. *Jacq. stirp.
na. amer. pict. t. 107.*

elliptica. 2. X. caule inermi, foliis elliptico-lanceolatis, pedunculis mul-
tifloris. *Forst. fl. austr. p. 27.*

inermis. 3. X. foliis ovatis, pedunculis unifloris.

SASSIA. Cal. 4phyllus. Cor. 4petala. Caps. 2locu-
laris, 2sperma.

tinctoria. I. SASSIA. *Molin. hist. nat. Chil. p. 122.*

1155. **ACER.** Flores mere masculi reliquis interjecti.
Cal. 5fidus. Cor. 5petala. Caps.
2-3 ispermae, ala terminatae.

sempervi- I. A. foliis ovatis integerrimis sempervirentibus.
rens.

- tatari- 2. A. foliis cordatis indivisis ferratis: lobis obsoletis, floribus
cum. racemosis. *Pallas fl. ross. t. 3.*
- trifidum. 3. A. foliis indivisis trifidisque integris. *Thunb. fl. jap. p. 163.*
- monspe- 4. A. foliis trilobis integerrimis glabris annuis. *du Hamel
fulanum. arbr. 1. t. 10. f. 8.*
- creticum. 5. A. foliis trilobis integerrimis pubescentibus perennantibus.
du Hamel arbr. 1. t. 10. f. 9.
- pensylva- 6. A. foliis trilobis argute duplicato ferratis, racemis simplici-
nicum. bus: calicibus glabris. *du Roi Harbk. Baumz. 1. p. 8. t. 1.*
- monta- 7. A. foliis subquinelobis acutis ferratis, racemis compositis:
num. calicibus pilosis. *du Roi Harbk. Baumz. 1. p. 22. t. 2.*
- campe- 8. A. foliis quinelobis integerrimis: lobis inferioribus emar-
stre. ginatis, corymbo tripartito erecto. *Cram. Anl. 2. Forstn.
t. 29. Lactescit.*
- platanoi- 9. A. foliis quinelobis dentatis; dentibus acuminatis, co-
des. rymbo simplici erecto. *Mill. ic. t. 8. f. 1. Lactescit.*
- rubrum. 10. A. foliis quinelobis subdentatis subtus glaucis peduncu-
lis simplicissimis aggregatis. *Catesb. car. 1. t. 62. Flores
masculi in distincta arbore.*
- Pseudo- 11. A. foliis quinelobis obtusis inaequaliter ferratis, racemis
platanus. compositis pendulis. *du Hamel arbr. 1. t. 36. f. 1.*
- pietum. 12. A. foliis septemlobis glabris: lobis acuminatis integris.
Thunb. fl. jap. p. 162.
- septemlo- 13. A. foliis septemlobis glabris: lobis acuminatis aequaliter
bum. acute ferratis. *Thunb. fl. jap. p. 162.*
- palma- 14. A. foliis palmatis ferratis glabris, floribus umbellatis.
tum. *Thunb. fl. jap. p. 162.*
- sacchari- 15. A. foliis quinquepartito-palmatis acuminato-dentatis sub-
num. tus pubescentibus.
- dissectum. 16. A. foliis multipartito-palmatis: laciniis subpinnatifidis fer-
ratis. *Thunb. fl. jap. p. 160.*
- japoni- 17. A. foliis multipartito-incisis villosis, floribus subumbella-
cum. tis. *Thunb. fl. jap. p. 161.*
- Negando. 18. A. foliis compositis, floribus racemosis. *Pluckn. alm.
t. 123. f. 45.*
- lacinia- 19. A. foliis laciniatis. *Lactescit.*

carolinia- 20. A. foliis trilobis ferrulatis subtus glaucis, floribus monoi-
num. cis, pedunculis unifloris aggregatis. *Walt. flor. carol.*
p. 251.

1161. DIOSPYROS. Flores mere masculi in aliis ar-
boribus. Cal. 4fidus. Cor.
4fida, arceolata. Stil. 4-
fidus. Bacca 4-8sperma.

Latus. 1. D. foliorum paginis discoloribus.

virginiana. 2. D. foliorum paginis concoloribus. *Catesb. Car. 2. t. 76.*

Kaki. 3. D. ramis tomentosis, foliis ovatis utrinque acuminatis sub-
tus pubescentibus, pedunculis tripartitis. *Suppl. p. 439.*
Kaempf. amoen. exot. p. 85. 86. ic.

hirsuta. 4. D. ramis foliisque subtus villosis, foliis ellipticis obtusis,
floribus axillaribus congestis sessilibus. *Suppl. p. 440.*

Ebenum. 5. D. foliis ovali-oblongis coriaceis, gemmis glabris, floribus
axillaribus solitariis sessilibus. *Rumpf. amb. 3. t. 6.*

glaberri- 6. D. foliis ovato-lanceolatis acuminatis, gemmis hirtis, flo-
ma. ribus axillaribus solitariis sessilibus. *Fr. Rottb. n. act.*
Havn. 2. p. 540. t. 5.

tetrasper- 7. D. foliis membranaceis nitidis cuneiformibus, baccis tetra-
ma. spermis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 62.*

1128. FUCHSIA. Cal. 0. Cor. 8fida. Bacca infera,
4locularis, polysperma.

triphylla. 1. F. pedunculis unifloris terminalibus, foliis lanceolatis ternis.
Plum. ic. 133. f. 1.

excorti- 2. F. pedunculis unifloris axillaribus, foliis ovatis alternis,
cata. *Suppl. p. 217. Forst. char. gen. pl. t. 29.*

coccinea. 3. F. petalis obovatis, foliis oppositis ovatis denticulatis. *Ait.*
hort. Kew. 2. p. 8.

multiflora. 4. F. pedunculis multifloris. *Mutis.*

involucra- 5. F. floribus involucratis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 62.*
ta.

MINDIUM. *Cal.* 8fidus. *Cor.* campanulata, 8fida.
Stigma gradiatum. *Caps.* 8locularis, polysperma, calice coronata.

spicatum. I. MINDIUM. *Jussieu gen. plant. p. 164.*

1258. CHLORA. *Cal.* 8phyllus. *Cor.* 1petala, 6-8fida. *Caps.* 1locularis, 2valvis, polysperma.

perfoliata. I. Chl. foliis perfoliatis. *Spec. pl. 164.* *Gentiana perfoliata, Sabb. h. rom. 1. t. 100.*

imperfoliata. 2. Chl. corollis sexfidis. *Suppl. p. 218.*

quadrifolia. 3. Chl. foliis quaternis. *Spec. pl. 1671.* *Gentiana quadrifolia.*

dodecandra. 4. Chl. foliis oppositis. *Sp. pl. 273.* *Chironia dodecandra.*

MICHAUXIA. *Cor.* 8partita rotata. *Cal.* 16partitus. *Nectar.* 8valve, staminiferum. *Caps.* 8locularis, polysperma.

nova. I. MICHAUXIA.

1303. DODONAEA. *Cal.* 4phyllus. *Cor.* 0. *Caps.* 3locularis, inflata. *Sem.* bina.

viscosa. I. D. foliis oblongis. *Suppl. p. 258.* *Syst. nat. XII. 3. p. 125.* *Ptelea viscosa. Trew. Ebret. 12. t. 9.*

angustifolia. 2. D. foliis linearibus. *Suppl. p. 218.*

VALENTINIA. *Cal.* 5partitus, coloratus, patens. *Caps.* baccata, 1locularis, polysperma.

ilicifolia. I. VALENTINIA. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 63. Pluffron. ic. 167. f. 2.*

482. LAWSONIA. Cal. 4fidus. Petala 4. Stamina
4 parium. Caps. 4ocularis,
poly sperma.

inermis. 1. L. inermis, foliis subsessilibus ovatis utrinque acutis. *Suppl.*
p. 219. Rheed. b. mal. 4. t. 57.

Acrony- 2. L. inermis, foliis longe petiolatis cuneiformibus. *Suppl.*
chia. *p. 219. Forst. char. gen. t. 27.*

spinosa. 3. L. ramis spinosis. *Rheed. b. mal. 1. t. 40.*

481. MEMECYLON. Cal. superus: fundo striato;
margine integerrimo.
Cor. 1petala. Antherae
insertae lateri apicis fila-
menti. Bacca coronata
calice cylindrico.

capitella- 1. M. foliis ovatis. *Burm. zeyl. t. 30.*
tum.

grande. 2. M. foliis acuminatis. *Koenig apud Retz. obs. bot. 4. p. 26.*

ICICA. Cal. 4dentatus. Petala 4 in tubum conni-
ventia. Stigm. capitatum, 4fulcatum
Caps. subrotunda, coriacea, 2-4valvis,
2-4sperma.

hepta- 1. I. foliis septenatis. *Aubl. pl. guj. 1. p. 337. t. 130.*
phylla.

gujanen- 2. I. foliis pinnatis, floribus pedunculatis axillaribus congestis.
fis. *Aubl. pl. guj. 1. p. 340. t. 131.*

altissima. 3. I. foliis pinnatis: pinnis ovatis acuminatis, capsulis race-
mosis. *Aubl. pl. guj. 1. p. 340. t. 132.*

Acuchini. 4. I. foliis pinnato-quinatis ternatisque. *Aubl. pl. guj. 1.*
p. 343. t. 133.

decandra. 5. I. foliis omnibus pinnato-quinatis, floribus decandris. *Aubl.*
pl. guj. 1. p. 346. t. 135.

ennean- 6. I. foliis ternatis, floribus enneandris. *Aubl. pl. guj. 1. p.*
dra. *345. t. 134.*

TALI-

TALISIA. *Cal.* 5partitus. *Petala* 5, squamula au-
cta. *Stil.* brevissimus. *Pericarp.*
4loculare.

gujanensis. I. **TALISIA.** *Aubl. pl. guj. I. p. 349. t. 136.*

MELICOPE. *Cal.* 4partitus, campanulatus, inferus.
Cor. 4petala. *Nectarium* glandu-
lae 4 dymae germinis basi adnatae.
Germen apice 4lobum. *Stilus*
4angulus.

ternata. I. **MELICOPE.** *Forst. char. gen. p. 28. t. 28. Gaertn. de fr.
et sem. cent. 5. t. 68. f. 6.*

483. **VACCINIUM.** *Cal.* superus. *Cor.* 1petala. *Fi-*
lamenta receptaculo inserta.
Bacca 4locularis polysper-
ma, infera, umbilicata.

* *foliis annotinis s. deciduis.*

Myrtillus. I. V. pedunculis unifloris, foliis ferratis ovatis, caule angula-
to. *Knorr del. hort. I. t. S. 18. n. 1.*

hirtum. 2. V. pedunculis unifloris, foliis ovatis ferratis, ramis tereti-
bus divaricatis. *Thunb. fl. jap. p. 155.*

diffusum. 3. V. pedunculis unifloris solitariis nudis, foliis ovatis acutis
obsolete ferratis subtus villosiusculis. *Ait. hort. Kew. 3.
p. 11.*

angustifolium. 4. V. pedunculis unifloris solitariis, foliis elliptico-lanceolatis
glabris obsolete ferrulatis. *Ait. hort. Kew. 2. p. 11.*

aliginosum. 5. V. pedunculis unifloris, foliis integerrimis obovatis obtusis
laevibus. *Flor. dan. t. 231.*

stamineum. 6. V. pedunculis unifloris solitariis, antheris corolla longiori-
bus, foliis oblongis integerrimis. *Pluckn. alm. t. 339. f. 3.*

cereum. 7. V. pedunculis unifloris solitariis, corollis quinquangulari-
ovatis, foliis ovato-subrotundis ferratis. *Forst. fl. austr.
p. 28. Suppl. p. 238. Andromeda cerea,*

- mucrona- 8. V. pedunculis unifloris simplicissimis, foliis ovatis mucronatum. glabris integerrimis.
- album. 9. V. pedunculis simplicibus, foliis integerrimis ovatis subtus tomentosis.
- corymbo- 10. V. floribus corymbosis ovatis, foliis oblongis acuminatis sum. integerrimis.
- Antosta- 11. V. floribus racemosis, foliis crenulatis ovatis acutis, caule arboreo. *Tournef. it. 2. p. 223. ic.*
- frondosum. 12. V. racemis filiformibus bracteatis, foliis oblongis integerrimis.
- ciliatum. 13. V. racemis bracteatis, foliis ovatis integris hispidis. *Thunb. fl. jap. p. 156.*
- bractea- 14. V. racemis bracteatis, foliis serratis acutis. *Thunb. fl. jap. p. 156.*
- pallidum. 15. V. racemis bracteatis, corollis cylindrico-campanulatis, foliis ovatis acutis ferrulatis glabris. *Ait. hort. Kew. 2. p. 10.*
- venustum. 16. V. racemis bracteatis: pedicellis bracteolatis, corollis subcampanulatis, foliis ellipticis acutis integerrimis glabris. *Ait. hort. Kew. 2. p. 11.*
- resinosum. 17. V. racemis bracteatis, corollis ovatis, foliis ellipticis acutiusculis integerrimis resina irroratis. *Ait. hort. Kew. 2. p. 12.*
- amoenum. 18. V. racemis bracteatis, corollis subcylindricis, foliis ellipticis subserrulatis, venis subtus subvillosis. *Ait. hort. Kew. 2. p. 12.*
- tenellum. 19. V. racemis bracteatis sessilibus, corollis ovato-cylindricis, foliis oblongo-ellipticis subcuneiformibus serrulatis subglabris. *Ait. hort. Kew. 2. p. 11.*
- virgatum. 20. V. racemis sessilibus, corollis subcylindricis, foliis oblongo-ellipticis serrulatis, utrinque glabris, ramis floriferis elongatis. *Ait. hort. Kew. 2. p. 12.*
- fuscatum. 21. V. racemis nudiusculis, corollis cylindrico-ovatis, calicibus acutis, foliis ellipticis acutis integerrimis: venis subtus subvillosis. *Ait. hort. Kew. 2. p. 11.*
- ligustri- 22. V. racemis nudis, caule fruticoso, foliis crenulatis oblongis: num.
** foliis sempervirentibus.
- Vitis 23. V. racemis terminalibus nutantibus, foliis obovatis revolutis integerrimis subtus punctatis. *Flor. dan. t. 40.*
- idaea. 24. V.

- hispidu- 24. V. foliis integerrimis revolutis ovatis, caulibus repentibus
lum. filiformibus hispidis. *Pluckn. alm. t. 320. f. 6.*
- macrocar- 25. V. foliis integerrimis ovali-oblongis obtusis planis, cauli-
pon. bus repentibus filiformibus. *Ait. hort. Kew. 2. p. 13. t. 7.*
- meridio- 26. V. floribus racemosis, foliis ovatis crenato-ferratis, caule
nale. arboreo. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 62.*

SCHOLLERA. *Cal.* 4fidus, superus. *Cor.* 4petala, regularis, tota recurvata. *Fi-
lamenta* conniventia. *Antherae* 2-
partitae, tubulosae. *Bacca* poly-
sperma.

- Oxycoc- 1. Sch. foliis ovatis integerrimis revolutis sempervirentibus,
cus. caulibus filiformibus, repentibus nudis. *Syst. nat. XII. 3. p. 268.* Vaccinium Oxycoccus. *Flor. dan. t. 80.*

484. ERICA. *Cal.* 4phyllus. *Cor.* 4fida. *Filamen-
ta* receptaculo inserta. *Antherae*
apice 2fidae, pertusae. *Caps.* 4lo-
cularis, 4valvis, polysperma.

* *antheris simplicibus, muticae.*

† *foliis alternis.*

- Daboecia. 1. E. foliis subtus tomentosis. *Syst. nat. XII. 3. p. 300.* Andro-
meda Daboecia. *Petiv. gaz. t. 27. f. 4.*

†† *foliis oppositis.*

- tenuifo- 2. E. foliis lanceolatis glabris, floribus ternis, calice colorato.
lia. *Seb. mus. 2. t. 9. f. 8.*

††† *foliis ternis.*

- bracteata. 3. E. foliis lanceolatis glabris, floribus umbellatis bracteis pe-
tiolatis coloratis obvallatis. *Thunb. de eric. p. 13. n. 3.*
- petiolata. 4. E. foliis lanceolatis glabris, floribus umbellatis campanulatis,
caule decumbente. *Thunb. de eric. p. 15. n. 7. t. 6.*
- fucata. 5. E. foliis lanceolatis glabris, floribus racemosis secundis
globosis, ramis glabris. *Thunb. de eric. p. 15. n. 9.*

6. E.

- tetragona. 6. E. foliis lanceolatis ciliatis, floribus racemosis secundis tetragonis. *Suppl. p. 223. Thunb. de eric. t. 4.*
- Thunbergii. 7. E. foliis linearibus glabris, floribus umbellatis, corollae tubo glabro: limbo campanulato. *Suppl. p. 220. Montin. n. act. Ups. 2. t. 9. f. 2.*
- Petiverii. 8. E. foliis linearibus glabris, floribus terminalibus solitariis cylindricis, bracteis imbricatis. *Mant. p. 235.*
- Pluckene- 9. E. foliis linearibus glabris, floribus racemosis cylindricis, bracteis remotis. *Seb. mus. 2. t. 25. f. 5. β) Thunb. de eric. t. 2.*
- umbellata. 10. E. foliis trigonis ciliatis, floribus umbellatis campanulatis, caule erecto.
- axillaris. 11. E. foliis trigonis glabris, floribus racemosis globosis, ramis tomentosis. *Thunb. de eric. p. 16. n. 10.*
- melanthe- 12. E. foliis trigonis glabris, floribus umbellatis; antheris inclusis, bracteis ovatis laxis. *Mant. p. 232.*
- leucanthe- 13. E. foliis trigonis glabris, floribus umbellatis: antheris exsertis albis. *Suppl. p. 223.*
- spumosa. 14. E. foliis trigonis glabris, floribus capitatis, bracteis imbricatis. *Seb. mus. 2. t. 9. f. 10. β) Erica scariofa. Berg. fl. cap. p. 102.*
- bryantha. 15. E. foliis ovatis ciliatis, floribus paniculatis, caule decumbente. *Gmel. fl. sibir. 4. t. 57. f. 3.*
- ciliaris. 16. E. foliis ovatis ciliatis, floribus axillaribus campanulatis: calicibus ciliatis.
- capitata. 17. E. foliis ovatis hirsutis, floribus umbellatis, calicibus lanatis. *Seb. mus. 1. t. 20. f. 1. β) Erica bruniades. Syst. nat. XII. 3. p. 270. Seb. mus. 2. t. 63. f. 7.*
- passerinae. 18. E. foliis ovatis glabris, floribus subsolitariis, calicibus tomentosis. *Suppl. p. 221. Montin. n. act. Ups. 2. t. 9. f. 1.*
- hispida. 19. E. foliis ovatis integris, floribus umbellatis globosis, calicibus integris. *Suppl. p. 222.*
- virgata. 20. E. foliis oblongis scabris, floribus ternis globosis: calicibus integris, stilo exserto. *Thunb. de eric. p. 18. n. 18. β) Erica ablinthoides. Syst. nat. XII. 3. p. 269.*
- Totta. 21. E. foliis oblongis hispidis, floribus ternis: calicibus ciliatis. *Thunb. de eric. p. 18. n. 17.*

- imbrica- 22. E. foliis oblongis ferratis, floribus umbellatis: antheris
ta. exsertis, bracteis imbricatis. β) Erica quinquangularis.
Berg. fl. cap. p. 117.

TTTT foliis quaternis.

- grandiflo- 23. E. foliis linearibus glabris, floribus racemosis clavatis gla-
ra. bris. *Suppl. p. 223.*
- herbacea. 24. E. foliis linearibus glabris, floribus racemosis secundis.
 β) Erica carnea. *Syst. nat. XII. 3. p. 270. Jacq. fl. austr. 1. t. 32.*
- mediter- 25. E. foliis linearibus glabris, floribus racemosis campanula-
ranea. tis, calice colorato integro lanceolato. *Mant. p. 229.*
- glandulo- 26. E. foliis linearibus glanduloso-pilosis, floribus clavatis
fa. glabris, calicibus hispids. *Thunb. de eric. p. 25. n. 32.*
- racemo- 27. E. foliis lanceolatis villosis, floribus racemosis globosis:
fa. calicibus tomentosis. *Thunb. de eric. p. 31. n. 47. t. 5.*
- Maffoni. 28. E. foliis oblongis ferratis villosis, floribus cylindricis visco-
sis. *Suppl. p. 221. Thunb. de eric. p. 27. n. 35. t. 3.*
- Sparman- 29. E. foliis oblongis ciliato-ferratis, corollis campanulatis
ni. calicibusque strigosis. *Suppl. p. 219. Act. Stockh. 1778. t. 2.*
- cerinthoi- 30. E. foliis oblongis ciliato-ferratis, floribus cylindricis vil-
des. losis, calicibus ferratis. *Seb. mus. 2. t. 22. f. 4. et t. 34. f. 6.*
- ventrico- 31. E. foliis trigonis ciliatis, floribus ventricosus glabris. *Thunb. de eric. p. 27. n. 36. t. 1.*
- tubiflora. 32. E. foliis trigonis ciliatis, floribus terminalibus solitariis
curvatis clavatis hirsutis. *Seb. mus. 1. t. 20. f. 4.*
- pyrami- 33. E. antheris inclusis, corollis infundibuliformibus quaternis,
dalis. stilo subexterto, foliis pubescentibus. *Ait. hort. Kew. 3. p. 491.*
- conspi- 34. E. antheris subinclusis corollis cylindricis curvis longissi-
cua. mis pilosis: limbo revoluto stilo exterto, foliis glabris.
Ait. hort. Kew. 2. p. 22.
- curvisflo- 33. E. foliis trigonis glabris, floribus terminalibus solitariis
ra. curvatis clavatis glabris. *Seb. mus. 2. t. 19. f. 5.*
- cylindri- 34. E. foliis trigonis glabris, floribus terminalibus cylindricis
ca. glabris. *Thunb. de eric. p. 24. n. 29.*
- fastigiata. 35. E. foliis trigonis glabris, floribus capitatis, calicibus inte-
gris. *Mant. p. 66.*

- comosa. 36. E. foliis trigonis glabris, floribus capitatis, calicibus ciliatis.
Mant. p. 234.
- dentata. 37. E. foliis trigonis glabris, floribus capitatis, calicibus serratis. *Mant. p. 229.*
- viscaria. 38. E. foliis trigonis glabris, floribus racemosis campanulatis, calice rudi ciliato. *Mant. p. 231.*

TTTTT foliis quinis.

- purpurascens. 39. E. foliis quaternis quinisque glabris, floribus sparsis campanulatis, caule decumbente.
- vagans. 40. E. foliis quaternis quinisque glabris, floribus sparsis campanulatis, caule erecto. *Mant. p. 230.*
- cubica. 41. E. foliis trigonis incurvis glabris, floribus umbellatis globosis: calice colorato carinato. *Mant. p. 233.*
- multiflora. 42. E. foliis linearibus glabris, floribus racemosis subcampanulatis; calice colorato integro ovato. *Garid. fl. aix. t. 32.*
- concinna. 95. E. antheris inclusis, corollis cylindricis basi attenuatis, foliis subsenis glabris, floribus terminalibus umbellatis. *Ait. hort. Kew. 2. p. 23.*
- nudicaulis. 96. E. antheris stilibusque inclusis, corollis ovatis umbellatis, foliis subquaternis subscabridis, caule nudo. *Berg. flor. cap. Thunb.*

TTTTTT foliis senis.

- vestita. 43. E. foliis linearibus secundis, floribus axillaribus clavatis villosis. *Thunb. de eric. p. 22. n. 25.*
- pineae. 44. E. foliis lineari-lanceolatis, floribus verticillatis clavatis glabris. *Thunb. diff. de eric. p. 23. n. 26.*
- coccinea. 45. E. foliis lanceolatis, floribus racemosis clavatis villosis. *Seb. mus. I. t. 21. f. 4.*
- cephalotes. 46. E. foliis lanceolatis, floribus verticillato-capitatis clavatis. *Thunb. de eric. p. 21. n. 23.*
- pulchella. 47. E. foliis lanceolatis, floribus axillaribus tubuloso-campanulatis. *Thunb. de eric. p. 22. n. 24. t. 4.*
- verticillata. 48. E. floribus pedunculatis verticillatis axillaribus. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 210. an distincta, et hujus quidem tribus species?*

* *antheris inferne setis duabus acutis.*

† *setis laevibus, aristatae.*

† *foliis oppositis.*

- glutinosa. 49. E. foliis oppositis sparsisque linearibus ciliato-glandulosis. *Mant. p. 239.* Andromeda droseroides. *Pet. mus. t. 161.*
 lutea. 50. E. foliis lineari-trigonis glabris. *Mant. p. 234.* β) Erica albens. *Mant. p. 231.*

†† *foliis ternis.*

- depressa. 51. E. foliis oblongis glabris, floribus subracemosis, caule decumbente. *Mant. p. 230.* *Thunb. de eric. p. 33. n. 50. t. 6.*
 nigrita. 52. E. foliis oblongis glabris, floribus ternis, bracteis acutis imbricatis. *Mant. p. 65.* *Seb. mus. 2. t. 9. f. 7.*
 virescens. 53. E. foliis lanceolatis glabris, floribus racemosis secundis. *Syst. nat. XII. 3. p. 268.* Erica viridi-purpurea.
 halicacaba. 54. E. foliis lanceolatis glabris, floribus solitariis, caule decumbente.
 urceolaris. 55. E. foliis lanceolatis subtus tomentosis, floribus subracemosis villosis. *Syst. nat. XII. 3. p. 271.* Erica pentaphylla. *Seb. mus. 1. t. 21. f. 2.*
 Monfoni- 56. E. foliis ovatis glabris, floribus solitariis, caule erecto, niana. *Suppl. p. 223.* *Thunb. de eric. p. 34. n. 52. t. 1.*
 articul- 57. E. foliis ovatis glabris, floribus racemosis, caule erecto. ris. *Mant. p. 65.*
 bicolor. 58. E. foliis ovatis scabris, floribus ternis cernuis glabris: calice villoso colorato. *Thunb. de eric. p. 36. n. 57.*
 planifo- 59. E. foliis ovatis ciliatis, floribus axillaribus, caule decum- lia. bente. *Pluckn. mant. t. 347. f. 1.*
 marifolia. 97. E. foliis ovatis pubescentibus subtus albidis, corollis ovato-conicis, stilo mediocri. *Ait. hort. Kew. 2. p. 15.*
 eruenta. 98. E. foliis glabris lineari-subulatis, bracteis remotis, corollis cylindricis incurvis, calicibus subulatis basi dilatatis, stilo exserto. *Ait. hort. Kew. 2. p. 16.*
 regermi- 60. E. foliis linearibus glabris, floribus racemosis, caule ere- nans. cto. *Mant. p. 232.*
 hirta. 61. E. foliis linearibus hispidis, floribus umbellatis, calice scabro rudi. *Thunb. de eric. p. 36. n. 56. t. 2.*

††† *foliis*

††† foliis quaternis.

- pubescens. 62. E. foliis ternis quaternisque linearibus scabris, floribus umbellatis villosis. *Thunb. de eric. p. 38. n. 61. t. 5.*
β) Erica parviflora. *Syst. nat. XII. 3. p. 269.*
- perfoliata. 63. E. foliis ternis quaternisque trigonis glabris, floribus umbellatis: calice ciliato. *Mant. p. 230.* β) Erica paniculata. *Syst. nat. XII. 3. p. 269.*
- frigosa. 99. E. foliis pubescentibus ciliatis, corollis campanulatis glabris, stilo exserto. *Ait. hort. Kew. 2. p. 17.*
- abietina. 64. E. foliis lanceolatis glabris, floribus racemosis cylindricis: calice ovato ferrato. *Seb. mus. I. t. 21. f. 1.*
- arborea. 65. E. foliis lanceolatis ciliatis, floribus racemosis.
- florida. 66. E. foliis lanceolatis hirsutis, floribus umbellatis: calice villosō reflexo. *Thunb. de eric. p. 40. n. 64. t. 6.*
- inflata. 67. E. foliis linearibus glabris, floribus umbellatis ventricosis; calice subulato glabro. *Thunb. de eric. p. 41. n. 67. t. 2.*
- pilulifera. 68. E. foliis linearibus ciliatis, floribus umbellatis: calice naviculari apice ciliato glabro.
- Tetralix. 69. E. foliis oblongis ciliatis subtus tomentosis, floribus umbellatis: calice ciliato tomentoso. *Flor. dan. t. 81.*

†††† foliis senis.

- empetri- 70. E. foliis oblongis ciliatis, floribus verticillatis: calice ciliato. *Linn. Pflanzen syst. 3. t. 23. f. 2.*
- spicata. 71. E. foliis lanceolatis glabris, floribus verticillatis: calice petiolato integro. *Suppl. p. 220.* Erica sessiliflora. *Thunb. de eric. p. 43. n. 71. t. 4.*
- mammo- 72. E. foliis lanceolatis glabris, floribus umbellatis: calice subulato glabro. *Mant. p. 234.*

††††† foliis octonis.

- octophyl- 73. E. foliis linearibus truncatis squarrosis, floribus umbellatis. *Suppl. p. 219.* Erica fascicularis. *Thunb. de eric. p. 44. n. 72. t. 3.*

†† antherarum setis dentato-ferratis: Cristatae.

† foliis sparsis.

- obliqua. 74. E. foliis oblique sparsis linearibus truncatis glabris. *Thunb. de eric. p. 44. n. 73. t. 1.*

— — foliis oppositis.

vulgaris. 75. E. foliis sagittatis. *Flor. dan. t. 677. Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. t. 63. f. 3.*

— — — foliis ternis.

gnaphalodes. 76. E. foliis ovatis integris glabris, floribus ternis glabris: calice bracteisque navicularibus coloratis. *Pluckn. mant. t. 346. f. 11.*

formosa. 77. E. foliis ovatis integris glabris, floribus umbellatis sulcatis: calice patente integro. *Thunb. de eric. p. 49. n. 82. t. 3.*

calicina. 78. E. foliis ovatis integris glabris, floribus umbellatis glabris: calice naviculari truncato cuspidato. *Seb. mus. 2. t. 11. f. 7. β) Erica vespertina. Suppl. p. 221.*

incarnata. 79. E. foliis ovatis integris glabris, floribus umbellatis ovatis: calice integro, ramis villosis. *Thunb. de eric. p. 50. n. 84.*

mucosa. 80. E. foliis ovatis ferratis glabris, floribus umbellatis viscosis: calice ovato colorato. *Mant. p. 232.*

corifolia. 81. E. foliis lanceolatis integris glabris, floribus umbellatis glabris: calice naviculari inflexo. *Seb. mus. 1. t. 21. f. 3.*

cinerea. 82. E. foliis lanceolatis integris glabris, floribus umbellatis ovatis: calice ferrulato, ramis villosis. *Flor. dan. t. 38.*

Bergiana. 83. E. foliis lanceolatis scabris, floribus subternis: calice reflexo ciliato. *Mant. p. 235.*

triflora. 84. E. foliis subulatis glabris, floribus subternis: calice ovato aequante, caule hispido. *Thunb. de eric. p. 47. n. 79. t. 5.*

scoparia. 85. E. foliis linearibus integris glabris, floribus umbellatis: calice ovato brevi, caule hispido. *Lob. ic. 2. p. 215.*

rubens. 86. E. foliis linearibus integris glabris, floribus umbellatis globosis: calice lanceolato brevi, ramis glabris. *Thunb. de eric. p. 49. n. 83.*

australis. 87. E. foliis linearibus ferrulatis glabris, floribus terminali-subsessilibus, bracteis imbricatis.

— — — — foliis quaternis.

baccans. 88. E. foliis linearibus ferrulatis, floribus umbellatis: calice ovato aequante. *Mant. p. 233. Seb. mus. 1. t. 21. f. 3.*

physodes. 89. E. foliis linearibus, floribus umbellatis viscosis: calice ovato brevi.

90. E.

- ramenta- 90. E. foliis trigonis integris, floribus umbellatis: calice lan-
 cea. ceolato brevi. *Mant. p. 65.* β) Erica granulata. *Mant.*
p. 234.
- cernua. 91. E. foliis ovatis ciliatis, floribus capitatis: calice ciliato.
Suppl. p. 222. Montin n. act. Ups. 2. t. 9. f. 3.
- margari- 100. E. corollis urceolato-campanulatis, stilo mediocri. *Ait.*
 tacea. *hort. Kew. 2. p. 20.*
- retorta. 92. E. foliis ovatis ferrulatis squarrosis, floribus umbellatis
 viscosis. *Suppl. p. 220. Montin. act. Stockh. 1774. t. 7.*

CEDROTA. Cal. 6partitus. Cor. o. Germen glandula cinctum. Stil. brevis.

gujanensis. I. CEDROTA. *Aubl. pl. guj. 1. p. 327. t. 126.*

ATHENAEA. Cal. coloratus, 5partitus. Cor. o.
 Set. 8plumosae filamentis inter-
 fitae. Stigm. 5partitum. Caps.
 globosa, 3valvis,ilocularis, 3-
 5sperma.

gujanensis. I. ATHENAEA. *Aubl. pl. guj. 1. p. 328. t. 127.*

GRUBBIA. Involucr. 2phyllum, 2-3florum. Cor.
 4petala, infera. Germen hirsutum.
 Stigm. simplex.

capensis. I. GRUBBIA. *Berg. pl. cap. p. 90.*

1304. OPHIRA. Involucrum 2valve, 3florum. Cor.
 4petala, supera. Bacca ilo-
 cularis.

striata. I. OPHIRA. *Mant. p. 229.*

HEYMASSOLI. Cor. 4petala, supra tomentosa. Cal.
 4partitus. Stil. brevis. Dru-
 pa ovata,ilocularis, isperma.

spinosa. I. H. ramis aculeatis. *Aubl. pl. guj. 1. p. 324. t. 125.*

inermis. 2. H. ramis inermibus. *Aubl. pl. guj. 1. p. 325.*

1425, SCOPOLIA. *Cal.* 2phyllus, multiflorus. *Cor.* 4fida. *Antherae* connatae duplici columna, quarum altera supra alteram posita.

composita. I. SCOPOLIA. *Suppl.* p. 409.

1123, POPULUS. *Flores* dioici, amentacei. *Cal.* lamina lacera. *Cor.* turbinata, obliqua integra.
♀. *Stigma* 4fidum. *Caps.* 2locularis. *Sem.* multa, papposa.

- alba. 1. *P.* foliis subrotundis dentato-angulatis subtus tomentosis. *Blackw. herb. t. 548.*
- tremula. 2. *P.* foliis subrotundis dentato-angulatis utrinque glabris. *Blackw. herb. t. 248.*
- nigra. 3. *P.* foliis utrinque glabris acuminatis ferratis deltoidibus: diametro longitudinali longiori. *Mill. illustr. ic. Regn. bot. t. 321.*
- dilatata. 4. *P.* foliis utrinque glabris acuminatis ferratis deltoidibus: diametro transversali longiori. *Ait. hort. Kew. 3. p. 406.*
- balsamifera. 5. *P.* foliis ovatis ferratis subtus albidis: stipulis resinosis. *Trew, Ebrēt. t. 46. β) Pallas flor. ross. t. 41.*
- monilifera. 6. *P.* foliis subcordatis glabris basi glandulosis: ferraturis cartilagineis hamatis subpilosis, nervis patulis, petiolis compressis, ramis teretibus. *Ait. hort. Kew. 3. p. 406.*
- candicans. 7. *P.* foliis cordatis acuminatis subtus albidis subtriplinerviis, stipulis resinosis, ramis teretibus. *Ait. hort. Kew. 3. p. 406.*
- laevigata. 8. *P.* foliis cordatis trinerviis glabris basi glandulosis inaequaliter ferratis: petiolis compressis, ramis teretibus. *Ait. hort. Kew. 3. p. 406.*
- graeca. 9. *P.* foliis cordatis glabris basi glandulosis remote crenatis: petiolis compressis, ramis teretibus. *Ait. hort. Kew. 3. p. 407.*
- heterophylla. 10. *P.* foliis cordatis: primoribus pubescentibus basi eglandulosis; petiolis subteretibus, ramis teretibus. *Du Hamel arbr. 2. t. 39. f. 2.*
- angulata. 11. *P.* foliis cordatis glabris, ramis alato-angulosis. *Du Ham. arbr. 2. p. 178. t. 39. f. 9.*

12. *P.*

- Carolinen-12. P. foliis cordatis crenatis supra glandulosis anterieus integerrimis. *Moench Weissenst. p. 31.*
 canadensis-13. P. foliis cordatis crenatis eglandulosis. *Moench Weissenst. p. 31.*

485. DAPHNE. *Cal.* (plurimis) 0. *Cor.* 1 petala, regularis, 4 fida infundibuliformis. *Drupa* baccata, superiora,ilocularis.

* *floribus lateralibus.*

- Mezerium. 1. D. floribus sessilibus ternis caulinis, bacis globosis. *Flor. dan. t. 268. Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 39. f. 4.*
 Thymelaea. 2. D. floribus sessilibus axillaribus, foliis lanceolatis, caulibus simplicissimis. *Ger. fl. prov. t. 17. f. 2.*
 Tartonraira. 3. D. floribus sessilibus axillaribus aggregatis, foliis ovatis utrinque pubescentibus nervosis. *Lob. ic. 371.*
 alpina. 4. D. floribus subsessilibus aggregatis terminalibus lateralibusque, foliis lanceolatis obtusiusculis utrinque incano-pubescentibus. *Gesn. fasc. 6. t. 3. f. 7.*
 pubescens. 5. D. floribus sessilibus aggregatis, foliis lanceolato-linearibus, caule pubescente. *Mant. p. 66.*
 villosa. 6. D. floribus sessilibus solitariis, foliis lanceolatis planis ciliatis pilosis confertis.
 calicina. 7. D. floribus axillaribus solitariis sessilibus caliculatis, foliis linearilanceolatis glabris, caulibus prostratis. *de la Peirouse act. Tolos. 1. p. 209. t. 15.*
 dioica. 8. D. floribus axillaribus geminis, foliis linearilanceolatis. *Suppl. p. 223. Gouan. bot. t. 17. f. 1.*
 pontica. 9. D. pedunculis lateralibus bifloris, foliis lanceolato-ovatis. *Tournef. it. 3. p. 180. ic.*
 Laureola. 10. D. racemis axillaribus quinquefloris, foliis lanceolatis glabris. *Jacq. fl. austr. 2. t. 183.*

** *floribus terminalibus.*

- occidentalis. 11. D. pedunculis axillaribus, floribus terminalibus umbellatis dioicis, foliis alternis lanceolatis glabris. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 63.*

- squarrosa. 12. *D. floribus pedunculatis, foliis sparsis linearibus patentibus mucronatis. Burm. afr. t. 49. f. 1.*
 oleoides. 13. *D. floribus geminis sessilibus, foliis elliptico-lanceolatis glabris. Schreb. dec. p. 13. t. 7.*
 odora. 14. *D. floribus aggregatis sessilibus, foliis ovatis alternis glabris. Thunb. fl. jap. p. 159.*
 foetida. 15. *D. glabra floribus congestis sessilibus, foliis oppositis petiolatis ovato-oblongis acutis. Suppl. p. 223.*
 rotundi- 16. *D. hirsuta, floribus congestis sessilibus, foliis oppositis ellipticis subpetiolatis obtusis glabris. Suppl. p. 223.*
 folia.
 Cneorum. 17. *D. floribus congestis sessilibus, foliis lanceolatis nudis mucronatis, baccis exsuccis. Jacq. fl. austr. 5. t. 426. β) Daphne candida. Scop. flor. carn.*
 indica. 18. *D. capitulo terminali pedunculato, foliis oppositis oblongo-ovatis glabris.*
 Gnidium. 19. *D. floribus paniculatis, foliis lineari-lanceolatis acuminatis. Regn. bot. t. 328.*
 Lagetto. 20. *D. spicis paniculatis, foliis ovatis acutis. Nicolf. doming. p. 172. t. 1. f. 1-5. Bois dentelle.*
 tinifolia. 21. *D. racemo composito erecto: floribus confertis, foliis oblongis. Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 63.*
 caucasica. 22. *D. umbellis terminalibus multifloris, foliis oblongo-lanceolatis mucronatis. Pallas flor. ross. t. 53.*
 altaica. 23. *D. floribus fasciculatis terminalibus sessilibus, foliis oblongo-ovatis glabris. Pallas flor. ross. t. 35.*

486. DIRCA. *Cal. o. Cor. tubulosa: limbo obsolete. Stamina tubo longiora. Bacca isperma.*

palustris. I. DIRCA. *Du Hamel arbr. 1. t. 212.*

BUGINVILLEA. *Cal. inferus tubulosus, basi subventricosus, medio coarctatus, limbo subinteger. Stamina inclusa.*

brasiliensis. I. BUGINVILLEA. *Jussieu gen. plant. p. 91.*

QUI-

QUIVISIA. *Cor.* 4-5petala. *Cal.* urceolatus 4-5dentatus. *Stam.* 8-10. *Stigma* capitatum. *Caps.* coriacea, 4-5locularis, 8-10sperma, apice 4-5valvis.

fruticosa. I. QUIVISIA. *Jussieu gen. plant. p. 264.*

487. GNIDIA. *Cal.* infundibuliformis, 4fidus. *Petalata* 4 calici inserta. *Sem.* 1 subbaccatum.

capitata. I. Gn. foliis sparsis lanceolatis glabris, floribus capitatis bracteis obvallatis, pedunculo nudo. *Suppl. p. 224.*

tomentosa. 2. Gn. foliis sparsis ovato-oblongis glabris margine scabris.

pinifolia. 3. Gn. foliis sparsis linearibus, floralibus verticillatis. *Mant. p. 375. Seb. mus. 2. t. 32. f. 5.*

polystachya. 12. Gn. foliis sparsis linearibus obtusiusculis, spicis subpaniculatis: bracteis ovatis, nectariis octophyllis. *Berg. fl. cap.*

simplex. 4. Gn. foliis omnibus linearibus acutis, floribus terminalibus sessilibus. *Mant. p. 67. Breyn. cent. 10. t. 6.*

acerosa. 5. Gn. foliis lineari-subulatis supra planis acutis, floribus binis axillaribus. *Suppl. p. 225.*

radiata. 6. Gn. foliis subulatis triquetris acutis, capitulis terminalibus sessilibus radiatis: bracteis lanceolatis. *Mant. p. 67.*

oppositifolia. 7. Gn. foliis oppositis lanceolatis. *Mant. p. 375. Pluckn. alm. t. 323. f. 7. β) Passerina laevigata. Sp. pl. 513. Burm. afr. t. 49. f. 3.*

sericea. 8. Gn. foliis ovatis tomentosis: floralibus quaternis, caule hirsuto, florum corona setis octo. *Burm. afr. t. 49. f. 2. Sp. pl. p. 513. Passerina sericea.*

filamentosa. 9. Gn. foliis elliptice ovatis glaberrimis approximatis, floribus capitatis, filamentis capillaribus. *Suppl. p. 224.*

imbricata. 10. Gn. foliis oblongis quadrifariam imbricatis sericeis, floribus terminalibus in axillis foliorum. *Suppl. p. 225.*

daphnaefolia. 11. Gn. foliis oblongis planis integerrimis, capitulo terminali pedunculato involucreto: floribus quinquefidis decandris. *Suppl. p. 225.*

488. STELLERA. *Cal.* o. *Cor.* 4-5fida. *Stam.*
brevissima. *Nux* supera cor-
ticata, ilocularis.

Passerina. 1. *St.* foliis linearibus, corollis quadrifidis. *Col. ecphr.* 1. t. 80.
Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 39. f. 2.

Chamae- 2. *St.* foliis lanceolatis, corollis quinquefidis. *Amm. ruth.*
jasina. 16. t. 2.

489. PASSERINA. *Cal.* o. *Cor.* 4fida. *Stam.* tu-
bo imposta. *Sem.* 1. cortica-
tum.

- hirsuta. 1. *P.* foliis carnosis extrinsecus glabris, caulibus tomentosis.
filiformis. 2. *P.* foliis linearibus convexis quadrifariam imbricatis, ramis
tomentosis. *H. Cliff.* t. 11.
ericoides. 3. *P.* foliis linearibus laevibus subimbricatis, corollis globosis.
Mant. p. 236.
capitata. 4. *P.* foliis linearibus glabris, capitulis pedunculatis tomento-
sis. *Burm. afr.* t. 48. f. 3.
uniflora. 5. *P.* foliis linearibus oppositis, floribus terminalibus solitariis,
ramis glabris. *Burm. afr.* t. 48. f. 1. 2.
ciliata. 6. *P.* foliis lanceolatis subciliatis erectis, ramis nudis. *Seb.*
mus. 2. t. 12. f. 9.
spicata. 7. *P.* foliis ovatis villosis, floribus lateralibus solitariis. *Suppl.*
p. 225.
anthylloi- 8. *P.* foliis ovatis villosis, floribus capitatis hirsutis. *Suppl.*
des. p. 225.
laxa. 9. *P.* foliis ovatis sparsis, floribus capitatis, ramis laxis cer-
nuis. *Suppl.* p. 226.
Metkan. 10. *P.* foliis ovatis incurvis quadrifariam imbricatis, caule to-
mentoso, floribus congestis sessilibus terminalibus. *Forsk.*
fl. aeg. arab. p. 81.
grandi- 11. *P.* glaberrima, foliis oblongis acutis concavis extrinsecus
flora. rugosis, floribus terminalibus sessilibus solitariis. *Suppl.*
p. 226.

490. LACHNAEA. Cal. 0. Cor. 4fida: limbo
inaequali. Sem. 1. sub-
baccatum.

erioce- 1. L. capitulis solitariis lanatis, foliis quadrifariam imbricatis.
phala.

conglome- 2. L. capitulis confertis, foliis laxis. *Breyer cent. 18. t. 7.*
merata.

491. BAECKEA. Cal. infundibuliformis, 5dentatus.
Cor. 5petala. Caps. subglo-
bosa 3-4locularis, coronata,
femiinfera. Sem. pauca.

frutescens. I. BAECKEA. *Osbeck. it. t. 1. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 31. f. 7.*

DIGYNIA.

TONDIN. Cor. 8-9petala. Cal. 4fidus. Nectaria 4.
Sem. 4breviora. Pericarp. 3locula-
re, 3valve.

furina- 1. TONDIN. *Schilling de lepra. t. 1.*
menium.

LITCHI. Cor. 5petala. Cal. 5dentatus. Filament.
6-8 subtus pubescentia. Germ. 2lobum.
Stigm. divergentia. Drupa subrotun-
da: nucleo ovali.

sinense. 1. LITCHI. *Sonner. it. ind. 2. t. 129.*

1259. SCHMIEDELIA. Cal. 2phyllus. Cor. 4petala.
Germina pedicellata,
flore longiora. Baccae
2 subglobosae, 1per-
mae.

racemosa. I. SCHMIEDELIA. *Mant. p. 67. 514. Burm. ind. t. 32. f. 1.*

492. GALENIA. Cal. 4fidus. Cor. o. Caps. subrotunda, 2sperma.

africana. 1. G. erecta fruticosa, foliis linearibus carnosis. *Suppl. p. 227. Mill. illustr. ic.*

procumbens. 2. G. procumbens, foliis ovatis canaliculatis: apice patulo recurvato. *Suppl. p. 227.*

493. WEINMANNIA. Cal. 4phyllus. Cor. 4petala. Caps. 2locularis, 2rostris.

pinnata. 1. W. foliis pinnatis: foliolis obovatis crenatis laevibus. *Suppl. p. 228.*

tomentosa. 2. W. foliis pinnatis: foliolis ovatis integerrimis subtus tomentosis, stipulis caducis. *Suppl. p. 227.*

hirta. 3. W. foliis pinnatis: foliolis ovatis serrato-crenatis: subtus racemisque hirsutis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 63.*

trifoliata. 4. W. foliis ternatis: foliolis elliptice lanceolatis serratis glaberrimis, paniculis compositis. *Suppl. p. 227.*

racemosa. 5. W. foliis simplicibus ovatis serratis petiolatis utrinque glaberrimis, stipulis nullis, racemis axillaribus solitariis. *Suppl. p. 227.*

parviflora. 6. W. foliis simplicibus ovatis serratis subsessilibus, racemis terminalibus ternis quinisque. *Forst. fl. austr. p. 29.*

394. MOEHRINGIA. Cal. 4phyllus. Petala 4. Caps. 2locularis, 4valvis,

muscosa. 1. MOEHRINGIA. *Jacq. fl. austr. 5. t. 449.*

1388. CODIA. Cal. 4phyllus. Petala 4. Receptaculum commune involucreatum.

montana. 1. CODIA. *Suppl. p. 228. Forst. char. gen. t. 30.*

1074. CORYLUS. Flores monoici. Cor. o.
 ♂. Cal. 1phyllus, 3fidus, squa-
 miformis, iflorus.
 ♀. Cal. 2phyllus lacerus. Nux
 ovata.

Avellana. 1. C. stipulis lanceolatis, ramulis pilosis. *Blackw. herb. t. 293.*

rostrata. 2. C. stipulis lanceolatis, ramulis glabris. *Ait. hort. Kew. 3.
 p. 364.*

americana. 3. C. stipulis lato-subulatis obliquis subincisis. *Walt. flor.
 na. carol. p. 236.*

Columa. 4. C. stipulis linearibus acutis. *Seb. mus. 1. t. 27. f. 2.*

LUZIOLA. Flores monoici. Cor. o. Cal. 2valvis,
 muticus.

♂. Stam. 8-10. Antherae pedunculatae.

♀. Sem. ovatum, nudum.

peruviana, 1. LUZIOLA. *Jussieu gen. plant. p. 33.*

TRIGYNIA.

495. POLYGONUM. Cal. o. Cor. 5partita, cali-
 cina. Sem. 1. angulatum,
 (in plurimis) nudum.

* caule frutescente, Atraphaxoides.

frutes- 1. P. foliolis calicis duobus reflexis, *Gmel. fl. sibir. 3. t. 12,
 cens, f. 1. 2.*

** caule herbaceo.

† floribus pentandris, Persicariae.

virginia- 2. P. floribus femidigynis: corollis subquinquefidis inaequali-
 num, bus, foliis ovatis.

lapathi- 3. P. floribus femidigynis, staminibus corollae regulari aequali-
 folium, bus. *Lob. ic. 315.*

amphibi- 4. P. floribus femidigynis, spica ovata. *Flor. day, t. 282.*
 um.

5. P.

filiforme. 5. P. floribus digynis, spicis filiformibus, foliis ovatis, stipulis ciliatis. *Thunb. flor. jap. p. 163.*

ocreatum. 6. P. floribus trigynis, foliis lanceolatis. *Gmel. fl. sib. 3. t. 8.*

TT floribus hexandris, capsulis unilocularibus, Perficariae.

Hydropiper. 7. P. floribus semidigynis, foliis lanceolatis, stipulis submuticis. *Blackw. herb. t. 119.*

minus. 8. P. floribus submonogynis, foliis lineari-lanceolatis, caule basi repente. *Curtis flor. Lond. t. 66.*

Perficaria. 9. P. floribus digynis, spicis ovato-oblongis, foliis lanceolatis, stipulis ciliatis. *Flor. dan. t. 702. β) Polygonum mite. Schrank baierisch. Flor. 1. p. 668. γ) Polygonum tomentosum. Hall. hist. stirp. Helv. ind. n. 1556.*

barbatum. 10. P. floribus trigynis, spicis virgatis, stipulis truncatis setaceo-ciliatis, foliis lanceolatis. *Sloan. hist. jam. 1. t. 3. f. 1.*

tinctorium. 33. P. floribus trigynis, spicis virgatis, stipulis truncatis ciliatis, foliis ovatis acutiusculis. *Ait. hort. Kew. 2. p. 31.*

TTT floribus heptandris, Perficariae.

orientale. 11. P. floribus digynis, foliis ovatis, caule erecto, stipulis hirtis hypocrateriformibus. *Rheed. h. malab. 12. t. 76.*

sagittatum. 12. P. floribus trigynis, foliis sagittatis, caule aculeato. *Gmel. fl. sibir. 3. t. 13. f. 2.*

arifolium. 13. P. floribus trigynis, foliis hastatis, caule aculeato. *Pluckn. amalth. t. 398. f. 3.*

perfoliatum. 14. P. foliis triangularibus, caule aculeato, stipulis perfoliatis, patentibus subrotundis. *Burm. ind. t. 31. f. 2.*

TTTT floribus octandris.

— digynis.

pensylvanicum. 15. P. pedunculis hispidis, foliis lanceolatis, stipulis muticis. *Curt. flor. Lond. t. 67. 68.*

— — trigynis.

† foliis oblongis, spica unica.

l caule simplicissimo, Bistortae.

Bistorta. 16. P. foliis ovatis in petiolum decurrentibus. *Flor. dan. t. 421.*

- Bellardi. 33. P. erectum; foliis elliptico-lanceolatis; vaginis ciliatis.
Allion. flor. pedem. t. 90. f. 2.
- viviparum. 17. P. foliis lanceolatis. *Flor. dan. t. 13.*
- || caule magis ramoso.
- articulatum. 18. P. spicis articulatis paniculatis, stipulis vaginalibus truncatis.
- divaricatum. 19. P. floribus racemosis, foliis lanceolatis, caule divaricato patulo. *Gmel. flor. sibir. 3. t. 11. f. 1.*
- undulatum. 20. P. floribus racemosis, foliis lanceolatis acuminatis undulatis. *Murray comm. Goett. 1774. p. 34. t. 5. Suppl. p. 228. Polygonum fibiricum.*
- aviculare. 21. P. floribus axillaribus, foliis lanceolatis, caule procumbente. *Flor. dan. t. 803. Curt. flor. Lond. t. 60.*
- maritimum. 22. P. floribus axillaribus, foliis ovali-lanceolatis sempervirentibus, caule suffrutescente. *Kniph. bot. orig. cent. 11. n. 85.*
- erectum. 23. P. floribus axillaribus, foliis ovalibus, caule erecto.
- ferratum. 24. P. foliis crenatis.

†† foliis ad cordis figuram accedentibus, Helxine.

- sinense. 25. P. pedunculis scabris, foliis ovatis, bracteis cordatis. *Burm. ind. t. 30. f. 3.*
- crassifolium. 26. P. foliis hastatis carnosissimis, caule decumbente inermi. *Murray comm. Goett. 1774. t. 6.*
- tataricum. 27. P. foliis cordato-sagittatis, caule inermi erecto, seminibus subdentatis. *Gmel. flor. sibir. 3. t. 13. f. 1.*
- Fagopyrum. 28. P. foliis cordato-sagittatis, caule erectiusculo inermi, seminibus angulis aequalibus. *Knorr del. hort. 2. t. F.*
- Convulvulus. 29. P. foliis cordatis, caule volubili angulato, floribus obtusatis. *Flor. dan. t. 344.*
- multiflorum. 30. P. foliis cordatis, caule volubili angulato, florum panicula ramosa. *Thunb. flor. jap. p. 169.*
- dumetorum. 31. P. foliis cordatis, caule volubili laevi, floribus carinato-alatis. *Flor. dan. t. 756.*
- scandens. 32. P. foliis cordatis, caule erecto scandente. *Sloan. hist. jant. 1. t. 90. f. 1.*

COLLIGUAJA. Flores monoici. Cor. o. Cal. 4fidus.
♀. Caps. 3angularis, 3sperma.

odorifera. I. COLLIGUAJA. *Molin. hist. nat. Chil. p. 134.*

PONAEA. Cal. 5partitus, patens. Petala 4, apice
glandulis piliferis aucta. Germen 3
quetrum. Caps. 3alata, 3ocularis:
loculis 1spermis.

gujanensis. I. PONAEA. *Aubl. pl. guj. I. p. 359. t. 140.*

496. **COCCOLOBA.** Cal. 5partitus, coloratus, de-
mum baccatus, clausus.
Cor. o. Drupa ex calice
baccato 1sperma.

pubescens. I. C. foliis orbiculatis pubescentibus. *Pluckn. phyt. 222. f. 8.*

emargi- 2. C. foliis coriaceis subrotundis exciso-emarginatis. *Jacq.*
nata. *obs. bot. I. t. 9.*

leoganen- 10. C. foliis subrotundis integerrimis nitidis, racemis fructuum
fis. erectis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 260. f. 30.*

Uvifera. 3. C. foliis cordato-subrotundis nitidis. *Jacq. stirp. amer.*
pict. t. 110.

barbaden- 4. C. foliis cordato-ovatis undulatis. *Jacq. obs. bot. I. t. 8.*
fis.

australis. 5. C. foliis cordato-ovatis acutis, floribus polygamis. *Forst.*
fl. austr. p. 29.

diversifo- 11. C. foliis ovato-cordatis: ramusculorum ovatis. *Jacq.*
lia. *stirp. amer. pict. t. 113.*

excoriata. 6. C. foliis ovatis, ramis quasi excorticatis. *Jacq. stirp. amer.*
pict. t. 115.

tenuifolia. 7. C. foliis ovatis membranaceis. *Brown. jam. t. 14. f. 3.*

punctata. 8. C. foliis lanceolato-ovatis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 114.*

flaves- 12. C. foliis lanceolato-oblongis obtusis mucronatis. *Jacq.*
cens. *stirp. amer. pict. t. 112.*

obtusifo- 13. C. foliis oblongis obtusissimis. *Jacq. stirp. amer. pict.*
lia. *t. 111.*

nivea. 9. C. foliis ellipticis acuminatis venosis supra nitidis, racemis erectiusculis. *Jacq. stirp. amer. p. 115. t. 78.*

497. PAULLINIA. Cal. 5phyllus. Petala 4. Ne-
ctaria; altero glandulis 4;
altero 4phylo, inaequali.
Caps. simplex, 3locularis,
3valvis. Sem. 2loba, foli-
taria.

asiatica. 1. P. foliis ternatis; petiolis cauleque aculeatis. *Jacq. obs. bot. 3. t. 61. f. 1.*

Cururu. 2. P. foliis ternatis; petiolis marginatis. *Jacq. obs. bot. 3. t. 61. f. 4.*

nodosa. 3. P. foliis ternatis; petiolis nudis; foliolo medio obovato. *Jacq. obs. bot. 3. t. 61. f. 3.*

Seriana. 4. P. foliis ternatis, petiolis nudis, foliolis ovato-oblongis. *Jacq. obs. bot. 3. t. 61. f. 2. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 79. f. 3.*

mexicana. 5. P. foliis triternatis; petiolis omnibus marginatis, caule acu-
leato. *Jacq. obs. bot. 3. t. 61. f. 5.*

cartha- 6. P. foliis biternatis; petiolis omnibus marginatis, caule iner-
ginensis. mi. *Jacq. obs. bot. 3. t. 61. f. 6.*

caribaea. 7. P. foliis biternatis; petiolulis omnibus marginatis, ramis
aculeatis. *Jacq. obs. bot. 3. t. 61. f. 7.*

curassavi- 8. P. foliis biternatis; petiolulis omnibus marginatis, ramis
ca. inermibus. *Jacq. obs. bot. 3. t. 61. f. 8.*

barbaden- 9. P. foliis biternatis; petiolo intermedio marginato; reliquis
fis. *Jacq. obs. bot. 3. t. 61. f. 9.*

divarica- 10. P. foliis biternatis; foliolis ovatis acutis subintegrif; petio-
ta. lis nudis, paniculis divaricatis, alis capsularum ovatis.
Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 64.

poly- 11. P. foliis triternatis; petiolulis nudis. *Jacq. obs. bot. 3.
phylla. t. 61. f. 10.*

triterna- 12. P. foliis triternatis; petiolulis marginatis. *Jacq. obs. bot.
ta. 3. t. 61. f. 11. stirp. amer. pict. t. 260. f. 29.*

japonica. 13. P. foliis quinato-pinnatis; petiolulis marginatis, caule her-
baceo inermi. *Thunb. fl. jap. p. 170.*

- Vesperti-lio. 14. *P.* foliis pinnatis: foliolis ovato-acuminatis incisfis; petioli-
lis nudis, capsulis pedicellatis: alis horizontalibus lanceo-
latis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 64.*
- pinnata. 15. *P.* foliis pinnatis nitidis; petioli marginatis. *Jacq. obs.
bot. 3. t. 61. f. 12. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 79. f. 3.*
- tomento-
fa. 16. *P.* foliis pinnatis tomentosis: petioli marginatis. *Jacq.
obs. bot. 3. t. 61. f. 13.*
- tetragona. 17. *P.* foliis pinnatis: pinnis integerrimis, capsula subalata.
Rumpf. amb. 5. p. 4. t. 2. f. 4.
- diversifo-
lia. 18. *P.* foliis supradecompositis: petioli marginatis; infimis
pinnatis, reliquis ternatis. *Jacq. obs. bot. 3. t. 61. f. 14.*

498. **CARDIOSPERMUM.** *Cal.* 5phyllus. *Petala* 4.
Nectarium 4phyl-
lum, inaequale. *Caps.*
3 ad axin connatae,
inflatae. *Semina* glo-
bosa, solitaria.

- Halicaea-*
bum. 1. *C.* foliis laevibus. *Rumpf. amb. 6. t. 24. f. 2. Gaertn. de
fr. et sem. cent. 5. t. 79. f. 2.*
- Corindum.* 2. *C.* foliis subtus tomentosis.
- grandiflo-*
rum. 3. *C.* foliis pubescentibus, capsulis acuminatis maximis laevi-
bus. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 64.*

499. **SAPINDUS.** *Cal.* 4phyllus. *Petala* 4. *Drupae*
baccatae 3, coadunatae. *Pu-*
tam. 2loculare. *Sem.* solitaria.

- trifoliatus.* 1. *S.* foliis ternatis.
- spinofus.* 2. *S.* foliis abrupte pinnatis, caule spinosissimo. *Brown. jam.
t. 20. f. 2.*
- Saponaria.* 3. *S.* foliis impari-pinnatis, caule inermi. *Commel. h. amst.
1. t. 94. β) Sapindus frutescens. Aubl. pl. guj. 1. t. 138.
γ) Sapindus arborecens. Aubl. pl. guj. 1. t. 139.*
- sinensis.* 4. *S.* foliis pinnatis: foliolis laciniatis. *Herit. fert. angl. t. 19.*
- rigidus.* 5. *S.* foliis quaterne pinnatis rigidis acutis. *Gaertn. de fr. et
sem. cent. 5. t. 70. f. 3.*

TETRAGYNIA.

500. PARIS. Cal. 4phyllus. Petala 4 angustiora.
Bacca 4ocularis.

quadrifolia. I. PARIS. Flor. dan. t. 139.

501. ADOXA. Cal. 2fidus, inferus. Cor. 4-5fida,
supera. Bacca 4-5ocularis, cum
calice coalita.

Moschata. I. ADOXA. Flor. dan. t. 94. Curt. flor. Lond. t. 137.

502. ELATINE. Cal. 4phyllus. Petala 4. Caps.
4ocularis, 4valvis, depressa.

Hydropiper. I. E. foliis oppositis. Flor. dan. t. 156.

Alfinastrum. 2. E. foliis verticillatis. Vaill. fl. parif. t. 1. f. 6.

1389. HALORAGIS. Cal. 4fidus, superus. Petala 4.
Drupa infera, 4gona, 4-
sperma.

prostrata. I. H. foliis oblongis integerrimis mucronatis, fructibus glo-
bosis. Forst. char. gen. t. 31.

alata. 2. H. foliis ovato-lanceolatis ferratis, fructibus pyramidatis
tetragonis alatis. Jacq. pl. rar. ic. cent. 1. t. 26; annon
potius tetragonae species?

1070. QUERCUS. Flores monoici. Cor. o.
♂. Cal. 5-7fidus. Stam. 5-10.
♀. Cal. 1phyllus, integerrimus,
scaber. Stil. 2-5. Nux ova-
ta, coriacea, 1sperma, ma-
tura ilocularis.

sempervi- I. Q. foliis lanceolatis perennibus integerrimis subrevolutis.
rens. Walt. flor. carol. p. 234.

Phellos. 2. Q. foliis lanceolatis integerrimis deciduis seta terminatis.
Catesb. car. 1. t. 16. 17. 22.

- humilis. 3. Q. foliis lanceolatis integerrimis feta terminatis subtus tomentosis. *Walt. fl. car. p. 234.*
- pumila. 4. Q. foliis lanceolatis integerrimis glabris subtus glaucis. *Walt. flor. carol. p. 234.*
- moluca. 5. Q. foliis lanceolato-ovatis glabris integerrimis. *Rumpf. amb. 5. t. 56.*
- glabra. 6. Q. foliis lanceolato-oblongis acuminatis glabris. *Thunb. flor. jap. p. 175.*
- acuta. 7. Q. foliis oblongis cuspidatis integris: junioribus tomentosis. *Thunb. fl. jap. p. 175.*
- ferrata. 8. Q. foliis oblongis parallelo-nervosis. *Thunb. fl. jap. p. 176.*
- Cerris. 9. Q. foliis oblongis lyrato-pinnatifidis: laciniis transversis acutis subtus subtomentosis. *Du Roi, barb. Baumz. 2. t. 5. f. 1.*
- femina. 10. Q. foliis oblongis subpetiolatis obtusis pinnato-finuatis fructibus subsolitariis longe pedunculatis. *Kuorr del. hort. 1. t. E. 2.*
- Robur. 11. Q. foliis petiolatis oblongis superne latioribus: sinibus acutioribus; angulis obtusis, fructibus subsessilibus. *Mant. p. 496. von Gleichen das neuest. aus dem Reiche der Pflanz. t. 29.*
- Aegilops. 12. Q. foliis ovato-oblongis glabris ferrato-repandis. *Mill. ic. t. 215.*
- Suber. 13. Q. foliis ovato-oblongis indivisis ferratis subtus tomentosis, cortice rimoso fungoso. *Du Hamel arbr. 2. t. 80.*
- Ilex. 14. Q. foliis ovato-oblongis indivisis ferratisque subtus incanis, cortice integro. *Blackw. herb. t. 186.*
- coccifera. 15. Q. foliis ovatis indivisis spinoso-dentatis utrinque glabris. *Garid. fl. aix. t. 53. Regn. bot. t. 275.*
- Prinus. 16. Q. foliis ovatis utrinque acuminatis sinuato-ferratis: denticulis rotundatis uniformibus. *Catesb. Car. 1. t. 18.*
- cuspidata. 17. Q. foliis ovatis cuspidatis ferratis glabris. *Thunb. flor. jap. p. 176.*
- glauca. 18. Q. foliis obovatis acuminatis apice ferratis subtus glaucis. *Thunb. flor. jap. p. 175.*
- dentata. 19. Q. foliis obovato-oblongis obtusis inciso-dentatis subtus tomentosis. *Thunb. flor. jap. p. 177.*

- nigra. 20. Q. foliis cuneiformibus obsolete trilobis. *Du Roi herbk. Baumz. 2. t. 6. f. 1. β) Quercus marilandica. Catesb. Car. 1. t. 19.*
 rubra. 21. Q. foliis obtuse sinuatis fetaceo-mucronatis. *Catesb. car. 1. t. 23. β) Catesb. car. 1. t. 21. f. 1.*
 alba. 22. Q. foliis oblique pinnatifidis: sinibus angulisque obtusis. *Catesb. car. 1. t. 21. f. 2.*
 Esculus. 23. Q. foliis pinnatifidis: laciniis lanceolatis remotis acutis posteriorius angulatis. *Mant. p. 496.*
 palustris. 24. Q. foliis oblongis pinnatifidis: laciniis dentatis acuminatis seta terminatis. *Du Roi herbk. Baumz. 2. p. 268. t. 5. f. 4.*
 aquatica. 25. Q. foliis obcuneiformibus subtrilobis laevibus nitidis subperennibus. *Walt. flor. carol. p. 234.*
 laevis. 26. Q. foliis obtuse sinuatis laevibus fetaceo-mucronatis. *Walt. flor. carol. p. 234.*
 lyrata. 27. Q. foliis lyratis laevibus obtusissime sinuatis. *Walt. flor. carol. p. 235.*
 sinuata. 28. Q. foliis sinuatis laevibus obtusis subtus subglaucis. *Walt. flor. carol. p. 235.*
 villosa. 29. Q. foliis obtuse lobatis subtus villosis. *Walt. flor. carol. p. 235.*

1124. RHODIOLA. Flores dioici. Cal. 4partitus.
 ♂. Cor. 4petala.
 ♀. Cor. 0. Nectaria. 4. Caps. 4.
 polyspermae.

rosea. I. RHODIOLA. *Flor. dan. t. 483.*

1433. MARGARITARIA. Flores dioici. Cal. 4dentatus. Cor. 4petala.
 ♀. Stil. 4-5. Bacca cartilaginea, 4-5cocca.

nobilis. I. MARGARITARIA. *Suppl. p. 428. Pluckn. phyt. 176. f. 4.*

1066. MYRIOPHYLLUM. Flores saepe monoici.
 Cal. iphyllus, 4den-
 ratus. Petala 4 un-
 guiculata, caduca.
 Stil. o. Nuces 2-4
 corricatae.

spicatum. 1. M. caule ramoso, spicis terminalibus nudis interruptis: flo-
 ribus bracteatis, floribus pinnatis capillaribus. *Flor. dan.*
 t. 681.

verticilla-2. M. caule simplici, floribus verticillatis hermaphroditis, fo-
 tum. liis pinnatis: pinnis linearibus carnosis.

XANTHORHIZA. Cal. o. Petal. 5. Nectar. 5phyl-
 lum, pedicellatum. Fila-
 menta 5-10 receptaculo infer-
 ta. Caps. plures, ispermae.

apiifolia. 1. XANTHORHIZA. *Herit. stirp. nov. 4. p. 79. t. 38.*