

## CLASSIS IX:

## ENNEANDRIA.

## MONOGYNIA.

504. TINUS. *Cal.* 5fidus. *Cor.* 5petala. *Bacca* 3locularis.  
*Sem.* 1.
503. LAURUS. *Cal.* 0. *Cor.* 6petala, calicina. *Nectarii*  
glandulae 21etae. *Bacca* 1sperma.
520. ANACARDIUM. *Cal.* 5partitus. *Cor.* 5petala. *Stamina* 10, de-  
cimo castrato. *Nux* receptaculo carnofo.
- CAQUEPIRIA. *Cal.* elongatus supra foliis petiolatis, infra  
exterius squamulis auctus. *Cor.* 1petala  
tubo longissimo, limbo 9fido. *Antherae*  
sessiles, didymae. *Fructus* ovatus.  
*Sem.* arillata.
- CADAMBA. *Cal.* subquadridentatus, extrinsecus villosus.  
*Cor.* infundibuliformis, 9fida, extrinsecus  
villosa. *Antherae* subsessiles. *Drupa*  
globulosa: *Nux* 6loba, 6-9locularis:  
loculis 1spermis.
1225. ARECA. *Flores* monoici. *Cor.* 3petala. *Cal.* - -  
♀. *Drupa* calice imbricato.
505. CASSYTA. *Cal.* minimus 3phyllus. *Cor.* 6partita, cali-  
cina. *Nectarii* glandulae truncatae. *Bacca*  
1sperma.
- GINANNIA. *Cal.* 2plex: uterque 1phyllus. *Cor.* 3petala,  
patens. *Germen* pedicellatum, superius  
ala membranacea auctum. *Legumen* 2-  
valve, 1loculare, polyspermum.
- VOLUTELLA. *Cal.* 6phyllus. *Cor.* 6petala. *Nectarii* cor-  
nicula 3. *Antherae* subsessiles. *Bacca*  
1sperma.
- GERBERA. *Cal.* 1phyllus. *Cor.* 5petala. *Stigm.* 2lobum.  
*Caps.* coriacea, 2locularis. *Sem.* solitaria.
- PANKE. *Cal.* 4fidus. *Cor.* campanulata, 4fida. *Caps.*  
2valvis, 1locularis, 1sperma.
- PLEGORHIZA. *Cal.* 0. *Cor.* integra. *Caps.* oblonga, 1locu-  
laris, 1sperma.

\* *Schinus.* *Portulacae.*

## DIGYNIA.

1125. MERCURIALIS. *Flores dioici. Cal. 3partitus. Cor. 0.*  
 ♂. *Stamina 9-12. Antherae globosae, didymae.*  
 ♀. *Caps. 2cocca, 2locularis, 1sperma.*

\* *Quercus. Crataegus rotundifolia.*

## TRIGYNIA.

506. RHEUM. *Cal. 0. Cor. 6fida, persistens. Sem. 1. 3quetrum.*

\* *Quercus.*

## TETRAGYNIA.

\* *Quercus.*

## PENTAGYNIA.

\* *Quercus. Portulaca oleracea.*

## HEXAGYNIA.

507. BUTOMUS. *Involucr. simplex 3phyllum. Cor. 6petala.*  
*Caps. 6 polyspermae.*  
 1126. HYDROCHARIS. *Flores dioici. Cal. 3fidus. Cor. 3petala.*  
 ♂. *Spatha 2phylla. Filamenta 3 interiora stitilifera.*  
 ♀. *Caps. 6locularis, polysperma, infera.*

## MONOGYNIA.

1225. ARECA. Flores monoici. Cor. o.  
 ♂. Cal. 3phyllus.  
 ♀. Cal. 6phyllus. Drupa supera:  
 putamine chartaceo.

Catechu. 1. A. frondibus pinnatis: foliolis replicatis oppositis praemorsis.  
*Rumpf. amb. l. t. 4-8.* β) Areca fructibus sanguineis.  
*Koenig Naturf. 23. p. 201.* γ) Areca fructibus lacteis.  
*Koenig Naturf. 23. p. 201.*

oleracea. 2. A. frondibus pinnatis: foliolis integerrimis. *Jacq. stirp. amer. t. 170.*

CADAMBA. Cal. obsolete 4dentatus, exterius villosus. Cor. infundibuliformis, supera, 9fida. Antherae subsessiles. Drupa globulosa, obtuse 6gona. Nux subsexloba 6-glocularis: loculis ispermis.

jasmini- I. CADAMBA. *Sonner. it. ind. 2. p. 228. t. 128.*  
 flora.

503. LAURUS. Cal. o. Cor. calicina, 4-6partita. Nectarium glandulis 3 2setis, germen cingentibus. Filamenta interiora glandulifera. Bacca f. Antrum corticosum. Drupa ispermum. Flores saepe diclini.

Chloro- 1. L. foliis trinerviis ovatis coriaceis: nervis apicem attingentibus. *Brown. jam. t. 7. f. 1.*  
 xylon.

Cinnamo- 2. L. foliis trinerviis ovato-oblongis: nervis versus apicem  
 mum, evanescentibus. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 117. Flores dioici.*

Cassia. 3. L. foliis triplinerviis lanceolatis. *Blackw. herb. t. 319. an mera cinnamomi varietas?*

Culila- 4. L. foliis triplinerviis oppositis. *Mant. p. 237. Rumpf. amb.*  
 ban. 2. t. 14.

- montana. 5. L. foliis triplinerviis ovato-acuminatis perennantibus, floribus racemoso-paniculatis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 65.*
- Camphora. 6. L. foliis triplinerviis lanceolato-ovatis. *Blackw. herb. t. 347. Regn. bot. t. 432.*
- sumatrensis. 7. L. foliis nervosis ovalibus acuminatis. *Houttuyn act. Haarl. 21. cum ic. Ex hac camphora sumatrensis.*
- glauca. 8. L. foliis nervosis lanceolatis perennibus, ramulis tuberculatis, floribus solitariis. *Thunb. fl. jap. p. 173.*
- pedunculata. 9. L. foliis nervosis oblongis integris, floribus solitariis pedunculatis. *Thunb. flor. jap. p. 174.*
- Benzoin. 10. L. foliis enerviis ovatis utrinque acutis integris annuis. *Regn. bot. t. 419. Non exhibet benzoën.*
- aestivalis. 11. L. foliis venosis oblongis acuminatis annuis subtus rugosis, ramis supra axillaribus. *Catesb. Car. 2. t. 28?*
- nobilis. 12. L. foliis venosis lanceolatis perennantibus, corollis quadrididis. *Flores dioici. Regn. bot. t. 323.*
- exaltata. 13. L. foliis venosis ovato-lanceolatis coriaceis perennantibus, planis, racemis erectis compositis, corolla cyathiformi persistente. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 65.*
- coriacea. 14. L. foliis venosis ovatis acuminatis planis nitidis coriaceis, racemis erectis folio brevioribus. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 65.*
- membranacea. 15. L. foliis venosis oblongis acuminatis, convexis coriaceo-membranaceis, ramis racemisque erectis folio brevioribus. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 65.*
- martiniensis. 16. L. foliis oblongis acuminatis venosis planis, racemis paniculatis. *Jacq. collect. 2. p. 109. t. 5. f. 2. an distincta satis a praecedentibus?*
- geniculata. 17. L. foliis lanceolatis utrinque laevibus, caule dichotomo, gemmis pedicellatis trifloris. *Walt. flor. carol. p. 133.*
- melissae-folia. 18. L. foliis cordato-lanceolatis venosis membranaceis subtus pubescentibus, gemmis sessilibus trifloris. *Walt. flor. carol. p. 134.*
- pendula. 19. L. foliis venosis oblongis membranaceis perennantibus, racemis laxis, fructibus pendulis, corollis deciduis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 65.*
- Persea. 20. L. foliis transverse venosis ovatis coriaceis perennantibus, floribus corymbosis. *Jacq. stirp. amer. t. 264. f. 92. Sloan. hist. jam. 2. t. 222. f. 2.*

- foetens. 21. L. foliis ellipticis acutis perennantibus: venarum axillis  
subtus villosis, racemis elongatis compositis. *Ait. hort.*  
*Kew. 2. p. 39.*
- indica. 22. L. foliis lanceolatis perennantibus planis, ramulis tubercu-  
latis cicatricibus, floribus racemosis. *Seb. mus. 2. t. 84. f. 6.*
- Borbonia. 23. L. foliis lanceolatis perennantibus, corollis in fructu bac-  
catis. *Catesb. car. 1. t. 63.*
- triandra. 24. L. foliis lato-lanceolatis perennantibus planis, floribus  
triandris, corolla fructum tegente. *Swartz nov. pl. gen.*  
*et sp. p. 65.*
- Leucoxy- 25. L. foliis oblongo-lanceolatis planis perennantibus, race-  
lon. mis folio brevioribus; corollis inerassatis verrucosis. *Swartz*  
*nov. pl. gen. et sp. p. 65.*
- patens. 26. L. foliis ovato-lanceolatis planis membranaceis, racemis  
erectis diffusis folio longioribus. *Swartz nov. pl. gen. et*  
*sp. p. 65.*
- floribun- 27. L. foliis ovato-lanceolatis planis membranaceis, floribus  
da. racemoso-paniculatis laxis terminalibus. *Swartz nov.*  
*pl. gen. et sp. p. 65.*
- umbella- 28. L. foliis ovatis ferratis, ramulis umbellatis, floribus race-  
ta. mosis. *Thunb. flor. jap. p. 175.*
- caultica. 29. L. foliis ovalibus rugosis perennantibus, corollis quadri-  
dis. *Molin. hist. nat. Chil. p. 151.*
- lucida. 30. L. foliis oblongis ferratis, ramulis ternis, floribus axilla-  
ribus solitariis subsessilibus. *Thunb. fl. jap. p. 174.*
- Sassafras. 31. L. foliis trilobis integrisque. *Trew. Ehret. t. 69. 70. Flo-*  
*res mere masculi reliquis intersiti.*

**CAQUEPIRIA.** *Cal.* elongatus, infra ventricosus  
squamulisque extrinsecus, su-  
pra foliolis petiolatis acutus. *Cor.*  
4-petala: tubo longissimo; limbo  
4-partito. *Antherae* sessiles, 2-  
didymae. *Fructus* ovatus. *Sem.*  
arillata.

*Bergkia.* I. CAQUEPIRIA. *Sonner. it. nov. Guin. 1. p. 47. t. 17.*

520. ANACARDIUM. *Cal.* 5partitus. *Petala* 5 reflexa. *Antherae* 9, filamento decimo castrato. *Nux* reniformis supra receptaculum carnosum, grande.

occidentale. I. ANACARDIUM. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 121.*

504. TINUS. *Cal.* 5fidus. *Cor.* 5partita. *Nectarium* urceolatum, includens germen. *Bacca* 3locularis. *Sem.* solitaria.

occidentalis. I. TINUS. *Brown. jam. t. 21. f. 1. an clethrae generi subjungendus?*

PANKE. *Cal.* 4fidus. *Cor.* 4fida, campanulata. *Capsf.* 2valvis, 1locularis, 1sperma.

caulescens. I. P. caulescens, foliis quinquelobis, racemo terminali. *Molin. hist. nat. Chil. p. 120.*

acaulis. 2. P. acaulis, racemo radicali. *Molin. hist. nat. Chil. p. 121.*

PLEGORHIZA. *Cal.* 0. *Cor.* 1petala, integra. *Capsf.* oblonga, 1locularis, 1sperma.

Guaicura. I. PLEGORHIZA. *Molin. hist. nat. Chil. p. 140.*

GERBERA. *Cal.* 1phyllus. *Cor.* 5petala. *Stigm.* 2lobum. *Capsf.* coriacea, 2locularis: loculis 1spermis.

recentior. I. GERBERA. *Scop. introd. gen. 1297.*

VOLUTELLA. *Cal.* 6phyllus. *Cor.* 6petala. *Antherae* sessiles. *Nectarium* corniculis 3. *Drupa* 1sperma.

2phylla. I. VOLUTELLA. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 84.*

GINAN-

**GINANNIA.** *Cal.* 2plex: uterque iphyllus. *Petala* 3 fimbriata, patentia. *Germen* pedicellatum, superne ala membranacea auctum. *Legumen* 2-valve,iloculare, polyspermum.

gujanensis. 1. **GINANNIA.** *Aubl. pl. guj.* 1. p. 365. t. 141.

**505. CASSYTA.** *Cor.* calicina, 6partita. *Nectarium* glandulis 3 truncatis germen cingentibus. *Filamenta* interiora glandulifera. *Nux* supera isperma, evalvis, calice baccato vestita.

filiformis. 1. *C.* filiformis laxa. *Jacq. stirp. amer.* t. 116. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 2. t. 27. f. 4.

cornicu- 2. *C.* ramis lignosis spinosis. *Mant. p.* 237. *Burm. ind.* t. 33. f. 1.

zeylanica. 3. *C.* floribus hexandris. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 2. p. 134. t. 27. f. 4. litt. b-G.

## DIGYNIA.

**1125. MERCURIALIS.** *Flores* dioici. *Cor.* o. *Cal.* 3partitus.

♂. *Stamina* 9-12. *Antherae* globosae, didymae.

♀. *Caps.* 2cocca, 2locularis, isperma.

perennis. 1. *M.* caule simplicissimo, foliis scabris. *Flor. dan.* t. 400.

ambigua. 2. *M.* caule brachiato, foliis glabriusculis, floribus verticillatis: femineo masculisque. *Linn. dec.* 1. t. 8.

annua. 3. *M.* caule brachiato, foliis glabris, floribus spicatis. *Blackw. herb.* t. 162. *Belliard herb. Frank.* t. 159. 235.

tomentosa. 4. *M.* caule suffruticoso, foliis tomentosis.

TRI-

## TRIGYNIA.

506. RHEUM. *Cal.* 0. *Cor.* 6fida, persistens. *Sem.* 1. triquetrum, alatum.

Rhapon- I. Rh. foliis glabris: petiolis subfulcatis. *Knorr del. hort.* 2.  
ficum. t. R.

Rhabarba- 2. Rh. foliis subvillosis; petiolis aequalibus. *Regnault bot.*  
rum. t. 113.

palma- 3. Rh. foliis palmatis, acuminatis. *Aff. angl.* 1765. t. 12.  
tum. *Blackw. herb.* t. 600. a. b.

compa- 4. Rh. foliis sublobatis obtusissimis glaberrimis lucidis denticu-  
ctum. latis. *Mill. dict.* t. 218.

Ribes. 5. Rh. foliis granulatis: petiolis aequalibus. *Dill. h. Elth.*  
t. 158. f. 192.

tataricum, 6. Rh. foliis cordato-ovatis integris planis glaberrimis: petiolis  
femiteretibus angulatis, panicula fulcata. *Suppl.* p. 229.

hybri- 7. Rh. foliis cordatis acuminatis planis: radicalibus utrinque  
dum. subtridentatis; caulinis repandis. *Murray comment. Goett.*  
1779. p. 7. t. 1.

## HEXAGYNIA.

507. BUTOMUS. *Involucr.* simplex, 3phyllum. *Peta-*  
*tala* 6. *Capsf.* 6 polyspermae.  
*Semina* parietalia.

umbella- I. BUTOMUS. *Curt. flor. Lond.* t. 3. *Gaertn. de fr. et sem. pl.*  
rus. cent. 1. t. 19. f. 3.

1126. HYDROCHARIS. *Flores* dioici. *Cal.* 3fidus.  
*Cor.* 3petala.

♂. *Spatha* 2phylla. *Fila-*  
*menta* 3 interiora, sti-  
lifera.

♀. *Capsf.* 6ocularis, poly-  
sperma, infera.

Morsus I. HYDROCHARIS. *Flor. dan.* t. 878. *Curt. flor. Lond.* t. 167.  
ranac.

CLAS-