

CLASSIS X.

D E C A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

* Flores completi.

T polypetali.

— irregularares.

- | | |
|-------------------|--|
| 508. SOPHORA. | <i>Cor.</i> papilionacea : vexillo adscendente.
<i>Legumen</i> torulis remotis. |
| 509. ANAGYRIS. | <i>Cor.</i> papilionacea : vexillo brevi recto ; <i>cari-</i>
<i>nina</i> alis longiore. |
| MYROSPERMUM. | <i>Cor.</i> papilionacea : vexillo supra patentissi-
mo, alis aequali. |
| 510. CERCIS. | <i>Cor.</i> papilionacea : alis vexilliformibus. <i>Ne-</i>
<i>ctarium</i> glandula stiliformis sub ger-
mine. |
| 511. BAUHINIA. | <i>Cor.</i> patens, unguiculata, adscendens. <i>Pe-</i>
<i>tala</i> lanceolata. |
| 512. HYMENAEA. | <i>Cor.</i> subaequalis. <i>Legumen</i> lignosum pul-
pa farinosa. |
| 515. POINCIANA. | <i>Cor.</i> petalo summo majore. <i>Legumen</i> com-
pressum. |
| CUBAEA. | <i>Cor.</i> subaequalis. <i>Legumen</i> coriaceum, ven-
tricosum oblique acuminatum. |
| TRIGONIA. | <i>Petal.</i> superius foveis 2 notatum. <i>Caps.</i> 3-
gona, 3valvis,ilocularis. |
| MYROXYLON. | <i>Cor.</i> petalo summo majore, germine bre-
vior. <i>Cal.</i> campanulatus. <i>Legumen</i>
Isperrum. |
| 513. PARKINSONIA. | <i>Cor.</i> petalo infimo reniformi. <i>Legumen</i>
teres moniliforme. |
| 516. CAESALPINIA. | <i>Cor.</i> petalo infimo pulchriore. <i>Legumen</i>
rhombium. <i>Sem.</i> rhombea. |
| 524. TOLVIFERA. | <i>Cor.</i> petalo infimo majore. <i>Cal.</i> cam-
panulatus. |
| 514. CASSIA. | <i>Cor.</i> inaequalis. <i>Antherae</i> rostratae. <i>Le-</i>
<i>gumen</i> isthmis interceptum. |
| 517. GUILANDINA. | <i>Cor.</i> subaequalis, calici insidens. <i>Legu-</i>
<i>men</i> rhombium. <i>Sem.</i> ossea. |
| 522. DICTAMNUS. | <i>Cor.</i> patula. <i>Filamenta</i> pulverata. <i>Caps.</i>
5 connexae. <i>Sem.</i> arilla. |

— re.

— regulares.

ALANGIUM.

Petala 6-10 linearia. Stamina 10-12.
Cal. 6-10 dentatus, superus Bacca
sphaerica, 1locularis, 1-3sperma.

CADIA.

Petala 5-7. Stamina 10-14. Filamen-
ta basi introrsum gibba. Legumen
lineare, compressum, polypermum.
Cal. 5phyllus. Petala 5 lanceolata, refle-
xa. Bacca ovalis, multilocularis.
Sem. solitaria, oblonga.

URATEA.

Cal. 5phyllus. Petala subrotunda. An-
therae conjunctae. Germen 5gonum.
Stigm. 5.

DECODON.

Cal. 10dentatus. Petala 5 unguiculata.
Caps. 3locularis, 3valvis.

CANTUFFA.

Flores declini. Cal. 5fidus. Petala 5.lan-
ceolata.

MARSANA.

Cal. 5dentatus. Petala 5 lanceolata. Stig-
ma 5gonum. Nux ovalis, acumina-
ta 1locularis, 1sperma.

CRISTARIA.

Cal. 5dentatus. Petala 5 inter dentes ca-
lici inserta, staminibus duplo brevio-
ra. Sem. nudum ovatum, quinquan-
gulare alatum.

CACUCIA.

Cal. 5dentatus, campanulatus. Petala 5 ca-
lici ad incisuras inserta. Bacca sub-
quinqangularis, 1sperma.

TRISTEMMA.

Cal. 5fidus, semituperus, bifarium ciliatus.
Petala 5 unguiculata. Bacca ovata,
compressa, 5locularis.

MURIRI.

Cal. 5dentatus. Petala 5 subrotunda acu-
ta. Bacca globosa, infera, 1locula-
ris, 4sperma.

SANDORICUM.

Cal. 5dentatus. Petala 5 linearia. Dru-
pa sphaerica: nucibus 5 basi 2valvibus
1spermis.

GILIBERTIA.

Cal. 5dentatus, campanulatus. Petala 5
vel 4 lanceolato-obtusa. Stamina 8-
10 basi connexa. Caps. ovata, 4locu-
laris: loculis 1-2spermis.

HIPPOMANICA.

Cal. 4partitus. Petala 5. Caps. 4locula-
ris. Sem. plurima, reniformia.

519. CYNOMETRA.

Cal. 4partitus: lacinis oppositis majoribus.
Legumen 1spermum carnosum.

SIMA-

- SIMABA. *Cal. 4-5 partitus. Petala 4-5. Filam. 8-10. Germin. 4-5 connata. Stil. 1. Capl. 4-5 1loculares, 1spermae.*
- GUJERA. *Cal. 4dentatus. Petala 5. Stamin. exserta. Caps. cylindrico-pentagona, villosissima, 1locularis, polysperma.*
1260. PROSOPIS. *Cal. hemisphaericus. Legumen polyspermum.*
526. ADENANTHERA. *Antheris glandula insidens. Legumen compressum, membranaceum.*
525. HAEMATOXYLON. *Stigma infundibuliforme. Legumen 1loculare: valvis 2 inaequalibus.*
528. TRICHILIA. *Nectarium tubulosum, 5dentatum. Caps. 3locularis, 3valvis. Sem. baccata.*
1306. TURRAEA. *Nectarium tubulosum, 10dentatum. Caps. 5coccia. Sem. bina.*
527. MELIA. *Nectarium tubulosum, 10dentatum. Drupa nucleo 5loculari.*
521. SWIETENIA. *Nectarium tubulosum, 10dentatum. Caps. lignosa, 5valvis. Sem. imbricata: margine membranaceo.*
- EKEBERGIA. *Nectarium fertiforme, cingens germen. Bacc 5sperma. Sem. oblonga.*
1024. KLEINHOVIA. *Nectarium campanulatum, columnae cylindricae insidens, staminiferum. Cal. 5phyllus: Petala 5. Caps. inflata 5lobata.*
518. GUAJACUM. *Calicis laciniae 2extiores minores. Caps. carnosae, introrsum coalitae, 1spermae.*
- SCHOTIA. *Cal. semiquinquefidus, aequalis. Legumen pedicellatum.*
- GAERTNERA. *Cal. 5partitus. Petala patula: margine lacero-ciliata. Filamenta basi levissime coalita. Germen superum, 3dentatum. Caps. 4alata, 1locularis, 1sperma.*
523. RUTA. *Germen punctis 10 melliferis. Caps. 5fida, 5locularis, polysperma.*
531. TRIBULUS. *Stil. o. Caps. 5. connexae, polyspermae.*
530. ZYGOPHYLLUM. *Nectarium squamae 10 baseos staminum. Caps. 5locularis, polysperma.*
529. QUASSIA. *Caps. 5 2valves, 1spermae insertae receptaculo carnofo.*
657. OCHNA. *Cor. 5petala. Cal. 5phyllus. Antherae subfessiles. Drupae receptaculo subrotundo incrassato carnofo insertae.*

DECANDRIA.

1130. SCHINUS.
 533. THRYALLIS.
 534. LIMONIA.
 535. HEISTERIA.
 539. QUISQUALIS.
 536. MONOTROPA.
 553. CLETHRRA.
 554. PYROLA.
 546. LEDUM.
 1307. DIONAEA.
 1341. MURRAYA.
 PETALOMA.
 1261. CHALCAS.
 544. MELASTOMA.
 538. JUSSIEUA.

Flores dioici. Cal. 5fidus. Petala 5.
♀. Bacca 3cocea.
Cor. 5petala. Caps. 3cocea.
Cor. 3-5petala. Bacca 3sperma.
Cor. 5petala. Drupa insidens calici colorato incrementi.
Cor. 5petala, insidens calici filiformi. Drupa secca.
Cal. corollinus, basi gibbus. Caps. 5locularis, polysperma.
Stigm. 3fidum. Caps. 3locularis, polysperma.
Antherae fursum 2cornes. Caps. 5locularis, polysperma.
Cor. plana, 5partita. Caps. 5locularis, polysperma.
Cal. 5phyllus. Stigma fimbriatum. Caps. 1locularis. Sem. ad basin capsulae.
Cor. 5petala. Nectarium margine cingens germen. Bacca 1sperma.
Cal. cyathiformis, 5dentatus. Petala 5, calici inter dentes inserta. Bacca 1locularis, 1-4sperma.
Cor. campanulata. Bacca 2sperma.
Cor. calici insidens. Antherae refractae apice hiantes. Bacca 2-5locularis, calice vestita, polysperma.
Cor. 4-5petala. Caps. infera.

* *Contortae et Gerania multa. Jacquinia racemosa. Conocarpus racemosa. Mangifera decandra. Rhexia Acisanthera, leucantha, purpurea. Gnidia daphnaefolia. Lythrum fruticans. Portulacae.*

TT Flores monopetali, aequales.

NICANDRA.

1285. CODON.

Cor. 1ofida: tubo brevissimo. Cal. turbinate, 4partitus, coloratus. Germen annulo membranaceo cinctum. Stigma peltatum gradiatum. Bacca subrotunda, 6falcata, 3locularis, polysperma.
Cor. campanulata 1ofida. Cal. 10partitus. Caps. polysperma.

CERA.

CERATOSTEMA.

Cor. coriacea, cylindrica, 5fida. *Cal.* turbinatus, 5fidus. *Antherae* longissimae apice 2furcae. *Caps.* 5locularis, polysperma.

549. ANDROMEDA.

Cor. campanulata, rotunda. *Caps.* 5locularis.

EPERUA.

Petalum lateribus basi convolutum. *Cal.* 4partitus. *Filam.* 9 inferne coalita, liberum. *Germen* pedicellatum. *Lignum* falcatum, iloculare, 2valve, elatice dehisces, 3-4permum.

548. RHODODENDRON.

Cor. infundibuliformis. *Stamina* declinata. *Caps.* 5locularis.

545. KALMIA.

Cor. limbo subtus 5corniculato. *Caps.* 5locularis.

550. EPIGAEA.

Cal. exterior 3phyllus: interior 5phyllus. *Caps.* 5locularis.

551. GUALTERIA.

Cal. exterior 2phyllus: interior 5fidus. *Caps.* 5locularis: calice baccato.

552. ARBUTUS.

Cor. ovata basi diaphana. *Bacca* 5locularis. *Cor.* infundibuliformis. *Drupa* ilocularis.

595. STYRAX.

Nux 1-2.

1391. INOCARPUS.

Cor. infundibuliformis. *Cal.* 2fidus. *Stamin.* duplii serie. *Drupa* 1sperma.

STRIGILIA.

Cor. 5partita: laciniis conniventibus. *Caps.* 6locularis: loculis 1spermis.

* *Vaccinia nonnulla*, *Anacardium*. *Sideroxylon decandrum*.

** *Flores incompleti*.

540. DAIS.

Cor. 1petala. *Involucrum* 4phyllum multiflorum.

Flores dioici.

♂. *Cal.* subnillus. *Cor.* 5fida, infundibuliformis. *Filamenta* in tubo corollae: alterna breviora.

♀. *Cal.* 5dentatus. *Cor.* 5petala. *Stigm.* 5. *Bacca* ilocularis polysperma.

Flores monoici.

♂. *Cal.* 4partitus. *Filamenta* 4, 6, 8, 10.

♀. *Cal.* o. *Germen* subrotundum. *Stil.* striatus. *Stigm.* 5capillaria.

CRUDIA.

Cal. 4partitus, inaequalis, persistens, tubo brevi. *Filamenta* collo calicis inserta. *Germen* acinaciforme. *Stigma* incrassatum. *Legumen* evalve, 1loculare, 2spermum.

CYCLAS.

Cal. 4partitus, patens: tubo brevi turbinate. *Filamenta* calicis collo inserta. *Germen* ovato-oblongum. *Legumen* alatum, 1loculare, 1spermum.

TANIBUCA.

Cal. 5partitus, campanulatus. *Germen* inferum.

AQUILARIA.

Cal. turbinatus, coriaceus, semiquinquepartitus. *Stamina* bafi connexa. *Caps.* pyriformis, 2valvis, 2locularis: loculis 1spermis.

543. SAMYDA.

Cal. 5fidus. *Nectarium* 10-18fidum, cingens *germen*. *Caps.* 1locularis, 4falcata, 4valvis, polysperma, coriacea.

ASEARIA.

Cal. 5phyllus. *Nectar.* 4-5phyllum. *Caps.* coriacea 1locularis, 3valvis, polysperma.

541. BUCIDA.

Cal. 5partitus. *Bacca* 1sperma.

MYROBALANIFERA.

Cal. campanulatus, 10dentatus. *Drupa*.

REYNOUTRIA.

Cal. 5phyllus. *Filam.* brevissima. *Germ.*

ANAVINGA.

Cal. 3gonum. *Fructus*.

1283. TERMINALIA.

Cal. 5phyllus, squamatus ad basin foliorum. *Bacca* polysperma.

CHUNCOA.

Flores mere masculi intermixti. *Cal.* 5partitus.

DETARIUM.

Drupa infera, cymbiformis.

542. COPAIFERA.

Flores mere masculi intersiti. *Cal.* 5fidus

patens. *Caps.* 1sperma, 5gona: an-

gulis alatis.

Cal. 4fidus. *Drupa* orbicularis: *officulum*

1spermum fibris reticulatum.

Cor. 4petala.

* *Nyssa. Stellera Chamaejasma, Laurus Borbonia. Mer-*

curialis. Bergera Koenigii nondum satis dilucidata.

D I G Y N I A.

562. SCLERANTHUS.

Cor. o. *Cal.* 5fidus, superus. *Sem.* 2.

537. TRIANTHEMA.

Cor. o. *Caps.* circumscissa.

558. CHRYSOSPLENIUM. *Cor. o. Cal. superus. Caps. 2locularis, 2rostris.*
555. ROYENA. *Cor. 1petala. Cal. ventricosus. Caps. 4-sperma, 4valvis.*
- THURARIA. *Cor. 1petala. Cal. tubulosus. Caps. 2locularis, 2sperma.*
- ROKEIEKA. *Cor. 5petala. Cal. 5fidus, persistens. Caps. compressa, 1locularis.*
557. HYDRANGEA. *Cor. 5petala. Cal. 5fidus, superus. Caps. 2locularis, 2rostris, circumscissa.*
559. SAXIFRAGA. *Cor. 5petala. Cal. 5partitus. Caps. 1locularis, 2rostris.*
560. TIARELLA. *Cor. 5petala. Cal. corollifer. Caps. 2valvis: valva altera majore.*
561. MITELLA. *Cor. 5petala. Petala pectinata. Cal. corollifer. Caps. 2valvis.*
556. CUNONIA. *Cor. 5petala. Cal. 5phyllus. Caps. 2locularis, acuta.*
563. GYPSOPHILA. *Cor. 5petala. Cal. 5partitus, campanulatus. Caps. 1locularis, globosa.*
564. SAPONARIA. *Cor. 5petala. Cal. tubulosus basi nudus. Caps. 1locularis, oblonga.*
565. DIANTHUS. *Cor. 5petala. Cal. tubulosus basi squamosus. Caps. 1locularis, oblonga.*

* *Contortae multae. Quercus. Carpinus. Crataegus rotundifolia.*

TRIGYNIA.

- BRUNNICHIA. *Caps. 1locularis. Cor. o. Stigmata obtusa, 2fida, divergentia.*
569. ARENARIA. *Caps. 1locularis. Petala integra, patentia.*
568. STELLARIA. *Caps. 1locularis. Petala 2partita, patentia.*
566. CUCUBALUS. *Caps. 3locularis. Petala 2fida: fauce nuda.*
567. SILENE. *Caps. 1-3locularis. Petala (ut plurimum) 2fida: fauce coronata.*
570. CHERLERIA. *Caps. 3locularis. Neetaria petaloidea, calice minora.*
- DEUTZIA. *Caps. 3locularis. Filamenta 3cuspidata.*
571. GARIDELLA. *Caps. 3 distinctae. Petala calicina. Neetaria 5 labiata.*
- CAUCANTHUS. *Drupa? Petala 5 patentia, integra, nuda.*

575. ERYTHROXYLON. *Drupa 1sperma. Petala basi squama instrueta.*
572. MALPIGHIA. *Bacca 3sperma. Petala 5 unguiculata. Cal. glandulosus.*
573. BANISTERIA. *Caps. 3alatae. Petala 5 unguiculata. Cal. glandulosus.*
569. HIRAEA. *Caps. 3. 3alatae, 1spermae. Petala 5 unguiculata. Cal. minimus.*
- HORTENSIA. *Fructus - - - Cor. 5partita, minima. Cal. corollinus.*
1308. TRIOPTERIS. *Caps. 3 2alata. Petala 6, praeter 3minora. Flores polygami. Cal. 5dentatus. Petala 5 basi convoluta.*
- ALANTHUS. *♀. Stamin. 2-3.
♀. Pift. 3-5. Caps. 3-5compressae, membranaceae, lingulatae, medio tumidae 1spermae.*
- * *Tamarix germanica. Clutia Elateria. Polygonum Biflora. Quercus.*

TETRAGYNIA.

* *Lychnis alpina. Quercus.*

PENTAGYNIA.

578. COTYLEDON. *Caps. 5 ad nectaria. Cor. 1petala.*
579. SEDUM. *Caps. 5 ad nectarium. Cor. 5petala.*
1025. HELICTERES. *Caps. 5 intortae. Nectarium 5phyllum. Cor. 5petala. Cal. 1phyllus, obliquus.*
- CNESTIS. *Caps. 5 leguminiformes, coriaceae, 2valves, 1spermae, utrinque villoso-pruientes. Cal. 5partitus. Petala 5.*
580. PENTHORUM. *Caps. 5loba. Cor. 5petala aut o.*
1309. BERGIA. *Caps. 5locularis, 5valvis: valvis horizontali dehiscentibus.*
582. OXALIS. *Caps. 5locularis, angulata. Cor. basi subcohaerens.*
584. LYCHNIS. *Caps. 1-3 5locularis, oblonga. Cal. oblongus, membranaceus.*
583. AGROSTEMMA. *Caps. 1locularis, oblonga. Cal. tubulosus, membranaceus.*

585. CERASTIUM. *Caps. 1locularis. Petala 2fida. Cal. 5-phyllus.*
586. SPERGULA. *Caps. 1locularis. Petala integra. Cal. 5-phyllus.*
1128. KIGGILARIA. *Caps. 1locularis 5valvis. Cor. 5petala. Cal. 5partitus. Nectarium glandulae 5.*
- JONCQUETIA. *Caps. 1locularis, 5valvis, 5sperma. Cor. 5petala. Cal. 5phyllus.*
- ROBERGIA. *Drupa ovata: Nux 1locularis; putamine 2valvi. Cor. 5petala. Cal. 1phyllus.*
577. SPONDIAS. *Drupa nucleo 5loculari. Cal. 1phyllus.*
576. AVERRHOA. *Pomum 5loculare. Cal. 5phyllus.*
1235. GRIELUM. *Sem. 5 distincta, mutica. Cor. 5petala. Stili o.*
581. SURIANA. *Sem. 5 subrotunda. Cor. 5petala. Stili filiformes, laterales.*
1262. FORSKOHLÉA. *Sem. 4-5 lana involuta. Caps. 8-10petala.*
1129. CORIARIA. *Sem. 5petalis succulent - baccatis tecta. Cor. 5petala, calici simillima connecta. Flores dioici.*
- POUPARTIA. *Fructus nuce 5loculari. Cal. 5fidus. Petala 5. Stili approximati.*

* *Adoxa. Gerania. Quercus. Drosera lusitanica. Portulaca oleracea.*

DECAGYNIA.

587. NEURADA. *Cal. 5partitus. Cor. 5petala. Caps. 10ecocca.*
588. PHYTOLACCA. *Cal. 5phyllus, corollinus. Cor. o. Bacc. 10ecocca.*

MONOGYNIA.

508. SOPHORA. *Cal. 5dentatus, superne gibbus.*

Cor. papilionacea: alis longitudine vexilli. Legumen.

- monosperma. 1. *S. foliis impari-pinnatis: pinnis quinquejugis, leguminibus monospermis, caule arboreo.* Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 66.
- havanensis. 23. *S. foliis impari-pinnatis: foliolis numerosis oblongo-ovatis emarginatis villosis.* Jacq. Stirp. amer. piit. t. 261. f. 62.
- alopecuroides. 2. *S. foliis pinnatis: foliolis numerosis villosis oblongis, caule herbaceo.* Buxb. cent. 3. t. 46.
- tomentosa. 3. *S. foliis pinnatis: foliolis numerosis subrotundis tomentosis.* Herm. parad. lugdb. t. 171.
- occidentalis. 4. *S. foliis pinnatis: foliolis numerosis subrotundis.* Trew. Ehret. 27. t. 59. an vere distincta a tomentosa?
- capensis. 5. *S. foliis pinnatis: foliolis numerosis lanceolatis subtus tomentosis, caule fruticoso.* Mant. p. 67.
- tetrapeta. 18. *S. foliis pinnatis: foliolis numerosis lanceolato-oblongis villosiculis, leguminibus membranaceo-quadrangulis, caule arboreo.* Ait. hort. Kew. 2. p. 43.
- microphylla. 6. *S. foliis pinnatis: foliolis numerosis obovatis emarginatis, leguminibus tetragonis: angulis membranaceis caule arboreo.* Suppl. p. 230.
- flavescens. 19. *S. foliis pinnatis: foliolis numerosis oblongis glabris, caule herbaceo.* Ait. hort. Kew. 2. p. 43.
- japonica. 7. *S. foliis pinnatis: foliolis pluribus ovatis glabris, caule arboreo.* Mant. p. 68.
- heptaphylla. 8. *S. foliis pinnatis: foliolis septenis glabris.* Rumpf amb. 4. t. 22.
- genistoides. 9. *S. foliis ternatis sessilibus: foliolis linearibus.* β) Sophora gallioides. Pluckn. phyt. 413. f. 5.
- tinctoria. 10. *S. foliis ternatis subsessilibus: foliolis obovatis glabris, stipulis minutis.* Mant. p. 377.
- australis. 11. *S. foliis ternatis subsessilibus glabris, stipulis ensiformibus.* Mant. p. 378.

- fupinoides. 12. S. foliis ternatis petiolatis: foliolis ovalibus pilosis.
 alba. 13. S. foliis ternatis petiolatis: foliolis ellipticis glabris, stipulis subutatis brevibus. *Mant.* p. 440. *Sp. pl.* 1006.
Crotalaria alba. *Murray comment. Goett.* 1778. t. 6.
 villosa. 20. S. foliis ternatis lanceolatis, spica terminali: calicibus cauleque villosis. *Walt. flor. carol.* p. 134.
 lanceola- 21. S. foliis ternatis lanceolatis, caule recto, floribus axillari-
 ta. bus solitariis. *Walt. flor. carol.* p. 135.
 buxifolia. 14. S. foliis simplicibus ovalibus supra glabris subtus sericeis,
 pedunculis unifloris, calicibus basi intrufis tomentosis, coloratis. *Retz. obs. bot.* 1. p. 35.
 rotundi- 15. S. foliis simplicibus obovatis utrinque sericeis cun acumine obtusis, pedunculis unifloris, calicibus basi intrufis tomentosis. *Syst. nat.* XII. 3. p. 287. *Sophora biflora*. *Seb. mus.* 2. t. 99. f. 3.
 hirsuta. 22. S. foliis simplicibus hirsutis: superioribus ovatis; inferioribus subrotundis, calicis laciniis lanceolatis alas aequanti-
 bus. *Ait. hort. Kew.* 2. p. 46.
 calypt- 16. S. foliis simplicibus subovatis pubescentibus, pedunculis
 ta. unifloris, calicibus tomentosis. *Retz. obs. bot.* 1. p. 36.
 Retzii. 17. S. foliis simplicibus ovatis subtomentosis, pedunculis bifloris, calicibus basi intrufis tomentosis coloratis. *Retz. obs. bot.* 1. p. 36.

509. ANAGYRIS. *Cor. papilionacea: vexillo aliisque carina brevioribus. Legumen.*

* foetida. I. ANAGYRIS.

MYROSPERMUM. *Cor. papilionacea: vexillo supra patentissimo alis aequali. Caps. membranacea apice ilocularis: Semin. paucare. niformia.*

frutescens. I. MYROSPERMUM. *Jacq. stirp. amer. ed. 2. t. 118.*

510. CERCIS. *Cal. 5dentatus, inferne gibbus. Cor. papilionacea: vexillo sub alis brevi. Pericarpium leguminosum.*

Siliqua- 1. *C. foliis cordato-orbiculatis glabris.
strum.*

canaden- 2. *C. foliis cordatis pubescentibus. Voy. suppl. plant. Ehr.
sis. sel. t. CIV.*

511. BAUHINIA. *Cal. 5fidus, deciduus. Petala patula, oblonga, unguiculata calici inserta: superiore magis distante. Legumen.*

scandens. 1. *B. caule cirrhifero. Rheed. b. malab. 8. t. 29. β) Bauhinia Utimata. Aubl. pl. guj. I. p. 375. t. 144. γ) Bauhinia gujanensis. Aubl. pl. guj. I. p. 377. t. 145.*

aculeata. 2. *B. caule aculeato. Jacq. stirp. amer. pičt. t. 260. f. 31.*

divaricata. 3. *B. foliis ovatis: lobis divaricatis. Voy. suppl. pl. Ehr. sel. t. CVI.*

ungulata. 4. *B. foliis ovatis: lobis parallelis.*

glabra. 12. *B. foliis subrotundo-cordatis glabris: lobis semiorbiculatis, ramulis cirrhosis. Jacq. stirp. amer. pičt. t. 260. f. 32.*

acumina- 5. *B. foliis ovatis: lobis acuminatis semiovatis. Rheed. b. malab. I. t. 34. Bruce trav. in Eg. Ar. Ab. and Nub. 5. app. p. 57. ic.*

purpurea. 6. *B. foliis subcordatis bipartitis rotundatis subtus tomentosis. Rheed. b. malab. I. t. 33.*

tomento- 7. *B. foliis cordatis: lobis semiorbiculatis tomentosis. Burm. zeyl. t. 18.*

variegata. 8. *B. foliis cordatis: lobis coadunatis obtusis. Rheed. b. malab. I. t. 32.*

porrecta. 9. *B. foliis cordatis: lobis porrectis acutis trinerviis, floribus subdecandris: petalis lanceolatis. Plum. ic. 44. f. 2.*

candida. 10. *B. foliis cordatis: lobis ovatis obtusis subtus pubescentibus, calicibus superne attenuatis elongatis. Ait. hort. Kew. 2. p. 49.*

Cor.
alis
umi-

Ehr.

etala
nicu-
riore
en.

Bauhi-
Bauhi-

31.
.CVI.

icula-
f. 32.

b. ma-
i. app.

itosis.

lurm.

. ma-

ribus

centi-
hort.

I. E.

inermis. **II.** B. foliis subrotundis: lobis ovalibus divergentibus, leguminibus compressis tomentosis testaceis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 85.*

512. HYMENAEA. *Cal.* 4partitus. *Petala* 5 subaequalia. *Stilus* deflexus. *Legumen* repletum pulpa farinacea, polyspermum.

Courbaril. **I.** HYMENAEA. *Jacq. Stirp. amer. piēt. t. 264. f. 65.* *Pluckn. alm. t. 82. f. 2.*

513. PARKINSONIA. *Cal.* 5partitus. *Petala* 5ovata: infimo reniformi. *Stilus* filiformis, assurgens. *Legumen* moniliforme.

aculeata. **I.** PARKINSONIA. *Jacq. Stirp. amer. piēt. t. 119.*

CADIA. *Petala* 5-7. *Stamina* 10-14, basi introrsum gibba. *Pistillum* inflexum. *Legumen* lineare, compressum, membranaceum, polyspermum.

arabica. **I.** CADIA. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 90.*

ALANGIUM. *Petala* 6-10 linearia. *Stamina* 10-12. *Cal.* 6-10dentatus, superus. *Bacca* sphaerica, subcoriacea, ilocularis, 1-3sperma.

pungens. **I.** ALANGIUM. *Jussieu gen. plant. p. 323.*

514. CASSIA. *Cal.* 5phyllus. *Petala* 5. *Antherae* supernae 3 steriles, 3 infimae rostratae. *Legumen*.

* *Sennae.*

diphylla. **I.** C. foliis conjugatis, stipulis cordato-lanceolatis.

2. C.

- bacillaris. 2. C. foliis bijugis ovatis obliquis: glandula obtusa inter infima, racemis axillaribus pedunculatis, legumine tereti longo. *Suppl. p. 231.*
- Absus. 3. C. foliis bijugis obovatis: glandulis duabus subulatis inter infima. *Burm. zeyl. t. 97.*
- viminæ. 4. C. foliis bijugis ovato-oblongis acuminatis: glandula oblonga inter infima, spinis subpetiolaribus obsoletis tridentatis.
- sennoides. 5. C. foliis subtrijugis obovatis integerrimis: glandula inter infima foliola convexa, stipulis setaceis. *Jacq. collect. I. p. 75.*
- Apucuita. 6. C. foliis subtrijugis ovato-oblongis glabris integerrimis: glandula inter singula foliolorum paria, caule arboreo. *Aubl. pl. guj. 2. p. 379. t. 146.*
- Tagera. 7. C. foliis trijugis: glandula petiolari, stipulis ciliatis cordatis acuminatis. *Rheed. b. malab. 2. t. 52.*
- Tora. 8. C. foliis trijugis obovatis: exterioribus majoribus; glandula subulata inter inferiora. *Mant. p. 378. Dill. b. Elth. 2. t. 63. f. 63.*
- bicapsula. 9. C. foliis trijugis obovatis glabris: interioribus rotundioribus minoribus; glandula interjecta globosa. *Merian. surin. t. 32.*
- emarginata. 10. C. foliis trijugis ovatis rotundatis emarginatis aequalibus. *Sloan. hist. jam. 2. t. 180. f. 1-4.*
- obtusifolia. 11. C. foliis trijugis ovatis obtusifolis. *Dill. b. Elth. t. 62. f. 72.*
- Sunsub. 12. C. foliis trijugis obovatis ciliatis: exterioribus majoribus. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 86. an satis distincta a Tora?*
- carolinia. 13. C. foliis trijugis ovatis acuminatis: glandula petiolari, caule erecto. *Walt. flor. carol. p. 135.*
- sericea. 13. C. foliis subquadrijugis ovatis hirsutis: glandulis inter foliola subulatis, pedunculis quadrifloris, leguminibus trigonis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 66.*
- falcata. 14. C. foliis quadrijugis ovato-lanceolatis retro-falcatis: glandula baseos petiolorum.
- longifolia. 15. C. foliis quadrijugis: foliolis extimus lanceolatis; glandula subulata infra intima interque extima. *Suppl. p. 230.*
- Afchrek. 16. C. foliis subquinquejugis ovali-oblongis glabris cum acuminis obtusis: glandula subulata inter singula bina foliola. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 86.*

- sensitiva. 17. C. foliis subquinquejugis obovatis integerimis subvillosis: glandula petiolata inter singula foliorum paria. *Jacq. coll. 2. p. 362.*
- sinensis. 18. C. foliis subquinquejugis glabris lanceolato-oblongis: glandula petiolari, racemis axillaribus terminalibusque. *Jacq. collect. 1. p. 64.*
- lanceola- 19. C. foliis quinquejugis lanceolatis aequalibus. *Forsk. fl. ta. aeg. arab. p. 85.*
- lineata. 20. C. foliis quinquejugis oblongiusculis aequalibus subtus pubescentibus; glandula obsoleta sub infimis, pedunculis unifloris. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 66.*
- occiden- 21. C. foliis quinquejugis ovato-lanceolatis margine scabris: talis. exterioribus majoribus; glandula baseos petiolorum. *Commel. b. amst. 1. t. 26.*
- planifili- 22. C. foliis quinquejugis ovato-lanceolatis glabris: glandula qua. baseos petiolorum. *Plum. ic. 77.*
- patula. 23. C. foliis quinquejugis oblongis acutiusculis glabris: glandula baseos petiolorum, ramis laevibus. *Ait. hort. Kew. 2. p. 51.*
- Fistula. 23. C. foliis quinquejugis ovatis acuminatis glabris: petiolis eglandulatis. *Rumpf. amb. 2. t. 21.*
- atomaria. 24. C. foliis quinquejugis ovatis subtomentosis: petiolis terribus eglandulatis. *Mant. p. 68.*
- pilosa. 25. C. foliis quinquejugis eglandulatis, stipulis semicordatis acuminatis, caule stricto piloso.
- Senna. 26. C. foliis sejugis subovatis: petiolis eglandulatis. *Morif. hist. pl. 2. t. 24. f. 1. 2.*
- biflora. 27. C. foliis sejugis oblongiusculis glabris: inferioribus minoribus; glandula subulata inter infima, pedicellis bifloris. *Plum. ic. 78. f. 1.*
- rufscifolia. 28. C. foliis sejugis lanceolatis acutis glabris: glandula supra basin costae, floribus racemosis. *Jacq. collect. 1. p. 43.*
- hirsuta. 29. C. foliis sejugis late ovatis acuminatis lunatis.
- multiglan- 30. C. foliis sejugis subtus et margine villosis obtusis; glandula dulosa. inter omnia foliorum paria. *Jacq. pl. rar. ic. cent. 1. t. 99.*
- serpens. 31. C. foliis septemjugis, floribus pentandris, caulis filiformibus prostratis herbaceis.

- ligustrina. 32. C. foliis septemjugis lanceolatis: extimis minoribus; glandula baseos petiolorum. *Mant.* p. 378. *Dill. b. Elth.* t. 259. f. 338.
- stipulacea. 32. C. foliis suboctojugis ovato-lanceolatis: glandula inter inferiora, stipulis ovatis maximis. *Feuill. it.* 3. p. 56. t. 42.
- tomento- 33. C. foliis suboctojugis linearibus basi oblique rotundatis supra hirtis, paniculis axillaribus, leguminibus villosis. *Suppl.* p. 231.
- alata. 34. C. foliis octojugis ovali-oblongis: exterioribus minoribus; petiolis eglandulatis, stipulis patulis. *Mant.* p. 378. *Merian. surin.* t. 58.
- furattén. 34. C. foliis octojugis ovato-oblongis obtusis emarginatis: inferioribus minoribus: glandula ad basin binorum foliorum pedicellata. *Burm. ind.*
- marilan- 35. C. foliis octojugis ovato-oblongis aequalibus; glandula baseos petiolorum. *Dill. b. Elth.* t. 260. f. 339.
- tenuissi- 36. C. foliis novemjugis oblongis: glandula subulata inter infra.
- frondosa. 33. C. foliis novemjugis ovali-oblongis obtusiusculis: glandula cylindrica inter inferiora, petiolo basi eglandulofo. *Ait. bart. Kew.* 2. p. 53.
- Sophera. 37. C. foliis decemjugis lanceolatis: glandula baseos oblonga. *Burm. zeyl.* t. 98.
- braéteata. 38. C. foliis decemjugis oblongis obtusis eglandulatis, racemis elongatis: braéteis ovatis tumidis imbricatis, legumine quadrangulari compresso. *Suppl.* p. 232.
- virgata. 39. C. foliis decemjugis ovato-lanceolatis villosis glandula petioli pedicellata, pedunculis unifloris folio longioribus. *Swarts nov. pl. gen. et sp.* p. 66.
- auricula- 40. C. foliis duodecimjugis obtusis mucronatis: glandulis subulatis pluribus, stipulis reniformibus barbatis. *Pluckn. alm.* t. 314. f. 4.
- javanica. 41. C. foliis duodecimjugis oblongis obtusis glabris: glandula nulla. *Commel. b. amst.* 1. t. III.
- grandis. 42. C. foliis vigintijugis subholosericis eglandulatis. *Suppl.* p. 230. *Breyn. cent.* t. 14.

** *Chamaecristae.*

- Chamae- 43. C. foliis multijugis: glandula petiolari pedicellata, stipulis
cripta. *Commel. h. amst.* I. t. 37.
- glandulo- 44. C. foliis multijugis multiglandulatis: stipulis subulatis.
fa. *Breyn. cent.* t. 24.
- minosoi- 45. C. foliis multijugis linearibus: glandula baseos petiolorum
des. stipulis setaceis.
- flexuosa. 46. C. foliis multijugis, stipulis dimidiato-cordatis. *Breyn.*
cent. t. 23.
- Crista. 47. C. foliis multijugis oblongis obtusis integrimis; glandula
inter foliola intima, pedunculis axillaribus. *Jacq. Col-*
lect. I. p. 82.
- nictitans. 48. C. foliis multijugis, floribus pentandris, caule erectiusculo.
Hort. Cliffort. t. 36.
- procum- 49. C. foliis multijugis eglandulatis, caule procumbente.
bens.

515. POINCIANA. *Cal. 5partitus. Petala 5:* summo majore. *Stamina longa:* omnia foecunda. *Legumen oblongum polyspermum.*

bijuga. 1. P. aculeis solitariis, foliolis emarginatis. *Rumpf. amb.* 4.
t. 20.

pulcherri- 2. P. aculeis geminis. *Jacq. stirp. amer. piſt.* t. 120.
ma.

elata. 3. P. caule inermi. *Jacq. stirp. amer.* t. 175. f. 36.

CUBAEA. *Cal. 5partitus, patens. Petala 5 subae-*
qualia, unguiculata. Legumen ven-
tricosum, oblique acuminatum.

panicula- 1. C. foliis pinnatis: pinnis oppositis. *Aubl. pl. guj.* I. p. 372.
ta. t. 143. f. 1.

trigona. 2. C. foliis pinnatis: pinnis alternis. *Aubl. pl. guj.* I. p. 374.
t. 143. f. 2.

EPERUA. *Cal.* 4partitus. *Petal.* 1. calici insidens, lateribus basi convolutum. *Filament.* longissima, quorum 9 inferne coalita. *Germen* pedicellatum. *Legumen* coriaceum, falcatum, illiculare, 2valve, 3-4spermum.

falcata. 1. **EPERUA.** *Aubl. pl. guj.* 1. p. 369. t. 142.

1390. MYROXYLON. *Cal.* campanulatus. *Petala* 5: summo majore. *Germen* corolla longius. *Legumen* ispermum.

peruise- 1. **MYROXYLON.** *Suppl. p. 233. Hernand. mex. p. 51. ic. ex-*
rum. *hoc balsamum peruvianum.*

516. CAESALPINIA. *Cal.* 5fidus: lacinia infima majori. *Petala* 5: infimo pulchriore. *Legumen.*

vesicaria. 1. **C.** caule aculeato, foliolis obcordatis subrotundis. *Sloanea*
bifl. jam. 2. t. 181. f. 2. 3.

Sappan. 2. **C.** caule aculeato, foliolis oblongis inaequilateris emarginatis. *Rumpf. amb.* 4. t. 21.

Crista. 3. **C.** caule arboreo, foliolis ovatis integris, floribus pentandris. *Plum. gen.* t. 68.

517. GUILANDINA. *Cal.* iphyllus, hypocrateriformis. *Petala* calicis collo inserta, subaequalia. *Legumen* rhomboideum illiculare. *Semina* ossea.

Bonduc. 1. **G.** aculeata, pinnis ovatis: foliolis aculeis solitariis. *Rumpf.*
amb. 5. t. 48.

- Bondu-cell. 2. *G. aculeata*, pinnis oblongo-ovatis: foliolis aculeis geminis. *Rheed. b. malab.* 2. t. 22.
- Nuga. 3. *G. caule inermi*, foliis petiolo primario subtus aculeis geminis. *Rumpf. amb.* 5. t. 50.
- Moringa. 4. *G. inermis*, foliis tubbipinnatis: foliolis inferioribus ternatis. *Mant. p.* 379. *Blackw. herb.* t. 386. *Polygama.*
- dioica. 5. *G. inermis*, foliis bipinnatis: basi apiceque simpliciter pin-natis. *Du Hamel arb.* I. t. 103.

TRIGONIA. *Cal.* 5partitus. *Petala* 5 inaequalia: sumnum foveolis 2 notatum. *Stamina* interne in vaginam coalita, quorum antherae 3-7 steriles. *Stigma* capitatum. *Caps.* 3gonia, 3valvis, 1locularis, polysperma.

villofa. 1. *Tr.* foliis subtus villoso-incanis. *Aubl. pl. guj.* I. p. 388. t. 149.

Iaevia. 2. *Tr.* foliis utrinque glabris. *Aubl. pl. guj.* I. p. 390. t. 150.

SCHOTIA. *Cal.* semiquinquefidus, coloratus, inferius, corolla minor: laciniis aequalibus. *Petala* 5 aequalia, calicis tubo imposta. *Legumen?* pedicellatum.

speciosa. 1. **SCHOTIA.** *Syst. nat.* XII. 3. p. 291. *Guajacum afrum.* *Waltb. hort.* t. 2. *Jacq. collect.* I. p. 93. *Medicus Theodora speciosa monogr.* *Mannb.* 1786.

518. GUAJACUM. *Cal.* 5phyllus, inaequalis. *Petala* 5 receptaculo inf. rta. *Caps.* 2-5 subseffiles, membranaceae,ispermae, introrsum coalitae.

officinale. 1. *G.* foliolis bijugis. *Seb. mus.* I. t. 53. f. 2.

sanctum. 2. *G.* foliolis multijugis. *Blackw. herb.* t. 350. f. 3. 4.

dubium. 3. G. foliis conjugatis oblongo-lanceolatis. *Forst. fl. austri.*
p. 33.

519. CYNOMETRA. *Cal. 4phyllus. Antherae apice
2fidae. Legumen carno-
sum, lunatum, ispermum.*

cauliflora. 1. C. trunco florifero. *Rumpf. amb. I. t. 62.*

ramiflora. 2. C. ramis floriferis. *Rumpf. amb. I. t. 63. Banks t. IX.*

* *Speciem nondum satis definitam Manghas iconem illustrari
curavit Banks t. X.*

CRUDIA. *Cal. 4partitus oblique truncatus: tubo basi
anterius gibbo. Cor. o. Filamenta me-
dio inflexa: dorso antheras gerentia.
Germen acinaciforme, hispidum, pedi-
cellatum. Stigma incrassatum. Legu-
men ovatum, evalve, iloculare, 2-
spermum.*

Schreberi. I. CRUDIA. *Schreb. gen. pl. Linn. I. p. 282.*

CYCLAS. *Cal. 4partitus, patulus: tubo turbinato.
Cor. o. Stil. flexuosus. Legumen
subrotundum, alatum, iloculare,
ispermum.*

spicata. I. C. foliis pinnatis. *Aubl. pl. guj. I. p. 382. t. 147.*

aromatica. 2. C. foliis simplicibus. *Aubl. pl. guj. I. p. 384. t. 148.*

HIPPOMANICA. *Cal. 4partitus. Petala 5 ovata.
Caps. 4locularis, polysperma.*

fessilifolia. I. HIPPOMANICA. *Molin. hist. nat. Chil. p. 104.*

GUJERA. *Cal. 4dentatus, subcylindricus. Petala 5 parva. Stamina exserta. Caps. cylindrico-pentagona villosissima, ilocularis, subpentasperma. Semina pendula.*

senega- 1. GUJERA. *Jussieu gen. plant. p. 320.*
lensis.

CRISTARIA. *Cal. 5dentatus, intus villosus. Petala 5 ovalia, calici inter dentes inserta. Sem. 1 nudum, 5angulare: angulis membranaceis.*

coccinea. 1. CRISTARIA. *Sonner. it. ind. 2. p. 247. t. 140.*

MARSANA. *Cal. 5dentatus, inferus. Petala 5 lanceolata. Drupa ovalis, ilocularis: nucleo succulento.*

buxifolia. 1. MARSANA. *Sonner. it. ind. 2. p. 245. t. 139. an ad Murray referenda?*

SONNERATIA. *Cal. minimus, 4phyllus, extrinsecus villosus, inferus. Petala 5 lanceolata, reflexa. Baccæ ovalis, villosa, multilocularis. Sem. solitaria, oblonga.*

punctata. 1. SONNERATIA. *Sonner. it. ind. 2. p. 231. Wampi vel Cookia punctata.*

1285. CODON. *Cal. iopartitus, persistens: foliolis alternis brevioribus. Cor. campanulata iofida. Nectarium 10-loculare: squamis 10. Pericarpium 2loculare, polyspermum.*

Royeni. 1. CODON. *Murray syst. veget. ed. 13. p. 330.*

CERATOSTEMA. *Cal. 10fidus*, turbinatus. *Cor. coriacea*, tubulo-cylindrica, 5fida. *Antherae longissimae*, 2furcae. *Caps. infera*, 5locularis, polysperma,

peruviana. 1. **CERATOSTEMA**; *Jussieu gen. plant. p. 163.*

522. DICTAMNUS. *Cal. 5phyllus*. *Petala 5patula*. *Filamenta punctis glandulosis aspersa*. *Caps. 5co-litae*, 1iloculares, introrsum elastice dehiscentes.

albus. 1. *D. foliis pinnatis*, caule simplici. *Suppl. p. 232. Jacq. fl. aust. 5. t. 428.*

capensis. 2. *D. foliis simplicibus*, caule ramoso. *Suppl. p. 232.*

523. RUTA. *Cal. 5partitus*. *Petala (ut plurimum) concava*. *Receptaculum punctis melliferis 10cinctum*. *Caps. lobata*. *Quinta pars numeri in quibusdam excluditur*.

graveo-lens. 1. *R. foliis decompositis*: foliolis lanceolatis, floribus laterali-bus quadrifidis. *Blackw. herb. t. 7.*

legitima. 2. *R. foliis tripinnatis*: pinnulis sublinearibus. *Jacq. Collect. I. p. 74. Lobel. ic. 54.*

pinnata. 3. *R. foliis pinnatis trijugis*: foliolis lanceolatis; impari serrato, petalis planis crenulatis. *Suppl. p. 232.*

chalepen-sis. 4. *R. foliis supradecompositis*, petalis ciliatis. *Mant. p. 69. Moris hist. pl. 2. t. 35. f. 8.*

patavina. 5. *R. foliis ternatis sessilibus*, petalis planis integris. *Mich. gen. t. 19.*

linifolia. 6. *R. foliis lanceolatis indivisis*, petalis planis integris. *Bocc. mus. 2. t. 73. β) Buxb. cent. 2. t. 28. f. 1. 2.*

tuberculata. 7. *R. foliis linear-lanceolatis*, subtus caulibus capsulisque tuberculatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 86.*

DECO-

DECODON. *Cal. 10dentatus. Petala 5 unguiculata.
Caps. globosa, 3locularis, 3valvis,
polysperma.*

aquaticus. I. DECODON. *Walt. flor. carol. p. 137.*

CANTUFFA. *Flores declini.
Cal. 5fidus. Petala 5 lanceolata.*

exosa. I. CANTUFFA. *Bruc. trav. in Eg. Ar. Ab. and Nub. 5. app. p. 49.*

524. TOLVIFERA. *Cal. 5dentatus, campanulatus.
Petala 5: infimo maximo
obcordato. Stilus o.*

Balsamum. I. TOLVIFERA. *Hernand. mex. p. 53.*

NICANDRA. *Cal. turbinatus, coloratus, 4partitus.
Cor. 1petala 10fida. Germen annu-
lo membranaceo cinctum. Stigm.
peltatum, orbiculare, 6radiatum.
Bacca subrotunda, 6sulcata, 3lo-
cularis, polysperma.*

amara. I. NICANDRA. *Aubl. pl. guj. I. p. 394. t. 151.*

URATEA. *Cal. 5phyllus. Petal. 5. Anther. in cy-
lindrum conjunctae. Germen sangu-
lare. Stigm. 5.*

gujanensis. I. URATEA. *Aubl. pl. guj. I. p. 397. t. 152.*

525. HAEMATOXYLUM. *Cal. 5partitus. Petala 5.
Legumen lanceola-
tum, 1loculare, 2-
valve: valvis navi-
cularibus, inaequa-
libus.*

campechi- I. HAEMATOXYLUM. *Catesb. Car. 3, t. 66.
anum.*

Uu 3

1260.

1260. PROSOPIS. *Cal. hemisphaericus, 4dentatus.
Stigma simplex. Legumen inflatum, polyspermum.*

spicigera. 1. PROSOPIS. Mant. p. 68. Burm. ind. t. 25. f. 3.

1261. CHALCAS. *Cal. 5partitus. Cor. campanulata;
petalis unguiculatis. Stigma capitato - verrucosum.*

paniculata. 1. CHALCAS. Mant. p. 68. Rumpf. amb. 5. t. 17.

PETALOMA. *Cal. cyathiformis, 5dentatus. Petala 5, calici inter dentes inserta.
Bacca ilocularis, 1-4sperma.*

myrtilloides. 1. P. pedunculatus solitarius uniflorus, foliis subsessilibus ovatis
attenuatis basi obliquis. Sloan. hist. jam. 1. p. 78. t. 187. f. 3.

Mouriri. 2. P. floribus corymbosis axillaribus, foliis petiolatis ovatis
acuminatis, baccis tetraspermis. Aubl. plant. guj. p. 452.
t. 180.

1341. MURRAYA. *Cal. 5partitus. Cor. campanula: nectario germen cingente. Bacca 1sperma.*

exotica. 1. MURRAYA. Mant. p. 563. Murray Comm. Goett. ad ann.
1788. c. ic.

526. ADENANTHERA. *Cal. 5dentatus. Petala 5,
antheris apice exteriore glandulae globosae affixae. Legumen membranaceum.*

scandens. 1. A. foliis pinnatis glabris cirriferis. Forst. fl. aust. p. 33.

pavonina. 2. A. foliis decompositis utrinque glabris. Rumpf. amb. 3. t. 109.

falcata. 3. A. foliis decompositis subtus tomentosis. Rumpf. amb. 3.
t. 112.

528. TRICHILIA. *Cal. subquinquedentatus. Petala 5. Nectarium cylindricum, ore antheras gerens. Caps. 3locularis, 3valvis. Sem. baccata.*

- hirta. 1. *Tr. foliis pinnatis subhirsutis: pinnis intermediis majoribus.* *Jacq. Stirp. amer. pi&t. p. 64.*
- spondioi. 2. *Tr. foliis pinnatis subhirsutis: pinnis subdecemjugis; inferioribus majoribus, racemis axillaribus.* *Sloan. hist. jam. 2. p. 103. t. 210. f. 2. 3.*
- glabra. 3. *Tr. foliis pinnatis glabris: foliolis extimis majoribus.* *Jacq. Stirp. amer. pi&t. t. 260. f. 35.*
- terminalis. 9. *Tr. racemis terminalibus.* *Jacq. Stirp. amer. p. 130.*
- pallida. 4. *Tr. foliis pinnatis membranaceis, racemis axillaribus terminalibusque, floribus octandris: filamentis villosis, capsulis bivalvibus.* *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 67.*
- moschata. 5. *Tr. foliis pinnatis: pinnis alternis, racemis compositis: floribus subdecandris monopetalis, capsulis monospermis.* *Sloan. hist. jam. 2. p. 21. t. 166. f. 2.*
- spectabi- 6. *Tr. foliis pinnatis: foliolis obovatis, racemis axillaribus com- lis.* *Forst. fl. austr. p. 33.*
- alliacea. 7. *Tr. foliis pinnatis: foliolis lanceolatis acutis, racemis axillaribus supradecompositis.* *Forst. fl. austr. p. 33.*
- trifolia. 8. *Tr. foliis ternatis.* *Jacq. Stirp. amer. pi&t. t. 123.*

1306. TURRAEA. *Cal. 5dentatus. Petala 5. Nectarium cylindricum, ore antheras gerens. Caps. 5cocca. Sem. bina.*

- virens. 1. *T. foliis elliptico-lanceolatis, calicibus sericeo-villosis.* *Mant. p. 732. Smith. pl. ic. ined. 1. t. 10.*
- lanceola- 2. *T. foliis lanceolatis alternis.* *Cavanill. diff. bot. 7. p. 361. ta.* *t. 205. f. 1.*
- glabra. 3. *T. foliis ovato-lanceolatis, petalis longissimis glabris.* *Cavanill. diff. bot. 7. p. 360. t. 204.*

- tomento- 4. T. foliis ovatis tomentosis. *Cavanill. diff. bot. 7. p. 361.*
fa. t. 205. f. 2.
- fericea. 6. T. foliis utrinque villosis, calicibus pedunculisque tomen-
tosis. *Smith plant. ic. ined. 1. t. 12.*
- maculata. 7. T. foliis nudis, calicibus glabris ciliatis. *Smith ic. pl. ined. 1.*
t. II.
- pubes- 5. T. foliis ovatis subintegerrimis membranaceis pubescentibus,
cens. floribus umbellatis. *Helen. n. act. Stockb. 1788. t. 10. f. 3.*

SANDORICUM. Cal. 5dentatus. Petala 5 linearia.

Nectarium 10dentatum, in den-
tibus antheras gerens. *Drupa*
sphaerica: nucibus 5, basi 2-
valvibus, 1spermis.

indicum. 1. **SANDORICUM.** *Cavanill. diff. bot. 7. p. 359. t. 202. 203.*

521. SWIETENIA. Cal. 5fidus. Petala 5. Necta-
rium cylindricum, ore an-
theras gerens. *Caps. 5locu-*
laris, lignosa, basi dehiscens.
Sem. imbricata, alata.

Mahagoni. 1. **SWIETENIA.** *Catesb. Car. 2. t. 81.*

EKEBERGIA. Cal. 4partitus. Petala 4. Nectarium
fertiforme, cingens germen. *Bacca*
5sperma. *Sem. oblonga.*

capensis. 1. **EKEBERGIA.** *Sparrmann act. Stockb. 1779. p. 282. t. 9.*

527. MELIA. Cal. 5dentatus. Petala 5. Nectarium
cylindricum, ore antheras gerens.
Drupa 5locularis: loculis 1pyrenis.

Azeda- 1. M. foliis bipinnatis: foliolis planis. *Cavanill. diff. bot. 7.*
rach. t. 207.

sempervi- 2. M. foliis bipinnatis: foliolis rugosiusculis subseptenis. *Comm.*
rens. h. amst. 1. t. 76.

3. M.

361. dubia. 3. M. foliis bipinnatis: pinnulis acutis serratis; terminali magno. *Cavanill. diff. bot. 7. p. 364.*

men- Azadi- 4. M. foliis pinnatis. *Burm. zeyl. t. 15.*
ed. I. racha.

Koetjape. 5. M. foliis ternis. *Burm. ind.*

530. ZYGOPHYLLUM. Cal. 5phyllus. Petala 5.
Nectarium 10phyl-
lum, germen tegens.
Caps. 5locularis.

* *foliis simplicibus.*

simplex. 1. Z. foliis sessilibus cylindricis. *Mant. p. 68. Forsk. fl. aeg. arab. ic. t. 12. B.*

cordifoli- 2. Z. foliis oppositis cordato-orbiculatis. *Suppl. p. 232.*
um.

** *foliis conjugatis.*

Fabago. 3. Z. foliis petiolatis: foliolis obovatis, caule herbaceo. *Knorr del. hort. 2. t. C. Theca baccans.*

cocceine- 4. Z. foliis petiolatis: foliolis cylindricis carnosis laevibus.
um. *Forsk. fl. aeg. arab. ic. t. 11.*

album. 5. Z. foliis petiolatis: foliolis clavatis carnosis arachnoideo-in-
canis. *Mant. p. 379. Forsk. fl. aeg. arab. ic. t. 12. f. A.*

macula- 12. Z. foliis petiolatis: foliolis linear-lanceolatis. *Ait. hort.
Kew. 2. p. 60.*

Moryfa- 6. Z. foliis subpetiolatis: foliolis obovatis, caule fruticoso.
na. *Mant. p. 379. Burm. afr. t. 3. f. 2.*

micro- 7. Z. foliis subpetiolatis: foliolis ovalibus minutis, capsulis
phyllum. emarginatis. *Suppl. p. 232.*

fessiliboli- 8. Z. foliis sessilibus: foliolis lanceolato-ovalibus margine sca-
um. bris, caule fruticoso. *Burm. afr. t. 2. f. 1. β) Burm.
afr. t. 3. f. 1.*

spinosum. 9. Z. foliis sessilibus: foliolis linearibus carnosis supra planis,
caule fruticoso. *Burm. afr. t. 5.*

aestuans. 10. Z. foliis sessilibus: foliolis obovatis retusis.

arbore- 11. Z. foliis pinnatis, caule arboreo. *Sp. pl. p. 1673. Jacq.
um. Stirp. amer, pict. t. 124.*

GILIBERTIA. *Cal.* 4-5dentatus persistens inferus.
Petala 4-5. *Stamina* 8-10 basi
 coalita. *Caps.* ovata, coriacea
 4locularis: loculis 1-2permis.

- decandra.* 1. *G.* foliis alternis lanceolatis glabris integerrimis, floribus axillaribus racemosis. *Cavanill. diff. bot.* 7. p. 367. t. 211. *Quivista decandra.*
- ovata.* 2. *G.* foliis ovatis alternis integerrimis, floribus subsessilibus. *Cavanill. diff. bot.* 7. p. 368. t. 212.
- hetero-* 3. *G.* foliis ovatis integris pinnatifidisve. *Cavanill. diff. bot.* 7.
phylla. p. 368. t. 214.
- oppositi.* 4. *G.* foliis oppositis ovatis integerrimis. *Cavanill. diff. bot.* 7.
folia. p. 368. t. 214.

529. QUASSIA. *Cal.* 5phyllus. *Petala* 5. *Nectarium*
5phyllum. *Baccae* 5 distantes
 1ispermae, iloculares.

- excelsa.* 1. *Q.* floribus hermaphroditis pentandris, foliis impari-pinnatis: foliolis oppositis petiolatis, petiolis nudis. *Swarts nov. pl. gen. et sp.* p. 67. n. aet. Stockh. 1788. t. 8.
- amara.* 2. *Q.* floribus hermaphroditis, foliis impari-pinnatis: foliolis oppositis sessilibus, petiolo articulato alato, floribus racemosis. *Amoen. acad.* 6. p. 429. ic. *Suppl.* p. 235.
- Simaru-* 3. *Q.* floribus monoicis, foliis abrupte pinnatis: foliolis alterba. nis subpetiolatis, petiolo nudo, floribus paniculatis. *Suppl.* p. 234. *Aubl. pl. guj.* 2. t. 331. 332. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 5. t. 70. f. 1.

657. OCHNA. *Cor.* 5petala. *Cal.* 5phyllus. *Antherae*
 subsessiles. *Baccae* 2-3recep-
 ptaculo incrassato subrotundo
 carnosof insertae, iloculares.

- squarrosa.* 1. *O.* racemis lateralibus. *Burm. zeyl.* t. 56. β) *Pluckn. alm.*
 t. 263. f. 1. 2.
- Jabotapi-* 2. *O.* racemis terminalibus, petalis calice triplo majoribus,
 ta. drupis receptaculo immersis. *Plum. ic.* 153. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 5. t. 70. f. 2.

3. *O.*

nitida. 3. O. calice eorollae aequali, drupis receptaculo superimpositis, foliis ellipticis terratis. Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 67.

1130. SCHINUS. *Flores dioici. Cal. 5fidus. Petala 5.*
♀. *Bacca 3coccia.*

Molle. 1. Sch. foliis pinnatis: foliolis serratis; impari longissimo, petiolis aequalibus.

Huygan. 2. Sch. foliis pinnatis: foliolis serratis petiolatis; impari brevissimo. Molin. hist. nat. Chil. p. 145.

Areira. 3. Sch. foliis pinnatis: foliolis integerrimis aequalibus, petiolis aequalibus. Feuill. per. 3. t. 30.

1024. KLEINHOVIA. *Cal. 5phyllus. Petala 5.* *Nectararium campanulatum, columnae insidens, staminiferum. Caps. inflata, globata, singularis.*

Hospita. 1. **KLEINHOVIA.** Cavanill. diff. 5. t. 146. an potius ad monadelphas referenda, aut dodecandras?

531. FAGONIA. *Cal. 5phyllus. Petala 5' cordata.*
Caps. 5locularis, 1ovalvis: loculis ispermis.

hispanica. 1. F. inermis.

scabra. 2. F. foliis ternatis oppositis scabris. Forsk. fl. aeg. arab. p. 88.

cretica. 3. F. spinosa, foliolis lanceolatis planis laevibus.

arabica. 4. F. spinosa, foliolis linearibus convexis.

indica. 5. F. foliis simplicibus ovalibus, spinis geminis. Mant. p. 238.
Burm. ind. t. 34. f. 1.

532. TRIBULUS. *Cal. 5partitus. Petala 5 patentia.*
Stil. o. Nuces 5 aut plures coadunatae: loculis transversis.

maximus. 1. Tr. foliis subquadrijugis: exterioribus majoribus, pericarpis decaspermis muticis. Brown. jam. t. 132. f. 3.
2. Tr.

- Ianugino- 2. Tr. foliis subquinquejugis subaequalibus, seminibus bicor-
fus. *Mant.* p. 380. *Burm. zeyl.* t. 106. f. 1.
- terrestris. 3. Tr. foliis subsexjugis subaequalibus, seminibus quadricor-
nibus. *Lob. it.* 2. p. 84. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 5.
t. 69. f. 2.
- pentan- 4. Tr. foliis subseptemjugis subaequalibus, floribus pentandris.
drus. *Forsk. fl. aeg. arab.* p. 88.
- cistoides. 5. Tr. foliis octojugis subaequalibus. *Pluckn. alm.* t. 64.

534. THRYALLIS. *Cal.* 5partitus. *Petala* 5. *Caps.*
3cocca.

brasiliensis. 1. **THRYALLIS.** *Margr. bras.* 79. f. 3.

535. LIMONIA. *Cal.* 3-5fidus. *Petala* 3-5. *Fila-
menta* 6-10. *Bacca* 3locularis.
Sem. solitaria, pulpae involuta.

- mono- 1. *L.* foliis simplicibus, spinis solitariis. *Mant.* p. 732. *Burm.*
phylla. *zeyl.* t. 65. f. 2.
- lucida. 2. *L.* inermis, foliis simplicibus, pedunculis axillaribus.
Forst. fl. austr. p. 33.
- trifoliata. 3. *L.* foliis ternatis, spinis geminis. *Mant.* p. 732. *Burm.*
ind. t. 35. f. 1.
- dulcis. 4. *L.* foliis ternatis, spinis solitariis. *Sonner. it. nov. Guin.*
p. 102. t. 63.
- penta- 5. *L.* inermis, foliis subquinatis. *Koenig apud Retz. obs. bot.*
phylla. 5. *p.* 24.
- acidissi- 6. *L.* foliis pinnatis, spinis solitariis. *Mant.* p. 380. *Rumpf.*
ma. *amb.* 2. t. 43. *an ad Crotaevam amandanda?*
- minuta. 7. *L.* inermis, foliis pinnatis, racemis corymbosis terminali-
bus. *Forst. fl. austr.* p. 33.
- pusilla. 8. *L.* *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 4. t. 58. f. 4. *an distincta
species?*

GAERTNERA. *Cal. 5partitus, persistens. Petala 5 subaequalia, patula: margine lacero-ciliata. Filamenta basi levissime coalita. Germen superum, 3dentatum. Stil. lateralis, incurvus, persistens. Caps. 4alata, 2locularis, 1sperma.*

Caps. indica. 1. **GAERTNERA.** Schreb. gen. pl. Linn. I. p. 290. Sonner. it. ind. 2. p. 238. t. 135.

536. MONOTROPA. *Cal. o. Petala 10. horum 5 exteriora basi excavato-mellifera. Caps. 5valvis. Quinta pars numeri quibusdam excluditur.*

Hypopithys. 1. M. floribus lateralibus octandris: terminali decandro. *Flor. dan. t. 232.*
uniflora. 2. M. caule unifloro: flore decandro. *Catesb. Car. I. t. 36.*

AQUILARIA. *Cal. turbinatus, coriaceus, semiquinquepartitus. Nectarium urceolatum, 10fidum, stamina gerens. Caps. pyriformis, lignosa, 2valvis, 2locularis.*

Quata. 1. **AQUILARIA.** Cavanill. diff. bot. 7. p. 377. t. 224.

1307. DIONAEA. *Cal. 5phyllus. Petala 5. Caps. ilocularis, gibba, polysperma.*

Muscipula. 1. **DIONAEA.** Ellis nov. aet. Ups. I. t. 8. *Folia biloba, radicalia, ciliata, conduplicanda, irritabilia, infecta, quibus continguntur, incarcerantia.*

538. JUSSIEUA. *Cal. 4-5 partitus. Petala 4-5. Caps. 4-5 locularis, columnaris infra, angulis dehiscens. Sem. numerosa, minuta.*

* *floribus pentapetalis decandris.*

- repens. 1. *J. repens*, foliis ovato-oblongis. *Rheed. b. mal. t. 2. f. 51.*
β) *Jussieua adscendens*. *Mant. p. 69.*
- diffusa. 2. *J. repens*, foliis lanceolatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 210.*
- tenella. 3. *J. glabra*, floribus sessilibus, foliis oppositis linear-lanceolatis. *Burm. ind. t. 34. f. 2.*
- peruviana. 4. *J. erecta*, pedunculis foliosis. *Feuill. per. t. II.*
- pubescens. 5. *J. erecta villosa*, floribus sessilibus.

** *floribus tetrapetalis octandris.*

- suffruticosa. 6. *J. erecta villosa*, floribus pedunculatis. *Mant. p. 381.*
Rumpf. amb. 6. t. 41. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 31. f. 9.
- erecta. 7. *J. erecta glabra*, floribus sessilibus. *Mant. p. 381. Plum. ic. 175. Seb. mus. 1. t. 24. f. 3. Guertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 31. f. 9.*
- inclinata. 8. *J. erecta glabra*, floribus pedunculatis. *Suppl. p. 235.*
- edulis. 9. *J. caulinus prostratus*, foliis ovatis longe petiolatis margine pinnato-ferratis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 210.*

535. HEISTERIA. *Cal. 5 fidus. Petala 5. Drupa calice colorato maximo.*

coccinea. 1. *HEISTERIA*. *Sp. pl. p. 1663. Jacq. Stirp. amer. piæt. t. 122.*

539. QUISQUALIS. *Cal. 5 fidus filiformis. Petala 5. Drupa singularis.*

indica. 1. *QUISQUALIS*. *Burm. ind. t. 28. f. 2. et t. 35. f. 2.*

540. DAIS. *Involucrum 4 phyllum. Cor. 4-5 fida. Nux supera corticata, ilocularis.*

cotinifolia. 1. *D. floribus quinquefidis decandris*, foliis obovatis. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 39. f. 3.*

2. D.

- laurifo- 2. D. floribus quinquefidis decandris, foliis lanceolatis. *Jacq.
lia. collect. I. p. 146.*
- disperma. 3. D. floribus octandris decandrisque, foliis ovato-lanceolatis
acuminatis encravatis. *Forst. fl. aust. p. 33.*
- octandra. 4. D. floribus quadrifidis octandris. *Mant. p. 69. Burm. ind.
t. 33. f. 2.*

544. MELASTOMA. *Cal. 4-5fidus, campanulatus.*

*Petala 4-5, calici inserta.
Bacca 2-5locularis, cali-
ce obvoluta, polysperma.*

* *floribus dodecandris.*

- patens. 1. M. foliis trinerviis subdenticulatis cordatis hirsutis, racemis
terminalibus patulis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 68.*

** *floribus decandris.*

† *foliis trinerviis.*

- glabrum. 2. M. foliis integerrimis elliptico-lanceolatis sebris, calicibus
circumfessis. *Forst. fl. aust. p. 34.*

- longifo- 3. M. foliis integerrimis lanceolatis glabris superne quaternis pa-
lium. niculis terminalibus. *Aubl. pl. guj. I. p. 432. t. 170.*

- asperum. 4. M. foliis integerrimis lanceolatis sebris. *Rumpf amb. 4.
t. 71.*

- holoseri- 5. M. foliis integerrimis oblongo-ovatis subtus tomentosis, ra-
ceum. ceum brachiatis: spicis bipartitis. *Plackn. mant. 4. t.
250. f. 2.*

- strigosum. 6. M. foliis integerrimis strigosis ovatis, floribus solitariis.
Suppl. p. 236.

- quadran- 7. M. foliis integris ovato-lanceolatis glabris: nervis coloratis,
gulare. ramis quadrangulis, racemo stricto terminali. *Swarts
nov. pl. gen. et sp. p. 69.*

- ornatum. 8. M. foliis integris rigidis: supra setis adpressis; subtus inca-
nis, umbella quadrifida terminali pauciflora, capsulis his-
pidis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 69.*

- trinervi- 9. M. foliis integris glabris oblongis utrinque attenuatis, race-
um. mo simpliciculo terminali. *Swarts nov. pl. gen. et sp.
p. 69.*

- ramiflo- 10. M. foliis integris ovato-lanceolatis scabriusculis, ramis floriferis, floribus pedunculatis subconfertis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 69.*
- bivalve. 11. M. foliis integris ovatis obtusis, corymbis terminalibus trifloris. *Aubl. pl. guj. I. p. 404. t. 155. f. a.*
- trivalve. 12. M. foliis integris linearibus acutis, corymbis terminalibus trifloris. *Aubl. pl. guj. I. p. 406. t. 155. f. b.*
- Cacatin. 13. M. foliis ovato-oblongis acutis glabris, ramis tetragonis. *Aubl. pl. guj. I. p. 437. t. 173.*
- procерum. 14. M. arboreum, foliis subdenticulatis glabris, racemis terminalibus: spicis simplicibus erectis; calicibus truncatis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 68.*
- rigidum. 15. M. foliis subdenticulatis ovatis subcordatis rigidis posterius scabris, paniculis terminalibus ferrugineo-hirsutis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 69.*
- scandens. 16. M. foliis denticulatis ovatis acutis glabris, racemo terminali: spicis subsecundis, caule scandente. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 69.*
- monta- 17. M. foliis denticulatis oblongis acutis glabriusculis, racemo terminali: spicis patulis; petalis retusis, calicibus truncatis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 69.*
- Acinoden- 18. M. foliis denticulatis subtrinerviis ovatis acutis. *Pluckn. dron. mant. 4. t. 159. f. 1.*

TT foliis triplinerviis.

- grossula- 19. M. foliis denticulatis ovatis acuminatis. *Pluckn. alm. t. rioides. 249. f. 4.*
- cinnamo- 20. M. foliis subintegerrimis lanceolatis acuminatis. *Jacq. mifolium. coll. 2. p. III. t. 6. f. 2.*
- fessilifo- 21. M. foliis integerrimis spatulatis fessilibus subtus tomentosis. *Brown. jam. t. 24. f. 1. 2.*
- prasinum, 22. M. foliis integerrimis lato-lanceolatis glabris, panicula terminali patentissima. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 69.*

TTT foliis quinquenerviis.

- crispatum. 23. M. foliis integerrimis quaternis, ramis crispatis. *Rumpf. amb. 5. t. 35.*
- grossum. 24. M. foliis integerrimis subcordatis scabris. *Suppl. p. 236.*

25. M.

- ramis
s nov.
ustri.
alibus
gonis.
is ter-
natis.
sterius
iwarts
termi-
s nov.
acemo-
runca-
luckn.
alm. t.
Jacq.
entosis.
ula ter-
69.
Rumpf.
p. 236.
25. M.
- Iaeviga- 25. *M. foliis integerrimis ovato - oblongis laeviusculis acumina- tum.* Sloan. hist. jam. 2. t. 197. f. 1.
- atum. 26. *M. foliis integerrimis ovato - oblongis subfessilibus tomen- tofo - incanis, racemis terminalibus trifloris.* Aubl. pl. guj. I. p. 410. t. 158.
- succosum. 27. *M. foliis integerrimis ovatis acutis supra asperis subtus to- mentofo - incanis petiolatis; floribus congeitis axillaribus subfessilibus.* Aubl. pl. guj. I. p. 418. t. 162.
- arboreſ- 28. *M. foliis integerrimis ovatis glabris rigidis, petiolatis, ra- cens.* Aubl. pl. guj. I. p. 420. t. 163.
- imalaba- 29. *M. foliis integerrimis lanceolato - ovatis scabris.* Burm. thricum. zeyl. t. 73.
- flavescens. 30. *M. foliis integerrimis ovato - oblongis petiolatis, supra fla- vescens subtus incanis, racemis axillaribus.* Aubl. pl. guj. I. p. 423. t. 164.
- villoſum. 31. *M. foliis integerrimis ovatis acutis hirsutis fessilibus.* Aubl. pl. guj. I. p. 428. t. 168.
- Taniboa. 32. *M. foliis integerrimis ovatis acutis glabris petiolatis alter- nis, floribus fessilibus spicatis.* Aubl. pl. guj. I. p. 448. t. 178.
- Tamonea. 33. *M. foliis integris oblongo - lanceolatis acutis subtus tomen- tofo - incanis, racemis compositis terminalibus: racemulis brachiatis; bracteis geminis.* Aublet pl. Guj. p. 441. t. 175.
- albicans. 34. *M. foliis integris ovatis acutis supra glabris subtus tomen- tofis albido - ferrugineis, racemis terminalibus erectis: flo- ribus confertis fessilibus.* Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 70.
- Splendens. 35. *M. foliis integris oblongis acuminatis utrinque glabris su- pra nitidis, paniculis terminalibus erectis.* Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 70.
- Strigilo- 36. *M. foliis subdenticulatis subcordatis acuminatis supra stri- sun. goso - pilosis tubus tomentosus, racemis axillaribus solita- riis: floribus pedicellatis confertis.* Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 71.
- argente- 37. *M. foliis subdenticulatis ovatis glabris subtus tomentosis um. candidis, paniculis terminalibus patentibus.* Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 70.
- rubescens. 38. *M. foliis subdenticulatis ovato - oblongis acutis subpilosis petiolatis, caule ramisque hispidis.* Aubl. pl. guj. I. p. 402. t. 154.

- racemo-** 39. *M. foliis subdenticulatis ovatis acutis ciliatis petiolatis, floribus sessilibus racemosis terminalibus.* *Aubl. pl. guj. I. p. 406. t. 156.*
- rufescens.** 40. *M. foliis subdenticulatis cordatis acuminatis sessilibus, floribus congestis racemosis terminalibus.* *Aubl. pl. guj. I. p. 408. t. 157.*
- grandiflo-** 41. *M. foliis subdenticulatis cordatis acuminatis pilosis petiolatis, corymbis axillaribus terminalibusque.* *Aubl. pl. guj. I. p. 414. t. 160.*
- rubrum.** 42. *M. foliis subdenticulatis cordatis acuminatis subsessilibus tomentosis, floribus solitariis ternisve axillaribus.* *Aubl. pl. guj. I. p. 416. t. 161.*
- spicatum.** 43. *M. foliis subdenticulatis ovatis acutis utrinque ferrugineo-pilosis subsessilibus, spicis axillaribus terminalibusque.* *Aubl. pl. guj. I. p. 423. t. 165.*
- agreste.** 44. *M. foliis subdenticulatis ovato-oblongis acutis villosis petiolatis, paniculis terminalibus axillaribusque.* *Aubl. pl. guj. I. p. 425. t. 166.*
- scandens.** 45. *M. foliis subdenticulatis ovatis acutis hirsutis petiolatis, corymbis terminalibus trifloris.* *Aubl. pl. guj. I. p. 435. t. 172.*
- Tococa.** 46. *M. foliis subdenticulatis ovatis acutis pilosis petiolatis: petiolis inflatis perforatis, spica terminali verticillata.* *Aubl. pl. guj. I. p. 438. t. 174.*
- scabro-** 47. *M. foliis denticulatis cordatis scabris subtus tomentosis, ramis tomentoso-villofis.* *Brown. jam. t. 24. f. 3.*
- hirtum.** 48. *M. foliis denticulatis ovato-lanceolatis, caule hispido.* *Sloan. bift. jam. 2. t. 197. f. 2.*
- impetio-** 49. *M. foliis denticulatis subsessilibus oblongis acuminatis coriaceis subtus tomentoso-ferrugineis, paniculis terminalibus axillaribusque erectis.* *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 70.*
- coriace-** 50. *M. foliis cartilagineo-denticulatis ovatis rugosis, ramis petiolisque trigonis, ramis paniculae tetragonis.* *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 70.*
- alatum.** 51. *M. foliis ferrato-denticulatis oblongis coriaceis subtus ferrugineo-tomentolis, paniculis terminalibus patentibus: floribus sessilibus.* *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 70.*

Tibuchi- 52. *M. foliis ferrulatis ovato-acutis rigidis petiolatis squamu-*
na, floribus axillaribus solitariis, terminalibus corymbo-
sis. Aubl. pl. guj. I. p. 446. t. 177.

Majeta. 53. *M. foliis ferrulatis ovatis acutis pilosus rufescens, sub-*
petiolatis basi tumidis, floribus sessilibus axillaribus solita-
riis. Aubl. pl. guj. I. p. 443. t. 176.

parviflo- 54. *M. foliis ferrulatis ovato-oblongis glabris petiolatis, pani-*
rum, culis terminalibus. Aubl. pl. guj. I. p. 433. t. 171.

fragile. 55. *M. foliis ferratis reticulatis, floribus secundis sessilibus ra-*
cemos. Suppl. p. 236. Sloan. hist. jam. 2. t. 196. f. 1.

elegans. 56. *M. foliis crenatis cordatis villosis petiolatis; corymbis ter-*
malibus axillaribusque. Aubl. pl. guj. I. p. 427. t. 167.

*** *floribus octandris.*

† *foliis trinerviis.*

octandrum. 57. *M. foliis integerrimis ovatis glabris margine hispidis.*

fascicula- 58. *M. foliis integris ovatis acutis scabris, ramis floriferis; flo-*
re. Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 71.

angustifo- 59. *M. foliis integris linear-lanceolatis subtus incanis, ramis*
virgatis, panicula terminali: floribus erectis. Swarts nov.
pl. gen. et sp. p. 71.

purpuraf- 60. *M. foliis integris oblongis acutis strictis glaberrimis, race-*
cens. Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 71.

alpinum. 61. *M. foliis integris ovatis coriaceis glabris, pedunculis sim-*
plicibus trichotomis: floribus distinctis. Swarts nov. pl.
gen. et sp. p. 71.

hirtellum. 62. *M. foliis margine hispido-pilosus, pedunculis brevissimis*
axillaribus trifloris. Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 72.

micro- 63. *M. foliis subdenticulatis ovatis obtusis supra hispidis sub-*
phyllum. Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 72. ***

hirsutum. 64. *M. foliis subdenticulatis lato-lanceolatis attenuatis hirsutis,*
pedunculis axillaribus trifloris divaricatis. Swarts nov.
pl. gen. et sp. p. 71.

glabratum. 65. *M. foliis subdenticulatis ovatis acutis glabris coriaceis, pe-*
dunculis terminalibus solitariis unifloris. Swarts nov. pl.
gen. et sp. p. 71.

capillare. 66. M. foliis subdenticulatis lato - lanceolatis attenuatis glabris, pedunculis capillaribus trifloris axillaribus. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 71.*

rubens. 67. M. foliis denticulatis ovato - lanceolatis acuminatis glaberrimis, ramis petiolisque coloratis, racemis terminalibus: floribus confertis dioicis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 71.*

micranthum. 68. M. foliis denticulatis oblongis acutis glabris, racemis axillaribus reclinatis: floribus acuminatis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 71.*

TT foliis triplinerviis.

virgatum. 69. M. foliis integris ovato - lanceolatis glaberrimis, ramis floriferis, racemis decussatis diffusis sparvis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 72.*

elaegrooides. 70. M. foliis integris lato - lanceolatis, subtus albido - tomentosis, pedunculis terminalibus trichotomis: floribus solitariis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 72.*

TTT foliis quinquenerviis.

discolor. 71. M. foliis integerrimis oblongo - ovatis glabris margine laevibus. *Jacq. Stirp. amer. p. 125.*

hispidum. 72. M. foliis subdenticulatis ovatis acutis supra strigoso - hirsutis, subtus reticulato - tomentosis, panicula terminali divaricata. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 72.*

umbrosum. 73. M. foliis denticulatis lato - ovatis utrinque hirtis, ramulis floriferis, racemis dichotomis patentibus: ramis petiolisque hirsutis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 72.*

pilosum. 74. M. foliis denticulatis oblongis acutis subtus hirsutis, racemis lateralibus hirsutis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 72.*

aquaticum. 75. M. foliis cordatis acutis crenulatis supra hirtis subtus laevis, paniculis terminalibus trichotomis diffusis. *Aubl. pl. guj. p. 430. t. 169.*

**** floribus tetrandris.

tetrandrum. 76. M. foliis integris trinerviis oblongis acuminatis basi emarginatis glabris convexiusculis, racemo erecto terminali. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 72.*

CACUCIA. *Cal.* campanulatus, 5dentatus, deciduus. *Petala* 5. *Bacca* subquinquangularis, utrinque acuta, 1sperma. coccinea. 1. **CACUCIA.** *Aubl. pl. guj.* 1. p. 450. t. 179.

MURIRI. *Cal.* 5dentatus. *Petala* 5 carnosa. *Filamenta* 10, quorum 5 corolla longiora. *Bacca* globosa, infera, ilocularis, 4sperma.

gujanensis. 1. **MURIRI.** *Aubl. pl. guj.* 1. p. 453. t. 180.

TRISTEMMA. *Cal.* 5fidus, semisuperus, bifariam ciliatus. *Petala* 5unguiculata. *Bacca* ovata, compressa, 5locularis.

mauritia- 1. **TRISTEMMA.** *Jussieu gen. plant.* p. 329.
num.

545. KALMIA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* hypocrateriformis: limbo subtus 5plicato. *Caps.* 5locularis, polysperma.

latifolia. 1. *K.* foliis ovatis, corymbis terminalibus. *Trew. Ebret.* t. 38. f. 1.

polifolia. 2. *K.* foliis lanceolatis revolutis, corymbis terminalibus spicatis. v. *Wangenheim Schr. berl. Naturf.* 8. p. 129. t. 5.

glauca. 3. *K.* foliis oblongis laevigatis margine revolutis, corymbis terminalibus, ramulis ancipitibus. *Ait. hort. Kew.* 2. p. 64. t. 8.

angustifo- 4. *K.* foliis lanceolatis, corymbis lateralibus. *Trew. Ebret.*
lia. t. 38. f. 2.

hirsvta. 5. *K.* foliis lanceolatis hirsutis, floribus axillaribus solitariis. *Walt. flor. carol.* p. 131.

546. LEDUM. *Cal.* 5fidus. *Cor.* plana, 5partita.
Caps. 5locularis basi dehiscens.

palustre. 1. *L.* foliis linearibus, staminibus decem corolla longioribus. *Linn. diff.* 1775.

groenlan. 2. L. foliis ovalibus, staminibus decem corolla brevioribus dicum. Retz. fl. scand. prodr. p. 436. Flor. dan. t. 567.

latifoli- 3. L. foliis ovatis integerrimis, floribus pentandris. Jacq. um. coll. 2. p. 308 pl. rar. ic. cent. 2. t. 36.

548. RHODODENDRUM. Cal. 5partitus. Cor. (saepe) infundibuliformis. Stam. declinata. Caps. 5locularis, polysperma.

ferrugi- 1. Rh. foliis glabris subtus leprosis, corollis infundibuliformi- neum. Jacq. fl. austr. 3. t. 255.

dauuri- 2. Rh. foliis glabris punctatis nudis, corollis rotatis. Pallas fl. cum. ross. t. 32.

chrysan- 3. Rh. foliis oblongis impunctatis supra scabris venosissimis, thum. corolla rotata irregulari, gemma florifera ferrugineo-tomentosa. Suppl. p. 237. Pallas flor. ross. t. 30.

caucasi- 4. Rh. foliis ovatis scabris margine inflexis subtus tomentosis, um. umbellis terminalibus; bracteis elongatis. Pallas fl. ross. t. 31.

hirsutum. 5. Rh. foliis ciliatis nudis, corollis infundibuliformibus. Jacq. fl. austr. I. t. 98.

Chamae. 6. Rh. foliis ciliatis subtus leprosis, corollis rotatis. Jacq. fl. cistus. austr. 3. t. 217.

camtscha- 7. Rh. foliis ciliatis utrinque glabris, corollis hypocrateriformibus. Pallas flor. ross. t. 33.

ponticum. 8. Rh. foliis nitidis lanceolatis utrinque glabris, racemis terminalibus. Jacq. pl. rar. ic. cent. I. t. 79.

maximum. 9. Rh. foliis nitidis ovalibus obtusis venosis: margine acuto reflexo, pedunculis unifloris. Catesb. car. 3. t. 17. f. 2. Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. t. 63. f. 6.

Rhodora. 10. Rh. corollis tripetalis. Sp. pl. p. 561. Rhodora. du Hamel sem. app. 10. t. 27. f. 2. nonne distinctum genus?

549. ANDROMEDA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* magis minusve ovata: ore 5fido. *Caps.* 5locularis. *Sem.* pauca.

- (sae-
lifor-
lecli-
locu-
rma.
formi-
llas fl.
fimis,
o - to-
ntosis,
t. ross.

Jacq.
icq. fl.
rifgr-
is ter-
uto re-
. f. 2.
u Ha-
?
- tetragona. 1. A. pedunculis solitariis lateralibus, corollis campanulatis, foliis oppositis imbricatis obtusis revolutis. *Flor. lapp.* t. 1. f. 4.
- hypnoi- des. 2. A. pedunculis solitariis terminalibus, corollis campanulatis, foliis confertis subulatis. *Flor. dan.* t. 10.
- cerea. 3. A. pedunculis axillaribus diphyllis unifloris, foliis alternis ovatis ferratis. *Suppl. p. 238.*
- caerulea. 4. A. pedunculis aggregatis, corollis ovatis, foliis sparsis linearibus obtusis planis. *Flor. dan.* t. 57.
- mariana. 5. A. pedunculis aggregatis, corollis cylindricis, foliis alternis ovatis integerrimis. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 2. t. 58.
- fasciata. 6. A. pedunculis aggregatis, foliis alternis ovato-lanceolatis obtusis subcrenulatis membranaceis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 73.*
- octandra. 7. A. pedunculis aggregatis, corollis cylindricis quadrifidis, foliis alternis ovato-lanceolatis integris membranaceis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 73.*
- jamaicensis. 8. A. pedunculis aggregatis, corollis ovatis diaphanis, foliis alternis lato-lanceolatis obtusis integris membranaceis subtus cinereis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 73.*
- ferruginea. 17. A. pedunculis aggregatis axillaribus, corollis subglobosis, foliis ellipticis integerrimis subtus squamoso-scariosis. *Ait. hort. Kew.* 2. p. 67.
- polifolia. 9. A. umbellis terminalibus paucifloris, corollis ovatis nutantibus, foliis alternis linear-lanceolatis revolutis. *Flor. dan.* t. 54.
- ferruginea. 18. A. floribus aggregatis axillaribus terminalibusque, foliis rotundatis margine revolutis subtus ferrugineis. *Walt. flor. carol.* p. 138. an distincta a ferruginea?
- nitida. 19. A. pedunculis aggregatis axillaribus, foliis alternis lanceo-lato-ovatis integris perennantibus. *Walt. flor. car.* p. 137.
- Catesbaei. 20. A. racemis ovatis axillaribus, foliis alternis petiolatis ovato-lanceolatis ferrulatis perennantibus. *Walt. fl. carol.* p. 137

- reticula- 21. A. racemis ovatis axillaribus, foliis ovatis acuminatis crenata. nulatis alternis petiolatis subtus reticulatis perennantibus. *Walt. flor. carol. p. 138.*
- japonica. 10. A. racemis paniculatis: floribus subcylindricis bracteatis, foliis ellipticis reflexis apice ferratis. *Thunb. fl. jap. p. 181.*
- panicula- 11. A. racemis secundis nudis paniculatis, corollis subcylindricis, foliis alternis oblongis crenulatis. *Catesb. car. 2. t. 43.*
- arborea. 12. A. racemis secundis nudis, corollis rotundo-ovatis. *Catesb. Car. 1. t. 71.*
- racemo- 13. A. racemis secundis bracteatis, eorollis gibboso-cylindricis, foliis alternis oblongis ferratis.
- calicula- 14. A. racemis secundis foliaceis, corollis subcylindricis, foliis alternis lanceolatis obtusis punctatis. *Buxb. commt. Petrop. 1. t. 8. f. 1. Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. t. 63. f. 5.*
- anastomo- 15. A. racemis confertis foliaceis, foliis ovatis subferratis: subtus anastomosibus punctatis. *Suppl. p. 237.*
- rupestris. 16. A. racemis simplicissimis, bracteatis, corollis campanulatis, foliis oblongis alternis ferrulatis. *Suppl. p. 237.*
- lucida. 17. A. racemis axillaribus solitariis: floribus pendulis subcylindricis, foliis integerrimis crenulatisque lanceolatis. *Jacq. collect. 1. p. 95.*

550. EPIGAEA. Cal. exterior 3phyllus; interior 5-partitus. Cor. hypocrateriformis. Caps. 5locularis.

- repens. 1. E. foliis cordato-ovatis integris planis asperis, corollis cylindricis. *Pluckn. alm. t. 107. f. 1.*
- cordifo- 2. E. foliis cordatis subrotundis ferratis convexis hispidis rigida, corollis ovatis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 73.*

551. GUALTHERIA. *Cal. 2plex exterior 2phyllus, interior 5fidus. Cor. ovata. Nectarium mucronibus 10. Caps. 5locularis, vestita calice baccato colorato, polysperma.*

procum- 1. *G. caule procumbente. du Hamel arb. t. t. 113. Gaertn. bens. de fr. et sem. cent 4. t. 63. f. 8.*

antipoda. 2. *G. foliis sparsis subrotundis serrato-dentatis, caule fruticoso diffuso. Forst. fl. aust. p. 34.*

552. ARBUTUS. *Cal. 5partitus. Cor. ovata: ore 5fido basi pellucida. Bacc 5locularis, supera, polysperma.*

Unedo. 1. *A. caule arboreo, foliis glabris obtuse ferratis, panicula terminali, baccis polyspermis. Suppl. p. 238. Knorr. del. hort. t. 1. E. 1. a. Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. t. 59. f. 4.*

Iaurifolia. 2. *A. caule arboreo, foliis oblongis utrinque acuminatis acute ferratis glabris, racemis axillaribus secundis tessilibus foliariis. Suppl. p. 238.*

Andrach- 3. *A. caule arboreo, foliis glabris integerrimis ferratisque, ne. baccis polyspermis. Ehret act. angl. 1767. t. 6.*

ferrugi- 4. *A. caule arborecente, foliis oblongis obtusis glabris integerrimis, racemis terminalibus. Suppl. p. 238.*

mucrona- 5. *A. caule fruticoso, foliis alternis ovatis ferratis mucronatis, ta. pedunculis axillaribus unifloris. Suppl. p. 239.*

pumila. 6. *A. caulibus diffusis, foliis alternis distichis oblongis integerrimis, floribus lateralibus solitariis. Suppl. p. 239.*

acadien- 7. *A. caulibus procumbentibus, foliis ovatis subferratis, florisis. baccis polyspermis.*

alpina. 8. *A. caulibus procumbentibus, foliis rugosis ferrulatis, pilosofiliatis. Flor. dan. t. 73.*

Uva ursi. 9. *A. caulibus procumbentibus, foliis oblongo-ovatis integerrimis subtus reticulatis. Flor. dan. t. 33.*

1391. INOCARPUS. *Cal.* 2fidus. *Cor.* infundibuliformis. *Stamina* serie duplii. *Drupa* isperma.

edulis. **I.** INOCARPUS. *Suppl.* p. 239. *Forst. char. gen.* t. 33. *Rumpf amb.* I. t. 65.

STRIGILIA. *Cal.* 5crenatus. *Cor.* 5partita. *Stam.* basi coalita. *Stigm.* 3. *Caps.* glo-

cularis.

racemosa. **I.** STRIGILIA. *Cavan. diff. bot.* 7. p. 358. t. 201.

553. CLETHRA. *Cal.* 5phyllus. *Petala* 5. *Stigma* 3fidum. *Caps.* 3locularis, 3valvis.

alnifolia. **I.** Cl. fruticosa, racemis spicatis. *Jungb. pl. ic. cent.* I. t. 32. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 4. t. 62. f. 2.

paniculata. **2.** Cl. fruticosa, floribus paniculatis. *Ait. hort. Kew.* 2. p. 73.

arborea. **3.** Cl. arborea, racemis spicatis, calicibus obtusis. *Ait. hort. Kew.* 2. p. 73.

554. PYROLA. *Cal.* 5partitus. *Petala* 5. *Caps.* 5-locularis, angulis dehiscentes. *Sem.* arillata, plurima.

rotundi- **1.** P. staminibus adscendentibus, pistillo declinato. *Flor. dan.* folia. **t.** 110. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 4. t. 63. f. 4.

minor. **2.** P. floribus racemosis dispersis, staminibus pistillisque rectis. *Flor. dan.* t. 55.

secunda. **3.** P. racemo unilaterali. *Flor. dan.* t. 402.

umbellata. **4.** P. pedunculis subumbellatis.

maculata. **5.** P. pedunculis bifloris. *Pluckn. mont.* t. 349. f. 4.

uniflora. **6.** P. scapo unifloro. *Flor. dan.* t. 8.

546. STYRAX. *Cal. inferus, 5dentatus. Cor. infundibuliformis 5fida. Drupa matura, ilocularis, 1-2sperma.*

officinale. 1. St. foliis ellipticis integris subtus tomentosis, racemis simpli- cibus. *Mill. ic. t. 260. Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. t. 59. f. 5. Regn. bot. t. 390.*

grandifo- 2. St. foliis obovatis subtus villosis, pedunculis inferioribus axillaribus solitariis unifloris. *Ait. hort Kew. 2. p. 75.*

Benzoin. 3. St. foliis oblongis acuminatis subtus tomentosis, racemis com- positis longitudine foliorum. *Dryander act. angl. vbl. 77. 2. p. 307. t. 12. ex hac benzoe.*

glabrum. 4. St. foliis subovatis glaberrimis denticulatis, floribus axilla- ribus cernuis. *Cavanill. diff. bot. 6. p. 340. n. 500. t. 188. f. 1. an monadelphum genus?*

543. SAMYDA. *Cal. 5fidus, coloratus. Cor. o. Ne- ciar. conic. truncatum 10-18den- tatum. Caps. intus baccata, 4valvis, ilocularis. Sem. ni- dulantia.*

* *floribus octandris.*

tomento- 1. S. foliis ovatis ferratis, subtus tomentosis. *Swarts nov. pl. fa. gen. et sp. p. 68.*

** *floribus decandris.*

villosa. 2. S. foliis oblongis subserratis basi obliquis sericeis subtus vil- losis, pedunculis solitariis axillaribus. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 68.*

glabrata. 3. S. foliis ovato-lanceolatis integris nitidis, pedunculis axilla- ribus unifloris. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 68.*

spinescens. 4. S. floribus terminalibus, foliis lanceolato-ovatis obtusis cre- natis glabris, ramis patulis spinescentibus. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 68.*

viridiflo- 5. S. foliis oblongo-ovatis ferrulatis subtus tomentosis. *Aubl. ra. pl. guj. I. p. 402.*

*** flo-

*** floribus dodecandris.

pubescens. 6. S. foliis ovatis subtus tomentosis.

ferrulata. 7. S. foliis ovato-oblongis ferrulatis. *Jacq. coll. 2. t. 17. f. 1.*

CASEARIA. *Cal. 5phyllus deciduus. Cor. o. Nectar. 4-5phyllum. Filament. 8-10. Stigm. capitatum. Caps. coriacea, subrotunda, 3valvis, ilocularis, polysperma.*

nitida. 1. *C. inermis, floribus octandris. Syst. nat. XII. 3. p. 301. Samyda nitida. Brown. jam. t. 23. f. 3.*

aculeata. 2. *C. aculeata, floribus octandris. Plum. ic. 147. f. 1. Syst. nat. XII. 3. p. 301. Samyda spinosa.*

parviflora. 3. *C. floribus decandris. Syst. nat. XII. 3. p. 301. Samyda parviflora. Jacq. stirp. amer. pict. t. 127.*

SIMABA. *Cal. 4-5partitus. Petala 4-5. Filamenta 8-10. Germin. 4-5. Stil. 1. 4-5striatus. Stigm. 4-5radiatum. Caps. 4-5 iloculares, spermae.*

gujanensis. 1. *SIMABA. Aubl. pl. guj. 1. p. 400. t. 153.*

542. COPAIFERA. *Cal. o. Petala 4. Legumen ovatum. Sem. 1. arillo bacato.*

officinalis. 1. *COPAIFERA. Jacq. stirp. amer. pict. t. 123.*

DETARIUM. *Cal. 4fidus. Cor. o. Stamin. alterna breviora. Drupa orbiculata farinacea: officulum spernum fibris exterius undique reticulatum.*

Senegalense. 1. *DETARIUM. Jussieu gen. plant. p. 365.*

1127. CARICA. *Flores dioici.*

- ♂. *Cal. subnullus. Cor. 5fida, infundibuliformis. Filamenta in tubo corollae, alterna breviora.*
 ♀. *Cal. 5dentatus. Cor. 5petala. Stigm. 5. Baccailocularis, polysperma.*

Papaya. 1. *C. foliorum lobis sinuatis. Trem. Ebret. t. 7.*

Posoposa. 2. *C. foliorum lobis integris. Feuill. per. 2. t. 39. f. 1.*

spinosa. 3. *C. foliis digitatis: foliolis integerrimis. Aubl. pl. guj. 2. p. 908. t. 346.*

SIPARUNA. *Flores monoici. Cor. o.*

- ♂. *Cal. 4partitus. Filamenta 4-10 receptaculo inserta.*
 ♀. *Cal. o. Germen subrotundum. Stil. striatus. Stigm. 5 capillaria.*

gujanensis. 1. SIPARUNA. *Aubl. pl. guj. 2. p. 865. t. 333.*

1283. TERMINALIA. *Flores mere masculi intermisti.*

- Cal. 5partitus. Cor. o.*
 ♀. *Drupa infera, cymbiformis.*

Catappa. 1. *T. foliis obovatis integerrimis subtus tomentosis. Mans. p. 128. 519. Suppl. p. 434. Rumpf amb. 1. t. 68.*

Latifolia. 2. *T. foliis obovatis subferratis, drupis carnosis. Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 68.*

cherbula. 3. *T. foliis ovatis integerrimis. Retz. obs. bot. 5. p. 31.*

arbuscula. 4. *T. foliis ovato-lanceolatis integris pubescentibus, ramis dichotomis, racemis erectis. Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 68.*

angusti-folia. 5. *T. foliis lanceolatis. Syst. vag. XIII. p. 721. Croton Ben-zoc. Suppl. p. 434. Jacq. b. Vind. 3. t. 100.*

CHUNCOA. *Cal. 5fidus, limbo patens. Caps. isperma, 5gona: angulis alatis.*

amazonia. I. CHUNCOA. Jussieu gen. plant. p. 76.

541. BUCIDA. *Cal. 5dentatus, superus, Cor. o. Bacca isperma.*

Bucceras. I. BUCIDA. Brown. jam. t. 23. f. 1.

ANAVINGA. *Cal. 5phyllus squamatus. Cor. o. Bacca polysperma.*

exotica. I. ANAVINGA. La Marck encycl. I. p. 147.

REYNOUTRIA. *Cal. 5phyllus. Cor. o. Filam. brevissima. Germen trigonum.*

japonica. I. REYNOUTRIA. Houttuyn syst. veget. 6. p. 627.

MYROBALANIFERA. *Cal. campanulatus, roduntatus. Cor. o. Drupa.*

fertilis. I. MYROBALANIFERA. Houttuyn syst. veget. I. p. 667.

DIGYNIA.

555. ROYENA. *Cal. urceolatus. Cor. ipetala: limbo revoluto. Caps. ilocularis, 4valvis.*

- | | |
|-----------------|---|
| <i>Iucida.</i> | <i>1. R. foliis ovatis scabriusculis. Comm. hort. amst. I. t. 96.</i> |
| <i>villosa.</i> | <i>2. R. foliis cordatis oblongis subtus tomentosis.</i> |
| <i>glabra.</i> | <i>3. R. foliis lanceolatis glabris. Commel. b. amst. I. t. 65.</i> |
| <i>hirsuta.</i> | <i>4. R. foliis lanceolatis hirsutis.</i> |
| <i>polyan-</i> | <i>5. R. foliis ovatis subtus tomentosis, floribus polyandris. Suppl.</i> |
| <i>dra.</i> | <i>p. 240.</i> |

557. HYDRANGEA. *Caps. 2locularis, 2rostris, infera, foramine inter stilos dehiscens.*

arboreo. 1. *H. caule arboreo.* *Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 30. f. 7.*
cens. *Voy. suppl. pl. Ehr. sel. t. CVIII.*

radiata. 2. *H. caule suffruticoso.* *Walt. flor. carol. p. 251.*

THURARIA. *Cal. tubulosus. Cor. ipetala infundibuliformis, calice duplo longior.*
Caps. 2locularis, 2sperma.

chilensis. 1. **THURARIA.** *Molin. hist. nat. Chil. p. 135.*

ROKEJEKA. *Cal. 5fidus. Cor. 5petala, patens. Stili ad angulum rectum patuli. Caps. 1locularis, 3sperma.*

deserti. 1. **ROKEJEKA.** *Forsk. fl. aeg. arab. p. 90.*

556. CUNONIA. *Cor. 5petala. Cal. 5phyllus. Stili flore longiores. Caps. 2locularis, acuminata, polysperma.*

capensis. 1. **CUNONIA.** *Burm. afr. t. 96.*

557. TRIANTHEMA. *Cal. sub apice mucronatus.*
Cor. o. Stamina 5-10.
Germen retusum. Caps. duplicata, superimposita.

monogy- 1. *Tr. floribus pentandris monogynis.* *Mant. p. 69. Pluckn. num. alm. t. 95. f. 4.*

pentan- 2. *Tr. floribus pentandris digynis.* *Mant. p. 70. Pluekn. alm. drum. t. 104. f. 3.*

decan- 3. *Tr. floribus subdecandris digynis.* *Mant. p. 70. Burm. ind. drum. t. 31. f. 3.*

558. CHRYSOSPLENIUM. *Cal. coloratus, 4-5fidus.*

Cor. o. Caps. 2rostris, ilocularis, polysperma, semiinflera, semibivalvis.

alternifo- 1. Chr. foliis alternis. *Flor. dan. t. 366. Gaertn. de fr. et
lum. sem. cent. 3. t. 44. f. 7.*

oppositi- 2. Chr. foliis oppositis. *Flor. dan. t. 365.
folium.*

559. SAXIFRAGA. *Cal. 5dentatus. Cor. 5petala.*

Caps. infera 2rostris, 2locularis, polysperma, inter stilos foramine dehiscens.

* *foliis indivisis.*

† *caule subnudo.*

Cotyle- 1. S. foliis radicatis aggregatis lingulatis cartilagineo-ferratis,
don. caule paniculato. *Flor. dan. t. 241. Gaertn. de fr. et
sem. cent. 3. t. 36. f. 4.*

Aizoon. 2. S. foliis radicatis aggregatis lingulatis cartilagineo-ferratis,
caule subracemoso, calice glabro. *Jacq. fl. aust. 5. t. 438.*

mutata. 3. S. foliis radicalibus aggregatis lingulatis cartilagineo-ferratis,
caule racemoso folioso, calice villoso vilcido, petalis
lanceolatis aurantiis. *Haller hist. stirp. helv. 1. t. 16.*

media. 44. S. foliis radicalibus aggregatis ligulatis cartilagineis mar-
gine supra punctatis, caule racemoto. *Gouan. ill.*

sedoides. 4. S. foliis aggregatis alternis oppositisque sublanceolatis, flore
pedunculato. *Seg. pl. veron. t. 9. f. 4.*

caesia. 5. S. foliis aggregatis linearibus perforato-punctatis recurvatis,
caule multifloro. *Jacq. fl. aust. 4. t. 374.*

bursaria. 6. S. foliis aggregatis imbricatis triquetris subulatis laevibus,
na. caule unifloro. *Wulfen apud Jacq. misc. aust. 1. t. 17. f. 3.*

bronchia. 7. S. foliis imbricatis subulatis ciliatis spinosis, caule multifloro.
lis. *Gmel. flor. fib. 4. t. 65. f. 2.*

tenella. 8. S. foliis linearis-subulatis ciliatis spinula terminatis, caulis
erectis paucifloris; stolonibus e latere cauliferis, *Wulf.
ap. Jacq. coll. 3. p. 144. t. 17.*

- bryoides. 9. S. foliis imbricatis ciliatis inflexis, caule nudiusculo multi-floro. *Mant.* p. 383. *Scopol. fl. carn.* ed. 2. t. 15.
- androsoa. 10. S. foliis lanceolatis obtusis pilosis, caule nudo bifloro. *Jacq. cea.* *fl. aust.* 4. t. 389.
- peninsula. 11. S. foliis lanceolatis denticulatis, caule nudo paniculato, nica. floribus subcapitatis. *Dill. h. Elth.* t. 253. f. 328.
- stellaris. 12. S. foliis serratis subcuneiformibus obovato-oblongis, caule nudo ramoso, petalis lanceolatis biguttatis. *Flor. dan.* t. 23. *Wulfen apud Jacq. coll.* 1. p. 202. t. 13.
- crassifolia. 13. S. foliis ovalibus retusis obsoleto-serratis petiolatis, caule nudo, panicula conglomerata. *Linn. dec.* 2. t. 14.
- nivalis. 14. S. foliis ovatis crenatis subsessilibus, caule nudo, floribus congestis. *Flor. dan.* t. 28.
- farmento-
fa. 15. S. foliis radicalibus subrotundis cordatis crenatis, farmentis axillaribus radicantibus, racemo composito: corolla irregulari. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. t. 15. *Murray comm. Goett.* 1781. t. I.
- hirsuta. 16. S. foliis cordato-ovalibus retusis cartilagineo-crenatis, caule nudo paniculato. *Magn. h. monsp.* t. 87.
- umbrosa. 17. S. foliis ovatis subretusis cartilagineo-crenatis, caule nudo paniculato. *Mill. ic.* 141. f. 2.
- punctata. 18. S. foliis subrotundis dentatis longius petiolatis, caule nudo. *Morif. hist. pl.* 3. t. 9. f. 17.
- Geum. 19. S. foliis reniformibus dentatis, caule nudo paniculato. *Morif. hist. pl.* 3. t. 9. f. 12.
- cuneifo-
lia. 20. S. foliis cuneiformibus obtusissimis repandis, caule nudo paniculato. *Gesn. fasc.* 19. t. 12. f. 37.

TT caule folioso.

- muscoi- des. 21. S. foliis radicalibus aggregatis linearibus integris trifidisque, scapo gracili tuberculo paucifloro: floribus subflessilibus. *Jacq. misc. aust.* 2. p. 125.
- oppositi- folia. 22. S. foliis caulinis oppositis imbricatis: summis ciliatis. *Flor. dan.* t. 34. β) *Gesn. fasc.* 26. t. 9. f. 3.
- biflora. 45. S. foliis imbricatis ovatis, caulibus reptantibus bifloris. *Allion. fl. pedem.* t. 21. f. 1.
- trichodes. 46. S. foliis lanceolatis villosis, caulibus prostratis, pedunculis filiformibus subunifloris. *Allion. flor. pedem.* t. 61. f. 2.

- aspera. 23. *S. foliis caulinis lanceolatis alternis ciliatis, caulis pro-*
cumbentibus. Mant. p. 383. Jacq. fl. austr. 5. app. t. 31.
- Hirculus. 24. *S. foliis caulinis lanceolatis alternis nudis inermibus, caule*
erecto. Mant. p. 383. Flor. dan. t. 200.
- aizoides. 25. *S. foliis caulinis linearis - subulatis sparsis nudis inermibus,*
caulis decumbentibus. Mant. p. 383. Flor. dan. t. 72.
Folia interdum ciliata; an vere specie distincta ab auctum-
nali?
- auctum- 26. *S. foliis caulinis linearibus alternis ciliatis, radicalibus ag-*
nalis. Scop. fl. carn. ed. 2. t. 14.
- retusa. 47. *S. propaginibus prostratis, foliis oppositis quadrifariam im-*
briatis punctatis triquetris acutis, floribus terminalibus
geminatis. Gouan. illusfr. t. 18. f. 1.
- Clusii. 48. *S. foliis cuneiformibus subdentatis caule paniculato. Gouan.*
illusfr.
- rotundi- 27. *S. foliis caulinis reniformibus dentatis petiolatis, caule pa-*
niculato. Gesn. fasc. 19. t. 10. f. 25. Bulliard herb.
Franc. t. 327.
- *** *foliis lobatis.*
- T *caulis erectis.*
- granulata. 28. *S. foliis caulinis reniformibus lobatis, caule ramoso, ra-*
dice granulata. Flor. dan. t. 514.
- bulbifera. 29. *S. foliis palmato-lobatis: caulinis sessilibus, caule ramoso*
bulbifero. Moris. hist. pl. 3. t. 9. f. 24.
- cernua. 30. *S. foliis caulinis palmatis petiolatis, caule simplicissimo*
unifloro bulbifero. Flor. dan. t. 22.
- rivularis. 31. *S. foliis caulinis palmatis: summo florali ovato, caule sim-*
plici subbifloro. Flor. dan. t. 118.
- fibirica. 32. *S. foliis caulinis reniformibus palmatis pilosis, caule pe-*
dunculisque filiformibus.
- ajugifolia. 33. *S. foliis radicalibus palmato-quinquepartitis, caulinis li-*
nearibus indivisis, caulis adscendentibus multifloris.
- exarata. 49. *S. foliis palmato-trifidis supra lineatis hirsutis, caule ad-*
scendente multifloro: petalis trinerviis. Allion. fl. pedem.
t. 88. f. 2.
- groenlan- 34. *S. foliis caulinis palmato-multifidis sparsis: laciinis acutis.*
dica. Gunn. fl. norw. t. 7. f. 1. an mera cespitosae varietas?

- tridactyli- 35. S. foliis caulinis cuneiformibus trifidis alternis, caule ramoso. *Curt. flor. Lond. t. 129.* β) foliis omnibus lanceolatis integerrimis. *Retz. obs. bot. 1. p. 18.*
- adscen- 36. S. caule firmo foliisque subcoriaceis cuneiformibus villosissimis: apice trivel quinquedentatis. *Mant. p. 384.*
Wulfen apud Jacq. coll. I. p. 197. t. II. 12. f. 1. 2.
- geranioi- 37. S. foliis radicalibus reniformibus quinquelobis multifidis: caulinis linearibus, caule ramoso. *Gouan. ill. t. 18. f. 2.*
- moschata. 38. S. foliis radicalibus aggregatis linearibus integris trifidisque una cum caule glutinosis hirsutis, floribus longe pedunculatis. *Jacq. misc. austr. 2. p. 128.*
- cespitoſa. 39. S. foliis radicatis aggregatis linearibus integris trifidisque, caule subbifloro. *Mant. p. 383. Flor. dan. t. 71.*
- hypnoi- 40. S. foliis caulinis linearibus integris trifidisque, stolonibus procumbentibus, caule nudiſculo. *Flor. dan. t. 348.*
- pedemon- 50. S. foliis trilobis tridentatisque: caulinis palmatis, caule subnudo. *Allion. flor. pedem. t. 21. f. 5. 6.*

TT caulis procumbentibus.

- orientalis. 51. S. foliis radicalibus ramisque subseptemlobis: summis integerrimis bifidisque, caule ramosissimo basi decumbente. *Jacq. obs. bot. 2. t. 34.*
- cymbala- 41. S. foliis caulinis cordatis trilobis integrisque. *Buxb. cent. 2. t. 45. f. 2.*
- hederacea. 42. S. foliis caulinis ovatis lobatis, caule filiformi flaccido.
- petraea. 43. S. foliis petiolatis palmato-tripartitis: laciinis subtrifidis, caule flaccido ramosissimo decumbente, pedunculis longissimis unifloris: petalis emarginatis. *Pluckn. phyt. t. 222. f. 3. Gouan. obs. t. 18. f. 3.*

TTT caule nullo.

- Bellardi. 52. S. foliis cuneiformibus subquinquelobis. *Allion. flor. pedem. t. 88. f. 1.*

560. TIARELLA. *Cal. 5partitus. Cor. calici inserta,*
5petala : petalis integris.
Caps. ilocularis, 2valvis : val-
va altera majore.

- cordifo- 1. *T. scapo aphylo, foliis cordatis sublobatis.* *Hermt. par.*
lia. bot. t. 129.
- unifolia. 2. *T. caule unifolio, foliis cordatis integris.* *Retz. obs. bot. 3.*
p. 30.
- trifoliata. 3. *T. foliis ternatis.*

561. MITELLA. *Cal. 5fidus. Cor. calici inserta, 5-*
petala : petalis pinnatifidis.
Caps. supera, ilocularis, semi-
bivalvis : valvis aequalibus.

- diphylla. 1. *M. scapo diphylo.* *Mentz. pug. t. 10. Gaertn. de fr. et*
sem. cent. 3. t. 44. f. 6.
- nuda. 2. *M. scapo nudo.* *Gmel. flor. sib. 4. t. 63. f. 2.*

562. SCLERANTHUS. *Cal. iphyllus. Cor. o. Sem.*
1. calici inclusum.

- polycar- 1. *Scl. calicibus fructus patentissimis spinosis, caulibus subvil-*
pos. *Iofis. Col. ecphr. 1. t. 294.*
- annuus. 2. *Scl. calicibus fructus patulis inermibus.* *Flor. dan. t. 504.*
- perennis. 3. *Scl. calicibus fructus clausis.* *Flor. dan. t. 563.*

563. GYPSOPHILA. *Cal. iphyllus, campanulatus,*
angulatus. Petala 5 ova-
ta, sessilia. Caps. globosa,
ilocularis.

- perfoliata. 1. *G. foliis ovato-lanceolatis semiamplexicaulibus.* *Dill. h.*
Etb. t. 276. f. 357. β) Gypsophila tomentosa. Syst.
nat. XII. 3. p. 306. Barr. pl. rar. ic. t. 1002.

- prostrata. 2. *G. foliis lanceolatis laevibus, caulis diffusis, pistillis co-*
rolla campanulata longioribus. *Pluckn. alm. t. 75. f. 2.*
3. G.

- viscosa. 3. *G. foliis lanceolatis, internodiis caulis ramorum pedunculorumque medio viscosis, petalis emarginatis.* Murray conum. Goett. 1783. t. 3.
- repens. 4. *G. foliis lanceolatis, staminibus corolla emarginata brevioribus.* Jacq. fl. austr. 5. t. 407.
- panicula. 5. *G. foliis lanceolatis scabris, floribus dioicis: corollis revolutis.* Jacq. fl. austr. 5. t. 1.
- altissima. 6. *G. foliis lanceolatis subtrinerviis, caulis rectis.* Gmel. flor. fib. 4. t. 60.
- adscendens. 7. *G. foliis lanceolato-linearibus, caulis prostratis, staminibus pilosissime corollam aequantibus.* Jacq. b. Vind. 2. t. 138.
- fastigiata. 8. *G. foliis lanceolato-linearibus obsolete triquetris laevibus obtusis secundis.* Gmel. flor. fib. 4. t. 61. f. 1.
- struthium. 9. *G. foliis linearibus carnosis: axillaribus confertis teretibus.* Barr. pl. rar. ic. t. 119.
- muralis. 10. *G. foliis linearibus planis, calicibus aphyllis, caule multiplicato-dichotomo ramosissimo, petalis crenulatis.* Mentz. pug. t. 7. f. 4.
- rigida. 11. *G. foliis linearibus planis, caule dichotomo, pedunculis bifloris, petalis emarginatis.*
- alpina. 12. *G. foliis linearibus sessilibus: caulinis oppositis connatis, caule ramoso, pedunculis axillaribus unifloris: calice petalis integerrimis minore.* Hablize apud S. G. Gmelin it. 4. p. 178.
- saxifraga. 13. *G. foliis linearibus, calicibus squamis quatuor: petalis emarginatis.* Barrel. pl. rar. ic. t. 998.

564. SAPONARIA. *Cal. iphyllus, nudus. Petala 5 unguiculata. Caps. oblonga, ilocularis.*

- officina. 1. *S. caulis cylindricis, foliis ovato-lanceolatis.* Curt. flor. Lond. t. 102.
- porrigens. 2. *S. calicibus cylindricis pubescentibus, ramis divaricatissimis, capulis pendulis.* Mant. p. 239. Syft. nat. XII. 4. p. 230. *Silene porrigens.* Jacq. b. Vind. 2. t. 109.
- ocymoides. 3. *S. calicibus cylindricis villosis, caulis dichotomis procumbentibus.* Jacq. fl. austr. 5. app. t. 23.

- orienta- 4. *S. calicibus cylindricis villosis, caule dichotomo erecto pa-*
 lis. *Dill. h. Elth t. 167. f. 204.*
- illyrica. 5. *S. calicibus subcylindricis, caule erecto viscido-purpuraf-*
 cente: ramis alternis, corollis punctatis. *Mant. p. 70.*
Ard. spec. 2. t. 9.
- lutea. 6. *S. calicibus teretibus, corollis coronatis, floribus subumbel-*
 latis, foliis sublinearibus canaliculatis. *Allion. fl. pedem.*
t. 5. f. 2.
- Vaccaria. 7. *S. calicibus pyramidatis quinangularibus, foliis ovatis*
acuminatis lessilibus. *Tabern. Kraeuterb. p. 866.*
- cætica. 8. *S. calicibus quinquangularibus striatis, caule erecto subdi-*
 chotomo, foliis subulatis. *Alp. exot. t. 291.*

565. DIANTHUS. *Cal. cylindricus, iphyllus: basi*
squamis 2-8. Petala 5 un-
guiculata. Caps. cylindri-
ca, ilocularis.

* *caule herbaceo.*

T *multifloro.*

— *floribus aggregatis.*

- barbatus. 1. *D. floribus fasciculatis: squamis calicinis ovato-subulatis*
tubum aequantibus, foliis lanceolatis.
- japonicus. 2. *D. floribus fasciculatis: squamis calicinis acutis ciliatis tubo*
brevioribus. *Thunb. flor. japon. p. 183.*
- Armeria. 3. *D. floribus fasciculatis: squamis calicinis lanceolatis villosis*
tubum aequantibus. *Flor. dan. t. 230.*
- prolifer. 4. *D. floribus capitatis: squamis calicinis ovatis obtusis muticis*
tubum superantibus. *Flor. dan. t. 221.*
- ferrugi- 5. *D. petalis bifidis: laciniis tridentatis.* *Mant. p. 563. Barr.*
 neus. *pl. rar. ic. t. 497.*
- carolina- 26. *D. pedunculis elongatis, squamis calicinis tubo dimidio*
 nus. *longioribus.* *Walt. flor. carol. p. 140.*
- atro- 28. *D. squamis calicinis ovatis aristatis tubo brevioribus, foliis*
 rubens. *connatis striatis.* *Allion. flor. pedem.*
- carthusia- 6. *D. floribus subaggregatis, squamis calicinis ovatis aristatis*
 norum. *tubum subaequantibus, foliis trinerviis.* *Loef. fl. pruss. f. 7.*

— — *flo-*

— floribus solitariis.

- glaucus. 7. D. floribus subsolitariis: squamis calicinis lanceolatis quaternis brevibus, corollis crenatis. *Dill. b. Elth. t. 298. f. 348.*
- albens. 27. D. squamis calicinis lanceolatis quaternis brevibus, corollis emarginatis. *Ait. hort. Kew. 2. p. 90.*
- Caryo- 8. D. squamis calicinis subovatis brevissimis, corollis crenatis.
phyllus. *Regn. bot. t. 117. Blackw. herb. t. 85. Knorr del. hort. 1. t. N. 10-12.*
- diminu- 9. D. squamis calicinis octonis florem superantibus. *Tabern. Kraeuterb. p. 290.*
- tus.
- pomeri- 10. D. squamis calicinis binis cordatis brevissimis, corollis
dianus. emarginatis subintegerrimis. *Sp. pl. p. 1673.*
- deltoides. 11. D. squamis calicinis lanceolatis binis, corollis crenatis.
Flor. dan. t. 577.
- rupestris. 12. D. squamis calicinis obtusissimis binis, petalis crenatis.
Suppl. p. 240. Cluf. hist. 1. p. 282. ic.
- sinensis. 13. D. squamis calicinis subulatis patulis tubum aequantibus,
corollis crenatis. *Mill. ic. 81. f. 2.*
- monspe- 14. D. squamis calicinis subulatis tubum aequantibus, corollis
liacus. multifidis, caule erecto.
- plumari- 15. D. squamis calicinis subovatis brevissimis, corollis multifidi-
us. dis fauce pubescentibus.
- moscha- 16. D. squamis ovato-obtusis, corollis profunde multifidis, fo-
tus. liis filiformibus subulatis. *Joh. Mayer boehm. Abb. 1787.
p. 318.*
- superbus. 17. D. floribus paniculatis, squamis calicinis brevibus acumi-
natis, corollis multifido-capillaris, caule erecto. *F.
dan. t. 578.*
- glacialis. 18. D. floribus subacaulebus, squamis calicinis elongatis acu-
minatis tubum superantibus, foliis linearibus florem supe-
rantibus. *Haenk. apud Jacq. coll. 2. p. 84.*

— caule unifloro.

- arenarius. 19. D. caulebus subunifloris, squamis calicinis ovatis obtusis,
petalis multifidis, foliis linearibus.
- silvestris. 20. D. caulebus subunifloris, squamis calicinis subovatis bre-
vissimis, corollis crenatis, foliis rigidis subulatis supra sul-
catis. *Wulfen apud Jacq. coll. 1. p. 237.*

- virgineus. 21. D. caule subunifloro, corollis crenatis, squamis calicinis brevissimis, foliis subulatis. *Jacq. fl. aust. 5. app. t. 15.*
 alpinus. 22. D. corollis crenatis, squamis calicinis exterioribus tubum aequantibus, foliis linearibus obtusis. *Jacq. fl. aust. 1. t. 52.*

** *caule fruticoso.*

- pungens. 23. D. caule suffruticoso, foliis linearis-subulatis, petalis integris. *Mant. p. 240.*
 arboreus. 24. D. foliis subulatis, petalis ferratis. *Alp. exot. t. 38.*
 fruticosus. 25. D. foliis lanceolatis. *Tournef. it. 1. t. 9.*

TRIGYNIA.

- 566. CUCUBALUS.** *Cal. inflatus. Petala 5 (rarius plura) unguiculata, absque corona ad faucem. Caps. 3locularis.*

- baccifer. 1. *C. calicibus campanulatis, petalis distantibus, pericarpiis coloratis, ramis divaricatis.* *Gmel. act. Petrop. 1759. t. 17. f. 1. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 77. f. 7.*
 Behen. 2. *C. calicibus subglobosis glabris reticulato-venosis, corollis subnudis.* *Flor. dan. t. 857.*
 glutinosus. 3. *C. calicibus clavatis, petalis bipartitis, genitalibus rectis, panicula dichotoma patentissima.* *Retz. obs. bot. 2. p. 18.*
 italicus. 4. *C. calicibus clavatis, petalis semibifidis, genitalibus declinatis, panicula dichotoma erecta, caule erecto.* *Jacq. obs. bot. 4. t. 97.*
 molassimus. 5. *C. petalis semibifidis, panicula dichotoma, caule foliisque holotericeis: radicalibus spatulatis.* *Mant. p. 385. Bocc. mus. t. 118?*
 procumbens. 6. *C. petalis semibifidis, panicula dichotoma: floribus singulis pedicellatis.* *S. G. Gmel. it. 3. p. 309. an distincta species?*
 laxiflora. 7. *C. petalis bifidis, calicibus striatis: terminalibus subsessiliibus; lateralibus pedunculatis.* *Mant. p. 71. Schreb. dec. 9. t. 5.*

- fruticolo- 8. *C. petalis bifidis, calicibus cylindrico-ventricosis scabris fus.* decemfriatris, foliis linearibus acutissimis. *Pallas it. 2. p. 739. t. T.*
- tataricus. 9. *C. petalis bipartitis, floribus secundis decumbentibus, pedunculis oppositis solitariis erectis, caule simplicissimo.*
- catholi- 10. *C. petalis bipartitis, staminibus longis, floribus paniculatis, foliis lanceolato-ovatis.* *Jacq. b. Vind. I. t. 59.*
- reflexus. 11. *C. petalis subbipartitis obsoletis, floribus spicatis alternis subfessilibus.* *Magn. fl. monsp. t. 170.*
- sibiricus. 12. *C. petalis emarginatis, floribus subverticillatis: verticillis umbellatis aphyllis.* *Hall. comm. goett. I. p. 150. ic.*
- aegyptia- 13. *C. petalis emarginatis retroflexis: utrinque denticulo notatus, floribus erectis.* *Mant. p. 385.*
- Otites. 14. *C. floribus dioicis: petalis linearibus indivisis.* *Flor. dan. t. 518.*
- viscosus. 15. *C. floribus lateralibus undique decumbentibus, caule indiso, foliis basi reflexis.* *Tournef. it. 2. t. 361.*
- polypeta- 16. *C. foliis oppositis ovato-lanceolatis, floribus polypetalis.* *Walt. flor. carol. p. 141.*
- pumilis. 17. *C. caulibus unifloris flore brevioribus.* *Mant. p. 71.* *Jacq. fl. aust. 5. app. t. 2.*
- fabarius. 18. *C. foliis obovatis carnosis.* *Bocc. mis. t. 92.*
- stellatus. 19. *C. foliis quaternis.*

567. SILENE. *Cal. ventricosus. Petala 5 unguiculata, ad faucem coronata. Caps. 1-3 locularis.*

* *floribus lateralibus.*

T *solitariis.*

- Iusitanica. 1. *S. hirsuta, petalis dentatis indivisis, floribus erectis, fructibus divaricato-reflexis alternis.* *Dill. b. Elth. t. 311. f. 401.*
- anglica. 2. *S. hirsuta, petalis emarginatis, floribus erectis, fructibus reflexis pedunculatis alternis.* *Curt. flor. Lond. t. 266.*
- cerastoi- 3. *S. hirsuta, petalis emarginatis, fructificationibus erectis, calicibus subfessilibus subpilosis.* *Dill. b. Elth. t. 309. f. 307.*

- villosa. 4. *S. hirsuta*, petalis bifidis oblongis basi connatis, foliis lanceolatis sessilibus. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 88.*
- cuneifolia. 5. *S. villosa*, petalis integris crenulatis, foliis cuneiformibus basi ciliatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 210.*
- succulen- 6. *S. petalis bifidis*, floribus pedunculatis, foliis carnosis ovata. *Iibus villosis sessilibus subviscidis confertis patentissimis. Forsk fl. aeg. arab. p. 89.*
- nocturna. 7. *S. petalis bifidis*, floribus spicatis alternis secundis sessilibus. *Dill. b. Elth. t. 310. f. 400.*
- aegyptia- 8. *S. petalis emarginatis*, utrinque dentatis, foliis subto-
ca. *mentosis. Suppl. p. 241.*
- gallica. 9. *S. petalis indivisis*, floribus subspicatis alternis secundis, fructibus erectis. *Dill. b. Elth. t. 310. f. 399.*
- quinque- 10. *S. petalis integerrimis subrotundis*, fructibus erectis alternis. *vulnera.*
- pumilio. 11. *S. caulibus unifloris*, floribus maximis: calice subcoriaceo ventricoso-campanulato hirsuto. *Wulfen. ap. Jacq. coll. 2. p. 126. t. 10.*
- Smithii. 12? *S. calicibus glabris clavatis*, petalis semibifidis, foliis glau-
cis: inferioribus ovatis; summis cordatis amplexicaulibus. *Smith plant. ic. ined. I. t. 13.*
- latifolia. 48. *S. calicibus clavatis*: petalis bifidis, foliis ovatis acumina-
tis laevibus. *Poir. voy. en Barb. 2. p. 165.*
- colorata. 49. *S. calicibus alternis coloratis*, petalis bifidis, foliis spatula-
tis. *Poir. voy. en Barb. 2. p. 163.*
- sedoides. 50. *S. floribus pedunculatis*, caule visco humili dichotomo.
Poir. voy. en Barb. 2. p. 164.

TT *floribus confertis.*

- involuta. 13. *S. petalis apice bifidis*, foliis lanceolato-linearibus sessili-
bus ciliatis subtus tomentosis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 210.*
- mutabilis. 14. *S. petalis bifidis*, calicibus angulatis pedunculatis, foliis lanceolato-linearibus.
- nutans. 15. *S. petalis bifidis*, floribus lateralibus secundis cernuis, pa-
nicula nutante. *Flor. dan. t. 242.*
- amoena. 16. *S. petalis bifidis*: coronula subcoadunata, floribus secundis,
pedunculis oppositis trifloris, ramis alternis. *Moris. hist. pl. 2. t. 20. f. 2.*

- is lan-
mibus
s ova-
llimis.
ilibus.
subto-
undis,
ernis.
riaceo
g. coll.
glau-
libus.
mina-
atula-
omo.
effili-
210.
foliis
, pa-
ndis,
bifl.
- paradoxa. 17. *S. petalis bifidis, calicibus decemfalcatis viscidis, floribus racemosis: aliis staminibus exsertis, aliis inclusis.* Sp. pl. p. 1673. *Jacq. h. Vind.* 3. t. 84.
- fruticosa. 18. *S. petalis bifidis, caule fruticoso, foliis lato-lanceolatis, panicula trichotoma.* Bocc. sic. t. 30.
- buplen- 19. *S. petalis bifidis, floribus pedunculatis oppositis bractea roides.* brevioribus, foliis lanceolatis acutis glabris. *Tournef. it.* 2. t. 154.
- gigantea. 20. *S. petalis bifidis, foliis radicalibus cochleariformibus obtusissimis, floribus tubverticillatis.* Walth. hort. t. 11.
- viridiflo- 21. *S. petalis semibifidis, foliis ovatis sebriusculis acutis, pani- ra.* cula elongata subaphylla. *Herm. parad. lugdb.* t. 99.
- crassifolia. 22. *S. petalis emarginatis, foliis suborbiculatis carnosis hirsutis, racemo secundo.*

** *floribus ex dichotomia caulis.*

- Armeria. 23. *S. petalis integris, floribus fasciculatis fastigiatis, foliis superioribus cordatis glabris.* Flor. dan. t. 559.
- conoidea. 24. *S. petalis integris, calicibus fructus globosis acuminatis, striis triginta, foliis glabris.* Moris. bifl. pl. 2. t. 36.f. 6.
- conica. 25. *S. petalis bifidis, calicibus fructus conicis: striis triginta, foliis mollibus.* Jacq. fl. aust. t. 253.
- vespertini- 26. *S. petalis bifidis: coronula coadunata, calicibus subclava- na.* na. *Retz. obs. bot.* 3. p. 31.
- bellidifo- 27. *S. petalis bifidis, calicibus fructus ovatis villosis, foliis lia.* pilosis subasperis. *Jacq. h. Vind.* 3. t. 81.
- noctiflo- 28. *S. petalis bifidis, calicibus decemangularibus: dentibus tu- ra.* rum aequantibus, caule dichotomo. *Cam. hort.* t. 34. *Caps. ilocularis.*
- ornata. 56. *S. petalis bifidis, calicibus fructus oblongis carinatis pilo- sis, foliis lanceolatis pubescentibus planis cauleque viscidis.* Ait. hort. Kew. I. p. 96.
- undulata. 57. *S. petalis bifidis, calicibus fructus clavato-cylindricis pilo- sis, foliis lanceolatis pubescentibus undulatis, caule ad- scendente.* Ait. hort. Kew. 2. p. 96.
- portensis. 29. *S. petalis bifidis, calicibus striatis, caule dichotomo pan- culato, foliis linearibus.*

- cretica. 30. *S. erecta laevis*, petalis bifidis, calicibus erectis decemangularibus. *Dill. b. Elth. t. 314. f. 404. 405.*
- Muscipula. 31. *S. petalis bifidis*, caule dichotomo, floribus axillaribus sessilibus, foliis glabris.
- vallesia. 32. *S. petalis bifidis*, caulis subunifloris decumbentibus, foliis lanceolatis tomentosis, longitudine calicis. *Mant. p. 385. Bocc. mus. t. 54.*
- Saxifraga. 33. *S. petalis bifidis*, floribus hermaphroditis femineisque, caulis subunifloris, pedunculis longitudine caulis. *Seg. pl. var. t. 6. f. 1.*
- orchidea. 35. *S. petalis quadrifidis*, floribus fasciculatis, foliis ovatis glabris. *Suppl. p. 241.*
- alpestris. 38. *S. petalis quadrifidis*, caule subunifloro, foliis linearilanceolatis glabris. *Jacq. flor. austr. t. 96.*
- Atocion. 36. *S. petalis semibilobis*, fasciculo florum terminali dichotomo, calicibus fructus clavatis foliis obovatis. *Jacq. b. Vind. 3. t. 32.*
- striata. 37. *S. petalis emarginatis*, calicibus glabris reticulato-venosis acuminatis pedunculo longioribus, caule dichotomo stricto.
- antirrhina. 38. *S. petalis emarginatis*, calicibus ovatis, pedunculis trifidis, foliis lanceolatis subciliatis. *Dill. b. Elth. t. 313. f. 403.*
- elongata. 59. *S. petalis emarginatis*, calicibus subpelliformibus, foliis linearibus, caule unifloro. *Bellard. offerv. botan.*
- exscapa. 60. *S. acaulis*, petalis emarginatis, capsulis globosis. *Allion. flor. pedem. t. 79. f. 2.*
- acaulis. 39. *S. acaulis depressa*, petalis emarginatis, capsula cylindrica. *Flor. dan. t. 21.*
- rupestris. 40. *S. petalis emarginatis*, calicibus teretibus erectis, foliis lanceolatis. *Flor. dan. t. 4.*
- inaperta. 41. *S. petalis emarginatis brevissimis*, calicibus laevis, caule dichotomo paniculato, foliis glabris lanceolatis. *Sp. pl. 19. 21. Dill. b. Elth. t. 315. f. 407.*
- rubella. 42. *S. erecta laevis*, calicibus subglobosis glabris venosis, corollis inapertis. *Dill. b. Elth. t. 314. f. 406.*
- pendula. 43. *S. calicibus fructus inflatis pendulis*: angulis decem scabris. *β) Dill. b. Elth. t. 312. f. 404.*
- Behen. 44. *S. calicibus glabris ovatis venoso-reticulatis*. *Dill. b. Elth. t. 317. f. 409.*

- virginica. 45. *S. calicibus floris cylindricis, panicula dichotoma.* *Pluckn.*
alm. t. 203. f. 1.
- Catesbaei. 54. *S. calicibus cylindricis, petalis laciniatis, panicula subtri-*
chotoma. *Walt. flor. carol. p. 141.*
- carolinia. 55. *S. calicibus cylindricis, petalis obtusis, panicula subtricho-*
na. *Walt. flor. carol. p. 142.*
- polyphylla. 46. *S. foliis fasciculatis setaceis: ramorum florentium op-*
positis.
- chloraeo. 51. *S. calicibus glabris clavatis, petalis semibifidis, foliis glau-*
cia: inferioribus ovalibus; summis cordatis amplexicauli-
bis. *Smith plant ic. ined. t. 13.*

*** incertae tribus.

- oppositifolia. 47. *S. procumbens, foliis oppositis, calicibus hirsutis venoso-*
reticulatis supra incrassatis, petalis bifidis. *S. G. Gmelin*
it. 3. p. 306. t. 32. f. 2.
- hirsvta. 52. *S. floribus subspicatis secundis: calicibus alternis hirsutis*
fessilibus; petalis emarginatis. *Poir. voy. en Barb. 2.*
p. 163.
- angustifolia. 53. *S. caule paniculato, foliis linearibus, petalis angustis in-*
tegerrimis. *Poir. voy. en Barb. 2. p. 164.*
- procumbens. 48. *S. calicibus ovatis inflatis erectis obsolete decemangularibus,*
petalis subauriculatis bifidis, caule procumbente. *Mur-*
ray comm. Goett. ad ann. 1784. et 1785. p. 83. t. 2.
- sericea. 61. *S. foliis acuminatis succulentis hirsutis lucidis, floribus ter-*
minalibus pedunculatis. *Allion. flor. pedem. t. 79. f. 3.*
- cordifo- 62. *S. caule simplici, foliis ovatis acutis, floribus terminali-*
bus subfessilibus, petalis semibifidis. *Allion. flor. pedem.*
t. 25. f. 3.
- nicacensis. 63. *S. villosa viscosa, foliis linearibus obtusis, petalis semibi-*
fidis, capsulis ovatis: calicibus decemstriatis. *Allion. flor.*
pedem. t. 44. f. 2.

568. STELLARIA. *Cal. 5phyllus, patens. Petala*
5utplurimum 2partita. Caps.
ilocularis, polysperma.

nemorum. 1. *St. foliis cordatis petiolatis, panicula pedunculis ramosis.*
Flor. dan. t. 271.

2. St.

- arenaria. 2. St. foliis spatulatis, caule erecto bifido, ramis alternis, petalis emarginatis.
- dichoto- 3. St. foliis ovatis sessilibus, caule dichotomo, floribus solitaria, pedunculis fructiferis reflexis. *Smith. pl. ic. ined. I. t. 14.*
- bulbosa. 4. St. foliis lanceolato-ovatis, caule subdichotomo, pedunculis elongatis unifloris, radice repeate bulbifera. *Wulsen apud Jacq. Collect. 3. p. 21.*
- hyperici- 16. St. foliis glaucis glabris sessilibus: imis ovatis; superioribus elliptico-lanceolatis. *Allion. flor. pedem.*
- crassifolia. 5. St. foliis ovato-lanceolatis crassiusculis, pedunculis unifloris ex dichotomia caulis, floribus erectis: corolla caliceum superante, capsulis reflexis. *Ehrhart Hannov. Mag. 1784. n. 8. p. 117.*
- radians. 6. St. foliis lanceolatis ferrulatis, petalis quinquepartitis. *Amm. ruth. t. 10.*
- Holosteae. 7. St. foliis lanceolatis ferrulatis, petalis bifidis. *Flor. dan. t. 698.*
- uliginosa. 8. St. foliis lanceolatis basi ciliatis angustioribus, caule diffuso procumbente ramosissimo, pedunculis ternis: intermedio unifloro; lateralibus dichotomis paucifloris. *Roth. fl. germ. I. p. 191.*
- lateriflo- 9. St. foliis lanceolatis integerrimis, floribus secundis: petalis bifidis. *Kroker flor. filef. 2. I. p. 52. t. 4.*
- Dillenia- 10. St. foliis linear-lanceolatis, caule flaccido, pedunculis terminalibus bifloris. *Moench fl. haff. n. 364.*
- cerastro- 11. St. foliis oblongis, pedunculis subbifloris. *Jacq. coll. I. des. p. 254. t. 19.*
- undulata. 12. St. foliis oblongis undulatis, caule angulato, floribus axillaribus. *Thunb. flor. jap. p. 185.*
- graminea. 13. St. foliis linearibus integerrimis, floribus paniculatis. *Mill. illustr. ic.*
- biflora. 14. St. foliis subulatis, scapis subbifloris, petalis emarginatis, germinibus oblongis, calicibus striatis. *Flor. dan. t. 12.*
- uniflora. 15. St. foliis subulatis oppositis, pedunculis alternis unifloris, calicibus subhirsutis, petalis emarginatis. *Walt. flor. carol. p. 141.*

rupestris. 17. St. foliis planis subtus trinerviis, petalis calice brevioribus.
Scop. flor. carn. t. 18.

ciliata. 18. St. foliis imbricatis semicylindricis: margine infra medium
ciliato. *Scop. flor. carn. t. 17.*

569. ARENARIA. *Cal. 5phyllus, patens. Petala 5 integra. Caps. ilocularis,
polysperma.*

cerastioi- 1. A. foliis spatulatis, caule erecto pubescente, floribus subfo-
des. litariis: petalis calice duplo longioribus. *Poir. voy. en
Barb. 2. p. 166.*

peploides. 2. A. foliis ovatis acutis carnosis. *Flor. dan. t. 624.*

trinervia. 3. A. foliis ovatis acutis nervosis petiolatis. *Flor. dan. t. 329.*

ciliata. 4. A. foliis ovatis acutis nervosis ciliatis. *Flor. dan. t. 346.*

multicau- 5. A. foliis ovatis acutis enerviis sessilibus, corollis calice ma-
lis. joribus. *Hall. stirp. Helv. t. 17. an meraciliatae varietas?*

lateriflora. 6. A. foliis ovatis obtusis, pedunculo laterali bifloro.

tetraque- 7. A. foliis ovatis carinatis recurvis quadrifariam imbricatis.
tra. *Mant. p. 386. β) Gypsophila aggregata. Sp. pl. p. 581.
Magn. fl. monsp. t. 5.*

balearia. 8. A. foliis ovatis lucidis subcarnosis, caule repente, peduncu-
lis unifloris. *Herit stirp. nov. 2. p. 29. t. 15.*

norwegi- 38. A. foliis ovatis nudis nitidis, caule procumbente, bifloro.
ca. *Gunn. flor. norw.*

Halleri. 39. A. foliis ovatis obtusis ad basin subciliatis, caule prostrato.
Hall. hist. stirp. Helv. n. 877.

serpil- 9. A. foliis subovatis acutis sessilibus, corollis calice breviori-
lifolia. bus. *Curt. flor. Lond. fasc. 45.*

biflora. 10. A. foliis obovatis obtusis, caulibus procumbentibus, pedun-
culis bifloris lateralibus. *Mant. p. 71.*

dichoto- 11. A. foliis inferioribus orbiculatis: superioribus lanceolatis,
ma. caule geniculato decumbente geniculisque dichotomis.
Krocker flor. filef. 2. I. p. 55.

lanceola- 40. A. foliis calicibusque lanceolatis trinerviis. *Allion. flor.
ta. pedem. t. 26. f. 5.*

- calicina. 12. A. foliis linear-i-lanceolatis, caule erecto laevi, pedunculis unifloris, calicibus corolla longioribus. *Poir. voy. en Barb. 2. p. 167.*
- montana. 13. A. foliis linear-i-lanceolatis scabris, caulis sterilibus longissimis procumbentibus.
- polygo- 14. A. foliis linearibus, caulis procumbentibus, pedunculis bifloris terminalibus erectis calicum subvileidorum foliolis encravatis. *Wulfen apud Jacq. coll. 1. p. 241. t. 15.*
- marina. 15. A. foliis semicylindrico-subulatis pulposis oppositis longitudine internodiorum: stipulis membranaceis ovato-acutis, caulis prostratis, calicibus capiula dimidio brevioribus. *Flor. dan. t. 740.*
- striata. 16. A. foliis linearibus erectis appressis, calicibus oblongis striatis.
- dianthoi- 17. A. foliis linearibus margine scabris, floribus capitatis, bracteis ventricosis pedunculos superantibus. *Smith pl. ic. ined. 1. t. 16.*
- cucuba- 18. A. foliis linearibus margine scabris, panicula dichotoma pubescente, petalis obovatis. *Smith pl. ic. ined. 1. t. 17.*
- genicula- 19. A. foliis linearibus, floribus paniculatis pubescentibus, petalis calice brevioribus. *Poir. voy. en Barb. 2. p. 166.*
- obtusa. 20. A. foliis linearibus obtusis, ramis bifloris, petalis vix calicem excedentibus. *Allion. flor. pedem. t. 64. f. 4.*
- gypsophi- 21. A. foliis linearibus: radicalibus fetaceis, panicula subpubescente, petalis lanceolatis.
- media. 22. A. foliis linear-i-subulatis verticillatis senis, caule erecto, calicibus capsula dimidio brevioribus. *Ephem. Ac. nat. cur. cent. 5. f. 6. t. 4.*
- recurva. 23. A. foliis linear-i-subulatis sulcatis recurvis secundis, caulis procumbentibus, pedunculis subbifloris terminalibus erectis, calicibus striatis. *Wulfen apud Jacq. coll. 1. p. 244. t. 76. f. 1.*
- triflora. 24. A. foliis subulatis, caulis paniculatis, calicis foliolis ovatis obtusis. *Gmel. flor. sibir. 4. t. 63. f. 2.*
- verna. 25. A. foliis subulatis, caulis paniculatis, calicibus acuminatis striatis. *Mant. p. 72. Jacq. fl. aust. 5. t. 404.*

- tenuifolia. 26. A. foliis subulatis, caule paniculato, capsulis erectis, petalis calice brevioribus lanceolatis. *Fior. dan.* t. 389.
- hispida. 27. A. foliis subulatis subtus hispidis.
- juniperi. 28. A. foliis subulatis spinosis, caulis erectis, calicibus striatis, capsulis oblongis. *Mant.* p. 72. *Gerard flor. prov.* t. 15. f. 1.
- fascicula. 29. A. foliis subulatis, caule erecto stricto, floribus fasciculatis: petalis brevissimis. *Jacq. fl. austr.* 2. t. 182.
- grandiflora. 30. A. foliis subulatis planis strictis: radicalibus confertis, caulis unifloris. *Allion. flor. pedem.* t. 10. f. 1.
- austriaca. 31. A. foliis subulatis, caulis suffruticosis prostratis, inde herbaceis et erectis, floribus geminis: petalis emarginatis. *Jacq. fl. austr.* 3. t. 270.
- liniflora. 32. A. foliis subulatis, caulis erectis inferne ramosis suffruticosis, floribus geminis. *Suppl. p. 241.* *Jacq. fl. austr.* 5. t. 445. coll. 2. t. 3. f. 3.
- carolinia. 39. A. foliis subulatis imbricatis, caule paniculato, pedunculis trifloris. *Walt. flor. carol.* p. 141.
- recurva. 42. A. foliis radicalibus congestis recurvis subulatis, caule simplici subtrifloro. *All. fl. ped.* t. 38. f. 3.
- filifolia. 33. A. foliis filiformibus liberis, caulis dichotomis, debilis. *Forsk. fl. aeg. arab.* p. 211.
- rubra. 34. A. foliis filiformibus oppositis internodiis duplo brevioribus, caulis prostratis: calicibus capsulis aequalibus. *Loef. fl. pruss.* t. 63.
- bavarica. 35. A. foliis semicylindricis carnosis obtusis, pedunculis terminalibus subbinatis, petalis lanceolatis.
- laricifolia. 36. A. foliis setaceis, caule superne nudiusculo, calicibus subhirsutis. *Jacq. fl. austr.* 3. t. 272.
- capillacea. 43. A. foliis setaceis rigidis glabris, floribus erectis: petalis calice majoribus. *Allion. flor. pedem.* t. 86. f. 2.

570. CHERLERIA. *Cal. 5 phyllus. Nectaria 5 2-fida, petaloidea. Antherae alternae steriles. Caps. ilocularis, 3 valvis, 3 sperma.*

fedoides. 1. CHERLERIA. *Jacq. fl. austr.* 3. t. 284.

BRUNNICHIA. *Cal. 1phyllus, per maturitatem coriaceus, glaberrimus, 5fidus, inferne ventricosus. Cor. o. Stigmata 2fida, obtusa, divergentia. Caps. supera, 1locularis, 1sperma.*

cirrhosa. **I. BRUNNICHIA.** *Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 45. f. 2.*

DEUTZIA. *Cal. 1phyllus. Filamenta 3 cuspidata. Caps. 3locularis.*

scabra. **I. DEUTZIA.** *Thunb. fl. jap. p. 185. nov. pl. gen. p. 19. 21. ic.*

HORTENSIA. *Cal. 5partitus, corollinus: laciniis ovatis unguiculatis. Cor. minima 5partita: laciniis squamarum aemuluis. Stamina caduca. Stili mammillares.*

japonica. **I. HORTENSIA.** *Jussieu gen. plant. p. 214.*

571. GARIDELLA. *Cal. 5phyllus, petaloideus. Nectararia 5labiata, 2fida. Caps. 3 connexae, polyspermae.*

Nigella. **I. GARIDELLA.** *Magn. ò. monsp. t. 143. strum.*

572. MALPIGHIA. *Cal. 5phyllus, basi exterius glandulis 2 melliferis. Petala 5 reniformia plicata, ciliata, unguiculata. Bacca (plurimis) 1locularis, 3sperma.*

glabra. **I. M.** foliis ovatis integerrimis glabris, pedunculis umbellatis, *Mant. p. 387. Mill. ic. t. 181. f. 2.*

martini- 23. M. foliis ovatis subtus setis decumbentibus hispidis. *Jacq. cenis. stirp. amer.*

2. M.

- punicifo. 2. M. foliis ovatis integerrimis glabris, pedunculis unifloris. *Cavanill. diff. bot. 8. p. 406. t. 234. f. 2.*
- crassifolia. 3. M. foliis ovatis integerrimis subtus tomentosis, racemis terminalibus. *Aubl. pl. guj. I. p. 457. t. 182.*
- Murcila. 4. M. foliis ovatis integerrimis rigidis subpetiolatis pilosis subtus tomentosis, spica terminali elongata. *Aubl. pl. guj. I. p. 459. t. 183. an eadem cum crassifolia?*
- coriacea. 5. M. foliis ovatis acutis integris utrinque glabris, racemis terminalibus spicatis. *Sloan. hist. jam. 2. t. 163. f. 1.*
- odorata. 6. M. foliis ovatis emarginatis utrinque tomentosis. *Jacq. Stirp. amer. p. 136. t. 177. f. 41.*
- diphylla. 7. M. foliis ovalibus glabris, racemis terminalibus. *Jacq. Stirp. amer. p. 136. n. 4.*
- coccigera. 8. M. foliis subovatis dentato-spinosis. *Jacq. pl. rar. ic. cent. 2. t. 37.*
- lucida. 9. M. foliis obovatis cuneiformibus integerrimis enerviis nitidis, pedunculis terminalibus multifloris. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 74.*
- altissima. 10. M. foliis ovato-oblongis acutis rigidis integerrimis pilosis subtus tomentosis, spica terminali. *Aubl. pl. guj. I. p. 455. t. 181.*
- faginea. 11. M. foliis oblongo-ovatis integris subtus sericeo-nitidis, pedunculiis tripartito-umbellatis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 74.*
- urens. 12. M. foliis oblongo-ovatis: setis subtus decumbentibus rigidis, pedunculis unifloris aggregatis. *Mill. ic. 181. f. 1. Drupa succulenta clausa polypyrena.*
- verbasci-folia. 13. M. foliis lanceolato-ovatis tomentosis integerrimis, racemis terminalibus. *Cavanill. diff. bot. 8. t. 240.*
- armenia-ca. 14. M. foliis ovato-lanceolatis magnis, spicis longis axillariibus, bacca villosa. *Cavanill. diff. bot. 8. p. 410. t. 238.*
- glandulo-fa. 15. M. foliis lanceolatis basi biglandulosis, floribus racemosis monogynis. *Cavanill. diff. bot. 8. p. 411. t. 239. f. 2.*
- spicata. 16. M. foliis lanceolatis, supra ferrugineis, spicis terminalibus, petalis hastatis. *Cavanill. diff. bot. 8. p. 409. t. 237.*
- nitida. 17. M. foliis lanceolatis integerrimis glabris, spicis lateralibus. *Cavanill. diff. bot. 8. t. 239. f. 1.*

- aquifol. 18. M. foliis lanceolatis dentato-spinatis subtus hispidis. *Cavanill. diff. bot. 8. t. 236. f. 2.*
- grandifo. 19. M. foliis lanceolato-oblongis, racemis corymbosis axillaribus. *Jacq. Stirp. amer. p. 137. n. 6.*
- angustifol. 20. M. foliis lineari-lanceolatis: setis utrinque decumbentibus rigidis, pedunculis umbellatis. *Cavanill. diff. bot. 8. t. 236. f. 1.*
- dubia. 21. M. foliis ovato-acutis cartilagineis glabris, ramis punctatis, floribus racemosis minumis. *Cavanill. diff. bot. 8. p. 413. t. 242.*
- caneſceſſens. 22. M. foliis oblongis obtusis pubescentibus, racemis axillaribus compositis. *Ait. hort. Kew. 2. p. 105.*

573. BANISTERIA. Cal. spartitus: basi extrinsecus glandulis 2 melliferis. Petala orbiculata, unguiculata. Caps. 3membra-naceo-alatae,ispermae.

- angulosa. 1. B. foliis sinuate-angulosis. *Plum. amer. t. 92.*
- brachiata. 2. B. foliis subovatis, ramis brachiatis, seminibus introrsum angustioribus.
- fulgens. 3. B. foliis subovatis subtus tomentosis, racemis brachiatis, pedunculis umbellatis. *Sloan. hist. jam. 2. t. 162. f. 2. Banks ic. t. II.*
- dichotoma. 4. B. foliis ovatis, ramis dichotomis. *Plum. ic. 13.*
- purpurea. 5. B. foliis ovatis, spicis lateralibus, seminibus erectis. *Plum. ic. 15.*
- Quapara. 6. B. foliis ovatis integerrimis petiolatis supra villosis subtus tomentosis, ramis scandentibus, corymbis axillaribus. *Aubl. pl. guj. 1. p. 464. t. 186.*
- finema- 7. B. foliis ovatis integerrimis petiolatis supra hispidis, ramis riensis. scandentibus; racemis axillaribus. *Aubl. pl. guj. 1. p. 463. t. 185.*
- Iaurifolia. 8. B. foliis ovato-oblongis rigidis, racemis terminalibus.
- bengha- 9. B. foliis ovato-oblongis acuminatis, racemis lateralibus, seminibus patentibus. *Plum. ic. 14.*

Longifolia. 10. B. foliis oblongis acuminatis rigidis nitidis, paniculis terminalibus, ramis patentissimis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 75.*

569. HIRAEA. *Cal. 5phyllus. Petala subrotunda, unguiculata. Caps. 3ereætae 1-spermae, dorso carinatae.*

reclinata. 1. **HIRAEA.** *Jacq. Stirp. amer. piæt. t. 260. f. 37.*

574. TRIOPTERIS. *Cal. 5partitus. Petala mentiuntur germinis alae 6. Caps. 3 3-4alatae, 1spermae.*

jamaicensis. 1. Tr. foliis oblongis acuminatis venosis nitidis, racemis compositis terminalibus laxis, capsulis trialatis.

citrifolia. 2. Tr. foliis oblongis integris utrinque glabris, racemis axillaris, ramis dichotomis, capsulis quadriangularibus. *Plum. ic. t. 16.*

rigida. 3. Tr. foliis subrotundis acutis marginatis lineatis coriaceis, racemis compositis axillaris, capsulis trialatis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 75.*

575. ERYTHROXYLUM. *Cal. turbinatus. Petala basi squamula neopeltarifera emarginata. Stam. basi connexa. Drupa ilocularis.*

areolatum. 1. E. foliis obovatis, ramis glabris. *Jacq. Stirp. amer. piæt. t. 129.*

havanense. 2. E. foliis ovatis obtusis. *Jacq. Stirp. amer. piæt. t. 130.*

squamatum. 3. E. foliis ovatis acuminatis, ramulis squamosis, drupis acutis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 75. Cavanill. diff. bot. 8. p. 402. t. 229.*

rufum. 4. E. foliis ovatis coriaceis subtus rufis: squamulis imbricatis, axillis multifloris. *Cavanill. diff. bot. 8. p. 404. t. 232.*

- ferrugi- 5. E. foliis ovatis saepius emarginatis: squamulis imbricatis,
neum. floribus solitariis. *Cavanill. diff. bot.* 8. p. 404. t. 231. f. 2.
- hyperici- 6. E. foliis ovatis, ramis punctato-scabris, pedunculis longis
folium. capillaribus, drupa triloculari. *Cavanill. diff. bot.* 8. p.
403. t. 230.
- buxifoli- 7. E. foliis lanceolato-ovatis: nervo supra procumbente in fe-
num. tulam terminato, floribus axillaribus solitariis. *Cavanill.*
diff. bot. 8. p. 403. t. 231. f. 1.
- mucro- 8. E. foliis lanceolatis longissimis: squamulis amplexicaulibus
phyllum. striatis, axillis multifloris drupa triloculari. *Cavanill. diff.*
bot. 8. p. 401. t. 227.
- laurifo- 9. E. foliis lato-lanceolatis: squamis acutis concavis, floribus
lium. glomeratis terminalibus. *Cavanill. diff. bot.* 8. p. 401. t. 226.
- longifo- 10. E. foliis oblongis crassis nitidis: squamis acutis deciduis,
lium. floribus axillaribus. *Cavanill. diff. bot.* 8. p. 399. t. 225.
- Sideroxy- 11. E. foliis obovatis, ramis tuberculatis: squamis acutis, axil-
loides. lis paucifloris. *Cavanill. diff. bot.* 8. p. 401. t. 428.

AILANTHUS. *Flores polygami. Cal. minimus 5-*
dentatus. Petala 5 basi con-
voluta.

♀. *Stam. 2-3.*

♀. *Germin. 3-5 incurva. Caps. 3-5*
compressae, membranaceae lin-
gulatae, medio tumidae, insper-
miae.

Ponge- 1. AILANTHUS. *Rumpf. herb. amb. 3. t. 132. Des fontaines*
lion. *aet. Paris. ad 1786. p. 265. t. 3.*

CAUCANTHUS. *Cal. 1 phyllus, campanulatus, ca-*
lice brevior. Petala 5 nu-
da, patentia, calice sextu-
plo longiora.

Forskählii. I. CAUCANTHUS. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 91.*

PENTAGYNIA.

1025. HELICTERES. *Cal. iphyllus, obliquus. Petala 5. Nectarium foliolis 5. Caps. 5 intortae spiraliter, iloculares, longissime pedunculatae.*

- angustifolia. 1. *H. foliis lanceolatis integerrimis, fructu ovato recto. Obs. it. t. 3.*
- pentandra. 2. *H. pentandra, foliis ovatis, floralibus coloratis. Mant. p. 294.*
- baruensis. 3. *H. decandra, foliis cordatis serratis, fructu contorto: apicibus rectis. Mant. p. 122. Jacq. Stirp. amer. pięt. t. 227. Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. t. 64. f. 3.*
- Isora. 4. *H. decandra, foliis cordatis acutis serratis, fructu ovato acuto contorto. Rheed. b. malab. 6. t. 30. β) Helicteres jamaicensis. Jacq. Stirp. amer. pięt. t. 226.*
- apetala. 5. *H. dodecandra apetala, foliis quinquelobis, capsulis divaricatis. Jacq. Stirp. amer. pięt. t. 263. f. 74.*
- carthageensis. 6. *H. polyandra, foliis cordatis ferratis, fructu oblongo recto. Jacq. Stirp. amer. pięt. t. 228.*

1128. KIGGELARIA. *Flores dioici. Cal. 5 partitus. Cor. 5 petala: glandulae 5 globae.*

- ♂. *Antherae apicibus perforatae.*
- ♀. *Caps. baccata ilocularis, 5 valvis, polysperma.*

- africana. 1. *K. foliis ferratis. Mill. illustr. ic. Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 44. f. 4.*
- integrifolia. 2. *K. foliis integerrimis. Jacq. coll. 2. p. 296. pl. rar. ic. cent. 2. t. 50.*

1129. CORIARIA. *Flores dioici. Cal. 5phyllus;*
Cor. 5petala, calici simillima, connexa.
♂. Antherae 2partitae.
♀. Sem. 5. petalis succulento-baccatis tecta.

myrtifolia. 1. *C. folia ovato-oblongis. Angl. hortul. t. 20. f. 1.*
ruscifolia. 2. *C. foliis cordato-ovatis sessilibus. Feuill. peruv. 3. t. 12.*
farmento- 3. *C. foliis cordato-ovatis subpetiolatis; caule procumbente
fa. diffuso. Forst. fl. austri. p. 71.*

576. AVERRHOA. *Cal. 5phyllus. Petala 5, superne patentia. Pomum 5gonum, oblongum 5loculare.*

Bilimbi. 1. *A. caudice nudo fructificante, pomis obtusangulis. Rumpf
amb. 1. t. 36. Cavanill. diff. bot. 7. t. 219.*

Carám-bola. 2. *A. axillis foliorum fructificantibus, pomis acutangulis. Rumpf
amb. 1. t. 35. Bruce act. angl. 1785. 2. p. 356. Cavanill. diff. bot. 7. t. 220.*

JONCQUETIA. *Cal. 5phyllus. Petala 5 patula.
Filamenta glandulae adnata.
Germen 5gonum glandula cinctum.
Stili o. Caps. subglobosa, 1locularis, 5valvis, 5sperma.*

gujanensis. 1. *JONCQUETIA. Aubl. pl. guj. 1. p. 470. t. 180.*

POUPARTIA. *Cal. minimus, 5fidus. Petala 5. Receptac. crenatum. Stil. approximati. Pericarpium: nuce 5-loculari.*

borbonica. 1. *POUPARTIA. Jussieu gen. plant. p. 373.*

577. SPONDIAS. *Cal. 5dentatus. Cor. 5petala. Dru-*
pa nucleo 5loculari.

Mombin. 1. Sp. foliis petiolo communi compresso. *Jacq. stirp. amer.*
piet. t. 131.

Myroba- 2. Sp. petiolis teretibus, foliis nitidis acuminatis. *Sloan. hist.*
lanos. jam. 2. t. 219. f. 1. 2.

dulcis. 3. Sp. petiolis teretibus, foliolis sexjugis serratis costatis. *Forsk.*
fl. austr. p. 34 Sonner. it. 2. t. 123.

ROBERGIA. *Cal. 5partitus, persistens, corollae 5pe-*
talae aequalis. Germen villosum
superum. Stigm. sulcata. Dru-
pa ovata: Nuxilocularis, putami-
ne 2valvi.

frutescens. 1. ROBERGIA. *Aubl. pl. guj. 1. p. 467. t. 187.*

CNESTIS. *Cal. 5partitus. Petala 5. Germin. hir-*
suta. Caps. 5 leguminosae coria-
ceae, 2valves,ispermae utrinque
villoso-prurientes.

scandens. 1. CNESTIS. *Jussieu gen. plant. p. 374.*

578. COTYLEDON. *Cal. 4-5fidus. Cor. 1petala.*
Squamae nectariferae 5
ad basin germinis. Caps. 5.

hemisphaerica. 1. C. foliis semiglobosis. *Dill. b. Elth. t. 95. f. III.*

orbiculata. 2. C. foliis orbiculatis carnosis planis integerrimis, caule fru-
tico. Morif. hist. pl. 3. t. 7. f. 39.

deficiens. 3. C. foliis cochleariformibus carnosis tuberenatis, floribus
standris: staminibus quatuor brevioribus. Forsk. fl. aeg.
arab. p. 89.

nudicau- 4. C. foliis spatulato-ovatis, cymae floribus quadrifidis. *Me-*
lis, dic. comm. ac. palat. phys. vol. 3. t. 9.

- panicula. 5. C. foliis oblongo-ovatis sessilibus, panicula divaricata racemosa, caule fruticoso. *Suppl.* p. 242.
 triflora. 6. C. foliis ovatis integris, floribus subpedunculatis ternis. *Suppl.* p. 242.
 mammil- 7. C. floribus subsessilibus, foliisque tereti-ovatis alternis. *Suppl.*
 laris. p. 242.
 papillaris. 8. C. foliis oppositis tereti-ovatis, floribus corymbosis. *Suppl.*
 p. 242.
 reticula- 9. C. foliis teretibus, floribus reticulato-corymbosis, caule
 ta. fruticoso. *Suppl.* p. 242.
 cacilioi- 10. C. foliis teretibus, floribus corymbosis, caule fruticoso.
 des. *Suppl.* p. 242.
 hispanica. 11. C. foliis oblongis subteretibus, floribus fasciculatis. β
 Shaw afr. f. 128.
 spinosa. 12. C. foliis oblongis spinoso-inucronis, caule spicato. *Murray comm. Goett.* 1736. p. 33. t. 5.
 spuria. 13. C. foliis spatulato-lanceolatis carnosis integerrimis, caule
 fruticoso. *Mant. p. 388. Burm. afr. t. 18. 19. f. 1. et*
 t. 22 f. 1.
 lanceola- 14. C. foliis lanceolatis carnosis sessilibus subcarinatis apice
 ta. ferratis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 89.*
 malaco- 15. C. foliis lanceolato-lingulatis planis integerrimis carnosis,
 phylla. floribus spicatis. *Pallas it. 3. p. 729. t. O. f. 1.*
 ferrata. 16. C. foliis ovalibus crenatis, caule spicato. *Dill. b. Elth. t. 95. f. 112.*
 fascicula- 17. C. foliis cuneiformibus fasciculatis terminalibus, caudice
 ris. incrassato: ramis carnosis subconicis. *Burm. afr. 41. t. 18.*
 Umbili- 18. C. foliis cucullato-peltatis ferrato-dentatis alternis, caule
 cus. ramoso, floribus erectis. *Blackw. herb. t. 263.*
 Iaciniata. 19. C. foliis pinnatifidis, paniculae floribus quadrifidis. *Boerb. b. Lugdb. 1. p. 288. ic.*

579. SEDUM. Cal. 5fidus. Cor. 1 aut 5petala. Squamae nectariferae 5 ad basin germinis. Caps. 5. discretae, leguminosae.

* *foliis planis.*

verticilla- 1. S. foliis quaternis. *Amoen. acad. 2. t. 4. f. 14.*

2. 5.

- Telephi- 2. S. foliis planiusculis serratis, corymbo folioso, caule erecto.
um. Knorr del. hort. 1. t. F. 5. Gaertn. de fr. et sem. cent. 4.
t. 65. f. 7. β) Flor. dan. t. 686.
- stellatum. 3. S. foliis planiusculis angulatis, floribus lateralibus sessilibus
solitariis. Col. phytob. t. 11.
- Anacam- 4. S. foliis cuneiformibus integerrimis, caulis decumbenti-
pferos. bus, floribus corymbosis. Lob. ic. 340.
- hybri- 5. S. foliis cuneiformibus concavis subdentatis aggregatis, ra-
dum. mis repentibus, cyma terminali. Murray comm. Goett.
1776. t. 5.
- stolonife- 6. S. foliis subcuneiformibus subdentatis fasciculatis, caulis
rum. repentibus articulatis nudis, cyma sessili terminali foliosa.
S. G. Gmel. it. 3. p. 311. t. 35. f. 2.
- divarica- 26. S. foliis cuneiformi-rhombeis emarginatis petiolatis, cauli-
tum. bus ramosis, paniculis terminalibus divaricatis. Ait. hort.
Kew. 2. p. 108.
- Aizoon. 7. S. foliis lanceolatis serratis, caule erecto, cyma sessili ter-
minali. Gmelin flor. fib. 4. t. 67. f. 1. Guertn. de fr. et
sem. cent. 4. t. 65. f. 7.
- libanoti- 8. S. foliis radicalibus fasciculatis spatulato-lanceolatis, caule
um. fubnudo simplicissimo.
- populifo- 9. S. foliis petiolatis cordatis dentatis, floribus paniculatis.
lium. Suppl. p. 242. Pallas it. 3. p. 732. t. O. f. 2.
- Cepaea. 10. S. caule ramoso, floribus paniculatis. Moris. hisp. pl. 3.
t. 7. f. 37.
- alsinefoli- 26. S. caule erecto ramoso, pedunculis longis. Allion. flor. pe-
rum. dum. t. 22. f. 2.
- heptape- 11. S. foliis ovato-oblongis planiusculis, pedunculis subhirsu-
talum. tis paniculatis. Poir. voy. en Barb. 2. p. 169.
- *** foliis teretibus.
- villosum. 12. S. villoso-viscidum, foliis planiusculis pedunculisque subpi-
lofis, caule erecto basi fubramoso. Flor. dan. t. 24.
- faxatile. 27. S. foliis caulem versus planis, caule ramoso prostrato, flo-
ribus sessilibus. Flor. dan. t. 59.
- lineare. 13. S. foliis tereti-linearibus oppositis, cyma trifida. Thunb.
fl. jap. p. 187.
- caerule- 14. S. foliis teretiusculis oblongis obtusis sessilibus patentibus,
um. racemis simplicibus. Mant. p. 241.

- hispani- 15. S. foliis teretiusculis acutis : radicalibus fasciculatis, cyma
cium. pubescente. *Jacq. fl. austr. 5. app. t. 47.*
- album. 16. S. foliis teretiusculis oblongis obtusis sessilibus patentibus,
cyma ramosa. *Flor. dan. t. 66.*
- nudum. 17. S. foliis cylindricis oblongis sparsis, caulis fruticosis ra-
mosissimis : ramis tortuosis, cymis terminalibus. *Ait.
hort. Kew. 2. p. 112.*
- hirsutum. 18. S. foliis teretiusculis hirsutis, caule erecto ramoso, petalis
aristatis stamina superantibus, pedunculis unifloris. *Flor.
dan. t. 24.*
- aestivum. 19. S. foliis ovato-teretiusculis alternis obtusis, caule bifido,
floribus sessilibus. *Lob. ic. 378.*
- acre. 20. S. foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis al-
ternis, cyma trifida. *Knorr del. hort. 2. t. S. 12. f. 1.*
- sexangu- 21. S. foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis sex-
lare. fariam imbricatis. *Curt. flor. Lond. t. 225.*
- anglicum. 22. S. foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis alternis, cyma
ramosa bifida. *Huds. flor. angl. 196.*
- annuum. 23. S. foliis ovatis sessilibus gibbis alternis, caule erecto solita-
rio annuo, cyma recurva. *Raj. angl. 3. t. 12. f. 2.*
- dasyphyl- 24. S. foliis ovatis obtusis carnosis oppositis, caule infirme,
lum. floribus sparsis. *Jacq. b. Vind. 2. t. 153.*
- virens. 25. S. foliis subulatis sparsis basi solutis, floribus cymosis, pe-
talibus calice lanceolato sesquilongioribus. *Ait. hort. Kew.
2. p. 110.*
- reflexum. 26. S. foliis subulatis sparsis basi solutis: inferioribus recurva-
tis. *Flor. dan. t. 113?*
- rupestre. 27. S. foliis subulatis quinquefariis confertis basi solutis, flori-
bus cymosis. *Dill. hort. Eth. t. 255. f. 333.*
- nicaeense. 28. S. foliis subulatis sparsis basi solutis alternis, cyma bifida.
Allion. flor. pedem. t. 90. f. 1.
- quadrifi- 29. S. foliis acutis, caulis erectis simplicissimis, floribus
dum. octandris tetragynis quadrifidis. *Pall. it. 3. p. 730. t. P.
f. 1. A.*
- atratum. 30. S. caule erecto, floribus corymbosis fastigiatis. *Sp. pl. 1673.
Jacq. fl. austr. 1. t. 8.*
- procum- 31. S. caule ramoso procumbente, foliis alternis remotis, flori-
bens. bus subsessilibus. *Schrantz baier. Flor. 1. p. 726.*

580. PENTHORUM. *Cal. 5fidus. Petala 5 aut 5.*
Caps. 5cuspidata, 5locularis.

sedoides. 1. PENTHORUM. Ait. upf. 1744. t. 2. Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. t. 65. f. 6.

1309. BERGIA. *Cal. 5partitus. Petala 5. Capsula globosa, torulosa, 5locularis, 5valvis: valvis petaloideis.*
Sem. plurima.

capensis. 1. B. foliis lanceolatis vel ellipticis, floribus verticillatis. Mant. p. 241. Suppl. p. 243.

glomera- 2. B. foliis obovatis crenulatis, floribus glomeratis. Suppl. ta. p. 243.

581. SURIANA. *Cal. 5phyllus. Petala 5. Stili inferti lateri interiori germinum,*
Sem. 5 nuda.

maritima. 1. SURIANA. Sloan. hist. jam. 2. t. 162. f. 4.

1235. GRIELUM. *Cal. 5fidus. Petala 5. Filamenta persistentia. Caps. ex indu- rato calice orbiculata depres- fa, 5-locularis. Semina solitaria.*

tenuifo- 1. GRIELUM. Burm. afr. t. 53. Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. lium. t. 36. f. 6.

582. OXALIS. *Cal. 5phyllus. Petala unguibus con- nixa. Caps. angulis dehiscens,*
5gona.

** foliis simplicibus.*

mono- 1. O. foliis ovatis indivisis. Mant. p. 241. Thunb. de oxal. t. 1. phylla.

*** fo-*

** *foliis ternatis.*

— *acaules.*

T *scapis unifloris.*

- minuta. 2. O. foliolis oblongis glabris. *Thunb. de oxal. t. 2.*
 punctata. 3. O. foliolis obcordatis punctatis. *Thunb. de oxal. t. 1.*
 natans. 4. O. foliolis obcordatis glaucis. *Thunb. de oxal. t. 1.*
Acetosella. 5. O. foliolis obcordatis pilosis. *Zorn pl. med. ic. t. 9.*
 lanata. 6. O. foliolis obcordatis hirsutis. *Thunb. de oxal. n. 6.*
 compref- 7. O. foliolis obcordatis ciliatis, petiolis compressis. *Thunb.*
 fa. *de oxal. n. 7.*
 purpurea. 8. O. foliolis subrotundis ciliatis. *Mant. p. 389. Seb. mus. I.*
 t. 22. f. 10.
 longiflora. 9. O. foliolis semibifidis.

TT *scapis multifloris.*

- virgoſa. 10. O. foliolis ovatis, floribus verticillatis. *Molin. bifl. nat.*
 Chil. p. 110.
 caprina. 11. O. scapis umbelliferis, foliis glabris, floribus erectis. *Mill.*
 ie. 195. f. 1.
 cernua. 12. O. scapis umbelliferis, foliis glabris, floribus plurimis
 clausis cernuis. *Thunb. de oxal. t. 2.*
 violacea. 13. O. scapis umbelliferis, foliis glabris, calicibus callosis.
 Jacq. b. Vind. 2. t. 180.
 fericea. 14. O. scapis umbelliferis, foliis tomentosis. *Thunb. de oxal.*
 n. 13.

— — *caulescentes.*

- repens. 15. O. caule repente, pedunculis unifloris, foliolis obcordatis
 hirtis. *Thunb. de oxal. n. 14. t. 1.*
 cornicula- 16. O. caule decumbente herbaceo, pedunculis umbelliferis.
 ta. *Flor. dan. t. 873.*
 incarnata. 17. O. caule bulbifero, pedunculis unifloris, foliolis obcorda-
 tis glabris. *Commel. b. amst. 1. t. 22.*
 tuberosa. 18. O. caule ramoso, radice tuberosa, pedunculis umbelliferis.
 Molin. bifl. nat. Chil. p. 109.
 Barrelieri. 19. O. caule erecto, pedunculis racemiferis. *Feuill. per. 2. t. 23.*

- frutescens. 20. O. caule erecto fruticoso, pedunculis umbelliferis. *Plum. ic. 213. f. 1:*
- stricta. 21. O. caule erecto herbaceo, pedunculis umbelliferis. *Moris. bist. pl. 2. t. 17. f. 3.*
- versicolor. 22. O. caule erecto hirto, pedunculis unifloris, foliolis linearibus callosis. *Burm. afr. t. 27. f. 1. β) Burm. afr. t. 27. f. 2.*
- hirta. 23. O. caule erecto hirto, pedunculis unifloris, foliis subsessilibus: foliolis oblongis emarginatis glabris. *Mant. p. 389. Seb. mus. 1. t. 22. f. 11. β) Oxalis fessilifolia. Syst. veg. 13. p. 360. mant. p. 341. Burm. afr. t. 28.*
- glabra. 24. O. caule erecto glabro, pedunculis unifloris, foliolis oblongis emarginatis glabris. *Thunb. de oxal. n. 17. t. 2.*
- bifida. 25. O. caule erecto glabro, pedunculis unifloris, foliolis semibifidis. *Thunb. de oxal. n. 16. t. 1.*
- *** *foliis digitatis, vel multifidis.*
- flava. 26. O. foliis glabris. *Burm. afr. t. 27. f. 4. 5. et t. 30. f. 1.*
- tomentosa. 27. O. foliis hirtis. *Pluckn. amalch. t. 350. f. 3.*
- **** *foliis pinnatis.*
- sensitiva. 28. O. *Garc. ael. angl. 1730. t. 2.*

**583. AGROSTEMMA. Cal. iphyllus, coriaceus.
Petala 5 unguiculata:
limbo obtuso, indiviso.
Caps. ilocularis.**

- Githago. 1. A. hirsutum, calicibus corollam aequantibus, petalis integris nudis. *Curt. flor. Lond. t. 209.*
- Coronaria. 2. A. tomentosum, foliis ovato-lanceolatis, petalis emarginatis coronatis ferratis. *Knorr del. hort. 1. t. R. 20.*
- Flos jovis. 3. A. tomentosum, petalis emarginatis. *Bocc. mus. t. 42.*
- Coeli rosa. 4. A. glabrum, foliis linear-lanceolatis, petalis emarginatis coronatis. *Herm. par. Lugdb. t. 393.*

584. LYCHNIS. Cal. 5phyllus, oblongus, laevis.

Petala 5 unguiculata: limbo
subbifido. Caps. 5locularis.

- dioica. 1. L. floribus dioicis. *Flor. dan. t. 792. Curt. flor. Lond. t. 81. Caps. huic et chale. 5locularis.*
- apetala. 2. L. calice inflato corollam superante, caule subunifloro, flore hermaphrodito. *Flor. dan. t. 806.*
- chalcedo- 3. L. floribus fasciculatis fastigiatis. β) *Flore plano. Knorr nica. del. hort. 1. t. 1. 2.*
- coronata. 4. L. glabra, floribus axillaribus terminalibusque solitariis: petalis laciniatis. *Tbunb. fl. jap. p. 187.*
- Flos cu- 5. L. petalis quadrifidis: fructu subrotundo. *Flor. dan. t. 590. culi. Curt. flor. Lond. t. 12.*
- alpestris. 6. L. petalis quadrifidis coronatis, foliis recurvis. *Suppl. p. 244. Seg. pl. ver. 3. t. 5. f. 1.*
- quadri- 7. L. petalis quadridentatis, caule dichotomo, foliis glabris
dentata. recurvis. *Syst. nat. XII. 3. p. 311. Silene quadrifida. Jacq. fl. austr. 2. t. 120.*
- laeta. 8. L. petalis bifidis, floribus solitariis, calicibus decemcarina-
tis, foliis linear-lanceolatis glabris. *Ait. hort. Kew. 2. p. 118.*
- sibirica. 9. L. petalis bifidis, caule dichotomo, foliis subhirtis.
- alpina. 10. L. petalis bifidis, floribus tetragynis. *Flor. dan. t. 65.*
- Viscaria. 11. L. petalis subintegris. *Kniph. bot. orig. cent. 12. n. 69.*
- grandi- 12. L. petalis truncato-obtusis, calice elongato turbinato fo-
flora. liis sublanceolatis, sessilibus asperis. *Jacq. coll. I. p. 149.*

585. CERASTIUM. Cal. 5phyllus. Petala 2fida.

Caps. 5locularis, apice de-
hiscens.

* *capsulis oblongis.*

viscosum. 1. C. erectum villoso-viscosum. *Curt. flor. Lond. t. 791*

perfolia. 2. C. foliis connatis. *Dill. b. Elth. t. 217. f. 284.
tum.*

- vulga- 3. *C. foliis ovatis, petalis calici aequalibus, caulis diffusis.*
tum. *Curt. flor. Lond. t. 130.*
- alpinum. 4. *C. foliis ovato-lanceolatis, caule dichotomo subtrifloro,*
capsulis cylindrico-incurvis. Fior. dan. t. 6.
- dichoto- 5. *C. foliis lanceolatis, caule dichotomo ramosissimo, capsu-*
mum. lis erectis.
- arvense. 6. *C. foliis linear-lanceolatis obtusis glabris, corollis calice*
majoribus. Flor. dan. t. 626.
- lineare. 19. *C. foliis linearibus aristatis flaccidis, pedunculis subuni-*
floris tomentosis. Allion. flor. pedem. t. 88. f. 4.
- semide- 7. *C. floribus pentandris, petalis emarginatis. Curt. flor.*
candrum. *Lond. t. 122.*
- pentan- 8. *C. floribus pentandris, petalis integris.*
drum.
- procum- 9. *C. caule procumbente villoso viscido dichotomo, capsulis*
bens. *erectis. Forsk. fl. aeg. arab. p. 211. an distincta hujus*
tribus species?
 *** capsulis subrotundis.*
- repens. 10. *C. foliis lanceolatis, pedunculis ramosis. Vaill. fl. par.*
t. 30. f. 5.
- maxi- 11. *C. foliis lanceolatis scabris, petalis crenatis, capsulis glo-*
mum. *bosis. Gmel. flor. fib. 4. t. 62. f. 2.*
- manti- 12. *C. glabrum, foliis lanceolatis, pedunculis longissimis, cap-*
cum. *sulis globosis, caule striato. Seg. pl. ver. 3. t. 4. f. 2.*
- dioicum. 13. *C. hirtum viscidum, foliis lanceolatis, floribus dioicis:*
petalis calice triplo majoribus. Ait. hort. Kew. 2. p. 120.
- suffruti- 14. *C. foliis linear-lanceolatis subhirsutis, caule perenni pro-*
cosum. *cumbente.*
- striatum. 15. *C. foliis linearibus acuminatis glabris, pedunculis uniflo-*
ris subtomentosis, capsulis globosis. *Haller hist. stirp.*
helv. I. t. 14.
- tomento- 16. *C. foliis oblongis tomentosis, pedunculis ramosis, capsu-*
sum. *lis globosis.*
- latifoli- 17. *C. foliis ovatis subtomentosis, ramis unifloris, capsulis*
um. *globosis. Wulfen apud Jacq. collect. I. t. 20.*
- aquati- 18. *C. foliis cordatis sessilibus, floribus solitariis, capsulis pen-*
cum. *dulis. Curt. flor. Lond. t. 130.*

*** dubiae tribus.

- illyri- 20. C. foliis lanceolatis calicibusque barbatis, caule dichotomo
cum. ramosissimo, capulis ovatis. *Ardach. spec. 2. t. 2.*
- refra- 21. C. foliis lanceolatis glabris, pedunculis infractis. *Haller
etum. bish. stirp. Helv. n. 890.*
- rigidum. 22. C. foliis lanceolatis asperis cauleque erecto villoso rigidis.
*Scop. flor. carn. t. 19. β) Cerastrum angustifolium. Scop.
flor. carn.*

586. SPERGULA. *Cal. 5phyllus. Petala 5. integra.
Caps. ovata,ilocularis, 5-
valvis.*

- arvensis. 1. Sp. foliis verticillatis, floribus decandris. *Du Hamel cult.
6. p. 149. t. I.*
- pentan- 2. Sp. foliis verticillatis, fleribus pentandris; *an satis et con-
stanter distincta ab arvensi?*
- faginoi- 3. Sp. foliis oppositis linearibus laevibus, pedunculis solitariis
des. longissimis, caule repente. *Flor. dan. t. 12. an satis di-
stincta a laricina?*
- nodosa. 4. Sp. foliis oppositis subulatis laevibus, caulibus simplicibus.
Flor. dan. t. 96.
- laricina. 5. Sp. foliis oppositis subulatis ciliatis fasciculatis. *Flor. dan.
t. 858. Smith plant. ic. ined. 1. t. 18.*

1262. FORSKOHLEA. *Cal. 4-5phyllus, corolla
longior. Petala 8-10-
spatulata. Caps. 4-5la-
natae. Sem. solitaria.*

- tenacissi- 1. F. foliis ovatis ferratis. *Mant. p. 72. Suppl. p. 245. Jacq.
ma. b. Vind. 1. t. 48.*
- candida. 2. F. foliis ovalibus dentatis. *Suppl. p. 245.*
- angustifo- 3. F. foliis lanceolatis dentatis sinuatis. *Murr. comm. goett.
lia. 1784. t. 3.*

DECAGYNIA.

587. NEURADA. *Cal. 5partitus. Petala 5. Caps. infera, orbiculata, iolocularis, iisperma, superne mucicata, evalvis.*

procum- 1. NEURADA. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 32. f. 4.*
bens.

588. PHYTOLACCA. *Cal. 5phyllus, persistens.
Cor. o. Bacca supera,
iolocularis, iisperma.
Sem. lenticularia, nitida.*

oestandra. 1. Ph. floribus octandris octagynis. *Dill. b. Elth. t. 239. f. 308.*

decandra. 2. Ph. floribus decandris decagynis. *Blackw. herb. t. 515.*

icosandra. 3. Ph. floribus icosandris decagynis. *Mill. dict. s. 207. Gaertn.
de fr. et sem. cent. 5. t. 77. f. 8.*

dioica. 4. Ph. floribus dioicis.