

CLASSIS XII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

* *staminibus calici insertis, Caliciflorae.*

613. CACTUS.

CATINGA.

616. EUGENIA.

659. CARYOPHYLLUS.

614. PHILADELPHUS.

EUCALYPTUS.

FABRICIA.

MENICHEA.

615. PSIDIUM.

PIRIGARA.

617. MYRTUS.

SCOLOPIA.

618. PUNICA.

Cal. superus, Iphyllus. *Cor.* multifida.
Bacca 1locularis, polysperma.

Cal. superus, 4dentatus, minimus. *Cor.* - -

Drupa subrotunda, 1locularis.

Cal. superus, 4partitus. *Cor.* 4petala. *Dru-*

pa 1locularis, 1sperma.

Cal. superus, 4partitus. *Cor.* 4petala. *Ger-*

mnen 2loculare: *Semina* vicena. *Bac-*

ca 1-2locularis: *Semina* solitaria.

Cal. superus, 4-5partitus. *Cor.* 4-5petal-

la, *Caps.* 4-5locularis, polysperma.

Cal. Operc. superum, integerrimum. *Cor.*

calyptra obverse hemisphaerica. *Caps.*

subquadrilocularis, polysperma.

Cal. hemisphaericus adnatus, 5partitus.

Cor. 5petala. *Caps.* multilocularis.

Cal. 3partitus, in fructum abiens. *Cor.*

4petala. *Fruetus* subovatus costatus,

1locularis, 1spermus.

Cal. superus, 5fidus. *Cor.* 5petala. *Bac-*

ca 1locularis, polysperma.

Cal. superus, 4partitus turbinatus. *Cor.* 4-

6petala. *Stil.* o. *Bacca* obtuse 4go-

na, 4locularis: loculis 6-7spermis.

Cal. superus, 4-5fidus. *Cor.* 4-5petala.

Bacca 1-3locularis: *Semina* pauca.

Cal. persistens, inferus 3-4partitus. *Cor.* 3-

4petala, patens. *Stigma* 3lobum fo-

veolis 3notatum. *Stil.* persistens. *Bac-*

ca subrotunda, 1locularis, 6sperma.

Cal. superus, 5fidus. *Cor.* 5petala. *Po-*

mum polyspermum, 2partitum: par-

te inferiori subnovemloculari; supe-

riori subtriloculari.

GUA-

- GUAPURUM. *Cal. superus 4fidus. Petala 4. Baccæ sphaerica, 2-4sperma.*
- FOETIDIA. *Cal. turbinatus, 4fidus, superus. Stigm. 4fidum. Caps. lignosa, 4angularis: 4locularis: loculis 1-2spermis.*
619. AMYGDALUS. *Cal. inferus 5fidus. Cor. 5petala. Drupa nucleo foraminuloso.*
620. PRUNUS. *Cal. inferus, 5fidus. Cor. 5petala. Drupa nucleo integro.*
- GRANGERIA. *Cal. inferus 5fidus. Petala 5. Drupa subtriangula. Nux 3questra ossea 1isperma.*
621. CHRYSOBALANUS. *Cal. inferus, 5fidus. Cor. 5petala. Drupa nucleo sulcato.*
671. PLINIA. *Cal. inferus, 4-5partitus. Cor. 4-5petala. Drupa fulcata.*
- ROBINSONIA. *Cal. 5dentatus, turbinatus, superus. Cor. 5petala, patens. Stil. o. Stigma striatum. Baccæ depresso-globosa longitudinaliter sulcata 7locularis: Semina solitaria.*
- METROSIDEROS. *Cal. 1phyllus, 5dentatus. Cor. 5petala. Caps. calicis ventre corticata, 3-4locularis. Sem. immatura numerosissima, matura paucissima.*
- MITRARIA. *Cal. 2partitus, persistens, inferus. Petala 2-3 concava. Nux 1locularis, 2sperma, angulata.*
- COUEPIA. *Cal. 5partitus: fauce tumida. Cor. - Germen pedicellatum. Drupa sicca, ovata, 1isperma.*
- MOQUILEA. *Cal. 5dentatus, turbinatus intus villosus. Cor. 5petala. Antheræa versatiles. Stil. lateralis, inferne villosus, superno glaber incurvus. Peric. -*
- CASSIPUREA. *Cal. turbinatus, 4-5dentatus. Petala 5 tenuissime laciniata. Stil. villosus. Peric. -*
- XYLOSMA. *Flores dioici. Cal. 4-5partitus. Cor. o. ♂. Stamina calice duplo longiora, neostriato annulato cincta. ♀. Stil. minimus. Stigm. obsolete 3fidum. Baccæ? sicca subbilocularis: loculis 2spermis.*

* *Crataegus leucophleos minogyna, nigra, lucida.*

Ccc 2

** fig.

POLYANDRIA.

772

** staminibus receptaculo insertis, Fructiflorae.
† corolla o; apetalae.

MAERUA.

Cal. 4fidus. *Nectarium* multifidum. *Pericarpium* cylindricum, pedicellatum.
Cal. 1phyllus. *Stam.* exteriora sterilia, foliacea. *Caps.* echinata, intus bacata.

655. SLOANEA.

Flores monoici.

HEDYOSMUM.

♂. *Amentum* antheris tectum. *Cal.* o. *Cor.* o.

THOA.

♀. *Cal.* 3dentatus. *Stil.* 3queter. *Bacca* 3gona polysperma.

CONCEVEIBA.

Flores monoici. *Cal.* o.

1239. TREWIA.

♀. *Stilus* fere o. *Stigm.* 3-4. *Caps.* ovata, 1locularis, intus setis farcta, 1sperma.

674. PROCKIA.

Flores monoici. *Cal.* carnosus, 5dentatus, inferne 3gonus.

LIGHTFOOTIA.

♀. *Germ.* 3gonum. *Stigm.* 3falcata. *Caps.* 3locularis: loculis 2valvibus. *Sem.* solitaria, arillata.

661. LAETIA.

Cal. 3phyllus. *Pericarpium* 3coccum.

676. SEGUIERIA.

Cal. 3phyllus. *Pericarpium* 5loculare.

672. DELIMA.

Cal. 4phyllus. *Stigma* tessile. *Bacca* umbilicata, 1locularis, 3-6sperma

ACIDOTON.

Cal. 5phyllus. *Pericarpium* 1loculare, 3-valve, polypermum.

SLOANEA.

Cal. 5phyllus. *Pericarpium* 1sperrum, alatum.

TUNATEA.

Cal. 5phyllus. *Pericarpium* 2valve, 2-spernum.

Flores declini.

♂. *Cal.* 5phyllus. *Receptaculum* globosum.

♀. *Cal.* 6phyllus. *Stil.* 3fidus. *Caps.* 3-cocca.

Cal. 5partitus. *Caps.* echinata: aculeis deciduis, 5valvis, 1locularis: *Semina* solitaria vel bina.

Cal. turbinatus, persitens, 4partitus. *Cor.* -- *Filamenta* declinata. *Stil.* brevis, incurvus. *Caps.* ovata, utrinque fulcata, 2valvis, 1locularis, 1ipermum.

CA-

CARAIPA.

Cal. 5partitus. *Cor.* - - - *Caps.* subtri-
gona, 3valvis, 3locularis: *loculis* 1-
spermis.

+ *corolla monopetala.*

POSSIRA.

Cal. 4phyllus. *Petal.* 1. laterale. *Legu-*
men 1loculare 2valve.

CIPONIMA.

Cal. 5partitus. *Cor.* tubulosa, 5partita.
Drupa 1locularis: *Nux* 4locularis:
loculis 1spermis.

1397. TERNSTROEMIA.

Cal. 5partitus. *Cor.* 5partita, arceolata.
Bacca secca, 2locularis: *Semina* sub-
octona.

1398. ALSTONIA.

Cal. imbricatus. *Cor.* 8-10partita: laci-
niis alternatis.

THOTTEA.

Cal. o. *Cor.* supera, margine 3loba. *Ne-*
tar. in diteo floris, cui stamina ad-
nata. *Stil.* o. *Stigm.* perforatum.

NECTANDRA.

Cal. o. *Cor.* 6partita. *Nectarium* squa-
mis 9. *Filamenta* 36 per 9 quater-
niones ad squamas nectarii distributa.

640. MARCYRAVIA.

Cal. 6phyllus, imbricatus. *Cor.* clausa.
Bacca multilocularis, multivalvis.

CUBLANDIA.

Cal. tubulosus 4dentatus. *Cor.* 4fida: tu-
bo oblongo. *Filamenta* 25 basi coa-
dunata. *Legumen* nodosum.

1158. MIMOSA.

Flores mere maleuli reliquis intersiti. *Cal.*
5dentatus. *Cor.* 5fida. *Stamina* 5-
100. *Legumen*.

PARALEA.

Cal. 4dentatus. *Cor.* 4partita carnosia: tu-
bo 4gono. *Peric.* - - -

MADHUCA.

Cal. semiquadrifid. superne imbricatus.
Cor. tubo inflato, squamis 9 imbrica-
tis intus aucta. *Antherae* sessiles. *Dru-*
pa 2-3locularis: *loculis* 1spermis.

1228. CARYOTA.

Flores monoici. *Cal.* communis. *Cor.* 3-
partita.
♀. *Bacca* 2sperma.

corolla bivalvi.

PARIANA.

Flores monoici. *Cal.* Gluma 1flora, 2valvis.
♂. *Filamenta* circiter 40.

♀. *Germen* ovato-trigonum. *Stigm.* 2-
villosa. *Sem.* 1. 3gonum.

- TTTT corolla tripetala.
1313. TRILIX.
DOLIOCARPUS. *Cal. 3phyllus. Caps. 5locularis, polysperma.*
Cal. 5phyllus, persistens. Bacc globosa,
1locularis, 2sperma, stilo coronata.
- TTTTT corolla tetrapetala.
- STERBECKIA. *Cal. 3-5phyllus. Cor. 3-5petala. Caps.*
1locularis, polysperma.
641. RHEEDIA.
659. GRIAS. *Cal. o. Bacc 3sperma.*
Cal. 4fidus. Drupa 1sperma : Nucleus
8falcatus.
- TOVOMITA. *Cal. 2phyllus. Germen 4falcatum. Stigm.*
4subrotunda.
656. MAMMEA. *Cal. 2phyllus. Bacc 1locularis : Semina*
cellosa.
648. PAPAVER.
647. CHELIDONIUM.
643. CAPPARIS.
644. ACTAEA. *Cal. 2phyllus. Caps. 1locularis, coronata.*
Cal. 2phyllus. Siliqua.
Cal. 4phyllus. Bacc pedicellata, corticosa.
Cal. 4phyllus. Bacc 1locularis : Semina
geminio ordine.
650. CAMBOGIA. *Cal. 4phyllus. Pomum Sangulare, 1locu-*
lare : Semina solitaria vel 2.
- GREGGIA. *Cal. 4partitus. Cor. 4petala. Bacc 1lo-*
cularis, 1sperma.
658. CALOPHYLLUM. *Cal. 4phyllus. Drupa globosa : Nucleus*
subglobosus.
1400. SPARRMANNIA. *Cal. 4phyllus. Caps. angulata, 5locularis,*
echinata.
1401. VALLEA. *Cal. 4-5phyllus. Cor. 4-5petala. Caps.*
2locularis, polysperma.
- STALAGMITIS. *Flores mere masculi intersiti. Cal. 4-6-*
phyllus. Cor. 4-6petala.
- TIGAREA. *♀. Stil. persistens. Stigm. lobatum. Bae-*
ca globosa.
Flores dioici. Cal. 4-5partitus.
♀. Filam. plurima, sterilia. Caps. subro-
tunda, 2valvis, 1locularis, 1sperma.
- ** Crataecea Marmelos.
- TTTTT corolla pentapetala.
1286. LOOSA. *Caps. semiinfera, 1locularis, semitrivalvis,*
polysperma.
670. MENZELIA. *Caps. infera, 1locularis, 3valvis, subhe-*
xasperma,

666. VATERIA.	<i>Caps.</i> 1locularis, 3valvis, 1sperma.
673. CISTUS.	<i>Caps.</i> subrotunda. <i>Cal.</i> 5phyllus, foliolis 2 minoribus.
675. CORCHORUS.	<i>Caps.</i> subquinquelocularis. <i>Cal.</i> 5phyllus, deciduus, longitudine corollae.
652. SARRACENIA.	<i>Caps.</i> 5locularis. <i>Stigma</i> clypeatum. <i>Cal.</i> inferior 3phyllus, superior 5phyllus.
660. TILIA.	<i>Caps.</i> 5locularis coriacea, 1sperma. <i>Cal.</i> deciduus.
BONNETIA.	<i>Caps.</i> 3locularis, polysperma. <i>Cal.</i> 5partitus. <i>Stigma</i> 3lobum.
CLEYERA.	<i>Caps.</i> 2locularis.
ORYGIA.	<i>Caps.</i> 1locularis, 3valvis, polysperma, supera.
MARILA.	<i>Caps.</i> 4locularis, polysperma. <i>Stigma</i> simplex. <i>Cal.</i> 5phyllus.
LEGNOTIS.	<i>Caps.</i> 3locularis. <i>Petala</i> lacera, receptaculo inserta. <i>Cal.</i> 5fidus.
MYRODENDRUM.	<i>Peric.</i> 5loculare: <i>Sem.</i> solitaria. <i>Cor.</i> patens, <i>calice</i> 5dentato major.
LEMNISCIA.	<i>Pericarp.</i> 5loculare: <i>Sem.</i> solitaria. <i>Petala</i> linearia, recurva. <i>Nectar.</i> cynthiae. <i>Cal.</i> 5dentatus.
ASCIUM.	<i>Bacca?</i> 1locularis, polysperma. <i>Petala</i> receptaculo inserta. <i>Cal.</i> 5phyllus.
DUGORTIA.	<i>Drupa</i> nuce 2loculari: loculis 1spermis. <i>Cal.</i> 5partitus.
663. ELAEOCARPUS.	<i>Drupa</i> nucleo criso. <i>Petala</i> lacera.
MALLOCOCCA.	<i>Drupa?</i> 4locularis, 4cocca: nucleis ova-tis. <i>Cal.</i> 4phyllus, corolla triplo longior.
FRANKLINA.	<i>Nux</i> 5locularis: loculis polyspermis. <i>Cal.</i> 5dentatus.
651. MUNTINGIA.	<i>Bacca</i> 5locularis, umbilicata. <i>Cal.</i> 5partitus.
1026. GREWIA.	<i>Bacca</i> 4locularis. <i>Petala</i> basi squama nectarifera. <i>Cal.</i> 5phyllus.
EROTEUM.	<i>Bacca</i> 3locularis, exsucca polysperma. <i>Stil.</i> 3fidus. <i>Cal.</i> 5phyllus.
SORAMIA.	<i>Bacca</i> 1locularis. <i>Cal.</i> 5partitus, coloratus. <i>Germen</i> orbiculatum. <i>Stigma</i> capitatum.
CHADARA.	<i>Drupa.</i> <i>Cal.</i> 5phyllus.
* <i>Delphinium</i>	<i>Consolida</i> , <i>Ajacis</i> , <i>Aconiti</i> .

||||| corolla hexapetala.

667. LAGERSTROEMIA. Cal. 6fidus. Stamina 6 exteriora majora.
Cor. crispa.

649. ARGEMONE. Cal. 3phyllus. Caps. 1locularis, semivalvis.

664. LECYTHIS. Cal. 6phyllus. Stamina nocturno lingula-
to connata. Caps. circumscissa.

1154. CLUSIA.

Flores mere masculi hermaphroditis inter-
fisi. Cal. 4-6phyllus: foliolis oppo-
sititis imbricatis. Nectarium ex anthe-
ris coalitis germen includens. Caps.
5locularis, 5valvis, pulpa farcta.

668. THEA.

Cal. 5-6partitus. Petala 6 vel 9. Caps.
3locularis. Sem. solitaria.

ADAMBEA:

Cal. hemisphaericus 5-7partitus. Cor. 5-
7petala. Caps. carnosa, calice testa,
5-7locularis.

||||| corolla octopetala.

645. SANGUINARIA. Cal. 2phyllus. Caps. 2valvis, polysperma.

MAYNA. Flores dioici. Cal. 3partitus.

WEBERA. Cal. turbinatus, superus 4-5partitus deci-
duus. Petala 8-9 fimbriata. Stig-
ma capitatum, 13striatum. Bacc
turbinata, 8-9locularis polysperma.

||||| corolla enneapetala.

646. PODOPHYLLUM. Cal. 3phyllus. Bacc 1locularis, coronata.

FORSYTHIA. Cal. 9phyllus. Caps. 1locularis, polysper-
ma, turbinata, stigmate coronata.

* Thea.

||||| corolla decapetala.

654. BIXA. Cal. 5dentatus. Cor. duplex. Caps. 2val-
vis, polysperma.

AUBLETIA. Cal. 5partitus. Caps. echinata, 10locula-
ris: loculis polyspermis.

||||| corolla polypetala.

653. NYMPHAEA. Bacc multilocularis, corticosa. Cal. ma-
gnus.

ONCOBA. Bacc 1locularis, polysperma. Cal. 1-
phyllus, persistens.

1335. CHRYSITRIX.

Flores in altera planta mere masculi. Gluma 2valvis. Cor. ex paleis numerosis, setaceis. Stamina intra singulas paleas singula.

1075. PLANTANUS,

Flores monoici. Amentum globosum.
 ♂. *Cor. vix manifesta. Antherae filamentum circumnatae.*
 ♀. *Stigma recurvum. Sem. subrotunda. Stilo mucronata, basi papposa.*

DIGYNIA.

* *staminibus calici insertis, caliciflorae.*

LUCUMA.

Cal. 4fidus, duplicitus. Cor. o. Drupa 1-2sperma.

CRATAEGUS.

Cal. superus, 5fidus. Cor. 5petala. Bacca 2sperma.

** *staminibus receptaculo insertis, fructiflorae.*

1133. CLIFFORTIA.

Flores dioici. Cal. 3phyllus, superus. Cor. o.

♀. *Cap. 2locularis. Sem. 1.*

1069. POTERIUM.

Flores monoici. Cal. 4phyllus. Cor. 4-partita.

♀. *Bacca e tubo corollae indurato.*

1076. LIQUIDAMBAR.

Flores monoici. Cal. 4phyllus. Cor. o.

♀. *Cap. multae in globum, 2valves, polyspermae.*

1346. FOTHERGILLA.

Cal. integerrimus. Cor. o. Cap. 2locularis. Sem. bina.

680. CALLIGONUM.

Cal. 5phyllus. Cor. o. Pericarpium echinato-uncinatum.

679. CURATELLA.

Cal. 5phyllus. Cor. 4petala. Cap. 2partita, 2sperma.

678. PAEONIA.

Cal. 5phyllus. Cor. 5petala. Cap. polysperma. Semina colorata.

TEMUS.

Cal. 3fidus. Cor. 18petala. Bacca 2coccia.

TRICHOCARPUS.

Cal. persistens, 4-5partitus. Cor. o. Stili 2fidi. Cap. fetosa, 1locularis, 4-valvis, polysperma.

LACIS.

Cal. o. Cor. o. Recept. spinis 12 cinctum. Cap. ovata, 8striata, 1locularis, 2valvis, polysperma.

TRIGYNIA.

* staminibus calici insertis: Caliciflorae.

623. SORBUS. Cal. superus, 5fidus. Cor. 5petala. Bat-
ca 3sperma.
424. SESUVIUM. Cal. inferus, 5fidus. Cor. o. Caps. 3lo-
cularis, circumscissa.

* Crataegus coccinea, rotundifolia.

** staminibus receptaculo insertis, Fructiflorae.

- CURYANDRA. Cal. 5phyllus. Cor. 3petala. Antherae
2dymae. Folliculi 3ovati, divaricati.
1156. BEGONIA. Flores monoici. Cor. 4petala: petalis cor-
datis: oppositis obcordatis. Cal. o.
♀. Stili 2fidi. Caps. infera, 3angularis,
inaequalis, 3locularis, polysperma.
- HOMALIUM. Cal. 6-7partitus. Cor. 6-7petala. Sta-
mina 21terna. Caps. 1locularis po-
lysperma.
- TATTIA. Cal. 6fidus. Cor. 6petala villosa. Stigm.
obtusa. Pericarp. - - -
- MARSCHALLIA. Cal. 6-7dentatus. Glandul. 7. inter pe-
tala. Stil. o. Stigm. 3-4acuta. Caps.
lignosa, 1locularis, polysperma.
681. DELPHINIUM. Cal. o. Cor. 5petala: supremo coronato.
Nectarum 2fidum, sessile.
682. ACONITUM. Cal. o. Cor. 5petala: supremo galeato.
Nectaria 2 pedicellata.
- CONAMI. Flores dioici. Cor. o. Cal. 6partitus. Caps.
6locularis.

* Reseda Luteola. Conhorus. Thea viridis.

TETRAGYNIA.

- PERA. Flores dioici. Cor. 1petala, dependens,
semiglobofo-concava.
1282. CIMICIFUGA. ♀. Capsula subtrigona, 3locularis, 3val-
vis: valvis 2fidis. Sem. solitaria.
- ASSA. Cal. 4phyllus. Cor. nectariis 4 urceola-
tis. Caps. 4. Semina squamosa.
- UBIUM. Cal. 4phyllus. Cor. o. Caps. 4 2valves.

UBIUM.

Cal. 4phyllus. *Cor.* 4petala. *Caps.* compressae, polyspermae.

683. TETRACERA.

Cal. 6phyllus. *Caps.* 4 1spermae.

LUDIA.

Cal. 5-7lobus, inferus. *Stilus* apice 3-4fidus. *Stigm.* 3-4 2dyma. *Bacca* sicca, globosa, 1locularis, polysperma.

1314. CARYOCAR.

Cal. 5partitus. *Cor.* 5petala. *Drupa* nucleis 4.

RHIZOBOLUS.

Cal. semiquinquefidus. *Cor.* 5petala. *Dru-*
pae 4 reniformes, 1loculares, 1sper-*miae:* Nux reniformis; nuclei solitarii.

* *Wintera aromatica. Membryanthemum geniculiflorum,*
noctiflorum. Elaeocarpus Dicera. Crataegus luci-
da, Crus Galli.

PENTAGYNIA.

* *staminibus calici insertis, Caliciflorae:*

627. TETRAGONIA.

Cal. superus, 4-5phyllus. *Cor.* o. *Dru-*
pae 4alata: *Sem.* 1. 4loculare: *Nuclei*
oblongi.

625. MESPILUS.

Cal. superus, 5fidus. *Cor.* 5petala. *Bac-*
ca 5sperma.

626. PYRUS.

Cal. superus, 5fidus. *Cor.* 5petala. *Po-*
mum 5loculare, polyspermum.628. MESEMBRYANTHEMUM. *Cal.* superus, 5fidus. *Cor.* multifida. *Caps.* ramosa, locularis, polysperma.

629. AIZOON.

Cal. inferus, 5fidus. *Cor.* o. *Caps.* 5lo-
cularis, polysperma.

630. SPIRAEA.

Cal. inferus, 5fidus. *Cor.* 5petala. *Caps.*
plures congestae.

* *Crataegus, Crus Galli.*

** *staminibus receptaculo insertis, Fructiflorae.*

684. AQUILEGIA.

Cal. o. *Cor.* 5petala. *Nectararia* 5 infer-
ne cornuta.

685. NIGELLA.

Cal. o. *Cor.* 5petala. *Nectararia* 8 super-
ne 2labiata.

686. REAUMURIA.

Cal. 5phyllus. *Cor.* 5petala: *nectariis* 10
adnatis, ciliatis. *Caps.* 5locularis,
polysperma.

POLYANDRIÄ.

- WORMIA. *Cal. 5phyllus. Cor. 5petala. Nectar. an-*
nulare germen cingens.
1402. BRATHYS. *Cal. 5phyllus. Cor. 5petala. Nectarium o.*
C.pf. 1locularis, polysperma.
- * *Aconitum Anthora, variegatum. Helicteres carthage-*
nensis. Orygia decumbens.

HEXAGYNIA.

687. STRATIOTES. *Cal. 3partitus. Cor. 3petala. Bacca glo-*
cularis intra spatham.

HEPTAGYNIA.

- FLACOURTIA. *Flores dioici. Cor. o.*
♂. Cal. 5partitus. Stamina innumera ca-
lici immersa.
♀. Cal. polyphyllus. Germ. superum.
Stili 7-9. Bacca multilocularis.

OCTOGYNIA.

1403. WINTERA. *Cal. 3lobus. Petala 6 vel 12. Germina*
clavata. Stilus o. Bacca clavata.
- * *Flacourtia. Mesembryanthemum calamiforme.*

ENNEAGYNIA.

- * *Flacourtia.*

DECAGYNIA.

- BRASENIA. *Cal. persistens, 6partitus inaequalis. Cor. o.*
Germina et capsulae 5-10 evalves,
1loculares, 2-3ispermae.

POLYGYNIA.

- * *Staminibus calici insertis, Caliciflorae.*
631. ROSA. *Cal. 5fidus. Cor. 5petala. Cal. baccatus,*
polyspermus.

632. RUBUS. *Cal. 5fidus. Cor. 5petala. Baccia composita.*
 635. TORMENTILLA. *Cal. 8fidus. Cor. 4petala. Semina 8mutica.*
 637. DRYAS. *Cal. 5-10fidus. Cor. 5-8petala. Sem. plurima: arista lanata.*
 633. FRAGARIA. *Cal. 10fidus. Cor. 5petala. Sem. plurima, supra receptaculum baccatum decidua.*
 634. POTENTILLA. *Cal. 10fidus. Cor. 5petala. Sem. plurima, mutica.*
 636. GEUM. *Cal. 10fidus. Cor. 5petala. Sem. plurima: arista geniculata.*
 638. COMARUM. *Cal. 10fidus. Cor. 5petala. Semina plurima supra receptaculum carnosum persistens.*
 639. CALYCANTHUS. *Cal. squamulos, corollinus. Cor. o. Sem. caudata calice succulento.*
 1432. HEDYCARIA. *Flores dioici. Cal. 8-10fidus. Cor. o.*
 ♂. *Filamenta o. Antherae in fundo calicis, 4fuscae, apice barbatae.*
 ♀. *Germina pedicellata. Nuces pedicellatae 1spermae.*
Flores dioici.
 ♂. *Amentum strobiliforme, squamis subtus undique testis polline.*
 ♀. *Spadix ensiformis. Germina angulo immersa solitaria. Stil. I. Drupa nucleo ligneo.*
Flores dioici. Amentum strobiliforme.
 ♂. *Squamae subtus testae polline.*
 ♀. *Drupa solitaria in utroque amenti margine.*

* *Spiraea Filipendula, Ulmaria, Phytolacca icosandra.*
Mesembryanthema varia.

** *staminibus receptaculo insertis, Fructiflorae.*

1032. ZOSTERA. *Spadix linearis: altero latere fructifero.*
Cal. o. Cor. o. Stam. alterna. Sem. solitaria, alterna.
 1030. CALLA. *Spadix testus flosculis. Spatha plana. Cal. o.*
Cor. o. Baccæ polyspermae.
 1028. ARUM. *Spatha 1phylla, cucullata. Spadix supra nudus, inferne femineus, medio stamineus.*

etar. an.
 arium o.
 arthage-
 eca glo-
 iera ca-
 perum.
 ris.
 ermina
 ita.
 Cor. o.
 valves,
 catus,

1027. XYLOPIA.

Cal. 3phyllus. *Cor.* 6petala. *Antherae*
fibus sessiles. *Stil.* o. *Caps.* 4gonae,
2valves, 1-2loculares, 1-2spermae.

68

1238. AMBROSINIA.

Spatha 1phylla dissepimento divisa. *Sta-*
mina interioris; *pistilla* exterioris la-
teris.

69

704. HYDRASTIS.

Cal. o. *Cor.* 3petala. *Bacca* composita
acinis 1spermis.

69

695. ATRAGENE.

Cal. o. *Cor.* 4petala major: interius poly-
petala. *Sem.* plurima, aristata.

69

696. CLEMATIS.

Cal. o. *Cor.* 4petala. *Sem.* plurima, aristata.

69

697. THALICTRUM.

Cal. o. *Cor.* 4-5petala. *Sem.* plurima,
submutica, nuda.

61

701. ISOPYRUM.

Cal. o. *Cor.* 5petala, decidua. *Nectaria* 5.
Caps. polyspermae.

702. HELLEBORUS.

Cal. o. *Cor.* 5petala, persistens. *Nectaria*
plura. *Caps.* polyspermae.

703. CALTHA.

Cal. o. *Cor.* 5petala. *Nectaria* o. *Caps.*
plurimae.

694. ANEMONE.

Cal. o. *Cor.* 6petala. *Sem.* plurima.

700. TROLLIUS.

Cal. o. *Cor.* 14petala. *Nectaria* linearia.
Caps. polypermae.

691. MICHELIA.

Cal. truncatus. *Cor.* 8petala. *Baccae* 4-
spermae, glomeratae.

1067. SAGITTARIA.

Flores monoici. *Cal.* 3phyllus, *Cor.* 3petala.
♂. *Filamenta* fere 24.

♀. *Sem.* multa nuda.

CANANGA.

Cal. 3phyllus. *Cor.* 6petala. *Caps.* plures,
pedunculatae, 1loculares, 1spermae.

1404. UNONA.

Cal. 3phyllus. *Cor.* 6petala. *Baccae* plu-
res, pedicellatae, 2spermae.

692. UVARIA.

Cal. 3phyllus. *Cor.* 6petala. *Baccae* po-
lysparmac, recept. longo affixa.

693. ANNONA.

Cal. 3phyllus. *Cor.* 6petala. *Bacca* po-
lysparma: cortice imbricato.

689. LIRIODENDRUM.

Cal. 3phyllus. *Cor.* 6petala. *Sem.* pluri-
ma, lanceolata, imbricata.

690. MAGNOLIA.

Cal. 3phyllus. *Cor.* 9petala. *Caps.* glo-
meratae, 2valves. *Sem.* pendula.

HOUTTUYNIA.

Cal. 4phyllus. *Cor.* o. *Stamina* pistillis
mixta.

688. DILLENTIA. *Cal. 5phyllus. Cor. 5petala. Caps. plures connatae: recept. carnoso.*
699. RANUNCULUS. *Cal. 5phyllus. Petala 5: ungue nectario-fero. Sem. plurima.*
698. ADONIS. *Cal. 5phyllus. Cor. 5-10petala. Sem. plurima angulata, corticata.*
- HAMADRYAS. *Cal. 5-6phyllus. Petala 10-12 linearia. Stil. o. Caps. 1permae.*
611. ILLICIUM. *Cal. 6phyllus. Petala 27. Caps. 1permae in orbem.*

* *Phytolacca icosandra. Nigellae nonnullae.*

ntherae
gonae,
ermae.
. Sta-
oris la-
nposita
s poly-
,
ristata.
lurima,
aria 5.
eclaria

Caps.

1.
nearia.
cae 4-
petala.

olures,
ermae.
e plu-
ze po-
z po-
pluri-
glo-
a.
istillis

688.

MONOGYNIA.

613. CACTUS. *Cal. iphyllus, superus, imbricatus.*
Cor. multiplex. Antrum dupli-
catum ioculare, pericarpiis offeis
intus nidulantibus.

* *subrotundi*, Echinomelocacti.

mammil- 1. *C. tectus tuberculis ovatis barbatis.* *Pluckn. alm. t. 29.*
Iaris. *f. 1. 2.*

Meloca- 2. *C. quatuordecimangularis.* *Clus. exot. t. 32.* β) *spinis lon-*
gus recurvis albidis.

nobilis. 3. *C. quindecimangularis.* *Mant. p. 243.* β) *angulis in spi-*
ram contortis.

** *elongati*, Cerei.

† *erecti, stantes per se.*

Pitajaya. 4. *C. triangularis.*

tetragonos. 5. *C. quadrangularis longus: angulis compressis.*

pentago- 6. *C. subquinquangularis longus articulatus.*
nus.

hexago- 7. *C. sexangularis longus: angulis distantibus.* *Knorr del.*
nus. *bort. 1. t. F. 7.*

heptago- 8. *C. oblongus septemangularis.*
nus.

peruvia- 9. *C. longus suboctangularis: angulis obtusis.* *Lob. ic. 2.*
nus. *p. 25.*

repandus. 10. *C. longus octangularis: angulis compressis undatis, spinis*
lana longioribus. *Trew. Ebret t. 14.* β) *Cactus americanus.* *Bradl. succ. t. 12.*

Ianugino- 11. *C. longus subnovemangularis: angulis obsoletis, spinis*
fus. *lana brevioribus.* *Herm. parad. Lugdb. t. 115.*

Royeni. 12. *C. novemangularis articulatus: articulis subovatis, spinis*
lanam aequantibus.

coquim- 13. *C. longus decemangularis: angulis obtusis, spinis longissi-*
banus. *mis rectis.* *Molin. hist. nat. Chil. p. 146.*

TT repentes: radiculis lateralibus.

- catus. 14. C. teres striatus muticus. *Plum. ic. 197. f. 2.*
 dupli-
 offeis
 t. 29.
 his lon-
 in spi-
 rr del.
 ic. 2.
 spinis
 ameri-
 spinis
 portulaci-
 nissi-
 T re-
- parasiticus. 14. C. teres striatus muticus. *Plum. ic. 197. f. 2.*
 pendulus. 15. C. pendulus: ramis verticillatis teretibus glabris muticis.
Mill. illustr. ic. Cassytha polysperma.
 triangula- 16. C. triangularis. *Jacq. a Et. helv. 5. t. 2.*
 ris.
 grandiflo- 17. C. subquinquangularis. *Trew. Ehret. t. 31. 32.*
 rus.
 flagelli- 18. C. decemangularis. *Trew. Ehret. t. 30.*
 formis.
 monili- 19. C. articulis globosis spinosis glomeratis. *Plum. ic. 198.*
 formis.
 Opuntia. 20. C. laxus: articulis ovatis, spinis setaceis. *Knorr del. hort.*
 i. t. F. a.
 Ficus 21. C. articulis ovato-oblongis, spinis setaceis.
 indica.
 Tuna. 22. C. articulis ovato-oblongis, spinis subulatis. *Knorr del.*
hort. 2. t. O.
 cochenil- 23. C. articulis ovato-oblongis subinermibus. *Knorr del. hort.*
 lifer. 2. t. O. 1.
 curassa- 24. C. articulis cylindrico-ventricosis. *Knorr del. hort. 2.*
 vicus. t. O. 2.
 Phyllan- 25. C. ensiformi-compressus ferrato-repandus. *Dill. b. Elth.*
 thus. t. 64. f. 74.
 spinosissi- 26. C. caule erecto compresso: ramis oppositis bifariis com-
 pressis; spinis setaceis. *Ait. hort. Kew. 2. p. 155.*
 alatus. 27. C. ensiformi-compressus crenatus. *Swarts nov. pl. gen.*
et sp. p. 77.

***** caule arboreo tereti.*

- Pereskia. 28. C. aculeis geminis recurvis, foliis lanceolato-ovatis. *Dill.*
b. Elth. t. 227. f. 294.
 portulaci- 29. C. caule spinoso, foliis cuneiformibus retusis. *Plum. ic.*
 folius. 197. f. 2.

614. PHILADELPHUS. *Cal. superus, 4-5 partitus.*

Petala 4-5. Caps. poly sperma, 4-5 locularis, semiinfera. Semina arilata.

- corona- 1. Ph. foliis subdentatis. *Du Hamel arbr. 2. t. 83. Gaertn. rius. de fr. et sem. cent. 3. t. 35. f. 2.*
- inodorus. 2. Ph. foliis integerrimis. *Catesb. Car. 2. t. 84.*
- aromaticus. 3. Ph. foliis linear-lanceolatis enerviis integerrimis, floribus omnibus quinquefidis: calice colorato deciduo. *Ait. hort. Kew. 2. p. 156.*
- laniger. 4. Ph. foliis oblongis acutis integerrimis pubescentibus, calicibus lanatis. *Ait. hort. Kew. 2. p. 156.*
- floribus. 5. Ph. *Mag. für die Botan. 7. t. 2.*

615. PSIDIUM. *Cal. 5 fidus, superus. Petala 5. Bacca 1 uni- vel multilocularis, polysperma, infera.*

* *pedunculis unifloris.*

- pyriferum. 1. Pf. foliis lineatis obtusiusculis. *Trew. Ehret. t. 43.*
- decasper. 2. Pf. foliis ovatis acuminatis planis, pedunculis bracteatis baccum. *Suppl. p. 252. Forst. char. gen. t. 37. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 27. f. 5.*
- grandiflorum. 3. Pf. foliis ovatis acuminatis, baccia quadriloculari. *Aubl. pl. guj. I. p. 483. t. 190.*
- aromaticum. 4. Pf. foliis ovato-oblongis acuminatis, baccia quadriloculari. *Aubl. pl. guj. I. p. 485. t. 191.*
- Cujavil- 8. Pf. foliis lineatis ovato-lanceolatis, pedunculis subbifloris. lus. *Rumpf. amb. I. t. 49.*

** *pedunculis trifloris.*

- pomiferum. 5. Pf. foliis lineatis acuminatis. *Jacq. obs. bot. 2. t. 31.*
- guineense. 6. Pf. foliis ovatis integris subtus tomentosis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 77.*

*** pc*

*** *pedunculis multifloris.*

- montana. 7. Pf. foliis oblongis acuminatis crenulatis nitidis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 77.*

PIRIGARA. *Cal. turbinatus, 4partitus, superus.*
Petala 4-6. Stigm. 4gonum, sessile. Bacca obtusa 4gona, 4locularis: loculis 6-7spermis.

tetrapeta- 1. P. foliis ovato-oblongis acuminatis dentatis. *Aubl. pl. guj. I. p. 487. t. 192.*

hexapeta- 2. P. foliis obovatis acutis serrulatis. *Aubl. pl. guj. I. p. 490. t. 193.*

616. EUGENIA. *Cal. 4partitus, superus. Petala 4. Drupa 1sperma, 4angularis.*

*** *foliis integerrimis.*

malaccensis. 1. E. pedunculis ramosis lateralibus. *Rumpf. amb. I. t. 37. 38.*

Jambos. 2. E. pedunculis ramosis terminalibus. *Rumpf. amb. I. t. 39.*

carthage- 18. E. pedunculis ramosis axillaribus. *Jacq. stirp. amer. t. nensis. 173. f. 53.*

aquea. 19. E. pedunculis quadrifloris, drupa quinqueloculari. *Rumpf. amb. I. t. 38. f. 2.*

Pseudopsi- 3. E. pedunculis unifloris pluribus lateralibus terminalibusque dium. *Jacq. stirp. amer. piit. t. 140.*

periplo- 4. E. pedunculis paniculatis axillaribus terminalibusque, foliis caefolia, acuminato-lanceolatis. *Jacq. coll. 2. p. 108. t. 4.*

panicula- 5. E. pedunculis paniculatis axillaribus terminalibusque, foliis ta. ovatis obtusis. *Jacq. coll. 2. p. 108. t. 5. f. 1.*

montana. 6. E. racemis terminalibus: floribus sessilibus, foliis ovatis acutis glabris. *Aubl. pl. guj. I. p. 495. t. 195. β) Eugenia Cumete. Aubl. pl. guj. I. p. 497. t. 196.*

Mini. 7. E. racemis terminalibus axillaribusque: floribus pedunculatis, foliis lanceolatis glabris pellucido-punctatis. *Aubl. pl. guj. I. p. 498. t. 197.*

latifolia. 8. E. pedunculis unifloris axillaribus, foliis ovatis acutis rigidis pellucido-punctatis. *Aubl. pl. guj. I. p. 502. t. 199.*

gujanen- 9. E. pedunculis subtrifloris axillaribus, foliis ovatis acutis pel-
lucido-punctatis subfessilibus. *Aubl. pl. guj. I. p. 506.*
t. 201.

tomento- 10. E. floribus racemosis, foliis ovatis tomentosis. *Aubl. pl.*
guj. I. p. 504. t. 200.

sinemari- 11. E. floribus congestis fessilibus, foliis ovatis acuminatis gla-
bris. *Aubl. pl. guj. I. p. 501. t. 198.*

cotinifo- 12. E. foliis ovatis obtusis, pedunculis unifloris. *Mant. p. 243.*
Jacq. ohf. bot. 3. t. 53.

uniflora. 13. E. foliis cordato-lanceolatis, pedunculis unifloris lateralibus.
Till. h. pis. t. 44.

undulata. 14. E. floribus axillaribus subfessilibus, foliis ovato-oblongis
acuminatis glabris, pellucido-punctatis undulatis. *Aubl.*
pl. guj. I. p. 508. t. 202. β) Eugenia Ariboa. *Aubl.*
pl. guj. I. p. 510.

baruensis. 15. E. pedunculis lateralibus unifloris racemosisque. *Jacq.*
coll. 3. p. 183. utrum hujus, an sequentis tribus?

** *foliis crenatis.*

acutangu- 16. E. pedunculis terminalibus, pomis oblongis acutangulis.
Rumpf. amb. 3. t. 115.

racemosa. 17. E. racemis longissimis, pomis ovatis quadrangulis. *Rumpf.*
amb. 3. t. 116.

CATINGA. *Cal. minimus, 4dentatus, superus.*

Cor. - - Drupa rotunda 1locula-
ris: cortice carnosofibroso.

moschata. 1. *C. drupa globosa.* *Aubl. pl. guj. I. p. 511. t. 203. f. 1.*

aromatica. 2. *C. drupa pyriformi.* *Aubl. pl. guj. I. p. 512. t. 203. f. 2.*

METROSIDEROS. *Cal. 5dentatus. Cor. 5petala.*

Caps. calicis ventre cortica-
ta. Sem. immatura numero-
rosissima, lineari-paleacea,
matura paucissima rotunda-
ta, aut angulata.

* *capsula 3-4loculari.*

gummi- 1. *M. calice fructifero globose suberofo edentulo.* *Gaertn. de-*
fera. *fr. et sem. cent. 3. t. 34. f. 1.* *2. M.*

- costata. 2. M. calice fructifero ovato-globoso costato brevissime quinquentadato. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 34. f. 2.*
- folicifo- lia. 3. M. calice fructifero subgloboso truncato edentulo. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 34. f. 3.*
- viminalis. 4. M. calice fructifero subhemisphaerico crasso edentulo. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 34. f. 4.*
- armilla- ris. 5. M. calice fructifero subgloboso crasso edentulo. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 34. f. 5.*
- nodosa. 6. M. calicibus aggregatis sphaericis edentulis glaberrimis. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 34. f. 6.*
- fulgens. 7. M. calice fructifero ovato-oblongo obsolete costato subdentulo. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 34. f. 7.*
- excelsa. 8. M. calice fructifero tomentoso quinquedentato. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 34. f. 8.*
- spectabi- lis. 9. M. calice fructifero tomentoso obsolete pentagono obtuse quinquedentato. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 34. f. 9.*
- scandens. 10. M. calice fructifero hemisphaerico quinquedentato. *Gaertn. de fruct. et sem. cent. 3. t. 34. f. 10.*
- albiflora. 11. M. calice fructifero cum tota capsula connato subtus ventricoso sursum angustato: dentibus quinque patulis. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 34. f. 11.*
- myrtifo- lia. 12. M. calice fructifero arête capsulae adhaerente infundibuliformi, quinquedentato. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 34. f. 12.*

** *capsula quinqueloculari*, Leptosperma.

- arachnoi- dea. 13. M. capsulis globosis: calice tenuissimo lanato, quinquedentato. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 35. f. 3.*
- umbella- ta. 14. M. capsulis umbellatis subglobosis ad verticem pyramidis auctis. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 35. f. 3.*
- squarrofa. 15. M. capsulis subglobosis: calice edentulo; margine inaequali repando. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 35. f. 3.*

FABRICIA. *Cal. adnatus, hemisphaericus, 5partitus. Petala 5 rotundata, concava, sessilia. Stigm. globosum. Caps. multilocularis. Sem. pauca, alata.*

myrtifolia. I, FABRICIA, *Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 35. f. 4.*

EUCALYPTUS. *Cal. operculum superum, integer-
rium, truncatum. Cor. calyptra obverse hemisphaerica
ante anthesin discedens. Caps. subquadrilocularis, apice de-
hiscens, polysperma.*

obliqua. 1. **EUCALYPTUS.** *Herit. Sert. angl. p. 18. t. 20.*

617. MYRTUS. *Cal. 4-5fidus, superus. Petala 0, 3-5.
Bacca 1-3sperma, 1-3locularis.*

* *corolla pentapetala.*

- commu- 1. *M. floribus solitariis, involucro diphyllo.* *Blackw. herb.
nis.* *t. 114. Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 38. f. 2.*
- brasiliiana. 2. *M. floribus solitariis, pedunculis nudis, petalis subciliatis.* *Comm. b. amst. 1. t. 89.*
- Luma. 3. *M. floribus solitariis, foliis suborbiculatis.* *Molin. hist. nat.
Chil. p. 148.*
- Ugni. 4. *M. floribus solitariis, ramis oppositis, foliis ovalibus sub-
sessilibus.* *Molin. hist. nat. Chil. p. 136.*
- alpina. 5. *M. pedunculis solitariis terminalibus unifloris brevissimis,
foliis ovatis, ramulis quaternis faltigiatis, caule arboreo.* *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 77.*
- tomento- 39. *M. pedunculis unifloris, foliis triplinerviis subtus tomen-
fa.* *Ait. hort. Kew. 2. p. 159. Pluckn. amalb. t. 372. f. 1.*
- procera. 6. *M. pedunculis unifloris axillaribus confertis, foliis ovatis
acuminatis planis glabris, ramis virgatis, caule arboreo.* *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 77.*
- ligustrina. 7. *M. pedunculis solitariis ramosisque terminalibus unifloris,
foliis lanceolatis obtusis convexis lucidis.* *Swarts nov. pl.
gen. et sp. p. 78.*
- biflora. 8. *M. pedunculis bifloris, foliis lanceolatis.* *Brown. jam. t. 25. f. 3.*
- crenulata. 9. *M. pedunculis solitariis axillaribus subtrifloris, foliis subro-
tundis crenulatis glabris.* *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 78.*
- lucida. 10. *M. pedunculis subtrifloris, foliis subfessilibus lanceolatis
attenuatis.*

- teger.
or. ca-
aerica
Caps.
ce de-
- O, 3-5.
ularis.
- z. herb.
ciliatis,
ifl. nat.
- us sub-
issimis,
boreo.
- tomen-
2. f. I.
ovatis
boreo.
- ifloris,
ov. pl.
- 25.f.3.
subro-
· p. 78.
eolatis
- I. M.
- angustifo- **11.** *M. pedunculis umbellatis, foliis linear-lanceolatis subfes-silia.* *Mant. p. 74. Burm. afr. t. 83. f. 2.*
- laevis. **12.** *M. pedunculis umbellatis, foliis ovatis acuminatis.* *Thunb. flor. jap. p. 198.*
- cumini. **13.** *M. pedunculis multifloris, foliis lanceolato-ovatis.* *Rumpf. amb. I. t. 41.*
- maxima. **14.** *M. pedunculis multifloris, foliis alternis subovalibus.* *Mo-lin. hist. nat. Chil. p. 149.*
- lineata. **15.** *M. floribus axillaribus subfessilibus, foliis ovatis acumina-tis rigidis lineatis subtus incanis.* *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 78.*
- cordata. **16.** *M. floribus axillaribus lateralibusque subfessilibus, foliis fessilibus cordatis ovatis nitidis.* *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 78.*
- laurina. **17.** *M. pedunculis racemosis bracteolatis, foliis ovato-lanceo-latis ferrulatis glabris.* *Burm. zeyl. p. 139. t. 62.*
- buxifolia. **18.** *M. racemulis brevissimis confertis axillaribus, foliis cunea-tis oblongis obtusis convexiusculis.* *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 78.*
- glabrata. **19.** *M. racemulis brevissimis axillaribus multifloris, foliis ellipticis acuminatis convexis coriaceis glaberrimis.* *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 78.*
- disticha. **20.** *M. pedunculis axillaribus multifloris folio brevioribus, fo-liis distichis deflexis ovato-lanceolatis; ramis patentibus.* *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 78.*
- montico- **21.** *M. pedunculis multifloris brevissimis axillaribus solitariis,*
la. *foliis ovatis obtusatis planis glaberrimis.* *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 78.*
- axillaris. **22.** *M. pedunculis multifloris brevissimis axillaribus confertis,*
foliis ovatis acuminatis nitidis planis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 78.*
- Gregii. **23.** *M. pedunculis multifloris axillaribus, foliis ovato-ellipti-cis acutis integerrimis subtus pubescentibus.* *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 78.*
- dioica. **24.** *M. pedunculis trichotomo-paniculatis, foliis oblongis, floribus dioicis.*
- virgulto- **25.** *M. pedunculis axillaribus terminalibusque paniculatis: pe-dicellis remotis decussatis unifloris, foliis lato-lanceolatis attenuatis, ramis virgatis, caule arboreo.* *Plum. ic. 208. f. 1.*

- splen- 26. M. pedunculis axillaribus solitariis trichotomis, foliis ellip-
dens. pticis acuminatis planis venosis leucostachys nitidis, ramis vir-
gatis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 79.*
- zeylani- 27. M. pedunculis multifloris, foliis ovatis subpetiolatis. *Herm.*
ca. *b. Lugdb. t. 435. Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 33. f. 1.*
- androsoe- 28. M. pedunculis trifido-multifloris, foliis subovalibus ses-
moides. filibus.
- caryo- 29. M. pedunculis trifido-multifloris, foliis obovatis. *Jacq.*
phyllata. *obs. bot. 2 t. 25.*
- acris. 30. M. pedunculis axillaribus terminalibusque corymbosis tri-
chotomis folio longioribus, foliis ellipticis convexis, co-
riaceis venosis punctatis, caule arboreo. *Pluckn. alm.*
t. 155. f. 3. β) Plum. ic. 208. f. 2.
- fragrans. 31. M. pedunculis axillaribus trichotomis simplicibusque, fo-
liis ovatis convexiusculis subcoriaceis punctatis glabris,
caule arboreo. *Aubl. pl. guj. p. 495. t. 195. Eugenia*
montana.
- Pimenta. 32. M. foliis alternis oblongo-ovatis. *Blackw. herb. t. 355.*
Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 38. f. 2.
- triflora. 39. M. foliis alternis, pedunculis trifloris. *Jacq. stirp. amer.*
t. 183. f. 59.
- ** corolla nulla, calice operculato, Calyptrantheae.
- rigida. 33. M. arborescens, pedunculis solitariis axillaribus subtriflo-
ris, foliis ovatis acutis convexis aeniis rigidis. *Swarts*
nov. pl. gen. et sp. p. 80.
- Chytra- 34. M. pedunculis dichotomis paniculatis tomentosis, foliis ter-
culia. minalibus subovatis geminis. *Brown. jam. t. 137. f. 2.*
- Zuzygi- 35. M. pedunculis multifloris, ramis dichotomis, foliis gemi-
um. nis subovatis terminalibus. *Brown. jam. t. 7. f. 2.*
- Makal. 36. M. bacca ovato-globosa coriacea glabra: semine bilobo.
Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 33. f. 1.
- panicula- 37. M. bacca ovata coriacea tenui: semine bilobo. *Gaertn. de*
ta. *fr. et sem. cent. 3. t. 33. f. 1.*
- nitida. 38. M. bacca sphaerica longissime pedunculata glabra: semine
bilobo. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 33. f. 1.*
- *** dubiae tribus.
- rotinifolia. 40. M. foliis alternis ovatis. *Plum. amer. t. 208. f. 1.*

faligna. 41. M. foliis linear-lanceolatis integerrimis, spicis terminalibus, baccis sessilibus. *Rumpf. amb. 2. t. 17. f. 2.*

linearis. 42. M. foliis linearibus, floribus axillaribus geminis pedunculatis. *Plum. amer. t. 207. f. 2.*

SCOLOPIA. *Cal. 3-4 partitus, persistens. Cor. 3-4 petala, calice duplo longior. Stigma 3 lobum: foveolis 3 impressis. Bacca subrotunda, stilo coronata, 1 locularis, 6 sperma.*

Schreberi. I. SCOLOPIA. *Schreb. gen. pl. Linn. I. p. 335.*

FOETIDIA. *Cal. 4 fidus, turbinatus, superus. Stigm. 4 fidum. Caps. lignosa, 4 angularis, 4 locularis; loculis 1-2 spermis.*

borbonica. I. FOETIDIA. *Jussieu gen. plant. p. 325.*

GUAPURUM. *Cal. 4 fidus superus. Petala 4. Bacca sphaerica, 2-4 sperma.*

peruviana. I. GUAPURUM. *Jussieu gen. plant. p. 324.*

618. PUNICA. *Cal. 5-10 fidus, superus. Petala 5. Bacca infera multilocularis, polysperma.*

Granatum. 1. *P. foliis lanceolatis, caule arboreo. Blackw. herb. t. 97-145. Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 38. f. 1.*

nana. 2. *P. foliis linearibus, caule fruticoso.*

619. AMYGDALUS. *Cal. 5 fidus, inferus. Petala 5. Drupa nuce poris perforata.*

Persica. 1. *A. foliorum serraturis omnibus acutis, floribus sessilibus solitariis. Knorr del. hort. I. t. P. I.*

communis. 2. *A. foliis petiolatis serratis: serraturis insimis glandulosis, floribus geminis: petalis emarginatis. ♂) Knorr del. hort. I. t. M. I, ♀) Blackw. herb. t. 105.*

- dulcis. 3. A. foliis petiolatis crenatis, floribus geminis: corollis calice vix majoribus.
- pumila. 4. A. foliis venoso-rugosis. *Mant.* p. 74. 514. *Herm. par.* *Lugdb.* t. 489.
- nana. 5. A. foliis basi attenuatis. *Mant.* p. 396. *Jungh. plant. ic.* cent. I. n. 14. *Pallas fl. ross.* t. 6.
- incana. 6. A. foliis lanceolatis ferratis subsessilibus rugosis: subtus albo-tomentosis. *Pallas flor. ross.* t. 7.
- orientalis. 7. A. foliis lanceolatis integerrimis argenteis perennantibus: petiolo brevi. *Ait. hort. Kew.* 2. p. 162.

620. PRUNUS. Cal. 5fidus, inferus. Petala 5. Drupe ilocularis superne clausae nux futuris prominulis.

- Padus. 1. Pr. floribus racemosis, foliis deciduis basi subtus biglandulosis *Flor. dan.* t. 205. β) caucasica. *Pallas flor. ross.* p. 17.
- rubra. 29. Pr. floribus racemosis: racemis erectis, foliis deciduis laevibus basi biglandulosis. *Ait. hort. Kew.* 2. p. 162.
- virginiana. 2. Pr. floribus racemosis, foliis deciduis crenatis basi anterius glandulosis. *Catesb. Car.* 2. t. 94.
- nana. 3. Pr. floribus racemosis, foliis deciduis argute serratis basi anterius glandulosis. *Du Roi harbk. Baumz.* 2. p. 194. t. 4.
- canadensis. 4. Pr. floribus racemosis, foliis deciduis eglandulosis lato-lanceolatis rugosis utrinque pubescentibus. *Pluckn. almt.* t. 58. f. 4.
- occidentalis. 5. Pr. floribus racemosis: racemis lateralibus, foliis perennantibus eglandulosis oblongis acuminatis integris utrinque glabris. *Swarts nov. pl. gen. et sp.* p. 80.
- sphaero-carpa. 6. Pr. floribus racemosis: racemis axillaribus, foliis sempervirentibus eglandulosis integris nitidis, drupis subrotundis. *Sloan. hist. jam.* 2. p. 79. t. 193. f. 1.
- Iusitanica. 7. Pr. floribus racemosis, foliis sempervirentibus eglandulosis ovatis, drupis oblongis. *Mill. ic.* 196. f. 1.
- Laurocerasus. 8. Pr. floribus racemosis, foliis sempervirentibus dorso biglandulosis. *Blackw. herb.* t. 512.
- carolina. 9. Pr. floribus racemosis, foliis lanceolatis acute denticulatis sempervirentibus. *Du Roi harbk. Baumz.* 2. p. 193.
10. Pr.

- lis calice elliptica. 10. Pr. floribus racemosis, foliis ellipticis serratis glabris. *Thunb. flor. jap. p. 199,*
- m. par. panicula- 11. Pr. floribus paniculatis patulis, foliis ovatis. *Thunb. flor. ta. jap. p. 200.*
- lant. ic. Mahaleb. 12. Pr. floribus corymbosis terminalibus, foliis ovatis. *Jacq. fl. austri. 3. t. 227.*
- us albo. latifolia. 13. Pr. umbellis sessilibus, foliis obovato-oblongis serratis: petiolis nudis. *Moench Weissens. p. 85.*
- ntibus: avium. 14. Pr. umbellis sessilibus, foliis ovato-lanceolatis subtus pubescentibus conduplicatis. *Mant. p. 397. Blackw. herb. t. 425.*
- Dru- pensilva- 15. Pr. umbellis subsessilibus aggregatis multifloris, foliis ovato-lanceolatis, ramulis pallide punctatis. *Suppl. p. 252.*
- ausae nigra. 16. Pr. umbellis sessilibus solitariis paucifloris, foliis ovatis acuminatis. *Ait. hort. Kew. 2. p. 165.*
- glandu- Cerasus. 17. Pr. umbellis subpedunculatis, foliis angusto-lanceolatis glabris conduplicatis. *Blackw. herb. t. 449. β) du Hamel arbr. fr. 1. t. 7. γ) du Hamel arbr. fr. 1. t. 5.*
- l. p. 17. pumila. 18. Pr. floribus subumbellatis, foliis lanceolatis ferrulatis utrinque glaberrimis petiolatis. *Pallas flor. ross. t. 8. b.*
- uis lae- Chamaec- 19. Pr. floribus sessilibus, foliis subcordatis. *Knorr del. hort. terius ceratus. ca. 1. t. A. 2.*
- is basi sibirica. 20. Pr. floribus sessilibus, foliis ovato-oblongis, fructibus exsuccis. *Pallas flor. ross. t. 8.*
4. t. 4. infititia. 21. Pr. pedunculis geminis, foliis ovatis subvillosis convolutis, ramis spinescentibus. *Blackw. herb. t. 305.*
- o - lan- domesti- 22. Pr. pedunculis subsolitariis, foliis lanceolato-ovatis convolutis, ramis muticis. *Blackw. herb. t. 309. β) Knorr del. hort. 1. t. P. 2. γ) du Hamel. arbr. fr. 2. t. 20. f. 14. δ) du Hamel. arbr. fr. 2. t. 20. f. 15.*
- . almt. spinosa. 23. Pr. pedunculis solitariis, foliis lanceolatis glabris, ramis spinosif. *Blackw. herb. t. 494.*
- ennan- japonica. 24. Pr. pedunculis solitariis, foliis ovatis acuminatis glabris, ramis inermibus. *Thunb. flor. jap. p. 201.*
- inque- glandulo- 25. Pr. pedunculis solitariis, foliis oblongis glanduloso-ferratis, ramis inermibus. *Thunb. flor. jap. p. 202.*

- incisa. 26. Pr. pedunculis solitariis, foliis ovatis inciso-ferratis villosis, ramis inermibus. *Thunb. flor. jap. p. 202.*
- tomento- 27. Pr. pedunculis solitariis, foliis ovatis subtus tomentosis. *Thunb. flor. jap. p. 203.*
- aspera. 28. Pr. floribus solitariis terminalibus, foliis ovatis ferratis apertis. *Thunb. flor. jap. p. 201.*

671. PLINIA. *Cal. 4-5partitus. Petala 4-5. Drupa supera, fulcata.*

crocea. 1. Pl. floribus pentapetalis. *Plum. ic. 225.*

peduncu- 2. Pl. floribus tetrapetalis pedunculatis: staminibus receptaculata. *Mant. p. 243. Suppl. p. 253.*

ROBINSONIA. *Cal. turbinatus, 5dentatus. Cor. 5petala. Stigma sessile, striatum. Bacca depresso-globosa longitudinaliter fulcata, infera, 7locularis: loculis ispermis.*

gujanensis. I. **ROBINSONIA.** *Aubl. pl. guj. I. p. 492. t. 194.*

CASSIPUREA. *Cal. turbinatus, 4-5dentatus. Cor. 5petala. Anther. incumbentes, 2loculares. Stilus longus, villosus. Stigma obtusum. Peric. - - -*

gujanensis. I. **CASSIPUREA.** *Aubl. pl. guj. I. p. 528. t. 211.*

621. CHRYSOBALANUS. *Cal. 5fidus. Petala 5. Drupae Nux 5falcata, 5valvis.*

Icaco. I. **CHRYSOBALANUS.** *Jacq. stirp. amer. piæt. t. 141.*

GRANGERIA. *Cal. 5fidus, inferus. Petala 5. Stamina 15. Drupa subtriquetra: Nux ossea, 3quatra, isperma.*

borbonica. I. **GRANGERIA.** *Jussieu gen. plant. p. 340.*

XYLOSMA. *Flores dioici. Cal. 4-5partitus. Cor. o.*
♂. Stamina calice duplo longiora, ne-
ctario annulato cincta.
♀. Stilus minimus. Stigma obsolete
3fidum. Bacca? sicca, subbilo-
cularis: loculis 2spermis.

Suaveo- 1. *X. foliis ovatis ferratis, Forst. fl. aust. p. 72. charact. gen.*
lens. *t. 63. f. k.*
orbicula- 2. *X. foliis subrotundis integerrimis. Forst. fl. aust. p. 72.*
tum. *char. gen. t. 63. f. a-i.*

POSSIRA. *Cal. 4partitus. Petalum 1 laterale. Le-*
gumen 1loculare, 2valve.

simplex. 1. *P. foliis simplicibus oblongis. Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 82.*
triphylla. 2. *P. foliis ternatis: petiolis marginatis. Aubl. pl. guj. p.*
931. t. 355.

CUBLANDIA. *Cal. tubulosus, 4dentatus. Cor. 1pe-*
tala, 4fida: tubo oblongo. Fi-
lamenta basi coadunata. Legu-
men nodosum: nodulis 1spermis.
frutescens. 1. *CUBLANDIA. Aubl. pl. guj. 2. p. 937. t. 356.*

640. MARCGRAVIA. *Cor. 1petala, calyptriformis.*
Cal. 6phyllus, imbrica-
tus. Bacca multilocula-
ris, polysperma.

umbellata. 1. *MARCGRAVIA. Jacq. stirp. amer. pict. t. 143.*

1397. TERNSTROEMIA. *Cor. 1petala, 5-6partita*
urceolata. Cal. 5par-
titus. Bacca exfuc-
ta, 2locularis, eval-
vis, polysperma.

elliptica. 1. *T. foliis ellipticis acutis integris, pedunculis lateralibus.*
Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 81.

- meridionalis. 2. *T. foliis obovatis integris, pedunculis terminalibus. Suppl. p. 264. Mutis amer. I. t. 9.*
- punctata. 3. *T. foliis oblongis integris subemarginatis margine punctatis, pedunculis axillaribus. Aubl. pl. guj. p. 571. t. 228. Taonobo punctata.*
- dentata. 4. *T. foliis oblongis acuminatis dentato-serratis, pedunculis axillaribus lateralibus. Aubl. pl. guj. p. 569. t. 227. Taonobo dentata.*

1398. ALSTONIA. *Cor. ipetala, 8-lobata: lacinias alternatis.*

theaeformis. I. ALSTONIA. *Suppl. p. 264.*

THOTTEA. *Cal. o. Cor. ipetala, supera, margine triloba. Receptac. truncatum, radiatum. Stigma in centro radiorum. Stil. o. Siliq. 4angularis.*

grandiflora. I. THOTTEA. *Fr. Rottboll. n. act. dan. 2. p. 530. t. 2.*

CIPONIMA. *Cal. turbinatus, 5dentatus. Cor. ipetala, tubulosa, 5partita. Filamenta basi coniuncta in 2 ordines digesta. Stigma capitatum. Bacca ovata 1locularis: officulo 4loculari; loculis 1spermis.*

gujanensis. I. CIPONIMA. *Aubl. pl. guj. I. p. 566. t. 226.*

PARALEA. *Cal. 4dentatus. Cor. ipetala, carnosa, 4partita: tubo 4gonio. Peric. . . .*

gujanensis. I. PARALEA. *Aubl. pl. guj. I. p. 576. t. 231.*

Suppl.
puncta-
t. 228.
unculis
• Tao-
laci-
argi-
tum,
o ra-
laris.
ipe-
nen-
s di-
acca
cula-
ofa,
..
AD.

MADHUCA. *Cal.* semiquadrif. superne imbricatus.

Cor. tubo inflato, squamis 9 imbricatis intus aucta. *Antherae* sessiles. *Drupa* 2-3locularis: loculis 1spermis.

indica. 1. MADHUCA. *Hamilton act. soc. benghal.* I. p. 300. c. ie.

NECTANDRA. *Cor.* infundibuliformis, 6partita, intus tomentosa. *Cal.* o. *Nectarium* squamae 9 obovatae. *Filamenta* 36 in 9 quadrigas per squamas nectarii distributa. *Drupa* turbinata, truncata, calici affixa.

sanguinea. 1. N. caule diffuso, foliis alternis lanceolatis, antheris quaternis collateralibus. *Fr.* Rottb. *act. litter. univ. Havn.* 1778. p. 279.

bijuga. 2. N. foliis ovato-lanceolatis acuminatis, racemis filiformibus, floribus polygamis: antheris bijugis. *Fr.* Rottb. *act. litt. un. Havn.* 1778. p. 281.

MITRARIA. *Cal.* inferus, iphyllus, 2partitus. *Petala* 2-3 concava, superne rotunda. *Nux* 1locularis, 2sperma, calice testa, subtetragona.

Commer- 1. MITRARIA. Sonner. *it. nov. Guin.* p. 14. t. 8. 9.
fonia.

MENICHEA. *Cal.* 3partitus, in fructum abiens. *Petala* 4concava, superius rotunda. *Drupa* sulcata, subovata, 1locularis, 1sperma.

rosata. 1. MENICHEA. Sonner. *it. nov. guin.* p. 133. t. 92. 93.

1158. MIMOSA. *Flores mere masculi reliquis intersiti. Cal. 5dentatus. Cor. 5fida aut. o. Stamina 4-100. Legumen,*

* *foliis simplicibus.*

simplici- 1. *M. inermis arborea*, foliis ovatis integerimis nervosis obtusis, spicis globosis pedunculatis. *Suppl. p. 436. Rumpf amb. 3. t. 81.*

verticilla- 2. *M. inermis*, foliis verticillatis linearibus pungentibus. *Herit. fert. angl. p. 30. t. 41.*

** *foliis bigeminis.*

bigemina. 3. *M. inermis*, foliis acuminatis. *Flores monadelphi.*

Unguis 4. *M. spinosa*, foliis obtusis. *Plum. ic. t. 4. Flores monadelphi. Cati.*

*** *foliis tergeminis.*

tergemi- 5. *M. inermis*. *Jacq. stirp. amer. piæt. t. 262. f. 69. Flores monadelphi.*

**** *foliis conjugatis pinnatisque.*

† *inermes.*

latifolia. 6. *M. pinnis terminalibus oppositis: lateralibus alternis. Plum. ic. 9.*

purpurea. 7. *M. pinnis intimis minoribus. Plum. ic. 10. f. 1.*

viva. 8. *M. foliis partialibus quadrijugis subrotundis, caule herbaceo. Sloan. hist. jam. 2. t. 182. f. 7.*

†† *spinosa.*

reticulata. 9. *M. spinis stipularibus, foliolis sexjugis: petiolis glandula aculeoque terminatis. Pluckn. alm. t. 123. f. 2.*

††† *aculeatae.*

circinalis. 10. *M. pinnis aequalibus, stipulis spinosis. Catesb. car. 2. t. 97.*

cineraria. 11. *M. pinnis aequalibus, aculeis incurvis. Pluckn. alm. t. 2. f. 1.*

castra. 12. *M. foliis partialibus trijugis subaequalibus. Conimel. b. amst. 1. t. 28. Flores decandri.*

POLYANDRIA MONOGYNIA. Mimoſa.

801

inter-
Cor. 5-
4-100.
esis ob-
Rumpf
is. He-
adelphi.
Flores
Plunt.
rbacco.
landula
2. t. 97.
2. f. 1.
mel. b.
13. M.

Sensitiva. 13. M. foliis partialibus bijugis: intimis minimis. *Trew. Ebret. t. 95. Flores pentandri apetali.*

pudica. 14. M. foliis subdigitatis, caule hispido. *Commel. b. amſt. I. t. 29. Flores tetrandri apetali.*

***** foliis simpliciter pinnatis.
T *spinosa.*

stellata. 15. M. spinis stellatis ternis: duabus apice recurvis, foliis geminis novemjugis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 177.*

TT *inermes.*

Inaa. 16. M. foliis quinquejugis: petiolo marginato articulato. *Merian. Surin. t. 51.*

alba. 17. M. foliis trijugis: pinnis aequalibus ovatis acuminatis; petiolis submarginatis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 85.*

Iaurina. 18. M. foliis bijugis: pinnis ovatis nitidis subaequalibus; petiolis linearibus angulosis, spicis axillaribus solitariis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 85.*

fagifolia. 19. M. foliis bijugis: petiolo marginato. *Jacq. Stirp. amer. pięt. t. 247.*

nodosa. 20. M. foliis bijugis: pinnis interioribus minoribus; petiolo linearis. *Pluckn. alm. t. 211. f. 5.*

natans. 21. M. procumbens, foliis bijugis, capitulis subrotundis, floribus decandris, radicalibus sterilibus minoribus. *Suppl. p. 439.*

Burgoni. 22. M. foliis bijugis: petiolis biglandulosis non marginatis, legumine exsucce. *Aubl. pl. guj. 2. p. 941. t. 358.*

***** foliis bipinnatis.
T *inermes.*

scandens. 23. M. foliis conjugatis cirrho terminatis: foliolis bijugis. *Pluckn. phyt. 211. f. 6. Flores decandri pentapetali.*

Entada. 24. M. foliis cirrho terminatis: partialibus quinquejugis. *Jacq. Stirp. amer. t. 183.*

plena. 25. M. spicis pentandris: inferioribus planis. *Mill. ic. 190. f. 2.*

virgata. 26. M. erecta angulata, spicis masculis: inferioribus anandris apetalis. *Jacq. b. Vind. I. t. 80.*

punctata. 27. M. spicis erectis: floribus decandris; inferioribus castratis. *Commel. b. amſt. I. t. 31.*

Eee

28. M.

- pernam- 28. *M. decumbens*, spicis cernuis pentandris: inferioribus ca-
bucana. *fluckn. alm.* t. 307. f. 3.
- arborea. 29. *M. pinnis dimidiatis acutis*, caule arboreo. *fluckn. alm.*
t. 251. f. 2. *Flores monadelphi*.
- grandiflo- 30. *M. foliis abrupte bipinnatis multijugis*: pinnis multijugis;
ra. foliolis distinctissimis, racemo composito terminali. *Herit. sert. angl.* p. 30. t. 42.
- comosa. 31. *M. foliis trijugis*: pinnis subdecemjugis ovalibus basi retu-
sis, floribus paniculatis monadelphis, caule arboreo.
Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 85.
- Lebbek. 32. *M. foliis quadrijugis*: pinnis ovali-oblongis, floribus mo-
nadelphis fasciculatis, caule arboreo. *fluckn. mant.* 331. f. 1.
- odoratis. 33. *M. foliis quadrijugis multijugis*: foliolis oblongis obtusis,
fima. paniculis virgatis: spiculis globosis. *Suppl.* p. 437.
- speciosa. 34. *M. foliis subquadrijugis*: pinnis subnovemjugis oblongis gla-
bris, glandula supra costae basin. *Jacq. coll.* I. p. 47.
pl. rar. ic. cent. I. t. 75.
- vaga. 35. *M. pinnis exterioribus majoribus incurvatis pubescentibus*.
- villosa. 36. *M. foliis subquinquejugis*: pinnis ovatis petiolisque villo-
sis, spicis globosis, caule fruticoso. *Swarts. nov. pl. gen.*
et sp. p. 85.
- latiflilia. 37. *M. foliis partialibus quinquejugis*, ramulis flexuosis, gem-
mis globosis. *fluckn. spec.* 17. t. 6.
- polysta- 38. *M. foliis partialibus pinnisque sexjugis oblongis*. *Jacq.*
chya. stirp. amer. piæt. t. 262. f. 67. *Plum. ic.* 12.
- balsamica. 39. *M. foliis partialibus sexjugis subdenticulatis*, floribus octan-
dris. *Molin. hist. nat. Chil.* p. 141.
- glauca. 40. *M. foliis partialibus sexjugis*: pinnis plurimis, glandula
inter infima. *Trew. Ebret.* t. 36.
- peregrina. 41. *M. foliis partialibus sedecimjugis*: pinnis quadragintajugis,
glandula baseos petiolari.
- Sejal. 42. *M. foliis solitariis*: pinnis trijugis; inferioribus squama
simplici, extimus duplice distinctis. *Forsk. fl. aeg. arab.*
p. 177.

43. M.

Irritabiles, prouti etiam *Dionaea*, *Smithia* et *Oxalis sensitiva* sunt *M. pudica*, vi-
va, casta, asperata, quadrivalvis; utrum proxima huic generi *Pamea Aubl.*
pl. guj. 2 p. 946. dicta, t. 359. delineata drupa tamen succulenta acida distin-
cta, an *Terminaliae* propior?

- flava. 43. M. foliis subquinquejugis: pinnis subdecemjugis linearibus obtusis eglandulosis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 176.*
- tortilis. 44. M. foliis quinquejugis: pinnis subnovemjugis oblongis; extimis Iquamula interlinctis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 176.*
- glomerata. 45. M. leguminibus nigris contorto-globeratis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 177. an vere distincta species?*
- muricata. 46. M. foliis partialibus quinquejugis: propriis multijugis, caule muricato. *Plum. ic. 11.*
- gujanensis. 47. M. foliis partialibus: subquinquejugis, caule arboreo, floribus spicatis. *Aubl. pl. guj. 2. p. 938. t. 357.*
- bipinna. 48. M. foliis partialibus quadrijugis, leguminibus dilatatis. *Burm. amer. p. 7. t. 12.*
- sanguinea. 74. M. foliis partialibus octojugis: pinnis tredecimjugis, spinis axillaribus pedunculatis geminis. *Bruce trav. in Eg. Arab. Ab. and Nub. 5. app. p. 34. ic.*

TT *spinosa.*

- cinerea. 49. M. spinis solitariis, foliis decemjugis, floribus spicatis. *Burm. zeyl. 3. t. 2.*
- mangenensis. 50. M. spinis solitariis brevibus, foliis subnovemjugis, spicis globosis axillaribus solitariis. *Jacq. Stirp. amer. p. 267. n. 5.*
- juliflora. 51. M. spinis stipularibus geminis, foliis bijugis glandula interlinctis, spicis pendulis, leguminibus compressis. *Brown. jam. p. 251.*
- Orfota. 52. M. spinis stipularibus geminis patentissimis, foliis geminis subquinquejugis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 177.*
- Asak. 53. M. spinis stipularibus subternis patentibus recurvis, foliis triungis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 176.*
- Senegal. 54. M. spinis ternis: intermedia reflexa, floribus spicatis. *Catesbe. Car. 2. t. 44.*
- nilotica. 55. M. spinis stipularibus patentibus, foliis partialibus extimis glandula interlinctis, spicis globosis pedunculatis. *Blackw. herb. t. 377. β) Mimosa capensis. Paterson journeys into Caffraria p. 126. ic.*
- Cavenia. 56. M. spinis stipularibus patentibus, spicis globosis verticillatis sessilibus. *Molin. hist. nat. Chil. p. 149.*

- farnesia- 57. M. spinis stipularibus distinctis, foliis partialibus octojugis,
na. spicis globosis sessilibus.
- latronum. 58. M. spinis stipularibus connatis divaricatis teretibus subula-
tis, foliolis quadrijugis, spicis elongatis pedunculatis axil-
laribus subgeminatis. *Suppl. p. 438.*
- eburnea. 59. M. spinis stipularibus connatis divaricatis teretibus subula-
tis, foliolis sexjugis, spicis globosis peduncularibus axilla-
ribus pluribus. *Suppl. p. 437.*
- cornigera. 60. M. spinis stipularibus connatis divaricatis compressis apice
subulatis, foliolis duodecim ad vigintijugis, spicis axilla-
ribus elongatis. *Suppl. p. 438. Seb. mus. I. t. 70. f. 13.*
- Catechu. 61. M. spinis stipularibus, foliis multijugis: glandulis partia-
lium singulis, spicis axillaribus geminis ternisve peduncu-
latis. *Suppl. p. 439. Knorr medic. obs. and inq. 5. p.
151. t. 4.*
- horrida. 62. M. spinis stipularibus longitudine foliorum, foliis partiali-
bus sexjugis, ramis laevibus. *Pluckn. alm. t. 121. f. 4.*
- tortuosa. 63. M. spinis stipularibus, foliis quadrijugis: glandula inter
infima; pinnis sedecimjugis, spicis globosis.

TTT aculeatae.

- pigra. 64. M. laevis, foliis opposite aculeatis: spina erecta inter sin-
gula partialia.
- asperata. 65. M. hirta, foliis opposite aculeatis: spina erecta inter sin-
gula partialia. *Commel. h. amst. I. t. 30.*
- caesia. 66. M. pinnis ovali-oblongis oblique acuminatis. *Pluckn.
mant. s. 330. f. 3.*
- pennata. 67. M. foliis numerosissimis linearis acerosis, panicula aculea-
ta: capitulis globosis. *Burm. zeyl. 2. t. 1.*
- Intia. 68. M. pinnis incurvis, caule angulato, stipulis aculeo longio-
ribus. *Mant. p. 503. Pluckn. alm. t. 122. f. 2.*
- semispini- 69. M. articulis caulinis superne aculeatis.
noia.
- quadri- 70. M. caule quadrangulo: aculeis recurvis, leguminibus qua-
valvis. *Mill. ic. t. 182. f. 1.*
- tenuifolia. 71. M. foliis partialibus vigintijugis: pinnis multijugis.
- cornuta. 75. M. foliis partialibus pinnisque multijugis, spicis peduncu-
latis axillaribus erectis solitariis globolis, leguminibus his-
pido-

pido-pungentibus, tredecimlocularibus. *Bruce trav. in Eg. Ar. Ab. and. Nub. 5. app. p. 35. ic.*

Cerato- 72. M. foliis quinquejugis: partialibus trijugis; pinnis trinervia. *Plum. ic. 8.*

tamarin- 73. M. foliis quinquejugis: partialibus decemjugis; petiolis indifolia. *Mant. p. 503. Plum. ic. 7.*

1228. CARYOTA. *Flores monoici. Cal. 6phyllus.*

Cor. o.

♀. *Bacca supera ilocularis, 2-sperma.*

urens. 1. C. frondibus bipinnatis: foliolis cuneiformibus oblique praemorsis. *Rumpf amb. I. t. 14. Gaertn. de fr. et sem. cent. I. t. 7. f. 3.*

1313. TRILIX. *Cor. 3petala. Cal. 3phyllus. Bacca 5locularis, polysperma.*

Iutea. 1. *TRILIX. Mant. p. 247.*

DOLIOCARPUS. *Cor. 3petala, plicata. Cal. 5phyllus. Stigma subbifidum. Bacca globosa, stilo coronata, 1-locularis, 2sperma.*

Rolandri. 1. D. caule stricto, foliis ovato-lanceolatis dentatis, floribus terminalibus. *Rolander aet. Stockb. ad 1756. p. 261.*

major. 2. D. caule scandente, foliis ovatis dentatis, pedunculis lateribus, unifloris. *Roland. aet. Stockb. ad 1756. p. 261.*

Calinea. 3. D. caule scandente, foliis ovatis integerrimis, floribus axillaribus fasciculatis. *Aubl. pl. guj. I. p. 557. t. 221.*

641. RHEEDIA. *Cor. 4petala. Cal. o. Bacca 3-sperma.*

lateriflora. 1. *RHEEDIA. Plum. gen. t. 257.*

643. CAPPARIS. *Cal. 4phyllus, coriaceus. Petala 4.*
Stamina longa. Bacca corticosa, ilocularis, pedunculata.

- spinosa. 1. *C. pedunculis unifloris solitariis, stipulis spinosis, foliis annuis, capsulis ovalibus.* *Blackw. herb. t. 417.*
- zeylanica. 2. *C. pedunculis unifloris solitariis, stipulis spinosis, foliis ovatis utrinque acutis.*
- erythro- 3. *C. pedunculis solitariis unifloris, stipulis spinosis, foliis ovatocarpos.* *pericarpis hexagonis.* *Isert. Schr. berl. Naturf. 9. p. 334. t. 9.*
- Baducca. 4. *C. pedunculis unifloris, foliis perennantibus ovato-oblongis determinate confertis nudis.* *Brown. jam. t. 27. f. 2.*
- horrida. 5. *C. pedunculis axillaribus binis, stipulis aculeatis, ramis flexuosis, foliis ovato-lanceolatis mucronatis glabris.* *Suppl. p. 264.*
- sepiaria. 6. *C. pedunculis umbellatis, stipulis spinosis, foliis annuis ovatis emarginatis.* *Pluckn. alm. t. 338. f. 3.*
- frondosa. 7. *C. pedunculis umbellatis, foliis passim confertis.* *Jacq. Stirp. amer. pict. t. 153.*
- ferrugi- 8. *C. pedunculis umbellatis, foliis persistentibus lanceolatis subtus tomentosis, floribus octandris.* *Jacq. Stirp. amer. t. 100.*
- torulosa. 9. *C. pedunculis subbifloris teretibus terminalibus, foliis lanceolato-ovalibus subtus albido-punctatis, fructibus teretibus linearibus torulosis.* *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 81.*
- Carandas. 23. *C. pedunculis subtrifloris, foliis oppositis ovatis acuminatis, spinis bifurcis.* *Rumpf. amb. 7. t. 25.*
- longifo- 10. *C. foliis linear-lanceolatis subtus farinoso-punctatis.* *Pluckn. alm. t. 327. f. 6.*
- lia. flexuosa. 11. *C. pedunculis congestis terminalibus, foliis persistentibus oblongis obtusis glabris, ramis flexuosis.*
- cynophal- 12. *C. pedunculis multifloris terminalibus, foliis ovalibus oblongis perennantibus, glandulis axillaribus.* *Jacq. Stirp. am. pict. t. 145.*
- filiquosa. 13. *C. pedunculis multifloris compressis, foliis persistentibus lanceolato-oblongis acuminatis subtus punctatis.* *Pluckn. phyt. 327. f. 6.*

- haftata. 14. *C. pedunculis multifloris*, foliis haftato-lanceolatis nitidis.
Jacq. Stirp. amer. piæt. t. 147.
- comosa. 24. *C. pedunculis multifloris*, cœma subrotunda densa. *Jacq. Stirp. amer. p. 160.*
- verrucosa. 25. *C. pedunculis multifloris*, foliis oblongis acutis nitidis, bacca-
 cis verrucosis. *Jacq. Stirp. amer. piæt. t. 148.*
- jamaicensis. 26. *C. pedunculis multifloris*, foliis oblongis emarginatis sub-
 sis. *Jacq. Stirp. amer. t. 101.*
- Eystachi. 27. *C. pedunculis multifloris*, foliis ovatis acuminatis nitidis,
 ana. baccis glabris. *Jacq. Stirp. amer. piæt. t. 146.*
- grandis. 15. *C. corymbis terminalibus*, foliis ovatis acutis glabris, fru-
 ctu globoſo. *Suppl. p. 263.*
- linearis. 16. *C. pedunculis subracemosis*, foliis linearibus. *Jacq. Stirp.
 amer. piæt. t. 151.*
- pulcherri- 17. *C. pedunculis racemosis*, foliis oblongis obtusis, fructibus
 ma. baccatis. *Jacq. Stirp. amer. piæt. t. 155.*
- Breynia. 18. *C. pedunculis racemosis*, foliis persistentibus oblongis, ca-
 licibus pedunculisque tomentosis, floribus octandris. *Jacq.
 Stirp. amer. piæt. t. 152.*
- oblongi- 19. *C. pedunculis racemosis*, foliis perennantibus ovali-oblon-
 gis cum acumine obtusis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 99.*
- nemoro- 28. *C. pedunculis racemosis*, foliis ovatis acuminatis integerri-
 sa. mis coriaceis. *Jacq. Stirp. amer. piæt. t. 154.*
- tenuifili- 29. *C. racemis erectis simplicibus*, foliis integerrimis nitidis.
 qua. *Jacq. Stirp. amer. piæt. t. 154.*
- mithrida- 20. *C. foliis alternis pendulis linear-lanceolatis obtusis gla-
 tica*. baccatis supra nitidis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 99.*
- exstipula- 21. *C. exstipulata*, foliis subpeltatis ovato-cordatis crassiſeu-
 ta. lis planis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 100.*
- Dahi. 22. *C. spinis axillaribus duabus brevibus oppositis*, foliis bi-
 pinnatis: pinnis subtrijugis; foliolis subovovemjugis ova-
 li-oblongi obtusis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 213.*

**644. ACTAEA. Cor. 4petala. Cal. 4phyllus. Bacca
 ilocularis. Sem. semiorbiculata.**

- spicata. 1. *A. racemo ovato*, fructibus baccatis. *Blackw. herb. t. 565.*
β) Corn. canad. t. 77.

- racemo- 2. A. racemis longissimis, fructibus siccis. *Dill. b. Elth. n. sa. 67. f. 78.*
- monogyna. 3. A. racemis longissimis radicatis. *Walt. flor. carol. p. 151.*
- dioica. 4. A. floribus paniculatis, caule tuffruticoso. *Walt. flor. carol. p. 153.*
- japonica. 5. A. spicis longissimis, foliolis incisis palmatis indivisis. *Thunberg flor. jap. p. 221.*
- pentagy- 6. A. floribus solitariis axillaribus heptapetalis. *Walt. flor. car. na. rot. p. 151.*

645. SANGUINARIA. Cor. 8petala. Cal. 2phyllus.
Siliqua ovata, ilocularis.
canadensis. I. SANGUINARIA. *Giseck. ic. fasc. 1. n. 13.*

MAYNA. Flores dioici. Petala 8 in orbem expan-
fa. Cal. 3partitus.

♂. Anth. 4gonae, 4falcatae.

odorata. I. MAYNA. *Aubl. pl. guj. 2. p. 921. t. 352.*

646. PODOPHYLLUM. Cor. 9petala. Cal. 3phyllus. *Bacca* ilocularis,
coronata stigmate.

peltatum. I. P. foliis peltatis lobatis. *Trew. Ehret. t. 29.*

diphyllum. 2. P. foliis binatis semicordatis; an hujus generis?

TOVOMITA. Cor. 4petala. Cal. 2phyllus. Stigm.
4 subrotunda.

gujanensis. I. TOVOMITA. *Aubl. pl. jug. 2. p. 956. t. 364.*

FORSYTHIA. Cal. 9phyllus. Cor. 9petala. Caps.
turbinata, ilocularis, polysper-
ma, stigmate et calice coronata.

scandens. I. FORSYTHIA. *Walt. flor. Carol. p. 153.*

*Elth. n.
p. 151.
flor. ca-
Thun-
flor. ca-
yllus.
ularis.
xpan-
sphyl-
ularis,
e.
Stigm.
Caps.
sper-
onata.
647.*

647. CHELIDONIUM. *Cor. 4petala. Cal. 2phyllus. Siliqua linearis : receptaculo (in plurimis) fenestrato.*

- majus. 1. Ch. pedunculis umbellatis. *Flor. dan. t. 542. β) Flor. dan. t. 676.*
- Glaucium. 2. Ch. pedunculis unifloris, foliis amplexicaulibus sinuatis, caule glabro. *Flor. dan. t. 585. Receptacul. loculos mentiens ; uti in corniculato.*
- cornicula- 3. Ch. pedunculis unifloris, foliis sessilibus pinnatifidis, caule tum. hispido.
- hybri- 4. Ch. pedunculis unifloris, foliis pinnatifidis linearibus, caudum. le laevi, siliquis trivalvibus.
- dodecan- 5. Ch. pedunculis unifloris, foliis bipinnatifidis petiolatis, sili- drum. quis hispidis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 100.*
- japoni- 6. Ch. pedunculis unifloris, foliis petiolatis pinnatis ovatis. cum. *Thunb. flor. jap. p. 221.*

648. PAPAVER. *Cor. 4petala. Cal. 2phyllus. Stigma peltatum, radiatum, cre- natum. Caps. (plurimis) mul- tilocularis, sub stigmate per- sistente poris dehiscens.*

* *capsulis hispidis.*

- hybri- 1. P. capsulis subglobosis torosis, caule folioso multifloro. *Mo- dum. ris. hist. pl. 2. t. 14. f. 9.*
- Argemo- 2. P. capsulis clavatis, caule folioso multifloro. *Flor. dan. ne. t. 867.*
- alpinum. 3. P. scapo unifloro nudo hispido, foliis bipinnatis. *Jacq. fl. aust. I. t. 83. Caps. Ilocularis.*
- nudicau- 4. P. scapo unifloro nudo hispido, foliis simplicibus pinnato- le. sinuatis. *Flor. dan. t. 41.*

** *capsulis glabris.*

- Rhocas. 5. P. capsulis globosis, caule piloso multifloro, foliis pinnati- fidis incisis. *Knorr del. hort. I, t. R. 12-14.*

- dubium. 6. *P. capsulis oblongis, caule multifloro setis adpresso, foliis pinnatifidis incisis.* *Jacq. flor. aust. t. 1. t. 25.*
- somnife- 7. *P. calicibus glabris, foliis amplexicaulibus incisis.* *Regn. rum. bot. t. 143. 144. Blackw. herb. t. 482. 483. Bulliard. herb. Franc. t. 57.*
- cambri- 8. *P. capsulis oblongis, caule multifloro laevi, foliis pinnatis cum. incisis.* *Dill. h. Elth. t. 223. f. 290.*
- orientale. 9. *P. caulibus unifloris scabris foliosis, foliis pinnatis ferratis.* *Knorr del. hort. t. R. 14. a. Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. t. 60. f. 4.*

649. ARGEMONE. Cor. 5-6petala. Cal. 2-3phyllus. Caps. semivalvis, ilocularis, polysperma.

- mexicana. 1. A. capsulis sexvalvibus, foliis spinosis. *Merian. surin. t. 24. Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. t. 60. f. 2.*
- armeniaca. 2. A. capsulis trivalvibus.
- pyrenaica. 3. A. capsulis quadrivalvibus, caule nudo.

650. CAMBOGIA. Cor. 4petala. Cal. 4phyllus. Pomum iloculare, 1-2spermum
Gutta. 1. CAMBOGIA. *Blackw. herb. t. 392.*

STALAGMITIS. Flores masculi reliquis intermisti. Cal. 4-6phyllus. Cor. 4-6petala. Receptac. carnosum, 4gonum. Bacca globosa, stilo et stigmate subquadrilobata coronata.

- cambo- 1. STALAGMITIS. *Murray comment. Goett. 1788.*
gioides.

FRANKLINA. Cor. 5petala. Cal. 5dentatus. Nux 5locularis: loculis polyspermis.
americana. 1. FRANKLINA. *Marshall. Stirp. amer. p. 86.*

*s, foliis
Regn.
d. herb.
pinnatis
ferratis,
u. cent.
phyl-
, ilo-
urin, t.
. Po-
num
nisti.
4 6-
sum,
posa,
trilo-
Nux
mis.
651.*

651. MUNTINGIA. *Cor. 5petala. Cal. 5partitus. Stigma pyramidatum 5fulcatum sessile. Bacca multilocularis, polysperma.*

Calabura. 1. MUNTINGIA. Jaeg. stirp. amer. piet. t. 158. Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. t. 59. f. 6.

MALLOCOCCA. *Cor. 5petala. Cal. 5phyllus, corolla triplo longior. Filamenta corolla duplo longiora. Stigma 4lobum. Drupa 4cocca, 4locularis. Nuclei solitarii, ovati.*

crenata. 1. MALLOCOCCA. Forster nov. act. Upf. 3. p. 179.

652. SARRACENIA. *Cor. 5petala. Cal. duplex, 3phyllus et 5phyllus. Caps. 5locularis, stilo stigmate clypeato.*

flava. 1. S. foliis strictis: valva colli contracta. Catesb. Car. 2. t. 69.

purpurea. 2. S. foliis gibbis. Catesb. Car. 2. t. 70.

rubra. 3. S. foliis erectis tubulatis: valva plana erecta. Walt. flor. Carol. p. 153.

minor. 4. S. foliis erectis tubulatis: valva concava nutante. Walt. flor. Carol. p. 153.

653. NYMPHAEA. *Cor. polypetala. Cal. 4-5phyllus. Stigma orbiculatum sessile. Bacca multilocularis, truncata, supera.*

Noucheli. 9. N. foliis ovalibus subpetiolatis integerrimis. Burm. ind.

lutea. 1. N. foliis cordatis integerrimis, calice pentaphyllo majore. Flor. dan. t. 603. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 19. f. 1.

- alba. 2. N. foliis cordatis integerrimis, calice quadrifido. *Flor. dan. t. 602. Gaertn. de fr. et sem. cent. I. t. 19. f. 1. β) Gmel. fl. sib. 4. t. 71.*
- Lotus. 3. N. foliis cordatis dentatis. *Rheed. b. malab. II. t. 26.*
- Nelumbo. 4. N. foliis peltatis undique integris, corolla polypetala. *Rheed. b. malab. II. t. 30. 31. Gaertn. de fr. et sem. cent. I. t. 19. f. 2.*
- pentape- 5. N. foliis peltatis undique integris, corolla pentapetala. *Walt. -tala. flor. carol. p. 155.*
- reniformis. 6. N. foliis reniformibus. *Walt. flor. carol. p. 155.*
- Sagittifo- 7. N. foliis cordato-sagittatis undulatis. *Walt. flor. carol. lia. p. 155.*
- advena. 8. N. foliis cordatis integerrimis: lobis divaricatis, calice hexaphyllo petalis longiore. *Ait. hort. Kew. 2. p. 226.*

654. BIXA. Cor. 2plex, utraque 5petala. Cal. 5dentatus. *Caps. hispida, 2valvis, ilocularis. Sem. baccata.*

Orellana. 1. BIXA. *Sonner. it. nov. guin. p. 29. t. 13. Regn. bot. t. 413. Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. t. 61. f. 3.*

AUBLETIA. Cor. 5petala. Cal. 5partitus. *Caps. echinata, multilocularis: loculis polyspermis.*

- Tiburbu. 1. Au. foliis acute serratis hirsutis. *Aubl. pl. gr. p. 538. t. 213.*
- Patumo. 2. Au. foliis ellipticis acute serratis subtus incanis. *Aubl. pl. gr. p. 543. t. 215.*
- aspera. 3. Au. foliis integerrimis subtus pubescentibus, fructu compresso. *Aubl. pl. gr. p. 545. t. 216.*
- Iaevia. 4. Au. foliis integerrimis utrinque glabris, fructu aspero depresso. *Aubl. pl. gr. p. 541. t. 214.*

*Flor.
1. β)*
*6.
Rheed.
int. I.
Walt.
carol.
hexa-
5.
den-
ocu-
.413.
Capf.
culis
.213.
il. pl.
com-
pref-*
655. SLOANEA. *Cor. o. Cal. 5partitus, deciduus.*
Antherae filamento infra apicem adnatae. Stigma perforatum 5fidum. Caps. corticosa, echinata, 3-6locularis, 3-6-valvis: Semin. bina: arillo baccato.

- dentata.* 1. *Sl. foliis ovatis acutis denticulatis, stipulis cordato-triangularibus. Plum. ic. 244.*
- emarginata.* 2. *Sl. foliis oblongis integerrimis emarginatis. Catesb. Car. ta. 2. t. 87.*
- Mussioni.* 3. *Sl. foliis cordato-ellipticis, stipulis linearibus, calicibus quinquepartitis setaceis, capsulis longissimis. Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 82.*
- Sinemari-* 4. *Sl. foliis subrotundo-ovatis integris, capsulis ovatis setosis ensis. apice dehiscentibus. Aubl. pl. guj. p. 354. t. 212.*

1239. TREWIA. *Cor. o. Cal. 3phyllus, superus.*
Caps. 3cocca.

nudiflora. 1. *TREWIA. Rheed. b. malab. I. t. 42.*

TIGAREA. *Flores dioici. Petala 4-5concava. Cal. 4-5partitus.*

♀. Caps. subrotunda, 2valvis, 1locularis, 1isperma.

aspera. 1. *T. foliis subrotundis undulatis utrinque asperis. Aubl. pl. guj. 2. p. 918. t. 350.*

dentata. 2. *T. foliis ovatis acutis dentatis supra glabris subtus tomentosis. Aubl. pl. guj. 2. p. 920. t. 351.*

656. MAMMEA. *Cor. 4petala. Cal. 2phyllus. Bacc. maxima, 4isperma.*

americana. 1. *MAMMEA. Jacq. stirp. amer. piet. t. 248.*

659. GRIAS. *Cor. 4petala. Cal. 4fidus. Stigma sessile, cruciatum. Drupa nucleo octofulcato.*

cauliflora. 1. GRIAS. Sloan hist. jam. 2. t. 217. f. 1. 2.

658. CALOPHYLLUM. *Cor. 4petala. Cal. 4phylloides, coloratus, Drupa baccata globosa, 1isperma: putamine intus fungoso.*

Inophyl. 1. C. foliis ovalibus. Pluckn. alm. t. 147. f. 3. Gaertn. de lum. fr. et sem. cent. 3. t. 43. f. 1.

Calaba. 2. C. foliis ovatis obtusis. Jacq. Stirp. amer. piæt. t. 249.

Akara. 3. C. foliis ovatis acuminatis; floribus terminalibus paniculatis. Rheed. hort. malab. 5. t. 8.

Soulatti. 4. C. foliis oblongo-ovatis lineatis glaberrimis, floribus lateralibus pedicellatis. Burm. ind.

1400. SPARRMANNIA. *Cor. 4petala, reflexa. Nectaria plura, torulosa. Cal. 4phyllus. Caps. angularis, echinata, 5locularis.*

africana. 1. SPARRMANNIA. Suppl. p. 265. Retz. obs. bot. 5. t. 3.

1401. VALLEA. *Petala 4-5 3fida. Cal. 4-5phylloides. Stigma 4-5fidum. Caps. 2locularis, 4-5angularis, polysperma.*

stipularis. 1. VALLEA. Suppl. p. 266. Mutis amer. 7. t. 10.

BONNETIA. *Cor. 5petala, inaequalis, calice 5partito inaequali longior. Stigm. 3lobum. Caps. 3valvis, 3locularis, polysperma.*

palustris. 1. BONNETIA. Aubl. pl. guj. I. p. 558. t. 222.

ORY-

ORYGIA. *Cor. 5petala, infera. Cal. 2phyllus. Caps. 3valvis, 1locularis.*

portulaci- 1. *O. foliis alternis cuneatis glabris. Forsk. fl. aeg. arab.*
folia. *p. 103.*

decum- 2. *O. caule decumbente fruticoso, foliis ovatis acutis subfari-*
bens. Forsk. fl. aeg. arab. p. 103. Vix hujus generis, ob
corollam 5petalam, calicem 5phyllum, stilos 5, capsulam
5valvem 5locularem.

CHADARA. *Cor. 5petala. Cal. 5phyllus. Germen 2coccum. Stigma 4fido-laciniatum.*
Drupa coriacea.

arborea. 1. *Ch. foliis glabris subtus tomentosis. Forsk. fl. aeg. arab.*
p. 105.

velutina. 2. *Ch. foliis basi obliquis utrinque villosis. Forsk. fl. aeg. arab.*
p. 105.

660. TILIA. *Cor. 5petala. Cal. 5partitus. Antrum globosum, 5loculare, corticosum,*
5valve, basi dehiscens.

europaea. 1. *T. floribus nectario destitutis, baccis quadrilocularibus. Flor.*
dan. t. 553.

cordata. 2. *T. floribus nectario destitutis, baccis quinquelocularibus.*
Du Roi harbk. Baumz. 2. p. 466.

carolinia. 3. *T. floribus nectario institutis, foliis utrinque glabris. Du*
na. Roi harbk. Baumz. 2. p. 469.

americana. 4. *T. floribus nectario instructis.*

tomento- 5. *T. foliis subtus tomentosis argute ferratis. Moench Weif-*
sa, fensft. p. 136.

pubes- 6. *T. foliis basi truncatis obliquis denticulato-ferratis subtus*
cens. pubescentibus, floribus nectario institutis. Ait. hort.
Kew. 2. p. 229.

alba. 7. *T. foliis profunde cordatis subsinuatis dentatis subtus tomen-*
tosis. Ait. hort. Kew. 2. p. 230.

CLEYERA. *Cor. 5petala. Caps. 2locularis.*

japonica. 1. **CLEYERA.** *Tbunb. flor. jap. p. 224. Kaempf. amoen. exot. 5. p. 774. ic.*

661. LAETIA. *Cor. o aut 5petala. Cal. 5phyllus. Fructus ilocularis 3gonus. Semina arillo pulpozo.*

completa. 1. *L. floribus completis.* *Jacq. Stirp. amer. piſt. t. 261. f. 42.*

apetala. 2. *L. floribus apetalis, racemis laxis axillaribus, foliis ovatis subcrenatis.* *Jacq. Stirp. amer. piſt. t. 159.*

Guidonia. 3. *L. floribus apetalis, pedunculis unifloris terminalibus, foliis oblongis acuminatis ferratis pubescentibus.* *Brown. jam. p. 249. t. 29. f. 4?*

Thamnia. 4. *L. floribus apetalis, pedunculis multifloris subdivisis axillaribus, foliis oblongis acutis subcrenatis nitidis.* *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 83.*

MARILA. *Cal. 5phyllus. Cor. 5petala. Stigma simplex. Caps. 4locularis, polysperma. racemosa.* 1. **MARILA.** *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 84.***DUGORTIA.** *Cor. 5petala. Cal. 5partitus. Drupa nuce 2loculari: loculis 1spermis.*

nucamen- 1. **DUGORTIA.** *Scop. introd. g. 956. tosa.*

663. ELAEOCARPUS. *Cor. 3-5petala, lacera. Cal. 3-5partitus. Antherae apice 2valvi. Drupa ilocularis: putamine muriato subvalvato.*

ferrata. 1. *E. foliis alternis oblongis serratis, racemis axillaribus.* *Mant. p. 401. Suppl. p. 266. Rheed. b. malab. 4. t. 24.*

Dicera. 2. *E. foliis oppositis ovatis duplicato-ferratis, racemis lateribus oppositis, floribus tetragynis.* *Suppl. p. 266. Forst. char. gen. t. 40. n. 2.*

3. E.

- copallife- 3. E. foliis ovatis integerrimis. *Koenig apud Retz. obf. bot. 4.*
ra. p. 27.
oblonga. 4. E. drupa subcylindrica glabra. *Gaertn. de fr. et sem. cent.*
3. t. 43. f. 3.

LEGNOTIS. *Petala 5 lacera, receptaculo inferta.*
Cal. 5fidus. Caps. 3locularis.

elliptica. 1. L. foliis ellipticis, floribus pedicellatis. *Swarts nov. pl. gen.*
et sp. p. 84.

Cassipu- 2. L. foliis ovatis, floribus sessilibus. *Aubl. pl. guj. p. 529.*
rea. t. 211.

MYRODENDRUM. *Cor. 5petala, patens, calice 5-*
dentato major. Stigm. capi-
tatum, globum. Peric. 5lo-
culare: loculis ispermis.

balsamife. 1. **MYRODENDRUM.** *Aubl. pl. guj. 1. p. 564. t. 225.*

LEMNISCIA. *Cor. 5petala, recurva. Cal. 5dentatus.*
Nectar. cyathiforme, germen
cingens. Peric. 5loculare: locu-
lis ispermis.

gujanensis. 1. **LEMNISCIA.** *Aubl. pl. guj. 1. p. 572. t. 228.*

ASCIUM. *Cor. 5petala, calice major, receptaculo*
inferta. Cal. 5phyllus. Stigma capi-
tatum. Bacca? Ilocularis, polysperma.

gujanense. 1. **ASCIUM.** *Aubl. pl. guj. 1. p. 554. t. 220.*

1026. GREWIA. *Petala 5: basi squama nectarifera.*
Cal. 5phyllus. Drupae congre-
gatae iloculares.

occidenta- 1. Gr. foliis subovatis, floribus solitariis. *Seb. mus. 1. t. 26.*
lis. f. 3.

- Microcos.* 2. Gr. foliis ovato-oblongis, floribus paniculatis. *Sp. pl. p. 733.*
Microcos paniculata. *Burm. zeyl. t. 74.* *Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. t. 57. f. 4.*
- salvifolia.* 3. Gr. foliis oblongis integerrimis, floribus axillaribus pluribus pedicellatis: petalis recurvis linearibus. *Suppl. p. 409.*
- orientalis.* 4. Gr. foliis sub lanceolatis, floribus solitariis. *Rheed. b. malab. 5. t. 46.*
- asiatica.* 5. Gr. foliis cordatis. *Mant. p. 122.* *Sp. pl. p. 734.* *Microcos lateriflora.*

1154. CLUSIA. *Flores mere masculi reliquis intersiti. Cal. 4-6phyllus: foliolis oppositis imbricatis. Cor. 4-6petala. Nectarium ex antheris coalitis germen includens. Caps. 5locularis, 5valvis, pulpa farcta.*

- rosea.* 1. *Cl. foliis aveniis, corollis hexapetalis.* *Catesb. Car. 2. t. 99.*
- alba.* 2. *Cl. foliis aveniis, corollis pentapetalis.* *Jacq. Stirp. amer. pict. t. 250.*
- flava.* 3. *Cl. foliis aveniis, corollis tetrapetalis.* *Jacq. Stirp. amer. pict. t. 251.*
- venosa.* 4. *Cl. foliis venosis.* *Plum. ic. 87. f. 2.*

664. LECYTHIS. *Cor. 6petala. Cal. 6phyllus. Nectarium ligulatum, staminiferum. Pericarpium circumscissum, polyspermum.*

- Ollaria.* 1. *L. foliis sessilibus, cordato-ovatis subintegerrimis.*
- grandiflora.* 2. *L. foliis ovatis undulatis petiolatis, pedunculis crassis spicatis.* *Aubl. pl. guj. 2. p. 712. t. 283.*
- amara.* 3. *L. foliis ovato-lanceolatis integerrimis petiolatis, floribus spicatis.* *Aubl. pl. guj. 2. p. 716. t. 286.*
- parviflora.* 4. *L. foliis ovato-lanceolatis integerrimis petiolatis, paniculis spicatis terminalibus, fructibus bilocularibus.* *Aubl. pl. guj. 2. p. 717. t. 287.*

- p. 733.
de fr.
pluri-
p. 409.
b. ma-
Micro-
nter-
diolis
4-6-
heris
Caps.
recta.
.. t. 99.
amer.
amer.
Ne-
inife-
cum-
spica-
oribus
niculis
bl. pl.
5. L.*
- Idatimon. 5. *L. foliis ovato-lanceolatis acuminatis integerrimis petiolatis, floribus spicatis, fructibus quadrilocularibus. Aubl. pl. guj. 2. p. 721. t. 289.*
- Iutea. 6. *L. foliis lanceolatis integerrimis petiolatis. Aubl. pl. guj. 2. p. 721.*
- minor. 7. *L. foliis petiolatis lanceolatis ferratis. Jacq. stirp. amer. piæt. t. 160.*
- Zabucajo. 8. *L. foliis lanceolato-oblongis integerrimis petiolatis, racemis terminalibus, seminibus dulcibus. Aubl. pl. guj. 2. p. 719. t. 284. 285. 288.*

ACIDOTON. Flores diclini. Cor. o.

♂. *Cal. 5phyllus. Receptaculum globosum.*

♀. *Cal. 6phyllus. Stil. 3fidus. Caps. 3cocca.*

urens. I. ACIDOTON. *Sloane hist. jam. I. p. 125. t. 83. f. 1.*

672. DELIMA. Cor. o. Cal. 5phyllus. *Bacca 2sperma. farmentosa.* I. DELIMA. *Burm. ind. t. 35. f. 1.*

666. VATERIA. Cor. 5petala. Cal. 5fidus. Caps. 3valvis, ilocularis, 3sperma.

indica. I. VATERIA. *Rheed. h. malab. 4. t. 15.*

670. MENTZELIA. Cor. 5petala. Cal. 5phyllus. Caps. infera, cylindrica, polysperma, ilocularis, apice 3valvis.

aspera. I. MENTZELIA. *Plum. ic. 174. f. 1.*

1286. LOOSA. Cor. 5petala, cucullata, patentissima. Cal. 5phyllus. *Nectarium 5phyllum conicum. Caps. turbinata, polysperma, ilocularis, 3valvis: valvis semiovatis.*

hispida. I. LOOSA. *Jacq. obs. bot. 3. p. 15. t. 38.*

STERBECKIA. *Cor.* 3-5petala, crenata. *Cal.* 3-5phyllus. *Stigm.* capitatum, concavum. *Caps.* supera, cylindrica, ilocularis, polysperma.

gujanensis. I. STERBECKIA. *Aubl. pl. guj.* I. p. 574. t. 230.

CUEPIA. *Cor.* - - - *Cal.* 5partitus inaequalis: fauce tumida. *Germen* pedicellatum. *Dru-*
pa sicca, ovata corticata, isperma.

gujanensis. I. CUEPIA. *Aubl. pl. guj.* I. p. 519. t. 207.

MOQUILEA. *Cor.* 5petala. *Cal.* turbinatus, 5den-
tatus. *Antherae* 2loculares, ver-
satiles. *Stilus* lateralis, inferne
villosum, superne incurvus glaber.
Pericarp. - - -

gujanensis. I. MOQUILEA. *Aubl. pl. guj.* I. p. 521. t. 208.

WEBERA. *Cal.* turbinatus, 4-5dentatus, crispus.
Petala 8-9fimbriata ad unum latus
appendiculata. *Stigma* capitatum
13striatum. *Bacca* infera turbinata,
8-9locularis, polysperma.

quinque- I. WEBERA. *Aubl. pl. guj.* I. p. 525. t. 210. Blakea; utrum
nervia. *hujus, an prioris classis?*

TUNATEA. *Cal.* turbinatus, persistens, 4partitus.
Cor. - - - *Filamenta* universa
declinata. *Antherae* 2loculares.
Stil. incurvus. *Caps.* ovata, ilo-
cularis, 2valvis, isperma.

gujanensis. I. TUNATEA. *Aubl. pl. guj.* I. p. 550. t. 218.

SORA-

SORAMIA. *Cal.* 5partitus, coloratus. *Cor.* 5petala.
Germen orbiculatum. *Stil.* longus.
Stigm. capitatum. *Bacca* ovata, ilo-
cularis, isperma.

gujanensis. 1. SORAMIA. *Aubl. pl. guj.* I. p. 552. t. 219.

CARAIPA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* . . . *Antherae* 2lo-
culares. *Caps.* subtrigona, 3valvis,
3locularis: loculis ispermis.

parvifolia. 1. C. foliis ovatis acuminatis. *Aubl. pl. guj.* I. p. 561. t. 223. f. 1.
latifolia. 2. C. foliis ovatis cuspidatis. *Aubl. pl. guj.* I. p. 561. t. 223. f. 3.
longifolia. 3. C. foliis lanceolatis. *Aubl. pl. guj.* I. p. 561. t. 223. f. 2.
angustifo- 4. C. foliis linear-lanceolatis. *Aubl. pl. guj.* I. p. 561. t. 223.
lia. f. 4.

667. LAGERSTROEMIA. *Cor.* 6petala, crispa. *Cal.*
6fidus, campanulatus.
Stam. multa: horum
6 exteriora crassiora
petalis longiora.

indica. 1. LAGERSTROEMIA. *Mant.* p. 402. *Rumpf. amb.* 7. t. 28.

ADAMBEA. *Cor.* 5-7petala. *Cal.* hemisphaericus
5-7partitus. *Caps.* carnosā, calice
tecta, 5-7locularis, polysperma.

capsulifera. 1. ADAMBEA. *La Marck encycl.* I. p. 39.

668. THEA. *Cor.* 6-9petala. *Cal.* 5-6phyllus.
Caps. 3cocca, 3locularis.

Bohea. 1. Th. floribus hexapetalis. *Blackw. herb.* t. 352.

viridis. 2. Th. floribus enneapetalis. *Regn. bot.* t. 317.

EROTEUM. *Cor.* 5petala. *Cal.* 5phyllus. *Stilus* 3fidus. *Bacca* 3locularis, exsucca, polysperma.

theoides. 1. *E.* foliis ovato-lanceolatis serrato-dentatis, floribus axillaribus solitariis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 85.*
undula. 2. *E.* foliis elliptico-lanceolatis acuminatis ferratis, floribus tum. confertis axillaribus. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 85.*

669. CARYOPHYLLUS. *Cor.* 4petala. *Cal.* 4partitus superus. *Stamina* in 4 phalanges disposita. *Bacca* infera 1-2locularis, 1-2-sperma.

aromatica. 1. **CARYOPHYLLUS.** *Sonner. it. nov. Guin. p. 196. t. 119. an-*
cus. myrti species?

GREGGIA. *Cal.* 4partitus, superus. *Cor.* 4petala. *Bacca* matura 1locularis, 1sperma. *Sem.* reniforme, acocon.

aromatica. 1. **GREGGIA.** *Gaertn. de fr. et sem. cent. 3. t. 33. f. 3.*

673. CISTUS. *Cor.* 5petala. *Cal.* 5phyllus: foliolis 2 minoribus. *Capsula* 1-10locularis, 3-10valvis.

* *Exstipulati.*

+ *arborecentes.*

Ibanotis. 1. *C.* foliis linearibus revolutis, floribus umbellatis. *Barr. ic. 294.*

monspeliensis. 2. *C.* foliis linear-lanceolatis sessilibus utrinque villosis trineriensis. viis. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 76. f. 10.*

ladenise. 3. *C.* foliis lanceolatis supra laevibus: petiolis basi coalitis var. rugosus. β) *Commel. b. ampl. 1. t. 20.*

medius. 55. *C.* foliis cordato-lanceolatis rugoso-scorbiculatis denticulatis. *Allion. flor. pedem.*

- erifpus. 4. *C. foliis lanceolatis pubescentibus trinerviis undulatis.*
Blackw. herb. t. 197.
- albidus. 5. *C. foliis ovato-lanceolatis tomentosis incanis sessilibus sub-trinerviis.*
- capensis. 6. *C. foliis ovato-lanceolatis petiolatis trinerviis denticulatis utrinque nudis.*
- Iaxus. 52. *C. foliis ovato-lanceolatis undulatis denticulatis glabris:*
summis hirtis, calicis foliolis subrotundo-cordatis. *Ait. flor. Kew. 2. p. 233.*
- vaginatus. 53. *C. foliis oblongis pilosis subtus reticulato-rugosis: petiolis basi coalitis vaginantibus sulcatis.* *Ait. hort. Kew. 2. p. 232.*
- Iaurifo- 7. *C. foliis oblongo-ovatis petiolatis trinerviis supra glabris:*
lius. *petiolis basi connatis.*
- salvifoli- 8. *C. foliis oblongo-ovatis petiolatis oppositis subcrenulatis*
us. *utrinque hirtutis.* *Jacq. collect. 2. p. 120. t. 8.*
- villofus. 9. *C. foliis ovatis petiolatis hirtis.* *Du Hamel arbr. 1. t. 64.*
- creticus. 10. *C. foliis spatulato-ovatis petiolatis enervis scabris,* calici-
bus lanceolatis. *Buxb. cent. 3. t. 64. f. 1.*
- icanus. 11. *C. foliis spatulatis tomentosis rugosis: inferioribus basi con-*
natis vaginantibus.
- populifo- 12. *C. foliis cordatis laevibus acuminatis petiolatis.*
lius.
- halimifo- 13. *C. foliolis duobus calicinis linearibus.* *γ) Mill. ic. t. 290.*
lius.

† suffruticosi.
T procumbentes.

- Fumana. 14. *C. foliis alternis linearibus margine scabris, pedunculis unifloris.* *Jacq. fl. austr. 3. t. 252.*
- lacvipes. 15. *C. foliis alternis fasciculatis filiformibus glabris, peduncu-
lis racemosis.* *Jacq. b. Vind. 2. t. 158.*
- umbellatus. 16. *C. foliis oppositis, floribus umbellatis.*
- eanus. 17. *C. foliis oppositis obovatis villofus subtus tomentosis, flori-
bus subumbellatis.* *Mant. p. 403. Jacq. fl. austr. 3. t. 277.*
- marifoli- 18. *C. foliis oppositis oblongis petiolatis planis subtus incanis.*
us. *Barr. pl. rar. ic. t. 441.*
- roseus. 19. *C. foliis oppositis oblongis ad oras revolutis utrinque sub-
icanis.* *Jacq. b. Vind. 3. t. 65.*

- anglicus. 20. *C. foliis oppositis oblongis revolutis pilosis, floribus racemosis.* *Mant. p. 245.*
- oelandi- 21. *C. foliis oppositis oblongis utrinque glabris: petiolis ciliatis, petalis emarginatis.* *Jacq. fl. austr. 4. t. 399.*
- scabrosus. 54. *C. foliis oppositis ovatis piloso-scabris trinerviis, calicibus triphyllis.* *Ait. hort. Kew. 2. p. 236.*

†† *erecti.*

- italicus. 22. *C. foliis oppositis hispidis: inferioribus ovatis; superioribus lanceolatis, ramis patentibus.* *Barr. pl. rar. ic t. 366.*
- syriacus. 23. *C. foliis lanceolatis, floribus racemosis.* *Jacq. coll. I. p. 98. pl. rar. ic. cent. I. t. 54.*
- calicinus. 24. *C. foliis linearibus, pedunculis unifloris, calicibus triphyllis.* *Pluckn. alm. t. 83. f. 6.*

††† *herbacei.*

- guttatus. 25. *C. foliis oppositis lanceolatis trinerviis, racemis ebracteatis.* *Mant. p. 403. Col. ecphr. 2. p. 77. ic.*
- Tubera- 26. *C. perennis, foliis radicalibus ovatis trinerviis tomentosis: ria. caulinis glabris lanceolatis; summis alternis.* *Buxb. cent. 3. t. 63.*
- canadensis. 27. *C. foliis omnibus alternis lanceolatis, caule adscendente.*
- carolinia- 51. *C. villosus, foliis caulinis alternis lanceolato-ovatis: radicalibus rotundatis, caule erecto.* *Watt. flor. carol. p. 152.*

** *stipulati.*† *herbacei.*

- salicifoli- 28. *C. patulus villosus, floribus racemosis erectis: pedicellis us. horizontalibus.* *Seg. pl. veron. 3. t. 6. f. 3.*
- ledifolius. 29. *C. erectus glaber, floribus solitariis subsessilibus folio ternato oppositis.* *Lob. ic. 2. p. 118.*
- niloticus. 30. *C. erectus subtomentosus, floribus racemosis solitariis sessilibus oppositifoliis.* *Mant. p. 246.*
- aegyptia- 31. *C. erectus, foliis lineari-lanceolatis petiolatis, calicibus cus. inflatis corolla majoribus.* *Mant. p. 404. Jacq. obs. bot. 3. t. 68.*

†† *suffruticosi.*

- Lippii. 32. *C. erectus, foliis alternis oppositisque lanceolatis scabris, spicis secundis.* *Mant. p. 245.*

- pilosus. 33. *C. erectiusculus*, foliis linearibus subtus bisulcatis incanis, calicibus laevibus.
- squamatus. 34. *C. foliis obtectis squamis orbiculatis.* *Bocc. mus. 2. t. 64.*
- nummu- 35. *C. foliis inferioribus orbiculatis: superioribus ovatis.*
larius.
- serpylli- 36. *C. foliis oblongis, calicibus laevibus.*
- folius.
- glutino- 37. *C. foliis linearibus oppositis alternisque, pedunculis villosis*
fus. *glutinosis.* *Mant. p. 246. Barr. pl. rar. ic. t. 415.*
- racemo- 38. *C. foliis lanceolato-linearibus subtus tomentosis.* *Mant.*
fus. *p. 76. Barr. pl. rar. ic. 293.*
- arabicus. 39. *C. foliis alternis lanceolatis planis laevibus.*
- hirtus. 40. *C. foliis ovatis, calicibus hispidis.* *Barr. rar. pl. ic. t. 488.*
- apenninus. 41. *C. patulus, foliis lanceolatis hirtis.* *Menz. pag. 8. f. 3.*
- angustifo- 42. *C. diffusus, foliis lanceolatis, calicibus hirsutis.* *Jacq.*
lius. *b. Vindob. 3. t. 53.*
- foetidus. 43. *C. procumbens, foliis oblongis scabris, stipulis lanceolatis.*
Jacq. misc. 2. p. 341. pl. rar. ic. cent. I. t. 18.
- Helian- 44. *C. procumbens, stipulis lanceolatis, foliis oblongis revo-*
themum. *lutis subpilosis.* *Flor. dan. t. 101. Gaertn. de fr. et sem.*
cent. 5. t. 76. f. II. β) Cistus grandiflorus. Scop. flor.
carn. t. 25.
- mutabilis. 45. *C. procumbens, stipulis lanceolatis, foliis oblongis gla-*
bris planis. *Jacq. misc. 2. p. 340. pl. rar. ic. cent. I. t. 17.*
- polifoli- 46. *C. procumbens, foliis oblongo-ovatis incanis, calicibus*
us. *laevibus, petalis ferratis.* *Dill. b. Elth. t. 145. f. 172.*
- surraja- 47. *C. procumbens, foliis ovato-oblongis subpilosis, petalis*
nus. *lanceolatis.* *Dill. b. Elth. t. 145. f. 174.*
- canarien- 48. *C. procumbens, foliis subovatis alternis et oppositis, race-*
sis. *mis erectis.* *Jacq. misc. 2. p. 339. rar. pl. ic. cent. I. t. 16.*
- thymifo- 49. *C. procumbens, foliis ovali-linearibus oppositis brevissi-*
lius. *mis congestis.* *Barr. pl. rar. ic. 444.*
- ††† fruticosi.
- stipulatus. 50. *C. foliis confertis tomentosis ovalibus breviter petiolatis*
margine revolutis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 100.*

674. PROCKIA. *Cal. 3phyllus, praeter foliola 2 ba-*
feos. Cor. o. Bacca 5angu-
laris, polysperma.

Crucis. I. PROCKIA.

LIGHTFOOTIA. *Cal. 4phyllus. Cor. o. Stigma*
fessile. Bacca umbilicata,
ilocularis, 3-6sperma.

ferrata. 1. L. foliis ferratis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 83.*
 oxyco- 2. L. foliis integerrimis lanceolatis. *Herit. fert. angl. t. 4.*
 coides.
 subulata. 3. L. foliis integerrimis subulatis. *Herit. fert. angl. t. 5.*

HEDYOSMUM. *Flores monoici.*

♂. *Amentum antheris tectum. Cal. o.*
Cor. o.

♀. *Cal. 3dentatus. Stilus 3queter.*
Bacca 3gona, polysperma.

nutans. 1. H. caule fruticoso, ramis laxis, foliis lanceolatis acuminatis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 84.*

arboreo- 2. H. caule arborecente, ramis strictis erectis, foliis ovato-lanceolatis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 84.*

THOA. *Flores monoici. Cal. o. Cor. o.*

♀. *Germen ovatum. Stil. fere o. Stigm. 3-4.*
*Caps. ovata, ilocularis, setis intus far-
 ta, 1sperma.*

urens. I. THOA. *Aubl. pl. guj. 2. p. 874. t. 336.*

CONCEVEIBA. *Flores dioici. Cal. carnosus, 5den-
 tatus, inferne 3gonus. Cor. o.*

♀. *Germen 3gonum. Stigm. 3crassa,
 concava, incurva fulcata.*
*Caps. 3locularis: loculis 2val-
 vibus, 1spermis.*

gujanensis. I. CONCEVEIBA. *Aubl. pl. guj. 2. p. 923. t. 353.*

MAE.

MAERUA. *Cal. 4fidus. Cor. o. Nectarium multifestum. Receptaculum pedicellatum.*

arabica. I. MAERUA. Forsk. fl. aeg. arab. p. 104.

675. CORCHORUS. *Cor. 5petala. Cal. 5phyllus, deciduus. Caps. multivalvis, loculamentosa. Sem. angulata, plurima.*

olitorius. 1. *C. capsulis oblongis ventricosis, foliorum serraturis infimis setaceis. Mant. p. 565. Commel. b. amst. 1. t. 12. Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. t. 64. f. 2.*

hirtus. 2. *C. capsulis oblongis cauleque pilosis, foliis oblongis aequaliter ferratis. Jacq. b. Vind. 3. t. 58.*

aestuans. 3. *C. capsulis oblongis trilocularibus trivalvibus sexfulcatis sexculpidatis, foliis cordatis: ferraturis infimis setaceis. Mant. p. 565. Jacq. b. Vind. 1. t. 85.*

trilocula- 4. *C. capsulis trilocularibus trivalvibus triquetris: angulis bifidis scabris, foliis oblongis: ferraturis infimis setaceis. Mant. p. 77. 566. Jacq. b. Vind. 2. t. 173.*

tridens. 5. *C. capsulis linearibus teretiusculis scabris, foliorum ferraturis infimis setaceis. Mant. p. 566. Burm. ind. t. 37. f. 2.*

filiqusus. 6. *C. capsulis linearibus compressis bivalvibus, foliis lanceolatis aequaliter ferratis. Jacq. b. Vind. 3. t. 59.*

capsularis. 7. *C. capsulis subrotundis depressis rugosis, foliorum ferraturis infimis setaceis. Rumpf. amb. 5. t. 78. f. 1.*

hirsutus. 8. *C. capsulis subrotundis lanatis, foliis ovatis obtusis tomentosis aequaliter ferratis. Jacq. b. Vind. 3. t. 57.*

japonicus. 9. *C. capsulis rotundis glabris, foliis duplicato-ferratis. Thunb. flor. jap. p. 227.*

javanicus. 10. *C. capsulis subrotundis hispidis, foliis ovato-lanceolatis aequaliter ferratis: stipulis setaceis. Burm. ind. t. 36. f. 3.*

676. SEGUIERIA. *Cal. 5phyllus. Cor. o. Caps. isperma, ala magna terminata aliquaque lateralibus.*

americana. I. SEGUIERIA.

1075. PLATANUS. *Flores monoici. Amentum globosum.*

- ♂. *Cor. vix manifesta. Antherae filamentum circumnatae.*
- ♀. *Cor. polypetala. Stigma recurvum. Sem. subrotunda, stilo mucronata, basi paposa.*

orientalis. 1. *Pl. foliis palmatis.* *Du Hamel arbr.* 1. 2. t. 33.

occidentalis. 2. *Pl. foliis lobatis.* *Catesb. Car.* 1. t. 56.

PARIANA. *Flores monoici. Cal. Gluma 2valvis.*
Cor. 2valvis.

- ♂. *Cor. calice major.*

♀. *Cor. calice minor. Germ. 3gonum.*
Stigm. 2. *Sem. 1 corolla tectum, 3-gonum.*

campestris. 1. **PARIANA.** *Aubl. pl. guj.* 2. p. 876. t. 337.

1335. CHRYSITRIX. *Flores in alia planta mere masculi. Gluma 2valvis. Cor. ex paleis numerosis setaceis, intra quas singulas stamen.*

capensis. 1. **CHRYSITRIX.** *Mant.* p. 305.

ONCOBA. *Cor. polypetala. Cal. iphyllus, 4partitus. Bacca ilocularis, polysperma.*

spinosa. 1. **ONCOBA.** *Forsk. fl. aeg. arab.* p. 103.

DIGY-

DIGYNIA.

CRATAEGUS. *Cal. 5fidus. Petala 5. Antrum infernum, 1-vel polypyrenum, superne apertum, iloculare.*

- elliptica. 1. Cr. foliis ellipticis inaequaliter serratis glabris, petiolis calicibusque glandulosis, baccis globosis pentaspermis. *Ait. hort. kew. 2. p. 168.*
- leuco-phleos. 2. Cr. foliis ovatis inaequaliter serratis basin versus integerrimis, stilo semibifido. *Moench Weissensl. p. 31. t. 2.*
- laevis. 3. Cr. foliis ovatis acuminatis glabris serratis, florum umbella subsimplici. *Thunb. flor. jap. p. 204.*
- rotundi-folia. 4. Cr. foliis ovatis serratis glabris: petiolis eglandulosis, ramis spinosis. *Moench Weissensl. p. 29. t. 1.*
- glandulo-sa. 5. Cr. foliis ovatis incisis serratis glabris decurrentibus: petalorum alis rubello-glandulosis. *Moench Weissensl. p. 31.*
- edulis. 6. Cr. foliis ovatis incisis serratis glabris: nervis subtus rufescents; lateralibus albidis. *Moench Weissensl. p. 30.*
- Aria. 7. Cr. foliis ovatis incisis serratis subtus tomentosis. *Flor. dan. t. 302.*
- punctata. 8. Cr. foliis obovatis basi attenuatis serratis glabris, caule inerme. *Jacq. h. Vind. 1. t. 28.*
- tomento-vilfa. 9. Cr. foliis cuneiformi-ovatis serratis subangulatis subtus villosis, ramis spinosis. *Trew. Ehret. t. 17.*
- Crus Gal-li. 10. Cr. foliis lanceolato-ovatis serratis glabris, ramis spinosis. *Mill. hort. angl. 13. Drupa officulis pluribus.*
- uniflora. 11. Cr. foliis lanceolato-ovatis serratis subtus villosis, stipulis semicordatis, floribus solitariis: calicibus foliaceis, spinis longissimis. *du Roi barbk. Baumz. 1. p. 184. Moench Weissensl. t. 4. an potius messuli species?*
- viridis. 12. Cr. foliis lanceolato-ovatis subtrilobis serratis glabris, caule inerme; *an mera coccineae varietas?*
- alpina. 13. Cr. foliis oblongo-ovatis serratis utrinque virentibus. *du Roi barbk. Baumz. 1. p. 192.*
- glabra. 14. Cr. foliis oblongis acutis glabris ferratis, florum panicula composita. *Thunb. flor. jap. p. 205.*

- villosa. 15. Cr. foliis oblongis acuminatis glabris ferratis, florum umbella composita. *Thunb. flor. jap.* p. 204.
- maura. 16. Cr. foliis oblongis apice dentatis. *Suppl. p. 253.*
- indica. 17. Cr. foliis lanceolatis ferratis, caule inermi, corymbis squamosis.
- lucida. 18. Cr. foliis ovato-lanceolatis lucidis, stipulis linearibus ferratis, floribus corymbosis, ramis spinosis. *du Roi Barbk. Baumz.* 1. p. 186. *Mill. dict. ic. t. 178. f. 2.*
- triloba. 19. Cr. foliis cuneiformibus trilobis subdentatis villosis, calicibus pedunculisque subtomentosis. *Poir. voy. en Barb.* 2. p. 177.
- populi-folia. 20. Cr. foliis subcordatis trilobis utrinque laevibus: petiolis elongatis. *Walt. flor. carol.* p. 147.
- coccinea. 21. Cr. foliis cordatis repando-angulatis ferratis glabris. *Mant.* p. 397. *Mill. dict. ic. t. 179.*
- tormina-lis. 22. Cr. foliis cordatis septangulis: lobis infimis divaricatis. *Flor. dan.* t. 798. *Jacq. fl. austr.* 5. t. 443. *Antrum carnosum.*
- monogy-na. 23. Cr. foliis subtrifidis acutis, floribus monogynis. *Jacq. fl. austr.* 3. t. 292. f. 1. *Drupa superne aperta monopyrena.*
- Oxy-cantha. 24. Cr. foliis obtusis subtrifidis ferratis. *Flor. dan.* t. 634. *Jacq. fl. austr.* 3. t. 292. f. 1. *Drupailocularis, polypyrena, supera aperta.*
- Azarolus. 25. Cr. foliis obtusis subtrifidis subdentatis.

LUCUMA. *Cal. 4fidus, duplex, hemisphaericus, persistens. Cor. o. Drupa 1-2sperma.*

* *foliis oppositis.*

valpara-difera. 1. L. foliis petiolatis ovato-oblongis. *Molin. hist. nat. Chil.* p. 162.

** *foliis alternis.*

bifara. 2. L. foliis petiolatis ovato oblongis. *Molin. hist. nat. Chil.* p. 161.

turbinata. 3. L. foliis petiolatis lanceolatis. *Molin. hist. nat. Chil.* p. 161.

Keule. 4. L. foliis petiolatis ovalibus subserratis. *Molin. hist. nat. Chil.* p. 162.

spinosa. 5. L. foliis sessilibus, ramis spinosis. *Molin. hist. nat. Chil.*
p. 163.

TEMUS. *Cal. 3fidus. Cor. 18petala. Bacca 2coccoa.*
moschata. 1. TEMUS. Molin. hist. nat. Chil. p. 153.

II33. CLIFFORTIA. *Flores dioici. Cal. 3phyllus,*
superus. Cor. o.
♀. Capf. 2locularis. Sem. 1.

* *foliis simplicibus.*

odóra. 1. Cl. foliis ovoatis ferratis costatis subtus villosis. *Suppl. p. 431.*

ilicifolia. 2. Cl. foliis subcordatis dentatis. *Mant. p. 499. Mill. illustr. ic.*

ruficifolia. 3. Cl. foliis lanceolatis integerrimis. *Hort. Cliff. t. 31.*

ferraginea. 4. Cl. foliis lanceolatis setaceo-ferratis. *Suppl. p. 429.*

graminea. 5. Cl. foliis ensiformibus ferrulatis: petiolis dilatatis terminatis aristis binis stipuliformibus. *Suppl. p. 429.*

cuneata. 6. Cl. foliis cuneiformibus apice ferratis. *Ait. hort. Kew. 3.*
p. 413.

polygoni. 7. Cl. foliis linearibus pilosis. *Hort. Cliff. t. 32.*
folia.

filifolia. 8. Cl. foliis filiformibus triquetris glabris integerrimis. *Suppl.*
p. 430.

teretifo- 9. Cl. foliis fasciculatis teretibus subulatis incurvis glabris in-
lia. tegris. *Suppl. p. 430.*

ericaefo- 10. Cl. foliis fasciculatis teretibus sulcatis glabris. *Suppl. p. 430.*
lia.

** *foliis binatis.*

crenata. 11. Cl. foliis orbiculatis crenulatis. *Suppl. p. 430.*

pulchella. 12. Cl. foliis orbiculatis integerrimis. *Suppl. p. 430.*

*** *foliis ternatis.*

trifoliata. 13. Cl. folio intermedio tridentato. *Pluckn. alm. t. 319. f. 4.*

farmen- 14. Cl. foliis linearibus villosis. *Mant. p. 299.*
tota.

strobilife- 15. Cl. foliis linearibus acutis laevibus. *Pluckn. alm. t. 275.*
ra. f. 2.

16. Cl.

- falcata. 16. Cl. foliis linearibus falcatis glabris. *Suppl. p. 431.*
 juniperina. 17. Cl. foliis triquetris subulatis confertis. *Suppl. p. 430.*
 ternata. 18. Cl. foliolis integris pilosis. *Suppl. p. 430.*
 obcordata. 19. Cl. foliolis subrotundis: intermedio obcordato. *Suppl. p. 429.*

1076. LIQUIDAMBAR. *Flores monoici. Cal. communis 4phyllus. Cor. o.*
♀. Caps. multae, 2valves, polyspermae in globum.

- Styraci- 1. L. foliis palmato-lobatis: sinubus baseos venarum villosis.
 flua. *Catesb. Car. 2. t. 65.*
 imberbe. 2. L. foliis palmato-lobatis: sinubus baseos venarum laevibus.
Ait. hort. Kew. 3. p. 365.
 peregrin- 3. L. foliis oblongis alternatim sinuatis. *Pluckn. alm. t. 100.*
 num. *f. 6. 7.*

1069. PTERIUM. *Flores monoici. Cal. 4phyl-*
lus. Cor. 4partita.
♂. Stamina 30-40.
♀. Drupa exsucea infera, 1-2-
locularis e tubo corollae
indurato.

- Sanguisor- 1. P. inerme, caulis subangulosus. *Blackw. herb. t. 413.*
 ba. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 32. f. 3.*
 hybri- 2. P. inerme, caulis teretibus striatis. *Sabb. h. rom. 2. t.*
 dum. *72. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 32. f. 3.*
 cauda- 3. P. inerme frutescens, ramis teretibus villosis, spicis clon-
 tum. *Ait. hort. Kew. 3. p. 354.*
 spinosum. 4. P. spinis ramosis. *Sabb. h. rom. 2. t. 73. Gaertn. de fr. et*
sem. cent. 2. t. 32. f. 3.

678

offici

hum

integ

anon

tenui

679

amer

134

alnifo

680

polys

noide

678. PAEONIA. Cal. 5phyllus. Petala 5 aut plura.
Stil. o. Caps. polyspermae
leguminosae, subquinae. Sem.
subglobosa.

officinalis. 1. P. foliis decompositis nudis: foliolis lobatis; lobis lato-lan-

ceolatis, capsulis rectiusculis tomentosis. Blackw. herb.

t. 245.

humilis. 2. P. foliis bibernatis subtus subvilloso: foliolis tripartito-laci-

natis, capsulis erectiusculis pilosis. Knorr del. hort. I.

t. R. 2. K. 3.

integra. 3. P. foliis bibernatis: foliolis integris ovatis, corolla regulari-

tegerrima. Murray comm. Goett. 1784. et 1785. p. 92.

Mill. illustr. ic.

anomala. 4. P. foliis ternatis, calice folioso, capsulis glabris depresso-

Murray comm. Gaett. 1784. et 1785. p. 90. t. 5.

tenuifolia. 5. P. foliolis linearibus multipartitis. Linn. dec. 9. t. 5. Gacrtin.

de fr. et sem. cent. 4. t. 65. f. 1.

679. CURATELLA. Cal. 5phyllus. Petala 4. Caps.

2partita: loculis 2spermis.

americana. 1. CURATELLA. Aubl. pl. guj. I. p. 579. t. 232.

1346. FOTHERGILLA. Cal. truncatus, integerri-

mus. Cor. o. Germen.

2fidum. Caps. 2locu-

laris. Sem. solitaria,

ossea.

alnifolia. 1. FOTHERGILLA. Suppl. p. 267. Jacq. Coll. I. p. 97. pl. rar.

ic. cent. I. t. 87.

680. CALLIGONUM. Cal. 5phyllus. Cor. o. Stil.

o. Fructus hispidus, 1-

spermus.

polygo- 1. CALLIGONUM. Mant. p. 404. Pallas it. 2. p. 738. t. S. R.

noides. Pterococcus aphyllus.

TRICHOCARPUS. *Cal. 4-5partitus. Cor. o. Stili apice 2fidi. Caps. ovato-tragona, setis deciduis hispida, 4valvis, ilocularis, polysperma.*

gujanensis. I. TRICHOCARPUS. *Aubl. pl. guj. I. p. 585. t. 234.*

LACIS. *Cal. o. Cor. o. Filamenta inferne utrinque alata. Receptac. spinis 12 cinctum. Caps. ovata, 8striata, ilocularis, 2valvis, polysperma.*

fluvialis. I. LACIS. *Aubl. pl. guj. I. p. 582. t. 233.*

TRIGYNIA.

623. SORBUS. *Cal. 5fidus. Petala 5. Pomum 5locula-re, superne apertum, 3spermum.*

aucuparia. I. S. foliis pinnatis utrinque glabris. *Mill. illistr. ic.*

domestica. 2. S. foliis pinnatis subtus villosis. *Jacq. fl. aust. 5. t. 447.*

hybrida. 3. S. foliis semipinnatis subtus tomentosis. *Flor. dan. t. 311.*

624. SESUVIUM. *Cal. 5partitus, coloratus. Cor. o. Caps. ovata, 3locularis, circumscissa, polysperma.*

Portula- I. SESUVIUM. *Jacq. stirp. amer. piët. t. 142.*
castrum.

CONAMI. *Flores dioici. Cal. 6partitus. Cor. o. ♀. Germ. ovatum, 6striatum. Stili semifissi. Stigm. villosa. Caps. 6locularis.*

brasiliense. I. CONAMI. *Aubl. pl. guj. 2. p. 926. t. 354.*

EURYANDRA. *Cal. 5phyllus. Cor. 3petala. Antherae 2dymae. Folliculi 3ovati, divaricati.*

scandens. 1. **EURYANDRA.** *Forst. char. gen. p. 41. t. 41.*

1156. BEGONIA. *Flores monoici.*

♂. *Cal. o. Cor. 4petala. Stamina (circiter) 25.*

♀. *Cal. 2phyllus inferus. Cor. 5petala. Stigm. 2partita, spiraliter torta. Caps. inaequalis, 3angularis, 3alata, 3locularis, polysperma, infera.*

ferrugi- 1. *B. caule fruticoso declinato, foliis integerrimis, floribus nea. paniculatis. Suppl. p. 419. Mutis amer. 1. t. 18.*

obliqua. 2. *B. caule fruticoso suberecto, foliis oblique cordatis carnosis glaberrimis, stipulis tripteris. Herit. stirp. nov. 4. p. 95. t. 46.*

grandifo- 3. *B. caule fruticoso erecto, foliis serratis glabris: floribus pa- lia. paniculatis. Plum. ic. 45. f. 1.*

minor. 4. *B. caule fruticoso erecto, foliis dentatis glabris, floribus pa- niculatis. Jacq. collect. 1. p. 128.*

dichoto- 5. *B. caule fruticoso erectiusculo, foliis dentatis glabris, pedun- ma. culis terminalibus superne dichotomis. Jacq. coll. 3. p. 250.*

acutifolia. 6. *B. caule fruticoso reptante, foliis acuminatis inaequaliter ser- ratis glabris, floribus paniculatis. Plum. ic. 45. f. 3.*

glabra. 7. *B. caule fruticoso radicante, foliis serratis glabris, floribus paniculatis dichotomis. Aubl. pl. guj. 2. p. 916. t. 349.*

malabari- 8. *B. caule erecto, foliis obsolete dentatis subtus hirsutis, pe- ca. dunculis subtrifloris. Rheed. h. malab. 9. p. 167. t. 68.*

humilis. 9. *B. caule erecto, foliis hispidis semicordatis acuminatis dupli- cato-serratis, capsulae alis rotundatis parum inaequalibus. Ait. hort. Kew. 3. p. 353.*

urticae. 10. *B. herbacea diffusa, foliis biserratis hispidis, pedunculis axillaribus elongatis unifloris, fructu hispido. Suppl. p. 420.*

- hirsuta. 11. B. herbacea, foliis cauleque hirsutis, paniculis dichotomis.
Aubl. pl. guj. 2. p. 913. t. 348.
- Erminea. 12. B. herbacea, foliis subaequalibus cordatis acuminatis ciliato-dentatis supra caudato appendiculatis. *Herit. stirp. nov. 4. p. 97. t. 47.*
- nana. 13. B. acaulis, foliis aequalibus lanceolatis; scapo subtrifloro.
Herit. stirp. nov. 4. p. 99. t. 48.
- octopeta. 14. B. acaulis, foliis cordatis quinquelobis inaequaliter dentatae,
la. floribus masculis octopetalis. Herit. stirp. nov. 4. p. 101.
- capensis. 15. B. acaulis, foliis inaequaliter denticulatis, corollis tetrapetalis.
Mant. p. 502. Suppl. p. 420. Rumpf. amb. 5. t. 169. f. 2. Gaertn. de fr. et sem. cent. 2. t. 31. f. 5.

HOMALIUM. *Cal. 6-7fidus. Cor. 6-7petala. Stamina 18-28 terna vel quaterna. Capsula ilocularis, ovata, lignosa, polysperma.*

- racemo- 1. H. foliis ferratis, racemis axillaribus terminalibusque: floribus pedunculatis. *Jacq. stirp. amer. p. 170. t. 183. f. 72.*
- Rocou- 2. H. foliis dentatis coriaceis, racemis terminalibus, floribus sub-
bea. sessilibus. Aubl. pl. guj. p. 590. t. 236.

TATTIA. *Cal. 6fidus. Cor. 6petala villosa. Stigm. obtusa. Pericarp. - - -*

ignota. 1. **TATTIA.** *Scopol. introd. g. 262.*

MARSHALLIA. *Cal. 7dentatus. Gland. 7 intra coroll. Caps. lignosa, ilocularis, polysperma.*

Lagunae. 1. **MARSHALLIA.** *Scop. introd. gen. 949.*

681. DELPHINIUM. *Cal. o. Petala 5-6. Nectarium 2fidum, posterius cornutum. Caps. leguminosae, subternae, polyspermae.*

* *Siliqua una.*

Consolida. 1. *D. nectariis monophyllis, caule subdiviso.* *Flor. dan. t. 683.*

Ajacis. 2. *D. nectariis monophyllis, caule simplici.* *Regn. bot. t. 147. f. 2.*

aconiti. 3. *D. nectariis monophyllis anterius quadridentatis, ramulis unifloris.* *Mant. p. 77.*

** *Siliquae tribus.*

ambi- 4. *D. nectariis monophyllis, corollis hexapetalis, foliis mul-
guum. tipartitis.*

peregri- 5. *D. nectariis diphyllis, corollis enneapetalis, foliis multipar-
num. titis obtusis.* *Mor. bis. pl. 3. t. 4. f. 3.*

grandiflo- 6. *D. nectariis diphyllis: labellis integris, floribus subsolita-
rum. foliis compositis linearis-multipartitis.* *Mill. ic. t. 250. f. 1.*

elatum. 7. *D. nectariis diphyllis: labellis emarginatis apice barbatis,
foliis subpeltatis tripartitis caule erecto.*

interme- 8. *D. nectariis diphyllis: labellis ovatis bifidis, foliis triparti-
dium. tis: laciniis trifidis incisis.* *Mill. ic. t. 119.*

exalta- 9. *D. nectariis diphyllis: labellis oblongis bifidis: laciniis ae-
tum. qualibus, foliis tripartitis glabris.* *Mill. ic. t. 250. f. 2.*

punice- 10. *D. nectariis diphyllis: labellis bipartitis pilosis, cornu re-
um. eto, foliis multipartitis, bracteis ealycinis nullis.* *Suppl.
p. 267. Pall. it. 3. p. 96. 736.*

carolinia- 11. *D. nectario diphylo: labellis integris, petalis duobus bi-
anum. fidis barbatis.* *Walt. flor. carol. p. 155.*

Staphis- 12. *D. nectariis tetraphyllis petalo brevioribus, foliis palma-
agria. tis: lobis obtusis.* *Blackw. herb. t. 265.*

hybri- 13. *D. nectario tetraphyllo: labellis superioribus integris; in-
dum. ferioribus bifidis apice barbatis, foliis palmatis; lobis acu-
tis.* *Gouan. illusfr.*

urceola- 14. *D. nectariis diphyllis: labellis bifidis apice barbatis, foliis
tum. palmatis profunde quinquepartitis, caule erecto.* *Jacq.
coll. 1. p. 153.*

682. ACONITUM. *Cal. o. Petala 5:* supremo fornicate. *Nectaria 2 pedunculata, recurva. Caps. leguminosae 3 vel 5. Sem. arido-baccata.*

- volubile. 1. *A. eaule volubili. Pallas hort. Demidos.*
- septen- 2. *A. foliis villosis palmatis multifidis: laciniis longis acutis,*
trionale. *nectariis obliquis. Koelle de aconito. n. 9. Flore caeruleo.*
- lycoeto- 3. *A. foliis villosis palmatis multifidis: laciniis brevibus obtusiusculis, nectariis rectiusculis. Jacq. fl. austr. 4. t. 380.*
Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. t. 65. f. 4. β?) Aconitum carpathicum. Hacq. carp. sept. 1. p. 169. t. 7.
- japoni- 4. *A. foliis trifido-palmatis: laciniis incisis obtusis. Thunb.*
cum. *flor. jap. p. 231.*
- pyrenai- 5. *A. foliis multipartitis: laciniis linearibus incumbentibus*
cum. *squareos.*
- Anthora. 6. *A. foliis hirsutis multipartitis: laciniis linearibus distinctis*
aequalibus. *Jacq. fl. austr. 4. t. 382.*
- Napellus. 7. *A. foliis petiolatis digitato-quinquepartitis: segmentis li-*
neari-lanceolatis laciniatis; laciniis remote inciso-dentatis,
dentibus lanceolatis. *Koelle de aconit. ic.*
- tauri- 8. *A. foliis petiolatis digitato-quinquepartitis: segmentis ob-*
cum. *longis latifcentibus; trifido-laciniatis: laciniis remote inciso-dentatis,*
dentibus lanceolatis. Koelle de acon. n. 2.
Wulf. apud Jacq. coll. 2. p. 112. an vere distincta a na-
pello species?
- neomon- 9. *A. foliis subpalmato-quinquepartitis petiolatis: segmentis*
tanum. *latefcentibus profunde inciso-laciniatis; laciniis lato-lan-*
ceolatis dentatis, dentibus brevibus latiusculis aequatis. *Koelle*
de aconito. n. 3. Jacq. fl. austr. 4. t. 381. an vere distin-
ctum a napello?
- cernuum. 10. *A. foliis petiolatis subtus pallidis digitato-quinquepartitis:*
segmentis divaricatis semipartitis; laciniis inciso-dentatis,
dentibus linear-lanceolatis. *Koelle de acon. n. 4.*
- variega- 11. *A. foliis multipartitis: laciniis semipartitis superne latio-*
tum. *ribus.*
- Cammina- 12. *A. foliis multipartitis: laciniis cuneiformibus incisis acutis,*
ruum. *Jacq. flor. austr. 5. t. 424.*

- uncinatum. 13. A. foliis multilobis, corollarum galea longius extensa.
- album. 14. A. foliis glabris tripartitis acute incisis, floribus pentagynis: petali supremi ungue lateralibus longiore. *Ait. hort. Kew. 2. p. 246.*

T E T R A G Y N I A.

683. TETRACERA. *Cal. 4fidus: laciniis rotundatis subinaequalibus. Cor. o. Caps. 4 iloculares, 1-spermae. Sem. arillata.*

volubilis. 1. **TETRACERA.** *Pluckn. phyt. 146. f. 1. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 69. f. 3.*

LUDIA. *Cal. 5-7lobus inferus. Stilus apice 3-4fidus. Stigm. 3-4 2dyma. Bacca sicca, globosa, ilocularis, polysperma.*

mauritiæ. 1. **LUDIA.** *Jussieu gen. plant. p. 343.*

1314. CARYOCAR. *Cal. 5partitus. Petala 5. Dru-
pa nucleis 4 sulcis reticulatis.*

nuciferum. 1. **CARYOCAR.** *Mant. p. 247.*

1282. CIMICIFUGA. *Cal. 4phyllus. Cor. nectariis
4 urceolatis. Caps. 4. Se-
min. squamosa.*

foetida. 1. **CIMICIFUGA.** *Amoen. acad. 7. t. 6. f. 2.*

ASSA. *Cal. 4phyllus. Cor. o. Caps. 4 2valves.*

exotica. 1. **ASSA.** *Houttuyn syst. veget. 4. p. 39.*

UBIUM. *Cal. 4phyllus. Cor. 4petala. Caps. com-
pressæ, polyspermae.*

quadrifaria. 1. **UBIUM.** *la Mark encycl. 1. p. 610.*

RHIZOBOLUS. *Cal.* semiquinquefidus. *Petala* 5.
Germen 4gonum. *Drupae* 4
 reniformes, iloculares: *Nuces*
soltariae reniformes; *nuclei* so-
litarii reniformes.

butyro- 1. Rh. foliis digitatis utrinque glabris. *Aubl. pl. guj.* I. p. 594.
 fus. t. 238.

tuberu- 2. Rh. foliis digitatis subtus tomentosif. *Aubl. pl. guj.* I. p.
 lotus. 597. t. 239.

PERA. *Flores* dioici. *Cal.* 2phyllus, deciduus. *Pe-*
tal. 1. semigloboso-concavum, dependens.
Nectar. ex membranulis multifidis, sub-
 plicatis, erectis.

♂. *Filamenta* 24-30 dupli serie transversim.
 digesta.

♀. *Stigm.* singulis pistillis 3. *Caps.* subtri-
 gona, 3locularis, 3valvis: valvis 2fidis. *Sem.*
 solitaria.

arborea. 1. **PERA.** *Mutis nov. ael. Stockh.* 1784. p. 299. t. 8.

PENTAGYNIA.

625. MESPILUS. *Cal.* 5fidus. *Petala* 5. *Antrum* 1-
 2-5loculare.

* *spinosa.*

Pyracan- 1. M. foliis lanceolato-ovatis crenatis, calicibus fructus obtu-
 tha. *Pallas flor. ross.* t. 13. *Drupa* 1locularis polypyrena,
 superne aperta.

Iaciniata. 2. M. foliis obovatis ferratis subtus tomentosis, floribus solita-
 riis: calicibus laciniatis. *Walt. flor. carol.* p. 148.

hyemalis. 3. M. foliis subovatis angulatis ferratis laevibus petiolatis, flo-
 ribus corymbosis. *Walt. flor. carol.* p. 148.

aestivalis. 4. M. foliis angulatis ferratis, floribus corymbosis. *Walt.*
flor. carol. p. 148.

5. M.

Xantho- 5. M. foliis subcuneiformibus crenatis, floribus solitariis: la-
carpus. ciniis calicinis subfoliaceis inciso-serratis longis reflexis,
fructibus subturbinatis punctato verrucosis. *Suppl. p. 254.*
an vere distincta a Crataego tomentosa?

Pheno- 6. M. foliis cordatis tri-ad septemfidis serratis glabris, flori-
pyrum. bus corymbosis: segmentis calicinis deciduis, fructibus
depresso-globosis. *Suppl. p. 254.*

** *inermes.*

germani- 7. M. foliis lanceolatis dentatis subtus tomentosis, floribus so-
ca. litariis sessilibus. *Blackw. herb. t. 154.* β) *du Hamel*
arbr. fr. 1. t. 3. Drupa polypyrena superne aperta.

arbutifo- 8. M. foliis lanceolatis crenatis subtus tomentosis, floribus fas-
lia. ciculatis. *Mill. dict. t. 109.* *an potius cum sequente pyro*
associanda? Antrum supra apertum duplicatum 5loculare,
pericarpis offeis intus nidulantibus.

Amalan- 9. M. foliis ovalibus ferratis subtus hirsutis. *Jacq. fl. aust.*
chior. *3. t. 300. Antrum 10loculare carnosum.*

Chamae- 10. M. foliis ovalibus acute ferratis glabris, floribus corymbo-
mespilus. fo-capitatis. *Mant. p. 398.* *Jacq. fl. aust. 3. t. 231.*
Pomum 2loculare clausum.

Cotonea- 11. M. foliis ovatis integerimis subtus tomentosis. *Flor. dan.*
ter. *t. 112. Drupa polypyrena superne aperta.*

canaden- 12. M. foliis ovato-oblongis glabris ferratis acutiusculis; *an*
sis. *forsitan pyri species?*

japonica. 13. M. foliis oblongis obtusis apice ferratis subtus tomentosis.
Thunb. flor. jap. p. 206.

626. PYRUS. Cal. 5fidus. Petala 5. Pomum infe-
rum, 5loculare, polyspermum.

* *foliis simplicibus.*

commu- 1. P. foliis ferratis laevibus, floribus corymbosis. *Blackw.*
nis. *herb. t. 453.* β) *du Hamel arbr. 2. t. 45.*

Pollveria. 2. P. foliis ferratis subtus tomentosis, floribus corymbosis.
Mant. p. 244. Knoop pomol. 2. t. 4. Antrum 5loculare
carnosum.

praecox. 3. P. foliis ferratis villosis, umbellis sessilibus. *Pallas flor. ross.*
p. 22.

- spectabi- 4. *P. foliis ferratis laevibus ovali-oblongis, umbellis sessilibus: unguibus calice longioribus, stilos bafi lanatis.* *Ait. hort. Kew. 2. p. 175.*
- Malus. 5. *P. foliis ferratis, umbellis sessilibus, unguibus calice brevioribus, stilos glabris.* *Mill. illustr. ic. 3) Blackw. herb. t. 178.*
- Coronaria. 6. *P. foliis ferrato-angulosis, umbellis pedunculatis.*
- angusti- 7. *P. foliis lanceolato-oblongis dentato-ferratis, pedunculis corymbosis.* *Ait. hort. Kew. 2. p. 176.*
- baccata. 8. *P. foliis ferratis, pedunculis confertis, pomis baccatis.* *Mant. p. 75. Giseck. pl. ic. fasc. 1. n. 12. Pomum globulare, superne clausum.*
- dioica. 9. *P. foliis serratis ovalibus, floribus solitariis dioicis.* *Moench Weissenst. p. 87. t. 5.*
- japonica. 10. *P. foliis cuneatis glabris, floribus solitariis.* *Thunb. flor. jap. p. 207.*
- salicifolia. 11. *P. foliis linear-lanceolatis canis subtus albo-tomentosis, floribus axillaribus solitariis subsessilibus.* *Suppl. p. 255. Pallas flor. ross. t. 9.*
- spinosa. 12. *P. foliis oblongis glabris, ramulis mucronatis, spinis lateralibus minoribus.* *Forsk. flor. aeg. arab. p. 211.*
- Cydonia. 13. *P. foliis integerrimis, floribus sessilibus.* *Jacq. fl. aust. 4. t. 342. 3) Blackw. herb. t. 137. 3) du Hamel arbr. 1. t. 83.*
- nivalis. 14. *P. foliis integerrimis, floribus corymbosis.* *Suppl. p. 255. Jacq. fl. aust. 2. t. 107.*
** *foliis ternatis.*
- hadiensis. 15. *P. foliis lanceolatis rugosis integris: venis subtus griseis.* *Forsk. flor. aeg. arab. p. 212.*
*** *foliis pinnatis.*
- hybrida. 16. *P. foliis subtus lanatis: pinna extrema maxima, floribus corymbosis.* *Moench Weissenst. p. 90. t. 6.*

627. TETRAGONIA. Cal. 4-5partitus. Cor. o. Dru-
pa corticosa infera 4-5go-
na, multilocularis.

- fruticosa. 1. *T. foliis linearibus.* *Mant. p. 398. Mill. ic. t. 263. f. 2.*
2. *T.*

- japonica. 2. *T.* foliis subcordatis ovatis punctatis, floribus axillaribus solitariis. *Thunb. flor. Jap.* p. 208.
- herbacea. 3. *T.* herbacea, foliis obovato-lanceolatis, pedunculis axillaribus ternis unifloris. *Mant. p. 398. Mill. ic. t. 263. f. 1.*
- hirsuta. 4. *T.* herbacea hirsuta procumbens, foliis ovatis villosis, floribus axillaribus ternis sessilibus. *Suppl. p. 258.*
- spicata. 5. *T.* herbacea glabra erecta, foliis glabris: inferioribus ovatis; supremis lanceolatis, floribus racemosis. *Suppl. p. 258.*
- expansa. 6. *T.* herbacea, ramis expansis elongatis, foliis parabolicis, floribus subsolitariis, fructu cornuto. *Murray comm. Goett. 1783. t. 5.*
- echinata. 7. *T.* herbacea, foliis rhombo-ovatis, fructibus echinatis. *Ait. hort. Kew. 2. p. 177.*
- crystalli- 8. *T.* foliis ovatis crystallino-papilloso, floribus axillaribus.
na. *Herit. Stirp. nov. 4. p. 81. t. 39.*

**628. MESEMBRYANTHEMUM. Cal. 5fidus. Petala numerosa,
linearia. Caps. carnosia, infera, polysperma.**

* *corollis albis.*

- ciliatum. 52. *M.* foliis oppositis connatis semiteretibus: stipulis membranaceis reflexis laceris ciliiformibus. *Ait. hort. Kew. 2. p. 179.*
- pallens. 53. *M.* foliis oppositis amplexicaulibus distinctis oblongo-lanceolatis acutis obtuse carinatis: papulis minutis. *Ait. hort. Kew. 2. p. 182.*
- digita- 54. *M.* subacaule, foliis alternis teretibus obtusis, floribus
tum. axillaribus, sessilibus. *Ait. hort. Kew. 2. p. 181.*
- nodiflo- 1. *M.* foliis alternis teretiuseculis obtusis basi ciliatis. *Moris. rum. hist. pl. 2. t. 33. f. 7.*
- crystalli- 2. *M.* foliis alternis ovatis papulosis, floribus sessilibus: calici-
num. bus late ovatis acutis retusis. *Suppl. p. 259. Dill. b. Elth. t. 180. f. 221.*
- Tripoli- 3. *M.* foliis alternis lanceolatis planis impunctatis, caulis laxis
um. simplicibus, calicibus pentagonis. *Dill. b. Elth. t. 179. f. 220.*
4. *M.*

- expansum. 4. M. foliis alternis oppositisque remotis planiusculis lanceolatis, impunctatis patentibus distinctis. *Knorr del. hort. 2. t. M. 3.*
- apetalum. 5. M. foliis linearisublanceolatis, subtus muricatis, caulis prostratis. *Suppl. p. 258.*
- criniflorum. 6. M. foliis ovatis, scapis unifloris. *Suppl. p. 259.*
- cordifolium. 7. M. foliis cordatis obtusis, caulis prostratis. *Suppl. p. 260. Jungbans plant. ic. cent. 1. n. 37.*
- humifusum. 55. M. foliis amplexicaulibus spatulatis carinatis: papulis conicis scabris, petalis minutissimis. *Ait. hort. Kew. 2. p. 179.*
- testiculae. 56. M. foliis quatuor decussatis supra planis. *Ait. hort. Kew. 2. p. 181.*
- umbellatum. 8. M. foliis subulatis scabrido-punctatis connatis: apice patulum, caule erecto, corymbo trichotomo. *Dill. b. Elth. t. 208. f. 266.*
- calamiforme. 9. M. acaule, foliis subteretibus adscendentibus impunctatis connatis, floribus octogynis. *Mill. ic. t. 176. f. 1.*
- splendens. 10. M. foliis subteretibus impunctatis recurvis distinctis congestis, calicibus digitiformibus terminalibus. *Dill. b. Elth. t. 204. f. 260.*
- caducum. 57. M. foliis filiformi-semiteretibus distinctis: papulis ovatis, floribus lateralibus sessilibus: terminalibus pari foliorum cinctis. *Ait. hort. Kew. 2. p. 179.*
- geniculiflorum. 11. M. foliis semiteretibus papulosis distinctis, floribus sessilibus axillaribus, calicibus quadrifidis. *Dill. b. Elth. t. 205. f. 261.*
- copticum. 12. M. foliis semiteretibus papulosis distinctis, floribus sessilibus axillaribus, calicibus quinquefidis. *Jacq. b. Vind. 3. t. 6.*
- noctiflorum. 13. M. foliis semicylindricis impunctatis distinctis, floribus pendunculatis: calicibus quadrifidis. *Knorr del. hort. 1. t. G. 8. β) Dill. b. Elth. t. 206. f. 263.*
- ** corollis rubicundis.
- bellidiflorum. 14. M. acaule, foliis triquetris linearibus impunctatis: apice trifariam dentatis. *Knorr del. hort. 1. t. G. 5. a. n. 1.*
- deltoides. 15. M. foliis triquetris deltoidibus dentatis impunctatis distinctis. *Knorr del. hort. 1. t. G. 5. b. n. 1.*

- reptans. 58. M. foliis triquetris acutis scabris, caule reptante. *Ait.*
hort. Kew. 2. p. 185.
- deflexum. 59. M. foliis triquetris acutis glaucis: punctis obsoletis scabri-
 usculis, calicis laciniis interioribus membranaceis. *Ait.*
hort. Kew. 2. p. 187.
- filamen- 16. M. foliis aequilateri-triquetris acutis subpunctatis connat-
 tosum. tis: angulis scabris, ramis hexagonis. *Dill. b. Elth. t.*
211. f. 273.
- stipulace- 17. M. foliis subtriquetris compressis incurvis punctatis distin-
 tum. tis congestis basi marginatis. *Dill. b. Elth. t. 209.*
f. 267. 268.
- australe. 60. M. foliis subtriquetris punctulatis connatis obtusiusculis,
 caule terete repente, pedunculis solitariis obtuse aequi-
 bus. *Ait. hort. Kew. 2. p. 187.*
- spinosum. 18. M. foliis tereti-triquetris punctatis distinctis, spinis ramo-
 sis. *Dill. b. Elth. t. 208. f. 265.*
- crassifoli- 19. M. foliis semicylindricis impunctatis connatis apice trique-
 tris, caule repente semicylindrico. *Knorr del. hort. 2.*
t. M. 4.
- Ioreum. 20. M. foliis semicylindricis recurvis congestis basi interiori
 gibbis connatis, caule pendulo. *Dill. b. Elth. t. 200. f. 255.*
- hispidum. 21. M. foliis cylindricis papulosis distinctis, caule hispido.
Mill. ic. t. 176. f. 3. B) Knorr del. hort. 2. t. M. 5.
y) Dill. b. Elth. t. 215. f. 281.
- brevifoli- 61. M. foliis cylindricis obtusissimis papulosis patentibus, ra-
 um. mis diffusis. *Ait. hort. Kew. 2. p. 188.*
- laeve. 62. M. foliis cylindricis obtusis amplexicaulibus laevibus, cali-
 cibus quinquefidis: laciniis oblongis obtusis. *Ait. hort.*
Kew. 2. p. 187.
- glemera- 22. M. foliis teretiusculis compressis punctatis distinctis, caule
 tum. paniculato multifloro. *Dill. b. Elth. t. 213. f. 274.*
- tubero- 23. M. foliis subulatis papulosis distinctis apice patulis, radice
 sum. capitata. *Dill. b. Elth. t. 207. f. 264.*
- scabrum. 24. M. foliis subulatis distinctis subtus undique punctato-mu-
 ricatis, calicibus muticis. *Dill. b. Elth. t. 197. f. 251.*
- emargin- 25. M. foliis subulatis congestis subscabris, calicibus spinosis,
 natum. petalis emarginatis. *Dill. b. Elth. t. 197. f. 250.*

- tenuifoli- 26. M. foliis subfiliformibus glabris distinctis internodio longioribus, caulinis procumbentibus. *Dill. b. Elth. t. 201. f. 256.*
- falcatum. 27. M. foliis acinaciformibus impunctatis connatis: angulo carnali scabro, petalis lanceolatis. *Knorr del. hort. 2. t. M. 4.*
- forficata- 28. M. foliis acinaciformibus obtusis impunctatis connatis apice spinosis, caule ancipiti. *Jacq. b. Vind. I. t. 26.*
- braetea- 63. M. foliis subacinaciformibus punctatis apice recurvis, bracteis amplexicaulibus lato-ovatis carinatis. *Dill. b. Elth. t. 197. f. 249.*
- barba- 29. M. foliis subovatis papulosis distinctis apice barbatis. *Mill. ic. t. 176. f. 3. β) Dill. b. Elth. t. 190. f. 235. γ) Dill. b. Elth. t. 190. f. 236.*
- villosum. 30. M. foliis pubescentibus connatis impunctatis, caule piloso.
- uncinata- 31. M. articulis caulinis terminatis, foliis connatis acuminatis punctatis subtus dentatis. *Dill. b. Elth. t. 193. f. 239. 240.*
- cuneifo- 32. M. foliis lanceolato-cuneiformibus oppositis integerrimis planis fessilibus cum caule ramoso purpureo papulosis. *Jacq. coll. 2. p. 319. pl. rar. ic. cent. 2. t. 41.*
- *** *corollis luteis.*
T *caulescentia.*
- edule. 33. M. foliis aequilateri-triquetris-acutis strictis impunctatis connatis: carina subserrata, caule ancipiti. *Dill. b. Elth. t. 212. f. 272.*
- glaucum. 34. M. foliis triquetris acutis punctatis distinctis, calicis foliolis ovato-cordatis. *Dill. b. Elth. t. 196. f. 248.*
- ferratum. 35. M. foliis triquetris subulatis punctatis distinctis: angulo carnali retrorsum ferrato. *Dill. b. Elth. t. 192. f. 238.*
- pugioni- 36. M. foliis triquetris subulatis longissimis impunctatis alternis confertis. *Mant. p. 398. Dill. b. Elth. t. 210. f. 269.*
- molle. 64. M. foliis triquetris connatis erectis glaucis impunctatis ramis semiteretibus, pedunculis axillaribus compressis. *Ait. hort. Kew. 2. p. 192.*
- echina- 65. M. foliis subtriquetris oblongo-ovatis gibbis ramentaceo-hispidis, calicis laciniis foliiformibus. *Ait. hort. Kew. 2. p. 194.*
- cornicula- 37. M. foliis triquetro-semicylindricis scabrido-punctatis: supra basin linea elevata connatis. *Dill. b. Elth. t. 199. f. 253. 254. β) Dill. b. Elth. t. 198. f. 252.*

- verucula- 38. M. foliis triquetro-cylindricis acutis connatis arcuatis im-
tum. punctatis distinctis. *Dill. b. Elth. t. 203. f. 259.*
- micans. 39. M. foliis subcylindricis papulosis distinctis, caule scabro.
Knorr del. hort. I. t. G. 5.
- grossum. 66. M. foliis subcylindricis confertis papulosis, caudice basi
incrassato: ramis diffusis glabris. *Ait. hort. Kew. 2. p. 191.*
- brachia- 67. M. caulibus foliisque cylindricis papulosis, ramis tricho-
tum. *Ait. hort. Kew. 2. p. 191.*
- bicolo- 40. M. foliis subulatis punctatis laevibus distinctis, caule fru-
tescente, corollis bicoloribus. *Mill. ic. t. 177. f. 1.*
- tortuo- 41. M. foliis planiusculis oblongo-ovatis subpapulosis confertis
sum. connatis, calicibus triphyllis bicornibus. *Dill. b. Elth. t. 181. f. 222.*
- pomeri- 42. M. foliis planiusculis lato-lanceolatis laevibus subciliatis
dianum. distinctis, caule pedunculis germinibusque hirtis. *Jacq. pl. rar. ic. cent. 2. t. 42.*
- papulo- 43. M. foliis spatulato-oblongis papulosis, floribus peduncu-
latis: calicibus linearibus. *Suppl. p. 259. Jacq. b. Vind. 3. t. 7.*
- fessilifo- 68. M. foliis planis spatulatis caulisque papulosis, ramis di-
rum. varicatis, floribus fessilibus. *Ait. hort. Kew. 2. p. 193.*
- helian- 69. M. foliis spatulatis planis laevibus, pedunculis longissimis,
thoides. calicibus basi planis angulatis. *Ait. hort. Kew. 2. p. 193.*
- glabrum. 70. M. foliis spatulatis glaberrimis amplexicaulibus distinctis,
pedunculis folia aequantibus, calicibus hemisphaeriois.
Ait. hort. Kew. 2. p. 193.
- pinnati- 44. M. foliis pinnatifidis. *Suppl. p. 260.*
fidum.

TT acaulia.

- ringens. 45. M. foliis ciliato-dentatis punctatis. *Mill. ic. t. 177. f. 2.*
β) *Knorr del. hort. I. t. G. 6. n. 1.*
- difforme. 46. M. foliis difformibus punctatis connatis. *Mill. ic. t. 176. f. 2.*
- dolabri- 47. M. foliis dolabiformibus punctatis. *Dill. b. Elth. t. 191.
f. 237.*
- rostra- 48. M. foliis semicylindricis externe tuberculatis connatis,
tum. *Dill. b. Elth. t. 186. f. 229.*

linguifor- 49. M. foliis linguiformibus altero margine crassioribus impunctatis. Knorr del. hort. I. t. G. 6. n. 2. β) Knorr del. hort. I. t. G. 7. n. 2. γ) Dill. b. Elth. t. 185. f. 226. δ) Knorr del. hort. I. t. G. 7. n. 1.

albidum. 50. M. foliis triquetris integerrimis. Dill. b. Elth. t. 189. f. 232.

compa- 71. M. foliis connatis punctatis semiteretibus apice triquetris
tum. subreflexis acutis, floribus sessilibus: calice subcylindrico
sexido. Ait. hort. Kew. 2. p. 191.

***** corollis viridibus.

viridiflo- 72. M. foliis semicylindricis papulofo-pilosis, calicibus quinquefidiis hirsutis. Ait. hort. Kew. 2. p. 196.

***** incertae tribus.

capillare. 51. M. foliis connatis teretibus papulosis, caule erecto, ramulis unifloris filiformibus glabris. Suppl. p. 260.

629. AIZOON. Cal. 5partitus. Cor. o. Caps. supera, 5locularis, 5valvis. Sem. reniformia.

canarien- 1. A. foliis cuneiformi-ovatis, floribus sessilibus. Pluckn.
fe. alm. t. 303. f. 4.

glinoides. 2. A. hirsutum herbaceum procumbens, foliis ovatis, floribus sessilibus distinctis. Suppl. p. 261.

secundum. 3. A. hirsuto-canum herbaceum procumbens, foliis ovatis, floribus sessilibus imbricatis secundis. Suppl. p. 261.

rigidum. 4. A. fruticosum procumbens tomentosum, foliis ovatis, floribus sessilibus remotis. Suppl. p. 261.

perfolia- 5. A. tomentosum, foliis obovatis connatis cristallino-punctatis, floribus pedunculatis. Suppl. p. 261.

hispani- 6. A. herbaceum, foliis lanceolatis, floribus sessilibus. Dill.
cum. b. Elth. t. 117. f. 143. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 76. f. 9.

frutico- 7. A. fruticosum erectum glabrum, foliis lanceolatis, floribus sum. sessilibus. Suppl. p. 261.

panicula- 8. A. hirsutum, foliis lanceolatis, floribus sessilibus, ramis tum. erectis. Suppl. p. 261.

lanceola- 9. A. foliis lanceolatis, floribus paniculatis.
tum.

farmento- 10. A. foliis linearibus filiformibus, panicula dichotoma, floribus solitariis pedunculatis. *Suppl. p. 260.*

630. SPIRAEA. *Cal. 5fidus. Petala 5. Caps. 4 vel plures polyspermae, iloculares, 2valves.*

* *Fruticose.*

laevigata. 1. Sp. foliis lanceolatis integerrimis sessilibus, racemis compositis. *Mant. p. 244. Pallas flor. ross. t. 23. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 69. f. 5.*

salicifolia. 2. Sp. foliis lanceolatis obtusis serratis nudis, floribus duplicita-racemosis. *Pallas flor. ross. t. 21. β) Spiraea alpestris. Pallas fl. ross. t. 22.*

alba. 3. Sp. foliis lanceolatis acutis apice serratis, floribus duplicato-racemosis. *Mill. ic. t. 257. f. 2.*

tomento- 4. Sp. foliis lanceolatis inaequaliter serratis subtus tomentosis, fa. floribus duplicato-racemosis. *Pluckn. alm. t. 321. f. 5.*

altaica. 5. Sp. foliis oblongis integerrimis sessilibus, racemis terminalibus compositis. *Pallas flor. ross. t. 23.*

camtscha- 6. Sp. foliis simpliciter palmatis: petiolis appendiculatis, caule hirsuto, floribus cymosis. *Pallas flor. ross. t. 28.*

callosa. 7. Sp. foliis lanceolatis acutis serratis subvillosis, panicula decomposita subfastigiata. *Thunb. flor. jap. p. 209.*

japonica. 8. Sp. foliis lanceolatis acutis serratis nudis, caule pubescente, corymbo terminali composito. *Suppl. p. 262. an forte eadem cum japonica?*

hyperici- 9. Sp. foliis obovatis integerrimis, umbellis sessilibus. *Pluckn. folia. alm. t. 218. f. 5.*

alpina. 10. Sp. foliis oblongis glabris integerrimis, racemis terminalibus subfastigiatis. *Pallas flor. ross. t. 20.*

crenata. 11. Sp. foliis oblongisculis apice serratis, corymbis lateribus. *Pallas flor. ross. t. 19.*

argentea. 12. Sp. foliis cuneiformibus sericeis lineatis apice serratis subplicatis, racemis compositis. *Suppl. p. 261.*

batulifolia. 13. Sp. foliis ovatis crenatis, corymbis terminalibus compositis fastigiatis. *Pallas flor. ross. t. 16.*

chamae- 14. Sp. foliis ovatis inciso-terratis glabris, umbellis pedunculatis. *Jacq. b. Vind. 2. t. 140.*

- incisa. 15. Sp. foliis ovatis inciso-quinquepartitis ferratis, umbellis terminalibus. *Thunb. flor. jap.* p. 213.
- thalictroides. 16. Sp. foliis ovato-cuneiformibus: inferioribus subintegris; lumen trilobato-incisis, floribus umbellatis sessilibus ramorum terminalibus. *Pallas flor. ross.* t. 18.
- triloba. 17. Sp. foliis lobatis crenatis, umbellis terminalibus. *Mant.* p. 244. *Pallas flor. ross.* t. 17.
- opulifolia. 18. Sp. foliis lobatis ferratis, corymbis terminalibus. *Commel.* b. amst. 1. t. 87. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 5. t. 69. f. 5.
- forbifolia. 19. Sp. foliis pinnatis: foliolis uniformibus ferratis, floribus paniculatis. *Pallas flor. ross.* t. 24. 25.

** *Herbaceae.*

- Aruncus. 20. Sp. foliis supradecompositis, spicis paniculatis, floribus dioicis. *Pallas flor. ross.* t. 26.
- Filipendula. 21. Sp. foliis interrupte pinnatis: foliolis linear-lanceolatis interrupte ferratis glaberrimis, floribus cymosifloris. *Suppl.* p. 262. *Flor. dan.* t. 635. *Regn. bot.* t. 384.
- Ulmaria. 22. Sp. foliis interrupte pinnatis: foliolis ovatis biserratis subtus canis, floribus cymosis. *Suppl.* p. 262. *Flor. dan.* t. 547. *Regn. bot.* t. 311.
- lobata. 23. Sp. foliis pinnatis: impari lateralibusque lobatis biserratis, floribus cymosis. *Suppl.* p. 262. *Synt. veg.* XIII. 1. p. 393. *Spiraea palmata.* *Jacq. b. Vind.* 1. t. 88.
- palmata. 24. Sp. foliis palmatis ferratis, panicula supradecomposita. *Thunb. flor. jap.* p. 212.
- trifoliata. 25. Sp. foliis ternatis ferratis subaequalibus, floribus subpaniculatis. *Mill. ic.* t. 256.

684. AQUILEGIA. Cal. 0. Petala 5. Nectaria 5
corniculata, inter petala.
Caps. 5 distinctae.

- viscosa. 1. A. nectariis incurvis, caule subnudo subunifloro viscofo-pilosofoliis subtrilobis. *Mant.* p. 77. *Gouan. illustr.* t. 19.
- vulgaris. 2. A. nectariis incurvis petalo subaequalibus, foliolis omnibus petiolatis. *Flor. dan.* t. 695.

- alpina. 3. A. nectariis incurvis petalo lanceolato brevioribus, caule paucifloro, foliolis lateralibus sessilibus. *Allion. flor. ped.*
2. t. 66.
- canaden- 4. A. nectariis rectis, staminibus corolla longioribus. *Mill. ic.*
sis. t. 47.
- viridiflo- 5. A. nectariis rectis conniventibus petalo lanceolato aequali-
ra. *Jacq. plant. rar. ic. cent.* 1. t. 55.

685. NIGELLA. *Cal. o. Petala 5. Nectaria 5 3fida*
intra corollam. Caps. 5 con-
nexae.

* *Pentagynae.*

- damasce- 1. N. floribus involucre folioso cinctis. *Mant. p. 405. Blackw.*
na. *herb. t. 558. β) Knorr del. hort. 1. t. S. 21.*
- fativa. 2. N. capsulis muricatis subrotundis, foliis subpilosis. *Mill. ic.*
t. 187. f. 1.
- arvensis. 3. N. petalis integris, capsulis turbinatis. *Balliard. herb.*
Franc. t. 126.

** *Decagynae.*

- hispanica. 4. N. pistillis corollam aequantibus. *Moris. hist. pl. 3. t. 18. f. 8.*
- orientalis. 5. N. pistillis corolla longioribus. *Moris hist. pl. 3. t. 18. f. 10.*

686. REAUMURIA. *Cal. 6phyllus. Petala 5. Caps.*
ilocularis, 5valvis, poly-
sperma,

- vernicu- 1. REAUMURIA. *Moris. hist. pl. 3. t. 9. f. 6.*
lata.

WORMIA. *Cal. 5phyllus. Cor. 5petala. Nectar.*
annulare germen cingens. Germ.
3gona.

- triquetra. 1. WORMIA. *Fr. Rottb. n. act. dan. 2. p. 532. t. 3.*

1402. BRATHYS. *Cal. 5phyllus. Petala 5. Nectarium o. Caps.ilocularis, polysperma.*

juniperina. I. BRATHYS. *Suppl. p. 268.*

HEXAGYNIA.

687. STRATIOTES. *Spatha 2phylla. Perianth. 3fidum aut 3phyllum. Petala 3. Sexus interdum distinctus. Bacca gloularis, infera, 6gona.*

Aloides. I. Str. foliis ensiformi-triangulis ciliato-aculeatis. *Flor. dan. t. 337. Gaertn. de fr. et sem. cent. I. t. 14. f. 8.*

acoroides. 2. Str. foliis ensiformibus planis glaberrimis, spatha apice barbata. *Suppl. p. 268.*

alismoi- 3. Str. foliis cordatis. *Mant. p. 405. Rheed. h. malab. II. t. 46.*

HEPTAGYNIA.

FLACOURTIA. *Flores dioici. Cor. o.*
♂. Cal. 5partitus. Stam. innumera, calici immersa.
♀. Cal. polyphyllus. Germ. superum. Stili 7-9. Bacca multilocularis.

Ramout. I. FLACOURTIA. *Herit. stirp. nov. 3. p. 59. t. 30.*

OCTOGYNIA.

1403. WINTERA. *Cal. 3lobus. Petala 6-12. Germ. clavata. Stil. o. Bacca clavata.*

axillaris. I. W. pedunculis axillaribus congestis unifloris, pistillis quatuor. *Suppl. p. 270. Forst. char. gen. t. 42. n. 2.*

2. W.

- aromatica. 2. W. pedunculis aggregatis terminalibus, pistillis quatuor.
Suppl. p. 269. Soland. med. obs. and inq. 5. t. I.
- granadensis. 3. W. pedunculis axillaribus elongatis trifidis, pistillis octo.
Suppl. p. 269.

DECAGYNIA.

BRASENIA. *Cal. 6partitus, persistens, coloratus.*
Cor. o. Germ. 5-10 apice attenuata.
Stili apice inflexi. Caps. 5-10 evanescentes, iloculares, 2-3permae.

Schreberi. I. BRASENIA. Schreb. gen. pl. Linn. I. p. 372.

POLYGYNIA.

631. ROSA. *Petala 5. Cal. urceolatus, 5fidus, carnosus, collo coarctatus demum baccatus, coloratus. Antrum duplicitum, iloculare superne apertum, pericarpiis osseis intus nidulantibus.*

* *germinibus magis minusve globosis.*

Eglantaria. 1. R. germinibus pedunculisque glabris, caule aculeis sparsis rectis, petiolis scabris, foliolis acutis. Kniph. bot. orig. cent. 7. n. 77. β) Rosa bicolor. Jacq. h. Vind. I. t. I. γ) Knorr del. hort. I. t. R. I.

cinnamomea. 2. R. germinibus pedunculisque glabris, caule aculeis stipulatis, petiolis subinermibus. β) Rosa foecundissima. Münchhausen. Hausvat. 5. p. 279.

arvensis. 3. R. germinibus pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis, floribus cymosis. Mant. p. 245. Flor. dan. t. 398.

pimpinellifolia. 4. R. germinibus pedunculisque glabris, caule aculeis sparsis rectis, petiolis scabris, foliolis obtusis. *an specie vere distincta a spinosissima?*

spinosissima. 5. R. germinibus glabris, pedunculis hispidis, caule petiolisque aculeatissimis. Mant. p. 399. β?) Rosa suavifolia. Flor. dan. t. 870.

- rugosa. 6. R. germinibus glabris, pedunculis caule petiolisque aculeatis, foliis subtus tomentosis. *Thunb. flor. jap.* p. 213.
 sulphurea. 26. R. petiolis cauleque aculeatis: aculeis caulinis duplicitibus majoribus minoribusque numerosis, foliolis ovalibus. *Hort. angl.* 66. t. 18.
 blanda. 27. R. germinibus glabris, caulinis adultis pedunculisque laevibus inermibus. *Ait. hort. Kew.* 2. p. 202.
 virginia. 7. R. germinibus hispidis, pedunculis glabris, petiolis carinata. foliolis ovatis glabris, floribus umbellatis. *Du Roi harbk. Baumz.* 2. p. 353.
 carolina. 8. R. germinibus hispidis, pedunculis subhispidis, caule aculeis stipularibus, petiolis aculeatis.
 villosa. 9. R. germinibus pedunculisque hispidis, caule aculeis sparsis, petiolis aculeatis, foliis tomentosis. *Mant.* p. 399. β) *Rosa lanceolata. Moench Weissenst.* p. 117.
 sempervirens. 10. R. germinibus pedunculisque hispidis, caule petiolisque recurvis, aculeatis, floribus subumbellatis. *Regn. bot.* t. 336. β) *Rosa scandens. Moench Weissenst.* p. 118.

** *germinibus ovatis.*

- rubigino- 11. R. germinum basi pedunculisque aculeatis, caule aculeis recurvis, foliis subtus rubiginosis. *Jacq. fl. austr.* t. t. 50.
 turbinata. 28. R. germinibus turbinatis pedunculisque pilosis, petiolis villosis, aculeis sparsis recurvis. *Ait. hort. Kew.* 2. p. 206.
 centifolia. 12. R. germinibus pedunculisque hispidis, caule hispido aculeato, petiolis inermibus. *Knorr del. hort.* 1. t. R. β) *Rosa muscosa. Hort. angl.* t. 18. γ) *Rosa regina. Moench Weissenst.* p. 121. δ) *Rosa belgica. ε) Rosa provincialis.*
 gallica. 13. R. germinibus pedunculisque hispidis, caule petiolisque hispido-aculeatis. *Mant.* p. 399. *Blackw. herb.* t. 82. β) *Mill. dict.* t. 221. f. 2. γ) *Rosa papaverina. δ) Rosa holosericea. Du Roi harbk. Baumz.* 2. p. 351. ε) *Rosa damascena. Du Roi harbk. Baumz.* 2. p. 369. ζ) *Rosa basilica. η) Rosa arvina. Knorr flor. fil.* 2. I. p. 150.
 pumila. 14. R. germinibus, pedunculis petiolisque hispidis, caule superne aculeatissimo. *Suppl.* p. 262. *Jacq. fl. austr.* 2. t. 198.
 moschata. 15. R. germinibus pedunculisque hispidis, caule petiolisque aculeatis, foliolis ovatis acuminatis glabris, floribus cymbolis. *Du Roi harbk. Baumz.* 2. p. 365.

- collina. 16. R. germinibus subglabris, pedunculis petiolisque glandulose hirsutis, caule aculeato. *Jacq. flor. aust. 2. t. 197.*
- finica. 17. R. germinibus glabris, pedunculis aculeatis hispidis, caule petiolisque aculeatis, calicinis foliolis lanceolatis subpetiolatis. *Jacq. obs. bot. 3. t. 55.*
- alpina. 18. R. germinibus glabris, pedunculis petiolisque hispidis, caule inermi. *Jacq. fl. aust. 3. t. 279.* *an specie vere distincta a pendulina? β) Rosa biflora. Krock. flor. siles. 2. I. p. 151. γ) Rosa hispida. Krock. flor. siles. 2. I. p. 153.*
- penduli- 19. R. germinibus glabris, pedunculis cauleque hispidis, petio-
na. lis inermibus, fructibus pendulis. *Dill. b. Eth. t. 245.*
f. 317.
- alba. 20. R. germinibus glabris, pedunculis hispidis, caule petiolisque aculeatis. *Knorr del. hort. 1. t. R. 6.* *β) Blackw. herb. t. 73.* *γ) Rosa Haller. hist. stirp. Helv. n. 1102.*
- canina. 21. R. germinibus pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis. *Mant. p. 399.* *Flor. dan. t. 555.* *Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 33. f. 4.*
- indica. 22. R. germinibus pedunculisque glabris, caule subinermi, petiolis aculeatis. *Petiv. gaz. t. 35. f. 11.*
- corymbo- 23. R. germinibus pedunculisque glabris: bracteis linearibus,
ia. caule aculeis recurvis, floribus corymbosis. *Moench Weissenst. p. 119.* *β?) Rosa umbellata. Leyss. fl. hal. 435.*
- multiflo- 24. R. germinibus pedunculisque inermibus villosis, caule pe-
ra. tiolique aculeatis. *Thunb. flor. jap. p. 214.*
- persica. 25. R. foliis simplicibus, stipulis spinaeformibus, calicis laci-
niis nudis. *Michaut apud Jussieu gen. plant. p. 452.*

632. RUBUS. *Cal. 5fidus. Petala 5. Stili ex apice
germinum. Drupae congregatae
iloculares. Receptaculo conico bac-
canti superimpositae.*

* frutescentes.

- canaden- 1. R. foliis digitatis denis quinis ternatisque, caule inermi.
sis. *Mill. ic. t. 223.*

- fruticosa. 2. R. foliis quinato-digitatis ternatisque, caule petiolisque aculeatis. *Mill. illustr. ic. Regn. bot. t. 394. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 73. f. 9.*
- australis. 3. R. foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule petiolisque aculeatis, racemis axillaribus simplicibus, floribus dioicis. *Forst. flor. aust. p. 40.*
- idaeus. 4. R. foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule aculeato, petiolis canaliculatis. *Flor. dan. t. 788.*
- ferratus. 23. R. foliis quinatis ellipticis acuminatis argute ferratis utrinque villosis, caulibus petiolisque aculeatis. *Ait. hort. Kew. 2. p. 210.*
- occidentalis. 5. R. foliis ternatis subtus tomentosis, caule aculeato, petiolis teretibus. *Dill. b. Elth. t. 287. f. 319.*
- triphyllus. 6. R. foliis ternatis subtus tomentosis: foliolis ovatis incisis dentatis, ramis, petiolis pedunculisque villosis aculeatisque. *Thunb. flor. jap. p. 215.*
- jamaicensis. 7. R. foliis ternatis subtus tomentosis, caule petiolis foliisque pubescentibus recurvato-aculeatis. *Mant. p. 75. Sloan. hist. jam. t. 213. f. 1.*
- parvifolius. 8. R. foliis ternatis subtus tomentosis, caule hirto petiolisque aculeis recurvis. *Rumpf. amb. 5. t. 47. f. 1.*
- caesius. 9. R. foliis ternatis subnudis: lateralibus bilobis caule aculeato tereti. *Ballard herb. Franc. t. 381.*
- hispidus. 10. R. foliis ternatis nudis, caulibus petiolisque hispidissimis, strigis rigidulis.
- trifidus. 11. R. foliis simplicibus inciso-trifidis glabris, caule inermi. *Thunb. flor. jap. p. 217.*
- palmatus. 12. R. foliis cordatis palmato-trilobis glabris, caule petiolisque aculeatis. *Thunb. flor. jap. p. 217.*
- odoratus. 13. R. foliis simplicibus palmatis, caule inermi multifolio multifloro. *Mill. ic. t. 223.*
- molucca. 14. R. foliis simplicibus cordatis sublobatis, caule aculeato decumbente. *Rumpf. amb. 5. t. 47. f. 2.*
- japonicus. 15. R. foliis simplicibus cordatis oblongis acuminatis duplicator-ferratis, pedunculis solitariis unifloris, caule inermi glaberrimo. *Mant. p. 245. Suppl. p. 263.*
- incisus. 16. R. foliis simplicibus cordatis incisis glabris, caule aculeato. *Thunb. flor. jap. p. 217.*

- villosum. 17. R. foliis simplicibus cordatis acutis aculeatis, caule erecto petiolisque aculeatis. *Tkunb. flor. jap. p. 218.*

** *herbacei.*

- saxatilis. 18. R. foliis ternatis nudis, flagellis reptantibus herbaceis. *Flor. dan. t. 134.*

- arcticus. 19. R. foliis ternatis, caule inermi unifloro. *Flor. dan. t. 468.*

- geoides. 20. R. foliis simplicibus ternatisque obtusis ferratis nudis: foliolo impari maximo. *Smith pl. ic. ined. I. t. 19.*

- sanctus. 22. R. foliis ternatis simplicibusque subtus tomentosis, caule petiolisque aculeis recurvis. *Schreb. dec. I. t. 8.*

- Chamaec- 21. R. foliis simplicibus lobatis, caule inermi unifloro, flori-
morus. *Flor. dan. t. I.*

- Dallbar- 22. R. foliis simplicibus cordatis crenatis, scapo aphylio-
da. *Smith pl. ic. ined. I. t. 20.*

633. FRAGARIA. *Cal. iofidus. Petala 5. Semina
nuda, glabra. Receptaculo
ovato, baccanti, deciduo,
colorato superimposito.*

- vesca. 1. Fr. foliis omnibus ternatis, flagellis reptantibus. *Knorr
del. hort. I. t. E. I. β) Fragaria muricata. Syst. nat.
XII. 3. p. 350. Barr. pl. rar. ic. t. 90. γ) Dill. h. Elth.
t. 120. f. 146.*

- mono- 2. Fr. foliis simplicibus,
phylla.

634. POTENTILLA. *Cal. iofidus. Petala 5. Sem.
subrotunda, nuda, ru-
gosa, receptaculo parvo
exfusco, fungoso, tu-
berculato affixa.*

* *foliis pinnatis.*

- fericea. 1. P. foliis bipinnatis utrinque tomentosis: segmentis paralle-
lis approximatis, caulibus decumbentibus.

- multifida. 2. P. foliis bipinnatis subtus tomentosis: segmentis integerim distantibus, caule decumbente. *Buxb. cent. I. t. 49. f. 1.*
- fruticosa. 3. P. foliis pinnatis, caule fruticoso. *Du Hamel. arbr. 2. t. 20.*
- Anserina. 4. P. foliis pinnatis ferratis, caule repente, pedunculis unifloris. *Flor. dan. t. 544.*
- bifurea. 5. P. foliis pinnatis subaequalibus: foliolis oblongis subbifidis; extimus confluentibus. *S. G. Gmel. it. I. p. 149. t. 27. f. 1.*
- pimpinellæ. 6. P. foliis pinnatis: foliolis subrotundis dentatis aequalibus, loides. caule erecto. *Buxb. cent. I. t. 48.*
- supina. 7. P. foliis pinnatis, caule dichotomo decumbente. *Jacq. fl. aust. 5. t. 406.*
- penstylæ. 8. P. foliis inferioribus pinnatis: superioribus ternatis; foliolis inciso-ferratis, caule erecto pubescente. *Mant. p. 76.*
Jacq. h. Wind. 2. t. 189.
- rupestris. 9. P. foliis pinnatis ternatisque, caule erecto, flagellis nullis. *Jacq. fl. aust. 2. t. 114.*
- fragarioidea. 10. P. foliis pinnatis ternatisque: extimus majoribus, flagellis reptantibus. *Gmel. fl. sibir. 3. t. 34. f. 2.*

** *foliis digitatis.*

- recta. 11. P. foliis septenatis lanceolatis ferratis utrinque subpilosis, caule erecto. *Uacq. flor. aust. 4. t. 383.*
- nivalis. 12. P. foliis septenatis utrinque villosis cuneiformibus apice serratis caule erecto calicibus duodecimfidis, corolla majoribus. *Lapeirouse act. tolos. I. p. 210. t. 16. an satis distincta species?*
- stipularis. 13. P. foliis septenatis sessilibus, stipulae dilatatae insidentibus. *Gmel. flor. sib. 3. t. 37. f. 2.*
- valderia. 14. P. foliis septenatis obovatis ferratis tomentosis, caule erecto, petalis calice brevioribus, receptaculis lanatis.
- hirta. 15. P. foliis septenatis quinatisque cuneiformibus incisis pilosis, caule erecto hirto. (?) *Potentilla rubens. Allion. flor. pedem.*
- argentea. 16. P. foliis quinatis cuneiformibus incisis subtus tomentosis, caule erecto. *Flor. dan. t. 865.*
- canadensis. 17. P. foliis quinatis villosis, caule adscendente hirsuto.

- alba. 18. P. foliis quinatis apice connivent-i-serratis, caulis filiformibus procumbentibus, receptaculis hirsutis. *Jacq. flor. austr. 2. t. 115.*
- caulef- 19. P. foliis quinatis apice connivent-i-serratis, caulis multifloris decumbentibus, receptaculis hirsutis, petalis oblongis. *Jacq. fl. austr. 3. t. 220.*
- Clusiana. 20. P. foliis quinatis apice connivent-i-serratis, caulis multifloris decumbentibus, receptaculis hirsutis, petalis subrotundis. *Jacq. flor. austr. 2. t. 116.*
- alchimil- 21. P. foliis quinatis lanceolatis subtus sericeis nunc integerri-
loides. mis nunc serratis apice connivent-i-tridentatis, caule ere-
cto. *Lapeirouse act. tolos. I. p. 212. t. 17.*
- reptans. 22. P. foliis quinatis, caule repente, pedunculis unifloris.
Curt. flor. Lond. t. 29.
- astraceni- 23. P. foliis radicalibus et caulinis infimis quinatis, caulis
ca. villosis basi procumbentibus dichotomis. *Jacq. pl. rar. ic.
cent. I. t. 68.*
- opaca. 24. P. foliis radicalibus quinatis cuneiformibus serratis; caulinis suboppositis, ramis filiformibus decumbentibus. *Jacq.
pl. rar. ic. cent. I. t. 49.*
- verna. 25. P. foliis radicalibus quinatis acute ferratis retusis, caulinis ternatis caule declinato. *Crautz austr. t. I. f. I.*
- aurea. 26. P. foliis radicalibus quinatis ferratis acuminatis: caulinis ternatis, caule declinato. *Flor. dan. t. 114. anmera ver-
nae varietas?*
- interme- 27. P. foliis radicalibus quinatis: caulinis ternatis, caule ere-
dia. sti sculo ramosissimo. *Mant. p. 76.*
- salisbury- 28. P. foliis hirsutis: radicalibus quinatis inciso-serratis; cau-
gensis. linis ternatis, caule adscendente debili compresso pauci-
floro, calicis foliolis subdentatis. *Haenke ap. Jacq. Col-
lect. 2. p. 68.*
- nitida. 29. P. foliis subternatis tomentosis connivent-i-tridentatis, cau-
libus unifloris, receptaculis lanatis. *Jacq. fl. austr. 5.
app. t. 25. β) Potentilla terglovenis. Haenke ap. alp.
carn. t. 4. f. 2.*
- *** *foliis ternatis.*
- monspel- 30. P. caule ramoso erecto, pedunculis supra genicula enatis.
liensis. *Morif. hist. pl. 2. t. 20. f. 2.*

- tridentata. 31. *P. foliis ternatis cuneiformibus apice trifidis.* *Ait. hort. Kew. 2. p. 216. t. 9.*
- norwegica. 32. *P. caule dichotomo, pedunculis axillaribus.* *Flor. dan. t. 171. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 78. f. 6.*
- nivea. 33. *P. foliis incisis subtus tomentosis, caule adscendente.* *Gmel. flor. sib. 3. t. 36. f. 1.*
- grandiflora. 34. *P. foliis dentatis utrinque subpilosis, caule decumbente foliis longiore.* *Gmel. flor. sib. 3. t. 35. f. 1. 2.*
- subacaulis. 35. *P. foliis dentatis utrinque tomentosis, scapo decumbente,*
Gmel. flor. sib. 3. t. 36. f. 2.

635. TORMENTILLA. *Cal. 8fidus. Petala 4. Semina rotunda, nuda, receptaculo parvo exsucco affixa.*

- erecta. 1. *T. caule erectissimo, foliis sessilibus.* *Flor. dan. t. 598.*
- reptans. 2. *T. caule repente, foliis petiolatis.* *Plot. oxfordsb. t. 9. f. 5.*

636. GEUM. *Cal. 10fidus. Petala 5. Stili terminales. Semina arista geniculata. Receptaculum columnare.*

- virginiana. 1. *G. floribus nutantibus, seminibus omnino nudis uncinatis, foliis superioribus ternatis: inferioribus pinnatis laciniatis.* *Murray comm. Goett. 1774. t. 2.*
- aleppicum. 2. *G. pedunculis unifloris, foliis radicalibus pinnatis; caulinis superioribus ternatis; summis simplicibus.* *Jacq. Collect. I. p. 88.*
- urbanum. 3. *G. floribus erectis, fructibus globosis villosis: aristis uncinatis nudis, foliis lyratis.* *Flor. dan. t. 672. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 74. f. 1.*
- canadense. 4. *G. floribus erectis, seminibus hirsutis: aristis nudis, foliis omnibus pinnatis: pinnis cuneiformibus incisis.* *Murray comm. Goett. 1774. t. 4.*
- japonicum. 5. *G. floribus erectis, fructibus hirsutis: aristis nudis, foliis subtrilobis.* *Thunb. flor. jap. p. 220.*

- alatum. 6. G. floribus erectis, seminibus aristaeque uncino pilosis, foliis pinnatis. *Jacq. b. Vind.* 2. t. 175.
- rivale. 7. G. floribus nutantibus, fructu oblongo: aristis plumosis tortis. *Flor. dan.* t. 722.
- hybridum. 8. G. flore nutante, calice folioso corollam polypetalam excidente. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. t. 6.
- montanum. 9. G. flore inclinato solitario, fructu oblongo: aristis villosis erectis. *Jacq. fl. austr.* 4. t. 373.
- reptans. 10. G. foliis uniformibus incisis: alternis minoribus, flagellis reptantibus. *Jacq. fl. austr.* 5. app. t. 22.
- carolinianum. 11. G. foliis radicalibus subpinnatis: caulinis simplicibus ferratum, ovato-lanceolatis hirsutis alternis, floribus erectis, caule decumbente. *Walt. flor. carol.* p. 150.

637. DRYAS. *Cal. 5-10fidus. Petala 5-8. Sem. caudata, stilo plumoso. Receptaculum depresso latum.*

- arremoides. 1. Dr. pentapetala, foliis pinnatis: pinnis omnibus distinctis. *Gaertn. nov. comm. Petrop.* 14. 1. t. 19. f. 2. 3.
- geoides. 2. Dr. pentapetala, foliis pinnatis: pinnis extimis confluentibus. *Jacq. b. Vind.* 4. t. 68. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 5. t. 74. f. 1.
- octopetala. 3. Dr. foliis simplicibus. *Flor. dan.* t. 31. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 5. t. 74. f. 2.

638. COMARUM. *Cal. 10fidus persistens: laciinis alternis minoribus. Petala 5. Semina nuda, glabra. Receptaculum carnosum globosum, villosum, persistens.*

- fragarioides. 1. C. foliis ternatis, petalis calice majoribus. *Syst. nat. XII.* 3. p. 350. *Fragaria sterilis. Curt. flor. Lond.* t. 173.
- palustre. 2. C. foliis pinnatis, petalis calice minoribus. *Flor. dan.* t. 686. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 1. t. 73. f. 1.

639. CALYCANTHUS. *Cal. iphyllus, urceolatus squarrosus foliolis coloratis. Cor. calicina. Stili plurimi: stigmate glanduloso. Sem. plurima caudata intra calicem succulentum.*

- floridus. 1. *C. petalis interioribus longioribus. Catesb. Car. I. t. 46.*
 Praecox. 2. *C. petalis interioribus minutis. Ait. hort. kew. 2. t. 10.*
 sterilis. 3. *C. foliis subrotundis subtus pubescentibus subrevolutis. Walt. flor. carol. p. 151.*
 fertilis. 4. *C. foliis lanceolatis utrinque laevibus subtus glaucis. Walt. flor. carol. p. 151.*

1432. HEDYCARIA. *Flores dioici. Cal. 8-10fidus. Cor. o.*

♂. *Antherae in fundo calicis sessiles, 4 sulcae, apice barbatae.*

♀. *Germina pedicellata. Nubes pedicellatae, ispermae.*

dentata. 1. **HEDYCARIA.** *Suppl. p. 431. Forst. char. gen. t. 64.*

1222. CYCAS. *Flores dioici.*

♂. *Amentum strobiliforme: squamis subtus undique testis antheris globosis.*

♀. *Spadix ensiformis. Germina angulo immersa solitaria, stilo 1. Drupa nucleo ligneo.*

circinalis. 1. *C. frondibus pinnatis: foliolis linearibus planis. Seb. mus. I. t. 25. f. 1.*

revoluta. 2. *C. frondibus pinnatis: foliolis margine revoluto. Thunb. flor. jap. p. 229. Rumpf. amb. I. t. 24.*

1227. ZAMIA. *Flores dioici. Amentum strobiliforme.*

♂. *Amenti squamae subtus tectae an-*
theris globosis.

♀. *Drupa solitaria in utroque amen-*
ti margine.

pumila. 1. *Z. frondibus pinnatis: foliolis linearibus obtusis, superne car-*
tilagineo-ferrulatis. *Suppl. p. 443. Trew. Ehret. t. 26?*

Cycadis. 2. *Z. frondibus pinnatis: foliolis lanceolatis acuto-spinosis.*
Suppl. p. 443. Thunb. n. act. Ups. 2. p. 284. t. 5. Gaertn.
de fr. et sem. cent. I. t. 3.

angustifo- 3. *Z. frondibus pinnatis: foliolis linearibus obtusis integerri-*
mis. *Jacq. coll. 3. p. 263.*

1032. ZOSTERA. *Spadix linearis, altero latere fru-*
ctifero, intra folium grami-
num occultus. Cal. o. Cor. o.
Stam. alterna. Caps. alternae.
Sem. solitaria.

marina. 1. *Z. pericarpiis sessilibus.* *Flor. dan. t. 15. Gaertn. de fr.*
et sem. cent. I. t. 19. f. 5.

oceania. 2. *Z. pericarpiis pedicellatis oliviformibus.* *Lob. ic. 251.*

uninervis. 3. *Z. foliis brevissimis: nervo medio obscuro, caule compresso*
articulato. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 157.*

ciliata. 4. *Z. stipite vaginato compresso, foliis distichis ciliatis retusis*
imbricatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 157.*

stipulacea. 5. *Z. foliis geminatis oblongo-lanceolatis petiolatis: stipulis*
oppositis oblongis complicatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 158.*

1030. CALLA. *Spatha plana. Spadix tectus flo-*
culis. Cal. o. Cor. o. Baccae
polyspermae.

aethiopi- 1. *C. foliis sagittato-cordatis, spatha eucullata, spadice super-*
ca. *ne masculo.* *Lederm. microsc. 37. t. 18. 19.*

palustris. 2. *C. foliis cordatis, spatha plana, spadice undique hermaphro-*
ditico. *Flor. dan. t. 422. Lesk. is. t. I.*

1028. ARUM. *Spatha iphylla*, cucullata. *Spadix supra nudus*, inferne femineus, medio stamineus.

* *acaulia.*

1 *foliis compositis.*

- Dracunculus. 1. A. foliis pedatis: foliolis lanceolatis integerrimis aequantibus spatham spadice longiore. *Sabb. b. rom. 2. t. 76. 77.*
- Dracontium. 2. A. foliis pedatis: foliolis lanceolatis integerrimis superantibus spatham spadice breviorem. *Blackw. herb. t. 269.*
- hellebori-folium. 29. A. foliis pedatis: foliolis lanceolato-oblongis integerrimis superantibus spatham spadici aequalem. *Jacq. coll. 3. p. 217.*
- flavum. 3. A. foliis pedatis: foliolis ovato-acutis integris, spatha spadicem superante. *Forsk. flor. aeg. arab. p. 157.*
- venosum. 30. A. foliis pedatis: foliolis subovalibus integerrimis, lamina lanceolata spadicem superante. *Ait. hort. Kew. p. 315.*
- pentaphyllum. 4. A. foliis quinatis. *Morif. hist. pl. 3. t. 5. f. 27.*
- triphyllum. 5. A. foliis ternatis, lamina lanceolata acuminata spadicem aequante. *Dod. mem. 81. f. 273. β) Morif. hist. pl. 3. t. 5. f. 43.*
- ternatum. 6. A. foliis ternatis, receptaculo spatha longiore. *Thunb. flor. jap. p. 233.*
- atrorumbens. 31. A. foliis ternatis, lamina ovata spadice diuidio breviore. *Pluckn. alm. 52. t. 77. f. 6.*

11 *foliis simplicibus.*

- Colocasia. 7. A. foliis peltatis ovatis repandis basi emarginatis. *Catesb. Car. 2. t. 45.*
- esculentum. 8. A. foliis peltatis ovatis integerrimis basi emarginatis. *Sloan. hist. jam. 1. t. 106. f. 1.*
- bicolor. 32. A. foliis peltatis sagittatis disco coloratis, spatha medio coarctata basi subglobosa, lamina subrotunda acuminata erecta subconvoluta. *Ait. hort. Kew. 3. p. 316.*
- macrorhizon. 9. A. foliis peltatis cordatis repandis basi bipartitis. *Herm. parad. bot. t. 73.*

- peregrinum. 10. A. foliis cordatis obtusis mucronatis: angulis rotundatis.
pietum. 11. A. foliis cordatis venis coloratis pictis. *Suppl. p. 410.*
- Arisarum. 12. A. foliis cordatis oblongis, spathae apertura ovata. *Sabbat. b. rom. 2. t. 79.*
- divaricatum. 13. A. foliis cordatis hastatis divaricatis. *Rheed. b. malab. 11. t. 20.*
- virginicum. 14. A. foliis hastato-cordatis acutis: angulis obtusis.
- maculatum. 15. A. foliis hastatis integerrimis, spadice clavato. *Flor. dan. t. 505. an cum universo genere monandris monogyniis inferendum?*
- proboscideum. 16. A. foliis hastatis, spatha declinata filiformi subulata. *Sabb. deum. b. rom. 2. t. 78.*
- trilobatum. 17. A. foliis sagittato-trilobis, flore sessili. *Rumpf. amb. 5. t. 110. f. 2.*
- sagittae folium. 18. A. foliis sagittatis triangulis: angulis divaricatis acutis. *Jacq. b. Vind. 2. t. 127.*
- tenuifolium. 19. A. foliis lanceolatis, spadice setaceo declinato. *Moris. b. plant. 3. t. 6. f. 21.*
- cannaefoliū. 20. A. foliis lanceolatis aeniis. *Suppl. p. 410.*
- spirale. 21. A. foliis lanceolatis, spatha spirali sessili. *Koenig apud Retz. obs. bot. 1. p. 30.*
- ovatum. 22. A. foliis ovato-oblongis, spatha scabra. *Rumpf. amb. 5. t. 108.*
- muscivolum. 23. A. subacaule, foliis hastatis pedato-septemfidis, spatha intrum spadiceque pilosis. *Suppl. p. 410.*

** *caulescentia.*

- arboreum. 24. A. rectum, foliis sagittatis. *Plum. amer. t. 51. g. et 60. cens.*
- seguinum. 25. A. suberectum, foliis lanceolato-ovatis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 229.*
- hederae. 26. A. radicans, foliis cordatis oblongis acuminatis: petioli-cepum. teretibus. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 230.*

auritum. 27. *A. radicans*, foliis ternatis: lateralibus unilobatis. *Plant. am.* t. 58.

lingula- 28. *A. repens*, foliis cordato-lanceolatis: petiolis marginato-
membranaceis. *Sloan. hist. jam.* I. t. 27. f. 2.

1238. AMBROSINIA. *Spatha* iphylla dissepimento
divisa. *Stamina* interio-
ris, *pistilla* exterioris la-
teris.

Baffii. **I. AMBROSINIA.** *Moris. hist. pl.* 3. t. 6. f. 19.

1027. XYLOPIA. *Cal.* 3phyllus, deciduus. *Peta-
la* 6: exteriora 3majora. *Re-
cept.* 3gonum. *Antherae* sub-
sessiles. *Stili* o. *Caps.* pedi-
cellatae (2-15) 4gonae, com-
pressae, 2valves, 1-2locula-
res. *Semina* solitaria vel bi-
na lucida arillata.

muricata. **I.** X. pedunculis multifloris, fructibus muricatis. *Brown. jam.* t. 5. f. 2. *Gaertn. de fr. et semi. cent.* 5. t. 69. f. 7.

glabra. **2.** X. pedunculis subunifloris, fructibus glabris. *Pluckn. alm.* t. 238. f. 4.

688. DILLENIA. *Cal.* 5phyllus. *Petala* 5. *Caps.* polypermae, connatae, pul-
pa repleteae.

indica. **I. DILLENIA.** *Rheed. h. malab.* 3. t. 38. 39.

611. ILLICIUM. *Cal.* 6phyllus. *Petala* 27. *Caps.* plures in orbem digestae, 2-valves,ispermae, margine superiori dehiscentes.

anisata. 1. *I.* corollis flavescentibus. *Regn. bot.* t. 396. *Gaertn. de fr.* et sem. cent. 5. t. 69. f. 6.

floridana. 2. *I.* corollis rubris. *Mill. en var. subj.* t. 5. f. 1-8. *Gaertn. de fr.* et sem. cent. 5. t. 69. f. 6.

689. LIRIODENDRON. *Cal.* 3phyllus. *Petala* 9. *Caps.* ispermae in strobilum imbricatae.

Tulipifera. 1. *L.* foliis lobatis. *Trew. Ehret.* t. 10.

Liliifera. 2. *L.* foliis lanceolatis. *Rumpf, amb.* 2. t. 69.

690. MAGNOLIA. *Cal.* 3phyllus. *Petala* 9. *Germ.* 2locularia. *Caps.* 2valves, imbricatae, iloculares. *Sem.* baccata, pendula.

grandiflora. 1. *M.* foliis perennantibus lanceolatis. *Trew. Ehret.* t. 33.

Plumieri. 2. *M.* foliis perennantibus ovato-subrotundis utrinque glabris. *Plum. gen. p.* 38. n. 7. ic.

glauca. 3. *M.* foliis ovato-oblongis subtus glaucis. *Trew. Ehret.* t. 9.

acuminata. 4. *M.* foliis ovato-oblongis acuminatis. *Catesb. car.* 3. t. 15.

tripetala. 5. *M.* foliis lanceolatis, petalis exterioribus dependentibus. *Catesb. car.* 2. t. 80.

Fraseri. 6. *M.* foliis obovato-lanceolatis, basi auriculatis. *Walt. flor. carol.* p. 159. ic.

691. MICHELIA. *Cal. 3phyllus. Petala 15. Baccae multae, 4spermae.*

Champaca. 1. M. foliis lanceolatis. *Rumpf. amb. 2. t. 67.*

Tscampa- 2. M. foliis lanceolato-ovatis. *Mant. p. 78. Rumpf. amb. 2.*
ca. *t. 68.*

692. UVARIA. *Cal. 3phyllus. Petala 6. Baccae numerosae, pendulae, 4spermae.*

zeylanica. 1. U. foliis integerrimis. *Aubl. pl. guj. 1. p. 605. t. 243.*

japonica. 2. U. foliis serratis ovatis, floribus monoicis. *Kaempf. amoen. exot. p. 477. ic.*

longifolia. 3. U. foliis linear-lanceolatis. *Sonner. it. ind. 2. p. 233. t. 131.*

lanceola- 4. U. foliis lanceolatis integris, floribus axillaribus solitariis,
ta. ramis virgatis. *Brown. jam. p. 370. n. 11.*

CANANGA. *Cal. 3phyllus. Petala 6. Anther. sub- sessiles. Stigm. sessilia. Caps. ova- tae, pedunculatae,iloculares, 1- spermae.*

Uregu. 1. **CANANGA.** *Aubl. pl. guj. 1. p. 607. t. 244.*

693. ANNONA. *Cal. 3phyllus. Petala 6. Bacca polysperma subrotunda: cor- tice squamato.*

aegyptia- 1. A. foliis ellipticis, fructibus globosis. *Forsk. flor. aeg. ca. arab. p. 102.*

sinensis. 2. A. foliis ellipticis glabris. *Suppl. p. 270. Annona hexapetala.*

muricata. 3. A. foliis oval-lanceolatis glabris nitidis planis, baccis mu- ricatis. *Jacq. stirp. amer. piæt. t. 161.*

reticula- 4. A. foliis lanceolatis, fructibus ovatis reticulato-areolatis.
ta. *Jacq. stirp. amer. piæt. t. 264. f. 93. Rheed. h. muslab. 3. t. 30. 31.*

- africana. 5. A. foliis lanceolatis pubescentibus.
 asiatica. 6. A. foliis lanceolatis glabris nitidis lineatis. *Plum. ie. 143. f. 2.*
 triloba. 7. A. foliis lanceolatis, fructibus trifidis. *Trew. Ehret. t. 5.*
 glabra. 8. A. foliis lanceolato-ovatis, fructibus conoideis glabris. *Catesb. Car. 2. t. 64.*
 palustris. 9. A. foliis oblongis obtusiusculis glabris, fructibus areolatis. *Sloan. hist. jam. 2. t. 228. f. 1.*
 squamosa. 10. A. foliis oblongis subundulatis, fructibus obtuse subsquamatis. *Jacq. Stirp. amer. piét. t. 162.*
 Apere- 11. A. foliis oblongis integerrimis tomentosis sublessilibus, fru-
 moa. 12. A. foliis oblongis integerrimis tomentosis subtus rufescen-
 paludosa. 13. A. foliis oblongis glabris integerrimis, fructibus punctatis. *Aubl. pl. guj. I. p. 611. t. 246.*
 punctata. 14. A. foliis oblongis glabris integerrimis, fructibus punctatis. *Aubl. pl. guj. I. p. 614. t. 247.*
 longifolia. 15. A. foliis ovatis acutis integerrimis, subtus ferrugineo- to-
 Ambotai. 16. A. foliis ovato-cordatis petiolatis subtus tomentosis, fru-
 rufescens. 17. A. foliis cordatis glabris petiolatis subtus flavescentibus,
 amara. 18. A. foliis ovatis acutis subtus pubescentibus, floribus tripe-
 tripetala. 19. A. foliis oblongis, fructibus areolatis, corollis extimis monopetalis. *Jacq. obs. bot. 2. t. 16.*

1404. UNONA. Cal. 3phyllus. Petala 6. Baccae
 plures pedicellatae, 2spermae.

discreta. 1. UNONA. *Suppl. p. 270.*

694. ANEMONE. *Cal. plurimis o. Petala 5-10.*
Caps. plures mucronatae aut caudatae, stilum retinentes.

* *flore subcaliculato*, Hepaticae.

Hepatica. 1. A. involucro triphylo caliciformi, foliis trilobis integerimis. *Flor. dan. t. 610.*

** *pedunculo involucrato, seminibus caudatis*, Pulsatiliae.

patens. 2. A. foliis digitatis multifidis. *Helv. pulsat. t. 2. 3.*

apiifolia. 3. A. foliis caulinis ternis connatis supradecompositis multifidis tenuissimis, subtus pilosissimis. *Wulf. apud Jacq. misc. austr. 2. p. 47. t. 4.*

alpina. 4. A. foliis caulinis ternis connatis supradecompositis multifidis, feminibus hirsutis caudatis. *Mant. p. 406. Jacq. flor. austr. I. t. 85.*

sulphurea. 5. A. foliis triplicato-pinnatis pilosis planis acute incisis. *Mant. p. 78.*

pratenis. 6. A. foliis bipinnatis, petalis apice reflexis. *Flor. dan. t. 611.*

Pulsatilla. 7. A. foliis bipinnatis, petalis rectis. *Flor. dan. t. 1 53.*

cernua. 8. A. foliis pinnatis, flore cernuo. *Thunb. flor. jap. p. 238.*

vernalis. 9. A. foliis pinnatis; pinnis inciso-lobatis, scapo unifloro hirsutissimo, flore subnutante. *Flor. dan. t. 29.*

Halleri. 29. A. foliis hirsutis pinnatis: pinnis acute lobatis, involucris multifidis. *Allion. flor. pedem. t. 80. f. 2.*

baldensis. 10. A. foliis bibernatis hirsutis. *Mant. p. 78. Scop. flor. carn. Ed. II. I. t. 26. β) Anemone caroliniana. Walt. flor. carol. p. 156.*

*** *caule folioso, seminibus caudatis*, Anemonae.

coronaria. 11. A. foliis radicalibus ternato decompositis, involucro folioso.

hortensis. 12. A. foliis digitatis, seminibus lanatis.

13. A.

palmata. 13. A. foliis cordatis sublobatis, calice hexaphyllo colorato.
Morif. hist. pl. 2. t. 25. f. 3.

***** flore nudo, seminibus ecaudatis, Anemonoidae.

sibirica. 14. A. caule unifloro, involucro folioso obtuso.

decapeta- 15. A. caule unifloro, flore decapetalo, foliis ternatis lobatis
la. radicalibus. *Mant. p. 79. Ard. sp. 2. t. 12. β) Anemone dodecaphylla. Krock. flor. siles. 2. 1. p. 235. t. 20.*

trifolia. 16. A. caule unifloro, foliis ternatis ovatis integris serratis.

quinke- 17. A. caule unifloro, foliis quinatis ovalibus serratis. *Pluckn.
folia. alm. t. 106. f. 3.*

nemorosa. 18. A. caule unifloro, foliolis incisis, seminibus acutis. *Curt.
flor. Lond. t. 75.*

ranuncu- 19. A. caule subbifloro, petalis subrotundis, foliolis incisis,
loides. seminibus acutis. *Flor. dan. t. 140.*

apennina. 20. A. seminibus acutis, foliolis incisis, petalis lanceolatis nu-
merosis. *Menz. pug. t. 8. f. 2.*

dichoto- 21. A. caule dichotomo, foliis sessilibus omnibus oppositis am-
plexicaulibus trifidis incisis. *Mant. p. 406. Linn. dec.
ma. 29. t. 15.*

penstyl- 22. A. caule dichotomo, foliis sessilibus amplexicaulibus: in-
vanica. finis ternis trifidis incisis. *Mant. p. 247.*

sylvestris. 23. A. pedunculo nudo, seminibus subrotundis hirsutis. *Bul-
liard herb. Franc. t. 59.*

fragifera. 24. A. pedunculo nudo, seminibus subrotundis lanatis, folio-
rum laciniis acutis lanceolatis. *Jacq. pl. rar. ic. cent.
I. t. 61.*

virginia- 25. A. pedunculis alternis longissimis, fructibus cylindricis,
na. seminibus hirsutis. *Herm. par. t. 18. Gaertn. de fr. et
sem. cent. 5. t. 74. f. 9.*

narcissi- 26. A. floribus umbellatis, seminibus depresso-ovalibus nudis.
flora. *Mant. p. 406. Jacq. flor. aust. 2. t. 159.*

thalictroi- 27. A. floribus umbellatis, foliis caulinis simplicibus verticilla-
des. *Pluckn. alm. t. 106. f. 4.*

fascicula- 28. A. floribus umbellatis congestis, foliis multifidis. Tour-
ta. nef. it. 3. t. 92. an varietas narcissiflorae?

695. ATRAGENE. *Cal. 4phyllus. Petala 12. Filamenta exteriora petaloidea. Caps. plures, plumosō-caudatae.*

japonica. 1. A. erecta, foliis oppositis triternatis: foliolis ovatis incisis. Thunb. flor. jap. p. 239.

alpina. 2. A. foliis duplicato-ternatis ferratis, petalis exterioribus quaternis. Mill. ic. t. 284. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 74 f. 8. β) Jacq. flor. austr. 3. t. 241.

capensis. 3. A. foliis ternatis: foliolis incisis dentatis, petalis exterioribus quinis. Munt. p. 406.

polyga- 6. A. foliis caulinis ternatis: ramuscilorum simplicibus, flo-
ribus dioicis. Jacq. Stirp. amer. piēt. t. 261. f. 244.

tenuifolia. 4. A. foliis duplicato-pinnatis: pinnulis linearibus integris.
Suppl. p. 270.

zeylanica. 5. A. cirrhis diphyllis.

696. CLEMATIS. *Cal. o. Petala 4, rarius 5-6. Stili persistentes. Caps. plures caudatae. Recept. capitatum.*

* *scandentes.*

cirrhosa. 1. Cl. foliis simplicibus, caule cirrhis oppositis scandente, pe-
dunculis unifloris lateralibus.

crispa. 2. Cl. foliis simplicibus ternatisque: foliolis integris trilobisve.
Dill. b. Elth. t. 73. f. 84.

virginia- 3. Cl. foliis ternatis: foliolis cordatis sublobato-angulatis scan-
da. dentibus, floribus dioicis. Albin. annot. acad. I. t. 7.

japonica. 4. Cl. foliis ternatis: foliolis elliptico-ovatis ferratis, floribus cylindricis. Thunb. flor. jap. p. 240.

5. Cl.

- Tour.
Fila-
idea.
cau-
ncifis.
squa-
nt. 5.
riori-
, flo-
egris.

Sti-
ires
um.

pe-
isve.

can-
7.
ibus

Cl.
- Forsteri. 5. Cl. foliis ternatis: foliolis cordato-ovatis crenato-incisis, pedunculis ramosis trichotomis diphylloides, floribus poly-petalis dioicis. *Forster fl. austr. p. 42. an eadem cum hexapetala?*
- panicula. 6. Cl. foliis ternatis: foliolis ovatis integris mucronatis, pedunculis axillaribus paniculatis diphylloides. *Forst. fl. austr. p. 42. an hujus tribus?*
- dioica. 7. Cl. foliis ternatis integerrimis, floribus dioicis. *Sloan. hist. jam. I. t. 128. f. I.*
- orientalis. 8. Cl. foliis compositis: foliolis incisis angulatis lobatis cuneiformibus, petalis interne villosis. *Dill. b. Elth. t. 119. f. 145.*
- hexapeta. 9. Cl. foliis compositis: foliolis ovatis ferratis, pedunculis dilata. phyllis, corolla patente hexapetala. *Suppl. p. 271.*
- Viticella. 10. Cl. foliis compositis decompositisque: foliolis ovatis sublobatis integerrimis. *Kniph. bot. orig. cent. II. n. 30.*
- Viorna. 11. C. foliis compositis decompositisque: foliolis quibusdam trifidis. *Dill. b. Elth. t. 188. f. 444.*
- florida. 12. Cl. foliis decompositis: foliolis binatis ternatisque, petalis ovatis. *Thunb. flor. jap. p. 240.*
- reticulata. 21. Cl. foliis pinnatis quadrijugis: foliolis ovatis integris reticulatis, foliis floralibus simplicibus. *Walt. flor. carol. p. 156.*
- Vitalba. 13. Cl. foliis pinnatis: foliolis cordatis scandentibus. *Jacq. flor. austr. 4. t. 308. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 74. f. 3.*
- Flammea. 14. Cl. foliis inferioribus pinnatis laciniatis: summis simplicibus integerrimis lanceolatis. *Knorr del. hort. I. t. C. 9.*
- Pallasii. 15. Cl. caule subflexuoso, foliis oppositis pinnatis; terminali tripartito, floribus subseptenis hexapetalis. *Pallas it. 3. p. 735. t. Q. f. 2.*
- ** *Erectae.*
- finensis. 16. Cl. caule debili, foliis quinato-pinnatis: foliolis lanceolatis. *Bladh. apud Retz. obs. bot. 2. p. 18. t. 2.*

maritima. 17. Cl. foliis pinnatis linearibus, caulis simplicibus hexagonis,
crecta. 18. Cl. foliis pinnatis: foliolis ovato-lanceolatis integerrimis,
caule erecto, floribus pentapetalis tetrapetalisque. *Jacq. flor. austr. 3. t. 291.*

integri- 19. Cl. foliis simplicibus ovato-lanceolatis, floribus cernuis.
folia. *Jacq. flor. austr. 4. t. 363.*

ochroleu- 20. Cl. foliis simplicibus ovatis pubescentibus integerrimis, flo-
ca. *Pluckn. mant. t. 379. f. 5.*

697. THALICTRUM. Cal.o. Petala 4-5. Caps. plures, rostellatae.

alpinum. 1. Th. caule simplicissimo subnudo, racemo simplici terminali.
Flor. dan. t. II.

simplex. 2. Th. caule simplicissimo folioso angulato. *Mant. p. 78. Flor. dan. t. 244.*

contor- 3. Th. caule ancipi, fructibus pendulis triangularibus con-
tum. tortis.

aquilegi- 4. Th. caule tereti, fructibus pendulis triangularibus rectis.
folium. *Jacq. flor. austr. 4. t. 318.*

atropur- 5. T. caule tereti stricto pluries ramoso nebuloso, fructibus pen-
pureum. dulis triangularibus rectis. *Jacq. b. Vind. 5. t. 61.*

lucidum. 6. Th. caule sulcato folioso, foliis linearibus carnosis. *Pluckn. alm. t. 65. f. 5.*

nigricans. 7. Th. caule sulcato folioso, foliolis acute trilobis, panicula
multiplici erecta. *Jacq. flor. austr. 5. t. 421.*

flavum. 8. Th. caule sulcato folioso, foliolis acute trifidis, panicula
multiplici erecta densa, floribus erectis.

longifo- 9. Th. caule sulcato divaricato, foliis pinnatis longissimis cras-
lium, panicula diffusa. *Krock. flor. filef. 2. 1. p. 242. an
distincta species?*

foetidum. 10. Th. caule paniculato filiformi ramosissimo folioso. *Pluckn. alm. t. 65. f. 4.*

II. Th.

- agonis.
rrimis,
Jacq.
ernuis.
is, flo-
Caps.
•
ninali.
Flor.
s cor-
rectis.
is pen-
luckn.
nicula
nicula
s craf-
.2. an
luckn.
Th.
- elatum. 11. Th. caule tereti paniculato, foliis multipartitis: foliolis cordatis ovatisve obtusis incisis. *Jacq. b. Vind.* 3. t. 90.
- majus. 12. Th. foliis multipartitis, floribus cernuis, ramis floriferis ex eadem axilla binis vel ternis. *Jacq. flor. austr.* 5. t. 420.
- medium. 13. Th. foliis multipartitis: foliolis lanceolatis incisis, floribus erectis. *Jacq. b. Vind.* 3. t. 96.
- minus. 14. Th. foliis sexpartitis; foliolis cordato-subrotundis tripartitis, panicula ampla patente: floribus cernuis. *Flor. dan.* t. 732. *Jacq. fl. austr.* 5. t. 419.
- rugosum. 24. Th. caule stricto, foliolis rugosis venosis: lobulis obtusis. *Ait. hort. Kew.* 2. p. 262.
- sibiricum. 15. Th. foliis tripartitis: foliolis subreflexis argute incisis, floribus cernuis. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 5. t. 74. f. 7.
- purpurea. 16. Th. foliis tripartitis, caule foliis duplo altiore, floribus cernuis. *cens.*
- folio- 17. Th. foliis tripartito-pinnatis: stilos basi alatis. *Suppl. p. 271.*
deum.
- angusti- 18. Th. foliolis lanceolato-linearibus integerrimis. *Jacq. b.*
folium. *Vind.* 3. t. 43.
- dioicum. 19. Th. floribus dioicis.
- tubero- 20. Th. floribus pentapetalis, radice tuberosa. *Mill. ic. t.*
sum. *265. f. 2.*
- Cornuti. 21. Th. floribus pentapetalis, radice fibrosa.
- carolina- 22. Th. floribus pentapetalis, foliis palmatis. *Walt. flor.*
num. *carol. p. 157.*
- stami- 23. Th. filamentis petaliformibus lanceolatis. *Suppl. p. 271.*
neum.

HAMADRYAS. *Flores dioici. Cal. 5-6phyllus. Petala 10-12 linearia, longa.*
♀. Germ. in capitulum collecta. Stil. o. Caps. ispermae.

magella. 1. HAMADRYAS. *Jussieu gen. plant. p. 232.*
nica.

698. ADONIS. *Cal. 5phyllus. Petala quinis plura.*
nectarium o. Caps. ispermae; clausae.

aestivalis. 1. A. floribus pentapetalis fructibus ovatis. *Knorr del. hort.*
t. 2. t. A. 12.

austum- 2. A. floribus octopetalis, fructibus subcylindricis, corollis atro-
 nalis. purpureis. *Curt. flor. Lond. t. 135. β) Adonis flore*
citrino.

miniata. 3. A. floribus octopetalis, fructibus subcylindricis, corollis
 miniatis. *Jacq. flor. aust. 4. t. 354. an ab autumnali*
satis distincta?

flammea. 4. A. floribus octopetalis, calicibus hirsutis, fructibus cylindricis. *Jacq. flor. aust. 4. t. 355.*

vesicato- 5. A. floribus decapetalis, foliis bitemnatis: foliolis ferratis glabra. *Suppl. p. 272.*

capensis. 6. A. floribus decapetalis, fructibus depresso- foliis bitemnatis: foliolis ferratis glabris. *Suppl. p. 272. Burm. afr. t. 51.*

vernalis. 7. A. flore dodecapetalo, fructu ovato. *Jacq. fl. aust. 1.*
t. 44.

apennina. 8. A. floribus pentadecapetalis. *Mentz. pug. t. 3. f. 1.*

699. RANUNCULUS. *Cal.* deciduus 5phyllus (rarius 3phyllus). *Petala* 5 (rarius 2-3 aut 8) intra unguis squamula vel poro mellifero. *Stili* persistentes. *Sem.* incrassata, erecta.

* *foliis indivisis.*

Ficaria. 1. R. foliis cordatis angulatis petiolatis, caule unifloro: floribus octopetalis; calice triphylo. *Curt. flor. Lond.* t. 76.

plantaginifolia. 2. R. foliis cordato-ovatis apice integris tridentatis, flagellifolius. *Jacq. h. Vind.* 3. t. 31.

parnassia. 3. R. foliis subovatis nervosis lineatis integerrimis petiolatis, foliis floribus umbellatis.

nodiflora. 4. R. foliis ovatis petiolatis, floribus sessilibus. *Pet. gaz.* t. 25. f. 4. β) *Pet. gaz.* t. 24. f. 9.

amplexicaulis. 5. R. foliis ovatis acuminatis amplexicaulibus, caule multifloro, radice fasciculata. *Morif. bifl. pl.* 2. t. 30. f. 36.

bullatus. 6. R. foliis ovatis ferratis, scapo nudo unifloro. β) *Morif. b. plant.* 2. t. 31. f. 49-51.

Flammula. 7. R. foliis ovato-lanceolatis petiolatis, caule declinato. *Flor. dan.* t. 572.

Lingua. 8. R. foliis lanceolatis, caule erecto. *Mant. p.* 407. *Flor. dan.* t. 754.

graminea. 9. R. foliis lanceolato-linearibus, caule erecto laevissimo: paucifloro. *Bulliard herb. Franc.* t. 123.

pyrenaica. 10. R. foliis linearibus, caule erecto striato subbisfloro. *Mant. p.* 248. *Jacq. misc. austr.* 1. t. 18. f. 1.

reptans. 11. R. foliis linearibus, caule repente. *Flor. dan.* t. 108.

Thora. 12. R. foliis reniformibus subtrilobis crenatis: caulinis sessili, floralibus lanceolatis, caule subbifloro. *Jacq. flor. austr.* t. 442.

** *foliis dissectis divisisque.*

¶ *diversis.*

creticus. 13. R. foliis radicalibus reniformibus crenatis sublobatis: caulinis tripartitis lanceolatis integerrimis, caule multifloro.

auricō- 14. R. foliis radicalibus reniformibus crenatis incisis: caulinis digitatis linearibus, caule multifloro. *Flor. dan.* t. 665. *an mera varietas acris?*

polymor- 51. R. foliis radicalibus subrotundis petiolatis, caulinis sessili-
phus. *digitatis* foliolis integerrimis. *Allion. flor. pedem.*
t. 67. f. 3. 4.

cassubi- 15. R. foliis radicalibus subrotundo-cordatis crenatis: caulinis
cus. *digitatis dentatis*, caule multifloro.

abortivus. 16. R. foliis radicalibus cordatis crenatis: caulinis ternatis an-
gulatis, caule subtrifloro.

alpestris. 17. R. foliis radicalibus subcordatis obtusis tripartitis: lobis
trilobatis; caulino lanceolato integerrimo, caule subuni-
floro. *Jacq. flor. austr.* 2. t. 110.

nivalis. 18. R. foliis radicalibus palmatis: caulinis multipartitis sessili-
bus, caule unifloro, calicibus hirsutis. *Jacq. flor. austr.* 2.
t. 325. 326. *an mera acris varietas?*

nitidus. 50. R. foliis caulinis nitidis trifidis: laciniis obtusis. *Walt.*
flor. carol. p. 159.

sceleratus. 19. R. foliis inferioribus palmatis: summis digitatis, fructibus
oblongis. *Flor. dan.* t. 570.

acris. 20. R. foliis tripartito-multifidis: summis linearibus, pedun-
culis teretibus, calicibus patulis. *Curt. flor. Lond.* t. 20.

- sessili,
aust.
s: cau-
tifloro.
aulinis
z. 665.
sessili-
pedem.
aulinis
tis an-
lobis
abuni-
sessili-
fr. 2.
Walt.
tibus
edun-
t. 20.
I. R.
- hetero- 21. *R. foliis submersis capillaceis: emersis reniformi-palmatis.*
phyllus. Leyss. fl. bal. n. 555.
- asiaticus. 22. *R. foliis ternatis binternatisque: foliolis trifidis incisis, caule inferne ramoso.* Mill. ic. t. 216.
- multifi- 23. *R. foliis multifidis: inferioribus pinnatis, caule multifloro,*
dus. calice corollam aquante. Forsk. flor. aeg. arab. p. 102.

¶ *foliis uniformibus.*

- parviflo- 24. *R. foliis simplicibus laciniatis acutis hirtis, caule diffuso,*
rus. feminibus muricatis. Pluckn. alm. t. 55. f. 1.
- murica- 25. *R. foliis simplicibus lobatis obtusis glabris, caule diffuso,*
tus. feminibus aculeatis. Pr. Alp. exot. p. 262. ic. Gaertn.
de fr. et sem. cent. 5. t. 74. f. 4. an specie distinctus ab
arvensi?
- hederace- 26. *R. foliis subrotundis trilobis integerrimis, caule repente.*
us. Flor. dan. t. 321.
- parvulus. 27. *R. hirtus, foliis trilobis incisis, caule erecto subunifloro.*
Mant. p. 79. Col. ecphr. t. 316.
- Ianugino- 28. *R. foliis trifidis lobatis crenatis holofericeis, caule petiolis-*
fus. que hirsutis, pedunculis teretibus, calicibus patulis. Flor.
dan. t. 397.
- glacialis. 29. *R. foliis multifidis, caule bifloro, calicibus hirsutis.* Flor.
dan. t. 29.
- orientalis. 30. *R. foliis multifidis, calicibus reflexis, feminibus spinoso-*
subulatis recurvis.
- grandiflo- 31. *R. foliis multifidis: caulinis alternis sessilibus, caule erecto*
bifolio.
- aquatilis. 32. *R. foliis multifidis capillaceis: laciniis divergentibus.* Col.
ecphr. I. t. 316.

- flaviati- 33. R. foliis multifidis capillaceis : laciniis parallelis. *Flor. dan. t. 376.*
- falcatus. 34. R. foliis multifidis filiformi-ramosis, scapo nudo unifloro, seminibus falcatis. *Jacq. fl. aust. I. t. 48.*
- polyan- 35. R. foliis multipartitis, caule erecto, pedunculis sulcatis, themos. calicibus patulis. *Lob. ic. 666.*
- Colum- 52. R. foliis rotundis nitentibus quinquefidis : laciniis bis trifidae, floribus terminalibus. *Allion. flor. pedem. t. 67. f. 3. 4.*
- Breynii. 53. R. foliis tripartitis subtus hirsutis, receptaculis lanuginofisis. *Crantz stirp. aust. t. 4. f. 2.*
- monspeli- 36. R. foliis tripartitis crenatis, caule simplici villoso subnudo acus. unifloro.
- Iaponni- 37. R. foliis tripartitis lobatis obtusis, caule subnudo unifloro. cus. *Flor. dan. t. 144. 331.*
- platanifo- 38. R. foliis palmatis laevibus incisis, caule erecto, bracteis linearibus. *Mant. p. 79. Flor. dan. t. III.*
- hirsutus. 39. R. hirsutus, foliis trilobis, caule hirsuto, radice fibrosa annua, calicibus papilloso-hispidis acuminatis demum reflexis. *Curt. flor. Lond. t. 80.*
- paludo- 49. R. foliis inferioribus tripartito-multifidis incisis : superioribus fus. simplicissimis linearibus. *Poir. voy. en Barbar. 2. p. 184.*
- bulbosus. 40. R. foliis compositis, caule erecto multifloro, pedunculis sulcatis, calicibus retroflexis. *Curt. flor. Lond. t. 40.*
- repens. 41. R. foliis compositis, stolonibus repentibus, pedunculis sulcatis, calicibus patulis. *Flor. dan. t. 795. an mera bulbosa varietas?*
- chaero- 42. R. foliis compositis linearibus multifidis, caule erecto unifloro, pedunculis sulcatis, calicibus retroflexis. *Col. ecphr. I. t. 511.*

- Flor. arvensis.* 43. R. foliis superioribus decompositis linearibus, seminibus aculeatis. *Flor. dan. t. 219.*
- nifloro,* *rutaefoli-* 44. R. foliis supradecompositis, caule simplicissimo unifolio
us. unifloro, radice tuberosa. *Moris. hist. pl. 2. t. 31. f. 54.*
- ulcatis,* *illyricus.* 45. R. foliis ternatis integerrimis lanceolatis. *Jacq. flor. aust.*
3. t. 222.
- is trifl-* 46. R. foliis ternatis trifidis, caule multifloro, calicibus retro-
t. 67. flexis. *Thunb. flor. jap. p. 241.*
- pensylva-* 47. R. foliis ternatis trifidis incisis subtus pilosis, caule erecto,
nicus. calicibus reflexis. *Suppl. p. 272. Jacq. pl. rar. ic. cent.*
1. t. 62.
- ibnudo* *aconitifo-* 48. R. foliis quinatis lanceolatis inciso-ferratis. *Baub. hist.*
nifloro. *lius.* *pl. 3. p. 844.*

700. TROLLIUS. *Cal. o. Petala circiter 14. Caps.*
plurimae, ovatae, poly-
spermae.

- europae-* 1. Tr. corollis conniventibus, nectariis longitudine staminum.
us. *Flor. dan. t. 133.*
- asiaticus.* 2. Tr. corolla patula, nectariis stamina superantibus. *Buxb.*
cent. I. t. 22.

701. ISOPYRUM. *Cal. o. Petala 5. Nectaria 3fida,*
tubulata. Caps. leguminosae recurvae, polyspermae.
Sem. globosa.

- fumarioi-* 1. I. stipulis subulatis, petalis acutis. *Amm. ruth. t. 12.*
des. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. t. 65. f. 5.*

thalictrois. 2. I. stipulis ovatis, petalis obtusis. *Jacq. fl. austr.* 2.
des. t. 105.

aquilegioides. 3. I. stipulis obsoletis. *Morif. hist. pl.* 3. t. 11. f. 5.

702. HELLEBORUS. *Cor. o. Cal. 5phyllus, saepe coloratus. Nectaria zlabiata, tubulosa. Caps. polyspermae, erectiusculae, rostratae, leguminosae.*

hyemalis. 1. H. flore folio insidente. *Mant. p. 408. Jacq. flor. austr.* 3.
t. 202.

trifolius. 2. H. scapo unifloro, foliis ternatis. *Flor. dan.* t. 566.

niger. 3. H. scapo subbifloro subnudo, foliis pedatis. *Mant. p. 408. Jacq. flor. austr.* 3. t. 201.

viridis. 4. H. caule bifido, ramis foliosis bifloris, foliis digitatis.
Mant. p. 408. Jacq. flor. austr. 2. t. 106. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 4. t. 65. f. 2.

foetidus. 5. H. caule multifloro folioso, foliis pedatis. *Blackw. herb.*
t. 57.

703. CALTHA. *Cal. o. Petala 5. Nectaria o.
Caps. plures, polyspermac.*

palustris. I. CALTHA. Flor. dan. t. 668.

HOUTTUYNIA. *Cal. 4phyllus. Cor. o. Stamina
pistillis mista.*

cordata. I. HOUTTUYNIA. Thunb. n. act. Stockb. 1783. p. 149. t. 5.

704. HYDRASTIS. *Cal. o. Petala 3. Nectaria o.
Bacca composita acinis
1spermis.*

*canaden- I. HYDRASTIS. Mill. ic. 290. t. 285. β) H. carolinensis.
sis. Wait. flor. carol. p. 156.*

1067. SAGITTARIA. *Flores monoici. Cal. 3phyl.*

lus. Cor. 3petala.

♂. Filamenta fere 24.

♀. Sem. multa, nuda.

sagittifolia. 1. *S. foliis sagittatis acutis. Flor. dan. t. 172.*

obtusifo- 2. *S. foliis sagittatis obtusis, caule ramoso. Pluckn. alm.
lia. t. 200. f. 1.*

lancifolia. 3. *S. foliis lanceolato-ovatis. Plum. ic. 116. f. 1.*

natans. 4. *S. foliis natantibus oblongo-acutis trinerviis. Pallas it. 3.
p. 757. t. G.* f. 3.*

acutifolia. 5. *S. foliis subulatis. Suppl. p. 419.*

trifolia. 6. *S. foliis ternatis. Pet. gaz. t. 19. f. 3.*

phyl.

alm.

it. 3.

