

dorsali

CLASSIS II.
A V E S.

*Ipsi laetitia voces ad fidera mittunt
Intonosi montes, ipsae jam carmina rupes,
Ipse sonant arbusta.*

VIRGIL. ecl. V. 62.

AÈREAE vocales Volucres pulcherrimae, *Mandibulis protractis nudis,*
Corpo pennis imbricato. Alis duabus pennatis volitantes bipedes
dignoscuntur.

AVES levissimae modici ponderis et magnitudinis, tectae pennis plumisque, destitutae *Auriculis, Labiis, Scroto, Dentibus, Utero, Venica urinaria, Epiglottide, Fornice, Corpore calloso, Diaphragmate.*

PENNAE avibus propriae imbricatum in quincuncem dispositae, interstinctae *Plumis*, distinctae a *Remigibus Reelectricibusque*, omnes supra convexae, subitus concavae: latere exteriore angustiores; interiore latiores; anteriore laxiores; posteriore strictiores; scilicet e baseos cylindro tubulo referto aerifero vase lymphaticis simili, *Rachi elongatae, bifariae radiis parallelis approximatis distinctis* itidem pinnatis ancipites.

*Colore ludunt, sed variant aetate, sexa, tempestate, climate; constantiores Remiges et Relectrices, quae attente notandae. *)*

Nuda cutis utrinque ad colli latera a capite versus interscapulum, ab axillis per latera pectoris fere ad inguina et ad femora postica.

OVA his animalibus communia (p. 8. n. 4.) numero diversis vario, sed majora pro mora exclusionis siccae, semper putamine calcareo obtecta, incubatu calido excludenda Parentis, in *Nido* artificio.

Trachea multis musculis munita, annulis constat mere cartilagineis, in nonnullis avibus ipsa adeo branchia.

Receptacula aërea per totum corpus dispersa, ad volatum cantumque summe necessaria cum pulmonibus aut ore commercium alentia, ut pro arbitrio aëre vel impleri vel evacuari possint; hue spectat tela cellulosa abdominalis subaxillaris aliaque subcutanea, potissimum vero (exceptis scolopacibus, fulicis, et anseribus) osia intus cava et

P 5

medul-

*) Att. Stockh. 1740. p. 370. t. I. f. 10. II.

medullae expertia, femoris, brachii, sterni, costae, coxae, humeri, claviculae, dorsi quoque spina, in paucioribus cranium aut maxilla inferior, in quae posteriora per os aut tubum Eustachii intrat aer.

DIVIDITUR Avium corpus in *Caput*, *Truncum*, *Artus*.

Caput tegitur supra *Pileo* e *Vertice*, *Fronte* et *Occipite* unitis, cingens rostrum antice *Capistro*, in quo *Lora* e lineis duabus nudis a rostro ad oculos ducta; *Orbitae* ambiant oculos, supra quos *Supercilia*; inter oculos et aures *Tempora*; inter oculos vero et gulam *Genae* sunt.

Rostrum in variis varium: *Rectum*, *Incurvum*, *Recurvatum*, *Teres*, *Compressum*, *Depressum*, *Conicum*, *Subulatum*, *Cylindricum*, *Angularium*, *Cultratum*, *Fornicatum*, *Uncinatum*.

Mandibulae nudaedentulæ, quibusdam pone apicem *emarginatae*, paucis *serratae*, exorrectæ in *Rostrum* cornuum, *Naribus* pertusum, superioris basi quibusdam *Cera* nuda vestita, *Vibrissis* pectinatum ciliatis ad fauoris exterioris margines.

Lingua carnosa, cartilaginea, emarginata, lacera, pennacea, ciliata, *integra* s. acuta.

Oculi laterales *Palpebris* *Membranaque* nictante detergendi; lente crystallina mobilissima, in loculis nigris, plicatis, conicis recondita. *Superciliorum* loco interdum linea picta, rarius carunculata.

Aures truncatae absque auriculis, quarum loco pennae strigibus longae.

Barba *Myctacea* ad mandibulas inferiores, mobilis *Momotae*, *Pendulino*; in ipso pectore pendula *Meleagridi* adulto; at *Capistrum* reversum tegit basin rostri *Corvis*, *Picis*, *Strigibus*.

Crista pennacea pilei *Frontalis*, *Verticalis*, *Occipitalis*, *Erecta*, *Recurvata*, *Deflexa*, *Plicatilis*, *Compressa*; *Carunculae* vero carnosæ nudaæque *Frontis*, *Verticis*, *Nuchæ*, *Superciliorum*, *Gulæ*, *Juguli*, sunt ornamenta capitis in variis.

Collum elongatum, erectiusculum, teres, supra incipit *Nucha*, continuatur *Cervice*; infra vero incipit *Gula*, continuatur *Jugulo*.

TRUNCUS ovatus constans *Dorso* coadunato macro, subtus supra *Sternum* magnum carinatum musculoſissimo *Pectore*, *Claviculis* coadunatis in *Fyrcam*, *Abdomine* minore, postice sub uropygio perforato *Ano*, genitalibus communi, et terminato *Criſſo*.

ARTUS sunt *Brachiales Alae*, veri *Pedes*, *Caudale Uropygium*.

ALAE compressæ, *Oſſium* articulis mobiles, *tectæ* *Pennis*, demum *Teetribus* primis secundisque, postice ciliatae *Remigibus*; explicantur hæ in forniciatum ventilabrum volitanti; complicantur stabulanti primoribus subcuntibus secundarias, ut hæ latere anteriore depin-

humeri,
maxilla
at aer.

s, cin-
nudis a
Super-
gulam

Teres,
n, An-

inatae,
pertu-
s pecti-

ciliata,

lente
ondita.

rigibus

Pend-
um re-

a, Re-
arnofae
ic, Ju-

, con-
lo.

n Ster-
coadu-
erfora-

emum
olican-
stabu-
eriore
depin-

depingant specificum *speculum* nitidum Anatum; nec deficiunt, nisi in *Impennibus pelagicis* (*Diomedea demersa*, *Alca impenni*) vel *vo- latui ineptis* (*Struthione*, *Dido*).

OSSA α . *Brachii* 1 elongatum. β . *Cubiti* 2 elongata. γ . *Carpi* 2 brevissima. δ . *Metacarpi* 2 connexa mediocria. ε . *Digitii* 2 attenuata, altero majore biarticulato, compresso; altero minuto. ζ . *Pollicis* vero 1 minutum, insidens basi anteriori metacarpi, raro *spina evadens* (*Parris*, *Charadrio*, *Struthioni*) adjacente spina setacea.

REMIGES Primores X: quorum 1—4 *Digitii*, 5—10 *Metacarpi*; Secundarii 10—20 f. 28 *Cubiti*, nulli vero *Brachii*; at *Alula* spuria pennis 3 f. 5 *Pollici* infidet.

PEDES ex Femore, Tibia, Digitis, Unguis.

FEMORA ex Osse Femoris Crurisque binis altero setaceo, carnofa, pennis tecta, praeterquam cruribus denudatis in vadantibus Grallis; ceterum plerisque aequilibrio supposita, nisi in *Compedibus* ambulare nesciis, quibus intra commune abdominis tegmen recondita (*Alcis*, *Colymbis*); nonnullis *Armillae* supra genua cingunt coloratae.

TIBIAE ex osse Tarsi elongato, macres, angustae, tendinosae, nudae, rariusve *villosoe plumosaeve*, paucis postice *Spina calcara- tae*, in primis masculis.

DIGITI e Metatarsi phalangibus, plerumque IV, quorum unus posticus breviorque, intermedius anterior vero longior, sed *Scan- soriis* digitii antici 2, posticique 2; *Cursoriae* vero postico destituantur *tridactylae* (*Charadrius*, *Haematopus*, *Otis*, *Casuarius*), rarissime *didaactylae* (*Struthio Camelus*). Sunt vero Digitii distincti *Fissipedibus* plerisque; vel intermedius adnatus laterali *Gressoriis*; vel anteriores intertexti membrana integra *Natato- riis*; quae fissa in *Lobatis*, vel basi tantum intertexta *Semipalma- tis* vadantibus, vel articulus membranula marginali *Pinnatis*.

UNGUES acuti, quibusdam obtusi, paucis marginati, paucissimis muticis nulli.

UROPYGIUM sessile, cordatum, glandula gemina caudae brevi adposita tumidum, supra pertusum *Poro oleifero*, cincto Penicillo, ambitu ciliatum Rectricibus Caudae:

RETRICES saepe XII (1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1); plures (18) Gallinis; pauciores (10) Picis (*Pico*, *Certhiae*, *Cuculo*, *Yungi*, *Bucero*, *Ramphasto*, *Trochilo*).

CAUDA

CAUDA inde vel Pedibus brevior *brachyuris*, vel longior *macrouris*; ex Rectricibus aequalibus *integra*, vel ad latera per gradus brevioribus *cuneata*, aut lateralibus longioribus *fornicata*, in quibus omnibus Rectricibus complicatis subeunt laterales intermediae.

VOLATILES hae, Telluris vigiles libidinosique musici, cantu tamen aut amorum interprete, aut adscitio; pleraque *Diurnae*; paucae *Nocturnae* (e. g. *Striges*, *Caprimulgus*), quarum variae Noctu cantant (*Luscinia*, *Turdi*) et Mane (*Tetraones*, *Gallinacei*), pleraque inermes sunt, cum Alarum remigibus se facile in aethera recipient ab hostibus terrestribus, et Caudae rectricibus aereos diverso volatu eludant, nisi in terra negotiari necesse sit, quibus odor vel ingratus hostes arceat, vel abolitus occultat; dum aliae speculantur hostem appropinquantem indicantque aliis: *Lanius*, *Yunx*, *Parra*, *Hematopus*, *Meleagris*, *Hirundo purpurea* etc.

ARMA paucis, praeter *Rostrum* et *Ungues* plerisque.

Cornua Meleagridi cornutae, *Palamedaeae*.

Calcaria Pavoni, *Phaiano*, *Tetraoni*.

Spinae (pollicares) Struthioni Cameloi, *Parrae*,
Charadrio spinoso, *Palamedaeae*.

VENERE monogama junguntur pleraque Aves, polygama pauciores, ut Gallinac, Anates. Illae utriusque sexus conjunctis viribus struunt nidum saepe artificiosissimum (pendulum, natantem, concameratum, argillosum, foraminosum, nullumve) uteri succedaneum, incubant sedulac ovis (1 *Alca*, 2 *Colymbus*, 3 *Larus*, 4 *Corvus*, 5-8 *Hirundo*, pluribus Anates, Gallinac), pullos famelicac alunt (ostenendo, porrigendo, regurgitando,) fovent, curant, pro aris et foecis defendunt,*) dum in his orientur mares. Nuptias celebrant vestitu, musica, ludibus pleraque.

MIGRATIONES annuas inter septentrionales aestivas et australes hybernatas plagas arcticae Telluris plures instituunt internuncii hi naturae, ne hyeme demergerentur boreales omnes insectivoreae. Sic migrant plurimi *Passeris* in primis *tenuirostris*, ob defectum insectorum; *Grallae* ob denegatum glacie aditum vermis et amphibiis: *Anseres* ob congelatas aquas includentes pisces etc. Revocant vero easdem Dies aestatis longiores, ciborum copia, densiores vestitus, nuptiae paratae. Pauciores hybernant.

HABITANT aliae intra *Tropicos*, ut *Phaeton*; intra *Polos*, ut *Procellaria glacialis*; aliae alibi, ad *Africæ* promontorium australe *Procellaria capensis*; in *India Paradilea*, *Pavones*; in *Africa Struthio I. Pele-*

*) *Mos. Deuteronom. XXII. 6, 7.*

Pelecanus I. in *America* Palamedea, *Psophia*. In *Pelago* impennes coimpedes; in *Mari Procellariae*; in *Lacubus Colymbi*; in *Fluviis* *Mergi*; in *Cataractis* *Cinclus*; in *Littoribus Charadrii*; in *Paludibus* *Scolopaces*, *Tringae*; in *Campis Otis*, in *sylvis* *Lanius* insatius; in *Arboribus Passeres*; in *Rupibus* *Bubo*; in *Pagis Pica*, *Hicundo*; in *Alpibus* *Turdus roseus*, *Emberiza nivalis* etc.

VICTUS cuique suus. Aliae Carnivore: vorant *Cadavera* *Accipitres*, *Corvi*; *Pisces Anseres*; *Insecta Passeres tenuirostres*, et *trochili*; *Larvas cochleasque cornix*; *Larvas Cerambycum Pici*; *Lepidopterorum Cuculus*; *Ricinos Crotophaga*; *Oestros Buphaga*; *Oniscos Cinclus*; *Phryganeas Hirundines*; *Conchas Haematopus*; *Caneros Mycteria*, *Cancroma*; *Squillas Recurvirostra*, *Lumbricos Crex*. Aliae *Phytiphagae*: viuent *Plantis Anseres*; *Pomis Pittaci*; *Nucibus Caryocatactes*; *Nucleis Coccothraustes*; *Strobilis Curvirostra*, *Enucleator*.

OPERA, nec sine fructu, peragunt sua singulae: sedentes *Accipitres* *Cadavera* auferunt, ut vivis parcent; incedentes *Picae Quisquillias* impuras verminolasque devorant; natantes *Anseres Aquarum nimios hospites* minuunt; vadantes *Grallae* inquirunt in *Paludum* animalecula; currentes *Gallinae* decidua grana legunt; salientes *Passeres arbutorum herbarumque Semina* *Insectaque carpunt*; eoque varia semina *Piscium*, *Insectorum*, *Plantarumque* saepius in remotissima loca deferunt naturae disseminatores. Conquiruntur *Venatu*; *Falconaria*; *Aucupio*; instituantur *Faltones ad venatum*, *Parrae ad pastoritiam*, *Pelecani ad piscaturam*, *Passeres ad musicam*. Manuescunt *Gallinae*, *Anates*, *Passeresque variii*. In *Ornithone faviario* coluntur ob *carnes*, *ova*, *plumas*, *pennas*, *pulchritudinem*, *sonum*.

HISTORIA Avium absolvitur *Descriptione*, *Habitatione*, *Volatu*, *Migratione*, *Nuptiis*, *Nidificatione*, *Ovatione*, *Incubatione*, *Educatione*, *Victu*.

GENERUM Characteres defumendi a *Rostro*, *Lingua*, *Naribus*, *Cera*, *Caruncula*, reliquisque partibus denudatis.

ORNITHOLOGI eminentiores in Veteres et Recentiores dispescuntur.

VETERUM *Bellonius 1557* et *Gesnerus 1555* patres artis; horum aves colligit et auxit *1599 Aldrovandus*, *Brasilenses novas addente Marcgravio 1648*; has omnes digessit et auxit *Willughby cum suo Rajo 1713*, iconesque varias dedit *Marsiglius 1726*.

RECENTIORES vivis *Coloribus nova luce* illustrarunt artem, *Europaeas Albinus 1731*, *Europae meridionalis (1772-1782) Bernini*, *Sardas (1776) Cetti*, *Germanicas Frischius 1734*, *belgicas (1770-1778) Noze-*

Nozemannus et *Seppii*, suecicas nonnullas *Tengmalm*, borussicas *Bockius*, britannicas *Hages* 1775, has aequae ac indicas 1768–1777. *Pennantus*, rariorum novarumque avium Centuriam unam *Catesby* 1731, tres et ultra centuriā pulcerrimas *Edwards* 1745, centuriā novem et ultra (ab anno 1775) *Daubentonius*, pauciores Jof. Fr. Nob. a *Jacquin* 1784, Bl. *Merrem* 1784–1786, et in musei Carlionianī descriptione *Sparrmannus* 1786; ova variarum avium descrip-ta a *Günthero* pinxit *Wirsingius* (1703).

Avium anatome et physiologia multa debet *Reaumurio*, *Hemso-nio*, *Campero*, *Huntero*, *Blumenbachio*, *Merrem*, *Blochio*, *Vicq d'Azyr*, *Pallas*, *Güldenstaedtio*, *Silberschlagio*, *Malacarne*.

SYSTEMATICAM in formam aves reducere tentavit de suecicis Fauna mea 1746, *Systemaque Naturae* 1758; omnes collegit et digessit *Brissonus* 1760, cui integrum exercitum et notarum et novarum ob-tulere labores et museum magni *Reaumurii*. Nuperius idem ten-tarunt 1781 *Pennant* et 1785 *Latham*.

ASSERVANTUR vel in *spiritu vini* integrae, vel siccatae; vel exuviis integris farctis aut dimidiatis *gypso* fixato repletis, methodo *Schaefferi*.

I. AC

II. P

III.

IV.

ORDI-