

A sanguinem componit. Sed oportet prohibere frequenter eius usum, & maxime qui cholericā sunt temperātia: Nisi forte ad eos solum, qui phlegmate, & crudis, & glutinosis, & pinguibus humoribus collectis repletī sunt. Pinguor qui dem dieta nutrit etiam abundantē, attamen uentri & cpati digestione si competens sit: & cibis euchymus bonū sanguinem generat, splen autem & epar constipat. Hoc autē faciunt quæ sunt pachychyma, id est quæ pingues nutrīt humores solos, ut est lenticula. Quæ autem glutinosa, quema dmodum malua. Aliquis autem utrasq; cōtingit pacicimas esse, & glutinosa, sicut sunt ostracoterme. Cautior ergo est quæ extenuat dieta ad custodiā sanitatis eis quæ impinguat magis. Quæ autem non satis nutrīunt, uirtutem nō imponunt, necq; fortitudinem in corpore. Vnde oportet ea quæ multum nutrimentum præstant adhibere, sed mediocriter quando causam indigentia aliquis sentit. Maxime utiq; absq; periculo assumitur illis, qui exercitantur competenter, & dormiunt in quo uolunt tempore. Omnes autem qui non possunt propter exercitationē dormire, fugiāt pachychymos cibos, pigri autē neq; ad istos cibos accedāt. Maximum enim malum in sanitatis custodia omnino pigritia. Quemadmodū mediodris magis motio bonum est, ita inter spissos & tenues cibos, optimus hominibus mediocris, qui generat sanguinem secundum constitutionē competenter. Ergo talis cibus corporibus nostris ministrandus est, laxibilis enim est carochymus cibus, quem semper oportet fugere. Custodienda est autem uarietas ciborum, optimum & magnum est ut de contrarijs uirtutibus copulentur, & digestioni moderentur, quia & ea si non digeruntur, quæ assumuntur, competenter lēdunt.

DOMINI ORIBASII SARDIANI

DIANI DE VIRTUTE SIMPLICIVM MEDICAMENTORVM
AD EVNAPIVM LI
BER II,

MEDIA INTER CALIDA
& frigida.



DOMINI IANTVS, asparagus, māchantinus, brion, & splenion, glīcīrīzā succus, oleum dulce, cera, faba, castanea nucleus qui manducatur, līcius, lotus, uel ros quo caligarij utuntur, aut trīphilus, citrīz cortex, ptereus, id est, filicis radices, lentiscus, lenticula, terra cymolia, & terra samia, catinia & litargirus.

QVAE SINT QVAE
calefaciant.

Agnī folia & semē mediocriter, agalaphis semē & folia, amīgdala dulcis, anagallides utriq; andragnis, tiles aut cincus agrestis, uuāt maturā se men, lenticula, liquirīzā radix, oliuā fructus maturus, fermētum, orīngium, resinā omnis succus siccus, squīnoantus, cochlearūstā, aut cineres earū; caulis id est brassica, dactylorum fructus, rīpus, coclīm, calcucracamenon aut cnīcus, cyrocrambi, butrachij radix, & tota herba, pulegium, lauri folia, magis bacca, minus

C minus autē cortex eius radicis, diptamnus, pseudodiptamnus, elelisfagus, erisimus, lana usta, zinziber, taspia, cardamomus, capilli usti, brioniae radices, aristochiae radices, asphodeli radices, daucus, catmedaphnis, dragontex radices, oleum raphaninū, cicer, ixus, id est uiscus, caucalidis, libisticus, ferulae semen, sagapenus, satyron, sion, sinon, storax, piper, lysinon, ypiricon, alis, sulphur, sanguis, cholera, urina, sputum, carnes serpentium, adipes, salmoriades de falsis piscibus.

Q V A E S I N T Q V A E P R I M O
gradu calefaciant.

A Loës, antimisaron, absinthium, laadanum, lini semen, folium spicæ nardi, nardus celtica, uinum dulce, id est mustum, serum, triticum, fucus sicca.

Q V A E S I N T Q V A E S E C U N D O
gradu calefaciant.

O Lei feces, anethum uiride aut minus, artemisia, balsamū, elaphobus, clamus aromaticus, crocus libanotus, mastiche, mel, uinum, pycula, meliphon, prassium, propoleus, cucumeris agrestis succus, scandix, squilla, scolimbus, pastinacæ syluaticæ radix, smyrnis, terebinthi cortex & folia & fructus, foenugræcum, cameleontis utriusq; radices, camipiteas, ocimus.

Q V A E S I N T Q V A E T E R T I O
gradu calefaciant.

D **A** Brotanum & magis ustum, egypti flores, id est populi & resina, acorus, amomum, amaracus, ameus ustus, annis, arciothidus, asari radices, herba sabina, ellebori utricq; epithymus, menta, calamentis, thymus, calamus, fraxini cortex usta, caceus, cassia, citria utracq; cimici semen, conisia, cymimum, libanotum, allium, foeniculum, gitter, men, radix ruta sylvestris, rododaphnis, uinum uetus, origani omnes, opopanax, petrosilinum, ruta, raphanus, samsucus, smyrnion, hyssopus, galbanum, camitria.

Q V A E S I N T Q V A E Q V A R T O
gradu calefaciant.

A Darcis, ampilon, prassion, id est porrum syluaticum, euphorbiū, citria, oleum, costum, cepulla, lipidion, sinapis, allium, struthij radix, tithymaliscus, caustica sunt omnia hæc.

Q V A E S I N T Q V A E I N F R I G I L
dent mediocriter.

G Ramen mediocriter, elxine, id est, uitrago, mediocriter atque stipseus, apij mitreus, cataplasma omne, balaustion, rubifolia & comæ, & immaturus fructus ipsius, & flores, bromus mitreus, brion maritimus, glaucion mediocriter, dorignion nimis, calami fraginati folia mediocriter, conion nimis, lichen que in petris est, papaueres omnes, moleas fructus & folia, oliuarum comæ & immaturus fructus, oleum myrtite, sisaminum oleum, balaninū oleum, elxine que & perdition, uel uitrago dicitur, mediocriter, elimosiu folia, id est uiola & cortices eius propter dulcedinem, persicus fructus, citri carnes, amante sufficienter, omphacij succus sufficienter, amilustriticeus mediocriter, oleum roseū mediocriter, pathus de palestra, succus crudus siccus, tribuli utricq; dactylorū comæ succus, gessamia terra mediocriter, cimolia terra, cotis acutatio, molidina mediocriter, plumbum, pismithiū, scandix mediocriter, caseus mollis & recens.

Q V A E

A QV AE INFRIGIDENT PRIMO GRADU.

ACATIA non lota, atriplex absq; stipseus, sigarta, milium, hordeum, platanus, ramnus, intuba.

INFRIGIDANTIA SECVN= do gradu.

ACATIA lota, plantago, bletum, galla asiana, cucurbita, melones, malum, peponis, uua canina de hortis, lenticula desuper aqua, ficus uirides, adueri maritimus, psylli semen.

INFRIGIDANTIA TERTIO GRADU.

SEMPERIUS uterq; portulata, mandragora, cida cidonica, polygonium, flos uva, cimæ, iusquiam & flores, & semen album habens.

INFRIGIDANTIA QVARTO GRADU.

Opium thebaicum.

DESICCANTIA ABSQ VE mordicatione.

ACaliphis semen & folia, sex olei, anagallides, utraq; plantago, bromus oleidulcis cum ratione lauatus, omnibus magis tritici fermentum, extra hit de profundo & digerit, lupinus in poris fortiter, salicis folia, & plus cum ali quo stiptico, Alij autem & succos ex eis faciunt, & sine mordicatione desiccatum habet medicamen in plurima utile. Nihil enim plus utilissimum est, & sine mordicatione desiccatis, & stipticum modice medicamē. Nuces, lepus ustus leptomeris est, melius est centaurea tenuis modice fortis, cerasiæ gummi, liliū, fabæ cortex, id est babulia superposita, cupressi omnia, ciperi radicis nodus in aqua infusus, nymphæ radices, ireus sati, pétaphili radices, polypodiū, smyrna, sarcocula, stybis, tracacanti terra omnis, cathmia, asia petra & flos ipsius infusus carnes remittit, pompholix frequenter lotus, calx uiva extincta & lauata fortiter, ouorum albumen tenue. Similis autem naturæ est & uitellus eorum.

SIMPLICITER DESICCANTIA.

AGNI folia & semen, graminis radices mediocriter, adiantus, id est herba capillaris, semperiuia utraq; populi flores & resina ipsius, sambucus, ebulus, amaranthus, reuma desiccant potata. Brioniæ radices, egyptiæ sicca folia, de pyris cataplasma impositum mediocriter, aristolochia, asparagus achantis, asparagi, asphodeli radices, & magis usta, aut cinis ipsarum, balaustion, sianapis, rubi non maturus fructus, bulbis cataplasmati, pioniaæ radices, lauri folia uehementer, & magis baccæ, roboris omnia loca, & ficus, oleum cyprini, laurinum, dadinum, elimus cataplasmati, eringion, isatis quam Gothi uisdī Gothis, lem uocant, tinctores herbam uitrum, salicis cortex aut cinis fortiter, canopi se, men, cardamomum, caucolis, daucus, cinis coniæ & magis de fico, cinis de brassica usta, hæc enim fortius faciunt, desiccant enim cineres. Crinon, id est liliæ folia & radix linina desup petra, lucerna omnis, lotus, nymphæ radix, omphacium, platanæ cortex & pilæ mediocriter, polypodiū, amilū, sal, nitrum, gypsus ustus, magis cathmæ oës, & omnia metallica & lapidosa, & terrestria uel usta de furno, testæ ostrearum, cribami, id est leporis coagulū & stercus omne. De anseribus uero inutilis est ex nimia acredine. Rhipus, carnes serpentium, capita sardiniarum uistarum, cornu ceruinū & caprinum ustum, castorei ossa cōbusta nimis, capilli usti, ossa sippiaæ, lana usta, gambari usti cinis, garum sufficienter, salmoria.

O DESICCANTIA

C

DESICCANTIA PRIMO GRADU.

DEsiccatius anthemis, arciotidus fructus, careus, ordeum, alpita, crocus, libanotus, foeniculum, rododaphnis, uinum album, cucumeris, melonis semen & radix sicca, foenogracum.

SECUNDΟ GRADU DE
siccatiuia.

LAna, amaracus, aspastum, anethum, balsamum, gigasta, gingidion, elaphob, cion, calamus aromaticus, libanotus, cortex & folia arboris ipsius & fructus, mastice & amel, cedri cortex, & semen, & arboris ipsius folia, misi radix, spica nardi, celtica, uinum orobum, opopanax, pix, ramnus, raphanus, scandex, fabae radix, scolymbo radix, smyrna, lentiscus, terebinthi semen & folia, lenticula, ficus uirides adhuc & humida folia, galbanum.

DESICCANTIA TERTIO
gradu.

ABrotanum & magis ustum, acatia, acorus, aloë, anethum ustum, ani si semen, arciotidus, asarus, absinthium, herba sabina, helleborus albus, epithymus, calamantis calami, eragmitis cortex usta, caibo, cassia, cedrus, coniza, libanotus & thalus, gitter, citrum, quod sub semine est, uinum quanto plus uetustissimum est, acetum, origanum, pentaphili radix, petroselinum, smyrnion, ruta de horto, prassii, ros, samsucus, eringion, hyssopus, camitrius, camaleontis utriusq; radix.

DESICCANTIA QVARTO GRADU.

CAmipites, ampilon, prassion, citrinum oleum, sinapis, ruta agrestis, callium.

MEDIAE DESICCATIVA ET
humectantia.

Graminis radix supersparsa oleo dulcissimo.

HUMECTANTIA PRIMO GRADU.

Elxine, buglossa, liquirizæ succus, lactuca mediocriter, olivarium foilia, acetum mediocriter, meleas, persicus fructus, ammanitas, oleum roseum, satyron, stractiotis quæ in fluminibus & stagnis nascitur.

HUMECTANTIA SECUNDU GRADU.

POrcacula, atriplex, bletus, coloquintida, meleas, ammoniacus, fructus cumeris, melones, lenticula quæ super aquarum fit stagna.

QVAE AQVOSA INFRIGIDENT
tertio gradu.

ACacia, elxine, idest uitrago, porcacia, plantago, atriplex, rubi folia, bletus, bronia maritima, glaucion, dorignion, lactuca, uiolæ folia, curbita, cotyledon, conion, piccius arbor, malua domestica, papauer, men, malva præcocia, amanithas, platanus, policonon secus fluuium proxime nata, sidertitis, cucumeres qui comeduntur, succus elxicinus, tribulus, lenticula super aquas nata, psylli semen, plumbum.

QVAE SINT LEPTOMERES,

id est, extenuandi habentes uirtutem.

ABrotanum ustum, agnus, scandex, populi folia uel flores, agaliphis fructus & folia, acorus, amomum, balciclæ radix, bronia, artemisia, palma, aristolochia

Aristolochia, plantago sicca, asphodeli radix, & magis usta cinis, balsamus, rubi radix, herba sabina satis, liquiritza radix, diptamnus, dragosteae radix, oleum uetus, oleum cicinum, elapholus, euphorbiu, fermetum, sa'icis opes, calametis, calamus, aromaticus, calamini fragmitis cortex usta, cassia, cappasian, costus, citriæ oleum, cocomelas, gumen, mastice, gitter, opium cyrenaicum, opobalsamum, ruta passa, pisti, eniæ fructus, propuleus, terebinthina, oleum roseum, sagapenum, samsucus, sylois, calx uiua, hyssopus, salis flos, nitrum alcioniu, arsenicon ustum, gypsum ustus, sulphur, cathmia, pumex assios, asia petra flores, melaneria, mileus, calcaneum, chrysocolla, scandex, ficus, adeps leonis, & pardi, & irenis multum extenuat, castoreum, ossa sippia & lana usta. Hycinan Afri uocat belua similis leonem. Hoc *Hycinas.* animal timet canis, ita ut si eum inuenierit ut ouem sic comedat. Vnde fugiunt cum canes, & in domibus se abscondunt. Quod si dentem eius habeat homo secum, non eum canes latrant.

IMPINGVANTIA HVMECTANDO.

Plantaginis radices, balaustion, zigasta, zinziber, cepe, cucumeres, lipidus, omnes rores, stipteria.

STIPTICA ET CONFORTATIVA.

Cassia, galla asiana, omphacium, tigadus, dactyla, absinthium.

QVAE DIGERANT MITIGANDO.

AMomus, uua domestica, cera, iadanus, glutites, crocus, libanotus, spica egyptia, mastice, oleum roseum, myrrha, storax, galbanum aut alica, butyrum, hyssopus, adeps porcinus.

QVAE PVSS FACIANT.

BQuæ calidæ fomentum adhibitum, hydroleum tepidum, oleum calidum, farina tritcea, panis triticeus, alica, adeps porcinus & uitulinus, butyrum, libanotus, pices, resina.

QVAE M ALAXENT.

MAlaxat caprinus sceus & adeps pullinus, & anserinus, & hircinus, & taurinus, medulla ceruina & uitulina, amoniacus, storax, galbanum, bdellium, oleum sicyonium, & liliacium, & oleum dulce, antemis, euiscit radices, cucumeris agrestis radix, & maluæ agrestis folia, & de arbore maluæ, mastice, cera, terebinthina, colophonie, opopanax, ripes de statuis, sterlus humanum, butyrum.

INDVRANTIÆ.

SEmperiuua, porcacia, psyllion, lenticula, & desuper aqua quæ in stagnis generatur, uua canina. Indurat autem quæ sicca fuerit herba, & humectat ea ipsa si abundanter in usu sit, & euacuat ea aut coagulat. Ea quæ calefit, medicamente resoluere oportet, & malaxare de supradictis.

QVAE HVMORES EXTRAHANT PER OS.

PErerum, lappacium, capparis, fucus maturæ, dadinus, mel, papauer, absinthium, origanum, raphanus, uua sine semine & caciæ, sinapis, helborus albus, elaterius, thymus, sal, omphacium, anisus, piper, coconidius, daphnidis, balsamus, amoniacus, storax, fex sicca usta.

QVAE SINT QVAE PER NARES
educant.

ELaterius, betæ succus, cyclamini cortex de radicibus, mel, thlaspeus, coco nidius, anagallis, amonitis, helleborus albus, omphacium, prassij, edera folia mollia.

C

QV AE DE OCVLIS ED VCANT LA^E
chrymas uel humores.

MEl, hyssopus, oleum uetus, anagallis, oleum laurinum, oleum nardinum,
cassia, costum, opium, sagapinum, daucus, apium, malo granata, amygdala,
prassum, helleborus albus, anemonis, ruta, castoreum, litus emathitis,
anserinus adeps, fel, smyrna, calcitheus, sulphur, stipteria, scistis, ossa sippia,
& cortex libanotus, squilla, amoniacus, & sine omnibus alijs omphacion.

QV AE PER AVRES ED VCANT.

MEl, piper, bouis fel aut tauri, mercurialis, linogustis herba succus, cap-
paris radices, cocconidiu, bdellium, cassia, galbanus, helleborus albus,
omphaciu. QV AE CONSTIPATA RELAXENT
& purgant.

ANagyrops, folia sicca & radicis ipsius cortex, agaricus, agaliphis semen,
amygdala amara & arbor ipsa, adiantus, asari radices, pulegium, dra-
gontea, daucus, gentianae radix, sinapis, cicer nasutus, eupatorium sine calefa-
ctione, thymus, carica pinguis, calamentis, cassia, coccimeleas, gummi, gitter,
ruta, cucumeris, melones, spondilion semen & radix, stycas, camitrius, & que
cunq; alia in se continent amaritudinem qualitatis.

QV AE EXTRAHANT.

CApræ sterco ustum & non ustum, & ostracondernion, & omnia de ostreis
& de sippijs ossa, ecinoni utriq; ustum, aut cinis eorum, serum de lacte, mel,
brioniae radix, amygdala dulcis, & ipsa arbor, anagallidis, amniones omnes,
Daristolochia longa, plantaginis folia & magis succus, ireus, asparagus, mia-
cantinus, staphisagria, asphodeli radices, atraphis semen, absinthij succus, bul-
bus superpositus, hellebori utriq; elxine quæ & perdicion, salicis opes, cala-
mi fragmiti radix cum folijs sufficienter sine acredine, centaurea minor, & suc-
cus eius, brassicæ, critmon, ordeum mediocriter, liliifolia & radix trita medio
 criter, fabæ caro, lapsami cataplasmati, licinon de petris, uiola alba, omniamis-
on, platani cortex, de radicibus mediocriter, porrum cataplasmatum, propule-
us mediocriter, ptoleæ & folia, & cortex, & radix, ptisanæ, terebinthina plus à
 mastice, sagapinu mediocriter, cucumeris, melones omnes, cucumeris agrestis
 radix, smyrna, beta, titimali cortex, camipiteus, alconia, omnis terracia & sa-
mia mediocriter & cretica, cathmia, pumex ustus & non ustus, lithargyrus
 mediocriter, ismeris terra de furno, cornu ceruinum & caprinum ustum.

V R I N A S M O V E N T I A.

Apium, petroselinum, foeniculum, daucus, smyrnion, anisi semen, asarus,
acoron, asparagus, basilicon, & oximyrsinon, bdellium, bronia, terebin-
thina, calamus aromaticus, careus, carpesia, caucalis, costum, cyminum, cyperi ra-
dices, liuisticum, mion, spica nardi, celtica, ruta, polion, filis, cucumeris, melo, pe-
pones, scandix, alliū, pastinaca, squinoantum, thermentum, carpus, absinthium, her-
basabina, sanguinē per urinas deducit, eritrodani radix, id est rubet, urinam
pingue & multam & utiq; sanguineā educit, capinus cholera per urinam educit
multā, orobus, amplius assumptus sanguinē per urinam educit male olentem.
Si quis eum in uino coctum bibat, male olentes sanat urinas, & mulsa, & oxi-
mel, & uinum tenuie, & aquosum.

QV AE PER VRINAS DE SPLENE ED VCANT.

Titimali semen, caragium, gitter, cyminum, thymus, ampilon, acriæ radix,
capparis radices, scolopendron, cithisus, dragontea, aristolochia radix,
origanum,

A origanum, polion, coloquintida agrestis, bronia, ciclaminus, porcacla, scorpi
on maritimus extensus suffocatus in uino, ipsa infusione uini potata.

QVAE PER VRINAS DR E P A= te educant.

A Gni sperma, dauci folia, scenicum, balsamum, capnion, anisus, dacty
lorum ossa, lauri folia, absinthium, smyrnion, anagallis, menta, enancij
opos, sylphiū, eringion, trithion, decoctio, asarus.

QVAE PER VRINAS DE RENIBVS
educant humores.

A Pijs semen, piper, pastinaca, porrus, cnicus, broniae radicis cortex, gra
men, ossa sippix, sulphur & cicer albus.

QVAE PER VRINAM DEDUCANT
de thorace humores, quæ adaperiunt omnia.

Nucleus pineus totus uiridis, pituita, butyrum, castoreum super carbo
nes suffumigatum, & in os tractum intrinsecus cum spiritu. Iuuat autem
maxime & pulmones & cerebri humida & frigida existente distemperatia: Spi
ca nardi capitum & thoracis reuma desiccatur; edicit autem ex pulmonibus in electua
rio data & in catapotis cnici semen, daucus, papaver niger, thymus, raphani
succus, sinapis, anisus, fisanus, erisimus, squilla, orobus, cucumeris semen, pi
per, ruta, nardus, sulphur, polion, aron, dragontea, costum, sulphur, smyrnis,
lauri baccæ, interiora capparis radicis, cortex, amygdala amara, ponia, castore
um, abrotanum, sthorax, bdellion, sylphiū, uua passa sine semine, nucleus pineus,
omphacion, aristolochia, galbanum, prassion, eringij radices.

RENES PVRGANTIA QVAE
abscindunt omnia.

P Lantiginis siccæ radices & folia & semen eius, asparagus, miacanthinus,
licides, id est poniae radix, cicer, amygdala plus.

QVAE RAREFACIANT COR= pus, uel cutem.

Camimola, euistus, cucumeris agrestis radix, oleum uetus, abrotanum ustum.

QVAE ADAPERIANT ET ORA FACIANT.

O Mnia quæ sunt acra, animonis herba omnis, fel taurinum, allium, cepe,
irini & amaracini olei feces.

CONDENSANTIA CVTEM CORPORIS.

A Qua frigida, semper uia, porcacla, tribulus uiridis, psyllion, lentiscula
quæ super stagnantes nascitur aquas, & ut simpliciter dicam, quæcunque
infrigidare possunt, & non desiccatur.

PVTREFACIENTIA CARNES, ET ADVENTIA.

A Vripigmentum, sandaraca, chrysocolla, pitis campi, cidria, gitter, hellebo
rus niger.

QVAE PVRGENT VVLNERA.

E Laterius, cucumeris agrestis radix, ocra, mandragora, siue petra asis flos,
& de ostreis omnia uista purgant quæ carnis supercrescent ulceri medio
criter, aut similiter utræ uista cum toto corpore: sed & ematitis lapidis puluis tri
tus tenuissime, & uiolæ folia, & faba, & lipidis calcus, & chrysocolla.

QVAE CICATRICENT.

S Tipteria, galla afiana, omphacius, calcuci caumenon, & maxime lotus, ma
logranati cortices siccæ, scorpa plumbi, lithargyrus, molipdinus, id est plum

Cbum ustum, cochlearii testa omnia, purphira, uitrum, pumices, speculare ustum, psithium, pompolix, spondilion, chrysocolla, stimeus ustus, desfrigis, sarcocula. Hac omnia praedicta utique si aspergantur vulneribus cicatricant.

MORDICATIONES FACIENTIA.

CAlcantum ustum, cathmia, lapidis calcus & ferri aciarum ferrugo. Sed & ius, & calx uiua si urantur & assentur, sine mordicatione inducunt cicatricem.

QVAE VLCERENT.

RVbi canini folia, beta, allium, pulegium, hyssopus, origanum, sippia, asphodeli radix, appii semen, & quercuncus sunt salsa & acra & amara.

QVAE ADVRENT.

CAntarida, desfrigis, sex usta, acetum, animonis, dactyli flores, allium, cinis fuscis, nitrum assuum, calcucicaumenum, stipiteria, cyrus, testa usta, capita sardinarum ustorum, auripigmentum, caciurus, staphisagria, cocconidium, portreti radix, sinapis, calx si quidem asbestus, id est calx uiua non extincta. Nam si extincta est, scaras facit, diuturna autem minus calefaciunt: calefaciunt enim & consumunt carnes.

QVAE EVOCENT ET EDVCANT.

ANimonis omnes, anagallides utriusque, diptamnus, cicer, taspia, terrae malum, narcissi radix, propuleus fortiter, fermentum, stercora omnia, sagapenum, opium quirinaicum, opium miconum, psilphiu, radix eius, asparagi semen & uirgultorum ipsius succus fortiter, resina, terebinthina magis de alijs resinis, sulphur, stercus boum, & magisquamido herbas comedunt, calamentis cataplasmata, costum, lolium, herbum, euiscus fortiter extrahit.

QVAE SINT DIAPHORITICA.

ABrotanum ustum, agaricus, adiantus, agilops, acalisis semen & folia nimis, sambucus, ebulus, antimis, anisi semen, aristolochiae radix, asphodeli radix & magis usta, aut cinis eius, atrifex, bulbus, herba sabina, bronia, & splagnon, daucus herba, euiscus, oleum dulce uetus, oleum raphaninum, taspia, calamus fragmiti cortex usta nimis, brassica, liliifolia & radix, cithissifolia, ladanus, linogustis, malua agrestis, mastice, cia, mel persici, cimae & folia, rosa, laurus, caprifoli, opobalsamum, opium quirinaicum nimium, paliuri folia & radix, ruta, picula, prassion, thermentis, roseum oleum, sordes de statuis, patus, samsucus, cucumeris agrestis radix, smyrna, ficus ea quae acriora sunt, erimion, magis beta quae sine calore est, & fortior est alba beta, galbanus, salustus, & magis salis flos aut nitrum, alconia omnis, gessamia, iusquiamus, careus mollis, acidum lac mediocriter, nitrum, butyrum, coaguli omnes, stercus omne, hyssopus mediocriter, carnes serpentium fortiter, adeps leoninus omnibus plus & magis ossa eius usta, lana usta de utriscus illis aut cinis eius.

REPRIMENTIA.

OLiua agrestis, rosa, lentiscus, apium, semperuua, papauer, cithisus, aloes, acaliphes, gigarta, id est uva semen, pira, crocus, euiscus, thermenatum, balanum, iusquiamus, cissus, id est edera, nymphaea, dactyli, uitella ouorum assa, paliurus, hiperis, id est cauda caballina, radix cyperi, euantis, brassica discocta, coagulii leporis, spongia usta, ramnus. Multa quidem sunt & alia spistica, quae omnibus sunt cognita.

QVAE

QVAE LAC GENERENT.

ERuca, fœniculum, anetum. Dico autem herbam uiridem adhuc & humi-
dam. Smyrnion similiter & apium, sisanus, cucumeris semen, caciros, smyr-
na, polypodium, cerebrū, succus fœniculi, brionie radix, critmon, cymínium.

QVAE CONSTRICTA EDVCANT MENSTRVA.

Potata igitur herba sabina, men, ireus, ruta, calamentis, pulegium, dipharnus,
asarus, id est, bacida, costum, cassia, aristolochia. Dabis unam quanq; her-
bam cum tritici decoctione, aut fœniculi cocti cum aqua, aut ptisaniae succis. Ca-
raplasma uero impones de pulegio, gitter, smyrna hordei infusi succo expresso,
soricis simo, pocacula, adipe anserino, ptelea arboris folijs, cera, sulphure, tauro-
colla. Iterū apponuntur in pissaria seuum ceruinum recens, simul & adeps an-
serinus, fex sicca usta, fel taurinum, sal, oleum, cyperum, aphronitrum, sthorax,
absinthium, artemisia, samsucus, helleborus niger, cocomidium, herba mercur-
ialis, cymínium, fœnogracum, uua passa, exfoliata citria.

GENERANTIA SEMEN ET MOVENTIA LIBIDINEM.

DEcibis quæ nutriunt & inflant. De medicamentis autem ea quæ spumam
mouent & calefaciunt. Bulbi igitur, cicer, & faba, & ficus comestī mul-
tum semen faciunt, cynicus & satyrion, medicamenta. Cibi autem simul & me-
dicamenta sunt, lini semen, & eruca, & hijs similia.

CONSUMENTIA ET REPRIMENTIA SEMEN.

Qvicunq; infrigidare possunt cibi, uel medicamenta impinguantia & de-
siccantia & condensantia, hæc reprimunt semen, qualia sunt lactucæ &
bleti, atriplex, cucurbita, mora, melo, pepones, cucumeris. Quæ autem desificant
principalem uitutē, & non permittunt generari semen: utiq; quæ calida natura
sunt, quemadmodum est ruta. Si autem non sint calida multū magis nymphæ.

AD ELECTIONEM SIMPLICIVM MEDICAMENTORVM.

AGaricus melior est, membrana neruosa habens recta.
Acaciam existima esse modico rubeam boni odoris.

Aloës eligenda est pinguis, & non lapidea, sed lucida, subrubea, facilis ad re-
soluendum, epati similis, cito humectans, abundantem habens amaritudinem.
Nigra autem & quæ uix dicitur, bona non est.

Amoniacus autem thimiamatus, qui sine lignis est & libanotizat in glebis
mundus, densus, nullum habens odorem, & suau odore est, & gustu amaro.

Amonius autem eligendus est recens & albus & subrubeus existens, non
maturus, aut spissus. Resolutus autem & diffusus, semiplenus, similis botro, gra-
uis nimis & boni odoris, absque apertione & acer in gustu, simplex in colore
& non uarius. Adulterant autem eum aliqui amonio admixto.

Aspastum autem bonum est quod graue est, & cum flammeo colore, subru-
beum, spissum, boni odoris, subamaricans in gustu. Aspastum autem bonū est
purpura simile, flagrans lucore, citatū in odore graui. Nigrū autē malū est, adul-
teratur enim pice mixta absinthio. Melius enim est in Ponto & in Cappadocia
natū. Adulteratur autē succus eius fecibus olei, id est, amurca cocta cōmixta.

Bdellion optimū est, qd' gustu amaro est, tauri collo simile, & pingue in pfun-
do, & bene molle, absq; ligni mixtura & sordibus odoratum simile thimiamatis
unice. Helleborus niger eligendus est boni nutrimenti, nonsatis interioris
habens, acer in gustu & sordidus. Talis autem est, qui in Helicone, Parnasso &
Italia nascitur. Euphorbium eligendum est, quod perlucidum est, & acre.
Eriscus bonus est prasino colore intrinsecus, extrinsecus autem subrubeus, ni-
hil in se habens asperum, aut furfureum: Colligitur autem de queru arbore,

C **qua** folia habet similia melario, & pyro, & ex alijs arboribus.

Icrocolla bona est alba, & subpinguis, & non scabiosa, & cito se resoluens.

Calamus aromaticus optimus est rubeus, spissus, geniculas habens, & in multas scissuras uadit cum frangitur, repleti araneis, fistula subalba: In masticatione uero glutinosus & stipticus est, & subamarus.

Cardamomum optimum est de Armenia comizonon: Eligitur autem quod non facile frangitur.

Cassia eligenda est qua rubea est, boni coloris, corallio similis, tenuis, nitida, ualde longa & pinguis in fistulis, & in gustu dipticis & stiptica cum igne multo, uelut aromatum similis odore. Cera optima est pontica.

Ladanus utilis est qui bene olet, subuividis, bene mollis, pinguis, absque participatione fablonis arenosus: Talis autem est in Cypro factus.

Gluten, quam aluxirocollam uocant, optima est rodiacis: Est autem alba perlucida. Nigra autem qua est nitro similis, perlucida sine lignis: Ita & alba resinosa & pinguis inutilis est.

Costum optimum est arabicum, album & leue, & habens proprietatem odoris. Secundum autem est indicum, quod & leue est sicut ferula. Tertium est siriacum colore píxode, repercutiens in odore: Optimum est quod recens est & album, & plenum est omnino, spissum, siccum, gustu sine mordicatione, ignitum. Adulteratur autem radicibus enulæ mixtis: Certa autem cognitio eius est, quia neque ignita in gustu est enula, neque bonum costi odorem, neque uirtutem & repercuSSIONEM costi representat.

Crocus optimus est coricius regionalis, recens & bono colore, modicam subalbedinem habens, & tate in longitudine non se frangens.

D Crocomagma autem fit ex crocino mero, aromaton expressum & factum. Est autem hoc bonū quod bene olet. Catafmyron, graue, nigrum, sine lignis.

Cyperum optimū est quod graue est & spissum nimis, & difficile frangitur, asperum, longum, bene olens, cum quadam acredine. Iumelinum optimū est.

Libanus precedit masculus: Rotundus autem albus intus, pinguis. Adulteratur autem ex pituina resina.

Glumen facile cognoscitur, quod gummi non exardescit: Suffumigatum enim resinam in fumo spargit.

Libani cortex differt, quod plenus est & pinguis, odoratus, recens, leuis, nitidus, & licet leprodis aut membrana habens: Adulteratur autem mixta cortice pinii, aut picea. Probat autem ignis: suffumigantes non accenduntur. Libanus autem accenditur cum odore suaui.

Malana trifolia bona sunt, quod dicitur folium, si sit recens & subalbidum in ipsa nigredine, & non facile se frangit, sed integer est, repercutiens odorem, & permanet odor nardi similis & in gustu neque falsoidine.

Mellilotus optimus est atticus, & qui in cígico nascit̄ coricizon, & boni odoris est. Papaueris succus, id est, opium, optimus est spissus, & grauis in odore, somnum faciens, amarus in gustu. Facile soluitur in aqua, nitidus, albus, non asper, neq̄ thromboidis, id est, neq̄ conglomeratus in resolutione, neq̄ indurescit in sole positus, incensus, & ad lucernam accensus terrestrisflammam mittit. Adulterant autem eum glaucium miscentes, aut gummi, aut lactucæ agrestis succos. Si glaucium admixtum habet, crocizat in resolutione. Si autem lactucæ agrestis succus miscetur, odorem non habet similem, & asper est. Quod si gummi mixtum est sine uirtute imbecillis est & perlucidus.

Medulla optima est ceruina, post uitulina, deinde taurina, & post has caprina &

Ana & ueruecina. Bona autem est aestate collecta, aut autumno: Alijs enim temporibus cum sanguine mixta est. Curatur autem medulla recens malaxata superflua aqua, & sic cum linteo colas similiter & lauas, donec aqua munda fiat: Postea in duplice uase remittes & leuabis cum penna supernatantes fordes, & purgatam mittes in mortario, & cum se gelauerit repones in teste uase subraso diligenter. Si autem non curatam reponere uolueris, sic facies omnia, sicut de pulli, aut anseris adipibus fit.

Nardus tacius bona est, leuis, recens. Policonus rubeus colore cum odore suauis nimis, & cyperum similat in odore, modicam habens spicam, amarus in gustu, & linguam desiccat permanente odore. Venditur autem infusus, quod cognoscitur ex albumine, & spica.

Omphaciū eligas rubeū & bene tritum, stipticū ualde, & mordicans linguā.

Onix bona est de eretra gummi similis, subalba, rubra, pinguis.

Panacis radices meliores sunt, siccæ, & albæ, & rectæ, & non comestæ, & ignitæ in gustu, & aromaticant.

Opopanax differt, amarior est in gustu, interior alba, exterior crocizans, pinguis, lenis, & cito se frangens, & cito se soluens, & graui odore est.

Piper longus eligitur, qui grauis est & plenior, & niger, recens & non furfuraceus, & grano maiorī.

Peucedanum optimum est quod fuerit grauiori odore, calefaciens gustu.

Polio quod rectum fuerit utilissimum est.

Resina terebinthina utilis est quæ lucet, uitro similis colore, & bono odore.

Smyrna prima est troclites, minea, subuiridis, & perlucida existens. Amo meas uero quæ uocatur eligitur recens, leuis, uno colore omnino, & rupta intrinsecus, habens colorem unicum. Item & amara est, & bene olet subacrum. Grauis autem & colorem picis habens, inutilis est.

Stactys autem smyrna bona est, quæ boni odoris est, & nitida, & non est mixta oleo. Stirax differt, quæ est rubea, & pinguior, & resinosa, thrombos habens subalbos, permanens in bono odore quamplurimo, & cum eam malaxas, emituit ex se humorem mellis similem.

Terebinthina autem resina bona est, quæ perlucida est colore, & odorata est.

Tracacantum lachryma radicis excisa existens: Differt enim quæ est perlucida & leuis, & tenuis, & munda, & subalbida.

Iusquiamus autem utilis est in usu, qui album habet florem, & semen album. Si autem non inuenitur talis, uteris flavo: Nigrum uero reprobare oportet.

Galbanus optima est libano similis, condrodis, & munda, sine lignis, habens aliqd de semine & ferulā mixtā, nō grauis, quæ neq; nimis sit humida, neq; siccā.

Agnus eligenda est lenis, & colore nō æqualis, & sine lapide, & odore bono.

Arsenicon optimum est placidum, auro simile, picis squamas similes habens. Gisara pilotidus nigra prouidenda est.

Peucedanis longa inferenda est pellucida.

Defrigis eligendus est qui est in gustu aramenti. Stipticus & desiccatius est multum in lingua.

Sulphur optimum est thinapiron, id est, quod ignem non est expertus. Flammeum est colore, & pellucidum, & non est lapidosum: Accensum autem uiride. Indicum uero optimum est cianoide.

Cadinia optima est botriodis, quæ uocatur grauis: Media habet epiphona botriodi colore cinereo rupta deintus, inter fros & lotus. Secunda autem est ex insecus cinizosa; Intrinsecus autem diareses similans onycem lapidem.

C Pumex perquirenda est leuis, & non multum uacua, scissa, & non lapide mixta, adhuc magis & alba.

Lithargyrus optimus est chrysites qui uocatur, & qui pellucet.

Lapis acius eligendus est pumicis similem colorem habens, inflatus & leuis.

Lapis emathites optimus est, qui bene teritur. Durus autem, solidus, inutilis.

Lapis Gabatis perquirendus est qui cito apprehendit, & in odore aspaltizat.

Magnes autem lapis optimus est, qui ferrum trahit, & colore est cianeus, spissus.

Melanteria differt, thicio cus, ualde aequalis, munda, & in tinctura nigra, cito uirtutem habet causticam, similem ireus multum.

Sinopitis optimus est grauis & spissus, epatizosus, similans lapide suo colore.

Misi assumendus est cyprinus, chrysophanes, durus, & in tritura chysizon. Sic est causticus, aut calcitheus siue prorica confectione.

Molipdina bona est, quae est lithargyroidis, flava, sublucida, & rubea cum teritur. Lauata uero & usta habet simile lithargyro.

Nitrum eligendum est leue, & roseo colore, aut album colore in tritura.

Aphronitrum optimum est, quod uidetur leuissimum & placidum, facile teritur, & in porphyrum est spumosum.

Pompholix optima est Cypria: In aceto autem infusa, decurrit.

Sandaraca prouidenda est prouincialis, & rubea, bene florescens, munda, & cinnaborifans colore. Adhuc autem sulphurea, & opophoran habens.

Sthimeus optimus est lucidus & relucens, in fractura terrestris, aut pinguis, facile se frangens.

D Stipteria optima est scistis, recens & alba nimis, & sine lapide.

Icore prouidenda est Aegyptia, & cum frangitur nigrior uidetur, fenestras multas habens, & subpinguis est, & substiptica: fex adhibenda est maxime de uino Italico ueteri, aut simili huius.

Calcucicaumenus uetus bonus est, rubeus, & in tritura cinnabari similis, iauatur sicut cathimia, quarta uice in die mutata aqua.

DE MENSURA CERAE ET OLEI.

Acopa unguenta. EA uero quae dicuntur acopa unguenta si uolueris facere, quartam partem mittes ceræ in oleum. Si autem uolueris in fracturis humidum cerotum facere, duplum mittes ceræ. Si autem medicamen emplastrî uolueris facere, aequali penso ceram & oleum mittes.

DE MENSURIS ET PENSIIS.

Amphora. TALICA amphora habet sextarios XLVIII. Sextarius habet libram 1 &

Sertarius. VIII. Sextarius mellis pensat libras II & 2 XI III. Congius habet 55

Congius. VI. Sextarius habet heminas duas, cyathos duodecim: Olei pensat librā I &

Hemina. 5. Hemina habet cyathos VI. Vncia habet 2 VIII. Olca habet 2 III.

Vncia. Drachma habet siliquas XVIII. Obolus pensat siliquas III. Oxibaphum

Olea. in mensura est hemina quarta pars. In pensa habet 2 XII, quod est uncia una.

Drachma. Cyathus pensat 1 & 5. Cheme maius habet Cyathos quatuor. Cheme

Obolus. minus habet cyathos duos. Mystron maius, cyathos habet tres. Digihi plenis

Oxibaphum. quant 2 II. Cyathus Aegyptius, id est, faba Aegyptia, pensat obolos 4, quod

Cyathus. est solidus medius. Alexandrinus autem obolos III, id est, siliquas IX. Eli-

Cheme. micus obolos duos, id est, siliquas 6. Nux auellanæ magnitudinis pensat obo-

Cyathus. los 6. Nucis autem maioris magnitudo pensat drachmas VI. Cochlear uero

Cochlear. pensat drachmas 4. Drachma habet obolos 6. Obolus habet siliquas 3.

Scrupulus. Vncia habet obolos 48. Scrupulus habet obolos 2. Ilarium est drachma di-

mida, id est, scrupulus & semis.

confienda.

Quæ coptaria uocantur platismata, si mediocre uolueris facere medicamen poloticon, id est, quod cicatricem ulceribus insanabilibus possit induce, quartam partem mittes cera cum metallicis speciebus. Si autem fortius medicamen facere uolueris, tertiam scilicet partem de cera malaxata in sole, aut ad ignem, aut in aqua calida cōmiscebis cum metallicis speciebus.

DE COCTIONIBVS E M P L A S T R O,
rum ex Antilio autore.

Mittenda sunt sic medicamenta in coctionibus medicamentorū: Lithargyrum cum oleo coquitur. Oportet autem tritum & cretum lithargyrum iterum cum oleo in mortario teri, ut molle fiat & lene, postea sic coquatur ad ignem lenem. Sine intermissione autem agitabis ab initio, ut non se inflet ebulliens ne foras exeat, & cum proximū fit coctioni, ut non solum amolentum sit, ut iam non coinquinet digitos, sed etiam mutetur ex sordibus ad colorem rubrum nīmum bene florescens, līpidus. Calculm autem coques non ab initio missum, sed medio iam cocto emplastro: Mensura autem coctionis, si satis modice mittitur, tenet colorem, & rubeum fit emplastrum. Sorī autem & defrigis, mittuntur uero & hēc media decoctionis mensurā: Mensura autem defrigis quemadmodum & līpidum continet colorem. Sorī uero nullam habet mensuram. Hēc omnia amolentum præbent emplastrum.

B Calcitheus autem coquitur simpliciter, & mensuratim coquitur rubicundius, ut dactylis simile fiat emplastrum, calcanti flos similiter calcij. Mensura autem eorum cōmuniſ est in coctione. Calcantum ergo mittitur in media coctione. Cocta uero frigida terantur, & faciet colorem emplastrum. Misum autem quando uis mittes. Propriam autem mensuram nullam habet.

Arsenicus autem & sandaracis mittuntur effecta coctione. Plumbum uero combustum in media coctione mittitur. Plumbum in albī emplastris & magis albescunt. In nigro autem ab initio, quia diu coctum amplius nigrum efficitur. Iu uero in uiridibus emplastris mittitur post coctionem. In quibus autem non in initio mittitur in olla, sed cum aceto tritum & manente in mortario, supermittuntur alia quæ cocta sunt. In nigris autem emplastris, media cocta confectione Iu mittitur. In prosopo autem emplastro ab initio mox coquitur Iu. Supertensum igitur in coctione, primo quidem nigrum superadducere oportet. Prosopum rubeum fit colore. Stipteria mittitur quamplurime post coctionem. Propriæ uero coctionis nullam habet mensuram. Sinopidis uero transfacta coctione mittitur. Cathmia & pompholix mittuntur in initio. Sal & nitrum mittuntur circa medianam coctionem. Sulphur peracta coctione mittitur. Coctio autem eius nigrescere facit emplastrum. Terra omnis uel lapides mitti conuenit perfecta coctione quamplurime. Pumicem quoq; & conchylia usta conuenit imperfecta coctione mittere: Oleum siquidem in initio non mittitur. Resina & pix liquida absque constitutione facit esse emplastrum. Oportet ergo post constitutionem in olla coctum sic mittere oleum. Cetera autem alia in media mittenda sunt coctione. Oleum autem irinum coctionem portat. Cyprinū autem & roseum minus. Alia autem ex toto olea omnino non sufficiunt coctionē, propter quod perfecta coctione mittuntur. Cera non est coquenda: Proprietas eius sola incenditur, necq; cum resina liquida, aut pice liquida sine constitutione

C constitutione manet. Sed mittitur cum oleo mundo, aut cum aliquibus metallicis coquitur, aut cum resina aut pice ante cocta, & prima coctione aliorū quæ immittēda sunt, primo ceram mittere, & postea resina frixa mittitur post ceram: Nam liquidam ante omnes alias species eam solam coques, sed non nimis, & sic mittere alias omnes species. Piculam mittere ante omnes mensuras, liquida quidem coquenda est, ut consistat, sicca autem maxime cum aceto coquitur, ut nullo modo bulliscat, leuet, aut infletur. Asphaltum coquitur missum ab initio. Non oportet autem teri id, asperitatem habens in colore. Similiter autem si teratur fortiter, & coquatur in aceto, non agitabis, ut nullo modo bulliscat aut leuet. Propuleum malaxari oportet & coqui. Sub coctione autem nullo modo ardeat. Amoniacum in media coctione mittendum est. Oportet autem si possibile est ut subtiliter teratur, & sic superaspergatur. Si uero nō potest, cum humore aliquo terendum est. Si autem ad sanguinolenta uulnera fiat emplastrum, cum aceto aut cum uino teratur. Si autem mollia loca sunt, qualis est anus, cum aqua. Sic molientes eum habeant infrigidatum, ut non ebulliscat.

Opopanax mittitur multum postea post amoniacum. Omnino autem modicum bulliat. Oportet autem & hoc ante teri cum uino aut cum aceto. Galbanum bullire nullo modo fert. Sed quando amolementum fit emplastrum, id est, *emplastrum*, quando iam non coquinat digitos, leuas ab igne, & malaxatum eum mittere.

D Sagapinum uero contundis in pila, & molle factum commalaxa cum emplastro approximatū igni. Aloë superasperges post decoctionem, & sic commisces. Opium myconum infundes ante unam diem in aqua modica, & ita teres in mortario, & sic postea id super emplastrum mittere. Tapsum supersparges nouissime. Bdellium tritum supersparge post cum ab igne tuleris emplastrum. Quod si pingue esse uideatur, & non potest teri, similiter quo modo sagapinum tundes in pila, & facies emplastro simile, & sic conmalaxabis cum emplastro post coctionem. Libanotum & mannis tritos post coctionem supersparges. Smyrna trita cum modico mellis, aut cum aceto, aut cum aqua, si humidum fuerit emplastrum, sic liquidam emplastro liquido supermittes perfecta iam coctione, mittere conuenienter coctum. Semen autem, & radices, & herbae, nihil bullitioni conueniunt. Tritas ergo in mortario superfundes, quæ soluta, aut liquidam sunt.